

✕

e/5

遠西醫方名物考

以

卷



吉士川文庫
3268

遠西醫方名物考標目

卷一

凡例

引用書目

秤量符

以¹乙¹百¹葛¹格¹安¹那¹

附¹乙¹百¹葛¹格¹安¹那¹丁¹幾¹生¹爾¹

黙¹栗¹薩¹催¹吐¹飲¹

雙¹聖¹散¹

乙¹百¹葛¹格¹安¹那¹酒¹



12冊
499.2
Em-3
1

葉26

18e 15 No. 1426

榛齋宇田川先生著

初篇

遠西醫方名物考



風雲堂藏版

青藜閣發兌

乙百葛格安那排毒飲
托歇爾私發汗散

硫黃

附 華石飲

硫黃華

硫黃精

硫黃拔爾撒謨

拔爾撒謨 卒爾
布兒斯 同シ

遠西醫方名物考

凡例

一從來我邦ニ於テ遠西ノ醫術ヲ唱ル者。大率外科者流ニ過ズ我王父槐園先生西說内科撰要ヲ著ハシコレヲ首唱スルニ及テ人ニ實ニ西洋内科ノ術アルヲ知ル。爾後四方俊秀ノ士其緒ヲ繼テ講明シ遂ニ海内ヲ風靡ス。然ルニ其病因證治ノ說皆人身解剖ノ實測ニ據ルヲ以テ必ズ先ツ内景ニ通曉セサレバ猶權衡ナフシテ錙銖ヲ較ルガ如ク竟ニ其真面目ヲ領解シ難シ。是ニ於テ家嚴榛齋先生醫

範提綱ヲ著^{アラ}ハシ遠西内景説ノ綱要ヲ述ベ且銅鏤
 ノ圖ヲ附シ併^ズセテ世ニ公ニス。苟モ遠西ノ醫術ヲ
 學ブ者。是ニ蹟^{ツヒ}テ講究スレバ略^ホ其原^{モト}キ據ル所ヲ考
 ルニ足ル。然^レモ藥品方劑製煉諸術ノ名物未ダ詳明
 ナラザレバ臨診施治ノ際^{シキ}靴^{クツ}ヲ隔^ヘテ痒^イヲ搔^カノ憾ナ
 キヲ能ハズ。世ノ進^ムテ其説ヲ究^ムント欲スル者。亦是
 ヲ以テ口實トシ功ヲ半途ニ廢スル者アリ。家嚴^{シヨク}竊
 ニ是ヲ憂ル^ルアリテ和蘭藥鏡ヲ著^{アラ}ハシ今又此篇
 ヲ述^ブ。然^レモ其品類ノ浩繁衆多ナル悉ク包羅シテ
 臚列スルニ違^イアラザレバ唯古今多ク歷驗シ試効

一 彰著ニシテ日用^{カク}闕^クベカラザル者ヲ辨晰シ國字ヲ
 頭韻ニ掲^ゲテ各自ノ名物ヲ排纂シ檢索ニ便リス
 猶其遺漏スル者ハ後篇ニ載ス
 一 藥品和産アル者或ハ漢土及ビ應^シ帝^テ亞^ア地方。南海諸
 島ニ産シテ從來清船載^セ來リ名稱著明ナル者ハ和
 蘭藥鏡ニ載ス。然^レモ製煉シテ其固有ノ性功ト併^ズセ
 考フヘキ者^{肉豆蔻、罌粟、大麥ノ類}或ハ本邦ニ産スレ^モ西
 說ト比較シテ考證スベキ者^{羯布羅亞爾、鮮安、質沒、}
 ノ如キハ皆此篇ニ載ス
 一金石土鹽及ビ動物ニ屬スル品類ハ和漢産ノ有無

ヲ論セズ皆此篇ニ收ム。是レ製煉ニ關ル者多キガ
ユ正ニ先ツ其性質主能ヲ覈知セザレバ其製劑ノ
効用モ辨識シ難ケレバナリ

一藥品和漢ニ産スル者ハ漢名ヲ舉グ。唯本邦ニ産
シテ漢名未ダ詳ナラザル者ハ和名ヲ舉グ。和漢ノ

産未ダ詳ナラザル者並ニ方劑器械等ハ對譯シテ

原名ヲ舉ケ草木ハヒ百葛格安那阿利機ノ類方劑

械ハ列篤或ハ直譯義譯シテ其名ヲ定ム葱ノ類方

兒多ノ類劑ハ鎮痲散ノ類製劑ハ霸王鹽ノ類器械ハ地管ノ類ナリ

一和漢ノ産未ダ詳ナラザル品類ハ其產地。形狀。性味

主療等殊ニ詳ニ是ヲ載ス其要スル所三アリ。一ハ

和漢ノ物産中遷ニ充ツベキ者ナキヲ以テ後來ノ

考證ニ備ヘ。二ハ其性味主能ヲ考究シ己ヲ得ガ

ルノ時ニ臨テ代用ノ品ヲ擬スベキ一助ト爲シ。三

ハ其舶來ノ品ヲ得ルニ當ツテ眞價良否ヲ辨識ス

ル龜鑑ト爲スナリ

一藥品唯西洋ニ産シテ和産及ビ漢産ノ充ツベキ者

ナキハ是ヲ西籍ニ參考シ代用ノ說アル品ハ其最

モ的當ナル者ヲ擇テ各條ニ附ス。其說ナキ者ハ強

テ代用ヲ擬セズ舶來ノ品ヲ用フベキヲ記ス。讀

者或ハ謂ン邈矣遠西ノ物産設使神驗奇効アリ
 尋常得難キ品ナレバ畢竟畫餅ニ同シト予熟コレ
 ヲ察スルニ凡ソ物品ノ性味主療未ダ詳明ナラザ
 レバ則己矣既ニ詳明ニシテ大患危癘ヲ救ノ奇効
 アルキハ人誰カ是ヲ需メザラン需メテ己ザレハ
 必ズ致ザルヲ無シ何者方今昇平日深ク仁風遠
 ク異域ニ洽ク每歲洋船方物ヲ貢獻シ來テ互市ヲ
 請ヒ奇器珍玩ト雖モ坐シテ致ザルヲナシ況ヤ生
 民必用ノ藥品ヲヤ假令雜腹蘭的里亞加技爾撒謨
 的列竝底那龍腦礪砂ノ如キ往古ハ曾テ輸ザル品

ナレモ効驗世ニ顯レテ人々購リ求ルニ隨ヒ今既
 ニ通用闕ベカラザル品トナリ或ハ幾那ノ如キモ
 我輩西說ニ稽ヘ試テ治驗ヲ稱シ且崎港在館ノ和
 蘭人亦屢用ヒテ危疾ヲ療スルニ及テ世人漸ク其
 効用ヲ稱シ彼亦近來齋來ルヲ虛歲ナク遂ニ濟生
 ノ一奇品ニ充ルガ如シ故ニ今其得難シトスル藥
 品モ篇中説ク所ノ効用ヲ詳ニシ購リ求メテ試ル
 ニ至ラバ遂ニ日用常供ノ品タルベキヲ猶上ニ列
 スル諸品ノ如クナルベシ彼固ヨリ四方ニ航海シ
 テ互市ヲ事トス凡ソ萬國ノ物産有無相通セザル

ハナシ故ニ我輩遠物奇品得難シト思ヘル者彼ニ
 在テハ尋常日用ノ品居多シテ輸シ易キニ論ナシ
 然レバ只其乾曝製煉ノ品ノミナラズ或ハ種子根
 莖ヲ彼ニ得テ培植シ或ハ金石動物ノ如キモ彼ニ
 徴シテ主療ヲ明ラメ我物産ヲ擴充スルニ至ラバ
 亦開物濟生ノ一助ニ非ズヤ然ルニ今其未詳ノ藥
 品毎ニ代用ノ說ヲ論スレバ世人其得易キニ慣テ
 終ニ彼ニ需メズ彼亦齎來ルノ意ヲ絶テ畢世是ヲ
 輸スノ日無ルベシ是此篇強テ代藥ヲ擬セザル所
 以ナリ

一和蘭古ヨリ所謂ル局方ノ書アリテ歷世經驗ノ方
 劑ヲ収録スル極テ多シ故ニ方劑及ビ製煉術モ
 古今ノ差別アリ蓋シ醫術ハ經驗ニ據テ發明スル
 所ノ日新ノ業ナレバ歷代ノ名哲相繼テ親試實驗
 シ日ヲ逐ヒ年ヲ累子テ漸ク精巧ヲ極メ近世ニ至
 テハ遂ニ多味冗長ノ古方ヲ廢シ煩擾迂濶ノ製法
 ヲ祛キ更ニ簡便捷効ノ方法ヲ立ツ故ニ古今方名
 同フノ藥品製法共ニ異ナル者アリ今此篇ニ載ル
 所ハ務テ近來撰著セル方書ニ取テ集録ス技太及ビ
 亞謨斯の的の爾の達の廢の幾のハ無稽亂雜新古擇フナキノ

弊無ランカ

一西洋説ヲ按スルニ凡ソ萬物ノ地上ニ産スル者ヲ

分テ三類トス。即チ動物。植物。山物金石土鹽ノ類ヲ總稱スナリ

是ヲ造化ノ三富ト謂フ。就中植物ニ於テハ古今ノ

名哲特ニカヲ用ヒテ其品類ヲ研究シ種族ヲ分ツ

極メテ精覈ナリ。其人ハ孔コ刺チ需ス斯ス健ケン斯ス涅ニ律リ私シ人人

最モ上世ニ在テ草昧ヲ闢ヒキ。爾後木里索肉私刺愈

私ス蒲イ爾ル花ハ歌カ多ト兒ル涅ニ福ホ爾ル篤ト林リ娜ナ私ス律リ兌ド弗フ以イ上上皆皆等等

ノ諸賢發明。日ニ新ニノ遂ニ精微ヲ究メ各一家ノ

説ヲ立ツ。林リ娜ナ私ス特トニ其巨擘タリト云。其説或ハ心

鬚ノ二蕊ニ據リ或ハ花瓣ト萼トニ由テ族ヲ分チ

種ヲ別ツノ差異アレ也。唯花實ニ蹟シヒテ是ヲ分晰

スルニ至テハ皆一揆ナリ。學者先ツ斯ノ如キ一科

ノ學アルヲ知テ此篇ヲ讀ニ非レバ草木ノ形狀

ヲ説クニ至テ漢人未ダ言ハザル異様ノ名目怪ニ疑

フベキ者アリ。假令タトバ豆類ノ花。漢説ニハ概ノ蛾形

ノ如シト云。西説ニハ是ヲ分テ旗瓣。兩翼。幾兒キノ三

部トスルガ如キ區別命名ノ同シカラザルヲ準メ

知ルベシ。又唇花。半花。繖花。繖子。猫兒。或ハ脂類ニ趨ゾ

謨ト華爾斯ヲ分ツノ類。枚舉ニ勝ス。予別一是ヲ撰

述ス故ニ斯ニ贅セズ予嘗テ苦多尼訶經ヲ述テ植
 物究理ノ大綱ヲ論ス就テ考
 シフベ
 一篇中或舶來或洋船ト云者皆和蘭ノ舶ヲ斥スナリ
 一篇中載ル所ノ人身内景ノ諸器名稱ハ皆醫範提綱
 ニ載ス參考ノ知ルベシ
 一篇中舉ル所ノ病名諸症ハ皆增補重訂内科撰要及
 ビ和蘭藥鏡ノ凡例ニ出ツ就テ考フベシ
 一原書載ル所藥劑ノ方名ナキ者ハ今權ニ其名ヲ命
 シ學者ヲシテ施用ノ際記認シ易ク且稱呼ニ便ナ
 ラシム

一篇中按字ヲ冠スルハ家嚴各條ノ譯說ヲ辨晰ノ其
 考ル所ヲ述ルナリ搭管見ヲ述ルハ搭按ノ二字ヲ
 舉グ

一篇中引用ノ書頗ル多シ今其書名ノ首字ヲ掲テ符
 號トシ通篇各條ニ附ス讀者先ツ左ニ舉ル書目ヲ
 閱テ其說ノ出所ヲ知ルベシ

○引用書目

肖墨廬 初篇

叔墨廬 後篇

淑墨廬 續篇

百家工藝諸術韻府書

同

同

裴

裴斯

同

揭

揭幾斯哥兒

醫學校諸科教授集成書

伍

伍乙都增補書

醫事纂要書

協

協乙斯的盧

內科治療書

斯

斯微甸

同

底

底電

同

羅

羅仙斯的印

內外科治療書

傑

傑泄兒

瘍科集成書

度

度突乃斯

生植寫真本草集成書

革

革律失烏斯

同

繆

繆模琛屈

同

涅

涅乙蘭度

同

勃

勃郎加盧都

同

物

物印滿

同著色書

戾

戾鄧局方

方劑製煉集成書

亞

亞謨斯的爾達謨局方

同

拔

拔太盼亞局方

同

布

布廉幾藥性主治集成書

依

依百乙

同

福

福烏的

同

過爾涅滿 同

一和蘭用ル所ノ藥秤固ヨリ和漢ノ秤量ト異ナリ。但本邦秤量ノ名目ヲ以テ是ヲ譯セント欲スレバ每常分釐不盡アリテ煩冗ニ堪ズ。故ニ今和蘭ニ通用セル秤量符ヲ約略ノ直ニ是ヲ用ヒ學者ヲノ簡易ニノ書記シ易カラシム

○秤量符

〔𠄎〕一錢ヲ六十二分チタル其一ニノ即チ一釐六毛強ナリ。○和蘭ニ是ヲ傑列印ト呼ブ。今稱呼ノ煩冗ニ略シテ呼ブ。Gヲ以テ符號トス。故是ヲ略メ𠄎ニ作ル

〔𠄎〕一錢ヲ三ニ分チタル其一ニノ即チ三分三釐三毛強ナリ。○和蘭ニ是ヲ須屈爾百兒ト呼ブ。今權ニ

ト呼ブ。日ヲ以テ符號トス。故ニ是ヲ略メ日ニ作ル

〔𠄎〕八錢ナリ。○和蘭ニ是ヲ穩斯ト呼ブ。今權ニ略メ

今直ニ其符ヲ用フ

〔𠄎〕九十六錢ナリ。○和蘭ニ是ヲ封度ト呼ブ。今權ニ略メ

呼ブ。此ヲ以テ符號トス。故ニ略メ比ニ作ル。右秤量ハ先輩嘗テ和蘭ノ一達刺屈末ヲ以テ我邦ノ一錢トスル說ニ準メ定ル所ナリ。然レ今西客通用ノ亞謨斯的爾達謨和蘭ノ藥秤ヲ以テ改メ較

ルニ一達刺屈未ハ我邦ノ一錢二釐五毛ニ當ル。故ニ一多ハ八錢二分ニ當リ。一比ハ九十八錢四分ニ當ル。然レバ上文各符ノ下ニ記ス所ハ其大略ニメ少差ナキヲ能ハズ。又錢以下ハ刃ノ如キハ其差甚ダ微ニメ論スルニ足ラスト雖モ錢以上積テ數十百錢ニ至レバ其差頗ル著シ。學者宜ク是ニ意ヲ加テ裁酌スベシ。

一量器及ビ撮握等ノ分量其大略ヲ知ルベクノ詳細ヲ盡シ難シ即チ左ニ列ス

(匙) 一匙ノ量。四錢ヲ容ル

食匙 同上

小匙 茶匙 卵匙 可喜匙 共ニ一匙ノ五分一ヲ容ル

文 即チ八分ナリ

商 琶布匙 大約二錢ヲ容ル

麥酒蓋 硝子酒蓋ノ名大約四十錢ヲ容ル

小麥酒蓋 硝子酒蓋ノ名大約五六杓ヲ容ル

爾蔑兒苗 硝子酒蓋ノ名大約十六錢或ハ三杓許

決爾幾 硝子酒蓋ノ名大約三四杓ヲ容ル

碗 大約一合ヲ容ル

大約一合ヲ容ル

了り十五六花攢簇ノ一窠ヲ爲ス。花後櫻子大ノ軟實ヲ結ブ。初メ綠。熟スレバ黯赤。其肉白ク汁多シ。二三ノ硬核了り淡黃色。小ナル豆ノ如シ。根太キハ鷲翮ノ如ク長一指許。硬固ニメ屈曲シ促節輪匝ノ串珠ノ如シ。中心木硬ノ白筋了り。此筋ハ功用ナシ。唯其肉ヲ用フ是レ灰色味苦。微辛。香氣微ク疏脆ニメハル華爾斯樣ナリ凡ソ草ホノ脂液ヲ趨護ト華爾斯トナリニ詳○此草數年枯レス。春月新芽ヲ生ズ。○其根上品ハ肥實柔靱。黯灰色。肉厚ク白筋細シ。末トシ硝子ニ入レ固封シ貯フベシ否レバ性力耗散ス。○赭

色ニメ促節輪起セス。皺紋多ク苦味微ク或ハ白色ナルハ用ヒテ効ナシ。一種黃色ノ者了り是レ大毒アリ用フベカラズ。
○按ニ此草。和漢產未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用フベシ。

主治 湧吐ヲ取ル聖藥トス。瞑眩少クノ快吐シ。他ノ吐劑ニ比スレバ嘔吐長ク留連セス且劇シカラズ。腹痛ヲ發セス。瀉下セス。故ニ數回施セテ害ナシ。虛人或ハ感動シ易キ人ト雖モ用フベシ。○凡ソ胃中ニ穢物敗液等。吐シ除クベキ物アルハ一味細末

トシ大人ハ白湯少許ニテ一匁ヲ送下シ能ク吐ス
服後四分時許ヲ經テ嘔氣ヲ發セバ頻ニ微温湯數
碗ヲ飲シムベシ是ニ由テ其粘穢汚物ヲ稀釋メ吐
シ易ク瞑眩必シ嘔氣盡ク止ムマデ白湯ヲ與ルヲ
肝要トス但此藥ヲ服メ後未ダ嘔氣ヲ發セザルニ
白湯ヲ與ルヲ勿レ藥力ヲ緩メテ快吐セザレバナ
リ○患者惡心噫氣アリ胃ノ部苦悶シ口苦ク舌苔
アル等ハ胃中ニ汚物アル候トス吐劑ヲ與フベシ
患者衰弱スト雖モ病毒ヲ吐シ除カサレバ害ヲ爲
スヲ逾多キヲ察スルヲ肝要ナリ偏ニ虛候ニ拘ハ

ルヲ勿レ病毒吐シ了リテ諸症速ニ解散シ精力回
復スルヲ多シ○患者虛弱ニテ瞑眩ヲ恐ルキハ此
末一二分許ヲ用フベシ或ハ僅ニ二三匁ヲ用ヒテ
ヨク吐スル者アリ或ハ此末五匁ヨリ十匁マテヲ
四分時毎ニ與テ吐スルニ至ルモ亦良或ハ吐セシ
ムベキ症數日連絲ノ休サル者ハ毎日若クハ隔日
ニ右ノ如ク少量ニ用ヒ輕吐セシムベシ或ハ此末
半錢ヨリ一錢マデヲ取り水或ハ葡萄酒ニ弓ニ浸
スヲ三日或云煖處ニ置テ一晝夜漚過メ上清ヲ取り貯テ是ヲ
乙百葛格安那丁幾去爾ト名ク是ヲ以テ四分時或

ハ半時毎ニ一匙ヲ與レバ瞑眩セズメ數輕吐ス亦
 良効アリ○凡ソ吐劑ハ胃ト十二指腸トニ凝聚鬱
 滯セル粘穢腐敗ノ汚物。酷厲ナル膽液等ヲ徑チニ
 吐シ除クヲ以テ是ヨリ起ル所ノ諸病ニ捷効ヲ奏
 シ腐敗熱膽液熱間歇熱胃腸熱痢疾等ヲ云又其湧泄ノ振蕩ニ由テ諸
 器脉管ノ運營ハミチ怠慢緩弛セルヲ警發醒寤シ以テ血
 液ヲ健運シ又胃ト皮トノ神經相連貫交通スルヲ
 以テ其湧越ノ餘勢徑チニ皮表ニ貫徹メ大ニ津液
 ヲ融溢シ汗管ヲ弛開メ蒸氣及ヒ汗ヲ發スルナリ
 ○大約吐劑ヲ處スベキ病ヲ舉レバ**第一**中毒麻痺

催睡毒。或ハ金石類ノ猛烈ナル侵蝕毒ニ中ル片ハ
 速ニ吐劑ヲ用テ盡ク其毒ヲ吐シ除クベシ既ニ胃
 腸ヲ腐爛シ全身ニ泛溢シ危症ヲ發スルニ至テハ
 吐劑ノ治スベキニ非レバナリ或ハ霍亂或ハ停食
 若クハ酷厲腐敗ノ膽液胃中ニ壅滯メ吐瀉ナク腹
 痛煩躁スル症モ亦吐セシメテ捷効アリ**第二**酷厲
 ナル酸敗液或ハ粘液留飲。壅滯鬱蓄メ發スル病ニ
 是ヲ用ヒテ吐セシムレバ徑チニ其病毒ヲ驅除ス
 ルノミナラズ又其湧泄ノ振蕩ニテ全身ノ脉絡諸
 藏衆器ノ各處ニ凝結潛滯セル膠粘液ヲ渙釋疏解

ノヨク流動セシム。即チ卒厥昏睡。喘急。黃疸。粘液様ノ水腫ノ如シ。或ハ尋常ノ水腫モ是ヲ用ヒテ間奇効ヲ得ル。アリ。○粘痰。肺ニ壅滯ノ呼吸ヲ妨ル症。假令痰喘湧盛。或ハ小兒疫效百日ノ如キハ其粘痰ヲ吐セシメテ殊効アリ。○膠固ノ粘液。或ハ結石。膽液管ニ窒塞ノ黃疸ヲ發スル者甚タ多シ。此症吐劑ヲ用テ屢吐セシムレバ其振蕩ノ勢ニテ膽液管中ニ窒塞セル物ヲ推盪搾出メ治スル。下必ナカラズ。然レ其窒塞頑固ニノ掣痛發熱嘔吐等ヲ發スル者ハ吐劑ノ治スベキニ非ズ。此症ハ刺絡ヲ施シ阿芙蓉劑及ビ油脂甘和ノ藥ヲ與テ其焮衝痛。掣急等ヲ和解スベシ。第三膽液熱胃腸腐敗熱發斑熱。惡性ノ傷冷熱。等ノ初發。惡心嘔噦。心下苦滿。舌苔口苦。等ノ症ヲ現スルハ是レ酷厲腐敗ノ粘穢汚物。胃中ニ鬱積スル候トシ。眼中黃色ヲ帶ルモ其毒膽液管ニ壅塞スル候トス。是レ皆速ニ吐劑ヲ用ヒテ其毒ヲ除クベシ。否ラズノ時日ヲ經レバ其毒盡ク血中ニ泛濫シ全身ニ彌滿ノ腐敗熱。惡性熱トナリ危險ノ諸症ヲ發メ救ハレザルニ至ル。右ノ如キ吐セシムベキ症。一次吐劑ヲ與テ盡ク是ヲ除クニ足ラズ數回

蓉劑及ビ油脂甘和ノ藥ヲ與テ其焮衝痛。掣急等ヲ和解スベシ。第三膽液熱胃腸腐敗熱發斑熱。惡性ノ傷冷熱。等ノ初發。惡心嘔噦。心下苦滿。舌苔口苦。等ノ症ヲ現スルハ是レ酷厲腐敗ノ粘穢汚物。胃中ニ鬱積スル候トシ。眼中黃色ヲ帶ルモ其毒膽液管ニ壅塞スル候トス。是レ皆速ニ吐劑ヲ用ヒテ其毒ヲ除クベシ。否ラズノ時日ヲ經レバ其毒盡ク血中ニ泛濫シ全身ニ彌滿ノ腐敗熱。惡性熱トナリ危險ノ諸症ヲ發メ救ハレザルニ至ル。右ノ如キ吐セシムベキ症。一次吐劑ヲ與テ盡ク是ヲ除クニ足ラズ數回

吐セシムベキ症ハ頻々ニ左ノ方ヲ用フベシ

黙栗薩催吐飲

黙栗薩水 五

葡萄酒 二

覆盆子舍利別 六

錢

乙百葛格安那 二

右調勻シ半時毎ニ一匙或ハ二匙ヲ用フ。暫時嘔氣

ヲ發ノ夥ク腐敗液ヲ吐ス。○乙百葛格安那ハ瀉下

ノ功ナシ故ニ膽液熱腐敗熱等ノ初發其毒胃腸ニ

在テ吐シ且瀉スルノ功ヲ取ント欲セバ韃爾答律

斯越默室屈私安贊及ヲ用ヒ或ハ左ノ方尤良

雙聖散

乙百葛格安那 末一

韃爾答律斯越默室屈私 末二

右調和ノ散劑トシ飲液少許ヲ以テ送下ス。○秋ノ

間歇熱ハ患者心下痞悶嘔氣休ズ口苦舌苔アリ

食ヲ惡ム等ノ症ヲ發スル者多シ是レ腐敗酷厲ノ

膽液胃腸ニ鬱聚メ侵刺スル候トス此症ハ初發吐

劑ヲ用ヒテ先ヅ胃中ノ毒ヲ蕩滌シ其諸症去テ後

輕キ下劑ヲ用ヒテ腸中ノ毒ヲ驅泄シ胃腸共ニ淨

潔ニメ後終ニ幾那劑ヲ與テ全治ニ至ルベシ **第四**

赤痢ノ初發屢嘔氣アリ或ハ心下苦滿攣痛等胃中

ニ酷厲毒鬱蓄ノ侵刺スル候アル者ハ速ニ吐劑ヲ用フベシ。當ニ其毒ヲ吐シ除クノミナラズ又其湧泄ノ攪擾ニテ胃中ニ潜滯セル餘毒ヲ疏釋ノ通利シ易カラシム。或ハ右ノ如ク一次吐セシ又病毒ヲ減ノ後又服量少許ニシテ數次是ヲ用レバ其鬱遏セル表發ノ蒸氣及ヒ汗ヲ驅發シ是ヨリ其毒モ亦排泄ス故ニ偏ニ下劑ヲ用ルヨリハ捷効アリ或ハ是ヲ酒劑ト爲バ其功穩ニシテ瞑眩セス即左ノ方尤良

乙百葛格安那酒

乙百葛格安那 二日

葡萄酒 一弓半

右淹シ藥氣ヲ出シ瀉テ滓ヲ去リ一服トス或ハ乙百葛格安那ニ大黃阿芙蓉ヲ加ヘ散劑トシ用ル。ト○赤痢ノ極テ惡性ニシテ大ニ虛脱セル者吐下劑。其他總テ胃腸ヲ刺戟衝動スル劑甚ダ害アリ。斯ノ如キ症ハ阿芙蓉劑ヲ用ヒテ腸ノ攪擾ヲ鎮メ精力ヲ保護メ治スベシ。第五發狂或ハ脾病様ニシテ神思沈重憂悶シ熱ナク精神錯亂ヲ兼ル症ハ數吐劑ヲ用テ腦中及ヒ腹部諸藏ニ鬱結頑滯セル膠粘液ヲ湧泄ノ間大効ヲ得ルアリ。第六此藥少許ヲ服スレバ吐ヲ發セス唯惡心ヲ催スノミ即チ其衝

動ノ運營ニ因テ粘痰凝液ヲ疏釋ノ諸竅ヨリ排泄
以壅塞ヲ開通シ小便ヲ利スル峻効アリ故ニ冒寒
傷冷毒ノ頑固ナル欬嗽或ハ痙性ノ喘急内科撰要
喘急篇
出ツ黑障眼頑固ノ間歇熱痛風流走痛水腫或ハ諸器
ノ壅塞及ビ痙樣ノ攣急ヨリ發スル諸病ニ治驗多
シ服量假令患者ノ強弱感觸ノ多少ニ隨テ半匁ヨ
リ五匁マデ適宜ニ増減ノ沙糖ヲ加ヘ日ニ一服或
ハ二三服ヲ用フ但少許ヲ用テ仍吐スル者アル故
ニ患者ノ體質ヲ察スルヲ肝要ナリ感觸甚キ者ハ
飲液ヲ用ヒズ乾末ニテ毎朝空心ニ一服宛用ヒ其

服前四分時服後一時半ノ間ハ一切飲液ヲ禁スベ
シ斯ノ如ク毎日用ルヲ一月餘ニ功ヲ成ス者多
シ○凡ソ熱病スロレ毫モ炊衝ノ候ナク唯神經熱樣或ハ
傷冷熱樣或ハ粘液質樣ニノ痙攣ノ諸症始ト子宮
病ノ諸症ノ如キ者ハ右ノ如ク此藥ヲ用ヒテ間大
効アリ或ハ其症ニ隨テ結爾蔑斯密涅刺列麝香消
石礪砂等ヲ加テ其解凝疏散ノ功ヲ扶テ尤良○肺
炊衝モ前法ノ如ク用レバヨク發汗シ且病毒ヲ化
メ痰唾ト爲シ排出ス惡性ノ胸脇痛ニ肺炊衝ヲ兼
于適宜ニ刺絡等ヲ施セ凡其脈仍強ニメ小ナル者

ハ此藥ヲ前法ノ如ク少許宛用ヒテ其毒ヲ疏解シ
尤効アリ又右兩件ノ症ニ左ノ方良効アリ

乙百葛格安那排毒飲

乙百葛格安那末一錢 亞兒尼加半錢

右沸湯三弓ニ浸ス一八分時滓ヲ去リ次ノ藥ヲ加

過爾託亞舍利別四錢 酒石葉一錢

右攪和シ一時毎ニ一匙ヲ用フ○冒寒傷冷熱ニ瘰
癧様ノ症ヲ兼ル者假令顔面黧悽脉小肌膚乾テ觸
知甚キガ如キハ右ノ飲劑甚夕驗アリ或ハ發汗藥
ノ泡劑ニ接骨木傑列及ヒ民埜列利精ヲ加ヘ兼

用ノ疏解發汗ノ功尤峻ナリ○粘稠液壅塞ノ發ス

ル病假令黃疸水腫ノ如キハ此藥少許宛用ル前

法ノ如クシヨク粘液ヲ疏釋シ壅滯ヲ驅泄ノ良驗

アリ第七乙百葛格安那ヲ以テ一種ノ發汗劑ヲ製

ス是ヲ摺歇爾私發汗散ト名ク摺歇爾私發汗ノ良

劑トス其方左ノ如シ

乙百葛格安那末 阿芙蓉精製者

孕礬酒石九氏

右調勻シヨク研和メ散劑トシ飲液少許ヲ以テ一
頓ニ服ス夜中臨臥ニ用テ尤良○或ハ乙百葛格安

那ノ末半斤ヨリ一尺マデヲ取テ阿芙蓉等分ニ和
 シ一時或ハ一時半毎ニ用ルモ亦ヨク發汗ス○此
 劑ハ服スルニ臨テ製スベシ製シ貯レバ性功耗散
 ス○劑中ノ孕礬酒石ハ瓦^カ字^ク別里鹽ヲ代用ノ効同
 シ○荏苒タル傷冷毒痛痛風腰^カ脚^ク臂^ク痛等ハ下劑
 ヲ用テ後此劑ヲ與ヘ發汗セシメテ効アリ或ハ數
 回是ヲ用ヒ慣テ發汗ノ効少ナキハ漸次ニ服量
 ヲ増シ用フベシ總テ吐藥ハ此劑ニ限ラズ服量以
 許ニメ胃ニ觸レガル程ニ用ヒ飲食ヲ節慎シ温覆
 スレハ皆發汗ス阿芙蓉ハ鎮痙催眠ノ功ヲ以テ諸

脉纖維ヲ緩弛シ津液ヲ皮表ニ誘發ス○故ニ默^ム他^タ
 兒雜^ニ腹^ヲ蘭^ヲ酒^ニ阿芙蓉液ヲ加テ發汗酒ヲ製スルモ
 亦良^ニ默^ム他^タ兒雜^ニ腹^ヲ蘭^ヲ酒^ニハ吐劑ノ名製法本條ニ出○吐劑ヲ禁スベキ病甚
 ダ多シ是ヲ略舉スレバ第一内部諸藏ノ焮衝ハ吐
 劑大害アリ其湧吐ノ衝動ニ由テ焮衝ヲ増劇スレ
 バナリ故ニ甚ダ多血ノ人或ハ頭腦及ヒ胸部ニ血
 ノ上衝壓迫スル症ハ吐劑ヲ與ルニ就テ意ヲ用フ
 ベシ或ハ刺絡ヲ施メ後是ヲ與フベシ第二諸失血
 殊ニ吐血ノ患アル人ハ吐劑ヲ禁ス此病多クハ諸
 脉纖維及ヒ神經脆弱ニメ血液酷厲ナル故ニ吐劑

ノ衝動ニ乘ノ復失血ヲ發スレバナリ第三胸腹各
藏ニ頑硬腫様ノ壅塞壞疽等アル者ハ吐劑ヲ禁ス
若シ是ヲ犯セバ勞瘵或ハ癌瘡トナレバナリ第四
胸ノ形惡ク重訂内科撰要第七十脊骨尙樓ノ者ハ
吐劑ヲ禁ス斯ノ如キ症ハ其血常ニ肺藏ニ運行シ
難クレバナリ肺藏常度ノ如クヨク縮張セス故ニ
其血肺ノ血脉ニ運行ニ難ク呼吸常
ニ短促ス此症吐劑ヲ用レバ肺大ニ寧
急ノ呼吸窒塞スルノ危殆アリ或ハ患者虛
衰ノ呼吸短促スル症或ハ乾喘痰ナキノ如キハ血
喘息ノ肺ニ運行ニ難キヲ前症ト同シ但粘痰湧盛ノ喘
急ハ吐セシメテ効アリ第五惡阻ハ吐劑ヲ禁ス是

レ子宮膨脹ノ腹部ニ循行スル血ヲ阻遏シ且腹内
諸藏ヲ逼迫ノ逆行ノ機轉ヲ起シ嘔吐ヲ發スレバ
ナリ然レ惡液穢物胃中ニ鬱聚ノ發スル症ハ孕婦
ト雖モ速ニ吐劑ヲ用フベシ物因物因

硫黃 ソルフルス 羅甸 スワフル 和蘭

硫黃ハ毘黠密那是ハ石腦油石炭琥珀膏風ノ如キ
土中ニ生スル華爾斯ノ總稱ナリ

石膽鹽及ビ精微ノ土相濕和シ地中ノ火脉ニ焦化

セラレテ成ル者トス然レ是古説ナリ硫黃ノ性質

單一無雜ニノ一個ノ元素ナリ○黃色ト帶綠色ト

ノ二種アリ内服ニハ黄金色ノ如ク或ハ淡黄磨碎
シ易ク指間ニ摩スレバ聲ヲ爲シ淨潔ニ汚物ナ
キヲ擇ムベシ。綠色ヲ帶ルハ綠礬鹽ノ酸氣ヲ含ム
テ殊ニ多シ是ヲ焚セバ酸臭ノ煙氣ヲ發ス。其酸氣
ハ即チ硫黄精ナリ是ヲ以テ硫黄精ヲ製スレバ精
ヲ得ルテ殊ニ多シ其性亦綠礬精ト同シ

主治 發汗ノ良効アリ又後爾撒謨様ノ脂油ヲ含ミ
血中ノ酷厲液ヲ包攝ノ甘和ス。故ニ酷厲液ノ肺ニ
侵刺ノ發スル欬嗽或ハ蒸發氣壅遏ノ發スル欬ニ
用ヒテ發汗ノ効アリ又粘痰ヲ疏豁ノ咯出セシメ

肺ヲ淨刷ス故ニ粘痰多キ喘息。冒寒傷冷毒ノ經久
欬嗽。聲啞或ハ肺癆吐膿ニ良驗アリ。硫黄末一匁ニ
沙糖ヲ等分ニ加ヘ適宜飲液ヲ以テ一時毎ニ用フ。
但シ硫黄ハ甘和ノ性アレ氏肺脆弱ニノ感觸甚ク
粘痰汚液等ノ壅滯ナキ者是ヲ過用スレバ却テ肺
ニ觸テ欬ヲ増發スルアリ。○是ヲ服スレバ遍身
硫黄臭ヲ發シ或ハ其帶ル所ノ金銀ノ具。皆楮黑色
トナルヲ以テ其發汗及ビ蒸氣ヲ發スル効アルヲ
知ルベシ故ニ痛風。歷節痛。及ビ瘡疹類ノ潜伏内攻
ヨリ發スル諸症ニ尤効アリ。○瘡瘍ノ内攻ヨリ發

スル胸水。腹水ノ症ニ是ヲ用レバ痰ヲ吐シ小便ヲ
 利メ其腫ヲ消シ或ハ發斑。羅斯等ノ冷氣ヲ冒リ内
 伏メ發スル水腫モ亦良驗アリ。斯等ノ症ニ水腫留ノ胸
 スル一種ノ水腫ナリ其症殊ニ甚シ故ニ呼吸短促不利ニ
 憑テ俯靠倚坐シ小便增スハ乾效ヲ發ス初メ足
 附或ハ脚腫起ス脚腫増スハ胸中寛快ヲ覺エ脚
 腫減スレバ胸中苦満ス或ハ其胸ノ左腔ニ在レ
 バ右脇ヲ下ニ臥ス能ハズ其甚キニ至レバ頭等腫
 脹ス其水右腔ニ在ル者モ是ニ準ス兩腔共ニ胸骨起
 バ少モ側臥ス能ハズ其甚キニ至レバ胸骨起
 張シ脇ノ周圍闊クハ血ノ胸内ニ滯留ス胸者
 亦右ノ證候ヲ發ス然レ屢ス如キ患者ノ屍ヲ剖
 觀スルニ膿血等ノ滯留スル者稀ニ多クハ胸水
 ナリ又重訂内科撰要第百九十三章ニ出鼓
 腹水ハ即チ水液腹腔ニ滯留ノ腹肚脹滿ニ其狀鼓

服ニ似タル水腫ノ一種ナリ。○羅斯ハ内科撰要精
 料撰要精神錯亂篇第百三十三章ニ註ス。○疥癬禿
 瘡。惡性ノ浸淫瘡。其他皮上ノ諸病ニ内服外敷ノ峻
 効アリ是レ其酷厲毒ヲ包攝緩和ノ蒸發氣ヨリ驅
 散スレバナリ。○痔ノ諸症殊ニ其劇痛ノ出血ナキ
 症ニ効アリ此其凝聚セル酷厲液ヲ甘和疏散ニ或
 通利シ又皮表ニ發洩スレバナリ或ハ左ノ**華石飲**
 良驗アリ
 硫黃華石 消石 石長生 舍利別 適宜
 右調和シ一時毎ニ一卵匙ヲ用フ。○脚痛風ニ硫黃
 一味水煎シ毎朝八寸ヲ服メ間治驗アリ但水煎

ニハ生硫黄ヲ用フベシ硫黄華ハ水ニ溶化シ難シ
 ○服量大人ハ一月宛日二三度沙糖或ハ雞子黄ニ
 研和シ服ス○過服スレバ瀉下ス然レ數日用レバ
 自ラ止ム或ハ過服ノ脉數發熱スル者アリ故ニ壯
 熱熾衝アル症ハ多ク服スルコト勿レ○軟膏ニ和シ
 外敷ノ乾燥シ腐穢ヲ除キ頑固ノ皮病瘡類ノ膿汁
 多キ症ニ施シ殊ニ疥癬ヲ治スル聖藥トス或ハ硬
 腫ヲ消散シ或ハ腺腫ヲ化膿ス○硫黄ニ石鹼家猪
 脂ヲ研和シ疥癬ニ外敷ノ捷効アリ或ハ硫黄末ヲ
 亞麻油ニ和シ塗ルモ良但硫黄劑ヲ施メ治セザル

疥癬ハ微毒ヲ兼ルナリ此症ハ水銀劑ヲ兼用スベ
 シ但劑中ノ脂油ヲ以テ表發ノ蒸氣ヲ壅遏ノ速ニ
 治セザル者アリ斯ノ如キハ皓礬礬砂等ヲ加テ良

硫黄華

〔福〕〔福〕

アロレスソルフルス羅スワフルブルム又
 ゲノイフルテスワフル蘭

内服ニハ多ク硫黄華ヲ用フ硫黄ニ含ム所ノ鑛氣
 土氣ヲ脱ノ純粹ナレバナリ

○榕按ニ本邦藥舖ニ鷹ノ目ト呼フ者ハ一回
 升煉ヲ經ル者ニノ上品ナリ硫黄華ニ近シ内服
 ニ用フベシ

製法

硫黃ヲ陶製ノ格兒弗ニ入レ硝子ノ堯ヲ覆
 ヒ其接際ヲ固封シ燼ニ安シ漸次ニ火ヲ増ス片ハ
 水少許出テ後硫黃ノ純粹ナル者其堯ニ升リ著ク
 是レ硫黃華ナリ但火氣強ケレバ其華焔消ス故ニ
 火候ニ意ヲ用ルコト肝要ナリ此華ヲ取り水ヲ以テ
 數洗ヒ酸味盡ク脱スルニ至リ乾シ貯フ

硫黃精
 スロリセス又オレウムソルフルスペルカ
 ハバナシルゲーストハシスワフル蘭

製法
 潤大ナル硝子壘ヲ取り其底面ニ墨ヲ以テ
 假ニ徑七八寸許ノ輪狀ヲ記シ金剛鑽ヲ以テ深ク
 其輪圍ヲ鑽刻シコレト同徑ノ烙鐵ノ輪ヲ其鑽刻

セル處ニ當レバ底面落テ圓孔ヲ作ス是ヲ取テ其
 上口ヲ塞ギ頸ヲ繫テ懸垂シ温湯ノ蒸氣ニテ其裏
 面ヲヨク濕シ又徑五寸許ノ陶壺ニ硫黃ヲ入レ其
 壺ヲ炭火上ニ置キ硫黃焔化メ自ラ燃ルニ至リ他
 ノ壺ヲ取テ倒ニシ此上ニ硫黃ノ燃ル壺ヲ載セ又
 其下ニ潤ク深キ磁盃ヲ置キ是ヲ右ノ懸垂セル硝
 子ノ下ニ置テ硫黃ヲ燃ス片ハ其煙氣硝子内ニ升
 リ著テ蒸溜シ自ラ其磁盃ニ滴シ下ルナリ是レ硫
 黃精ナリ○其燃ル硫黃ト硝子トノ間ハ其焰ノ減
 ルコトナクノ精液適宜ニ流滴スル程ニ近ク隔ツベ

シ○其硫黄ノ燃ル^モト間斷ナク過不及ナキヲ肝要トス○硫黄漸ク灰ト爲リ凝固ノ上面ニ蓋フ^ハ速ニ鐵篋ニテ碎キ或ハ取り去ルベシ否レバ硫黄焔化セズ燃ザレバナリ。又預メ他ノ陶壺ニ硫黄ヲ入レ置テ前ノ硫黄燃了レバ前法ノ如ク燃メ速ニ換フベシ○雨氣ヲ催シ濕リテ風ナキ日ヲ擇ミ又煙窓ノ下。煙氣障リナク升散スル處ニテ製スベシ精ヲ得ル^ト尤多シ○右ノ如ク製スレバ硫黄一坵ニテ精一^ト或ハ一^ト半ヲ得ベシ。四五百錢ノ硫黄ヲ以テ製スレバ十二時中ニ五^ト許ノ精ヲ得ベシ

○硫黄燃^モテ青焰ヲ發スルハ油氣ノ發現スルナリ

其鑛性ノ酸氣ハ烈キ火力ニ由テ焔解シ焚燒ノ風化揮散スト雖モ其中ノ最モ重厚ノ質ハ自ラ凝聚ノ精液トナリ流滴ス其粘脂ハ燃テ氣中ニ升散シ傍人ノ咽喉氣管ヲ侵刺シ欬ヲ發ス

又法

水銀 四^ト 綠礬油 再餾者

右水銀ヲ矮^{ヒク}キ格兒弗ニ入レ徐々ニ油ヲ滴シ加ヘ

堯ヲ覆ヒ石灰ト雞子白トヲ捏和ノ布條ニ塗リ是

ヲ以テ堯ノ合際ヲ固封シ氣ヲメ透漏セザラシメ

遠西各物考 卷一 十六 風雲堂藏

頸長ク大ナル硝子ノ承餾壘ニ水十六ヲ入テ兜ノ嘴ニ接合シ其接際ヲ塗封セズ布片ニ冷水ヲ浸メ承餾壘ニ貼シ格兒布ヲ文火ニ上セ漸ク火ヲ増テ煮ルニ至リ遂ニ其承餾壘中ノ精二比ノ量トナルニ至テ火ヲ下シ承餾壘ヲ放開シ其蒸氣口鼻ニ觸テ噎フ故ニ預メ意ヲ用フベシ其精ヲ硝子壘ニ收メ固封シ冷處ニ貯フ○古昔ハ硫黄ノ煙氣ヲ覆餾ノ製ス初ニ舉ル製法ヲ云其性功殆ト此精ト同シ然レ醫家多ク此精ヲ用ヒ或ハ此ニ綠礬油ヲ加テ覆餾製ノ精ニ代用ス是レ其性功尤モ勝ルヲアレバナリ按

主治 性寒。峻酸ニノ壯熱ヲ涼解シ煩渴ヲ止メ血及

ビ膽液ノ沸騰ヲ鎮メ粘稠ノ血液ヲ稀釋シ腐敗ヲ

止ム故ニ清涼飲ニ加テ焮衝熱熾盛熱或ハ腐敗惡

性熱ニ用テ煩熱ヲ爽涼シ精神ヲ活潑シ腐敗ヲ防

護ス。性功大抵綠礬精消石精ト同シ或ハ覆餾ノ硫

綠礬精消石精ハ收斂ノ功尤モ烈ナリ硫黄精ハ特

ニ接爾撒謨質アリテ血液ノ酷厲毒ヲ包攝甘和ス

ル功ヲ兼ヌ乃チ披烈栗ハ自驗ノ說ニ云水鏡ヲ以

テ硫黄精一ニ氏ヲ狗ノ頸靜脈ニ注スルニ異狀

ナシ消石精ニ水ヲ加テ服シ旋轉ノ斃ル是ヲ剖觀
 注入スルニ漸ク搖擲ヲ發シ旋轉ノ斃ル是ヲ剖觀
 スルニ凝血充滿セリ○服量一二滴ヲ適宜ノ飲液
 ニ和シ酸美口ニ適フヲ度トス○外敷ノ口中斷頸

ノ潰爛或ハ鷺口瘡ニ効アル等其
他總テ綠礬精ト同シ或ハ玫瑰蜜ニ和シ
綿撒絲ニ浸シ屢貼ノ良因

此藥ハ西國ニ出ルニ由リ其性ハ熱毒ヲ消シ腐肉ヲ去ルニ効アリ
凡ソ瘡癤腫毒ノ患ニテハ此藥ヲ用テ之ヲ敷キ或ハ酒ニ浸シ之ヲ洗フ
或ハ水ニ溶キ之ヲ飲ムニモ効アリ又ハ此藥ヲ用テ膏藥ヲ造ルニモ
宜シク其性ハ温和不燥不寒不毒故ニ凡ソ諸症ニテハ用テ可ク
凡ソ瘡癤腫毒ノ患ニテハ此藥ヲ用テ之ヲ敷キ或ハ酒ニ浸シ之ヲ洗フ
或ハ水ニ溶キ之ヲ飲ムニモ効アリ又ハ此藥ヲ用テ膏藥ヲ造ルニモ
宜シク其性ハ温和不燥不寒不毒故ニ凡ソ諸症ニテハ用テ可ク
凡ソ瘡癤腫毒ノ患ニテハ此藥ヲ用テ之ヲ敷キ或ハ酒ニ浸シ之ヲ洗フ
或ハ水ニ溶キ之ヲ飲ムニモ効アリ又ハ此藥ヲ用テ膏藥ヲ造ルニモ
宜シク其性ハ温和不燥不寒不毒故ニ凡ソ諸症ニテハ用テ可ク

遠西醫方名物考卷一終

