


遠西醫方名物考

久良也未上

卷十



藏26

499.2
En-3
10
No. 1435
12 e 15

樸齋宇田川先生著

四篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

遠西醫方名物考標同

卷十

刺必斯塙謹亞

刺必斯印歇兒那栗斯

刺必斯加烏斯蠻屈斯

酪乳條

酪餘上同

蠟條

銀漿 銀礬

楚し典塙羅佩

武

模失刺及油

模失刺及尼蒲私膏

宇

茴香水

茴香驅風飲

茴香精

茴香油

芸香水

芸香鎮痙露

微的撒爾弗

物耶獨亞斯

剥篤亞斯

久 拘櫟皮精

拘櫟皮油

拘櫟皮舍利別

拘櫟汁舍利別

規吉斯麗謨ノ條

規吉撒爾弗ノ條

驅風精(消癆露)

苦扁桃(扁桃)

也 葡刺巴

苦扁桃油(扁桃)

末 玫瑰蜜

玫瑰膏

玫瑰舍利別

玫瑰昆設爾弗

茉沃刺那

玫瑰油

玫瑰丁幾失爾

茉沃刺那精

茉沃刺那水

茉沃刺那油

遠西醫方名物考卷十

棕齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

刺必斯姪(羅)亞

陳製法

蝦殼

河產者

蠣殼

四弓

注家

麝香

各二錢

主八

龍涎香

各二錢

右極細末トシ亞刺比亞(羅)謨一錢ヲ取テ薔薇水二
弓ニ溶シ是ヲ以テ本劑ノ末ヲ捏和シ球ノ状ニ造

リ乾シ又右ノ液ミテ漏メ金箔ヲ衣トシヨク風乾
シ屢羅紗ノ巾ニテ是ヲ摩擦スレバ鮮美ノ光澤ヲ
生ス是レ一種製造ノ鮮荅ナリ

觸

主治 腦心ヲ強健シ酸敗液ヲ制入

庚

刺必斯印歐兒那栗斯羅

ヘルセステーン

蘭

製法

銀

純粹者

消石精

銀溶化スル
ノ度トス

右銀ヲ薄片ト爲シ細ニ截リ硝子壘ニ内レ消石精
ヲ加テ銀盡ク烊化スルヲ度トシ其壘ヲ沙火ニ内

レ漸次ニ火ヲ増テ其水氣ヲ蒸散シ殆ド乾ク頃ニ
其劑ヲ濶大ナル堵ニ入レ文火ニ上セ漸ク烈火ト
爲ス片ハ煮沸ノ泡起シ遂ニ蠟ノ如ク流動ス是ニ
於テ試ニ少許ヲ以テ石上ニ傾ケ寫スニ冷テ凝固
スル片ハ乃チ鐵管ヲ取り温メテ其管中ニ脂油ヲ
塗リ是ニ右ノ液ヲ注入シ放冷スレバ即チ乾固メ
灰色トナル是ヲ取り出シ硝子壘ニ入レ固封シ貯
フ

亞

○大約銀一弓ヲ以テ此劑十三錢許ヲ製スベ

シ○上品ハ赭色或ハ帶黑色氣ニ暴レバ濕リテ溶化
水ヲ注ゲバ忽チ燒焚ス○氣ニ暴_トレバ濕リテ溶化

シ性力脱スル故ニ固封シ貯ル。肝要ナリ。○極テ
純粹ナル銀ニテ是ヲ製スレバ酸氣ヲ含マザル故
ニ容易ニ濕^{タヒ}ラズ銀純粹ナラザレバ是ヲ製ノ後濕
リ易ク或ハ銀ニ銅氣ヲ含ム故ニ。此劑日ヲ經ルニ
隨ヒ綠色ノ鏽^{ササ}ヲ生メ其功力脱ス。○銀ヲ消石精ニ
投メ其液澄清ニノ濁ラズ銀盡ク溶化スルハ消石
精上好ノ候トス。銀溶化スレば其液稍濁ルハ銀ニ銅氣ヲ含
精不良ノ候トス。其液綠色トナルハ銀ニ銅氣ヲ含
ム候トス。其澄清ニノ色ナキハ銀モ純粹ノ候トス

叔^ハ
侯^ア

又法

銀礮

拔ノ製法ノ者ヲ用フ。後ニ出ツ
適宜

右陶鍋或ハ銀鍋ニ入レ。堆ニ沙ヲ盛^{モリ}テ炭火ニ上セ
是レニ右ノ鍋ヲ内^イレ意ヲ用ヒテ火屑其鍋ニ入ル
ノ無ラシ大適宜ノ火候ヲ以テ徐々ニ煮テ溶化セ
シメ。終ニ煮沸セザルニ至テ仍火上ニ置フ八分時。
油ノ如ク流動シ淡赭色トナルニ至リ銅ニテ造ル
型ヲ取リ温メテ其内ニ脂油ヲ塗リ右ノ溶液ヲ是
ニ注入シヨク放冷ノ後。是ヲ型ヨリ取出シ硝子壠
ニ入レ固封シ暗處ニ貯フ^拔

○銀ヲ純粹ニスル法

銀一弓ニ鉛十弓ヲ加ヘ清

キヰ堀ニ入レ火ニ上セ熔セハ汚物盡ク分レテ銀
純粹トナル其熔タル銀ヲ取テ水ヲ盛モリタル硝子壠
ニ投スレバ大ニ沸騰メ銀細粒トナリ水中ニ散布
ス。是ヲ粒銀ト名ク アルゲンチムガラヌラカ 此ヲ
純粹ノ銀トス ム羅カヘルシルフル蘭

主治 性收濁ス。峻烈ノ腐藥ナリ少シク皮膚ニ觸レバ
其處黒斑ヲ生ノ速ニ消セズ是ヲ貼スレバ忽チ腐
蝕シ痴ヲ結ブ。故ニ一切創傷潰瘍中ノ頑肉。水棉様
肉ヲ消ス。創ニ觸テ甚キ疼ヲ發セバ又鼻痔。胼胝。贅
瘤。疣痣。汚斑。醜痕等ヲ除クニ用フ○此藥ハ他ノ諸

腐藥ニ比スレバ焫衝ヲ發スルフ。少シ。故ニ多ク稱
一用フ○是ニ少シ唾ヲ濕メ點スレバ其處忽チ腐
蝕ス然、氏深ク穿透セズ。ノ痴ヲ結ブ○是ヲ貼メ其
部ノ津液ヲ得レバ忽チ溶テ傍圍ニ流散ス。故ニ知
覺多クノ疼痛スベキ部ニ是ヲ貼スルニハ右手ニ
テ此藥ヲ患處ニ點シ左手ニ細ク卷タル紙ヲ取テ
其滲出スル液ヲ紙ニ浸潤セシメ傍圍ニ流散セザ
ラシム。斯ノ如クノ屢點スレバ患者少モ苦惱ナシ
○膿腫ヲ潰破スルニ用フ。是ハ若把兒麻膏等ノ硬
膏ヲ攤テ其正中ニ小孔ヲ穿テ膿腫ニ貼シ其孔ニ

此腐藥ヲ點スベシ但此藥ハ極テ收瀦スル故ニ爾後其部硬固ナルヲアリ○小肉腫疣癌息肉ヲ除クニ此藥尤効アリ耳孔ノ息肉ヲ侵蝕シ去ルニ亦良○或ハ下疳ノ毒ヲ消スルニ用フ此ハ其潰瘍小ニノ甚キ焮衝ナキ者ハ此藥ヲ水ニ溶シ屢患處ニ點メ其痂ヲ除ケバ速ニ治ス○經久頑固ノ淋疾ニ此藥一二匕ヲ蒸餾水五弓ニ溶シ水銃ニテ數尿道ニ灌入メ治ス又洗藥トメ創傷潰瘍ノ汚穢ヲ淨刷シ或ハ瘻瘍。淚管瘻ニ注入シ或ハ角膜星翳ヲ除クニ是ヲ點メ良効アリ○此劑ヲ水ニ浸セバ盡ク溶化

シ其銀少モ變セズ全然トノ其底ニ沈ニ酸味ナラズ侵蝕セズ少モ味十クメ故ノ如シ○泥炭和名ズ
名脣瓦^{シハ}ハ劫灰若シ泥炭ナキ<sup>スミノモ漢
氏ハ是ニ石炭ヲ代用スバシ</sup>ノ、礬紅ニメ烟氣大々淨潔ナルヲ縱ニ置キ上頂ノ正中ニ小圓孔ヲ穿ナ此劑一錢ヲ取テ其孔ニ投スレバ忽^{ナトク}熔テ爆焰ヲ發スルヲ消石ノ如シ其焰滅^{キテ}後其炭ヲ割見レバ此劑ニ用タル純銀^{スミ}量毫モ減セズ凝結ス然^ダ消石ノ酸精ハ銀ノ外面ニ粘著セルノミニテ毫モ銀ヲ毀損セズ唯銀ヲ圍繞メ銳利ノ鋒尖ヲ作シ宛毛銀鍼ヲ束スル如キ質トナリ侵蝕スル者ナリ叔^サ医^カ
布^カ過^カ

銀漿

「オントビンデンド・シルフルエトル」蘭

製法

銀一弓ヲ取硝子壇ニ内レ是ニ消石精二

弓ヲ注入スレバ忽沸騰ノ蒸氣升リ熱メ銀盡ク消化シ澄清透明ニノ香臭ナク味辛苦酷烈ニノ燒ガ如キ液トナル其壇底ニ黑色ノ未少許沈ム然ニ其消石精ニ誤テ鹽氣或ハ硝砂或ハ酸味ノ液雜レバ銀少シモ溶化スルトナシ○此液ヲ水ニ滴スレモ少モ濁ラズ降沈セズ但其水ニ鹽氣アレバ忽溷濁ス○此液一弓ヲ以テ雨水二十弓ニ和シ硝子壇ニ内レ火ニ上セ温メ琢磨シタル薄キ銅版ヲ以テ是ニ

浸セバ其銅忽灰色トナリ遍ク毛茸生シ其清稀ノ液漸ク綠色トナル是ニ於テ其銅版ヲ振蕩スレバ其毛脱落ス其毛復生スレバ隨テ振蕩シ毛少シモ生セザルニ至テ暫靜定シ其液ヲ他ノ器ニ傾ケ寫セバ其壇底ニ塗アリ是ヲ取温湯ニテ數洗ヒ淨潔トナルニ至火上ニテ乾セバ微細ノ銀粉トナリ其量減セズ酸氣及銅氣ヲ含丁ナク故ノ如純粹ナリ因主治刺必斯アルゲンチム印歇兒ヘル那栗斯ナリスノ如シ此液一滴モト皮膚ニ塗レバ忽チ腐蝕ス多ク腐藥ニ用フ侯

銀礬

「アルゲンチム・ミトラチム又ケレイスタル」蘭

製法

銀

純粹ナル者所謂粒銀
適宜

消石精

水等分ニ和スル者
適宜

右銀ヲ硝子壇ニ入レ文火ニ上セ是ニ右ノ消石精
ヲ注キ加テ銀盡ク溶トテ澄清ノ液トナルヲ度トシ
放冷スル時ハ其液ニ凝聚セル者現ハル是ヲ取去
リ其液ヲ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ放
冷スレバ光彩アル薄片様ノ芒ヲ結ブ是ヲ取り紙
上ニ展ヒロゲ乾シ硝子壇ニ收メ固封シ暗處ニ貯フハラ
又法 ヒツトリヨリウムアルゲンチウム 蘭ヒットリオニル蘭

銀漿ヲ適宜ニ取り火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ其十分

一ノ量トナルニ至リ冷處ニ置テ芒ヲ結バシメ其
芒ヲ取り貯フ医

又法 銀漿ヲ適宜ニ取り粒銀ヲ少許宛是ニ投メ
溶化セシメ終ニ少モ溶化セザルニ至リ是ヲ冷處
ニ置バ芒ヲ結消石ノ如シ其芒ヲ取固封貯フ医

主治 刺必斯。加烏斯。蠶屈斯。那栗斯。印歇兒。那栗斯。ノ如シ医

製法

贊已典塹羅掘

製法

刺必斯。加烏斯。蠶屈斯。那栗斯。

製法次ニ出

右淨

鐵壺ニ内レ文火ニ上セ漸火ヲ加ヘ水氣ヲ

侵蝕ノ質トナル者ナリ斯ノ如ク盡酸性ヲ脱除スル所ハ是ニ酸性ノ液ヲ加レ必モ滚动スルノナシ但大氣ニ暴レバ濕テ溶化シ其性功モ消散ス過

主治腐蝕ノ良藥トス。外敷メ速ニ腐蝕ス然ニ其痛須臾ニ休痂ヒヤマヲ結、火傷ノ如シ痂ヲ成ルハ軟化ノ膏藥ヲ貼メ化膿セシムベシ○刺破截斷カツルノ怖人ハ是ヲ用テ膿腫ヲ潰破シ或贅瘤。息肉。胼胝。疣痣。污斑及瘡中頑肉等ヲ除ニ捷効アリ○膿腫ノ邊圍堅硬或腺部ノ膿瘍。便毒腫等ヲ潰破スルニ尤良トス但、焮腫ノ邊圍堅硬ナルハ軟化ノ劑ヲ外敷メ其凝

蒸散シ究油ノ如久大ルニ至テ試ニ是ヲ鐵版ニ滴スレバ凝固スルヲ度トシ大小適意ノ銅型ヲ温其内ニ少油ヲ塗テ是ニ其液ヲ傾寫シ其稍温ナル氏取出シ硝子壇ニ入レ是ニ乾ケル糠ヲ充固封シ貯フ亞

又法 生石灰三弓剥篤亞斯ホットアス一弓

右生石灰ニ水適宜ニ加テ沸騰セシメ。是ニ剥篤亞斯ヲ加木瀧ニテヨク攪和シ紙ニテ濾過シ汁ヲ取鐵壺ニ入火ニ上水氣ヲ蒸散メ乾固セシメ堦ニ内火ニ上セ烊製スルノ前法ノ如クス圓○此劑ハ其亞兒アルカリ加利鹽中ニ含所ノ酸性ヲ脱メ極テ酷烈ナル

結ヲ解スベシ。此劑ヲ施^スハ硬膏ヲ厚^く攤テ其正中ニ小孔ヲ穿^チ是ヲ患部ニ貼^ン其孔ニ此劑ヲ施^ベシ否^ヲザレバ流散メ浸淫ス。此劑ヲ水^一溶シ稀^クシ施セバ腐蝕セズ唯潰瘍等ノ臭穢腐爛壞肉ヲ淨刷シ愈スニ峻効アリ。犬咬傷ニ是ヲ施セバ其藥氣深ク滲透シ是ヲ以テ其毒ヲ阻遏メ内部ニ吸收セザラシム。極テ驗アリ。其法先^づ鉢針ヲ以テ其創ヲ鑽截メ出血セシメ水ニテ洗淨シ次ニ此劑半錢或一錢ヲ取テ沸湯一北ニ溶^シ是ヲ以テ其創ヲ洗^フ日ニ數次^ド其痛ニ耐ル間ハ是ヲ施シ毎次微温湯ヲ

以テ是ヲ洗去^ルベシ但其痛少キ者ハ右ノ如ク洗テ後此液ヲ綿撒絲ニ蘸^{ヒタ}シ貼^ム縛繩ヲ施^スヘシ或其焮痛甚キ者ハ軟化釀膿ノ琶布^{ハサブ}ヲ貼^ムノ膿ヲ成^シシムベシ或其創窄小ナルカ若^モクハ愈ル者ハ頻^リニ此液ヲ施シ創^モ侵蝕セシメテ潤^クシ其痂落^ルニ至^ルベシ此法尤^モ治驗アリ。蝮蛇咬モ右ノ療法尤^モ驗アリ。○下疳甚^キ者ハ其毒ヲ患部ヨリ體中ニ吸収メ内伏スル者多シ是ヲ遏止スルニ右ノ溶液ヲ以テ其潰瘍ヲ洗ヒ又是ヲ布片ニ蘸^{ヒタ}シ貼^ム縛繩ヲ施シ毎日斯ノ如クメ終ニ其腐爛消シ好肉トナルニ至^ルベシ

右生石灰ト剥篤亞斯トヲ合シ鐵壺ニ内レ水ヲ加火ニ上セ木棍ヲ以テ手ヲ住メズ攪セ煮丁四分時。此液少許ヲ分取濾過シ試ニ酸味ノ液ヲ是キ加ル年滾動スルハ生石灰ノ量少キ候トス故ニ右ノ液ニ生石灰少許ヲ加テ銳烈ト爲シ滾動セザルニ至ベシ或ハ剥篤亞斯ヲ温湯ニ溶ク其液ニ加ムニ濁ルハ石灰多キ候トス故剥篤亞斯少許ヲ加フヘシ然バ是ニ醋ヲ加レ圧滾動スルト甚微ナク或ハ剥篤亞斯ヲ加レ圧濁ラズ偏勝ナキハ此液銳烈上好ナル候トス硝子ノ漏斗ニ布片ヲ重子敷是ニ右人液ヲ寫内テ

○黴毒淋疾ノ毒ヲ驅除シ多ク汚液ヲ排泄セシムルニ右ノ液ニ阿芙蓉少許ヲ加水鏡ヲ以テ數尿道ニ注入ス但是ヲ注入メ疼ニ堪ザル者ハ水ヲ加ヘ稀クシ施スベシ○瘻瘍及ビ腐爛甚キ潰瘍等モ右ノ液ヲ施ノヨク腐肉ヲ祛キ愈スノ偉効アリ〔夷布〕蘭リキシヒウムカウスチキッス羅侵
楚ヒ典塙羅倒 〔蘭〕 蝕灰汁ノ義セアシデルス・ログ又
生石灰 〔三弓〕
剥篤亞斯 〔二弓〕 精製者
水 〔十六弓〕

硝子壙中ニ滲漏セシメ。終ニ少絞濾シ其液ヲ火ニ
上セ水氣ヲ蒸散シ減メハ弓ノ量ト爲。是ヲ大ナル
硝子壙ニ移内固封ノ靜定シ澄清トナルニ至テ其
塗ヲ去硝子壙ニ收硝子塞ニテ固封貯其漏斗ニ殘
タル渣脚ト右ノ靜定シタル底塗トニ雨水四弓ヲ
加テ其餘殘ノ鹽ヲ溶シ前法人如久布序ニテ濾過
シ其液ヲ硝子壙ニ收貯テ亞兒加利鹽ヲ用ベキ病
ノ藥ニ供_ス初ニ濾過シタル液ト同本ラズ。唯酸敗液
ノ諸病ヲ治スル藥ニ供スル如キヲ云核

主治**刺必斯。**加烏斯蠻屈斯ト同シ

叔

底

因

也

也

也

武

摸失刺及油一ニハカギ又油ト名ク
共ニ粘液油ノ義**製法****遏爾託亞根**

四弓

海葱

一弓

胡蘆巴子

亞麻子

各一弓半

右水適宜ニ加テ熟煮シ絞濾テ粘汁ヲ取リ再ヒ
煮テ蜜ノ稠トシ左ノ油ヲ加フ

蒔蘿油

加密列油

煎油

百合油

各一弓半

右調和シ微火ニ上セ煉和シ濾過シ貯**主治堅腫ヲ軟ラゲ膿ヲ成ス。一切堅硬ヲ軟化ス**

医

謨失刺及尼蒲私膏

一ニハムブナストニラギニブヌ羅

主

治

也

也

也

本草

卷十

十一

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

製法

黃蠟 十一弓

謨失刺及油 八弓

趨謨安沒尼亞幾

水ニ溶シ濾過シ渣ヲ去ル者六弓

的列竝底那

二弓

右油ニ蠟ヲ加ヘ文火ニテ烊シ又別ニ趨謨ニ的列竝ヲ加テ烊シ終ニ四味煉合ノ硬膏ト爲ス
 主治堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ融解シ膿ヲ釀シ或ハ硬腫ヲ消散ス

医

亞麻子

字

茴香水 ヘンケルウアトル

蘭

製法

薄荷水ノ條ニ出ツ○其露水ノ上面ニ浮ム油

ヲ取り去レバ此水ノ効ナシ。若シ是ヲ醇厚ニセント欲セバ再ビコレヲ蒸餾メ其殘ル所ノ淡水ヲ除クベシ

國

主治破氣驅風ノ良藥トシ痞氣鬱蓄ノ諸症ニ効アリ。又急迫ヲ緩メ小便ヲ利シ粘痰ヲ除キ傷冷毒胸脇痛。咳嗽。疝痛。淋疾痛。水腫ニ用フ○右ノ諸症並ニ痙攣ヨリ起ル疝痛。脚冷等ニ左ノ方尤モ良。

茴香驅風飲

茴香水

半 北

薄荷舍利別

四 錢

驅風精

二 錢

舍電發謨阿芙蓉液

三十滴

右調勻シ半時ニ一匙完服ス。但其症ノ輕重ニ隨テ
阿芙蓉液ト驅風精ヲ加減スベシ或ハ痙攣搐掣ノ
症甚ク或ハ疼痛劇キ者ハ先ツア芙蓉液二十五滴
許用可否サレハ救ヒ難シ○小兒腹痛ニ此露水一
味用ヒ或ハ麻僵涅失亞。遇爾拔ヲ加ヘ用テ速効ア
リ大便ヨク通スル者ハ白璧粟舍利別少許ヲ加テ

尤良○洗藥トメ眼ノ腫痛ヲ療ス

医

茴香精

「ゲースト・ハン・ヘンケル」蘭

製法 茴香子

二 北

燒酒

九 北

右浸ス「二日蒸餾ノ精ヲ取リ固封シ貯フ」

医

又法

茴香子

搗者 半 北

燒酒

十度者 八 北

右適宜ニ浸シ蒸餾ノ十九度ノ精ヲ取ル

医

主治

虛冷ヲ温メ痞氣鬱結ヲ散シ疝痛拘攣胸中ノ

諸症ヲ治シ胃ヲ健運シ飲食ヲ消化ス

医

茴香油 ヘンケル・オリイ 蘭

製法 薄荷油ノ條。蒸餾油製法括套ニ出ツ 拔

又法 茴香子 一兩

水 八比

右浸ス一六時ニメ蒸餾シ油ヲ取ル。其後薄荷油製

法ノ如クス 臣

主治 破氣驅風ノ良藥トシ又胸病ニ驗アリ。輕ク衝動シ痞氣鬱滯ヲ散シ粘稠液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ傷冷毒。胸中鬱塞ヲ開利シ胃ヲ健ニシ飲食ヲ消化シ乳汁ヲ益ス○此油ハ亞的爾アーティーレ綠礬油ノ如クニメ性

緩ナリ胃弱ク風氣痞滯シテ腹脹スルニ良効ヲ奏シ又肺管ヲ開利シ欬ヲ止メ吐痰ヲ進メ傷冷毒ノ諸症ヲ療ス○此油三四滴ヲ沙糖一弓ニ研和シ飲液ニ攪セ用テ良 疾底福

芸香水

アーナ・ルタ

羅

アーナ・ルタ

製法 薄荷水ノ條。露水製法括套ニ出ツ 拔 ○此露水

ノ氣弱キ代ハ効ナシ若シ其氣弱キ代ハ罐内ノ滓ヲ絞リ去リ其液ニ新芸香ヲ加ヘ又是ニ其露水ヲ加ヘ蒸餾スベシ。斯ノ如クノ再三蒸餾スレバ其氣

醇厚ナリ若シ醇厚ノ露ナキ片ハ其症ニ從テ茴香水或ハ薄荷水ヲ代用スベシ
主治竄透ノ氣ヲ以テ胃ヲ健運シ小便及ビ月經ヲ通シ惡液ヲ驅散シ風氣ヲ消ス。子宮衝逆。痙攣。氣疝。小兒蛇蟲。狂犬蝮蛇咬傷ヲ治ス。○子宮衝逆及ビ痙攣ノ諸症ニ左ノ方奇効アリ

芸香鎮痉露

芸香水 六弓三四滴一服
 薄荷舍利別 六錢
 琥珀丁幾去爾

阿魏丁幾去爾 各二錢
 密涅刺爾鎮痛液 一錢
 舍電發謨阿芙蓉液 三十六滴

右調匀シ八分時ニ一匙家用ヒ其症治スルニ至ル

依

微的撒爾弗蘭 ユング卫ントアルビッロ 羅

製法

草越沒里膏

五弓

琥珀

鉛粉

一弓

阿利襪油

二弓半

本膏

極細末

右膏ニ油ヲ加ヘ文火上ニ烊化シ鉛粉ヲ攪和シ軟膏ト爲ス 枝

主治 乾燥シ軟化ス火傷。潰瘍等ヲ乾愈ス 福月經

燐山丹

燐山丹

燐山丹

燐山丹

附 肺症ニ左ノ方奇効アリ

古驗レノハ食都ニ一湯濃用カ其無欲スヨニ鑑

含膏發難阿芙蓉斯

三十六兩

密堅陳爾興麻斯

一錢

阿膠丁鱗法爾

各二錢

久

拘櫞皮精

スピリトス。コルチセス。シトリオリウム

羅生鮮ノ黃皮ヲ薄ク刮リ取ル者

製法

拘櫞皮

二比

燒酒

十度者

右浸ス一二日。蒸餾ノ十度ニ至ルマデ露精ヲ取ル

主治 性熱。精神ヲ活潑シ衰弱ヲ強壯ニシ破氣驅風

本効アリ。失氣眩暈痙攣ノ治シ鬱塞ヲ開キ粘液ヲ

稀久シ飲食ヲ消化シ痞氣鬱蓄ノ諸症ニ尤良

良

枝

羅

羅

拘櫞皮油

オレウム。コルチセス。シトリオリウム

羅

製法

薄荷油ノ條。蒸餾油製法括套ニ出ヅ。但薄ク黃

皮ヲ刮リ取テ蒸餾スベシ

枝

羅

主治性熱。腦心胃ヲ強健ニシ。鬱塞ヲ開キ。破氣驅風。
ノ峻効ヲ稱シ蟲ヲ殺ス。

疾

越後

益

兵庫

近江

滋賀

三河

甲斐

信濃

長野

駿河

伊豆

相模

武藏

埼玉

千葉

東京

神奈川

山梨

福井

石川

富山

岐阜

愛知

三重

和歌

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

琉球

日本

拘椽皮舍利別 セイローブスコルチセスシットリ 羅
拘椽汁舍利別 セイローブスシットリムクス 羅

右二方。製法主治。橙皮舍利別及ビ橙汁舍利別ト同

シ 因 卸房諸軒ト此處ミ賣得也。越井ニシテ如漢鴻風
古文書「子自縣國メ十寅ニ至リナマセ賣醉ミ事」

熟酢

四出
十度

實志

肺病丸

二出

肺病丸 スヨリホスヒナキタカハシタリシテシハシ

也

薬刺巴 羅 ヤラバ 蘭

長品ニシテス

形狀

此草。春月莖ヲ抽ク二三尺許。節高ク是ヨリ枝

ヲ分チ。葉橢圓ニメ末尖リ本潤ク稍厚ク光澤アリ

互ニ對生ノ十字様ヲ爲シ龍葵葉ノ如シ花筒様。五

出一心蕊。五鬚蕊アリテ枝梢ニ攢簇シ煙草花ニ似

タリ其色淡紅或ハ深紅或ハ紫或ハ黃或ハ白或ハ

紅白ノ顯文アリ或ハ黃紅ノ條理駁雜ナル等ナリ。

皆タニ開キ朝ニ萎ム。香氣アリ。花後圓子ヲ結ブ。黑

色ニメ皺アリ内ニ白色人體アリ根太ク尖リ外黒

色。或ハ赭黑ニメ皮ニ皺アリ。裏灰色ニメ赭色ノ條

理或云黑色ノ及ビ細黒アリ。其條理多ク。赭色ナル
條理アリ。及ビ細黒アリ。其條理多ク。赭色ナル
ハ華爾斯ス多ク且上品ニメ新鮮トス或云黑色多キ
ハ華爾斯スモ亦多クメ効力峻ナリ。是ヲ割レバ華爾
斯滲出メ細黒ヲ見ス者ハ上品トス。斯ノ如キ根ハ
脂多クノ光澤アリ或ハ是ヲ切片トシ販グ。火ヒ黒
スレバ燃モ易シ味辛咽喉刺戟シ微嘔スベク惡ム
ベキ不佳人氣アリ肥實ニメ重ク固ク華爾斯ス脂氣
ヲ多ク破碎シ難キヲ上品トス○根黴蛀輕虛裏淡
白ナルヲ下品トス○或ハ蒲里阿尼亞根ヲ以テ是
ヲ偽造スル者アリ眞品ニ比スレバ切片輕虛ニメ

灰白ナリ○印度地方及ビ南亞墨利加洲諸國ニ
產ス。根數年ニメ漸ク肥大トナル按ニ舶來ノ品ヲ
見ルニ形チ蕃薯シノ如

○榕按ニ先輩此草ヲ以テ紫茉莉俗間オシロイ
ニ充ツ是オ和蘭ノ諸書ニ參攷スルニ紫茉莉ニ
穩當ナルヲ右ノ譯說ノ如シ。和蘭ノ醫書ニ此根
留飲停水ヲ瀉下スル効ヲ稱ス其洋船ノ品ヲ試
ニ用ルニヨク瀉下ス。和產ノ紫茉莉根ハ瀉下ノ
効ナシ物云此根印度地方及ビ亞墨利加洲ニ產
スル者ハ峻下ノ効アリ和蘭地方ノ者ハ其効ナ

シ是レ風土氣候ノ異^{コト}ナルニ因ルト。然レバ和產ノ者モ風土ノ異^{コト}ナルニ因テ効ナキカ此猶和產ノ大戟甘遂ハ瀉下ノ効ナキガ如シ。故ニ此物舶來ノ品ヲ用ヒ或ハ留飲停水ヲ瀉下スル藥ヲ擇テ代用スベシ或ハ和產ノ者モ暖國ニ產シ數年宿根メ脂氣多ク肥大ナル者ハ瀉下ノ効アランカ未ダ悉^タ試用セズ。○天紫藤子根性熱味辛留飲停水粘液膽液ヲ瀉下シ又小便ヲ利ス故ニ水腫ニ多ク良効ヲ稱ス。○黃疸痛風傷冷毒痛ヲ治ス。○體中粘液或ハ水液過多ニノ血瘀衝アル者ハ是ヲ用テ大ニ害アリ。○薬刺巴ハ甚^ヤ粘^ル華爾斯^スヲ含ム。多牛故ニ是ヲ服メ胃腸ノ僻積ニ膠著ノ溶化セザルヲアリ故ニ沙糖或ハ石

鹼。扁桃。雞子黃等ノ石鹼質ノ品ヲ是ニ研和シ用テ良○服量末トシ五仄ヨリ半錢ニ至ル。或ハ他ノ下劑ニ加テヨク瀉下ス或ハ桂末少許ヲ加ヘ用ヒ或ハ桂ト山柰ノ末ヲ加テ燒酒ニ浸シ藥氣ヲ出シ用ヒテヨク停水ヲ瀉下シ胃腸ヲ健運ス水腫ニ尤^モ驗アリ○水煎ニハ一二錢ヲ用又○其一陳輝○製法次○出○入○用○峻下ノ藥○藥刺巴ヨリ華爾斯ヲ取リトス然ニ凡^ハ華爾斯ノ下劑中ニ於テ此物性緩ニメ害ナシ服量一仄ヨリ十二仄ニ至ル。五歳以下ノ兒ハ半仄ヨリ一二仄マデ用フ水液ヲ瀉下スルニハ

是ノ末トシ十仄ヨリ十六仄マデ用フ少年虛人等ノ感觸シ易キ者ハ右服量ノ半ヲ用フ此華爾斯ノ質甚ダ膠粘ニシテ溶解シ難キ故ニ是亦沙糖。雞子黃石鹼。扁桃ノ如キ石鹼質ノ品一倍ノ量ヲ加ヘ用フベシ丸藥ト爲スニハ石鹼ヲ等分ニ研和シ三仄ヲ一丸トシ病ノ輕重ニ隨ヒ一丸ヨリ七丸マデ一服トシ用テ瀉下ノ良劑トス或ハ此末十六仄ニ適宜ノ雞子黃ニ研和シ或ハ葡萄酒二錢ニ溶化シ用ヒ或ハ雞子黃石鹼ニ研和メ丸トシ或ハ雞子黃適宜接骨木花水遏爾託亞舍利別各二錢ニ是ヲ研和シ

一服トス。○險重ノ咽喉焮脣、脳焮衝等ハ初發刺絡ヲ施シ速ニ右ノ諸方ヲ擇ニ用レバヨク其病毒惡液ヲ下部ニ導泄メ治ス。是レ初發速ニ用ヒザレバ終ニ藥劑ヲ嚥下ス。能ハザレバナリ。或ハ此華爾斯十六氏ヲ燒酒二錢ニ溶シ董菜舍利別三錢ヲ和シ一服トシ用ルモ良。伍叔授依福

薑刺巴_{ヤシラバ}。華爾斯_{ハルス}

レシナ。ヤーラ。パ

羅

製法

薑刺巴根_{ヤシラバ}

粗末

四 北

燒酒三十度者

十 北

右硝子壙ニ内ル固封シ沙火上ニ置キ。時々其壙ヲ

振蕩シ浸ス。三日濾テ其液ヲ取り又其滓ニ燒酒十北ヲ加ヘ沙火ニ置フ。前法ノ如クシ濾テ其液ヲ取り終ニ其滓ヲ搾_{キツキ}ニテ搾_{シボ}リ其液ヲ取テ前ノ液ニ合シ硝子壙ニ内レ靜定メ漚_{オリ}ヲ去リ濾過シ蒸露罐ニ内レ雨水八北ヲ加ヘ文火ニテ蒸餾シ盡ク其燒酒ヲ滴シ去レバ華爾斯ハ罐底ニ殘ルナリ。是ヲ取蒸餾水ニテ洗ヒ其水少モ味ナキニ至ルベシ其罐内ノ液モ亦華爾斯ヲ含ム故ニ又蒸餾ノ其液ヲ引去レバ華爾斯自ラ罐底ニ凝結ノ粒ヲ爲ス。是レヲ取り洗フ。前法ノ如クメ前ニ取ル華爾斯ト合シ。

末

玫瑰蜜

メル・ローザリム

羅甲センホニフ蘭

製法

玫瑰花

陰乾シ華ヲ去ル者

本體

白蜜

煮テ沫ヲ去ル者

沸湯

六升

右花瓣ヲ

湯ニ浸スト六時ニノ罐ニ入レ文火ニ煮

テ半バノ減シ絞リ濾テ汁ヲ取リ底莖ヲ去リ蜜ヲ
和シ煮元水氣ヲ蒸散シ舍利別ノ稠ト爲ス

(拔)

主治

清涼強壯シ疼痛ヲ甘ゲ創ヲ愈シ汚液ヲ淨刷

シ腐敗ヲ遏ム多ク漱藥及ビ口舌ノ塗藥ニ用フ〇

咽喉口中ノ潰爛ヲ淨刷ス〇漱藥トメ沕乙様ノ咽

是ニ二十度ノ焼酒少許ヲ加テ溶シ文火ニ上セ乾
シ貯フ幾那ノ華爾斯製法モ是ニ同シ新鮮ノ薬刺
巴根。二十比ヨリ華爾斯三十六弓許出シ〇此華爾
斯ハ赤赭ニメ黒色ヲ帶ビ碎ケバ光澤アリ焼酒ニ
溶化シ易ク火ニ投ノヨク燃粘著セザルヲ上品ト
ス或ハ滿格碌波尼亞。藤黃等ヲ以テ是ヲ贋造セル
者アリ然ニ是ヲ火ニ投スレバ松脂様ノ香氣アリ
(拔) 淑依(伍) 其率(第)ニモ諸(レ)其來(キ)來(キ)而(キ)て(キ)前(キ)人(キ)之(キ)也(キ)ニ
十升ド噬(キ)心火ニ量(キ)前走(キ)人(キ)喉(キ)ノ熱(キ)也(キ)其來(キ)也(キ)ニ
懲(キ)蘇(キ)子(キ)數(キ)み(キ)内(キ)三(キ)國(キ)也(キ)其來(キ)也(キ)而(キ)メ其來(キ)也(キ)數(キ)

喉腫ニ多ク効ヲ奏ス 湯ハ重訂内科撰要第二十章ニ註ス。此咽喉腫ハ同ク第百六十六章ニ出ツ。 ○鶩口瘡。口中斷頸ノ潰瘍ハ海鹽精或ハ

綠礬精。蓬砂ヲ此藥ニ加ヘ患處ニ施メ奇効アリ○

硫黃精少許ヲ是ニ加ヘ失苟兒陪苦ノ齒斷腐爛ニ

塗テ良驗アリ又左ノ方極メテ良

玫瑰膏 玫瑰蜜 六錢 海鹽精 四十滴

阿煎藥丁幾去爾 丁幾キタル 二錢

右調匀シ翎ヲ以テ斷ニ塗ル日四次。病ノ輕重ニ隨元海鹽精ヲ増減スペシ。玫瑰花ハ清涼ニノ收斂ス。文 文 劳欬肺癆 勞欬肺癆ニ接爾撒謨碌加的刺ヲ加ヘ用テ良効 中眼ノ熖腫ニ是ヲ水ニ浸シ漱藥。慰藥ト

アリ。○阿煎藥丁幾去爾ノ方。阿煎藥一錢ヲ技遇燒酒六錢ニ浸ス。六日濃テ液ヲ取り貯フ。福依玫瑰舍利別 セイヨーフスローサリウム 羅 ロ 舍利別ノ方。阿煎藥一錢ヲ以テ斷ニ塗ル。日四次。病ノ輕重ニ隨元海鹽精ヲ増減スペシ。玫瑰花ハ清涼ニノ收斂ス。文 文 劳欬肺癆 勞欬肺癆ニ接爾撒謨碌加的刺ヲ加ヘ用テ良効 中眼ノ熖腫ニ是ヲ水ニ浸シ漱藥。慰藥ト

製法

玫瑰花

陰乾シ萼ヲ去ル者

沙糖

八弓

沸湯

五升半

右玫瑰花ヲ沸湯ニ浸ス。六時煮テ半々減シ絞リ濁テ液ヲ取リ沙糖ヲ加ヘ文火ニ上セ煮沸セズ只水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ稠ト爲シ固封シ貯フ。主 主 治清涼收斂シ吐血崩漏等諸失血ヲ治シ傷冷毒效喫ニ良効アリ矣

玫瑰昆設爾弗 コニセラフ ロザリウム 羅

製法

玫瑰花

生鮮ノ花ヲ採リ萼ヲ去リ
瓣ヲ用フ

沙糖

淨白ノ者

右石臼

入木杵

テ搗少許

宛沙糖ヲ加テ泥ト爲シ貯

水少許加

磁壺ニ内レ固封シ貯フ

○乾花ハ末トシ水少許加

浸一宿ニメ沙糖ヲ加ヘ搗テ泥ト爲シ貯

フ

主治收斂シ吐血白帶下等ニ用ヒテ輕キ收瀦藥ト

ス或ハ欬嗽欬血ヲ治シ又勞欬ニ多ク効アリ然凡

多服セサレハ驗ナシ乳汁ヲ兼用メ尤良○丸藥ヲ

製スルニ是ヲ糊ニ代用メ良

良福

玫瑰醋

アセチムロサリムリブリム 羅

製法

玫瑰花

稍乾ノ萼ヲ去ル者

釀醋

四北半北

右硝子壇ニ入レ固封シ大陽ニ曝ス

ト數日濾過メ

醋ヲ取り硝子壇ニ入レ固封シ貯

フ

主治焮熱ヲ清涼シ枯燥ヲ滋潤シ失血ヲ止メ衰弱

ヲ強壯ス失氣昏冒ニ是ヲ面部ニ撒ケ省復ス頭痛

ニ是ヲ棉布ニ蘸シ頭ニ貼シテ効アリ

布

玫瑰油

オレウムロザリム 羅

製法

玫瑰花

生鮮萼ヲ去ル者

阿利襪油 オーリー・ソーラー 一 北半

右玫瑰花ヲ少タメ搗キ。硝子壠ガラス入ル油ヲ加ヘ固封シ爐邊或ハ太陽ニ曝サラス數日。ヨク藥氣ヲ浸ミ出シ磁鍋テ入レ文火ニテ煮ル。半時許。水氣大キニ至テ布ニテ絞ケル。濾シ其油ニ又玫瑰花一北ヲ加ヘ浸ミ下前法人如クシ斯ノ如ク爲ト三四回ドニノ其油ヲ濾コシ固封シ貯フ強壯シ腫瘍打撲傷。肢節轉戾門挫等ニ良驗アリ。額顱顱ニ塗テ頭痛ヲ治ス。琵布バブ或ハ軟膏ニ加ヘ施メ。良○内服メ下利赤痢。痛ヲ治ス。服量四錢ヨリ一

製法

玫瑰花

一
半
斯六錢ニ作ル

沸湯

二
半
斯三北ニ作ル

綠藜油

適宜酸味口ニ適フ。度半錢ニ作ル

右花ヲ湯ニ浸ス。一時半。漉過メ。滓ヲ去ル。冷テ後。

綠藜油ヲ攬和ス。

主治 收斂強壯メ腐敗ヲ遏ム。ニ峻効アリ。故ニ凡メ凝體諸部。衰弱弛緩ノ發入ル諸病ニ稱用入ス。○血液烊崩散渙メ汗多ク漏泄スル症ヲ治ス。○惡性腐敗

熱ヲ治スル良劑トス或ハ熱病人患者瘦削衰弱枯燥スルニ此劑ニ幾那ヲ兼用ノ殊効アリ是レ收斂爽涼ノ性功ヲ以テ胃腸ヲ活潑健運シ惡心嘔噦食ヲ嫌フ等ノ症ヲ治スレバナリ○粘液沕^{ウツ}乙或ハ血ヲ交ル汚液ヲ諸竅ヨリ脱泄スル諸症婦人崩漏痔血過多等總テ失血ヲ治ス。若シ瘻攣ノ諸症ヲ兼ル者ハ阿芙蓉液ヲ如用ベシ○肺ノ虛弱ニ屬スル冒寒嗽嗽及吐血ニハ此劑ニ乳糖ヲ加用テ甚^タ驗アリ又内部ノ潰瘍ニ用テ膿ヲ排シ腐敗ヲ止ム。内藏ノ壅塞ヲ疏解シ血液ノ惡質ヲ淨除シ神思鬱憂病痔。

疾ニ特効アリ○冒寒傷冷毒ノ諸症走注痛ニ是ヲ用レバ諸腺ノ緩弛閑喫セルヲ收固牽縮ノ汚液ヲ分利シ治ス○毎服一麥酒盞ヲ用ル一日三四次○若シ玫瑰花闊^{タク}ル片ハ玫瑰昆設爾弗^{コシセリフ}ノ代用シ製スベシ但其花ノ二倍或ハ三倍ノ量ヲ用フベシ^{依_ホ断_テ}

茉沃刺那

羅

マヨレイン又マヨラーン

蘭

形狀

此草二種アリ第一種ハ尋常ノ茉沃刺那ト名ク。數莖根ヨリ叢生スル^ト一尺許細硬粗糙灰白或ハ赤色ヲ帶ブ葉小ク橢圓柔ニメ毛茸アリ灰白或

ハ淡綠芳烈香竄。微甘香アリ。味辛苦。夏月莖枝梢ニ
荅穗ヲ生シ層々莖ヲ匝リテ叢園シ其狀細鱗ヲ連
次スルガ如シ。其後小白花ヲ開單瓣唇狀。上唇ニ义。
下唇三义。是ニ細小ナル。指圓ノ四子生シ栗壳色。軟
脆滑澤。苦味佳香アリ。根細ク鬚ノ如シ。莖葉花共ニ
芳香アリ。冬月莖葉枯レ宿根ス或云根亦枯ル。○第二種ハ
形狀前種ノ如クニメ。稍灌木様ナリ。莖細ク粗慥多
節微赤葉小ク。稍厚ク凹ニメ。匙ノ如シ。灰白色香氣
尤モ烈ナリ。莖葉共ニ冬ヲ經テ枯レズ然凡嚴寒ノ
候ニハ枯ルトアリ。○一種莖葉大ク。鋸齒アル者。

アリ。○第一種ハ種ヲ下シ或ハ扞シ或ハ根ヲ分チ
植テ園ニ培養ス。歐羅巴洲ノ南地ニ生ス。第二種ハ
亞細亞洲。亞弗利加洲ノ諸國ニ產ス。○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ。洋舶ノ品ヲ用
フベシ。或ハ迷迭香ニ代用ス。主治莖葉性温苦辛。香氣頭ニ徹ス。腦及ビ神經衰弱
虛冷ノ諸症ヲ治シ。頭中ニ凝滯スル粘液ヲ疏散ス
ルニ峻功アリ。或ハ粘痰多キ喘急。老人痰喘及ビ
卒倒昏眩。痙攣搐掣。子宮衝逆ヲ治ス。○經閉。處女病。
風氣痞滯疝痛ニ良効アリ。○冒寒傷冷毒ノ頭痛ニ

是ヲ末トシ鼻ニ吸引メ嚏藥トシ鼻膜ヲ刺戟ノ頭
中ノ粘液ヲ引泄シ又鼻ノ香臭徹セザルニ殊効ア
リ○水煎或ハ泡湯トシ或ハ葡萄酒ニ浸シ或ハ蒸
餾ノ露水精油ヲ取リ用フ

茱沃刺那水精油製法薄荷水精油製法括套ニ出ツ
又迷迭香精及油ノ製法ノ如シ**主治**適宜ノ飲液ニ
點服ノ茱沃刺那主治ノ諸症奇効アリ此油ニ沙糖
ヲ和シ嚏藥トシ鼻。香臭徹セザルヲ治ス

度
叔
伍
物
福

遠西醫方名物考卷十終

