

遠西醫方名物考

幾二

卷二十

✕  
e 15

499.2  
En-3.  
20

藥26

499,2  
EM-3  
20

No. 1445  
R E 15



富士川文庫

3287

遠西醫方名物考標目

卷二十

幾那

主治

間歇熱

間歇熱幾那方劑服法

幾那亞爾尼加煎膏

赤幾那煎

雙幾那散

發歇往來諸病

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎

幾那煎



遠西醫方名物考

卷二十

標目

風雲堂藏





喘急 幾那救喘飲

疫效 瘰癧瘰癧

神經病 香竄幾那飲

腹痛 萎黃病

瘰癧 多汗尿崩

失血 肺瘍

勞效 幾那和胸飲 趙護幾那丸

虛損羸瘦病 痛風傷冷毒痛

嗽衝 痘疹發斑

遠西醫方名物考卷二十

遠西醫方名物考卷二十

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那 ○春月八間

主治 此藥ハ強壯收瀋衝動ノ効力ヲ以テ凝體纖維

ノ虚弱ニ屬スル諸病ニ大効ヲ奏ス然レ元運力人

虚極ニ至リ胃腸ノ運營此藥ヲ消化スルハ能ハザ

ル症ニハ害アリ即左ニ其良驗アル諸病ヲ掲テ治

例ヲ示ス

間歇熱 凡ソ間日熱ハ治シ易ク日發熱ハ是ニ次ギ

三日熱ハ解シ難ク。重複熱ハ最解シ難シ。○此病ハ新久ヲ論セズ幾那ヲ用テ良効アリ然レ先ヅ胃腸ヲ淨掃ノ後。少モ焮衝ノ症ナク或ハ内藏ノ壅塞藏内諸器ノ部位ニ微驗スベキ硬結塊癖アリ且其器ノ官能ヲ失フ諸症アルヲ以テ是ヲ知ル。此類和蘭藥鏡凡例ニ略載ヲ兼ルナキ片ハ速ニ幾那ヲ用フス參考スベシ。ベシ其時ヲ失ハズ用レバ頑固經久ノ病トナルナシ。○春月ノ間歇熱ハ治シ易シ然レ焮衝性ノ熱多シ。此症ハ先ヅ刺絡ヲ施シ清涼下劑ヲ投メ焮衝ヲ除クニ非レバ幾那害アリ。○秋ノ間歇熱ハ多クハ胃腸熱重訂内科撰要熱病篇第八章ニ出ツ性アリテ解シ

難シ。此症吐劑及ビ下劑ヲ用テ十分胃腸ヲ淨掃スレレ仍解散セザル者。或ハ是ヨリ替留熱トナル者ハ皆幾那ヲ用テ良驗アリ。○凡ノ間歇熱ハ先其病性ヲ察スベシ。即チ焮衝性。膽液性。寒粘液性ナリ。焮衝性ノ熱病ハ體質壯實ノ人及ビ春月ニ多ク發ス。此症ヲ誤治スレバ替留熱或ハ焮衝熱トナル。膽液性ノ症ハ膽液過多ノ人及ビ季夏秋暑ノ候ニ多シ。此症ヲ誤治スレバ腐敗熱トナル。寒粘液性ノ症ハ體稟虛弱ニノ粘液多キ人及ビ寒冷雨濕多キ秋冬ニ發ス。此症動モスレバ頑滯ノ解シ難ク諸液粘稠



ニメ良性ヲ失ヒ精力虚憊ノ羸瘦シ是ヨリ萎黃病  
 黃疸。水腫。内藏硬結。及ヒ勞瘵トナル者必カラス○  
 右病性各異ナレト皆初發ニヨク病毒ヲ驅除メ速  
 ニ幾那ヲ用レバ險重頑固ノ病トナルトナシ治法  
 ハ初發。間日ニ吐劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ヲ滌除ス  
 ル。肝要ナリ。吐劑ハ乙百葛格安那或ハ韃爾答。越  
 默室。或ハ海葱蜜等ヲ擇ニ與フベシ○焮衝性。膽液  
 性ノ症ハ殊ニ初ニ數輕ク吐セシメ其後清涼下劑  
 ヲ用フベシ即チ瀉利鹽。答麻林度。酒石英。旃那。大黃。  
 瓦老別里鹽ノ如シ或ハ下劑ヲ用テ後吐劑ヲ用ル

其後。焮衝性ノ症ハ刺絡ヲ施シ消石劑。清涼  
 石鹼質ノ藥ヲ用フベシ。膽液性ノ症ハ酸性石鹼質  
 ノ劑及ビ防腐藥ヲ用テ血液ヲ稀釋シ脉管ヲ開達  
 スベシ即チ消石。消石錠消石條。霸王鹽。甘消石精以上消石  
 劑。酒石英。孕礬酒石。民埤列利精。橙汁。醋。酸模根以上  
 清涼防腐劑。蒲公英根。失格列乙。水蒿苴。蘆根。濱瞿麥。瞿麥。  
 山菴菜。碎采薺以上石鹼質ノ藥。葉根共ニ用フ。越幾斯劑トシ用テ殊ニ効有等ヲ擇  
 之用フベシ○寒粘液性ノ症モ初發吐劑ヲ用ヒ又  
 衝動ノ粘液ヲ溶化スル下劑ヲ用フベシ前ノ患者  
 寒粘液質ノ人ニ用ル温資稟ノ條或ハヨク胃腸ヲ淨掃メ後  
 煖衝動開達ノ下劑ヲ云

開達ノ越謨及ヒ鹽劑。苦味香竄劑。温煖劑ニ發汗利  
 尿ノ藥ヲ加ヘ用テ其熱毒ヲ驅除スベシ。即チ瓦爾  
 拔奴謨。越謨安。沒尼亞。幾撒瓦。百奴謨。沒藥。以上開達  
 王鹽。孕礬酒石。酒石葉。以上開達健質亞那。亞爾鮮。葛爾  
 儒珊篤里。纈草根。攝爾扁答利亞。土木香。橙皮。以上苦  
 温煖等ノ如シ發汗利尿藥ハ即チ硃砂精。民埏列利  
 精。鹿角精。精製土茯苓。薩撒弗刺斯。昆答刺。越兒發海  
 葱。硫黃華。等ノ如シ右ノ諸藥ヲ適宜ニ擇テ用テ患  
 者呼吸寬徐。腹肚和柔。內藏壅結硬塊ナク舌苔去リ  
 諸部疼痛ナキニ至テ其熱仍解散セザル者ハ幾那

ヲ用テ速ニ治ス○或云。焮衝性ノ症ハ幾那ニ清涼  
 藥ヲ加ヘ。膽液性ノ症ハ防腐藥ヲ加ヘ。寒粘液性ノ  
 症ハ苦味開達ノ藥或ハ發汗利尿ノ藥ヲ加ヘ用テ  
 病毒ノ排泄ヲ助ルモ亦良以上ノ諸藥

**間歇熱。幾那方劑。服法** 間日熱。日發熱ハ幾那ノ末一

ヲ取リ分テ八服或ハ十服トシ發作後ヨリ次ノ  
 發作前マデニ盡ク用ベシ。日發熱ハ發作劇盛ナル  
 時過レバ速ニ用ベシ。熱ナキ時少ケレバナリ。重複  
 熱ハ熱ナキ時最少キ故ニ服數ヲ減メ分量ヲ増ス  
 ベシ。三日熱ハ幾那ノ末一ヲ半或ハ二ヲ間日ニ



用、ベシ總テ間日ノ多キニ隨テ服量ヲ多クシ且、日  
數モ長ク用、ベシ否ラザレバ良効ヲ成シ難シ○間  
日熱ハ上好ノ幾那ヲ末トシ一多ヲ取テ次ノ發作  
前マデニ盡ク用、レバ治セザル者稀ナリ○幾那ノ  
末ハ水。乳汁。麥酒。葡萄酒。等適意ノ飲液ニ和シ用、ベ  
シ○或云。幾那ノ末ニ燒酒少許ヲ加ヘ飲劑ニ和シ  
用、レハ其華爾斯ヨク溶解スル故ニ尤効多シ假令  
ハ左ノ方ノ如シ

幾那默栗薩飲

幾那 末

燒酒

各一多

默栗薩水

三十多

覆盆舍利別

六十錢

右調和シ硝子壘ニ内レ固封シ貯ヘ用ルニ臨テヨ  
ク振蕩シ半時ニ一匙宛服ス○幾那ハ散劑トシ用  
ルヲ良トス。煎劑ハ煮ルニ因テ華爾斯ノ精微ナル  
質。蒸散シ其餘ハ冷ルニ隨ヒ罐底ニ沈テ融和シ難  
ケレバナリ二人同症ノ間歇熱ニ於テ一ハ散劑一  
ハ煎劑ヲ同時ニ用ヒ試ルニ散劑ノ功捷ナリ。又其  
他幾那ノ諸製劑モ散劑ニ比スレバ其質全備セズ  
ノ効力劣レリ體稟壯實ナル少女姊妹アリ。共ニ初  
秋同症ノ三日熱ヲ患ヒ對症ノ藥劑ヲ用、テ後幾那

ヲ煉膏トシ或ハ煎劑トシ用レテ治セズ。遷延累日ノ間漸ク幾那劑ヲ厭ヒ且、飲食起居等攝養ヲ慎マズ。其熱逾頑固ニメ解散セズ終ニ羸瘦罷困甚シ。因テ患者俱ニ醫ニ告テ云、若シ此頑滯危篤ノ疾。幸ニ瘳ルトヲ得バ何如ナル氣味ノ惡ムベキ藥劑モ服スベク。幾多ノ服量モ是ニ堪テ必モ厭フナク用フベシト。乃チ醫幾那ノ末ニ苦味鹽瓦老別里鹽或ハ瀉利鹽等ト鐵劑ヲ加ヘ散劑トシ一錢ヲ一服トシ四分時ニ一服宛水或ハ葡萄酒或ハ麥酒ニテ間日ニ服セシム。是ヲ用ルト三日ニメ其熱發作セズ。因テ此劑日

ニ二服宛與ヘ其後八日ニ一服或ハ隔日ニ用ルト二十餘日ニテ竟ニ再發セズ。但、其後二人ニ咽喉焮腫ヲ發ス。然レテ對症ノ藥劑ヲ施メ速ニ治ス。是ヲ以テ觀レバ幾那ハ此病ニ奇効アレテ服量饒多ニメ其毒ヲ制伏スルニ足ルニ非レバ効ナシト知ルベシ。○或云。發作ノ少シ以前ニ幾那末二錢許ヲ取テ一頓ニ服スレバ常法ノ如ク一多ヲ用ルヨリハ効多シ。或云發作ノ初惡寒ノ時。右ノ如ク用テ峻効アリト。然レテ斯ノ如ク用ルニ劇キ煩悶搐搦等ヲ發シ死スル者アル故ニ近來此服法ヲ廢セリ。○幾那



ノ散劑ヲ服スルノ能ハザル者ハ其服量ノ一倍ヲ  
取テ煎劑トシ用フベシ假令バ左ノ如シ

**幾那煎**

幾那 二弓

右水適宜ニ加ヘ煮テ滓ヲ去リ其湯十二弓若クハ  
十六弓ヲ取リ半時毎ニ一小茶碗ヲ服ス或ハ舍利  
別一二弓ヲ和スレバ服シ易シ○或ハ衝動開達ノ  
驅熱藥ヲ加ヘ水煎メ用ルモ亦良假令バ左ノ如シ

**幾那亞兒尼加煎**

幾那 一弓半

右水ヲ加ル下適宜煮下四分時ニメ滓ヲ去リ左ノ  
藥ヲ加ヌ  
亞兒尼加花 四錢

右沸湯十六弓ヲ加テ泡出シ滓ヲ去テ舍利別一弓  
半或ハ二弓ヲ攪和シ是ヲ右ノ幾那煎ニ加ヘ半時  
毎ニ一小茶碗ヲ服ス○往古ハ幾那ノ粗末ヲ煮下  
一時半ニメ藥力盡ク其湯ニ出ツト云近來醫家ノ  
說ニハ右ノ如ク濃煎スルニ由テ其精微ノ質半蒸  
散シ効力大ニ劣レリトス故ニ近來ノ藥局ニハ左  
ノ如ク製メ其揮發精微質耗散セズ尤効アリトス

局方幾那煎

幾那 極細末 二多

沸湯 二十八多

右調和ノ磁罐ニ内レ蓋閉シ慢火ニテ煮ル八分時

毛布ニテ濾過スレバ其液十六多トナル。稍放冷メ

速ニ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

赤幾那煎

赤幾那 細末 二多

沸湯 三十二多

右煮テ濾過スル。前法ノ如クシ其液二十多トナ

ル 按 幾那ノ効力ハ其揮發ノ質ニ在ル故ニ右ノ如

ク稀キ煎劑ト爲セハ其質蒸散セズノ尤効アリト

ス ○或云幾那ノ末一多ニ水八多或ハ十多ヲ加ヘ

暫ク研磨シ飲劑ト爲セバ其効諸煎劑ニ勝レリ ○

此病ハ幾那ノ服量ヲ多クシ且久服スルニ非レバ

良効ヲ成シ難キガ故ニ其味ヲ厭ヒ惡ム者ハ他藥

ヲ加テ味ヲ佳シ用ル。醫家ノ權法トス。假令ハ幾

那煎ニ橙皮舍利別。薄荷舍利別。茴香舍利別。製法薄

別ト接骨木傑列。若クハ昆設爾弗等。其症ニ隨ヒ

擇ニ用ルガ如シ ○或ハ幾那ノ散劑若クハ煎劑ニ



右ノ舍利別昆設爾弗類ヲ加へ煉膏トシ適意ノ飲液ニテ送下スルモ良。或ハ左ノ煉膏ヲ用フベシ。

幾那加密列飲

幾那末六錢

加密列末二錢

珊篤里越幾斯劑

水揚梅根末

各半錢

接骨木傑列乙

半錢

橙汁舍利別

適宜

右調和シ煉膏ト爲シ四分時ニ一卵匙宛服ス○幾

那ノ散劑煎劑共ニ服スルノ能ハザル者ハ苦味ノ

越幾斯劑葛爾儒健質亞那珊篤或ハ鐵劑或ハ香竈

藥ヲ加へ丸藥トシ與フベシ或ハ左ノ方ヲ用フ

幾那丸

幾那一弓

覆盆舍利別

適宜

右適宜ニ調和シ三瓜ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トス

或ハ銀箔ヲ衣トシ其味ヲ藏スモ良。大約二百八十丸トナル。一劑ヲ

一日ニ服ス○幾那ヲ多久服スルノ能ハザル者ハ

一二弓ヲ取テ煎劑若クハ浸劑トシ是ヲ吉利詞爹

兒トシ肛門ニ注輸シ其効ヲ補助スベシ。或ハ昏睡

惡心嘔吐。搐搦等ノ如キハ嚥下シ難キ故ニ幾那ヲ

吉利詞キリス爹兒テイルトシ施ノ速効ヲ得ルトアリ。少許スコシ宛施セバヨク腸中ニ住留ス。或ハ其症ニ隨ヒ阿芙蓉少許ヲ溶シ加テ良効ヲ得ルトアリ。但先必輕キ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ淨刷ノ是ヲ施スベシ。是内服スルニ比スレバ幾那ノ量三倍モ多ク施ノ的當ス。宜ク一時半或ハ二時毎ニ施シ。每次幾那ノ量五六錢ヲ用フベシ。或ハ濃煎トシ是ニ幾那越幾斯劑ヲ溶シ加レバ尤効アリ假令タトヘバ左ノ方ノ如シ

幾那吉利詞爹兒

幾那煎

四弓

幾那越幾斯劑

四錢

扁桃油

或阿利襪油

阿芙蓉丁幾去爾

五滴至十滴

右調和ノ吉利詞爹兒トス。二時ニ一劑宛施スベシ

○小兒ハ幾那越幾斯劑一錢ヲ取テ温湯ニ溶シ阿芙蓉丁幾去爾少許ヲ加ヘ吉利詞爹兒トシ施スベシ

シ。幾那劑ヲ内服メ治セザル症モ間速効ヲ得ルトアリ

アリ○幾那ヲ琶布若クハ蒸湯劑トシ腹部ニ施シ

或ハ浴湯トメ間歇熱ニ良効アリ小兒ハ二弓。大人

ハ五弓ヲ取り煮テ琶布トシ數日は腹ニ貼スベシ

但是ニ熱湯ヲ濕メ貼シ乾ケバ更ニ數濕スベシ

或云。間歇熱ニ幾那十六弓ヲ取り煮テ琶布トシ布



片ニ夾ニ適宜ニ温メ。胃ノ部ニ貼メ速効ヲ得タリ  
 或云。小兒ノ間歇熱ニ幾那ヲ葡萄酒ニ煮テ胃ノ部  
 ニ貼メ多ク治驗アリ。或ハ是ニ龍腦ヲ加ヘ貼メ多  
 ク蛇蟲ヲ下ス。アリ。或云。間歇熱ニ幾那一比ヲ水  
 煎ノ間日ニ數患者ノ脚ヲ浸シ暫ク摩擦メ大効ヲ  
 得タリ。或云。小兒ノ間歇熱ニ幾那ノ末一二ヲ綴  
 布ノ縹絆ニ縫内レ著セシメテ治スト。○間歇熱治  
 メ後。再發ヲ防グガ爲ニ暫ク幾那ヲ用ヒ。或ハ症ニ  
 隨テ下劑ヲ與ル。アリ。通例ノ間歇熱ハ治シ易シ  
 ト雖モ再發ヲ防グハ甚ダ難シ。熱性ノ患者。再發ス

ルハ赤幾那散劑ヲ服量多ク用ベシ。但是ヲ服ノ頭  
 旋痞懣等ヲ發シ多ク用難キ者ハ左ノ方ヲ用ベシ

雙幾那散

赤幾那

黃幾那

各十二錢

霸王鹽

四錢

右散劑トシ分テ二十五服若ハ三十服トシ。熱間歇

セル時。半時ニ一服宛飲液ニテ送下ス。○頑固ノ日

發熱。間日熱ハ治メ後。第十日ニ再發シ。三日熱ハ治

メ後。第十四日ニ再發スル。多シ。故ニ日發熱。間日

熱ハ治メ後。一週毎ニ幾那ヲ用テ三週或ハ四週ニ

至ルベシ三日熱八十日毎ニ用ヘシ○秋人間歇熱  
ハ幾那ヲ用治メ後動モスレバ再發シ患者終ニ羸  
瘦ノ粘液質トナリ且幾那ヲ嫌ヒ惡ムコ多シ此症  
ハ幾那ヲ用テ効ナシ唯韃爾答越默室或ハ乙百葛  
格安那ヲ少許宛數用テ惡心嘔氣ヲ起サシメ是ヲ  
以テ内部諸器ヲ衝動ノ其潛伏セル膠粘ノ膽液及  
粘稠液ヲ溶解ノ排泄セシメ其後苦味ノ越幾斯劑  
ニ中和鹽或ハ硃砂ヲ加ヘ用テ峻効アリ假令バ左  
ノ方ノ如シ

解凝排毒飲

接骨木花水 六勺  
珊瑚里越幾斯劑 五錢

硃砂 一錢  
舍利別 一勺

右調和シ半時ニ一匙宛用フ是ヲ用テ熱勢減シ或  
ハ回復スルキハ患者ヲ高燥ノ地ニ移メ新鮮氣ヲ  
受シムベシ右ノ劑ヲ用テ仍全治セザル者ハ復幾  
那劑ヲ用テ良効アリ○間歇熱頑固ニメ發作ノ時  
刻少モ違ハザル症ハ阿芙蓉金硫黃等ヲ用テ其時  
刻ヲ變移セシムレバ治シ易シ乃左ノ方良驗アリ

芙蓉金硫散

金硫黃 各二錢  
阿芙蓉 各二錢



沙糖 一匁

右散劑トシ分テ二服トシ發作ノ半時前ニ一服ヲ與ヘ四分時過テ又一服ヲ與スベシ。是ヲ用上テ發作ノ時刻變スル片ハ其後數幾那ヲ用ヘシ或ハ此劑ニ幾那ヲ加テ良驗アリ假令ハ左ノ方ノ如シ

芙蓉幾那散

金硫黃 十六匁 阿芙蓉 三匁

加密列 各八匁

三香散

此劑桂薑益智各四分調和シ散劑トス

右調和シ散劑トシ分テ十六服トシ熱歇ハ時ニ於

テ半時ニ一服宛飲液ニテ送下ス經久ハ間歇熱モ大抵三四劑用レバ治ス

發歇往來諸病凡ノ時日ヲ定テ發スル病ハ幾那ヲ

用テ治スル下亦間歇熱ノ如シ即發止時アル癩喘

急疫效瘧癰搐掣等ノ如シ或ハ發作スレハ發熱煩

渴欬衝ノ諸症ヲ現ハシ或ハ肢體勞倦懈惰顔色黧

澹ナル者アリ或ハ頭痛心腹痛眼耳痛失血等ヲ發

シ或ハ痛風傷冷毒痛ヲ發シ間歇ノ時ハ脉平常ノ

如シ其發熱欬衝等ノ症ハ間歇熱ノ欬衝性膽液性

ノ治法ヲ施ノ後幾那ヲ用ヘシ勞倦懈惰ノ症ハ秋

發スル頑固ノ間歇熱及寒粘液性ノ療法ヲ施メ後  
 幾那ヲ用テ治スベシ○發歇アル昏睡。發狂。痙攣。搐  
 掣等ノ頭腦。神經ニ係ル病ハ刺絡。發泡。打膿法。脚湯  
 ヲ兼施メ病毒ヲ導泄シ。熱性ナラザル患者ハ幾那  
 ニ神經劑ヲ兼用スベシ即チ刺賢。堙兒精。鹿角精。琥  
 珀精。葛私多。樓謨等ヲ擇ムベシ。搐掣ノ諸症ハ鎮痙  
 劑ヲ兼用スベシ即チ精製阿芙蓉。舍電發謨。阿芙蓉  
 液。實亞格。日温。白罌粟。舍利別等ヲ擇ムベシ○凡血  
 液腐敗ニ傾キ。諸症發止往來ノ解セザル病ハ幾那  
 ノ強壯收瀋防腐ノ効力ヲ以テ患者ノ精力ヲ挽回

メ治スルノ宛モ間歇熱ノ如シ。然レ胃腸ニ病毒ア  
 ル者ハ是ヲ疏滌シ多血家ハ刺絡ヲ施シ壯熱。炊衝  
 アル片ハ清涼劑ヲ與ル等。各對症ノ治法ヲ施メ後。  
 幾那ヲ用ヘシ○毎日。時ヲ定メテ各部暫ク炊痛ス  
 ル症ハ幾那ヲ用テ多ク捷効アリ毎年若クハ毎月  
 發スル症モ是ニ同シ○一男子劇キ偏頭痛ヲ發ス  
 ルヲ毎日四時許。幾那ヲ用テ速ニ治ス○一男子毎  
 日午時ヨリ偏頭痛ヲ發メ堪忍ビ難ク曉ニ至テ休  
 ム。諸藥効ナク阿芙蓉劑ヲ用レバ稍寛解スレレ全  
 治セズ。終ニ幾那ノ越幾斯劑ヲ用テ其痛速ニ解散



シ回復ス○一婦人毎日晚間頭ノ右邊及右腕疼痛  
シ夜中増劇シ早朝漸ク減シ午前ニ解散ス刺絡發  
泡蒸湯藥其他内外方法寸効ナシ終ニ幾那ヲ用テ  
全治セリ○一男子毎日眼盲スルト一時許幾那ヲ  
用テ治ス○一男子毎夜大ニ顫振シ次テ發狂スル  
ト一時半許ニノ解ス晝間神思樂マズ沈黙鬱悒シ  
怯怖スルト小兒ノ如シ此症孕礬酒石ヲ蜜ニ溶シ  
幾那煎ニテ送下シ治効ヲ收ム○七歳ノ女兒數搗  
搦ヲ發シ荏苒トメ治ヒズ幾那ヲ水ニ浸シ其液二  
弓ヲ取テ忽弗滿鎮痛液少許ヲ滴シ加ヘ數内服セ

シメテ回復セリ○頭眩眩暈肢體顫掉心動悸癢痛  
等ノ神經病時ヲ定テ發スルト宛モ間歇熱ノ如キ  
症ハ皆幾那ヲ用テ奇効ヲ得ル經驗說甚々多シ

**喘急**時日ヲ定テ發スル乾喘重訂內科撰要喘急篇  
第百九十五章ニ出ル

是性ノ喘ハ發作ナキ時幾那ニ開達ノ神經劑鎮痙

劑解凝ノ鹽劑開達神經劑ハ葛松多樓謨鹿角精琥珀精撒瓦百奴謨樓謨安沒尼亞幾那

爾技奴謨阿魏沒藥等ヲ云鎮痙劑ハ阿芙蓉劑ヲ云

解凝鹽ハ霸王鹽孕礬酒石亞爾鮮鹽酒石鹽等ヲ云

ヲ兼用メ胸中ノ壅塞ヲ開通シ或ハ發泡膏ヲ胸背

ニ貼シ或ハ脚湯ヲ施メ効アリ○三日一發ノ喘急  
ニ神經劑解凝劑ヲ用ヒテ後左ノ方ヲ與ヘテ屢治

驗ヲ得タリ

幾那救喘飲

幾那未

玫瑰昆設爾弗

各一弓

亞爾鮮鹽

孕礬酒石

瀉利鹽

各一錢

麗春花舍利別

適宜

右調和ノ煉膏トシ發作セザル時。生時毎ニ胡桃大  
ヲ與フ。○一少年毎日午時喘急ヲ發ス。然レ脈甚夕  
變セズ平常ノ如シ。幾那ヲ用テ速ニ治ス。○濕喘ハ  
多ク粘痰ヲ吐キ古苔アリ。此症ハ粘液多ク胃腸ニ  
壅滯スル故ニ吐劑下劑。開達劑。解凝劑ヲ用ヒテ肺

胃ノ粘液ヲ驅除シ其後喘急劇發セザル時。幾那ヲ

用テ良驗アリ。其開達劑ハ樓謨安沒尼亞幾。瓦爾拔

奴謨。撒瓦百奴謨。阿魏。沒藥。酒石鹽。亞爾鮮鹽。葛爾儒

鹽。孕礬酒石。等ヲ擇ムベシ。解凝劑ハ結爾茂斯。密涅

刺列。金硫黃。勿搦。祭亞石。鯨。睡菜。越幾斯劑。水葛苴。越

幾斯劑。碎米。薺。越幾斯劑。等ヲ擇ミ用ベシ。吐劑ハ乙

百葛格。安那。韃爾答。越默室。安質。沒扭酒。默他兒。雜腹

蘭酒。等下劑ハ瓦老。別里鹽。瀉利鹽。等ナリ。或ハ幾那

ニ右ノ諸藥ヲ擇ミ加ヘ若ハ互ニ用ベシ。○幾那ハ

初少許宛用テ漸ク加フベシ。一頓ニ多ク與フレバ



胸腹ニ停滯シ呼吸不利痞滿等ヲ發シ肺及ビ胃腸  
ノ分利排泄ヲ妨レバナリ○往年小兒ノ喘息大ニ  
流行シ毎日劇ク發作ス此症ニ阿魏ヲ飲液ニ和シ  
用ヒ或ハ吉利詞參兒トシ施ノ多ク良驗ヲ得タリ  
是ヲ用テ治セザル症ハ皆左ノ方ヲ用テ驗アリ

薄荷幾那飲

薄荷水 六錢

幾那末 一錢

洋石竹舍利別 花ヲ用テ製法董菜舍  
別利別ト同シ 二錢

右調和ノ飲劑トス此劑ヲ用レバ喘急淹滯セズ或  
ハ經久頑固ノ症モ亦殊効アリ○經久ノ喘急ハ發

作中ニ龍腦清涼飲 世部ヲ用ヒ發作セザル間ハ健

質亞那 珊篤里葛爾儒亞爾鮮亞兒尼加 橙皮 土木香

根及ビ越栗失爾赫篤立等ノ苦味ノ藥ヲ用テ胃ヲ

健運シ又幾那ニ鐵劑ヲ加テ纖維ノ弛弱ヲ強壯ニ

シ全功ヲ成スベシ或ハ經久ノ喘急終ニ勞瘵様ト

ナル症幾那ニ沒藥ヲ加ヘ用テ全愈セル者アリ

疫效 此病小兒ニ多シ初起病毒ノ刺戟甚フノ嗽衝

様ノ諸症劇盛ナル者ハ幾那害アリ然レ病勢漸ク

衰ヘ諸症番替メ發止往來スルニ至レバ幾那良効

アリ又麝香阿芙蓉等ヲ加テ神經ヲ揮發シ痙攣ノ

運動ヲ鎮定ノ殊ニ良○此病發歇アルノ間歇熱ノ如キ者ハ粘穢汚物。胃中ニ鬱滯ノ刺戟衝動シ發スル者多シ。故ニ吐劑及ビ下劑ヲ與ヘテ汚液ヲ滌除シ其後。開達發汗利尿ノ劑開歇熱ノ條ニ出ツヲ用テ粘液ヲ稀釋シ壅滯ヲ疏通シヨク病毒ヲ驅除ノ後。其效仍休ザル者ハ幾那ヲ用テ大効アリ或ハ神經劑。鎮痙劑ヲ加ヘテ其劇キ效ヲ靜止スルモ亦良

**痙攣搐掣** 痙。子宮衝逆等皆痙攣病ニ屬ス。幾那ヲ用テ良驗アリ左ニ其治驗ヲ舉グ○一患者年十八。嘗テ十歳ノ時驚駭ニ由テ痙ヲ發シ人事ヲ省セズ爾

來數發シ十六歳ニノ痙トナリ其症仍數發作ス是ニ幾那ヲ與ルノ一月許。其發作ノ劇症漸ク減シ其後全治セザレモ稀ニ輕ク發動スルニ至ル○一婦人年十八。熱病後數子宮衝逆ノ症ヲ發シ諸藥効ナシ。終ニ幾那ヲ用ルノ半月許ニソ回復ス○一婦人子宮衝逆ニ罹リ其症數發ノ經年治セズ。幾那ニ撒兒末爾サハルマール扶斯フスト益智ヲ加ヘ用ルノ三週ニメ全愈ス○一男子年二十一。痙ヲ患ルノ二年。幾那ニ類草ヲ加ヘ與ルノ十日ニメ諸症大ニ寛解シ爾後全愈セザレモ其劑ヲ連進メ稀ニ輕ク發スルニ至ル○



右ノ經驗說ヲ以テ觀レバ少モ熾衝ノ候ナク他病  
ヲ兼ザル搖掣病ハ幾那ノ峻効アルヲ知ルベシ  
**神經病** 幾那ハ幾多ノ神經病ニ治驗多シ。凡ソ疑體  
纖維ノ脆弱ニノ神經感動シ易キ者ハ動モスレバ  
憂愁忿怒驚恐等ノ神思ノ擾動ニ由テ頭眩眩暈。搦  
掣攣急。衝逆。精神鬱重。悒悶。心腹痛等ノ症ヲ發スル  
ト多シ是神經ノ感動甚フメ靈液ヲ運行常度ヲ失  
フヨリ發スルナリ。此症ハ專ラ幾那ヲ用テ疑體纖  
維ヲ健固シ殊ニ神經質ヲ強壯ニシ又香竄揮發ノ  
神經藥ヲ兼用メ幾那ノ効ヲ資益スベシ。即チ纈草。

茱<sup>マ</sup>沃<sup>ヨ</sup>刺<sup>ライ</sup>那<sup>ナ</sup>。山柰。菩提樹花。橙皮。沒藥。撒<sup>サ</sup>瓦<sup>ガ</sup>百<sup>ベ</sup>奴<sup>ヌ</sup>謨<sup>ム</sup>。乳香。  
阿魏。琥珀。葛<sup>オ</sup>私<sup>スト</sup>多<sup>ト</sup>。儂<sup>レ</sup>謨<sup>ム</sup>。刺<sup>ライ</sup>賢<sup>ヘン</sup>埵<sup>デ</sup>兒<sup>ル</sup>精。鹿角精。及ビ鐵劑  
ノ如シ。然レ内藏壅塞アリ或ハ侵刺衝動スル内因  
アリテ此症ヲ發スル者ハ先ツ其因ヲ除治メ幾那  
ヲ用ルニ非レバ効ナシ○神經病ハ幾那煎ニ亞<sup>ア</sup>兒<sup>ル</sup>  
加利鹽及ビ揮發ノ神經藥ヲ加テ殊効アリ。假令ハ  
左ノ方ノ如ク製メ甚ダ驗アリ

**香竄幾那飲**

幾那 二勺

酒石鹽 二錢

右水適宜ニ加ヘ煮テ其液十四勺ヲ取り左ノ藥ヲ

加不... 默栗薩精 二錢  
阿魏... 一錢  
橙皮舍利別 二錢

右調和シ一小茶碗ヲ用ル丁日四次此劑中ノ阿魏  
丁幾去爾...ヲ去テ葛私多僕謨...丁幾去爾二錢ヲ加レ  
バ其効尤峻ナリ

腹痛 痙攣ノ運動ヨリ發スル腹痛ハ幾那ニ鎮痙藥  
及ビ神經劑ヲ加ヘ用ヒテ捷効アリ ① 蛇蟲ヨリ發  
スル腹痛モ幾那殊効アリ但粘液ヲ溶化スル劑及  
ビ下劑殺蟲劑ヲ兼用スベシ即チ開達ノ樓謨類

安... 沒... 尼... 亞... 幾... 瓦... 爾... 拔... 奴... 謨... 撒... 勿... 擲... 祭... 亞... 石... 鹼... 孕... 礬... 酒... 石...  
疑... 藥... 解... 瀉... 利... 鹽... 瓦... 老... 別... 里... 鹽... 落... 葉... 松... 耳... 盧... 會... 若... 傑... 禮... 需...  
謨... 下... 劑... 纈... 草... 攝... 絲... 施... 那... 加... 羅... 蔑... 兒... 甘... 汞... 草... 麻... 油... 以上殺

等ナリ宜ク其症ニ隨ヒ擇ムベシ  
萎黃病 總テ萎黃病ノ類及ビ失苟兒...陪苦...ハ纖維弛  
弱メ血液ノ良性ヲ失ヒ運行怠慢ニメ壅滯スル病  
タルガ故ニ幾那ヲ用テ開達衝動收固強壯防腐ノ

良効ヲ奏スルナリ或ハ其症ニ隨ヒ温煖開達防腐  
劑... 攝... 爾... 刺... 越... 兒... 發... 根... 良... 薑... 健... 質... 亞... 那... 珊... 葛... 里... 及... 藥... 吐... 劑...  
下劑利尿發汗劑ヲ兼用シ或ハ鐵劑ヲ用テ幾那ノ



効力ヲ扶クベシ此病ニ熱ヲ兼ル者ハ腐敗熱ノ藥劑ヲ與ヘテ的當ス

瘰癧 瘰癧腫及ビ其毒ヨリ險惡ノ諸症ヲ發スル者

ハ幾那多ク良効アリ然レ其毒既ニ深ク滋蔓シ大

ナル腺ニ壅結ノ惡厲ノ硬腫トナル者ハ幾那害ア

リ○各部ノ腺ニ膿ヲ成シ荏苒タル内伏熱ヲ發シ

日ニ虚羸ニ就ク症ハ幾那ヲ的當トス徽毒ニ因テ

右ノ如ク虚損スル者或ハ汞劑ヲ用ヒテ吐涎過多

ナル者ハ皆幾那ヲ用ヒテ其精カヲ保護シ脱泄ヲ

防クニ尤良

多汗尿崩 此兩症ハ汗及ビ小便ヲ排泄スル細管大

ニ弛弱縱解セルヨリ發シ或ハ血液甚ダ稀薄ナル

ヨリ發ス故ニ幾那ヲ用ヒテ收固強壯ノ偉効アリ

或ハ其症ニ隨ヒ阿芙蓉ヲ加ヘ或ハ礮性ノ酸精ヲ

加ヘ清涼收斂ノ殊ニ驗アリ

失血 吐血。衄血。崩漏。孕婦産後墮胎ノ崩血。痔血。外傷

失血等多血ニシテ血液沸騰妄行シ發スル症ハ刺絡

ノ治スベシ幾那害アリ。焮衝ノ症去テ仍失血甚ク

ノ止ザル者ハ幾那煎ニ綠礬精若クハ硫黃精ヲ加

ヘ或ハ阿芙蓉劑。亞刺比亞。亞釐謨。或ハ阿煎藥。赤石脂。

血竭等其症ニ隨ヒ擇テ加ヘ用ヒテ血ノ運行ヲ抑  
制シ治スベシ○内部諸器ノ脉管大ニ弛弱シ血稀  
薄ニシテ細絡ノ末梢ニ滲出シ或ハ血絡破裂ノ失血  
ヲ爲ス者ハ專ラ幾那ヲ用ヒ或ハ玫瑰舍利別ニ研  
和シ與ヘテ殊効アリ  
**肺瘍** 肺ノ潰瘍ハ幾那良効アルト云カラズ。是レ纖  
維ヲ強壯シ腐壞ヲ遏メ創ヲ愈シ肺靜脉ヨリ血中  
ニ吸收セル膿ヲ排泄シ。潰瘍ノ周圍ヲ收固メ腐爛  
ヲ防ギ良膿ヲ醸スルト諸潰瘍ニ用テ良驗アルガ  
如シ。然レ此病甚ダ增長ノ精力虛脱シ惡症ヲ現ス

者ハ不治トス○此病ハ起居攝養ヲ慎ミ淡薄ノ飲  
食ヲ用ヒ殊ニ一切肉類ヲ禁シ麥類蔬菜及ビ乳汁  
ヲ與ヘテ腐敗ヲ防ギ血熱ヲ清涼ニシ。藥劑ノ効ヲ  
扶ルト最要ノ先務トス○肺瘍潰破シ欬ノ其膿ヲ  
咯出スルハ最良トス。否ラザレバ其腐壞ノ酷厲毒  
肺ニ鬱蓄ノ侵蝕シ其瘍逾増展スレバナリ或ハ其  
膿小便ヨリ通泄スルモ亦良。但下利若ハ汗ヨリ排  
泄スルトアレバ此兩道ヨリ數多ク出ルハ必ズ佳  
事ニ非ズ是ニ由テ治スルト稀ナリ○多ク膿ヲ吐  
ク症ハ幾那良効アリ但是ニ緩和ノ効アル藥ヲ加



へ用テ效ノ急迫ヲ緩メ且幾那ノ收瀦ニ因テ吐痰  
ヲ障碍スルコトナクヨク咯出セシムベシ即チ亞刺  
比亞護ゴム達刺侃ト篤甘草膏ト過爾託亞ト葵類石長生等  
ヲ煎劑トシ若ハ舍利列ト爲スガ如シ○其膿小便  
ニ排泄スル症尿ヲ洩器ニ取リハ屋施茂兒海葱蜜  
民埜列利精レ甘消石精リ消石錠リ霸王鹽等ヲ擇テ幾那  
ニ加ヘ用テ其排泄ヲ扶クベシ○此病壯熱ヲ發シ  
若ハ肺中壅塞スル處アルヨリ吐痰ヲ妨ケ咯出シ  
難キ症ハ先是ヲ治スベシ痰ヨク咯出スルニ非レ  
バ幾那ヲ用テ害アリ○肺瘍甚ダ增長セザル者ハ

右ノ如ク意ヲ用テ幾那ヲ與レバ多ク良驗ヲ奏ス。

幾那ノ肺瘍ニ効アリト稱スルハ皆右說所ノ症ナ

リ○胸内瘍重訂内科撰要第百六十四章ニ出ハ幾那ヲ用テ間全治

ス。痰ノ臭氣多キ症ハ殊ニ効アリ○肺中ノ各處化

膿スベキ硬結腫ヲ生メ勞效トナル者並ニ焮衝性

ノ病アリテ肺ニ膿ヲ成ス者ハ幾那害アリ

勞效勞效及ビ勞瘵様ノ羸瘦病凝體纖維ノ虛弱弛

解セルヨリ發シ或ハ瘰癧毒ノ潜伏メ侵襲スルヨ

リ發スル症ハ幾那良効アリ○痰ヨク咯出シ或ハ

膿ヲ交ヘ其熱間歇往來シ若ハ時ヲ定テ増發シ脉

弱。精力缺脱スル症ハ幾那ヲ用テ驗アリ○吐痰甚  
ダ多クノ脉弱。精力缺脱スル者ハ殊ニ幾那適應ス。  
吐痰甚ダ多クレバ精力是ガ爲ニ虛脱シ其潰瘍ヲ  
愈スベキ善膿ヲ化醸スルヲ能ハザレバナリ○幾  
那ノ散劑ハ其熱ヲ増發シ胸中促迫ヲ起シ吐痰ヲ  
阻遏スルヲアル故ニ煎劑トシ用フベシ。是ヲ沸湯  
ニ浸シ煎スレバ殊ニ効多シ假令バ左ノ方ノ如シ

幾那和胸飲

幾那 一  
沙列布根 一  
亞刺比亞越謨ヲ用

右幾那ニ適宜ノ沸湯ヲ加ヘ浸ス  
トハ時ニシテ沙列

布根ヲ加ヘ煮ル  
トハ分時。漉テ其液十四ヲ取リ

舍謨亭黠謨舍利別。十二錢ヲ攪和シ一時半或ハ二

時毎ニ半茶碗ヲ服ス  
按ニ白及沙列布ノ一族ナリ

○患者體質乾涸ノ痰出難ク或ハ欬劇ク  
痰稀キ

ハ沙列布其他緩和ノ藥ヲ加ヘ用ベシ  
全軀羸瘦甚

ク。胃弱キ者ハ依蘭苔ヲ加フベシ  
○幾那劑ハ甘草

ヲ加テ宜シ是ニ由テ其苦味ヲ甘和シ  
又吐痰シ易

カラシム○幾那ノ煎劑ヲ用テ熱減シ痰目ク咯出

スル者ハ幾那ノ末ヲ飲液ニ和シ或ハ煉膏ニ和シ



日二三回用フベシ。○幾那ヲ用テ後。冷氣ニ冒感シ  
 吐痰俄ニ止。煩悶スル者ハ過爾託亞。甘草。或ハ亞  
 刺比亞。越謨ノ末ニ甘草膏ヲ加テ用テ肺ノ癆急ヲ  
 緩和シ痰ヲ滑利セシメ。痰ヨク出ルニ至テ復幾那  
 ヲ用フベシ。○幾那ヲ用テ發熱減シ炊衝候ナク  
 脈甚々急疾ナラズ呼吸促進セズ痰日夕出ル者ハ  
 左方ヲ用フベシ。

**越謨幾那丸**

合 越謨幾那 一兩  
 亦 幾那 一兩  
 各 二錢  
 甘草膏 一錢

二錢製法蒲公英  
 越幾斯劑ト同シ

**龍牙草越幾斯劑**

二錢製法蒲公英  
越幾斯劑ト同シ

右調和シ舍利別ヲ加ヘ三氏ヲ一丸トシ。六丸若ハ  
 八丸宛用ル。一日ニ三回。○顔色黧澹灰白。熱ナク血  
 液沸騰ノ候ナキ者ハ左ノ方ヲ用テ驗アリ。

**乳沒越幾斯劑**

乳糖 一兩半  
沒藥越幾斯劑 四錢

右調和シ一月或ハ半錢宛用。一日ニ三回。但以前ニ  
 吐血ノ症アル者ハ沒藥ノ量ヲ減スベシ。○勞瘵ノ  
 汗多ク出ル症ハ幾那煎ニ越栗失爾。赫篤立少許ヲ  
 加ヘ用テ殊効アリ。○勞瘵ニ拔爾撒謨劑ヲ與レバ

其熱ヲ増發シ良効ヲ得ルヲ稀ナリ○患者熾熱乾  
 效胸痛シ脉稍力アル者ハ刺絡ノ後緩和ノ効アル  
 和胸劑ヲ用ベシ此症ハ幾那ノ類總テ收瀦ノ藥ハ  
 吐痰ヲ妨ゲ害アリトス○凡勞效ニ幾那ヲ用テ吐  
 痰減シ熱及ビ渴ヲ發シ呼吸短促發汗等增長スル  
 ハ幾那害アル候トス速ニ是ヲ休ムベシ○右ノ如  
 ク戒慎注意ノ幾那ヲ用レテ其熱増發シ諸症日ニ  
 加ハリ精力漸ク缺脱スル者ハ不治トス斯ノ如キ  
 患者ノ死體ヲ剖觀スルニ肺藏ニ癭樣ノ潰瘍及ビ  
 硬結腫夥ク生スレバナリ○右説ク所ノ如ク病性

各差別アル故ニ幾那モ亦功害途ヲ異ニス醫家此  
 藥ノ大功アルヲ稱シ或ハ大害アリトシ排斥スル  
 事アルハ皆是ガ爲ナリ○勞瘵ニ用テ多ク良驗ヲ  
 得ル藥ハ依蘭苔亞兒尼加越栗失爾赫篤立ナリ  
 條ニ故ニ是ヲ幾那ニ加ヘ用テ治驗多シ  
 虛損羸瘦病在苒タル虛羸ノ諸病ニ幾那ヲ用テ間  
 殊効ヲ得ルヲアリ遺精白帶下等漏泄ノ諸症久キ  
 ヲ經テ羸瘦スルガ如キハ幾那ニ緩和滋養ノ藥ヲ  
 加ヘ用テ多ク効アリ即チ乳汁雞子黃暹爾託亞依  
 蘭苔ノ如シ其症治スレバ幾那ニ鐵劑ヲ加ヘ用ヘ

遠西名物考 卷二十 二十六 風雲堂藏



シ内藏壅塞ナク唯血液枯涸維弛弱ヨリ起ル云○小兒ノ羸瘦ハ多  
 久内藏ノ壅塞硬結ヨリ起ル故ニ幾那害アリ此症  
 ハ苦味石鹼質ノ解凝劑及ヒ中和鹽類共ニ上ノ  
 用テ治スベシ○内藏ニ較著ノ壅塞硬塊ナク唯凝  
 體纖維ノ弛弱虚衰セルヨリ發スル諸病ハ幾那良  
 効アリ即チ諸器脉管ノ衰弱ヨリ發スル水腫尿管  
 尙悽病或ハ失シ苟ク兒ル陪ボイ苦ノ病後虚羸セル者或ハ虚  
 弱ヨリ起ル荏苒タル下利失血多汗痰夥久出テ虚  
 罷セル者或ハ失血過多ニテ虚衰セルヨリ發スル  
 諸症如キハ皆幾那ヲ用テ回復ス○内藏虚弱ナ

ルヨリ發スル諸病荏苒トメ治セズ終ニ宿疾滯患  
 トナル者ハ幾那ヲ用テ治スル者多シ然レ斯ノ如  
 キ症多クハ粘液留飲等胸腹諸器ニ壅滯スル故ニ  
 先ヅ是ヲ除治メ後幾那ヲ用ルニ非レバ効ナシ○  
 胃腸ノ虚弱ナルヨリ發スル諸症假令タトヘバ飧泄下利  
 嘔吐噫氣腹鳴痞脹食進マズ或ハ化シ難ク或ハ善  
 饑異嗜此症内科撰要善飢異嗜篇ニ出ツ疝腹痛ノ如キ惡液汚  
 物ノ壅滯ナク唯胃腸ノ神經及ヒ纖維ノ虚弱ナル  
 ヨリ發シ荏苒トメ治セザル者ハ幾那良効アリ又  
 温壯香竄ノ諸藥ヲ加テ其効ヲ助クベシ即チ桂橙

皮肉豆蔻。山柰。丁香。益智。及ビ苦味健胃ノ品。鐵劑等  
其症ニ隨ヒ擇ニ加フベシ

痛風傷冷毒痛 此病、焮衝多血壯實ノ症アルハ幾那  
害アリ。然レ諸、疏滌ノ方法ヲ施メ後、其痛淹滯メ解  
散セズ患者漸ク虚衰シ汗多ク出ル症ハ幾那大効  
アリ○傷冷熱ノ腐敗ニ傾ク症或ハ失苟兒陪苦ヲ  
患ル者、傷冷毒ノ諸症ヲ兼テ甚ダ頑固ナル症ハ專  
ラ幾那ヲ用テ甚ダ驗アリ○傷冷毒痛ト徽毒痛ト  
兼併セル症多シ。是ハ先ヅ水銀劑ヲ用テ徽毒ヲ除  
キ、其痛仍治セザル者ハ安質没扭劑雙鸞菊越幾斯

劑失鳩答越幾斯劑阿芙蓉劑等其症ニ隨ヒ擇テ幾  
那ニ加ヘ用テ全功ヲ收ムベシ

焮衝 胸脇焮衝等總テ實症ノ焮衝病ハ幾那害アル  
ニ論ナシ然レ一種虚症ノ焮衝アリ是ハ纖維諸管  
弛緩虚弱ニメ病性劇盛ナラス甚ダ慢緩ナリ。此症  
ハ少ク刺絡ヲ施シ又一兩次吐劑ヲ與ヘテ病毒ヲ  
驅除シ其後幾那煎ヲ用テ捷効アリ

痘疹發斑 痘瘡麻疹モ亦元運力虚乏ノ其毒發越シ  
難ク或ハ内攻スル症ニ幾那ヲ用テ大効アリ。或ハ  
腐敗ニ傾キ若クハ斑ヲ兼ル痘ニハ殊ニ峻効アリ



凡痘ノ結痂ノ頃ニハ幾那多ク適應ス。實症ノ痘ト雖モ此時ニ至レバ精力虛損スル者多ク或ハ其膿ヲ血中ニ吸收スルヲ過多ニメ所謂膿熱ヲ發スル者多キ故ニ幾那ヲ與ヘテ其惡症ヲ防グニ甚ダ的當スレバナリ。又其虛弱ノ輕重ニ隨ヒ纈草セトル攝爾扁ペン答ト龍腦。阿芙蓉。礞砂ヲ幾那ニ加ヘ用ヒテ尤驗アリ。其他發斑。瘡疹類ニ幾那ヲ用ル標的皆右說久所ノ如シ。

遠西醫方名物考卷二十終

