

遠西醫方名物考

幾
三

卷二十一

✕
e 15

壞疽

水腫

神經熱

龍幾散

壯神消毒飲

纈草消毒散

揮發回神膏

壯神解毒飲

幾那壯神飲

龍亞幾那飲

鎮痛和胸飲

纈草壯神飲



遠西醫方名物考卷二十一

榛齋先生譯述

男

宇田川格

榕菴校補

幾那^{キナ}三

咽喉焮腫 腐敗性ノ病ニ惡性ノ咽喉焮腫若ハ鷺口

瘡ヲ兼テ虚憊セル症ハ幾那煎ニ海鹽精ヲ滴シ加

テ適意ノ酸味ト爲シ用ヒテ奇効アリ

痢疫性ノ痢ハ先ツ胃腸ニ鬱蓄セル病毒汚物ヲ淨

掃スルニ吐劑若ハ下劑ヲ用ヒ或ハ吉利詞參兒ヲ

施スベシ吐劑ハ七^イ百^ベ葛^カ格^コ安^ア那^ナ若^ナハ韃^タ爾^ル答^ダ越^エ默^メ室^シ

ヲ良トス。是特ニ吐スルノミナラズ。ヨク膠粘液ヲ
 溶解スレバナリ。下劑ハ大黃。答末林度ヲ良トス。防
 腐清涼ノ効ヲ兼レバナリ。吐下劑ハ初發ノミナラ
 ズ其症ニ隨ヒ時々施スベシ。○胃腸ヲ淨掃ノ後焮
 衝ノ諸症漸ク退キ患者虚罷スル片ハ腐敗ヲ防ギ
 虚脱ヲ復スルニ幾那ヲ用ヒ或ハ疫毒腐敗熱ヲ兼
 ル者ハ幾那ニ礬性酸精綠礬精。硫黃。精。鹽精等。ヲ加ヘ施ス
 腐敗熱ノ條後ニ說如クスベシ。但患者ノ虚憊及
 腐敗ノ多少ニ隨ヒ服量ヲ加減スベシ。右二品ノ收
 瀋ノ効ニ由テ憊弊セル腸ヲ強壯シ腐敗ヲ防止ノ

病毒ノ夥ク腸ニ聚リ來ルヲ阻遏シ且其酸性ヲ以
 テ亞兒加利性ノ酷厲毒ヲ剋制シ相抱合ノ一種ノ
 中和鹽性トナリ刺戟セザラシム又緩和鎮痛ノ劑
 ヲ兼用スベシ是ヲ以テ其酷厲毒ヲ包攝ノ刺戟セ
 ザラシメ且其傷爛剥裸ノ感觸甚キ腸ニ遍ク塗布
 ノ劇痛ヲ鎮メ攀急ヲ甘解スレバナリ其劑ハ亞刺
 比亞ビ越ゴ謨ム達タ刺ラ侃ガ葛ト過ア爾ル託タ亞ア錦キ葵キ根ン舍シ謨ム字ジ黥キ謨ム根ン
 黥キ失シ刺ラ越ゴ葉エ等ト煎劑若ハ舍利別トシ用ルガ如シ
 或ハ阿利オ襪イ油ウ甘扁挑油等モ亦良効アリ鎮痛藥ハ
 阿芙蓉劑ヲ用ベシ○此病毒ハ多ク大腸ニ凝聚ス

ルヲ以テ内服劑ヲ吉利詞キリス參兒テイトシ肛門ヨリ注輸
 ノ飲劑ノ効ヲ扶クベシ○神經熱ヲ兼ル者ハ幾那
 ニ壯神發汗劑後ノ神經熱ヲ加ヘ用テ尤効アリ○
 凡、漏泄甚キ諸症ハ胃腸ヲ淨掃シ炊衝ノ候退テ後
 對症ノ藥劑ニ幾那ヲ加ヘ施メ効アルヲ右説ク所
 ノ如シ

潰瘍幾那ハ華爾斯ス越謨ゴム及鐵ヲ含テ一種ノ技爾バ撒サ
 謨質ヲ成ス故ニ腐敗ヲ遏止シ纖維ヲ充張セシメ
 テ諸器ノ運營ヲ强健ニシ善膿ヲ化釀ス。他ノ技爾バ
 撒謨サノ刺戟ダシキメ炊熱ヲ發スルガ如クナラズ故ニ纖

維虛衰ノ愈難キ潰瘍ニ峻効アリ○凡、外部ノ潰瘍
 膿汁多ク漏泄ノ精力虛損スル者或ハ侵蝕滋蔓ノ
 腐骨疽ヲ兼ル者ハ幾那ヲ用テ峻効アリ。或云一患
 者。股ニ潰瘍ヲ發シ腐骨疽ヲ兼子胯骨脫臼ノ疼ニ
 堪ズ遷延タル消耗熱ヲ發シ大ニ瘦削メ骸骨ノ如
 シ乃チ幾那ヲ久服セシメテ全愈セリ。又云潰爛セ
 ル癌ニ幾那ヲ用レバ治セズト雖モ諸症増劇セズ。
 總テ斯ノ如キ症ハ幾那ニ阿芙蓉ヲ加テ劇症ヲ鎮
 メ或ハ越栗エリキ失爾シ赫篤利ト綠礬精リ拳參根ル亞兒尼ア加ニ挂カ。
 等ノ酸性。強壯。收瀉ノ藥ヲ擇ミ加テ幾那ノ性功ヲ

扶ケテ尤良○凡險惡頑固ノ潰瘍ハ幾那ヲ用テ精
 カノ虚損ヲ保護シ善膿ヲ釀成セシメ或ハ其膿ヲ
 血中ニ吸收メ發スル諸惡症ヲ治スルニ峻効アリ
 ○大ナル創傷ノ膿潰シ或ハ肢節ヲ截斷メ虚衰シ
 或ハ瘦瘠ノ汚液多ク漏泄シ或ハ大ナル潰瘍ノ膿
 夥ク溢レ滿ル症ハ皆幾那ヲ饒多ニ用ヒテ腐敗ヲ
 遏メ精カヲ挽回メ全功ヲ收ムベシ
 腹瘍 肝及膽ノ潰瘍ハ幾那ヲ用テ効多シ肝ノ潰瘍
 ハ先肝硬腫ノ痛ニ荏苒トメ消散セズ終ニ膿ヲ釀
 ノ外部ニ潰破シ或ハ其膿總管ヨリ十二指腸ニ通

泄シ或ハ其通泄ノ路壅塞スレバ停滯ノ胃ヲ侵蝕
 シ其膿胃中ニ漏泄ス或ハ横膈ヲ侵蝕メ肺ニ連及
 シ肺瘍トナル者アリ此症ハ幾那ニ石鹼質解凝開
 達劑ヲ加用ベシ即蒲公英越幾斯劑失格列乙越幾
 斯劑睡菜越幾斯劑莖葉ヲ用フ製法失山苧菜昆設
 爾弗酸模昆設爾弗ノ如シ誓留熱ヲ發メ潰瘍逾増
 長スル者ハ酸性石鹼質ノ藥酸模答未林及礮性酸
 精ヲ用ベシ内部ニ鬱聚スル膿ノ排泄ヲ扶ルニハ
 清涼下劑ヲ良トス又前ニ舉ル利尿劑ヲ用ベシ○
 腹部ノ膿瘍皮上ニ潰發メ經久愈ズ瘦瘠トナリ或

其瘍。膽ニ穿透ノ膿ニ膽液交リ外泄スル症ハ幾那
 越幾斯劑ニ的列竝底那ヲ加ヘ丸藥トシ輕下劑ト
 更互ニ用テ甚ダ驗アリ。又拔爾撒謨碌加的刺ヲ綿
 撒絲ニ塗テ瘡口ニ貼シ若把兒麻膏ヲ以テ蓋
 腎膀胱潰瘍此症ハ初發各其患部焮腫メ遂ニ膿瘍
 トナリ其膿ヲ小便ニ通泄ノ淋瀝刺痛シ或ハ小便
 閉ヲ兼ヌ。是ハ緩和劑ヲ與テ其攣急刺痛ヲ解シ其
 膿ヲ通利シ易カラシムベシ。即チ過爾託亞錦葵葉
 亞麻子。甘草。茴香等ノ如シ或ハ是ニ幾那ヲ加ヘ用
 此テ防腐排膿ノ効ヲ取ルベシ。○膀胱裏面ノ潰瘍

ニ右ノ療法ヲ施シ荏苒タル症ハ緩和劑ノ煎湯ニ
 拔爾撒謨少許ヲ加ヘ水銃ニテ尿道ヨリ膀胱ニ注
 入スレバ治スルヲ速ナリ

潰爛痔痔。潰爛ノ劇痛アル症ハ幾那ヲ内服シ或ハ

吉利詞參兒トシ施メ排膿愈創ノ一良藥トス。或ハ

重墜努責ヲ兼子疼痛甚キ症ハ拔爾撒謨碌加的刺

的列竝底那甘扁桃油阿利磯油玫瑰蜜雞子黃等ヲ

擇法加テ捷効アリ

壞疽重訂内科撰要第幾那ハ善膿ヲ釀スル殊能ア

ル故ニ壞疽ニ用レバ壞肉ト生肉トノ間ニ多ク膿

ヲ醸シ壞肉自ラ分テ剥脱ス。即チ前説ノ諸潰瘍ニ
 良効アルガ如シ内服ハ煎劑トシ外用ハ蒸湯劑ト
 シ施スベシ。凝體纖維弛緩虚弱ノ甚キホド逾効ア
 リ。故ニ熱壞疽ノ如キ熱多ク乾燥ノ渴アル症ハ幾
 那害アリ。熱壞疽ハ即チ寒壞疽ノ初發ニ未ダ凝
 流二體ノ運動廢絶セズ脉絡牽張ノ血液焮熱スル
 症ナル故ニ唯其患部ニ凝聚セル血液ヲ疏散シ牽
 張セル脉絡ヲ緩弛ノ寒壞疽ニ至ラシメザルヲ專
 要トス既ニ寒壞疽トナリ患部盡ク壞肉トナリテ
 痛痒ヲ覺エザル者ハ幾那ヲ用テ腐壞ヲ遏止シ生

肉ヲ防護シ死肉ヲ分析セシムルニ確實ノ効ヲ稱
 ス。但、其輕重ニ隨ヒ服量ヲ増減シ或ハ強壯ノ効ア
 ル藥ヲ加テ幾那ノ功ヲ補助スベシ。龍腦モ亦此症
 ニ殊効アリ幾那ヲ外用スルニハ蒸湯劑或ハ琶布
 トシ施シ或ハ薄荷。亞爾鮮。硃砂。龍腦。醋。赤葡萄酒。及
 礦性、酸精等其症ニ隨ヒ擇ニ加テ峻効アリ是ヲ以
 テ焮衝。打撲等ヨリ發スル壞疽ノニナラズ乾壞疽
 ト稱スル乾枯ノ症モ亦効アルヲ以テカラス
 水腫凡、水腫病ハ幾那の當セズ然レ、疔間歇熱ヨリ來
 ル水腫ハ治驗多シ。其熱仍舊留スル者ハ殊ニ効ア

リ但服量多カラザレバ効ナシ又利尿温壯ノ藥ヲ兼用ノ尤良。即チ健質亞那^{ゲシチアア}良薑^カ。乾薑^カ。薄荷油^カ及鐵劑ノ如シ。○水腫ハ先ツ利尿劑或ハ驅水下劑ヲ用テ其停水ヲ導泄スベシ。利尿劑ハ海葱。霸王鹽。孕礬酒石。氏埤列利精等ヲ擇ムベシ。驅水下劑ハ即チ刺巴^{ヤイラッ}。蘇甘沒^{スカムモ}。扭盧會。藤黃等ヲ擇ムベシ。停水通泄ノ後ハ其病因ヲ除ベシ。是ハ内部諸器ノ壅塞或ハ水脉ノ縱弛破裂及諸脉纖維ノ虛弱セル等ナリ。故ニ解疑開達ノ劑^{上ニ}ヲ與テ其壅塞ヲ疏通シ次ニ幾那ヲ用テ水脉諸管ヲ收固ノ綫縮セシメ。虛弱ヲ回復シ

再發ヲ防グベシ。又收潘香竄ノ藥ヲ加テ尤良。即チ健質亞那^{ゲシチアア}。珊篤里亞兒尼加^{サントリアニカ}。葛爾儒龍牙草^{ケルジュウリョウ}。土木香根。益智。茴香。葛縷子^{ケルイ}。良薑。橙皮。拳參根。及ビ鐵劑等ノ如シ。或ハ再發ヲ防グニ發汗利尿ノ藥ヲ加ヘ用ルモ良。○鼓脹ハ風氣ノ鬱積ニ因ラス唯腸ノ潰瘍及ビ腐壞ノ處アリテ發スル症ニハ幾那良驗アリ。又酸性清涼防腐。石鹼質ノ劑^{上ニ}ヲ加テ殊ニ的當ス。神經熱^カ。神經熱ト腐敗熱トノ症候ヲ鑒別セザレバ諸熱ノ病性ヲ辨識スルヲ能ハズ施療多ク紛錯ヲ致スナリ。是諸熱病。危險ニ至レバ右兩種ノ病性ニ

罹^カレバナリ。○其症。初發患者未ダ卧床ニ就^ツスノ神
思沈重鬱悒シ惘然トノ樂マズ志意好了セズ。微惡
寒シ或ハ忽チ發熱ノ往來定ラズ。夜中快寢セズ。全
軀疲倦懈惰ノ舉動ニ堪ヘズ。漸ク頭痛困重ノ眩運
ヲ兼子或ハ前頂疼ニ或ハ頭後痠痛麻痺ノ冷ルヲ
覺エ。飲食味ヲ失ヒ或ハ惡心嘔氣アリ若ハ吐スレ
バ唯淡水出ツ。渴ナク若ハ微渴アレバ煩渴引飲ノ
症ナシ。次テ頭眩困重發熱等増劇シ夜分殊ニ甚シ。
顔色慘悽。精神更ニ沈垂ノ微煩シ呼吸不利ノ屢大
息シ。時ニ鬱冒ノ睡ルガ如シト雖モ患者少モ睡ル

トヲ覺エズ或ハ頰頰焮熱ノ顔赤色ナルトアレバ
鼻頭耳輪四末微冷シ額冷汗出ツ。脉弱ニノ數搏度
齊ハズ。病勢增長スレバ頭旋上衝耳鳴甚クノ時ニ
謔語ス然レバ狂躁ニ非ズ唯思慮錯誤セル呢喃ノ老
言ニノ時ニ自ラ醒復ス。胸中壓迫苦悶シ肢體顫振
睏動ノ億困シ僅ニ轉側スレバ昏眩ノ冷汗出ツ。漸
危篤ニ至レバ脉極テ細數ニノ振蕩シ驅趨スルガ
如シ。或ハ飲液咽ニ下リ難ク或ハ舌ヲ出セバ振搖
シ或ハ舌縮テ出ス不能ハズ眼鼻陷削ノ四肢冷或
ハ頻ニ呃逆ヲ發シ或ハ顫振筋惕甚クノ搐掣シ或

ハ謔語休テ昏睡シ或ハ四肢冷テ粘汗漏泄シ或ハ
 數烈ク水瀉シ或ハ大小便浹覺エス漏泄シ或ハ精
 神昏瞶ノ視聽分明ナラズ或ハ初視聽ノ感觸過甚
 クノ僅人光暉物響ニ堪ザル者。今瞪視耳聾ノ少モ
 通徹セザルハ此即纖維諸管衰弊罷極シ。括約衛固
 ノ元カヲ失ヒ諸液崩壞烓解ノ死ニ瀕キノ候トス
 ○舌初ハ乾燥セズ色變セズ或ハ微白ノ滑苔生ス。
 病勢増劇スレバ黯赤色ニシ甚タ乾燥シ裂紋ヲ生
 ス或ハ邊焦黃ナル者アリ。唇舌甚ダ燥熱スレバ渴
 セズ○小便黦澹ニシ濁リ近ナシ。但病勢劇盛ナル

氏ハ濃色ニシ粘著ス○凡熱病ハ人ノ稟賦ニ隨テ
 病性ヲ異ニス。纖維脉管強剛充張ノ血液醇厚饒多
 ノ人ハ血中揮發ノ鹽油ヲ含ト尤多クノ運動ノ勢
 力強健ナリ。故ニ疫氣ニ感染スレバ是ヲ抗拒スル
 勢力強盛ニシ大過ノ運動ヲ逞發シ。血液大ニ沸騰
 ノ壯熱焮衝等劇盛ナル諸症ヲ發ス。即熾盛熱焮衝
 熱是ナリ但血液大ニ酷厲ナル人ハ其壯熱ノ沸蒸
 ニ因テ血中ノ鹽油速ニ凝聚シ變ノ亞兒加利性ノ
 酷厲毒トナリ劇ク血質ヲ腐敗ス即腐敗熱是ナリ
 神經熱ニ罹ル患者ハ元來纖維諸管柔弱弛緩ニシ

揮發ノ鹽油匱乏シ血質淡薄ニノ醇厚ナラズ神經液及水樣諸液殊ニ薄弱ナリ大ニ神思ヲ困苦シ形體ヲ勞役シ飲食宜ニ適セズ。饑飽節ヲ失ヒ或ハ失血其他甚キ脱泄房勞過度或ハ瘴霧雨濕多キ地ニ住等ニテ天稟ノ纖維血質ヲ虧損スル者故ニ疫毒侵刺スト雖モ大過ノ殊ニ多ク此病ニ罹ル故ニ疫毒侵刺スト雖モ大過ノ運動ヲ憤起ノ炊衝壯熱等ノ劇盛ナル諸症ヲ發見スルヲ能ハズ。是ニ由テ血質速ニ腐敗ニ罹ラズ。唯神經液及水樣液タ沕タ等。膠粘ニノ凝固シ運行甚々怠慢ニノ脉管ニ壅滯停滯シ漸腐敗ノ酷厲臭穢ノ液トナリ危險ノ諸症ヲ發スルナリ故ニ神經熱ハ其毒。水樣液ニ在テ病性遷延慢緩ヲ致シ。腐敗熱ハ其

毒。血質ニ在テ速ニ腐敗シ病性劇盛ナルヲ其諸症ニ徵メ察スベシ。○或ハ神經熱ト腐敗熱ト合併スル症アリ。此ハ纖維諸管柔弱弛緩ニノ血質甚酷厲ナル者。疫氣ニ感染スレバ血中ノ鹽油速ニ變ノ酷厲トナリ大ニ侵刺スレバ大過ノ運動ヲ發スルヲ厲トナリ大ニ侵刺スレバ大過ノ運動ヲ發スルヲ能ハズ。腐敗熱ノ諸症ヲ兼發ノ危險ニ至ルト雖モ病性慢緩ナリスノ如ク患者ノ體稟強弱厚薄多少交錯スルヲアル故ニ病性諸症モ每人多少ノ差異アリト知ヘシ。○其治法。初發惡心嘔氣アリ。心下痞滿等。胃中鬱滯ノ症アル者ハ輕キ吐劑ヲ用テ胃ヲ

淨掃スベシ。下劑ニ比スレバ害ナシ即チ¹百葛格
安那^ア十五^ナ氏若^ハ二十^ハ氏^ヲ與^ヘ。或清凉湧吐^出飲^世ニ
二三匙宛^{ツク}與^ヘ。其症仍^ホ休^ヤザル者ハ二日若^ハ三日ニ
一回^ト用^ベシ。○吐劑ヲ服シ難キ者ハ大黃梅那等ノ
泡劑ヲ與^テ胃腸ノ汚液ヲ滌除シ。鬱滯ナキニ至テ
幾^ソ那^ヲ用^ベシ。爾後^ソ大便壅滯スル者ハ兩三日ニ一
回宛^{ツク}綏和^キ吉利詞^{リス}爹兒^スヲ施^テノ病毒ノ鬱滯ヲ通スベ
シ。此病ハ峻攻ノ下劑ハ大害アリ殊ニ初發妄^リニ瀉
下スレバ精力速ニ虚脱ノ昏睡等ノ惡症ヲ發ス。○
神經熱其他虚人ノ熱病。初發ヨリ神經大ニ虚憊^ハ

ル諸症ヲ見^ハシ或ハ發斑熱ノ甚ダ惡厲ニシテ精力大
ニ缺脱セル症ハ胃腸ヲ淨掃ノ後幾那ヲ用ヒテ驗
アリ。然^レモ動輒^バ初發^ハ病性分明ナラズノ幾那ヲ投
メ害ヲ致シ或ハ初發ニ用テ効アレモ病勢増劇セ
ル者ニ用テ害ヲ爲ス^トアリ。故ニ諸症ノ轉移傳變
ニ注意メ病性ヲ察スル^ト肝要ナリ。○虚弱ノ患者
幾那ヲ服メ下利スル^ト此末ニ舍利別ヲ加テ煉
膏トシ香竈阿芙蓉液少許ヲ加ヘ與^フベシ。○此病ハ
神經ヲ强健シ粘稠液ヲ稀釋シ蒸氣及ビ汗ヲ發ス
ル劑ヲ用テ全功ヲ收ム^ベシ。蒸氣及ビ微汗ヲ發ス

レバ徐々ニ病毒敗液ヲ排除ノ神經血液ノ失常ノ
 運動ヲ鎮メ煩悶ヲ除テ安眠セシム其藥ハ昆答刺
 越兒發攝爾扁答利亞雜腹蘭葛私多僕謨ノ如シ又
 龍腦清涼飲壯神清涼飲共ニ世テ的里亞加鎮痛和胸
 飲後ニ出ツノ如キモ良効アリ但阿芙蓉劑ヲ過用スレ
 ハ大ニ害アリ不寐ヲ兼ルト雖モ戒慎ノ服量ヲ斟
 酌スベシ○患者虛憊スル症ハ左ノ方尤驗アリ

龍幾散

攝爾扁答利亞
 昆答刺越兒發

幾那 各十瓦

龍腦 四瓦

右散劑トシ二時毎ニ一劑ヲ與フ○左ノ方亦殊効
 アリ

壯神消毒飲

攝爾扁答利亞

昆答刺越兒發

葛私多僕謨 各十瓦

雜腹蘭 六瓦

右細末トシ適宜ニ舍利別ヲ加テ煉膏トシ一服ト

ス。二時若ハ二時半ニ一服宛用フ○左ノ方亦良

額草消毒散

額草 一月

雜腹蘭

葛私多 各四瓦

右細末トシ調和ノ一服トシ日三四服。飲液ニテ送下ス○病勢増劇ノ顫振睨動甚ク或呃逆。神經掣引等危篤ノ症ヲ發スル者ハ麝香六瓦ヨリ六瓦ヲ一服トシ日二三服用テ奇効アリ。或左方ヲ用ベシ

揮發回神膏

麝香 十五瓦

龍腦 三瓦

鹿角鹽 六瓦

右研和シ舍利別ヲ加テ煉膏トシ一服トス。此劑搗

掣ヲ鎮メ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利メ病毒ヲ驅散ス或

ハ左ノ劑亦捷効アリ

壯神解毒飲

鹿角鹽 二瓦

雜腹蘭 一月

刺賢埵兒精 一錢半

橙汁 三錢

解毒水

亞鉛條ニ出ツ 一多半

右解毒水ト橙汁ヲ調和シ。鹿角鹽ヲ加ヘ沸騰シ了
テ餘藥ヲ攪和シ一服トス。二三時ニ一服宛用フ又
壯神清涼飲^{上ニ}ヲ兼用ノ良。或ハ揮發香竈精ヲ葡
萄酒若ハ白芥子ノ煎湯ニ滴シ用テ殊効アリ。○精
神萎靡錯語休ザル者ハ瓦爾拔奴謨ニ龍腦少許ヲ
加ヘ用ヒ。芫菁膏ヲ項窩。耳後等ニ貼シ。鹿角膠或ハ
乳清或ハ大麥煎ニ葡萄酒若ハ橙汁ヲ加ヘ頻リニ
與ベシ是ニ由テ酷厲液ヲ潤灌メ清爽活潑シ蒸氣

微汗ヲ發メ病毒ヲ排泄ス。○病勢漸減メ其熱發止
往來スル者ハ橙汁ニ亞爾鮮鹽ヲ加ヘ沸騰止ムヲ
度トシ用レバ其熱長ク誓留セズ。此劑粟疹ヲ兼ル
ニ用テ尤良。○病勢漸ク退テ其熱發止往來シ或ハ
發汗等ノ排泄ニ因テ精力虛憊スル者ハ幾那末半
錢若ハ一錢宛日四五次赤葡萄酒ニテ服スベシ。若
末ニテ服シ難キ者ハ此末一多ヲ取テ列印設酒若
ハ赤葡萄酒一勃^{ボツ}的里斯^{リス}ニ浸ス。兩三日。憑テ滓ヲ
去リ頻クニ一盞宛用ベシ或ハ左ノ方亦治驗多シ

幾那壯神飲

幾那 一弓

纈草 二錢

雜腹蘭 一錢

橙皮 四錢

右細末トシ燒酒十弓ヲ加ヘ浸ス_一三四日。漚テ滓ヲ去リ二卵匙死赤葡萄酒一盞ニ加ヘ與ル_一日三次或ハ幾那ヲ煎劑若ハ浸劑トシ揮發衝動防腐ノ藥ヲ加ヘ用テ効アリ假令バ龍腦ヲ亞刺比亞越謨漿ニ研和シ幾那煎ニ加ルガ如シ。但是ヲ燒酒ニ溶ス_一勿レ。斯ノ如キ精烈ノ液ニ溶ノ煎湯ニ加フ

レバ其氣速ニ耗散スレバナリ○險重ノ神經熱。腐敗熱。其他虛罷甚キ熱病ハ幾那煎ニ揮發衝動ノ峻藥ヲ加ヘ用テ殊効アリ。假令バ左ノ方ノ如シ

龍亞幾那飲

幾那 尋常者

赤幾那

各一弓半

右水適宜ニ加ヘ煮テ滓ヲ去リ左ノ藥ヲ加フ煎

纈草 六錢

右浸ノ藥氣ヲ出シ。滓ヲ去リ。其液二十弓ヲ取リ。又

左ノ藥ヲ加フ

橙皮 舍利別

龍腦上好者二乃亞刺比亞越 亞的兒二錢一

右調和シ半時毎一一小茶碗ヲ服ス○右ノ諸劑ハ徐クニ衝動ノ纖維諸管ノ運動怠慢乏弱ナルヲ振起醒覺シ。血液ヲ稀釋ノ微汗ヲ發シ。筋惕顫搖煩悶等ヲ治ス○右ノ療法ヲ施メ舌潤ヒ。齶口瘡等口中ノ諸患ナクメ多ク痰唾ヲ咯キ。皮膚温ニノ遍ク潤澤アルハ最モ善徵トス。此病ハ微汗及ビ痰唾ノ排泄アルヨリ佳キハナシ。患者耄昧昏惑スト雖モ死ヲ免ルベシ。或ハ病勢漸ク減スル時。輕ク下利ノ患

者虛疲セズ或ハ鼻唇等ニ皰疹若ハ腫瘍ヲ生シ或ハ耳聾ノ耳中及ビ耳邊ニ膿腫ヲ發スルハ皆善徵トス。斯ノ如キ排泄アルキハ滋養津潤ノ飲液ヲ多ク與テ精氣ヲ活潑助長シ且其排除ニ因テ日夜ニ多ク費耗セル津液ヲ補充シ。逾内托分利ノ全功ヲ成サシムベシ○此病ニ大汗ヲ發スルハ甚ダ害アリ。殊ニ辛熱慄悍ノ發汗劑。銳烈竄透ノ露精類ヲ投メ發汗スレバ速ニ血液ヲ焯解渙崩メ危篤ニ至ラシム。或ハ初發熱勢増進スル時。大ニ發汗セシムレバ精力頓ニ虛脱シ。精神昏聩。筋惕顫振。戰慄冷汗等

ヲ發ノ終ニ昏睡トナリ或ハ焮衝熱ヲ發ノ胸中苦悶呼吸促迫漏汗不寐譫語等ヲ兼ルト宛モ肺焮衝内科撰要ノ如シ。是神經攣急ノ衝逆スルヨリ發スル症ニノ子宮衝逆ノ呼吸促迫苦悶ト同シ。又咳嗽ナキヲ以テ肺焮衝ニ非ルヲ知ベシ。此症ハ上ニ舉ル壯神劑ヲ擇ニ用テ神經失常ノ運動ヲ靜止シ治スベシ。○大抵第七日以後粟疹ヲ發ノ病毒排泄スルヲ多シ。此症ハ輕キ強壯潤灌ノ飲劑ヲ多ク與ヘ或ハ的テ里亞ア加カ若カハ左ノ劑ヲ兼用ノ諸險症ヲ靜止シ蒸氣微汗ヲ進テ粟疹ヲ發スベシ

鎮痛和胸飲

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

安息香華

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

阿芙蓉

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

龍腦

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

苗香油

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

燒酒

蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

右浸ノ藥氣ヲ出シ。臨時ニ瀝シ。一卵匙宛飲液ニ和

シ服スル日ニ三次。○粟疹ヲ發セシトスル時。胸

中苦悶呼吸不利煩躁スルト多シ。或ハ粟疹内攻ス

レバ必ズ右ノ諸症ヲ發ス。此亦右ノ劑。並目前ニ舉

ル壯神劑ヲ用ヒ。且強壯潤灌ノ飲劑ヲ兼用メ驅發
 スベシ。○斑疹アル症ニ微汗ヲ發スルハ利益アル
 氏大ニ發汗スルハ甚害アリ。或ハ夥キ發汗連綿ノ
 休マズ其間ニ粟皰ヲ發スルヲ二三回。病患必モ減
 セズ。精力大ニ虛憊セル者アリ。或ハ發汗劑ヲ投メ
 汗止ガルヲ三四十日。其間粟疹ヲ發スルヲ三四回
 ニノ精力大ニ虛脱セル者アリ。斑疹ナキ神經熱モ
 熱性ノ發汗劑ヲ投メ大汗ヲ發シ危險ニ至ル者少
 カラズ故ニ汗甚多キハ病毒排泄ノ症ニ非ズノ血
 液崩解シ精力虛耗スル候トス。赤色或ハ白色ノ粟

皰夥クメ且數發スルハ特ニ病毒多キ候トシ。又辛
 熱走竄ノ劑ヲ過用スルヨリ發スルヲ稀ナラズ或
 ハ汗多キニ因テ粟疹ヲ發スル者アリ。是皮中ノ細
 腺。其發汗ニ因テ腫起メ疹ノ如ク見ユルナリ。此猶
 平人ノ夏月汗多キ者汗疹ヲ發スルガ如シ。○右ノ
 如キ精力虛耗ノ漏汗ヲ發シ或ハ病勢退ク時。汗漏
 泄メ虛憊スル者ハ數上好ノ赤葡萄酒ヲ與ヘ或ハ
 幾那壯神飲上ニヲ用ベシ。ヨク汗ヲ減メ強壯ス。或
 ハ幾那丁テインキ幾去爾ラウ後ニ出ツニ雜腹蘭攝爾扁答カフヲ加ハ少許
 宛與テ精力ヲ資補スベシ。○凡病毒ノ排泄過度ニ

因テ患者虚憊スルキハ徐々ニ是ヲ抑遏スヘシ。假
 令ハ下利甚キ者ハ的^テ里^リ亞^ア加^カ等ヲ用テ微汗ヲ發ス
 レバ下利自ラ止ムカ如シ。然レ凡漫ニ收瀉劑ヲ過用
 ノ是ヲ閉止スレバ其毒忽チ内攻ノ他部ニ轉移シ
 危症ヲ發ス。假令^{タトヘ}バ烈キ收瀉劑ヲ用テ卒ニ下利發
 汗ヲ閉止シ或ハ冷氣ニ觸レ若ハ寒冷ナル衣衾飲
 食ヲ用テ斑疹ヲ内攻セシムレバ忽チ痙攣ノ運動
 ヲ發メ惡寒戰慄胸中苦悶煩躁譫語昏聩或ハ惡心
 嘔逆心腹痛ヲ發スルカ如シ○依^イ百^ベ乙^イ人^人名^名經驗說ニ
 云、幾那ハ神經熱ニ多ク偉効ヲ稱スレ凡其功一様

ナラズ。嘗テ經驗セル一二ノ患者ヲ左ニ略舉ス○
 一婦人年二十一。乳養ノ兒アリ。神經熱ヲ患ヒ。第七
 日ニ當テ精力大ニ虚憊シ呼吸蹇難。數大息シ乾欬
 及輕キ下利アリ。脉百四動。晝夜平分、時半時ヲ六十
 ニテ密^ニ扭^ト馬^ト云フ。密^ニ扭^ト馬^トノ間ニ脉搏^カツ^ル一^分ヲ和蘭
 ナルヲ云。西洋ノ醫家常ニ三針ヲ具ル自鳴鐘ヲ帶
 テ患者ノ脉動ヲ算ルナリ。舌潤ヒ小便^ニ逆^{アリ}。此症幾那ノ末ヲ
 取、一時半毎ニ半錢宛用フ。第十日ニ至テ脉百八動。
 呼吸逾蹇難ニ熱増發シ微渴アリ。翌日脉百十二
 動。睡リ難ク微譫語シ。小便^ニ逆^{ナク}。舌燥キ。下利益甚
 シ。因テ幾那ノ害アルヲ察シ。是ヲ休ム。其後右ノ

諸症暫留スルヲ五日。終ニ病勢漸減シ。日ヲ經テ回復ス。○一患者年二十。神經熱ニ罹リ頭痛及心下疼微效アリ。小便濃濁ニノ艱澁ス。第六日ノ夜微譫語ヲ發シ。脉弱ニノ百二十動。第七日ニ當テ幾那ノ末一錢ニ水ヲ加テ研磨シ一服トシ。二時半ニ一服宛與フ。翌朝脉百二動。其夜百十動。第九日ハ脉百八動。手腕潤澤アリ。多ク睡眠ス。幾那ヲ用テ以來毎夜微譫語ヲ發ス。第十日ハ脉九十四動。總身遍ク蒸氣ヲ發メ潤澤アリ。第十一日脉八十七動。大汗ヲ發シ臭氣アリ。其睡眠及譫語仍歇ガレ皮膚益潤澤ヲ生

スル故ニ幾那ノ良効アルヲ知ル。若應セザレバ皮膚乾キ呼吸不利スレバナリ。爾後日ヲ經テ其熱漸減シ諸症解散ノ全愈セリ。○一患者年二十一。神經熱ニ罹リ第七日ニ當テ韃爾答越默窒ヲ與テ輕ク吐セシム。第十三日脉九十二動。乃ニ二時毎ニ幾那末半錢ヲ與フ。第十四日脉八十動。頭痛減ス。第十五日小便夥ク生シ是ヨリ日ヲ經テ其熱並ニ諸症解散シ回復ス。○一婦人年二十四。神經熱ニ罹リ舌乾キ微汗アリ。呼吸不利シ時ニ呃逆ヲ發シ小便濃濁。夜中譫語ス。第十二日。是ヲ診ニ脉百八動ニノ弱

顫振觸動ス。乃、幾那、未一錢ヲ取テ飲液ニ和シ二時半毎ニ用フ。第十三日脉百二十八動徹夜譫語シ聲嘶嘎ス。然レ舌潤ヒ筋惕稍減ス。第十四日脉百三十動。皮膚乾キ熱增長ス。第十五日脉百四動。大便平生ノ如ク通利シ稍食ス。第十六日脉百十動。大汗ヲ發シ。大便通スルヲ三回。第十七日ニ至テ脉百動。熱減シ諸症漸寛解シ日ヲ經テ回復ス。此症幾那ヲ與テ二三日ハ其熱及諸症増劇シ皮膚乾キ聲嘎レ譫語逾甚シ然レ舌益潤ヒ筋惕顫動減スル故ニ幾那ノ適應スルヲ知ル。此症自然良能ト病毒ヲ排泄メ

回復スルヲ固ヨリ論ナシト雖モ幾那亦其運營ヲ扶ルヲ少カラズ。○右ノ經驗ヲ以テ考レハ幾那ノ効用一様ナラス。第一ノ症ハ呼吸蹇難増加スルヲ以テ幾那ノ害アルヲ知ル他病ニ於テモ幾那ヲ用テ此症ヲ發シ病勢増進スルハ幾那害アル候トス故ニ神經熱ノ初起少ク炊衝ヲ兼子或ハ呼吸蹇難不利スル者ハ幾那害アル一徵トスルナリ。○神經熱ニ幾那ヲ用テ總身發汗アルハ善徵トス。○此病ハ渴少ク或ハ渴ナク筋惕顫動。脉弱ニメ數患者數大息スル者多シ。是皆幾那良候アル症トス或ハ病

未ニ至テ其熱發止往來ヲ爲ス者モ亦幾那適應ス
 其熱少モ往來ナキ症ハ荏苒トシテ解セザル者多シ
 ○凡、幾那ノ効アル病ハ葡萄酒モ亦良効アリ。幾那
 害アル症ニハ葡萄酒モ亦害アリ。但、幾那ハ葡萄酒
 ニ比スレバ効力慢緩ナリ。○扶歇蘭度ヒト名云、一種危
 險ノ神經熱アリ。此症腸大ニ虚衰ノ初ヨリ下利ヲ
 兼ヌ。初發、傷冷熱ノ如ク寒熱往來肢節疼痛シ全軀
 疲勞甚ク神思困重頭痛堪忍ビ難ク肌熱漸増發シ
 脉疾數ニメ搏度齊ハズ。小便稠濁ナリ。次テ讖語ヲ
 發シ筋惕顫振。目ニ明ヲ惡シ耳ニ物響ノ微スル下

甚ダシ病勢最危劇ニ至レバ下利益甚クノ重墜努

責ヲ兼子或ハ發斑衄血下血大便失禁舌燥黑尿尿

汗唾皆惡臭アリ發斑以下血液腐敗ノ微或ハ精神蒙昧昏瞶摸

床撮空昏睡呃逆及粘汗漏泄ノ死ス此病讖語セザ

ル者ヲ第一等トス。既ニ讖語スル者ヲ第二等トス。

腐敗ノ徵及危劇ノ諸症ヲ發スル者ヲ第三等トス

第一等ノ症ト雖モ三週ヲ經ザレバ病勢減セズ。第

三等ノ症モ三週ヲ過シレバ死ヲ免ルベシ脉ノ疾數

一等ヲ加レバ病勢一等深シト知ルベシ。故ニ脉漸

緩ナレバ佳徵トス小便艱澀或ハ小便閉ヲ爲ス者

アリ是其部ノ學急甚キ候トス熱毒惡厲ナル者ハ
 毎日兩次^ド諸症増劇ス。午前若ハ午時ニ一發シ。日晡
 若^{モレ}ハ夜中一發スルガ如シ小便。初發ヨリ病未ニ至
 ルマデ膠ヲ水ニ溶^カスガ如シ。病危篤ニ至レバ小便
 逾稠厚ナリ。其色麥酒ノ如ク。白^ク渣アル^{コト}一指横徑
 許。粘リテ膠ヲ加ルガ如シ病勢増劇ノ小便忽チ澄
 清トナルハ搗搗謔妄ヲ發スル候トス小便漸ク澄
 渣渣^ク減^ク稀^クナリ終ニ拘椽色ノ如ク其底ニ純
 白ノ渣少許アルハ回復スベキ善徵トス精神朦昧
 ノ諸部麻痺不遂スルハ死候トス數^ク乾嘔シ飲食藥

汁ヲ吐スルハ危候トス耳聾ハ善徵トス。然^レ此症
 變ノ物響徹觸スル^{コト}甚クナルハ病ノ増進スル徵
 トス三週ヲ經テ痰^ク多ク出ルハ佳候トス。是^レヨリ
 病毒分利スレバナリ或ハ病毒解散セントスル時
 總身發汗ノ諸症輕快ヲ覺ルハ善徵トス治法ハ揮
 發衝動ノ藥ヲ與ヘテ患者ノ精力ヲ維持挽回シ又
 腸ノ罷弱ニ意ヲ用^ヒテ其下利ヲ止ル^{コト}一大要鍵夕
 リ第一等ノ症ハ左ノ方ヲ與フベシ

纈草壯神飲

纈草

四錢

沸湯

六考

右磁罐ニ内レ蓋閉シ浸ス_一八分時。濃テ滓ヲ去リ
放冷_一ノ左ノ藥ヲ加フ

民埵列利精 一_一勺 忽弗滿鎮痛液 一_一錢

右調和シ一時ニ一匙宛服セシム。又接骨木花ノ泡
湯ニ葡萄酒ヲ加ヘ温服セシムベシ。民埵列利精ヲ
用テ下利增長スル者ハ是ヲ除クベシ。○第二等ノ
症ハ右ノ方中。纈草。鎮痛液及ビ葡萄酒ノ量ヲ増シ
又攝爾扁答利亞ヲ加用フベシ。○第三等ノ症ハ極
テ揮發衝動ノ峻効アル藥ヲ用テ其垂絶罷極ノ元
運氣ヲ挽回スルニ非レバ治シ難シ。即チ麝香。龍腦。

亞的兒亞爾箇兒。硃砂。阿芙蓉。桂露等ノ如シ然_レ庄斯

ノ如キ藥ハ極テ慎重戒懼ノ服量ヲ些少ニシ纈草。

攝爾扁答泥菖根等テ作ル前方ノ如キ飲劑ニ加ヘ

或ハ葡萄酒ニ和メ其揮發ノ峻性ヲ抑制シ甚ク刺

戟セシメズノ徐々ニ其元運力ヲ醒覺振起メ挽回

セシムベシ。但服量少許ニノ數回用ルヲ佳トス。○

阿芙蓉ハ衝動ノ性力尤峻ニノ頑凝潛結セル邪毒

ヲ揮發ノ潰散シ易カラシメ又下利及ビ腸ノ諸症

ヲ寛解シ神經熱ニ殊効アル藥トス。然_レ庄其酷厲毒

ノ衝動ノ性尤峻ナルヲ以テ精練ノ醫家服量ヲ斟

酌ノ其症ニ的當セシムルニ非レバ効ナク却テ衰
弊罷散ノ元運力ヲ殘害スト知ルベシ。若シ是ヲ用
テ精神冒昧昏睡多汗四肢麻痺脉益細數トナル片
ハ其服量多クノ衝動ニ過ル候トス。故ニ速ニ其量
ヲ減シ或ハ暫ク休ムベシ。○麝香ハ其性甚ダ揮發
ニノ神經熱ニ的當ノ藥トス。阿芙蓉ノ如キ元運力
ヲ殘害スル毒ナシ。虛脱ノ甚キ症ニハ是ヲ以テ阿
芙蓉ニ代用テヨク元運力ヲ揮發ノ醒復セシメ。一
ハ阿芙蓉ノ毒ヲ解シ一ハ諸筋ノ動惕危篤ノ顫振
譫語狂妄或ハ腠理緊縮ノ汗ナク或ハ胸中促迫欬

嗽喘急等痙攣ノ運動アルニ奇効ヲ奏ス。○龍腦ハ
神經熱危劇ノ諸症ニ用テ麝香ト共ニ殊効ヲ見シ
阿芙蓉毒ヲ解シ他藥ノ揮發衝動ノ効力ヲ資益ス。
脉細ニノ弱。腠理弛開ノ汗アリ。耳聾シ睡眠多ク。虛
罷殊ニ甚キ症ニ用テ其精力ヲ挽回スルノ捷効ア
ル。○阿芙蓉。麝香ニ優レリ然レ脉細ニノ緊。腠理閉
塞ノ汗ナキ症ハ麝香ヲ的當トス。龍腦ハ熱勢ヲ增
發シ汗管ヲ開弛スル。○麝香ニ若カズ。又過用スレ
バ胃ニ觸テ惡心嘔噦眩暈ヲ發ス。故ニ服量少許ニ
ノ芳香ノ諸藥ヲ加ヘ用ベシ。○葡萄酒ハ揮發ノ殊

能アリテヨク元運カヲ維持保護シ酷厲刺戟ノ害
 ナクメ殊ニ神經熱ニ峻効アリ。是ニ鹿角膠ヲ加ヘ
 用テ大ニ滋養ノ効ヲ稱ス○硃砂ハ尤揮發衝動ノ
 峻藥ニメ神經熱ニ用レバ効用阿芙蓉ニ近シ。故ニ
 戒慎ヲ加テ用ベシ過服スレバ衝動大過ニメ血液
 溶解シ汗漏泄ノ虚脱スルノ恐レアリ○但右ノ諸
 藥モ唯一藥ノニニ固執ノ久ク用レバ其藥ノ偏性
 ニ慣テ殊効ヲ奏セズ。故ニ右ノ諸品ヲ配合シ或ハ
 更互ニ用ヒ或ハ効力緩和ナル藥品ヲ加ヘ若ハ兼
 用メ其漸次ニ沈淪スル元運カヲ喚發ノ回復スベ

シ○礮性ノ酸精^{出上}ニハ其下利ヲ増ス故ニ多クハ

用^レズ。然^レ凡^レ衄血崩漏等過多ニメ逾^レ危篤ヲ爲ス症ハ

是ヲ用^レテ極テ驗アリ或ハ收斂亞^イ的兒^ルヲ粘滑ナル

液ニ和シ與フベシ其効。綠礬精ニ勝^イレリ。或礮性ノ

酸精ヲ用^レテ腹痛下利ヲ起ス^コアル^クハ亞^ア爾^ル箇^コ兒^ル

ヲ加ヘ與^テ是ヲ治スベシ神經虚罷ス^レ凡^レ甚ダ多

血ニメ血絡大ニ盈脹スル者ハ右ノ酸精良効アリ。

但^レ熱性衝動ノ藥ハ大ニ害アリ○劇^キギ^シ神經熱ニ於

テ脉洪數。壯熱。譫語。衄血ヲ發スル者ハ收斂亞^ア的兒^ル

ニ阿芙蓉六分ノ一ヲ溶シ一時每^ニ六滴宛^ツ粘滑ノ

液ニ加へ與テ殊効アリ○下利ニ重墜努責ヲ兼ル
 症ハ專ラ揮發衝動ノ峻藥ヲ用テ上ニ説ク如クス
 ベシ。此神經熱ニ幾那及ビ其他收瀰ノ強壯藥ヲ用
 レバ虚憊ノ胃腸是ヲ消化スルヲ能ハズノ逾。下利
 ヲ増シ煩悶ヲ發ス或ハ下利ナク胃腸ノ虚憊甚シ
 カラザル症ト雖モ是ヲ用レバ熱勢増劇ノ煩悶ス。
 此神經熱ハ幾那ノ如キ收瀰ノ藥ヲ投メ治スベキ
 輕易緩慢ノ病ニ非レバナリ乃チ其害アル所以ヲ
 察スルニ大凡虚憊ノ症ニ二種アリ真虚ト真虚ニ
 非ルトナリ所謂真虚ハ專ラ精カノ虚耗缺損スル

己^{ハナ}甚^クキヨリ發スル神經熱ニノ病毒ノ體中ニ盤
 潜セザル者ナリ。此症ハ危篤ニ至レ者ト雖モ幾那
 ヲ與テ功ヲ收ムベシ。然レ^レ斯ニ舉ル所ノ神經熱ハ
 真虚ニ非ズノ嘗テ感受セル邪毒ノ内藏諸器ヲ暗
 襲潛侵ノ恣ニ剽掠劫奪スル故ニ元運力是ヲ攘^{ハラ}ヒ
 除ントノ相攻伐シ大ニ罷弊ノ爲ス所ノ虚憊ナリ。
 故ニ揮發衝動ノ峻藥ヲ以テ其罷弊セル元運力ヲ
 喚發振起メ邪毒ヲ攘除セシムルニ非レバ回生ノ
 績ヲ致シ難シ又其諸藥ハ營^クニ元運力ノ罷弊ヲ資
 補培養スルノ云ナラズ其潜伏沈滯セル邪毒ヲ揮

散發越ノ排除シ易カラシム然レニ幾那ヲ與レバ其
 憤起ノ充張スベキ元運力ヲ收固シ澁滯セシメ重
 テ一層ノ衰弱ヲ増シ或ハ邪毒ヲ凝澁ノ逾體中ニ
 淹留セシム然レ病毒漸ク解散シ胃腸消化ノ機轉
 ヲ得。脉力漸ク生ノ稍緩ナレニ至テハ幾那等ノ收
 固強壯ノ藥劑ニ香竄ノ諸品ヲ調和シ葡萄酒若ハ
 適宜ノ丁幾生爾ニ加ヘ用フベシ

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 棟齋宇山先生著 全三冊 醫學入門 植學啓原 宇山捨庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完 自初篇至七篇

增補和蘭藥鏡 同上 全七冊 醫療正始 沖齋伊東先生著 每篇三冊完 自初篇至七篇

遠西醫方名物考 同上 全五冊 泰西名醫彙講 紫川真作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄幹先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 醫方研幾 無涯足立先生著 每篇三冊完 初篇二篇

蘭學階梯 同上 全三冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄幹先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著 每篇三冊完 初篇二篇 病學通論 洪菴緒方先生著述 初篇三冊出来 二篇三篇四篇 逐々出初

濟生三方 杉田成卿先生譯 全四冊 青藜閣 江ノ浅草茅町三丁目 須原屋伊八

