

遠西醫方名物考

美女
五

卷十三

X
e | 5

F 23
工-16

499.2
三三-3
23

No. 1448
12 e 15



富士川文庫

3290

遠西醫方名物考標目

卷二十三

揮發香竄精

堇菜舍利別

蚯蚓油

銀漿

那刺栗必
扭安栗斯印
質斯兒條歇

銀簪

同上

牛乳

乳條

金硫黃
那刺栗必
扭安栗斯印
質斯兒條歇

急製硝砂精

重訂內科撰要
第五十章

女迷迭香精

迷迭香油

默栗薩

默栗薩水

默栗薩精

咲坪

默他兒雜腹蘭

默他兒雜腹蘭

美蜜

黃白蜜

扭質沒

酒上同

咲坪

黃白蜜

扭質沒

酒上同

蠟

白蠟

薰蠟法

昆設爾弗

蠟水

明礬

散血丸

芙蓉糖

散

明礬水

枯礬

白蠟

清眼膏

龍礬水

明礬水

密陀醣

鉛嘴條

芙蕖散

玫瑰舍利別

水

密涅刺

列結爾蔑斯

密涅刺

列同

密涅刺

爾鎮痛液綠礬精

安質沒

扭


民塙列利精

硝砂條

薰蠟法

昆設爾弗

蠟水



遠西醫方名物考卷二十三

孫齊先生譯述

男 宇田川 榕榕菴校補

揮發香竄精

〔サルホラテイ・オレヲシム羅オーリイ・卫
ン・スペセレゲスト・ハン・フリクソト〕蘭

製法

狗櫟皮

或、橙皮、新鮮黃皮、去取

半

桂

火肉豆蔻

各二錢

丁香

一弓半

硇砂

一弓半

剥鴛亞斯

精製者

燒酒 十度者
二北

右剉三搗テ合和シ格兒弗ニ内レ固封シ燒酒ニ浸ス
ト二日。硝子ノ列篤兒多^ト_{或ハ}磁製ノ者ニ内レ重湯若^ユ_{セシ}ハ
沙火ニテ徐々ニ蒸餾シ精ヲ取ルト十四弓技

又法 酒石鹽 末半北

丁香油

茴香油

桂油 各半錢

府利剉 一月

山柰粗末

琥珀 末各半刀

右合和メ格兒弗^{ルフ}ニ内レ固封シ置クト兩三日ニメ
左ノ品ヲ加フ

燒酒 一北半

硇砂 精製者

右攪和シ格兒弗^{ルフ}ニ内レ文火ニテ蒸餾シ精ヲ取ル

十九弓伍

又法

硇砂精

燒酒

各四弓

橙皮油

府利油 各一錢

桂油 半錢

右調匀ス 揭

主治 指發衝動ノ元運氣ヲ活潑シ脳神經ノ衰弱及壅塞ヲ健運開達シ感觸知覺ノ微弱ナルヲ銳敏ニシ凝血粘液ヲ疏釋シ失氣眩冒昏睡痱精神虛乏煩悶及ビ痞氣鬱滯ノ諸症ヲ治ス○患者虛衰ノ血液ノ運行怠慢ナルヲ指發衝動ノ治スベキ諸症ニ用ヒ又發汗ノ峻効アリ○痘瘡及ビ傷冷毒痛脚痛風等ノ内攻ノ惡症ヲ發スルニ用テ捷効アリ。雜腹蘭

丁幾去爾ヲ加ヘ四分時ニ二三十滴宛用テ殊ニ良
○服量一錢ヨリ三錢マデ大麥煎。其他適宜ノ飲液ニ點服ス○失氣昏冒ハ此藥ヲ小硝子壙ニ内レ鼻下ニ接シ藥氣ヲ嗅シメテ醒復ス 依伍

董菜舍利別

セイローブ・ハンヒオーレン蘭古傳敷用

製法

董菜花 生鮮芬香ノ花瓣ヲ採リ嫩葉中擗碎

沙糖

聞三北煎入煎後奏聲誅滅火解

沸湯二十弓

右花ヲ硝子壙ニ内レ湯ヲ加ヘ固封シ慢火ニ上セ

浸スト三時ニメ絞リ濾シ其液ニ沙糖ヲ攪和シ再
ビ濾^コシ煮テ舍利別ノ稠ト爲ス 拔

主治 緩和滋潤清凉鎮痙ノ良効ヲ奏シ粘痰ヲ稀豁
シ嗽嗽等肺ノ諸症ヲ寛解ス。又微利ノ効アリ。初生
兒ノ胎屎ヲ下スニ良○鶴口瘡及ビ口舌瘡瘍ヲ治
スルニ蓬董舍利別 蓬秋ノ出ヲ用テ捷効アリ 叔依

蚯蚓油 オレウヘルムブリコリム 羅

製法

蚯蚓 洗淨者半丸

阿利襪油 四二丸

右硝子壇ニ内レ煅處ニ置キ淹^{ヒタ}スト二十一日。絞テ
油ヲ取り貯フ 医

又法

蚯蚓 適宜

右磁器ニ内レ置ト三日。ヨク土ヲ吐カレメ温湯ニテ
洗ヒ布巾ニテ拭ヒ乾^カシ磁壺ニ内レ阿利襪油ヲ加
ルト三指横徑上ニ至リ。又葡萄酒少許ヲ加ヘ固封
シ煅處ニ置ト三日ニメ磁鍋ニ内レ文火ニ上セ煮
テ水氣ヲ消シ布巾ニ包テ絞リ濾シ暫ク靜定ノ底
ニ沈ム漚渣ヲ去リ硝子壇ニ内レ固封シ貯フ 叔

主治 外敷ノ肢節拘強。神經攣急ヲ緩弛シ。痛風。打撲

傷。神經創。火傷ニ良驗アリ

矣

女

迷迭香精

ア・ホ・ン・ガ・リ・ア・羅・甲・セ・マ・レ・イ・ン・・ゲ・ス・ト・蘭

半○按ニ迷迭香ハ江戸花戸コシ子ノロウト呼ビ

多ク培植ス。遇云効力刺賢坪兒ト同シ○榕嘗テ

古越後長岡邊ノ河濱沙地ニ生スル一種ノ芳草ヲ

鑒識ノ和蘭ノ捲坪兒ニ充ツ。近來多ク採出シ直

其名ヲ以テ藥舗ニ貨セシム此草江州伊吹山
又ニ關西ノ俗伊吹麝香草ト稱ス。江戸花戸セキ性
ハカト呼バ然ニ宜ク和蘭名ヲ以テ稱スベシ
功。迷迭香。刺賢坪兒。黑栗薩。未沃刺那等ニ類ス。若モシ

缺ルニ遇バ代用メ可ナリ

製法 迷迭香 生鮮花穗及ビ梢葉

燒酒 十度者
八北

右迷迭香ヲ燒酒ニ投シ固封シ浸ス。一兩日重湯

若^{モエ}ハ沙火ニテ蒸餾メ精ヲ取り十九度ニ至ル。

福小窓

鶯兒テ測リト九度マデ/精ヲ取ルヲ云技○此精ノ一ニ翁加里設水ト名ク

又法 迷迭香 生鮮花穗及ビ梢葉

燒酒 三北

右格兒弗^ル内レ蒸餾メ其液殆ド盡ルニ至リ。其滓ヲ絞リ去リ。其汁ニ又迷迭香ノ花穗梢葉一比。燒酒半比ヲ加ヘ前ニ取りタル精モ是ニ加ヘ再ビ蒸餾メ其精ヲ取り芳烈ノ氣味盡ルニ至テ止ム。叔

又法

ニアウ.デラ.レイ子又ア.ク.レギア.ホンカリア.羅ボンガリセ.ウトル.蘭

迷迭香 生鮮葉花ヲ取り陰乾者

四北

沙糖 一比

水 六北

右先沙糖ヲ水ニ溶シ濃テ渣ヲ去リ格兒弗ニ内レ迷迭香ヲ浸シ文火ニ上セ格兒弗熱メ大抵手ニ觸テ堪^{タヌ}ル許ニ至リ新ナル麥酒酵^{ホド}ノ條^モ出一二匙ヲ加ヘ攪合シ冬ハ密閉セル爐室ニ入レ置クヤハ泡釀ス。大抵三晝夜ヲ經レバ泡釀止テ其沫消散ス。是ニ於テ其格兒弗ニ兜ヲ蓋^{カホ}ヒ。文火ニテ蒸餾スレバ氣

味芳烈ナル露精出ヅ。終ニ氣味薄弱ナルニ至テ火
ヲ下シ其精ヲ取リ硝子壠ニ入レ固封シ貯フ○久
ク貯テ杳氣脱スル所ハ是ニ迷迭香ヲ加ヘ再ビ蒸
餾スベシ○默栗薩撒爾非亞薄荷等ノ精モ右ノ如
ク製ノ尤良叔

主治 芳烈竄透シ頭腦神經ヲ強壯シ微衝動シ粘液
脳ニ鬱聚スル諸症卽ナ昏睡病失氣昏冒ヲ醒復シ
癱頭痛ニ良驗アリ○痙攣子宮衝逆ヲ治シ粘液頭
腦子宮等ニ凝滯スルヲ驅散ス○痛風傷冷毒及ビ
虛冷粘液ヨリ起ル諸病ニ多ク効アリ

○服量一錢マデ飲液ニ點服ス○昏睡失氣ニ嗅藥
トシ或ハ頭部顛顛等ニ塗リ或ハ痛風傷冷毒痛齒
痛耳痛鼻塞耳聾等ノ患部ニ外敷シ或ハ瘡ノ蒸湯
剤ト爲シ神經ヲ強健シ粘液ヲ疏解メ捷効ヲ稱ス

叔依

迷迭香油 オレウム・アントス又ロリスマリニ羅
製法 薄荷油ト同シ花葉莖叶ニ蒸餾ス

主治 衝逆眩冒。搐掣喘急。卒厥等ニ二三滴内服メ奇
効アリ又腦神經ノ諸症ニ外敷シ或ハ嗅藥トシ捷
効ヲ稱ス○竄透ノ龍腦ノ如シ性功。加耶普的油ト

同シ○腹部攣急衝逆疝痛等ノ患處ニ擦ノ速ニ解
散ス又侵刺メ骨ニ滲透シ歯痛ヲ治ス。棉ニ滴シ齶
孔ニ挿テ卽効アリ。〔疾遇〕
叔

默栗薩羅 メリッセ又シットルーンコロイド
又ベイエンコロイド蘭

形状此草方莖硬固帶白色。高サ一二尺許。叢生シ。多
枝兩對ス葉モ亦柄アリテ對生シ。橢圓メ長一母
指許邊ニ刻缺及ビ皺アリ。深綠光澤微細ノ毛茸ア
リ。夏月葉間ニ唇狀單瓣ノ小白花ヲ開キ。莖ヲ圍テ
層々簇生シ上唇ニ分レ圓クメ直立ス。下唇ハ三ツ

ニ分レ低垂ス萼筒様五叉ヲ爲ス花後下心蕊ノ本
ニ四ノ細子ヲ生シ。圓ク滑澤淡黒ナリ。一種花莖ノ
偏側ニ著キ。初メ淡黃ニメ熟スレバ白色トナル者
アリ。根本ノ如ク鬚多ク經年枯レズ。或ハ一種宿根
セザル者アリ。○莖葉花皆芬香。賞スベク。其氣狗
ノ如シ前ニ舉ル「トル」ノ名ハ即チ狗ノ義ナリ。又ベイエンコロイドノ名ハ
蜂草ノ義ナリ。蜂甚大此草ヲ好メバナリ。アリ蜜ノ義ナリ。蜜蜂多ク此花ニ就テ蜜え得レバナリ。
味微辛。歐羅巴洲ノ南地ニ生ス。○變生二種アリ一
種ハ葉班駁黃色ナリ。一種ハ葉大且外粗糙。萼麻葉
ノ如ク其氣重クメ佳ナラズ。或ハ氣烈ニメ臭ニ近

キアリ。是ヲ「ロムセメリ、セ」ト名ク。或ハ花紅淡紅紫碧等アリ。或ハ葉淡綠ナルアリ。變生異種多クハ宿根セズ。多ク園ニ培養ス。

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ。性功大抵迷迭香。撒爾非亞ノ如シ。

主治葉及ビ花。性溫。香竄揮發ノ油鹽アリ。頭腦神經ヲ強壯スル効ヲ稱ス。故ニ昏睡病。痙攣。眩運ニ用フ。

○泡瀉トシ用ヒテ敗黑膽液ノ閉塞。脾病。依剥昆蛭兒。鬱憂病ニ殊効アリ。○心動悸。婦人子宮病。經閉。白帶下。痔血等ノ壅滯ヲ治ス。

○感動シ易キ婦人ノ子

宮病ニ尤^モ驗アリ。○是ヲ泡湯トシ用ヒテ經閉ヲ治スル一藥トシ又產婦ニ用ヒテ惡露ヲ通シ乳汁ヲ増ス。

○健胃ノ効ヲ稱シ胃ノ諸症ヲ治シ風氣痞脹疝痛ヲ消散ス。

○泡湯或ハ水ニ浸シ杓汁ト沙糖ヲ加ヘ酸美清香ノ飲液トシ熱病ノ煩渴ヲ治ス又腐敗熱。神經熱ニ用ヒテ輕キ鎮痉劑及ビ發汗劑トシ偉効アリ。

○葡萄酒ニ浸シ用ヒ或ハ蔬ニ加ヘテ佳香ヲ賞ス。

黒栗薩水

アーチメルサ^{リッサ}羅

製法

薄荷水製法ト同シ。

○或ハ黒栗薩生草六比ヲ

風雲堂藏

蒸餾ノ露水十北ヲ取ル。或ハ是ヲ蒸餾ノ後其格兒
弗ノ滓ヲ絞テ汁ヲ取り又新ニ此草ヲ加ヘ。其露水
モ是ニ加ヘ。再ビ蒸餾スレバ香氣尤烈ナリ 技亞

主治 神經ヲ強壯ニシ精神ヲ欣慰シ鬱憂病依剥昆
垤兒子宮衝逆處女病等ノ諸症心悸動失氣等神經
攬擾ノ諸症ヲ治シ風氣ヲ驅リ小便ヲ利シ月經ヲ
通ス 叔房

默栗薩精 スピリクス・メリッサ 罗

製法 薄荷精製法ト同シ

主治 腦心胃ヲ強壯シ昏睡失氣鬱憂病經閉等總テ

默栗薩 リッサ 主治ノ諸症ニ捷効アリ○服量一二匙ヲ葡
萄酒麥酒白湯等ニ默服ス 叔房

呴蛭 ヘイドロメル 罗

ホーニ フダランカ 蘭

是ハ蜜ニ水ヲ加テ釀シ製スル酒ノ如キ一種ノ飲
料たり。北方寒地ノ葡萄ヲ產セザル處ニテハ是ヲ
葡萄酒ニ代テ日常ノ飲料トシ或ハ藥用ニ供ス。上
好ノ白蜜ニテ造釀スレバ味甘美ニメ尤良性トス

製法

白蜜

一 匹

本草水

三 匹

右蜜ヲ水ニ溶シ慢火ニ煮テ浮沫ヲ抄去リ水氣ヲ
減耗シ是ニ雞卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ火ヲ下シ布
疔ニテ濾シ桶ニ内レ注孔桶ノ蓋ヲ塞グヲナク但
綿布ヲ被テ塵埃ヲ防ギ竈爐ノ邊燒處ニ置テ泡釀
セシムルヲ凡四十日餘終ニ少モ泡釀セザルニ至
テ注孔ヲ塞ギ窖ニ内レ貯ヘ冬月製スレバ翌春二
頃取出シ飲料トス其桶ハ新ニ造リ熱湯ヲ盛リ
浸スフニ三四回ニソヨク其材ノ氣ヲ去リ又葡萄酒
ヲ以テヨク洗ヒ用フベシ○此飲料久ヲ經レバ蜜
ノ味脱ノ性味正ニ葡萄酒ノ如シ○時ニ臨テ速ニ

製スルニハ蜜ニ水ヲ加ヘ煮タルノニニテ泡釀セ
ズ用フ。是モ亦咲塙ト名ク○或ハ是ニ覆盆子汁。桑
椹汁等ヲ加造釀ノ美味ナル咲塙ヲ製スルヲアリ

又法

水六十四斗

蜜適宜入大桶入量人共宜小數
右水ニ蜜ヲ攪和シ是ニ卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ枸
櫞三個ノ黃皮ヲ刮リ取テ此液ニ加ヘ煮テヨク泡
沫ヲ去リ火ヲ下シ又拘櫟三個ノ切片ヲ加ヘ清楚
ナル桶ニ内レ燒處ニ置テ泡釀セシムルヲ三日ニ
メ又ヨク泡沫ヲ去リ濾テ渣ヲ去リ小桶ニ内レ置キ

火モ泡釀セザルニ至テ固ク蓋ヲ閉テ貯ル。三日
許ニメ取り出シ用テ飲料トス。或ハ丁香。府利肉豆
蔻。各四錢。末トシ袋ニ内レ淹メ佳香ヲ賞ス。
主治緩和滋潤ノ効アリ。欬嗽喘急等肺ノ諸症ニ用
ヒ心胃ヲ強健ス。○多血熱性ノ人。多ク用フレバ膽
液ヲ増シ熱ヲ發ス。故ニ老人虛冷ノ者ニ宜シ。小兒
少壯ノ人。過飲スレバ害アリ。伍

叔園

蟻長等生火蟲類又美和十日半數也。蟻也。大頭也。
大頭也。長也。布也。生也。十日半也。○大頭也。蟲也。十日半也。

美

蜜 「メル」羅 「ホニフ」又ホニンフ 蘭

總テ草木ノ花蕊ノ本ニ花ノ精液ヲ蓄ル處アリ。是
ヲ「ホニングバッキ」蜜槽 又「ホニングキリル」蜜腺ト
義ト
名ク。其液味甘シ。其處ヲ摘シ取テ嘗レバ花ノ興ナ
ルニ隨テ其形モ同ジカラス。蜂其液ヲ吸取テ胃中
ニ蓄ヘ蜜脾ノ窩中ニ吐出シ貯ル。是即チ
蜜ナリ。○花ノ精液先づ蜂ノ胃中ニ在テ稍熟シ蜜
脾ニ貯ル間ニ全ク釀熟メ醇厚甘美ノ質トナル。是
レ衆花ノ精英化釀シ成ルヲ以テ其性技爾。撒謨ノ
如ク且油氣鹽氣アリ。但其花ノ性ニ隨テ蜜モ亦差
ヤ。

異ナリ假令バ迷迭香ノ如キ芳香ノ花ヲ吸テ成ル
蜜ハ佳香アルガ如シ○凡ソ暖國ノ蜜ハ寒地及ビ
寒暖中和ノ國ニ產スル者ニ比スレバ皆上好ナリ
一國中ニテモ山陽及ビヨク大陽ヲ受ル地ニ產ス
ル蜜ハ氣味尤醇厚ニノ上品ナリ是レ大氣ニ濕穢
ナク暖和ニメ淨潔ナレバナリ。然レバ上好ノ蜜ヲ
造ルニハ山地高夾ノ暖地ヲ擇ミ北風ヲ避ケ東南
ニ向テ蜂籠ヲ造ルベシ平原卑濕ノ地ニ比スレバ
其蜜尤良性ナリ○蜂ノ吮フ花ニ因テ蜜亦善惡ア
リ。香氣アル花假令バ迷迭香草零陵香櫻草_{サクランボサウ}洋石竹_{オランジダセキヂ}。

薔薇。鈴蘭。羅勒。金盞花等ヲ吮テ成ル蜜ハ最上品ト
ス故ニ總テ芳香ノ花アル草木ヲ以テ蜂籠ノ邊ニ
培栽スベシ○蜜ヲ取ルニハ春夏及ビ秋ヲ佳トス
花多クノ其精液モ充滿シ春月ハ殊ニ蜂ノ氣力壯
旺ノ舊房ヲ離レ新巢ヲ造テ多ク蜜ヲ蓄フレバナ
リ又暖國ニテハ天氣晴和ノ早且ニ湛露。降テ草木
ノ花葉ニ珠ヲ成ス。此卽チ一種ノ滿那_{マシナ}ニメ味甘美
ナリ。蜂是ヲ吮テ多ク良蜜ヲ釀シ又此時令ニ於テ
草木ノ英華多ク萌發ノ充溢スレバナリ
○蜜ノ善惡ヲ試ル法 蜜ヲ手指ニ著ケ長久絲ヲ

引テ折斷セズ。或ハ蜜ヲ匙ニ内レ文火ニ温メテヨク烊化シ流動スルハ良品トス。否ラズノ稠厚凝結スルハ偽品。若クハ沙糖ヲ雜フル者ナリ。

製法 蜜ニ黄白ノ二種アリ。白蜜ハ火力ヲ假^カテズ製^ス。其法新蜜脾^{ハチ}ヲ取り碎テ篩^ス或ハ蘿^{イカキ}ニ内レ桶ニ載^セテ。爐邊ニ置キ或ハ天日ニ曝^サス。且ハ潔白鮮美ノ蜜自ラ淋^リ下^ス。和蘭ニ是ヲ姫蜜^{原名「モヘ」ト名^シク。即チ白蜜ニメ最上品トシ多ク内服製劑ニ用フ。但其暖氣ニ過ル。勿レ蠟モ共ニ烊^トテ下レバナリ。上品ハ潔白鮮麗ニメ稠^ク。粒塊ヲ雜ヘ甚ダ甘美ニメ微舌。}

ニ滲透シ佳香アリ。漢名生蜜○右ノ如クノ白蜜ヲ取テ後蜜脾ヲ布袋ニ内レ榨^シニテ榨^シリ餘殘ノ蜜ヲ取ル。アリ。然^ニ是ハ蜂子等雜ル故ニ潔白ナラズ其品劣レリ。

○黃蜜ハ蜜脾ノ新陳ヲ擇ハズ取り碎^キテ鍋ニ内レ或ハ水少許加^シ火ニ上セ温メ布袋ニ内レ榨^シリ取ル者ナリ。即チ其滓ヲ以テ蠟ヲ製ス。然^ニ蠟モ少許ハ其蜜ニ雜ル故ニ是ヲ再煎メ放冷スレバ蠟ハ自ラ分ルナリ。此蜜ハ蜂子等ノ汚物雜ル故ニ白蜜ニ比スレバ淨潔ナラズ下品トス。漢名熟蜜然^ニ鮮黃稠厚ニメ甘美

ナルハ良品ニ屬ス○白蜜モ久ク貯レハ黃色ヲ帶
ブ。或ハ火カヲ假^カラズ淋滴メ取ルト雖モ黃色ノ者
アリ是ハ蜂ノ呑フ所ノ花ノ性ニ因テ其色ノニナ
ラズ蜜ノ性モ差異^{ヤコト}ナルフ上ニ説ク如シ
○蜜ヲ藥用トスルニハ宜ク左ノ法ヲ以テ淨製ス
ベシ

淨製法 蜜ニ水四分一或ハ六分一ヲ加ヘ雞子白
ヲ拌セ文火ニ煮テ盡ク上面ノ浮沫ヲ抄^{ハシ}ヒ去リ是
ニ雞卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ毛篩ニテ濾シ放冷シ
貯フ○新鮮上好ノ蜜ハ火カヲ假^カラズメ淨製スル

モ亦良其法。蜜ヲ濶キ磁器ニ内レヨク蓋^{フタ}ヲ覆ヒ寒
燈中等ノ處ニ置フ三四日。上面自ラ泡沫生ス。數回
是ヲ抄ヒ去リ泡沫少^シモ生セザルニ至リ貯フ新蜜
ハ是ニ由テヨク純粹トナルナリ○蜜ヲ煮テ稍稠
厚ト爲シニ個月許貯レバ芒ヲ結テ沙糖ノ如シ

主治 性溫。白蜜ハ油氣土氣ヲ含ミ鹽氣少^シシ專ラ内
服藥ニ用フ○凝結ヲ疏解スル良藥トス。故ニ粘液
痰飲多キ症ニ用フ○肺ノ攣急ヲ甘解シ酷厲液ヲ
除キ粘痰ヲ釋キ大便ヲ滑シ小便ヲ利シ胸中ノ諸
病ヲ療ス○技爾撒謨^{ハサム}様人性アリテ枯燥ヲ滋潤シ

津液ヲ生シ痛ヲ止ム。○久病血液枯涸。虛羸。勞瘵ノ初起瘦削セル者或ハ老人虛冷ノ症ハ飲液ニ和シ用ヒテ良。○蜜ハ沙糖ニ比スレバ凝結ヲ疏釋スル効多シ故。肺藏ニ膿瘍アルヨリ發スル勞瘵ハ的當セス。○胃弱クメ食進マザル症ニ多ク用レバ停滯メ消化ヲ妨グ。又少壯多血熱性。膽液過多ノ人ニ多ク用レバ害アリ。○黃蜜ハ酸性鹽ヲ含ミ。油氣土氣少ナシ。白蜜ニ比スレバ氣味剽悍ナリ。汚液ヲ濾刷シ凝結ヲ溶解シ粘痰ヲ祛ク。○外敷メ軟化。淨刷。化膿ノ効アリ。○蒸湯藥トシ或ハ小麥粉ヲ加ヘテ泥ト

シ或ハ雞子黃ヲ加ヘ貼メ堅硬ヲ軟ラグ膿ヲ釀ス
○吉利詞キリス_{テイル}爹兒ティルトシ施ノ腸ノ絞痛ヲ消シ大便硬結ヲ潤シ通ス

裴過伍依

蠟

セラロ

ワス蘭

蜜蜂。草木ノ花蕊頭ノ粉及ビ葉ノ脂粉ヲ吮テ胃中ニ蓄ヘ或ハ是ヲ脚ニ著テ蜂籠ニ集リ是ヲ以テ蜜脾ヲ造ル。是ヲ搾テ蜜ヲ取り又其滓ヲ搾テ蠟ヲ取ルナリ。是ニ黃白ノ二種アリ。○白蠟又二種アリ。其一ハ當年ノ蜜脾ヨリ取りタル蠟ニ白色ナリ。是ヲ自然白蠟ト名ヅ。但是ニモ鮮黃色ノ者アリ此ハ

蜂ノ吮取ル花ノ性ニ因テ然リ其ニハ黃蠟ヲ晒メ白蠟ト爲ス者ナリ是ヲ尋常ノ白蠟ト名ク蜜ヲ取ルニハ大抵蜜脾ノ新古ヲ擇バス相混シ搾ル故ニ自然白蠟ヲ取ルニ便ナラズ多クハ黃蠟ヲ晒メ白蠟トシ用ルナリ○二年ノ蜜脾ヨリ取りタル蠟ハ黃色ナリ是ヲ黃蠟ト名ク。三年ノ蜜脾ヨリ取りタル蠟ハ黃赭或ハ黑色ヲ帶ブ

黃蠟製法 蜜脾ヲ搾テ蜜ヲ取りタル滓ハ蜂子塵埃等ノ汚物雜ル故ニ是ヲ淨淘ソ蠟ト爲スナリ其法先ヅ蜜脾ヲ鉢ニ内レ水ヲ注キ加ヘヨク其粘著

セル蜜ヲ淘洗シ罐ニ入レ文火ニテ烊シ上面ノ浮沫穢物ヲ抄^スヒ去リ或ハ酒石英少許ヲ加ヘテ盡ク浮沫ヲ去レバ甚ダ淨潔鮮明トナル。是ヲ布袋ニ内レ漏^{コシ}テ鉢ニ内レ是ニ微温湯少許ヲ加レバ蠟其上面ニ凝リ聚ル。冷テ後是ヲ取り貯フ再ビ右ノ如^{トカ}烊シ製スレハ蠟尤^モ純潔ナリ蜜脾。新ナルホド蠟逾鮮麗純潔ナリ

又法其蜜ヲ取テ後蜜脾ニ水ヲ加ヘヨク洗ヒ是ヲ繩^ス杓子ニテ抄^スヒ取り罐ニ内レ火ニ上セ其蠟ヲ烊シ煮テ水氣ヲ去リ又上潤^{ヒロ}ク下窄^スキ鉢數多排列シ

各是ニ三分一説ノ沸湯ヲ盛リ其烊シタル蠟ヲ以テ適宜ニ分キ内レ冷テ後是ヲ取り出セバ汚物ハ盡ク其底ニ聚リ著テ凝固ス。是ヲ刮リ去リ貯フ
又法 蜜ヲ取タル蜜脾ヲ火ニ上セヨク烊化シ布袋ヲ水ニ濕メ其蠟ヲ注キ内^イレ水ヲ盛タル桶ノ上ニ掛テ其蠟^{ミタ}淋リ下ラシメ又其袋ヲ太キ木棍ノ間ニ夾テ絞レバ蠟盡ク水ニ入テ凝固ス。是ヲ取り再ビ前法ノ如ク烊^{ヨク}シ濃^{ヨシ}テ水ニ淋リ下ラシメ其水中ニ凝固スル蠟ヲ取り貯フ多ク製スルニハ右ノ袋ヲ搾^{ミキ}ニテ搾^{ミキ}ルベシ

白蠟製法 黃蠟ヲ火ニ上セ烊^{ヨク}シ熱湯ニ投シ濃^{ヨシ}テ汚物ヲ去リ冷テ後濶キ鍋ニ内^イレ火ニ上^セテ烊^{ヨク}シ平等滑澤ナル薄キ板ノ正中ニ長キ釘ヲ刺テ柄ト爲シ冷水ニテヨク濃^{ヨシ}シ是ヲ以テ其烊タル蠟中ニ投スレバ蠟遍ク其板ノ兩面ニ著テ厚キ紙ノ如シ。是ヲ取出^リセバ速ニ凝固ス。是ヲ冷水ニ投スレバ蠟離レテ薄序トナル。數回斯ノ如クメ其蠟ヲ取り集メ四五月ノ頃天日ニ曝^シ。烊^{ヨク}レバ數回水ヲ撒ケ濃シ或ハ蠟ヲ引タル布ヲ覆フテ塵埃ヲ避^ケ。夜ハ星ニ露^{サラ}スベシ。其蠟終ニ潔白硬脆ニメ碎ケ易ク嚼^{カム}テ齒

ニ粘著セザルニ至テ是ヲ鍋ニ内レ火ニ上セ烊シ放冷メ塊ト爲シ貯ス

又法 黄蠟ヲ鍋ニ内レ火ニ上セテ烊シ水ニ投メ攪^{カキ}滚スレバ碎片トナル其水ヲ換ヘ淹^{ヒタク}ス。數回ニノ瀧シ取リ布曳上ニ展^{ヒロ}グ盆ニ載^{ハセ}テ日乾及ビ露宿スルコ五六十日。終ニ白蠟トナルニ至テ再ビ火ニ上セテ烊^{トガ}シ是ニ酒石英少許ヲ加^ムテ上面ノ浮沫ヲ抄^スヒ去リ瀧^{コロ}テ放冷シ凝固セシメ收メ貯ス

主治 蠟ハ花ノ脂油ニノ其性^バ爾撒謨様ナリ故ニ諸油ニ加^ムテヨク溶化ス又鹽氣水氣アリ○黄蠟ハ

外敷ノ堅硬ヲ軟ラグ凝結ヲ解^ムキ急迫ヲ緩メ膿ヲ釀シ或ハ腫瘍ヲ消散ス。乳頭ノ焮熱腫痛及ビ坼裂等ニ塗テ良効アリ多々膏藥ニ用フ○白蠟ノ性功大抵黃蠟ト同シ但清涼スベキ症ニハ多ク白蠟ヲ用フ。但^シ黃蠟比^シスレバ急迫ヲ緩ル効少シ○赤痢ニ左ノ方ヲ用ヒテ治驗多シ

瑰蠟毬設爾弗

玫瑰昆設爾弗^{コシセ}二弓

甘扁桃油一弓半

右蠟ト油ヲ文火ニ上セテヨク烊シ。玫瑰昆設爾弗ヲ合和シ服ス。或ハ其症ニ隨テ阿芙蓉少許ヲ加テ殊効アリ。○勞瘵様ノ症或ハ稟賦薄弱ニメ肺ノ運營罷勞シ欬嗽喘急吐血聲嗄等ノ症ヲ患ヒ或ハ傷冷毒火痰嗽甚キ症ハ左ノ方多ク驗アリ。

薰蠟方 黃蠟ニ松香或ハ乳香沒藥ヲ等分ニ加ヘ或ハ拔爾撒謨字露ヲ加ヘ適宜ニ是ヲ取テ小鍋ニ内レ文火ニ上セ漸ク烊解スレバ佳香ヲ生ス。患者常ニ其蒸氣ヲ口ニ受テ吸入スルナリ。伍叔襄遇

明礬

アリイニ羅蘭

是レ一種ノ酸性鹽ナリ天造ノ者ト人工ノ者十二種アリ。天造ノ者ハ山坑及ビ土中ニ出ヅ。人工ノ者ハ一種ノ礦泉ヲ煮テ製シ或ハ一種ノ石ヲ煅テ製シ或ハ礬氣ホカ帶ル土ヲ煮テ製ス。人工ノ者ヲ以テ藥用トス。○製煉術ニテ此物ノ質ヲ研究スレバ綠礬油。礬土出次結晶水七補卷及ヒ少許ノ剝篤亞斯ヲ以テ成ル者トス。明礬ヲ蒸餾スレバ初ニ淡水出ツ。次ニ酸味ノ精液出ツ。其性綠礬精ト同シ但明礬ハ武火ニテ蒸餾スト雖モ精出ル。甚ダ少ク且氣味亦

綏弱ナリ是明礬ニ含ム所ノ土質ト綠礬油ト甚ダ
密ニ混合スルヲ以テ烈火ニテ蒸餾スレバ分離シ
難ケレバナリ。故ニ此精ヲ用ヒズ綠礬精ヲ藥用ト
ス。是ヲ蒸餾メ後其列駕兒多ニ殘ル渣塊ハ卽チ枯
礬ナリ。是レ明礬ニ含メル水ト綠礬油少許トヲ脫
スルノミニテ仍^ホ許多ノ綠礬油其土質ニ固著スル
者ナリ。明礬ヲ沸湯ニ溶シタル濃キ液ニ峻^{ツヨ}キ亞兒^{アヒル}
カリ鹽ヲ加レバ白色ノ土其底ニ沈ム。此卽ナ前說
ニ謂フ所ノ礬土ナリ○明礬ハ諸金類ノ質ヲ含ム
フナシ。是レ石膽ト異^{コト}ナル所以ナリ又石膽ニ比ス

レバ酷烈ナラズ然^レ收斂ノ効ハ同シ○明礬ハ亞^ア
兒^{アルカカリ}鹽ヲ含ム故ニ能ク結芒メハ稜或ハ十稜ヲ
爲ス卽チ一種ノ結晶鹽ナリ。是ヲ沸湯ニ溶シ草木
類ノ灰汁若^{モレ}クハ其^ア亞兒^{アルカカリ}鹽^{ボツ}剥駕兒^{アヒル}等^ナ六^六ヲ滴シ加
テ滾濁セザルニ至リ煮テ放冷シ結芒セシムレバ
孕礬酒石トナル但^レ右ノ明礬ノ溶液ニ鰶蓬鹽ヲ加
ヘ前法ノ如クメ結芒セシムレバ瓦老^{ガラバ}別里鹽トナ
ル○明礬種類多シト雖モ潔白ニメ汚色アル者ハ研
者ヲ藥用トス^{此所謂明}不潔ニメ汚色アル者ハ研
末シ雨水ノ沸湯ニ溶シ濾テ滓ヲ去リ又煮テ放冷

シ結芒セシムレバ上好ノ品トナル○此物。冷水及
ビ焼酒ニハ溶化セズ沸湯ニハ溶化ス

主治甚ダ收斂シ稍刺戟ス。其効力。専テ其含ム所ノ
許多ノ綠礬精ニ在ル故ニ甚ダ脉管ヲ收斂メ止血
ノ効ヲ稱ス。多ク諸失血及ビ水液脱泄ノ諸症ニ用
フ○衄血吐血婦人崩漏痔血等ノ劇キ症ハ二時毎
ニ明礬半錢ヲ取テ大麥煎ニテ送下ス。其血漸々減
スレバ朝夕一服宛與フベシ○危険ノ失血ハ半時
或ハ四分時ニ十五丸若クハ一又宛用ヒテ其血盡
ク止ニ至ル。但、輕キ失血ハ少許宛用ベシ多ク與レ

バ嘔吐スレバナリ○諸失血劇キ者ハ左ノ方亦殊
効アリ

效血丸

明礬 末 二 丼

血竭 末 四 錢

右明礬ヲ火ニ上セテ烊シ。血竭ヲ加テ攬和シ。温ニ乘
メ丸トス。服用量二時毎ニ一又ヨリ一錢マデ症ニ隨
テ加減シ適宜ノ飲液一二碗ヲ以テ送下ス。血症治
メ後モ日一二服與フベシ。但、諸失血ノ初發速ニ閉
澁ノ藥ヲ用ルヲ勿レ動モスレバ瘀血ヲ壅滯セシ

ムレバナリ。故ニ失血過度ノ候アルニ就テ用ベシ
此劑ヲ用レバ大便祕結スル故ニ時々下劑ヲ兼用
スベシ○諸失血ニ疼痛或ハ痙攣ノ諸症眩暈等ヲ
兼ルハ此藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ベシ。左ノ方尤良。

芙蓉糖礬丸

阿芙蓉 精製者 三合

明礬

阿煎藥

沙糖 淨白者 各二錢

右研和メ散劑トシ。分テ二十五服トシ。一時半ニ一

服完用フ。但其症メ輕重ニ隨テ加減スベシ○月經
過多ナルガ爲ニ諸症ヲ發スル者ハ明礬ヲ丸藥ト
シ毎月經水常期ノ七八日以前ヨリ毎朝空心ニ用
フベシ。下血モ是ニ同シ痔血甚キ者ハ明礬ヲ亞刺
比亞越謨ニ加ヘ火ニ上セ烊メ適宜ノ坐藥ニ造リ
肛門ニ挿^{サシ}テ治ス○頑固ノ遺精及ビ黴毒淋疾治メ
後唯粘液淋瀝ノ歇^{ヤマ}ザル症ハ毎日明礬十合ヨリ一
刃マデ用ヒ且冷水ニ浴ソ良驗アリ○腎膀胱尿道
等衰弱セルヨリ小便淋瀝白帶下。小便失禁及ビ淋
疾ヲ發シ頑固ノ者ハ對症ノ藥ニ加用ヒテ効多シ

○間歇熱。傷冷毒熱ノ患者衰弱ノ其症荏苒トノ解
セズ或ハ腐敗熱。神經熱ノ患者虛弱ニメ綠礬精ヲ
用ベキ諸症明礬對症劑加用ヒテ適應ス○明礬ノ
蒸餾精ヲ治熱ノ飲劑ニ加ヘ用ヒ清涼解凝利尿ノ
効ヲ稱ス。然ニ味惡キ故ニ皆綠礬精ヲ用ベシ但腐
敗熱ヲ兼ル赤痢ニ於テ酷烈ナル酸精綠礬精消石
精硫黃精等ヲ用ヒ難キ症ハ胃腸ノ汚物ヲ滌除メ後明礬ヲ
用テ間良驗アリ腐敗熱ヲ兼ル痢ハ胃腸罷弊スル
甚キ故ニ酷烈ナル酸精ノ刺戟ニ堪ザ○腐敗熱及ビ腐敗ノ痘ニ於テ小便失禁ス
ル者ハ明礬ヲ用テ良効アリ毎日十匁モレ若クハ十二

匁ヲ舍利別ニ和シ一卵匙ツバ宛與フレバ服シ易シ。薄
弱ノ小兒ハ日一ノマデ用ベシ○腸ノ衰弱弛緩メ
發スル疝痛頑固ノ大便閉下利或腸焮衝ヲ兼ル疝
痛ノ焮衝既ニ解散スレ由腸大ニ衰弱セルニ因テ
其痛莊苒トノ治セザル者ハ明礬十匁ヨリ一ノマ
デ用フレバ下利ヲ發メ治ス○腸ニ粘液過多ニソ
疝痛ヲ發シ且其粘液自ラ下利スル症ハ此藥ヲ用
テ良効アリ。但多ク粘液ヲ下利スレ由治セザル者
ハ是ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用フベシ即チ左ノ方ノ

芙蓉散

阿芙蓉 四升

明礬 二升

右研和ノ散剤トシ分テ四服トシ時ミ一服寃飲液ニテ送下ス○痙攣ノ運動ヨリ發スル疝痛モ胃腸ニ鬱滯セル惡液ヲ疏濫メ後明礬ヲ用テ腸ノ纖維ヲ收固シ強壯ニメ治スル者多シ○明礬ハ渴下ノ功アル故ニ下利ノ症ニハ効少シ○尋常ノ服量ハ五升ヨリ十升ニ至ル多ク服スレバ胃ニ觸テ嘔吐ヲ發シ或ハ下利ス○明礬ハ收斂甚フノ刺戟スル

故ニ胃腸ノ感動シ易キ人ハ是ニ堪ズ宜ク戒慎ヲ加ヘ用フベシ

外敷 收斂清涼ノ強壯シ腐穢ヲ淨刷ス○經久人焮腫眼ニ明礬ヲ沸湯ニ溶シ湯六勺明礬半錢沸放冷ノ眼ニ點スレバ收斂強壯ノ焮腫ヲ消ス殊ニ涙多ク出ル症ニ良或云其効皓礬及ビ鉛糖ニ勝ル症アリト○焮腫眼ノ涙多キ症ハ左ノ方良驗アリ

清眼膏

雞子白一個

適宜末

水

蜜

酒

水

蜜

酒

右雞子白ニ明礬末ヲ研和メ適宜ノ稀キ膏ト爲シ
是ヲ布片ニ塗リ眼ニ被貼スル。一時許ニメ洗ヒ
去リ。其後一時許ヲ經テ復貼スベシ。久ク貼スレバ
其熱セル。涙眼中ニ鬱住メ焮腫ヲ増發スル。アレ
バナリ。然レ汎數換貼スレバ是ヲ以テ眼膜ノ細絡ヲ
收斂メ強壯ラシ涙ヲ他ノ部ト驅散メ其毒ヲメ眼
中ニ鬱聚スル。無ラシム故ニ此症ハ兼テ刺絡ヲ
施シ下劑ヲ用ヒ或ハ發泡膏ヲ貼シ或ハ吸角ヲ施
メ其毒ヲ諸部ニ排泄スベシ。○明礬ト沙糖ト等分
ニ研和シ眼膜ノ障翳星斑ニ點メ消散ス。○明礬ニ
効アリ。

雞子白ト薔薇水ヲ研和シ煮テ泥ト爲シ温ニ乘メ
被指大ノ錠ト爲シ放冷メ乾固セシム。是ヲ糖礬ト
名ク。外敷メ婦人粧顏料トシ又面部ノ小皰亦疹汗
黜汚斑ヲ消シ或ハ焮腫眼ノ涙多キ症ヲ治シ或ハ
脫肛子宮及ビ腔ノ下墜ニ良驗アリ。○咽喉焮腫ノ
初發ニ明礬ヲ漱藥ニ加ヘ施メ消散ス。患者虛弱ニ
ノ焮衝刺盛ナラザル症ニ尤良或ハ左ノ漱劑亦殊
効アリ。

瑰礬舍利別

玫瑰花

明礬 各一錢

桑椹舍利別製法覆盆舍利別
ト同シ

一弓

右玫瑰花ト明礬ニ水八弓ヲ加ヘ煮テ濾過シ滓ヲ去リ舍利別ヲ攪和シ含漱ス○明礬半錢ヨリ一錢マデ取テ沸湯六弓ニ溶シ漱藥トシ咽喉口中ノ焮腫及ビ潰瘍或ハ斷腫起出血及ビ腐蝕潰爛若ハ断水棉様ニメ出血シ或ハ懸壅垂腫脹シ或ハ失苟兒陪苦ボイクニ因テ斷頸腐爛スルヲ治ス○失苟兒陪苦シタクルボイクノ毒ニテ斷膚蝕スルニ左ノ方奇効アリ

龍礬水

龍腦 一弓
明礬 二弓
沙糖 四弓
燒酒 二北

右調匀シ浸ス二日。濾テ液ヲ取り含漱ス○纖維虛弱ニメ愈難キ潰瘍及ビ水棉様ノ腫瘍或ハ鞦帶ノ弛緩ノ發スル閃挫脱臼ハ左ノ明礬水ヲ以テ患部ヲ洗ヒ或ハ蒸漏シテ偉効アリ

明礬 極細末
一 北

沸湯

三九

右攬和シ熱灰上ニ置テ明礬盡ク溶化スルニ至リ放冷シ濾^{コレ}テ上清ヲ取り硝子壇ニ收メ固封シ貯フ○金創等外傷ノ出血或ハ衄血ニ右ノ明礬水ヲ外敷ノ卽効アリ○頸或ハ膝等ニ發スル水棉様ノ腺腫ハ右ノ明礬水ニ的列^{レジ}底^ナ那精少許ヲ加ヘ蒸竭ノ驗多シ○脱肛及ビ子宫。腔等ノ下墜突腫スルニ右ノ明礬水ヲ蒸湯藥^{ヘルクスリ}トシ殊効アリ○一切搔痒ヲ去リ腋臭ヲ消スルニ明礬ノ末ヲ患處ニ擦メ速効アリ又搖齒ヲ固^{クタ}メ目^ツ淨潔ニス

枯礬

ゲブランドアリュイン

蘭

明礬ハ多ク水氣ヲ含メリ。是ヲ陶壺ニ内^イレ煅^{ヤキ}テ水氣ヲ脱スレバ乾白輕虛トナリ其酸性鹽。凝聚メ酷厲トナリ收敛ノ性逾^モ峻ニメ侵蝕藥トナル。故ニ細末トシ外敷メ尤止血ノ効ヲ稱シ或ハ潰瘍ノ腐肉。贅肉。水棉様肉ヲ消シ或ハ便毒ヲ潰破シ斷ノ息肉ヲ消シ或ハ腐穢潰爛ノ創瘍ヲ淨刷シ。又甚ダ乾燥スル効アリテ汚液多キ潰瘍ヲ乾愈シ。口中咽喉ノ粘液腫ヲ消ス○此末ニ沙糖六倍^{或云}等分和シ眼ノ星斑翳膜ニ點メ消散ス○腋臭及ビ總テ惡臭アル部

ニ此末ヲ擦リ或ハ是ヲ布序ニ掺ケ數換アカ貼メヨク

消散又依福揭伍

依布
福叔
褐叔
而

伍

多飮酒。每食後，以鹽水漱口，則無口瘡。人有口瘡者，宜
贊肉水漱。贊肉，貞心丸外藥也。蜀人謂之燒餅。燒餅
末，以水和作丸，五粒入一枚，候半日，食之，其瘡自
愈。有大瘡者，用炒熟的鮮參頭，以火燙過，取其頭，切碎
研末，用炒熟的白芷頭，研末，同其頭，共研，以水
調，以香茶水漱口，日早晚各一次，可愈。

