

遠西醫方名物考

世

卷三十

✕

e 15

499.2
En-3
30

No. 1455
12 e 15

藥 26



遠西醫方名物考標目

卷三十

石灰

石灰水

石鹼

尋常石鹼

白石鹼

石鹼膏

石鹼軟膏

舍利別

製法

石鹼解凝丸
鹼硫丸



富士川文庫

3297

遠西名物考 卷三十 標目

風雲堂藏

石長生。舍利別

接骨木傑列乙

接骨木昆設爾弗

接骨木水

旃那葉

旃那丁幾去爾

旃那越幾斯劑

旃那舍利別

舍謨字黠謨

舍謨字黠謨舍利別

旃那涼解飲
孕驗旃那飲

遠西醫方名物考卷三十

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石灰 カルキス 羅 カルク 蘭

是ハ石灰礦ヲ燒テ製ス。石灰礦ハ燒テ灰トナル

種ノ石ニシテ或ハ堅剛ノ者アリ或ハ土塊ノ如キ

リ或ハ破碎スレバ針眼アリ或ハ蠟鹵ニシテ光澤

ル碎片ヲ間錯シ或ハ貝類。蝸牛殼。石梅等ヲ化石

夾ム者アリ。○石灰礦ヲ燒テ石灰ト爲シ末々水

濕サズ。大氣ニ觸レズ。碎粉トナラザル者ヲ生石

灰ト曰フ。是多ク火氣ヲ含ム。盡ク酸性ヲ脱メ純粹ナル亞兒加利性ノ石灰土トナル故ニ其礦石ノ秤量ニ比スレバ半ヲ減シ。又亞兒加利性ノ酷厲鹽ヲ含ム故ニ氣味極テ慄悍猛烈ニシテ侵蝕スルヲ焚カ如シ。是ヲ酸味ノ液ニ加レテ毫モ沸騰セズ。是盡ク脱除メ純粹ノ亞兒加利性トナル故ニ然レ是ニ水沸滓セズ沸滓ハ炭酸ヲ含ムニ因ル。夫注ゲバ忽チ焚焯メ碎粉トナリ。或ハ大氣ニ觸テ濕氣ヲ受レバ亦碎粉トナリ。其性水ヲ沾ス者ト同シ。故ニ生石灰ハ硝子壘ニ入密封シ貯ヘシ兒加利土ト交カ強力強キ故ニ水ヲ注クハ此ニ物緊合ノ生石灰ニ含所ノ火氣并水中ノ溫素共配偶ヲ喪ヒ

游逸熱ヲ生シ。或焰ヲ發ス。○其既ニ水ヲ注テ碎粉トナル者ハ即尋常ノ石灰ナリ。是性緩和ナルヲ以テ酸味ノ液ニ加レバ沸騰ス。又石灰水出ツト爲セバ内服外用ノ侵蝕セズ。○蠣殻ヲ沸湯ニテヨク洗ヒ粘穢ヲ去リ燒テ灰ト爲セバ其性生石灰ト同シ。其燒テ冷定セシ時少許ヲ取り醋ニ摻ケ少モ沸騰セザルハ即生石灰ト同様ナル。微トス或ハ尋常ノ石灰ヲ燒テ通紅ト爲シ冷定メ少許ヲ取り醋ニ投メ少モ沸騰セザルハ亦其性生石灰ト同シ。是酸性脱メ純粹ノ亞兒加利鹽トナル候トス。此モ亦濕氣ニ觸レバ復尋

常ノ石灰トナル故ニ硝子壘ニ收メ固封シ貯ベシ
 ○總テ亞兒加利鹽ヲ以テ製スル藥品ニ生石灰ヲ
 加レバ其氣極テ銳烈トナリ。若ハ腐蝕ノ品トナル。
 假令バ急製硃砂精。硃砂加石灰精。釐乙典埵羅偈ノ
 如シ。是レ生石灰ヲ以テ其質ニ含メル酸性ヲ奪除ス
 レバナリ。蠟殼卵殼。蝟蛄石等皆石灰性土ヲ含メリ
 [主治] 生石灰ハ多ク製劑ニ用フ。又外敷ノ腐藥トシ
 腐蝕乾燥シ。疣贅息肉ヲ消ス。往古ハ惡厲ノ潰瘍ヲ
 淨刷スルニ用フ。○生石灰ニ蜜ヲ煉和シ傷冷毒痛
 腕股痛ニ貼メ多ク驗アリ。○面部ノ斑ヲ消スルニ

生石灰ト勿擗祭亞石鹼。各等分。細末トシ。研和膏
 藥トシ。先蓋膏ヲ攤テ斑大ノ孔ヲ截開キ貼メ斑ヲ
 露シ。是ニ其石灰膏ヲ貼シ縛帶ヲ施シ大抵六時ヲ
 經テ腐蝕シ痂ヲ結ブ。是ニ於テ其膏ヲ去。按實粟膏
 ヲ貼メ膿潰セシメ愈スベシ。其斑大ナル者若ハ龍
 起セル者ハ右ノ膏ヲ數貼メ漸次ニ侵蝕シ除ベシ
 [石灰水] ア多カルキス。羅カルクウト。蘭
 [製法] 生石灰 一斗
 水 十五斗
 右。石灰ヲ陶器ニ内レ。水少許宛加テ手ヲ住メ攪

遠西各物考 卷三十 一風雲堂藏

七。終ニ靜定スル_レ六時。其間。時々振蕩シ。並沈ム_レ候_ニ上清ヲ取り硝子壘ニ内_レ。固封シ貯_フ。石灰水一_斗中ニ精微ノ石灰四分_斗ヲ含メリ

主治 性收瀟ス。内服メ酸敗液ヲ消スル良藥トス。○下利荏苒トメ治セズ。胃腸ノ汚物ヲ疏滌メ後對症藥劑ヲ處スレ_レ。効驗ナキ症ニ多ク驗アリ。○乳汁ヲ加甘和シ服メ刺戟セズ衰弱ヲ強壯ニシ内傷ヲ治ス。又下利赤痢淋疾及結石腎痛ニ甚_ク驗アリ。石灰水二十_斗許ニ乳汁ヲ適宜ニ加_テ毎日朝夕兩次ニ服ス。但乳汁及石灰水モ冷飲シ若_クハ微温ニメ服ス

ベシ。煮テ熱セシム_ル勿_レ。○腎膀胱ノ結石ヲ溶解シ其疼ヲ消ス。但結石ヲ溶解スルニハ蠣殻灰水尤_モ効アリ。結石ノ尖稜ヲ溶消メ刺戟セザ_ラシム。日一二_斗宛内服ス。但_シニ堪_タザル者ハ乳汁十分一_斗加_ヘシ。○經久淹滯ノ酷厲毒アル病。瘰癧毒ノ諸症。及_テ癌瘡ニ良驗アリ。是_レ酸酷澁敗ノ汚液ヲ消スルニ因_ル。凡_レ腺腫瘰癧ハ弛弱ノ腺ニ酸敗ノ粘液凝聚ス_ル故ニ石灰水ヲ用_テ強壯ニシ粘液ヲ溶解シ酸敗毒ヲ消メ良効アリ。○服量。四_斗宛用_テ日ニ數次_ニ但_シ是_レヲ製メ速ニ硝子壘ニ固封シ貯_ヘ。若_クハ臨時ニ製

スベシ。氣ニ觸レバ精微ノ藥氣消散メ効驗ナシ。○
 外敷メ侵蝕セズ。稍收瀝シ乾燥メ纖維ヲ強壯ニシ
 粘稠液ヲ稀釋シ。酸敗毒ヲ消シ。腐壞メ遏メ。敗膿ヲ
 淨掃ス。○凡、潰瘍癰瘡等メ纖維弛緩虛衰メ愈難キ
 症ニ外敷スレバ筋肉充張メ勢力ヲ生シ膿ヲ排テ
 乾愈ス故ニ乾カシ愈メ害アル症ハ是ヲ禁ス。○頑固
 惡厲メ潰瘍。失苟兒陪苦及癩瘰メ潰瘍。腐骨疽。壞疽
 等ニ蒸扇劑トシ施メ甚驗アリ。○濕ヲ乾カス効ヲ以
 テ總テ腐爛メ潰瘍及水様腫ヲ治ス。○癰瘡ニ注入
 メ敗膿壞液ヲ淨刷シ新肉ヲ生ス。○稀膿ヲ稠厚ニ

スル効アリ。故ニ潰瘍。腐骨疽等ノ稀涼ノ壞液多ク
 滲漏スル症ニ施メ良膿ヲ生セシム又粘稠ヲ稀釋
 スル効アリ故ニ粘稠液ヨリ發スル腫瘍ヲ消散ス
 ○燒酒少許ヲ加。若ハ綠礬油一二滴加寒壞疽ニ外
 敷メ腐壞メ遏ム。○石灰水四等ニ羯布羅精一等ヲ
 研和シ蒸濕劑トシヨク焮腫ヲ解散ス。○創ヲ愈シ
 及火傷ヲ治スルニ蒸濕劑トシ甚驗アリ。但火傷ハ
 温テ施スベシ。ヨク其焮痛ヲ消散ス。○石灰水ニ阿利
 襪油。若ハ亞麻油ヲ適宜ニ和シ。硝子壘ニ内テヨク
 振蕩スレバ拔爾撒謨ノ如キ稠厚ノ液トナル。是ヲ

遠西名物考 卷三十

風雲堂藏

布片ニ蘸シ數外敷ノ火傷及^ヒ炊腫ヲ消散シ。又汚液
多ク滲漏スル潰瘍ニ捷効アリ○石灰水ヲ黃銅ノ
器ニ内^レ置^ケバ銅氣出テ美碧色トナル。是ヲ取テ潰瘍
及^ヒ小瘡。疥癬。若^クハ眼赤痒等ニ塗^リ或ハ硃砂少許ヲ加
眼眇及^ヒ淚多^キ症。翳膜。痘眼等ニ點^メ良驗アリ○石灰
水一斗^ニ升^一杓^一月若^クハ二十五^ニ氏^一ヲ研和スレバ黃色
トナル。是ヲ亞^ア拈^ク扒^ハ瓦^ガ埴^デ尼^ニ加^カト名^ク水銀^ノ條^ニ出^テ外敷^メ
潰瘍膿腫ノ穿蝕腐爛臭穢ノ症ヲ淨刷シ。膿ヲ排^テ
良肉ヲ生シ乾愈ス。但^シ其毒多^ク鬱蓄セル症ニ是ヲ過
用スレバ其毒ヲノ内攻セシム○膀胱尿道ノ潰瘍

及^ヒ遺精淋疾ニ水銃ヲ以テ是ヲ尿道ニ注輸シ洗藥
トシ排膿強壯ノ良効ヲ奏ス○微毒淋ニ是ヲ以テ
陰頭及^ヒ包皮ヲ洗淨ノ預^メ下疳ヲ防^グニ尤^モ良○吉利詞^ス
爹兒トシ直腸ニ注輸メ蟻蟲ニ奇効アリ

| | |
|---|---|
| 馮 | 福 |
| 依 | 而 |

石鹼 ^{「サポ} ^{「セ」} ^{「フ} ^{「蘭}

石鹼ハ亞兒加利鹽ト油ト合^テ煮^テ製ス。其鹽ハヨク
油ヲ翕收シ油ハ其酷厲ナル亞兒加利鹽ヲ甘和シ
相抱合メ速ニ粘結凝固シ石鹼トナルナリ○其亞
兒加利鹽ハ鹹蓬鹽。剥篤亞斯。酒石鹽。等ヲ擇取^リ生石

灰ヲ加テ水ニ溶シ灰汁ト爲者ナリ○其油ハ阿利
 襪油。榛子油。胡桃油。亞麻油。大麻油。薑薑油。罌粟子油
 等ノ火氣ヲ假ラスノ搾取者ヲ擇ニ用、臭氣アリテ
 下品ナル石鹼ハ鯨油或ハ獸類ノ脂膏ヲ用テ製ス
 ○亞兒加利鹽ニ乾性ノ土質ヲ加バ其鹽中ノ酸性
 ヲ剋制メ極テ銳烈性トナル。故ニ必是ニ石灰ヲ加
 ルナリ亞兒加利鹽。銳烈ナレハ油ト合和スルト甚
 密ニ速ニ凝固ス。鹽氣劣弱ナレバ油ト合和スレ
 疋凝固セズ。故ニ此鹽ノ強弱ハ石鹼ヲ製スル一大
 要鍵ニ特ニ注意スベキ所ナリ○多ク酸收ヲ含

ル油ハ灰汁ト和スレ疋凝固シ難シ。斯ノ如キ油ハ
 慢火ニ上水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ用ベシ○此物
 ハ各國製法ヲ異ニシ。鹽油ノ性。分量配合ノ多少同
 カラザル故ニ其品亦一様ナラズ○尋常ノ灰白色
 及帶黑色ノ石鹼ハ味苛烈ニメ舌ヲ刺戟ス。故ニ内
 服ノ害アリ但シ外敷藥トシ或ハ布帛ヲ晒メ潔白ニ
 シ或ハ衣服ヲ浣洗メ脂垢汚點等ヲ除キ或ハ毛類
 ノ粘脂ヲ去リ羅紗毛布類ヲ淨刷スルニ必用トス
 皆石鹼水ス者トシ用フ。尋常ノ灰汁ニ比スレバ
 悍烈ナラズメ布帛ノ質ヲ損セズヨク汚垢ヲ去ル

尋常石鹼製法是ヲ製スルニハ先ヅ固性亞兒加利
 鹽ヲ製スベシ。其法生石灰一斗ヲ鐵壺ニ内レ精製
 人鹼蓬鹽一斗ヲ加コレヲ以テ其上ニ被ヒ固封シ
 置テ石灰盡ク碎粉トナルニ至リ是ニ水一貫六百
 錢ヲ加攪セ煮ル一_ト時。綴布ニテ數漚テ澄清ノ液
 ト爲シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾固ノ鹽ト爲シ是
 人坩鍋ニ内レ武火ニ上セ坩通紅トナリ烟氣ナキ
 ニ至レバ其鹽烱解ス。是ヲ温タル鐵版ニ寫シ。未ダ
 全ク凝固セザル片ニ截テ小片ト爲シ温乾シタル
 硝子壘ニ收メ端ニテ其口ヲ塗封シ貯フ。此鹽外敷
 腐藥ト

シ腐肉肝胝樣肉贅疣等ヲ侵蝕スル極テ捷ニ
 其効刺必斯加烏斯蟄屈斯ト同シ。又硫氣アル金石
 類ヲ侵蝕消化ス。右ノ亞兒加利鹽ヲ取リ。少許宛
 温湯ニ溶シ是ニ雞卵ヲ投メ其汁ヲ
 適宜ニ分チ取テ水ヲ加ヘ雞卵ヲ投メ沈ムニ至リ
 是ニ油ヲ等分ニ攪和シ慢火ニ煮テ漸ク凝結スル
 至テ餘殘ノ灰汁_{卵ヲ投メ}油ノ三倍量ヲ取テコ
 レニ加ヘ手ヲ住メ攪セ煮テ凝固セシメ。試ニ少
 許ヲ取テ_{放冷スル}溶解セズ。水ニ溶_{トカ}メ油氣ヲ見
 ハス下ナキニ至レバヨク煮熟スル候トス。是ニ於
 テ火ヲ下シ稍冷定メ適意ノ錠ト爲シ風乾ス。若シ

遠西名物考 卷三十一 一編 雲 鹽 藏

水ニ溶ノ油ヲ見ハス片ハ右ノ灰汁ヲ取テ少許宛
 加ヘ煮テ油氣ヲキニ至ルベシ。或ハ其石鹼ノ味酷
 烈ニ舌ヲ侵刺スル片ハ油ヲ加ヘ煮テ甘和スベ
 シ○此劑ヲ煮テ凝固シ難キハ其灰汁弱キ候トス
 故ニ少許宛灰汁ヲ加ヘ煮テ凝固スルニ至ルベシ
 ○凡ソ上好ノ石鹼ハ亞兒加利鹽。純粹ニメ油良性
 ナルヲ用ルナリ○上品ハ乾固淨潔ニメ黄色ヲ帶
 ニ。澁敗セズ。粉樣ナラズ柔軟ナラズ又印記アリ勿
 搦祭亞石鹼及ビ白石鹼製法次ハ最上品トス。氣味
 香美ニメ甘脂ノ如シ。他ノ石鹼ニ比スレバ性緩和

ニメ專ラ内服藥ニ用フ

○按ニ依福云。勿搦祭亞石鹼及ビ技ノ白石鹼ハ

鹹蓬鹽。生石灰。阿利襪油ヲ以テ製シ特ニ内服藥

ニ用フト。然バ其二品ノ性功同様ナル故ニ次ニ

舉ル白石鹼ト勿搦祭亞石鹼ト互ニ相代用スベ

シ○榕按ニ勿搦祭亞石鹼。舶來アリ。方形。長三寸

許。濶二寸餘。面ニ二寸許ノ印記アリ。微透亮。鮮黃

淨潔ニメ蠟ノ如シ。又一種。龍動龍動。都府龍動。製ノ白

石鹼アリ。形方長ニメ長二寸餘。濶一寸二分。秤

量十四錢許。面ニ一雙ノ立獅。其國ノ識號ヲ圍ム

圖アリ。其下ニ西文四行ヲ印記ス。共ニ陰識ナリ
 白色微黄。每個紙ニ罫ニ紅條ニテ結束ス。右ノ二
 品共ニ佳香アリ。削レハ屑片雪白色。味毫モ舌ヲ
 刺戟セス。芳美ニメ乾酪ヲ嚼ガ如シ。○本邦古來
 未ダ石鹼ヲ製セズ。予近時次ニ舉ル^{ナカ}拔^ソノ製法ニ
 倣ヒ上好ノ石鹼ヲ創製^ソノ居常内服劑ニ供ス。勿
 擲祭亞石鹼ト異ナル^トナシ。但製煉家宜ク阿利
 襪油等ノ清稀ニメ良性ナル油ヲ以テ製スベシ
 否^ラザレバ性味苛烈ニメ内服藥ニ用難シ。○又按
 本邦藥舖ニ尋常舶來ノ石鹼二品アリ。角樣

ト稱スル者ハ方形五六寸許。白色光澤アリ。丸樣
 出ト呼ブ者ハ灰白色ニメ光澤ナシ。角樣ニ比スレ
 バ下品トス。但ニ品共ニ味發クノ舌ヲ侵刺シ鹽
 氣多ク。白色ノ沙土ヲ雜ヘ久ク貯レバ鹽芒ヲ生
 ス。故ニ内服藥ニ用ヒズ。
 白石鹼 ^{サボメダカ} ^{左ス} ^羅 ^{ウイツテ} ^セ
^ア ^又 ^{ウツ} ^テ ^ス ^{パン} ^セ ^セ ^イ ^ブ ^蘭
 製法 生石灰 各四北
 右鹼蓬鹽晶ト生石灰ヲ攪セ水ヲ加ヘ煮テ布片ヲ

以テ瀝テ渣ヲ去リ。硝子壘ニ内レ固封シ静定ノ渣
 ヲ去リ此灰汁ヲ慢火ニ止セテ水氣ヲ減熬シ。試ニ此
 液ヲ分チ取り水六寸ヲ容ル量器ニ盛テ重サ八寸
 トナルヲ度シ。灰汁ノ量水ニ比ス。火ヲ下シ冷定メ
 磁鍋ニ内レ冷處ニ於テ左ノ油ヲ加フ
 阿利襪油 新鮮上好者 灰汁ノ一倍
 右木棍ニテ手ヲ住メズ攪セテ混和セシメ。漸ク凝
 結スルヲ候ヒ。扁キ木型ニ寫シ。凝固スルニ至テ取
 出シ。適宜ノ截片トシ冷處ニ貯フ。用時ニ出スル
 主治 性温。是油質ト亞兒加利鹽ト抱合融和シ成ル

ト雖モ多ク亞兒加利鹽ノ効用ヲ爲ス。但シ油質ヲ以
 テ其鹽ノ酷厲質生石灰ヲ以テ蘇蓬鹽ノ亞兒加利
 包攝メ其刺戟ノ性ヲ抑制スル故ニ是ヲ内服ノ侵
 蝕セズ。且、體中ノ油膩脂膏ト交和シ。亞兒加利鹽ヲ
 啓導メ其効力ヲ逞發セシメ。諸器脉管ニ牢著セル
 膠粘凝汚ヲ溶釋メ淨掃ス故ニ一切粘稠凝結ノ病
 毒ヲ疏解シ。堅硬ヲ軟化スル要藥トス。○酸敗液乳
 糜。乳汁等。胃中ニ凝滯メ發スル諸症ニ用レバ其亞
 兒加利鹽ヲ以テ酸敗毒ヲ消シ。膠粘ノ汚物ヲ溶解
 メ滌除ス。殊ニ薄弱ノ小兒ハ乳汁。胃中ニ停滯ノ酸

敗シ其毒胃腸ヲ侵刺ノ腹痛吐乳播擗等ヲ發ス此
 症ハ石鹼十五氏若ハ二十氏ヲ適宜ノ飲液ニ溶シ
 毎日用テ殊効アリ○凡ソ小兒ノ腹痛痞脹便秘等
 多クハ酸敗液ヨリ發スル故ニ此藥良効アリ茴香
 水其他芳香ノ露水ニ溶シ用テ尤良○酸敗液腸中
 ニ鬱積ノ發スル諸症ハ石鹼ヲ吉利詞參兒トシ施
 ノ良○此藥ハ肺肝脾腸間膜等ノ内部諸器及ヒ諸
 腺ノ頑固ナル壅塞凝結硬腫ヲ疏解シ治スル要藥
 トス大黃若ハ越謨安沒尼亞幾沒藥瓦爾拔奴謨等
 ノ解凝藥及ヒ苦味ノ越幾斯劑健實亞那瑪萬里亞爾鮮葛爾備等ノ越

幾斯劑ヲ加テ殊ニ良○石鹼ニ越謨安沒尼亞幾海
 葱ヲ加頑固ノ諸病ニ用テ治驗多シ即チ短氣喘息
 經久愈ス或ハ荏苒タル黃疸或ハ胸腹諸器壅塞硬
 結シ膠粘液凝固ノ諸脉管ニ壅塞シ神經液ノ融活
 順運ヲ阻遏スルヨリ發スル諸病ニ奇効アリ又驅
 水ノ偉効アルヲ以テ肝脾等壅塞ノ依剝昆垺兒ノ
 症アル水腫ニ尤驗アリ依剝昆垺兒ハ上腹ノ兩側
 即重訂內科撰要此藥品皆纖維諸管ニ鑽透シ膠粘
 第六十九章ニ出此藥品皆纖維諸管ニ鑽透シ膠粘
 液ヲ稀釋シ汚滯ヲ淨掃スルノ峻効アレバナリ即
 左ノ方尤良

越謨解凝丸

白石鹼

三錢

越謨安沒尼亞幾末

二錢

海葱末

一錢

舍利別

適宜

右研和ノ丸藥トシ十二日ヨリ一月マデ一服トシ

朝夕一服宛用フ○座學ノ運動ヨリ胃痛ヲ發シ一

處ニ頑滯ノ轉移セザル症ハ左ノ劑奇効アリ

石鹼解凝丸

石鹼 四錢

失鳩答越幾斯劑 二錢

越扶屋布斯安質沒扭 一錢

瓦爾拔奴謨 水銀ノ條ニ出

牛膽 各半錢

右三氏ヲ一丸トシ四丸宛用ル一日ニ四次○萎黃

病様ノ諸症ニ石鹼半錢若ハ一錢宛毎日一兩上用

テ良驗アリ其失性ノ粘稠液ヲ溶解ノ小便ニ利ス

○痛風傷冷毒ノ劇痛スル症ニ毎日三錢マデ用テ

大効アリ其痛極テ劇キ者ハ雙鸞菊越幾斯劑ト阿

芙蓉ヲ加用ヒ或ハ水銀劑其他解凝劑ヲ加へ用テ

峻効アリ。假令ハ左ノ方ノ如シ。稍延滞ニ成ルハ用マ

大鹼硫丸。其煎法。水八雙。煎取汁。每日三服。用マ

○煎石鹼。水八雙。煎取汁。每日三服。用マ

テ身。的列。並底那。卦。ハ。排。離。來。マ。家。精。ハ。少。野。ハ。味。ハ

越。扶。屋。布。斯。密。涅。刺。列。ハ。各。三。錢。水。銀。ノ。條。ニ。出。所。以。用

金。硫。黃。ハ。二。月。四。次。取。用。ハ。十。日。ハ。四。次。取。用。ハ。四。日。取。用。ハ

右。三。氏。ヲ。一。丸。ト。シ。朝。夕。十。丸。宛。用。フ。或。ハ。石。鹼。越。謨

安。沒。尼。亞。幾。孕。鹼。酒。石。ヲ。丸。藥。ト。シ。用。ル。モ。良。患。者。粘

稠。液。多。ク。若。ハ。胃。腸。ニ。酸。敗。液。アル。症。ハ。右。ノ。諸。劑。殊

ニ。驗。アリ。○。傷。冷。毒。及。ビ。痛。風。ノ。熱。解。散。ノ。其。痛。減。セ

ス。遊。走。ス。ル。症。ハ。石。鹼。ヲ。丸。藥。ト。シ。每。朝。日。中。夜。分。ニ

半。錢。若。ハ。一。錢。宛。薩。撒。弗。刺。斯。白。檀。甘。草。ノ。泡。劑。ニ。テ

送。下。ノ。殊。効。アリ。○。膽。管。ニ。結。石。生。メ。梗。塞。シ。膽。液。逆

流。ノ。血。中。ニ。泛。濫。シ。黃。疸。ヲ。發。ス。ル。者。甚。ク。多。シ。其。候。

腹。ノ。右。邊。疼。痛。ス。ル。等。ナリ。此。症。ハ。石。鹼。ニ。大。黃。ヲ。加

テ。服。量。多。ク。用。ヒ。温。湯。若。ハ。乳。汁。ニ。テ。頻。ニ。患。部。ヲ。蒸

漏。ス。ベ。シ。其。結。石。溶。解。メ。自。ラ。大。便。ニ。通。利。シ。回。復。ス

○。血。液。淤。衝。甚。ク。若。ハ。神。經。ノ。感。觸。甚。ク。纖。維。諸。管。強

硬。乾。燥。メ。壅。塞。ス。ル。日。ハ。黃。疸。ヲ。發。ス。ル。者。亦。少。カ。ラ

ス。粘。液。壅。塞。ノ。症。此。症。ハ。石。鹼。ノ。如。キ。熱。性。衝。動。ノ。藥

ハ害アリ。宜ク答未林度。酒石英。蘆根。等ノ清涼解凝
 藥ヲ的當トス。○小便ノ質ニ酸敗毒アリ。日川腎
 痛。結石ヲ生シ。若ハ小便ニ沙石ヲ通泄。淋痛スル
 症ハ石鹼三錢。宛毎日用テ結石ヲ溶解シ治ス。○石
 鹼ハ酷厲毒ヲ解ス。殊ニ升汞。礬石等ノ毒ヲ解スル
 効アリ。○凡ソ壯熱。喉衝ノ諸病。及ビ諸失血ヲ患ル
 者ニ是ヲ用レハ其病勢ヲ增長ス。又是ヲ久服スレ
 ハ飲食消化ノ機力ヲ害ス。○往古ハ以爲ク此藥ノ
 解凝ノ効諸藥ニ超過シ。諸壅塞頑固ノ病ニ久服セ
 シメテ内部ニ膠著セル粘液汚物ヲ溶解スルヲ死

モ皮上ノ粘膩脂垢ヲ淨刷スルガ如シト然レ是附
 會ノ臆説トス。此藥ハ唯其亞兒加利鹽ヲ以テ纖維
 諸管ヲ衝動メ其運營ヲ増發シ是ニ凝滯牢著セル
 粘液ヲ推盪運輸シ驅除スルニ因ル。○尋常ノ石鹼
 ハ勿搦祭亞石鹼及ビ白石鹼ニ比スレバ更ニ酷烈
 ナル故ニ多ク琶布及ビ蒸濕劑等ノ外敷藥トス。大
 抵琶布若ハ藥草三弓ニ石鹼四錢或ハ一弓許ヲ加
 施スベシ。○外敷ノ解凝消散ノ峻藥トス。粘稠液ヲ
 解キ酸敗液ヲ消シ堅硬ヲ軟化ス。○燒酒ニ溶シ琶
 布トシ貼ノ傷冷毒痛。臍股痛。脚痛。硬結塊腫等ヲ消

散スルニ殊効アリ○失鳩答ヲ加ヘ乳房結核。關節
 塊腫。脚痛ニ貼ノ良驗ヲ稱ス○乳汁ニ溶シ蒸濕劑
 トシ堅硬腫。癰癰腺腫ニ施ノ消散ス○温乳汁若ハ
 迷迭香精ニ溶シ或ハ乳汁ヲ加テ琶布トシ若ハ膏
 藥ノ如クシ諸瘡瘍ニ貼ノ弛緩軟化シ腐穢潰爛ノ
 膿瘍。疥癬等ニ貼ノ膿ノ排泄ヲ扶ケ淨刷ス○乳汁。
 粘液類。油類ニ溶シ施セバ緩和ノ効ヲ爲シ又其劑
 ヲ酸敗セザラシム○的列竝底那油。燒酒ヲ適宜
 ニ加ヘ。寒腫及ビ汚液滲漏ノ止ザル瘡瘍ニ施ノ疏
 散シ治ス○小兒ノ大便閉ニ坐藥トシ施ノヨク通

石鹼膏

「エムブラスト。ガボ子ス羅
 セフ。フレイス。テル蘭

製法

密陀僧 三北

六手

右文火上セ煇解煉和火ヲ下シ稍冷ル候

ヒ龍腦四錢ニ阿利襪油少許ヲ研和本劑ニ煉和

之硬膏ト爲ス

又法 若把兒麻膏

白石鹼

細末

龍腦 六錢

右若把兒麻膏ヲ文火ニ上テ煇シ。石鹼ヲ下シ。水少

許ヲ加ヘ煉熬ノ硬膏ト爲シ。火ヲ下シ冷ルヲ候ヒ

龍腦ニ油少許ヲ研合シ。本劑ニ加テ煉和ス。

主治 外敷ノ解凝消散ノ良藥トス。疼痛ヲ止メ。酸敗

毒ヲ消シ。膜瘤。乳房結核或ハ頑硬腺腫。靱帶硬腫。或

ハ肢節拘直。攣急或ハ關節強痛屈伸シ難ク或ハ痛

風。遊走痛ヲ消散ス。

石鹼軟膏 羅歐底斯福 布技叔過

製法 石鹼 三馬

龍腦 一錢

迷迭香精 十二馬

右研和シ軟膏トス。

主治 外敷ノ傷冷毒痛。一切肢節痛。痲不遂。凍瘡等ヲ

治ス。

又法 石鹼 一北

的列並底那油 二北

剥篤亞斯 三北

右研和ス

主治 溶解疏散ノ捷効アリ。肢節強直。硬強。牽痛。打撲

傷等ニ一多ヲ水ニ溶シ一時毎ニ患部ニ擦テ捷効アリ

舍利別

セイロップス羅「ロ」ン
ホウヂヘシロップ「蘭」

製法

沙糖 淨白者 八比

沸湯 四比

右調和シ文火ニ上テ烱化シ。濃過ノ渣ヲ去リ。煮テ蜜ノ稠ト爲ス

主治 急迫ヲ甘メ。枯燥ヲ潤シ。粘痰ヲ豁ノ吐シ易カラシメ。欬嗽ヲ治ス。又諸藥ニ加テ甘美ニシ。服シ易

カラシム

石長生 舍利別

セイロップス。カピルス。ヘ子リス。羅
「ロ」ップ。ハン。フ。多。空。ン。ハ。イ。ル。蘭

製法

石長生 莖葉判者 一北

甘草 判者 二多

沙糖 四比

右石長生。甘草ニ適宜ノ沸湯ヲ加ヘ浸ス。一晝夜。濃テ滓ヲ去リ沙糖ヲ溶化シ。又濃テ液ヲ取り。煮テ

舍利別ノ稠ト爲ス

主治 胸中ヲ開利シ。壅急ヲ甘メ。粘痰ヲ稀豁ノ吐シ

易カラシメ。欬嗽。喘急。冒寒傷冷毒ノ諸症ヲ治シ。沸湯ニ攪和シ服メ汗ヲ發シ小便ヲ利ス 〔疾〕

接骨木

傑列乙イ草 コツブ。サム。ロツ。ス。キ。ス。バ。シ。ハ。シ。フ。レ。イ。バ。ン。フ。

製法

接骨木子ヲ適宜ニ取り搗爛シ。水少許ヲ加。

慢火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ徐々ニ煮ルヲ四分時

ニノ篩ニ内レ。温ニ乘ノ押シ絞リ濾シ。其汁十五弓

ニ淨白ノ沙糖三弓ヲ和シ。速ニ煮沸セシメテ浮沫

ヲ抄ヒ去リ。火ヲ下セバ即チ傑列乙イノ稠トナル。是

ヲ磁壺ニ收メ貯フ 〔接〕

〔主治〕輕キ發汗ノ良劑トス。凡ノ熱病。傷冷毒等ニ劇

キ發汗劑ヲ用レバ血液ノ運行ヲ衝動シ。壯熱。嗽衝

ヲ發スベキ症ニ此劑四錢ヨリ三弓マデ與レバ其

熱ヲ増發セズ。蒸氣及ビ汗ヲ發ノ必モ害ナシ。又肺

ノ攣急ヲ緩解シ。胸中人粘痰ヲ疏豁シ。大小便ヲ利

ス。○熱病。膽液瀦敗ノ諸症。疫熱。羅斯。痘瘡。麻疹。焮衝

病。胸脇痛。等ニ用テ血液ノ沸騰ヲ鎮メ。清涼緩和鎮

痛ノ良効アリ 〔疾〕

接骨木昆設爾弗 接骨木傑列乙イト同シ

接骨木水 製法 薄荷水ノ條ニ出ツ

主治蒸氣及汗ヲ發ス

旃那葉 センナ セイ子ブラデン 蘭

形状是一種ノ灌木ニ幹二三尺若ハ四尺許數枝

互生シ葉四對若ハ五六對細柄アリテ枝ニ排列ス

ル下甘草ノ葉人如シ厄日多亞弗利加ノ産ヲ最上

品トス是ヲセンナアレキサンテリナト稱ス

多ノ地名此品葉小クノ末漸ク尖リ長廿五六分

潤二分餘硬厚滑澤淡緑ニノ黄色ヲ帶ビ氣味佳ナ

ラス微苦辛粘滑ニノ胡盧巴子ヲ爵ガ如シ夏月枝

梢ニ五瓣ノ黄花攢生シ或云黄色ニノ赤ヲ帶花後

小莢ヲ結ブ形ヲ彎リテ新月ノ如ク扁ク汚點ア

リ核四個若ハ六個アリ葡萄核ノ如シ香氣ナク味

微苦宿根セズ一年若ハ一年半ニ枯ル多ク熱國

ニ産ス得里步利洲亞弗利加意太里亞福撈察歐共羅

巴洲ノ産ハ葉大ニ圓久未尖ラス綠色粗糙ニノ

脉理多ク莢小ク黯緑ニノ楮色ノ斑アリ是皆下品

ニノ瀉下ノ効微ナリ故ニ藥用トセズ或ハ他葉ヲ

雜テ偽ル者アリ亞刺比亞ノ默加地ノ産ヲ莫斯箇

未亞旃那ト名ク其葉厄日多産ノ上好ノ品ニ比ス

レバ殊ニ狭ク長クメ尖レリ。此亦藥用トセズ。○右ノ如ク葉形ニ隨テ上下品ヲ分ツ故ニ葉形。全夜破碎セザルヲ擇ムベシ。○榕按ニ地滅門草。略梅那ニ似タレ。其葉大ク柔薄ニノ味淡。不佳。氣ナク莢ヲ結バズメ角ヲ生シ。大小指ノ如ク直ニノ彎ラズ圓クメ扁ナラズ。核扁ニメ葡萄核ノ如クナラズ。其葉少モ瀉下ノ効ナシ。角ハ圓長ニメ裏ニ縱隔膜及臍帶アリ。莢ハ區長ニメ縱隔膜及臍帶ナシ。是其分別ナリ。

○梅那。和漢產未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用ベシ。主治性平。瀉下ノ良藥トス。効力大黃ノ如クニメ腹痛ヲ發セズ。且瀉下後便秘ノ患ナシ。○揮發鹽及ビ華爾斯質刺戟ノ瀉下シ。粘液酸敗液酷厲ナル洩シ等ノ鬱蓄スルヲ滌除シ。胃腸ヲ害セズ劇疾緩病ニ用テ妨ゲズ。○膽液熱紫斑熱ノ如キ連綿タル瀉下ヲ要スル病ニ尤良。○粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解スル効アル故ニ水腫停水及ビ膽液質ノ敗液ヲ瀉下シ。藥性酷厲ナラザル故ニ老人虛人孕婦ニ用テ害ナシ。小兒ハ此細末ヲ舍利別。若ハ砂糖ニ和シ與テ服シ易シ。○大便閉ノ諸症及留飲停水等ハ左ノ劑殊効アリヨク瀉下ノ清涼シ腹痛ヲ發スルヲナ

痛ヲ發セズ。且瀉下後便秘ノ患ナシ。○揮發鹽及ビ華爾斯質刺戟ノ瀉下シ。粘液酸敗液酷厲ナル洩シ等ノ鬱蓄スルヲ滌除シ。胃腸ヲ害セズ劇疾緩病ニ用テ妨ゲズ。○膽液熱紫斑熱ノ如キ連綿タル瀉下ヲ要スル病ニ尤良。○粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解スル効アル故ニ水腫停水及ビ膽液質ノ敗液ヲ瀉下シ。藥性酷厲ナラザル故ニ老人虛人孕婦ニ用テ害ナシ。小兒ハ此細末ヲ舍利別。若ハ砂糖ニ和シ與テ服シ易シ。○大便閉ノ諸症及留飲停水等ハ左ノ劑殊効アリヨク瀉下ノ清涼シ腹痛ヲ發スルヲナ

シ。故ニ大便閉ニ諸、焮衝。蓄留熱。咽喉焮腫痔痛等ヲ
兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク
兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

兼ルニ用テ亦的効アリ諸病ヲ留焮熱ヲ去テ全ク

右煮沸スルヲ候ヒ火ヲ下シ稍冷ルニ至リ滓ヲ去
リ三弓宛服ス○大便閉及瘧氣鬱滞ノ症ニ旃那丁
幾去爾良驗アリ或ハ是ヲ葡萄酒ニ加服又瘧瘵ノ

運動。寒粘液。酸敗液。等ヨリ發スル胃痛。疝痛ヲ治ス

旃那丁幾去爾

旃那葉 四弓

葛縷子 半錢

益智 十片

乾葡萄 四錢

燒酒 一北

右浸ノ藥氣ヲ出シ。漚テ滓ヲ去リ。分テ四服トス○

又右ノ旃那煎一北ニ旃那丁幾去爾二弓ヲ合和シ

用テ前說ノ諸症ニ甚ダ驗アリ○壯熱病。膽液熱。發

斑熱ハ答末林皮ヲ加良驗アリ。左ノ方モ亦良

旃那涼解飲

旃那 二錢半 拘櫟皮 生鮮ノ黄皮 四月

拘櫟汁 二錢 沸湯 七勺

右調和ノ微火ニ上セ藥氣ヲ出シ。瀝テ滓ヲ去リ。次ノ藥ヲ加フ

覆盆舍利別 一勺

右調和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ與フ。○旃那ニ中和鹽。石鹼質。驅風ノ藥ヲ加ヘ瀉下ノ効ヲ扶テ尤良。假令ハ左ノ方ノ如シ

孕鹼旃那飲

旃那葉 三錢 孕鹼酒石

胡荽子 各二錢

右水適宜ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ。瀝テ其液一匕ヲ

取リ次ノ藥ヲ加フ

薄荷舍利別 一勺半 甘消石精 四月

右攪和シ半時毎ニ二匙宛用テ瀉下スルヲ度トス

旃那ヲ服メ嘔氣ヲ發スル者ハ甘消石精ヲ用テ速

ニ治ス。○旃那ニ茴香。消石ヲ加ヘ泡劑トシ鼓脹ノ

便秘ニ殊効アリ。○神經ノ感動シ易キ人ハ大黃ヲ

用テ腹痛昏眩スルコトアレハ梅那ハ其患ナシ。但シ一
 頓ニ多ク服スレバ腹痛スルコトアリ。然レ水煎及泡
 劑トスレバ其揮發鹽及華爾斯質耗散スル故ニ其
 害ナシ。但シ香竄藥ヲ加ヘ用レバ殊ニ良○服量一錢
 ヨリ一錢半許。泡劑若ハ水煎トシ用フ。但シ一頓ニ多
 服スレバ嘔氣ヲ發ス○凡ソ熱性ノ病便秘ノ症ハ
 二三錢ヲ取り香竄驅風ノ藥ヲ加ヘ沸湯六多許ヲ
 以テ泡劑若ハ煎劑トシ用フ或云濃煎スレバ粘稠
 トナル故ニ泡劑トス
 ルヲ良○峻下ノ劑ヲ忌ム症ハ半錢若ハ一錢ヲ泡
 劑トシ用テ良或ハ酒石英一二錢。滿那一多若ハ大

黄ヲ加ルモ良○散劑ハ半錢ヨリ一錢許用フ○或
 云莢及ビ葉柄ヲ雜ヘ用レバ腹痛ヲ發スト。然レ是
 ヲ試ルニ否ラズ。効力葉ト同シ。故ニ是ヲ雜ヘ用ル
 モ害ナシ○梅那ノ華爾斯質ハ刺戟ノ性アル故ニ
 壯熱炊衝ノ諸症ニハ清凉藥ヲ加ヘ失血過多ノ症
 ハ緩和劑ヲ加テ尤良叔叔福
 物伍
梅那越幾斯劑 **製法** 蒲公英越幾斯劑ト同シ○此
 劑一錢ヲ服ノヨク瀉下ス。未ダテ用ルト同シ。丸藥
 トシ若ハ飲液ニ溶シ用ルニ尤簡便トス依

梅那舍利別

旃那葉

ハク

沙糖

淨白者
三北

沸湯

四北

煎及泡

右旃那ヲ沸湯ニ浸ステ一時絞リ瀝シ其液ヲ靜定

メ澄ヲ去リ沙糖ヲ加ヘ文火ニ煮テ舍利別メ稠ト

爲ス〔後〕此劑甘美ニメ服シ易クヨク大便ヲ通利

ス感動甚キ症及ビ小兒ニ用テ良〔疾〕失血過多

舍謨亭セイムペイテイ黠謨ハチ羅ハ

コソソリダマヨル
ワルワルトル蘭

形状 此草莖二三尺許太サ指ノ如ク毛茸アリテ粗
糙中虛線稜アリ數枝ヲ分ツ葉ハ根ヨリ生シ又莖

枝ニ著テ互生シ葉柄ナシ長潤ニメ末尖リ黯綠色

土木香葉ニ似テ皺及ビ毛茸アリ手ニ觸レバ刺ガ

如クニメ柔ナリ邊平等ナラズ夏月莖枝ハ梢ニ數

花簇生メ穂ヲ爲シ懸垂ス筒様ニメ鐸ノ如シ單瓣

ニメ五刻缺アリ或云本未窄クノ中差潤シ或云未

ハ莖枝梢ノ偏面開ノ時ハ形チ蝎尾ノ如シ或云花

ニ著テ懸垂ス黯赤或ハ白色或ハ紫赤青等ノ變

色アリ或ハ稀ニ黃色アリ五鬚蕊アリテ短ク末尖

テ白シ一心蕊萼底ヨリ生シ其色花ト同シ花謝メ

心蕊萼底ニ殘リ其本ニ黯灰色滑澤ナル四ノ小子
生ス萼筒様粗糙深ク缺裂シ尖テ刺ノ如シ根外面

黑裏肉白色。太廿指人如夕長久大枝極分。膠樣
 粘汁多シ。香氣ナク味淡シ。粘著ス或云根白色
粘汁稠厚トナ一種。莖短ク葉小ク花黄色ニメ
 根塊節様ノ者アリ。○此草叢林陰地。水邊濕土ニ自
 ラ繁茂シ。礪確瘠地ト雖モヨク長ス。或ハ春月種ヲ
 下シ或ハ根ヲ分チ培植ス中陰ハ吹シ根云未
 ○按ニ依福云。此草粘汁多ク殊ニ根ニ多シ。邊爾
 託亞根ノ粘汁ノ如クニメ微收瀦ス。性功大抵邊
 爾託亞及ヒ葵根ノ如シト。代用メ可ナリ。○榕按
 ニ鰕夷ニ産スル「エライバブ」ト名ル草殆ト是

近シ又按ニ此草略地黄ニ似テ異ナリ。地黄ノ

生根。黄色ニメ少モ膠粘ノ汁ナシ。其他充當セザ
 ルト右ノ譯說ニ就テ知ルベシ

主治 根ヲ用フ。性涼。滋潤。緩和。收瀦ス。○粘稠ノ質ヲ

以テ稀涼ノ血液ヲ稠厚ニシ。酷厲液ヲ甘和シ。枯燥
 ヲ滋潤シ。急迫ヲ寛解ス。○血液ノ酷厲ナルヨリ發
 スル諸失血。殊ニ吐血ニ良効ヲ奏ス。○下利。赤痢。痔

血。崩漏。尿血。膀胱潰瘍。血淋。痔痛。脫肛。或ハ痛風。關節

痛ヲ治ス。血液ニ酷厲毒アレハ侵刺ノ疼痛ヲ發シ

各部ニ壅滯或ハ細血絡ヲ穿蝕ノ諸失血ヲ發シ或ハ
 敗ヲ爲シ。肺ニ在テハ咳嗽ヲ發スル等ナリ。○乾欬

肺傷。勞嗽。肺癆。或ハ傷冷毒欬嗽等。醋厲液。稀涼液。喘發スル胸中ノ諸症ヲ治ス。○生根ヲ水煎シ。或ハ舍利別トシ。或ハ砂糖若ハ蜜ヲ加入。搗テ煉膏トシ。用テ○此藥ハ軟化シ。收滯スル故ニ外敷。諸創傷。骨傷。潰瘍ヲ愈シ。劇キ痔血等ニ俾効アリ。○製法。過爾託亞舍利別トシ。同シ。○主治。醋厲液ヨリ發スル諸症ヲ治シ。殊ニ吐血。大効アリ。服量四錢ヨリ一匁許服スル。一日ニ數次。○伍勒○物度。黃色ニ大クニ顯シ。其外亦當出也。

遠西醫方名物考卷三十終。此黃ニ外ニ舉テ。此黃ニ

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 榛齋宇山先生著 全三冊 醫學入門 植學啓原 宇山榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完

增補和蘭藥鏡 同上 全七冊 醫療正始 中齋伊東先生著 每篇三冊完 自初篇至七篇

遠西醫方名物考 同上 全八冊 泰西名醫彙講 蘇川真作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄幹先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大觀先生著 全四冊 醫方研幾 無涯足重先生著 每篇三冊完 初篇二篇

蘭學階梯 同上 全二冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄幹先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著 每篇三冊完 初篇二篇 病學通論 洪菴精方先生譯述 初篇三冊出末 二篇三篇四篇 進出枚

濟生三方 杉田成卿先生譯 全四冊 青藜閣 江戸淺草茅町三丁目 須原屋伊八

