

遠西醫方名物考

〔土〕

卷五

✕
e15

醫士川文庫
✕
499.2
En-3
5



富士川文庫

3272

遠西醫方名物考標目

卷五 西洋藥材考

〔土〕 橙皮水

橙皮油

橙皮精

橙皮丁幾去爾

橙皮舍利別

杜松實油

篤爾面室刺

度祿布

橙汁舍利別



499.2
Em-3
3



No. 1430
10 e 15



遠西醫方名物考 標目



硃砂

精製硃砂

硃砂 硃砂布

齒痛驗方

硃砂漱方

硃砂華

硃砂揮發華

硃華膏

硃鐵華

硃砂精

硃油擦方

硃砂加燒酒精

硃砂加石灰精

硃砂揮發精

固性硃砂

硃砂揮發膏

甘硃砂精

民埤列利精

傑列乙發汗散

陀歇爾私發汗散

乙百葛格安那

遠西醫方名物考卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川

榕菴校補

橙皮水

ア多コルチセスアウラント

製法

橙皮

生鮮者黃皮剉

右格兒弗ニ入レ水適宜ニ加ヘ蒸餾メ露水十比ヲ

取ル其法薄荷水ノ條露水製法括套ニ説ク如シ

主治胃腸ヲ健運シ痞氣ヲ散シ嘔吐ヲ止メ酸敗液

及ビ粘液ヨリ發スル諸症ニ驗アリ

橙皮油

オレウムコルチセスアウラント



製法 橙皮

生鮮者或陰乾者黃皮剝分量適宜

右格兒弗ニ入レ水適宜ニ加ヘ蒸餾ス其法薄荷油ノ條蒸餾油製法括套ニ説ク如シ

主治 腦心胃ヲ强健ニシ痞氣鬱蓄ヲ驅散シ壅塞ヲ開達シ失氣昏冒風疝腹痛等ヲ治シ小便ヲ利ス○此油ハ清稀ニメ水ノ如シ橙皮ノ製劑中尤峻効アル者ニメヨク竄透刺戟ス故ニ少許宛用フベシ大抵十滴許ヲ沙糖六錢ニ研和シ硝子壘ニ入レ固封シ貯ヘ胃ノ衰弱セル諸症ニ時々一小卵匙ヲ用ヒテ効アリ○服量八滴ヨリ十六滴ニ至ル沙糖ニ和

シ或ハ白湯或ハ燒酒ニ點服ス○外敷メ痲不遂瘰癧或ハ熱ナキ痛風等ノ神經病ニ驗アリ

橙皮精

スピリチス・コルチセス・アウラント

製法 橙皮

未熟綠色者白肉ヲ去リ乾シ剝ニ比 燒酒 十度者四比

右浸ス一ニ日蒸餾メ露精ヲ取リ十度ニ至ル其法薄荷精ノ條蒸餾精製法括套ニ説ク如シ

主治 破氣驅風ノ良劑トス痞氣鬱滯ノ諸症ヲ消シ

粘液留飲ヲ祛キ心胃ヲ健運シ飲食消化ヲ助ケ汗ヲ發シ小便ヲ利シ失氣昏冒ヲ復ス又橙皮丁幾去爾主治ノ諸症ヲ治ス○服量三四十滴許ヲ用フ

橙皮オンキテウル丁幾去爾テイケンキテウル

子クナ穢クナニ入レ硝子塞ニテ固封シ時々振蕩シ浸

製法

橙皮

一北 白肉ヲ去リ剉

燒酒

六北 十五度者

右硝子穢ニ入レ硝子塞ニテ固封シ時々振蕩シ浸ス
ス
六日布片ヲ以テ漚シ又紙ニテ漚シ其液ヲ硝子穢ニ入レ固封シ貯フ

主治

強壯衝動ノ劑トシ凡衰弱ヨリ起ル遷延諸病

ニ用テ偉効アリ。諸萎黃病ノ類久ク食機ヲ失ヒ勞

倦虚乏ヲ覺エ腹中風氣痞滯苦滿ヲ患ル等多クハ

胃及ビ腸ノ虚弱ヨリ發ス。或ハ疑體諸器虚衰ノ其

運營ノ減損スルヨリ發スル經閉及ビ其虚損ノ括

約ヲ失フヨリ發スル崩漏等ニ用ヒテ治驗多シ○

服量八十滴マデ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス

○未熟ノ橙實大櫻實ノ如ク黯綠色ニシテ苦味佳香

アル者ヲ取リ丁幾去爾ト爲シ用テ尤効アリ

橙皮舍利別

セイロフス。コルチセス。アウラント

製法

橙皮

一北 鮮白肉ヲ去

砂糖

三北 淨白者

水四北

右橙皮ヲ磁罐ニ入水ヲ加ヘ浸月十二時蒸餾メ露

水ヲ取リ三多。是ニ砂糖六多ヲ加ヘ文火上ニテ溶

化ス其罐中ノ橙皮ヲ絞テ汁ヲ取リ其餘ノ砂糖ヲ

加ヘ漚テ渣ヲ去リ文火ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲シ

放冷シ前ノ露水ヲ和シ硝子壘ニ入固封シ貯フ
〔主治〕心胃ヲ强健シ飲食ヲ消化シ風氣鬱滯心下痞悶ヲ祛キ粘痰留飲ヲ消シ腐敗ヲ遏ム

橙汁舍利別 セイロフス、シツクス、アウラント 羅

〔製法〕橙汁 静定ノ底渣ヲ去ル者、十六号 砂糖 淨白者、二比半

右調和シ文火ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲シ放冷ス

〔主治〕清酸甘美ニメ口舌ヲ滋潤シ渴ヲ止メ熱ヲ解

シ血液ノ沸騰ヲ鎮メ膽液ノ酷厲腐敗ヲ消シ衰弱

ヲ強壯シ一切壯熱病ニ良効アリ

杜松實油 ホルウム、デスチル、チ、バツカ、ユニペリ 羅

〔製法〕薄荷油ノ條、蒸餾油製法括套ニ説ク如シ

〔主治〕性熱甚ダ竄透ス。的列並底那ノ性アリ然レ酷

烈ナラス。小便ヲ利スルニ峻効アリ。虛寒ニノ辛

熱衝動ノ劑ヲ用フベキ水腫ニ尤驗アリ。荏苒々

ル冒寒傷冷毒ノ熱ナキニ與ヘ發汗ヲ治ス。風氣

鬱蓄メ心腹痞滿攣痛スルヲ治ス。服量感觸甚キ

人ハ六滴ヨリ十二滴許マデ用フ水腫ニハ利尿ノ

煎劑或ハ適宜ノ飲液ニ點服シ或ハ砂糖ニ和シ用

フ。外敷メ痲不遂ヲ治シ痛風、腕股痛、傷冷毒痛痔

痛等其他神經ノ諸症ヲ治ス

篤爾面室刺トルシチラ羅セヘンブラド蘭

○榕按ニ此草小野蘭山翁嘗テ度ノ圖說ニ據テ

蝦夷産ノオフシキナト云草ニ充ツ予此草ヲ得

テ和蘭ノ諸說ニ徵スルニ形狀氣味篤爾面室刺

ニ穩當セリ物依云此根主治拳參根藥鋪ニ金線

主ト同一般ナリト然レハ拳參根ニ代用スベシ

形狀篤爾面室刺ハ一根數莖叢生シ高廿一尺許微

赤粗糙細弱撓タハニ易ク地ニ塌シ每節七葉層々湊生

シ狼牙葉ニ似テ小邊缺裂ス夏月薔薇様四瓣ノ黃

花ヲ開キ長梗アリ心蕊一鬚蕊十六其頭ニ葯アリ

萼ハ出花後楕圓ハ稜ノ朔ヲ結ビ稍長キ八個ノ核

ヲ藏ム根拇指大ニメ短ク塊節様ニメ鬚アリ栗殼

色ニメ裏赤ク味收滯ナリ○北方寒國叢林陰地ニ

産ス種ヲ下シ或ハ根ヲ分チ培養ス

主治根温煖強壯ニシ收滯ノ効アリ故ニ下利赤痢

下血吐血痔血淋疾白帶下崩漏等ノ虛症ニ用ヒ總

テ弛弱虛衰セル諸症ニ良驗アリ○傷冷毒及ビ熱

病ニ下利ヲ兼テ虛脫セル症ニ用ヒテ汗ヲ發シ胃

ヲ健ニシ腐敗ヲ遏メ蚊蟲ヲ殺ス○或說ニ是ニ健
 質チア亞ナ那代用龍膽ヲ加ヘ熱病及ヒ間歇熱ニ用ル丁日ニ
 半錢ヨリ三錢ニ至リ其効殆ト幾キ那ナノ如シト云○
 服量末トシ十五ルヨリ一ル或ハ一錢ニ至ルル或ハ
 根到ニ一錢ヲ取り水煎シ一服トスス或ハ一ルヲ取
 リ水一匕半ニ浸シ滓ヲ去リ一盞宛服ス○齒痛ヲ
 止メ斷顎腐爛ヲ愈シイ或ハ失苟兒陪苦ヨリ發スル
 斷ノ潰瘍ヲ治シ咽喉腫ヲ消スル等ニ此末ヲ患部
 ニ摻シフリカケ或ハ水煎シ蜜若クハ醋ヲ加ヘ漱藥トシ効
 アリ○創傷潰瘍瘻瘡侵蝕潰爛等ヲ乾愈シ凝血ヲ

疏散シ打撲傷毒螫刺咬ヲ治スルニ此末ヲ摻シ或
 ハ水煎メ蒸湯劑ニ或ハ洗藥トシ良驗アリ
 物伍度

度祿布ト蘭ト

トロキシゲイセイリサロ羅クイキスハント
 トホウトスワルテボルストクイキス蘭
 亞刺比亞護ア甘草膏各ニシ砂糖四

製法

右件調和シ蒸餾水ヲ適宜ニ加テヨク溶化シ濾過
 ノ滓ヲ去リ文火ニ上セテ水氣ヲ蒸散シ凝結セシ
 メテ適意ノ錠ト爲シ放冷ノ乾固シ貯フフ或ハ茴香
 油少許ヲ加ヘ製スルモ良○煎熬スル片手ヲ住メ
 ス攪テ少モ焦著セシムルレ勿レ

〔主治〕咽喉氣管肺ヲ滋潤シ酷厲侵刺ノ惡液ヲ甘和シ痰ヲ吐キ易カラシメ傷冷毒ノ欬嗽聲嘎喘急淋疾痛等ニ効アリ

硃砂 サルアムモニアモム

硃砂ハ一種ノ中和鹽ナリ形扁圓ニシテ潤二三寸許厚三四指横徑上凸下稍凹尋常ノ品ハ外面灰白微黃或ハ黑色ヲ帶ビ裏淡白ナリ上品ハ乾固潔白石英様ニシテ裏亦瑩白破碎スレバ束鍼紋アリ味鹹辛舌ニ滲透シ殆ト香氣ナシ然レバ剥篤亞斯或ハ生石

灰或ハ酒石液或ハ生石灰水等ノ亞兒加利性ノ物ヲ加テ研磨スレバ銳烈竄透ノ香氣ヲ揮發ス其銳烈ナル程逾上品トス火ニ觸ルレバ盡ク溶化ス然レバ大氣ニ觸テ溶化セズ此物既日多産ヲ上品トス勿搦祭亞和蘭其他歐羅巴洲ノ諸國ニテ製造スル者亦良ナリ○製煉術ニテ硃砂ヲ溶解シ試ルニ尿ノ揮發鹽三分ノ二アリ海鹽精同様ノ酸精少許出ツ然レバ此物ハ固性海鹽精性ニシテ風化セザレハ前ニ註ス少許ニ風化揮發ノ亞兒加利鹽居多相渾合升煨ノ固性ヲ爲シ一種ノ中和鹽トナル者ナ

リ。此亞兒加利鹽ハ揮發ナル故ニ諸酸性ノ物ヲ加
 レハ相激ノ沸騰ス亞兒加利性ノ物前ニ云剥ト篤ト亞
 云ヲ加レバ其海鹽精ト抱合シ揮發亞兒加利鹽ハ
 分離ノ忽チ銳烈ノ香氣トナル故ニ此物ノ性能モ
 亞兒加利性ノ揮發鹽ニ在リト知ルベシ叔福

製法 駝尿 凝固者 海鹽 二十 煤 十

○按ニ駝尿ハ牛馬厩中ノ尿ノ凝結スル者ヲ取
 リ代用スベシ叔揭ニ諸獸畜ノ尿ノ凝結セル鹽
 ヲ用フベシ煤ハ常動物ヲ焚ヒス竈上ノ煙窓ニ著
 久者ヲ用フベシト云動物ハ總テ禽獸ノ骨
 及ヒ皮肉毛羽類ヲ云

右搗碎キ調和シ適宜ニ水ヲ加ヘ煮テ烱化シ濾テ
 汁ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾シ硝子曇ニ入
 レ沙火ニテ升煨シ取出シ水ニ溶シ濾テ渣ヲ去リ
 又火ニ上セ乾固シ貯フ医○凡、硝砂ハ土氣等ノ汚
 物混スル故ニ是ヲ再製ノ純粹ト爲シ用フベシ

精製硝砂 ケソイフルデ、アムモニアクソウト蘭

製法 硝砂 尋常者細末 沸湯 三倍

右硝砂ヲ湯ニ溶化シ紙ニテ濾シ文火ニ上セ水氣
 ヲ蒸散ノ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバ芒
 ヲ結ブ是ヲ取り乾シ硝子曇ニ入レ固封シ貯フ医

〔主治〕鑽透刺戟ノ細絡織管ヲ衝開シ膠粘ノ諸液ヲ稀釋ノ汗孔ト尿道ヨリ排泄ス故ニ總テ閉塞ヲ開キ凝結ヲ解クニ奇効アリ○諸藏ノ壅塞及ヒ胃腸ノ粘液ヨリ起ル諸病ニ効ヲ奏シ又輕ク衝動ノ胃腸肺等ノ運營ヲ活潑増進ス然レ過服スレバ吐下等ヲ發ス但服量適宜ニ用レバ虛損スベキ脫泄ヲ起スコトナシ○此藥ハ兼用ノ品ニ隨テ或ハ發汗シ或ハ小便ヲ利ス○粘液質ノ經閉ヲ通ス血脈纖維弛弱ニ血中粘液過多ニ壅滯セル萎黃病様ノ經閉ヲ云○胃腸ニ粘液過多ニ下利スル症ハ是ヲ苦味香竄ノ藥ニ加ヘ用フ○胃腸

ニ滯著セル膠粘液ヲ疏解スル効ヲ以テ纖維虛弱ニノ粘稠液過多ナル熱病所謂粘液熱粘液質ノ水腫或ハ大便閉、虻蟲等ニ驗アリ○此藥ハ亞兒加利性ノ揮發鹽多キ故ニ一切壯實ノ熱病、嗽衝熱ニハ害アリ然レ冒寒傷冷毒及ビ斯ノ如キ酷厲毒ノ壅滯セルヲ疏解ノ大抵減スル症ハ是ヲ用ヒテ良効アリ○熱病ノ毒漸ク化熱ノ諸竅ニ分利スベキ症ニ是ヲ用レバ痰ヲ吐セシメ蒸氣ヲ發シ或ハ小便ヲ利メ其毒ヲ排泄ス○肺嗽衝ノ嗽熱漸ク退キ病勢減スル者或ハ咽喉焮腫或ハ關節痛、傷冷毒痛等ニ是

ヲ用レバ能^レ病毒ヲ疏散ノ排泄ス○膽液熱胃腸熱
 等ノ毒甚^ク膠固頑滯ノ解シ難キ症モ亦是^ニ用^レ
 バヨク其毒ヲ疏解ノ排泄ス○腐敗熱及ビ神經熱
 ニ於テ其焮衝ノ諸症退キ脉勢衰へ唯精力虚脱ス
 ルニ因テ專^ニ腐敗ヲ防護シ強壯スル劑ヲ與スベ
 キ症ニ是^ニ用^ヒテ驗アリ○發斑熱羅斯痘疹等患
 者虚衰シ舌苔アリ大ニ煩渴スル等ノ症ヲ發シ或
 ハ其斑疹消散ノ内攻スル症ニ用^テ甚^ク効アリ○硃
 砂ハ專^ニ間歇熱ヲ治スル藥ノ如ク用^ル者アリ凡
 間歇熱ニ吐劑或ハ下劑ヲ用^テ胃腸ニ壅滯スル毒

ヲ滌除ノ後其發作ノ一時前ニ此藥半錢許ヲ用^レ
 バ腹内諸器ノ壅塞ヲ開通シ病毒ヲ汗及ビ小便等
 ニ疏泄ノ治ス但^シ此病ハ膠粘ノ惡液胃腸腸間膜等
 ニ鬱塞ノ發スル^ル居多^キ故ニ特^ニ此症ニ用^テ良
 驗アルナリ若^シ其惡液壅滯ノ解セザレバ動^モス
 レバ黃疸或ハ水腫ヲ發ス或ハ其腹内ニ鬱塞セル
 病毒漸ク減ズレ^レ其熱仍頑固ニ治セザル者ハ
 幾^キ那^ナニ硃砂ヲ加^ヘ用^テ効アリ
 分^分ノ一^一ヲ加^フ○
 服量五匁ヨリ十匁マデ日ニ數次用^フ急劇ノ症ニ
 ハ十匁ヨリ一^一マデ飲液ニ加^ヘ或ハ舍利別ニ和

シ甘美ト爲シ用ルモ良末エテ用レバ惡心嘔吐ヲ
 發スルヲアレバナリ○末トシ眼ニ點メ角膜翳星
 ヲ祛ク○凡、中和鹽ノ類ニ於テ外敷メ解凝ノ峻効
 ヲ奏スルヲ此鹽ニ若ハナシ蒸溺劑洗藥或ハ琶布
 ニ加、施メ稍衝動シ汗孔ヲ開キ凝結ヲ散シ粘液ヲ
 鑽リ細絡ヲ通シ衰弱ヲ強壯ニシ腐敗ヲ防護ス故
 ニ一切寒腫腺腫肉腫粘液瘤痛風腫粘液腫ヲ消散
 シ或ハ經久ノ潰瘍ニ洗藥トシ施メヨク其瘡ヲ淨
 刷シ腐骨疽寒壞疽ノ腐爛ヲ止メ皮上ノ汚斑ヲ消
 シ或ハ打撲傷皮肉中泛溢ノ血液ヲ疏散ス○關節

ノ水腫ニ是ヲ外敷メ縛帶ヲ施セバ消散ス或ハ陰
 囊水腫ハ是ヲ醋ト燒酒ト各半ノ液ニ溶シ蒸溺ス
 ルヲ八日ニメ腫消シ疼止ム或ハ其腫ニ鍼メ水ヲ
 泄シ其水ノ内攻ヲ防メ良○輕キ焮衝凍瘡等ハ是
 ヲ水ニ溶シ稀クメ患部ヲ洗テ治ス○是ヲ温湯ニ
 溶化シ漱藥トメ傷冷毒ノ咽喉焮腫ヲ消ス○疥癬
 等ノ皮病ヲ治スルニ是ヲ膏藥ニ加メ施メ尤効アリ
 ○閃挫骨傷ノ後其部弛緩痿弱スルニ是ヲ施メ
 强健ナラシメ或ハ其部水腫ヲ發スルモヨク消散
 ス○乳房ニ乳ノ凝聚シ結核腫痛スルニ施メ疏散

ス是ヲ迷迭香精等ニ溶シ施メ殊ニ効アリ或云水
 三溶シ布片ニ浸シ温メテ乳房ニ貼シ乾ケバ更換
 ス○是ヲ吉利詞參兒ノ劑ニ加ヘ施メ卒倒昏睡或
 ハ溺死等ヲ蘇復ス或ハ此末少許ヲ取テ鼻中ニ吹
 内レテ卒厥ヲ省覺ス○凡右ニ説ク諸外症ニ硃砂
 ヲ水ニ溶シ醋ト燒酒トヲ加ヘ施セバ其功尤峻ナ
 リ或ハ硃砂一多。醋燒酒各四多。右溶化シ用ルモ良
 ○一切腫瘍ヲ消散スルニ左ノ琶布捷効アリ

硃砂琶布 亞麻子 末四 草蓼陵香花 二握
 加密列 一握 硃砂 五錢

右水適宜ニ加ヘ煮テ琶布トシ温メ貼ス

○腫瘍ヲ消散シ或ハ潰瘍ノ腐肉ヲ消シ癩瘡ヲ愈
 シ疣贅息肉ヲ除クニ左ノ蒸湯方効アリ

硃砂蒸湯方 硃砂 一多

右葡萄酒ト醋ト各半ノ液四多ニ溶シ蒸湯劑トス

○齧齒劇痛ニ左ノ方奇効アリ

齒痛驗方 硃砂 一錢 橙汁 二錢

右研和シ綿撒絲ニ浸シ齧孔ニ容ル

○咽喉ノ粘液腫或ハ舌癰 言語 蹇澁ニ左ノ方尤効アリ

硃砂含方 泥菖根 良薑 胡椒 各半

硃砂 一錢

右末トシ布片ニ包テ嗽含テ涎唾ヲ湧起ス
○左ノ漱劑ヲ施スモ良効アリ

硃露漱方

接骨木花水 六勺
山薺菜精 硃砂 各一錢

右調勻シ漱藥トス

○精製硃砂ハ極テ純粹ニシテ前説ノ諸病ニ峻効アリ是レヲ末トシ水ニ溶セバ其水甚ダ寒冷ナリ夏月此水ヲ器ニ盛リ酒壘ヲ浸セバ其酒極テ寒冽ナ

中 庚底福 叔伍依

硃砂華

フロレスサリスアムモニアキ

製法

硃砂 再製乾淨者細末

右陶製ノ格兒弗ニ内レ大ナル硝子ノ堯ヲ覆ヒ承
留壘ヲ屬シ膠泥ヲ以テ其接際ヲ固封シ沙鍋ニ入
堯ノ際マデ沙ニ埋メ文火ニシテ蒸餾スレバ硃砂ニ
含メル水氣蒸升ノ承留壘ニ下ル其液必モ下ラザ
ルニ至テ承留壘ヲ換初ノ如ク塗封シ漸火ヲ増テ
其堯雪白色トナルニ至テ火候ヲ同等ニシ四時或
ハ四時半ニメ放冷ス即堯内ト壘ノ頸トニ雪白柔
脆輕虛ノ精華升リ著ナリ是ヲ取集メ硝子壘ニ入

密封シ貯フ其格兒弗内ニ白屑片塊等著^コアリ是
ハ其未^ル升化セズノ凝結スル者ナリ故ニ是ヲ刮^クリ
取テ以後此華ヲ製スル^ル片。硃砂ニ加テ升煨スベシ
其格兒弗ノ底ニ殘ル鹽樣ノ黑汚物ハ棄去^ルベシ[○]

主治 硃砂ト同フノ尤モ揮發純粹ナリ[○]

硃砂揮發華

モニアル^カアムモニア^ニアキホラチレ^ル羅^アム
ツウ^フツケブル^メシ^蘭

製法 硃砂

一北 剝^{ハツ}篤^ト亞斯^ス 二北半

右各別ニ細末シ合メ研和シ頸澗^キ列篤兒多^ニ入
レ承餾壘ヲ屬シ其合際^ヲ塗封シ沙鍋ニ入レ漸ク
火ヲ加テ蒸餾スレバ揮發銳烈タル精華^升リ著^ク

ナリ是ヲ取り硝子壘ニ入レ固封シ貯フ[○]

又法 硃砂 一北 結麗土 二北

右ヨク乾^カシ研和ノ極細末トシ硝子ノ頸澗^キ列篤
兒多^ニ入レ大ナル承餾壘ヲ屬シ其接際^ヲ塗封シ沙

鍋ニ入レ武火ニテ升煨ス但大ナル桶ニ冷水ヲ盛

リ是^レニ其承餾壘ヲ浸シ冷^シ温ナル片ハ速^ニ其水

ヲ更換スベシ是^ニ由テ硃砂ノ精華^升テ遍^ク承餾

壘ニ著^クナリ是ヲ取り硝子壘ニ入レ固封シ貯フ[○]

主治 大抵硃砂加石灰精^出次^ニノ如ク極メテ鑽透揮

發^シ凝結ヲ疏散スルニ峻効アリ[○]肘臂膝等ノ關

節寒腫ヲ發シ久ヲ經テ治セザル症ハ左ノ膏尤驗

〔又法〕大熱麻痺ハ石鹼二錢若把兒麻膏四錢

右石鹼ト若把兒麻膏トヲ烱和シ冷定メ硃砂揮發

硃砂一錢華ヲ研合ス

硃鐵華一錢フロレス・サリス・アムモニアキ・マルチアレ

〔製法〕硃砂十二弓升鐵鹽二一弓

右能ク研和メ乾シ太ナル硝子ヲ列篤兒多ニ内レ

封閉シ沙火ニ上セ漸ク火ヲ加テ升煨シ其壘底熾

紅トナリテ火ヲ下シ放冷メ其華ヲ取り細末トシ

硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

〔又法〕血石極細末或鐵粉代用海鹽精各二弓硃砂細末十六弓

右血石ヲ石臼ニ入レ鹽精ヲ加ヘ研磨シ次ニ硃砂

ヲ研和シ大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ヲ以

テ升煨シ漸次ニ火ヲ増テ終ニ其壘底殆ト熾紅ト

ナレバ其華升テ凝結ス但火候ニ強弱アレバ偏ニ

硃砂ノ升ルガ故ニ是ニ意ヲ加ルヲ專要ナリ

〔又法〕鐵屑鋪ナキ硃砂華各四弓鐵屑一倍ヲ加フ

右合ノ硝子臼ニ入、研磨メ亞兒加利鹽樣ノ竄透ノ
 氣ヲ發スルニ至レバ、澗大ナル硝子ノ格兒布ニ内
 レ平等ニ其底ニ展ゲ、硝子ノ兜ヲ覆ヒ承餾壘ヲ屬
 シ膠泥ニテ其接際ヲ塗封シ沙鍋ニ入、格兒弗ノ頸
 マテ沙ニ埋メ漸ク火ヲ増シ兜ノ頂温ナル氏ハ清
 稀ノ液、承餾壘ニ下ル。此液下ラザルニ至レバ初ニ
 帶白色ノ華。其兜ニ升リ著キ爾後其色一様ナラズ
 皮色（淑云橙）斯ノ如ク升煨スルヲ三時或ハ四時ニメ其
 華少モ升エザルニ至リ放冷スレバ鮮美乾淨ノ華
 其兜内及ビ嘴ニ固著ス是ヲ取り速ニ硝子壘ニ内

レ固封シ貯フベシ否レバ忽チ濕テ溶化シ粘テ鹽
 泥ノ如ク石鹼ノ如クニノ黄色トナレバナリ○其
 承餾壘ニハ風化揮發ノ亞兒加利鹽ヲ含メル黄色
 ノ液アリ是ニ白黄色ノ物雜ル此液ヲ鐵油ト名ク
 和蘭名（エイ）○格兒弗ノ内圍ニ著ク所ノ華ノ如キ
 者ハ其藥料溶化シ烈火ニテ凝結メ未ダ華トナラ
 ザル者ナリ是ヲ取貯ヘ復升煨メ華ト爲スベシ其
 華赤色ヲ帶ルハ其加ル所ノ鐵氣ヲ多ク含ムナリ
 ○格兒弗ノ底ニハ赭赤色ノ渣塊、残り味辛烈ナリ。
 氣ニ觸レバ溶化シ收滿黄色ニメ鐵性ノ油ノ如シ

然^レ凡^レ性効ハ此^ノ華ト異ナリ○其初^ニ硃砂ト鐵トヲ研和スルニ由テ其鐵ニテ硃砂ニ含ム所ノ酸性鹽^ニ上^ニ出^ルヲ吸收セラル。故ニ其中ノ亞兒加利性ノ揮發鹽ノミ自ラ放解メ竄透ノ蒸氣ヲ發ス又硃砂中ノ酸性鹽ニテ鐵ノ質ヲ消化シ。蒸餾ノ火力ニ由テ升化シ凝結ノ華トナルナリ。斯ノ如キ堅實ニテ消化シ難キ鐵質ヲヨク升化スルヲ以テ觀レバ硃砂ハ一種ノ奇異ナル揮發ノ性カアルヲ察スベシ^矣

主治 此藥ハ硃砂ニ鐵性ノ硫黃ヲ含テ^{鐵中硫黃アリ} 竄透開達^ノ粘液ヲ稀釋シ^リ 虛冷ヲ温壯シ^リ 稍^ヤ

睡ラシメ發汗シ又鎮痛ノ功アリ故ニ内藏ノ壅塞ヲ開通シ脾病^{イハレ} 依^ハ剥^キ昆^コ埵^デ兒^ル ^{内科撰要膽液ニケケルハイ} 敗^ク黑^ク篇^ニ出^ツ 苦等ヲ治ス○纖維ヲ收^メ瀦^シ且^シ甚^クダ衝動スル性功アルヲ以テ經久頑滯ノ粘液閉塞病ヲ疏解スルニ峻効アリ故ニ經閉ヲ通スル良藥トス或ハ鐵屑ヲ用テ功アル諸症ニ尤^モ驗アリ或ハ幾^キ那^ノヲ加用テ頑固ノ間歇熱ヲ治ス○服量十^ハ尺^ヨリ一^マ夕^ニ至^ル ^綱 ^綱

硃砂精 ^ス ^ヒ ^リ ^左 ^ス ^サ ^リ ^左 ^ス ^サ ^ル ^ア ^ム ^モ ^ニ ^ア ^キ ^ム ^ハ ^又 ^ス

右各別ニ研末シ合和ノ硝子列篤兒多ニ内レ水ヲ加ヘ承餾壘ヲ屬シ獸ノ膀胱ヲ濕メ其接際ヲ卷キ氣ヲ少シモ透漏セザラシメ沙鍋ニ入レ漸ク火ヲ増シ蒸餾ノ其精少シモ出ザルニ至リ承餾壘ヲ放チ其精ヲ取テ硝子壘ニ入レ密封シ貯フ○其列篤兒多ク嘴ヲ塞ギ更ニ其火ヲ増ス片ハ白色ノ硃砂華升テ坩ノ裏面ニ著ク是ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ是レ上ニ説ク所 硃砂華ト同シ 國 國

主治 硃砂精及ビ硃砂揮發華ハ其氣銳烈ニノ極テ鑽透刺戟シ壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ蒸氣及ビ汗ヲ

發シ小便ヲ利シ血液ヲ衝動健運シ細絡纖維ニ壅滯セル寒粘液酸敗液ヲ驅散ス○粘痰多キ欬嗽喘急等ニ効アリ○神經及ビ諸脉ニ寒粘液壅塞ノ發スル卒倒昏睡痲痺子宮衝逆水腫ニ用ヒ或ハ痛風關節痛傷冷毒痛等ノ劇痛退ケ凡仍多少ノ痠痛荏苒トメ休ガル症ニ用レバ此藥ノ竄透開達ノ性力ニテ其惡液ヲ汗ト小便ヨリ驅逐シ治ス○劇キ下利或ハ恐驚等ニテ失氣暈倒シ或ハ烟ニ咽ビ或ハ水ニ溺レ或ハ縊レテ半死セル者ハ此精ヲ嗅シメ或ハ綿撒絲ニ浸メ鼻中ニ挿シ或ハ是ヲ眼中ニ滴

スレバ皆其膜ヲ刺戟ノ靈液ヲ衝動シ忽チ甦復ス
 卒倒昏睡病或ハ子宮衝逆等。總テ人事不省ノ症ニ
 ハ皆右ノ如ク施メ即効アリ○子宮衝逆痙攣ノ諸
 症ニ此精効アレバ鹿角ノ亞兒加利鹽鹿角精ノ殊
條ニ出ツ
 ニ良驗アリ○卒倒昏睡病。痲痺等ノ粘稠液壅塞メ
 發スル症ニハ効有レバ多血ヨリ發シ或ハ清涼劑ヲ
 用テ治スベキ症ハ皆害アリ○小兒齒ヲ生スル片
 搖掣腹痛下利等ヲ發スルニ用テ効アリ此症動モ
 スレバ酷厲ナル酸敗液。胃腸ニ鬱蓄メ發スレバナ
 リ○瘰癧毒諸疔ニ内服外敷シ酸敗ノ諸病。小兒腹

痛等ニ甚ダ驗アリ○此精ハ總テ患者虛脱シ脉小
 ニノ搏動齊ハズ振惕惴動シ冷汗出。氣息冷テ不利
 スル等ノ症ニ奇効アリ藥性慄悍ナレバ神經ヲ害
 セズ或ハ麝香龍腦纈草幾那等ヲ加ヘ用ルナリ
 故ニ壯實ノ症ニハ總テ是ヲ禁スベシ○服量五滴
 ヨリ十五滴マデ沙糖或ハ適宜ノ液ニ點服ス○熱
 性多血ノ人ハ斯ノ如キ揮發竄透ノ藥精ヲ過服ス
 ルト勿レ動モスレバ焮衝ヲ發スレバナリ○此精
 ニ蚯蚓油ヲ和シ傷冷毒痛或ハ痛風痲不遂ノ部ニ
 塗擦ノ良驗アリ○諸寒腫或ハ咽喉痛ニ左ノ擦方

ヲ擦テヨク疏解消散ス咽喉痛ハ頭ニ擦スヘシ

硃油擦方 硃砂精 一匁 阿利襪油 二匁

右調和ス 亞叔 依揭

硃砂加燒酒精 スヒリ左スサルアムモニアキヒノス羅

製法 燒酒 銳烈者 硃砂精 八匁

右調和ス **主治** 甘硃砂精ト同シ 亞

硃砂加石灰精 一名硃砂 揮發精 硃砂精

製法 生石灰 二匁 硃砂 一匁 水 五匁

右二味各別ニ研末シ潤大ナル硝子ノ列篤兒多ニ

入レヨク混和シ是ニ水ヲ加レバ大ニ沸騰ス速ニ

承餾壘ヲ接合シ其沸騰盡ク止片ハ沙鍋ニ入レ膠

泥ヲ以テ其合際ヲ塗封シ初ハ文火トシ漸ク火ヲ

増テ精ヲ取ル一匁半是ヲ硝子壘ニ入レ硝子ノ

塞ニテ密閉シ貯ス 亞

又法 硃砂 二匁 生石灰 燒テ新者十分一ノ水

右各別ニ研テ極細末トシ石灰一匁ヲ殘シ置テ其

餘ハ硃砂下共ニ列篤兒多ニ入能合和シ是ニ右ノ

殘置タル石灰ヲ加テ其上面ヲ被ヒ其列篤兒多ヲ

沙火ニ入レ是ニ頭彎リタル硝子ノ承餾壘三個ヲ連
 續ス但第一個ト第二個トノ承餾壘ニハ其頭本ノ
 側ニ一小孔ヲ穿即列寫兒多ノ頭ヲ第一個ノ承餾
 壘ニ挿第二個ノ承餾壘ノ頭ハ第一個壘ノ頭本ノ
 孔ニ挿第三個ノ承餾壘ノ頭ハ第二個壘ノ頭本ノ
 孔ニ挿テ連續セシムルナリ但第一個ノ承餾壘ハ
 小ナリ是ニ蒸餾水ハ多ヲ盛リ劑中ノ硝砂ノ第二
 個第三個ノ承餾壘ハ大ナリ各是ニ蒸餾水ニ比テ
 盛リ劑中ノ硝砂皆其合際ヲ塗封シ或云頭彎リ
 多ヲ取其頭ヲ第一個ノ承餾壘ノ頭ニ挿其壘ノ頭
 本ノ小孔ニ彎リタル硝子管ヲ挿其一端ヲ第二個

ノ壘頭ニ挿其壘ノ頭本ノ小孔ニ又彎リタル硝子
 管ヲ挿其一端ヲ第三個ノ壘頭ニ挿各其挿際ノ罅
 隙ヲ塗封シ蒸餾スルモ亦一良法ト是ニ由テ其
 承餾壘三個共ニ彎頭ノ者ヲ用ルニ及ハズ尋常ノ硝
 子壘ノ頭本ニ小孔ヲ初文火トシ漸火ヲ増蒸餾メ
 遂ニ其精少モ下ザルニ至リ火ヲ下放冷ス乃第一
 個ノ承餾壘ニ硝砂精アリ然レ不潔ノ物雜ニアリ
 然ルレハ除去ベシ第二個ノ承餾壘ニハ極テ純粹
 ニメ銳烈ナル精アリ第三個ノ承餾壘ニモ純粹ノ
 精アリ然レ第二個壘ノ精ニ比スレバ銳烈ナラズ
 故各別ニ硝子壘ニ入硝子塞ニテ密閉シ貯ヘシ後
 主治 此精ハ硝砂ニ含ル酸性鹽ヲ脱メ純粹ノ亞兒

加利性トナル故ニ尋常ノ礶砂精ニ比スレバ揮發
 竄透ノ氣烈ク酸味ノ液ヲ加レモ甚ク沸騰セズ○尋
 常礶砂精主治ノ諸症ニ峻効アリ但刺戟衝動ノ性
 極テ銳烈ナルニエニ諸急卒ノ病ニ用テ閉塞ヲ開
 キ捷効ヲ奏ス卒倒昏睡病或ハ失氣眩冒呼吸絶ス
 ルカ如キ諸症或ハ驚駭溺死縊死咽烟或ハ大饑神
 思勞傷劇脱泄ニテ卒厥スル者ハ頻ニ此精ヲ嗅シ
 或ハ綿撒絲ニ浸メ鼻中ニ挿シ或ハ眼中ニ點メ
 醒後ス患者嚔下スル片ハ此精ニ二十五滴マデヲ水
 二匙ニ加ヘ用フ○此精ニ芫菁丁幾去兒ヲ加ヘ痲

不遂ノ患部ニ擦メ効アリ○此精一二滴宛吉利詞
 參兒ノ液ニ加ヘ施メ痲或ハ衰弱ノ患者ニ尤驗アリ
 ○小兒酸敗液ヨリ發スル腹痛搐掣或ハ大人酸
 敗液ノ諸症ニ適宜ノ飲液ニ點服メ捷効アリ○微
 毒ニ是ヲ用テ發汗ノ煎劑ヲ兼用シ汗ヲ發メ良○
 卒倒昏睡病等ノ多血ヨリ發スル者或ハ清涼劑ヲ
 用フベキ症ニハ此精總テ大害アリ○水銀劑ヲ過
 服メ汞熱水銀ノ條ニ出ヲ發スル者ハ此精ヲ用テヨク解
 ス○齧齒ノ劇痛ニ此精ヲ綿ニ浸シ齧孔ニ挿テ速
 効アリ是ヲ以テ其神經ヲ侵蝕メ麻痺セシムレバ

遠西各物考 卷五 三十一 廣雲堂藏

大川○脚痛風或ハ打撲傷或ハ乳。疑固ノ乳房結核
 生スル等ニ蒸湯劑トシ或ハ是ニ油ヲ和シ塗テ
 其久消散ス○此精ニ水ヲ加ヘ稀クシ洗藥トシテ
 關節ノ水綿様腫或ハ狂犬咬創ニ施シ或ハ輕キ火
 傷或ハ惡厲ノ疥癬浸淫瘡等ノ患部ニ施シ皆殊効
 大稱ス或ハ水銃ヲ以テ是ヲ瘻瘡ニ注入ノ其腐穢
 頑硬ノ肉ヲ消ス（依）（國）
 固性硃砂ハステアムモニアクノウト 蘭大入箱
 製法 硃砂加石灰精或ハ硃砂揮發華（拔）ヲ製シ其
 列篤兒多ノ底ニ殘リタル渣塊ヲ取り沸湯ニ溶シ

發烟海鹽精ヲ是ニ滴スレバ沸騰ス是ヲ滴シ加テ
 毫モ沸動セザルニ至リ紙ニテ濾テ其液ヲ取り文
 火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾白ノ鹽ト爲シ硝子壘ニ
 入レ固封シ貯フ（國）
 又法 結麗土精製者 分量適宜
 右結麗土ニ發烟海鹽精ヲ滴シ加テ毫モ滾動セザ
 ルニ至リ濾テ其液ヲ取リ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾
 白ノ鹽ト爲シ其温ナルヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ（國）
 主治 壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ汗ヲ發ス。間歇熱發作
 ノ一時前ニ一錢ヲ服シ温覆ノ發汗シ其毒ヲ驅發

殊効アリ故ニ一ニ是ヲ驅熱鹽ト名ク

硃砂揮發膏

サボアムモニアキホルチヲル又リニ
メシ左ムホラチレホルチウス
ルケレセブハンアムモニア
カ又フルツケスメルセル蘭

製法

硃砂加石灰精一弓 阿利襪油 二弓
右硝子燻ニ入振蕩ノ能混和セシメ固封シ貯フ

主治

外敷ノ疼痛ヲ止メ痙攣ヲ鎮メ腫瘍ヲ消散シ
壅塞ヲ開キ凝結ヲ解ク要藥トス○内部焮衝ヨリ
起ル頑固ノ痛ヲ消スルニ是ヲ患部ニ擦シ或ハ咽
喉焮痛ニハ頰ニ頸ニ塗テ殊ニ驗アリ或ハ胸膜焮
衝傷冷毒痛痛風脚痛風或ハ痙攣痛疝痛或ハ諸般

ノ寒腫壅結硬腫便毒腫等ニ擦メヨク消散ス或ハ

赤痢ノ腹痛ニ外敷シ或ハ非不遂ノ部ニ數塗テ殊

ニ治驗多シ或ハ水腫ニ塗テヨク小便ヲ利ス○此

藥一弓ニ羯布羅或ハ實百兒油一錢ヲ和シ施メ尤

効アリ○專ラ止痛劑或ハ鎮痙劑ト爲スニハ是ニ

阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ舍電發謨阿芙蓉液等少

許加ヘ用フベシ○患部ノ皮膚感觸甚クメ此藥ノ

刺戟ニ堪ガル者ハ左ノ一方ヲ施メ良

又法

サボアムモニアキホルチヲル又リニ
ラチレセブハンアムモニア
硃砂精 四錢 阿利襪油 一弓半

右硝子壘ニ入レ振蕩ノヨク混和シ固封シ貯フ

甘硝砂精 スピリ左スサルアム

製法 剥篤亞斯六多 硝砂四多 燒酒三北

右ニ味各別ニ研末シ合和シ硝子ノ格兒弗ニ入レ

燒酒ヲ加ヘ蒸餾ノ精一北半ヲ取り硝子壘ニ内レ

固封シ貯フ

主治 汗ヲ發シ小便ヲ利シ精神ヲ爽快シ失氣昏冒

痲及ビ痙攣ヲ治シ月經ヲ通スルニ尤モ効アリ

民埤列利精 スピリ左スミンデレリ

按ニ浦爾花歇人創テ此劑ヲ製シ其後思可祭

亞ノ歐羅巴洲ノ民埤列利人多ク是ヲ用テ奇効ヲ

古稱シ大ニ世ニ行ハル。因テ是ヲ民埤列利精ト名

又ト云

製法 硝砂揮發華 蒸餾醋 各適宜

右醋ヲ硝子ノ格兒弗ニ入レ温沙火ニ上セ硝砂華

少許ヲ加レハ忽チ沸騰ス其滾動靜止スレバ後硝

華少許ヲ加ヘ斯ノ如ク逐次ニ少許宛加テ竟ニ其

液毫毛滾動セザルニ至リ火ヲ下シ靜定スル下兩

三日其間時々格兒弗ヲ振蕩ノ混和セシムベシ爾

後其二味平等ニ和勻スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ此液

醋一二滴ヲ加ヘ或ハ礶華少許ヲ加ルニ毫毛滾動セザルハ二物偏勝大久平等ニ調和スル候ト又但此液ニ醋ヲ滴メ微滾動スルハ仍礶華偏勝ノ候ト又故ニ是ニ醋ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ礶華少許ヲ加テ微滾動スルハ仍醋偏勝ノ候ト又故ニ礶華少許宛加テ毫毛滾動セザルニ至リ是ヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯クベシ

又法 蒸餾醋 礶砂加石灰精 各適宜

右醋ヲ長頸ノ硝子壘ニ入レ礶砂精ヲ一滴宛加レバ少ク滾動ス斯ク如ク漸ク加テ竟ニ其液毫毛滾

動セザルニ至リ又其二味平等ニ調和スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ二個ノ茶碗ニ各此液少許ヲ分チ取リ先シ一個ノ茶碗ノ液ニ醋ヲ滴メ微滾動スルハ礶砂精仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ蒸餾醋ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ其他ノ一個ノ茶碗ノ液ニ礶砂精ヲ滴メ微滾動スルハ醋仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ礶砂精ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ右ノ如ク兩個ノ茶碗ノ液ニ醋或ハ礶砂精ヲ加テ毫毛滾動セザルハ其液偏勝ナキ候ト又宜ク硝子壘ニ入レ固封シ

貯^テ入^ルシ^テ○枸櫞汁或ハ橙汁ヲ以テ右ノ蒸餾醋ニ
 代用メ亦良効アリ○枸櫞汁ニ鹿角鹽ヲ加ヘ前法
 ノ如ク製スレバ其効尤峻大^ニ○
 [主治]諸峻効アル發汗劑中ニ於テ尤此精^ニ稱ス極
 力揮發鑽透シ鬱塞ヲ開達シ粘稠液ヲ稀釋スレバ
 亞的兒^{アテラ}及ビ阿芙蓉^{アヘン}ニ比スレバ侵刺衝動ノ性緩ニ
 メ毫毛^{スウ}酷厲刺戟ノ害ナク又血液ノ運行ヲ増發セ
 不能ク發汗ス故ニ多ク熱病ニ用テ驗アリ○凡^レ虛
 弱ノ熱病ニ於テ蒸氣ヲ發スベキ症ニ用テ○熱病
 ノ患者虛弱ニメ血液ノ運行凝泣怠慢ナル症ハ是

ヲ用テ能^ク揮發健運シ腐敗ヲ遏ム故ニ腐敗熱惡性
 熱等ニ多ク用テ神經熱ニハ纈草根ヲ加テ尤良○
 鬱遏セル蒸氣ヲ發泄シ小便ヲ利ス故ニ是ヲ用テ
 温覆セズ蒸氣ヲ抑遏スレバ利尿ノ効多シ○大ニ
 勞動歩走スル等ニテ憊倦シ肢體痠痛彊拘不遂ス
 ルヲ治ス○傷冷熱^ニ炊衝走注痛風或ハ傷冷毒ヨ
 リ起ル咽喉炊腫ニ用ヒ發汗メ治ス或ハ接骨木花
 ノ泡劑ニ加ヘ用テ或ハ蒸湯劑トシ患部ニ施メ効
 アリ○一處ニ住留スル炊衝ニハ蒸餾醋少許ヲ加
 ヘ適意ノ酸味トシ用テ良○肺炊衝胸脇炊衝ニハ

海葱醋ヲ等分ニ加ヘ用テ尤効アリ○秋ノ間歇熱
 發作ノ時惡心嘔氣甚ク或ハ煩悶ノ熱劇キ者ハ即
 ナ膽液熱ナリ膽液腐敗シ其酷厲毒胃腸ニ鬱蓄ノ
 侵刺シ其諸症ヲ發スルヲ云是レ替
 留熱ニ在テハ或ハ胃腸熱ト稱ス膽液熱此症ハ吐劑ヲ用テ其毒ヲ滌
 除メ後此精四錢ヲ飲液ニ和シ是ニ阿芙蓉液五滴
 許加ヘ四分時毎ニ是ヲ用フベシ三四回用レバ微
 汗ヲ發メ熱解スコハシトキ每次右ノ如ク用レバ其發作漸ク
 減メ回復ス○服量一錢ヨリ三四錢マデ飲液ニ和
 シ日ニ數次用フ○過服シ或ハ久服スレバ下利ヲ
 發シ或ハ飲食消化ヲ妨グ○此液二錢ヲ温湯ニ加

ヘ服メ臥床ニ温覆シ少頃シテ復服スレハ微汗ヲ

發シ病毒ヲ驅發ス○利尿ニハ每服四錢日ニ兩次
 用フ過爾託亞根舍利別ヲ等分ニ加ヘ用テ殊ニ良

○蒸氣ヲ發スルニハ鹿角鹽少許ヲ加テ其効尤峻
 ナリ發汗スルニモ鹿角鹽ヲ加ヘ十二時中ニ十六

錢許用フベシ

○發汗スベキ諸症ハ左ノ方良驗アリ

傑列七發汗飲

接骨木傑列七五錢
 接骨木花水三錢

右一服トシ八分時中ニ服ス○外用ニハ蒸溺劑或

ハ洗藥トシ或ハ壓定巾ニ蘸シ施シ或ハ其症ニ隨
 ヒ水ヲ加ヘ搨クシ施メヨク凝結ヲ疏解シ諸腫ヲ
 消散ス炊衝ナキ寒腫肉腫或ハ瘰癧腫或ハ瘤ノ初
 發ニ施メ消散スルニ殊ニ効アリ或ハ是ニ失鳩答
 越幾斯劑ヲ加ヘ施メ頑硬腫腺腫ヲ消ス○打撲傷
 及ビ脉外肉裏ニ瘀血泛溢メ斑ヲ發スルニ施メヨ
 ク消散ス○眼中角膜ノ星翳或ハ水樣液ノ曇暗ニ
 點メ偉効アリ（依）（福）
發心疎毒ヲ驅發ス○味根或ハ每服四錢日ニ兩次

遠西醫方名物考卷五終

