

遠西醫方名物考

與加
下

卷八

✕

e 15



遠西醫方名物考標目

卷八

瓦老列里鹽	海鹽精	肥海鹽	瓦爾拔奴謨	葛縷子	海葱醋	海葱	龍沒海葱散	酒石海葱散	盧會海葱丸	海葱	海葱蜜	酒石海葱蜜	瓦爾拔奴謨膏	葛縷子油	海葱	金硫海葱散	桂健海葱散	海葱	海葱	海鹽炒乾法	鹽精舍利列	鹽精蜜	海鹽精	鹽精健胃水	海鹽精	甘海鹽精
-------	-----	-----	-------	-----	-----	----	-------	-------	-------	----	-----	-------	--------	------	----	-------	-------	----	----	-------	-------	-----	-----	-------	-----	------



499.2
E_m-3
8



No. 1433
IR e 11



富士川文庫

3275



葛私多兒 カス トル 葛私多 カス ト 葛私多 儂 カス ト 葛私多 儂 鎮瘕 カス ト 鎮瘕 儂 カス ト 鎮瘕 儂 飲

家猪脂淨製法

甘扁桃 扁桃 條 甘扁桃油 同 甘硝砂精 硝砂 條
 甘乳清 乳清 條 甘消石精 消石 條 甘綠礬精 綠礬 條
 甘汞 水銀 條 乾酪 乾酪 條 乾白撒兒末爾扶斯 鐵 條
 加羅蔑兒 水銀 條 乾白揮發鹽 重訂 內科 撰 要 第 百 八 章
 與孕礬酒石 酒石 條 孕鹼酒石 同 孕鹼酒石液 同

遠西醫方名物考卷八



遠西醫方名物考卷八

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴 校補

海葱 シキルラ

セイアイイン

海葱ノ義

形狀是レ歐羅巴洲ノ南地海邊ニ多ク生スル一種

ノ草ナリ冬月或ハ初春葉生スルコト五六枚龍舌草
 葉ニ似テ小長一尺餘潤三四寸許背凸面凹深綠色
 肥厚低テ地ニ塌ス是ヲ截レバ苦味ノ粘汁出ツ初
 夏葉盡ク枯レ立秋ノ頃一直莖ヲ抽ク一尺半許六
 瓣ノ白花莖ヲ圍テ長穗ヲ成シ其狀月下香花ノ如

遠西名物考

風雲堂藏

シ但一穗ノ中。花開タリ漸ク以テス。初メ下部ニ開
 キ萎テ後。中程綻ビ。終ニ頂上ニ及ブ。稀ニ黄花ノ者
 アリ。花後三稜ノ莢ヲ結ビ。肉ニ類ノ如キ赭黒ノ扁
 子充ツ。八九月實熟シ莖盡ク枯ル根ハ葱薤ノ如ク
 層片襲被メ球ヲ爲シ大サ拳ノ如シ或云兒頭ノ如ク大ナル枸櫞
ノ如シ外皮赭赤色下底ニ太キ鬚條多シ。淡黄色ノ粘
 汁アリ味苦辛。舌ヲ刺戟ス肌膚ニ貼スレハ侵蝕メ
 泡ヲ發ス。香臭ナシ。鐵刀ニテ截レバ其刀鏽テ用フ
 ベカラズ故ニ木刀或ハ象牙刀ヲ用フ新ナルハ白
 色ニメ粘液多シ。久ク曝乾シ或ハ焙乾度ニ過レバ

性力耗散ス○一種根葉氏ニ小ナルアリ根大ナル
 ハ花モ美ナリ○此草イスバニア伊スバ斯ニア把ニア尼亞イタリア意リア太リア里波亞波爾杜杜
 瓦爾シ齊シ西シ里シ亞シ以上歐歐羅羅巴色バ西セイ里イ亞イン亞細細州其州他州地
 中海ノ邊。沙地原野ニ自ラ生ス。和蘭ニハ園ニ培養
 ス。根ヲ分テ或ハ種ヲ下シ生ス風氣爽塏温燠ノ地。
 疏松交沙ノ濕地ヲ好ム。寒氣ニ堪ヘズ冬月春初ニ
 ハ密ニ覆ヒ養フベシ度物國國
 ○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來品ヲ用
 小フベシ

主治 根ヲ藥用トス生鮮ノ者効力尤峻ナリ乾ス者

小氣味稍減ス○性温。鑽透刺戟シ膠粘液ヲ疏釋シ小便ヲ驅泄スルニ奇効アル藥トス又湧吐ノ功アリ○小便ヲ分利スル諸器衰弱シ若クハ粘稠液壅滯メ發スル水腫小便閉ヲ治スルニ大効アリ○粘液過多ニメ肺咽喉或ハ腹中諸器ニ鬱聚スル諸病ヲ治ス故ニ粘痰多キ喘急及ビ水腫ニ關ベカラザル良藥トス然レ内藏ニ壅塞及頑硬腫アリ或ハ脉強ニメ煩渴乾燥ヲ兼ル諸症ハ此藥適當セズ○此藥吐劑トシ用ルアリ是ハ唯膠粘ノ汚液肺及ビ氣管ニ凝聚メ壅塞スルヲ疏解湧泄メ吐シ除クニ

用フ但是ニハ海葱蜜後ニ出ツヲ良トス痰欬喘滿短氣

促迫等ニ速効アリ○散劑或ハ丸藥トシ用ルニハ

四匁ヨリ十六匁ニ至ル但感觸シ易キ人ハ吐下等

ノ瞑眩アルガ故ニ初メ一匁許用ヒ患者堪ルニ隨

ヒ漸ク加フベシ或ハ香竈ノ藥ヲ加テ瞑眩ヲ抑制

スベシ假令バ幾那龍腦阿芙蓉泥菖根等ヲ加ルガ

如シ○過用スレバ吐下腹痛尿血ヲ發ス故ニ多血

家或ハ感觸シ易キ人或ハ尿道ニ潰瘍アル者ハ是

ヲ禁ス○專ラ利尿ノ効ヲ取ガ爲ニ阿芙蓉少許ヲ

加ヘ用ルアリ否ザレバ吐シ或ハ瀉メ利尿ノ功

減スルコトアレバナリ或ハ阿芙蓉劑ト互ニ用ヒテ
其吐ヲ防クモ良○海葱ハ粘痰留飲ヲ疏解ノ驅除
スルニ峻効アレハ焮衝ノ症ナキ者或ハ寒性粘液
質ノ人皮膚黧澹灰白脉小遲ニシテ肢體勞倦スル者
ニ用フベシ右ノ諸症ニ後方良効アリ

龍沒海葱散

海葱末一 龍腦十 沒藥一錢 沙糖四錢

右合和メ散劑トシ分テ十服トシ一日ニ四次干服
宛用フ○左ノ方亦良

金硫海葱丸

海葱末一 麴ロム 沒藥各二

金硫黃十 右調和シ三丸トシ每服三丸或ハ其餘日ニ
三四次用フ○留飲停水粘液ノ胃腸ニ鬱蓄スルヲ

小便ヨリ驅逐シ水腫脚腫黃疸經閉等ヲ治スルニ
左方捷効アリ清涼驅水ノ効アルヲ以テ熱アル
症ニ尤良

酒石海葱散

酒石英 沙糖 各六錢

右調和メ散劑トシ分テ十服トシ日ニ四次一服宛

用ヲ○海葱ハ動スレバ嘔氣ヲ發スルコト又ニ胃ノ運化ヲ妨ゲ漸ク食進マザル者アリ然ル片ハ是ヲ休メ或ハ健胃ノ藥ヲ加ヘ用フベシ○丸藥トシ用レバ胃ヲ攪擾スル患少シ左ノ方尤良

桂健海葱丸

小野海葱 末ニ 二錢
桂 二錢
健質亞那 一錢

薄荷油 六滴
過爾託亞根舍利別 適宜

右調和ノ百二十丸トシ三丸宛用ル一日四次但其症ニ隨テ増減ス○腹水或ハ粘液胸中ニ蓄滿スル症ハ酒石海葱蜜 海葱 良効アリ且腹水後方殊良

海葱酒

海葱 自一錢 至二錢
葡萄酒 酸性者 六分

右硝子壘ニ入レ固封シ煖處ニ浸ス一兩三日漚シ毎朝一匙或ハ二匙唯惡心ノミニテ吐セシメス海葱モ初メ下錢ヨリ堪ルニ隨ヒ加フヘシ或ハ惡心ヲ防クニ橙皮丁幾劑少許加ルモ良○又左ノ方驅水ノ効効アリテ嘔吐ヲ發スルコト無シ水煎ニ用

海葱丁幾去爾

○海葱 酒石鹽 各一匁
燒酒 八匁
小野

右硝子壘ニ入レ浸ス一兩三日。漚過メ滓ヲ去リ十

五滴ヨリ二十滴許。其症ニ隨テ増減シ服ス
 ○海葱ニ消石一倍ノ量ヲ加ヘ用ヒテヨシ小便ヲ
 利シ停水ヲ驅逐シ水腫ニ大効アリ然レ間吐下ス
 ルヲアリ○海葱末ニ峻下ノ藥ヲ加ヘ水腫ニ用ヒ
 テ停水ヲ瀉下シ速効ヲ取ルヲアリ此症ニハ左列
 方峻効アリ

盧會海葱丸
 海葱 末二十
 蘇甘沒扭謨 兩三日
 藥刺巴華爾斯 各半
 盧會 一
 右調和シ九丸トシ一時半或ハ二時毎ニ一丸ヲ服

ス○水腫ノ患者。右ノ如キ劑ヲ用ヒテ小便夥ク通
 シ腹脚等ノ腫減スル片ハ其收縮スル多少ニ隨テ
 其部ニ縛帶ヲ施シ又鐵劑ヲ用ヒテ其弛緩セル部
 ヲ故ニ復スベシ○若シ右ノ諸劑ヲ用ヒテ嘔吐ヲ
 發スル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ其吐ヲ鎮ムベシ○外
 敷シ瘡瘡ヲ治ス

海葱醋
 アゼチムシキル之羅
 インアゼイン蘭 海葱醋ノ義

製法
 蒸餾醋 二十四
 右硝子壘ニ入レ固封シ微火上ニ置テ浸シ藥氣ヲ

出ス于八日。絞テ汁ヲ取り是ニ燒酒ニ多ク加ヘ靜定ノ底塗ヲ去リ上清ヲ取り硝子燻ニ入レ固封シ貯フ其燒酒ヲ加ルハ久ク貯テ損敗セザラシムル

試ガ爲ナリ

主治 粘稠液ヲ稀釋シ肺ノ壅滯ヲ疏通シ頭痛痰欬

ヲ治ス ○適宜ニ水ヲ和シ救藥トメ咽喉焮腫ヲ消

散ス ○芥子泥ニ加ヘ外敷メ發泡藥トス 〔後〕

海葱蜜 「オツキメル」シキルヲ羅「ホ」ニフアゼン。ハシ。ゼ。ア

製法 海葱醋一北ハ其外諸スハ義

水蜜二北煮テ泡ヲ去ル者

右硝子燻ニ入レ振蕩シ混和シ磁鍋ニ内レ文火ニ

煮テ蜜ノ稠ト爲ス 〔後〕

主治 膠粘液ヲ稀釋シ留飲停水ヲ驅逐シ小便ヲ利

シ痰欬喘急ヲ治シ肺ノ頑痰ヲ祛キ黃疸ニ効アリ

○此劑ハ醋ノ酸性ト蜜ノ甘和ノ性トヲ以テ海葱

ノ酷厲毒ヲ抑制スル者ナリ。水腫及ビ小便ヲ利ス

ベキ諸症ニ大効アリ是ニ中和鹽ノ類ヲ加テ殊ニ

良効アリ即チ左ノ方ノ如シ

酒石海葱蜜 海葱蜜 四多 酒石葉 三錢

右研和シ一時或ハ一時半毎ニ二錢宛用ス。但嘔氣

ヲ發セバ服量ヲ減スベシ此劑胸水腹水及口胸中
 粘液壅滯スル諸症ニ殊効アリ○海葱蜜ハ粘痰吐
 シ難キ症ニ用ヒテ痰唾ヲ吐セシメ喘急等ニ捷効
 アリ○肺瘍ノ膿熟セルヲ潰破メ吐セシムルニ用
 フ○膠痰肺ニ粘結セル症ニ此劑一匁ニ硃砂精一
 錢ヲ和シ一時或ハ一時半ニ一匙或ハ二匙宛用ヒ
 テヨク痰ヲ咯出ス○是ニ薺ゴハム謨アム安ム沒ム尼ム亞ム幾ムニ茴香
 水ヲ加ヘ用ヒテ胸水病ニ奇効アリ○此劑殺蟲ノ
 効アリヨク虻蟲ヲ驅除ス○適宜ニ水ヲ加テ漱藥
 及咽喉焮腫ヲ治ス（原）（依）（西）（福）

葛縷子カクシイ

カクシイカクシイカクシイカクシイ又カクシイカクシイ羅ラホホフフコメコメイイシシ蘭ラン

形状 葛縷草ハ方莖中虛長一二尺許叢生シ枝多シ

葉胡蘿蔔葉ニ似テ細ニ分裂シ枝ニ排列ス柔ニシ

毛茸ナシ夏月五瓣ノ小白花ヲ開キ繖狀ヲ爲ス花

速ニ謝メ子ヲ結ブ茴香ニ似テ小差長ク灰褐色ニ

シ條理アリ味辛甘香氣アリ根細柔白或ハ黄色ナ

リ實熟スレバ莖枯テ宿根ス水邊濕地ヲ好ム煖國

ニ産ス根食用トスル者アリ○子ヲ取り藥用トス

○按ニ此藥和産未ダ詳ナラズ舶來ノ者ヲ用フ

べシ度濕云性功。茴香ノ如シト代用スベシ。○榕
按ニ此草伊吹防風ニ近シ唯方莖ナラズ根瘦硬
ナルヲ異ナリトス

主治 子性温。衝動開達。破氣驅風ノ劑トス。痙攣ヨリ
起ル疝腹痛ニ尤効アリ然レ焮衝壯熱或ハ膽液過
多。胃腸ニ汚物敗液壅滯スル症ニハ害アリ汚物ヲ
滌除ノ後用スベシ。○子宮衝逆ヲ治シ小便ヲ利シ
淋疾痛ヲ甘メ婦人乳汁ヲ増ス。○毳布ゴブ或ハ慰劑ト
ノ凝結ヲ疏解シ疝痛ニ効アリ又腫瘍硬腫ヲ消散
シ或ハ化熟ノ膿ヲ釀ス 物叔伍 依麻

葛縷子油 カ リ イ ホ レ ウ ム カ ル 左 イ 羅

製法 薄荷油及ヒ茴香油製法ト同シ

主治 葛縷子主治ノ病ニ用ヒテ尤効アリ十滴マデ
内服ス。○胃腸虚弱ニメ風氣痞脹疝痛腸攣急等ノ
患部ニ塗テ効アリ 天福

瓦爾拔奴謨羅 ガ ル バ ヌ ム ロ メ ト ピ ウ ム ロ ム ド ル ハ ル ス 蘭

是ハ亞弗利加州南北ノ諸國及ヒ伯兒西亞亞刺比
亞細亞洲齊西里亞歐羅巴洲等ニ産スルヘリ
ガバニムト名ル草及ヒ

其根ヨリ自ラ流滴シ或ハ是ヲ鑽刻ノ乳汁ノ如キ
 液ヲ取リ曝乾ノ凝固セルハル華爾斯様ノゴム護謨ナリ云
 此脂ハ護謨ト華爾斯トノ間ニ屬ス其故ハ是ヲ火
 二投スレバ酸ヲ發ス是レ華爾斯ハ質ナリ是ヲ水
 酒醋等ニ浸セバ溶化ス然レ油ニハ溶化セズ是レ
 護謨ノ質ナレバナリ依云此脂ハ護謨質多クハ華
 爾斯質少ク或云此脂ハ其質柔ニノ粘リ蠟ノ如ク
 一種ノ灌ホヨリ生スト一種ノ灌ホヨリ生スト
 黃色或ハ赤ヲ帶ビ臭氣蒜ノ如シ上好新鮮ナルハ
 淡白人粒ヲ雜ヘ大捺子ノ如シ○此脂二種アリ第
 一種ハ小ナル顆粒ヲ爲シ白色或ハ褐色ニノ淨潔
 微透亮光澤アリ乾固ク油樣ノ粘氣ヲ含ム柔ナレ
 且過ク粘著セズ磨メ細末トナル温ムレバ粘レ且

火氣ニテ溶化セズ火ニ投メ燃易ク味不佳ニ苦
 ク辛ヲ帶ビ竄透ノ臭氣アリ氣味且ニゴム護謨アンモ安沒尼
 亞アキ幾ノ如クニノ強シ是ハ上品トス○第二種ハ大
 塊ヲ爲シ多クハ赭色ニノ鐵鏽色ヲ帶ビ粘著メ不
 潔ノ蠟ノ如シ是ヲ下品トス然レ鮮美淡黃淨潔
 ノ疏脆ノ塊片ヲ成シ乾テ粘著セズ臭氣甚ク味苦
 辛或ハ裏ニ白キ光澤アル顆粒ヲ雜ルハ上品トス
 ○赭色或ハ種々汚色アリ或ハ木屑藁子仁塵土ヲ
 雜ヘ或ハ軟メ粘著シ或ハ臭氣ナク黑色ヲ帶ル
 ハ皆下品或ハ偽品トス○此脂ヲ生スル草ハ高サ

六七尺許。莖太。拇指ノ如シ。多ク傍枝ヲ分チ中心淡
 白ノ髓アリ葉。洋芹葉ニ似テ潤ク固ク尖テ缺裂シ
 四時常緑。味辛。臭甚シ。莖枝頭ニ五瓣ノ黄花簇生シ
 繖狀ヲ爲ス。花後微長キ扁圓ノ繖子生ス。繖子ハ刺ヲ
 發スノ條
 註 楮褐色。辛味烈香アリ。下品ノ脂ハ多ク此子ヲ
 雜フ根太ク鬚多ク灰白色ナリ。○此脂ノ顆粒ヲ成
 ス者ハ此草ニ含メル乳様ノ汁自然ニ莖枝及根ヨ
 リ流淌ノ凝結シ或ハ鑽刻メ流淌スルヲ取リ仔細
 ニ意ヲ用テ塵埃ヲ避ル者ナリ其大塊ヲ成シ下品
 ナルハ其草ヲ鑽刻メ倉卒ニ多ク其脂ヲ集メ取テ

塊ト爲ス者ナリ

○按ニ此脂和漢産未ダ詳ナラス舶來ヲ用ベシ

主治 性温。竄透酸性揮發ノ鹽油多シ又微水氣土氣

ヲ含メリ○神經ヲ強健ニシ堅硬ヲ軟化シ粘稠ヲ

稀釋シ痛ヲ止メ風氣ヲ驅リ諸藏ノ壅塞ヲ疏散ス

此要藥トス肺腸間膜肝脾等ノ壅塞硬腫ヲ疏散ス

是非以テ又子宮衝逆或ハ月經不調及ビ經閉ヲ治

スル一良藥トス。多ク丸藥トシ用フ又欬嗽喘急等

胸肺ノ粘液諸病ニ殊効ヲ奏シ或ハ癩症ヲ治シ蛇

蟲ヲ殺ス○經閉ニ左ノ方良効アリ

越謨通經飲

瓦爾技奴謨 一多 燒酒 十多

右溶化シ日ニ二卵匙宛適宜ノ飲液ニ和シ服ス○
此脂ヲ膏藥ニ加ヘ外敷ノ堅腫ヲ消シ凝固ヲ散シ
或ハ焮腫ヲ化熟ノ膿ヲ成ス故ニ焮熱アル腺腫或
ハ頑硬腫。瘰癧。骨腫。微毒結腫等ニ殊効アリ○是ヲ
沸湯ニ投メ溶シ上面ニ浮ム汚物ヲ去リ用フ或ハ
醋ニ浸シ溶シ煮テ適宜ニ凝固セシメ用ルモ良○
服量日一乃至ヨリ一月半ニ至ル
瓦爾技奴謨膏 一エムプラスト。デガ。ル。バ。ラム。羅

製法

瓦爾技奴謨 淘淨ノ汚物
若把兒麻膏 各一坩
的列竝底那 勿擲祭亞

黃蠟 半坩

右先ヅ的列竝底那ヲ慢火ニ上セ溶化シ漸次ニ餘

藥ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス 錢ニ碗砂四

主治 諸般ノ堅硬腫ヲ消散ス

海鹽 一サ。ル。マ。リ。ラ。ム。羅 一セ。ソ。ウ。ト。蘭

主治 温煖疏解ノ効アリ適宜ニ用レバ胃ヲ健運シ
飲食消化ヲ扶ク過用スレバ吐下スル一海水ノ如

シ或ハ一月ヨリ半錢許ヲ吉利詞參兒ノ藥液ニ加
 へ施メ下利ノ効ヲ扶ク或ハ浴湯トメ痛風ヲ治シ
 或ハ刺咬傷ノ洗藥トシ或ハ炒温テ袋ニ入レ貼メ
 腹痛ヲ治ス○尋常海鹽ハ土氣水氣多キ故ニ藥用
 トスルニハ精製ノ用フベシ (依) (編)

精製海鹽

ゲソイフルデゼソウト蘭

海鹽ヲ適宜ニ取り沸湯三倍ノ量ヲ加テ溶化シ其
 熱セル液ニ鹽蓬晶液 鹽蓬晶一北水 ヲ滴シ加レハ
 白塗ヲ生ス終ニ毫モ白塗生セサルニ至リ紙ニテ
 漚シ其液ヲ取り文火ニ上セ少許水氣ヲ蒸散ノ冷

處ニ置^ケハ芒ヲ結ブ其芒ヲ取リ乾シ貯フ (因)

海鹽炒乾法 ハルキナレテクレピタ考^ル

製法 海鹽ヲ磁鍋ニ入レ蓋ヲ覆ヒ炭火ニ上セ爆

鳴ノ粉ノ如クナリ透明ナラズ白色トナルニ至リ

硝子壘ニ入レ固封シ貯フ (因)

海鹽精 スヒリカスサリスマリニ羅

製法 發烟海鹽精 一多

蒸餾水 二多 (因) 二味等分トス

右硝子壘ニ内レ靜定スルヲ數日時々振蕩ノ漸ク

混和セシメ固封シ貯フ (因)

發烟海鹽精

ロケンデゼソウトタル又ゲーストハン
ゼソウトハンガラウベル又ソウト
此精常ニ蒸氣升發ノ烟ノ如シ故ニ名ク
海鹽精製シ炒乾ノ極細末ト爲ス者

製法



綠礬油 再餾ノ銳烈者 雨水 六多

右鹽ヲ潤大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ。雨水ヲ磁
器ニ入レ綠礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘ終ニ少
モ沸動セズ冷ルニ至テ管長キ硝子ノ漏斗ヲ以テ
徐々ニ是ヲ右ノ列篤兒多ニ加テヨ久鹽ト混和セ
シメ是ヲ沙火ニ入レ。硝子ノ承餾壘三個ヲ以テ其
列篤兒多ニ連屬ス。其法第一個ト第二個ノ承餾壘

ノ頸本ノ側ニ一小孔ヲ穿テ先ヅ列篤兒多ノ彎リ

タル頸ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿シ其頸本ノ孔ニ

彎リタル硝子ノ管ヲ挿シ其一端ヲ第二個壘ノ頸

ニ挿シ第二個ノ頸本ノ孔ニ亦彎リタル硝子管ヲ

挿シ其一端ヲ第三個壘ノ頸ニ挿テ連屬セシムル

ナリ但第二個ノ壘ニ蒸餾水四多 綠礬油ノ三分ヲ

入レ第三個ノ壘ニ蒸餾水六多 綠礬油ノ半ヲ入レ

皆其合際ヲ塗封シ初メ文火トシ漸ク火ヲ増シ蒸

餾メ遂ニ必モ蒸氣升ラザルニ至リ火ヲ下シ冷テ

後速ニ放開スレバ第一個第二個ノ壘ニアル精ハ

尤銳烈ナリ第三個壘ノ精ハ緩弱ナリ各是ヲ分チ
硝子壘ニ移シ硝子塞ニテ固閉シ此ニ蠟ヲ塗リ貯
フベシ右如承餾壘ヲ連屬スルハ其蒸氣ヲ水中ニ
吸收スルガ爲ナリ○此精ハ酸性極テ猛烈ナルヲ
以テ其硝子塞ヲ放テハ蒸氣升發スルノ烟ノ如シ
○其綠礬油多シ此精中ニ混シ清潔ナラザルヲアリ
綠礬油雜バ其斯ノ如キ片ハ精製炒乾ノ海鹽ニ多
色清澄ナラズ
綠礬油ノ六分ヲ加テ再ビ蒸餾メ精ヲ取ルベシ是
ニ由テ淨潔トナルナリ

又法

海鹽

精製者炒乾極細末ト爲ス
六北

綠礬油

三北

蒸餾水

二北

右鹽ヲ頸彎リタル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ニ
入レ潤キ蒸餾壘ヲ接合シ蒸餾水ヲ磁器ニ入レ綠
礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘテ必モ沸騰セズ冷
ルニ至テ硝子ノ漏斗ヲ以テ徐々ニ是ヲ右ノ列篤
兒多ニ加テ鹽ト混和セシメ其口列篤兒多ノ腹ヲ
栓ニテ塞キ膠泥ニテ其罅隙及ビ壘ノ接際ヲ塗封
シ初メ文火トシ鹽精縷狀ヲ爲シテ列篤兒多ノ頸
ニ升リ委蛇彎曲メ承餾壘ニ下ル片ニ漸ク火ヲ増
テ遂ニ沙鍋通紅トナリ蒸氣升ラズ精下ラザルニ

至テ放冷シ速ニ其精ヲ硝子壘ニ寫シ硝子塞ニテ固閉シ冷處ニ貯フ

主治 峻酸ノ性。清涼ノ効。綠礬精。消石精ノ如シ。○血液ノ腐敗ヲ遏ル効。綠礬精ニ勝レリ。清涼飲劑ニ加ヘ清爽ノ味アリテ渴ヲ止メ一切腐敗性ノ熱病ニ乾燥熱ヲ兼子咽喉燥キ頭痛譫語或ハ血液烱解崩壞ノ失血等ヲ兼ルニ大効アリ。○總テ此精ヲ内服スルニハ水ヲ加ヘ稀クシ酸美ト爲シ用フベシ。右ノ如キ腐敗性ノ熱病ニハ左ノ舍利別尤良

鹽精舍利別

二 沸湯 九 舍利別 一 海鹽精 一 鐵

右調和シ半時ニ匙死用フ。○腐敗熱神經熱ニ於

テ血液腐敗ヲ爲ス。多キホド此精逾効アリ。然レ

諸熱病腐敗ナク唯炊衝ヲ兼此者ハ害アリ。炊衝多

キホド害モ亦甚シ是レ鹽精ノ精微ナル酸性ヲ以

テ其炊衝シテ强硬ナル諸脉纖維ヲ衝動メ逾强硬

ナラシメ諸症ヲ増劇スレバナリ。故ニ肺炊衝胸脇

炊衝ニ用レバ其乾欬ヲ増發シ遂ニ勞欬トナリ救

ハ出サルニ至ル。麻疹ニモ亦害アリ其熱毒ニテ肺

ニ炊衝ヲ發スレバナリ。○發斑熱モ腐敗ニ屬スル

症ニハ良驗アリ然レ自餘ノ症ニハ害アリ
 熱間歇熱モ炊衝ヲ兼ガル者ニ多ク驗アリ
 腐敗ヲ兼ル者ニ偉効アリ勞瘵熱ニハ總テ害アリ
 小便ヲ利スルニ峻効アリ故ニ水腫ニ十滴ヨ
 リ二十滴マデ適宜ノ湯液ニ加ヘ用テ驅水藥ト
 ス
 胃衰弱ノ食進マズ或ハ嘔吐ヲ兼ル症ヲ治シ
 胃液粘液ヲ稀釋ス左ノ方良効アリ
 鹽精健胃水 海鹽 四錢 水 四升
 右溶化シ是ニ海鹽精二錢ヲ加ヘ調和シ卵匙ニ一
 二匙宛冷水一盞ニ和シ毎日數次用ヒテ諸症全治

スルニ至ルベシ或ハ十滴ヨリ二十滴マデ適宜ノ
 稀キ飲液ニ滴シ酸美口ニ適フヲ度トシ用ルモ良
 ○外用メ腐壞ヲ遏ル峻効ノ藥トス漱劑或ハ塗藥
 トメ咽喉頰裏斷頸等ノ潰瘍滋蔓腐爛シ或ハ其骨
 ヲ蝕スル症ニ大効ヲ奏シ殊ニ失苟兒陪苦ヨリ發
 スル口中斷頸ノ潰爛ヲ遏ルニ神効アルヲ他ニ比
 スベキ者ナシ是ニ玫瑰蜜沒藥丁幾劑龍腦ヲ加ヘ
 施ス殊ニ良○口頸斷舌ニ癌瘡ヲ生メ臭穢腐爛侵
 蝕スル症ハ左ノ方奇効アリ

鹽精蜜

右溶化シ綠礬精ヲ一滴宛加ヘ終ニ火モ沸騰セザ
 ルニ至テ漚過シ文火ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ試ニ其
 液ヲ冷石上ニ滴メ結芒スル片ハ火ヲ下シ冷處ニ
 於テ芒ヲ結バシム其芒即チ瓦老別里鹽ナリ是ヲ
 取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯ス其餘ハ芒ヲ結バシム
 此液ハ前法ノ如ク煮テ冷處ニ置キ芒ヲ結バシム
 又法ハ發烟海鹽精ヲ製メ後其列篤兒多ニ殘リタ
 ル白キ凝固セル渣鹽ヲ取リ適宜ニ水ヲ加テ溶化
 ス是酸性多キ故ニ鹹蓬鹽晶ヲ少許宛加レバ沸騰

ス終ニ火モ滾動セザルニ至テ紙ニテ漚シ冷處ニ
 置キハ芒ヲ結ブ。是ヲ取リ貯フ此芒白色ニメ半透
 亮。味苦鹹。是ニ水三倍ノ量ヲ加レバ溶化ス。又氣ハ
 觸テ消化シ盡ク粉末トナル
 ○榕按ニ洋船齋來ル瓦老別里鹽ヲ見ルニ其氣
 味形質漢舶來ノ芒硝ト毫モ異ナルコトナシ但シ其
 製法ニ於テハ大同小異アレ其質ハ一ナリ猶
 諸厄利斯瀉利鹽ハ元來越貌宋ノ泉ヲ煮テ製ス
 ル者ナレ用或ハ海水ヲ煮テ製シ或ハ山ヨリ掘
 取テ製スル者モ其氣味性功毫モ差ハルカ如シ

〔主治〕性寒味苦鹹綠礬性酸氣ト亞兒加利鹽ト結成セル中和鹽ナリ消石ニ比スレハ刺戟セズ其性孕礬酒石ノ如シ然レハ少許用ヒテ瀉下シ又凝結ヲ溶解シ粘稠ヲ稀釋シ大小便ヲ利シ血液ノ沸騰ヲ降鎮シ熾熱ヲ涼解スル良藥トス一吋毎キ一刃宛用フ〇閒歇熱ノ壯熱ヲ涼解スルニ半吋毎ニ半刃ヨリ一刃マテ用ヒテ良〇少宛數用レバ凝結ヲ疏解スル功ヲ稱ス半刃ヨリ一刃マテ飲液ニ溶シ用レバ瀉下ス此物氣ニ觸レバ盡ク風化シ粉末トナル是其晶ノ質ヲ成ス所ノ水氣脱シテ氣中ノ濕ヲ

引クヲナク乾ケバナリ故ニ此粉末ハ瀉下ノ効多シ四錢許ヲ用ヒテ大ニ瀉下ス〇外敷ノ腐敗ヲ遏ム寒壞疽ニ効アリ

甘海鹽精

スピリタス・サリス・ドルシス・羅

製法

海鹽

炒乾者 黑礬ス 澆瓦ノ稱 黑礬ヲ繪 罌

亞爾箇兒

十二号 燒酒條出

綠礬油

四号

右鹽ト黑礬ト合和シ頸長キ硝子ノ列篤兒多ト入レ亞爾箇兒ト綠礬油ヲ合和ノ其列篤兒多ト加ヘ沙鍋ニ入レ承餾壘ヲ接シ其接際ヲ塗封シ慢火ニテ蒸餾シテ殆ト其液ノ三分ノ二ヲ取り硝子壘

ニ收メ固封シ貯フ〔按〕

主治海鹽精ニ比スレバ性緩和ニシテ酷烈ナラズ又

風化揮發ノ油氣ヲ含シ酸美ニシテ甘消石精及ビ海鹽ノ如

撒謨ノ質アル故ニ内服ノ甘消石精及ビ海鹽ノ如

クニシテ又甘和ノ効アリ〔服量四滴ヨリ十二滴

許。飲液ニ點服シ或ハ沙糖ヲ和シ舍利別ノ如クシ

甘一焉ヲ用フ〔収〕〔医〕

葛私多兒カストール羅ヘーフル蘭蘭

葛私多兒ハ水陸共ニ住ム一種ノ獸ナリ牝牡共ニ

陰處ノ兩側ニ四個ノ囊アリ左右二個宛合ノ四個

囊ヲ上囊ト名ケ後部ナリ左右共ニ前部ノ

是ヲ取テ藥用ニ充ツ是ヲ葛私多カストール儂謨ト曰フ此猶

ノ香アル如キ者ナリ其此獸四大洲ノ諸地彼此ニ

形狀主治次條ニ詳ナリ北亞墨利加止白里亞細亞洲

産スレバ殊ニ加拿達北亞墨利加止白里亞細亞洲

没斯箇未亞入爾馬尼亞波羅泥亞共ニ歐羅

名ニ多シ軀長大約二三尺許。稀ニ四尺ニ及ブ者ア

リ其圍略其長ニ稱フ。然レ肉肥厚ニシテ軀短ク見ユ。

頭ハ大約圓ク喙長ク齒上下各十枚互咬メ缺人如

ク太ク銛利ニシテ力強シ是ヲ以テ樹ヲ倒シ或ハ斷

ツ。切齒ト齧齒ハ殊ニ太クメ銳利ナリ眼小ク黒シ
 耳短ク圓クメ外面ハ毛被ヒ裏面ハ滑澤ナリ。脚短
 ク前脚殊ニ短クメ五六寸ニ過キズ。後脚扁クメ鱗
 被ヒ水鳥ノ脚ノ如シ五指アリ後脚ハ指間ニ膜ア
 リテ連リ蹠ノ如シ故ニ後脚ト尾ヲ以テ能ク水ヲ
 游グ。前脚ハ五指皆離レテ膜ナク手ノ用ヲ爲シヨ
 ク物ヲ把ル^ト。獼猴ノ如シ筋肉厚ク勁硬ニメ力強
 シ指端皆爪アリ斜ニ尖リ管ヲ爲テ翮ノ如シ尾ハ
 扁圓ニメ長八九寸ヨリ一尺許アリ。其根濶四拇指
 横徑許。中程ハ五拇指横徑許。厚一拇指横徑許。遍ク

鱗アリテ魚ノ如シ。每鱗形六稜濶三四分許。厚クメ
 革ノ如シ其隙ニ少ク小毛アリ故ニ喙ヨリ股マデ
 ハ鼠ニ似タリ股ヨリ尾ニ至テハ殆ト水鳥ノ如シ
 故ニ首ヨリ股マデハ味。獸肉ト同シ。後脚及ヒ尾ハ
 味。魚肉ノ如シ。總身ノ毛柔ニメ細ク栗殻色或ハ褐
 色ニメ光澤アリ北方寒地ニ住ム者ハ色濃ク或ハ
 黒シ。稀ニ灰白ナルアリ但其毛ニ様アリ一ハ長ク
 メ遍ク表面ニ見ユ大約一寸六七分許。首尾ニ至レ
 バ漸ク短ク差硬シ脚ハ毛甚ク短シ。一ハ其裏ニ在
 テ短ク遍ク膚ニ著キ長八分餘。毳ノ如ク甚ク纖細

柔軟稠密ナリ脇腹ノ毛ハ最モ柔ニシ是ヲ以テ多ク笠裘モイヤス莫大小等ニ造ル牝ハ四乳アリ孕テ四個月ニメ産ス每産三四子ヲ生ス。畢丸甚ダ小ク腹腿合縫ノ凹處ニ在リ是ヲ展レバ殆ト狗ノ畢丸ノ如シ○此獸性温順ニメ馴易シ陸ニ在テハ樹實枝葉ヲ食ヒ河ニ在テハ魚鰕ノ類ヲ食フ又草木ノ枝葉ヲ取テ冬月ノ食物ニ備ヘ蓄ヘ且嚴寒ヲ防クガ爲ニ夏月大河湖澤ノ邊ニ洞穴ヲ穿ツテ五六尺許ニメ其内ニ居室ヲ造リ出入ノ穴ヲ水中ニ通ス。或ハ河中ニ堤ヲ築テ水勢ヲ堰ギ其下流ノ岸ニ沿テ

厰ヲ造ルコト甚ダ巧ニメ伎倆殆ト人工ニ異ナラズ

乃チ此獸數百群リ集テ相共シハサキ力ヲ戮セ許多ノ樹

ヲ嚙截リ挽ヒキ來テ基趾ヲ設ク大小ノ柱材ヲ以テ

室ヲ構ヘ内ニ木ヲ格シ床ヲ造テ三層樓ノ如クシ

其内ニ間隔ヲ作シテ各房ヲ設ク其罅隙ハ悉ク樹

枝ヲ挿シシキリ重ニ樹葉ヲ雜テ泥ト爲シ尾ニ載テ其隔

壁及ビ外圍屋上ヲ打チ塗ルシラチ日數回ニメ内外平滑。

堅牢ナル牆壁ヲ造リ全形圓ク或ハ卵圓ニメ高サ

三四尺許。其洞穴中ニ在テ最モ大ナルハ丈餘ノ者

アリ。内徑八尺或ハ一丈許。其小ナルハ四五尺許ア

リ此獸牝牡相共ニ各房ニ住ス厥小ナルハ五六個。
 厥大ナレバ三十個モ住ス其下層ニハ水ヲ瀦メ綠
 草樹枝ヲ浸シ蓄ヘ第二層ハ水際ニ接シ是ニ住テ
 常ニ其尾ト股脚ヲ水中ニ濡ス。否ラレバ生活シ難
 シ若シ水高ク滿レバ第三層ニ住ム斯ノ如ク黨ヲ
 結ビ類ヲ集テ群居シ又其造築甚ダ堅固ニメ大雨
 洪水ト雖モ損壞セズト云 （叔）

○榕按ニ此獸本邦所産未ダ詳ナラズ是坤輿
 外紀ニ載ル般第狗ナリ外紀ニ云歐羅巴洲意太
 理亞國有河名巴鐸入海河口産般第狗晝潛身於

水夜卧旱地毛色不一以黑爲貴能嚙樹木其利如

刀又其般第狗ノ圖本編卷三十六ニ出ル葛私多

兒獸ノ圖ト差異ナシ

葛私多樓謨 カストトレム ロ ベ フ ル ゲ イル 蘭

葛私多兒獸 カストトレム 前條 ニ 出 ル ハ 牝 牡 牝 ニ 横 骨 ノ 下 股 間 ニ 四 個

ノ囊アリ大サ卵ノ如シ其二個ハ前部ニ在リ是ヲ

上囊ト名ク所謂葛私多樓謨ヲ此ニ藏ム其餘二個

ハ差後部ニ在リ是ヲ下囊ト名ク此ニ稠厚ノ液ヲ

藏ム其氣葛私多樓謨ニ似テ性異ナリ○上囊ハ陰

具ノ左右ニ傍テ相對峙シ囊底半規形ヲ爲シテ皮

上ニ隆起ス剖解ノ囊ヲ出セバ全形梨子ノ如シ其
 獸ノ大小ニ隨テ囊亦大小アレモ中等ノ者ハ長三
 姆指横徑許。底ノ潤一姆指半横徑許。其本ニ循ヒ漸
 ク細クメ一姆指横徑許トナリ直腸ニ連ル。下囊ハ
 肛門ノ左右ニ傍テ相對峙シ皮内ニ在リ其部ノ皮
 ヲ剥バ囊底見ユ。長ニ姆指横徑許。底潤一姆指横徑
 餘。其本漸ク細クメ直腸ニ連ル。○上囊ハ三襲ノ膜
 ヲ被フ。外膜ハ甚ダ硬固ナリ第二膜ハ厚ク柔ニシ
 許多人脉絡循行ス。裏膜ハ襞積多ク是ヲ展レバ三
 倍ノ長トナル。表面滑澤灰白色或ハ栗殼色及ビ帶

赭色ノ斑點アリ。裏面粗糙。細絡錯綜シ淡黄色ノ脂

液充ツ此液ノ乾固セル者即チ葛私多樓謨ナリ味辛ニシテ苦ヲ帶ビ臭

烈竄透其氣不佳ナリ此囊ヲ取り風乾スルト一月

許。或ハ是ヲ烟窻ニ掛レバ五六日ニシテ乾固ス。上品

ハ囊大ク重ク栗殼色。諸膜乾固メ破裂シ易ク裏膜

襞積アリテ厚ク革ノ如ク其液乾固疏脆ニシテ破碎

シ易ク蜜及ビ蠟ヲ雜ヘ細膜ヲ以テ組織シタル者

ノ如シ桂色或ハ栗殼色ニシテ黄ヲ帶ビ味辛苦。甚ダ

竄透スル一種ノ臭氣アリ火ニ投スレバ炎ヲ發シ

臭氣殊ニ甚ダシ新鮮ナルハ稠固ニシテ粘ラズ橙皮

色ニク竄透ノ氣甚ダシ。販賣ノ者ハ炮リテ赭色トナリ乾固ニシテ破碎シ易シ○此物止白里及ビ没斯箇末亞^{出上ニ}産ヲ上品トス其囊赤色ヲ帶ビ稍圓ク大ク重實キメノ硬固ナリ横斷スレバ裏赤赭色ニメ肝藏ノ色人如キ者充テ細膜筋條ノ組織セル如キモノニテ包裹シ摩シテ粉碎トナリ易シ然レ乾燥セズ北亞墨利加洲及ビ波羅泥亞^{ボロネア}諸厄利亞^{エリヤ}等ノ産ハ下品トス其囊充實セズ且濕リテ脂メ如ク或ハ燥テ滋潤ナシ凡ソ此物久ク經テ黒ク且臭氣ナキハ藥用ニ充タズ○此物價貴キ故ニ偽品多シ或ハ

秤量ヲ増ガ爲ニ鉛錫等ノ丸ヲ囊中ニ挿ス者アリ是ヲ横斷スレバ其丸見ル或ハ撒瓦百奴^{ガペヌ}謨^ム臭氣ア名ヲ雜ヘ其囊ニ充ル者アリ是ハ其臭氣ニテ知ルベシ凡ソ眞品ハ人工ニテ贗造スベカラザル所ノ細膜ノ組織セル者其囊中ニアルヲ以テ鑒定スベシ或ハ特牛ノ鞞丸ノ包膜ヲ取り是ニ前説ノ物ヲ雜ヘ實チテ葛私多^{カストト}樓謨^{レダム}ノ全形ヲ偽造スル者アリ或ハ葛私多^{カストト}樓謨^{レダム}ニ蜜ヲ煉和シ其囊ニ充ル者アリ是ハ其囊ヲ押ス片ハ蜜ノ腐敗セル者逆出スルヲ以テ知ルベシ○下囊中ニハ淡黄色ニメ油ノ如ク

蜜人如キ稠厚ノ液アリ其氣微葛私多僂謨ニ似夕
以凡久ヲ經レバ凝結シ其質及ビ色モ獸類ノ脂膏
ノ如シ故ニ藥用トセズ

主治 竄透油及ビ揮發鹽多シ頭腦神經ノ壅塞ヲ開
キ痙攣搐掣ノ諸症ヲ鎮定スル聖藥トス。故ニ子宮
衝逆風氣痞滯ノ諸症或ハ鬱憂病。癩等ノ諸症及ビ
頭眩眩暈肢體顫振調動ニ奇効ヲ奏ス或ハ顯草阿片
等ヲ加テ尤効アリ○粘痰多キ喘息ヲ治ス或ハ嗽
衝ナキ諸疝腹痛ニ是ヲ治疝ノ劑ニ加ヘ用テ驗ア
リ○子宮病ヨリ發スル經閉ヲ通スルニ屢効アリ

末トシ半錢マテ數用フ然レモ尋常多ク是ヲ用ル
能ハザルキハ臭氣アル僂謨類阿魏 僂謨 安沒尼亞
或ハ琥珀ノ製劑ヲ以テ代用スベシ○妊婦惡疽ニ
効アリ但此症ハ甘消石精ヲ數日連服シテ亦同ク
驗アリ○産後惡露ヲ下ス良藥トス○舌非言語蹇
澁ニ末トシ舌下ニ塗テ効アリ○子宮衝逆及ビ痙
攣其他前說ノ諸症ニ左ノ丁幾去爾奇効アリ

鎮痙丁幾去爾

葛私多僂謨カストレブム 阿魏アウイ 硃砂シュサ 加燒酒精カカウ
右調勻シ硝子壘ニ入レ固封シ淹ス下六日其間數

其壘ヲ振蕩スベシ。服量十五滴ヨリ四十滴ヲテ日ニ數次。葡萄酒ニ點服ス。○此藥末トシ用ルニハ一匁ヨリ十匁或ハ半錢マテ沙糖ニ和シ或ハ散劑丸

藥或ハ飲劑ニ和シ用ス。○叔國 伍國

葛私多僂謨カストロレウム丁幾去爾テイキンキテッセル羅ラ

製法 葛私多僂謨カストロレウム適宜テイケンキ

燒酒ニ十五度者八倍ハ

右硝子壘ニ入レ淹スヒタテ六日布片ニテ瀝シ又紙ニ

瀝シ滓ヲ去リ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治 葛私多僂謨カストロレウム主治ノ諸病ニ尤良○卒倒痲痺子

宮衝逆ノ苦悶促迫ヲ速ニ解ス○風氣痞滯ノ疝腹痛ニ甘消石精ヲ加ヘ用テ峻効アリ○服量一二滴ヨリ五十滴ニ至ル葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス○子宮病等一切痲攣ノ諸症ニ阿芙蓉劑ヲ加ヘ用テ殊ニ良左ノ方尤効アリ

葛私多僂謨鎮痲飲

葛私多僂謨カストロレウム丁幾去爾テイキンキテッセル二錢 薄荷水ハクニ

密涅刺爾鎮痛液ミネキラル一錢石膽イチケン 橙皮舍利別テイヒ

舍電發謨阿芙蓉液セイドン四十滴

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ其症治メ後仍半時

二一匙宛用フ○葛私多カスト儂レウム謨テインキテウ丁幾去爾テインキテウ得難テインキテウキレ片ハ
琥珀テインキテウ丁幾去爾テインキテウ或ハ阿魏テインキテウ丁幾去爾テインキテウ少許ヲ以テ代用
スルモ亦効アリ依

○按ニ葛私多カスト儂レウム謨テインキテウ丁幾去爾テインキテウ缺レルハ左ノ方ヲ
代用スベシ依

纈草丁幾去爾

○干亞爾ア箇兒ル十六テウヲ燒酒ニ出ツテ纈草根三テウ粗末ハ

右硝子壘ニ内レ浸シ其色出ルニ至テ絞リ瀝テ
滓ヲ去リ又纈草根ノ細末三テウヲ其液ニ加ヘ浸
宮ノ藥氣ヲ出シ絞リ瀝シ靜定ノ其渣ヲ去リ此液

西八テウニ亞ア的兒ル綠レ礬ニ出テ三テウヲ調和シ硝子壘ニ内

レ固封シ貯フ○服量二十滴ヨリ四十滴マデ時
々葡萄酒ニ點服ス

主治此丁幾去爾ハ神經ノ知覺鈍クナリ或ハ其

運營錯誤スル症オトヘハ假令神經熱子宮病ノ諸症等ニ
奇効アリ凡葛私多儂謨或ハ麝香ヲ用ベキ諸症

ニ皆甚ダ驗アリ或ハ薄弱ニノ感動シ易キ人ハ
葛私多儂謨及ビ麝香纈草根ノ氣ニ堪ズノ嫌惡

ムヲアルハ此劑ヲ代用ノ同ク良効ヲ奏ス或
痙攣ノ諸症甚キ者ハ阿芙蓉液ヲ加ヘ用ベシ依

家猪脂淨製法

「ゲソイフルデハルケンス」ルセル蘭
 家猪脂。適宜ニ取り膜ヲ去リ細ニ截リ水ニテ數回
 洗テ其水清澄トナルニ至リ清キ鐵罐ニ入レ微火ニ
 上テ溶化セシメ木匙ニテ攪セ温ニ乘メ布片ニテ
 絞り漉シ磁壺ニ入貯フ○諸獸脂。淨製法皆是ニ同

〔按〕

遠西醫方名物考卷八終

