

遠西醫方名物考

仁保
閑

卷四

✕
e 13



第1111号
3305

遠西醫方名物考標目

卷四

肉豆蔻

肉豆蔻油

肉豆蔻榨油
肉豆蔻蒸餾油

肉豆蔻摩油方

肉豆蔻水

肉豆蔻丁幾去爾

暹羅安質沒扭

安質沒扭

保蓬砂

蓬董舍利別

雜膜蘭通經散

雲砂散

刺篤亞斯

精製刺篤亞斯

物耶獨亞斯

蒲公英越幾斯劑

遠西醫方名物考

卷四

標目

風雲堂藏

499, 2
Em-4
2

12 e 13

No 1397

榛齋宇田川先生著



遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌





忽弗滿鎮痛液

石膽ノ條

福窟篤呼篤兒

綠礬ノ下

卷三十五ノ二葉ニ陰ス

閉扁桃

甘扁桃油

扁桃消厲飲

苦扁桃油

扁桃乳

歇巴兒安質沒扭

安質沒扭

勿搦祭亞的列並底那

的列並底那

勿搦祭亞石鹼

石鹼

覽乙典埕羅屈

刺必斯加烏斯蟄屈斯

覽乙篤密埕兒

水銀ノ條

遠西醫方名物考卷四

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴按補

肉豆蔻

ミクスモスカクタ

羅

モスカトノト

蘭

主治 辛温芳香ニメ收滿シ竄透揮發ノ油及ビ鹽ヲ

含三破氣驅風ノ効アリ又頭腦神經胃子宮ヲ强健

ニシ諸腸ノ弛弱虚衰ヲ因ル經久ハ下利ヲ止ル失

氣昏眩疝痛呃逆小便失禁或ハ粘液寒氣ヲ起ル

風氣痞滯ノ諸症腹攣痛腸鳴等ヲ治シ孕胎ヲ健固

シ墮胎ヲ防護ス

伍叔

肉豆蔻油 「オレウム、ニクス、モスカータ」 羅

是レ搾油ト蒸餾油トノ二種アリ。然レ其性功同シ。是ヲ蒸餾スト雖モ他人蒸餾油ノ如キ竄透揮發ノ香氣多ク出ルヲナシ故ニ多ク搾油ヲ用ヒ蒸餾油ヲ用ルヲ稀ナリ。

搾油

「オレウム、ニクス、モスカータ」 羅

製法

肉豆蔻 一斗

右石臼ニ入レ搗テ泥ト爲シ毛篩ニ入レ布巾ヲ覆ヒ罐ニ熱湯ヲ盛り文火ニ上セ右ノ毛篩ヲ罐上ニ置テ肉豆蔻泥熱スル時速ニ取テ布袋ニ盛り鐵版

ヲ熱湯ニ浸シ温メテ其袋ヲ夾ミ搾ニ肉豆蔻油ヲ

搾リ取ルナリ。但油冷レバ凝固シ酪ノ如シ故ニ是

ヲ温メ燂シ硝子壺ニ收メ固封シ貯スベシ。○肉豆

蔻ヲ細ニ剉シ搗テ鍋ニ入レ温メ搾テ油ヲ取ル法

又レ此宜シカラズ火氣ニテ其油ニ含メル竄透揮

發ニ精氣耗散スレバナリ。○搾油ニ三種アリ第一

種ハ尤芳香ニシテ黄色ヲ帶ヒ透亮粘テ稀シ或ハ血

色アリ。冷レバ凝結メ蠟ノ如シ。磁製小壺ニ入レ取

ル。是ハ上品中々。然レ火久貯レバ赭赤色ニシテ第

二種ハ第一種ニ比スレバ其色淡薄ニシテ性功モ劣

肉豆蔻。方形ノ小塊ト爲シ。取テ第三種ハ蠟。羊脂。椰子油ニ肉豆蔻油少許ヲ加ヘ製メ府刺油ト稱シ取テ。

是ヲ下品トス藥用ニ堪ズ（因）。

蒸餾油 オレウム。デスチルリウム。トリクス。モスカタル。ウ

製法 丁香。蒸餾油ノ製法ト同シ。○肉豆蔻。蒸餾油

ハ清稀ナリ然レ性功榨油ト同シ（因）。

主治 性熱。虛冷ヲ温壯ニシ破氣驅風ノ良驗ヲ稱ス

内服シ或ハ外敷メ肉豆蔻主治ノ諸病ニ峻效アリ

○服量四匁ヨリ十匁マデ適宜ノ飲液ニ點服ス○

外敷メ鎮痙疏通ノ功ヲ稱シ麻痺不遂。痙攣搐掣。痛

風脚痛或ハ劇キ頭痛等總テ神經ノ諸症ニ驗アリ

乳香油ヲ加ヘ施ノ尤良○是ヲ股部ニ擦テ痞氣鬱

滯ヨリ起ル疝痛。胃痛。或ハ生疔。再發此嘔吐ヲ治ス又

左ノ方良驗アリ（因）。

肉豆蔻摩油方 （因）。

肉豆蔻油。薄荷油。五（因）。

阿芙蓉液。固（因）。

右合和。患部ニ塗擦スル日共三四次（因）。

肉豆蔻水。粗末ニ北（因）。

製法 肉豆蔻 粗末ニ北（因）。

燒酒 六十比

右調和シ罐ニ入レ浸ス_一二三日。文火ニ上セ蒸餾
 シ其精露。氣味淡薄ナルニ至テ火ヲ下シ其露ヲ取
 リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ○甘味ヲ好ム者ハ其
 露水ニ茴香或ハ沙糖七比ヲ加ヘ浸スベシ美黄色
 ト爲スニハ鬱金ヲ適宜ニ加ヘ浸スベシ○其氣味
 悍烈ナルヲ嫌フ者ハ方中ノ燒酒ニ水十比ヲ加ヘ
 蒸餾スベシ**主治**肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ峻効
 アリ○

肉豆蔻テウキ丁テウトル幾テウトル去爾テウトル テウトルティンキテウトルエテウトルニクステウトルスモステウトルカータテウトル テウトル羅

製法 肉豆蔻

搗碎者四多

右硝子壘ニ入レ銳烈ノ燒酒ヲ加テ藥料ノ上ニ指
 横徑ニ至リ其口ヲ密封シ爐邊ニ置テ時々其壘ヲ
 振蕩シ藥氣ヲ出シ憑シ貯フ○府利ノ未少許ヲ加
 レバ氣味尤芳烈ナリ○適宜ニ沙糖ヲ加ヘ憑シ用
 レバ味甘美ナリ**主治**肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ
 峻効アリ○

遠西各物考 卷四 四 風雲堂藏

（以下為模糊文字，難以辨認）

保

蓬砂

蓬砂ハ諸金坑殊ニ銅坑ニ於テ自然ニ生スル一種

ノ鹽ナリ其質ボラス。此種蓬砂ニ含ム

蘇蓬鹽。種ノ亞。混合ノ成ル。製煉術ヲ以テ綠礬

其酸性鹽ト見ル。細分ル。其酸性鹽ハ細屑

ノ狀ヲ爲シ。光澤アル。微細ノ真珠ノ如ク。細屑

難シ。百兒西亞。國名。等ノ山坑ニ出テ未ダ製煉

セザル者ハ粘汚ニシテ淨潔ナラス。是ヲ生蓬砂ト名

ク。亞。莫。斯。的。爾。達。謨。和。蘭。市。是。ヲ。精。製。ス。上。品。其

塊大ク重ク乾固潔白。稍透亮ニシテ六稜ヲ爲シ兩端

鈍ナリ。風化セズ貯テ濕ラズ。ヨク水ニ溶化ス。酸味

ノ液ニ加レテ沸騰セズ。味初甘テ帯ビ終ニ微苦辛。
 淋灰鹽様ニ侵刺シ不佳ノ氣アリ。六對ト云クノ所載
 產地形質蓬砂資生ノ原由。性質。製法等。從來確定其
 說ナシ。然レ令。和蘭販賣所入者ハ應帝亞地方。殊ニ
 錫蘭印度島名ノ山坑ニ出ルヲ和蘭ニテ精製スル者ナ
 リ。或云。百兒西亞等ノ諸金坑。殊ニ銅坑ニ出ル礦
 性ノ泉。自然ニ凝結メ此物ヲ成ス。其質及ビ色。石鹽
 ノ如シ味鹹ク微辛ナリ。或ハ此物ノニ沙ノ如ク
 聚リ生シ或ハ諸礦ニ混メ生シ是ヲ分チ製煉ス。○
 生蓬砂ハ粘膩及ビ土氣アリテ淨潔ナラズ黯綠色

大榛子ノ如ク小石塊ノ如シ。百兒西亞或ハ莫卧兒
亞細亞洲ノ國ノ名ニ産ス。○生蓬砂ハ綠色ナリ深緑ナルヲ
 上品トス淺緑ヲ下品トス是ヲ製メ尋常ノ品ト爲
 ス。○是ヲ生スル礦ニ隨テ其色ヲ異ニス黄金礦ニ
 生スル者ハ黃色。銀礦ニ生スルハ白色。銅礦ノ者ハ
 綠色。鉛礦ノ者ハ黑色ナリ。○此物山坑ニ出テ氣ニ
 曝レバ粘膩ヲ生シ微赤色トナル是ヲ粘蓬砂ト名
 久。應帝亞地方ヨリ輸ス者ニ種アリ。一ハ黃赤色
 二ハ粘潤アリ是生蓬砂ナリ。一ハ灰色ナリ是ハ勿
 擗祭亞歐羅巴洲ノ國名ニテ生蓬砂ヲ水ニ溶シ煮テ結芒

セシムル者ナリ。或ハ是ニ明礬ヲ加ヘ偽ル者アリ。
 ○百兒西亞莫卧兒^{ペルシアモロ}ノ諸金坑殊ニ銅坑ニ於テ一種
 ノ泉出ツ濁テ綠色ヲ帶ビ鹽氣アリ。是ヲ煮テ稠厚
 トシ其坑ノ泥土ニ獸脂ヲ加テ泥ト爲シ是ヲ以テ
 其外圍ニ塗地ニ穴ヲ穿テ是ヲ内レ又其泥ヲ以テ
 封シ數月ヲ經テ取出セバ凝固メ蓬砂トナルト云
 製煉法^{和蘭拂郎察勿擲祭亞等}ニテ生蓬砂ヲ製メ
 純潔ト爲ス^{諸鹽類}ヲ淨製スル如ク是ヲ水ニ溶
 シ煮テ放冷シ芒ヲ結バシム此即チ尋常ノ品ナリ
 其結芒セサル渣液ハ膽礬氣アリ是レ蓬砂ニ含メ

ル酷厲毒ナリ故ニ製蓬砂ハ性緩^{醫藥ニ供ス}
 ○或ハ生蓬砂ニ水ヲ加ヘ搗磨メ淘洗シ靜定メ上
 清ヲ傾去リ又水ヲ加ヘ前法ノ如クスル^{數回}純
 潔鮮美トナルニ至リ日乾シ用フ○或ハ生蓬砂ヲ
 石灰水^{石灰條}ニ溶シ洗淨メ汚汁ヲ去リ煮テ放冷シ
 芒ヲ結バシム即チ瑩白人塊ヲ爲^{トス}メ明礬ノ如ク味
 鹹辛。淋灰鹽ノ如シ是ヲ勿擲祭亞蓬砂ト名ク今ハ
 多ク和蘭ニ於テ精製メ此品ト作シ四方ニ貨ス
 性^{製煉}蓬砂ヲ坩鍋ニ入レ燒ク^{ハ溶テ煮沸}
 シ明礬ヲ燒カ如シ但明礬ハ泡起メ止ズ蓬砂ハ水

氣盡レバ柑底ニ固著シ堅硬透亮ノ硝子トナル。逾
 火ヲ増シ是ヲ燒ク片ハ漸ク減耗シ終ニ盡ク消散
 ス。其硝子ハ堅固ナレバ水ニ淹セバ溶化シ氣ニ曝
 セバ風化ノ白霜トナル。製煉ノ蓬砂ヲ酸性ノ液
 ニ投シ或ハ亞兒加利性ノ液ニ加ルニ毫モ沸騰セ
 ズ。或ハ蓬砂十六ヲ取リ格兒弗ニ内レ漸ク火ヲ
 増シ蒸餾スレバ蓬砂大ニ泡起シ澄清ニメ氣味ナ
 ク水ノ如キ液。六ヲ出ツ。此水ニ酸性ノ鹽或ハ亞兒
 加利鹽ヲ加ルニ滾動セズ。然レバ蓬砂ハ酸性ナラ
 ズ。亞兒加利性ナラズノ唯一種ノ鹹鹽ナリ。其格兒

弗ニ火ヲ増シ蒸餾スルニ少モ出ル者ナク蓬砂其
 底ニ著テ硝子トナリ堅固透明ナル。尋常ノ硝子
 ニ勝レリ。元來蓬砂ノ質ハ硝子トナリ湯シ即チ此
 物少許ヲ取テ煨燒セル安質沒扭ニ加レ
 バ速ニ硝子トナル此硝子ハ舌ニ觸テ辛辣ス堅固
 ヲ以テ知ルベシナレバ數日温湯ニ淹セバ溶化ス是ヲ煮テ放冷ス
 レバ結芒ノ故ノ如キ蓬砂トナル。但尋常ノ者ニ比
 スレバ其質差鬆疏ニメ水棉様ナリ即チ是ヲ消石
 精ニ投スレバ微沸動シ遂ニ白霜トナレバナリ。○
 蓬砂ノ末ニ其三倍量ノ陶土ヲ和シ格兒弗ニ内レ
 武火ニテ蒸餾スレバ水ノ如キ清稀ノ液出ヅ。是レ

遠西名物考 卷四

風雲堂藏

亞兒加利性ニ味鹹久尿氣アリ○蓬砂ヲ水ニ溶
 シ是ニ薑菜舍利別ヲ加レバ綠色トナル加利性亞兒
 微升水ヲ加レバ黃赤色トナル同礪砂ヲ水ニ溶
 シ加レバ尿臭ヲ生ズ上同然レバ蓬砂ハ一種固性ノ
 亞兒加利鹽ニ酒石鹽ニ近シトス然レ是ニ酸性
 鹽ヲ加テ毫モ滾動セズノ相混和スル故ニ真ノ亞
 兒加利性ノ鹽ト差異ニ唯尿氣礪砂氣アリ微粘
 脂ヲ含テ鹹味アル一種ノ礦性鹽トス
 人工蓬砂或云勿搦祭亞等ニ於テ消石童便礪蓬鹽
 ヲ以テ蓬砂ヲ製造シ或ハ礪砂消石海鹽ヲ合シ或

ハ是ニ酒石ヲ加ヘ製シ或ハ固性消石朋礪尿ヲ合
 シ煮テ乾製スト云然レ其造法從前未詳晰ナラス
 ○榕按ニ蓬砂和産未ダ詳ナラス本邦藥舖ニ
 本舶來ノ者二種アリ一ハ白色透亮ニノ出品トス
 是レ右ノ譯說所謂製煉蓬砂ヲ利合淡黃赤
 色ニノ粘膩ヲ帶フ是ヲ油蓬砂ト呼フ是レ譯說
 ノ生蓬砂ナリ○
 主治 血液大過ヲ運動ヲ降鎮レ催睡ノ功アリ故ニ
 是ヲ清涼阿芙蓉ト名ク○亞兒加利鹽ヲ含テ居多
 ヲ以テ一種ノ制酸藥トス○凝結ヲ疏散シ輕ク濕

下シ小便ヲ利シ經閉ヲ通シ生胎ヲ分娩シ死胎胞衣ヲ下ス○經閉ニ一月ヨリ半錢ヲ用テ間捷効アリ○蓬砂半錢ヲ蒸餾水一盞^{トカ}溶^{トカ}以角膜星翳ニ點シ或ハ痔痛鷺口瘡ニ塗テ消散ス○鷺口瘡失^シ苟兒^{カク}陪^{ボイ}苦^クノ斷ノ潰爛ニ左ノ二方尤^モ驗ナリ

蓬董舍利別 蓬砂^{錢極細末一} 董菜舍利別^一

右調和シ四分時毎ニ一茶匙ヲ用フ或ハ棉撒絲ニ蘸^ヒシ患處ニ貼メ亦良

蓬砂蜜 蓬砂^{極細末一錢} 玫瑰蜜^一

右調和シ用ル^ル前法ノ如シ鷺口瘡遍夕口中咽喉

ニ滋蔓スルニハ半時毎ニ二茶匙ヲ用フ粟^リ薺^ベ子^ス傑^ダ列^レ乙^イ或ハ覆盆舍利別ヲ劑中ノ蜜ニ代用ノ尤良惡性ノ鷺口瘡モ兩三日連服ノ治ス治メ後口中仍腫痛スル者ハ緩和ノ軟劑ヲ施スベシ○左ノ二方經閉ヲ通シ胞衣ヲ下ス

雜腹蘭通經散

蓬砂 一^ツ 沒藥 十^ニ
雜腹蘭 三^ツ 桂油 一^滴

右散劑一服トシ葡萄酒或ハ艾蒿舍利別適宜ニ加月經常ニ來ル項ニ用フ

雜腹蘭通經膏

蓬砂 各十
沒藥 五^ツ

土青木香根 雜股蘭 各三匁
薩毘那油 滴 舍利別 宜適

右調和シ一服トス ○産後腹痛ヲ治シ惡露ヲ下シ
白帶下ヲ治スルニ左ノ方尤良

雲砂散 雲母 蓬砂 各半 沒藥 五

右散劑一服トス

○蓬砂外敷ノ鑽透シ贅肉ヲ侵蝕シ敗穢ノ創潰瘍
等ノ膿ヲ排ヒ淨刷ス ○煉金家はヲ以テ諸金ヲ熔
シ且錐鍍ニ用フ

剥ホツ鴛ト亞ア斯ス蘭ラン シ子レスカラヘルラチ羅

製法

樹類。山毛榉ノ類總テ堅實ナル樹ヲ燒テ灰

ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ其上清ヲ濾シ取テ煎熬
シ乾メ鹽ト爲ス是レ剥鴛亞斯ナリ ○是ヲ燒ク法。

曠野ニ一大坑ヲ穿チ其底ト内圍ニ遍ク瓦磚ヲ敷
連子。樹ノ幹枝ニ截テ其内ニ積テ焚シテ煙消

シ通紅トナル片尋常ノ灰汁ヲ取テ少シ宛頻ニ
撒ス片ハ其灰ノ鹽氣凝結メ堅キ塊片トナル。但數

時ヲ經テ盡ク焚了リ十分燒灰トナレバ其亞兒カ
利鹽ヨク凝結シ味鹹辛酷烈トナルナリ ○其大塊

ヲ成シ乾固ノ石炭ノ如ク疏脆ニメ碎ケ易ク灰白色或ハ天藍色ヲ帶ビ或ハ白點アルヲ上品トス
 ① 氣ニ觸テ溶ケ易ク或ハ水ニ浸メ溶化スルヲ多ク或ハ是ヲ磁孟ニ入レ水ヲ加ヘ浸スヲ十二時ヨク攪テ盡ク溶化スルヲ上品トス
 ② 或ハ此燒灰ヲ水ニ溶シ是ヲ明礬水明礬ヲ水ニ溶シタル液ニ滴メ其底ニ沈ム物多キハ亞兒加利鹽多キ候トス
 ③ 或ハ是ニ鹵石様ノ土ヲ含ム者アリ是ヲ試ル法此灰ヲ水ニ溶シ是ニ酸味ノ液ヲ滴スレバ其土多ク底ニ沈ムヲ以テ知ルベシ
 ④ 或ハ此灰ヲ窖ニ入レ置テ速ニ軟ラ

キ溶ルハ亞兒加利鹽多クノ上品トス否ルハ海鹽ヲ夾ニ或ハ消石質アル者ナリ
 ① 此燒灰ヲ貯テ日ヲ經レバ是ニ大氣中ノ酸氣ヲ吸收スルユエニ自ニ消石質トナリ其本性ヲ失フ故ニ是ヲ貯ルヲ十ク速ニ製メ剥篤亞斯ト爲スベシ
 ② 尋常ノ剥篤亞斯ハ礬性及ヒ海鹽性ノ酸氣ヲ含ムニ由テ其亞兒加利性純粹ナラズ諸製煉術ニ用ニ難シ故ニ左ニ記ス所ノ精製法ヲ以テ純粹ニシ

用スベシ
 精製剥篤亞斯
 羅子レスカラヘルラチデビラチ
 コログソウチヘコールシヨレポット

製法 剥篤亞斯アス 細末アス 適宜アス

雨水アス 等分アス
右ヨウ攪和シ潤キ盆アス 平アス 等ニ展アス グ大氣ニ曝アス
スヨ八日。漚過アス ヲ汁ヲ取リ是ヲ清キ鐵壺アス 入レ火
ニ上セ水氣ヲ蒸散アス ヲ乾カシ手ヲ住メズ攪セテ壺
底ニ固著セシメズ終ニ其底過アス ヲ透紅アス ナルニ至
テ速ニ火ヲ下シ硝子壺アス 二枚メ固封シ貯フアス

又法 剥篤亞斯アス 適宜アス

水アス 三倍アス

右剥篤亞斯ヲ坩鍋ニ入レ武火ニ上セ煨クヨ半時

許。ヨク其含メル汚物ヲ燒盡シ取出シ研末アス ヲ水ヲ

加ヘ數攪セ溶シ靜定ノ上清ヲ取リ紙ニテ漚シ火

ニ上セ其液ノ三分ノ二ヲ蒸散シ減シ上面ニ膜ヲ

生スルニ至テ火ヲ下シ冷處ニ置クアス 自ラ凝テ

芒ヲ結フ。芒ヲ去リ液ヲ取リ又煮テ膜ヲ生スルニ

至ル放冷テ芒ヲ去ル數次斯アス 如クノ其液必モ芒

ヲ結アス 止ニ至テ又煮テ手ヲ住メズ攪セ盡ク水

氣ヲ蒸散シ乾シテ鹽アス 下爲シ又必アス 夕アス 煨テ白色アス ナ

ス是ニ由テ最モ純粹固性ノ亞兒加利鹽アス ナルアス 風

スル鹽ハ揮發鹽ナリ風化是ヲ硝子燻ニ入レ固封
 セサル鹽ヲ固性鹽ト謂フ是ヲ硝子燻ニ入レ固封
 シ貯フ○其芒ヲ結ス者ハ純粹ハ亞兒加利鹽ニ非
 ズノ石膽質ノ酸性鹽ヲ含ムユエニ其二鹽自ラ渾
 和抱合メ芒晶ヲ結ブ其性食鹽或ハ孕礬酒石ト同
 様ノ中和鹽ナリ凡ソ芒ヲ結ビ晶ヲ成ス鹽類ハ皆
 必ズ酸性鹽ト亞兒加利鹽ト多ク
 自ラ渾和抱合メ成ル者ナリ故ニ總テ故ニ結芒セ
 是ヲ中和鹽ト名ク又乳清ノ條ニ註ス故ニ結芒セ
 シメテ盡ク其酸性鹽ヲ含マシメ是ヲ除キ去テ純
 粹ナル亞兒加利鹽性ノ剝篤亞斯ト爲スナリ○凡
 ソ剝篤亞斯ニ温湯ヲ加テ溶化セズ或ハ其汁ヲ漚
 テ透漏セザル渣壑ハ皆純粹ノ亞兒加利鹽ニ非ズ

ノ石膽質ノ酸性鹽ヲ混シ或ハ石様ノ土ヲ夾ム
 ナリ是レニ水ヲ加ヘ煮テ溶シ漚テ放冷スレハ結
 芒スルヲ以テ知ルベシ凡ソ芒ヲ結ビ晶ヲ成ス鹽類ハ皆
 必ズ酸性鹽ト亞兒加利鹽ト多ク

主治 此鹽ハ性侵蝕ノ凝體諸器ヲ衝動シ粘稠ヲ稀

釋シ衰弱ニ因ル寒性ノ粘液病ニ用ヒテ効アリ○

胃腸ノ酸敗液ヲ消ス故ニ胃ノ虛弱ニハ酸敗液過

多ナルヨリ發スル腹痛或ハ頑固ノ間歇熱ヲ治ス

ルニ此鹽ヲ苦味ノ健胃劑ニ加ヘ用ヒテ尤効アリ

○凡ソ虛弱ニハ粘液過多ナル頑固ノ諸病ハ斯ノ

如キ亞兒加利鹽適効アリ○寒性ニハ粘液多キ發

狂ニ用ヒテ小便ヲ利シ粘液ヲ疏ノ良効ヲ奏ス○
 此鹽ヲ服メ多ク温湯ヲ用ヒ被覆スレバ發汗ス。温
 覆セザレハ小便ヲ利ス。故ニ間水腫ニ大効アリ○
 服量二匁ヨリ十匁マテ水或ハ葡萄酒ニ溶シ日ニ
 三四次三十滴許宛用フ○酸敗液ノ諸症ヲ治シ或
 ハ結石ヲ消スルニ此鹽二錢ヲ水二比ニ溶シ每
 日連服ス○過服シ或ハ久服スレハ胃ノ運動ヲ減
 損シ飲食ノ消化ヲ妨ルヲアリ。故ニ預メ是ニ意ヲ
 用ヒ施スベシ○此鹽ヲ水ニ溶シ或ハ礮砂ヲ加テ
 蒸湯劑若クハ塗藥トシ水腫及粘液腫ヲ消散スル

ニ施メ屢効アリ○此鹽ノ性功。酒石鹽ニ同シ又是
 ヲ水ニ溶セバ酒石液ト同シ代用スベシ但酒石鹽
 及物耶獨亞斯出ツニ此ニレバ差峻烈ナリ。蘇蓬鹽
 蘇ニ比スレバ酸性ヲ含ム。微キユエニ尤酷烈ナリ
 故ニ大氣ニ觸レハ消化シ易シ○此鹽多ク製煉術
 ニ用ヒ或ハ石鹼ヲ製シ硝子ヲ造ル或ハ布帛ヲ晒
 スニ用フ依 福

物耶獨亞斯

蘭 シニス。インヘタトリウス羅

製法

葡萄酒ヲ造ルニ葡萄汁ヲ搾テ夕西滓或ハ

葡萄汁ヲ泡釀シタル桶ノ底ニ沈ム。脚ヲ絞リ渣

ヲ取り炙リ乾シ燒テ灰ト爲セバ固性鹽前ニ凝結如堅クノ石ノ如ク大小塊片ヲ成シ宛モ酒石鹽ノ如ク淡綠色鹹苦ニシテ乾固ナルヲ上品トス

主治 酒石鹽ノ如クニシテ差峻烈ナリ故ニ生石灰ヲ

加テ外敷メ腐蝕藥トス。又石鹼匠、漆匠多ク用ヲ疾

蒲公英根越幾斯劑

製法 蒲公英根

右罐ニ入レ蓋閉シ浸スヲ十二時ニシテ煮ルヲ半時。

放冷シ絞リ瀝テ汁ヲ取リ靜定メ塗ヲ去リ火ニ上
セ水氣ヲ蒸散シ手ヲ住メス攪テ稠膏ト爲シ貯ス
檢 蒲公英ハ莖葉根共ニ乳白色ノ汁アリ。蘆謨華
爾斯様ニシテ味苦シ全草ノ性功ヲ此汁ニ含シ殊ニ
根ニ多シ。季秋初冬ノ頃或ハ早春未ダ芽ヲ生セサ
ル時根ヲ採リ其汁多クメ性功モ完シ然レ常ニ
生津ヲ得難キ故ニ多ク越幾斯劑トシ用フ
主治 解凝驅熱利尿發散排泄健胃ノ功アリ。熱病
及ビ間歇熱ヲ解シ膽液過多ノ人ニ効アリ。是レ嫩
衝質ノ稠厚ナル血ヲ稀釋スレバナリ。然レ尋常ヲツテ嫩

衝壯熱ヲ涼解スル藥ト異ナリ。唯諸脉纖維ノ充張
 カヲ稍^ヤ虚弱ニシテ血ノ淤衝稠厚ヲ稀釋スルニ尤^モ適
 當スト知ベシ。○解凝利尿ノ効アルヲ以テ黄疸或
 ハ腹水病或ハ肝藏ノ壅塞硬腫等ノ初發ニ用ヒ殊
 是ガ粘稠液ノ鬱積ノ發スル者ニ用テ適効アリ。其
 深ク根蒂ヲ結者ハ此藥ヲ以テ其頑固ノ壅塞及膽
 液ノ結石等ヲ疏解スルト能サレバナリ。○此藥苦
 味ニシテ解凝ノ効アルニエニ胃ノ粘液ヲ祛^クキ飲食
 消化ヲ進メ稍^ヤ健胃ノ効アルト他ノ苦味健胃ノ諸
 藥ノ如シ又輕ク神經ヲ強壯シ膽液粘液ヲ分利シ

腹内諸器ノ壅塞ヨリ發スル熱病脾病鬱憂病精神
 錯亂等其他荏苒タル諸病ニ効アリ。○血中ノ惡液
 ヲ淨掃シ瘀血ノ壅滯ヲ疏通シ諸液ノ分利排泄ヲ
 進殊^ニ是ヲ腎ト尿管ヨリ排泄ス。故小便ヲ利諸頑固
 ノ瘡瘍ヲ發散ス。○服量日一ヨリ一ヨ半ニ至ル
 ○此根ノ生絞汁ヲ取眼ニ點メ角膜星翳ヲ消ス。○
 此草ノ性功大抵失格列乙根。洋蔘根ノ如シ。
 依^レ福

福窟^ホ篤^ク咩^ト篤^ト兒^ル 蘭^ホ窟^ク篤^トハ^ハ液^ノ義^ナ咩^ト篤^ト
 兒^ハ測^ハ驗^ノ器^ノ義^ナナリ
 榕按ニ是燒酒及ビ藥精露水等一切水漿ノ輕重

ヲ測リテ精粗ヲ知ル器ナリ此篇載ル所ノ方劑
 中。燒酒藥精等。幾十度ノ者ヲ用フト云ハ皆此器
 ヲ用テ測ルナリ其造法測度ノ說。諸書ニ出レ
 此簡便ナラズ但バ技タイヒ亞新撰局方ニ載ル所尤簡
 易ニメ測法モ密ナリ因テ今秋。玻璃匠ニ命メ創
 テ此器ヲ製シ家塾日常製劑ノ燒酒等ヲ試テ測
 其輕重精粗毫釐ヲ差ハズ故ニ其造法圖說
 左ニ記シ同好ニ告グ凡ソ西洋人醫術ヲ操ル
 者此器ヲ製ノ常ニ藥室ニ備ヘ諸藥精テイキ丁テウル幾去爾
 等ヲ製スルニ臨テ燒酒ノ度ヲ測リ篇中載ル所

製劑ノ定法ニ差フヲ勿レ



造法圖解 全形薄キ硝子ヲテ造ル天管長五六寸許。

人大球内。空廬ナリ地小球内。水銀ヲ實ツ。其管

正直ニメ毫モ斜歪セズ小球ノ下尖ト正ク相對シ

水ニ投メ管。傾側セズ直立スルヲ要ス。否レバ其度

正シカラズ。○度数ヲ定ル法下球ニ水銀ヲ實チ是

ヲ鹽水ニ浮ベ管直立メ靜定シ管ト大球トノ接際

鹽水度ノ符マデ没スル着度トシ假ニ火石ヲ以テ
 其處ヲ割ス若シ其球深ク沈ムハ其水銀ヲ減シ
 ○鹽水ハ精製海鹽ノ乾ク者一分ヲ蒸餾水九分ニ
 溶化スルナリ精製海鹽ノ製法海鹽ノ條ニ出ツ
 是ヲ鹽水ヨリ取り出シ清水ニテヨク洗ヒ又是ヲ
 蒸餾水製法ニ出ニ浮ムルハ其水鹽水ヨリ輕キユ工
 其管沈ム多シ假ニ火石ヲ以テ其水際ヲ割ス
 是ヲ平分トス是ヲ蒸餾水其鹽水度ト平分トノ間
 ノ長ヲ取テ是ヲ平分上ニ移シ此長ヲ十二分チ其
 一分ヲ一度トシ下ヨリ算ヘテ十分ニ當ル處ヲ十
 度ト定ム其長ヲ又十度ノ上ニ移メ二十度ト定メ

斯ノ如ク逐次ニ上ニ移メ五十度ニ至テ止ム其度
 毎ニ皆假ニ火石ヲ以テ管ヲ割シ又細ク裁リタル
 紙ニ右ノ度数ヲ寫シ其管中ニ容テ透見セシメ其
 口ヲ塗封ス○此器ヲ以テ燒酒藥精等ニ投スレバ
 其液ノ輕重稀稠ニ應メ浮沈出沒各異ナレバ其水
 際ノ度数ヲ見テ幾度ノ液タルヲ知ルナリ○或
 ハ二十度ノ燒酒ヲ十度ニセント欲セバ是ニ蒸餾
 水ヲ加テ重クシ十度ニ至ラシムベシ或ハ十度ノ
 燒酒ヲ二十度ニセント欲セバ復其燒酒ヲ蒸餾メ
 輕クシ二十度ニ至ラシムベシ餘ハ是ニ準ズ○此器

乃造此。初テ鹽水ト蒸餾水トヲ以テ上ニ云如ク其
 度ヲ測リ定ルニハ華鳥賢歌乙度名ノ驗冷熱器ニ
 六五十六度ヨリ六十度ノ氣候ノ時ニ於テスベシ
 驗冷熱器ハ俗間寒暖計ト名ケ氣候ノ寒暖ヲ驗ス
 ル器ナリ其華鳥賢歌乙度ノ製シ定ムル者ヲ和蘭常
 ニ用テ氣候ノ寒暖ヲ驗シ其度數ヲ諸書ニ載ス予
 此器ヲ得テ五十六度ヨリ六十度ニ至ル氣候ヲ測
 リ驗スルニ大抵春秋ノ稍冷○鹽水及蒸餾水ハ此
 器ヲ造テ其度ヲ測リ定ル時ニ臨テ製スベシ否ガ
 レハ其水ノ量變ス○海鹽ハヨク乾ク者ヲ用ベシ
 濕タル者ハ水氣多ク且ニ鹽ノ秤量切實ナラズ

閉

扁桃

アメイグタリス 羅 及マンドル 蘭

○榕按ニ扁桃ハ時珍綱目。桃ノ集解ニ出ツ扁桃。
 扁桃。巴且杏。皆同物ナリ。先輩是ヲ巴且杏ト稱
 ス。西洋說ヲ考ルニ是レ桃ノ族ニノ杏類ニ非ス
 故ニ扁桃ト稱フ適當トス。時珍曰。扁桃出南番形
 扁。肉澀。核狀如盒。其仁甘美。番人珍之名。波淡樹樹
 甚高大。扁桃出波斯。國百兒西亞。形薄而尖。頭偏。狀
 如半月。○華夷考曰。扁桃出波斯國。波斯呼爲婆淡
 樹。長五六丈。圍四五尺。葉似桃而濶大。三月開花。白
 色。花落結實。狀如桃子。而形偏。故謂之扁桃。其肉苦

澁不可噉核中仁甘甜西域諸國並珍之○巴且杏
 條時珍曰巴且杏出回回舊地今關西諸土亦有樹
 如杏而葉差小實亦尖小而肉薄其核如梅核殼薄
 而仁甘美點茶食之味如榛子西人以充方物○船
 來ノ品ヲ見ルニ其核桃ニ比スレバ扁ク上下兩
 端多クハ正ク對セズノ偏欹シ或ハ勾リテ半月
 ノ如シ故ニ扁桃偏桃或ハ偏核桃ノ稱アリ又波
 淡婆淡巴且皆音譯ノ稱呼ニメ別物ニ非ズ花葉
 核仁ノ形狀氣味凡テ左ノ譯說ニ同シ時珍扁桃
 偏核桃ヲ分テ二物トシ又別ニ巴且杏ヲ舉テ杏

ニ屬スルハ其形質ニ就テ親ク查考セザルナリ
 ○此樹和産未タ詳ナラズ但花戸ニアメントウ
 ト呼フ者二品アリ一ハ桃ノ一種矮生ニメ漢名
 壽星桃一ハ李ノ類ニメ漢名青皮李ナリ共ニ扁
 桃ニ非ズ

形狀 扁桃ハ桃ノ一種ニメ樹葉花實ノ形質大抵桃

ノ如シ但幹高大勁固葉微狹長柔ニメ味苦シ或云實熟

スレバ桃ト異ナリ又云葉ノ桃花白色或ハ紫ヲ帶

フ但桃花ノ如キ瀉下ノ効ナシ實ハ差長クメ偏面

縫路罅坼アリ外皮淡綠糙澁毛茸アリ熟スレバ淡

紫ヲ帶ズ。肉薄ク味惡ク硬固ニシテ食フベカラズ。核ニ云桃核ニ比スレバ差長ク扁ク頗ル固ク。皺眼細ニ云紋ニシテ平滑。黃褐色。是ニ白色ノ仁ヲ藏ム仁ニ栗殼色ノ膜ヲ被フ。桃仁ニ比スレバ差長シ。其味甘キヲ甘扁桃ト曰フ重實美味ナルヲ擇ムベシ。蛙徽碎折スルハ藥用ニ堪ズ。其苦キヲ苦扁桃ト曰フ即チ甘扁桃ノ一種ニシテ樹ノ形狀モ同シ。二種モ核ノ厚硬ナルト脆薄ナルト二品アリ仁ヲ扁桃ト名ケ藥用ス但核ヲ去ラザル者亦通ノ○幹枝ヨリ透亮ナル膠出ゾ桃膠ノ扁桃ト呼フ。○如シ花候モ亦桃花ト同シ。實ハ五六月ニ熟ス○此

物多ク暖國ニ産ス。亞弗利加洲ノ北地ニ自ラ生シ又拂郎察意太里亞齊西里亞。跋爾罷利亞。蘭牛鐸古以上歐羅巴洲ノ國名等ニ多ク培養シ或ハ和蘭ニモ長育ス○按ニ此物舶來アリ叔云。榛子ハ扁桃胡桃ノ如ク用フ。新鮮ナルハ乳劑ニ製シ或ハ搾テ油ヲ取ル。扁桃ノ如シ一切胸痛腎痛ヲ治ス其効扁桃油ノ如シ。榛子新鮮ノ者ハ甘美ナリ水或ハ葡萄酒ニ浸シ殼ヲ去リ用フベシ。陳久ノ者ハ燥テ收生瀝シ咽喉ニ粘刺メ効ナシ右ノ說ハ性功榛子或ハ胡桃○勃云。桃仁ハ其効苦扁桃ノ如シ此說ハ苦扁

桃ハ桃仁

主治 甘扁桃ハ甘美ノ油及ビ粘液多シ故ニ甘和滋

養シ攀急ヲ緩弛シ酷厲毒ヲ包攝和制シ乳汁ヲ増

シ炊熱ヲ消シ枯燥ヲ潤シ乾欬勞嗽吐血肺瘍羸瘦

病ヲ驗アリ○苦扁桃ハ惡液ヲ淨刷シ能ク醒ヲ解

ス又粘痰ヲ疏豁シ小便ヲ利シ脾病腸痛ヲ治シ經

閉ヲ通シ壅滯ヲ驅除ス 叔伍依 物裝勃

甘扁桃油 オレウムアメイグタリスドルシス

製法 甘扁桃 新鮮者分量適宜

右核殻膜皮ヲ去リ仁ノニ取リ 核膜ヲ去ラザレバ其油味辛澁ニシ

和ノ性功 石臼ニ入レ水杵ニテ搗テ泥ト爲シ麻布

ヲ失フ 袋ニ入レ榨ニ夾ミ徐々ニ油ヲ搾リ出ス

搾レバ油濁テ味佳ナラズ○仁ヲ焙ルヲ勿レ油熱

性トナリテ其主能ヲ失フ○榛子胡桃亞麻罌粟子

等ノ油ヲ製スルモ右ノ法ト同シ

主治 甘和滋潤ノ功ヲ以テ急迫ヲ緩メ攀痛ヲ止メ

欬嗽喘急聲嘎咽喉刺痛等ヲ治シ氣管肺腎尿道ノ

酷厲液ヲ消シ痙攣様ノ疝腹痛結石腎痛淋疾痛小

兒腹痛等ニ尤モ効アリ痛甚キ症ハ阿芙蓉少許ヲ加

ヘ用フベシ又臨産ノ腹痛甚キヲ鎮メ胎ヲ滑ニシ

小便ヲ利ス○此油ハ新鮮ノ者ヲ擇ムベシ動モス
 レバ腐敗ノ甘和ノ味ヲ失ヒ變メ辛辣發澁酷烈ト
 ナリ是ヲ用レバ侵蝕刺戟ノ焮痛壯熱ヲ發ス○胃
 弱キ人多ク是ヲ服スレバ胃中ニ鬱滯澁敗ノ酷厲
 トナリ胃ノ諸症又發スルコトアリ故ニ胃弱キ者ハ
 此油四多ニ亞刺比亞趨謨漿本條一多ヲ研和シ用
 レハ右ノ患ナシ○新鮮ノ油ハ痙攣性ノ痲腹痛腸
 攣急ヨリ起ルヲ云結石腎痛ニ捷効アリ此等ノ症ハ此油
 一二多ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用フベシ○膽液熱或
 ハ神經熱ノ患者稟賦感觸ノ甚キ者ハ對症ノ藥劑

雖モ衝動刺戟ノ攪擾ニ堪ガルコトアリ此症ハ左
 ノ方酷厲毒ヲ甘和メ大効アリ

扁桃消厲飲

甘扁桃油 一多
 亞刺比亞趨謨 一錢

苗香水 半北
 滿那 一多

右調勻研和シ半時毎ニ二匙ヲ用フ○冒寒傷冷毒
 等ノ劇キ效嗽或ハ勞瘵様ノ患者痙攣性ノ效肺氣管ノ
 攣急作因發スル效ヲ云重訂内科撰要喘急篇第百九十五章ノ症ト同シ同ヲ發スルニ
 効アリ但此症ニハ阿芙蓉劑ヲ加ヘ用ヒテ殊ニ良
 ○鬱憂病或ハ子宮病ニ痙攣性ノ效ヲ兼ルハ鎮痙

驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ尤モ驗アリ左ノ方ヲ與ヘン

扁挑鎮瘧飲

甘扁挑油

雞子黃

二個

苗香水

鹿角鹽

二十五瓦

過爾託亞舍利別

六錢

右調勻研和シ頻々ニ一匙ヲ用フ。小兒ハ一琶布匙

ヲ與フ。諸中毒ニ内服ノ酷厲毒ヲ包攝シ解スル

亦諸油質ノ藥ノ如シ。礬石或ハ消石精等ノ侵蝕

毒ニ中ルルハ輕キ中和鹽類ノ下劑ヲ與テ其毒ヲ

滌除ノ後此油ヲ服ノ捷効アリ。新鮮上好ノ阿利

襪油ヲ以テ甘扁挑油ニ代用シ亞刺比亞越謨阿美

蓉又加胸病欬嗽等ニ良効アリ。亞麻油モ此油ニ

代用メ効アリ腸攣急ノ縮窄シ若クハ燥屎滯積ノ

發スル劇キ疝痛ハ亞麻油ニ諸厄利斯瀉利鹽ト阿

芙蓉トヲ加ヘ用ヒテ速効アリ。蟲病ハ此油ヲ内

服シ或ハ吉利詞參兒トシ腸中ニ注入スレバヨク

蟲ヲ殺シ驅出ス然レ久服ヲ禁ス凡ソ蠅蟲ハ胃腸

ノ運化虧損ノ充張健輸セザルヨリ生スルユエニ

是ヲ久服スレバ逾胃腸ノ運營ヲ緩弛ノ轉蟲ヲ釀

スレバナリ。淋疾等ノ尿道焮痛ニ水銃ヲ以テ此

油ヲ尿道ニ注入メ効アリ○外敷メ疼痛ヲ止メ硬腫及ヒ肢節靱帶筋肉等ノ硬強ヲ軟和シ寧急ヲ縱弛ス然レ甘扁桃油ハ外敷スルヨ稀ナリ亞麻油阿利襪油ノ如キ廉價ニメ同効ノ油アレバナリ

苦扁桃油 オレウムアメイグダリスアマリス

製法 苦扁桃 新鮮者分量

右殼及ヒ膜皮ヲ去リ硝子壺ニ入レ熱湯ニ浸シ温メテ取出シ布袋ニ入レ搾ニ夾テ搾ル甘扁桃油製法ノ如シ

主治 肝脾ノ壅塞ヲ疏通シ粘液ヲ稀解シ汚液ヲ淨

除ス外敷ノ硬腫ヲ散シ疼痛ヲ消シ耳鳴ヲ止ム○或云此油ノ苦味ハ一個ノ毒トス多ク服スレバ人ヲ死ス是ヲ禽獸ニ與ルモ亦死ス

扁桃乳 アメイグダラ左ム又エニルシヲ羅

製法 甘扁桃 三多

右温湯ニ浸シ殼ヲ去リ石臼ニ入レ搗テ泥ト爲シ磁盃ニ入レ煮沸セル大麥汁三十二多許ヲ取テ必許宛加ヘ播リ蓋閉シ浸ス一小時許布巾ニテ濾シ絞レバ乳白色ノ汁トナル即チ扁桃乳ナリ甘味ヲ好ム者ハ砂糖ヲ適宜ニ加ヘ濾過スベシ

又法 甘扁桃

一弓半。殼及皮膜去之

右水適宜ニ加ヘ搗テ汁一匕ヲ取り濾過シ是ニ舍利別三錢ヲ調和ス〔叔〕

〔主治〕滋潤シ渴ヲ止メ煩熱ヲ涼解シ精神ヲ清爽シ血液虛損ヲ補充シ酷厲液ヲ和制シ痙攣搐掣ヲ緩弛ス○壯熱病ノ患者飲料ト爲シ用テ滋潤解熱ノ良効アリ但此乳劑一弓ニ水二十弓ヲ加ヘ稀クシ與フベシ或ハ消石一錢ヲ加ル〔良〕肺藏ノ酷厲液ヲ和解メ欬嗽ヲ治シ胸痛ヲ消シ焮衝病ニ尤〔驗〕アリ或ハ是ニ亞刺比亞〔亞〕藪謨〔藪〕ヲ焯和シ用ヒテ亦良

○惡性熱ノ患者虛脫シ脉沉微ナル症ニ鹿角鹽ヲ是ニ研和シ用テ奇効アリ但甘味ヲ嫌フ者ハ苦扁桃ヲ以テ製シ用フベシ○服量。一小茶碗ヲ頻々ニ温服スベシ○久服スレバ胃中ニ酸敗液ヲ生ス〔叔〕
〔底〕

麥西... 卷四...

右水... 一加...

判別三錢...

主治滋潤...

血液...

壯熱...

公卿...

小茶...

長...

藥...

楚西醫方石物考卷五

卷五

玉

橙皮油

橙皮精

橙皮

橙皮舍利

杜松油

杜松

杜松木

遠西醫方名物考標目

卷五

〔土〕 橙皮水

橙皮油

橙皮精

橙皮丁幾去爾

橙皮舍利別

杜松實油

篤爾面室刺

度祿布

橙皮水
橙皮油
橙皮精
橙皮丁幾去爾
橙皮舍利別

橙皮精

橙汁舍利別

杜松實油

篤爾面室刺

度祿布

遠西醫方名物考 卷五 原目 風雲堂藏

硃砂 精製硃砂

硃砂 蒸湯方

齒痛驗方

硃砂 露漱方

硃砂 華由硃砂揮發華

硃華膏

硃鐵華

硃砂 精硃油擦方

硃砂 含硃

硃砂 加燒酒精

硃砂 加石灰精

硃砂 揮發精

硃砂 固性硃砂

硃砂 揮發膏

硃砂 甘硃砂精

民埤列利精

傑列乙發汗散

卷 托歇爾私發汗散

乙百葛格安那

遠西醫方名物考 卷五

遠西醫方名物考卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川

榕榕菴校補

橙皮水

ア多コルチセスアウラント

製法

橙皮

生鮮者黄皮剉

右格兒弗ニ入レ水適宜ニ加ヘ蒸餾メ露水十比ヲ

取ル其法薄荷水ノ條露水製法括套ニ説ク如シ

主治胃腸ヲ健運シ痞氣ヲ散シ嘔吐ヲ止メ酸敗液

及ビ粘液ヨリ發スル諸症ニ驗アリ

橙皮油

オレウムコルチセスアウラント

製法

橙皮

生鮮者或陰乾者黃皮剝
分量適宜

右搭兒弗^フ入レ水適宜ニ加ヘ蒸餾ス其法薄荷油

左條蒸餾油製法拈套ニ説ク如シ^後

主治 腦心胃ヲ强健ニシ痞氣鬱蓄ヲ驅散シ壅塞ヲ

開達シ失氣昏冒風疝腹痛等ヲ治シ小便ヲ利ス○

此油ハ清稀ニメ水ノ如シ橙皮ノ製劑中尤峻効ア

ル者ニメヨク竄透刺戟ス故ニ少許宛用フベシ大

抵十滴許ヲ沙糖六錢ニ研和シ硝子曇ニ入レ固封

シ貯ヘ胃ノ衰弱セル諸症ニ時々一小卵匙ヲ用ヒ

テ効アリ○服量八滴ヨリ十六滴ニ至ル沙糖ニ和

シ或ハ白湯或ハ燒酒ニ點服ス○外敷メ痲不遂。痙

攣或ハ熱ナキ痛風等ノ神經病ニ驗アリ^後

橙皮精 スピリテス。コルチセス。アウテント^ト羅

製法

橙皮

未熟綠色者。白肉ヲ
去リ乾シ剝ニ比

燒酒

十度者
四比

右浸ス^ト二日。蒸餾メ露精ヲ取り十度ニ至ル其法

薄荷精ノ條。蒸餾精製法拈套ニ説ク如シ^後

主治 破氣驅風ノ良劑トス痞氣鬱滯ノ諸症ヲ消シ

粘液留飲ヲ祛キ心胃ヲ健運シ飲食消化ヲ助ケ汗

ヲ發シ小便ヲ利シ失氣昏冒ヲ復ス又橙皮^テ幾去

爾主治ノ諸症ヲ治ス○服量三四十滴許ヲ用フ^後

橙皮オレンジ丁シヤウ幾キョウ去キョウ爾ル 「アインキタルコルチセス、アウラント」 羅

製法 橙皮 白肉ヲ去リ到 燒酒 十五度者

右硝子壘ニ入レ硝子塞ニテ固封シ時々振蕩シ浸

ス一六日布片ヲ以テ濾シ又紙ニテ濾シ其液ヲ硝

子壘ニ入レ固封シ貯フ 後

主治 強壯衝動ノ劑トシ凡衰弱ヨリ起ル遷延諸病

ニ用テ偉効アリ。諸萎黃病ノ類久ク食機ヲ失ヒ勞

倦虛乏ヲ覺エ腹中風氣痞滯苦滿ヲ患ル等多クハ

胃及ビ腸ノ虚弱ヨリ發ス。或ハ疑體諸器虛衰ノ其

運營ノ減損スルヨリ發スル經閉及ビ其虛損ノ括

約ヲ失フヨリ發スル崩漏等ニ用ヒテ治驗多シ○

服量八十滴マデ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス

○未熟ノ橙實大櫻實ノ如ク黯綠色ニシテ苦味佳培

アル者ヲ取リアインキタル幾去爾ト爲シ用テ尤効アリ 依

橙皮舍利別 セイロフスコルチセスアツラント 羅

製法 橙皮 生鮮白肉ヲ去 砂糖 淨白者 水 四北

右橙皮ヲ磁罐ニ入水ヲ加ヘ浸ス十二時蒸餾又露

水ヲ取リ三多。是ニ砂糖六多ヲ加ヘ文火上ニテ溶

化ス其罐中人橙皮ヲ絞テ汁ヲ取リ其餘ハ砂糖ヲ

加ヘ濾テ渣ヲ去リ文火ニ煮テ舍利別ヲ稠汁ヲ爲シ

放冷シ前ノ露水ヲ和シ硝子壘ニ入固封シ貯フ

主治 心胃ヲ强健シ飲食ヲ消化シ風氣鬱滯心下痞

悶ヲ祛キ粘痰留飲ヲ消シ腐敗ヲ過ム

橙汁舍利別 セイロプス、シツクス、アウラント

製法 橙瓢汁 静定ノ底渣ヲ去ル者十六多 砂糖 淨白者二北半

右調和シ文火ニ煮テ舍利別ノ稠ト爲シ放冷ス

主治 清酸甘美ニメ口舌ヲ滋潤シ渴ヲ止メ熱ヲ解

シ血液ノ沸騰ヲ鎮メ膽液ノ酷厲腐敗ヲ消シ衰弱

ヲ強壯シ一切壯熱病ニ良効アリ

杜松實油 オレウム、テスチルシチ、バッカ、ユニペリ

製法 薄荷油ノ條蒸留油製法括套ニ説ク如シ

主治 性熱甚ダ竄透ス的列並底那ノ性アリ然レ酷

烈ナラス小便ヲ利スル峻効アリ虚寒ニメ辛

熱衝動ノ劑ヲ用フヘキ水腫ニ尤驗アリ

ル冒寒傷冷毒ノ熱ナキニ與ヘ發汗メ治ス

鬱蓄メ心腹痛滿攣痛スルメ治ス

人ハ六滴ヨリ十二滴許マデ用フ水腫ニハ利尿ノ

煎劑或ハ適宜ノ飲液ニ點服シ或ハ砂糖ニ和シ用

フ

痛等其他神經ノ諸症ヲ治ス

因因

篤爾面室刺トル羅セヘンブラト蘭

○榕按ニ此草小野蘭山翁嘗テ

度ノ圖說ニ據テ

蝦夷産ノオヲシキナト云草ニ充ツ予此草ヲ得

テ和蘭ノ諸説ニ徵スルニ形狀氣味篤爾面室刺

ニ穩當セリ物依云此根主治拳參根藥鋪ニ金線

ト同一般ナリト然レハ拳參根ニ代用スベシ

形狀篤爾面室刺ハ一根數莖叢生シ高サ一尺許微

赤粗糙細弱撓ス易ク地ニ塌シ每節七葉層々湊生

シ狼牙葉ニ似テ小邊缺裂ス夏月薔薇様四瓣ノ黃

花ヲ開キ長梗アリ心蕊一鬚蕊十六其頭ニ葯アリ

萼ハ出花後楯圓ハ稜刻菊ヲ結ビ稍長キ八個ノ核

ヲ藏ム根按指大ニメ短ク塊節様ニメ鬚アリ栗殼

色ニメ裏赤ク味收濡ナリ○北方寒國叢林陰地ニ

産ス種ヲ下シ或ハ根ヲ分チ培養ス

主治根温煖強壯ニシ收濡ノ効アリ故ニ下利赤痢

下血吐血痔血淋疾白帶下崩漏等ノ虚症ニ用ヒ總

テ弛弱虚衰セシ諸症ニ良驗アリ○傷冷毒及ヒ熱

病ニ下利ヲ兼テ虚脱セシ症ニ用ヒ汗ヲ發シ胃

ヲ健ニシ腐敗ヲ過メ蚊蟲ヲ殺ス○或説ニ是ニ健
 質チマ亞那代用龍膽ヲ加ヘ熱病及ヒ間歇熱ニ用ル下日ニ
 半錢ヨリ三錢ニ至リ其効殆ト幾那キナノ如シト云○
 服量末トシ十五ルヨリ一乃至一錢ニ至ル或ハ
 根到玄一錢ヲ取リ水煎シ一服トス或ハ一乃至一取
 リ水一匕半ニ浸シ滓ヲ去リ一盞宛服ス○齒痛ヲ
 止メ斷頸腐爛ヲ愈シ或ハ失苟兒陪苦ヨリ發スル
 斷ノ潰瘍ヲ治シ咽喉腫ヲ消スル等ト此末ヲ患部
 三摻シ或ハ水煎シ蜜若クハ醋ヲ加ヘ漱藥トシ効
 アリ○創傷潰瘍癩瘡侵蝕潰爛等ヲ乾愈シ凝血ヲ

疏散シ打撲傷毒螫刺咬ヲ治スルニ此末ヲ摻シ或
 炎水煎ノ蒸湯劑或ハ洗藥トシ良驗アリ

度祿布ドルク蘭トトホキシグセルリサシ羅クキスハシ不

製法 亞刺比亞アト比ホ亞ウ護ト甘草膏各二 沙糖四

右件調和シ蒸餾水ヲ適宜ニ加テヨク溶化シ濾過
 メ滓ヲ去リ文火ニ上セテ水氣ヲ蒸散シ凝結セシ
 メテ適意ノ錠ト爲シ放冷ノ乾固シ貯フ或ハ茴香
 油少許ヲ加ヘ製スルモ良○煎熬スル片手ヲ住メ
 ス攪テ必モ焦著セシムルヲ勿レ

主治 咽喉氣管肺ヲ滋潤シ酷厲侵刺ノ惡液ヲ甘和
痰ヲ吐キ易カラシメ傷冷毒ノ歎嗽聲嘎喘急淋
疾痛等ニ効アリ醫

硃砂 サルアムモニアモム羅

硃砂ハ一種ノ中和鹽ナリ形扁圓ニ潤二三寸許。
厚三四指橫徑。上凸下稍凹。尋常ノ品ハ外面灰白微
黃或ハ黑色ヲ帶ビ裏淡白ナリ上品ハ乾固潔白。石
英様ニ裏亦瑩白。破碎スレバ束鍼紋アリ味鹹辛
舌ニ滲透シ殆ト香氣ナシ然レ剥篤亞斯或ハ生石

灰或ハ酒石液或ハ生石灰水等ノ亞兒加利性ノ物
ヲ加テ研磨スレバ銳烈竄透ノ香氣ヲ揮發ス其銳
烈ナル程逾上品トス火ニ觸ルレバ盡ク溶化ス然
レ大氣ニ觸テ溶化セズ。此物既日多産ヲ上品ト
ス勿搦祭亞和蘭其他歐羅巴洲ノ諸國ニテ製造ス
ル者亦良ナリ。製煉術ニテ硃砂ヲ溶解シ試ルニ
尿ノ揮發鹽三分ノ二アリ海鹽精同様ノ酸精少許
出ツ。然レバ此物ハ固性海鹽精海鹽精ヲ云是ハ酸
性ニ風化セザレ
ハ前ニ註ス少許ニ風化揮發ノ亞兒加利鹽居多相
渾合升煨ノ固性ヲ爲シ一種ノ中和鹽トナル者ナ

此亞兒加利鹽ハ揮發ナル故ニ諸酸性ノ物ヲ加
 レハ相激メ沸騰ス亞兒加利性ノ物前ニ云刺鴉亞
 云ヲ加レバ其海鹽精ト抱合シ揮發亞兒加利鹽ハ
 分離メ忽チ銳烈ノ香氣トナル故ニ此物ノ性能モ
 亞兒加利性ノ揮發鹽ニ在リト知ルベシ國國

製法 駝尿 凝固者 海鹽 二十圓 煤 十錢

○按ニ駝尿ハ牛馬厩中ノ尿ノ凝結スル者ヲ取
 リ代用スベシ叔揭ニ諸馱畜ノ尿ノ凝結セル鹽
 ヲ用フベシ煤ハ常動物ヲ焚モヤス竈上ノ煙窓ニ著
 及ク者ヲ用フベシト云動物ハ總テ禽獸ノ骨
 及ヒ皮肉毛羽類ヲ云

右搗碎キ調和シ適宜ニ水ヲ加ヘ煮テ烱化シ瀝テ
 汁ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾シ硝子曇ニ入
 レ沙火ニテ升煨シ取出シ水ニ溶トカシ瀝テ渣ヲ去リ
 又火ニ上セ乾固シ貯フ疾○凡硝砂ハ土氣等ノ汚
 物混スル故ニ是ヲ再製メ純粹ト爲シ用フベシ蘭

精製硝砂 ケノイフルデアムモニアクソウト蘭

製法 硝砂 尋常者細末 沸湯 三倍

右硝砂ヲ湯ニ溶化シ紙ニテ瀝シ文火ニ上セ水氣
 ヲ蒸散メ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバ芒
 左結ブ是ヲ取り乾シ硝子曇ニ入レ固封シ貯フ疾

主治 鑽透刺戟ノ細絡織管ヲ衝開シ膠粘ノ諸液ヲ
 稀釋シ汗孔ト尿道ヨリ排泄ス故ニ總テ閉塞ヲ開
 キ疑結ヲ解クニ奇効アリ○諸藏ノ壅塞及ヒ胃腸
 ノ粘液ヨリ起ル諸病ニ効ヲ奏シ又輕ク衝動ノ胃
 腸肺等ノ運營ヲ活潑増進ス然レ過服スレバ吐下
 等ヲ發ス但服量適宜ニ用レハ虚損スベキ脱泄ヲ
 起ス下ナシ○此藥ハ兼用ノ品ニ隨テ或ハ發汗シ
 或ハ小便ヲ利ス○粘液質ノ經閉ヲ通ス血脉纖維
弛弱ニ血
 中粘液過多ニ壅滯セ中○胃腸ニ粘液過多ニ下
 ル萎黃病様ノ經閉ヲ云ル○胃腸ニ加ヘ用フ○胃腸
 利スル症ハ是ヲ苦味香竄ノ藥ニ加ヘ用フ○胃腸

ニ滯著セル膠粘液ヲ疏解スル効ヲ以テ纖維虚弱
 ニノ粘稠液過多ナル熱病所謂粘
液熱 粘液質ノ水腫或
 ハ大便閉。蚊蟲等ニ驗アリ○此藥ハ亞兒加利性ノ
 揮發鹽多キ故ニ一切壯實ノ熱病。嗽衝熱ニハ害ア
 リ然レ冒寒傷冷毒及ヒ斯ノ如キ酷厲毒ノ壅滯セ
 ルヲ疏解シ大抵減スル症ハ是ヲ用ヒテ良効アリ
 ○熱病ノ毒漸ク化熱シ諸竅ニ分利スベキ症ニ是
 ヲ用ヒテ痰ヲ吐セシメ蒸氣ヲ發シ或ハ小便ヲ利
 シ其毒ヲ排泄ス○肺嗽衝ノ嗽熱漸ク退キ病勢減
 スル者或ハ咽喉焮腫或ハ關節痛。傷冷毒痛等ニ是

ヲ用レバ能^レ病毒ヲ疏散ノ排泄ス○膽液熱胃腸熱
 等ノ毒甚ク膠固頑滯ノ解シ難キ症モ亦是ヲ用レ
 バヨク其毒ヲ疏解ノ排泄ス○腐敗熱及ビ神經熱
 二於テ其焮衝ノ諸症退キ脉勢衰ヘ唯精力虚脱ス
 ルニ因テ專ラ腐敗ヲ防護シ強壯スル劑ヲ與フベ
 キ症ニ是ヲ用ヒテ驗アリ○發斑熱羅斯痘疹等患
 者虚衰シ舌苔アリ大ニ煩渴スル等ノ症ヲ發シ或
 ハ其斑疹消散ノ内攻スル症ニ用テ甚効アリ○硃
 砂ハ專ラ間歇熱ヲ治スル藥ノ如ク用ル者アリ凡
 間歇熱ニ吐劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ニ壅滯スル毒

ヲ滌除メ後其發作ノ一時前ニ此藥半錢許ヲ用レ
 バ肢内諸器ノ壅塞ヲ開通シ病毒ヲ汗及ビ小便等
 ニ疏泄メ治ス但此病ハ膠粘ノ惡液胃腸腸間膜等
 ニ鬱塞メ發スルノ居多ガ故ニ特ニ此症ニ用テ良
 驗アルナリ若シ其惡液壅滯メ解セザレバ動モス
 レバ黃疸或ハ水腫ヲ發ス或ハ其腹内ニ鬱塞セル
 病毒漸ク減ズレバ其熱仍頑固ニメ治セザル者ハ
 幾^キ那^ナニ硃砂ヲ加ヘ用テ効アリ
 硃砂ハ幾^キ那^ナノ四
 分量ノ一ヲ加フ
 服量五匁ヨリ十匁マデ日ニ數次用フ急劇ノ症ニ
 ハ十匁ヨリ一月マデ飲液ニ加ヘ或ハ舍利別ニ和

シ甘美ト爲シ用ルモ良末ニテ用レバ惡心嘔吐ヲ
 發スルトアレバ力リ○末トシ眼ニ點ノ角膜翳星
 ヲ祛ク○凡中和鹽ノ類ニ於テ外敷ノ解凝ノ峻効
 ヲ奏スルト此鹽ニ若ハナシ蒸溺劑洗藥或ハ琶布
 ニ加施ノ稍衝動シ汗孔ヲ開キ凝結ヲ散シ粘液ヲ
 鑽^キリ細絡ヲ通シ衰弱ヲ強壯ニシ腐敗ヲ防護ス故
 ニ一切寒腫腺腫肉腫粘液瘤痛風腫粘液腫ヲ消散
 シ或ハ經久ノ潰瘍ニ洗藥トシ施メヨク其瘡ヲ淨
 刷シ腐骨疽寒壞疽ノ腐爛ヲ止メ皮上ノ汚斑ヲ消
 シ或ハ打撲傷皮肉中泛溢ノ血液ヲ疏散ス○關節

ノ水腫ニ是ヲ外敷メ縛帶ヲ施セバ消散ス或ハ陰
 囊水腫^ハ是ヲ醋ト燒酒ト各半ノ液ニ溶^{トカ}シ蒸溺ス
 ルト八日ニメ腫消シ疼止ム或ハ其腫ニ鍼^ノ水ヲ
 泄シ其水ノ内攻ヲ防^ムモ良○輕キ焮衝凍瘡等ハ是
 ヲ水ニ溶^{トカ}シ稀^{ウス}クメ患部ヲ洗^テ治ス○是ヲ温湯ニ
 溶化シ漱藥トメ傷冷毒ノ咽喉焮腫ヲ消ス○疥癬
 等ノ皮病ヲ治スルニ是ヲ膏藥ニ加^ヘ施メ尤^モ効^{アリ}
 リ○閃挫骨傷ノ後其部弛緩痿弱スルニ是ヲ施メ
 强健ナシメ或ハ其部水腫ヲ發スルモヨク消散
 ス○乳房ニ乳ノ凝聚シ結核腫痛スルニ施メ疏散

ス是ヲ迷迭香精等ニ溶シ施メ殊ニ効アリ或云水
 三溶シ布片ニ浸シ温メテ乳房ニ貼シ乾ケバ更換
 ス○是ヲ吉利詞參兒ノ劑ニ加ヘ施メ卒倒昏睡或
 ハ溺死等ヲ蘇復ス或ハ此末少許ヲ取テ鼻中ニ吹
 内レテ卒厥ヲ省覺ス○凡右ニ説ク諸外症ニ硃砂
 ヲ水ニ溶シ醋ト燒酒ト加ヘ施セバ其功尤峻ナ
 リ或ハ硃砂ハ醋燒酒各四多右溶化シ用ルモ良
 ○一切腫瘍ヲ消散スルニ左ノ琶布捷効アリ
 末四半 草蓼陵香花 二握
 亞麻子 末四半 草蓼陵香花 二握
 加密列 一握 硃砂 五錢

右水適宜ニ加ヘ煮テ琶布トシ温メ貼ス

①腫瘍ヲ消散シ或ハ潰瘍ノ腐肉ヲ消シ癩瘡ヲ愈
 シ疣贅息肉ヲ除クニ左ノ蒸濕方効アリ

硃砂蒸濕方

硃砂 一多

右葡萄酒ト醋ト各半ノ液四多ニ溶シ蒸濕劑トス

○齧齒劇痛ニ左ノ方奇効アリ

齒痛驗方

硃砂 一錢 橙汁 二錢

右研和シ綿撒絲ニ浸シ齧孔ニ容ル

①咽喉ノ粘液腫或ハ舌癰ニ左ノ方尤効アリ

硃砂含方

泥菖根 良薑 胡椒 各半

硃砂 一錢

右末トシ布片ニ包ニ嗽含テ涎唾ヲ湧起ス
○左ノ漱劑ヲ施スモ良効アリ

硃露漱方

接骨木花水 六勺 山萸菜精 硃砂 各一錢

右調勻シ漱藥トス

○精製硃砂ハ極テ純粹ニシテ前説ノ諸病ニ峻効アリ

是レヲ末トシ水ニ溶セバ其水甚テ寒冷ナリ夏

月此水ヲ器ニ盛リ酒壘ヲ浸セバ其酒極テ寒冽ナ

リ庚辰福 辰伍依

硃砂萃

フロレスサリスアムモニアキ羅

製法 硃砂再製乾淨者細末北

右陶製ノ格兒弗ニ内レ大ナル硝子ノ堯ヲ覆ヒ承

餾壘ヲ屬シ膠泥ヲ以テ其接際ヲ固封シ沙鍋ニ入

堯ノ際マデ沙ニ埋メ文火ニシテ蒸餾スレバ硃砂ニ

含メル水氣蒸升ノ承餾壘ニ下ル其液少シモ下ラザ

ルニ至テ承餾壘ヲ換初ノ如ク塗封シ漸火ヲ増テ

其堯雪白トナルニ至テ火候ヲ同等ニシ四時或

ハ四時半ニシテ放冷ス即堯内下壘ノ頸トニ雪白柔

脆輕虛ノ精華升リ著ナリ是ヲ取集メ硝子壘ニ入

密封シ貯フ其格兒弗内ニ白屑片塊等著^コアリ是
ハ其未^ル升化セズノ凝結スル者ナリ故ニ是ヲ刮^クリ
取テ以後此華ヲ製スル^キ。硃砂ニ加テ升煨スベシ
其格兒弗ノ底ニ殘ル鹽樣ノ黑汚物ハ棄去^ルベシ[○]

主治 硃砂ト同フ^メ尤モ揮發純粹ナリ[○]

硃砂揮發華 「サル、アム、モニ、アム、モニ、アキ、ホラ、チ、レ、アム、
モニ、アム、モニ、アキ、ホラ、チ、レ、アム、

製法 硃砂 一北 剝^{ハツ}篤亞斯^{アス} 二北半

右各別ニ細末シ合メ研和シ頸澗^ヒキ列篤兒^ト多ニ入
レ承餾壘ヲ屬シ其合際ヲ塗封シ沙鍋ニ入レ漸ク
火ヲ加テ蒸餾スレバ揮發銳烈ナル精華升リ著ク

大^ナ是ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ[○]

又法 硃砂 一北 結麗土^イ 二北

右ヨク乾^カシ研和シ極細末トシ硝子ノ頸澗^ヒキ列篤
兒^ト多ニ入レ大ナル承餾壘ヲ屬シ其接際ヲ塗封シ沙

鍋ニ入レ武火ニテ升煨ス但大ナル桶ニ冷水ヲ盛
リ是^レ其承餾壘ヲ浸メ冷シ温ナル^キハ速^ク其水

ヲ更換スベシ是ニ由テ硃砂ノ精華升テ遍^ク承餾
壘^ニ著^クナ^リ是ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ[○]

主治 大抵硃砂加石灰精^出次^ニノ如ク極メテ鑽透揮

發シ凝結ヲ疏散スルニ峻効アリ[○]肘臂膝等ノ關

節寒腫ヲ發シ久ヲ經テ治セザル症ニ左ノ膏尤驗

左水 大淋 痲瘋 疔毒 疥癬 疥癩 疥癬 疥癩 疥癬 疥癩

硃華膏 石鹼 二錢 若把兒麻膏 四錢

右石鹼 若把兒麻膏 一ツ 焯和シ冷定メ硃砂揮發

華ヲ研合ス 硃砂揮發 華 一錢

硃鐵華 硃砂 一ツ

製法 硃砂 十二ツ 升鐵鹽 一ツ

右能ク研和メ乾シ大ナル硝子ノ列篤兒多ニ内レ

封閉シ沙火ニ上セ漸ク火ヲ加テ升煨シ其壘底熾

紅トナリテ火ヲ下シ放冷メ其華ヲ取り細末トシ

硝子壘ニ入レ固封シ貯ス

又法 血石 極細末 海鹽精 各二ツ 硃砂 細末 十六ツ

右血石ヲ石臼ニノレ鹽精ヲ加ヘ研磨シ次ニ硃砂

ヲ研和シ大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ヲ以

テ升煨シ漸次ニ火ヲ増テ終ニ其壘底殆ト熾紅ト

ナレバ其華升テ凝結ス但火候ニ強弱アレバ偏ニ

硃砂ノニ升ルガ故ニ是ニ注意ヲ加ルニ專要ナリ

又法 鐵屑 鋪ナキ 硃砂華 各四ツ 鐵屑 一ツ

鐵屑 鋪ナキ 硃砂華 各四ツ 鐵屑 一ツ

鐵屑 鋪ナキ 硃砂華 各四ツ 鐵屑 一ツ

鐵屑 鋪ナキ 硃砂華 各四ツ 鐵屑 一ツ

鐵屑 鋪ナキ 硃砂華 各四ツ 鐵屑 一ツ

右合ノ硝子白ニ入、研磨メ亞兒加利鹽樣ノ竄透ノ
 氣ヲ發スルニ至レバ、潤大ナル硝子ノ格兒布ニ内
 レ平等ニ其底ニ展ゲ、硝子ノ堯ヲ覆ヒ承餽壘ヲ屬
 シ膠泥ニテ其接際ヲ塗封シ沙鍋ニ入格兒弗ノ頸
 マデ沙ニ埋メ漸ク火ヲ増シ堯ノ頂温ナルモハ清
 稀ノ液承餽壘ニ下ル。此液下ラザルニ至レバ初ニ
 帶白色ノ華。其堯ニ升リ著キ爾後其色一樣ナラズ
（云）橙皮色 斯ノ如ク升煨スルヲ三時或ハ四時ニメ其
 華少モ升ラザルニ至リ放冷スレバ鮮美乾淨ノ華
 其堯内及ヒ嘴ニ固著ス是ヲ取り速ニ硝子壘ニ内

レ固封シ貯フベシ否レバ忽チ濕テ溶化シ粘テ鹽
 泥ノ如ク石鹼ノ如クニ黄色トナレバナリ○其
 承餽壘ニハ風化揮發ノ亞兒加利鹽ヲ含メル黄色
 ノ液アリ是ニ白黄色ノ物雜ル此液ヲ鐵油ト名ク
和蘭名。エイ ○格兒弗ノ内圍ニ著ク所ノ華ノ如キ
スルオリイ 者ハ其藥料溶化シ烈火ニテ凝結メ未ダ華トナラ
 ザル者ナリ是ヲ取貯ヘ復升煨メ華ト爲スベシ其
 華赤色ヲ帶ルハ其如ル所ノ鐵氣ヲ多ク含ムナリ
 ○格兒弗ノ底ニハ赭赤色ノ渣塊残り味辛烈ナリ。
 氣ニ觸レバ溶化シ收瀉黄色ニメ鐵性ノ油ノ如シ

然^レ其性効ハ此華ト異ナリ○其初^ニ硃砂ト鐵トヲ研和スルニ由テ其鐵ニテ硃砂ニ含ム所ノ酸性鹽^ニ出テ吸收セラル。故ニ其中ノ亞兒加利性ノ揮發鹽^ニノミ自ラ放解メ竄透ノ蒸氣ヲ發ス又硃砂中ノ酸性鹽ニテ鐵ノ質ヲ消化シ。蒸餾ノ火力ニ由テ升化シ凝結ノ華トナルナリ。斯ノ如キ堅實ニテ消化シ難キ鐵質ヲヨク升化スルヲ以テ觀レバ硃砂ハ一種ノ奇異ナル揮發ノ性カアルヲ察スベシ^疾

主治 此藥ハ硃砂ニ鐵性ノ硫黃ヲ含テ^{鐵中硫黃アリ}竄透^{ノ功}闊達^ヲシ粘液ヲ稀釋シ虛冷ヲ温壯シ^{ノ功}稍

睡ラシメ發汗シ又鎮痛ノ功アリ故ニ内藏ノ壅塞ヲ開通シ脾病^{イハレ}依刺昆垤兒^{イコニデール}敗黑篇^{内科撰要}ニ出ツ^液失苟兒陪^{シケトルバイ}苦等ヲ治ス○纖維ヲ收瀟シ且甚ダ衝動スル性功アルヲ以テ經久頑滯ノ粘液閉塞病ヲ疏解スルニ峻効アリ故ニ經閉ヲ通スル良藥トス或ハ鐵屑ヲ用テ功アル諸症ニ尤^モ驗アリ或ハ幾那ヲ加用テ頑固人間歇熱ヲ治ス○服量十匁ヨリ一匁ニ至^ル

硃砂精 ^{スヒリ左スサルアムモニアモヒ又スピリ}
^{左スサリスアムモニアクモムシ子リビス}
^{カヲヘリアチ又カルボナスアム}
^{モニアキアルカリニリギイチ}

製法 硃砂^北剝^{ハツ}篤^ト亞斯^{アス}精^精製^製者^者水^水ニ^ニ北^北

右各別ニ研末シ合和ノ硝子列篤兒多ニ内レ水ヲ加ヘ承留壘ヲ屬シ獸ノ膀胱ヲ濕メ其接際ヲ卷キ氣ヲノ火シモ透漏セザラシメ沙鍋ニ入レ漸ク火ヲ増シ蒸餾メ其精必モ出ザルニ至リ。承留壘ヲ放チ其精ヲ取テ硝子壘ニ入レ密封シ貯フ○其列篤兒多ノ嘴ヲ塞キ更ニ其火ヲ増ス片ハ白色ノ硃砂華升テ堯ノ裏面ニ著ク是ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ是レ上ニ説ク所ニ同シ固封シ貯フ

主治 硃砂精及ビ硃砂揮發華ハ其氣銳烈ニメ極テ鑽透刺戟シ壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ蒸氣及ビ汗ヲ

發シ小便ヲ利シ血液ヲ衝動健運シ細絡纖維ニ壅滯セル寒粘液酸敗液ヲ驅散ス○粘痰多キ咳嗽喘急等ニ効アリ○神經及ビ諸脉ニ寒粘液壅塞ノ發スル卒倒昏眩。痲。子。宮。衝。逆。水。腫ニ用ヒ或ハ痛風關節痛。傷冷毒痛等ノ劇痛退ク凡仍多少テ痠痛在再トメ休ザル症ニ用レバ此藥ノ竄透開達シ性力ニテ其惡液ヲ汗ト小便ヨリ驅逐シ治ス○劇キ下利或ハ恐驚等ニテ失氣暈倒シ或ハ烟ニ咽ビ或ハ水ニ溺レ或ハ縊レテ半死セル者ハ此精ヲ嗅シメ或ハ綿撒絲ニ浸メ鼻中ニ挿シ或ハ是ヲ眼中ニ滴

スレバ皆其膜ヲ刺戟メ靈液ヲ衝動シ忽チ甦サマ後ス
卒倒昏睡病或ハ子宮衝逆等。總テ人事不省ノ症ニ
ハ皆右ノ如ク施メ即効アリ○子宮衝逆痙攣ノ諸
症ニ此精効アレバ鹿角ノ亞兒加利鹽鹿角精ノ殊
ニ良驗アリ○卒倒昏睡病。痲痺等ノ粘稠液壅塞メ
發スル症ニハ効有レバ多血ヨリ發シ或ハ清涼劑ヲ
用テ治スベキ症ハ皆害アリ○小兒齒ヲ墜スル片
搖掣腹痛下利等ヲ發スルニ用テ効アリ此症動モ
スレバ酷厲ナル酸敗液。胃腸ニ鬱蓄メ發スレバナ
リ○瘰癧毒諸疔ニ内服外敷シ酸敗ノ諸病。小兒腹

痛等ニ甚ダ驗アリ○此精ハ總テ患者虛脫シ脉小
ニノ搏動齊ハズ振惕惴動シ冷汗出。氣息冷テ不利
スル等ノ症ニ奇効アリ藥性慄悍ナレバ神經ヲ害
セズ或ハ麝香龍腦纈草幾那等ヲ加ヘ用ルアリ
故ニ壯實ノ症ニハ總テ是ヲ禁スベシ○服量五滴
ヨリ十五滴マデ砂糖或ハ適宜ノ液ニ點服ス○熱
性多血ノ人ハ斯ノ如キ揮發竄透ノ藥精ヲ過服ス
ルカ勿レ動モスレバ炊衝ヲ發スレバナリ○此精
ニ蚯蚓油ヲ和シ傷冷毒痛或ハ痛風痺不遂ノ部ニ
塗擦ノ良驗アリ○諸寒腫或ハ咽喉痛ニ左ノ擦方

ヲ擦テヨク疏解消散ス咽喉痛ハ頭ニ擦スヘシ

硃油擦方

硃砂精

阿利襪油

右調和ス亞 依 揭

硃砂加燒酒精

スヒリ左スサルアムモニアキヒノ匹羅

製法

燒酒 銳烈者 硃砂精 八弓

右調和ス主治甘硃砂精ト同シ亞

硃砂加石灰精

揮發精 硃砂 望リキヲルカアムモニアキ

製法

生石灰

二北

硃砂

一北

水

五北

又ラアロベイトンデアムモニア蘭又スピリ左スサルアムモニアキヒハ又アムモニアキアムモニアキアムモニアキアムモニアキ

右二味各別ニ研末シ潤大ナル硝子ノ列篤兒多ニ

入レヨク混和シ是ニ水ヲ加レバ大ニ沸騰ス速ニ

承留壘ヲ接合シ其沸騰盡ク止成ハ沙鍋ニ入ル膠

泥ヲ以テ其合際ヲ塗封シ初ハ文火トシ漸ク火ヲ

増テ精ヲ取ルト一北半是ヲ硝子壘ニ入ル硝子ノ

塞ニテ密閉シ貯フ亞

又法

硃砂上北 生石灰燒テ新者十分一ノ水

右各別ニ研テ極細末トシ石灰一北ヲ殘シ置テ其

餘ハ硃砂ト共ニ列篤兒多ニ入能合和シ是ニ右ノ

殘置タル石灰ヲ加テ其上面ヲ被ヒ其列篤兒多ヲ

沙火ニ入レ是ニ頭彎リタル硝子ノ承餾壘三個ヲ連
 續ス但第一個ト第二個トノ承餾壘ニハ其頭本ノ
 側ニ一小孔ヲ穿リ即列寫兒多ノ頭ヲ第一個ノ承餾
 壘ニ挿第二個ノ承餾壘ノ頭ハ第一個壘ノ頭本ノ
 孔ニ挿第三個ノ承餾壘ノ頭ハ第二個壘ノ頭本ノ
 孔ニ挿テ連續セシムルナリ但第一個ノ承餾壘ハ
 小ナリ是ニ蒸餾水ハ弓ヲ盛リ劑中ノ硝子ノ第二
 個第三個ノ承餾壘ハ大ナリ各是ニ蒸餾水ニ比テ
 盛リ劑中ノ硝子ノ皆其合際ヲ塗封シ或云頭彎リ
 多ヲ取其頭ヲ第一個ノ承餾壘ノ頭ニ挿其壘ノ頭
 本ノ小孔ニ彎リタル硝子管ヲ挿其一端ヲ第二個

ノ壘頭ニ挿其壘ノ頭本ノ小孔ニ又彎リタル硝子
 管ヲ挿其一端ヲ第三個ノ壘頭ニ挿各其挿際ノ罅
 隙ヲ塗封シ蒸餾スルモ亦一良法トス是ニ由テ其
 承餾壘三個共ニ彎頭ノ者ヲ用ルニ及ス尋常ノ硝
 子壘ノ頭本ニ小孔ヲ初文火トシ漸火ヲ増蒸餾メ
 穿ノニニテ用フベシ
 遂ニ其精少モ下サルニ至リ火ヲ下放冷ス乃第一
 個ノ承餾壘ニ硝砂精アリ然レ不潔ノ物雜ナリ
 然ルキハ除去ベシ第二個ノ承餾壘ニハ極テ純粹
 ニノ銳烈ナル精アリ第三個ノ承餾壘ニモ純粹ノ
 精アリ然レ第二個壘ノ精ニ比スレバ銳烈ナラズ
 故各別ニ硝子壘ニ入硝子塞ニテ密閉シ貯ヘシ因
主治 此精ハ硝砂ニ含ル酸性鹽ヲ脱メ純粹ノ亞兒

加利性トナル故ニ尋常ノ礶砂精ニ比スレバ揮發
 竄透ノ氣烈ク酸味ノ液ヲ加レ_レ甚_ク沸騰セズ○尋
 常礶砂精主治ノ諸症ニ峻効アリ但_シ刺戟衝動ノ性
 極_クテ銳烈ナルユ_レニ諸急卒ノ病ニ用_ヒテ閉塞ヲ開
 キ捷効ヲ奏ス卒倒昏睡病或ハ失氣眩冒呼吸絶ス
 ルが如キ諸症或ハ驚駭溺死_ニ縊死_ニ咽烟_ニ或ハ大饑神
 思勞傷剝_レ脱泄_ニテ卒厥スル者ハ頻_ニ此精ヲ嗅_ヒ
 或ハ綿撒絲ニ浸_シノ鼻中ニ挿_シ或ハ眼中ニ點_シ
 醒後ス患者嚥下スル_ルハ此精二十五滴マデヲ水
 二匙ニ加_ヘ用_フ○此精ニ芫菁_ヲ幾_ク去_リ兒_ヲ加_ヘ痲

不遂ノ患部ニ擦_リノ効アリ○此精ニ二滴宛_ニ吉利詞
 參_ニ兒_ノ液ニ加_ヘ施_メ痲或ハ衰弱ノ患者ニ尤_モ驗_{アリ}
 リ○小兒酸敗液ヨリ發スル腹痛搐掣或ハ大人酸
 敗液ノ諸症ニ適_宜ノ飲液ニ點服_シノ捷効アリ○微
 毒ニ是_ヲ用_ヒテ發汗ノ煎劑ヲ兼用_シ汗_ヲ發_メ良_シ○
 卒倒昏睡病等ノ多血ヨリ發スル者或ハ清涼劑ヲ
 用_フベキ症ニハ此精總_テ大害_{アリ}○水銀劑ヲ過
 服_シテ汞熱_ニ條_ニ出_ルヲ發スル者ハ此精ヲ用_ヒテ日夕解
 ス○齧齒ノ劇痛ニ此精ヲ綿ニ浸_シ齧孔ニ挿_シテ速
 効_{アリ}是_ヲ以_テ其神經ヲ侵蝕_メ麻痺セシム_レバ

大リ○脚痛風。或ハ打撲傷。或ハ乳。凝固ノ乳房結核
 才生スル等ニ蒸溺劑トシ或ハ是ニ油ヲ和シ塗テ
 日夕消散ス○此精ニ水ヲ加ヘ稀クシ洗藥トシテ
 關節ノ水綿様腫或ハ狂犬咬創ニ施シ或ハ輕キ火
 傷或ハ惡厲ノ疥癬浸淫瘡等ノ患部ニ施シ皆殊効
 才稱ス或ハ水銃ヲ以テ是ヲ瘻瘡ニ注入シ其腐穢
 頑硬ノ肉ヲ消ス因因因
 固性硃砂ハステアムモニアウソウト
 製法 硃砂加石灰精。或ハ硃砂揮發華法ヲ製シ其
 列篤兒多ノ底ニ殘リタル渣塊ヲ取り沸湯ニ溶シ

發烟海鹽精ヲ是ニ滴スレバ沸騰ス是ヲ滴シ加テ
 毫合ニ沸動セザルニ至リ紙ヲ漚テ其液ヲ取り文
 火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾白人鹽ト爲シ硝子壘ハ
 入レ固封シ貯フ要藥ノ大ニ内將精
 又法 結麗土精製者分量適宜
 右結麗土ニ發烟海鹽精ヲ滴シ加テ毫合ニ滾動セザ
 ルニ至リ漚テ其液ヲ取文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾
 白人鹽ト爲シ其温ナルヲ硝子壘ニ入固封シ貯フ因
 主治 壅塞ヲ開キ粘稠ヲ釋キ汗ヲ發ス。間歇熱發作
 ノ一時前ニ一錢ヲ服シ温覆メ發汗シ其毒ヲ驅發

硃砂揮發膏

硃砂揮發膏 硃砂加石灰精 阿利襪油 右硝子燻ニ入振蕩ノ能混和セシメ固封シ貯フ

製法

右硝子燻ニ入振蕩ノ能混和セシメ固封シ貯フ

主治

外敷メ疼痛ヲ止メ痙攣ヲ鎮メ腫瘍ヲ消散シ 壅塞ヲ開キ凝結ヲ解ク要藥トス 〇内部熱衝ヨリ 起ル頑固ノ痛ヲ消スルニ是ヲ患部ニ擦シ或ハ咽 喉焮痛ニハ頻ニ塗テ殊ニ驗アリ或ハ胸膜焮 衝傷冷毒痛痛風脚痛風或ハ痙攣痛疝痛或ハ諸般

ノ寒腫壅結硬腫便毒腫等ニ擦メヨク消散ス或ハ

赤痢ノ腹痛ニ外敷シ或ハ非不遂ノ部ニ數塗テ殊

ニ治驗多シ或ハ水腫ニ塗テヨク小便ヲ利ス 〇此

藥一弓ニ羯布羅或ハ實百兒油一錢ヲ和シ施メ尤

効アリ 〇專ラ止痛劑或ハ鎮痙劑ト爲スニハ是ニ

阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ含電發謨阿芙蓉液等少

許加ヘ用フベシ 〇患部ノ皮膚感觸甚クメ此藥ノ

刺戟ニ堪ガル者ハ左ノ一方ヲ施メ良

又法 サホアムモニアカリニメシムホ

硃砂精 四錢 阿利襪油 一弓半

右硝子壘ニ入レ振蕩メヨク混和シ固封シ貯フ

甘硝砂精 スピリ左スサルアム
モニアキドルシス

製法 剥篤亞斯ホッド
アス六多 硝砂四多 燒酒三北

右ニ味各別ニ研末シ合和シ硝子ノ格兒弗ニ入レ

燒酒ヲ加ヘ蒸餾ノ精一北半ヲ取り硝子壘ニ内レ

固封シ貯フ

主治 汗ヲ發シ小便ヲ利シ精神ヲ爽快シ失氣昏冒

痛及ビ痙攣ヲ治シ月經ヲ通スルニ尤効アリ

民埵列利精 スピリ左スミンデレリ

按ニ蒲爾花フルル
ハク人創テ此劑ヲ製シ其後思可祭

亞ア歐歐羅羅巴巴洲洲ノ民埵列利シ
デレリ人多ク是ヲ用テ奇効ヲ

稱シ大ニ世ニ行ハル。因テ是ヲ民埵列利精ト名

又ト云

製法 硝砂揮發華蒸餾醋各適宜

右醋ヲ硝子ノ格兒弗ニ入レ温沙火ニ上セ硝砂華

以許ヲ加レ忽チ沸騰ス其滾動靜止スレバ後硝

華少許ヲ加ヘ斯ノ如ク逐次ニ少許宛加テ竟ニ其

液毫毛滾動セザルニ至リ火ヲ下シ靜定スルヲ兩

五日其間時々格兒弗ヲ振蕩メ混和セシムベシ爾

後其二味平等ニ和勻スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ此液

ニ醋一二滴ヲ加ヘ或ハ礶華少許ヲ加ルニ毫毛滾動セザルハ自ニ物偏勝ナク平等ニ調和スル候トス但此液ニ醋ヲ滴メ微滾動スルハ仍礶華偏勝ノ候トス故ニ是ニ醋ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ礶華少許ヲ加テ微滾動スルハ仍醋偏勝ノ候トス故ニ礶華少許宛加テ毫毛滾動セザルニ至リ是ヲ硝子壘ニ入レ固封シ貯フベシ

又法 蒸餾醋 礶砂加石灰精 各適宜

右醋ヲ長頸ノ硝子壘ニ入レ礶砂精ヲ一滴宛加レバ少ク滾動ス斯ノ如ク漸ク加テ竟ニ其液毫毛滾

動セザルニ至リ又其ニ味平等ニ調和スルヤ否ヤヲ試ル爲ニ二個ノ茶碗ニ各此液少許ヲ分チ取リ先ツ一個ノ茶碗ノ液ニ醋ヲ滴メ微滾動スルハ礶砂精仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ蒸餾醋ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ其他ノ一個ノ茶碗ノ液ニ礶砂精ヲ滴メ微滾動スルハ醋仍偏勝ノ候トシ其硝子壘ノ液ニ礶砂精ヲ滴シ加テ毫毛滾動セザルニ至ルベシ或ハ右ノ如ク兩個ノ茶碗ノ液ニ醋或ハ礶砂精ヲ加テ毫毛滾動セザルハ其液偏勝ナキ候トス宜ク硝子壘ニ入レ固封シ

貯スベシ○拘椽汁或ハ橙汁ヲ以テ右ノ蒸餾醋ニ
 代用ノ亦良効アリ○拘椽汁ニ鹿角鹽ヲ加ヘ前法
 ノ如ク製スレバ其効尤峻ナリ
 主治諸峻効アル發汗劑中ニ於テ尤此精ヲ稱ス極
 テ揮發鑽透シ鬱塞ヲ開達シ粘稠液ヲ稀釋スレバ
 亞的兒及ビ阿芙蓉ニ比スレバ侵刺衝動ノ性緩ニ
 又毫毛酷厲刺戟ノ害ナク又血液ノ運行ヲ増發セ
 ス能ク發汗ス故ニ多ク熱病ニ用テ驗アリ○凡虛
 弱ノ熱病ニ於テ蒸氣ヲ發スルキ症ニ用フ○熱病
 ノ患者虛弱ニシテ血液ノ運行凝泣怠慢ナル症ハ是

ヲ用テ能揮發健運シ腐敗ヲ遏ム故ニ腐敗熱惡性
 熱等ニ多ク用フ神經熱ニハ纈草根ヲ加テ尤良○
 鬱過セル蒸氣ヲ發泄シ小便ヲ利ス故ニ是ヲ用テ
 温覆セズ蒸氣ヲ抑遏スレバ利尿ノ効多シ○大ニ
 勞動歩走スル等ニテ憊倦シ肢體痠痛彊拘不遂ス
 ルヲ治ス○傷冷熱炊衝走注痛痛風或ハ傷冷毒ヨ
 リ起ル咽喉炊腫ニ用ヒ發汗メ治ス或ハ接骨木花
 ノ泡劑ニ加ヘ用フ或ハ蒸湯劑トシ患部ニ施メ効
 アリ○一處ニ住留スル炊衝ニハ蒸餾醋少許ヲ加
 ヘ適意ノ酸味トシ用テ良○肺炊衝胸脇炊衝ニハ

海葱醋ヲ等分ニ加ヘ用テ尤効アリ○秋ノ間歇熱
 發作ノ時惡心嘔氣甚ク或ハ煩悶ノ熱劇キ者ハ即
 チ膽液熱ナリ膽液腐敗シ其酷厲毒胃腸ニ鬱蓄ノ
 侵刺シ其諸症ヲ發スルヲ云是レ替
 留熱ニ在テハ膽液熱或ハ胃腸熱ト稱ス此症ハ吐劑ヲ用テ其毒ヲ滌
 除ノ後此精四錢ヲ飲液ニ和シ是ニ阿芙蓉液五滴
 許加ヘ四分時毎ニ是ヲ用フベシ三四回用レバ微
 汗ヲ發メ熱解スイッヒ每次右ノ如ク用レバ其發作漸ク
 減メ回復ス○服量一錢ヨリ三四錢マデ飲液ニ和
 シ日ニ數次用フ○過服シ或ハ久服スレバ下利ヲ
 發シ或ハ飲食消化ヲ妨グ○此液二錢ヲ温湯ニ加

發シ服メ臥床ニ温覆シ少頃シテ復服スレハ微汗ヲ

發シ病毒ヲ驅發ス○利尿ニハ每服四錢日ニ兩次
 用フ過爾託亞根舍利別ヲ等分ニ加ヘ用テ殊ニ良

○蒸氣ヲ發スルニハ鹿角鹽少許ヲ加テ其効尤峻
 ナリ發汗スルニモ鹿角鹽ヲ加ヘ十二時中三十六

錢許用フベシ
 ○發汗スベキ諸症ハ左ノ方良驗アリ長ニ大熱者

傑列乙發汗飲接骨木傑列乙五錢

民埵列利精一錢接骨木花水三勺

右一服トシ八分時中ニ服ス○外用ニハ蒸湯劑或

ハ洗藥トシ或ハ壓定中ニ蘸シ施シ或ハ其症ニ隨
 ヒ水ヲ加ヘ稀クシ施ノヨク凝結ヲ疏解シ諸腫ヲ
 消散ス炊衝ナキ寒腫肉腫或ハ瘰癧腫或ハ瘤ノ初
 發ニ施メ消散スルニ殊ニ効アリ或ハ是ニ失鳩答
 越幾斯劑ヲ加ヘ施メ頑硬腫腺腫ヲ消ス○打撲傷
 及ビ脉外肉裏ニ瘀血泛溢ヲ斑ヲ發スルニ施メヨ
 ク消散ス○眼中角膜ノ星翳或ハ水樣液ノ曇暗ニ
 點メ偉効アリ

叔 叔 依 福
 斷 底 麻

遠西醫方名物考卷五終

遠西醫方名物考卷五終

此藥上之或八厘定也... 水之如... 消散... 變... 應... 及... 外... 及... 潤... 散... 藥... 丸... 湯... 藥... 丸... 湯... 藥... 丸... 湯...



遠西醫方名物考卷六

卷六

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸



遠西醫方名物考標目

卷六

知鎮瘞散

黥失刺獲

丁香油

丁幾去爾

蔣蘿油

利龍骨木脂

律比丸

里沒奈埕

知鎮瘞散

黥失刺獲

丁香油

丁幾去爾

蔣蘿油

利龍骨木脂

律比丸

里沒奈埕

實亞格日温

實百兒油

實百兒油

實百兒油

實百兒油

實百兒油

實百兒油

實百兒油

栗リベツ子ス

栗リベツ子ス傑ゲ列レイ乙イ

栗リベツ子ス昆コン設セ爾エル弗フ

栗リベツ子ス舍セ利レイ別ビ

龍リウ腦ノウ羯カ布フ羅ラ

龍リウ腦ノウ乳ニ同トウ

龍リウ涎ニ香ニ麝ニ香ニ後ニ

綠リョク礬ハ石シ條テウ

綠リョク礬ハ油ユ綠リョク礬ハ精セイ同トウ

綠リョク礬ハ揮キ發ハツ鹽エン上ジョウ同トウ

遠エン阿ア利リ襪ハク

阿ア利リ襪ハク油ユ

屋ウチ施シ蔑ニ兒ニ

鴿カ栗リ拔ハ奴ニ謨ハ

加カ密ミ列レ

加カ密ミ列レ煎セン方ホウ

加カ密ミ列レ蒸セイ餾リウ油ユ

加カ密ミ列レ煎セン油ユ

遠西醫方名物考 卷六

知

遠西醫方名物考 卷六

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴 拔補

鎮痙散

「ビルヒスアンテスバスモヂカ羅ニ」
「アドルテゲイデカラムプ」
蘭

製法 蘇消石

精製乾淨者

孕礬酒石

四錢

朱砂

製造者 二錢

右各別ニ研末シ能ク調勻シ硝子ニ内レ貯フ

主治 一切痙攣搐掣。癩衝逆等ノ諸症ヲ治ス。服量

半錢ヨリ一錢ニ至ル

丁幾去爾チンキヲウル 羅ラ アフヘルフセル蘭

是ハ藥品ヲ燒酒ニ淹ヒタシ藥氣並ニ其色ヲ浸出スル
藥液ノ總稱ナリ此ニ冷浸温浸ノ二種アリ冷浸ハ
其藥ヲ硝子壘ニ入レ燒酒ヲ加ヘ硝子塞ヲ以テ固
ク閉チ藥氣ヲ浸シ出スナリ温浸ハ其藥ト燒酒ヲ
潤キ硝子ノ格兒弗コルノ半ニ充シメ獸ノ膀胱ヲ水ニ
濕メ其口ヲ封閉シ針ヲ以テ其上面ヲ刺穿テ許多
ノ細孔ヲ作り其格兒弗ヲ爐邊或ハ微温火上ニ置
キ其間コレヲ數振湯シ藥氣ヨク出テ後布片ヲ以
テ是ヲ絞リ瀝テ液ヲ取り又紙ニテ瀝シ硝子壘ニ

入レ固封シ貯ラ其燒酒ノ強弱多少並ニ其淹ス日
數等ハテイキ丁幾去爾チンキト為ス藥品ノ各條ニ載ス附

黝失刺チウシ 羅ラ フフブラド蘭

榕按ニ黝失刺チウシ 羅ラ フフブラド蘭ハ款冬ノ一種ニシテ花葉款冬

ト異ナリ和産未ダ詳ナラズ是レ證類本草ニ出

テス所ノ秦州款冬ナリ是レ長雋足立氏嘗テ圖ヲ

採ルニ草款冬ノ一種ナリト云○ 舶來ノモノヲ見

ルニ葉厚ク背灰白ニシテ毛茸アリ乾葉ヲ到ムニ

澁○ 粘著ノ味亦款冬ト異ナリ○ 款冬根和蘭ニ
説ク所ノ主治開塞發汗利尿殺蟲祛疫等ハ此草

ト異ナレ_レ庄_レ欬嗽喘急等粘液ヨリ起_ル胸病ヲ治
 シ粘痰留飲ヲ解スル効ヲ稱スル片ハ其性功猶
 黥失刺_ト越ニ似タリ_功過爾託亞ノ如シ_性
形状 黥失刺_ト越ハ款冬ノ一種ナリ春月數莖ヲ抽_テ
 一尺許微赤中虛柔脆ニメ白キ毛茸及ヒ尖細ノ葉
 アル_ト刺ノ如シ莖頭各一花ヲ著_ク其瓣細ク線ノ
 如ク攢簇シ美黃色ニメ蒲公英花ノ如シ其邊圍ノ
 瓣ハ各一個ノ半花_{一瓣ヲ以テ一花トス其瓣全ク}
 筒狀ヲ成サズ_{缺テ馬耳狀ヲ爲}
 ス故ニ半_{花ト謂フ}ニメ微細ノ萼ヲ具シ各自ニ一種子ヲ結
 其形矢扁長ニメ白絮著_キ飄散ス萼綠色ニメ細

葉著_ク。花莖庄ニ速ニ枯_レ其後七八葉叢生ス嫩葉
 款冬葉ト鬚鬚氣味亦相似タリ各長梗アリテ毛
 茸被_フ。漸ク長ス_レハ款冬葉ニ似テ小ク大約圓ク
 メ微稜ヲ爲シ邊ニ細鋸齒アリ。面縁背白クメ毛茸
 アリ根柔白細長土中ニ滋蔓ス莖葉根庄ニ味微苦
 粘滑稍收瀟ノ鐵様ノ味アリ香氣ナシ葉冬月枯ル
 水邊濕地ニ生ス○一種山生ノ毛ノアリ花淡紫葉
 殆ト圓ク深緑光澤背灰色ニメ毛茸アリ又一種葉
 光澤大ク灰白人者アリ_物
主治 葉粘滑ニメ收瀟ス胸ヲ利シ肺ヲ和シ欬嗽ニ

峻効アリ殊ニ肺虚損シ或ハ氣管脆弱ニノ酷厲液
侵刺シ發スル痰欬或ハ肺傷乾効勞嗽或ハ粘液質
ノ勞瘵トナルベキ症ニ偉効ヲ稱シ或ハ肺瘍ヲ淨
刷シ或ハ肺焮衝。胸脇痛或ハ喘急。聲嘎及ヒ冒寒傷
冷毒等ノ粘痰ヲ化メ略易カラシメ一切肺病ヲ治
スル要藥トス ○總テ瘰癧毒アル諸症ノ良藥トス
○瘰癧毒ヲ夾ム肺瘍ノ膿腫。肺中ニ硬結シ稍クニ
膿ヲ成シ終ニ勞瘵トナル症ニ効アリ ○瘰癧ノ潰
瘍ハ此葉ヲ水ニ浸メ服シ或ハ此草ノ絞汁ヲ服メ
甚ダ驗アリ幾那ヲ用ヒテ効ナキ症ニ開大効アリ

○瘰癧毒アル小兒。腹肚膨脹。顔面黧澹灰綠色或ハ
眼及ヒ瞼。潰瘍ヲ生シ其他瘰癧毒ノ諸症アルハ此
藥ヲ長服メ殊効アリ ○此葉一弓ヲ取り水一比半
ヲ以テ煎シ減メ半比トシ用フ或ハ幾那或ハ鐵ノ
丁ラインキテウ幾去爾或ハウギリセツ薯草等ヲ加ヘ用ヒテ良 ○或ハ水ニ
浸シ或ハ泡劑トシ或ハ末トシ砂糖ヲ加ヘ或ハ舍
利別トシ用フ ○生葉ヲ取り焮腫。熱性ノ潰瘍。火傷。
乳頭坼裂等ニ貼メ疼ヲ甘メ毒ヲ消ス
丁香油 方レウムカレイヨペイルリ

丁香 分量適宜

右搗テ粗碎トシ罐ニ入レ適宜ニ水ヲ加ヘ或云丁
北水四煖處ニ置キ淹スト五日。硝子ノ格コ兒弗ルニ入レ
蛇管ヲ屬シ沙火ヲ以テ其水ノ半ヲ蒸餾スレバ油。
其露水ニ交テ底ニ沉ム。是ヲ悉契瓦刺斯ニ入レ分
泌メ其油ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯ヌ○其露
水ニ丁香ヲ加ヘ後蒸餾メ油ヲ取ルル前法ノ如ク
ス斯ノ如ク數回メ多ク油ヲ取ルベシ○此油ハ白
色鮮明ニメ稠厚ナラス芳烈ナルヲ擇ムベシ稠厚
ニメ暗黒色。舌ニ觸テ辛辣燒カ如ク大ルハ的列竝

油或ハ丁香ノ越幾斯劑ヲ加ヘ或ハ粘稠ノ油ヲ和
メ偽リ販ク者ナリ○肉豆蔻。桂。府利薩。撒弗刺斯。草
菓。益智。胡椒等ノ蒸餾油モ亦此製法ト同シ（同）

主治 腦。心。胃。子宮。神經ヲ强健ニシ呃逆ヲ治シ失氣

昏冒。胃虛冷痛。寒疝。子宮衝逆。經閉ニ驗アリ○服量

一二滴日川四滴ニ至ル○此油ヲ綿ニ滴シ齧孔ニ

内テ齒痛ヲ治ス是レ齒神經ヲ侵蝕メ麻痺セシム

レバナリ○是ヲ舌ニ塗テ舌神經ヲ衝動健運シ舌

痲言語ヲ治ス（同） 痲言語ヲ治ス（同）

蔣蘿油 「オレウム・ア子左ハ羅
オリイ・ハン・ダニル」

製法 薄荷油製法ト同シ **主治** 茴香油ト同シ 「疾」

實亞格日温 「セイル」 アスガコダク 「羅」

製法 白罌粟舍利別

過爾託亞舍利別 「各等分」

右調勻ス 「疾」

主治 白罌粟舍利別ト過爾託亞舍利別トノ主治ニ

舉ル病ニ良驗アリ 「疾」

利

龍骨木脂 「柔ウボル」 ビウ 「羅通稱」

龍骨木ヲ鑽刻スレバ乳汁ノ如キ脂液出ヅ是ヲ取

リ集メ曝乾スレバ凝結メ顆粒ヲ爲シ或ハ碎塊ト

ナル此即チ龍骨木脂ナリ其質越々様ノ華爾斯ト

ス○上品ハ黃白色乾固メ碎メ易ク淨潔ニメ沙土

等ノ汚物ナク顆粒ヲ成スナリ○印度地方及比亞

弗利加洲ノ諸國ニ多ク産ス

主治 性焚熱シ酷厲ナル揮發鹽及ビ竄透ノ油氣ヲ

少是ヲ嚼碎味辛熱ニメ佳大ラス舌ニ侵刺メ速ク

消散セズ皮膚ニ貼スレバ侵蝕メ泡ヲ發ス著キ香

臭ナシ○峻攻ノ下劑トス僅ニ半氏ヲ服スレバ留
飲停水粘稠ノ汚液ヲ瀉下シ又稠厚ノ血液ヲ溶解
稀渙ス故ニ水腫緊滿脚腫經閉等ニ捷効アリ○然
レ此藥ノ酷厲毒動モスレバ胃腸ヲ侵刺ノ激衝ヲ
發スル下アル故ニ感觸ノ鈍キ人或ハ輕キ下劑ヲ
與ヘテ通利ナキ症ニ非レバ是ヲ用ヒズ或ハ一二
氏許ヲ緩和劑ニ加ヘ與フベシ○嚏藥トメ峻効
アリ此末半氏ヲ嗅引ノ大ニ嚏ヲ發シ頭中ノ惡液
ヲ漏泄シ頭部ノ諸症ニ捷効アリ然レ過用スレバ
涕液大ニ漏泄メ止マズ或ハ困難ノ衄血ヲ發スル

恐レアリ○腐骨疽ニ此末ヲ摻ノ腐壞ヲ祛キ良肉
ヲ生ス○擦油或ハ軟膏ト作シ施メ汚液ヲ淨除シ
凝結ヲ溶解シ細絡ノ壅塞ヲ疏通シ神經ヲ刺戟衝
動ノ頑麻不遂肢節強硬等ヲ療シ或ハ顛顛ニ擦メ
昏睡ヲ省復ス即チ左ノ摩油方良驗アリ

龍骨木摩油方

龍骨木脂 半錢 未 的列並底那一 燒酒 一錢

右調勻シ微火ニ上セ煉和ス○左ノ膏亦良効アリ

龍骨木脂膏

龍骨木脂 一錢 阿利襪油 半 黃蠟 適宜

右文火ニ上七煉和シ軟膏ト作ス 四 國 製

律比丸 リョウヒ

製法

盧會 上好者

沒藥 半斤

雜腹蘭 二錢

右細末トシ燒酒少許ヲ加テ丸藥ト為ス 四 或ハ舍

利別少許ヲ加テ丸藥ト為ス 四 或ハ舍

主治 胃及ビ腸ヲ健運シ大便ヲ利ス緩下ノ良劑ト

ス又寒性ノ患者内藏ニ壅滯セル惡液ヲ消化メ驅

逐ス故ニ飲食消化ヲ助ケ云良液ヲ生シ萎黃病及

栗ビ經閉等ニ尤モ効アリ ① 服量半錢ヨリ一錢マデ用

ヒテ瀉下ス微利ノ効ヲ取ント欲セバ四五日死ス

ニ三次用フ ベ シ 四 國

里沒奈堙蘭 リモナイデ

製法

枸橼膿汁 或ハ橙膿汁

人ノ固糖 一比

右先ヅ枸橼汁ヲ取リ織布ニ夫瀝シ磁壺ニ入レ又

其實ノ黃皮ヲ薄ク剔リ取テ其汁ニ加ヘ沙糖ヲ攪

和シ是ヲ重湯ト爲シ砂糖ヨク烱化スルニ至テ沫
ヲ搦ヒ去リ放冷メ再ビ濾シ其汁ヲ取テ硝子壺ニ
入レ固封シ貯フ也

主治 壯熱病。腐敗熱。惡性熱。等ニ用ヒテ血液ノ燥涸

里 痰滋潤シ汗ヲ發シ津ヲ生シ渴ヲ止メ口舌枯燥ヲ

柔潤ス○冷水或ハ大麥煮汁一碗ニ此液一二匙ヲ

攪和シ服ス

醫

國

國

國

國

國

國

國

國

栗ベッス子ス

羅

リベス

ス

リ

アリ

ム

ト

同

半

アル

ベ

シ

ン

蘭

子

ナリ

是

ニ

赤

栗

子

形状 栗ベッス子スハ一種ノ灌木ニ生スル子ナリ是ニ赤

白黒ノ三種アリ○第一種ハ其樹枝柔撓ニメ皮褐

色葉葡萄葉ニ似テ小ク深綠色邊ニ鋸齒アリ葉間

嫩梗ヲ生メ單瓣五出黃綠色ノ花攢簇シ穂ノ如ク

懸垂シ一心蕊五鬚蕊アリ皆短シ萼五出尖ラズ花

後許多ノ小子ヲ結ビ攢簇メ房ヲ爲ス形子圓ク葡

萄ニ似テ跗カタアリ大ナルハ杜松實ノ如ク小ナルハ

胡椒粒ノ如シ地ノ肥瘠ニ隨テ様ナラズ熟スレ

ハ赤色透亮光澤アリ軟ニメ汁多ク酸甘葡萄汁ノ

如ク清爽賞スベシ圓核多シ○第二種ハ形狀前種

ノ如クメ樹差高ク葉背毛茸アリ子黑色ニメ味佳

ナラズ或ハ花赤色ナルアリ。○第三種モ亦前種ト
 同フノ子差大ク白色透亮或ハ淡黄味發甘。或ハ甚
 ダ酸或ハ過ナ甘シ其樹前種ニ比スレバ高ク枝葉
 淡白ナリ但是ニ三種アリ一ハ花實ハニ多シ一ハ
 花多ク實少シ一ハ花少ク實ヲ結バズ。○第一種ハ
 園ニ培養シ或ハ枝條密茂スルヲ以テ藩籬ニ作リ
 又嫩枝ヲ拵テ速ニ長育シ當年子ヲ結ブ但シ五六年
 大經レバ子ヲ結ス下少ク味亦惡キ故ニ毎年枝ヲ
 拵テ嫩苗ト爲スニ宜シ。○第二種第三種ハ荒野濕
 地水邊ニ生ス。○又一種多ク子ヲ結ビ大榛子ノ如

ク赤クメ味酸花帶赤色ノ者アリ或ハ葉多クノ小
 ク子甘味又者アリ。物因 度

○按ニ此樹和漢產未ダ詳ナラズ但覆盆子懸鉤

子桑椹蓬蘽越橘等ヲ代用スベシ大抵性功同シ

○榕按ニ木只ヨドリゼウ和産 灌 木 名ハ栗斃子ニ

類似タリ然レ子攢簇セズ唯葉間ニ三顆死生ノ頗

カ硬クメ透亮ナラズ味亦酸甘ナラズメ發澁ナ

リ故ニ栗斃子ニ充ラズ

主治子赤色ノ者ヲ藥用トス清涼滋潤シ解熱ノ効

アリ一切壯熱病焮衝ノ諸症ニ用ヒテ血液ノ熱燥

ヲ潤シ渴ヲ止メ心胃ヲ爽涼ニス○尤腐敗ヲ過ル
 効アリ故ニ膽液ノ腐敗酷厲毒ヲ解シ膽液熱腐敗
 熱ヲ治スルニ用フ○肝及ビ胃ノ焮衝ニ發スル惡
 心嘔氣ヲ止メ或ハ赤痢吐血霍亂等ニ用テ熱毒ヲ
 解シ煩悶ヲ消ス或ハ夏月酷暑ノ時用ヒテ煩熱ヲ
 解シ精神ヲ清爽ニシ口熱舌燥ヲ潤シ口腫ヲ消ス
 ○痘疹ノ熱毒ヲ解シ酒醉ヲ醒シ汗ヲ發ス○子ノ
 汁ヲ取り貯ヘ宛モ橙汁葡萄汁ノ如ク藥用或ハ飲
 膳ニ供ス或ハ蜜少許ヲ加ヘ酒ノ如クシ用ヒテ甘
 美清爽ノ飲料トス○此汁ヲ傑列乙出ツト作シ防

腐清涼驅熱ノ飲料トシ多ク用フ（叔）（依）

栗リベラス釐子レ傑列乙イ （ロ）（ブ）（リ）（ベ）（シ）（ノ）（リ）（ム）（ハ）（羅）

製法 栗釐子（リ）（ベ）（ス） 煮汁（ア）（イル）（ベ）（シ）（ン）（ゲ）（レ）（イ）（ハ）（蘭）

栗リベラス釐子レ沙糖（サ）（ハ）（ラ）（ン）（ド）

右栗釐子ヲ適宜ニ取り搗爛シ水少許ヲ加ヘ慢火

ニテ煮ル（コ）（ハ）（ン）（ト）（キ）四分時手ヲ住メズ攪セ篩ニ入レ押シ

絞リ濾テ汁ヲ取り此汁十斤ニ沙糖ヲ攪和シ武火

ニ上セ速ニ煮沸シ攪動セズ木匙ヲ以テ泡沫ヲ抄

去リ鍋ノ上邊マテ沸騰セシメテ火ヲ下セバ即

斤傑列乙ハ稠トナルナリ是ヲ磁壺ニ收メ貯フ○

子ノ汁必キ者ハ子ニ水少許ヲ加ヘ煮テ子破綻ス
ルニ至リ篩ニ入レ前法ノ如ク製スベシ〔按〕

主治 栗斃子ニ説ク所ト同シ〔一〕此劑半ヲ取リ大
麥煮汁十五多ニ和シ服メ前説ノ諸症ニ飲料トシ

用ヒテ尤良〔醫〕 和半ニ和シ服メ前説ノ諸症ニ飲料トシ

栗斃子リ 毘設爾弗ス 栗斃子傑列レト同シ

栗斃子舍利別 製法主治。覆金舍利別ト同シ

栗斃子舍利別 製法主治。覆金舍利別ト同シ

遠

阿利襪カ 蘭レ オリハアレ 羅カ オレアレ 此樹ノ
羅甸名

○按 阿利襪ハ西洋諸地ニ産スル一種喬木ノ

實ナリ土人は是ヲ搾テ油ヲ取り藥用及ビ飲膳燈

油ニ供シ又四方ニ貨ス和蘭ニテ此油ヲオレイ

フオリイトト名リ左ニ舉ル阿利襪油ナリ舶來ア

リ俗間藥舖ホルトガルノ油ト呼ブ〔一〕平賀鳩溪

ノ物類品隲並ニ小野蘭山翁ノ本草啓蒙ニ時珍

綱目篤耨香ノ附録ニ出ル膽八香ヲ以テ阿利襪

油ニ充又膽八樹ヲ以テ阿利襪樹ニ充ツ又膽八

樹ヲ以テ本邦豆州等ニ産スルハボソト云ル

子樹ニ充シ物類品隲云紀伊方言ツクノ木本草
 啓蒙云此樹本邦暖地ニ多シ俗名ツクノキ
 州紀シラキ州九ハボソ州ト云々今豆州産ノハボソ
 ヲ以テ阿利襪樹ノ説ニ較考スレバ其樹葉花實
 ノ形狀大抵相似タレ但阿利襪樹ノ葉ハ對生
 シ且紅色トナラズハボソハ葉互生シ又葉落ル
 并皆鮮紅色トナル又壬午ノ春駿州及ビ豆州ノ
 ハボソノ熟實並ニ未熟ノ者ヲ多ク得テ數搾ニ
 入レ搾リ試ルニ唯滋味ノ稀汁出ルノニテ油
 何味出ルコトナシ是ニ火ヲ點シ或ハ煎熬シ試ルニ絶

テ油氣ナシ然レバハボソハ阿利襪樹ニ非ルカ
 或ハ左ノ譯説ニ載ル一種野生ノ者カ若クハ地
 性ノ異ナルニ由テ其實ニ油ヲ生セサルカ未ダ
 未詳ナラズ又物類品隲ニ云ク此實ノ仁ヲ取テ油
 ヲ搾リタル者所謂ホルトガルノ油ナリト又本
 草啓蒙ニ云ク核中ニ仁アリ是ヲ搾リテ油ヲ取
 ル即ホルトガルノ油ナリト西洋諸説ヲ考ルニ
 阿利襪油ハ核中ノ仁ヲ搾リ取ル者ニ非ズ全果
 ノ肉盡ク油トナルト左ノ阿利襪油譯説ニ述ル
 如シ乃チ阿利襪樹ノ形狀並ニ其油ノ製法主治

等ヲ記ノ考證ニ備フ

〔形状〕此樹園生野生ノ二種アリ○園生ハ喬木ニノ幹塊節多ク皮灰色滑澤枝多ク又四敷シ葉經冬凋マズ狹長ニノ柳葉人如ク末尖リ稍厚ク硬シ面淡緑背灰白毛茸ナシ短梗ニ著キ對生ス葉間嫩莖ヲ抽テ單瓣淡白ノ碎花攢簇ノ接骨木花ノ如ク筒様未開テ四叉ヲ爲ス花後楕圓ノ實ヲ結テ初緑熟スレバ淡黒色皮滑澤肉柔ニノ油質ノ液充テ裏ニ稍長キ一堅核アリテ兩端尖リ内ニ仁アリ其實產地ニ隨テ大小アリ尤大ナルハ肉豆蔻ノ如ク或ハ鵝

卵ノ如ク或ハ榲實ノ如シ形ヲ或ハ圓キアリ或ハ赤色ヲ帶ルアリ味苦澁ニノ佳ナラス木材頗ル固ク淡黄或ハ赭色ヲ帶フ味苦ク微香氣アリ箱匣等ニ造ル○野生ハ樹及ビ葉實凡ニ小ク嫩枝方莖葉背白色多シ實ニ油少シ○此樹意太里亞伊斯把尼亞波爾杜瓦爾蘭牛鐸古福楞察以上歐羅其他歐羅巴洲ノ南方煖地ニ生ス夏月花生シ秋實熟ス種ヲ下シ或ハ藥ヲ分チ栽テ培息シ或ハ園生ノ枝ヲ野種ノ幹ニ接ゲバ八九年ニノ實ヲ結ブ皆油ヲ取テ四方ニ貨ス○未熟ノ實ヲ取リ鹽醬或ハ醋ニ漬

天食膳ニ用フ ○葉水煎救藥トシ口中ノ小瘡潰瘍

ヲ治ス 〔物〕〔度〕 オレウム オリハリ ム オレイフ オリイ オレイム

阿利磯油 オレイフ オレウム オリハリ ム オレイフ オリイ オレイム

製法 實全ク熟シ微黒色ナル片晴天ノ早朝ニ採

リ濕氣ヲ乾シ搾ニ入レ輕ク搾リ火氣ヲ假ラズ油

ヲ取ルナリ然レ其室ヲ煖ニスベシ油出ル日多シ

摺按ニ此油ハ全果ヲ搾リ取ル者ニ仁ヲ取ル

ニ非ル下右ノ譯說ノ如シ又職方外紀ニ云阿利磯

是樹頭之果熟後 ○此油白黃緑ノ三種アリ初ニ其

實ヲ輕ク搾テ出ル油ハ鮮美澄清透亮ニメ水ノ如

ク或ハ微黃味美好ニメ甘ヲ帶ビ佳香アリ 或云香

是ヲ上品トス別ニ貯フベシ ○其次ニ強ク搾テ出

ル油ハ淡黄色ニメ緑ヲ帶ブ是モ亦多ク用フ然レ

初メ白油ニ比スレバ氣味劣リ濃黃曇濁ニメ澁

味アルハ藥用ニ堪ヘズ ○其次ニ尚強ク搾テ出ル

油ハ綠色ナリ味惡ク下品トス燈油擦藥軟膏及ヒ

革ヲ製スルニ用フ ○油ヲ貯ル桶ハ適ク滿ク塗ル

ベシ古キ桶ハ灰汁ニテ洗フベシ桶ニ收メ三十日

許ヲ經レバ渣道生スル故ニ其時上清ヲ取テ他ノ

桶ニ入レ冷ル密ニ貯フベシ ○新鮮上好ノ油ハ澄

清透澈ノ水ノ如シ又味澁敗セズ香味好ク濁緑稠

濁緑稠

厚ナラス其他不潔ノ異色加シ深黄或ハ帶緑。透明
 ナラズ滋味アルハ内服ニ用ヒ難シ。①此油久ク貯
 レバ必ズ澁敗シ色變ス。預メ是ヲ防グニ其桶ヲ
 ヲ久固封シ冷處ニ貯ヘ冬月ハ必許ノ炒鹽或ハ沙
 糖或ハ消石必許ヲ加フベシ。是ヨリ由テ油ヨク溶化
 シ嚴寒ト雖モ凝固セズ且汚濁自澄テ淨潔トナル
 ナリ或ハ燂シタル蠟ヲ入レ或ハ蒸餅心一塊ヲ加
 ルモ良其油ノ汚濁不潔ノ物。惡キ味等ヲ是ニ吸ヒ
 取ルニ由テ澁敗スルヲナシ。②若シ油ニ惡臭ヲ生
 スル片ハ蒸餅心ニ鹽ヲ加ヘ油ノ桶ニ投シ置ベシ

①油濁ル片ハ天日或ハ火ニ燂シ或ハ沸湯ヲ加
 へ澄メ其汚濁ヲ去リ湯ヲ分テ除ク。②油既ニ
 澁敗スル片ハ熱湯ヲ加テ攪液シ其湯ヲ徐ク傾
 ケ去リ數斯ノ如クメ洗淨シ澁味盡ク除クニ至ル
 ベシ。③姦商。罌粟子油ヲ以テ此油ニ偽リ販ク。又
 リ是ヲ用ヒテ害ナシト雖モ阿利襪油ニ若クハ罌
 粟子油ヲ風日ニ曝セバ上面ニ膜ヲ生シ乾タル油
 ノ如シ是ヲ燃スニ燄鮮明ナラズ。阿利襪油ハ曝
 膜ヲ生セズ冬月凝固セズ燃シ光リ鮮明ナルヲ以
 テ分チ辨スベシ。蘭山翁本草啓蒙ニ云。近來續隨子
 ノ油ヲ以テ偽リ賣ル者凡ハ麻油

ノ如クノ色白シト○江戶藥舖清雅樂只亭云、舶來ノホルトカ、ルノ油ニ種アリ、一ハ澄清、一ハ水ノ如ク、
按ニ其疑テ獸脂ノ如キ者ハ藥用ニ堪ヘズ○

主治 甘潤滑利、緩和久功、アリテ且、滲透ニ凝結ヲ解
キ、堅硬ヲ柔ラゲ、痙攣ヲ鎮メ、内藏ノ刺戟疼痛ヲ止
ム、故ニ諸疝、淋疾、赤痢等ノ劇痛ヲ消シ、燥屎ヲ軟ゲ
大便ヲ滑利ス○肺、氣管ヲ滑利シ、咽喉口舌ヲ滋潤
シ、粘痰ヲ化シ、欬嗽喘急聲嘎等ヲ治ス、此油ニ砂糖
或ハ蜜ヲ加ヘ用フ○酷暑ノ頭ニ發スル諸症、霍亂、
膽液ノ酷厲毒ヨリ起ル劇キ腹痛、攣急痛等ニ此油
ヲ雞子黃ニ研和シ水ヲ加テ乳汁人如クシ用ヒテ

良○痛風、走注痛ニ此油四弓マテ毎日服、良驗アリ
催睡鎮痛ノ劑ヲ用ヒテ功ナキ症モ間治スルヲア
リ○勞動セザル人及ビ老人ハ大便閉ノ患多シ、此
症ニ蒸餅一片ヲ取リヨク炙リ是ヲ上好ノ阿利襪
油ニ投シ浸メ、毎朝空心ニ用レハ能ク燥屎ヲ軟ゲ
通利セシム○虛症ノ下利赤痢ニ肉豆蔻末或ハ拳
參根末ヲ此油ニ加ヘ砂糖ヲ摻シ用ヒテ効多シ○
酷烈刺戟ノ毒ヲ包攝甘和スルヲ以テ諸中毒ニ効
アリ、凡ソ亞兒加利鹽毒、或ハ礬石、升汞、膽礬等ヲ服
シ劇症ヲ發スルカ如キハ此油ヲ多服シテ速効アリ

川○但此油ヲ屢多ク服スレバ胃腸ニ在テ酸敗シ
 或ハ纖維ヲ弛弱シ飲食消化ヲ妨ゲ下利腹痛ヲ發
 スルアリ○吉利詞爹兒ノ藥汁ニ加ヘ施ノ急迫
 ヲ緩メ堅硬ヲ軟ゲ痛ヲ止ム○外敷ノ酷厲毒ヲ緩
 和シ硬強ヲ軟化弛緩スル効アリ故ニヨク關節硬
 強ヲ柔撓ス或ハ腹水ノ症ニ此油ヲ全腹ニ擦テ日
 ニ兩次或ハ是ヲ毛巾ニ濕シ腹ニ貼メヨク小便ヲ
 利シ治スルヲ多シ○服量ニ匙許適宜ノ飲液ニ加
 ヘ或ハ沙糖ヲ和シ服ス○疔疔硬結ノ耳痛ヲ發ス
 ル等ニ是ヲ耳中ニ滴シ入レテヨク其硬結ヲ軟化シ

治ス○諸創ヲ愈シ腫瘍ヲ消散シ或ハ化膿セシム
 ルニ塗藥トシ用フ○扁桃油亞麻油胡桃油罌粟子
 油モ阿利襪油ノ性功アリ闕ルニ遇バ代用スベシ
 ○凡ソ藥草花實皮根等ヲ此油ニ浸シ硝子壘ニ收
 メテ天日ニ温メ或ハ煮ル片ハ其藥ニ含メル性能
 及ビ油氣ヲ此油ニ引出シ良効ヲ奏ス○此油ヲ以
 テ上好ノ石鹼ヲ製ス或ハ厨房調理ニ用ヒ蔬菜ニ
 和シ乳酪或ハ脂膏ノ類ニ代用メ尤良

叙伍依後
 種度製

屋施蔑兒

「オツキメルシムフヒクス羅
 エーインホウダゲアセイインホーニグ」蘭

製法

白蜜

水少許ヲ加ヘ文火ニ煮テ泡沫ヲ
拭ヒ去リ毛篩ニテ濾ス者ニ比

右調和シ磁鍋ニ入レ文火ニ煮テ舍利別ノ稠トス

主治粘痰ヲ疏解メ吐キ易カラシメ效嗽喘急ヲ鎮

メ肺氣管ヲ滋潤シ一切肺病ニ驗アリ○膽液熱腐

敗熟ノ飲料トシ燥潤ヲ潤シ攀急ヲ緩和シ口舌ヲ

濡スニ尤良○服量半匙或ハ一匙ヲ用フ○漱藥ニ

加ヘ或ハ和胸ノ祛劑ニ加ヘ用フ取展
亞展

鵠栗拔奴謨羅

「ウイロク」又「左ス」蘭

鵠栗拔奴謨イリバヌムハ亞刺比亞アラビヤニ産スル一種ノ喬

木ヲ鑽刻ノ取ル所ノ越謨質ト華爾斯質ヲ兼樹脂

ナリ微黃白色。硬固膠粘凝塊ヲ爲シ火ニ投メ燃易

ク佳香アリ味苦クノ佳ナラズ○上品ハ鮮白微黃

透亮ニノ顆粒ヲ爲シ碎ケ易ク燃テ佳香アリ

主治性温揮發鹽及ビ油氣多シ微收瀟シ創ヲ愈シ

惡液ヲ除キ汗ヲ發シ下利ヲ止メ粘痰ヲ除キ效嗽

胸痛齒痛等ヲ治ス○服量半錢ヨリ一錢許舍利別

ニ和シ用フ○此末ヲ外敷シ或ハ膏藥ニ和シ貼メ

血ヲ止メ創傷潰瘍ノ腐爛ヲ淨除シ良肉ヲ生シ神

經ヲ強壯ニス叔伍

○按此物性功大抵乳香ト同シ代用スベシ疾

云松香ノ自然ニ滴瀝ノ鮮白微黃汚物ヲ雜ヘズ

顆粒ヲ爲ス者亦ウイロクト名ク代用スベシト

生苗ト置載發熱文ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

香ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

封香ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

封香ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

封香ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

封香ニ似るニ類外微ニ陰不冷也

加

加カ密ミ列レ蘭カ

カエニルラ又マトリカリアカ
モニルラリンナ羅カニル蘭

形状此草二種アリ一ハ尋常加密列ナリ一ハ羅謨

設加密列カレ二種ニ藥用トス○尋常ノ品ハ春

月細キ圓莖叢生スル一ニ尺許枝多ク葉細裂シ

朝霧草ニ似テ綠色夏月枝頭ニ小黃花簇生ス但重

瓣ノ者アリ單瓣ノ者アリ或ハ黃心白瓣或ハ重瓣

白色ノ者アリ舶來ノ者ヲ見ルニ白色ノ者ハ香味

微ニノ性功劣レリ皆瓣ノ端刻缺シ綠萼鱗次ス花

後多ク楕圓ノ細子ヲ結ブ花葉味苦夕竄透

ハ香氣アリ根細ク鬚多シ原野或ハ耕地ニ生ス宿

根セズ○一種黃球ノミニノ瓣大キ者アリ○羅漢
 設セカミツレ加密列ノ種類ハ皆宿根シ每春苗ヲ生シ圓莖低
 屈ノ直立セズ或ハ地ニ塌ス葉前種ノ如クニノ差
 大キ花亦前種ト同フノ味苦ク香氣尤強シ乾セバ
 其氣久ク消セズ此一種重瓣白色甚ダ稠密ニノ黃
 心ヲ掩フ者アリ或ハ黃球ノミニノ瓣ナキ者アリ
 或ハ莖細ク柔脆ニノ地ニ塌シ葉稍白ク小ナルア
 リ氣味大抵前種ト同シ○其他野生ノ者三種アリ
 皆藥用トセズ形狀相似テ混シ易キガ爲ニ是ヲ舉
 グ其第一種ハ「スチンケンデカミツレ」ト名ツク此皆

尋常ノ品ニ比スレバ莖長ク太ク綠色軟脆ニメ折
 レ易ク葉亦大ニノ稍濶ク深綠色花ハ尋常ノ如シ
 然レ花葉ニ臭氣アリ味苦シ宿根セズ○第二種
 ハ「クヂルレ」ト名ク尋常ノ品ニ比スレバ葉長ク灰
 色ヲ帶ビ花差大ニメ香氣ナシ○第三種ハ「ストレ
 イキブルム」ト名ク莖細ク柔葉青蒿葉ニ似テ大ク
 厚ク灰白花ハ前種ノ如クニメ瓣黃色ナリ香氣ナ
 シ○以上野生ノ三種ハ花心凸ナリ尋常藥用ノ二
 種ハ花心扁平ナリ○又一種海邊ニ生スル者アリ
 「セクトヂルレ」ト名ク莖小ク地ニ塌シ葉緑ニメ刻缺

アリ金盞花葉ノ如シ花前種ノ如シ臭氣アリ是モ亦藥用トセズ

○榕按ニ苧蒿ノ一種花戸ニギンコウライ又テウセシギクト呼ブ者花葉ニ加^{カミツレ}密列ノ如クナ

レ凡香氣ナシ右ニ云野生ノ類ニノ藥用ニ充テ難シ苧蒿モ亦右ノ類ニノ香氣微ナリ○其海邊

ニ生シ葉金盞花葉ニ似テ臭氣アルハ濱菊ナリ○崎港在館ノ和蘭人苦薏ヲ以テ加^{カミツレ}密列ニ充用

フト云其氣味性功略相似タルヲ以テ代用スルナルベシ

主治 性温。苦。揮發鹽。油アリ竄透衝動シ温煖開達シ

汗ヲ發シ疼痛ヲ止メ腐敗ヲ防キ衰弱ヲ強壯シ凝結ヲ疏シ堅硬ヲ軟ラゲ小便ヲ利シ又破氣驅風ノ

良効アリ○發汗利尿解凝ノ効アルヲ以テ間歇熱。脾病。黃疸。水腫。或ハ月經不調及ビ經閉ヲ治ス○間

歇熱ノ初發吐下劑ヲ用テ胃腸ニ鬱滯セル病毒ヲ驅除シ其後發作七八回^ドニノ仍^ホ治セガル者ハ左ノ

煎劑ヲ用ベシ幾^キ那^ナノ効ナキ症モ治スル者多シ

加密列煎 加密列一匁 酒石鹽二錢 水四北 右煮減又十六匁ト爲シ熱ノ發作ナキ時。每服四匁

或ハ五弓。日ニ三四次用フ○往古未ダ幾那ヲ用ヒ
 ガル頃ハ加^{カミツレ}密列ヲ用テ峻効アル驅熱劑トス故ニ
 今時モ其毒深ク潛滯セズ其熱甚ダ頑固ナラザル
 症ハ幾那^{キーナ}ニ勝リテ効アリトス是ヲ末トシ或ハ水
 ニ浸シ或ハ泡劑トシ用ヒ或ハ幾那^{キーナ。カコサウ}顯草等ヲ加ヘ
 水煎シ用フ○痙攣ノ諸症ヲ治シ疼痛ヲ止ルニ良
 効アリ水煎或ハ泡劑。浸劑トメ内服シ或ハ葡萄酒
 ヲ加テ蒸湯劑トシ或ハ^{ハツ}琶布或ハ^{キリス}吉利詞參兒トシ
 施ノ皆良^{ムニクスリ}故ニ又子宮衝逆ノ諸症。胃腸ノ^{キリス}攣急痛或
 ハ腎痛。淋疾痛或ハ孕婦臨月ニ發スル臨産痛ノ如

キ腰痛或ハ産後腰痛等ニ驗アリ○痛風走注痛。傷
 冷毒痛等ノ^{フリダシ}焮衝ナキ症ニ泡劑或ハ浸劑トシ或ハ
 亞的爾^{アテ}ヲ加テ用ヒ或ハ是ヲ外敷スルモ良○下利
 赤痢ニ多ク用フ痢ノ腰痛頑固ニメ休^ヤガル症ニハ
 泡劑トシ用ヒテ効アリ是レ能ク^{フリダシ}攣急痛ヲ緩解シ
 衰弱ヲ強壯シ腐敗ヲ防ク性功了レバナリ○赤痢
 ヲ治スルニ是ヲ葡萄酒ニ浸シ甘消石精或阿芙蓉
 少許ヲ加ヘ用テ偉効アリ或ハ是ニ傷冷毒ヲ兼テ
 發汗スベキ症アル片ハ殊ニ良○破氣驅風ノ効ヲ
 稱ス故ニ風氣痞滯ニ因ル心腹痛。疝痛。腹鳴等ヲ驅

散ス○服量末ハ半錢ヨリ一二錢ニ至ル泡劑浸劑
 ハ四錢ヨリ六錢許ヲ取テ沸湯ハ多ニ泡出シ用フ
 水ニ浸スモ或ハ水煎或ハ葡萄酒乳汁等ニ煮テ温
 是ニ同シ
 服ス○外敷ノ輕ク衝動シ硬腫ヲ軟化シ急迫ヲ緩
 ヲ痛ヲ止メ腫瘍ヲ消散シ或ハ化膿ス或ハ經久ノ
 潰瘍ヲ淨除シ或ハ虛弱ノ嗽衝ヲ消シ或ハ頭痛膠
 攣急痛支節痛或ハ子宮衝逆膀胱瘻膀胱瘻急ノ小便淋瀝或ハ尿
 閉ス等ニ蒸漏劑或ハ琶布トシ或ハ吉利詞參兒ト
 シ施ノ効アリ○此藥ハ特ニ腐敗ヲ遏メ血液ノ燥
 解ヲ防グノ効ヲ稱ス或說ニ一片ノ肉ヲ此浸劑ニ

淹シ貯フレバ全夏腐敗セズト云故ニ腐敗ノ潰瘍。
 寒壞疽ニ此末ヲ摻シ癩瘡或ハ臭穢ノ鼻瘍ハ水銃
 ヲ以テ此浸劑ヲ注入シ洗フテ驗アリ○壞疽ニハ
 幾那キナ或ハ樹皮ノ煎汁ニ是ヲ加ヘ蒸漏ノ良○虛
 弱ニ屬スル咽喉口中嗽腫或ハ懸壅垂ノ緩弛ノ腫
 脹スルニ是ヲ葡萄酒等ニ浸シ含漱ノ治ス○是ヲ
 葡萄酒ニ加ヘ煮テ琶布トシ温ナルヲ嗽腫ニ貼メ
 能膿ヲ釀ス○羅斯ロス様ノ嗽腫ハ左ノ燻方尤効アリ

加密列燻方

加密列

刺賢堙兒花

芸香葉

大麥粉

各一握 鷓布羅

末一錢半

右合和シ二個ノ布袋ニ入レ更換シ温メテ患部ニ貼ス○カミツ加密列ハ諸獸咬傷一切毒螫傷ニ内服外敷ノ良ロムムセカミツ羅謨設加密列ハ性功尤峻ナリ故ニ尋常ノ品ニ比スレバ服量必ク用フベシ感觸シ易キ人ハ腹痛嘔吐等ヲ發スルヲカミツ加密列蒸餾油カミツオレウムカモニルラヂスチルリカミツ羅

製法 花ヲ採リ陰乾シ細ニ搗キ温湯ニ浸ス一宿ニメ蒸餾ス其法薄荷油ノ條ニ説ク如シ其油ハ天藍色ナリ但油ヲ得ルヲ甚ダ少シ凡ソ花一比ヨ

油。僅ニ三刃許出ツ。故ニ多クハ加密列煎油ヲ代

用ス。主治 加密列主治ノ諸病ニ内服ノ尤効アリヨ

ク閉塞ヲ開キ汗ヲ發ス服量五六滴ヨリ十滴ニ至

加カミツ密列煎油 カミツオレウムカモニルラヂコク左ムカミツ羅

製法 加密列 新乾者 六多

阿利襪油 二北

右花ノ瓣ヲ去リ黄心ヲ取り硝子壘ニ入レ油ヲ加

ハ固封シ沙火ニ入レ藥氣ヲ浸出スルヲ十二時ニ

メ取出シ布袋ニ入レ絞テ油ヲ取り放冷ノ其稠厚

ノ渣脚ヲ去リ硝子壘ニ入レ固封シ貯ク○乙切草
 油百合油ノ製法モ是ニ同シ〔按〕
 〔主治〕外敷ノ堅硬ヲ軟ラゲ腫瘍ヲ化熟シ痛ヲ止メ
 内服ノ風氣ヲ驅リ肢節痛及ビ淋疾痛ヲ祛キ痙攣
 硬強ヲ緩弛ス〔突〕
 遠西醫方名物考卷六終

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭醫學範提綱 棟齋半田川先生著 全三冊 理學入門 植學啓原 宇山川榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 全七冊

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療正始 沖齋伊東先生著 全十五冊

遠西醫方名物考 同上 全十冊 泰西名醫彙講 紫川貞隆先生著 全六冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 玄哲大槻先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微 同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

