

遠西醫方名物考

加

卷七

林

✕
e 13



富士川文庫
3306

499, 2

12 e 13

Em-4
3

No. 1398

榛齋宇田川先生著

三篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷七

甘草膏

芥子泥

葛爾儒別涅實屈室

附 薄荷健胃水

葛爾儒別涅實屈室越幾斯劑

附 龍腦

龍消散

龍腦醋

遠西名物考

卷七

標目



阿腦點眼水

羯布羅精 カムフラ 羯布羅丁幾去爾 カムフラ 羯布羅精 ト同シ

附 羯布羅擦方

羯布羅油 カムフラ 蝕油 溶油 蒸餾油

附 龍腦乳

羯布羅膏 カムフラ

加耶普的油 カヤプ 卷三十五ノ 二十六葉出

遠西醫方名物考卷七

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴 校補

甘草膏

製法

甘草ヲ細ニ剉ニ磁鍋ニ入レ熱湯ヲ適宜ニ

加ヘ微火ニ上セ浸ス一四時許ヨク絞リ瀝テ汁ヲ
取り其滓ニ又熱湯ヲ加ヘ汁ヲ取ル一前法ノ如ク
シ前ノ汁ト合シ文火ニ煎熬メ凝固セシム
少許加テ凝固セシムレバ尤甘美ナリ
速ニ煎熬スレバ苦味ヲ生シ或ハ焦著ス或ハ銅鍋

ヲ以テ煮レバ銅氣ウツ染シ是ヲ服メ嘔氣ヲ發ス
[主治] 急迫ヲ緩メ乾燥ヲ潤シ酷厲液ヲ甘和シ乾欬
喘急咽喉刺痛ヲ祛キ痰ヲ化シ吐ハキ易カラシム

芥子泥

モスタールトバツフ

蘭

製法

大麥粉

十二弓

芥子末

三弓

醋

六弓

右研和ノ泥ト爲ス○一方ニ芥子末蒸餅心醋ヲ以
テ製ス○効力峻ニノ捷功ヲ要スル症ニハ芥子末

醋ヲ研和ノ泥ト爲シ

或ハ芥子ト蒸餅母ヲ研和ス

或ハ芥子ニ

海鹽オシキ芫菁オシキ丁幾オシキ去爾オシキヲ加ヘ製シ或ハ芥子ニ海葱醋

ヲ加ヘ製メ施ス

[主治] 外敷メ其處焮赤腫痛シ細胞ヲ發ス六時モ貼

スレハ泡ヲ發シ或ハ潰爛ス但芫菁發泡膏ニ比ス

レハ深ク滲透セズ其刺戟スルハ皮肉血絡ニ過ギ

ズ又是ヲ貼メ速ニ焮腫スル故ニ諸卒病捷効ヲ要

スル症ニハ芫菁發泡膏ヨリ勝レリ但芫菁膏ハ速

ニ焮腫ヲ發セザレモ專ラ其効ヲ神經ト水脉ニ致

メヨク發泡ス○脚腓或ハ躡アシタニ貼メ頭腦胸脇等ハ

病毒ヲ下部ニ引降シ且脉勢ヲ憤起増進セシム故
 ニ疝ノ部ニ貼メ良効アリ劇キ頭痛咽喉焮腫胸脇痛或ハ謔妄昏睡疝等ノ
 毒ヲ引降ス ○一切瘡瘍類發出スルハ慢緩遲滯ス
 ル症ニ施メヨク誘發ス又腐敗發斑熱神經熱ニ施
 メ効アリ ○支節走注痛痛風傷冷痛等ノ患部ニ貼
 メ其毒ヲ皮表ニ誘發シ或ハ内攻スルヲ驅發シ或
 ハ疥癬羅斯等瘡疹類ノ潜攻スルニ貼メ其毒ヲ表
 部ニ轉移シ或ハ頑癬等總テ惡性ノ皮病ニ施メ其
 酷厲液ヲ外泄シ治ス ○眼焮腫ニハ腕或ハ項ニ施
 シ胸焮衝ニハ肩胛ノ間ニ施シ咽喉焮腫ニハ頸ヲ

繞ラシ貼メ皆効アリ ○痘ヲメ多ク面部ニ發セザ
 ラシハ此カ爲タメ陰見點ノ時是ヲ腓ニ貼シ或ハ灌膿
 ノ時ニ貼シ其毒ヲ引降ス ○痙攣ノ諸症ニ施メ鎮
 痙ノ効アリ ○依味煎煮未ク精製スルニハ用

葛爾儒別涅實屈室カ羅ルゲセデシテダステル蘭

形狀是ハ薊ノ族ニシテ紅藍ノ二種ナリ春月圓莖ヲ
 抽ヨ二三尺太メ枝多ク粗糙柔撓ニシテ易ク或
 ハ地ニ塌ス葉長潤ニシテ深ク缺裂シ苦菜ノ如ク邊
 葉柔ナル刺及ビ鋸齒アリ莖葉共ニ遍ク毛茸アリ

莖枝頭ニ圓毬生シ毛刺多ク且刺ノ如キ細葉及ビ鱗片ヲ以テ圍ム。毬上ニ絲ノ如ク細キ筒瓣ノ黃花叢生シ後白色ノ毛絮トナリ絮毎ニ細長褐色ノ子著ク。根細長白色。柔脆ニシテ鬚多シ。花葉莖根共ニ味甚ダ苦シ。春月種ヲ下シ四五月花生シ子熟ス宿根セズ。舶來ノ品ヲ見ルニ葉及ビ毬ニ尖刺アレハ柔ニシテ觸テ刺スナシ尋常ノ薊類ト異ナリ。

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ。物云大薊根葉共ニ味苦ク性功殆ト此草ト同シ。江戸郊外ニ産スル大薊ハ根葉共ニ苦味ナク氣味牛蒡ノ如ク稍收滯ス故ニ代用シ難シ。

唯苦味ノ者ヲ擇ニ用フベシ。

主治 莖葉性温。味苦。揮發鹽油及ビ粘液多シ。發汗利

尿ニ用ヒ又健胃制酸解凝稀釋ノ効アリ。○發汗解

毒ノ良効アルヲ以テ傳染疫毒ヲ表發ノ蒸氣ヨリ

發泄シ發斑熱ヲ解シ腐敗ヲ遏ム。○痛風及ビ傷冷

毒痛ニ此葉一弓ヲ葡萄酒ニ比ニ浸シ毎朝臥蓐

在テ一二匙ヲ用ケレハ發汗メ治ス又吐痰ヲ進メ

蒸氣ヲ發スル効アル故ニ一切冒寒病ノ良藥トス

○肺ノ粘痰ヲ除キ効ヲ治ス故ニ肺ノ諸症ヲ兼メ

ル輕キ嗽衝熱ニ良。○咽喉焮腫ニ末トシ喉肉ニ吹

元良○總云羸瘦病ニ用ヒテ熱ヲ起サズ衰弱ヲ強
 壯シ粘液ヲ疏解ス○健胃ノ良効アルヲ以テ飲食
 消化ノ惡キヨリ起ル頭痛。萎黃病或ハ胃腸ニ粘液
 多クノ其觸知ノ鈍キヨリ發スル諸症ヲ驗アリ斯
 如キ症ハ薄荷水ノ如キ衝動驅風ノ藥ヲ加ヘ用
 ヒテ尤良。或ハ間歇熱ノ胃衰弱スルヨリ荏苒トシ
 治セザルニ甚タ驗アリ左ノ方尤良

薄荷健胃水

此方胃ノ衰弱セル諸症ニ殊効アリ

薄荷水

半比 橙皮舍利別 五錢

葛爾儒列涅實屈室越幾斯劑

五錢

幾那越幾斯劑 沒藥越幾斯劑 各半
 亞爾鮮鹽 一錢

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ用フ○此草ハ肝脾等腹
 藏ノ壅塞及ビ是ヨリ起ル黃疸水腫ニ多ク驗アリ
 或ハ失苟兒陪苦及ビ經閉ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス○是
 ヲ末トシ或ハ水煎或燒酒麥酒葡萄酒ニ浸シ用フ
 ○生汁ヲ取リ或ハ乾葉ヲ水ニ浸シ眼ヲ洗テ白膜
 ノ凝血ヲ散シ眼ヲ明カニス○諸獸咬傷毒螫痛ニ
 是ヲ葡萄酒或ハ麥酒ニ煮服ノ効アリ○子ヲ乳劑
 トシ用ヒテ肺嗽衝胸脇痛痘瘡麻疹ニ尤良

物依

葛爾儒列涅實屈室越幾斯劑

製法 蒲公英越幾斯劑ト同シ

羯布羅 カムボラ 同 カムボラ 蘭

按ニ羯布羅ハ龍腦樟腦ノ總稱ナリ西洋ニテ

ハ此ニ品共ニ同一種ニ屬メカムボラト稱ス其

渤泥及ビ蘇門答刺共ニ亞細亞洲ニ屬等印度地

方ノ諸島ニ産スル者ハ極テ上好ナリ是モ亦カ

ムボラト呼ブ漢人嘗テ其諸島ニ通商シ其地ニ

産スル上好ノ品ヲ以テ龍腦ト名ケ又其原名ヲ

音譯ノ羯布羅或ハ羯婆羅ト稱シ其樹モ亦羯不

婆律或ハ固不婆律或ハ婆律樹ト名ツケ又其

我邦及ビ支那ニ産スル下品ノ者ヲ樟腦ト名ク

共ニ時珍綱目ニ出ヅ故ニ今其譯名ヲ用ヒ原名

ヲ稱ソ羯布羅トス左ノ譯說ニ考徵ノ其品類ヲ

辨スベシ

羯布羅二種アリ一種ハ日本及ビ支那ニ産ス一種

ハ渤泥及ビ蘇門答刺ニ産ス二種共ニ羯布羅樹ヨ

リ出ル脂ナリ此樹羅甸名アラウヒスカムボラ其日

ヤホニカト名ク本産ノ樹ヲアラウヒスカムボラヘラ

名此樹殊ニ日本ニ多シ其地ニテ久須乃幾樟也ト名ク。勃泥及ビ蘇門答刺ニ産スル樹ハ日本産ノ樹ニ比スレバ矮小多節葉。丁香樹葉ノ如ク。子。榛子ニ似テ長ク莖大ナリ是ヲ日本産ノ者ニ比スレバ樹ノ小ナルト葉ノ形異ナルヲ以テ分ツノニ其材水材固ク日本産ノ樹ノ如シ椽按ニ花戸ニ龍腦樹ト呼フ者アリ尋常ノ樟ニ比スレバ葉小ナリ盆種ト爲ス勃泥産ノ○錫蘭ノ印度島其他亞細亞洲ノ地方樹ナルベシニテ桂ノ根ヲ鑽刻メ一種ノ羯布羅夫製ス其脂烈香。羯布羅ノ如キヲ以テナリ或ハ錫蘭産ノ山柰ヲ蒸餾ノ一種ノ羯布羅ヲ製シ或ハ歐羅巴洲ノ諸地

ニテモ迷迭香。撒爾非亞刺賢堙兒萊沃刺那以上草名各條出ニ羯歇爾格祿イドイソウハテイム突依卒布底謨以上草名未詳青蒿ノ如キ拔爾撒謨ガムノ實ガムナル草ヲ以テ羯布羅ヲ製ス然レ皆常用ノ品ト異ナリ各其性ニ隨テ香氣亦同カラス○是ヲ分テ精麤二種トシ上下品ヲ定ム其勃泥及ビ蘇門答刺ニ産スル者ハ精好ニメ上品トス故ニ總テ上品ヲ勃泥羯布羅ト名ク最上品ハ其國用ニ充テ敢テ他方ニ貿セズ故ニ是ヲ歐羅巴洲ニ輸スイタ王希ナリ其勃泥産ノ樹ハ小ニメ羯布羅出ルカムト少シト雖モ日本ノ品ニ比スレバ極メテ上品ナルユ

工ニ價モ亦百倍ス。是レ日本ニ於テモ甚ダ貴重シ
王侯貴人ニ非レバ多ク得難シト云
○按ニ勃泥ノ羯布羅ハ日本ノ品ニ比スレバ價
百倍スト云者ハ即チ龍腦ナリ又龍腦ハ勃泥蘇
門答刺等ノ南海諸島ニ出テ支那ニ産セザルコ
漢人亦是ヲ言フ東西洋考ニ云勃泥蘇門答刺暹
羅舊港啞齊滿刺加柔佛占城彭亨蘇祿婆羅等南
海諸國皆龍腦ヲ産スト。又時珍綱目龍腦條時珍
曰。龍腦香南番諸國皆有之。頌曰。今惟南海番舶賈
貨之。南海山中亦有之。宗奭曰。抹羅短叱國抹羅機
兒國也

在南印度境有羯布羅香中略即龍腦香也。又職方外
紀ニ勃泥出片腦極佳云。其時珍綱目云。其
其勃泥及蘇門答刺ニ産スル者ハ自ラ其樹ノ幹
枝ヨリ流滴シ或ハ幹心ヨリ罅罅ニ沿テ溢泄シ或
ハ其板材ヨリ滲出シ或ハ幹脚ニ凝溜メ塊粒ヲ成
ス。故ニ形狀大小一ナラズ。
○按ニ龍腦ハ皆其樹ヨリ滲出ス。樟腦ノ煎煉シ
取ルカ如キ者ト異ナリ。時珍綱目龍腦條頌曰。香
即水中脂也。香在水心中斷其樹剪取之。其膏於樹
端流出。斫樹作坎而承之時珍曰。土人解作板。板縫

成ス者ヲ取り羅テ沙土木屑ヲ去リ分テ上下數品ト爲ス。但其質麤鹵ニシテ鹽ノ碎屑ノ如ク或ハ沙土木屑ヲ雜ルハ下品トス。○其上品ハ鮮麗瑩徹雪白色ニシテ光澤アリ上好ノ消石ノ如ク乾固輕脆。指間ニ摩テ碎ケ易ク速ニ風化消耗セズ。但温氣ヲ得ルバ盡ク消化シ火ニ投スレバ速ニ燃テ消散ス。香氣極テ竄透。味辛微苦。口中爽涼ヲ覺エ黃色ヲ帶ビ汚點ナシ。若シ灰褐赭黯等ノ異色アルハ下品トス。

○按ニ時珍綱目龍腦ノ條宗奭曰濕時無香。木乾之後循理折之。中有香狀類雲母。色如冰雪。時珍曰

白瑩如冰。爲梅花片者爲良。恭曰明淨者爲良。○東西洋考云海上貝錄曰腦樹出東洋文萊國生深山中。老而中空乃有腦。有腦則樹無風自搖。入夜腦行而上瑟瑟有聲。

カム布羅ノ麤ナル者ハ日本及ビ支那ニ産ス。是ヲ尋常ノ品トシ下品ニ屬ス。日本ニ産スル者ヲ一ニ支那カム布羅ト名ケ又下品ヲモ爾ク名ク日本ニ是ヲ製スル法ハ其樹及ビ根ノ切片ヲ鐵罐ニ入レ水ヲ加ヘ堊ヲ蓋ヒ塗封シ煮テ蒸升スルヲ二十四時。即チカム布羅。其堊内ニ凝結ノ塊ヲ成ス。其質麤ニシ

疏脆。頗ル重ク沙糖ノ粗末ノ如ク指間ニ摩スレバ
脂氣アリ透亮白色或ハ黃褐灰色ヲ帶ビ氣味竄透
不佳。辛微苦ナリ是ヲ生羯布羅ト名ク○日本及ヒ
支那ニ出ル生羯布羅ハ麤凶ニメ鹽ノ碎塊ノ如ク
ナルユエニ皆歐羅巴洲ニテ再製メ上好ノ品ト爲
ス。其法。生羯布羅ヲ取り格兒弗或ハ陶罐ニ入レ兜
ヲ覆ヒ文火ニテ升煨スレバ其精粹ハ兜ニ升リ其
兜ノ形ニ隨テ凝結シ扁圓ノ大塊ヲ成シ或ハ碎粒
ヲ雜フ其沙土汚物ハ罐底ニ残り留ル此品潔白透
亮ニメ光澤アリ按ニ是レ木邦藥舖ニテ樟腦

日本産ノ羯布羅ハ洋船載歸リテ亞漠斯テ爾達ム謨
和蘭都ニテ再煉メ極テ上好ノ品ト爲シ四方ニ貨
府ノ名ニテ再煉メ極テ上好ノ品ト爲シ四方ニ貨
シ内外醫藥ニ供ス其精製ノ巧。萬國是ヲ擬スルコ
能ハズ又其法ヲ秘メ他邦ニ傳ヘズ其製スルヲ見
ルニ唯生羯布羅ヲ取り底ノ平ナル硝子壘ニ入レ
沙火ニテ升煨スルノニ他人是ニ倣テ製スレバ曾
テ上好ノ品ヲ得ズ然レバ是ニ夾加スル者アルカ
或ハ製煉術ノ精巧ニ出ルカ今ニ至ルマデ是ヲ知
ル人ナシ故ニ拂郎察ス。諸厄利亞等ノ賈船東方諸地
ヨリ下品ノ生羯布羅ヲ貿易シ來レバ自國ニテ上

品ト作ス_ナ能ハズ必ズ和蘭ニ貨シ其精製ヲ仰ク
 ト云其精製ノ上品ハ雪白色光澤アリ微透亮_ニノ
 輕シ是ヲ捻_ヒレハ粘リ極テ香竄ニ_ニ味清爽ナリ_云
 東方諸國ノ羯布羅ヲ輸シ來テ_ニ亞謨斯_の爾達謨_ニテ精製スト
 按_ニ本邦藥舖販_ル所ノ龍腦三種アリ_○第
 一種ハ洋船ノ品ナリ藥舖ニ是ヲ洋品ト呼ズ潔
 白透亮薄片ヲ爲シ或ハ大小碎屑ヲ雜ス是ヲ上
 品トス_{是レ上ノ譯說ニ云所ノ和蘭}藥舖ノ說ニ
 是ヲ羅_テ細屑ヲ去リ最大ノ薄片ヲ擇取リ本梅
 花ト呼ズ京攝ニテハ大梅花ト呼ビ江戸ニテハ

大頭ト呼ズ是ヲ最上品トス寶曆中吸ビ明和九
 年洋船潔白上好ノ本梅花ヲ輸ス_{イタ}是ヲ千二百斤
 物_モ呼フト云此即チ漢人所謂梅花片氷片ナリ
 第二種ハ清船ノ品ナリ黪澹灰白ニ_メ透亮ナ
 ラズ大小碎塊ヲ爲シ細屑ハ粉ノ如ク沙土木屑
 ヲ雜フ洋品ニ比スレバ稍_ヤ香氣強シ藥舖ノ說ニ
 清船ノ品ヲ唐品又唐人ト呼ズ灰色ヲ帶テ潔白
 ナラズ大小碎塊アリ_レ薄片希ナリ其細屑ニ沙
 土木屑アリ故ニ洋品ニ比スレバ品價共ニ劣_ル
 ト云或云先年清船モ亦潔白ナルヲ渡ス是ヲ藥

舖ニ本梅花ト呼テ上品トス今ハ渡ラズト○按
 龍腦ハ漢土及ビ西洋諸國ニ産セズ皆渤泥蘇
 門答刺等ノ南海諸島ニ産スルノ前ノ諸説ノ如
 シ故ニ唐品ト呼フ者ハ清船南海諸島ニ貿易シ
 來ルニ論ナシ其諸島ノ羯布羅樹ハ特ニ上好ノ
 羯布羅ヲ出ス_ト素ヨリ其風土ニ係ル所ニ其
 品灰色ヲ帶テ沙土ヲ雜フト雖モ製煉ヲ經ル者
 非ズ_{上ノ譯説ニ所謂灰色ヲ帶テ透亮ナラズ}
 屬ス_{ト云}○第三種ハ藥舖ニテ白樣龍腦ト呼
 者ナリ瑩白透亮ニ_{洋品ニ類ス}藥舖ノ説ニ

凡ソ洋品ハ指間ニ摩シテ碎粉トナリ易シ白樣
 ハ碎ケ難シ是レ漢土ニテ樟腦ヲ再煉シ造ル者
 其價特ニ廉ナリ清船載來ルト云_{江都藥舖}
 亭其業ニ熟シ傍ヲ物産ノ學ヲ_{清雅藥只}
 修ム右ノ藥舖ノ説皆是ニ出_ツ○按ニ時珍綱目
 龍腦ノ條時珍樟腦再煉ノ法ヲ載テ云如此升兩
 三次可充龍腦又物理小識云世多升打樟腦作水
 片此説ニ據レバ漢土亦樟腦ヲ再煉ノ龍腦ニ充
 ツ即チ白樣龍腦モ此類ナリ○按ニ龍腦樟腦各
 產地ヲ異ニシ其品同ジカラザレ_{西洋ニテ亦}
 皆一種ニ屬シ通メ羯布羅ト稱ス唯其精麤ヲ以

テ上下二品ヲ分チ其上品ヲ以テ醫藥ニ充ルノ
 云上好ノ品ト爲シ醫藥ニ供スト云 右三種ノ龍
 腦共ニ其質精微ニノ芬香ナレバ皆内服劑ニ用
 フベシ樟腦ハ再煉ヲ經ズ其質麤ニ人多ク汚物
 ヲ夾ム故ニ外敷諸劑 羯布羅精 羯布羅油 羯布
 雖モ藥舖ニ所謂及腦ヲ用フベシ 按ニ白樣龍腦
 ヲ發スル者多シ洋品及口唐品ハ此患ナシ又用
 試ルニ白樣龍腦ハ効劣リ篤疾ニハ上品用ヘシ
 羯布羅ハ密器ニ内レ固封シ貯レバ耗散スルコトナ
 シ或云亞麻子ヲ以テ其上ニ蓋ヒ固封シ貯レバ消
 散セズ其脂氣ヲ以テ羯布羅ノ揮發翔散ノ氣ヲ阻

過スレバナリト云云古入長天封塞ノ法

性温辛微苦極テ竄透ス。硫氣鹽氣アリ。○其質越謨

ニ非ズ華爾斯ニ非ズ又越謨華爾斯ニ非ズ油及ヒ

揮發鹽ニ非ズ唯是レ一種ノ華爾斯様ノ樹脂ナリ

依云華爾斯ノ質多クノ其他 其故ハ是ヲ燒酒及ヒ

油類華爾斯類技爾撒謨類ニ如テ研和スレバ盡ク

溶化ス然レバ其質華爾斯ノ如シ然レバ總テ華爾斯

ヲ溶スベキ所ノ亞兒加利鹽液ニ是ヲ加ルニ絶テ

溶化セズ是レ華爾斯ニ非ル微ナリ 亞兒加利鹽ハ

鹽酒石鹽ノ類其他總テ淋灰鹽ヲ云スハ如キ鹽反
 水ニ溶シタル液ヲ亞兒加利鹽液ト謂フ酒石液固

消石液ノ如シ。總テ華爾斯ノ質アル者ハ。又是ヲ水
 悉ク此亞兒加利鹽液ニテ溶化スルナリ。及ビ一切水質ノ液ニ加レバ溶化セズ。然レバ是レ
 華爾斯ノ如シ。然レバ亞刺比亞越謨ヲ水ニ溶シタル
 粘汁ニ是ヲ加レバヨク溶化ス。然レバ是亦華爾斯
 ニ非ル徵ナリ。○性刺戟衝動ス。故ニ過服スレハ其
 人脈數頗赤。眼焮赤。或ハ搐掣。或ハ譫妄熱ヲ發ス。然
 レ少許服スレバ血ノ運行急疾ナルヲ增益スル
 ナク。却テ焮衝ヲ消シ。熱ヲ解シ。咽喉焮腫。眼焮腫等
 ヲ治ス。或說ニ此物一ヲ服スレバ血ノ急疾ナル
 運行ヲ減スト云故ニ。古人是ヲ性寒トス。然レ畢竟

多ク服スレバ血ノ運行ヲ増進シ。熱ヲ發シ。又氣味
 竄透揮發ニシテ火ヲ點スレバヨク焔ヲ攝スルユ。又
 ニ性温ノ說ヲ確當トス。

主治 竄透衝動。開發温煖。發汗。排毒ノ効アリ。又膠粘
 稠厚ノ血液ヲ稀釋シ。凝結ヲ疏解シ。壅塞ヲ通シ。疼
 ヲ止メ。神經ヲ強壯ス。又拔爾撒謨ノ質アリテ血液
 ノ腐敗ヲ遏メ。酷厲毒ヲ消メ。煩悶ヲ解シ。表發ノ蒸
 氣ヲ驅發ス。○竄透揮發シ。凝結ヲ疏解スルヲ以テ
 腦及ビ神經ノ抑鬱沈重セルヲ徐クニ衝動發揚シ
 血液ヲ體表ニ驅逐ス。是ヲ以テ險痘ノ化膿遲慢シ

或ハ膿色アレハ熱シ難ニ用ヒテ奇効アリ○凡ソ
 熱病ノ性遷延沈滯メ其毒排泄シ難キ症ニ効アリ
 是ニ焮衝ヲ兼ルニモ亦良○總テ表發ノ蒸氣壅塞
 スルヨリ發スル諸症ニ効アリ故ニ傷冷毒ノ諸症
 類胸脇痛等ニ良○凡ソ脉駛數ナル症ニハ龍腦ヲ
 禁スレハ是ニ消石ヲ加ヘ用レバ良驗アリ此症ハ
 左ノ方ヲ用ヒテ尤良

龍消散 消石一分 龍腦一分 煎取汁一合 服之

右研和シ分テ十服トシ一時ニ一服宛乳汁或ハ大

麥煮汁ニテ送下ス○熱毒ヨリ起ル不寐尋常ノ劑
 ヲ用ヒテ効ナキ症ハ龍腦半ヲ消石ニヲ研和シ前
 法ノ如ク用ヒテ効アリ其他頑固ノ不寐ニモ用フ
 右ノ如ク催睡ノ効アルヲ以テ卒倒病及ヒ昏睡ノ
 症ニハ害アリ○惡性ノ痘及ビ疥癬或ハ一切瘡瘍
 ノ陷伏メ内攻シ或ハ是ヨリ蒸發氣壅過ノ發スル
 諸症殊ニ瘰癧ノ癰急ヲ兼ルニ用ヒテ峻効アリ○
 天行疫惡性熱發斑熱ニ効アリ但惡性熱ニハ病毒
 漸ク排泄ノ汗ヲ發スル頃ニ用フベシ初發ハ害ア
 リ○神經熱或ハ腐敗熱ノ脉沈小ニメ疾數皮膚乾

燥スル症ニハ龍腦ニ續草根。沙糖ヲ加ヘ用ヒテ効アリ斯ノ如キ症ハ消石ヲ加ルナシ。○此藥ハ卒病緩病共ニ衰弱セル者或ハ疼痛ヲ兼ル症ニ用フ即チ神經熱。腐敗熱。傷冷毒熱等ノ虛衰ノ内部或ハ外部ニ疼痛アル症。或ハ痛風。流走痛或ハ衰弱セル焮衝發斑。經久ノ失血。頑麻不遂。痙攣搐掣。發狂。黑障。眼。或ハ内藏衰弱ノ花苒タル諸症。脾病。子宮病。蛇蟲。芫菁毒ノ諸症。水銀ノ吐涎ヲ止ル等ニ用フ。○此物ハ發汗起熱ノ効アル故ニ壯熱病人初發焮衝ヲ兼手脈強實ナル症ニハ害アリ斯ノ如キ壯熱劇盛ナ

ル間ハ發汗ノ害アレバナリ然レ其症漸ク變シ過盛ノ運動減メ虚弱ニ涉リ痙攣ノ運動ヲ兼ヌル者ハ醋ヲ加テ殊ニ良。又腐敗ヲ遏。纖維ヲ強固ニス

龍腦醋

龍腦 一錢
亞刺比亞 二錢

沙糖 八錢
蒸餾醋 一北

右龍腦。麩。沙糖ヲ研和シ醋ヲ加ヘ攪合シ半時ニ置キ宛用フ。○龍腦六分ヲ蒸餾醋一斗ニ溶化シ一匙宛服メ發汗劑トシ或ハ鎮痙劑トス或ハ焮腫ノ初發ニ是ヲ外敷メヨク消散ス。○龍腦ハ内部ノ焮

衝ヲ治スル要藥トス殊ニ龍腦乳後ニ出効アリ○諸
焮衝ヲ清涼消散スルニ龍腦一二分ニ消石二倍ノ
量ヲ加ヘ用フ。殊ニ羅斯ニ適効アリ。此藥速ニ滿肢
體ニ透達ノ蒸發氣ヲ排泄シ發汗ノ効アリテ熱ヲ
増發セズ胸中ヲ爽涼ニシ四肢及ヒ皮表ニ鬱留停
著スル惡液ヲ驅發シ羅斯ノ毒ヲ消散スレバナリ。
惡厲ナル羅斯ハ血液腐敗シ或ハ變ノ寒壞疽トナ
ルユエニ是ヲ用ヒテ腐敗ヲ遏メ毒ヲ消シ尤効ア
リ○龍腦ニ消石ヲ加ヘ用ヒテ淋疾ヲ治シ小便ヲ
利シ或ハ月經ヲ通スルニ良効アリ○白帶下ニハ

琥珀ヲ加ヘ用ヒテ良○腎膀胱ノ膿瘍ニ用ヒテ驗
多シ○芫菁發泡膏ヲ貼メ其毒血液ニ浸染シ赤疹
或ハ焮腫ヲ發シ或ハ尿道焮痛小便赤澁淋瀝スル
者ハ其發泡ノ處ニ羯布羅膏ヲ貼シ扁桃乳ニ龍腦
ヲ和シ内服スレバヨク芫菁ノ酷厲毒ヲ制伏メ治
ス或ハ芫菁膏ニ羯布羅カムフラ必許ヲ加レバ右ノ諸症ヲ
發セズト云然レ是ヲ以テ的當ノ効ヲ稱シ難シ芫菁
ノ條ト併シ○龍腦ヲ水銀劑ニ加テ内服スレバ吐涎
セズメヨク其功ヲ爲スト云。是レ龍腦ニ發汗ノ効
アレバナリ然レ是亦確證シ難シ○發狂或ハ依剥イボ

昆^{コン}垤^{ゲル}兒^ニ 内科撰要ニ出 三^ニ 間^ニ 大^ニ 効^ヲ 得^ル ^{コト} ア^リ 然^レ 凡^レ 是^レ ヲ 多^ク 服^メ 効^ナ キ 者^ア レ^バ 是^亦 百^中 ノ 功^ヲ 稱^シ 難^シ ○ 龍^{リウ} 腦^{ノウ} ヲ 内^ニ 服^ス ル^ニ ハ 末^ト シ^テ 一^ニ 匁^{ヨリ} 五^匁 マ^デ 一^ニ 服^ト ス^十 匁^マ デ 用^ル ^ル 稀^{ナリ} ○ 沙^{シャ} 糖^{トウ} 或^ハ 消^{シヨウ} 石^{トク} ヲ 加^ヘ 用^フ 或^ハ 亞^ア 刺^ラ 比^ヒ 亞^ア 越^ゴ 謨^ム 漿^ニ 亞刺比亚越謨ト水ト等分ニノ溶 ス^ニ 研^シ 和^シ 用^ル モ 良^シ 或^ハ 扁^{ヘン} 桃^{トウ} ノ 如^キ 油^ヲ 氣^多 キ 子^ヲ 仁^一 倍^ノ 量^ヲ 加^テ 研^磨 ス^レ バ ヨ^ク 水^ト 混^和 シ^扁 桃^ノ 乳^ノ 一^種 ト^ナ リ 内^ニ 服^ス ル^ニ 宜^シ 或^ハ 雞^キ 子^ノ 黄^一 個^ニ 羯^カ 布^フ 羅^ラ 二^匁 許^ヲ 研^和 ス^レ バ ヨ^ク 水^ト 混^和 ス^レ バ 或^ハ 羯^カ 布^フ 羅^ラ 二^匁 許^ヲ 研^和 ス^レ バ 銳^ニ 烈^ノ 燒^{シヨウ} 酒^一 二^滴 加^テ 研^和 ス^レ バ

ヨ^ク 細^末 ト^ナ ル^カ 羯^カ 布^フ 羅^ラ ハ 水^及 ビ^一 切^ノ 水^質 ノ 諸^液 亞^ア 兒^ニ 加^カ 刺^ラ 鹽^ニ 液^上 註ス 並^ニ 草^木 類^{ヨリ} 製^シ 取^ル 酸^液 二^ハ 溶^化 セ^ス 然^レ 凡^レ 綠^礬 油^ニ 加^レ バ ヨ^ク 溶^化 ス^消 石^精 二^加 レ^バ 盡^ク 溶^化 ノ 所^謂 羯^カ 布^フ 羅^ラ 油^後 出ニトナ ル^カ 燒^{シヨウ} 酒^及 ビ^油 類^ニ 浸^ス モ ヨ^ク 溶^化 ス[○] 羯^カ 布^フ 羅^ラ ハ 患^者 ノ 老^少 強^弱 等^ニ テ 服^量 ヲ 加^減 ス^ベ シ 甚^ダ 衰^弱 ス^ル 者^ハ 半^時 毎^ニ 一^二 匁^{ヨリ} 四^五 匁^マ デ 用^フ 感^觸 石^甚 キ 者^ハ 初^メ 一^匁 ヲ 用^ヒ 漸^ク 其^量 ヲ 加^フ ベ^シ ○ 過^服 シ 或^ハ 數^回 用^ハ 刺^戟 衝^動 ノ 發^熱 頭^痛 眩^暈 嘔^吐 痙^攣 等^ヲ 發^ス ル^{コト} ア^リ 若^シ 此^症 ヲ 發^セ

ハ阿芙蓉劑少許ヲ用ヒテ靜止スベシ或說ニ一患
 者龍腦ニ月ヲ一服トシ用ルニ劇ク神經ノ諸患ヲ
 發シ殆ト死セントスル者ヲ見ルト云○外敷メ齒
 痛ノ一良藥トス此物少許ヲ取テ醋ニ和シ煮沸メ
 含漱ス或ハ鹵孔ニ挿テ痛ヲ止ム或ハ是ヲ醋ニ溶
 シ温メ塗モ良多血焮衝ヨリ發スル齒痛ニモ効ア
 リ或ハ是ヲ搗碎キ温湯ニ投シ固封シ燼ニ安シ暫
 ク温メ硝子壘ニ入レ固封シ貯ヘ用ルニ臨テ温メ
 含漱ス數換含テ尤良○羯布羅ハ腐敗ヲ遏メ凝結
 ヲ解キ且衝動ノ焮衝ヲ減スル性功アル故ニ外用

ノ焮衝羅斯小炮斑疹神經攣痛傷冷毒痛頭痛肢體
 痛總テ衰弱ノ痛及ヒ腫アル諸症ヲ治シ或ハ打撲
 傷火傷等ノ熱ヲ解シ痛ヲ止ム○外敷スルニハ是
 ヲ布ニ包ニ或ハ毛布ニ摻メ貼シ或ハ乾慰劑ニ加
 ヘ或ハ接骨木花加密列等ニ加テ蒸溺劑トシ或ハ
 亞麻油燒酒等ニ溶化シ或ハ軟膏硬膏ニ和シ用フ
 ○亞麻油ニ溶シ塗テ傷冷毒ノ焮衝痛ヲ消散ス○
 此物ハ甚々衝動ノ驅散スル功アル故ニ劇盛ナル
 焮腫總テ壯熱ノ症ニ過用スルハ焮痛ヲ増發ス唯
 虛症ノ焮腫或ハ焮衝刺戟ノ勢既ニ減スル症ニ効

アリ或ハ傷冷毒ノ焮衝及ビ羅斯等妄リニ外敷ス
 レバ其毒内攻メ危症ヲ發スル下アリ。但痛ナキ腫
 瘍ヲ消散スルニハ効ナシ。○虛症ノ焮腫眼及ビ眼
 眵多キ症ハ蜜或ハ蕃薇露ニ和シ眼ニ點メ良効ア
 リ。○焮腫眼ノ淚多キ症ハ左ノ方尤効アリ。

阿腦點眼水

龍腦 五分
 甘扁桃 三錢

右水適宜ニ加ヘ研和ノ乳劑トナルヲ云ト爲シニ
 十四錢ヲ取り左ノニ味ヲ加フ
 阿芙蓉液 二十滴
 皓礬 極細末 十分

右研和ノ點眼水トス。○羯布羅ハ經久ノ潰瘍及ビ

壞疽ニ外敷メ腐壞ヲ遏メ死肉ヲ祛ク。但感觸甚キ

人ハ其刺戟ニ堪ガルコアリ亞麻油ニ溶シ施メ熱

壞疽ヲ遏ム惡性ノ潰瘍及ビ寒壞疽ニ此末ヲ厚ク

患處ニ摻シ又是ヲ亞刺比亞鱗膜漿ニテ溶シ其上

ニ貼メ縛締ヲ施シ數更換メ偉効アリ。或ハ此末ヲ

冰糖ニ研和シ寒壞疽様ノ潰瘍ニ摻シ或ハ腐骨疽

ニ摻メ良。○羯布羅ハ風化シ易シ然レ燒酒油類越

膜ハ粘漿等ニ溶シ施セバ消散セズメ効多シ。

○(後) (福) (過) (依) (單) (覆) (叔) (依)

羯布羅精

スピリタス、ヒニ、カム、ホラ、羅、カム、ヘル、ブ
ラ、ンド、カ、イ、ン、カ、ム、ヘ、ル、ヲ、ン、キ、ヲ、ル、同

製法

燒酒

二十度者
十二度者

羯布羅

極細末

右研和シ硝子壘ニ收メ固封シ時々振蕩シ浸ス

六日ニノ聽用ス○迷迭香、刺賢、堙兒等ノ香竄ノ露

精ヲ以テ右ノ燒酒ニ代用シ製スルモ亦良

主治 外敷メ滲透開達シ凝結ヲ疏解シ腐敗ヲ遏

弛弱ヲ強固ス○傷冷毒痛、打撲傷、閃挫、轉筋、麻痺ヲ

治ス又左ノ擦方尤驗アリ

羯布羅擦方

薄荷油、加耶普的油、迷迭香

羯布羅精

十

薄荷油

加耶普的

油

各二錢

油、刺賢、堙兒、油

硃砂、加石灰精

六錢

迷迭香

右調和シ患部ニ塗擦スルヲ日ニ三次○羯布羅精ハ

閃挫、脱臼、轉筋ノ後、筋及ビ靱帶、弛緩痿弱スルヲ強

固スルニ良効アリ○麻痺等總テ觸知ノ鈍ナル部

ニ施シ或ハ痛風、硬腫、諸疼痛、攣急等ノ熱ナキ症、其

他神經ノ諸症ヲ消散ス○此藥ハ熱性ニシテ衝動シ

凝聚セル血液ヲ疏散スルヲ以テ輕キ焮腫ヲ消散

シ或ハ寒腫ニ尤効アリ故ニ妄リニ劇キ焮腫ニ施

セバ却テ是ヲ增長ス又毒螫刺咬ニ塗テ良○右ノ

右二味硝子壘ニ入レ固封シ煖處或ハ温湯中ニ置
時々振蕩スレバ羯布羅盡ク溶化ノ上面ニ浮ク白
油ノ如シ。是ヲ分チ取り硝子壘ニ收メ貯フ。此油ニ
消石精四分ノ一ヲ含メリ

羯布羅溶油

製法

阿利襪油

二多。亞麻油或ハ扁桃油
代用スルモ可ナリ

右調和シ硝子壘ニ入レ煖處ニ置テ時々振蕩シ
布羅盡ク溶化スルヲ度トシ固封シ貯フ

羯布羅蒸餾油

製法

羯布羅

末

陶土 乾燥シ末トス
海鹽精 一此

右研和シ列篤兒多ニ内レ潤キ塊ヲ覆ヒ。承餾壘ヲ
屬シ武火ニテ蒸餾スレバ羯布羅溶化メ油トナリ

出ツ。但火力緩ナレハ羯布羅悉ク塊ニ著テ油出ル
下ナシ。右三種ノ油ニ多ク水ヲ加レバ盡ク故

如キ羯布羅トナル

主治 阿利襪油。亞麻油。扁桃油。等ノ緩和ノ性アル榨

油ニ溶化シタル者ハ專ニ軟化消散ノ効アリ。凡ソ

寒腫及ビ疼ナキ腫ヲ微衝動ノ消散ス。○蝕油蒸餾油ハ專ラ鑽透侵蝕ノ疏散ス。故ニ外敷ノ硬肉堅腫贅疣息肉。肝胝癭瘤ヲ消散スル良藥トス。少許宛數鳥羽ヲ以テ塗ベシ。○經久ハ創瘍ヲ淨刷シ膿ヲ排吐肉ヲ生ス軟膏ニ和シ貼ノ腐骨疽ヲ治ス。○傷冷毒痛或ハ神經病ノ痛處ニ擦テヨク其痛ヲ消ス。○棉ニ包テ齧孔ニ挿シ或ハ諸齒痛ニ塗テ速効アリ。○拳大ノ琶布腫癩ニ此油ヲ塗ル。毎日兩次四個月ヲ經テ其腫頓ニ消ス。是レ竄透疏散ノ峻力ヲ以テ其粘液ヲ驅逐シ除ケバナリ。

〔叔〕
〔底〕
〔園〕
〔疾〕

龍腦乳

シカムヘルキ又カムヘル
シイメットカムヘル
蘭

製法

龍腦

上好者
半錢

甘扁桃

壳皮ヲ去ル者
六個

沙糖

一匁

薄荷水

ハろ

右龍腦扁桃ヲ石臼ニ入レヨク搗爛シ徐ク薄荷水ヲ加ヘ漚テ汁ヲ取り沙糖ヲ加ヘ溶化シ用フ

主治 凡ノ熱病ノ龍腦ヲ用フベキ症。其他發汗排毒

スベキ諸病ニ用ヒテ煩悶ヲ解シ痛ヲ祛キ安眠セシム。○服量 一時或ハ一時半毎ニ一匙ヲ用フ。

又法

甜瓜仁

大薊子

龍腦

安質沒扭若波烈

消石

大麥煮汁

沙糖 適宜

右瓜仁。薊子ヲ搗盆ニ内レ大麥煮汁少宛加ヘ搗磨
テ乳汁ノ如クシ絞テ汁ヲ取り是ニ餘藥ヲ研和シ
沙糖ハ患者ノ口ニ適フヲ度トシ加フ

主治

一切内部ノ焮衝及ビ壯熱ヲ解シ發汗シ潜伏
内攻ノ毒ヲ驅發ス○護謨規吉ヲ過用ノ頭眩暈

肢體振掉スルニ効アリ○半時毎ニ一匙ヲ用フ

羯布羅膏

製法

微的撒爾弗

右研和

又法

鉛粉

右調和

十瓦阿利機油少許
ヲ加ヘ研合スル者

三北
六北

家猪脂

煮テ手ヲ攪セ放冷シ此膏一匕ニ羯

布羅四錢ヲ加フ

亞

主治 外敷ノ一切焮熱腫痛ヲ涼解消散シ搔痒ヲ去

リ諸瘡瘍潰爛或ハ皮膚層剥脱火傷等ヲ乾愈シ癩痕

ヲ消ス或ハ傷冷毒痛ヲ治ス

亞

要志

外敷劑

一

遠西醫方名物考卷七終

退熱方名

退熱方名... 凡患此症者... 宜用此方... 功效如神... 凡患此症者... 宜用此方... 功效如神...

退熱方名

退熱方名... 凡患此症者... 宜用此方... 功效如神... 凡患此症者... 宜用此方... 功效如神...

遠西醫方名物考標目

卷八

興海葱

龍漫海葱散
酒石海葱散
海葱酒
海葱散
金硫海葱散
桂健海葱散
海葱丁
幾失爾

海葱醋

海葱蜜

酒石海葱蜜

葛縷子

葛縷子油

瓦爾拔奴謨

雙謨通經飲

瓦爾拔奴謨膏

肥海鹽

精製海鹽

海鹽炒乾法

海鹽精

發烟海鹽精

鹽精舍利列
鹽精健胃水
鹽精蜜

瓦老別里鹽

甘海鹽精

但一穗ノ中。花開久_ク漸_ク以テス。初メ下部ニ開
 キ萎テ後。中程綻ビ。終ニ頂上ニ及ブ。稀ニ黄花ノ者
 アリ。花後三稜ノ蒴_カ結ビ。内ニ種_{タネ}ノ如キ楮黒ノ扁
 子充_ツ以。八九月實熟シ。莖盡ク枯ル根ハ葱薤ノ如ク
 層片襲被メ球ヲ爲シ大廿拳ノ如シ_ク。或云兒頭ノ如
 シ_ノ如_ク外皮楮赤色下底ニ太キ鬚條多シ。淡黄色ノ粘
 汁アリ味苦辛。舌ヲ刺戟ス肌膚ニ貼スレハ侵蝕メ
 泡ヲ發ス。香臭ナシ。鐵刀ニテ截レバ其刀鏽テ用フ
 ベカラズ故ニ木刀或ハ象牙刀ヲ用フ新ナルハ白
 色ニメ粘液多シ。久ク曝乾シ或ハ焙乾度ニ過レバ

性力耗散ス○一種根葉氏ニ小ナルアリ根大ナル
 花モ美ナリ○此草伊斯把尼亞意太里亞波爾杜
 瓦爾齊西里亞_{以上歐羅巴}西里亞_{亞細亞洲}其他地
 中海ノ邊。沙地原野ニ自ラ生ス。和蘭ニハ園ニ培養
 ス。根ヲ分テ或ハ種ヲ下シ生ス風氣爽塏温燠ノ地
 疏脆交沙ノ濕地ヲ好ム。寒氣ニ堪ヘズ冬月春初ニ
 ハ密ニ覆ヒ養フベシ_{度物収}
 ○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用
 主治根ヲ藥用トス生鮮ノ者効力尤峻ナリ乾ス者

小氣味稍減ス○性温鑽透刺戟シ膠粘液ヲ疏釋シ
小便ヲ驅泄スルニ奇効アル藥トス又湧吐ノ功アリ○小便ヲ分利スル諸器衰弱シ若クハ粘稠液壅滯ヲ發スル水腫小便閉ヲ治スルニ大効アリ○粘液過多ニメ肺咽喉或ハ腹中諸器ニ鬱聚スル諸病ヲ治ス故ニ粘痰多キ喘急及ビ水腫ニ闕ベカラザル良藥トス然レ内藏ニ壅塞及頑硬腫アリ或ハ脉強ニメ煩渴乾燥ヲ兼ル諸症ハ此藥適當セズ○此藥吐劑トシ用ルコトアリ是ハ唯膠粘ノ汚液肺及ビ氣管ニ凝聚ノ壅塞スルヲ疏解湧泄ノ吐シ除クニ

用フ但是ニハ海葱蜜後ニ出ツヲ良トス痰欬喘滿短氣促迫等ニ速効アリ○散劑或ハ丸藥トシ用ルニハ四白ヨリ十六白ニ至ル但感觸シ易キ人ハ吐下等ノ瞑眩アルガ故ニ初メ一白許用ヒ患者堪ルニ隨ヒ漸ク加フベシ或ハ香竄ノ藥ヲ加テ瞑眩ヲ抑制スベシ假令ハ幾那龍腦阿芙蓉泥菖根等ヲ加ルガ如シ○過用スレバ吐下腹痛尿血ヲ發ス故ニ多血家或ハ感觸シ易キ人或ハ尿道ニ潰瘍アル者ハ是ヲ禁ス○專ラ利尿ノ効ヲ取ガ爲ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用ルコトアリ否ザレバ吐シ或ハ瀉ノ利尿ノ功

遠百名物考 卷八

遠百名物考 卷八

減スルヲアレバナリ或ハ阿芙蓉劑ト互ニ用ヒテ
其吐ヲ防クモ良○海葱ハ粘痰留飲ヲ疏解ノ驅除
スルニ峻効アレハ焮衝ノ症ナキ者或ハ寒性粘液
質ノ人皮膚黧澹灰白脉小遲ニハ肢體勞倦スル者
ニ用フベシ右ノ諸症ニ後方良効アリ

龍沒海葱散

海葱末一 龍腦十 沒藥一錢半 沙糖四錢

右合和ノ散劑トシ分テ十服トシ一日ニ四次一服
宛用フ○左ノ方亦良

金硫海葱丸

海葱末一 越謨安沒尼亞幾各二錢 沒藥各二錢

金硫黃十

右調和シ三丸ヲ一丸トシ每服三丸或ハ其餘日ニ
三四次用フ○留飲停水粘液ノ胃腸ニ鬱蓄スルヲ
小便ヨリ驅逐シ水腫脚腫黃疸經閉等ヲ治スルニ
左ノ方捷効アリ清涼驅水ノ効アルヲ以テ熱アル
症ニ尤良

酒石海葱散

酒石英 沙糖 各六錢

右調和ノ散劑トシ分テ十服トシ日ニ四次一服宛

用フ○海葱ハ動スレバ嘔氣ヲ發スルユ又ニ胃ノ
運化ヲ妨ゲ漸ク食進マズル者アリ然ル片ハ是ヲ
休メ或ハ健胃ノ藥ヲ加ヘ用フベシ○丸藥トシ用
レバ胃ヲ攪擾スル患少シ左ノ方尤良

桂健海葱丸

海葱 末ニ 桂 二錢 健質亞那 一錢

薄荷油 ○六滴 過爾託亞根舍利別 適宜

右調和ノ百二十丸トシ三丸宛用ル一日四次但
其症ニ隨テ増減ス○腹水或ハ粘液胸中ニ蓄滿スル
症ハ酒石海葱蜜 海葱 良効アレモ腹水ハ後方殊良

海葱酒

海葱 自一錢 至二錢 葡萄酒 酸性者

右硝子壘ニ入レ固封シ煖處ニ浸ス兩三日漚シ
毎朝一匙或ハ二匙唯惡心ノミニニテ吐セシメス海
葱モ初メ一錢ヨリ堪ルニ隨ヒ加フヘシ或ハ惡心
ヲ防クニ橙皮丁幾劑少許加ルモ良○又左ノ方驅
水ノ駛効アリテ嘔吐ヲ發スルヲ無シ水郵ニ用

海葱丁幾去爾

海葱 酒石鹽 各一弓 燒酒 八弓

右硝子壘ニ入レ浸ス兩三日漚過メ滓ヲ去リ十

五滴ヨリ二十滴許。其症ニ隨テ増減シ服ス。走ル十
 ○海葱ニ消石一倍ノ量ヲ加ヘ用ヒテヨシ小便ヲ
 利シ停水ヲ驅逐シ水腫ニ大効アリ然レ間吐下ス
 ルコアリ○海葱末ニ峻下ノ藥ヲ加ヘ水腫ニ用ヒ
 テ停水ヲ瀉下シ速効ヲ取ルコアリ此症ニハ左
 方峻効アリ

盧會海葱丸

海葱 末二十
 蘇甘沒扭謨 各一
 藥刺巴華爾斯 各一
 盧會 錢半

右調和シ丸トシ一時半或ハ二時毎ニ一丸ヲ服

ス○水腫ノ患者。右ノ如キ劑ヲ用ヒテ小便夥久通
 シ腹脚等々腫減スルハ其收縮スル多少ニ隨テ
 其部ニ縛帶ヲ施シ又鐵劑ヲ用ヒテ其弛緩セシ部
 ヲ故ニ復スベシ○若シ右ノ諸劑ヲ用ヒテ嘔吐ヲ
 發スル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ其吐ヲ鎮ムベシ○外
 敷タル瘡瘡ヲ治ス

海葱醋

製法 其海葱 鮮者切片 蒸餾醋 二十四

右硝子壘ニ入レ固封シ微火上ニ置テ浸シ藥氣ヲ

出スコノ八日。絞テ汁ヲ取り是ニ燒酒ニ多ク加ヘ靜
定メ底渣ヲ去リカク上清ヲ取り硝子壘ニ入レ固封シ

貯フ其燒酒ヲ加ルカクハ久ク貯テ損敗セザラシムル

散スカク○芥子泥ニ加ヘ外敷メ發泡藥トス医

主治 粘稠液ヲ稀釋シ肺ノ壅滯ヲ疏通シ頭痛痰效

ヲ治ス○適宜ニ水ヲ和シ救藥トメ咽喉嗽腫ヲ消

散ス○芥子泥ニ加ヘ外敷メ發泡藥トス医

海葱蜜 オウゴン 傳シキルラ羅ホニフアギハシセアフ
又セアイウンホニフ蘭海葱蜜ノ義

製法 海葱醋北

○小蜜煮泡去ル者出時小野見ル

右硝子壘ニ入レ振蕩メ混和シ磁鍋ニ内レ文火ニ

煮テ蜜ノ稠カク下為ス医

主治 膠粘液ヲ稀釋シ留飲停水ヲ驅逐シ小便ヲ利

シ痰欬喘急ヲ治シ肺ノ頑痰ヲ祛キ黃疸ニ効アリ

○此劑ハ醋ノ酸性下蜜ノ甘和ノ性トヲ以テ海葱

ノ酷厲毒ヲ抑制スル者ナリ。水腫及ビ小便ヲ利ス

ベキ諸症ニ大効アリ是ニ中和鹽ノ類ヲ加テ殊ニ

良効アリ即チ左ノ方ノ如シカク

酒石海葱蜜 海葱蜜 四カク 酒石葉 三カク 錢

右研和シ一時或ハ一時半毎ニ二錢宛用又。但嘔氣

又發セバ服量ヲ減スベシ此劑胸水腹水及ビ胸中
 粘液壅滯スル諸症ニ殊効アリ○海葱蜜ハ粘痰吐
 シ難キ症ニ用ヒテ痰唾ヲ吐セシメ喘急等ニ捷効
 アリ○肺瘍ノ膿熟セルヲ潰破メ吐セシムルニ用
 フ○膠痰肺ニ粘結セル症ニ此劑一多ニ硃砂精一
 錢ヲ和シ一時或ハ一時半ニ一匙或ハ二匙宛用ヒ
 テヨク痰ヲ咯出ス○是ニ薺グム謨アム安ム沒ム尼ム亞ム幾ムト茴香
 水ヲ加ヘ用ヒテ胸水病ニ奇効アリ○此劑殺蟲ノ
 効アリヨク蚊蟲ヲ驅除ス○適宜ニ水ヲ加テ漱藥
 或ハ咽喉焮腫ヲ治ス廣依
返福

葛縷子カクシイ

葛縷子カクシイカクシイ又カクシイカクシイ羅カクシイホカクシイスカクシイコカクシイメカクシイハカクシイハカクシイ蘭カクシイ

形狀 葛縷草ハ方莖中虛長一二尺許叢生シ枝多シ

葉 胡蘿蔔葉ニ似テ細ニ分裂シ枝ニ排列ス柔ニシ

毛茸ナシ夏月五瓣ノ小白花ヲ開キ繖狀ヲ爲ス花

速ニ謝メ子ヲ結ズ苗香ニ似テ小差長ク灰褐色ニ

之條理アリ味辛甘香氣アリ根細柔白或ハ黃色ナ

リ實熟スレバ莖枯テ宿根ス水邊濕地ヲ好ム煖國

ニ産ス根食用トスル者アリ○子ヲ取り藥用トス

○按ニ此藥和産未ダ詳ナラズ舶來ノ者ヲ用フ

其根ヨリ自ラ流滴シ或ハ是ヲ鑽刻ノ乳汁ノ如キ
 液ヲ取り曝乾ノ凝固セル華爾斯様ノ薹謨ナリ
 此脂ハ薹謨ト華爾斯トノ間ニ屬ス其故ハ是ヲ火
 二投スレバ燄ヲ發ス是レ華爾斯ノ質ナリ是ヲ水
 酒醋等ニ浸セバ溶化ス然レ油ニハ溶化セズ是レ
 薹謨ノ質ナレバナリ依云此脂ハ薹謨質多クメ華
 爾斯質少シ或云此脂ハ其質柔ニノ粘リ蠟ノ如ク
 一種ノ灌ホヨリ生スト
 黃色或ハ赤ヲ帶ビ臭氣蒜ノ如シ上好新鮮ナルハ
 淡白ノ粒ヲ雜ヘ大榛子ノ如シ○此脂二種アリ第
 一種ハ小ナル顆粒ヲ爲シ白色或ハ褐色ニメ淨潔
 微透亮光澤アリ乾固ノ油様ノ粘氣ヲ含メ柔ナレ
 此過タル粘著セズ磨メ細末トナル温ムレバ粘レ此

火氣ニテ溶化セズ火ニ投メ燃易ク味不佳ニメ苦
 夕辛ヲ帶ビ竄透ノ臭氣アリ氣味此ニ薹謨安沒尼
 亞幾ノ如クニメ強シ是ハ上品トス○第二種ハ大
 塊ヲ爲シ多クハ赭色ニメ鐵鏽色ヲ帶ビ粘著メ不
 潔ノ蠟ノ如シ是ヲ下品トス然レ鮮美淡黃淨潔ニ
 メ疏松ノ塊片ヲ成シ乾テ粘著セズ臭氣甚ク味苦
 辛或ハ裏ニ白キ光澤アル顆粒ヲ雜ルハ上品トス
 ○赭色或ハ種々汚色アリ或ハ木屑藁子仁塵土ヲ
 雜ヘ或ハ軟ニメ粘著シ或ハ臭氣ナク黑色ヲ帶ル
 ハ皆下品或ハ偽品トス○此脂ヲ生スル草ハ高サ

六七尺許。莖太^ト指ノ如シ。多ク傍枝ヲ分チ中心淡
 白ノ髓アリ葉^{オラシタセリ}洋芹葉ニ似テ潤ク固ク尖テ^{カタ}缺裂シ
 四時常緑味辛臭甚シ。莖枝頭ニ五瓣ノ黄花簇生シ
 繖狀ヲ爲ス。花後微長キ扁圓ノ繖子生ス^{繖子ハ刺ヲ}
 發斯ノ條^ニ註楮褐色。辛味烈香アリ。下品ノ脂ハ多ク此子ヲ
 雜フ根太ク鬚多シ灰白色ナリ。○此脂ノ顆粒ヲ成
 ス者ハ此草ニ含メル乳様ノ汁自然ニ莖枝及根ヨ
 リ流滴ノ凝結シ或ハ鑽刻ノ流滴スルヲ取リ仔細
 ニ意ヲ用テ塵埃ヲ避ル者ナリ其大塊ヲ成シ下品
 ナルハ其草ヲ鑽刻ノ倉卒ニ多ク其脂ヲ集メ取テ

貝塊ト爲ス者ナリ

○按ニ此脂和漢產未ダ詳ナラス船來ヲ用ベシ

主治性温竄透酸性揮發ノ鹽油多シ又微水氣土氣

ヲ含メリ○神經ヲ强健ニシ堅硬ヲ軟化シ粘稠ヲ

稀釋シ痛ヲ止メ風氣ヲ驅リ諸藏ノ壅塞ヲ疏解ス

此要藥トス肺腸間膜肝脾等ノ壅塞硬腫ヲ疏散ス

是亦以テ又子宮衝逆或ハ月經不調及經閉ヲ治

ス此亦良藥トス多ク丸藥トシ用テ又欬嗽喘急等

胸肺ノ粘液諸病ニ殊効ヲ奏シ或ハ癩症ヲ治シ蛇

蟲ヲ殺ス○經閉ニ左ノ方良効アリ

越漢通經飲

瓦爾技奴謨膏 燒酒 十
 右溶化シ日ニ二卵匙宛適宜人飲液ニ和シ服ス○
 此脂ヲ膏藥ニ加ヘ外敷ノ堅腫ヲ消シ凝固ヲ散シ
 或ハ焮腫ヲ化熟ノ膿ヲ成ス故ニ焮熱アル腺腫或
 頑硬腫。瘰癧。骨腫。微毒結腫等ニ殊効アリ○是ヲ
 沸湯ニ投メ溶シ上面ニ浮ム汚物ヲ去リ用フ或ハ
 醋ニ浸シ溶シ煮テ適宜ニ凝固セシメ用ルモ良○
 服量日一ノヨリ一ノ半ニ至ル
 瓦爾技奴謨膏 エムプラスト。デガルバナム 羅

製法

瓦爾技奴謨 淘淨ノ汚物
 若把兒麻膏 各一坵
 的列竝底那 勿拈祭亞
 右先ヅ的列竝底那ヲ慢火ニ上セ溶化シ漸次ニ餘
 藥ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス 錢ニ碗砂四
 主治 諸般ノ堅硬腫ヲ消散ス

海鹽 井ルマリナム 羅
 主治 温煖疏解ノ効アリ適宜ニ用レバ胃ヲ健運シ

飲食消化ヲ扶ク過用スレバ吐下スルヲ海水ノ如

シ或ハ一月ヨリ半錢許ヲ吉利詞キリス參兒スノ藥液ニ加
 へ施メ下利ノ効ヲ扶ク或ハ浴湯トメ痛風ヲ治シ
 或ハ刺咬傷ノ洗藥トシ或ハ炒温テ袋ニ入レ貼メ
 腹痛ヲ治ス○尋常海鹽ハ土氣水氣多キ故ニ藥用

トスルニハ精製メ用フベシ依福伍

精製海鹽

ケソイフルデゼソウト蘭

海鹽ヲ適宜ニ取リ沸湯三倍ノ量ヲ加テ溶化シ其
 熱セル液ニ鹼蓬晶液鹼蓬晶一此水ヲ滴シ加レハ
 白塗ヲ生ス終ニ毫モ白塗生セサルニ至リ紙ニテ
 漚シ其液ヲ取リ文火ニ上セ少許水氣ヲ蒸散ノ冷

處ニ置バ芒ヲ結ブ其芒ヲ取リ乾シ貯フ依

海鹽炒乾法

サルキナレテクレピタヲニ羅

製法

海鹽ヲ磁鍋ニ入レ蓋ヲ覆ヒ炭火ニ上セ爆

鳴ノ粉ノ如クナリ透明ナラズ白色トナルニ至リ

硝子壘ニ入レ固封シ貯フ依

海鹽精

スヒリチウスサリスマリニ羅
 ゲーストハンゼソウト蘭

製法

發烟海鹽精 一多

蒸餾水

ニ多 二味等分トス

右硝子壘ニ内レ静定スルヲ數日時々振蕩メ漸ク
 混和セシメ固封シ貯フ依

發烟海鹽精

ローケンデゼソウト多ル又ゲーストハン
ゼソウトハンガラウベル又ソウト
此精常ニ蒸氣升發ノ烟ノ如シ故ニ名ク
海鹽精製シ炒乾ノ極細末ト爲ス者

製法

綠礬油 再餾ノ銳烈者 雨水 六多

右鹽ヲ潤大ナル硝子ノ列篤兒多ニ入レ。雨水ヲ磁
器ニ入レ綠礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘ終ニ少
モ沸動セズ冷ルニ至テ管長キ硝子ノ漏斗ヲ以テ
徐々ニ是ヲ右ノ列篤兒多ニ加テヨク鹽ト混和セ
シメ是ヲ沙火ニ入レ。硝子ノ承餾壘三個ヲ以テ其
列篤兒多ニ連屬ス。其法第一個ト第二個ノ承餾壘

ノ頸本ノ側ニ一小孔ヲ穿テ先ツ列篤兒多ノ彎リ
タル頸ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿シ其頸本ノ孔ニ
彎リタル硝子ノ管ヲ挿シ其一端ヲ第二個壘ノ頸
ニ挿シ第二個ノ頸本ノ孔ニ亦彎リタル硝子管ヲ
挿シ其一端ヲ第三個壘ノ頸ニ挿テ連屬セシムル
ナリ但第二個ノ壘ニ蒸餾水四多 綠礬油ノ三分ヲ
入レ第三個ノ壘ニ蒸餾水六多 綠礬油ノ半ヲ入レ
皆其合際ヲ塗封シ初メ文火トシ漸ク火ヲ増シ蒸
餾メ遂ニ必モ蒸氣升ラザルニ至リ火ヲ下シ冷テ
後速ニ放開スレバ第一個第二個ノ壘ニアル精ハ

尤銳烈ナリ第三個壘ノ精ハ緩弱ナリ各是ヲ分チ
硝子壘ニ移シ硝子塞ニテ固閉シ此ニ蠟ヲ塗リ貯
ズベシ右如承餾壘ヲ連屬スルハ其蒸氣ヲ水中ニ
吸收スルガ爲ナリ○此精ハ酸性極テ猛烈ナルヲ
以テ其硝子塞ヲ放テバ蒸氣升發スル下烟ノ如シ
○其綠礬油多此精中ニ混シ清潔ナラザル下アリ
綠礬油雜バ其斯ノ如キ片ハ精製炒乾ノ海鹽ニ多
色清澄ナラズ
綠礬油ノ六分
一ノ量ヲ云
ヲ加テ再ビ蒸餾メ精ヲ取ルベシ是
ニ由テ淨潔トナルナリ

又法

海鹽

精製者炒乾極細末ト爲ス
六北

綠礬油

三北

蒸餾水

二北

右鹽ヲ頸彎リタル硝子ノ列篤兒多ニ入レ沙火ニ
入レ潤キ蒸餾壘ヲ接合シ蒸餾水ヲ磁器ニ入レ綠
礬油ヲ取テ一滴宛其水ニ加ヘテ少モ沸騰セス冷
ルニ至テ硝子ノ漏斗ヲ以テ徐々ニ是ヲ右ノ列篤
兒多ニ加テ鹽ト混和セシメ其口列篤兒多ノ腹ヲ
栓ニテ塞キ膠泥ニテ其罅隙及ビ壘ノ接際ヲ塗封
シ初メ文火トシ鹽精縷狀ヲ爲シテ列篤兒多ノ頸
ニ升リ委蛇彎曲ノ承餾壘ニ下ル片ニ漸ク火ヲ増
テ遂ニ沙鍋通紅トナリ蒸氣升ラス精下ラザルニ

至テ放冷シ速ニ其精ヲ硝子壘ニ寫シ硝子塞ニテ固閉シ冷處ニ貯フ

主治 峻酸ノ性。清涼ノ効。綠礬精。消石精ノ如シ。○血液ノ腐敗ヲ過ル効。綠礬精ニ勝レリ。清涼飲劑ニ加ヘ清爽ノ味アリテ渴ヲ止メ一切腐敗性ノ熱病ニ乾燥熱ヲ兼子咽喉燥キ頭痛譫語或ハ血液焯解崩壞ノ失血等ヲ兼ルニ大効アリ。○總テ此精ヲ内服スルニハ水ヲ加ヘ稀クシ酸美ト爲シ用フベシ。右ノ如キ腐敗性ノ熱病ニハ左ノ舍利別尤良

鹽精舍利別

沸湯九勺 舍利別一勺 海鹽精一錢

右調和シ半時ニ二匙宛用フ。○腐敗熱。神經熱ニ於テ血液腐敗ヲ爲ス。多キホト此精逾効アリ。然レ諸熱病腐敗ナク唯焮衝ヲ兼ル者ハ害アリ。焮衝多キホト害モ亦甚シ。是レ鹽精ノ精微ナル酸性ヲ以テ其焮衝シテ強硬ナル諸脉纖維ヲ衝動メ逾強硬ナラシメ諸症ヲ増劇スレバナリ。故ニ肺焮衝。胸脇焮衝ニ用レバ其乾欬ヲ増發シ遂ニ勞欬トナリ救ハレザルニ至ル。麻疹ニモ亦害アリ其熱毒ニテ肺ニ焮衝ヲ發スレバナリ。○發斑熱モ腐敗ニ屬スル

症ニハ良驗アリ然レ自餘ノ症ニハ害アリ○日發熱間歇熱モ焮衝ヲ兼ザル者ニ多ク驗アリ○赤痢ノ腐敗ヲ兼ル者ニ併効アリ○勞瘵熱ニハ總テ害アリ○小便ヲ利スルニ峻効アリ故テ水腫ニ十滴ヨリ二十滴マデ適宜ノ湯液ニ加ヘ用ヒテ驅水藥トス○胃衰弱ノ食進マズ或ハ嘔吐ヲ兼ル症ヲ治シ胃ノ粘液ヲ稀釋ス左ノ方良効アリ

鹽精健胃水

海鹽

四錢

水

四勺

右溶化シ是ニ海鹽精二錢ヲ加ヘ調和シ卵匙ニ一二匙宛冷水一盞ニ和シ毎日數次用ヒテ諸症全治

スルニ至ルベシ或ハ十滴ヨリ二十滴マデ適宜ノ稀キ飲液ニ滴シ酸美口ニ適ス度トシ用ルモ良○外用ハ腐壞外過ル峻効ノ藥トス漱劑或ハ塗藥トメ咽喉頰裏斷頸等ノ潰瘍滋蔓腐爛シ或ハ其骨ヲ蝕スル症ニ大効ヲ奏ス殊ニ失苟兒陪苦ヨリ發スル口中斷頸ノ潰爛外過ルニ神効アルヲ他ニ比スベキ者ナシ是ニ玫瑰蜜沒藥丁幾劑龍腦ヲ加ヘ瓦施殊ニ良○口頸斷舌ニ癌瘡ヲ生メ臭穢腐爛侵蝕スル症ハ左ノ方奇効アリ

鹽精蜜

右溶化シ綠蓉精ヲ一滴宛加ヘ終ニ火モ沸騰セザ
 ルニ至テ瀝過シ文火ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ試ニ其
 液ヲ冷石上ニ滴メ結芒スルハ火ヲ下シ冷處ニ
 於テ芒ヲ結バシム其芒即チ瓦老別里鹽ナリ是ヲ
 取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ其餘ハ芒ヲ結バザ
 ル液ハ前法ノ如ク煮テ冷處ニ置キ芒ヲ結バシム
 べ山按發烟海鹽精ヲ製メ後其列篤兒多ニ殘リタ
 ル白キ凝固セル渣鹽ヲ取リ適宜ニ水ヲ加テ溶化
 又是酸味多キ故ニ鹹蓬鹽晶ヲ少許宛加レバ沸騰

ス終ニ火モ滾動セザルニ至テ紙ニテ瀝シ冷處ニ
 置キハ芒ヲ結ブ是ヲ取リ貯フ此芒白色ニメ半透
 亮味苦鹹是ニ水三倍ノ量ヲ加レバ溶化ス又氣ニ
 觸テ消化シ盡ク粉末トナル按
 ○榕按ニ洋船齋來ル瓦老別里鹽ヲ見ルニ其氣
 味形質漢舶來ノ芒硝ト毫モ異ナルナシ但其
 製法ニ於テハ大同小異アレ其質ハ一ナリ猶
 諳厄利斯瀉利鹽ハ元來越貌宋ノ泉ヲ煮テ製ス
 ル者ナレ凡或ハ海水ヲ煮テ製シ或ハ山ヨリ堀
 取テ製スル者モ其氣味性功毫モ差ガルカ如シ

ニ收メ固封シ貯フ

主治海鹽精ニ比スレバ性緩和ニノ酷烈ナラス又

風化揮發ノ油氣ヲ含ニ酸美ニノヨク竄透シ技爾

撒謨ノ質アル故ニ内服メ甘消石精及ヒ海鹽ノ如

クニシテ又甘和ノ効アリ○服量四滴ヨリ十二滴

許飲液ニ點服シ或ハ砂糖ヲ和シ舍利別ノ如クシ

甘一弓ヲ用フ

葛私多兒カストール羅ベール蘭蘭

葛私多兒ハ水陸共ニ住ム一種ノ獸ナリ牝牡共ニ

陰處ノ兩側ニ四個ノ囊アリ左右二個宛合ノ四個

囊上囊ト名ク後部其上囊二個ノ内ニ脂液アリ

是ヲ取テ藥用ニ充ツ是ヲ葛私多カストール儂謨ト曰フ此獺

ノ形状主治次條ニ詳ナリ此獸四大洲ノ諸地彼此ニ

産スレ厄殊ニ加拿達北亞墨利加止白里亞細亞洲

没斯箇未亞入爾馬尼亞波羅泥亞孛漏生共ニ歐羅

名ニ多シ軀長大約二三尺許掃四尺ニ及ブ者アリ

リ其圍略其長ニ稱フ然厄肉肥厚ニメ軀短ク見ユ

頭ハ大約圓ク喙長ク齒上下各十枚互咬メ缺ノ如

ク太ク鈷利ニメ力強シ是ヲ以テ樹ヲ倒シ或ハ斷

シ。切齒ト齧齒ハ殊ニ太クメ銳利ナリ眼小ク黒シ
 耳短ク圓クメ外面ハ毛被ヒ裏面ハ滑澤大リ。脚短
 ク前脚殊ニ短クメ五六寸ニ過キズ。後脚扁クメ鱗
 被ヒ水鳥ノ脚ノ如シ五指アリ後脚ハ指間ニ膜ア
 リテ連リ蹠ノ如シ故ニ後脚ト尾ヲ以テ能ク水ヲ
 游ク。前脚ハ五指皆離レテ膜ナク手ノ用ヲ爲シヨ
 ク物ヲ把ルト獼猴ノ如シ筋肉厚ク勁硬ニメ力強
 シ指端皆爪アリ斜ニ尖リ管ヲ爲テ翮ノ如シ尾ハ
 扁圓ニメ長八九寸ヨリ一尺許アリ。其根濶四拇指
 横徑許。中程ハ五拇指横徑許。厚一拇指横徑許。遍ク

鱗アリテ魚ノ如シ。每鱗形六稜濶三四分許。厚クメ
 革ノ如シ其隙ニ少ク小毛アリ故ニ喙ヨリ股マデ
 ハ鼠ニ似タリ股ヨリ尾ニ至テハ殆ト水鳥ノ如シ
 故ニ首ヨリ股マデハ味。獸肉ト同シ。後脚及ビ尾ハ
 味。魚肉ノ如シ。總身ノ毛柔ニメ細ク栗殻色或ハ褐
 色ニメ光澤アリ北方寒地ニ住ム者ハ色濃ク或ハ
 黒シ。稀ニ灰白ナルアリ但其毛ニ様アリ一ハ長ク
 メ遍ク表面ニ見ユ大約一寸六七分許。首尾ニ至レ
 バ漸ク短ク差硬シ脚ハ毛甚ク短シ。一ハ其裏ニ在
 テ短ク遍ク膚ニ著キ長八分餘。毳ノ如ク甚ク纖細

柔軟稠密ナリ脇腹ノ毛ハ最モ柔ニシ細シ是ヲ以テ多ク笠裘莫大小等ニ造ル牝ハ四乳アリ孕テ四個月ニシテ産ス每産三四子ヲ生ス。畢丸甚々小シ其腹腿合縫ノ凹處ニ在リ是ヲ展レバ殆ト狗ノ畢丸ノ如シ○此獸性温順ニシ馴易シ陸ニ在テハ樹實枝葉ヲ食ヒ河ニ在テハ魚鰕ノ類ヲ食フ又草木ノ枝葉ヲ取テ冬月ノ食物ニ備ヘ蓄ヘ且嚴寒ヲ防久カ爲ニ夏月大河湖澤ノ邊ニ洞穴ヲ穿ツテ五六尺許ニシテ其内ニ居室ヲ造リ出入ノ穴ヲ水中ニ通ス。或ハ河中ニ堤ヲ築テ水勢ヲ堰ギ其下流ノ岸ニ沿テ

本草綱目卷八

三十一

風雲堂藏

厰ヲ造ル其甚ダ巧ニシテ伎倆殆ト人工ニ異ナラス乃チ此獸數百群ヲ集テ相共ニカヲ戮セ許多ノ樹ヲ齒截非挽キ來テ基趾ヲ設テ大小ノ柱材ヲ以テ室ヲ構ヘ内ニ木ヲ格シ床ヲ造テ三層樓ノ如クシ其内ニ間隔ヲ作シテ各房ヲ設テ其罅隙ハ悉ク樹枝ヲ挿シ重ニ樹葉ヲ雜テ泥ト爲シ尾ニ載テ其隔壁及ビ外圍屋上ヲ打テ塗ルヲ數回ニシテ内外平滑堅牢ナル牆壁ヲ造リ全形圓ク或ハ卵圓ニシテ高さ三四尺許其洞穴中ニ在テ最モ大ナルハ丈餘ノ者アリ。内徑八尺或ハ一丈許其小ナルハ四五尺許アリ

本草綱目卷八

三十一

風雲堂藏

リ此獸北壯相共ニ各房ニ住ス厥小ナルハ五六個。
 厥大ナレバ三十個モ住ス其下層ニハ水ヲ瀦メ綠
 草樹枝ヲ浸シ蓄ヘ第二層ハ水際ニ接シ是ニ住テ
 常ニ其尾ト股脚ヲ水中ニ濡ス。否カレバ生活シ難
 シ若シ水高ク滿レバ第三層ニ住ム斯ノ如ク黨ヲ
 結ビ類ヲ集テ群居シ又其造築甚ダ堅固ニメ大雨
 洪水ト雖モ損壞セズト云

○榕按ニ此獸本邦所産未ダ詳ナラズ是坤輿
 外紀ニ載ル般第狗ナリ外紀ニ云歐羅巴洲意太
 理亞國有河名巴鐸入海河口産般第狗晝潛身於

水夜卧旱地毛色不一以黑爲貴能噬樹木其利如
 刀又其般第狗ノ圖本編卷三十六ニ出ル葛私多

兒獸ノ圖ト差異アリ
 葛私多儂謨カストロレム ベールゲイル 蘭

葛私多兒獸カストロレム 前條ハ北壯ニ横骨ノ下股間ニ四個
 ノ囊アリ大サ卵ノ如シ其二個ハ前部ニ在リ是ヲ
 上囊ト名ク所謂葛私多儂謨カストロレム ヲ此ニ藏ム其餘二個
 ハ差後部ニ在リ是ヲ下囊ト名ク此ニ稠厚ノ液ヲ
 藏ム其氣葛私多儂謨ニ似テ性異ナリ○上囊ハ陰
 具ノ左右ニ傍テ相對峙シ囊底半規形ヲ爲シテ皮

上ニ隆起ス剖解ノ囊ヲ出セバ全形梨子ノ如シ其
 獸ノ大小ニ隨テ囊亦大小アレ氏中等ノ者ハ長三
 姆指横徑許。底ノ潤一姆指半横徑許。其本ニ循ヒ漸
 ク細クノ一姆指横徑許トナリ直腸ニ連ル。下囊ハ
 肛門ノ左右ニ傍テ相對峙シ皮内ニ在リ其部ノ皮
 ヲ剥ハ囊底見ユ長ニ姆指横徑許。底潤一姆指横徑
 餘。其本漸ク細クノ直腸ニ連ル。○上囊ハ三襲ノ膜
 ヲ被フ。外膜ハ甚ダ硬固ナリ第二膜ハ厚ク柔ニメ
 許多ノ脉絡循行ス。裏膜ハ襞積多ク是ヲ展レハ三
 倍ノ長トナル。表面滑澤灰白色或ハ栗殼色及ビ帶

赭色ノ斑點アリ。裏面粗糙。細絡錯綜シ淡黄色ノ脂
 液充ツ此液ノ乾固セル者即チ葛私多樓謨ナリ味辛ニメ苦ヲ帶ビ臭
 烈竄透其氣不佳ナリ此囊ヲ取り風乾スル一二月
 許。或ハ是ヲ烟窻ニ掛レバ五六日ニメ乾固ス。上品
 ハ囊大ク重ク栗殼色。諸膜乾固メ破裂シ易ク裏膜
 襞積アリテ厚ク革ノ如ク其液乾固疏脆ニメ破碎
 シ易ク蜜及ビ蠟ヲ雜ヘ細膜ヲ以テ組織シタル者
 ノ如シ桂色或ハ栗殼色ニメ黄ヲ帶ビ味辛苦甚ダ
 竄透スル一種ノ臭氣アリ火ニ投スレバ炎ヲ發シ
 臭氣殊ニ甚ダシ新鮮ナル者稠固ニメ粘テス橙皮

色ニノ竄透ノ氣甚ダシ。販賣ノ者ハ炮リテ赭色ト
 ナリ乾固ニノ破碎シ易シ○此物止白里及ビ没斯
 箇未亞^{出上}ニ産ヲ上品トス其囊赤色ヲ帶ビ稍圓ク
 大ク重實ニノ硬固ナリ横斷スレハ裏赤赭色ニノ
 肝藏ノ色ノ如キ者充テ細膜筋條ノ組織セル如キ
 モノニテ包裹シ摩シテ粉碎トナリ易シ然レ乾燥
 セズ北亞墨利加洲及ビ波羅泥亞^{エシ}諸厄利亞^ア等ノ産
 ハ下品トス其囊充實セズ且濕リテ脂ノ如ク或ハ
 燥テ滋潤ナシ凡ソ此物久ク經テ黒ク且臭氣ナキ
 ハ藥用ニ充タズ○此物價貴キ故ニ偽品多シ或ハ

秤量ヲ増ガ爲ニ鉛錫等ノ丸ヲ囊中ニ挿ス者アリ
 是ヲ横斷スレバ其丸見ル或ハ撒瓦^ガ百奴^{ベヌ}謨^ム臭氣^ア
 ノ名ヲ雜ヘ其囊ニ充ル者アリ是ハ其臭氣ニテ知ル
 ベシ凡ソ眞品ハ人工ニテ價造スベカラザル所ノ
 細膜ノ組織セル者其囊中ニアルヲ以テ鑒定スベ
 シ或ハ特牛ノ罽丸ノ包膜ヲ取り是ヲ前説ノ物ヲ
 雜ヘ實チテ葛私多^{カスト}儂謨^{トレム}ノ全形ヲ偽造スル者アリ
 或ハ葛私多^{カスト}儂謨^{トレム}ニ蜜ヲ煉和シ其囊ニ充ル者アリ
 是ハ其囊ヲ押ス片ハ蜜ノ腐敗セル者逆出スルヲ
 以テ知ルベシ○下囊中ニハ淡黄色ニテ油ノ如ク

蜜人如キ稠厚ノ液アリ其氣微葛私多僂謨ニ似タ
レ凡久ヲ經レバ凝結シ其質及ビ色モ獸類ノ脂膏
ノ如シ故ニ藥用トセズ

主治 竄透油及ビ揮發鹽多シ頭腦神經ノ壅塞ヲ開
キ痙攣搐掣ノ諸症ヲ鎮定スル聖藥トス。故ニ子宮
衝逆風氣痞滯ノ諸症或ハ鬱憂病。痲等ノ諸症及ビ
頭眩眩運肢體顫振調動ニ奇効ヲ奏ス或ハ纈草阿片
等ヲ加テ尤効アリ○粘痰多キ喘息ヲ治ス或ハ嗽
衝ナキ諸疝腹痛ニ是ヲ治疝ノ劑ニ加入用テ驗ア
リ○子宮病ヨリ發スル經閉ヲ通スルニ屢効アリ

末トシ半錢マテ數用フ然レ尋常多ク是ヲ用ル
能ハザル片ハ臭氣アル越謨類阿魏越謨安汶尼亞
幾瓦爾按奴謨等或ハ琥珀ノ製劑ヲ以テ代用スベシ○妊婦惡疽ニ
効アリ但此症ハ甘消石精ヲ數日連服シテ亦同タ
驗アリ○産後惡露ヲ下ス良藥トス○舌非言語蹇
澁ニ末トシ舌下ニ塗テ効アリ○子宮衝逆及ビ痙
攣其他前說ノ諸症ニ左ノ丁幾去爾奇効アリ

鎮痙丁幾去爾

葛私多僂謨カストリウム 阿魏アウイ 硃砂シユサ 加燒酒精カキヤウ
右調勻シ硝子壘ニ入レ固封シ淹ス日六日其間數

其壘ヲ振蕩スヘシ。服量十五滴ヨリ四十滴ニテ日ニ數次葡萄酒ニ點服ス。此藥未ト用ル者ハ一匁ヨリ十匁或ハ半錢マテ沙糖ニ和シ或ハ散劑丸

藥或ハ飲劑ニ和シ用ス。西國藥師法爾特氏云ク此藥ハ

葛私多儂漢丁幾去爾羅。天候アリ。寒宮商。漢又才靈

製法 葛私多儂漢 適宜 藥劑。古藥。治瘧

燒酒 二十五度者 藥日。藥。亦同

右硝子壘ニ入レ淹ス。六日。布片ニテ瀝シ又紙ニ

テ瀝シ滓ヲ去リ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治 葛私多儂漢。主治人諸病ニ尤良。卒倒癩瘵。子

宮衝逆ノ苦悶促迫ヲ速ニ解ス。○風氣痞滯ノ心腹痛ニ甘消石精ヲ加ヘ用テ峻効アリ。○服量一二滴ヨリ五十滴ニ至ル。葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス。○子宮病等一切瘵癰ノ諸症ニ阿芙蓉劑ヲ加ヘ用テ殊ニ良。左ノ方尤効アリ

葛私多儂漢鎮瘵飲

葛私多儂漢 幾去爾 二錢 薄荷水 半匁

密涅刺爾鎮痛液 一錢 石膽 橙皮舍利別 一匁

舍電發謨阿芙蓉液 四十滴

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ其症治ノ後仍半時

ニ一匙宛用フ○葛私多カストト儂謨レウム丁幾去爾テインキテウレ得難キ片ハ琥珀ラインキテウレ丁幾去爾テインキテウレ或ハ阿魏テインキテウレ丁幾去爾テインキテウレ少許ヲ以テ代用スルモ亦効アリ叔依

○按ニ葛私多カストト儂謨レウム丁幾去爾テインキテウレ缺ル片ハ左ノ方ヲ代用スベシ叔依

纈草丁幾去爾

亞爾箇兒アルホル十六十六条条ヲ燒酒燒酒ニニ纈草根纈草根粗末粗末ハ右硝子壘ニ内レ浸シ其色出出ル至テ絞リ濾テ滓ヲ去リ又纈草根ノ細末三三条条ヲ其液ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ絞リ濾シ靜定ノ其渣ヲ去リ此液

ハ多ニ亞的兒アールの條條ニ出出三三条条ヲ調和シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ○服量二十滴ヨリ四十滴マデ時々葡萄酒ニ點服ス

主治此丁幾去爾ハ神經ノ知覺鈍クナリ或ハ其

運營錯誤スル症假令神經熱子宮病ノ諸症等ニ

奇効アリ凡葛私多儂謨或ハ麝香ヲ用ベキ諸症

ニ皆甚ダ驗アリ或ハ薄弱ニ以感動シ易キ人ハ

葛私多儂謨及ビ麝香纈草根ノ氣ニ堪ズノ嫌惡

ムトアル片ハ此劑ヲ代用ノ同ク良効ヲ奏ス或

痙攣ノ諸症甚キ者ハ阿芙蓉液ヲ加ヘ用ベシ叔依

家猪脂淨製法 ケソイフルデハルケニス。ウセル 蘭

家猪脂適宜ニ取り膜ヲ去り細ニ截リ水ニテ數回

洗テ其水清澄トナルニ至リ清キ鐵罐ニ入レ微火ニ

上テ溶化セシメ木匙ニテ攪セ温ニ乘メ布片ニテ

絞リ漉シ磁壺ニ入貯フ○諸獸脂淨製法皆是ニ同

シ〔主治〕軟化緩和シ疼痛ヲ止メ凝結ヲ溶解ス〔按〕〔疾〕

遠西醫方名物考卷八終

遠西醫方名物考卷八終

家猪脂製法... 取猪脂適宜... 沈之其本... 上之溶化... 絞之濾之... 諸獸脂淨製法皆是... 止痛之止... 凝結之溶解... 國

香木... 飲

遠西醫方名物考標目

卷九

〔太〕答末林度

答末林度涼下飲

達刺侃馬

達刺侃馬鎮痛散

大黃舍利別

大黃越幾斯劑卷三十二蘇甘沒扭ノ條
大黃丁幾失爾卷二十四ノ十六葉出

打膿法

大麥

麥酒 膽礬 石膽

韃爾答律斯越默室屈松安質沒

〔禮〕

麗春花舍利別

列印設酒

遠西名物考 卷九 蘇合油 蘇合香 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油

列篤兒多

曾蘇合香 蘇合油

蘇合香樹 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油

奈那波里膏 水銀條規吉

良刺發斯

老利兒 榨油 煎油 老利兒油 刺賢埴兒油

老利兒油

刺賢埴兒

刺賢埴兒油

刺賢埴兒精

遠西醫方名物考卷九

遠西醫方名物考卷九

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補

太

答末林度 蘭 答末林度

榕按ニ答末林度ハ答末林電ト曰フ樹ニ生ス

ル英中ノ髓ナリ此樹亞刺比亞洲國名麻打葛失

葛爾 亞弗利加 錫蘭 印度 等熱帶ノ地ニ生ス高

甘胡桃樹ノ如ク葉皂莢葉ニ似テ淡緑夜分相合

スル丁合歡葉ノ如シ花三瓣ニモ萼四出白色若

香ニメ橙花ノ如シ花後莢ヲ結ブ長一指許形チ

遠西名物考 卷九 蘇合油 蘇合香 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油 蘇合香樹 蘇合油

肥皂莢ニ似テ厚ク鐵色ヲ帶ビ内ニ髓アリ或云ニ皮アリテ其間ニ髓ヲ藏ム髓中ニ核アリ大サ蠶豆ノ如シ黃赭色ニノ光澤アリ其髓ヲ取り布巾ニテ絞リ瀝シ藥用トス即チ答末林度ナリ栗殼色味酸クメ乾腊ノ杏肉ノ如シ新鮮多液味酸美黑色ノ泥ヲ爲シ細筋及ビ黑色ノ核ヲ雜ル者眞品トス○西洋未說ヲ按スルニ其莢ト核ヲ搗交ヘタル者ハ動モスレバ沙糖梅李ノ肉舍利別醋等ヲ加テ偽製スル者アリ宜ク擇ムベシト云○亞墨利加洲ノ地西方ヨリ輸ス者ハ必ズ沙糖ヲ加ヘ腐敗ヲ防クユ

味酸甘ニメ乾キ或ハ軟ナリ此ハ藥用ニ充難シ東方諸國莫卧兒ヨリ東ノ諸國ヲ云以下是ニ倣ノ品ハ沙糖ヲ加ヘザル故ニ酸味甚ク且重ク黑色ニメ乾ケリ其上品ハ津液多ク徽氣ナク發甘味ナク軟ニメ膨起セル核ヲ雜ルナシ又是ニ鐵刀ヲ刺シ置テ其力銅色トナシハ銅氣アルノ徵トス是ヲ用テ害アリ○按ニ此樹和産未ダ詳ナラズ但酒石英ト性功同シ代用スベシ依編圓李實椒實ヲ代用スル說アレモ穩當ナラズ○昔山藤林氏是ヲ華夷考ノ酸角ニ充ツ然モ其花葉未ダ詳ナラズ主治輕下劑トシ又性酸涼收斂メ津ヲ生シ渴ヲ止

膽液腐敗ノ酷厲毒ヲ疏滌シ一切壯熱病ニ用テ熱
ヲ涼解シヨク腐敗ヲ遏○腐敗熱炊衝熱膽液熱黃
疸黑膽液多キ等ノ劑ヲ用ベキ症ニ適當ス○血
ノ稠厚及煥衝性ヨリ起ル血經閉痔血壅滯疫痢等
ニ驗アリ○右ノ諸症ハ輕瀉下スベシ左方尤良

答末林度涼下飲

其 答末林度 三多 蒲公英根 蘆根 各二
右水適宜ニ加淹シ瀝テ其汁ニ比テ取左人品ヲ加

滿那 三多 霸王鹽 二錢

右攪和ニ其時ニ三四匙宛其症ハ輕重ニ隨ヒ用テ

○答末林度ノ質ヲ檢査スルハ酒石ノ酸性ト砂糖
及ビ粘液ヲ混和スル故ニ其性殆ト酒石ト同シ代
用ノ可ナリ○服量一多ヨリ三多マデ煎劑或ハ適
宜ノ飲液ニ和シ服ス○此物銅器ニ觸ルバ綠色ト
ナリ是ヲ服スレバ其毒ニ中テ危症ヲ發ス

物依福

達刺侃篤

達刺侃篤ハ一種ノ麴菌ナリ上品ハ細ク長クノ交糾

屈曲シ小蟲ノ如ク鮮美潔白或ハ灰白ニテ透亮滑
澤乾固ニテ脆ク嚼テ香味ナク粘リ或ハ微甘ヲ帶

ヒ水ニ溶化ス然レ亞刺比亞アラビヤ越謨ゴムニ比スレハ稠厚
 ニメ粘著シ溶易カラズ此物多ク水ハ多ク和メ
 粘汁トナル但水銀油脂華爾斯スト混和セス○下品
 ハ太ク黄色或ハ黯楮ニ塵土等ノ汚物ヲ雜フ○
 此越謨ハタラガカンタタ羅ラダラガントボム又ボック
 スドルン蘭ト名ル灌木ノ幹枝或ハ根ヨリ夏月自
 ヲ流淌シ或ハ是ヲ鑽刻メ取ル膠液ナリ其樹二種
 アリ第一種ハ枝硬ク白色ノ勁刺アリ葉小狹長
 ノ羊齒様ニ兩對排列シ莖梢尖テ白刺トナリ舊葉
 落レバ其莖長キ刺トナル枝梢ニ花攢簇シ豆花ノ

如ク金雀花ニ似タリ白色或ハ黄色ヲ帶ブ花後白
 キ小莢ヲ結ズ太甘白芥子ノ莢ノ如ク形蠶豆ノ莢
 ニ似タリ内ニ白ク稜アル小子アリ根長ク滋蔓
 ス第二種ハ大約前種ク如ク葉灰白ヲ帶ビ花ニ
 紫色ノ條理アリ此樹南拂郎察都兒格ト結麗タ亞加
 依那波里ホ甘的亞リ亞カ彫ボ綾リ以上歐羅巴ニ産ス
 ○按ニ此樹脂和漢産未ダ詳ナラス庚福云性功
 亞刺比亞越謨ト同シト代用スベシ人大人小人
 主治性潤涼微鹽氣アリ油氣多シ堅ヲ軟ク酷厲液
 ヲ甘和シ稀涼液ヲ稠厚シ粗糙ヲ滑利シ滋潤ス故

乾欬。咽喉刺痛。聲啞。治之。肺ノ酷厲液ヲ消シ。或下利赤痢下血。或淋疾痛。熱尿ヲ治シ。或焮腫眼。腎膀胱ノ焮痛等ヲ療ス。○諸疼痛ヲ消スルニ左ノ方尤良

達刺侃篤鎮痛散

達刺侃篤 末三錢 阿芙蓉 四分

右研和メ細末トシ分テ十八服トシ一時ニ一服宛用ヒ其症ニ隨テ加減ス。○服量半錢許。焙乾ノ末トシ或ハ水ニ溶シ膠汁ノ如クシ用ヒ或ハ散劑加ヘ或ハ錠及ビ丸藥ヲ作ルニ此護謨ヲ水ニ溶シ加テ製ス。其他亦内服スル可稀ナリ是ヲ薔薇水ニ溶シ

焮腫眼。墮淚眼ニ外敷シ或ハ水ト乳汁ヲ加テ溶シ吉利訶參兒トメ下利ニ施シ良効アリ。或ハ是ヲ水ニ溶メ龍腦乳ヲ製スルニ用フ。

大黃舍利別黃

大黃 到者 沙糖 沸湯 各二

右大黃ヲ湯ニ浸ス。六時。煮テ絞リ滓ヲ去リ漚過

シ靜定メ渣ヲ去リ沙糖ヲ加テ溶化シ文火ニ煮テ

舍利別ノ稠ト爲ス

主治 腐敗膽液等一切惡液ヲ大便ニ滌除ス。輕キ下

劑^ニノ微利ヲ取ル^ニ用^ヒ甘美^トノ^ハ小兒^ニ與^ルニ
 宜^シ。一卵匙宛數用^フ。○此劑古方ハ失格列^レ乙^イ等ノ
 無益ノ藥品ヲ加^レ凡^レ令^ハ通^メ此簡易ノ方ヲ用^フ
 矣^依○古方ニ多ク失格列^レ乙^イヲ加^ル
 方ヲ載^ル故^ニ左^ニ其製法ヲ記^ス
 又法^セイ^ルフ^スシ^コレ^イキ^ムラ^バル^バル^ニ羅
 大黃^合計^大黃^細判^ニ多^クハ^ハ失格列^レ乙^イ葉^及根^生鮮^者
 用^ヒ其^沙糖^隨之^加減^ス水^各三^北
 右^矢格^列乙^ニ水^ヲ加^ヘ煮^減ノ^三分^ノ一^トシ^漉テ
 汁^ヲ取^大黃^ヲ加^ヘ浸^下六^時再^ビ煮^沸シ^温ニ^乘メ
 瀝^シ沙^糖ヲ^加ヘ^文火^ニ煮^テ舍^利列^ノ稠^ト爲^ス 臣

打膿法

^ホン^タ子^ル羅^ハ蘭^ニ

是^ハ鉞^ヲ以^テ肢^體各^部ノ^皮ヲ^截或^腐藥^ヲ貼^メ
 小^創ヲ^作リ^膿ヲ^釀メ^流泄^セシ^メ是^ヲ以^テ體^中各^部
 部^ニ蠶^蓄メ^諸患^症ヲ^發ス^ル病^毒惡^液ヲ^導泄^シ除^ク
 久^療術^ナリ^或ハ^燒鉞^烙鐵^ヲ以^テ創^ヲ作^リ潰^膿セ^シ
 シ^ムル^トア^レ凡^レ患^者恐^怖シ^且痛^苦ニ^堪ザ^ル故^ニ
 令^時ハ^施サ^ズ多^ク鉞^ヲ用^フ其^痛必^クメ^創ヲ^作
 速^ナレ^バナ^リ然^レ凡^レ鉞^ヲ嫌^人ハ^腐藥^ヲ用^ベシ
 試^効是^ヲ施^セバ^其部^ヲ刺^戟衝^動ス^ルト^連綿^トメ

休ザルニ由テ體中ニ潛結壅滯セル病毒ヲ誘發ノ
 其部ニ轉移シ或ハ是ヨリ常ニ膿汁ノ淋漓スルニ
 因テ他人ノ部ニ諸液ノ漏泄スル病アルヲ治シ或ハ
 疼痛ヲ患ル部ノ近傍ニ是ヲ施シ膿汁ヲ排泄セシ
 メテ其痛ヲ治ス○勞效若クハ勞瘵トナルベキ病
 ノ初發。肺ニ酷厲液アリテ侵刺ノ休ズ或ハ瘡瘍ノ
 毒内伏メ其症ヲ發スル者ハ此術間大効アリ○頑
 固ノ傷冷毒痛。喘息。久効。胸肋焮衝ノ初發ニ是ヲ施
 ヲ効アリ○惡液質ノ人及ビ瘰癧毒アル者ニ發ス
 ル瘡瘍等頑固ノ皮病或ハ經久ノ眼疾。腺腫。瘰癧或

ハ險痘後ノ餘毒ニテ發スル諸病或ハ經久ノ頭痛。
 脚ノ潰瘍等ニ治驗多シ○是ヲ施シ膿汁多ク出テ
 患者良効ヲ覺ルハ其瘡ヲ愈スコ勿レ否カラサレバ
 其症復増發ス。但膿汁出ルコ必ク自ラ乾ク症ハ是
 ヲ愈シテ可ナリ

部位 是ヲ施ス部位ハ上臂内側。上部。股ノ肉側。
 下部。筋ノ内側。等ノ筋肉ノ凹處ナリ。但較著ハ血脉
 神經。腓アル處ヲ避テ施スベシ。假令ハ癩及頭腦病ハ
 頭ノ冠縫ト角縫トノ交際ノ部ニ施シ頭痛。眼痛。耳
 痛。齒痛。上臂ノ外側或項窩ニ施シ傷冷毒ノ焮腫

眼^ニ腕^及脚^ニ施^シ脛^腕股^等痛^ハ直^ニ其部^ニ施^ス等ナリ。但^レ筋肉薄^キ部^或瘦削^{セル}處^ニ是^ヲ施^セバ太^ニ炊痛^ヲ發^シ或^ハ乾燥^メ汚液^出ル^トナシ

施術 鉞^ヲ以^テ創^ヲ作^スヨ^ハ其部^ノ皮^ヲ撮^ツ舉^グ

若^ク縱^或ハ横^或ハ十字^様ニ截^テ筋上^{脂膜}ニ至^リ腕

豆^或ハ健質^{亞那}或^ハ泥菖根^ヲ豆^ノ如^ク圓^ク刮^テ

其創^ニ填^テ干^綿撒^絲ヲ被^ヒ蓋膏^ヲ貼^シ繃帶^ヲ施^シ

愈^スコトナク膿^ヲ成^シ久^ク流洩^セシムルナリ

但^レ每日^其豆^ヲ更換^テ創^ニ内^ルベシ

腐藥^ハ刺^必斯^即歇^兒那^粟斯^或ハ刺^必斯^加烏^斯蟄^屈私^或ハ罈^不

篤^密特^兒等^{ナリ}是^ヲ貼^スル法^粘固^ノ硬膏^ヲ厚^ク

攤^テ其正中^ニ小孔^ヲ穿^テ是^ヲ其部^ニ貼^シ其孔^ニ

腐藥^ヲ點^シ其上^ニ又^ハ蓋膏^ヲ貼^シ繃帶^ヲ施^シ其後

侵蝕^メ稍^炊痛^ス但^レ膿^ヲ成^スハ每日^是ヲ拭^去リ

豆^ヲ新^ニ換^テ蠟布^或ハ蠟紙^ヲ被^ヒ繃帶^ヲ施^シ常

ニ汚液^ヲ滲^泄セ^シメ其病^治スル^マテ愈^スコト無^ル

ベシ

○其創^炊熱^腫痛^甚キ者^ハ白蠟^ヲ膏藥^ト貼^スベシ

○ヨク炊痛^ヲ消^シ潰爛^ヲ止^ム或^ハ膿汁^甚多^ク

多^ク流泄^スル者^ハ唯^ハ縛帶^ノ施^スベシ

○其創^膿汁^少ク^ク乾^ク者^ハ大麥^煎其他^適意^ノ飲液^ヲ多^ク

其樹ヲ鑽刻シ脂液蜜ノ如ク滲出ノ凝固シ滴液ヲ成ス片ハ塵埃ヲ避ケ香氣ノ脱セザルカ爲ニ蘆管ニ收メ貯ル者ナリ此品近來甚ダ稀ナリ故ニ尋常ノ品第二種ヲ藥用トス○第一種第二種ハ滴液ヲ雜テ小塊ヲ成シ黃赤色或ハ淡赭ニシテ稍白色若ハ淡黃ノ碎粒ヲ雜ヘ淨潔鮮美ニシテ光澤アリ汚物ナク滋潤アリテ粘著セズ疏脆ニシテ燥硬ナラズ磨碎シ易シ佳香竄透メ索露拔爾撒謨ノ氣アリ火ニ投スレバ殊ニ佳香アリ味微苦シ是ヲストラクスカラエタメナリ第一種中ノト名ケ亦上品トス是レ土人其滴

液顆粒ヲ擇ビ取ラズ諸脂液ヲ雜合メ凝固セシメ塊ヲ成ス者ナリ但大塊ヲ成ス者ハ多クハ淨潔ナラズ○第三種ハ大塊ヲ成シ輕クメ水塊ノ如ク燥固ニシテ汚物ヲ雜フ是ヲストラクスエキスフレサ搾リ取ル蘇ト名ケ下品トス藥用ニ堪ズ是ハ拔爾合香ノ義ト名ケ下品トス藥用ニ堪ズ是ハ拔爾撒謨ノ如キ純粹上好ノ脂液ヲ搾リ取り其餘ノ性力半脱セル粗劣乾固ノ渣脂ヲ集メテ大塊ト爲ス者ナリ○第四種ハ蘇合油ナリ是ハ膠粘ニシテ拔爾撒謨ノ如ク膠汁ノ如ク或ハ蜜ノ如ク灰色ニシテ赤ヲ帶ビ或ハ綠ヲ帶ビ或ハ赤赭色ニシテ黃ヲ帶ビ汚

物ヲ雜へズ辛味芳香竄透ニ蘇合香ニ髣髴タリ是
 夫^トラク久ス^リギ^ンノ^クハ^ク流動蘇合^ノ義^也又^トラク久ス^ルホ
 ニ^ス蘇合香^ト名ケ小桶^ニ内^レ四方^ニ貨ス。此物水
 ニ浸シ貯^レバ氣味効力脱スル^トナシ上品ハ楮赤
 色ヲ帶ビ稠粘^ニメノ香氣蘇合香^ノ如シ○或云是レ
 一種ノ拔爾撒謨^{ナリ}其樹ハ亞墨利加洲^ノ暖地ニ
 産ス。或云是蘇合香樹ヨリ滲出スル清稀ノ華爾斯^ニ
 ニ没藥少許ヲ加ヘ煉和スル者ニ又偽品ニ非ズ香
 氣蘇合香ト一般ナレバナリ故ニ眞品ハ甚ダ芳香
 大^ニ比^テノ流動ト凝固ト二様ノ華爾斯^一樹ヨリ出

ル者多シ此物即チ蘇合香樹ノ流動ノ華爾斯ナリ。
 或云是蘇合香^的列竝底那^{アリ}阿利機油^{葡萄酒ヲ煉和}
 シ製ス^ル者ナリ或云蘇合香樹ノ皮ト葉ヲ煎熬シ
 楮色粘稠ノ流動セル^ニ趨謨^ヲ取^リ製スル者ナリト。
 然^レ眞品稀ナリ多^クハ蘇合香^{没藥的}列竝底那^ヲ合
 製スト云○此物ハ西里亞^{世布兒私}萬島錫蘭^{皆亞}
 洲^ニ或ハ西齊里亞^{甘的亞}彪綾^{歐羅巴洲}其他亞
 屬ス^細亞洲亞弗利加洲^ノ諸國ニ産^ス或^ハ亞墨利加洲
 ニ^モ一種上好ノ品アリ^其味^即知^傳蘇合香^也
 主治 性温開達解疑温煖ノ効アリ拔爾撒謨^ニ質アリ

用之腦神經心胃ヲ强健ニ以惡液ヲ驅散シ痲不遂
 ヲ療シ酷厲ナル傷冷毒欬嗽喘息咽喉刺痛聲啞等
 人肺ニ罹ル諸症ヲ治シ痙攣ヲ鎮メ痛ヲ止メ睡臥
 シメ肢節痛ヲ祛キ月經ヲ通ス軟膏ニ加テ潰瘍
 ヲ淨刷シ神經腫癩癰ヲ消シ或ハ香料薰藥トス
 蘇合油主治愈創ノ枝爾撒謨トシ或ハ軟膏トシ外
 敷メ温煖開達シ堅硬ヲ軟化シ攣急ヲ弛メ神經ヲ
 健運シ疥癬等一切皮上ノ汚斑小胞ヲ消シ衝動メ
 凝結ヲ疏解スル効ヲ稱ス収製法由蒲蒲郎大救時
 蘇合香樹アルボルステイラクス五重過由蒲蒲郎大救時
 蘇合香樹アルボルステイラクス五重過由蒲蒲郎大救時

形状是レ一種ノ小木ニノ樺或ハ榎楂榭梓樹ニ似
 テ幹差白ク葉亦小ク楮圓ニノ勁硬ナラズ梢葉ハ
 圓シ面綠色滑澤背淡白色ニノ毛茸アリ花單瓣白
 色筒様邊多ク分裂シ枝ニ攢簇ス大サ橙花ノ如シ
 花後一圓子ヲ結ブ肉厚ク大サ榛子ノ如シ淡白色
 味微苦裏ニ一二ノ堅核アリ核中仁アリ髓ノ如ク
 ニノ油多シ味佳ナラズ南方暖地ニ生ス故ニ寒氣
 ニ堪ズ此樹脂即チ蘇合香ナリ重製
 ○按ニ此樹和産未ダ詳ナラズ重製

① 此種味香未及精ヤク大明喉利消痰
 ② 樹部有七種合香ヤリ
 ③ 和封ヤク南流類也其主入効ニ與屬
 ④ 圓七毛熱マ肉厚ヤク大ヤ刺ヤク枝ニ花白
 ⑤ 外ニ刺ヤク枝ニ花白
 ⑥ 葉亦小ヤ圓
 ⑦ 葉ニ花白
 ⑧ 葉ニ花白
 ⑨ 葉ニ花白
 ⑩ 葉ニ花白

良

刺發斯蘭

レヒスチキム

和蘭

〔形状〕此草春月初テ葉生シ。白芷葉ノ如ク多ク又ヲ
 爲シ黯緑光澤ニメ邊ニ鋸齒アリ。葉間數莖叢生シ
 高廿五六尺。太ク中虛。黄緑色。條理アリ。節及ビ枝多
 クメ是ニ葉生ス。夏月莖頭單瓣五出ノ小黄花。繖ヲ
 成ス或ハ白花ノ者アリ花後稍長キ扁圓ノ繖子ヲ
 生シ。榕按ニ凡ソ繖ヲ爲ス花ヲ和蘭ニテゴロシム
 猶繖花ト謂ガ如シ其種子ヲゴロシムサドト名ク是
 亦冠子ノ義ニメ猶繖花子ト謂ガ如シ故ニ是ヲ譯
 ノ繖子ト名ク凡ソ繖ヲ爲ス花ハ皆扁圓ノ子ニ故
 合ノ繖子ノ如シ故ニ是ヲ繖子ト名ク是ヲ譯
 内ハ平ニ背ハ隆起シ種テハ二枚トナリ各
 葉ハ胡蘿蔔ノ類一切繖花ノ種テハ二枚トナリ各
 葉ハ胡蘿蔔ノ類一切繖花ノ種テハ二枚トナリ各

薄キ縁アルト白芷子ノ如クニメ差長ク小サク蔞蘿子ニ比スレバ大ナリ。褐色ニメ縦理皺紋アリ。根太ク硬ク長ク細楎アリテ滋蔓シ鬚多シ外面栗殻色或ハ黒色ヲ帯ビ。裏淡白色ナリ。○莖葉不佳ノ氣アリ。根子殊ニ甚シ。根味辛苦微甘。子辛クノ甘ヲ帯ブリ。○形状氣味大抵白芷ノ如クニメ花黄色ナリ。○此草歐羅巴洲南地ニ生ズ嚴寒ト雖モ枯レズ根多年存ス。春月根ヲ分テ栽テ繁茂シ易シ或ハ秋種ヲ下シ翌春苗ヲ生ス。陰濕ノ地。肥土ヲ好ム。○一種莖矮ク三葉宛著ク者アリ但氣味劣レリ

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ。叔物此根性効。白芷或ハ漢種ノ羌活ト同シ。代用スベシト云。依性効稍苗香ニ似タリト云。**主治**性温。根及子ヲ用フ。油氣鹽氣多シ。開達。發汗。利尿。驅風ノ効アリ。胃腸ヲ衝動シ飲食消化ヲ扶ケ又粘稠不化ノ汚液ヲ消シ水腫ニ用テ蒸氣ヲ泄シ小便ヲ利ス。○胸中粘痰ヲ祛キ喘息等胸病ヲ治シ又健胃ノ効アリ。○腹中痞氣鬱蓄ノ諸症及ビ寒冷ヨリ起ル内部疼痛ヲ治ス。○經閉及ビ産後惡露ヲ下ス。○根及ビ子。水煎或ハ散劑トシ或ハ水若ハ葡萄酒

酒ニ浸シ用フ○水煎シ或ハ露水ヲ取テ蒸溺劑或ハ洗藥トシ面部小皰赤疹汚斑ヲ消シ或ハ疥癬潰瘍蛇咬ヲ治ス

老利兒蘭

ラウリール 蘭 實 此樹大小二種アリ暖國ノ産ハ大ニメ喬木ト

形状 此樹大小二種アリ暖國ノ産ハ大ニメ喬木トナリ幹修直皮厚ク綠色滑澤上部ニ枝極繁リ葉四時緑長六七寸或ハ尚長キアリ濶二三指横徑末尖リ刻缺ナク硬固深緑ニシテ光澤アリ短梗ニ著ク摩スレバ清香賞スベシ味微苦芳竄微收瀟ス或ハ皺

紋アリ或ハ美黄色ノ斑アル者アリ春月葉間或ハ枝梢ニ細花生シ筒様單瓣四出或ハ五出ハ鬚蕊アリテ又ヲ爲ス白色或ハ黄綠色常春藤花ニ似テ稍大ナリ花謝テ秋卵圓ノ實ヲ結ブ大ナリ櫻桃子ノ如クニシテ褐色熟スレバ黒シ薄キ殻皮アリテ其内ニ堅仁アリ嚼片ハニツニ分レ楮黒色味辛苦香竄ノ者ヲ齧ムニ樟腦ノ氣アリ油氣多シ○樹ノ小ナル種類ハ矮クメ灌木ノ如ク一根數幹ヲ生シ枝赤色ヲ帯ビ葉前種ニ比スレバ狹小ニシテ薄ク柔ナリ○樹ニ雌雄アリ雄木ハ花アリテ實ヲ結バズ○意太里亞伊斯把尼

亞南拂郎察共ニ歐羅巴等ニハ自然ニ生ス。寒國ニ

テハ培養ス瘠地海邊ニ多シ。○林娜リナス私名ノ説ニ桂

樟。安息香樹。三桎烏藥等ハ此樹ノ種類ナリト云

○榕按ニ老利兒樹ラウリール先輩天竺桂ニ充ツ。天竺桂ノ

老葉ハ三縱道アリテ桂葉ノ如ク又莽草ノ氣アリ。

老利兒葉ラウリールハ三縱道ナク枸櫞葉或ハ多羅葉ノ如

ク夕ラウリール佳香アリ月桂天竺桂及ビ其油ハ臭氣又

非リ老利兒油ラウリールハ佳香アリ本邦暖地ニ生スル天

竺桂ノ皮ハ藥舖ニ松浦肉桂ト稱シ根皮ハ味辛

ク桂ラウリールニ似タリ。西洋説ヲ考ルニ老利兒皮ノ氣味。

桂ニ似タル説ナシ。故ニ老利兒實ハ月桂ニ穩當

ナラズ。舶來ノ老利兒葉及ビ實ノ氣味ヲ以テ考

レバ樟ノ類ニ近シ。○此樹和漢産未ダ詳ナラズ

舶來ノ品ヲ用フベシ。

主治實新鮮肥大油氣多キヲ擇ムベシ。性温。辛微苦。

鑽透開達ニ凝結ヲ解キ特ニ健胃發汗利尿ノ効ヲ

稱シ月經ヲ通ス。○神經及諸器虛弱ニハ血液粘稠

トナルヨリ發スル諸病ニ偉効アリ。○粘液風氣多

キ疝痛寒性ノ衝逆病ニ良。○凡辛熱衝動ノ劑ヲ處

スベキ諸病ニ適當ス。故虛寒ニ屬スル疝不遂黃疸。

水腫。肝脾壅塞。痞氣鬱滯。經閉。產後腹痛。良。但孕婦
 二ハ害アリ。○水煎。泡湯。トシ。或葡萄酒。或水。浸シ
 用フ。或末トシ。用レ。辛味甚キ。故ニ半錢ヨリ多ク
 用。難シ。或吉利詞。參兒ノ藥液ニ加ヘ。施メ。効アリ
 ○蒸湯劑。或。毛布ニ加ヘ。外敷メ。疼痛ヲ消散シ。堅硬
 ヲ軟化シ。寒腫ヲ消ス。○葉ノ功。大抵實ト同シ。末ト
 シ。飲食ニ掺シ。用テ。清香ヲ賞シ。或ハ每服一錢ヲ用
 テ。間歇熱ヲ驅除ス。○木材ハ油及。華爾斯多クノ
 稍。越。謨。樣ノ脂ヲ含。鹽氣アリ。温壯。軟化。解凝。利尿。
 驅風ノ効アリ。又神經ヲ強壯シ。月經ヲ通ス。○根ノ

皮小便ヲ利シ。肝脾ノ壅塞ヲ通ス。
 老利兒油。コレウム。バツカ。ラウリ。羅。
 此油。三種アリ。榨油。煎油。蒸餾油ナリ。○榨油ト煎油
 ハ香氣強ク稠厚ニメ。乳酪ノ如ク凝固ノ粒塊ヲ爲
 シ。上品ハ綠色。或ハ黃綠色。味辛苦。老利兒實ノ氣ア
 リ。○或ハ此油ニ家猪脂ヲ加テ。偽造シ。或ハ銅綠ヲ
 加テ。美綠色ト爲ス者アリ。是ヲ試ル法。此油ヲ亞的
 兒ニ溶シテ。乳色トナルハ家猪脂ヲ雜ル者ナリ。此
 油ヲ硃砂精ニ加ヘ。研磨メ。青色トナルハ銅綠ヲ雜
 ル者ナリ。○此油過。稠ク。凝塊ヲ雜ヘ。香氣微

ナルハ藥用トセズ○蒸餾油ハ清稀ナリ〔按〕

搾油製法 扁桃搾油ト同シ。意太里亞等ノ熱國ニ

テ製ス〔疾〕

煎油製法 全熟新鮮ノ實ヲ取テ搗碎キ罐ニ入レ

多ク水ヲ加ヘ煮ルニ半時許。温ニ乘メ絞リ漉シ放

冷スレバ水上ニ綠色ノ油凝固ス是ヲ泌別シ取テ

硝子壺ニ入レ貯ス。其滓ハ又前法ノ如ク煮テ絞リ

漉シ斯ノ如ク數ニテ少モ油出ガルニ至ル〔依〕

蒸餾油製法 全熟新鮮ノ實ヲ取リ鹽湯ニ浸ス

兩三日ニテ蒸餾ス其法薄荷油ト同シ〔疾〕

主治 三種ノ油性功同シ○外敷メ温煖衝動シ堅硬

ヲ軟化シ腫瘍ヲ消散ス或ハ沈重潜滯ノ疼痛ヲ散

シ肢體強拘不遂ヲ治シ凝結ヲ解キ温壯メ治スヘ

キ神經諸筋ノ衰弱ナル諸症ヲ復シ諸麻痺痿弱。或

ハ痙攣。子宮衝逆等ノ諸症。傷冷毒痛。脚痛風。寒腫冷

痛。痞氣鬱蓄疝痛。打撲青斑。疥癬浸淫瘡ニ効アリ但

過用スレバ羅斯樣ノ焮衝ヲ發スルアリ○或ハ

風ヲ殺スニ外敷シ或硫黃若ハ水銀ヲ外敷スルニ

是ヲ煉和シ施用ス〔疾〕
〔疾〕○按ニ此油缺ル片ハ柱
松實油ヲ代用ノ可ナリ

刺賢堙兒蘭 ラヘンダラ 羅

形状 刺賢堙兒ラヘンダラ 灌木様ノ草ニ長二尺許方莖硬固ニノ枝多シ葉長二三寸許潤二分許稍厚久灰色或ハ白綠色枝ニ對生シ迷迭香葉ヨリハ長ク潤シ夏月莖枝頭ニ長梗生シ細花長穗ヲ爲シ單瓣唇狀一心蕊四鬚蕊アリ上唇ニ分レテ直立シ下唇三分ル碧色或ハ淡紫或ハ罕ニ白色アリ花後心蕊ノ本ニ室ヲ成シ滑澤ニノ稍長キ四個ノ細子ヲ藏ム根ハ木ノ如ク鬚多シ花葉莖根共ニ芬香竄透味熱メ微苦ヨク寒氣ニ堪ヘ經年枯レズ荒野瘠地沙

土ニ生ス○此草大小二種アリ大ナルハ莖太ク葉稍潤ク長ク厚シ花穗亦長ク香氣強シ或ハ葉缺裂ノ又ヲ爲ス者アリ是ヲスピカナルガスト名ケ又此草ノ雄ト名ク其小ナルハ莖葉花穗ニ短小ニノ葉綠色香氣烈シカラズ是ヲ其雌ト名ク多ク藥用トス或ハ葉長ク纖細灰白ナルアリ○南拂郎察意太里亞イタリヤ 伊斯把尼亞イスパニア 皆歐羅巴洲ノ國名等ニ生ス

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品又用ベシ○性能大率迷迭香ノ如シ若缺ルキハ代用スベシ精及油モ迷迭香ノ精油ヲ代用ノ可ナリ

主治 花葉性温。精微ノ油。揮發鹽多シ。花尤^ニ香竄^ニメ効用多シ。荅^{ナク}ヲ採リ用テ殊^ニ良。○頭腦。神經ノ諸病ニ殊効ヲ稱シ心。胃。子宮ヲ強壯ニシ惡液ヲ蒸發氣ヨリ排泄シ又腐敗ヲ過メ開達。解凝。驅風ノ効アリ故ニ卒厥。昏睡。痲不遂。痲肢體顫振。頭旋眩冒。心動悸。舌痲痙攣。痛風傷冷毒ノ諸症。寒粘液ヨリ起ル子宮衝逆。肝脾壅塞。痞氣腹痛等ニ尤良。又小便ヲ利シ經閉ヲ通シ催生シ淋疾痛ヲ治シ眼力乏弱ヲ復ス但熱性壯實ノ病ニハ的當セズ。○水煎。泡湯。散劑トシ或花ヲ昆^{コシ}設^ヒ爾^ル弗^フ露水。精油ニ製シ内服ス。○外用ニ

ハ蒸溺劑或ハ芭^バ布トシ或露水。精油ヲ塗藥トシ或蒸溺劑トシ或乾花ヲ囊ニ盛貼ノ神經ノ諸症。痲不遂。頭痛。痛風。傷冷毒痛。眼力乏弱ニ驗アリ。
刺賢^{ヘン}埴^デ兒^ル油 オレ^レム^ム。ア^アヘン^ンダ^ダラ^ラ又オレ^レム^ム。ス^スヒ^ヒカ^カ。オ^オリ^リイ^イ。ス^スベ^ベキ^キオ^オリ^リイ^イ又ス^スヒ^ヒカ^カ。オ^オリ^リイ^イ。蘭

製法 花穗ヲ取り蒸餾ス。其法薄荷油ト同シ

主治 頭旋眩冒ヲ醒復スル藥トス又昏睡。卒倒。痲痺等ノ頭腦神經病。子宮衝逆。經閉。難産ニ奇効アリ。○服量三四滴ヨリ十滴ニ至ル。○擦藥トシ痲痺不遂ヲ治シ髮虱ニ速効アリ。○此油^ニ的^テ列^レ茲^シ底^ニ那^ナ或斯ノ如キ香竄ノ油及燒酒ヲ加偽製スル者アリ是ハ

遠西名物考 卷九 五十一 風雲堂藏

各其油ノ香氣アルヲ以テ知ベシ○此油ヲ匙ニ内
火ヲ點スレバ燃テ烟少ク焰鮮明ニノ不佳ノ氣ア
此ハ眞品トス。燒酒ヲ雜ル者ハ是ヲ水ニ滴スルニ

燒酒ハ水ニ和シ油ハ水上ニ浮ヲ以テ知ベシ

刺賢堙兒精 スビリダス。ラヘンダラ又エアウ。デ
ラハンダラ又ヘンデルゲスト。蘭

製法 刺賢堙兒 新鮮ノ花穂

燒酒 十度者 二比

右浸ス。二日。蒸餾シ十九度ノ精ヲ取り硝子壺ニ

入レ固封シ貯フ 按

又法 刺賢堙兒油ヲ適宜ニ取り銳烈ナル燒酒ニ

滴シ攪和シ貯フ 按

又法 刺賢堙兒油 一 移 養 不 養 二 効 効 二 効 効 二 効 効

迷迭香油 半 弓

桂油 一 錢

右合和シ燒酒八十弓ニ加ヘ攪和シ貯フ 按

又法 刺賢堙兒花 生 鮮 者 取 二 弓 辛 熱 者 取 二 弓 陰 乾 者 取 一 弓 半

同 陰 乾 者 一 弓 半

燒酒 三十二 弓

右格兒弗ニ入レ密封シ浸ス。三日。文火ニテ慢緩

蒸餾シ燒酒ノ量。半分餘ノ精ヲ取ル。此精峻烈大

質ヲ夾ニ香味ナク碎ケ易シ○夏月牡蝦ノ胃中ニ
 白液生シ初ノ軟ニノ漸ク凝固シ石トナル此時自
 ラ瀉下シ或說ニ春秋瀉下スト云或ハ其蝦ヲ剖テ取ル其剖テ
 取ル者ハ青色ヲ帶ズ是ヲ上品トス或ハ蝦ヲ煮テ
 取ル是ハ白色ナリ故ニ青白ノ二種アリ○此石ハ
 蝦ノ舊殼脫シ新殼更ル時ニ生シ是ヲ以テ新殼ノ
 軟脆ナルヲ硬固ニス故ニ新殼軟脆ナル時速ニ剖
 テ其石ヲ取ベシ殼既ニ硬固トナリテ剖クキハ此
 石絶テ無シト云○此石偽造ノ品多シ眞品ハ較重
 ク破碎スレバ片々層襲ス蒸餾スレバ揮發竄透ノ

精液揮發鹽臭氣アル稠キ油出ツ又一種ノ魚腥ア
 リ此石ヲ醋ニ浸セバ其含ム所ノ土質ハ溶化スレ
 凡粘液質ハ消化セズ依然トメ其石ノ全形ヲ存ス
 或ハ是ヲ消石精ニ浸スモ亦然リ○偽造ノ品ハ醋
 及ビ消石精ニ溶化スルヲナシ○此蝦亞細亞洲亞
 弗利加洲ノ諸國ニ産スエウロツバ歐羅巴洲アメリカ亞墨利加洲ニモ
 産スレ凡其石小ナリ
 ○按ニ此物舶來アリ又津輕松前ニ其産ス藥舗
 ニオクリカンキリト呼ズ偽品甚々多シ右ノ譯
 説ヲ以テ眞偽ヲ辨シ用フベシ○本邦長門ノ赤

間關並ニ豊前中津邊ノ河ニ産スル尋常ノ蟹ニ
 小石アリ形状薏苡仁ノ如ク上面凸ニ下面凹
 其蟹七八月ノ間舊殼脱メ新殼生ス其殼ヲ脱シ
 了ル時捕ヘテ剖ケバ必ズ其兩眼ノ間ニ二個ノ
 白石アリ但殼ヲ脱シ其體仍軟ニ未ダ跛歩ス
 ルコ能ハザルヲ窺ヒ速ニ取ベシ否ザレバ其石
 頃刻ニ溶化メ米泔汁ノ如クナリ殼硬固ヲ爲ス
 ト云是レ螭蛄石ノ一種ニ其性功モ亦同シ
 主治性收瀉乾燥ス土質ニ亞兒加利性ノ鹽ヲ含ミ
 專ラ酷厲ナル酸敗液ヲ消刺スルニ良藥トス其

質ニ多ク粘液ヲ含テ石灰質ノ土ヲ夾ムユエニ他
 ノ土質ノ制酸藥ニ比スレバ亞兒加利性酷烈ナラ
 ズメ胃ヲ刺戟セズ是其含ム所ノ粘液質ニテ感觸
 ノ敏ナル胃中ノ神經ヲ包攝メ保護スレバナリ故
 ニ酷厲ナル酸敗液アリテ胃ヲ刺戟シ或ハ胃中ノ
 神經剥裸スルヨリ起ル胃痛ヲ治ス○此物亦他ノ
 土質ノ藥ノ如ク大便ヲ閉ル故ニ大黃或ハ適宜ノ
 下劑ヲ兼用メ通利セシムルヲ肝要トス○此藥ハ
 粘液ヲ含テ軟化ノ性アルユエニ疼痛ヲ兼ル諸症
 ニ尤驗アリ其功麻痺失亞遏爾按ニ減セズ故凡

酸敗液ヨリ起ル諸症。即チ吞酸嘈雜胸脇心腹刺痛
 或ハ小兒痲瘰ノ諸症。諸骨軟弱佝僂病等ニ偉効アリ
 リ。○小便ヲ利シ汗ヲ發シ下利ヲ止メ粘稠ヲ稀釋
 シ凝結ヲ疏解スル効ヲ稱ス。○服量末トシ一ノヨ
 一錢ヲデ日ニ數次用フ。○瓦老別里鹽ヲ加ヘ用
 ヒテ諸病毒惡液ヲ汗ト小便ヨリ驅泄ス。○是ヲ橙
 汁或ハ蒸餾醋ニ加ヘ其沸動止ムニ至リ用テヨク
 發汗ス。叔伍枚 依

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭醫學範提綱 林爾宇由川先生著 全三冊 理學入門 植學啓原 宇田榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 全五冊

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療止始 小齋伊東先生著 全五冊

遠西醫方名物考 同上 全十冊 泰西名醫彙講 熱川眞作先生著 全六冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 玄澤大槻先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微 同上 全二冊

書 青藜閣 須原屋伊八

