

遠西醫方

考

良字
武宇
久也
末上

卷十

松
和
別

✕
e 13

499, 2
Em-4
4

re 13

No. 1399

榛齋宇田川先生著

四篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

遠西醫方名物考標目

卷一

刺必斯垤亞

刺必斯印敬兒那栗斯

刺必斯加烏斯蟄屈斯

酪乳 酪餘 蠟

武模失刺及油

字苗香水

芸香水

微的撒爾弗

銀漿

銀礬

乙典垤羅

尼蒲私膏

苗香精

苗香油

物耶獨亞斯

剝篤亞斯



富士川文庫 3307

遠西名物考

卷一

標目

風雲堂藏

久 枸櫞皮精

枸櫞皮舍利別

規吉斯麗謨水銀條

驅風精消痲露

也 葯刺巴

末 玫瑰蜜

玫瑰醋 玫瑰油

茉沃刺那

茉沃刺那精

枸櫞皮油

枸櫞汁舍利別

規吉撒爾弗水銀條

苦扁桃扁桃條

葯刺巴華爾斯

玫瑰舍利別

玫瑰丁幾去爾

茉沃刺那水

茉沃刺那油

苦扁桃油扁桃條

野羊乳乳條

玫瑰昆設爾弗

遠西醫方名物考卷十

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補

刺必斯羅 垓亞

製法

蝦殼

蠣殼

河產者

麝香

龍涎香

各二錢

右極細末トシ亞刺比亞羅 錢ヲ取テ薔薇水二

多ニ溶シ是ヲ以テ本劑ノ末ヲ捏和シ球ノ狀ニ造

遠西名物考



リ乾シ又右ノ液ニテ濡メ金箔ヲ衣トシヨク風乾シ屢羅紗ノ巾ニテ是ヲ摩擦スレバ鮮美ノ光澤ヲ生ス是レ一種製造ノ鮮荅ナリ

主治 腦心ヲ強健シ酸敗液ヲ制ス

刺必斯印歇兒那栗斯ラヒロス イシヘル ナリリス 羅ヘルセステイン 蘭

製法 銀純粹者

消石精銀溶化スルヲ度トス

右銀ヲ薄片ト爲シ細ニ截リ硝子壘ニ内レ消石精ヲ加テ銀盡ク烱化スルヲ度トシ其壘ヲ沙火ニ内

レ漸次ニ火ヲ増テ其水氣ヲ蒸散シ殆ト乾ク頃ニ其劑ヲ潤大ナル坩ニ入レ文火ニ上セ漸ク烈火ト爲ス片ハ煮沸ノ泡起シ遂ニ蠟ノ如ク流動ス是ニ於テ試ニ少許ヲ以テ石上ニ傾ケ寫スニ冷テ凝固スル片ハ乃チ鐵管ヲ取り温メテ其管中ニ脂油ヲ塗リ是レ右ノ液ヲ注入シ放冷スレバ即チ乾固ノ灰色トナル是ヲ取出シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

○大約銀一匁ヲ以テ此劑十三錢許ヲ製スベシ

○上品ハ赭色或ハ帶黑色氣ニ觸テ容易カラズ水ヲ注ガバ忽チ燒焚ス

○氣ニ暴レバ濕リテ溶化

シ性力脱スル故ニ固封シ貯ルノ肝要ナリ○極テ
 純粹ナル銀ニテ是ヲ製スレバ酸氣ヲ含マザル故
 ニ容易ニ濕ラズ銀純粹ナラザレバ是ヲ製メ後濕
 リ易ク或ハ銀ニ銅氣ヲ含ム故ニ此劑日ヲ經ルニ
 隨ヒ綠色ノ鏽ヲ生メ其功力脱ス○銀ヲ消石精ニ
 投メ其液澄清ニ濁ラズ銀盡ク溶化スルハ消石
 精上好ノ候トス銀溶化スレバ其液稍濁ルハ消石
 精不良ノ候トス其液綠色トナルハ銀ニ銅氣ヲ含
 ム候トス其澄清ニノ色ナキハ銀モ純粹ノ候トス
 叔 侯 亞

又法 銀鑿

製法ノ者ヲ用フ後出ツ
 適宜

右陶鍋或ハ銀鍋ニ入レ坩ニ沙ヲ盛テ炭火ニ上セ
 是レニ右ノ鍋ヲ内レ意ヲ用ヒテ火屑其鍋ニ入ル
 事無ラシメ適宜ノ火候ヲ以テ徐々ニ煮テ溶化セ
 シメ終ニ煮沸セザルニ至テ仍火ニ置テ八分時
 油ノ如ク流動シ淡赭色トナルニ至リ銅ニテ造ル
 型ヲ取り温メテ其内ニ脂油ヲ塗リ右ノ溶液ヲ是
 ニ注入シヨク放冷メ後是ヲ型ヨリ取出シ硝子壘
 ニ入レ固封シ暗處ニ貯フ
 ○銀ヲ純粹ニスル法 銀一匁ニ鉛十匁ヲ加ヘ清

キ坭塙ニ入レ火ニ上セ熔セハ汚物盡ク分レテ銀
 純粹トナル其熔タル銀ヲ取テ水ヲ盛タル硝子壺
 ニ投スレバ大ニ沸騰ノ銀細粒トナリ水中ニ散布
 ス是ヲ粒銀ト名クアルゲンチム、ガラヌラチ此ヲ
 純粹ノ銀トスハ羅カイヘルシルフル蘭

主治性收縮ス峻烈ノ腐藥ナリ少ク皮膚ニ觸レバ
 其處黒斑ヲ生ノ速ニ消セズ是ヲ貼スレバ忽チ腐
 蝕シ痂ヲ結ブ故ニ一切創傷潰瘍中ノ頑肉水棉様
 肉ヲ消ス創ニ觸テ甚キ疼ヲ發セズ又鼻痔胼胝贅
 瘤疣痣汚斑醜痕等ヲ除クニ用フ○此藥ハ他ノ諸

腐藥ニ比スレバ焮衝ヲ發スルト少シ故ニ多ク稱
 一月ノ○是ニ少ク唾ヲ濕メ點スレバ其處忽チ腐
 蝕ス然レ深ク穿透セズノ痂ヲ結ブ○是ヲ貼メ其
 部ノ津液ヲ得レバ忽チ溶テ傍圍ニ流散ス故ニ知
 覺多クノ疼痛スベキ部ニ是ヲ貼スルニハ右手ニ
 テ此藥ヲ患處ニ點シ左手ニ細ク卷タル紙ヲ取テ
 其滲出スル液ヲ紙ニ浸潤セシメ傍圍ニ流散セザ
 ラシム斯ノ如クメ屢點スレバ患者少モ苦惱ナシ
 ○膿腫ヲ潰破スルニ用フ是ハ若把兒麻膏等ノ硬
 膏ヲ攤テ其正中ニ小孔ヲ穿チ膿腫ニ貼シ其孔ニ

此腐藥ヲ點スベシ但此藥ハ極テ收滯スル故ニ爾後其部硬固ナルヲアリ○小肉腫疣悉息肉ヲ除クニ此藥尤効アリ耳孔ノ息肉ヲ侵蝕シ去ルニ亦良○或ハ下疳ノ毒ヲ消スルニ用ス此ハ其潰瘍小ニノ甚キ焮衝ナキ者ハ此藥ヲ水ニ溶シ屢患處ニ點メ其痂ヲ除ケハ速ニ治ス○經久頑固ノ淋疾ニ此藥一二氏ヲ蒸餾水五多ニ溶シ水銃ニテ數尿道ニ灌入メ治ス又洗藥トメ創傷潰瘍ノ汚穢ヲ淨刷シ或ハ瘻瘡淚管瘻ニ注入シ或ハ角膜星翳ヲ除クニ是ヲ點メ良効アリ○此劑ヲ水ニ浸セバ盡ク溶化

シ其銀少モ變セズ全然トメ其底ニ沈ミ酸味ナラズ侵蝕セズ必モ味ナクメ故ノ如シ○泥炭和名ス名膏風或ハ劫灰若シ泥炭ナキノ熾紅スミクモ漢ニ烟氣大ク淨潔ナルヲ縱ニ置キ上頂ノ正中ニ小圓孔ヲ穿テ此劑一錢ヲ取テ其孔ニ投スレバ忽熔テ爆焰ヲ發スルヲ消石ノ如シ其焰滅テ後其炭ヲ割見レバ此劑ニ用タル純銀ノ量毫モ減セズ凝結ス然レ消石ノ酸精ハ銀ノ外面ニ粘著セルノニテ毫モ銀ヲ毀損セズ唯銀ヲ圍繞メ銳利ノ鋒尖ヲ作シ宛モ銀鍼ヲ束スル如キ質トナリ侵蝕スル者ナリ

銀漿

オントビンゲンテシルフル名トル 蘭

製法

銀一多ヲ取硝子壘ニ内ニ是ニ消石精ニ
弓ヲ注入スレバ忽沸騰メ蒸氣升リ熱メ銀盡ク消
化シ澄清透明ニノ香臭ナク味辛苦酷烈ニノ燒ガ
如キ液トナル其壘底ニ黑色ノ末少許沈ム然レ其
消石精ニ誤テ鹽氣或ハ硃砂或ハ酸味ノ液雜レバ
銀必モ溶化スルヲナシ ①此液ヲ水ニ滴スレレ必
モ濁ラス降沈セス但其水ニ鹽氣アレバ忽濁ス
②此液一多ヲ以テ雨水二十多ニ和シ硝子壘ニ内
レ火ニ止セ温メ琢磨シタル薄キ銅版ヲ以テ是ニ

浸セバ其銅忽灰色トナリ遍ク毛茸生シ其清稀ノ

液漸ク綠色トナル是ニ於テ其銅版ヲ振蕩スレバ

其毛脱落ス其毛復生スレバ隨テ振蕩シ毛必モ生

セザルニ至テ暫靜定シ其液ヲ他ノ器ニ傾テ寫セ

バ其壘底ニ渣アリ是ヲ取温湯ニテ數洗ヒ淨潔ト

ナルニ至テ火上ニテ乾セバ微細ノ銀粉トナリ其量

減セズ酸氣及銅氣ヲ含下ナク故ノ如純粹ナリ 疾

主治

刺必斯印歇兒那粟斯ノ如シ此液一滴ヲ皮膚

ニ塗レバ忽チ腐蝕ス多ク腐藥ニ用フ 疾

銀礬

アルゲンチウムニトヲチム又ケレイスタル
ルナア羅ナルペトルニルシルフル蘭

製法

銀

純粹ナル者所謂粒銀
適宜

消石精

水等分ニ和スル者
適宜

右銀ヲ硝子壘ニ入レ文火ニ上セ是ニ右ノ消石精
ヲ注キ加テ銀盡ク溶テ澄清ノ液トナルヲ度トシ
放冷スルキハ其液ニ凝聚セル者現ハル是ヲ取去
リ其液ヲ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ放
冷スレバ光彩アル薄片様ノ芒ヲ結ズ是ヲ取リ紙
上ニ展ゲ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ暗處ニ貯フ

又法
シトルフリヲルムアルゲンチム
銀漿ヲ適宜ニ取リ火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ其十分

一ノ量トナルニ至リ冷處ニ置テ芒ヲ結バシメ其
芒ヲ取リ貯フ

又法

銀漿ヲ適宜ニ取リ粒銀ヲ必許宛是銀投メ
溶化セシメ終ニ必モ溶化セザルニ至リ是ヲ冷處
ニ置テ芒ヲ結ビ消石ノ如シ其芒ヲ取固封貯フ

主治

刺必斯。印歇兒那粟斯ノ如シ

製法

右淨キ鐵壺ニ内レ文火ニ上セ漸ク火ヲ加ヘ水氣ヲ

蒸散シ宛油ノ如クナルニ至テ試ニ是ヲ鐵版ニ滴
 スレバ凝固スルヲ度トシ大小適意ノ銅型ヲ温其
 内ニ少油ヲ塗テ是ニ其液ヲ傾寫シ其稍温ナル片
 取出シ硝子壘ニ入レ是ニ乾ケル糠ヲ充固封シ貯フ
 又法 生石灰 剥篤亞斯 一多
 右生石灰ニ水適宜ニ加テ沸騰セシメ是ニ剥篤亞
 スヲ加水篋ニテヨク攪和シ紙ニテ濾過シ汁ヲ取
 鐵壺ニ入レ火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾固セシメ柑ニ内
 火ニ上セ煇製スルヲ前法ノ如クス 〇此劑ハ其
 亞兒加利鹽中ニ含所ノ酸性ヲ脱メ極テ酷烈ナル

侵蝕ノ質トナル者ナリ斯ノ如ク盡酸性ヲ脱除ス
 ル片ハ是ニ酸性ノ液ヲ加レ片必モ滾動スルヲナ
 シ但大氣ニ暴レバ濕テ溶化シ其性功モ消散ス
 主治 腐蝕ノ良藥トス。外敷メ速ニ腐蝕ス然レ其痛
 須臾ニ休痂ヲ結テ火傷ノ如シ痂ヲ成片ハ軟化ノ
 膏藥ヲ貼メ化膿セシムベシ 〇刺破截斷ヲ怖ル人
 ハ是ヲ用テ膿腫ヲ潰破シ或贅瘤息肉。胼胝。疣痣。汚
 斑及瘡中頑肉等ヲ除ニ捷効アリ 〇膿腫ノ邊圍堅
 硬或腺部ノ膿瘍。便毒腫等ヲ潰破スルニ尤モ良トス
 但、焮腫ノ邊圍堅硬ナルハ軟化ノ劑ヲ外敷メ其凝

結ヲ解スベシ○此劑ヲ施スハ硬膏ヲ厚攤テ其正中ニ小孔ヲ穿是ヲ患部ニ貼シ其孔ニ此劑ヲ施スベシ否サレバ流散メ浸淫ス○此劑ヲ水ニ溶シ稀クシ施セバ腐蝕セズ唯潰瘍等ノ臭穢腐爛壞肉ヲ淨刷シ愈スニ峻効アリ○犬咬傷ニ是ヲ施セバ其藥氣深ク滲透シ是ヲ以テ其毒ヲ阻遏メ内部ニ吸收セサラシム極テ驗アリ其法先鉞針ヲ以テ其創ヲ鑽截メ出血セシメ水ニテ洗淨シ次ニ此劑半錢或一錢ヲ取テ沸湯一匕ニ溶シ是ヲ以テ其創ヲ洗フ日ニ數次其痛ニ耐ル間ハ是ヲ施シ每次微温湯ヲ

以テ是ヲ洗去ベシ但其痛少キ者ハ右ノ如ク洗テ後此液ヲ綿撒絲ニ蘸シ貼ノ縛帶ヲ施ヘシ或其炊痛甚キ者ハ軟化釀膿ノ琶布ヲ貼メ膿ヲ成シムベシ或其創窄小ナルカ若クハ愈ル者ハ頻ニ此液ヲ施シ創ヲ侵蝕セシメテ潤クシ其痂落ルニ至ルベシ此法尤治驗アリ○蝮蛇咬モ右ノ療法尤驗アリ○下疳甚キハ其毒ヲ患部ヨリ體中ニ吸收メ内伏スル者多シ是ヲ遏止スルニ右ノ溶液ヲ以テ其潰瘍ヲ洗ヒ又是ヲ布片ニ蘸シ貼メ縛帶ヲ施シ毎日斯ノ如クメ終ニ其腐爛消シ好肉トナルニ至ルベシ

○徵毒淋疾ノ毒ヲ驅除シ多ク汚液ヲ排泄セシム
 ルニ右ノ液ニ阿芙蓉少許ヲ加水銃ヲ以テ數尿道
 ニ注入ス但是ヲ注入ノ疼ニ堪ザル者ハ水ヲ加ヘ
 稀クシ施スベシ○瘻瘡及ビ腐爛甚キ潰瘍等モ右
 ノ液ヲ施メヨク腐肉ヲ祛キ愈スノ偉効アリ

整乙典埵羅偈 蘭リキシヒウムカウスチキス維侵
 蝕灰汁ノ義セアシデルスロク又
 フルイエンデ
 ボトアス蘭

製法

生石灰 三斤
 剥篤亞斯 精製者 二斤
 雨水 十六斤

右生石灰ト剥篤亞斯トヲ合シ鐵壺ニ内水ヲ加火
 止セ本棍ヲ以テ手ヲ住メス攪セ煮テ四分時此
 液少許ヲ分取瀝過シ試ニ酸味ノ液ヲ是ニ加ルニ
 滾動スルハ生石灰ノ量少キ候トス故ニ右ノ液ニ
 生石灰少許ヲ加テ銳烈ト爲シ滾動セザルニ至レ
 シ或ハ剥篤亞斯ヲ温湯ニ溶メ其液ニ加ニ濁ルハ石
 灰多キ候トス故剥篤亞斯少許ヲ加フヘシ然レバ是ニ
 醋ヲ加レテ滾動スルニ甚微ナク或剥篤亞斯ヲ加
 レテ濁ラズ偏勝ナキハ此液銳烈上好ナル候トス
 硝子ノ漏斗ニ布片ヲ重子數是ニ右ノ液ヲ寫内テ

硝子壘中ニ滲漏セシメ。終ニ少絞、濃シ其液ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ減メ八分ノ量ト爲是ヲ大ナル硝子壘ニ移内固封ノ静定シ澄清トナルニ至テ其塗ヲ去硝子壘ニ收硝子塞ニテ固封貯其漏斗ニ残タル渣脚ト右ノ静定シタル底塗トニ雨水四多ヲ加テ其餘殘ノ鹽ヲ溶シ前法ノ如ク布片ニテ濾過シ其液ヲ硝子壘ニ收貯テ亞兒加利鹽ヲ用ベキ病ノ藥ニ供初ニ濾過シタル液ト同カラス唯酸敗液ノ藥ニ供スル藥ニ供スル如キヲ云

主治 刺必斯加烏斯蟄屈斯ト同シ

本主... 合...

武

摸失刺及油

一ニムカギ又油ト名ク。共ニ粘液油ノ義

製法

過爾託亞根

四多

海葱

一多

胡蘆巴子

亞麻子

各一多半

右水適宜ニ加テ熟煮シ絞リ濃テ粘汁ヲ取ル再

煮テ蜜ノ稠トシ左ノ油ヲ加フ

時蘿油

加密列油

煎油

百合油

各一比半

右調和シ微火ニ上セ煉和シ濾過シ貯フ

主治 堅腫ヲ軟ラゲ膿ヲ成ス一切堅硬ヲ軟化ス

謨失刺及尼蒲私膏

エムフラスト

製法

黃蠟十一 一

謨失刺及油八 一

的列竝底那二 一

右油ニ蠟ヲ加ヘ文火ニテ烱シ又別ニ越謨ニ的列

竝ヲ加テ烱シ終ニ四味煉合メ硬膏ト爲ス

主治 堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ融解シ膿ヲ釀シ或ハ硬

腫ヲ消散ス

字

茴香水

製法

薄荷水ノ條ニ出ツ。其露水ノ上面ニ浮ク油

ヲ取り去レバ此水ノ効ナシ。若シ是ヲ醇厚ニ

ト欲セバ再ビコレヲ蒸餾メ其殘ル所ノ淡水ヲ除

クベシ

主治 破氣驅風ノ良藥トシ痞氣鬱蓄ノ諸症ニ効

リ。又急迫ヲ緩メ小便ヲ利シ粘痰ヲ除キ傷冷毒胸

脇痛咳嗽疝痛淋疾痛水腫ニ用フ。右ノ諸症並ニ

茴香驅風飲

苗香水 半北

薄荷舍利別 四錢

驅風精 二錢

舍電發謨阿芙蓉液 三十滴

右調勻シ半時ニ一匙宛服ス。但其症ノ輕重ニ隨テ阿芙蓉液ト驅風精ヲ加減スベシ或ハ痙攣搐掣ノ症甚ク或ハ疼痛劇キ者ハ先ツ阿芙蓉液二十五滴許用可_レ否_ラサレハ救ヒ難シ○小兒腹痛此露水一_レ味用ヒ或ハ麻_マ屈_グ涅_ネ失_シ亞_ア過_ア爾_ル拔_バヲ加ヘ用テ速効アリ大便ヨク通スル者ハ白罌粟舍利別少許ヲ加テ

尤良○洗藥トメ眼ノ腫痛ヲ療ス疾依

苗香精 ゲースト、ハン、ヘンケル蘭

製法 苗香子 二北

燒酒 九北

右浸ス_一二日。蒸餾ノ精ヲ取り固封シ貯フ固

又法 苗香子 搗者半北

燒酒 十度者八北

右適宜ニ浸シ蒸餾ノ十九度ノ精ヲ取ル拔

主治 虛冷ヲ温メ痞氣鬱結ヲ散シ疝痛、拘攣、胸中ノ

諸症ヲ治シ胃ヲ健運シ飲食ヲ消化ス疾

苗香油

薄荷油ノ條。蒸餾油製法括套ニ出ツ〔後〕

又法 苗香子 蒸一斗

水 八斗

右浸ス。六時ニ蒸餾シ油ヲ取ル。其後薄荷油製

法ノ如クス〔臣〕

主治 破氣驅風ノ良藥トシ又胸病ニ驗アリ。輕ク衝

動シ痞氣鬱滯ヲ散シ粘稠液ヲ稀釋シ汗ヲ發シ傷

冷毒。胸中鬱塞ヲ開利シ胃ヲ健ニシ飲食ヲ消化シ

乳汁ヲ益ス。○此油ハ亞的爾アテル綠禁油ルノ如クニ性

緩ナリ胃弱ク風氣痞滯シテ腹脹スルニ良効ヲ奏

シ又肺管ヲ開利シ効ヲ止メ吐痰ヲ進メ傷冷毒ノ

諸症ヲ療ス。○此油三四滴ヲ沙糖一匁ニ研和シ飲

液ニ攪セ用テ良〔庚〕〔福〕

芸香水

製法 薄荷水ノ條。露水製法括套ニ出〔後〕○此露水

ノ氣弱キハ効ナシ若シ其氣弱キ時ハ罐内ノ滓

ヲ絞リ去リ其液ニ新芸香ヲ加ヘ又是ニ其露水ヲ

加ヘ蒸餾スベシ。斯ノ如クメ再三蒸餾スルハ其氣

茵醇厚ナリ若シ醇厚ノ露ナキハ其症ニ從テ茴香水或ハ薄荷水ヲ代用スベシ其水ト

主治 竄透ノ氣ヲ以テ胃ヲ健運シ小便及ビ月經ヲ通シ惡液ヲ驅散シ風氣ヲ消ス子宮衝逆。痙攣。氣疝。小兒虻蟲。狂犬。蝮蛇咬傷ヲ治ス①子宮衝逆及ビ痙攣ノ諸症ニ左ノ方奇効アリ

芸香鎮痙露

薄荷 舍利別 六錢
 琥珀 丁幾去爾

阿魏 丁幾去爾 各二錢

密涅刺爾 鎮痛液 一錢

舍電發謨 阿芙蓉液 三十六滴

右調勻シ八分時ニ一匙宛用ヒ其症治スルニ至ル

依

微的撒爾弗蘭 ユングエントアルビム 羅

製法 越沒里膏 五錢 煎藥者ト揮愈ス

阿利襪油 二弓半

鉛粉 一極細末

右膏ニ油ヲ加ヘ文火上ニ烱化シ鉛粉ヲ攪和シ軟膏ト爲ス〔按〕

〔主治〕乾燥シ軟化ス火傷潰瘍等ヲ乾愈ス〔福〕

古時世に火食部ニ一收、淡用コ其蘇成スハニ至ル

冷薄發熱阿芙蓉煎三十六條

湯熱性種煎蘇煎一收

煎蘇丁蘇法爾各十條

〔久〕

枸櫞皮精 スピリチウス、コルチセス、シトリヨリム〔羅〕

〔製法〕 枸櫞皮 生鮮ノ黄皮ヲ薄ク刮リ取ル者〔北〕

燒酒十度者

右浸ス一ニ日、蒸餾ノ十度ニ至ルマデ露精ヲ取ル

〔主治〕 性熱、精神ヲ活潑シ衰弱ヲ強壯ニシ、破氣驅風

小効アリ。失氣眩暈、疝痛ヲ治シ、鬱塞ヲ開キ、粘液ヲ

稀クシ、飲食ヲ消化シ、痞氣鬱蓄ノ諸症ニ尤良〔按〕

枸櫞皮油 オレウム、コルチセス、シトリヨリム〔羅〕

〔製法〕 薄荷油ノ條、蒸餾油製法括套ニ出ツ。但薄ク黄

皮ヲ刮リ取テ蒸餾スベシ〔按〕

〔主治〕性熱。腦心胃ヲ强健ニシ。鬱塞ヲ開キ。破氣驅風

ノ峻効ヲ稱シ蟲ヲ殺ス〔因〕 志其毒ニ出シ。以養ク黄

枸櫞皮舍利別 「セイロフス。コルチセス。シトリ」 羅

枸櫞汁舍利別 「セイロフス。シトリ。シタス」 羅

右二方。製法主治。橙皮舍利別及ヒ橙汁舍利別ト同

シ〔因〕 封腸散ハホ酸ニ養育ニ遊却ニシ。如麻痺風

ハ數ス。トニ日。蒸燻ハ十數ニ至リ。マメ。製法ト同シ

製法 〔因〕 封腸散ハホ酸ニ養育ニ遊却ニシ。如麻痺風

封腸散 〔因〕 封腸散ハホ酸ニ養育ニ遊却ニシ。如麻痺風

封腸散 〔因〕 封腸散ハホ酸ニ養育ニ遊却ニシ。如麻痺風

〔也〕

葯刺巴羅 「ヤラッペ」 蘭 眞品ニ出ス。其味ハ苦ク。ク

〔形状〕此草。春月莖ヲ抽テ二三尺許。節高ク是ヨリ枝

ヲ分チ。葉楕圓ニテ末尖ハ本潤ク稍厚ク光澤アリ

互ニ對生ノ十字様ヲ爲シ龍葵葉ノ如シ花筒様。五

出。一心蕊。五鬚蕊アリテ枝梢ニ攢簇シ烟草花ニ似

タリ其色淡紅或ハ深紅或ハ紫或ハ黄或ハ白或ハ

紅白ノ縹文アリ或ハ黄紅ノ條理駁雜ナル等ナリ。

皆夕ニ開キ朝ニ萎ム。香氣アリ。花後圓子ヲ結テ。黒

色ニメ皺アリ内ニ白色ノ髓アリ根太ク尖リ外黒

色。或ハ赭黒ニメ皮ニ皺アリ。裏灰色ニメ赭色ノ條

理或云黑色及ビ細點アリ。其條理多ク。赭色ナル
 ハ華爾斯多ク且上品ニシテ新鮮トス或云黑色多キ
 ハ華爾斯モ亦多クノ効力峻ナリ。是ヲ割レバ華爾
 ス滲出メ細點ヲ見ス者ハ上品トス。斯人如キ根ハ
 脂多クノ光澤アリ或ハ是ヲ切片トシ敗グ火ヲ點
 スレバ燃易シ。味辛。咽喉ヲ刺戟シ微嘔スベク惡ム
 ベキ不佳ノ氣アリ肥實ニシテ重ク固クカク華爾斯脂氣
 ヲ多ク破碎シ難キヲ上品トス。○根黧蛙輕虛裏淡
 白ナルヲ下品トス。○或ハ蒲里阿尼亞根ヲ以テ是
 ヲ偽造スル者アリ真品ニ比スレバ切片輕虛ニシ

灰白ナリ。○印度地方及ビ南亞墨利加洲ノ諸國ニ
 産ス。根數年ニシテ漸ク肥大トナル。按ニ船來ノ品ヲ
 見ルニ形類蕃薯

○榕按ニ先輩此草ヲ以テ紫茉莉俗間オシロイ
 バナト呼ブ

ニ充ツ是ヲ和蘭ノ諸書ニ參攷スルニ紫茉莉ニ

穩當ナルト右ノ譯説ノ如シ。和蘭ノ醫書ニ此根

留飲停水ヲ瀉下スル効ヲ稱ス其洋船ノ品ヲ試

ニ用ルニヨク瀉下ス。和産ノ紫茉莉根ハ瀉下

効ナシ物云此根。印度地方及ビ亞墨利加洲ニ産

スル者ハ峻下ノ効アリ和蘭地方ノ者ハ其効ナ

シ是レ風土氣候ノ異ナルニ因ルト。然レハ和産ノ者モ風土ノ異ナルニ因テ効ナキカ此猶和産ノ大戟甘遂ハ瀉下ノ効ナキガ如シ。故ニ此物。舶來ノ品ヲ用ヒ或ハ留飲停水ヲ瀉下スル藥ヲ擇テ代用スベシ或ハ和産ノ者モ暖國ニ産シ數年宿根ノ脂氣多ク肥大ナル者ハ瀉下ノ効アラシカ未ダ悉ク試用セズ

主治 根性熱。味辛。留飲停水。粘液膽液ヲ瀉下シ又小便ヲ利ス故ニ水腫ニ多ク良効ヲ稱ス。○黃疸痛風傷冷毒痛ヲ治ス。○體中粘液或ハ水液過多。○血

液ノ運行怠慢ナル症。或ハ粘液腫或ハ粘液胃腸ニ壅滯ヲ發スル諸症等總テ粘液諸病ニ効アリ。○蛇蟲ヲ殺シ殊ニ條蟲ヲ驅泄ス。○壯實ニメ内藏頑固ノ壅塞アル等。總テ峻下劑ヲ用フベキ者及ビ壯熱ナク寒冷ニ屬スル諸病ニ尤良。○此藥甚ダ刺戟衝動スル故ニ脆弱ニシテ感動シ易キ人ハ是ヲ用ヒテ腹痛攣急ヲ發スルヲアリ或ハ肺及ビ腹部諸藏ニ衝アル者ハ是ヲ用テ大ニ害アリ。○藥刺巴ハ甚ダ粘ル華爾斯ヲ含ムト多キ故ニ是ヲ服メ胃腸ノ穢積ニ膠著メ溶化セザルヲアリ故ニ沙糖或ハ石

鹼。扁挑。雞子黃等ノ石鹼質ノ品ヲ是ニ研和シ用テ
 良○服量末トシ五匁ヨリ半錢ニ至ル。或ハ他ノ下
 劑ニ加テヨク瀉下ス。或ハ桂末少許ヲ加ヘ用ヒ或
 ハ桂ト山柰ノ末ヲ加テ燒酒ニ浸シ藥氣ヲ出シ用
 ヒテヨク停水ヲ瀉下シ胃腸ヲ健運ス水腫ニ尤驗
 アリ○水煎ニハ一二錢ヲ用フ○此藥甚ク健運
 ○藥刺巴ヨリ華爾斯ヲ取リ製法次出用テ峻下ノ藥
 トス然レ凡華爾斯ノ下劑中ニ於テ此物。性緩ニ
 害ナシ服量一匁ヨリ十二匁ニ至ル。五歲以下ノ兒
 ハ半匁ヨリ一二匁マデ用フ水液ヲ瀉下スルニハ

是ヲ末トシ十匁ヨリ十六匁マデ用フ少年虛人等
 ノ感觸シ易キ者ハ右服量ノ半ヲ用フ此華爾斯ノ
 質甚ク膠粘ニメ溶解シ難キ故ニ是亦砂糖。雞子黃
 石鹼。扁挑ノ如キ石鹼質ノ品一倍ノ量ヲ加ヘ用フ
 ヘシ丸藥ト爲スニハ石鹼ヲ等分ニ研和シ三匁ヲ
 一丸トシ病ノ輕重ニ隨ヒ一丸ヨリ七丸マデ一服
 トシ用テ瀉下ノ良劑トス或ハ此末十六匁ヲ適宜
 ノ雞子黃ニ研和シ或ハ葡萄酒ニ錢ニ溶化シ用ヒ
 或ハ雞子黃石鹼ニ研和メ丸トシ或ハ雞子黃適宜
 接骨木花水。遏爾託亞舍利列各二錢ニ是ヲ研和シ

一服トス○險重ノ咽喉焮腫腦焮衝等ハ初發刺絡
 ヲ施シ速ニ右ノ諸方ヲ擇ミ用レバヨク其病毒惡
 液ヲ下部ニ導泄ノ治ス是レ初發速ニ用ヒザレバ
 終ニ藥劑ヲ嚥下スル能ハザレバナリ或ハ此華爾
 ストホ氏ヲ燒酒二錢ニ溶シ薑菜舍利別三錢ヲ和
 シ一服トシ用ルモ良叔依 叔依 叔依
 藥刺巴華爾斯ヤラバハルシシナナヤヤススパパ羅羅計計ノ量ノ量モモ使使メメ用用スス
 製法 藥刺巴根ヤラバ粗末粗末四北四北燒酒燒酒三十度者三十度者十北十北
 右硝子壘ニ内レ固封シ沙火上ニ置キ時々其壘ヲ

振蕩シ浸スル三日。瀝テ其液ヲ取り。又其滓ニ燒酒
 十北ヲ加ヘ沙火ニ置テ前法ノ如クシ瀝テ其液ヲ
 取り終ニ其滓ヲ搾ニテ搾リ其液ヲ取テ前ノ液ニ
 合シ硝子壘ニ内レ靜定メ逆ヲ去リ瀝過シ蒸露罐蒸露罐
 ニ内レ雨水八北ヲ加ヘ文火ニテ蒸餾シ盡ク其燒
 酒ヲ滴シ去レバ華爾斯ハ罐底ニ殘ルナリ是ヲ取
 蒸餾水ニテ洗ヒ其水必モ味ナキニ至ルベシ其罐
 内ノ液モ亦華爾斯ヲ含ム故ニ又蒸餾メ其液ヲ引
 去レバ華爾斯自ラ罐底ニ凝結ノ粒ヲ爲ス是レヲ
 取り洗フテ前法ノ如クメ前ニ取ル華爾スト合シ

是二十度ノ燒酒少許ヲ加テ溶シ文火ニ上セ乾シ貯フ幾那ノ華爾斯製法モ是ニ同シ新鮮ノ藥刺巴根二十比ヨリ華爾斯三十六多許出ツ○此華爾斯ハ赤赭ニノ黑色ヲ帶ビ碎ケバ光澤アリ燒酒ニ溶化シ易ク火ニ投メヨク燃粘著セザルヲ上品トス或ハ滿格碌波尼亞藤黃等ヲ以テ是ヲ贗造セル者アリ然レ是ヲ火ニ投スレバ松脂様ノ香氣アリ

〔技〕
〔依〕

十比ノ燒酒ハ火ニ投メヨク燃粘著セザルヲ上品トス或ハ滿格碌波尼亞藤黃等ヲ以テ是ヲ贗造セル者アリ然レ是ヲ火ニ投スレバ松脂様ノ香氣アリ

〔末〕

玫瑰蜜

メルロザリム 羅
ロセンホニフ 蘭

〔製法〕

玫瑰花

陰乾シ萼ヲ去ル者

白蜜

煮テ沫ヲ去ル者

沸湯

四比

右花瓣ヲ湯ニ浸ス一六時ニノ罐ニ入レ文火ニ煮

テ半バヲ減シ絞リ濾テ汁ヲ取り底逆ヲ去リ蜜ヲ

和シ煮テ水氣ヲ蒸散シ舍利別ノ稠ト爲ス〔技〕

〔主治〕清涼強壯シ疼痛ヲ甘ク創ヲ愈シ汚液ヲ淨刷

シ腐敗ヲ遏ム多ク漱藥及ビ口舌ノ塗藥ニ用ス○

咽喉口中ノ潰爛ヲ淨刷ス○漱藥トノ湯乙様ノ咽

喉腫ニ多ク効ヲ奏ス
百六十六 章ニ出ツ
○驚口瘡口中斷頸ノ潰瘍ハ海鹽精或ハ
綠礬精蓬砂ヲ此藥ニ加ヘ患處ニ施メ奇効アリ○
硫黃精少許ヲ是ニ加ヘ失苟兒陪苦ノ齒斷腐爛ニ
塗テ良驗アリ又左ノ方極メテ良

玫瑰膏 玫瑰蜜 六錢 海鹽精 四十滴

阿煎藥丁幾去爾 二錢

右調勻シ翎ヲ以テ斷ニ塗テ日四次病ノ輕重ニ隨
テ海鹽精ヲ増減スベシ
ス勞效肺瘍ニ技爾撒護碌加的刺ヲ加ヘ用テ良効
吐血崩漏白帶下等ニ良効

アリ○阿煎藥丁幾去爾ノ方阿煎藥一錢ヲ技遇
燒酒六錢ニ浸ス六日瀝テ液ヲ取り貯フ福依

玫瑰舍利別 セイロフス 只サハ陰乾シ萼ヲ去ル者

製法 玫瑰花 陰乾シ萼ヲ去ル者

沙糖 十六兩 沸湯 五北半

右玫瑰花ヲ沸湯ニ浸ス六時煮テ半ヲ減シ絞ル
瀝テ液ヲ取り沙糖ヲ加ヘ文火ニ上セ煮沸セズ
水氣ヲ蒸散ノ舍利別ノ稠ト爲シ固封シ貯フ亞

主治 清涼收斂シ吐血崩漏等諸失血ヲ治シ傷冷毒
效嗽ニ良効アリ底

玫瑰昆設爾弗コンセルフ、ロザリウム、羅

製法 玫瑰花生鮮ノ花ヲ採リ萼ヲ去リ

淨白ノ者 沙糖二北

右石臼ニ入レ木杵ニテ搗スコシツ少許宛沙糖ヲ加テ泥ト爲

磁壺ニ内レ固封シ貯フ○乾花ハ末トシ水少許加

浸ス一宿ニメ沙糖ヲ加ヘ搗テ泥ト爲シ貯フ按

主治 收斂シ吐血白帶下等ニ用ヒテ輕キ收瀉藥ト

ス或ハ效嗽欬血ヲ治シ又勞效ニ多ク効アリ然レ

多服ヒサレハ驗ナシ乳汁ヲ兼用メ尤良○丸藥ヲ

製スルニ是ヲ糊ニ代用メ良按 福按

玫瑰醋 アセチウム、ロザリウム、ルブрум、羅

製法 玫瑰花楸乾ノ萼ヲ去ル者

半北 醋四北

右硝子壘ニ入レ固封シ大陽ニ曝ス一數日、瀝過メ

醋ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ按

主治 炊熱ヲ清涼シ枯燥ヲ滋潤シ失血ヲ止メ衰弱

ヲ強壯ス。失氣昏冒ニ是ヲ面部ニ撒ケ省復ス。頭痛

ニ是ヲ棉布ニ蘸シ頭ニ貼シテ効アリ按 羅按

玫瑰油 オレウム、ロザリウム、羅

製法 玫瑰花生鮮ノ萼ヲ去ル者

玫瑰水 阿利薇油 一北半

右玫瑰花ヲ少搗キ。硝子壘ニ入。油ヲ加ヘ固封シ。爐邊或ハ大陽ニ曝ス。一數日。ヨク藥氣ヲ浸出シ。磁鍋ニ入。文火ニテ煮ル。一半時許。水氣ナキニ至テ布ニテ絞。濾シ其油ニ又玫瑰花一北ヲ加。浸下前法ノ如クシ。斯ノ如ク爲。一三回ニメ其油ヲ濾固封シ貯フ

主治 外敷ノ堅ヲ軟ケ痛ヲ止メ凝結ヲ解キ衰弱ヲ強壯シ腫瘍打撲傷肢節轉戾閃挫等ニ良驗アリ。額顛顛ニ塗テ頭痛ヲ治ス。琶布或ハ軟膏ニ加ヘ施メ良。内服ノ下利赤痢疝痛ヲ治ス。服量四錢ヨリ一

弓ニ至ル 疾

玫瑰下幾去爾 「ティンキ」ヲラ。ロサリム。又「イン」ヒツム。ロサリム。リツム。リツム。羅

製法 玫瑰花 一弓 斷六錢ニ作ル

沸湯 二北 斷三北ニ作ル

綠礬油 適宜酸味口ニ適フヲ度トス

右花ヲ湯ニ浸ス。一時半。漉過メ滓ヲ去リ冷テ後

綠礬油ヲ攪和ス

主治 收斂強壯ノ腐敗ヲ遏ルニ峻効アリ故ニ凡ソ

凝體諸部衰弱弛緩ノ發スル諸病ニ稱用ス。血液

焯崩散渙ノ汗多ク漏泄スル症ヲ治ス。惡性腐敗

熱ヲ治スル良劑トス或ハ熱病ノ患者瘦削衰弱枯
 燥スルニ此劑ニ幾那ヲ兼用ノ殊効アリ是レ收斂
 爽涼ノ性功ヲ以テ胃腸ヲ活潑健運シ惡心嘔噦食
 ヲ嫌フ等ノ症ヲ治スレバナリ○粘液^ネ_乙或ハ血
 ヲ交ル汚液ヲ諸竅ヨリ脱泄スル諸症婦人崩漏痔
 血過多等總テ失血ヲ治ス若シ痙攣ノ諸症ヲ兼ル
 者ハ阿芙蓉液ヲ加用ベシ○肺ノ虚弱ニ屬スル冒
 寒欬嗽及吐血ニハ此劑ニ乳糖ヲ加用テ甚驗アリ
 又内部ノ潰瘍ニ用テ膿ヲ排シ腐敗ヲ止ム内藏ノ
 壅塞ヲ疏解シ血液ノ惡質ヲ淨除シ神思鬱憂病痔

疾ニ特效アリ○冒寒傷冷毒ノ諸症走注痛ニ是ヲ
 用レバ諸腺ノ緩弛開咳セルヲ收固牽縮ノ汚液ヲ
 分利シ治ス○每服一麥酒盞ヲ用ル一日三四次○
 若シ玫瑰花^{ダク}ル片ハ玫瑰昆^{コニセル}設爾弗^フヲ代用シ製ス
 ベシ但其花ノ二倍或ハ三倍ノ量ヲ用フベシ

茉^マ沃^ヨ刺^{ライ}那^ナ羅^ラ ^マヨ^レイ^ンシ^又 ^マヨ^ラン^蘭

〔形状〕此草二種アリ第一種ハ尋常ノ茉沃刺那ト名
 ク。數莖根ヨリ叢生スル一尺許細硬粗糙灰白或
 ハ赤色ヲ帶フ。葉小ク楮圓柔ニモ毛茸アリ灰白或

ハ淡緑。芳烈香竄。微甘香アリ。味辛苦。夏月莖枝梢ニ
荅穗ヲ生シ層々莖ヲ匝リテ叢圍シ其狀細鱗ヲ連
次スルガ如シ。其後小白花ヲ開單瓣唇狀。上唇二義。
下唇三義。是ニ細小ナル楮圓ノ四子生シ栗壳色。軟
脆滑澤。苦味佳香アリ。根細ク鬚ノ如シ。莖葉花共ニ
芳香アリ。冬月莖葉枯レ宿根ス或云根亦枯ル○第二種ハ
形狀前種ノ如クニノ稍灌木様ナリ莖細ク粗糙多
節微赤葉小ク稍厚ク凹ニノ匙ノ如シ灰白色香氣
尤モ烈ナリ莖葉共ニ冬ヲ經テ枯レズ然レ嚴寒ノ
候ニハ枯ルヲアリ○一種莖葉大クノ鋸齒アル者

アリ○第一種ハ種ヲ下シ或ハ扞シ或ハ根ヲ分チ
植テ園ニ培養ス。歐羅巴洲ノ南地ニ生ス第二種ハ
亞細亞洲。亞弗利加洲ノ諸國ニ産ス
○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ洋船ノ品ヲ用
スフベシ或ハ迷迭香ニ代用ス

主治 莖葉性温苦辛。香氣頭ニ徹ス。腦及ビ神經衰弱

虛冷ノ諸症ヲ治シ頭中ニ凝滯スル粘液ヲ疏散ス
ルニ峻功アリ。或ハ粘痰多キ喘急。老人ノ痰喘及ビ
卒倒昏眩。痙攣搐掣。子宮衝逆ヲ治ス○經閉。處女病。
風氣痞滯。疝痛ニ良効アリ○冒寒傷冷毒ノ頭痛ニ

是ヲ末トシ鼻ニ吸引ノ嚏藥トシ鼻膜ヲ刺戟ノ頭
中ノ粘液ヲ引泄シ又鼻ノ香臭徹セザルニ殊効ア
リ○水煎或ハ泡湯トシ或ハ葡萄酒ニ浸シ或ハ蒸
餾ノ露水精油ヲ取リ用フ

茉莉刺那水精油製法薄荷水精油製法括套ニ出ツ

又迷迭香精及油ノ製法ノ如シ**主治**適宜ノ飲液ニ
點服ノ茉莉刺那主治ノ諸症奇効アリ此油ハ沙糖
ヲ和シ嚏藥トシ鼻香臭徹セザルヲ治ス

度物福
叔伍依

遠西醫方名物考卷十終

遠西醫方名物考標目

卷十

滿那

麻屈涅失亞過爾拔

驅風消毒飲 鎮嘔飲 制酸消毒飲 燕柴薩滿那飲

煨製麻屈涅失亞

未兒叔尼斯散

朱爾扶斯鎮痛液

計 鹽蓬鹽

鹽蓬鹽晶

結麗土 精製結麗土

桂精 桂露 六二增訂和蘭藥鏡ニ出

桂丁幾去爾蘇系 桂舍利別

健質亞那越幾斯劑

健質亞那 林洞野夫亞

健質亞那丁幾去爾 煎味新派唯

結爾茂斯 結爾茂斯尼說爾弗

見篤散

結爾茂斯密涅刺列 安質沒扭

遠西醫方名物考卷十一

遠西醫方名物考卷十一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕 菴 校 補

滿那羅 マンナカラブリナ

滿那 ホニニフダウ 加辣 貌利亞齊西里亞 共ニ歐羅巴等

多ク産スル一種ノ苦櫪木 泰ノ幹枝及ヒ葉ヨリ

滲出スル白蜜ノ如キ脂液ナリ 或云細蟲アリテ其

液ナリト 其樹尋常ノ苦櫪木ニ比スレバ 幹枝葉

共ニ小ク花ニ瓣アリ花後萌フ結ビ内ニ仁アリ是

春滿那樹ト名ク○滿那三種アリ第一種ハ夏月酷

暑ノ頃自然ニ流溢シ清白或ハ帶黃色透亮ノ淚珠
 卜ナリ炎熱ニテ一日ノ間ニ乾キ凝結ノ顆粒ヲ爲
 シ枝葉ニ懸ルコレ最上品ニテ稀ナリ○第二種ハ
 形長ク指ノ如ク凝結シ長ク一二拇指横徑潤一拇指
 横徑許鮮美純潔輕白ニテ微赤色ヲ帶フ是ハ其樹
 ヲ鑽刻シ是ニ蘆管ヲ刺テ其流出スル脂ヲ取ル者
 ナリ故ニ長クノ管ノ狀ヲ爲ス是ヲ滿那カ加涅兒刺
 答ト名ク蘆管滿那ノ義○第三種ハ秋末暑氣減シ其脂流
 溢セザルユエニ土人其樹幹ヲ鑽刻メ流出セルヲ
 集メ乾固シテ凝塊ト爲ス者ナリ第一種ニ比スレ

ハ黃色ヲ帶フ淨潔ナル者或ハ不潔ナル者ナリテ
 一様ナラズ是レ尋常ノ加辣カ狼利亞リ滿那ナナリ其最
 モ純潔ナルヲ滿那マ越列屈答ト名ク越列屈答ハ上品ヲ擇ムノ義
 其純潔ナラザル品ハ水ニ溶シトカ漚コシテ汚物ヲ去リ火
 ニ上セ水氣ヲ蒸散メ蜜ノ稠ト爲シ磁壺ニ入木筋
 數多投シ置ケバ是ニ凝結メ淨潔トナルナリ○上
 品ハ新鮮透亮白色或ハ淡黃或ハ赤色ヲ帶ビ乾テ
 輕ク柔ニテ脂ノ如ク淨潔ニテ汚物ヲ雜ヘズ顆粒
 或ハ大小ノ碎塊ヲ成シ性味砂糖或ハ白蜜ノ如ク
 甘美ニテ辛ヲ帶ビ稍粘リ盡ク口中ニ溶化シ殆ト

香臭ナシ○其質ハ沙糖様ニノ粘液ヲ含メリ故ニ
其淨潔ノ者ハヨク燒酒及ヒ水ニ溶化ス○此物極
鮮麗瑩白ニシテ水晶ノ如キハ瀉下ノ効微ナシ粘
氣アル者其効却テ勝レリ或ハ淡赤栗壳色淨潔ナ
ラズ或ハ流動ノ蜜ノ如クナルハ皆藥用トセズ○
或ハ粉麩ヲ加ヘ或ハ沙糖ヲ和シ煮テ偽造スル者
アリ是ハ純ラ沙糖ノ味アルヲ以テ知ルベシ○或
ハ蜜沙糖汁等ニ梅那葉スカムモ蘇甘沒ニツ捩ムヲ加テ是ヲ偽
造スル者アリ此ハ眞品ニ比スレバ瀉下ノ効烈シ
宜ク仔細ニ擇ニ用ベシ○落葉松オウゴン松マツ樅ヒノキ杜松ヒノキ阿利アリ

本草綱目卷之十一
二、七
風雲堂藏

襪等ヨリモ亦滿那類ノ脂液出ルアリ或ハ楓樹
ヨリ出ル液ヲ煎熬ソ一種ノ滿那ヲ製ス云○或
ハホーステルビマン東方滿ナ義ト稱スル品アリ此ハ
百兒西亞及比亞刺比亞共ニ亞細亞ニ産ス是ニ
種アリ一ハ蜜ノ如ク流動ス一ハ凝固ス然レ多ク
ハ前ニ説ク品ヲ藥用トス
○榕按ニ滿那ハ漢人所謂甘露刺蜜雀餵ノ類ナ
リ和蘭ニ是ヲヘメルタウト名ク天露ノ義ナリ
又ホーニフダウト名ク蜜露ノ義ナリ滿那ハ日用
糧食ノ義ナリ其説ニ云昔人意ラク天オマヘ幽裔荒地

本草綱目卷之十一
風雲堂藏

ノ民ヲ愍テ甘露ヲ此樹ニ降シ餓殍ノ感ナカラシム○職方外紀曰度爾格國有樹如橡栗夜露墜其上卽疑爲蜜晨取食之極甘美萬寶全書大食勿斯國條云其國秋露降日曝之卽成糖霜食之清涼甘美コレ亦一種ノ滿那ナリ○此物和產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ

主治酸味ノ鹽油及微土氣アリ留飲^ク沍^イ敗黑膽液ヲ瀉下ス緩下ノ藥トス故ニ小兒ノ下劑ニ尤良

○肺ノ諸症ニ用テ胸ヲ利シ肺ヲ潤シ粘痰ヲ豁シ胸痛喘急經久ノ傷冷毒胃效重訂內科撰要第百七十七章出等ヲ

治ス是潤滑甘和ノ質ヲ以テ酷厲液ヲ消シ大便ヲ利スレバナリ或ハ大黃ヲ如飲液^和用テ胸中痰飲ヲ疏滌ス○熱病ニ用テ潤下ノ効ヲ稱ス○產婦或ハ壯熱熾衝病等ノ輕^大便ヲ通利スベク峻下劑ヲ用難キ症^的當トス○小兒呼吸不利胸中苦悶促迫スル者ハ海葱蜜ヲ加用テ粘痰ヲ驅除シ治ス○勞效等虛羸ノ病輕^下劑^並用ベキ者^以滿那最良トスヨク肺ヲ甘和^ノ大便ヲ通スルハ大^小兒服量小兒五歲以下^錢用^四錢^之適宜^飲液或ハ大麥煎或ハ乳沫^ニ用^大人^ハ錢^三

小二多或ハ三多マデ水ニ溶シ用日或ハ下劑ニ加
 用フ○過服スレバ酸敗液或ハ風氣ヲ生メ胸腹痞
 滿不斯ノ如キ者ハ苦味香竄ノ藥品ヲ加ヘ用ベシ
 ○體質薄弱ニメ感觸シ易キ者是ヲ過服スレバ腹
 痛ヲ發シ或ハ胃腸ニ風氣ヲ生スル下アリ故ニ常
 ニ多ク用ルニハ他藥ニ加ベシ或ハ味惡キ下劑
 加テ甘美ト爲スニ用フ○滿那ヲ蒸餾スレバ味辛
 微酸ナル清液出ヅ此液發汗ニ効アリ又惡性熱自
 餘熱病ニ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解ス服量半錢ヨリ一
 錢ニ至ル叔伍底物 裝伍福

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア過^ア爾^ル拔^バ羅^ラ

製法

其^コ諸^シ厄^エ利^リ斯^ス瀉^セ利^リ鹽^シ

剥^ボ篤^ト亞^ア斯^ス

精製者

右瀉利鹽ニ雨水ノ沸湯三比ヲ加テヨク溶シ濾過
 ノ汁ヲ取リ次ニ剥篤亞斯ニ雨水ノ沸湯一比半ヲ
 加テ溶シ濾テ汁ヲ取リ右兩個ノ灰汁仍熱セルヲ
 合シ磁壺ニ入レ又沸湯八比ヲ取テ是ニ加ヘ火ニ
 上セ煮ル下四分時ニテ是ヲ綴布上ニ傾テ寫シ其
 布ニ留ル瀉利鹽ニ數沸湯ヲ注キ透漏セシメテ洗

淨シ其鹽毫^ホ味ナキニ至テ取り出シ夏月ハ日乾
シ或ハ文火ニテ乾シ白色ノ鹽ト爲シ貯フ^後

又法 諸厄利斯瀉利鹽^{四北}

右瀉利鹽ヲ水ニ溶シ紙ニテ濾シ精製^{ゴツト}剝^ア篤^ス亞^ス斯^ヲ
取^リ適宜ニ水ヲ加テ溶シ紙ニテ濾シ此灰汁ヲ以
テ一滴宛右ノ鹽汁ニ滴スレハ每滴乳汁ノ如クナ
リ^テ其底ニ沈^シ雪白色トナル斯ノ如ク數滴ノ終
ニ^シ火^ニモ乳白色トナラス沈マザルニ至テ此液ヲ火
ニ上セテ煮沸セシメ其間ヨク攪セ火ヲ下シ微冷

ルニ至テ是ヲ細絹ニテ濾ス成ハ雪白色ノ麻^ハ偶^ニ涅^ト
失^レ亞^リ其^レ絹^上ニ留ルナリ此ヲ取り數水ニテ洗ヒ必
モ味ナキニ至テ乾シ硝子壺ニ入レ貯ス上好ノ品
ハ皆右ノ二法ヲ以テ製ス^固○古昔ハ多ク消石ヲ
以テ是ヲ製ス今ハ用ル^ル稀^ナリ其法消石ヲ製造
スル時消石ヲ結芒セシメテ後其芒ヲ結バザル苦
辛粘稠ノ汁ヲ取テ濾過シ徐々ニ煮テ水氣ヲ乾シ
鹽ト爲シ是ヲ坩鍋ニ入煨過メ白色トナルニ至リ
水ニテ洗ヒ絶^テ味ナキニ至リ乾シ貯フ或ハ扑硝
ヲ水ニ溶シ煮テ膜ヲ生スルニ至リ放冷メ芒ヲ結

バシメテ上好ノ消石ヲ取リ其刺汁ヲ前法ノ如ク
 煮テ結芒セシムルヲ數回ニシテ少モ芒ヲ結バザル
 汁ヲ取リ煮テ水氣ヲ乾シ煨過シ洗テ味カキニ至
 小乾シ貯フ ○或ハ結麗土等ノ石灰質ノ土ヲ以
 テ偽造スル者アリ宜ク仔細ニ擇ニ偽品ヲ用ル
 勿レ。石灰ヲ加ヘ偽ル者ハ其量重シ。眞品ハ秤量甚
 々輕シ。眞品ニハト偽品ニハト其多サ相等シ又眞
 品ハ甚々清潔ニシテ雪白色ナリ ○酸味ノ液殊ニ稀
 キ綠礬精ニ是ヲ加レバ盡ク速ニ溶化シ苦味ノ液
 トナル。是ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ稠厚ト爲シ冷

處ニ置ケバ酸性苦味ノ芒ヲ結テ復諸厄利斯。瀉利
 鹽トナルナリ。其苦味ノ液及ビ芒晶ニ微利ノ効ア
 リテ小兒産婦虛人ノ大便閉ニ用ヌ若シ此物ニ石
 灰質ノ土ヲ雜ルカ或ハ其土ニテ偽造スル品ハ右
 ノ酸液ニ加レバ速ニ溶化シ難ク或ハ絶テ溶化セ
 ズ。雲母ノ如クナリテ底ニ沈ミナリ。

主治 此藥ハ一種ノ中和鹽ナリ。酸敗液ヲ消刺スル
 一良藥トス。土質ノ品ナレバ微大便ヲ利スル故ニ
 胃ニ停滯セズ閉塞ノ害ナク大便閉ノ症ニ用テ妨
 害ニ速ニ制酸ノ良効ヲ奏シ凝結ヲ疏解シ依剥昆

堉兒神思鬱憂病共二十六章訂內科撰要脾病夫治不土凡
 質ノ藥ハ水液濕氣ヲ吸收シ殊ニ酸敗液ヲ剋制ス
 ルノ主能トス故ニ性收瀉ノ胃腸ヲ滯滯シ閉塞ス
 鹽ノ質ハ酸性トシ灰様ノ土質ノ亞兒加利鹽ト相和シタル中
 鹽ナリ故ニ是ヲ服スルキ瀉利ノ効力為ス故ニ土
 質ノ藥ハ中和鹽トナリ輕キ瀉利ノ効力為ス故ニ土
 質ノ藥ハ閉塞スルニナリ○小兒ハ多ク酸敗液ヨリ
 病ヲ生スル故ニ小兒諸病ニ多ク良驗ヲ稱ス○每
 服半錢ヨリ一錢ニ至ル小兒ハ五分ヨリ十分ニ至
 ル大人ハ半錢ニ至ル沙糖大黃橙皮茴香ヲ加テ用テ良
 是ヲ酸味ノ液ニ和シ用テ胃ノ痙攣及ヒ逆行
 運動ヲ鎮メ嘔吐ヲ止ム左ノ方劇キ嘔吐ヲ止メ

大便ヲ微利スルニ奇効アリ其藥ハ古亦
 麻僞涅失亞鎮嘔飲○酸味ニ用テハ之
 麻僞涅失亞過爾拔ハ蘇合降香○大黃
 拘櫟汁○適宜ハ之
 右麻僞涅失亞ヲ取テ必許宛拘櫟汁ヲ加入必毛滾
 動セサレバ度トシ其液ヲ取り硝子壘ニ内レ固封
 シ貯ス○麻僞涅失亞過爾拔ハ小兒酸敗液ノ腹痛
 ニ殊効アリ香味ナクノ服シ易ク他ノ制酸土質ノ
 品ノ如ク滯滯セズ宜ク此未ク飲液ニ加テ必許宛
 數用スベシ或ハ左ノ方尤効アリ

制酸消毒飲

品、麻^ハ屈^シ涅^シ失^ア亞^ア過^ア爾^バ技^未二錢
 石^ハ鹼^勿擗^祭亞^ア者^者
 薄荷^ハ舍利^別三錢
 苗^ハ香水^三多
 右^ハ調^和之^一時^毎一^二匙^布匙^用之^若以^ハ大^便通^セ
 ガ^ル者^ハ大^黄末^四五^分ヲ^加フ^ベシ^大便^ヨク^通利
 ス^レ氏^ハ腹^痛休^マガ^ル者^ハ薄^荷舍^利別^ト大^黄ヲ^除
 テ^白罌^粟舍^利別^三錢^ヲ攪^和シ^用フ^ベシ[○]酸^敗液
 及^ビ風^氣痞^滯ヨ^リ發^スル^腹痛^ハ左^ノ方^亦屢^捷効

驅風消毒散

入^レ麻^屈涅^失亞^過爾^技
 沙^糖
 苗^香各^二錢
 右^ハ散^劑半^時毎^一印^匙宛^適宜^ノ飲^液ニ^テ送
 下^ス斯^ノ如^キ散^劑ハ^小兒^勞瘵^様ニ^羸瘦^シ全^軀ノ
 榮^養虧^損シ^頻々^飢テ^食不^腹肚^膨脹^シ酸^敗液^ノ
 症^ヲ兼^シ者^ニ用^ヒテ^大効^{アリ}。此^症ニ^搗掣^ヲ兼^ル
 片^ハ阿^芙蓉^或ハ^麝香^ヲ加^フベ^シ右^ノ消^毒飲^ハ小

兒ノ胸熱兼嗽痰喘等 冒寒熱。生齒熱。或從善性ノ痘

瘡麻疹。赤斑熱等ニ良驗アリ若シ是ニ清涼ノ効

要濟或ハ大便ヲ利セテ欲スル者ハ左ノ方。的効

升レ水レ濃レ飲レ每レ日レ三レ回レ飲レ之レ。

古黙栗薩滿那飲 每レ日レ一レ回レ飲レ之レ。

古黙栗薩水 每レ日レ一レ回レ飲レ之レ。

滿那 六錢

消石 六錢

麻僞涅失亞 過爾拔

右研和シ頻々ニ一茶匙ヲ用フ

煨製麻僞涅失亞 マ グ子シア。ヒウラ。ウイタ。又

製法 麻僞涅失亞 過爾拔 適宜ニ取リ坩鍋ニ

入レ密ニ蓋ヲ覆ヒ炭及ビ灰ノ入ルヲ防キ火ニ上

セ。坩。熾紅トナリテ後一時許ヲ經テ火ヲ下シ硝子

壘ニ入レ固封シ貯フ但レ其初レハ漸々レ火ヲ加ヘ坩

ヲノ熱セシメ通紅トナスベシ初メヨリ烈火ニテ

煨片ハ此藥力脱メ諸液ニ溶化スベカラザル渣塊

トナリ或ハ煨燒其度ニ過レバ侵蝕スルキ酷厲毒

トナリ是ヲ服メ害アレバナリ。故ニ煨製セザルヲ

切實トス ○ヨク煨過スル者ハ是ヲ酸味ノ液ニ加

テ毫モ沸騰セズ是ヲ醋ニ加ルニ火ニ上セ温ムル
 非レバ融化セズ若シ是ヲ醋ニ加テ稍滾動スル
 片ハ再々煨過スベシ○石灰質ノ土ヲ雜テ偽造ス
 此者ヲ煨過スレバ其性更ニ酷厲トナリテ侵蝕ス
 故ニ是ヲ用ヒテ大害アリ
 主治是ヲ煨燒スレバ其含ム所ノ酸性ヲ脫除シ純
 ヲ亞兒加利性トナル故ニ胃腸ノ酸敗液ヲ除クノ
 効甚々峻ナリ然レ下利ノ効ナシ凡ノ石灰質ノ土
 ハ速ニ酸敗液ト混和セザル故ニ自ラ侵蝕スベキ
 酷厲毒ヲ生ス但此藥ハ煨過ノ酸性ヲ脫除スルノ

ニナレバ侵蝕毒トナルヲナク制酸ノ効ヲ成スナ
 リ
 亞兒加利
 福依

末兒叔尼斯散

マルヒス・マールヨニス・羅
 マルクガネヘン・アードル・蘭

製法 芍藥根

白鮮皮

槲寄生

鹿角

真珠母

各三多

蜩蛄石

或ハ石梅ヲ用フ

右各別細末トシ調勻ノ散劑トス

主治 痲痺搐掣等凡ノ神經ノ諸症ニ奇効アリ每服

十爪ヨリ十四爪ニ至ル **辰揚**

味 辛 性 温 功 用 治 痲 痺 搐 掣 等 凡 之 神 經 諸 症 奇 効 有 之 每 服 十 爪 至 十 四 爪 爲 度 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 勿 延 誤 也 此 藥 之 功 用 實 爲 神 妙 凡 患 痲 痺 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也 凡 患 搐 掣 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也 凡 患 神 經 諸 症 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也 凡 患 痲 痺 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也 凡 患 搐 掣 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也 凡 患 神 經 諸 症 者 宜 試 之 必 獲 奇 効 也

計
齶蓬鹽

ガルアルカリ

製法 齶蓬和名ハママツヲ取リ曝乾シ地ヲ穿テ

溝ヲ造リ上ヲ狭クシ内ヲ潤クシ此草ヲ填テ燒テ

通紅トナルヲ候ヒ其溝ヲ益封ス是ニ由テ火氣耗

散セズ其灰ニ鹽氣多ク含蓄ノ凝固シ冷レバ堅ク

メ石ノ如シ槌ニテ打碎キ取り出スベシ **上品**

乾固灰白ニメ青色若クハ赤色ヲ帶ビ光澤アリ又

黯色及ビ白色ニメ大小齊シカラザル鍼眼竅點ア

リ手ニ取テ重ク打テ響アリ惡臭ナク舌ニ觸テ辛

鹹滲透シ嚼テ聲アリ **是ヲ剥** 篤亞斯 比スレバ

酸性ヲ含ムト多クノ性緩ナリヨク芒晶ヲ結ビ氣
ニ觸レバ粉碎トナル

主治 是レ一種ノ亞兒加利鹽ニシテ大抵刺篤亞斯ト

同シ製煉術及モ精好ノ硝子ヲ造ルニ用フ○此鹽

ヲ水ニ溶シ濾テ火ニ上セ煮乾メ固鹽ト爲セバ性

尤酷烈ニシテ腐藥及モ打膿法ヲ施スニ用フ又衣服

ノ脂垢ヲ除クニ尤良凡ソ亞兒加利鹽ハ油氣アル

者ヲ多ク溶解スレバナリ○此鹽及刺篤亞斯ニ生

石灰ヲ和スレバ其含メル所ノ酸性ヲ脫除メ極テ

酷烈ナル亞兒加利鹽トナル

〔四〕
〔五〕
〔六〕

情

鰾蓬鹽晶

キリスタルヨリ又サルノイダ又ソイダ
シタタシタシタキリスタルレシ又ゲソイ
又ロクソウルヘコルシキロイグ

製法 鰾蓬鹽 適宜 其子

右極細末トシ鐵壺ニ内レ水適宜ニ加ヘ煮ルト良

久フメ其鹽氣ヲ融解セシメ水減耗スレハ數カ入

水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ温ニ乘メ濾過シ其液又

冷處ニ置成ハ晶ヲ結フ其晶ヲ取メ餘殘ハ液ヲ蒸

其前法ノ如クシ芒ヲ結バシム斯ク如ク數回

其液終ニ芒ヲ結バガルニ至リ其芒ヲ集メ硝子壘

又入レ固封シ貯フ

又法 鹹蓬鹽 三北

其煎水 十二北

右鹹蓬鹽ヲ坩ニ内シ火ニ上セ煨テ硫黄ノ蒸氣消

スルニ至リ水ニ溶シ煮テ紙ニ濾シ其渣ニ又水

六北ヲ和シ煮テ盡ク溶化セシメ紙ニテ濾シ前ノ

液ト合メ又濾過シ暫ク煮テ放冷シ芒ヲ結ハシメ

其餘ノ芒ヲ結ハサル液モ亦煮テ前法ノ如ク結芒

セシメ終ニ必モ芒ヲ結ハサルニ至リ其芒ヲ取り

貯フ其餘ノ汁ハ煮乾シ白色ノ鹽トナルニ至リ右

種ノ芒由共ニ收メ貯ヘ用フ

主治 是鹹蓬鹽ノ純精淨潔ナル者ナリ剥篤亞斯ニ

比スレバ性緩ニメ良効ヲ稱ス○石淋ヲ治スルニ

多ク用フ○蠣壳勿搗祭亞石鹼ヲ加ヘ丸トシ毎日

二錢或ハ三錢マデ用テ酸敗液ノ諸症ニ尤良

結麗土 蘭ケレタアルバ 羅

○榕按ニ是レ豊後土或ハ白繪土間ノ稱ト呼ブ

者天造ノ結麗土ナリ風化石灰ハ人工ノ結麗土

ナリ西洋説ニ云結麗土ハ能ク火ニ堪ヘ烈火ニ

投メ燒ケ其色少シモ變セズ灰トナラズ消化

セズト。蘭山本草啓蒙ニ云。茶碗ハ白藥ニハ豊後
 珍珠郡ノ白土ヲ用フ。燒テ白色變セズト是ナリ。
 先輩是ヲ白堊ニ充レテ磨ル。稱シ且磁器
 ノ不ト爲ス者ニノ和蘭ニホルセレイン。アルト
 性ト結麗土ト異ナリ。其ハ白
 結麗土ハ石灰質ノ白土ニノ其形鉛粉ト同シ。其質
 精細ニノ輕ク乾キテ脆ク磨碎スベク。ヨク水ヲ吸
 收シ沙様ナラズ粘氣アリ指ニ著テ剥易ク味毫モ
 收潘セズ燒テ性色變セズ消散セズ。灰トナラズ。消
 石精ニ加バ盡ク溶化シ或ハ醋ニ加バ沸騰ス。故
 三亞兒加利性ノ土トス。是ニ硫黃精若クハ綠礬精

ヲ和スレバ水ニ溶難キ一種ノ鹽トナル是ヲ硫酸
 加爾幾ノ類ト云燒テ白粉ト爲シ水ヲ和メ膠泥ニ
 用フ○往古此土結麗太島歐羅巴洲ニ屬スニ産ス。故ニ結
 麗土ト名ク。今ハ歐羅巴洲ノ諸國ニ出ツ○此物白
 色ノ畫料書記及ビ器械牆壁ヲ塗ルニ用ヒ又醫藥
 ニ供ス○藥用トスルニハ是ヲ精製メ汚物ヲ去リ
 用フ
 精製結麗土 結麗土ヲ取リ極細末トシ磁器ニ入
 多ク水ヲ加ヘ水棍ニテヨク搗リ和シ暫ク靜定メ
 後徐々ニ其上面ニ浮ム乳白色ノ液ヲ他ノ器ニ傾

ケ寫シ其渣滓ニ又水ヲ加ヘ攪滾メ前法ノ如ク其
 水ヲ傾ケ寫シ斯ノ如ク數回シテ其水乳白色トナ
 りザルニ至リ其水ヲ集メ合シ靜定メ其渣ヲ取リ
 又緻布ニテ其水ヲ濾テ布上ニ留ル粉ヲ取リ共ニ
 磁盃ニ入レ日乾シ研末トシ貯フ

主治 結麗土ハ自然ノ風化石灰ニノ性功亦同シ。酸
 敗液ヲ剋制緩和シ且吸收ノ濕ヲ乾ス効アリ故ニ
 胃中ノ酸敗液ヨリ發スル諸症。吞酸嘈雜。胸腹刺痛
 等ヲ治シ或ハ肺血嗽咯。下血。諸失血ニ効ヲ奏シ蟲
 ヲ殺ス或ハ甘和ノ効アル舍利別白罌粟舍利別過爾
 論亞舍利別等

云ヲ加ヘ或ハ一味用ヒテ酷厲ナル粘液肺ヲ刺戟
 ノ發スル劇キ痰效等ノ胸病ニ驗アリ。下利ニ痛
 痛或兼子或ハ酸敗液ヲ兼ル症ハ此物ニ驅風ノ藥
 ヲ加合用ヒテ効アリ。凡ソ亞兒加利性ノ土ハ酸
 敗液ヲ消化スルヲ全ナラズ又酷厲ナル粘液ニ衝
 動刺戟スルヲ甘和メ抑制スル効アリ。服量一刃
 目リ一錢ニ至ル或ハ此末六分ニ水三比ヲ攪和シ
 煮炙三分ノ十以減シ靜定メ其清ヲ取リ濾過スレ
 ハ乳汁同如シ是ニ舍利別ヲ和シ服メ良。但土質
 外藥ハ遊滯メ閉塞スルニ止ニ少許宛用フベシ。過

服スレバ胃腸ヲ閉塞メ食ヲ妨ガ或ハ疝痛ヲ發シ
 或ハ便閉ヲ患シ了ヲ休故ニ上ニ説ク如ク製シ用
 之或ハ必ク下劑ヲ加テ大便閉ヲ防ギ或ハ健胃香
 竈ノ藥ヲ如ク用スベシ假令ハ肉豆蔻山奈薑等ノ
 未次如ルガ如シ是亦酸敗液ヨリ起ル胸腹ノ諸症
 ニ甚ダ驗アリ○甲介ノ類即チ蠟壳雞卵壳蜎蛄石
 等ハ皆石灰質ノヒト生族ノ粘液質トテ含テ制酸
 奏効アル故ニ粘質必キ結麗土ニ比スレバ尤切實
 ニ受害ナシトス○外敷メ焮赤腫痛ヲ消シ酷厲毒
 ヲ祛ク故ニ創傷潰瘍ノ汚液出ルヲ多キ症或ハ瘡

中水棉樣ノ贅肉ヲ乾シ癰瘡ヲ愈シ或ハ一切皮上
 ノ焮赤小胞及ビ汗漏泄スル症或ハ乳頭坼裂ニ此
 末ヲ摻ケ或ハ乾カス藥ニ加ヘ施メ良効アリ
 血石 名譯 「ハ」マチテス羅「ブル」ドステ「ン」蘭
 此石ハ礦石ノ如ク堅固ニテ破碎シ難ク重ク接ア
 ル長キ塊片ヲ爲シ黯赭色ニシテ微黑色ノ條理アリ
 或ハ黃色ヲ上品ハ條理分明ニシテ破碎スレバ鮮美
 帶ルアリ

ノ束鐵紋ヲ爲シ朱砂ノ色アリ
 レバ血色ヲ爲シ或ハ水ヲ加ヘ礪ニテ磨スレバ其
 此品藥舖ニ呼ブ研末ス

汁血ノ如シ故ニ血石ト名ル或ハ止血ノ功ア或ハ此石稀ニ葡萄状ヲ爲シ或ハ腸ノ廻疊スル状ノ者アリ此品藥舖ニ代赭石様ト呼ブ○此石伊斯把尼亞獨乙都諸厄利亞共歐洲ノ國名鐵坑ニ出ヅ或ハ純ラ此石ノ出ル坑アリ此坑ニ赤石及ビ赤土アリ或ハ金剛鑽ノ出ル坑ニ血石出ヅ此二物共ニ鐵坑ニ出ル故ニ其性甚ダ鐵ニ近ク其質モ亦鐵礦ノ一種トス或云血石ハ許多ノ鐵ト少許ト即チ血石ヲ製煉スレバ上好ノ鐵ヲ成シ或ハ是ヲ酸味ノ液ニ浸セバ溶化スル丁鐵ノ如ク或ハ是ヲ綠礬油ニ

溶セバ撒兒末爾扶斯條ニ出トナル丁鐵ト同

又血石ヲ炭ニ載セ是ヲ火燧鏡丘丘燒ク成ハ忽チ

變メ鐵トナルヲ以テ知ル此石伊斯把尼亞

ノ産因上好トス東鐵紋鮮美ニ汚物ヲ雜ヘズ堅

固ナレバナリ○此石種類多シ故ニ是ヲ以テ血石

ヲ偽造スルヲアリ○此一種シキス者ト名ル石

アリ其塊片尖利ニ堅剛ナラズ割面平等ナリ血

石ハ其稜鈍ニ割面昂低アリ堅固ナリ割裂易

カラズ東鐵紋貫通シ其條理ニ循ヒ割裂ス○一種

アリイニステーン赭石ノ義ニ即チ下品ノ代赭石

近ト名ル石アリ此亦血石ニ比スレバ堅固ナラズ
 ○假血石ト名ル石アリ其色全ク血石ト同シ然レ
 軟脆ニテ小刀ニテ割截シ易シ畫家木匠等ノ摸像
 記痕ヲ爲ステ用フ是レ赤結麗土書記結麗土石筆
 云或ハブルドアルドノ義ト名クベキ者キ又赤石
 筆ノ類ナリ斯ノ如キ類多シト雖モ血石ニ比スレ
 バ堅固ナラズ又束鍼紋ナキヲ以テ分晰スベシ然
 凡其性功ニ於テハ大約血石ニ似タリ
 主治性收瀉閉澁シ乾燥ス諸失血吐血ヲ止ルニ速
 効アリ○白帶下下利萎黃病經閉ヲ治スルニ格碌

屈私末爾扶斯鐵ノ條ト同シ○服量極細末トシ十
 五五ハヨリ一錢マデ適宜ノ飲液ニ點服ス○燒酒ニ
 浸シ丁幾去爾ト爲シ用ヒテ吐血尿血肺血衄血ニ
 効ヲ稱ス○外敷ノ潰瘍ヲ乾愈ス是ニ肉豆蔻油少
 許ヲ研和シ創ニ塗テ愈ユ搗伍侯
 桂ラインキネウル丁幾去爾ト○服量七十餘トテ十餘ヲ稱シ
 製法判搗者桂ト燒酒ニ十度者ト固封シ淹スト六日ト漚テ滓ヲ去リ

固封シ貯フ〔按〕

主治衰弱ヲ強壯シ精神ヲ爽快シ諸失血下利脱泄

等ヲ閉止スルノ良効アリ是ヲ單用シ或ハ對症ノ

劑ニ加ヘ用フ○服量十二滴ヨリ三十滴マテ葡萄

酒ニ加ヘ用ルヲ日三四次○桂露ニ比スレハ苦味

アリ所收瀋ノ功多シ〔依〕

桂舍利別〔依〕

製法桂極細末

右硝子曇〔内〕レ固封シ淹ス〔三〕日布片ニテ絞リ

瀝シ其液ヲ靜定ノ塗ヲ去リ左ノ藥ヲ加フ

桂露〔比〕半

白糖〔淨白者〕

右磁鍋ニ入レ文火ニ上セ溶化シ水氣ヲ蒸散メ舍

利別ノ稠ト爲シ固封シ貯フ〔按〕

主治胃ヲ健運シ神經衰弱ノ諸症。處女病。虛寒ノ淋

疾白帶下ヲ治シ諸脱泄ヲ止メ驅風ノ効ヲ稱ス〔按〕

健質〔チ〕亞〔ア〕那〔ナ〕羅〔ロ〕

○按ニ是レ和蘭藥鏡ノ龍膽草條下ニ載ル所ノ

ゲンチアナの第三種。根太キ者ナリ若シ缺ルハ

龍膽ヲ代用スベシ其説和蘭藥鏡ニ出ツ

健質亞那越幾斯劑 エキスタラクト。ゲンチアナ羅

製法 健質亞那 根粗末

右浸ス一十二時。磁罐ニ内レ蓋閉シ煮ル一

時。温ニ乗メ濾過シ汁ヲ取り沸湯ハ比テ其滓ニ加

ヘ煮ル一。時。温ニ乗メ絞リ濾テ滓ヲ去リ前ノ汁

ト合シ是ヲ煎熬メ膏ト爲ス

主治 健胃ノ良藥トス是ヲ服メ刺戟衝動セズ熱ヲ

増發セス飲食消化シ難キ等總テ胃弱ノ諸症。萎黃

病。胃腸風氣痞滿。疝痛。酸敗液腹痛。脾病。依剝昆垓兒

子宮病ヲ治シ。虚症ノ黃疸。間歇熱ヲ解シ。痛風關節

痛ヲ消シ白帶下。虚損ニ因ル經閉等ニ良驗アリ。是

ニ幾那ヲ加テ健胃ノ効尤峻ナリ故ニ頑固ノ間歇

熱ニ用ヒテ治驗多シ。服量十氏ヨリ二十氏ニ至

ル

健質亞那丁幾去爾蘭 根搗碎者

製法 健質亞那 根搗碎者

燒酒 十五度者

遠西各物考 卷十一 二十五 風雲堂藏

右硝子壘ニ入レ固封温浸ス一三日。濾テ液ヲ取り

貯フ

主治 健質亞那。越幾斯劑ト同シ

結爾茂斯

結爾茂斯 ケルメス 羅 カアルケルメス 又 ガナナケルメス 羅 ベシカールラケルメス 又 ベシナケルメス 羅 ベシナケルメス 又 ベシナケルメス 羅

是ハイレクス。コシヘラ 種ノ名 小水ノ枝及ヒ

葉ニ生スル疣贅ノ如キ蟲ノ巢ナリ形チ大約圓ク

大サ豌豆ノ如ク灰白色。柔ニメ輕ク髓様ニメ水綿

ノ如シ。熟スレバ深紅。光澤アリ内ニ紅色ノ液ヲ含

ニ押セバ帶赤色ノ液出ツ味辛苦。微佳香アリ。此物

藥用トシ又猩々絨等ノ殷紅ナル染料及ビ畫料ニ

用フ○其蟲ハ微細ノ蚊蛾ノ如ク羽化シ白色ニメ

細毛アリ此蟲モ亦結爾茂斯ト名ク夏月夥ク其樹

ニ生シ枝葉ヲ刺蝕メ其精液ヲ吮枝葉ニ贅瘤ヲ成

シ其内ニ夥ク卵ヲ生シ漸ク長育蕃息スルヲ隨テ

其巢囊モ盈長シ豌豆ノ大サトナル。是猶榭ノ一種

ニ没食子ヲ生スルガ如シ若シ其蟲悉ク羽化メ飛

去レバ其巢空殼トナル故ニ未ダ羽化セザル頃ニ

取り醋ヲ撒テ蟲ヲ殺シ。水或ハ葡萄酒ヲ洗ヒ能

遠西各物考 卷十一 風雲堂藏

遠東名物考 卷十一 二十

ク乾シ貯フ。○此物新鮮肥實。虧損セズ。黯赤色ニメ
柔ナル者ヲ擇ムベシ。○其樹ハ亭落葉樹ノ一種ノ
一種ニシテ大約四尺許ノ灌木ナリ。葉ナラ拘骨イラキニ似テ小
久邊ニ刺角アリ。四時常緑。花ハ猫兒イニメ鱗屑様ノ
細線ヲ以テ成リ。是ニ碎花著ク。蓋様ニメ刻缺アリ
花後實ヲ結バズ。實ハ別ニ枝ニ生シ。榘實ノ如クニ
以灰白色。半刺アリ。其内ニ仁アリ。片ニ分ル
○此物意太里亞イスバ把尼亞ア波爾トル杜瓦ガ爾ル拂郎ラ察福ス
撈察セ蘭ン牛鐸ゴ古甘カ的ダ亞ア以上州ノ歐羅巴バ其他ア亞細亞ア州ア
弗利加洲カノ諸煖地ニ産ス。

○按ニ此物和漢産未ダ詳ナラス。洋船ノ品ヲ用
フベシ。

主治 性收斂ス。油氣鹽氣アリ。衰弱ヲ強壯シ。失氣眩
暈ヲ治シ。胃ヲ健ニシ。嘔吐ヲ止メ。飲食ヲ消化シ。孕
婦産婦ノ虛損ヲ復シ。墮胎ヲ防護シ。痘疹ヲ驅發ス。
○往古ハ虛損ヲ補充スルニ多ク用フ。近來ハ用ル
コ罕ナリ。○服量半及ヨリ一及ニ至ル。細末トシ。或
ハ雞卵ニ攪和シ。用ヒテ催生藥トス。性功大抵哥攝
尼爾ニル後ニ出ツト同シ。物伍伍
結爾ケル蔑斯ス舍利シ別ベセイセロロププススケケルルメメスス羅

製法 結爾蔑斯 二勺

蓄薇露

各一匙

右結爾蔑斯 蓄薇露ヲ如ヘ浸ス至十二時。文火ニ

上セ煮熟シ搾テ汁ヲ取リ砂糖ヲ加ヘ再ヒ文火ニ

上セ水氣ヲ蒸散シ舍利別ノ稠ト爲ス

主治 結爾蔑斯主治ノ諸病ニ尤効アリ

結爾蔑斯 昆設爾弗

コニセルフハンシカールラケン

製法 結爾蔑斯 舍利別 北半

遠西醫古沈香 卷十一

桂 各六錢

右舍利別ヲ文火ニテ溶シ二味ヲ下シ煉和ス

主治 腦心ヲ強壯シ精力ヲ旺盛シ精神沈重ヲ爽快

シ胃ヲ健ニシ眩暈昏冒ヲ醒シ神志鬱憂病ヲ治シ

虚脱ノ下利赤痢水腫ニ効アリ

錢 至ル

見篤散

製法 蟹爪 二勺 蜘蛛石 一勺

遠西醫方名物考卷十一終
二十四
厚雲堂藏

眞珠 一月
鹿角灰 一月
琥珀 各二錢
昆答刺越兒發根 八月
反鼻 四月
金箔 一月

右各別ニ極細末トシ調勻メ散劑トス

主治 小兒癩瘰瘡搨及ビ酸敗液ノ諸症ニ奇効ヲ奏

シ汗ヲ發シ惡液ヲ表發ノ蒸氣ヨリ排泄シ神經ヲ

強壯ニス○服量六匁ヨリ一月ニ至ル

卦 合六類

遠西醫方名物考卷十一終

遠西醫方名物考卷十一終

真珠	一	鹿角灰	八
琥珀	二	昆布刺	九
天麻	四	金箔	一〇
西谷粉	五	和木	六
主治小兒疳積	七	酸敗液	八
汗才發	九	蒸氣	一〇
強壯	一〇	服量六	一〇

遠西醫方名物考卷十二

卷十二

花膏	一
花膏	二
花膏	三
花膏	四
花膏	五
花膏	六
花膏	七
花膏	八
花膏	九
花膏	一〇

遠西醫方名物考標目

卷十二

芫菁

芙蓉驅水丸

蘇芫菁丁幾去爾

芫菁驅水酒

芫菁乳

治淋丁幾去爾

芫菁越栗失爾

咬傷消毒丸

咬傷解毒丸

發泡硬膏

發泡軟膏

排毒化膿膏

〔不〕覆盆舍利別

蒲里阿尼亞

府利

芙蓉

卷十二

遠西醫方名物考卷十二

遠西醫方名物考卷十二

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

芫菁

〔性〕芫菁ハ揮發鹽下華爾斯ヲ以テ其質ヲ成ス。是レ
燒酒ニ浸セバヨク溶解シ水ニハ溶化セザレバナ
其製煉術ニテ是ヲ蒸餾スレバ亞兒加利性ノ揮
發鹽蒸升シ其底ニ華爾斯殘ル。是ニ揮發酸性ノ酷
厲毒ヲ含メリ。味ハ舌ヲ侵刺シ其氣惡ムベシ。○是

〔性〕芫菁ハ揮發鹽下華爾斯ヲ以テ其質ヲ成ス。是レ
燒酒ニ浸セバヨク溶解シ水ニハ溶化セザレバナ
其製煉術ニテ是ヲ蒸餾スレバ亞兒加利性ノ揮
發鹽蒸升シ其底ニ華爾斯殘ル。是ニ揮發酸性ノ酷
厲毒ヲ含メリ。味ハ舌ヲ侵刺シ其氣惡ムベシ。○是

遠西各物考 卷十二 風雲堂藏

ヲ研末スレバ其氣眼鼻咽喉ニ竄入ノ大ニ焮腫シ
或ハ總身斑疹ヲ發スル者アリ故ニ研磨スルニ戒
慎ヲ加フベシ○此蟲ハ久々貯テ性能ヲ失ハズ然
氏新ニノ全形具ル者ヲ擇ニ用フベシ

主治 荒菁ノ主功二般アリ○其一ハ此蟲殊ニ腎輸
尿管膀胱尿道ヲ刺戟スル一種ノ酷厲毒アリ故ニ
過服スレバ右ノ諸器大ニ焮熱腫痛シ或ハ尿管尿
血ヲ發ス或ハ口舌咽喉熱燥シ胃腸肛門モ亦焮痛
赤爛シ甚キ者ハ壞疽トナリ死ス故ニ右ノ諸器焮
腫アル者ニ用レバ大ニ其症ヲ増劇ス然ルニ精練

ノ醫家病性ヲ察シ服量ヲ慎ニ適宜ニ是ヲ用レバ
其酷厲毒ヲ以テ腎膀胱等ヲ刺戟衝動シ小便分利
ノ機轉ヲ進メ極テ利尿ノ峻効ヲ奏ス故ニ水腫小
便閉ノ之ナラス凡ソ粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解シ
小便ニ驅泄シ治スベキ諸病ニ奇効アルニ是ニ比
スベキ者ナシ○其二ハ是ヲ過用スルハ其酷厲毒
ヲ以テ特ニ小便ノ諸器ノ之ナラス全軀ノ疑體織
維ヲ侵蝕毀壞シ血液ヲ稀渙焔崩ノ危殆ノ諸症ヲ
發ス是ヲ外敷スレバ肌膚ヲ腐爛シ發泡潰蝕スル
ヲ以テ知ルベシ然ニ良醫ノ手ニ在テ患者ノ強弱

遠西各物考 卷十二

隨七病性ヲ察メ服量ヲ斟酌シ或ハ對症ノ藥劑
 二調和シ用レバ是所謂名匠ノ利器ニシテ其酷烈刺
 戟ノ殊能ヲ以テ衆器諸液ノ運動怠慢衰頹セルヲ
 警發醒覺シ元運生氣ノ沉滯潛結セルヲ振起發揚
 シテ一種ノ熱ヲ誘發ス此熱即チ細絡纖管ニ頑滯
 セル膠粘液ヲ融解蕩滌メ諸竅ニ驅逐ス是ヲ以テ
 頑痼危險ノ諸病即チ癩癩神經熱腐敗熱疫欬經閉
 咬傷毒癩等ニ奇効アリ○右兩件ノ主功ハ此蟲ニ
 稟ル所ノ一種ノ刺戟衝動ノ所爲ニシテ古今ノ明哲
 多ク歷試考究シ殊効ヲ稱スルヲ勝テ算ヘ難シ即

遠西各物考 卷十二 二 風雲堂藏

ナ其一二ノ經驗說ハ左ニ舉グ

水腫 **小便閉** 水腫ニ芫菁ヲ内服メ利水ノ峻効アリ

殊ニ諸脉纖維ノ弛弱縱緩ノ感觸鈍ク血液ノ運行

怠慢ナル水腫ニ用ヒテヨク停水ヲ驅泄ス是七動

脉ノ神經膜動脉管ノ襲成スル神經衣膜ヲ刺戟メ其搏動ヲ強健

ニシ血液ヲ進輸メ壅滯ヲ開利シ小便ヲ驅逐スレ

バナリ○服量四分ハノ一ヨリ一ハマテ龍腦ト沙

糖少許ヲ研和シ用フ龍腦ハ芫菁毒ヲ抑制シ是小便

閉ノ云ナラズ小便不利艱澁淋瀝等ノ症ニ用ヒテ

捷効アリ○或ハ芫菁末ニ酒石鹽ヲ加テ驅水藥ト

遠西各物考 卷十二

シ用ヒテヨク水腫ヲ治ス○或ハ此末ニ消石龍腦
各一二分ヲ加ヘ用テ焮衝ヲ防キ小便閉ヲ治ス○
或ハ此末一分ヨリ三分ニ甘草ト龍腦少許ヲ
加ヘ用テ水腫ヲ治スルニ甚ク驗アリ○一患者小
便点滴モ通セザル十一日利尿ノ諸藥寸効ナク
苦悶讖語筋惕肉瞤冷汗等ノ惡症ヲ發ス乃チ芫菁
末一分ヲ扁桃乳ニ研和シ分テ九服トシ二時毎ニ
一服宛與フ第三服ニ至テ小便漸ク利シ諸症隨テ
減シ回復ス○一婦人腹水ヲ患フ芫菁ト幾オシキ去爾タル後
出ヲ取テ二十滴宛列ツレ印イシ設酒ニ點服シ爾後漸ク加

テ四十滴ニ至リ小便快利メ全治セリ○水腫ニ芫
菁發泡膏ヲ貼メ亦効アリ然レ内服スルヲ尤モ切實
トス刺戟スルコト少ク且焮衝ヲ發セズ諸器脉管ノ
運動ヲ増進シ粘稠液ヲ稀釋メ小便ニ通利スレバ
ナリ○焮衝ノ候ナク膀胱麻痺不遂メ小便利セズ
或ハ尿道粘液質ノ腫瘍アリテ久ク愈ズ小便利
メ妨メ是ヲ刺戟衝動メ疏散スベキ症ハ皆芫菁ヲ
用テ効アリ○尋常ノ水腫ニ左ノ丸藥奇効アリ

芙蓉驅水丸

阿芙蓉

精製者
十二分

芫菁末

六氏

右研和ノ十二丸ト爲シ銀箔ヲ衣トシ朝夕一丸宛服シ爾後漸ク半丸ヲ加フ是ヲ用レテ小便崩泄シ水腫隨テ消ス但痛ヲ發シ小便利セザル者ハ速ニ此藥ヲ休ムベシ

芫菁丁幾去爾

製法

芫菁 二十度者

燒酒

二十度者

右硝子壘ニ入レ固封シ浸スヲ六日。紙ニテ濾シ硝子壘ニ内レ固封シ貯ス。患者ノ感觸甚フノ芙蓉

驅水丸ニ堪ザル片ハ此丁幾去爾ヲ用フベシヨク

小便便利ス但每人瞑眩ノ一様ナラザル故ニ初少

許用テ漸ク加フベシ假令ハ十五滴宛日ニ一

ニ漸ク加テ患者小便焮痛ヲ覺ルニ至ルベシ諸藥

効ナキ小便閉塞此劑一二匙用ヒテ小便崩泄シ全

愈セル者アリ

芫菁驅水酒

式ノ芫菁

末

一列印設酒

四

右硝子壘ニ内レ浸メ藥氣ヲ出シ濾テ滓ヲ去リ此

液一匙ヲ取テ葡萄酒七匙ニ和シ用テ
劑トシ用レバ昏眩ノ恐ナシ故ニ感觸シ易キ者ハ
左ノ方ヲ用フベシ

芫菁乳

芫菁 末 半錢

龍腦 五
右扁桃ニ水ヲ加ヘ搗テ乳白色ノ汁ト爲シ次ニ二
味ヲ研和シ一時或ハ一時半ニ一匙宛用フ○或云
芫菁ハ小便閉ニ奇効アルト他ニ比スベキ者ナシ

然レ諸般ノ小便閉此一藥ニテ悉ク治スベキニ非

ズ唯腎中ノ泌尿管

重訂內科撰要尿管篇第三百十
三章ニ出是醫範提綱ニ所謂腎

管ナリ細輸尿管膀胱等ノ纖維衰弱弛弛ノ感觸鈍久

麻痺ノ小便ヲ分泌健輸スルヲ能ハス或ハ右ノ諸

道ニ粘液凝滯ノ小便ノ分利ヲ妨ケ閉塞スル者ハ

此藥ヲ用ヒテ刺戟衝動ニ其諸器ノ運營ヲ増發セ

シムレバ小便忽チ利ノ諸症自ラ解ス然レ腎膀胱

等ノ痙攣

腎尿管膀胱頸
拘攣掣急ヲ云及ビ焮衝ヨリ發スル症

ニ用レバ大ニ害アリ凡ソ刺戟衝動ニ諸藥ハ痙攣

及ビ焮衝ヲ増劇セシムレバ甚リト。或云芫菁ヲ

遠西名物考 卷十二 五 風雲堂藏

内服ノ腎膀胱ニ焮衝ヲ發スル者アレハ是ニ因テ小便閉ニ至ル者ナシ假令タトハ芫菁發泡膏ヲ外敷ノ其毒皮管ヨリ血中ニ侵入シ腎膀胱ニ觸テ焮衝ヲ發スル者アレハ是ヨリ小便閉ヲ為ス者ナキガ如シ或ハ此藥四モシ氏若クハ六氏ヲ一服トスルガ如キ服量過多ナレバ腎膀胱尿道大ニ焮衝シ或ハ尿管尿血等ヲ發スルヲアレハ小便閉ヲ為ス者ナシ或云水腫ハ水液多ク血中ニ混淆シ血ノ醇厚ノ質ヲ失ヒ焮解ノ終ニ腐敗ス然ニ芫菁ヲ用レバ其酷厲毒ニテ血液ヲ焮解崩壞ノ逾危篤ニ至ラシムト

然レハ服量適宜ニ是ヲ用レバ速ニ其停水ヲ驅泄スルガ故ニ曾テ血液ノ腐敗ヲ恐ル、トナシ

淋疾 微毒淋ヲ患ヒ其毒漸ク解散シ小便通スルニ痛少ク唯粘液漏泄ノ歇トザル症或ハ頑固ノ遺精ニ

芫菁ヲ用テ良効アリ此症動モスレバ經久治セズ滯患トナリ諸藥効ナキ者多シ是レ攝護精囊尿道

等ノ腺輸泄管重訂内科撰要微毒衰弱緩弛丸粘液

ヲ漏泄スル症ナル故ニ是ヲ用ヒテ刺戟衝動シ其

衰弊セル運營ヲ憤起増發セシムレバ其諸器自ラ

健旺メ小便通利ノ常調ニ復スルヲ其夫ノ腎膀胱

ノ麻痺ノ發スル小便閉前條小便失禁後ト症ヲ異
 ニノ原ヲ同フスル故ニ共ニ此藥ニテ治スル所以
 ナリ○右ノ諸症ハ芫菁末一匁ヨリ三匁マデ烏賊
 骨末一錢ニ研和シ日一服宛用ヒテ効アリ或ハ左
 ノ方良驗アリ

治淋丁幾去爾

大黃丁幾去爾

三錢○製法大黃剉十五度ノ
 燒酒八倍ヲ加ヘ硝子二匁内

固封シ浸シ六日濃テ
 其液ヲ取り貯フ

亞刺比亞一錢半

紫鉚一錢

芫菁末二錢

右銳烈ノ燒酒一比半ヲ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ其症

ノ輕重ニ隨ヒ三十滴ヨリ五十滴マデ朝夕兩次微

温湯必許ニ點服ス○徽毒ナクメ久ク愈ザル淋疾

モ芫菁劑良効アリ○或云芫菁ヲ過用スルバ小便

淋澁焮痛シ腎膀胱尿道ニ焮腫或ハ膿瘍ヲ發スル

故ニ總テ淋疾ニハ害アリト。但是ハ徽毒淋ノ初發

其毒多ク鬱蓄シ尿道焮熱腫痛ス此症ニ用レハ害

アリ云ナリ徽毒漸ク解散シ小便通スルニ痛ナ

ク粘液漏泄メ久ク愈サレ症ニ用レハ良効アリ不

久粘液漏泄メ久ク愈サレ症ニ用レハ良効アリ不

上ニ説ク如シ○凡ノ疑體纖維衰弱弛緩シ粘液水
 氣多ク壅滯ノ小便屢不利シ或ハ石淋ノ患アリテ
 具ヲ恐ル者ハ預メ芫菁劑ヲ用テ粘液ヲ稀釋シ小
 便ヲ驅泄ノ其諸道ヲ淨刷シ後患ヲ防グベシ○結
 石碎ケテ細沙トナリ膀胱ニ聚ル症ハ是ヲ用ヒテ
 ヨク其碎石ヲ通泄ス然レ結石腎痛及ビ大ナル結
 石懸留スル症ハ總テ刺戟衝動ノ驅水藥甚ダ害アリ
 但甘緩軟化ノ劑及ビ鎮痛劑ヲ用テ尤良トス
 尿崩 尿崩ハ小便夥ク通スル病ナリ但因其因一ナラ
 ス爰ニ舉ル尿崩ハ腎麻痺ノ分泌ノ官能ヲ失
 ヒ小便夥ク通スル症ヲ云其種類及ビ因症治法等
 重訂内科撰要尿崩篇第三百十九章ニ出併芫菁ベシ

芫菁ハ間尿崩ニ大効アリ是レ利尿ノ峻藥ニノ小
 便閉ニ効アリテ又尿崩ヲ治スルコト甚ダ恠ムベキ
 カ如シト雖モ是唯腎中ノ泌尿管及ビ神經麻痺ノ
 觸知ヲ失ヒ適宜ニ分泌ノ運營ヲ爲スコト能ハズメ
 尿液妄リニ其關ヲ逸ノ崩泄スルナリ故テ芫菁ヲ
 用ヒテ其麻痺セル諸管神經ヲ衝動シ其廢弛セル
 運營ヲ増發シテ小便分泌ノ常調ニ復セシムルナ
 リ此猶腎膀胱ノ麻痺ヲ發スル小便閉ヲ治スルト
 同シ此症ハ左ノ方良驗アリ

芫菁越果失爾

芫菁 未半多

越粟失爾赫篤立 一北 綠藝條

右調和シ浸ス_レ兩三日。瀝過シ十五滴ヨリ三十滴
ニテ服スル_レ日兩三次或ハ初十滴宛日兩次用ヒ
爾後二十滴宛用ヒ終ニ三十滴ニ至ル扁挑乳或ハ
亞刺比亞越謨漿 亞刺比亞越 謨ノ條ニ出ヲ兼用_レ尤良

小便失禁 此症亦芫菁ヲ用ヒテ間奇効アリ是レ膀胱

頭ノ括閉筋麻痺不遂ノ括約ヲ失_レヨリ發スル
故ニ是ヲ用ヒテ効アル_レ前條ノ症ト同シ○一男
子小便失禁ヲ患ヒ經年愈エス幾那ヲ服シ芫菁膏

ヲ薦骨ニ貼メ發泡シ或ハ冷水ニ浴メ皆寸効ナシ

終ニ芫菁_ヲ幾去爾_上ニ_出ヲ内服セシメ又其_ヲ幾去

爾二錢。硃砂精一錢。亞麻油少許ヲ研和シ患者ノ會

陰ニ塗擦メ全愈セリ

非此病ハ諸筋及ヒ神經虧損メ官能ヲ失_レヨリ發

スル故ニ芫菁ヲ用ヒテ其衰弊セル運營ヲ憤起_{ハタラシ}逞

發セシムル_レ尤肝要トス。凡ハ侵刺衝動メ細管纖

維ニ鑽透穿入スル_レ芫菁ニ若ク者ナキ故ニ古人

多ク是ニ發泡膏ヲ外敷メ良驗ヲ稱ス。晚近漸ク内

服劑トシ其性功ヲ擴充發明メ沈痾痼疾ヲ救_フ一

甚々多シ。此即チ前ニ説ク小便閉。尿崩。小便失禁ヲ
治スルト同シ。一男子痲ヲ患フ。芫菁^{ライキタル}丁幾^{タル}去爾^{タル}白
硝砂精ヲ加テ内服セシメ。又是ヲ項窩。脊椎及ビ頑
痺ノ關節ニ擦メ平復ス。一人頑固ノ脚痲ヲ患フ。每
日芫菁^{ライキタル}丁幾^{タル}去爾^{タル}十滴宛。錦葵花ノ浸劑ニ點服スル
一七日。其後二十滴宛前法ノ如ク用ヒ。又扁挑乳及
ビ龍腦ノ丸藥ヲ兼用メ尿道ノ刺戟ヲ防キ二月ニ
メ回復ス。一婦人痲痺^{タル}出^{タル}心^{タル}痛^{タル}ノ患ヲ患フ。其
痛^{タル}疫^{タル}效^{タル}頑^{タル}痰^{タル}芫菁^{タル}ハ脉絡纖維ヲ刺戟メ其運動ヲ增
發シ膠固頑結ノ諸液ヲ驅逐スル故ニ痛^{タル}疫^{タル}效^{タル}及ビ

肺氣管咽喉ニ膠痰凝聚壅盛セル症ニ間大効アリ
經閉婦人體質薄弱ニ萎黃病及ビ粘液質ノ諸病
ニ罹リ經閉ヲ患ル者ハ是ヲ用ヒテ膠粘稠固ノ汚
液ヲ稀釋メ回復スル者多シ
遷延神經熱腐敗熱芫菁^{ライキタル}丁幾^{タル}去爾^{タル}ニ民埵^{ミシデ}列^レ利^リ精^リ鹿
角精雜腹蘭龍腦ヲ適宜ニ加ヘ神經熱腐敗熱ニ用
ヒテ大効ヲ得ルコトアリ此熱病險重ニ至レバ視聽
嗅味ノ神經麻痺ノ作用ヲ失ヒ精神亦錯誤スル故
ニ是ヲ用ヒテ其神經及ビ元運生氣ノ運營沈垂怠
慢ナルヲ衝動揮發シ血液ヲ活潑健運セシメテ治

スルナリ。是ヲ外敷メ亦効多ク。然對症ニ使ハズ。亦
 狂犬咬傷 芫菁ハ犬咬傷ノ要藥トス。是ヲ用ヒテ小
 便ヲ利スルノ三ナラズ。發汗ノ其毒ヲ解ス。芫菁末
 ヲ丸トシ。或ハ丁幾去爾トシ。用テ良。○左ノ方殊ニ
 治驗多シ。

咬傷消毒丸

芫菁 末 一匁
 甘汞 一匁半

龍腦 十匁
 右研和シ。亞刺比亞。越謨漿ヲ加テ丸トシ。每夜一服

トス。又規吉撒兒弗ヲ以テ。毎日其創ニ塗ルベシ。効
 驗尤モ的實ニ。再發スル日ナシ。病治メ後。半年許ハ
 右ノ丸藥ヲ用フベシ。○咬傷毒ニ因テ狂躁等ノ危
 症ヲ發スル者ハ。左ノ丸藥奇効アリ。

咬傷解毒丸

芫菁 末 六匁
 桂 末 十二匁
 沙糖 半錢

右研和シ。玫瑰蜜適宜ニ加テ。三十丸トス。五丸ニ芫
 菁一匁ヲ含メリ。大人ハ一時。毎三六丸ヲ服ス。一歳

ノ兒ハ一時毎ニ一丸四歳ハ二丸七歳ハ四丸宛服
ス又芫菁發泡膏ヲ其創ニ貼シ患者ヲメ數温湯ニ
浴セシメテ尤良

癩芫菁ヲシキテ幾去爾ヲ癩ニ用ヒテ間大効ヲ得タル經

驗說甚ダ多シ是レ腎ニ於テ分泌スル小便モ皮表

ニ發越スル汗及ビ蒸氣モ固ヨリ一種ノ液ナレバ

此利尿ノ馱藥ヲ用ヒテ皮表ニ浸淫セル毒液ヲ小

便ニ驅逐シ一ニハ其頑疑牢著セル惡液ヲ稀釋焔

解ノ諸竅ニ排泄スルニ因ル凡ソ經久頑滯ノ皮

病ハ表部ニ運輸セル左イニ重訂内科撰要第 粘稠ニ

酷厲毒ヲ來ホニ因ル故特ニ癩ノミナラズ總テ

險重惡厲ノ諸藥効ナキ瘡瘍ヲ治スルノ効驗甚

々多シ○芫菁ハ一種ノ烈キ酷厲毒ナレバ誤用ノ

害ヲ致ス尙亦少カラズ故ニ精良ノ醫家病性ヲ察

シ體質ヲ審察シ戒慎四ノ服量ヲ些少ニシ用ルニ非

レ父百中大効ヲ得難シト知ルベシ依福依

發泡硬膏ヲアエンクヲストカトリムシテル蘭

製法 芫菁細末 黃蠟各八分

松香各四分

遠西名物考 卷十二

諸膏 各四勺

家猪脂 三勺

右臘松香滿猪脂ヲ文火ニ上セ烱化シ次ニ芫菁末

ヲ加ヘ火ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス

又法 芫菁 細末

家猪脂 各四勺

黃蠟 各一勺

松香 各一勺

右煉和ノ硬膏トス

發泡軟膏

製法 越没里膏

芫菁 極細末

右膏ヲ火ニ上セ烱化シ芫菁末ヲ加ヘ煉和ス

又法 拔實栗膏

芫菁 一錢

右調和ス

或ハ芫菁末ヲ家猪脂或ハ適宜ノ軟膏ニ和シ貼

シ或ハ芫菁末ヲ醋ニ和シ是ヲ攤タル硬膏ト上ニ

敷テ貼スルモ亦ヨク發泡ス

スニハ羌菁^{チンキョウ}下幾^{シカ}去爾^ル出^ツツ外敷^シ或ハ羌菁末^ヲ阿利^オ襪^イ油^フニ研和^シ塗^テ良^シ○此軟膏ハ上^ノ硬膏ニ比スレバ泡^ヲ發^スル^ヲ速^ナリ故ニ多^ク是^ヲ用^フ

發泡部位項窩顛顛身後肩胛ノ間股腓脚等ナリ但是ニ拘ラズ其症ニ隨ヒ各處ニ貼ス齒痛背痛手足痛ノ如キハ直ニ其患部ニ貼スル等ナリ唯神經多クメ知覺ノ敏ナル部ヲ避^ルル^ニ本^マクハ^ハ敷^クハ^ス

發泡試効是ヲ貼スレバ其處水泡ヲ發シ是ヨリ一切内部ニ鬱蓄スル病毒惡液ヲ外泄シ速ニ其部ノ疼痛等ヲ治ス故ニ總テ急迫ナル諸症ニ捷効アリ

但皮中ノ神經ヲ侵刺衝動ノ運動ヲ増發スル故ニ疼痛ヲ治スル効ヨリハ其部ノ壅塞ヲ開通シ其毒ヲ疏散スル功尤^モ居^ホ多^シ○此膏ハ痛風流走痛等ノ諸痛ノニナラズ内藏ノ痲衝或ハ痙攣ノ諸症或ハ瘡瘍内攻ノ發スル諸症ニ貼^テ其内鬱ノ毒ヲ外部ニ引泄ス但患人壯實ニハ刺絡スベキ者ヨリハ虛弱ニ屬スル症ニ尤^モ効アリ是レ羌菁ノ侵刺衝動ノ性力以テ諸器血液ノ弛弱怠慢ナルヲ憤起醒覺ノ其毒ヲ排泄セシムレバナリ故ニ神經血脉ノ弛弱ニメ運營怠慢ナル者ホト逾^リ功多^シ○咽喉焮腫

ハ頭或ハ項窩ニ貼ノ泡水出レバ其劇痛忽チ解散
 ス劇キ齒痛ハ其外部ニ發泡ノ捷効アリ○痛風傷
 冷毒痛。流走痛。荏苒タル關節痛。肩背腰腕脚等ノ
 焮熱ナキ痛ハ患部ニ發泡ノ其毒ヲ泄シ治ス○内
 部ハ焮衝ハ其外部ニ發泡ノ効アリ然レ先ツ焮衝
 ノ治法ヲ施メ其劇盛大ル諸症ヲ減スベシ焮衝劇
 クノ稽留スレバ膿ヲ成シテ危篤ニ至レバナリ。胸
 脇焮衝。肺焮衝等ハ刺絡スルコト一兩次ニメ其焮衝
 ノ血ヲ減シ次ニ胸脇ノ疼處或ハ其近傍ニ發泡ス
 レバ更ニ病毒ヲ疏解シ分利セシメ且其疼ヲ消散

ス患人衰弱セル者ハ殊ニ良○胸脇痛ハ表部ニ在
 ル者按ノ痛ハ者ハ其疼處ニ發泡ノ速ニ治ス○頑固ノ
 疝痛或ハ疝痛ノ腸焮衝トナラシムコトヲ恐ル症或ハ
 既ニ焮衝ヲ兼ル者或ハ赤痢ノ痛劇キ者ハ皆其疼
 處ニ發泡ノ解散ス○傷冷毒ハ眼耳痛。齒痛。頭痛ハ
 項窩。耳後。顛顛等ニ施メ良○焮腫眼ハ項窩或ハ
 顛顛ニ發泡ノ速効アリ但預メ尺澤ニ刺絡メ患部
 ニ攻衝スル血ヲ瀉メ尤モ良。傷冷毒。流走痛ヨリ起ル
 焮腫眼モ是ニ同シ○焮腫眼ノ淚多キ症モ亦顛顛
 或ハ耳後ニ發泡ノ効アリ麻疹後此症多シ○傷冷

表西各物考 卷十二 風雲堂藏

毒ノ炊腫眼及ビ齟齒痛ハ其發泡ヲ膿潰セシメテ
 久ク汚液ヲ漏泄スルヲ肝要トス如此症ハ發泡硬
 膏ヲ貼メ良○黑障眼兩形眼ハ是ヲ額ニ貼シ膿
 眼ニハ項窩ニ貼メ効アリ○惡厲ノ疥癬癩乾癬浸
 淫瘡疥瘡或ハ頑固ノ頭瘡雁瘡等ハ患部ニ發泡メ
 惡液ヲ泄シ若クハ膿ヲ成テ其毒ヲ泄シ或ハ其内攻
 セルハ速ニ再發メ鬱毒ヲ驅泄ス○熱病人斑疹及
 ビ痘瘡ハ適宜ノ部ニ發泡スレバヨク其瘡ヲ透發
 ノ潜伏セシメズ或ハ其陷没内攻スルヲ發越セシ
 ム○痘瘡ノ初發臂腓或ハ背ニ發泡メ痘毒ヲ肢體

下部ニ疏導シ頭面ニ多ク發セザラズ或ハ眼目
 ニ傳染スルヲ避ケ或ハ咽喉ニ侵襲メ呼吸不利飲
 食嚥下シ難キ等ノ患無ラシム○痘兒虛弱ニ見
 點スレバ快發起脹セス或ハ行漿メ善膿ヲ釀セズ
 苦悶譫語不寐或ハ痘乾枯メ内陷スル等ハ發泡メ
 ヨク其毒ヲ誘發シ諸惡症ヲ治ス○凡ハ頭腦及至
 内藏諸器ニ酷厲毒アリテ諸惡症ヲ發スル者皆四
 肢背脊等適宜ノ部ニ發泡シ其毒ヲ外泄メ間大効
 アリ○潰瘍ヲ作り或ハ打膿法ヲ施メ内部ノ毒ヲ
 表發シ或ハ種痘ヲ爲スニモ亦此膏ヲ用フ○芫菁

ハ諸器血液ノ運營怠慢之弱ナレバ刺戟衝動ノ警
 發省覺セシムルガ故ニ遷延緩慢ノ熱病即チ神經
 熱。心藏ノ運動微弱脈微ニ患者虛煩呻吟耳聾。小
 便黪澹色等ノ症ニ是ヲ頭部項窩ニ貼シ或ハ部位
 ニ拘ラズ發泡ノ大効アリ○惡性熱。腐敗熱ノ患者
 虛憊ノ精神沈倦昏曠或ハ脈沈微ニ四肢厥冷セ
 ル者ニ發泡ノヨク其精カヲ挽回ス○諸病ニ虛熱
 ヲ兼子。精力虛乏。精神朦昧或ハ昏睡様ノ症アルニ
 是ヲ貼メ効アル丁神經ヲ強壯ニスル諸藥ノ如シ
 ○卒倒昏睡ハ是ヲ項窩ニ貼シ大ニ發泡ノ省復ス

但粘液質ノ患者ニ尤驗アリ痲ニモ亦良効アリ然
 凡其痲痺ノ部ニ循行スル神經ノ原本ヲ考索メ發
 泡スベシ○或ハ發泡膏ニ堪ザル者或ハ遍ク痲痺
 ノ部ニ施スベキ者或ハ稍侵刺メ小泡ヲ發セシメ
 シト欲スル症ハ莞菁ランキヲル去爾前ニヲ布巾ニ蘸ヒメメ
 廣ク痲不遂ノ部ニ貼シ縛帶ヲ施セバ其部悉ク小
 泡ヲ發ス是ニ硃砂精ヲ加レバヨク鑽透シテ其効
 尤速ナリ○痲痺ノ部ニ發泡メ効アリ是レ其内鬱
 ノ病毒惡液ヲ引泄シ一ニハ刺戟衝動ノ功力ヲ以
 テ痲痺ノ運動ヲ變化メ消散スレバナリ故ニ癰症

或ハ瘰癧性ノ效嗽喘急或ハ瘰癧瘰癧ヨリ起ル經久ノ胸
腹痛及ヒ嘔吐ヲ治ス○小便失禁ニハ薦骨ノ部ニ
發泡ノ驗アリ○傷冷毒ノ經久ノ效嗽ニハ胛間ニ
發泡ノ捷功アリ○狂犬咬傷ハ其創ニ芫菁末ヲ摻
シ縛帶ヲ施シ潰爛ノ愈ルヲ無ラシメ宛モ化膿藥
ノ如クシ其毒ヲ引泄ノ内攻セズ惡症ヲ發セガラ
シム○水腫ノ水皮下ニ充滿スル症ハ肢脚ニ發泡
ノ其水ヲ泄シ効ヲ得ルコトアリ○諸器纖維ノ運營
衰弱ナル水腫ハ是ヲ施メ衝動健運ニ小便ヲ利ス
或云是ヲ水腫ニ貼スレバ其部潰爛ノ壞疽トナル

ト。然レ凡皆必ズ然ルニ非ズ。唯患者老年或ハ元運氣
虛脱ニ其腫經久ニメ停水既ニ腐敗スル者ニ是ヲ
貼スルハ間壞疽トナルコトアリ非ズ。然レ其

戒慎此膏ヲ貼スレバ特ニ泡ヲ發スルノミナラズ

皮中ノ喻收管ヨリ其酷厲毒ヲ吸收メ血中ニ運輸
シ一種ノ焮衝ヲ發ス故ニ多ク貼スレバ發熱苦煩
口中燥渴小便焮痛ヲ發シ或ハ其瘡遍ク皮上ニ浸
淫滋蔓シ焮痛潰爛ニ堪ガ正者アリ故ニ是レヲ施
スニ戒慎ヲ加フベシ

防護發泡ノ其部大ニ焮腫ヲ發シ或ハ小便淋痛尿

血等ヲ發スル片ハ緩和ノ効アル飲液ヲ多ク與フ
 へシ假令ハ乳汁或ハ扁桃乳或ハ扁桃乳ニ龍腦少
 許ヲ加へ用片或ハ遏爾託亞根々煎汁ヲ頻ニ服シ
 或ハ阿利襪油或ハ扁桃油二三匙宛服又皆捷効ア
 リ○芫菁ノ酷厲毒ヲ抑制スルガ爲ニ通例此膏ニ
 羯布羅ヲ加フ然レ是ヲ以テ却テ泡ヲ發スルヲ速
 〔ニ〕甚シク且焮腫スルモ亦甚ク然レバ是レ發
 泡ヲ扶ル者ニ抑制スル者ニ非ズ故ニ感觸ノ甚
 シキ人ハ阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ技爾撒謨亭露
 ヲ是レニ加フベシ共ニ鎮痛ノ良効アリ或ハ其部

ニ絨布ヲ置キ其上ニ此膏ヲ貼スベシ○然レ此膏
 ヲ貼シ或ハ芫菁ヲ内服スルニ就テ内部ノ焮衝ヲ
 抑制シ且解散スルニハ龍腦ヲ内服シ或ハ龍腦ヲ
 果仁乳扁桃乳等乳汁等ニ加へ用フベシ此毒ヲ解
 スルノ良藥トス

貼膏法 是ヲ貼スルニ法ノ如クナラザレハ特ニ効
 ナキノミナラズ或ハ害アリ故ニ審ニ左ノ所説ニ
 從ヒ施スベシ○發泡セント欲スル部ハヨク其膚
 上ノ脂垢ヲ拭ヒ去リ毛髮アル處ハ剃リ又醋ヲ塗
 リ布片ニテ摩擦シ微赤色トナルニ至テ是ヲ貼シ

其一倍モ大ナル蓋膏 ヨク膠著スル適宜ノ膏ヲ擇ビ用フベシ ヲ其上
ニ貼メヨク牢著セシメ又巾ニ醋ヲ撒ケ貼メ縛帶
ヲ施シ少シモ移動セシムルヲ勿ルベシ但是レヲ
緊禁メ發泡ノ起脹ヲ妨ルヲ勿レ速ニ發泡セシメ
シ自欲セバ布片ヲ温メテ敷其上ニ蓋フベシ○其
膏ノ大小ハ患者ノ資稟感觸ノ銳鈍老少症ノ緩急
部位ノ濶狹屈伸スル部ノ遠近ニ隨フベシ○此膏
ヲ貼メ後大人ハ五六時小兒ハ二三時許ニメ其處
稍膨起シ泡ヲ發ス輕症ハ其泡膜ヲ去ラズ唯刺破
メ水ヲ泄スベシ是ニ由テ痛ヲ發スルヲナシ但侵

蝕シテ膿潰セシメ長ク愈ルヲ勿ラシムベキ者ハ
鉸刀ニテ悉ク其泡膜ヲ截去リ緩和ノ軟膏ヲ貼ス
ベシ或ハ長ク其水ヲ流泄セシムルニハ泡膜ヲ去
ルヲナク緩和ノ軟膏ニ芫菁ノ末以テ許加ヘ若クハ
發泡軟膏ヲ加ヘテ其瘡ニ貼スベシ或ハ左ニ舉ル
緩和ノ化膿膏ヲ貼シ連綿刺戟ノ愈ルヲ勿ラシム
也

排毒化膿膏

○發芫菁 末 適宜ニ發シ其藥得盡ク米ハ又發軟膏
右水ニ浸シ溶化シ是ニ油ト蠟ヲ適宜ニ加ヘ徐々

ニ煎熬ノ軟膏ト為ス
 ○發泡後。五六月ヲ經テ其瘡稍乾ク者ハ又發泡膏
 少許ヲ貼スベシ ○屈伸運轉スル部ノ傍ニ貼ノ牽
 痛ニ堪ヘズ速ニ愈ン^トヲ欲シ或ハ數日は貼ス
 ルニ因テ瘡中頑肉ヲ生メ汚液ノ排泄ヲ妨ル者ハ
 緩和ノ軟膏越ノ里ヲ貼メ其痛ヲ甘ク膿ヲ釀メ頑
 肉ヲ除クベシ或ハ乾愈ノ膏藥微的撒爾ヲ貼スル
 モ良 ○或ハ發泡セシメズ稍侵刺スル人ニテ其
 部ニ鬱聚セル毒ヲ疏散スルガ爲ニ貼スルニハ緩
 和人軟膏前ニ註スニ發泡膏ヲ加ヘ貼シ或ハ前ニ記ス

化膿膏ヲ貼スベシ ○痛風傷冷毒痛ニ發泡メ出ル
 液ハ其性甚タ酷厲ナリ腐敗液アル人ニ貼メ出ル
 液ハ血ヲ交ル^トアリ ○惡液多キ人或ハ麻痺ノ部
 ニ發泡スレバ動モスレバ其瘡寒壞疽トナル^トア
 リ

疾 疾 疾 疾
 依 依 湯 湯

此藥之功用其效甚速凡患此症者服之立見其效
 少許之藥其效如此○在伸運轉之九部ノ傍ニ貼ル
 痛ニ著ルハ此ニ貼ルニ最モ速ク其效ヲ見ル
 因ニ此藥ノ功効ニ其効速ク其効大ニ其効大ニ
 天發熱スルハ此ニ貼ルニ最モ速ク其効ヲ見ル
 熱血血大交北見マレ○惡熱之ヲ入込ハ極熱ノ時
 熱ハ其効甚ク其効大ニ其効大ニ其効大ニ其効大ニ
 此藥之功用其効甚速凡患此症者服之立見其效

不

覆盆舍利別

覆盆子絞汁セイロフラス。リッダス。イダウス。セイロ
フ。ハン。ア。ラム。ベ。シ。ン。又。ロ。ン。子。ベ。シ。ン。蘭
濃過シ静定ノ底在ヲ
去ル者 十六多

製法

覆盆子絞汁

砂糖

淨白者 二比半

右合和シ磁鍋ニ入レ慢火ニ上セ煮テ舍利別ノ稠

ト爲シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

主治 收斂清涼ノ滋潤シ壯熱病。膽液熱。煩渴眩暈ヲ

治シ壯熱病ノ下利赤痢及ビ口中咽喉ノ焮腫等ニ

良驗ヲ奏シ又健胃強心ノ効アリ總テ栗斃子舍利

別ト功同シ

亞拔 伍四

蒲里阿尼亞フリアニア

羅ロチニスチニスアルバアルバ羅ロ

ウアルデウアルデカールドカールド又又ウツテウツテカールドカールド蘭蘭

〔形狀〕是レ一種蔓草ノ根ニソ黑白ノ二種アリ○其

白キ者ハ春月蔓莖叢生シ細硬多節粗糙ニソ速ニ

蔓延シ卷鬚アルル葡萄蔓ノ如ク能ク傍木垣籬ニ

絡フ葉葡萄葉ニ似テ小ク帶白色粗糙毛茸アリ夏

月葉間ニ筒様單瓣五出ノ小白花簇生ノ穂ノ如シ

一心蕊雌花三鬚蕊雄花アリ形チ常春藤花ノ如シ萼亦

筒様五义秋間小圓子攢簇スル小ナル葡萄ノ如

ク或ハ櫻子ノ如シ或ハ二子雙生スル者アリ初メ

綠色熟スレバ赤色黒色トナル内ニ許多ノ小核アリ

不

リ卵圓或ハ稀ニ核ヲ爲ス黄色ノ汁充テ味辛其氣

嘔スベシ根太ク腕ノ如ク外面灰白裏白ク或ハ黄

色ヲ帶ビ柔ニソ蘿蔔ノ如ク白ク乳汁ノ如キ液充

ツ是ヲ横斷シ切片ト爲セバ輪紋アリテ正中ヨリ

外邊ニ旋面ス味辛苦澁舌ニ刺戟シ嘔スベキ臭氣

アリ乾ケバ其氣味差減ス冬月莖枯レバ唯葉落ル

ノニ全草不佳ノ氣アリ○其黒キ者ハ莖赤色ヲ帶

ビ卷鬚ナシ鬚アリ然レモヨク傍木ニ絡フ葉缺裂ナ

ク旋花葉ノ如シ光澤アリ子熟テハ黒色深紅内

ニ四五核アリ根外面黒色或ハ栗殼色裏ハ黄色ニ

ノ黄揚ノ如シ其餘總テ前種ト同シ冬月莖葉枯レ
春苗宿根ヨリ生ス○一種葉三出牽牛葉ノ如キア

○按立此草和漢産未ク詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

主治根白キ者多ク藥用トス黑キ者ハ効稍劣レリ

○根性熱燥辛苦侵蝕鑽透ス油氣鹽氣及ビ粘液多

シ。生鮮ノ者ハ液多ク且臭氣有テ効尤峻ナリ。乾ケ
ル者モ多ク用フ○此物粘稠液ヲ疏釋シ留飲停水
ヲ大便ヨリ瀉下シ且血中ニ入テ細管ノ閉塞ヲ鑽

開ニ敗液ヲ驅逐メ小便ヲ利スル峻藥トス故ニ水

腫。粘液腫ヲ治スルニ多用ス○水腫及ビ水氣粘液

胸中ニ滯著メ喘息欬呼吸不利ノ症此生根搗

碎キ一弓ヲ取り葡萄酒ニ比ニ淹スヒタ十二時ニメ

滓ヲ去リ一時毎ニ一匙ヲ與レバ小便利メ速ニ治

ス○肝。脾。腸開膜等ニ粘液壅塞スルヲ疏泄シ痛風

脚痛等ノ惡液ヲ滌除シ或ハ發狂癩癰等ノ腦中粘

稠液過多ナルヨリ起ル症ニ尤驗アリ是ニ香竄ノ

藥ヲ加テ殊ニ良○寒性粘液質ノ經閉ヲ通スルニ

甚ダ驗アリ又生胎死胎ヲ下シ蛇蟲ヲ殺ス○此藥

ハ性峻ニノ胃ヲ刺戟スル故ニ桂。丁香。酒石鹽等ヲ
 加ヘ胃ヲ健運シテ更ニ良○末ハ半錢ヨリ一錢マ
 デ一服トス。水煎ニハ四錢ヲ用ヒ。葡萄酒ニ淹スニ
 ハ二錢ヲ用フ○生根ヲ採リ薑擦子ニテ擦リ温メ
 テ腹部ニ貼スレバ停水ヲ瀉下ス或ハ生根ヲ搗キ
 煮テ毳布トシ或ハ醋ヲ加テ搗キ或ハ煮テ膏トシ
 或ハ阿利襪油ヲ加ヘ煮テ外敷メ痛風脚痛ヲ消シ
 療癰堅硬腫及ヒ打撲青斑ヲ治シ皮肉間ノ凝血ヲ
 散シ疥癬惡厲諸瘡。經久潰爛侵蝕瘡。瘦瘡ヲ治シ竹
 木刺ヲ抜ク

物伍依
 叔裝淑

府利蘭

豆蔻花ノ義 本邦藥舖亦花肉豆蔻ト呼バ

是ハ肉豆蔻ノ外皮ノ下。裏皮ノ上ニ纏フ中皮ナリ

○肉豆蔻ニ三皮アリ外皮ハ柔滑ニメ緑。胡桃或ハ

扁桃ノ如ク肉様ニメ厚桃ノ如ク稍硬久裏面淡白

酸澁ノ汁アリ。初淡緑。熟スレバ桃ノ如キ紅色ヲ帶

ビ且黃ト紫ノ斑ヲ生シ自ラ坼裂スルヲ胡桃皮ノ

如クニメ中皮即チ府利見ニ。裏皮ハ直ニ核ヲ被ヒ

薄フノ榛子皮ノ如ク硬固赭赤。破レ易シ其核即チ

肉豆蔻ナリ○府利ハ形チ薄片ノ細條。羅紋ノ如ク

枝極ノ錯綜スルガ如クニ裏皮ニ纏ヒ其質水棉ノ如ク膜ノ如ク柔ニメ粘潤アリ。樹ニアリ此皮ハ血紅色ナリ採リ乾セバ赤黄色或云帶上ナリ氣味拔爾撒謨ノ如ク芳烈香竄。肉豆蔻ニ勝レリ○上品ハ其片條太ク鮮美赤黄色。形十全クノ碎折セズ其碎小ニメ赭色或ハ淡黄ナルハ下品トス是レ未熟ナルヲ採リ或ハ久ク經テ性味脱スル者ナリ○肉豆蔻ヨク熟メ皮自ラ坼裂スレバ土人府利ヲ採テ曝乾シ鹽水少許ヲ濕シ貯フ其燥テ油氣脱スルヲ防グナリ

主治 府利肉豆蔻共ニ性温辛微苦芳香ナリ肉豆蔻

ニ比スレバ收滿ノ効少クノ揮發鹽及ビ精微竄透ノ油氣多ク性功尤勝レリ肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ更ニ峻効アリ○府利モ亦搾油蒸餾油ヲ製ス是ヲオレウムマシスト名ク肉豆蔻油ニ比スレバ清稀ニメ揮發精微ナリ○府利油ハ性熱ノ虛冷ヲ温メ胃ヲ健ニシ風氣ヲ驅リ蟲ヲ殺シ失氣眩冒卒倒頭痛寒疝痛齒痛ヲ治シ外敷ノ痲及ビ脚痛風等ニ奇効アリ然レ貴價ナル故ニ多クハ肉豆蔻搾油ヲ代用ス○服量四滴ヨリ六滴マデ冰糖ニ和シ適

