

遠西醫方名

考

馬

卷十三

松  
野  
別

✕  
e13



富士川文庫  
3308

遠西醫方名物考標目

卷十三

〔巴〕 琥珀 琥珀油

〔天〕 琥珀 琥珀油

哥攝尼爾

昆答刺越兒發根

格墨因

越謨安沒尼亞幾

格碌波尼亞

昆設爾弗

琥珀鹽 再餽琥珀油

琥珀越仙扶亞

薩那調經丸

越謨安石丸

格密訥膏

格兒弗

遠西名物考

卷十三

標目

風雲堂藏

re 13

499.2  
Em. 4  
5

No. 1900

榛齋宇田川先生著

五篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌





遠西醫方名物考卷十三

香竄阿芙蓉液 舍電發謨阿芙蓉液ト同  
 昆勿苦蝨屋亞爾結爾 私結爾弗同  
 護烏刺兒度水 羅獨成篤爾  
 固性消石 消石條  
 固性硃砂 硃砂條  
 天 的里亞加 的里亞加水  
 底電愈創水 底電愈創水  
 若把兒麻膏 若傑禮需謨  
 若傑禮需謨 蘇甘沒扭  
 的里亞加精 的里亞加精  
 格碌屈斯未爾扶斯 格碌屈斯未爾扶斯  
 皓礬水 皓礬水  
 蘇甘沒扭 蘇甘沒扭  
 蘇甘沒扭 蘇甘沒扭

己

遠西醫方名物考卷十三

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕菴校補

琥珀 ソクシニシム 又 カラヘ 羅 バル シ ステ 蘭 ニ  
 琥珀ハ白色或ハ黄色 拘櫟皮色 鮮美透亮ナルヲ上  
 品トシ醫藥ニ供ス。黄赤色ハ者ハ是ニ次ク赭色灰  
 色ナルハ下品トス。土質多クノ藥用トセズ。○黄色  
 ナルハ油氣多シ。油ヲ取ルニ用テ。白色ナルハ油氣  
 少クノ揮發鹽多シ。鹽ヲ取ルニ用テ。○此物通例小  
 塊多シ。一塊ノ量一比。或ハ長九寸餘

遠西醫方名物考卷十三

潤七寸六分餘。厚五寸餘。秤量九斗餘。及七十塊  
 二十七北アルヲ見ル日アリ  
 産地 海産山産陸産ノ三種アリ海産珠ニ多クノ上  
 品トス ○海産ハ窩オ所ス德海北歐洲羅巴洲ニ産シ潮波  
 ニテ多ク亭漏ソ生イ洲歐國羅名巴ノ海濱ニ簸揚シ或ハ土入  
 其海岸ニ漂漾スルヲ見テ速ニ是ヲ採ル否ラサレ  
 バ風波ニテ復漂散ス。上品ハ多ク此濱ニテ採リ百  
 兒西亞都兒格支那共洲亞國細名亞等ニ輸スト云或ハ思  
 可祭亞蘇亦齊弟那瑪爾加共洲歐國羅名巴止白里洲亞國名亞  
 入海濱ニモ多ク簸揚ス ○窩オ所ス德海ニ産スル琥

珀中ニ灰色ニ木ニ如キ小扁塊著ク者アリ是ヲ  
 燒ケバ樹脂ノ氣アリ通紅トナレバ滅キザルヲ木炭  
 ノ如シ是琥珀ノ軟ナル片木片粘著メ化スル者ナ  
 リ或ハ甲介木片。樹皮。海草等膠著シ或ハ木葉形ヲ  
 印識スル者アリ ○山産陸産ハ亭漏ソ生イ波ホ墨ノ楞レ西シ齊シ  
 里亞蘇亦齊蘭半鐸古共洲歐國羅名巴等ノ海ニ遠キ山ニ  
 琥珀坑多シ或ハ福撈察洲歐國羅名巴洲地方ニ巖窟ノ間ヨ  
 リ出ル者アリ或ハ地ヲ掘テ十五丈許ニメ巖石ニ  
 著ク者アリ又亭漏ソ生イノ海邊ノ地ニ於テ琥珀坑多  
 シ其在所ハ一種樹皮様ノ土アリテ墳起シ宛七樹

皮其堆積セルガ如シ其上面ノ土ハ乾テ灰様ナリ  
其下ハ軟ニノ黑色ノ毘黠密那註後ニナリ其下ニ一  
襲木片ノ如キ者アリ然レ其質ハ木ニ非ズメ但薄  
片ハ層襲セル者ナリ是ヲ密涅刺爾木ト名ケ密涅刺爾  
金石類又琥珀母ト名ク此下ハ必ズ琥珀アル  
ハナリ。琥珀アル地ハ此物ノミナラズ石砮及ヒ石  
膽質ハ礦類多シ或ハ思ス可祭亞蘇亦齊弟那瑪爾加  
止白里上ニ出ツ海邊ノ湖澤淡水中或ハ沙地或ハ粘土  
或ハ毘黠密那質入土或ハ石膽明礬氣アル朽木多  
キ土或ハ鐵礦様ノ土中ニ生スト云○山産ノ琥珀

ハ多ク下品ニメ土氣多ク重濁黯楮ニメ透亮ナラ  
ズ。是ヲ蒸餾スルニ揮發鹽少ク總テ海産ノ如キ上  
品ナシ。然レ水用ニ固ヤシクハ  
**質琥珀ノ質ハ一種ノ毘黠密那ナリ**  
毘黠密那ハ石腦油石炭膏風  
等ノ土中ノ華爾斯ノ總稱ナリ。一ニアルドトキト  
名ク土中ノ華爾斯ノ義ナリ。又一ニアルドトハルスト名  
ク土中ノ華爾斯ノ義ナリ。故ニ是ヲ摩擦シ或ハ研末シ或ハ燒  
ケバ毘黠密那ノ氣ヲ發ス。火ニ投スレハ溶化シ燃モ  
テ其質消散ス○琥珀ハ初メ流動ノ油ノ如ク或ハ  
軟クメ脂膏ノ如シ。土中ノ鹽氣ト石膽質ノ蒸氣ニ  
因テ漸ク凝固ス。若シ其軟ナル片粘著スル物アレ

バ又此ニ其液流レ被ヒ或ハ片塊粘著ノ遂ニ凝固  
ス故ニ水粘土石膽松樅等ノ葉實枝皮蘆苔穀粒或  
ハ蜚蛾蜂蟻蜘蛛蟲蝨等種ノ物象琥珀ニ含容ノ  
透見スル者アリ其土中ノ華爾斯流動シ凝固ノ字  
漏生等ノ海岸及ビ海底ヨリ出ル者即チ其海産ナ  
リ○凡ソ其山坑ニ出ル者ハ海産ニ比スレバ柔ナ  
リ或ハ軟ニノ捏漏スベキ者アリ故ニ新ニ掘取ル  
者ハ暫ク海水ニ浸シ堅固ナラシムト云或ハ海邊  
ノ小河湖池陂頭ニモ琥珀ノ軟ナル者ト堅キ者ト  
アリ其軟ナル者時ヲ經レバ漸ク凝固ス或ハ石ニ

化スレ者アリ○古人以爲琥珀ハ白楊松樅等ノ樹  
脂漸ク土中ニ入リ深クノ字漏生等ノ海中ニ流溢  
シ鹽氣ニテ凝固スル者ナリト晚近ノ究理家ハ此  
説ヲ排セリ○或云琥珀ハ素樹脂ナリ太古洪水等  
ニテ地面陷没ノ大洋トナリ幾多ノ樹林海底ニ朽  
腐シ其脂遂ニ琥珀トナル故ニ蜚蛾蜘蛛等ヲ包容  
シ或ハ木葉形ヲ印識シ或ハ木屑樹皮等膠著シ或  
ハ蘆小枝等ノ周圍ニ著テ凝固シ琥珀ニ孔ヲ貫ク  
者アリト物理小識云天西言洪水時亞爾墨尼亞爲  
甚猛雨四旬地面全没止遺諾危數人考其  
時當帝嚳之八年壬辰云○林娜私名云琥珀ハ諸華爾斯ノ及ビ

アイルド。ハルス羅甸名アムペルテス年ヲ經テ海ニ  
入り潮水ニテ凝固ス。故ニ蟲類ヲ包容スト。是レ即チ  
樹脂ヲ以テ體ヲ爲シ。久ク土中ニ在テ昆黥密那質  
ノ油ヲ含之。又海ニ在テ鹽氣ヲ受テ凝固シ成ル者  
トスルナリ。  
性琥珀ヲ蒸餾スレバ初ニ微酸味ノ稀液出ヅ。次ニ  
帶黄色ノ油ニ揮發鹽交リ出ヅ。此鹽ヲ綠礬精ニ加  
ルニ沸騰セズ。是レ酸性鹽ノ微ナリ。硃砂精若クハ酒  
石液ニ加レバ泡起ノ沸騰ス。是亦酸性鹽ノ微ナリ。  
然レバ琥珀ハ昆黥密那質ノ稠脂精微稀薄ノ油樣液。

酸性ノ揮發鹽。硫黃精樣ノ液。自然ニ混和シ成ル者  
ナリ。○琥珀ハ亞兒加利鹽液酒石鹽剝鳥亞斯石灰  
ヲ草木類ノ酸汁醋或ハ消石精海鹽精ニ浸メ溶化  
セズ。石膽油ニ浸セバ溶化メ紫色トナル。燒酒ニハ  
溶化シ難クメ唯微赤色トナル。然レ此未ニ亞兒加  
利鹽剝鳥亞斯ヲ研和メ亞爾箇兒銳烈ノニ浸セバ  
溶化メ丁幾去爾トナル。或ハ此未ヲ香竈ノ蒸餾油  
ニ浸セバ。或ハ此未ヲ香竈ノ蒸餾油  
ニ加ヘ硝子壘ニ入レ時々振蕩スレバ  
漸ク溶化ス。或ハ此未ニ的列底那或ハ技爾撒謨  
格洋霍一倍量ヲ加ヘ硝子壘ニ内レ固封シ慢火ニ

上<sub>レ</sub>徐<sub>ク</sub>ニ煮<sub>テ</sub>八日許。其未盡ク溶化ノ赤色トナル。右ノ如クニメ老利兒油ニテ煮<sub>レ</sub>バ紫赤色トナル。阿利襪油。胡桃油ニテ煮<sub>レ</sub>バ美赤色トナル。罌粟子油ニテ煮<sub>レ</sub>バ黄色トナルナリ。扁桃油。亞麻油ニテ煮<sub>レ</sub>バ黄色トナルナリ。

**主治** 琥珀ニ含ム所ノ油氣鹽氣ヲ以テ小便ヲ利シ。經閉ヲ通ス。○傷冷毒等ノ酷厲ナル<sub>レ</sub> 沕<sub>レ</sub> 重訂内科撰要第二十章ニテ和解ノ排泄ス。○搗掣痙攣ノ諸症或ハ昏睡。眩冒。癩。子宮病。脾病ニ効アリ。是<sub>レ</sub>毘黠密那質ノ竄透揮發ノ油鹽ヲ以テ腦。神經ヲ開達スレバナリ。

又收斂ノ効アリテ下利多尿。遺精。淋疾。白帶下。吐血ヲ治ス。○末トシ飲液ニ點服シ或ハ雞子黃ニ和シ或ハ丸藥トシ用ヒ或ハ薰藥トス。○服量一月ヨリ一錢ニ至ル。○末トシ摻ケ皮膚疥裂小創ヲ乾愈ス。

**製法** 琥珀 極細末 二比  
 琥珀 淘洗シ乾淨スル者  
 琥珀ノ三分一

右拌合シ頸潤キ硝子ノ列篤兒多ノ半ニ充シ沙



火ニ入レ潤大ノ承餾壘ヲ接シ膠泥ニテ其接際ヲ固封ノ必モ透漏セザラシメ。初メ文火トシ漸ク火ヲ増シ列篤兒多ノ底熾紅トナルニ至テ火ヲ下シ初ハ酸味ノ精液ニ清稀ノ油浮エ且揮發鹽交リ出ツ。次ニ黄色ノ稠油ニ鹽交リ出ヅ。初ニ出ル油ハ揮發香竄ナリ。終ニ稠濁承餾壘ヲ放テバ其内ニ液。油。楮黑惡臭ノ油出ヅ。承餾壘ヲ放テバ其内ニ液。油。鹽。相混シ又列篤兒多ノ頸ニモ鹽升リ著ク。此鹽ヲ取リ承餾壘ノ液ニ加ヘ又是ニ沸湯ヲ加ヘ攪滾メ其鹽ヲ溶解シ悉契瓦刺斯<sup>出部</sup>ヲ以テ先ヅ其液ニ雜ル油ヲ分チ取リ其油ニ沸湯ヲ加ヘ洗淨メ又其油ヲ分チ取ル。前法ノ如クシ是ヲ硝子壘ニ收メ

貯フ。其洗ヒタル液ヲ承餾壘ノ液ニ合シ濕シタル紙ニテ是ヲ漚シ其液ヲ文火ニ上セテ水氣ヲ減シ放冷メ芒ヲ結ハシム。其芒ヲ取リ沸湯ニ溶シ火ニ上セ速ニ煮テ水氣ヲ減シ漚テ復火ニ上セ。水氣ヲ減メ放冷シ芒ヲ結ハシム。其芒ヲ取テ紙上ニ排ベ乾シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ。是レ琥珀ノ揮發鹽ナリ。右ノ如ク數結芒スルニ因テ油氣盡ク消シ純粹トナルナリ。<sup>枝</sup>○白琥珀一匕ヨリ揮發鹽四錢出ツ。黃琥珀一匕ヨリ揮發鹽一錢出ヅ。○黃琥珀一匕ヨリ油八弓許。精液二弓半許出ヅ。列篤兒多ノ底ニ

黒キ渣脚ニ多ク許殘ル。其質ハ鐵氣ヲ含メル硝子性土ナリ。

**琥珀鹽主治** 油氣ヲ含メル鹽ハ承留壘中ニ在テ未ダ結芒セシメズ油

氣ヲ含ム揮發竄透ノ神經ノ諸症ヲ治ス即チ痙攣

搐掣ヲ鎮メ子宮衝逆頭痛等ヲ治シ汗ヲ發シ殊ニ

ヨク小便ヲ利シ月經ヲ通ス○其結芒シタル鹽ハ

モツ純ラ酸性ニメ清涼ノ効アリ。殆ト枸櫞汁或ハ酒石

英ト同シ故ニ鎮痙發汗利尿ノ効必シ其効ハ唯油

氣ヲ含メル鹽ニ在ルノ云。故ニ此結芒鹽ヲ用ル

稀ナリ○多分ノ琥珀ヲ以テ些ス少ノ鹽ヲ得ル故ニ

是ヲ偽造シ販ク者アリ是ヲ驗辨スル法。其鹽ヲ頸

長キ硝子壘ニ入レ火ニ上セ火候差沸湯ノ熱ヲ過

ルニ至レバ眞品ハ盡ク升化メ雪ノ如ク。其底ニ留

ル者ナシ偽物ハ皆壘底ニ殘リテ升化スルコトナシ

○初留ノ琥珀油ハ臭氣アリテ稠濁ナルユエニ左

ノ法ヲ以テ再ビ蒸留メ土氣及ビ亞兒加利鹽夫去

レバ鮮美清稀ニメ水ノ如ク且佳香アリ藥用ニ供

メ尤良○此油ハ香竄ノ蒸留油或ハ的列並底那及

ビ拔爾撒謨ト混和シ易シ此說前ノ琥珀發烟消石

精ヲ加レバ大ニ熱ス。銳烈ノ燒酒ニハ混和セズ。是

皆草木類ノ油ト異ナル徴ニ其性殆ト石腦油ト同シ

再餾琥珀油

ゲソイフルデバルンステインオリイ蘭

琥珀油適宜

蒸餾水 琥珀油ノ六倍

右合和シ硝子ノ列篤兒多ニ入レ承餾壘ヲ屬シ其接際ヲ塗封シ沙鍋ニ入レ文火ニテ蒸餾メ其水ノ二分ノ二ヲ取り放冷メ其油ヲ分チ取り硝子壘ニ入レ固封シ貯ス後

琥珀油 主治 再餾ノ油ハ甚ダ精微ニ揮發竄透シ

且ハ拔爾撒謨ノ質アリテ凝結ヲ疏散シ稍衝動シ疼痛ヲ止ム。神經ノ閉塞ヲ衝開シ峻効アル鎮痙藥トス。故ニ子宮衝逆。痛ノ諸症ヲ治シ汗ヲ發シ小便ヲ利スルニ良驗アリ。○血液ノ運行ヲ増進シ粘液ノ

閉塞ヲ疏通シ以テ諸竅ノ壅滯ヲ開達ス。殊ニ經閉ニ驗アリ。○鎮痙解疑ノ功力ヲ以テ喘急。卒厥。眩暈。頭痛。精神沈重等ノ頭腦神經病ニ効多シ。○微毒去テ後荏苒トノ歇ヤサル淋疾白帶下及ビ小便閉ヲ治シ催生シ死胎ヲ下ス。○服量六滴ヨリ三十滴マテ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服シ或ハ雞子黃ニ

和シ用フ○外敷ノ卒厥麻痺不遂肢節強硬癱急或ハ痿弱或ハ寒性ノ痛風傷冷毒等一切神經。臍ノ諸症ニ効アリ是ヲ患處ニ擦ス。或ハ脊推ニ塗テ癩瘻ヲ治ス○此油ニ蒸餾醋少許ヲ加ヘ蒸餾スレバ烈キ香氣ヲ嫌フ患者モ惡ムコナク用ヒ易シ

琥珀アムキ丁幾テタル去爾アレンキタルシクシニシムシム羅ル蘭ラン

**製法** 琥珀細末一多 ○血氣ノ凝滞ヲ去ルニ効アリ

燒酒三十二度者八多

右硝子燻ニ入レ固封シ爐邊煖處ニ置テ十日ニテ滲過シ其液ヲ取り固封シ貯フ

**又法**

琥珀細末適宜

**又法**

亞的兒アデル綠礬油ノ條ニ出

右琥珀ヲ硝子燻ニ入レ亞的兒ヲ加ヘ琥珀ヲ溶化セシム○前方ノ如キ燒酒ノミニテハ琥珀盡ク溶化セズ此方ハ琥珀ヨク溶化スル故ニ尤効多シ癩瘻ノ諸症及ビ後ノ主治ニ舉ル神經病ニ殊効アリ

十滴ヨリ一茶匙マデ葡萄酒ニ點服シ或ハ鎮痙劑ノ飲液ニ加ヘ用フ

**又法**

琥珀細末一多

剥篤亞斯ポットアス精製者四錢

右研和シ格兒弗ニ入レ燒酒ヲ加テ其藥料ノ三四指橫徑ノ上ニ至リ固封シ煖處ニ置キ赤色トナルニ至テ瀝過シ其液ヲ取り用フ○或ハ酒石液四錢ヲ以テ劑中ノ剥蔦亞斯ニ代ヘ浸ス丁十二時ニ瀝シ用フ○或ハ琥珀ノ末四弓ヲ取リ酒石液ヲ撒ケ濕シ乾カシ硝子壘ニ入レ燒酒ニ比テ加ヘ浸シ赤色トナルニ至テ其液ヲ瀝シ用ルモ亦良

**主治** 痙攣搐掣。卒厥。癩。疝。脾病。子宮衝逆等ノ諸神經病及ビ虛弱ニ屬スル經閉。遺精。白帶下ヲ治シ痛風。傷冷毒ノ寒粘液ヲ驅除シ小便ヲ利ス○服量二十

滴ヨリ半錢許飲液ニ加ヘ用フ○此丁幾去爾ニ揮發香竄精ニ出部少許ヲ加テ硝子壘ニ入レ煖處ニ置テ泡熟セシム。是ヲ壯神丁幾去爾ト名ク。卒厥。失氣。昏冒。子宮衝逆。心悸怔忡。傷冷毒痛。非不遂經閉等ニ奇効アリ服量十五滴ヨリ一錢マデ茶湯。葡萄酒其他適宜ノ飲液ニ加ヘ用フ○頭蓋ノ骨縫ニ擦ノ傷冷毒ノ頭痛ヲ治ス鼻中。顛顛。心窩ニ塗テ失氣昏眩心動悸ヲ治ス。臍部ニ塗テ子宮衝逆ヲ治ス

琥珀越仙扶亞 琥珀丁幾去爾ト同シ

叔伍侯  
叔伍侯

哥攝尼爾ゴッシ子ルラ又ゴッシニルラ羅

哥攝尼爾ゴッシ小蟲ナリ生活セル者ハ蟻虱ニ似テ圓

或ハ楮圓大サ翹搖ノ如シ新伊イスパニア把パ尼亞ニア北亞墨利北亞墨利加洲國名

就中墨ノキ是シ可コ上上ニ産スル霸王樹ニ生ス此樹ノ花及

實ノ汁殷紅ナリ者ハ葉端ニ生ス蜜果ノ大ナル

四時常緑皮ニ刺アリ頂ニ臍アリ是ニ刺多シ味收

斂ス殷紅ノ汁アリ核多シ細小ニノ大サ胡荽子ノ

如シ此蟲其汁ヲ吮テ長育ス是ヲ破テ深紅ナル片取

テ籃ニ入レ水ニ浸シ殺ノ乾スナリ形扁ク三四稜

アル粒ヲ爲シ外面銀色或ハ淡白ニノ白粉ヲ摻ケ

タル如シ裏ハ深紅ナリ或云水ニ浸シ殺ノ暴乾ス

ル者ハ外面褐色ナリ焙リ乾ス者ハ焦黑色ナリ然

レ裏ハ皆美紅ノ粉充ツ○此物重實ニノ輕虚ナラ

ズ淨潔ニノ目ク乾キ銀白色ニノ光澤アリ破レバ

殷紅ナルヲ上品トス或云上品ハ黯紫色横紋アリ

白粉ヲ摻ケタル如シ是ヲ研末スレバ美紅色ナリ

○按ニ此物和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

ル

研フベシ

**主治** 強心發汗利尿ノ効ヲ稱ス然レテ醫藥ニ用ル

稀ニノ多クハ猩々絨等ノ美紅ノ染料ニ用フ○此

藥一月ヲ赤葡萄酒ニ加ヘ服メ小便閉ヲ治シ或ハ

胎動ヲ鎮メ墮胎ヲ護スルニ用フ（叔）（核）

昆コシ答タ刺ラ越エ兒ル發ハ根ハ羅ラテイゲンギフト。多ルトル蘭ラン

〔形狀〕是ハ字露ドリク。新伊イ斯ス把バ尼ニ亞ア墨メ是キ可コ。等ニ産スル蔓

草ノ根ナリ初メ數葉生ノ地ニ塌シ葉ノ末凹ニソ

馬蹄ノ狀ノ如シ或云半多長二三指横徑。濶一二指横

徑。綠色。背淡白且黯色ノ筋脉及ヒ黄點アリ。短梗ニ

著ク。其後葉間ニ圓莖ヲ抽キ是ニ亦葉生シ卷鬚ア

リテ高ク傍木ニ糾フ。花ハ洞庭藍ニ似テ小。花後粟

殼色ノ圓子ヲ結ビ黑色ノ仁アリ根太サ小指ノ如

ク塊節皺積ヲ爲シ長鬚多シ。外皮褐楮或ハ黄楮色。

裏淡白是ヲ嚼ニ初メ收濡シ漸ク滲透ノ微苦辛。微

佳香アリ○一種葉楮圓ニメ末微尖リ地ニ布テ坐

ヲ爲シ爾後葉間ニ蔓ヲ抽テ太一指許是ニ葉ナク

ノ花生スル者アリ○根新鮮。肥實。多鬚。佳香。葯味ア

ルヲ擇ニ鬚根ヲ除キ用フベシ

○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

フベシ〔依〕云白薇根ハ香竄ニメ衝動シ利尿。發汗。

通經ノ効アリ性功顯草及ヒ昆答刺越兒發根ノ

如シ〔叔〕〔伍〕〔物〕云山柰根或ハ白薇根ヲ以テ此藥ニ

代用スト。若シ闕ルニ遇バ代用スベシ。○榕按ニ  
 白薇ハ江戸ノ花戸、クサタチバナト呼ブ。其根味  
 苦辛微香氣アリ。或ハ白薇ノ一種。徐長卿。花戸ニ  
 柳葉細辛ト呼フ者根味苦辛微甘。香氣アリ。俱ニ  
 代用ノ可ナリ。

**主治**性温。精微ノ油氣鹽氣アリ。腦心胃ヲ強壯ニシ  
 血液運行ノ怠慢凝滯ヲ健輸シ。專ラ病毒ヲ汗ヨリ  
 發泄シ。又小便ヨリ除ク。○纖維ノ弛弱ヲ收固シ。腐  
 敗ヲ遏ム。故ニ惡性熱。發斑熱。神經熱。疫痢。間歇熱。肢  
 節痛等ニ用ヒ。其毒ヲ汗ヨリ發散メ。治ス。然レ是皆

温壯メ發汗ヲ要スル症。或ハ熱病ノ腐敗毒アリテ  
 血液ノ焔解スベキ症ニ的當トス。○寒粘液アリテ  
 食進マザルヲ治ス。○下利赤痢。虛症ニ用ヒテ殊効  
 アリ。○痲瘰。瘡癰等ノ腦神經ニ關ル諸症ヲ療シ。蛇  
 蟲ヲ殺シ。又蝮蛇咬毒ヲ解スルニ尤効アリ。○水煎  
 或ハ泡劑。或ハ末トシ。每服半錢ヨリ一錢。マデ。毎日  
 數次用フ。 **裴叔伍** **裴叔伍**

格墨因 蘭

キニニム

**形狀**此草。莖葉花實。大抵苗香ノ如ク。ニノ葉短ク一



尺アルハ稀ナリ。葉小ク。兩對シ枝頭ニ重瓣ノ小白

花或云織ヲ爲ス。其子大葛縷子ニ倍シ茴香ノ如シ

灰色或、緑黄色ニノ條理アリ。味辛、香氣強クノ不佳

ナリ。春月種ヲ下シ生ス是レ葛縷ノ一種ナリ。黒地

兀皮亞厄日多共ニ亞弗利等ノ熱國ニ産ス

○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

フベシ度云性功茴香ノ如シト。茴香或ハ葛縷子

ヲ代用メ可ナリ

**主治**子。性温。葛縷子ト同シ破氣驅風ノ要藥トス又

粘稠ヲ稀シ凝結ヲ解キ急迫ヲ緩メ堅硬ヲ軟ク故

ニ風氣痞滯拘攣痛。胸痛。疝痛ヲ治シ或ハ欬嗽喘急

等。肺ノ諸症ヲ甘ケ粘痰ヲ疏シ小便ヲ利シ淋疾痛

ヲ除キ月經及ビ産後惡露ヲ下ス○水煎或ハ泡湯

或ハ末トシ一錢許ヲ服ス○大麥粉ヲ加ヘ琶布ト

シ腫瘍ニ貼シ消散シ或ハ膿熟ス或ハ咽喉腫ニ漱

藥トシ効アリ伍叔裴

格墨因油ホレウムキニウム羅

**製法**子ヲ蒸餾ス。薄荷油及ビ茴香油製法ト同シ

**主治**痞氣鬱滯ヲ散シ欬嗽喘急。疝痛。脾病。淋疾等凡

ハ格墨因子ハ主治ニ舉ル諸症ニ捷効アリ○服量

ハ格墨因子ハ主治ニ舉ル諸症ニ捷効アリ○服量

ハ格墨因子ハ主治ニ舉ル諸症ニ捷効アリ○服量

五滴ヨリ十滴マデ飲液ニ點服ス（疾）  
格密訥膏（エム） プラスト（キ） ス（ノ） 蘭（テ） 若把兒麻膏（イ） 各一比

製法

若把兒麻膏 各一比  
阿利襪油 半比  
格墨因子 末一比

右膏蠟油ヲ合メ文火ニ上セ溶化シ火ヲ下シ格墨

因子ノ末ヲ煉和シ冷ルマデ攪セ膏ト爲ス（我）

主治 外敷メ堅硬ヲ軟ゲ凝結ヲ解キ胸脇痛肢節痛。

痛風脚痛ヲ散シ腫瘍ヲ膿熟シ或ハ消散ス（疾）

薤（ゴ） 安沒（アン） 尼亞（ニ） 幾（キ） 蘭（ラン） ギムエ。アムモニアキム（羅）

是ハ亞弗利加洲ノ地方ニ産スルアムモニアキム

ト名ル樹ヲ鑽刻メ取ル薤（ゴ） 華爾斯（ハ） ナリ（爾） 薤（ゴ） 華（ハ） 爾斯（ス） トノ

兩實アルヲ云故ニ此脂ハ水醋。其樹。形狀未ダ詳ナ

ラズ○此脂乾固柔脆ニメ汚物ヲ雜ヘズ淨潔ノ碎

塊宛モ顆粒ノ如ク捻レバ破碎セズ柔ニメ粘著ス。

新鮮ナルハ黄色ニメ白色ヲ帶ブ。經久ノ者ハ赭色

ヲ帶ブ。或云皆乳白色臭氣蒜ノ如ク或ハ葛私多儂

謨或ハ瓦爾拔奴謨ノ如シ是ヲ嚼片ハ白色トナル。

味初メ甘ク漸ク苦辛。此物白色ノ質多ク雜リ。脆ク  
温氣ニテ軟ニナリ易ク。其味舌ニ滲透シ火ニ投シ  
燃テ白色トナルヲ上品トス子仁木屑沙土等ヲ雜  
ヘテ塊ヲ爲ス者ハ下品ニメ藥用トセズ

○按ニ此脂和漢産未詳ナラズ舶來ヲ用フベシ  
主治 性温收瀉。油氣鹽氣アリ諸、ゴムハル趨謨華爾斯中ニテ  
此物尤凝結ヲ疏散スルノ効ヲ稱シ稍刺戟衝動ノ  
粘稠ヲ稀釋シ堅硬ヲ軟化ス○肝。脾。腸間膜等ノ壅  
塞硬腫ヲ融解疏散スル要藥トス子宮衝逆或ハ經  
閉ヲ兼ル症ニ尤効アリ○膠粘液ヲ疏解シ驅逐ノ

經閉ヲ治ス但血脉諸管ノ運營怠慢ニノ血液凝滯  
シ。痙攣ニ因ラス多血ナラザル經閉ニ効アリ。此症  
ハ鐵粉。盧會。沒藥。阿魏ヲ加テ丸藥トシ用ヒテ尤良  
又左ノ方殊効アリ

薩毘那調經丸

薩毘那調經丸 各二錢  
薩毘那油 十二滴  
右散劑トシ三氏ヲ一丸トシ五丸宛用ル一日四次

○此護謨ハ脾病。依剥昆垤兒。子宮衝逆或ハ黃疸。荏  
 苒タル間歇熱。白帶下。或ハ粘液ヨリ起ル頑固ノ疝  
 痛等。下劑驅風劑ヲ用ヒテ効ナキ症或ハ喘息等ノ  
 胸病。總テ頑滯ノ病ニ効アリ。此皆粘液ノ壅塞ヲ疏  
 解シ腹部諸器脉管ノ弛弱ヲ強健スルヲ標的トシ  
 用フ又右ノ諸病ニ左ノ方尤驗アリ

護謨安石丸

護謨安沒尼亞幾

石鹼 加搦祭亞

蒲公英越幾斯劑

各等分

右調勻汁三氏ヲ一丸トシ五丸宛用ルノ日四次○  
 此護謨ヲ漱藥ニ加レバヨク痰ヲ吐セシム○多ク  
 用レバ瀉下ス○外敷ノ稍刺戟衝動ニ疏散シ或ハ  
 軟化ス故ニ諸腫瘍頑硬腫ヲ消散シ或ハ軟化ノ膿  
 ヲ成スニ尤効アリ關節ノ頑硬腫水棉樣腫水腫經  
 久ハ膝臏水腫或ハ關節拘強ノ初發或ハ腺腫瘰癧  
 罌丸硬腫痛風結腫或ハ瘤ノ初起ニ施メ消散ス或  
 ハ潰瘍ノ腐敗液ヲ排ヒ膿ヲ釀ス或ハ癬樣ノ穢液  
 多キ浸淫瘡ニ効アリ但炊衝ヲ兼ル腫瘍ハ効ナシ  
 總テ寒性ノ腫ニ施スベシ○是ヲ醋ニ溶シ貼メヨ

腫瘍ヲ消ス或ハ醋若クハ葡萄酒ヲ加ヘ煮テ  
 布ト草ニ塗テ貼シ或ハ海葱醋ニ溶シ貼メ殊ニ  
 効アリ葡萄酒或ハ海葱醋ニ溶シ膏藥トシ貼メ 症  
 或ハ微毒丸腫ノ水腫或ハ頑硬腫瘰癧ノ經久ナラザル  
 等ニ貼メ消散ス○此脂ヲ蒸餾メ精及ビ油ヲ取ル  
 其精ハ失苟兒陪苦ヲ治シ閉塞ヲ開達シ卒厥ヲ蘇  
 復スルニ十滴ヨリ二十滴ヲ用フ油ハ肝脾ノ硬腫  
 并消シ子宮衝逆ヲ治ス物依布福遇  
 用ニ悉不ス○叔固襲按  
 格碌波尼亞コロホウニア 羅ア スス キキ ゲゲ ルル ハハ ルル スス 又又 ゲゲ ウウ 子子 ハハ ルル スス 蘭  
 是ニ二種アリ第一種ハ的列竝底那ヲ水ニ煮テ凝

固セシメ乾カシ破碎スベク爲ス者ナリ。上品ハ黃  
 色淨潔透亮ニノ是ヲ日ニ映ズレバ赤色ノ塊片透  
 見ス○第二種ハ的列竝底那ヲ蒸餾メ油ヲ取リ其  
 壘底ニ殘リタル渣脚ナリ乾脆黑色光澤アリテ滿  
 ノ如シ然レハ滿ニ比スレバ固クノ淨潔ナリ是ヲ下  
 品トス  
**主治** 性收瀋ス第一種ハ凝結ヲ疏解スルニ効ヲ稱  
 シ汚液ヲ淨刷シ創瘍ヲ乾愈シ膏藥トシ外敷ス○  
 是レ的列竝底那ノ良質ヲ存メ酷厲刺戟ノ性ヲ脱  
 ス。是ニ燒酒ヲ和スレバ殊ニ解凝ノ効多シ。或ハ丸

藥トシ用ヒテ無毒ノ淋疾及ビ遺精ヲ治ス○膝臏ノ寒性白色ナル腫ヲ消散スルニ此末ヲ布片ニ摻ケ一指横徑ノ厚ト爲シ是ニ再留セル燒酒ヲ濕シ患部ニ貼ス乾ケバ數燒酒ヲ濕メ良。是レ能ク華爾斯ヲ溶化シ滲透セシムレバナリ○潰瘍ノ汚液多ク流泄シ細絡纖維弛緩膨腫ノ乾愈シ難ク或ハ水棉様肉ヲ生ノ愈ザル症ニ此末ヲ摻スレバ乾テ愈ユ○第二種ハ凝結ヲ解散シ膿ヲ成スニ多ク硬膏或ハ軟膏トシ貼ス然レ第一種ニ比スレバ効稍劣レリ或松香ニ水ヲ加ヘ數煮テ  
是ヲ製スル者アリト云  
〔四〕  
〔五〕

昆設爾弗蘭

コンセルハ

是ハ藥品ヲ剉ニ或ハ細末トシ或ハ生鮮ノ品ハ搗爛シ其量ノ一倍或ハ二三倍ノ沙糖若クハ蜜ヲ調和スル劑ノ總稱ナリ。根ノ汁多キ者ハ剉テ磁罐ニ入レ重湯ニノ煮テ軟ニシ搗テ糊ノ如ク適宜ニ沙糖ヲ和ス或ハ果實ノ瓢肉仁等ハ搗テ篩過シ沙糖ヲ和シ製ス。尚其藥品ニ隨テ製法及ビ沙糖ノ分量差異同アリ各品本條ニ就テ詳ニ記ス  
〔六〕  
〔七〕

格兒弗 「ギユルビタ」 羅 「セイプ」 蘭 「ハット」

是ハ一種ノ蒸餾壺ナリ陶硝子錫銅等ニテ造ル其形下腹圓潤ニノ上頸窄ク長シ或ハ頸短キアリ是ニ硝子或ハ銅ノ塊ヲ益オホフ塊ニ長嘴アリテ承餾壺又接續ス露水精油等ヲ蒸餾スルニ用フ

味ハ水漬ハ酸味ナシ味ハ甘味ハ酸味ナシ  
融其量ハ一節取ハ二三節ハ必熱味ハハ酸味  
長ハ藥品性ニ依テ味ハ酸味ハ主親ハ品ニ依  
長ハ藥品性ニ依テ味ハ酸味ハ主親ハ品ニ依

天

的里亞加 「エレクチュアリウム」 テバ 「バイキ」 ム 「ロ」 ハ 「ン」 ハ 「ン」 サ 「プ」 蘭

製法 桂

主藥 乾姜 各細末 二弓  
入列美 纈草根 細末 三弓  
精製者 三錢 葡萄酒 九錢ニ浸シ溶ス者  
煮テ沫ヲ去ル者 一比

右阿芙蓉ヲ蜜ニ研和シ次ニ餘藥ヲ加ヘ煉和ス  
此劑一錢ニ阿芙蓉一瓜ヲ含メリ 往古多ク稱シ  
用所ノテリアカアンドロマキッス 是種ナリアンド

ロマキッス 其他の里亞加方一ナラズト雖モ皆多味  
 冗長ニメ主能的知シ難ク且功力相反スル品類ヲ  
 配合スル故ニ性味相抑制ノ効績ヲ逞シ難シ故ニ  
 漸ク勿擲祭亞其他諸國ニ於テ刺長無益ノ藥品ヲ  
 除キ簡約ニメ良効アル劑ト爲ス即チ**按**ニ載ル所  
 ノ阿芙蓉昆設爾弗是ナリ此方即チ右ニ舉ル  
 主治劑中阿芙蓉アルヲ以テ一切疼痛ヲ止メ不寐  
 煩躁等ノ急迫ナル症ニ用權ニ患苦ヲ鎮テ安眠セ  
 シメ患者ノ精力ヲ保護ノ甚ク虚罷セガラシムル  
 ノ要藥トス○此劑ハ熱性香竄ノ諸品ト阿芙蓉ア

ルヲ以テ血液ノ運行ヲ増發シ汗ヲ發ス故ニ冒寒  
 傷冷毒ニ用テ汗ヲ發シ疼痛及欬嗽ヲ止ム熱湯ニ  
 テ送下シ温覆メ尤良○痙攣搐掣ヲ鎮メ虚痘ニ用  
 テ起脹セシメ膿ヲ醸ス○胃腸ノ病毒去テ後嘔吐  
 下利劇クメ休ガルニ用フ○惡性熱ニハ龍腦少許  
 ヲ加ヘ橙汁或ハ醋ニ溶化シ用テ良驗アリ○虚寒  
 ノ諸症及粘液質ノ入ニ効アリ此藥ハ阿芙蓉並ニ  
 辛熱ノ品多キ故ニ壯熱病、焮衝病等總テ壯實熱性  
 多血ノ諸病ニハ大ニ害アリ又虚羸ノ諸病及癆勞  
 效等ニ是ヲ過服セシムレバ神經ノ知覺運營ヲ鈍



患者ヲ衰弱セシメ遂ニ昏睡搦ヲ發ス○服量半錢ヨリ一錢半ニ至ル○外敷又諸獸毒螫刺咬ヲ治ス痢狗傷。蝮蛇咬。其他諸獸毒蟲ノ咬傷ハ先鹽水或醋ニ的里亞加ヲ溶メ患處ヲ洗或是ヲ棉撒絲ニ塗テ患處ニ貼シ硬膏ヲ蓋フベシ或的里亞加少許ヲ取テ醋一匙ニ溶シ内服セシメ技實里膏ニ赤降汞少許ヲ加テ其創ニ貼シ毎日更換スルヲ兩次半月許ハ創ヲ愈スヲナク膿潰セシメテ其毒ヲ排泄シ又時々的里亞加ヲ醋或葡萄酒ニ加テ内服セシメ臥床ニ温覆メ發汗シ其毒ヲ驅發メ殊ニ良

依  
疾

的里亞加水テリアカコムボシタ羅

**製法**

的里亞加テリアカハ三ハ三

没藥モクヤク上好者ニ

龍腦リウノウ四錢

燒酒シウキウ銳烈者ニ半

右調和シ格兒弗コウキョフニ内レ蒸餾ノ露水ヲ取ル

**主治** 一切疫熱。惡性熱。胸脇痛。發汗スベキ症ニ用。虛

痘ヲ透發シ酷厲液ヲ消シ酸敗液ヲ祛キ疔痛ヲ治

ス○服量二錢ヨリ四錢マデ適宜。飲液ニ點服ス

的里亞加精テリアカスヒリチウステリアカ羅

製法 的里亞加

生鮮者到 八多

一山奈

地榆葉

酒石鹽

酒石精

右調和

又法

的里亞加

雜腹蘭

三多

生鮮者到 八多

到 各一多

四錢

一比

露精ヲ取ル

二多

一多

血燒酒

右固封シ浸スヲ三日蒸餾ノ精ヲ取ル或ハ罐ノ堯

内ニ龍腦四錢ヲ懸テ蒸餾ス

又法 的里亞加 十多

沒藥 五多

雜腹蘭 一多

燒酒 四比

右浸スヲ數日ニ蒸餾シ精ヲ取り是ニ龍腦六錢

ヲ加ヘ溶化シ貯フ

主治 汗ヲ發シ心胃ヲ强健シ失氣昏冒ヲ復シ疫熱

悪性熱ヲ解ス （飯） 胃ニ弱キニ夫原谷胃ニ對シテ

底電愈創水 （ア） ア多クヒル子ヲリア。チデシ。底電ハ人名

醋 （四） 各三北

燒酒 （一） 各三北

綠礬精 （正） 十多

又去 沙糖 （北） 十多

一方。四味等分。○右硝子壘ニ内レ固封シ重湯ニメ  
藥氣ヲ出ス。八日。漚過シ固封シ貯フ。如ハ...

主治 血絡ヲ刺戟ノ收斂ス。輕キ創ニ外敷メ速ニ治

ス一切打撲傷。脉外泛溢ノ疑血ヲ消散シ又輕キ止  
血藥トス。或ハ諸、焮腫ノ初發ニ施メ消散シ或ハ神  
經損傷等外傷ニ良効アリ。布ニ浸シ外敷ス （底）

若把兒麻膏 （エ） エムプラストルム。デヤバルマ。又エム  
アラストコム。子羅。ゲイ子。コレイ

製法 阿利襪油 （ハ） ハン。ゴウドゲルト。蘭

密陀僧 （各） 各三北

家猪脂 （各） 各二北

水 （各） 各二北

右阿利襪油。密陀。家猪脂ヲ合シ文火ニ上セ煮テ時  
 ム水ヲ加ヘ手ヲ住メズ攪セ溶シ。煎熬ノ硬膏ノ稠  
 ト爲シ鉢ニ水ヲ盛リ其膏ヲ投シ水中ニ捏テ凝固  
 セシメ適意ノ形ト爲ス。○煎熬スル間ニ水減耗セ  
 バ多ク水ヲ加ヘ煮テ焦著セシムルヲ勿レ。

法

主治

外敷ノ清涼乾愈ノ良膏トス。歎熱腫痛ヲ清涼  
 シ酷厲毒ヲ消シ熱痛風ヲ治シ癩痕ヲ祛キ乾シテ  
 肌膚ヲ生ス。

遠西醫方名物考卷十三終

右内科滋油... 水ヲ加ヘ手ヲ柱メテ... 下島... 七... 水... 滋... 油... 水... 手... 柱... 七... 水... 滋... 油... 水... 手... 柱... 七... 水... 滋... 油...

遠西醫方名物考卷十三終

遠西醫方名物考卷十三終

卷十四

遠西醫方名物考卷十四... 滋... 油... 水... 手... 柱... 七... 水... 滋... 油... 水... 手... 柱... 七... 水... 滋... 油...

遠西醫方名物考標目

卷十四

的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>底<sup>ニ</sup>那<sup>ナ</sup>  
的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>底<sup>ニ</sup>那<sup>ナ</sup>  
的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>底<sup>ニ</sup>那<sup>ナ</sup>油<sup>ア</sup>  
的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>底<sup>ニ</sup>那<sup>ナ</sup>油<sup>ア</sup>

的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>吉<sup>キ</sup>利<sup>リ</sup>詞<sup>ス</sup>爹<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>  
的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>吉<sup>キ</sup>利<sup>リ</sup>詞<sup>ス</sup>爹<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>  
的<sup>テ</sup>列<sup>レ</sup>並<sup>ビ</sup>吉<sup>キ</sup>利<sup>リ</sup>詞<sup>ス</sup>爹<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>  
驅<sup>ル</sup>蟲<sup>ス</sup>吉<sup>キ</sup>利<sup>リ</sup>詞<sup>ス</sup>爹<sup>テ</sup>兒<sup>ル</sup>

鐵

鐵屑

鐵鑪製法

治<sup>ル</sup>僂<sup>ス</sup>散<sup>ル</sup>  
未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>  
未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>

越<sup>エ</sup>扶<sup>テ</sup>屋<sup>フ</sup>布<sup>ブ</sup>斯<sup>ス</sup>未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>  
越<sup>エ</sup>扶<sup>テ</sup>屋<sup>フ</sup>布<sup>ブ</sup>斯<sup>ス</sup>未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>  
越<sup>エ</sup>扶<sup>テ</sup>屋<sup>フ</sup>布<sup>ブ</sup>斯<sup>ス</sup>未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>  
格<sup>コ</sup>碌<sup>ロ</sup>屈<sup>ク</sup>私<sup>ス</sup>未<sup>レ</sup>爾<sup>ル</sup>扶<sup>テ</sup>亞<sup>ス</sup>栗<sup>ス</sup>斯<sup>ス</sup>

遠西醫方名物考標目

風雲堂藏

撒兒末爾扶斯

乾白撒兒末爾扶斯

升鐵鹽

收斂鐵液

鐵丁幾去爾

收斂鐵丁幾去爾

開達鐵丁幾去爾

末爾扶斯鎮痛液

卷十四

遠西醫方名物考卷十四

遠西醫方名物考卷十四

捺齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

的列竝底那羅

テイルペンテイン

的列竝底那ハ其質拔爾撒謨ノ如ク。焔解セル膠ノ

如ク。粘稠ニメ澄清透亮。辛苦烈香アル樹脂ナリ。是

ニ三種アリ ○第一種ハテレピン

ト名ク。是レ際波里西里亞

牛鐸古意太里亞

洲ノ諸國ニ産スル

小木ノ幹枝ヨリ自然ニ流溢シ或ハ是ヲ鑽刻ノ出  
 此華爾斯ナリ。此品透亮ニ又硝子ノ如ク軟ニ稠  
 蜜ノ如ク粘リ白色或ハ淡黃或ハ青白色味辛熱舌  
 ニ滲透シ自餘ノ二品ニ比スレバ尤佳香アリ。是ヲ  
 嚼或ハ手ニ觸テ粘著セザルヲ上品トス是レ真ノ  
 的列並底那ナリ。此品近來輸ス可少ク藥舖ニ貯ル  
 稀ナル故ニ多クハ第二種第三種ヲ用フ其樹ハ  
 皮及白色枝稀ニ長シ葉老利兒葉ニ似テ小ク尖  
 ラス差硬ク四時常緑苦櫪木葉ノ如ク羊齒様ニ  
 兩對シ末ニ一葉アリ。此樹雌雄アリ雄ハ花アリテ

實ヲ結バズ雌花ニ實ヲ結ブ。春月淡紫色ノ花生シ  
 瓣ナク但鬚蕊攢束ノ穗狀ヲ爲シ阿利襪樹ノ花ノ  
 如シ。花後楕圓ノ實ヲ生ス大サ杜松子ノ如ク硬  
 久初綠色。後赤色ヲ帶ブ。熟スレバ青綠色。是ニ觸レ  
 バ粘著ノ脂氣多シ。其壳中微長キ一二ノ核アリ。此  
 樹甚ダ脂多ク。木理堅實。榆錢樹ノ如シ。秋間枝葉ニ  
 淡紫ノ小膜囊生シ又枝梢ニ没食子ノ如キ贅瘤生  
 シ。漸ク長スレハ軟骨ノ角ノ如シ。其大ナルハ八指  
 横徑許ニシテ赤色ヲ帶ビ。中虛ニシテ粘脂液及ビ蚊ノ  
 如キ蟲アリ。此樹ニ稠厚ノ脂液列並底那多キ故ニ



軟モスレバ其脂。水理ニ壅塞シ其地中ヨリ汁ヲ樹  
 ヲ養フ所ノ津液流通スルヲ能ハズノ乾枯シ水理  
 圻裂スルヲアリ。然レ其幹ノ地ニ近キ處及ビ幹枝  
 ノ數處ヲ鑽刻スレバ脂液溢泄メ其樹蘇活ス。此猶  
 多血ノ人卒厥ヲ發スレバ刺絡ヲ施メ忽チ甦復ス  
 ルガ如シ。○第二種ハ勿搦祭亞ハ勿搦祭亞的列的列底那底那ト名ク。  
 往古勿搦祭亞ハ勿搦祭亞ノ歐羅巴洲ヨリ出レバナリ。今ハ落葉  
 松或ハ白樅ノ幹皮ノ節ヨリ自ラ流溢シ或ハ是ヲ  
 鑽刻メ出ル脂液ヲ用フ。上品ハ潔白透亮或ハ淡黃  
 ニメ枸櫞皮色ノ如ク。軟ニメ流動シ。蜜ノ如ク稠油

ノ如ク拔爾撒謨ハ拔爾撒謨ノ如ク示メ味辛苦氣味共ニ枸櫞  
 皮ノ如クニシ甚シ或云華爾斯質此品多ク藥用  
 トス。其樹楮爾勿婁亞ハ楮爾勿婁亞ノ牙ハ牙而白ハ牙而白ノ歐羅巴洲其他山地  
 ニ多ク生ス。樅ハ赤白ニ種アリ。白樅ハ幹喬直。材白  
 色。皮帶白。滑澤柔撓。枝上部ニ四敷シ。每節四枝。十字  
 様ヲ爲ス。葉扁細ニメ未尖リ。赤樅ニ比スレバ細ク。  
 淡綠色ニメ莖ノ周圍ニ著ク是ヲハ重或ハ莖ノ兩  
 側ニ櫛比スルアリ。實楮圍ニメ未尖リ。鱗片疊次シ  
 毎片ニ核著キ。薄膜アリテ蜂羽ノ如シ。脂氣多シ赤  
 樅ハ白樅ニ比スレバ樹皮暗楮。材帶赤。葉黯綠ハ

稍潤久。莖ノ兩側ニ櫛比ス。○第三種ハ尋常的列竝底那上名久。是モ亦樅樹ノ脂ヲ取リ製ス。稠濁ニテ白色或ハ赭色ヲ帶ブ。香味凡ニ佳ナラズ。但上品ハ澄清ニテ黄色ヲ帶ビ汚物ナシ。○或ハ經久稠粘ニテ用スベカラザル。的列竝底那<sup>テ</sup>的列竝底那<sup>テ</sup>的列竝底那<sup>テ</sup>銅綠少許ヲ加ヘ偽テ上品ト稱スル者アリ。此ハ的列竝底那油ノ烈香アルヲ以テ知ルベシ。○樅樹ヨリ<sup>テ</sup>的列竝底那<sup>テ</sup>取ルニハ夏月樅ノ脂液流溢スル時。其幹ノ皮ヲ少シ剥キ。樹下ノ地ニ穴ヲ穿テ置ク。其ハ脂液自ラ流レテ其穴ニ聚ル。是ヲ取リ汚物ヲ

去リ水ニテ洗淨シ毛篩ニテ漉過ス。是即チ尋常ノ的列竝底那ナリ。其篩ニ留ル渣ニ多ク水ヲ加ヘ蒸餾ノ油ヲ取ル。其罐底ノ渣ハ即チ尋常ノ華爾斯ナリ<sup>即チ格碌</sup>。又法。樅或ハ落葉松ノ脂ヲ取リ。多ク水ヲ加ヘ。文火ニテ煮ル。其ハ其烈香漸ク減メ凝結シ。冷レバ其脂。手ニ觸テ粘著セス。宛モ硝子ノ如ク破碎スベクナルナリ。○樅ノ脂ヲ以テ滿ク製ス。其法。樅ノ幹ヲ割テ木屑ト爲シ地ニ深キ坑ヲ穿テ。其底ニ磚ヲ敷キ。是ニ細孔ヲ穿テ。其下ニ陶壺ヲ置キ。木屑大其坑ニ積ミ。鍋或ハ瓦ヲ其上ニ蓋ヒ。其邊ニ煙

氣ヲ泄ス孔ヲ穿テ。木屑ヲ火ヲ點シ焚ク片ハ其脂  
 流レテ陶壺ニ下ル。是ヲ麥爾ト名ク。是ヲ文火ニ上  
 セ煎熬ノ凝固セシムル者即チ尋常ノ諸ナリ。其  
 ○按ニ的列並底那樹。和漢產未ダ詳ナラズ。或云  
 真ノ的列並底那ハ甚ダ稀ナル故ニ第二種ヲ藥  
 用トス。性功。落葉松脂ト同シ。國或云尋常ノ品ハ  
 落葉松脂ヲ以テ製ス。其効。真ノ的列並底那ト同  
 〇或云三種共ニ性功同シ。或ハ藥舖ノ品ハ  
 白樅及ヒ落葉松ノ華爾斯ナリ。然レバ落葉松  
 脂或ハ白樅ノ脂ヲ以テ製シ用スベシ。

**主治** 性熱。辛苦收斂ス。諸管纖維ヲ開達シ。粘稠ヲ稀  
 釋シ。未熟ノ諸液ヲ化釀シ。腐穢敗液ヲ淨除シ。疼痛  
 ヲ止ム。○此藥ハ侵蝕スベキ酷厲質ナク。其性拔爾  
 撒謨亭露及ヒ格洋霍ノ如シ。故ニ拔爾撒謨ニ代用  
 スベシ。○表發ノ蒸氣ヲ排泄シ。殊ニ小便ヲ利スル  
 ニ峻効アリ。○是ヲ服スレバ其香氣直ニ小便ニ出  
 ルヲ以テ尿道ノ諸症ニ捷効アルヲ知ルベシ。○痞  
 氣鬱塞ヲ散メ小便ヲ驅逐シ。腎。膀胱。尿道ノ諸器虛  
 弱ヨリ起ル小便閉。淋疾。漏精。白帶下。或ハ淋疾ノ毒  
 解メ後。淋瀝止マザル症ヲ治シ。經閉ヲ通ス。○攝護。

及ビ婦人陰器諸部ノ弛弱セルヨリ起ル諸症尿道ノ潰瘍等。少焮衝ノ諸症ナキ者ハ十氏ヨリ半錢マテ用ヒテ良効アリ。○腎膀胱ノ膿瘍腎痛殊ニ尿道ノ諸症ニ雞子黃或ハ蜜或ハ沙糖ニ和シ用ヒテ尤良。○胸中ノ腐敗液粘稠液ヲ淨刷シ痰ヲ化熟シ略キ易カラシム。○肢節痛腰髓痛流走痛風ニ用ヒテ驗多シ。○條蟲ヲ殺ス。○過服スレバ瀉下ス。○每服十滴ヨリ二十滴マデ用フ。雞子黃或ハ亞刺比亞護謨漿ニ研和シ用フ。○多血熱性ノ人或ハ體質感動シ易キ者或ハ焮衝壯熱アル諸症ハ害アリ。此藥熱

性ニノ衝動刺戟スレバナリ。○是ヲ阿利襪油ト蜜ニ研和シ耳中ニ滴メ耳孔ノ潰瘍ヲ治ス。○二三錢許吉利詞參兒ノ藥液ニ加ヘ施メ大便閉ヲ通ス。○下利劇ク且荏苒トメ休マズ殊ニ重墜努責ヲ兼ル症ハ左ノ吉利詞參兒ヲ施メ大効アリ。又痔痛甚キヲ治ス。

的列竝吉利詞參兒

的列竝底那 二錢

雞子黃 一個

的里亞加 三錢

乳汁 五子

右先ヅ的列並ヲ雞子黃ニ研和シ。次ニ餘藥ヲ調和シ水銃ヲ以テ直腸ニ灌入スル。一日一兩次。○的列並底那ハ創傷潰瘍ニ外敷ノ稍鑽透刺戟シ汚液ヲ洩シ。膿ヲ排ヒ。腐敗ヲ過メ。瘡瘍ヲ乾愈スルノ良藥トス。○外敷ノ纖維ヲ強固シ。肉ヲ生シ痂ヲ作シ。醜穢ノ癍痕ヲ消ス。故ニ愈創ノ拔爾撒謨トシ。一切虛弱ニノ愈難キ潰瘍癭瘡ヲ治シ。硬肉ヲ軟ラゲ。又惡厲ノ諸瘡。頭瘡疥癬類ヲ治シ。或ハ捫挫轉筋攣急ヲ弛メ。或ハ皮上ノ汚斑ヲ消シ。陰處ノ搔痒ヲ去リ。竹

木刺ヲ拔ク。是ヲ脂類或ハ雞子黃ニ和シ外敷スレバ腐壞ヲ過メ穢液ヲ除キ殊ニヨク創ヲ愈シ。硬腫ヲ軟ラゲ。膿ヲ釀ス。○鑽透メヨク凝結ヲ疏散ス。故ニ關節及ビ腱ノ腫瘍ニ擦テ驗多シ。○蒸溺劑ニ加ヘ施メ神經ヲ強壯シ前説ノ諸症ヲ治ス。○但、焮衝ヲ兼ル腫瘍或ハ瘡瘍ヲ乾愈メ其毒内攻スヘキ症ハ總テ此藥ヲ禁ス。或ハ皮膚ノ感觸甚キ人ニ外敷スレハ動モスレバ焮腫發泡スルアリ。製法の的列並底那油 一七

水 三七

右頸長久潤ニ列レ篤兒多トニ内レ蒸餾ノ油ヲ滴ス

又法テ的レ列レ竝レ底レ那ナヲ以テ硝子モシ若クハ磁製ノ列レ篤兒

多トノ三分ノ二ニ充シメ。大ナル承餾壘ヲ接シ。其接

際ヲ塗封シ。炭爐或ハ沙鍋ニ入レ。文火ニテ蒸餾ス

レバ芳香酸味ニシテ鹽氣ヲ含メル水ノ如キ清稀ノ

液出テ是ニ清稀竄透烈香アル油浮ム其油ハ即チ

的レ列レ竝レ底レ那ナ油ナリ是レ澄清ニシテ水ノ如クナル故

ニ一ニ是ヲ的レ列レ竝レ底レ那ナ精ト名ク新鮮ノ者ハ澄清

色ヲ粘テ黄其精及ビ油出ザルニ至テ承餾壘ヲ換

へ。火ヲ増シ蒸餾スレバ酸味ノ水ニ稍稠キ微黄色

油雜リ出ツ其後逾火ヲ増ス片ハ黄色ノ水ニ粘

稠赤色ノ油雜リ出ツ終ニ其油出ザルニ至テ火ヲ

下シ放冷スレバ赤油ハ凝結シ又列レ篤兒多トノ底ニ

渣塊殘レリ。是即チ格碌波尼亞ナリ

**主治**清稀ノ油ハ味辛苦竄透揮發シ。細絡織管ノ壅

塞ヲ開達シ。粘液ヲ稀釋シ。冷結ヲ温散シ。汗ヲ發シ。

小便ヲ利シ。疝痛腎痛ヲ消シ。腎膀胱尿道ノ虛弱ヨ

リ起ル淋疾滑精尿道ノ潰瘍ヲ治ス○服量六滴ヨ

リ十二滴ヲ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス○

小便閉。淋疾。結石等。尿道ノ諸症ハ十滴ヨリ二十滴  
 マテ砂糖ニ和シ燒酒ニテ用ヒ速効アリ。但過服ス  
 レバ尿管ヲ發ス。然ハ陰具諸器ノ虛弱ヨリ起ル尿  
 崩漏精ニハ良驗アリ。○荏苒寒性傷冷毒痛。肢節腰  
 腕ノ痛風ニ左ノ方尤驗アリ。○  
 的列並膏長明大藥房 的列並底那油二錢  
 白蜜一匁 右研合シ朝夕一卵匙ヲ服ス。○的列並底那油ハ條  
 蟲ニ奇効アリ。早朝空心ニ取テ冷水一盞ニ加

へ服ス。蟲下ラザレバ半時ヲ經テ又一匁ヲ服ス。或  
 ハ左ノ方亦良。○  
 的列並驅蟲飲各一匁  
 的列並底那油各一匁  
 亞刺比亞各一匁  
 薄荷水八匁  
 右研和シ早朝空心ニ半劑ヲ服ス。効ナキ片ハ翌朝  
 半劑ヲ用フ。但其油ヲ増シ服スレバ尤良。○燒蟲ハ  
 左ノ吉利詞キリス 爹兒テイル 極メテ驗アリ

驅蟲吉利詞爹兒

的列竝底那油

式ノ雞子黃 一個

半價水 四寸多

右調和シ吉利詞爹兒ト爲ス。小兒ハ其量ヲ減ス○  
此油ハ辛熱ニシテ衝動スル故ニ諸、焮衝壯熱ノ症ニ  
ハ害アリ○外敷ノ峻効アル防腐藥トス。ヨク鑽透  
ノ腐壞ヲ遏ム○神經及ビ腱ノ損傷、截斷、破裂、刺傷  
等。總テ神經傷ニ外敷ノ特效ノ藥トス○諸創、潰瘍  
ノ膿ヲ排ヒ腐爛ヲ除ク○麻痺不遂及ビ神經孳急  
ノ部ニ擦メ尤驗アリ○此油ハ外敷ノ宛モ銳烈大

ル燒酒ノ如ク止血ノ良藥トス。細絡ヲ收固シ血液  
ヲ凝結セシムルヲ殆ト腐藥ノ如シ但、是ヲ温メ施  
サレバ峻効ナシ○刺戟衝動ノ分利疏散ノ効アリ  
故ニ糊瘤、腺腫、關節腫、陰囊水腫、其他諸部ノ水腫  
ニ外敷ノ良効アリ。然、疔、焮腫及ビ化膿スヘキ腫瘍  
ハ是ヲ施サズ。或ハ手ノ腱瘤ニ此油ヲ擦ルル毎  
日一次漸ク赤色トナリ細胞ヲ發シ終ニ軟化メ消散  
ス○寒壞疽ノ穢液出ルル多クメ血液焔解崩壞ス  
ル症ハ其部ヲ鑽刻メ此油ヲ塗リ或ハ樹皮ノ末ヲ  
摻ケテ此油ヲ滴シ濕スベシ。總テ寒壞疽ニ此油ヲ



塗レバヨク滲透ノ腐壞ヲ遏ム。幾那モ亦此症ニ大  
 効ヲ稱スト雖モ深ク其部ニ滲透セズ。故ニ幾那ハ  
 内服又峻効アレバ外敷ニハ此油ノ効勝レバ燒酒  
 ハ幾那ニ比スレバ刺戟メ深ク滲透ス。然レ其肝要  
 ナル化膿ヲ妨クテ的列油ヲ外敷スレバ深ク滲透  
 メヨク腐壞ヲ遏メ又化膿ヲ妨ルナシ。○腐骨疽  
 ノ大ニ腐蝕シ骨片剥脱スル症ニ施メ其腐蝕ヲ遏  
 メ速ニ腐骨ヲ脱除セシメテ治ス。但腐骨ノ剥脱セ  
 サル症ハ燒酒ヲ良トス。○其稠厚ナル黄色ノ油ハ  
 揮發竄透ノ氣少ク唯神經ヲ強壯シ急迫ヲ緩弛シ

鐵

堅硬ヲ軟化シ腫瘍ヲ消散シ拔爾撒謨ニ代用メ創  
 傷ヲ愈シ出血ヲ止ム粘稠赤色ノ油ハ止痛ノ奇効  
 アリ創ニ施セバ膿ヲ成サズノ愈依(依) 依(依) 依(依)

鐵ハ毘黠密那硫黃珪土ヲ渾合ノ成ルト云是古説

ナリ晚近是ヲ一種ノ元素トス故ニ毫毛夾雜ノ物

質ナシ生(生) 生(生) 生(生) 密那ハ石腦油琥珀石炭ノ如キ土中ニ

ヲ含ム者ナリ鉄ヲ炭末ニ總稱ナリ。○鋼ハ鍊ニ炭素

鋼トナル鋼ニ消石精ヲ點スレハ黑痕生ス是鋼ノ  
 炭素現スルナリ鉄ニ消石精ヲ點スレハ黑痕生ス是鋼ノ  
 炭素現スルナリ鉄ニ消石精ヲ點スレハ黑痕生ス是鋼ノ  
 炭素現スルナリ鉄ニ消石精ヲ點スレハ黑痕生ス是鋼ノ

屑ニ濕シ堆積シ置、片ハ是ニ含メル水氣鬱蒸ノ自  
 ラ熱氣ヲ生ス是ニ硫黄ヲ加ヘ置片ハ自ラ燃テ燄  
 ヲ發ス○鐵ニ銅氣ヲ含ム片ハ内服ノ害アリ。是ヲ  
 試ル法。鐵屑ニ硃砂精ヲ加ヘ研磨ノ青色トナルハ  
 銅氣アル候トス○鐵ト鋼ト性功同シ但、多ク鐵ヲ  
 藥用トス○製煉家ノ究理說ニ云凡ソ動物植物ノ  
 質多クハ鐵氣アリ或云血二十五比ニ鐵二錢ヲ含  
 或說血ハ酸化鐵ヲ含、五百零三分一ト云酸化鐵 補卷ハ  
 主治性温收瀋ス○鐵ヲ用レバ血ノ赤色ヲ増シ虛  
 冷ヲ温煖シ凝體諸器ノ基趾ヲ培補ノ強固ナラシ

ム○全軀ハ纖維弛緩虛衰セルヨリ起ル諸病ヲ治  
 ス。コレ其諸器ヲ收固メ強壯ニシ血液ノ運行ヲ増  
 進シ腺ノ諸液ヲ分泌スル機力ヲ健ニスレバナリ  
 ○纖維脆弱血液稀薄ニメ水ノ如クナルヲ醇厚ニ  
 ス○血液ノ運行怠慢ナルヨリ血中多ク粘液ヲ生  
 シ寒性ニメ顔色灰白黧澹ナル者ニ是ヲ用レバ脉  
 實シ體健ニメ肌膚紅潤トナル○凝體諸器ノ薄弱  
 ニメ血液ヨク釀熟セズ、粘稠液ヲ生メ諸藏ニ壅塞  
 スルヲ治シ、總テ寒性ノ粘液質ノ人ニ効アリ○胃  
 腸ノ纖維脆弱ニメ飲食化シ難ク動モスレバ下利

シ若クハ痞氣鬱蓄ノ諸症ヲ發スル者或ハ萎黃病  
脾病ノ衰弱セル者或ハ粘液腫。虚弱ノ水腫或ハ下  
利シ易ク若クハ汗多キ症。或ハ神經諸筋虚衰ノ肢  
體勞倦精力虚乏ノ者。或ハ皮肉軟弱。脉管緩弛。浮腫  
停水アリテ運輸シ難キ者。或ハ經久虚寒ノ諸病ニ  
萎黃病ヲ兼ル者或ハ血液多ク脱泄ノ羸瘦シ若ク  
ハ水腫トナル者或ハ内藏衰弱ノ月經過多若クハ  
閉滯シ及ビ尙僂病等ヲ發スル者。或ハ居恒放縱安  
逸ニ慣ヒ勞動ヲ厭ヒ懶惰ヲ好ニ竟ニ精力虚耗肢  
體乏弱ナル等ハ身體ヲ運動シ起居飲食ヲ節慎ノ

鐵劑ヲ用シハ皆良驗アリ○適宜ニ是ヲ服スレバ  
飲食消化ヲ扶テ腸中ノ酷厲液ヲ制ス但其病ニ適  
セズノ過用スレバ胃腸ノ消化ヲ妨テ閉塞ス○鐵  
維甚ダ硬強牽張セル者或ハ胃腸ニ膽液質ノ惡液  
鬱積スル者ハ鐵劑大ニ害アリ○鐵ハ收瀉ト開達  
トノ兩効ヲ兼ヌ即チ諸器ノ弛緩衰弱ヲ收固強壯  
ノ諸失血月經過多崩漏下利多汗尿崩等ヲ閉止シ  
良効ヲ奏スルハ收瀉ノ効トス萎黃病。脾病。依利昆  
垓兒等ノ壅塞ヲ開達スル聖藥トシ粘液質ノ經閉  
ヲ通シ肝脾腸間膜ノ閉塞ヲ疏解スルハ開達ノ効

トス斯ノ如キ兩般ノ効アルヲ以テ醫家種々ノ鐵劑ヲ製メ或ハ開達劑トシ或ハ閉澁劑トシ各異ノ効驗ヲ稱ス然レ共其閉澁劑ト稱スル者ヲ與ヘテ大小便ヲ利シ經閉ヲ通スルヲアリ。其開達劑ト稱スル者ヲ用ヒテ頑固ノ下利ヲ閉止スルヲアリ。又同方ノ鐵劑ヲ以テ或ハ下利崩漏ヲ止メ或ハ瀉下セシメ經閉ヲ通スルヲアリ。一種ノ鐵劑ヲ以テ斯ノ如ク相反スル効ヲ爲ス所以ヲ考究スルニ畢竟是皆收瀋ノ一性功ニ係ルノミ。其故ハ脉管纖維柔弱弛解シ血液ヲ保攝維持スルヲ能ハズノ脱泄ノ

諸症ヲ發スル者ノ如キハ鐵劑ヲ用ヒテ閉澁收固シ治スルヲ固ヨリ其主能トス。或ハ脉管纖維虛衰メ萎縮シ血液ヲ健輸スルヲ能ハズ且血中ノ水液粘稠トナリテ凝滯シ諸器脉管ニ壅塞ノ諸竅利セザル者ノ如キハ亦鐵劑ヲ用ヒテ是ヲ收固強健スルキハ脉管ノ萎縮セル者充張シ復括約縮張ノ機轉ヲ遲メ血液ヲ健輸シ壅塞セル者開通メ乃チ開達ノ効ヲ現ハスナリ。然ハ閉澁ト開達ト其効ヲ異ニスレ共皆其收瀋ノ功ニ非ルハナシ。唯患者ノ體稟及ビ病原ノ一ナラザルニ隨テ其効ヲ奏スルモ

亦同シカラザルノミ ○凡ソ鐵劑ヲ用ルニ就テ先  
少患者ノ血液ニ三種ノ差別アルヲ察シ是ニ蹟<sup>ツヒ</sup>テ  
或ハ効アリ或ハ害アルヲ辨スベシ ○第一種ハ  
血ノ質。膠粘ニシテ血中ノ水液亦甚ダ粘稠ナル者ナ  
リ是ニ因テ尿管縮張ノ運輸ノ機轉ヲ爲スト雖モ  
血液流利スルヲ能ハスノ尿管ニ壅滯シ是ヨリ萎  
黄病。處女病。粘液腫。經閉。其他粘稠液ニ因ル諸病ヲ  
發ス ○第二種ハ血中ノ沕<sup>ク</sup>水液過多ニシテ血ノ質  
稀薄ナル者ナリ是ニ因テ水液滿溢泛濫シ細絡纖  
管括約ノ力ヲ失ヒ緩弛縱解ノ下利自汗失血水腫

等ヲ發ス 右兩種ノ血質ヨリ發スル諸病ニ鐵劑ヲ  
用レバ全軀ノ尿管纖維ヲ收固ノ縮張運輸ノ機轉  
ヲ强健ニスル故ニ其壅滯セル膠粘ノ血液ヲ推盪  
碎挫ノ流利セシメ或ハ血質ヲ收固ノ水液ヲ分利  
滲泌セシメ或ハ泛濫停止セル水液ヲ搾出驅逐ノ  
通利セシム。故ニ萎黄病。處女病。粘液腫。經閉。其他纖  
維脆弱ニシテ血ノ膠粘ヨリ起ル諸病ヲ治シ或ハ下  
利尿崩自汗水腫其他纖維ノ弛解シ血液稀渙メ脱  
泄スル諸症ニ偉効ヲ奏スルナリ ○但諸藏ニ頑固  
ノ壅塞アリテ纖維攣急牽縮セルヨリ發スル諸病

即チ勞瘵熱肺傷久欬肺瘍羸瘦消耗熱等ニ於テ下  
 利自汗尿崩失血水腫ヲ發スル者ハ鐵劑大ニ害ア  
 リ。是其細絡織管ヲ收縮ノ逾壅塞セシメ血質ヲ收  
 固ノ水液ヲ搾出シ其脫泄ヲメ更ニ増劇セシムレ  
 バナリ。或ハ經久ノ腹水四肢羸瘦スル症モ鐵劑ヲ  
 禁ス。此病ハ水液腹腔ニ緊滿停滯シ血分ハ殆ト乾  
 涸ス然ルニ鐵劑ヲ用ヒテ其血ヲ收固スレバ血中  
 ノ水液逾消耗メ皆腹腔ニ滯留シ四肢更ニ瘦削ス  
 レバナリ。○第三種ハ血中ノ水液匱乏シ血ノ質甚  
 ダ乾涸ノ稠厚ナル者ナリ。  
此血ヲ和蘭ニブルト名ク血ノ

焦涸セル義ナリ。或ハ是ヲメランコリカ質ト名ク  
 神思沉重鬱憂病ノ義ニノ其血敗黑膽液質トナル  
 リ。是ニ因テ其血細絡織管ニ凝泣滯著スレバ是  
 ヲ以テ脉管ノ縮張運輸ノ機轉ヲ障碍メ牽縮セシ  
 メ遂ニ内藏ノ頑硬腫メコリ黙朗格里亞シ神思沉重シ失苟兒ル  
 陪苦ノ壅塞ヲ生シ。或ハ内藏ノ頑硬腫ヨリ危險難  
 治ノ下利失血嘔吐水腫等ヲ發ス。斯ノ如キ壅塞ア  
 ル病ニハ鐵劑大害アリ。是ヲ用レバ細絡織管ヲ收  
 固メ逾牽縮セシメ血モ亦益水液匱乏メ凝滯滯著  
 シ其患症ヲ増劇ス。故ニ鐵劑ハ開達閉澁ノ兩効ヲ  
 稱スレト右ノ血質ヨリ生スル患症並ニ凝體諸器

ノ硬強ニ因ル諸病及ビ膽液質ノ惡液胃腸ニ鬱蓄  
 スル症ニハ皆害アリト知ルベシ○凡ソ收瀰ノ諸  
 藥多シト雖モ鐵ニ比スベキ者ナシ其故ハ草木類  
 ノ收瀰藥ハ是ヲ服メ胃腸ノ諸液ニ泡釀消化セラ  
 レ、其ハ其性能渝變ノ普ク全軀ノ血液ニ達シ難  
 キトアリ胃腸ノ諸液ハ胃液腸液膽液脾液其他飲食諸液ヲ云鐵ハ胃腸ノ諸  
 液ニ混和スト雖モ其性少シモ變化セズヨク血液ニ  
 浸滲シ周身ニ普達ノ其効驗ヲ致スナリ○烙鐵ヲ  
 葡萄酒或ハ水ニ焯シ其汁ヲ用テ糞泄乳糜利下血  
 脾病其他胃弱ノ諸症ヲ治シ纖維ノ虛弱緩弛ヲ強

壯ス其功鐵泉ノ如シ○凡ソ衰弱虛損ヲ回復セン  
 ガ爲ニ鐵劑ヲ用ント欲スレニ便秘及ビ津液乾涸  
 スルヲ恐レ或ハ血液ヲ過ナ稠厚ナラシムルノ  
 害アラントヲ慮ル者ハ是ニ滋養浸潤ノ効アル液  
 ヲ和シ用フベシ此症ハ鐵乳清的當トス其方  
 烙鐵ヲ取テ數乳汁ニ投シ其上清ヲ取毎朝温服ス  
 此劑ハ滋養ノ功アルヲ以テ凡ソ神經脆弱枯燥ノ  
 人或ハ纖維勁固硬強ナルヨリ發スル諸症或ハ失  
 血過多或ハ房勞過度精力虛損ノ者或ハ體質薄弱  
 血中惡液多ク其血液ヲ以テ全軀ヲ養フ故ニ

面色黧澹萎黃肢體浮腫ヲ發シ或ハ脾病風氣痞滯ノ諸症ヲ患ル者ニ是ヲ用レバ精力健旺肌膚潤澤ヲ生シ神經ヲ衝動セズ。焮熱ヲ生セズ。大小便ヲ利シ。虛羸瘦削ノ人ニ用フレバ枯燥ノ害ナシ此劑ニ野羊乳或ハ牛乳等分ニ加ヘ用レバ滋養ノ効尤多シ按ニ乳劑ハ飲食ヨク消化スル者ニ用フベシ否ラザレバ停滯ノ胃腸ノ諸症ヲ發ス○或ハ鐵屑ヲ乳清若クハ水ニ浸シ用ヒテ亦良効アリ。鐵ノ精氣ハ血液ニ融和メ細絡纖維ニ灌漑シ渣滓ハ血ニ入リナク大便ニ通メ胃腸ヲ妨ルコトナシ○鐵ハ胃腸ニ於テヨク溶化スレバ大便黑色トナル

**鐵屑** 是ハ汚物ヲ去リ藥用トスベシ其法鐵屑ヲ取リ篩テ汚物ヲ去リ其上ニ粗篩ヲ置キ篩内ニ上好ノ磁石ヲ内レバ純粹ノ鐵屑ハ悉ク磁石ニ著クナリ是ヲ取リ硝子壘ニ入レ貯フ○鐵劑ハ鐵屑或ハ鐵鏽ヲ極細末トシ丸藥散劑煉膏或ハ酒劑トシ用ヒテ良効アリ○鐵粉ハ壅塞ヲ開キ經閉ヲ通スルニ稱シ用フ服量十二匁ヨリ半錢マデ丸藥或ハ煉膏トシ毎日一兩次用フベシ○鐵屑ノ極細末ヲ煨過シ三匁ヨリ十匁マデ用ヒテ胃腸ヲ強壯ニスルコト宛モ一種ノ神經劑ノ如クス然レバ惡液汚物胃腸



ニ鬱滯スル者ハ先ツ吐劑或ハ下劑ヲ用ヒ胃腸ヲ  
 淨掃ノ後用フベシ。或ハ内藏壅塞アル者ハ中和鹽  
 ノ類硝砂孕礬酒石ヲ用ヒ融解疏通ノ後是ヲ與フ  
 ベシ。○鐵粉ニ石鹼ト加カミツレ密列。越幾斯劑製法。蒲公英  
 同ヲ加ヘ黃疸水腫等ノ虛衰セル者ニ用ヒテ殊効  
 ヲ稱ス。○酸敗液ノ症ニ鐵粉ヲ用レバ鐵中ノ硝子  
 性ノ土ト胃中ノ酸液ト抱合渾和ノ鐵性ノ中和鹽  
 トナル故ニヨク酸敗液ヲ消化ス。又鐵ノ強壯ニス  
 ル性カヲ以テ胃ヲ強健ニシ酸敗液ノ復マタ滋生スル  
 ヲ抑制ス。是ヲ沙糖ニ和シ十氏マデ一服トシ日ニ

三四次用ヌ或ハ鐵粉ニ葛爾儒別涅實屈室桂薄荷  
 ヲ加ヘ散劑トシ用ヒテ酸敗液ノ諸症。心腹痛等ヲ  
 治ス。○胃腸ニ多ク酸敗液アル症ハ鐵粉尤効アレ  
 凡他ノ病ニハ重滯ヲ消化シ難キヲアル故ニ格碌  
 屈私末爾扶斯後ニ出ツ或ハ鐵鏽ヲ良トス。然レ此二劑  
 モ長服スレバ胃腸ニ鬱滯スルヲアル故ニ鐵丁幾  
 去爾テラヲ最モ良トス。○諸鐵劑及ビ鐵粉ハ殺蟲ノ良  
 効アリ。是レ胃腸ノ酸敗液ヲ消化シ胃ヲ強壯ニメ  
 蟲ノ巢ヲ滅スレバナリ。○鐵粉ハ香竈藥桂丁子。益  
 類ヲ加ヘ用ヒテ尤良。但レ初ハ少許宛用ヒ漸ク其量

ヲ増スベシ。初メ一頓ニ多ク用レバ胃ニ重滯ノ惡  
心妨悶等。胃ノ諸症ヲ發スルコトアレバナリ。若シ右  
ノ症ヲ發セバ鐵粉ヲ煨過メ用ヒ或ハ丁幾去爾ト  
シ用レバ服シ易クメヨク消化ス

**鐵鑪製法** 鐵屑精製者

右適宜ニ取り醋ヲ撒ケ曝乾シ數斯人如クノ盡ク  
鑪ト爲ルニ至リ。極細末トス。洋潔ノ鐵鑪ハ一味用  
ヒテ良。鐵粉ニ比スレバ消化シ易シ。萎黃病及ビ是  
ニ頭痛ヲ兼ル症。或ハ月經過多等ニ尤稱シ用フ○  
佝僂病ニ左ノ方。奇効アリ

**治僂散** ヒルヒスコントララシテム

鐵鑪 一弓

蝸站石 四錢

銀朱 一錢

右各別ニ極細末トシ調和シ分五十服トシ日ニ二服  
宛用フ是佝僂ニ經驗ノ一良方ナリ。患兒毎日は  
服シ時々下劑ヲ用ヒテ便秘セシメズ又身體ヲ運  
動シ飲食ヲ節ニシ水氣少ク乾テ強壯ニシ且香氣  
アリテ精神ヲ爽快ニスル物ヲ加ヘ用ヒ。又居室臥  
床衣衾等ハ勉テ濕氣ヲ避テ乾淨ニシ又香竈ノ藥

品ヲ火ニ投シ烟氣ヲ毛布ニ薰シテ毎日周身ヲ摩  
擦スベシ傳○左ノ方亦佝僂病ニ偉効アリ武室相

**未爾扶斯治僂散**

取乾白撒兒未爾扶斯後一錢

取用蝟蝟石三錢

右散劑トシ分テ四十服トシ一服宛乳汁ニテ用ル

一日二三次。小兒年齡強弱ニ隨テ服量ヲ増減ス依

**越扶屋布斯未爾扶亞栗斯**

オキセイダリヘルリニ  
ゲリ羅スワルトフル  
シールセルハンエイズル蘭エチヲプス  
ハ黑色ノ義マルチアリスハ鐵ノ義

**製法**

鐵屑 適宜

右陶製ノ坩堝ニ入レ火ニ上セ通紅ナラシメ頻々  
ニ水ヲ撒テ手ヲ住メズ攪セ鐵屑光澤ナク黑色ト  
ナルニ至リ温ニ乘メ研末シ羅ルヒ硝子壘ニ入レ固  
封シ貯フ傳

**主治** 感觸甚フメ脆弱ナル人及ビ小兒ニ用ヒテ衝  
動セズ鐵ノ主治ニ舉ル諸病ニ効アリ此劑二錢沙  
糖六錢研和メ十二服トシ一服宛用ル日四次依

**格碌屈私未爾扶斯**

羅 エイズルサフライン蘭鐵

**製法**

撒兒未爾扶斯後新製者適宜

右水ニ溶化シ漚テ汁ヲ取り是ニ精製剥篤亞斯ノ

溶液剥篤亞斯一多ヲ蒸ヲ滴シ加テ鐵質盡ク其底

ニ沈ムニ至リ其上清ヲ傾ケ去リ温湯ニテ其鐵ヲ

洗ヒ乾シ研末シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ此

劑ハ鐵ニ含メル酸性ヲ脱スル故ニ服シ易シ鐵味

ヲ惡者ニ用テ良服量越エ蟄屋布斯末爾扶斯ト同シ

**又法** 鐵屑淨潔者 適宜

右春月雨露風日ニ晒ス下數日悉ク鏽ヲ生スルニ

至テ研末シ篩スヒ聽用ス○或ハ鐵屑ニ多ク水ヲ加

ヘ搗テ攪滾シ其濁水ヲ取漚テ汚物ヲ去リ靜定ス

ルコト一宿其上清ヲ傾去レハ精細ノ渣泥其底ニ

留ル是ヲ取磁鍋ニ内レ火ニ上セ乾シ貯フ○或云

以上二方收漚開達ノ兩効ヲ兼ヌ服量十匁ヨリ二

匁ニ至ル臣○或ハ鐵粉ヲ煨過ノ通紅ト爲シ放

冷シ研末ス或ハ鐵鏽ヲ煨過シ末トス或ハ鐵ヲ燒

テ通紅ト爲シ數是ヲ醋ニ投シ鐵質終ニ磨碎スベ

クナリテ細末トス右三種ノ鐵劑モ亦格碌屈私末

爾扶斯ト名ク或云右三方ヲ收漚格碌屈私

**又法**

鐵屑 十匁

硫黃華 五匁

右合シ柑鍋ニ内レ密閉シ武火ニ煨テ通紅ト爲シ  
 放冷ノ末トシ聽用ス 按○或云此劑ヲ開達格碌屈  
 私未爾扶斯ト名ク○此劑  
 數種アリテ諸書ニ載ス然レ大  
 同小異ナルヲ以テ是ヲ略ス  
**主治** 下血崩漏痔血下利等一切脫泄ヲ止ム此劑輕  
 ク閉澁スルヲ以テ害ヲ貽スナシ○壅塞ヲ開達  
 スル良藥トス肝脾腸間膜等ノ壅塞ヲ疏通シ黃疸  
 ヲ治シ經閉ヲ通シ其他鐵ノ主治ニ舉ル諸病ニ良  
 効アリ○服量十氏ヨリ一錢ニ至ル沙糖ヲ加ヘ散  
 劑トシ或ハ丸藥錠藥煉膏水煎浸劑トシ用フ○諸  
 鐵劑ヲ長服ノ胃腸ニ重滯スル症アル者ハ適宜ノ

下劑ヲ用テ是ヲ導泄シ治スベシ

**撒兒末爾扶斯**

羅ヒツキリヲルマルチス羅ヒツトリヲール  
 ハンエイズル蘭鐵鹽又鐵礬ノ義

**製法**

鐵屑

淨潔者

右綠礬油

銳烈者  
各適宜

右綠礬油ニ蒸餾水四倍ヲ和シ硝子壘ニ入鐵屑ヲ

取テ少許宛加レバ沸騰シ其清液忽温ニメ灰色ト

ナリ蒜臭ヲ生ス右ノ如ク鐵屑ヲ加テ少モ沸騰セ

ザルヲ度トシ其壘ヲ温沙火ニ置テ半時ニメ濾過

シ又火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至

テ放冷スレバ鮮美綠色透亮ノ芒ヲ結ブ是ヲ取乾

硝子壘ニ入、固封シ黯處ニ貯ス。其芒ヲ結、ガル液モ  
 前法ハ如ク煮テ結芒セシムベシ。○是ヲ煮ニ火候  
 強ケレバ其液、美綠色ヲ失テ黯灰色トナルナリ。  
 〔主治〕諸藏ノ壅塞ヲ開キ凝結ヲ解ツ良藥トス。故ニ  
 大便ヲ通シ小便ヲ利シ萎黃病ヲ治シ處女病ノ經  
 閉ニ大効アリ。○殺蟲ノ効アリ殊ニ條蟲ヲ殺ス。ニ  
 氏ヨリ十氏マデ他ノ殺蟲劑ニ加用フ。但胃腸ノ脆  
 弱ナル者ハ腹肚微絞痛シ。過服スレバ吐スルコト  
 リ。○一味用ニハ製ノ乾白撒兒未爾扶斯次ニ出ツト爲  
 シ。大人ハ一タヲ琶布類ニ加用ヒ。幼兒ハ二氏マデ

用ヒ四五歳以上ノ兒ハ十氏マデ用フ。○酸敗液多  
 キ症ニ鐵劑ヲ用レバ蒜臭或ハ敗卵臭ノ噫氣ヲ發  
 ス。○熱性ニ膽液過多ノ症或ハ腐敗熱及ビ腐敗  
 ヨリ起ル諸病ニハ此劑害アリ。凡ソ亞兒レ加利性ノ  
 腐敗毒ハ此劑ノ酸性ヲ吸收スレバ凝泣滯著メ危  
 險ノ閉塞ヲ生スレバナリ。○此劑瀉下ノ効アリ。故  
 ニ下利アル人ハ是ヲ禁ス。○服量ニ氏ヨリ一月ニ  
 至ル。○此劑一錢ヲ水一匕ニ溶シ空心ニ一服トス。  
 大小便ヲ通シ蟲ヲ殺ス或ハ一氏ヲ取水十六弓ニ  
 溶シテ鐵泉ヲ擬製ス。毎日服メ良。○外敷ノ止血藥

トス或ハ多ク水ヲ加テ稀クシ淋疾白帶下ニ水銃  
ヲ以テ數灌入メ良効アリ（炭燭）

**乾白撒兒末爾扶斯** オイトドロクデスワ眼イ  
フルシルエイズル蘭

**製法** 撒兒末爾扶斯 適宜量ニ入リ

右陶埴（土）入レ。文火ニ上セ乾シ白色ノ鹽ト爲ルニ

至リ。硝子壘ニ收メ固封シ貯フ（瓶）

**主治** 撒兒末爾扶斯ニ比スレバ其芒ヲ爲ス所ノ水

氣ヲ脱スル故ニ性力差強クナルノ

**升鐵鹽** ヘルルム。ミリアチモム。又ヘルルム。

**製法** 鐵屑 三多

**發烟海鹽精**

適宜

右發鹽海鹽精ヲ取テ鐵屑ニ滴シ加ヘ文火ニ上セ

テ終ニ盡ク溶化スルニ至テ仍是ヲ文火上ニ於テ

水氣ヲ蒸散メ乾クニ至リ。鐵壺ニ入レ上ニ鐵壺或陶

壺ヲ蓋（ホ）ヒ。合際ヲ塗封シ。文火ニ上セ。漸火ヲ増シ。壺

底遍ク透紅ト爲テ三時ニ放冷シ。其上壺ノ内ニ

升化セル鐵鹽ヲ取速ニ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ（瓶）

**主治** 諸失血ヲ治ス又白帶下。夢遺。洩精或ハ善性淋

ニ偉効アリ。水ニ溶シ半時ニ五六滴宛服ス（福）

**收斂鐵液** リキナルス。チアキ。ス。羅。サ。メン。ゲ。ス。テ。ル。デ。フル。イ。エ。ンド。ソ。ウ。ト。シ。ル。エ。イ。ス。ル。蘭。

製法

硝鐵華

硝鐵華硝砂ノ條血石或鐵粉ヲ製ノ後  
其列ト篤兒多トノ底ニ殘リタルノ黯赭色ノ渣ヲ取リ是

ヲ濕處ニ置バ溶化ノ橙皮色。收溜稠厚ノ液トナル。

此液ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯ス。

主治一切失血ヲ止ム。升鐵鹽ニ比スレバ其効尤峻

劇崩漏白帶下。衄血等、半時毎ニ五六滴用ハ速ニ止

鐵子幾出爾

テインキテウラマルチス羅火土ニ合マ

此劑收斂ト開達トノ二方アリ

收斂方製法

テインキテウラマルチス羅火土ニ合マ  
ンテレケニズエイズルテインキタル蘭

升鐵鹽

一錢  
止ニ出

蒸餾水

一斗

右溶化シ硝子壘ニ内レ貯フ

又法 鐵鏽

三斗

右文火上七鹽精ヲ鐵鏽ニ加テ盡溶化スルヲ度ト

シ是又蒸餾醋ヲ加ヘ攪和ノ全劑ノ量ニ比半ト爲

シ。硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

主治收斂閉澁ノ良劑トス。險重ノ失血ニ速効アリ。

劇々衄血。婦人崩漏。帶下。遺精。善性淋等。半時ニ五六



滴宛用フ(依) 入煎...

開遠方製法 オインキ...

撒兒未爾扶斯 サレマール...

酒石 サトウ 各四...

蒸餾水 シュウスイ 六...

右合和シ鐵壺ニ入レ。煮テ手ヲ住メ...

至リ。葡萄酒四比ヲ和シ。靜定スル...

過シ。硝子壺ニ收メ固封シ貯フ(護)

又法 鐵鏽 細末 一...

又法 酒石 白者 一...

右鐵罐ニ入レ蒸餾水適宜ニ加ヘ。手ヲ住メ...

又法 鐵屑 淨潔者 半...

酒石英 一...

剥篤亞斯 精製者 適...

水 十六...

右鐵屑。酒石英ニ水ヲ加ヨク研和シ。剥篤亞斯...

許宛加テ少モ沸騰セザルニ至リ。文火ニテ煮...

二時。其間。水減スレバ適宜ニ加紙ニテ濾シ。再文火

ニ上セ。煮減メニ北ノ量ト為シ。硝子壘ニ内貯ス。臣  
主治萎黃病。經閉。水腫等脉管纖維ノ虚弱緩弛ヨリ  
起ル諸病ヲ治シ。内部ノ壅塞ヲ開通シ。血ヲ惡質ヲ  
回復シ。又諸鐵劑ノ性功ヲ全備ス。○寒性ニノ諸液  
稀涼ナル病ニ尤驗アリ。○此劑ニ健胃衝動ノ劑ヲ  
加テ良効アリ。假令バ健質亞那丁幾去爾珊篤里丁  
幾去爾越栗失爾刺祿布利怛阿魏丁幾去爾各條末  
爾扶斯鎮痛液 出次ニ等ナリ。○凝體纖維強壯ニノ血  
液稠厚ナル症ニハ此劑ヲ禁ス。○鐵粉。格碌屈斯末  
爾扶斯等ハ胃腸ニ鬱滯スルコトアレバ此丁幾去爾

ハヨク消化ス。○服量一錢ヨリ四錢マデ飲液ニ和  
シ用ヒ或ハ茶匙ニ三四抄マデ用フ。依(依)福(福)

未爾扶斯鎮痛液  
リキアル。アン。デ。イ。ナ。マル。チ。ス。羅。ス。  
ワフル。アー。テリ。セ。エイ。スル。アル。コ。ホ。ル。蘭

製法 鐵屑 適宜 十五箇ヨリ三十箇マデ毎日

發烟海鹽精 四馬 發入ノ軒發發録ノ請

主治 發烟消石精 一馬 發入ノ軒發發録ノ請

右海鹽精ト消石精ト合和シ鐵屑少許宛加テ溶化  
セシメ。終ニ鐵屑少シモ溶化セザルニ至テ文火ニ上  
セ。水氣ヲ蒸散メ乾固セシメ。是ヲ窖ニ内置ケハ  
濕リテ黯楮色ノ液流出ス。其液ヲ取リ亞的兒ノ綠礬

ヲ加ル<sub>一</sub>一倍量ニ<sub>ノ</sub>硝子燻ニ<sub>内</sub>。振蕩<sub>ノ</sub>ヨク混  
 和セシメ。又是<sub>ニ</sub>銳烈ノ燒酒ヲ加ル<sub>一</sub>一倍量ニ<sub>ノ</sub>  
 長キ硝子燻ニ收メ固封<sub>ノ</sub>靜定シ天日ニ透映<sub>ノ</sub>色  
 ナキ<sub>ニ</sub>至リ聽用ス按合味之難得也

**主治**鐵劑中最精微揮發竄透<sub>ノ</sub>強壯スル効アル藥  
 液トス。疼痛ヲ止、痙攣ヲ鎮メ經久ノ神經衰弱ノ諸  
 症ニ奇効アリ○每服十五滴ヨリ三十滴マデ毎日  
 數次其症ニ隨テ増減シ或ハ沙糖ヲ加用依福矣

遠西醫方名物考卷十四終

津西醫方名物考原目

卷十五

安

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

津西醫方名物考原目

卷十五

安

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

紅血丸

遠西醫方名物考標目

卷十五

安質沒扭謨

安質沒扭若波列

暹篤綸安質沒扭

韃爾答律斯越默窪屈私

爽涼催吐飲  
潤燥催吐飲

治痢驗方

亞爾瓦碌扶散

赫篤綸安質沒扭

安質沒扭酒

默他兒雜腹蘭

歇巴兒安質沒扭

默他兒雜腹蘭酒

亞括別涅實屈多律蘭地

默他兒發汗酒

金硫黃

芙蓉黃龍散

金黃排毒飲

芙蓉黃石散

結爾茂斯密涅刺列

遠西醫方名物考卷十五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

安

安質沒扭謨

スピースカラス

○按=此物 本邦伊豫出羽陸奥等其他諸州ノ

礦坑ヨリ多ク出ル一種ノ礦ナリ伊豫ノ方言マ

テガラト云火ニ投ノ硫黃臭ノ烟氣アリ○榕按

=銻石和漢ノ産數種アリ多クハ方形ヲ爲ス或

ハ稀ニ扁ナル者アリ其他形狀一ナラズ鐵色或

ハ銻色或ハ鉛色或ハ綠色アリ右ノ諸品ヲ火ニ

投スレバ皆青焰ヲ發シ硫黃氣アリ故ニ安質没  
 扭謨ノ類トス然レモ安質没扭謨ニ方解石様ノ者  
 アル説ヲ見ズ故ニ安質没扭謨ヲ以テ直ニ鉛石  
 ニ充ルハ未ダ當否ヲ詳ニセズ凡物體ノ方形ヲ  
 爲シ或ハ三稜等多少ノ尖稜ヲ爲ス者ハ必ズ然  
 ル所以アリテ各其質ヲ異ニスル説アレバナリ  
 形状安質没扭謨ハ諸鑛坑七金ノニ出ル一種ノ鑛  
 ナリ甚ダ諸金類ニ近シ然レモ其質破碎スベキガ故  
 ニ諸金ニ屬セズ半金ノ屬トス諸金ト石トノ間ニ  
 大小塊片ヲ爲シ形チ一ナラズ重クノ石ノ如ク

鉛色ニノ束鍼紋ヲ爲シ光輝アリ堅固ニノ破碎シ  
 易シ或ハ岩石ニ著ク者アリ或ハ透明ノ紋理及ビ  
 鑛様ノ石英ヲ夾ニ或ハ琢磨セル鐵及ビ鉛ノ如ク  
 或ハ銀色ノ光彩或ハ黑色ノ光澤アリ或ハ光輝ア  
 ル葉片ヲ爲シ脆ク碎ケ易ク或ハ破碎スレバ氷裂  
 紋ヲ爲シ或ハ帶黃若クハ帶赤ノ斑點アル者アリ  
 坑自リ出テ未ダ煨煉セザルヲ云子ラアチモ  
 二上名々純潔ニノ他物ヲ雜ヘザルヲ上品トス然  
 凡多クハ純潔ナラザル故ニ坑戸是ヲ熔ノ土石等  
 ノ汚物ヲ去リ尖形ノ塊ヲ爲ス此即チ尋常藥用ノ

品ニノ是ヲ生安質沒扭アンテモ謨ムト名ク其製法左ノ如シ  
**製法** 一個ノ陶壺ヲ取り其上端マデ土中ニ埋カメ鐵  
 版ニ許多ノ小孔ヲ穿テ其壺上ニ置キ安質沒扭アンテモノ  
 礦ヲ碎キ他ノ陶壺示内レ是ヲ倒サカシニメ鐵版上ニ載  
 セ其周圍炭火ヲ積ニ燒クキハ其礦熔テ土石等ノ汚  
 物ハ版上ニ残り精粹ノ者ハ版ノ小孔ヨリ流下リ  
 テ下壺ニ聚リ塊ヲ成シ鉛黑色ニメ光彩アリ東鐵  
 紋微細ニ錯綜シ重ク堅クメ破碎シ易ク淨潔ナリ  
**又法** 安質沒扭アンテモノ礦ヲ坩鍋ニ内レ火ニ上セテ煇化  
 シ網杓子ニテ其汚物ヲ抄ス去リ放冷メ其壺ヲ破

リ純潔光輝ノ東鐵紋アル者ヲ擇ニ取ルナリ○製  
 煉術ニテ安質沒扭アンテモヲ煇トカシ其質ヲ研究スルニ是ハ一  
 種ノ元素補卷ナリ然レ山坑ニ出ル者ハ必ス硫黃ヲ  
 含ム是ヲ製煉ノ硫黃ヲ脱スレハ純粹トナル是ヲ  
 安質王ト曰フ安質王ハ原名レギアアンテモニ凡  
 ニ含所ノ夾雜物ヲ脱ノ純粹ノ安質沒扭アンテモ黑鐵石等  
 金屬ト爲者是ヲ總テ王ト稱ス○安質沒扭アンテモヲ煇炒  
 スレバ灰色ニメ石灰様トナル烈火ニ上セ燒ケバ  
 溶テ遂ニ淡赭色ノ硝子トナル  
**主治** 製煉術ニテ安質沒扭アンテモニ含メル硫黃ヲ分チ去  
 リ純粹ノ質ト爲スハ一種ノ毒トナリ是ヲ服ス



レバ烈ク吐ス。但、硫黄ヲ分カズ唯溶メ汚物ヲ去ル  
 ノミナレバ硫黄ヲ混和スルニ由テ本性ノ毒ヲ發  
 スルコト能ハズ。一二錢内服スト雖モ惡心嘔吐ヲ發  
 セズ唯輕ク發汗シ粘液ヲ稀釋メ驅除ス。○一、月ヨ  
 リ二錢マテ水煎シ或ハ末トシ或ハ是ヲ搗劑ニ加  
 ヘ毎日用テ粘痰ヲ疏釋シ稠厚ノ血液ヲ稀解シ表  
 發ノ蒸氣ヲ驅發シ頑癬諸惡瘡惡厲ノ頭瘡等總テ  
 酷厲液ヨリ發スル經久ノ皮病ヲ治ス。但、水煎ニハ  
 薩撒弗刺斯、土茯苓等ノ粘稠ヲ稀釋スル藥ニ加ヘ  
 煎湯トシ用テ尤モ良。發汗ノ諸瘡ヲ治シ殊ニ微毒ノ

諸症ニ効アリ。○酸敗液多キ症或ハ多ク酸味ノ飲  
 食ヲ用ヒテ此藥ヲ服スレバ其酸性ヲ以テ是ニ合  
 メル硫黄ヲ分離シ其毒性ヲ逞スメ劇ク嘔吐下利  
 スルコトアリ故ニ生安質沒扭ヲ用ヒテ絶テ害ナシ  
 ト言ガタシ。○此物ハ製劑トシ用ヒテ奇効ヲ奏ス  
 ル藥トス。次ニ記ス諸 故ニ多ク製シ用フ。○膏藥ニ  
 加ヘ外敷メ潰瘍ヲ乾シ洗藥トメ焮腫眼ヲ治ス。○  
 畜類ニ用レバヨク肥腴セシム。○  
 安質沒扭若波列

ア、シ、テ、モ、ニ、ム、デ、ア、ホ、レ、チ、キ、ム、羅  
 ス、シ、ト、テ、レ、イ、ヘ、ン、デ、ス、ヒ、ス、ガ、ラ  
 ス、シ、ト、テ、レ、イ、ヘ、ン、デ、ス、ヒ、ス、ガ、ラ

本草綱目卷之十五

製法

安質沒扭

極細末トシ火モ光彩ナキニ至ル者一匕

消石

精製者極細末トス

右研和ノ黒色ト爲ルニ至リ。坩鍋ヲ火ニ上セテ通紅ナラシメ。右ノ細末一匙ヲ取テ其坩ニ投スレバ爆聲ヲ發ス。鐵籠ニテ是ヲ攪セ爆聲止ニヨク燒テ赤色トナルニ至テ又其末一匙ヲ投メ前法ノ如クシ數斯ノ如クノ其末ヲ燒盡シ溶化メ後。尚火上ニ置テ八分時ニ放冷スレバ白色ノ凝塊トナル。是ヲ末トシ硝子壘ニ收メ固封シ貯ク。否ラザレバ濕リテ酷厲ハ性トナル。○此劑一匕ニ蒸餾水十匕

ヲ加テ溶化シ是ニ綠礬油ヲ滴シ加テ以モ沸騰セザルニ至リ又沸湯ヲ加ヘ攪セ靜定ノ上清ヲ傾ク去リ數回斯ノ如ク沸湯ヲ加ヘ洗淨ノ其液必モ味ナキニ至ル其末ヲ取リ乾シ貯フ是ヲ洗淨安質沒扭若波列ト名ク。○蒲爾花歌ノ人ノ説ニ是ヲ洗淨スレバ安質沒扭ニ含ム剝篤亞斯ヲ脫除スル故ニ此

劑良効ナシト云。晚近ノ説ハ其加所ノ綠礬油ト剝篤亞斯モ水ニ溶解セズノ安質沒扭流散セズ故ニ是ヲ洗ト雖モ其効少モ減セズト云

主治

發汗ノ良劑トス。啻ニ汗及ビ蒸氣ヲ發スルノミナラズ小便ヲ利シ閉塞ヲ開キ血中ノ諸毒ヲ排

遠西名物考 卷十五 風雲堂藏

泄シ酷厲液ヲ消散シ水腫諸頑固ノ腫病傷冷毒流  
 走痛頭痛痘瘡下利等總テ汗解ノ治スベキ病ニ用  
 口テ其鬱毒ヲ驅泄スルニ大効アリ○服量一ツヨ  
 半錢ヲ温液ニ和シ臨卧ニ用ヒ兼テ熱飲ヲ服  
 シ温覆ヲ發汗ヲ助クベシ因  
**暱篤綸安質沒扭** 羅 二ツトリムスチビアテム 羅  
**製法** 安質沒扭若波列ノ細末ヲ温湯ニテ數回  
 淘洗シ其湯終ニ味ナキニ至リ其液ヲ硝子曇ニ内  
 シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾白ノ塊ト爲シ貯フ  
 或ハ右ノ液ヲ蒸散メ半ヲ減シ冷處ニ置テ芒ヲ結

バシメ其芒ヲ取り硝子曇ニ收メ貯フ  
**主治** 壯熱ヲ清涼シ閉塞ヲ開達シ發汗利尿ノ良効  
 アリ壯熱病炊衝痘疹胸脇焮痛開歇熱黃疸ヲ治ス  
 ○服量十氏ヨ收メ及マテ飲液ニ和シ用フ因  
**韃爾答律斯越然室羅** 羅 スチスチスチ 蘭  
**製法** 亞爾瓦碌扶散 九錢 後 出 ツ  
 酒石英ニ半量水ニ好メ盡メ蒸餾水ニ  
 蒸餾水 五 北 量 大 固 性 ニ 限 又 出  
 右ニ味末トシ硝子曇ニ入蒸餾水ヲ加へ火ニ上セ  
 煮下四分時或ハ其末盡ク溶化スルニ至リ濃ク其

液ヲ取り文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ上面膜ヲ結ブ  
 至リ更ニ微火上置テ漸次ニ芒ヲ結バシメ其芒  
 ヲ取り乾シ末トシ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ○此  
 劑右ノ如ク製スレバ蒸餾水ニ投メ盡ク溶化ス  
 ○黙他兒雜腹蘭或ハ赫篤綸安質沒扭ニ共ニ後ヲ以  
 テ亦ヨク此劑ヲ製スト雖モ其垢ノ土氣ヲ浸滌ス  
 ル下アル故ニ此製法ヲ用ルナリ然レ黙他兒雜腹  
 蘭ヲ以テ製スル方ハ其効穩ニノ瞑眩セズ亞爾瓦  
 碌扶散ハ多ク海鹽ノ酸性ヲ含ム故ニ此劑甚ク酸  
 烈ニノ湧吐ノ功殊ニ峻ナリ

又法

赫篤綸安質沒扭極細末 三弓  
 酒石英 六弓  
 水 六北

右二味各別ニ研末シ合和ノ磁罐ニ入レ水ヲ加ヘ  
 文火ニテ煮ルヲ六時水減スレバ數温湯ヲ加ヘ酒  
 石英ヲメヨク溶化セシメ紙ニテ濾テ其液ヲ取り  
 淺ク潤キ磁鍋ニ入レ火ニ上セ手ヲ住ズ攪セ速ニ  
 煮テ乾シ白色ノ鹽ト爲シ放冷メ研末シ硝子壺ニ  
 入レ固封シ貯フ

又法

歇巴兒安質沒扭二 十六錢  
 黙他兒雜腹蘭ノ條ニ出

酒石英 八号

右磁罐ニ入レ煮ル<sub>ル</sub>四時半許ニ<sub>ノ</sub>漉<sub>コ</sub>テ汁ヲ取リ

火ニ上セ煮テ乾シ白末ト爲ス<sub>獨</sub>

又法

默他兒雜腹蘭

酒石英 各四号

右磁罐ニ入レ水適宜ニ加ヘ煮テ酒石英盡ク溶化  
スルニ至リ温ニ乗シ紙ニテ漉シ又其液ヲ火ニ上  
セ煮テ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷ノ芒ヲ結バシ  
メ其芒ヲ取<sub>リ</sub>乾シ貯<sub>フ</sub>其餘殘ノ液モ前法ノ如ク煮

テ芒ヲ結バシム○劑中ノ酒石英ヲ以テ默他兒雜

腹蘭中ニ含メル硫黃ト安質沒<sub>ト</sub>日夕溶化ス

故<sub>ニ</sub>紙ニテ漉<sub>コ</sub>ト雖モヨク透過<sub>メ</sub>必<sub>シ</sub>モ其性能ヲ滓

ニ遺ス<sub>ト</sub>ナシ<sub>獨</sub>○此劑ハ安質沒<sub>ト</sub>酒石ノ酸性

下混和抱合メ成<sub>ル</sub>所ノ一種ノ中和鹽ナリ其結芒ス

ル者ハ三稜ヲ爲シ乾テ微黃白色味微酸ニ<sub>メ</sub>礦氣

アリ氣<sub>ニ</sub>觸<sub>レ</sub>テ容易風化セズ透亮ナラズ然<sub>レ</sub>水ニ

濕セハ透徹シ熾炭ニ投スレバ爆聲ヲ發ス○此劑

ヲ貯テ灰色ノ末トナル者ハ氣<sub>ニ</sub>觸<sub>レ</sub>テ濕<sub>リ</sub>其質溶

解<sub>メ</sub>純粹ナラズ其効力モ劣弱ニ<sub>シ</sub>藥用ニ充<sub>テ</sub>難<sub>シ</sub>

主治此劑ハ捷効アル吐藥トス。其効穩ニメ瞑眩劇シカラズ一切胃中ニ鬱蓄スル膠粘敗穢ノ汚物ヲ快吐ス或ハ下利スルヲアリ故ニ腐敗熱膽液熱赤痢間歇熱等ノ初發其毒滯著ク患者惡心嘔氣アルヲ用テ尤効アリ○イ百葛格安那ハヨク吐スレテ下利ノ効ナシ此藥ハ下利スルヲアル故ニ下利メ宜キ症ニハ此藥ヲ用ベシ若シ下利ノ害アル者ハイ百葛格安那ヲ用ベシ○小兒ハ百葛格安那人苦味ヲ嫌フ者ハ是ヲ用ベシ水ニ溶シ稀クメ用レバイ頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セイ頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セ

シムベキ症ハ是ヲ適宜ク飲液ニ溶シ少許宛與フベシ假令ハ左ノ方ノ如ク然レバ味ニ異ナシ○イ頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セ

爽涼催吐飲

韃爾答律斯越默室屈私五瓜ハ天水六等ニ

薔薇露七等ハ合テ藥味ニ異ナシ○イ頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セ

覆盆舍利別一等ハ良ク半換藥味ニ異ナシ○イ頓ニ快吐セシメズ頻クニ吐セ

右攪和シ四分時ニ匙宛用ヒ吐スルヲ度トス○

左ノ方亦良ク

潤燥催吐飲

韃爾答律斯越默室屈私五瓜ハ天水六等ニ

大麥煎

二北半  
 右攪和シ一麥酒盞宛用フ○右ノ二劑。膽液熱ノ熱  
 勢劇クノ煩渴アル症ニ尤効アリ○服量。通例此末  
 一匁ヲ蒸餾水四錢ニ溶シ一服トシ八分時毎ニ用  
 ヒテ吐スルヲ度トス。小兒ハ半匙宛用フ尋常ノ水  
 ハ石灰土。其他汚物ヲ含テ藥効ヲ妨ル故ニ蒸餾水  
 ヲ用ベシ○或ハ此末二匁ヨリ六匁マデ水六匁ニ  
 溶シ若クハ適意ノ飲液ニ和シ用ヒ或ハ此末二匁  
 若クハ三匁ニ沙糖少許ヲ研和シ用フ○壯實ノ人  
 感動少キ者ハ此末三匁或ハ四匁ヲ用フ中毒等ニ

テ快吐ヲ取ルニハ五匁ヲ温湯一盞ニ溶シ用フ神經  
 衰弱ノ觸知鈍ク精神朦昧セルガ如キハ十匁若ク  
 ハ十五匁マデ用テ吐ヲ取リアリ○是ヲ用テ吐ヲ  
 發スルハ微温湯或ハ微温湯ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ  
 雞肉煮汁等數碗ヲ與フベシ是ニ因テ胃中ノ粘液  
 ヲ稀釋シ吐シ易クノ苦悶ナカラシム但脂油ノ類  
 粘稠ノ飲液ヲ用ルナク却テ藥力ヲ妨ゲ且胃中  
 ノ粘液ヲ稀釋セザレバナリ○吐劑ノ服量少クメ  
 吐ザレバ徒ニ患者ヲノ惡心乾嘔ニ罷勞セシムル  
 ノミニテ寸功ナシ或ハ服量度ニ過レバ嘔吐止マズ

若クハ吐血搐搦ヲ發シ或ハ胃ノ厥衝ヲ生スル下  
 アリ○若シ此劑ヲ用ヒテ嘔吐止マザル者ハ硫黃  
 精或ハ綠礬精ヲ水ニ滴メ適意酸美ノ味ト爲シ用  
 ベシ是安質沒扭ノ毒ヲ制スルコト阿芙蓉ニ勝レリ  
 ○吐血ノ患アル人ハ吐劑ヲ禁ス。是ヲ用ヒテ吐血  
 ヲ發スルコトアレバナリ。孕婦及ビ内部厥衝アル者  
 モ是ヲ禁ス。是ヲ用レバ胃ニ搐掣ノ運動ヲ發シ其  
 症ヲノ増劇セシムレバナリ○此藥服量甚ダ些少  
 ナレバ吐ヲ發セズノ專ラ解凝發汗ノ良藥トシ胃  
 腸ニ滯著セル粘液ヲ溶化シ吐痰ヲ進メ大小便ヲ

利シ諸竅脉管ノ排泄ヲ進輸シ殊ニヨク蒸氣ヲ發  
 泄スルニ由テ諸内鬱セル酷厲毒ヲ驅發ス。故ニ病  
 毒潛伏内攻メ發スル諸病ニ用テ大効アル下ニ百  
 葛格安那ノ如シ凡ソ安質沒扭製ノ吐劑ノニナラ  
 ズ總テ吐藥ハ大抵服量八分氏ノ一ヨリ加テ半氏  
 ニ至ルマデ飲液ニ加ヘ用レバ吐ヲ發セズノ解凝  
 峻ニノ危懼ナク切實トス○此劑ヲ金硫黃後ニ出ツニ比スレバ功力  
 半氏ニ阿芙蓉等分ニ加テ湧吐ノ効ヲ抑制シ數用  
 レバ汗ヲ發メ惡性ナル傷冷熱等ノ毒ヲ發散メ治



ス。即チ托歇爾私發汗散トシハ百葛格安ノ如シ。傷冷毒  
 熱病ハ殊ニ皮中ノ蒸氣管拘強セル故ニ此發汗  
 劑ヲ用ヒテ尤モ的當トス然レハ患者ノ天質病性ノ夾  
 併。病毒排泄ノ時節ヲ察シ用ル下肝要ナリ但此藥  
 發汗劑及ヒ阿芙蓉ヲ加ルハ久々連服スル  
 勿レ動モスレバ血液甚ダ稀薄ニナリテ其醇厚ノ  
 質ヲ失ヒ終ニ烊解泛濫ノ水腫ヲ發シ其他荏苒々  
 ル虛羸ノ病ニ罹レバナリ○痢疾ノ傷冷毒ヲ夾テ  
 重墜努責ノ甚キ症ハ此藥ヲ吐劑トシ用テ徑ニ其  
 毒ヲ除クナラズ亦服量些少ニ用ヒテ汗ヨリ

發散シ其他諸竅ニ排泄ノ大効アリ○間歇熱ニ吐  
 劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ノ病毒汚液ヲ淨刷スレバ  
 其熱仍荏苒トノ解セザル症ハ毎日少許宛數是ヲ  
 用レバ其熱漸ク解散メ治ス。或ハ幾那ヲ用レバ頑  
 固ニメ治セザル症ハ此藥ヲ兼用メ幾那ノ驅熱ノ  
 性功ヲ扶ケ其毒ヲ排除メ治スル者甚ダ多シ。又是  
 ヲ幾那ニ加ヘ用レバ服量較多シト雖モ嘔吐ヲ發  
 セズ假令ハ幾那一多ニ水三十二多ヲ加ヘ煮テ半  
 減シ其煎汁ニ此藥十二瓦ヨリ十五瓦マデ加ヘ  
 用ルニ少モ惡心ヲ發スルヲナシ是レ幾那ノ收瀉

又性功ニテ是ヲ抑制スレバナリ○凡ソ間歇熱ハ  
 初メ此藥ヲ用ヒテ吐シ若クハ瀉下セシメ爾後半  
 氏或ハ一氏許吐セザル許ヲ一服トシ毎日亭午ノ  
 一時前ニ一服用ト夜分一服用レバ大抵五日許ニ  
 ヲ治ス。是ヲ服ノ吐スレバ効ナシ。故ニ服量ニ意ヲ  
 用ル。肝要ナリ。是レ飲液ニ和シ服スルヨリハ丸  
 藥トシ用テ効多シ○是亦鎮痙ノ良藥トス  
モ吐劑ニ少許用レバ鎮痙ノ効アルル此藥ト同シ  
 ヲ治スルニ偉効アリ。是此藥ノ神經及ヒ諸筋ノ失  
 常ノ運動痙攣ヲ鎮定スル一種ノ殊能ヲ曾テ病

毒ヲ排除スルノ効ニ非ズ○一小兒屢劇キ搐搦ヲ  
 發ス其發作ノ時此藥ヲ用テ頻ニ治シ爾後連用數  
 日ニテ其症全愈ス○一小兒痲ヲ患ヌ初メ此藥ヲ  
 吐劑トシ用テ吐セシメ爾後吐セザル程ニ少許宛  
 用ルニ總身小瘡ヲ發メ快復セリ○一女兒幼妹其ニ  
 痲ヲ患メ此藥ヲ用テ前法ニ如クニ總身臭汗ヲ  
 發シ是ヨリ病毒漸ク排除メ遂ニ治ス○一小兒痲  
 ニ因テ搐搦ヲ發スルト一時半許。左ノ方ニ匙以與  
 テ速ニ醒復シ爾後是ヲ連用メ其痲モ亦全愈セリ

治痲驗方

菩提樹花水 ハク ○其製法薄荷水ノ條露水製  
法拈套第十三 橙花水製法ト同シ  
韃爾答律斯 タールダラス 越默室屈私 エトモクキ

右調勻ス ○疫效ハ初メ此藥  
粘液ヲ吐セシメ次ニ少許死用ヒテ汗ヲ發シ大便  
ヲ利メ其餘毒ヲ驅除シ且其鎮痙ノ効ヲ以テ效嗽  
ノ發作ヲ靜止スレバ多ク治ス ○失血モ亦此藥少  
許宛用テ捷効アリ吐血及ビ崩漏等ニ用テ驗多シ  
是血脉諸管ノ痙攣搐掣ノ運動ヲ鎮定スルニ因ル  
○黑障眼及耳聾ハ此藥ニ護謨安沒尼亞幾ヲ加ヘ  
用テ治スル者甚多シ又左ノ方黑障眼ニ奇効アリ

治障驗方

瓦爾枝奴謨 カールバヌム 散瓦百奴謨 サカバヌム  
石鹼 シヤ 甘草膏 カンサウ 各一錢  
大黃 ダイカウ 一錢半  
韃爾答律斯 タールダラス 越默室屈私 エトモクキ ○十六丸

右研和シ一丸ヲ一丸トシ朝夕十五丸宛服ス大抵  
四週ヨリ七週ノ間ニ効ヲ奏ス ○韃爾答律斯越默  
室屈私ハ中和鹽 ドクハル 把飲爾私發汗散 ドクハル 等分ニ加

遠西各物考 卷十五 風雲堂藏

へ。殊ニ礶砂ヲ研和シ水ニ溶シ用テ尤良。是ニ由テ  
ヨク溶化シ其功切實ナリ○此藥外敷メ刺戟衝動  
シ鑽透開達メ凝結ヲ疏散スル功アリ。是メ水ニ溶  
シ皮膚ニ塗レバ小胞ヲ發ス○此末一匁。芫菁丁幾  
去爾トカ。水二匁研和シ溶シ是ヲ胃ノ部ニ塗リ日  
數次。劇キ欬嗽ヲ治シ又小便ヲ利シ水腫ニ良効ア  
リ○此末半錢ヲ水一匁ニ溶シ六十滴許ヲ取テ每  
日經久ノ流走痛ニ擦スレバヨク蒸發氣ヲ排泄シ  
治ス但是ニ由テ睡ヲ催シ或ハ嘔氣ヲ發スル者ア  
リ○此末十五匁ヲ取テ家猪脂一錢ニ調和シ肌膚

ニ塗レバ發泡ス。稟賦薄弱ニノ感動シ易キ人。及ビ  
小兒ハ是ヲ以テ芫菁發泡膏ニ代用シ瘡疹類ノ潛  
伏内攻セルヲ發越シ或ハ内部ノ疼痛ヲ表部ニ發  
散ス疾叔叔 揭底福 亞爾瓦 瓦礫 扶散 ブドル ハン アル カ ロツ チ 蘭

**製法** 黙他兒雜腹蘭ノ一匁量ニ凡ル四匁

海鹽炒乾者 三匁

雨水 四匁

右合和シ硝子ノ格兒弗ニ内レ温沙火ニ上セ時ス

攪セ温メ浸ス<sup>一</sup>六時ニ火ヲ下シ瀝テ其液ヲ取  
 是ニ其四十倍量ノ沸湯ヲ加テ溶シ静定ノ灰色ノ  
 渣ヲ取り亞兒加利鹽液剥鳥亞斯或ハ酒石鹽少許ヲ取テ水ニ溶ス液ヲ云

ヲ以テヨク是ヲ洗淨ノ乾シ貯フ

**主治** 峻吐ノ劑トシ又瀉下ス服量二匁ヨリ四匁ニ

至ル **赫篤緜安質沒扭** 羅 <sup>ガ</sup>ラス・ハン・スピースガラス <sup>蘭</sup>

**製法** 安質沒扭 適宜 右研末シ底ノ平ニノ瀾キ陶器ニ撒シ文火ニ上セ

硝子管或ハ磁棍ニテ手ヲ住メズ攪テ粒塊トナル

一 無ラシメ若塊トナラバ速ニ火ヲ下シ再ビ極細末  
 ト爲シ復火ニ上ス片ハ硫氣上升ス其氣止片ハ又  
 火ヲ加硫氣ヲ上升シ終ニ器底通紅トナリ烟氣消  
 ヲ後。是ヲ坩鍋ニ入レ蓋ヲ覆ヒ火屑ヲメ入<sup>一</sup>無ラ  
 シメ。燒テ遂ニ熔化流動ノ烱タル硝子ノ如クナル  
 ニ至リ磁甌或ハ硝子甌ヲ入レテ攪セ試ルニ流動  
 ノ透明ナル液其甌ニ著テ絲ヲ引ニ至ル片ハ是ヲ  
 温メタル銅鉢或ハ熱セル石上ニ寫シ漸ク放冷ス  
 冷ル器ニ寫セハ其乃チ赤色透明堅剛ニメ破碎ス  
 液逆散スレハナリ ○安質沒扭熔テ後火上ニ置<sup>一</sup>久キ  
 へキ質トナル

ホド逾、透明トナルナリ初メ煨ク成安質没扭ニ合  
メル硫黄ノ毒烟蒸升ス故ニ意ヲ用ヒテ其烟氣ヲ  
避クベシ〔按〕

**〔主治〕**峻吐ノ劑トス或ハ瀉下ス。服量一匁ヨリ三匁  
マテ用フ。但其効劇キ故ニ一味末ニテ用ヒズ。此末  
十匁ヲ取テ白葡萄酒ニ多ニ浸ス〔一〕一夜。紙ニテ漉  
シ其酒ヲ空心ニ温服ス。壯實ニテ頑固ノ病アル人  
ニ用フベシ。虚人久病羸弱ノ者ハ是ヲ禁ス〔疾〕

**安質没扭酒**

**〔製法〕**

赫篤綸ヒツト安質没扭アンシテモ細末細末  
一匁一匁

**葡萄酒**

右硝子壘ニ入時攪セ浸ス〔一〕十二日ニシテ清ヲ  
取り紙ニテ漉シ硝子壘ニ收メ固封シ貯ス〔按〕

**〔主治〕**峻吐ノ劑トス然レモ服量少許。大抵二三十滴ヨ

リ五六十滴許用レバ發汗劑及ビ衝動解凝劑トナ  
リ。發汗ノ諸酷厲毒ヲ驅泄シ。諸器脉管ノ排泄ヲ進  
メ粘稠液ヲ稀釋メ一切壅滯ノ病毒ヲ疏解シ驅除

ス。故ニ肝。脾。腸間膜腺ノ壅塞。痛風。肢節痛。頑固ノ瘡  
瘍等ニ大効アリ此酒ノニ用ヒ或ハ失鳩答。越幾斯  
劑。阿芙蓉液。石鹼等ヲ加ヘ用フ〔一〕服量吐劑ト爲ス

ニハ一錢ヨリ漸ク加テ吐スルニ至ル解凝劑ト爲スニハ五廿滴ヨリ漸ク加ヘ患者惡心ヲ覺ルニ至テ差其量ヲ減シ用ス。小兒ハ三四滴宛用フ

**黙他兒雜腹蘭** 蘭 コロクスメタルロルム 羅

**製法** 安質沒扭

消石 乾淨者 各等分

右ニ味各別極細末トシヨク混和シ坩鍋ヲ熾炭ト上セ通紅トナレ片右ノ末ヲ取テ少許宛坩ニ投スレハ爆聲ヲ發メ焚燒ス。遂ニ其末ヲ燒キ盡シ爆聲ナキニ至レハ赭黃ニシテ雜腹蘭色ノ塊トナル是

ヲ**歐巴兒安質沒扭**ト名ク 歐巴兒ハ肝ナリ是亦是肝藏ノ色ヲ以テ名ク

ニ雜ル帶白色ノ渣屑ヲ分チ去リ極細末トシ沸湯

ニテ數洗ヒ其湯火モ味ナキニ至リ 消石ヲ洗ヒ微

火ニテ乾シ硝子蠟ニ收メ固封シ貯フ ○亞爾瓦碌

扶散ヲ製スルニ用ル 黙他兒雜腹蘭ハ安質沒扭ニ

多。消石三弓ヲ用テ前法ノ如ク製ス 按

**主治** 峻吐ノ劑トス服量二匁ヨリ六匁ニ至ル ○眼

ニ點メ翳膜ヲ去リ細絡ノ凝血ヲ散シ角膜及ビ瞼

ノ潰爛ヲ治シ眼中ノ小胞汚點ヲ消ス 按

**黙他兒雜腹蘭酒**

イシヒシイコロクスメタルロルム又ヒヒムエメチキス羅

製法

黙他兒雜腹蘭

一錢

葡萄酒 一北

右調和シ硝子壘ニ入テ溶化シ微火上ニ置テ時々振蕩シ藥氣ヲ出ス丁二三日ニノ濃過シ貯フ○服量四錢ヨリ三弓ニ至ル

又法

黙他兒雜腹蘭

一弓

葡萄酒 三十弓

右硝子壘ニ入レ溶化シ浸ス丁十二時ニノ紙ニテ濃シ貯ヘ用フ此劑一ニ亞括別溼實屈多律蘭也ト名ク○服量三錢ヨリ四錢ニ至ル

主治

安質沒扭製ノ吐方中ニテ此劑尤峻ナリ○安質沒扭ハ葡萄酒中ノ酸性ニテヨク溶化ス故ニ酒劑ト爲シ尤効アリ○癩狂ニハ患者ノ強弱ニ隨ヒ一日ハ弓ヨリ十弓マテ與ヘ吐セシメテ効アリ但仔細ニ意ヲ用ヒ酌料ノ漸ク服量ヲ加フベシ○服量少許ニノ數用レバ凝結ヲ疏散シ粘液ヲ溶解スル良藥トス故ニ内藏ノ壅塞ヲ兼ル諸病ニ殊効アリ○肺焮衝ニ用テ痰ヲ豁シ略出シ易カラシム○此液三錢或ハ四錢ニ阿芙蓉液四分一ノ量ヲ加ヘ數用テ頑固ノ下利或ハ乾效傷冷毒痛總テ痛風様



ノ病ヲ治ス○又此藥發汗ニ峻効アリ左酒劑尤良

黙他兒發汗酒

黙他兒雜腹蘭酒

阿芙蓉液

右調和シ一服トス服法主治總テ陀歇爾私發汗散

隨テ漸ク増加フベシ

金硫黃

製法

硫黃華

安質沒扭

細末

三子中ニ五此藥ニ與テリ○

此藥ハ釐ヒ典埵羅偈

右釐ヒ典埵羅偈ニ水ヲ加ヘ鐵壺ニ内ニ攪テ煮沸

セシメ安質沒扭ト硫黃ヲ加ヘ手ヲ住ス攪セ煮其

液減スレハ適宜ニ蒸餾水ヲ加ヘ煮テ二品盡ク溶

化スルニ至リ放冷シ紙ニテ濾テ其液ヲ取り綠礬

精ヲ以テ徐々ニ其液ニ滴シ加テ硫黃盡ク其底ニ

沈ムニ至リ又是ヲ紙ニテ濾テ紙上ニ留ル硫黃ヲ

取り數水ヲ注テ洗淨シ微火ニテ乾シ貯

ハ安質沒扭ト硫黃ヲ煮テ混和セシメ酸精ヲ加テ

安質没<sup>モ</sup>扭<sup>ト</sup>硫黄ヲ分チ取リタル者ナレバ即チ安質没<sup>モ</sup>扭<sup>ト</sup>ニ含メル硫黄ナリ。ハニマ<sup>ニ</sup>漢<sup>ニ</sup>張<sup>ニ</sup>仲<sup>ニ</sup>景<sup>ニ</sup>の<sup>ニ</sup>此<sup>ニ</sup>藥<sup>ニ</sup>。

**主治** 金硫黄及ビ結爾<sup>ケ</sup>茂<sup>ル</sup>斯<sup>ス</sup>。密<sup>ニ</sup>涅<sup>ニ</sup>刺<sup>ニ</sup>列<sup>ニ</sup>出<sup>ニ</sup>次<sup>ニ</sup>ハ<sup>ニ</sup>稍<sup>ニ</sup>多<sup>ニ</sup>ク

服シ或ハ胃中ニ酸敗液アル者ニ與<sup>テ</sup>レ<sup>テ</sup>嘔吐シ或ハ瀉下ス。必許用レバ汗及ビ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利メ血中ノ惡液ヲ排除シ凝結ヲ疏解ス。約<sup>ク</sup>ハ言<sup>ハ</sup>バ病毒惡液ヲ諸竅ニ排泄スルハ之。即チ韃爾<sup>タ</sup>答<sup>ダ</sup>律<sup>リ</sup>斯<sup>ス</sup>。越<sup>エ</sup>默<sup>ク</sup>窒<sup>シ</sup>屈<sup>ス</sup>私<sup>ス</sup>出<sup>ス</sup>ツノ如シ。○吐ヲ取ルニハ四五<sup>ニ</sup>氏<sup>ヲ</sup>用フ發汗解凝等ノ効ヲ取ルニハ半<sup>ニ</sup>氏<sup>ヨリ</sup>三<sup>ニ</sup>氏<sup>ニ</sup>至ル小兒ハ四分<sup>ノ</sup>氏<sup>ノ</sup>一ヨリ半<sup>ノ</sup>氏<sup>マデ</sup>沙糖ヲ加ヘ或

ハ丸藥トシ用レバ吐セズ。散劑ハ水葡萄酒。玫瑰<sup>コ</sup>昆<sup>シ</sup>設<sup>セ</sup>爾<sup>ル</sup>弗<sup>フ</sup>等ニ和シ或ハ適宜ノ飲液ニ溶<sup>ト</sup>シ用フベシ。然<sup>レ</sup>ハ空心ニ服スレバ吐スルヲアリ。胃ノ感動シ易キ人ハ沙糖ヲ加ヘ食後一時<sup>ホト</sup>許<sup>ヲ</sup>經テ用フベシ。○胸ノ諸病ニ用ヒテ粘痰ノ肺ニ壅滯セルヲ稀豁ノ咯出セシム。故ニ喘息效嗽。胸水。及ビ燄衝ナキ傷冷毒ノ諸症ニ用ヒテ痰唾ヲ湧起シ良驗ヲ奏ス。○胸脇燄衝。肺燄衝ノ劇キ諸症燄熱等既ニ解散シ唯其滯著セル病毒ヲ衝動シ疏散シ治スベキ時節ニ用ヒテ良効アリ。麗春花<sup>フ</sup>泡湯<sup>ニ</sup>或ハ

葡萄酒ニテ送下ノ殊ニ良。或ハ冒寒傷冷毒ヨリ胸脇痛ヲ發シ較著ノ嗽衝ナク唯發汗ヲ治スベキ症ハ此藥ニ龍腦少許ヲ加ヘ用レバ微汗ヲ發メ治ス。乾效劇キ者ハ阿芙蓉少許ヲ加フベシ。○傷冷毒ノ乾效甚キ者。或ハ酷厲ナル粘液。肺。氣管ニ壅滯メ效ヲ發シ或ハ腹中諸藏ヲ壅塞アルヨリ頑固ノ效ヲ發スル症ハ是ヲ用テ痰ヲ湧起シ汗ヲ發シ凝結ヲ解キ大小便ヲ利メ殊効アリ。即左ノ方尤良。

芙蓉黃龍散

金硫黃 四匁 阿芙蓉 一匁

龍腦 二匁

精製者

右研和メ散劑トシ分テ四服トシ舍利別或ハ適宜ノ飲液ニテ一服宛用ル。日四次。○金硫黃ハ表發人蒸氣ヲ驅發シ血中ノ惡液ヲ排泄スルヲ以テ輕キ痛風。傷冷毒痛。及ビ瘰癧等總テ腺ノ壅塞ヲ疏散シ治スルニ良驗アリ。○喉風ノ嗽衝既ニ退クキハ左ノ劑ヲ用ヒテ咽喉ニ凝聚スル粘液ヲ疏散ノ捷効アリ。又痛風及ビ傷冷毒ノ諸症。瘰癧等ニ用ヒテ其毒ヲ驅除シ治ス。

金黃排毒飲

海葱蜜 瓜 各六錢  
過爾託亞 舍利別  
護謨 安沒尼亞 幾  
金硫黃 半錢  
右研和シ初ハ四分時一卵匙宛用ヒ爾後漸ク服度  
ヲ減ス○荏苒タル間歇熱ハ金硫黃半氏或ハ一氏  
宛日三四次用ヒテ良驗アリ或ハ亞爾鮮鹽若クハ  
孕礬酒石少許加ヘ用ヒテ殊ニ良○間歇熱及ビ頑  
固ノ三日熱發作時刻少モ變セサル症左ノ方尤良

芙蓉黃石散

芙蓉 各二  
阿芙蓉 各二  
蝟蛄石 一  
右研和シ分テ二服トシ發作ノ半時前ニ一服ヲ取  
テ適宜ノ飲液或ハ舍利別少許ニ加ヘ用ヒ。又發作  
ノ四分時前ニ一服ヲ用フ。間日ニモ右ノ如クニ  
毎日用レハ發作ノ時刻漸ク變メ熱解散ス○金硫  
黃ハ發汗ノ功アルヲ以テ頑固ノ瘡瘍疥癬等總テ  
皮病ヲ治ス或ハ水銀劑ヲ加ヘ用テヨク其毒ヲ驅

發ス○發斑熱或ハ痘瘡麻疹等ハ快發シ難キニ用  
 ヒテ血液ノ泡釀ヲ進メ蒸氣ヲ發シ涎唾ヲ湧泄シ  
 ヲク其瘡ヲ驅發メ煩躁ヲ解シ安眠セシム或ハ瘡  
 疹類ノ酷厲毒潛伏内攻メ發スル水腫ニ用テヨク  
 其毒ヲ驅逐シ治ス○頑固ノ萎黃病ハ此末一瓦格  
 碌屈斯ロククス末爾扶斯マールチス鐵ノ條  
 出ツ孕禁酒石酒石ノ條ニ出各十瓦研  
 和シ一服トシ毎日二服宛用テ良驗アリ。處女此病  
 ニ罹ル者ハ殊ニ良○痢症ニ用ヒテ間大効アリ。金  
 硫黃一瓦ヨリ三瓦マデ銀朱少許ヲ加ヘ一服トシ  
 毎日適宜ノ飲液ニテ服ス○健質亞那越幾斯劑甘

汞ヘ勿搗祭亞石子チア鹼ヲ適宜ニ加ヘ用テ肝。脾。腸間膜等  
 ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ粘液ヲ稀釋シ留飲ヲ驅除シ  
 久腹痛嘔吐。腹脹等ヲ治シ胃ヲ健ニス○内藏ノ閉  
 塞ヨリ起ル羸瘦病及ビ粘液留飲ノ壅滯セル經久  
 頑固ノ諸病ニ用テ間大効アリ然レ内藏ニ膿瘍ア  
 ル症肺瘍及ビ肝脾腸間膜等膿瘍アリハ害アリ。  
 テ勞瘵羸瘦病ヲ發スル者多シニハ害アリ。  
 斯ノ如キ衝動解凝ノ藥ハ其膿ヲ血中ニ驅逐メ膿  
 熱ヲ釀シ危篤ニ至レバナリ或ハ胸腹諸藏ノ輕キ  
 壅塞ヨリ發スル水腫ニ間大効アリ。是ニ鐵屑ト消  
 石ヲ加テ殊ニ良。然レ其壅塞頑固ニメ解シ難ク或

ハ血液甚ダ酷厲ナル症ニハ効ナシ○患者多血ニ  
 ノ壯熱焮衝アル者ハ是ヲ用テ害アリ。此症ハ清涼  
 ノ下劑ヲ與ヘ或ハ刺絡メ血液ヲ減スベシ。此藥ハ  
 血中ノ硫黃質ヲ融解シ血液ヲメ沸釀セシムル故  
 ニ焮衝病ニ用レバ血液更ニ沸騰シ血脉逾充脹シ  
 諸症ヲメ増劇セシムレバナリ○此劑ヲ製スル片  
 紙ニテ漚シタル刺水ハ外敷メ乾癬。白禿瘡。其他小  
 胞浸淫蔓延スル皮病ヲ治ス

**結爾茂斯密溼刺列**

**製法** 安質沒扭

剥篤亞斯精製者 各四弓

硫黃華洗淨者 一弓

右件極細末トシ合和メ坩鍋ニ内レ文火ニ上セテ  
 溶シ是ヲ鐵壺ニ内テ速ニ研末シ。沸湯五十弓ヲ磁  
 罐ニ盛リ是ニ右ノ末ヲ加ヘ手ヲ住ズ攪セ煮ル  
 八分時ニメ火ヲ下シ。暫ク靜定シ布片ニ漉紙ヲ襲  
 テ熱ニ乘メ漚過シ滓ヲ去テ放冷シ赤末其底ニ沈  
 ム候紙ニテ漚テ其末ヲ取り。又其刺水ニ前ノ  
 滓ヲ加ヘ煮テ前法ノ如クシ。水減スレバ適宜ニ加  
 へ放冷シ漚テ復其赤末ヲ取り。斯メ如ク數回ニメ

終ニ赤末少モ沈マザルニ至テ其末ヲ取り集メ冷水ニテ數洗ヒ微火ニテ乾シ貯フ

**又法** 安質沒扭極細末

鱒蓬鹽二百二十五錢

水二貫五百錢

右鱒蓬鹽ヲ鐵罐ニ内レ水ヲ加ヘ煮沸シ安質沒扭末ヲ投シ煮ル四分時餘ニテ瀝テ其液ヲ取リ磁孟ヲ沸湯上ニ置テ熱セシメ是ニ其液ヲ内レ靜定スル十二時ニテ瀝テ其底ノ末ヲ取り水ニテ洗ヒ微火上ニ乾シ貯フ

**又法**

安質沒扭極細末

剥篤亞斯精製者

水適宜

右調和シ鐵壺ニ内レ煮一時半其液ヲ八比ト爲シ温ニ乗メ紙ニテ瀝テ滓ヲ去リ放冷スレバ其底ニ赤末沈ム。又紙ニテ瀝テ其末ヲ取り其刺液ニ前ノ滓ト水ヲ加ヘ煮テ末ヲ取ル前法ノ如クシ數回斯ノ如クメ終ニ其末少モ沈セザルニ至リ其末ヲ取り集メ水ニテ數洗ヒ乾シ貯フ

**主治**

金硫黃ニ比スレバ安質沒扭ヲ含ム多クメ

遠西醫方名物考卷十五終

性功尤峻ナリ。故ニ服量稍多ケレバ吐シ或ハ瀉ス。  
 感動シ易キ人ハ少許用ヒ。或ハ先ヅ金硫黄ヲ與テ  
 効ナキ片ハ此藥ヲ用フベシ。○此藥二氏マデ用フ  
 ベシ。胃ノ感觸シ易キ人ハ半氏ヲ用ヒテ吐スルナ  
 アリ。但レ亞刺比亞アラビヤ護ゴムヲ加ヘ用レバヨク其毒ヲ抑  
 制シ服量多シト雖モ吐スルナシ。  
(依) (戻)

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭和蘭醫學範提綱棟齋宇田川先生著 全三冊  
 內景內景醫學範提綱棟齋宇田川先生著 全三冊  
理學入門植學啓原宇田川榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖同上 全一帖  
 舍密開宗同上 全五冊

增補和蘭藥鏡同上 全八冊  
 醫療正始沖齋伊東先生著 全十五冊

遠西醫方名物考同上 全十冊  
 泰西名醫彙講熱川眞作先生著 全六冊

同 補遺同上 全九冊  
 要術知新玄軒大槻先生著 全三冊

瘍醫新書玄澤大槻先生著 全四冊  
 西音發微同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町三丁目



