

遠西醫方名物考

幾左

卷十九

松
科
別

✕
e 13



富士川文庫
3310

499, 2
E-4
7

12e13

No. 1402

榛齋宇田川先生著

七篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

遠西醫方名物考標目

卷十九

左撒爾非亞

珊篤里

薩撒弗刺斯

薩毘那

薩毘那油

山萸菜精

山萸菜昆設爾弗

雜腹蘭丁幾去爾

珊篤里丁幾去爾

薩撒弗刺斯油

薩毘那通經散

山萸菜精

山萸菜昆設爾弗

雜腹蘭膏

遠西醫方名物考

標目

風雲堂藏

碎米薺昆設爾弗

雙鸞菊越幾斯劑

撒瓦百奴謨

撒兒末爾扶斯

再留綠蓉油

幾那

形狀圖

質 禁戒

患者資稟

雙鸞菊酒

酸乳清

撰品

遠西醫方名物考卷十九

左

遠西醫方名物考卷十九

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

撒爾非亞羅

形狀 是一種ノ香草ナリ。高共一二尺許。方莖叢生シ

硬クノ木ノ如ク。粗糙淡綠色。毛茸アリ枝多クメ

換ス 一種灌木様多枝 葉小梗ヲ取テ莖枝ニ兩對ス

此草。葉ノ潤狹ニ由テ二種ニ分ル。潤葉ノ者ハ橢圓

ニメ末尖ラズ排草葉ノ如シ狹葉ノ者ハ尖テ柳葉

ノ如ク或、葉ノ梗ニ小葉兩對メ耳ノ如ク有、二種ニ

硬ク厚ク粗糙。其脉理背ハ隱起シ面ハ溝路ヲ爲シ
 自ラ紋皺ス。毛茸及鋸齒アリ。或ハ鋸齒ナキ種類モ
 アリ。其色淡綠或ハ灰白或ハ紫色ノ者アリ。但脚葉
 ハ種々變色アリ。○一種葉黃綠斑駁或ハ白綠斑紋
 アリ或ハ皺紋ナク滑澤ノ者アリ或ハ槇楂葉ニ似
 テ稍長ク厚ク摩スレバ粗糙ニシテ細沙入ルカ如ク
 帶白色ノ者アリ皆芳烈竄透味苦辛。舌ニ徹シ微收
 瀋ス。六七月頃碧色芳香ノ唇花ヲ開キ層々莖枝ノ
 梢ヲ圍テ穂ノ如シ其瓣末濶ク上唇内ニ勾リテ窪
 ミ三齒ヲ爲シ。下唇モ亦三四齒ヲ爲シ。邊ニ皺アリ

一種白花或ハ紫花ノ者アリ萼尖テ五叉ヲ爲シ一
 心蕊長絲ノ如シ。四鬚蕊アリ鑿頭狀ニシテ二蕊ハ差
 短シ花後萼底ニ四房ヲ結ビ内ニ四個ノ圓子ヲ藏
 ム。茶褐色或ハ黯黑色ナリ根鬚ノ如シ。年ヲ經テ枯
 レズ。地ヲ擇バズ培養ノヨク長育ス。○或云此草香
 氣微龍腦ニ似タリ。是ヲ蒸餾スレバ精微ノ油出ヅ
 是ヲ抄ヒ取り其水ヲ放冷スレバ龍腦ノ如キ者罐
 底ニ凝結ス。○此草多ク歐羅巴洲ノ南地ニ生シ。支
 那ニ產セズ。故ニ歐羅巴人貴價ヲ以テ是ヲ支那ニ
 販ク。下猶支那人ノ茶ヲ以テ歐羅巴ニ販クカ如シ

故^ニ和蘭人其福撈察^{歐洲國名}人海邊^ニ產スル者ヲ
 買集メテ支那^ニ輸ス。支那人是ヲ得テ特^ニ自國ノ^ニ
 方ラズ是ヲ[○]日本^ニ貨ノ貴價ヲ購ルト云^{裝物}
 ○按^ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用^ル
 心[○]淑^云撒爾非亞^{内服外用}ニ性功迷迭香ノ
 如シ但迷迭香^ニ比スレバ驅熱殺蟲利胸ノ効ア
 リト。即迷迭香ヲ代用ノ可ナリ○榕按^ニ右譯說
^ニ所謂潤葉ノ者ハ藿香^ニ近シ^{本邦藥舖ニ青葉}
 時珍綱目藿香條集解禹錫曰葉似水蘇。時珍曰葉
 如^{フチバカ}都良。此亦撒爾非亞ノ潤葉ノ者^ニ似タリ。又禹

錫曰。藿香。出海邊國。南方草木狀云。出交阯九真武
 平興古諸國。唐史云。頓遜國出藿香。是即チ右ノ譯
 說^ニ此草支那^ニ產セズ唯西洋人は是ヲ支那^ニ貨
 スト云^ニ符ス^{海國藥材}
 主治 葉及^花性温。微收瀋。揮發鹽及^拔爾撒^撒謨^樣ノ芳
 香竄透ノ油アリ。多ク葉ヲ藥用トシ。狹葉ノ者ヲ上
 好トス○神經ヲ健運シ壅塞ヲ開達シ衰弱ヲ強壯
 スル要藥トス。故^ニ頭腦心胃子宮ノ虛弱^ニ因ル諸
 症ヲ治ス○葡萄酒或ハ水^ニ浸シ用テヨク發汗ス。
 綠礬精ヲ加テ尤^モ効アリ○飲食消化シ難ク或ハ痞

氣鬱滯妨悶。心腹痛。疝痛。効ヲ稱ス。○頭眩。癩。昏睡。非。肢節顫振。睨動。搖掣。子宮衝逆等ノ神經病ヲ治ス。○傷冷毒。痰欬。喘急等胸ノ諸症ニ驗アリ。○水腫。風氣腫。脚痛風ヲ療シ小便ヲ利ス。○血液虛損ニ因ル經閉或ハ崩漏。白帶下。諸失血過多ヲ治ス。○腐敗ヲ除キ虻蟲ヲ殺ス。○羸瘦病。虛冷ノ諸症。老人ノ病ニ多ク用フ。○葉。生乾片ニ飲膳羹汁等ニ加ヘ香味ヲ賞ス。○泡湯水煎或ハ麥酒。葡萄酒ニ浸シ或ハ煮テ用ヒ。或ハ乳汁ニ煮テ桂末ヲ加ヘ服シ或ハ昆コシ設セツ爾ニ弗フトシ或ハ蒸餾ノ露水。精油。煎油トシ施用ス。爾ニ弗フ設セツ爾ニ

及ヒ水。精油ノ蒸餾法。薄荷ノ條。説ク所ト同シ。煎油ハ加カ密ミ列リ煎油法ト同シ。○外用ノ口中潰瘍ヲ淨刷シ鷺口瘡失シ芍シヤク兒ニ陪ト苦クノ齒斷腐爛ヲ愈シ。傷冷毒ノ咽喉腫或ハ腐穢惡臭ノ咽喉腫壞疽様ノ症ヲ治シ涎唾ヲ湧起シ頭痛ヲ治ス。葉ヲ嚼カ含ク或ハ水ニ浸シ或ハ水煎ヲ漱藥トス或ハ其症ニ隨中ニ和鹽ト類。醋。明礬。蜜等ヲ和シ施メ良。○鼻中ニ吸引メ嚏セシム。○外敷ニ又腐敗ヲ遏トメ打撲傷。狂犬咬傷。毒螫ヲ治ス。依ニ叔ニ襲ニ物ニ叔ニ依ニ福ニ遇ニ按ニ

珊サン篤ト里リ 羅ラセンタウリムニス羅ラケレイ子サントリ蘭ラン

〔形状〕此草細莖ヲ抽、五六寸許。滑澤ニノ固ク微稜アリ。葉細、長クメ末尖リ長一寸許。潤四五分許。滑澤緑色。三縱理アリ對生ス。莖梢小枝ヲ分チ筒様五出ノ小花叢生シ末尖ハ小焦黄色ナリ或ハ肉色或ハ白色或ハ淡紫。或ハ淡紅或ハ碧色等アリ。萼亦筒様五出ニメ末尖ル。花後蒴ヲ生シ細長ニメ大麥粒ノ如シ熟スレバニニ剖テ内ニ微細子充ツ。根小。鬚多シ。沙地荒野瘠土ニ生ス。五六月花開ク。宿根ス。○一種甚矮小ニメ枝多者アリ或ハ白花ニメ穗ヲ爲者アリ

○此草莖葉花ニ香氣ナク味苦シ。但根苦味ナシ

○按ニ此藥和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ〔福〕云。性功遇爾鮮及ビ葛爾儒別涅實屈室

〔同〕トシト ○榕按ニ此草形状ノ說略當藥ニ似タレト船來ノ品ヲ見ルニ花葉莖根ニ當藥ト異

關大味又當藥ハ根ヲ藥用トシ其味極テ苦シ。珊篤

蜂里ハ根苦味ナクメ藥用トセズ又莖葉ノ苦味モ

黃當藥ノ如ク甚シカラズ ○此藥若シ關ルニ遇ハ

亞爾鮮ヲ代用スベシ

〔主治〕性温苦。粘稠ヲ稀釋シ汚液ヲ淨刷シ。稍強壯ニシ健胃ノ良藥トス ○膽液。粘液。留飲ヲ驅逐シ飲食

ヲ進メ汗ヲ發ス。○聞歇熱ヲ治シ殊ニ其發作次序
 ナキ症ニ効アリ。○凡内藏壅塞ヨリ發スル荏苒々
 ル病ニ多ク良驗アリ。○粘液壅塞ヲ驅除シ萎黃病
 黃疸。痛風。肝脾壅塞。失苟兒シケッル陪苦ボイク。經閉。又治シ蛇蟲ヲ
 殺ス。○體質弛弱ニメ痞氣鬱蓄ヨリ發スル衝逆苦
 悶ヲ治ス。○花。葉。莖。氏ニ用フ。泡湯。浸劑。水煎。散劑ト
 シ或ハ燒酒ニ浸シ或ハ越幾斯劑。丁幾劑トシ尤良
 珊篤里丁幾去爾 葉用 製法健質亞那。丁幾去爾ト同
 珊篤里越幾斯劑 葉用 製法蒲公英。越幾斯劑ト同

薩撒弗刺斯サツサフラス 羅

ヘンケルホウト蘭

茴香木義

○榕按ニ是レ一種ノ香木ニシテ先輩三極烏藥ニ
 充ツ是レ烏藥及ビク口モ和名一種ナリ。林娜チナ
 私西洋名本草圖說ヲ考ルニ薩撒弗刺私葉ノ形ハ
 三極烏藥ノ葉ニ髣髴タレ且其木理密キメ白色
 且香氣微ナリ。舶來ノ品ヲ見ルニ木理粗キメ赭
 色ヲ帶ヒ香氣強シ。是レ同一種ナレ且地方ノ寒
 暖ニ因テ異ナルカ未ダ穩當ナラズ又按ニ烏藥
 ハ老利兒ノ一種ニシテ氣味略薩撒弗刺斯ニ近シ
 林娜私ノ說ニ薩撒弗刺斯ヲ以テ老利兒ノ第十

一種トス又左ノ譯說ニ暖國ニ産スル者ハ葉ニ
又ナク狭ク薄ク或ハ老利兒ラウリール葉ニ似テ小ナル者
アリト云然レバ此樹略カ烏藥ニ近シ又

形状

此樹幹脩直梢ニ至テ枝極ヲ分ツ樹皮厚ク皺

アリテ灰色裏面赭色ヲ帶ブ木材ハ輕ク赭色味苦
辛香氣茴香ニ似タリ故ニ一ニ茴香水ト名ク然レ
其香根ニ比スレバ劣レリ○根黯赭色味苦辛ニ
甘ヲ帶ブ其質柔ニメ輕シ是ヲ薩撒弗刺斯木ト名
ケ塊節様ノ大ナル片材ヲ輸ス香氣強クメ皮ヲ被
フ者ヲ上好トス皮皺アリテ鐵鏽色香氣尤多シ○

此樹ノ嫩葉ハ梨葉ノ如シ長スレバ多ク三桮ヲ爲

シ蜜果イチゴク葉ニ似テ稜アリ但其又淺深多少アリテ一

様ナラズ暖地ニ産スル者ハ又ナク狭ク薄ク或ハ

老利兒ラウリール葉ニ似テ小ナル者アリ葉面暗緑背白色ヲ

帶ビ生乾ルニ香氣アリ花單瓣五出或ハ六出オホク幾多

攢簇ス是ニ雌雄アリ雌花ハ一心蕊六鬚蕊アリテ

實ヲ結ブ雄花ハ心蕊ナク九鬚蕊有テ實ヲ結バズ實

ハ老利兒ラウリール實ノ如クメ微長ク皺アリ長梗ニ著ク○

北亞墨利加洲及印度地方ノ海邊ニ生ス林リナ娜私是

ヲ老利兒ラウリールノ第十一種トス○或ハア子イヌホウト

香水ノ名ヲ以テ是ニ雜テ偽リ販ク者アリ然レ其偽品ハ重ク堅クノ華爾斯多キヲ以テ知ルベシ或ハ松樅等ノ片材ヲ取テ茴香ノ煎湯ニ淹シ販ク者アリ宜ク審ニ擇ニ辨スベシ

主治根及ビ木材皮皆藥用トス○性温竄透ス。精微揮發ノ油鹽ヲ含メリ○蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ粘液ヲ稀釋メ血中ノ惡液ヲ排泄ス。又壅塞ヲ開通シ風氣ヲ驅散シ疝痛ヲ治ス○是ヲ水煎スレバ油ニ粘液交ハリ出ヅ。此藥ノ効力專ラ是ニ在リ。内服ノ血中ノ酷厲毒ヲ表發ノ蒸氣ト汗ヨリ驅發ス

ル要藥トス○血液ヲ稀薄シ病毒ヲ排泄ノ淨除ス。故ニ痛風脚痛傷冷毒冒寒ノ諸症ヲ治シ水腫徵毒疥癬ニ偉効ヲ稱シ瘡毒内攻及汚穢腐爛ノ潰瘍小疹細皰等ヲ療ス○水煎泡湯浸劑散劑トシ用フ。水ニ浸セバ香氣出ヅ。燒酒ニ浸セバ味出ヅ○甚感觸シ易キ人ハ此藥ノ香竄ニ堪ズノ頭痛ヲ發スルアリ。斯症ハ慢火ニテ水煎シ其香氣ヲ升散シ減メ用レバ其患ナシ。泡湯トシ用レバ香氣尤甚ダシ○木材ハ揮發精微ノ油鹽多シ○實ヲ焙リ搾リテ油ヲ取リ擦藥トシ施メ痛風ヲ治ス

度叔淑按
裴伍依

薩撒弗刺斯油 「オレウム、サッサラス」 羅

製法 薩撒弗刺斯 木屑、適宜○或云、皮亦蒸餾シテ油ヲ製ス、香氣尤佳

右水ニ浸シ煖處ニ置テ十四日ニメ格兒弗ニ内レ

蒸餾ス。即チ薄荷油製法ト同シ此木屑一匁ヨリ油

三錢出ツ此油重キ故ニ沈テ露水ノ底ニアリ

主治 薩撒弗刺斯ノ性功專此油ニ在リ。故ニ少許ヲ

用テ多ク薩撒弗刺スヲ服スル功カアリ○此油十

滴許ヲ沙糖三錢ニ研和シ分テ五服トシ八分時ニ

六服宛大麥煎ニテ送下シ峻効ヲ發汗藥トス 亞依

要藥中ノ此藥ハ昔ハ毒ヲ排スル藥トシテ用テ

薩毘那羅

「ヒニペリタス、サビーナ羅、セーヘンボム蘭」

形狀 是一種ノ灌木ナリ。林娜私名人是ヲ杜松ノ第九

種ニ屬ス。二種アリ。第一種ハ葉、御柳葉ニ似テ勁硬。

尖刺ノ如シ。二葉宛著、二針松ノ如シ。香氣アリ。第

二種ハ葉、側柏葉ノ如シ。共ニ四時緑。味辛苦。花杜松

花ノ如ク猫兒ニ細線ノ如ク枝梢ニ生ス。但花ハ

實トナラズ實ハ別ニ幹枝ニ生シ杜松實ノ如シ初

緑。熟スレバ青黒或ハ黯赭色トナル内ニ數核ヲ藏

ム。稜アリ味辛。香氣アリ或云。實ヲ結バザル者ヲ雄

木トス。實ヲ結ブヲ雌木トス木材赤色ヲ帶ブ○此

樹波爾カボ杜瓦爾トワ爾ル意イ太里亞タリヤ
共ニ歐羅巴洲國名止白里亞細亞洲
 其他亞細亞洲地方ニ産ス。和蘭ニテハ園ニ培養ス

○按ニ此樹和漢産未ダ詳ナラズ但本邦ニ舶來ノ第一種ヲ栽培スル者多シ

主治 第一種ノ葉ヲ藥用トス性熱味辛。竄透ノ油アリ。子宮及腹部諸器ノ血脉ヲ衝動鑽透ノ婦人月經ヲ驅泄スル峻藥トス。故專經閉ヲ通スルニ用又胞衣死胎ヲ下ス○經閉ヲ通スルニ左ノ劑殊効アリ

薩毘那通經散

薩毘那葉

亞爾鮮穗

各四弓半

良薑 三錢 老利兒實 一錢

泥菖根 一弓

右各粗末トシ調勻シ分テ二劑トシ一劑ヲ取テ茴香水ニ比ニ浸其液ヲ取テ二三匙宛服スル日二次或ハ三次。若シ効ナキ者ハ又一劑ヲ服ス○薩毘那ハ辛熱ニシテ甚刺戟衝動スル故ニ經閉ノ婦人壯實熱性多血ニシテ體質健固ノ者ニ多用シハ血液沸騰激迫スルト甚メ上衝頭痛眩暈シ或ハ吐血衄血ヲ發スルトアリスノ如キ婦人ハ先刺絡ヲ施シ清涼疏滌ノ藥劑ヲ投シ其血ヲ減殺メ後此藥ヲ用テ

經閉ヲ通スベシ。或ハ體質薄弱ニ入多ク良血ヲ釀成スルヲ能ハズ。血常ニ虛乏シ經血自子宮ノ血脉ニ盈滿スルニ足ラズ。經閉ヲ爲者アリ。此症ハ滋養強壯ノ藥劑ヲ長服メ血ヲ補充シ竟日血脉ニ盈滿スルニ至レバ月經自調順ス。此症ニ薩毘那ヲ投スレバ奇ニ効ヲキメニナラス徒ニ其血ヲ驅逐メ酷厲ナラシメ更ニ諸症ヲ誘發ス唯此藥ハ血脉纖維弛弱縱緩メ血液壅滯シ粘液過多ニメ感觸少キ人ノ經閉ニ良驗有。○孕婦ハ此藥ヲ禁ス。動モスレバ墮胎スレバナリ。或云。是ヲ一孕婦ニ與ルニ墮胎セ

ズノ吐血ヲ發セリト。是壯實多血ノ孕婦ニ用テ暴ニ血液ヲ驅逐シ其血大ニ酷厲ニナリテ血脉ヲ穿破シ此症ヲ發スルナリ。○此藥ヨク小便ヲ驅泄ス。故ニ水腫小便閉。黃疸。石淋等ニ稱シ用フ。○痛風ニ内服シ或ハ外敷メ驗多シ。○喘急ノ粘痰湧盛セル症。或ハ腸間膜壅塞メ拘痛スルニ効アリ。○水煎シ或ハ散劑トシ服メ蛇蟲ヲ殺ス。○内服シ或ハ外敷メ腐骨疽。壞疽。經久頑固ノ瘡瘍ヲ治ス。○葉ヲ剉シ水煎シ用フ。或ハ葉四錢ヲ水十六多ニ浸用フ。或ハ葉ヲ細末トシ半月ヨリ一月マデ日ニ二次或ハ三次

用フ或ハ半錢宛日ニ二次用フ或云此末辛熱甚故ニ
 每服十氏ニ過ルヲ勿レト○木屑モ亦効アリ水ニ
 浸シ或ハ煎服メ經久ノ肢節痛ヲ治ス。發汗ノ煎劑
 ニ加用テ尤良○葉ノ末辛熱燒カ如クナル故ニ輕
 キ腐蝕藥トシ潰瘍ノ腐肉。水綿様肉。微毒ノ疣贅息
 肉等ニ外敷メヨク消化シ又是ヲ齒痛ニ搽メ速効
 アリ○此末ヲ冰糖ニ研和シ角膜ノ星翳ニ點メ消
 散ス○葉ヲ水煎シ疥癬ノ洗藥トシヨク乾愈ス。赤
 降汞ヲ加テ殊良○或云。此藥ハ甚熱性ニノ酷烈ナ
 ル故ニ經閉ニ是ヲ用テ害多シト。然レ其酷厲毒。即

此偉効ヲ奏スル主能ニノ醫家的當ノ症候ヲ鑒識
 シ服量ヲ斟酌ノ用レバ毫モ害アラズ
 薩毘那油 オレウム。サビナ羅

叔物
 依福伍

製法 生鮮ノ葉ヲ採リ蒸餾ノ油ヲ取ル其法薄荷

油製法ト同シ。葉二十九比ヨリ油九多出ツ

或云木材ヨリモ油ヲ取ル材屑
 三十二比ヨリ油四錢許出ツ

主治 辛熱鑽透シ極テ衝動驅逐メ經閉ヲ通スル藥

トス。粘液過多ニノ感觸少キ人ノ痛風及經閉ニ用
 元運氣ヲ揮發シ血液ノ運行ヲ進輸ノ經血ヲ通暢
 ス○服量一滴ヲ沙糖ニ和シ服スル一日三次。或ハ

通經ノ散劑若クハ丸藥ニ加ヘ用フ○此油ヲ綿ニ
滴シ齶齒ニ挿テ其痛ヲ消ス

山萸菜精

スビリス。コクレアリ。ア
ケイス。ト。ハン。レー。フル。ブ。ラ。ド。蘭

製法

山萸菜 莖葉穂生鮮者 燒酒 十五度者
四北

右格兒弗ニ内レ蒸餾メ精ヲ取り十度ニ至ル

篤兒ヲ以テ其精ヲ測リ十度ニ至ルマデ蒸餾スルナリ

主治 揮發油様ノ液ヲ含リ○失苟兒陪苦ヲ治スル

要藥トス凝體諸器ノ虚弱弛緩及壅塞ヨリ發スル
失苟兒陪苦並粘液質ヨリ發スル諸病ニ偉効アリ

○虛冷ヲ温煖シ竄透開達シ風氣ヲ驅散シ粘液ヲ

稀釋シ汗ヲ發シ小便ヲ利ス。故萎黃病。粘液腫。水腫。黃

疸ヲ治ス○脾病。鬱憂病。疝痛等用テ鬱塞ヲ開達シ

其痛ヲ消ス○此藥ハ寒性ニノ粘液多クニ驗アリ。

熱性乾燥ノ者ニ用テ血液ヲ衝動メ熾熱ヲ發ス。故

熱ヲ兼症ニハ清涼劑ノ飲液ニ加用テ良○失苟兒

陪苦ニ因テ齒齩腐爛膿潰出血等ノ症アルニ數是

ヲ塗リ或ハ漱藥トシ施メ殊効アリ

山萸菜昆設爾弗コンセルブハハンニフルズライド蘭

製法

山萸菜葉 生鮮者 適宜

沙糖 淨白者細末。山萸菜葉ノ三倍
但葉ノ津液少キ者ハ一倍

右葉ヲ剉云石臼ニ内レ木杵ニテ搗爛シ泥ト爲シ

沙糖ヲ少許宛加ヘ攪セヨ久合和スルニ至テ壺ニ

入レ固封シ冷處ニ貯フ 〔按〕

主治 失苟兒陪苦等其他諸症ヲ治スル丁山萸菜精

ノ如シ○山萸菜ハ水煎スレバ氣味脫失ノ効ナシ

然レ其精及昆設爾弗ト爲バ氣味暫ク消散セス 〔依〕〔叔〕

雜腹蘭 丁幾去爾 〔テインキヲラ。コロク。ス。羅。〕

製法 雜腹蘭 一多 燒酒 十五度者 十五多

右硝子壘ニ内レ固封シ浸ス丁八日紙ニテ漚シ滓

ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ 〔按〕 其處山萸菜

主治 蒸氣及汗ヲ發、病毒惡液ヲ皮表ニ驅發ス○惡

性ノ痘、潜伏内攻ノ危險諸症ヲ發スルニ用テ速排

泄シ其諸症ヲ治ス。此液二十滴許ヲ取テ葡萄酒等

ニ點服ス。其他瘡疹類、内攻セルニ用テ良驗アリ 〔依〕〔叔〕

雜腹蘭膏 〔エム。ガラス。ト。ル。ム。〕 蘭 〔セ。ム。羅。〕

製法 黃蠟 一 比 滿

瓦爾拔奴謨 各半 的列並底那

沒藥 細末 鵝栗拔奴謨 細末 各三多

雜腹蘭細末

右蠟。諸瓦爾拔奴謨。文火ニ燂化シ餘藥ヲ下シ煉和ノ硬膏ト爲ス叔

主治 外敷ノ一切堅硬結腫ヲ軟化シ痛ヲ止。肉腫及

小兒臍ノ突起等ノ漸長スルヲ消シ骨傷捫挫ヲ愈

關節痛ヲ甘ゲ神經ヲ強壯シ流走痛ヲ驅散ス叔底

碎米薺昆設爾弗コシセルフハ以テトルケルス蘭

製法 碎米薺生鮮ノ莖葉ヲ採リ製ス。其法山萐菜

昆設爾弗ト同シ叔

主治 失苟兒倍苦ノ諸症ヲ治シ閉塞ヲ開達シ汚液

ヲ淨刷シ清血ノ効ヲ稱ス。又小便月經ヲ通スル等

山萐菜昆設爾弗ト同シ叔

雙鸞菊越幾斯劑エキスタラクトアコニエムナベ

製法 雙鸞菊草生鮮者適宜

右雙鸞菊ノ花候前ニ莖葉ヲ採石臼ニ内レ搗爛シ

布袋ニ内レ絞テ汁ヲ取磁鍋ニ内レ文火ニ上徐々

煎熱夕稠厚下爲シ放冷ノ後此草ノ莖葉ノ乾末

右ノ絞汁ノ四分一ノ量ヲ攪和ノ越幾斯劑凝結ノ丸藥ト爲ベキニト爲シ壺ニ收メ固封シ貯ス按

主治 性熱發汗ノ峻効アリ。又小便ヲ利ス。凡痛風脚

痛風傷冷毒痛拘強不遂及微毒諸險症腫痛瘡瘍等

ノ沈痼頑滯ノ諸藥驗ナキ者ニ用テ偉効ヲ稱ス

痛及狂ニ用テ間奇効アリ○此藥ハ患者多血ノ候

ナク熱ナキ症ニ的當ス然レ總テ痛風様ノ頑固ノ

痛アリテ熱ヲ兼者此劑ニ消石ヲ加用テ劇痛速

ニ退キ大ニ發汗ノ瘥ル者多シ○頑固ノ間歇熱ノ

粘液多キ症或婦人經血過多帶下經久治セザルニ

用テ間良驗アリ○此藥ハ大毒アル故ニ每日半匁

或一匁ヲ用ヒ漸加テ五六匁或十匁ニ至ル或云

下劑ヲ用ヒ胃腸ヲ淨刷ノ後夜中此藥一匁ヲ與翌

夜二匁ヲ與第三夜四匁ヲ用其間若シ瞑眩スレバ

後服ヲ止或ハ是ヲ用テ兩回ニメ痛風傷冷毒痛流

走痛等全治スル者アリ或ハ感動シ難キ人ハ第四

日ノ夜七匁ヲ與テ効ヲ取テアリ○或ハ病症ニ

隨ヒ阿芙蓉失鳩答シキツタ金硫黃甘汞等ヲ擇テ此藥ニ加

丸藥トシ用テ奇効ヲ取テアリ頑固ノ微毒諸症ノ

如キハ殊ニ驗多シ○此藥ノ方劑甚々多シト雖モ

右説ク所ノ諸病ヲ治スルニ左ノ方極テ驗アリ

雙鸞菊酒

雙鸞菊越幾斯劑

安質没扭酒

安質没扭ノ條ニ出

右調勻シヨク溶化シ十滴宛用ル下日四次其後漸

服量ヲ加フ○此越幾斯劑ヲ製スルニハ武火ヲ以

テ速ニ煎熬スレバ精微ノ藥氣逆散ノ功力脱失ス

失鳩答。莨菪等モ然止此根毒殊烈葉毒少ナシ又雙

鸞菊ハ野生ニノ葉ヲ嚼片ハ口舌忽チ焮熱腫痛ス

ル者ヲ採リ用ベシ園庭肥土ニ生スル者ハ功力劣

レリ。此兩件ニ意ヲ用ヒガレバ此劑峻効ナシ

依福 淑技

撒瓦百奴謨

羅蘭 通稱

是ハ百兒西亞西里亞等ノ印度地方ニ産スルヘリ

ラ。サガベニヘラト名クル一種ノ草

高廿八尺許形

云トヲ鑽刻ノ取ル越謨華爾斯ナリ

其質越謨多ク

ニ水ニハ多ク溶解シ

○二種アリ第一種ハ顆粒ヲ

爲シ大榛子或胡桃ノ如ク其質蠟ノ如ク淨潔ニ

汚物ヲ雜ヘズ淡黃或赤色ヲ帶フ但裏白色ヲ帶テ

稍透亮ナルハ上品トス小刀ニテ刮レバ帶白色ノ

屑ト爲ル。手ニ握温レバ柔ニノ粘著ス。火ニ投ノ溶
 ケズ燃テ烟ヲ生ス。○第二種ハ大塊ヲ爲シ黄赤ニ
 ノ裏白色ヲ帶ブ但黯赭色ニノ汚物ヲ雜ルハ下品
 トス。○二種共ニ味苦ク其氣不佳ニノ竄透シ瓦爾
 技奴謨及阿魏ノ如キ臭ヲ帶ブ。其質亦同種類トス
 〔主治〕性功殆ト瓦爾技奴謨及阿魏ノ如シ。粘液ヲ疏
 解ノ排泄シ神經ヲ强健ニシ汗ヲ發シ大便ヲ利シ肺
 肝脾。腸間膜ノ壅塞ヲ開達シ經久ノ欬。水腫。非。痛。瘰。
 子宮衝逆ヲ治シ小便ヲ利シ月經ヲ通ス
 〔依〕〔収〕〔叔〕

幾

幾那一コルクテクス。ペルヒアニス羅一キーナバスト一又
 コルクツ。バスト一又一ペルヒアニス一セ一スコルス一蘭

〔形状〕幾那ハ南亞墨利加洲ノ字露一國ノ山地ニ産ス

ル一種ノ樹皮ナリ。幹ノ太サ人股ニ過ギ。最大ナル
 ハ人體ニ過グト云。然レ古來和蘭ニ輸ス者ハ最大
 ナルモ腕大ニ過ズ。枝葉多シ葉ハ梨。梅。李。等ノ葉ノ
 如シ梗アリテ枝ニ對生シ面黯綠色ニノ皺ナシ背
 毛茸アリ花赤色筒様五出。末披キ茉莉花ニ似テ瓣
 端毛狀ヲ爲シ五蕊アリ。蕊頭圓珠ヲ爲ス。萼亦筒様
 略五出ニ夕小ナリ細梗アリテ攢簇ス。花後卵圓ノ
 莢ヲ結ビ熟スレバ自ラ披綻メニツニ分ル。中隔アリ

其内仁アリ扁圓ニ有榆子ニ似タリ
全形圖ノ如シ



撰品 此皮藥用ト爲ス者三種アリ
 第一種ハ尋常
 赭色ノ品ナリ
 又「**コルテクス**」**ペリス**ヒアリス
 スヒリス
 スキリス
 又「**キンコナ**」**ホヒシ**ナリス
 ス羅アリス
 ンセバ「**スト**」**蘭**上品ハ輕ク薄クノ厚五六釐ヨリ七
 ハ釐許固ク筒卷シ長指ノ如シ外面皺多ク粗糙灰
 色ニメ赭色若クハ黑色ヲ帶ビ白斑或ハ白色ノ苔
 アリ裏ハ赭色或云鐵鏽色破碎シ易ク其實鬆疏ナラ
 ズ絲線様ニ分裂セズ粉様ナラズメ緻密ナリ或云
 ノ光澤アル味頗ル苦ク差收瀟シ微香氣ヲ帶ビ或
 ハ上好トス或云一種ノ微臭アリ或云一種皮甚夕厚夕外
 烈或ハ收瀟甚キハ偽品トス○一種皮甚夕厚夕外

面黯色。其他氣味右ノ品ト同様ナル者アリ是ヲ「ギ」
 ナ。ハン。ギ。ア。ナ。ゴ。ト。名。ク。性。功。前。種。ト。同。シ。皮。厚。シ。ト
 雖モ其品右説ク如クナルハ皆用フベシ。○下品ハ
 皮厚ク硬韌ニ折レ難ク。摧折スレバ鬆疏ニシテ
 線ヲ束ル如ク分析シ或ハ朽木ノ如ク粉碎トナリ
 或ハ太ク厚クメ木片ノ如ク是レ幹ノ皮若クハ外
 皮滑澤白色ニメ赤ヲ帶ビ或ハ裏面淡黄若クハ灰
 白。或ハ黑色ヲ帶ビ或ハ蛀刺蠹敗シ或ハ苦味微ナ
 ク發辛ヲ帶テ粘滑或ハ惡ニ嫌フベキ苦味アリ或
 ハ香氣アル下桂ノ如ク或ハ絶テ黴臭ナキハ皆下

品或ハ偽品トス。○偽品ハ山毛櫸或ハ山楂類ノ樹
 皮ヲ取テ盧會汁ニ浸シ造ル。然レ其苦味眞品ノ如
 クナラズノ甚ダ收瀋シ外皮光澤アリ裏面赤色ヲ
 帶ビ其他眞品ニ比スレバ偽品自ラ分明ナリ。○細
 末トシ販ク者苦味微ナク黑色ノ點及ビ木様ノ細
 屑雜ルハ幾那ノ櫃中ノ碎屑。蛀敗ノ者ヲ集テ末ト
 スルナリ。○上品ハ水煎スレバ黯赭色トナリ冷レ
 バ赭色減シ濁リテ乳清ノ如シ其底ニ華爾斯様ノ
 渣生ス。或云下品ト雖モ華爾斯ヲ含ム者但黄幾那
 及ビ赤幾那出ツニハ上品ト雖モ右ノ徵ナシ。下品及

偽品ノ煎湯ハ種々ノ汚色アリ○幾那ヲ水煎シ若クハ水ニ浸シ用テ其滓ヲ乾カシ取ク者アリ。是ハ越幾斯劑煎熬ノ膏ト爲ト爲シ試ムベシ。上好ノ幾那四弓ヲ水煎ノ熬乾スレバ越幾斯劑製法後ニ出ツ或云上品許ヲ製スハ煎熬ノ越幾斯劑四分ノ一ヲ製ス其滓ヲ乾カシ取ク品ハ越幾斯劑ノ量甚ダ少ナシ○第二種ハ黃幾那ト稱スゴルテクス。ペルヒアニス。レリ。テウス。羅。ゲレキナ。又。皮扁厚ニノ材片ノ如ク或云筒卷厚サ三分許長一尺或ハ一尺半許外面滑澤或云滑澤ナラガレ其色大黃ノ如シ或云深黄色ヲ

帶或ハ赤色ヲ帶ビ或ハ黯赭ヲ帶ル者アリ。裏面淡黃質固ク破碎スレバ絲線様ニ分裂シ光澤及ビ微香氣アリ或云香竄第一種ニ比スレバ苦味多ク且收瀟ス然レ嘔スベキ氣味ナシ是ヲ服ノ胃中ニ停滯セズ其効殊ニ勝レリ是ヲ上品トス。但未トスレバ濕リ易シ○第三種ハ赤幾那ト稱スゴルテクス。ス。リュ。ブ。ラ。羅。外。面。淡。灰。色。皺。多。ク。ノ。垢。裂。シ。苔。アリ。粗皮ヲ去レバ黯赤色裏面ハ赤色ニシテ光澤アリ或云鮮赤或云黯赤ニシテ掛色ノ第一種ニ比スレバ質重ク且筒卷セル者アレ比多クハ大ナル厚キ扁片ヲ爲シ

裏面差窪ニ苦味收瀟多シ。香氣第一種ノ如シ。其質固ク華爾ス様ニメ破碎スレバ絲線様ニ分析ス。多ク華爾スヲ含ニ蒸餾スレバ精微ノ油出ヅ。効力第一種ニ倍ス。或ハ皮ニ木片著ク者アリ是ハ刮リ去ルベシ。右三種ノ樹ハ族ヲ同フノ種ヲ異ニスル者ナリ。以上三種凡其他種類多シト雖モ形色種々紛錯メ真偽ヲ鑒識シ難ク且姦商偽造ノ品多キ故ニ藥用トセス。

質製煉術ニテ幾那ノ質ヲ精究スルニ越謨華爾斯。

酸性鹽 此酸收ハ没食子ニ含メル酸收ト同シ故ニ是ヲガルトト曰フ。即チ没食子酸收

ナリ。土鐵粘液精微揮發ノ油少許ヲ含メリ此油アルヲ以テ幾那ニ香氣アリ。其首稱スベキ者ハ越謨ト華爾スナリ。○幾那ヲ蒸餾スレバ酸味ノ精液出ヅ。次ニ油出ヅ。或云幾那一比ヨリ○多ク幾那ノ體質ヲ成ス者ハ土ナリ然レ幾那ヲ燒ケバ土ハ自ラ其焰烟ニ乘ノ多ク升散スル故ニ甚ダ少シ幾那一比ヲ燒ケバ灰四錢殘ル。其淋灰汁ヨリ亞兒加利鹽ニ乃許出ヅ。其灰汁ノ塗ヨリ土二錢許出ヅ。此土著キ性功ナク強キ一比ヲ蒸餾ノ其滓ヲ燒キ淋杜制酸ノ効ナシ。幾那一比ヲ蒸餾ノ其滓ヲ燒キ淋灰汁ト爲セバ其塗ヨリモ亦土二錢許出ヅ。○鐵ハ

幾那質ニ混和スルト甚ダ密ニ多ク是ヲ分チ出
 シ難シ。但幾那ノ灰ニ水ヲ加テ灰汁ト爲シ熬乾シ
 其灰土ニ磁石ヲ接スレバ鐵ヲ吸引ス。大約灰土ニ
 月ヨリ鐵二氏出ツ○幾那ノ苦味ハ其越謨ト華爾
 斯ヨリ生ス。此二物ヲ去レバ其苦味消スレバナリ
 或云幾那ノ苦味ハ鐵ト○幾那ノ收瀉ノ味ハ其酸
 明礬性ノ土トヲ以テ成レ○幾那ノ收瀉ノ味ハ其酸
 性鹽ヨリ生ス。幾那ニ制酸ノ藥ヲ加レバ收瀉ノ味
 消シ酸性ノ品ヲ加レハ收瀉ノ味甚シケレバナリ
 ○越謨華爾斯酸性鹽ハ幾那ノ主効ヲ爲ス故ニ苦
 味ト收瀉トノ微ナル幾那ハ効力少ク殊ニ閑歇熱

ヲ治スル効ナシ。幾那ノ諸製劑モ多ク苦瀉ノ質ヲ
 含ム片ハ良効アリ殊ニ閑歇熱ヲ治スルニ尤モ功ア
 リ○或云幾那ノ煎湯ニ固性ノ亞兒加利鹽ヲ加レ
 バ滾動ス是レ酸性鹽ヲ含メル微ナリ是ヲ貯ルト
 半年許ニシテ芒ヲ結ブ。是レ其酸性鹽ト亞兒加利鹽
 ト抱合ノ中和鹽トナル者ナリ○或云幾那ノ効力
 ハ其含メル鐵ニ在リト。然レ幾那ニ鐵ヲ含ムト甚
 ダ少キ故ニ其主効ヲ爲スニ足ラズ。或云幾那ノ効
 力ハ多ク其酸性鹽ニ在リ故ニ是ヲ幾那ニ含ムト
 甚ダ多クノ腐敗ヲ防ギ閑歇熱ヲ治スル良効ヲ致

シ又其鐵質ト混和シ收瀉強壯ノ功ヲ為ス○右ノ諸説ヲ參考スレバ幾那ノ効力ハ其麴謨華爾斯酸性鹽鐵等ノ為ス所トス○或云幾那ニ含メル酸收ハ幾那ノ良効ヲ妨ル故ニ是ヲ除テ用ルヲ佳トス是ニ因テ内服ノ消化シ易ク少許用レバ尋常ノ幾那ヲ用ルヨリハ峻効アリ按ニ其酸性ヲ制シ收瀉揮發ノ滋固重滯セズ消化シ易シ故ニ幾那ノ收瀉ニ過テ害アル症ニ是ヲ用ヒテ良効アルヲ云然レハ是ニ因テ盡ク幾那ノ酸性收瀉其酸收ヲ除ク法ハ質ヲ奪除スルニ非ルナリ幾那末一弓ニ煨製麻倭涅失亞ノ條ニ出ヅ三錢ヲ加ヘヨク研和シ沸湯ハ弓ヲ加ヘテ搗磨シ漚過ノ

放冷シ硝子壘ニ内レ貯フ又法幾那ノ末ニ煨製麻倭涅失亞四分一ヲ加ヘ又再留燒酒少許宛加ヘテ研磨スルト八分時是レヲ慢火ニ上セ乾シ貯フ是ニ由テ幾那ノ華爾斯モ亦ヨク溶化ス○幾那一比ヲ取り燒酒三十度ニ比半ニ浸セバ華爾斯十錢許出ヅ或云四分一其滓ニ水ヲ加ヘ煎熬スレバ麴謨五錢許出ヅ幾那一比ヲ取川氷煎シ熬乾スレバ麴謨七錢許出ヅ其滓ニ燒酒ヲ加ヘ浸セバ華爾斯六錢許出ヅ○凡ソ險重頑固ノ諸病ハ赤幾那ヲ用ヒテ峻効アリ或ハ尋常ノ幾那ヲ用ヒテ驗ナ

キ症ハ黄幾那ヲ用ヒテ捷効アルコト多シ或ハ尋常
 ノ幾那ヲ用ヒテ痞悶腹滿等ヲ發スル者ニ黄幾那
 ヲ與ヘテ其症ヲ發スルコトナシ是レ味苦辛香竅氣
 多クノ消化シ易ケレバナリ 依云此品尋常ノ幾那ニ比スレバ價亦廉
禁戒 幾那ノ性効ヲ數知シ病性ヲ的識メ是レヲ用
 レバ幾多ノ險病篤疾ヲ救フコト普ク世ニ知ル所ニ
 メ左ニ舉ルガ如シ然レ病性ヲ辨セズ妄リニ是レ
 ヲ投スレバ害ヲ致スコト亦鮮少ナラス故ニ先ヅ其
 害アル諸病ヲ察スルコト一大要務トス ○胃腸ニ病
 毒汚物鬱蓄セル候アリ或ハ胸腹諸藏ノ壅塞硬結

アル者或ハ内外各部ノ焮衝一切壯實焮衝熱並ニ
 虚弱ニ屬スル焮衝ト雖モ初發ニ幾那ヲ用レバ大
 害アリ ○凡ソ凝體纖維強硬ニシテ血液稠厚若クハ
 膠粘凝固ノ細絡ニ運行シ難ク或ハ運行強盛急疾
 ナル症ハ幾那ノ如キ收瀰ノ藥ハ皆害アリ ○幾那
 ハ虚弱ヲ強壯スル良効アレバ患者ノ精力極テ虚
 脱シ危篤ニ至ル症ニハ此收瀰ノ藥ヲ用ヒテ挽回
 スルニ足ラズ 揮發衝動ノ藥ニ非レバ救フコト能ハザルヲ云揮發衝動藥ハ後ノ神經熱
ノ條ニ 或ハ病毒ヲ收固シ逾滞著ノ轉移セザラシ
 ム ○病毒烹熟ノ自ラ諸竅ニ分利排泄スル諸症ヲ

現ス時ニハ幾那害アリ此症ニ幾那ヲ用レバ自然
 良能ノ運營ニテ病毒ヲ排泄スル順機ヲ障碍スレ
 バナリ。然レ此時ニ方テ自然良能ノ精力虚乏ニ
 病毒ヲ排泄スル少キ者ハ幾那ヲ用ヒテ其精力
 ヲ補助ノ良効アリ假令ハ傳染腐敗熱ニ於テ病毒
 分利ノ候アレバ精力虧損シ其排泄ノ機轉甚ダ慢
 緩ニモ悉ク是レヲ成シ遂ル能ハザルニ用ルガ
 如シ

患者資稟 患者壯實多血或ハ膽液過多若クハ黑膽
 液多キ人ハ幾那害アリ○多血ノ症ハ刺絡ニ其血

ヲ減スベシ否ラズノ幾那ヲ投スレバ血ノ運行増
 進シ諸動脈ノ細絡緊脹ノ破裂ニ是ヨリ失血ヲ發
 シ或ハ瘀血内藏ニ壅塞ノ炊衝ヲ發ス。故ニ多血ノ
 患者ニ必ず幾那ヲ用フベキ症アル氏ハ宜ク緩和
 清凉。稀釋。潤達ノ藥ヲ加ヘ用フベシ即チ覆盆舍利
 別。遏爾託亞舍利別。失格列ヒ舍利別製法過爾託亞
 石長生舍利別。接骨木傑列ヒ以上緩和劑消石。消石錠。
 霸王鹽。甘消石精。民埏列利精。孕礬酒石。酒石英。酒石
 葉。橙汁。醋。以上清凉稀釋劑等ヲ擇テ幾那ヲ稀ウスキ煎劑ニ
 加フベシ纖維強硬ノ人ニ幾那ヲ用フベキ症アル

モ是レニ同シ或ハ幾那ニ緩和ノ効アル藥ヲ加ヘ
 用ヒテ其收瀦ノ効力ヲ抑制スベシ即チ過爾託亞
 錦葵。亞麻子。舍謨。字黜謨等ノ如シ○膽液過多ハ入
 ハ膽液ヨク腸中ニ流通シ飲食ヲ消化シ適宜ニ乳
 糜ニ交テ血中ニ入リ其腸中ニ在テ剩餘ニ屬スル
 膽液ハ大便ニ交リ通泄スレバ少シモ効患ナシ否
 ラズメ或ハ肝膽ニ鬱積シ或ハ腸ニ在テ壅滯スレ
 バ忽チ變メ酷厲毒トナリ或ハ肝膽ヨリ返流メ血
 中ニ泛濫シ或ハ胃腸ニ蘊蓄メ諸器ヲ侵刺シ是ヨ
 リ胸腹疼痛。痞悶。焮衝壯熱。黃疸。下利。膽液熱。腐敗熱

等ヲ發ス。幾那ハ温壯收瀦ノ効アル故ニ右ノ症ニ
 ハ害アリ若シ必ズ是レヲ用フベキ症アルハ前
 説ノ藥劑ヲ加ヘ用フベシ。又幾那ハ大便ヲ閉澁ス
 ル故ニ清涼下劑ヲ兼用スベシ即チ答末林度。酒石
 英。霸王鹽。旃那ノ如シ○凡、黑膽液質ノ人血液ニ
 溜ル。重訂内科撰要第六十九章ニ出ヅ。ハ先ヅ開
 達ノ下劑ヲ用ヒテ腸中ニ凝滯セル病毒ヲ疏滌シ
 其壅塞セル脉管ヲ開達スベシ其藥ハ即チ瓦老別
 里鹽。孕礬酒石。瀉利鹽。霸王鹽。等ノ如シ又大黃。旃那
 等ノ輕キ下劑ニ越謨。安沒尼亞。幾若クハ瓦爾。技奴

遠西名物考

風雲堂

謨ノ如キ解凝開達ノ越謨ヲ加ヘ用ヒテ尤効アリ
 凡ノ脉管壅塞ノ諸液凝滯スル症ハ幾那害アリ唯
 石鹼質ノ解凝清涼稀釋スル藥ヲ用ヒテ其壅滯ヲ
 衝動疏解メ開通スベシ其藥ハ睡菜。碎米薺。葛爾儒
 別涅實。屈室。山芥菜。失格列乙。蒲公英。酸模。蘆根鮮生等
 ノ越幾斯劑製法皆蒲公英同シノ如シ○寒粘液質ノ
 人ハ纖維諸管弛弱縱解ノ粘液過多ナル故ニ幾那
 ヲ用ヒテ的當ス。但纖維甚タ弛弱ニシテ血液大ニ粘
 稠ナル者ハ先ヅ是ヲ稀釋ノ流利スベク爲スニ非
 レバ幾那ヲ用ヒテ捷効ヲ奏シ難シ故ニ此症ハ先

ズ温煖衝動開達ノ下劑ヲ用フベシ。即チ盧會。落葉
 松耳。若傑禮。需謨蘇甘沒扭。藥刺巴。律比丸以上温煖
 孕礬酒石。霸王鹽。瓦老別里鹽。瀉利鹽以上開達等ヲ
 擇ニ用ヒヨク粘液ヲ溶解ノ後幾那ヲ用ヒテ其弛
 弱ヲ回復シ血液ヲ健輸ノ良効アリ或ハ開達稀釋
 發汗利尿強壯ノ効アル藥ヲ兼用ノ尤良。即チ亞爾
 鮮鹽。葛爾儒別涅實。屈室鹽。酒石鹽。鐵劑。昆荅刺。越兒
 發根。海葱。等ノ如シ但纖維大ニ弛弱メ血液稀渙シ
 或ハ胃腸ノ感動甚クメ幾那ヲ用ヒテ下利スル症
 ハ温壯收瀋鎮痛ノ藥ヲ兼用スベシ即チ桂。橙皮。玫

遺留醫方名物考標目

卷二十

我那

主治

問歌

問歌幾那方劑服法

我那

亦我那

我非

發飲住

我那

我非

我非

我非

遺留醫方名物考卷十九

遺留醫方名物考卷十九
此卷記載了多種醫方及其藥材，內容較為零碎，部分文字因紙張損壞而模糊不清。可見之文字包括：「我那」、「我非」、「我非」等。

遠西醫方名物考標目

卷二十

幾那

主治

間歇熱

間歇熱幾那方劑服法

幾那亞爾尼加煎

赤幾那煎

幾那丸

雙幾那散

芙蓉金硫散

發歇往來諸病

遠西名物考

卷二十

標目

風雲堂藏

喘急 幾那救喘飲

疫效 薄荷幾那飲 痙攣搐掣

神經病 香竄幾那飲

腹痛 萎黃病

癩癧 多汗尿崩

失血 肺瘍

勞效 幾那和胸飲 越幾那丸

虛損羸瘦病 痛風傷冷毒痛

焮衝 痘疹發斑

遠西醫方名物考卷二十一

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那

主治 此藥ハ強壯收瀋衝動ノ効力ヲ以テ凝體纖維

ノ虚弱ニ屬スル諸病ニ大効ヲ奏ス。然レ元運力ノ

虚極ニ至リ胃腸ノ運營此藥ヲ消化スルヲ能ハザ

ル症ニハ害アリ即左ニ其良驗アル諸病ヲ掲テ治

例ヲ示ス

間歇熱 凡ソ間日熱ニ治シ易ク。日發熱ハ是ニ次ギ。

遠西名物考 卷二十一 胃腸熱

三日熱ハ解シ難ク重複熱ハ最モ解シ難シ○此病ハ新久ヲ論セス幾那ヲ用テ良効アリ然レ先ヅ胃腸ヲ淨掃メ後少モ炊衝ノ症ナク或ハ内藏ノ壅塞藏内諸器ノ部位ニ微驗スベキ硬結塊癖アリ且其器ノ官能ヲ失フ諸症アルヲ以テ是ヲ知ル此類和蘭藥鏡凡例ニ略載ヲ兼ルヲナキハ速ニ幾那ヲ用フス參考スベシベシ其時ヲ失ハズ用ルバ頑固經久ノ病下ナルヲナシ○春月ノ間歇熱ハ治シ易シ然レ炊衝性ノ熱多シ此症ハ先ヅ刺絡ヲ施シ清涼下劑ヲ投メ炊衝ヲ除クニ非レバ幾那害アリ○秋ノ間歇熱ハ多クハ胃腸熱重訂内科撰要熱病篇第十五章第十六章ニ出ツノ性アリテ解シ

難シ此症吐劑及ビ下劑ヲ用テ十分胃腸ヲ淨掃スレモ仍解散セザル者或ハ是ヨリ替留熱トナル者ハ皆幾那ヲ用テ良驗アリ○凡ソ間歇熱ハ先其病性ヲ察スベシ即チ炊衝性膽液性寒粘液性ナリ炊衝性ノ熱病ハ體質壯實ノ人及ビ春月ニ多ク發ス此症ヲ誤治スレバ替留熱或ハ炊衝熱トナル膽液性ノ症ハ膽液過多ノ人及ビ季夏秋暑ノ候ニ多シ此症ヲ誤治スレバ腐敗熱トナル寒粘液性ノ症ハ體稟虚弱ニメ粘液多キ人及ビ寒冷雨濕多キ秋冬ニ發ス此症動モスレバ頑滯ノ解シ難ク諸液粘稠

ニノ良性ヲ失ヒ精力虚憊ノ羸瘦シ是ヨリ萎黄病。黄疸。水肿。内藏硬結。及ヒ勞瘵トナル者少カラズ。○右病性各異ナレト皆初發ニヨク病毒ヲ驅除ノ速ニ幾那ヲ用レバ險重頑固ノ病トナルトナシ治法ハ初發間日ニ吐劑或ハ下劑ヲ用テ胃腸ヲ滌除スル下肝要ナリ。吐劑ハ乙百葛格安那或ハ韃爾答越默窒。或ハ海葱蜜等ヲ擇ニ與フベシ。○焮衝性。膽液性ノ症ハ殊ニ初ニ數輕ク吐セシメ其後清涼下劑ヲ用フベシ即チ瀉利鹽。答麻林度。酒石英。旃那。大黃。瓦老別里鹽ノ如シ或ハ下劑ヲ用テ後吐劑ヲ用ル

コトアリ其後焮衝性ノ症ハ刺絡ヲ施シ消石劑。清涼石鹼質ノ藥ヲ用フベシ。膽液性ノ症ハ酸性石鹼質ノ劑及ビ防腐藥ヲ用テ血液ヲ稀釋シ尿管ヲ開達スベシ即チ消石。消石錠消石條。霸王鹽。甘消石精以上消石。劑。酒石英。孕礬酒石。民埵列利精。橙汁。醋。酸模根以上酸性。清涼防腐劑。蒲公英根。失格列乙。水蒿苴。蘆根。濱瞿麥。瞿麥。山萸菜。碎米薺以上石鹼質ノ藥。葉根共ニ用フ。越幾斯劑トシ用テ殊ニ効有。等ヲ擇ニ用フベシ。○寒粘液性ノ症モ初發吐劑ヲ用ヒ又衝動ノ粘液ヲ溶化スル下劑ヲ用フベシ前ノ患者資稟ノ條。寒粘液質ノ人ニ用ル温或ハヨク胃腸ヲ淨掃メ後。煖衝動開達ノ下劑ヲ云

開達ノ越謨及ビ鹽劑。苦味香竄劑。温煖劑ニ發汗利
尿ノ藥ヲ加ヘ用テ其熱毒ヲ驅除スベシ。即チ瓦爾
拔奴謨。越謨安沒尼亞幾撒瓦百奴謨。沒藥以上開達越謨霸
王鹽孕礬酒石。酒石葉以上開達健質亞那亞爾鮮葛爾
儒珊篤里。纈草根。攝爾扁答利亞。土木香。橙皮以上苦
温煖藥等人如シ發汗利尿藥ハ即チ硃砂精。民埤列利
精。鹿角精。精製者上茯苓。薩撒弗刺斯。昆答刺越兒發海
葱。硫黃華。等人如シ右ノ諸藥ヲ適宜ニ擇テ用テ患
者呼吸寬徐。腹肚和柔。内藏壅結硬塊ナク舌苔去リ
諸部疼痛ナキニ至テ其熱仍解散セザル者ハ幾那

ヲ用テ速ニ治ス○或云。焮衝性ノ症ハ幾那ニ清凉
藥ヲ加ヘ。膽液性ノ症ハ防腐藥ヲ加ヘ。寒粘液性ノ
症ハ苦味開達ノ藥或ハ發汗利尿ノ藥ヲ加ヘ用テ
病毒ノ排泄ヲ助ルモ亦良以上ノ諸藥
間歇熱。幾那方劑。服法。間日熱。日發熱ハ幾那人末一
ヲ取リ分テ八服或ハ十服トシ發作後ヨリ次ノ
發作前マテニ盡ク用ベシ。日發熱ハ發作劇盛ナル
時過レバ速ニ用ベシ。熱ナキ時必ケレバナリ。重複
熱ハ熱ナキ時最モ少キ故ニ服數ヲ減メ分量ヲ増ス
ベシ。三日熱ハ幾那人末一ヲ半或ハ二ヲ間日ニ

用、べシ總テ間日ノ多キニ隨テ服量ヲ多クシ且日
數モ長ク用、べシ否ラザレバ良効ヲ成シ難シ○開
日熱ハ上好ノ幾那ヲ末トシ一多夫取テ次ノ發作
前マテニ盡ク用、レバ治セザル者稀ナリ○幾那ノ
末ハ水。乳汁。麥酒。葡萄酒。等適意ノ飲液ニ和シ用、
シ○或云。幾那ノ末ニ燒酒少許ヲ加ヘ飲劑ニ和シ
用、レハ其華爾斯ヨク溶解スル故ニ尤効多シ假令
ハ左方方用、如シ藥效ハ發見ナシトモ藥材ハ良
藥
幾那默栗薩飲 水煎内服熱症ハ寒熱並發ナ
諸用幾那末或ス○適去燒酒料各正多幾那一書

默栗薩水 三十多 覆盆舍利別 十錢

右調和シ硝子壘ニ内レ固封シ貯ヘ用ルニ臨テヨ
ク振蕩シ半時ニ一匙宛服ス○幾那ハ散劑トシ用
ルヲ良トス。煎劑ハ煮ルニ因テ華爾斯ノ精微ナル
質。蒸散シ其餘ハ冷ルニ隨ヒ罐底ニ沈テ融和シ難
ケレバナナリ二人同症ノ間歇熱ニ於テ一ハ散劑一
ハ煎劑ヲ同時ニ用ヒ試ルニ散劑ノ功捷ナリ。又其
他幾那ノ諸製劑モ散劑ニ比スレバ其質全備セズ
ノ効力劣レリ體稟壯實ナル少女姊妹アリ。共ニ初
秋同症ノ三日熱ヲ患ヒ對症ノ藥劑ヲ用、テ後。幾那

ヲ煉膏トシ或ハ煎劑トシ用レテ治セズ。遷延累日ノ間漸ク幾那劑ヲ厭ヒ且、飲食起居等攝養ヲ慎マズ。其熱逾頑固ニメ解散セズ終ニ羸瘦罷困甚シ。因テ患者俱ニ醫ニ告テ云、若シ此頑滯危篤ノ疾幸ニ瘳ルヲ得バ何如ナル氣味ノ惡ムベキ藥劑モ服スベク。幾多ノ服量モ是ニ堪テ必モ厭フヲナク用フベシト。乃チ醫幾那ノ末ニ苦味鹽瓦老別里鹽或ハ瀉利鹽等ト鐵劑ヲ加ヘ散劑トシ一錢ヲ一服トシ四分時ニ一服宛水或ハ葡萄酒或ハ麥酒ニテ間日ニ服セシム。是ヲ用ルヲ三日ニメ其熱發作セズ。因テ此劑日

ニ二服宛與ヘ其後ハ日ニ一服或ハ隔日ニ用ルヲ二十餘日ニメ竟ニ再發セズ。但、其後二人ニ咽喉焮腫ヲ發ス。然レテ對症ノ藥劑ヲ施メ速ニ治ス。是ヲ以テ觀レバ幾那ハ此病ニ奇効アレテ服量饒多ニメ其毒ヲ制伏スルニ足ルニ非レバ効ナシト知ルベシ。○或云。發作ノ必シ以前ニ幾那末二錢許ヲ取テ一頓ニ服スレバ常法ノ如ク一多ヲ用ルヨリハ効多シ或云發作ノ初惡寒ノ時。右ノ如ク用テ峻効アリト。然レテ斯ノ如ク用ルニ劇キ煩悶搖擲等ヲ發シ死スル者アル故ニ近來此服法ヲ廢セリ。○幾那

ノ散劑ヲ服スルノ能ハザル者ハ其服量ノ一倍ヲ取テ煎劑トシ用フベシ假令ハ左ノ如シ

幾那煎

右水適宜ニ加ヘ煮テ滓ヲ去リ其湯十二多若クハ

十六多ヲ取リ半時毎ニ一小茶碗ヲ服ス或ハ舍利

別一二多ヲ和スレバ服シ易シ○或ハ衝動開達ノ

驅熱藥ヲ加ヘ水煎又用ルモ亦良假令ハ左ノ如シ

幾那亞兒尼加煎

右水ヲ加ルノ適宜煮テ四分時ニシテ滓ヲ去リ左ノ

藥ヲ加フ

亞兒尼加花 四錢

右沸湯十六多ヲ加テ泡出シ滓ヲ去テ舍利別一多

半或ハ二多ヲ攪和シ是ヲ右ノ幾那煎ニ加ヘ半時

毎ニ一小茶碗ヲ服ス○往古ハ幾那ノ粗末ヲ煮テ

一時半ニシテ藥力盡ク其湯ニ出ツト云近來醫家ノ

說ニハ右ノ如ク濃煎スルニ由テ其精微ノ質半蒸

散シ効力大ニ劣レリトス故ニ近來ノ藥局ニハ左

ノ如ク製シ其揮發精微質耗散セズ尤効アリトス

局方幾那煎

幾那 極細末 二多

沸湯 二十八多

右調和ノ磁罐ニ内レ蓋閉シ慢火ニテ煮_ルテ八分時。毛布ニテ濾過スレバ其液十六多トナル。稍放冷ノ速ニ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ。

赤幾那煎

赤幾那 細末 二多

沸湯 三十二多

右煮テ濾過スル_テ前法ノ如クシ其液二十多トナ

ル技幾那ノ効力ハ其揮發ノ質ニ在ル故ニ右ノ如ク稀キ煎劑ト爲セハ其質蒸散セズメ尤効アリト

ス○或云。幾那ノ末一多ニ水八多或ハ十多ヲ加ヘ

暫ク研磨シ飲劑ト爲セバ其効諸煎劑ニ勝レリ○

此病ハ幾那ノ服量ヲ多クシ且久服スルニ非ルバ

良効ヲ成シ難キガ故ニ其味ヲ厭ヒ惡ム者ハ他藥

ヲ加テ味ヲ佳シ用ル_テ醫家ノ權法トス。假令バ幾

那煎ニ橙皮舍利別。薄荷舍利別。茴香舍利別。製法薄

別ト接骨木傑列_イ。若クハ昆設爾弗_フ等。其症ニ隨ヒ

同シ用ルガ如シ○或ハ幾那ノ散劑若クハ煎劑ニ

右ノ舍利別昆設爾弗類ヲ加ヘ煉膏トシ適意人飲
液ニテ送下スルモ良。或ハ左ノ煉膏ヲ用テ之

幾那加密列飲

幾那末六錢 用山並習加密列末二錢

珊篤里越幾斯劑 其和六厘日慈心善於藥

水揚梅根 各半錢 接骨木 傑列乙 二半錢

橙汁舍利別 適宜ハ其效前煎膏ニ類シ

右調和シ煉膏ト爲シ四分時ニ一卵匙宛服ス

那ノ散劑煎劑共ニ服スル不能ハザル者ハ苦味ノ

越幾斯劑葛爾儒健質亞那珊篤 或ハ鐵劑或ハ香竈

藥ヲ加ヘ丸藥トシ與フベシ或ハ左ノ方ヲ用フ

幾那丸

幾那 一弓

覆盆舍利別 適宜

右適宜ニ調和シ三爪ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トス

或ハ銀箔ヲ衣トシ 大約二百八十九丸トナル。一劑ヲ

一日ニ服ス○幾那ヲ多ク服スル不能ハザル者ハ

一二弓ヲ取テ煎劑若クハ浸劑トシ是ヲ吉利詞爹

兒トシ肛門ニ注輸ノ其効ヲ補助スベシ。或ハ昏睡

惡心嘔吐。搐搦等ノ如キハ嚥下シ難キ故ニ幾那ヲ

吉利詞キリス參兒テイールトシ施ノ速効ヲ得ルスアリ。少許宛施スコレツクセバヨク腸中ニ住留ス。或ハ其症ニ隨ヒ阿芙蓉少許ヲ溶トカシ加テ良効ヲ得ルトアリ。但先少輕キ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ淨刷ノ是ヲ施スベシ。是内服スルニ比スレバ幾那ノ量三倍モ多ク施ノ的當ス。宜ク一時半或ハ二時毎ニ施シ。每次幾那ノ量五六錢ヲ用フベシ。或ハ濃煎トシ是ニ幾那越幾斯劑ヲ溶トカシ加レバ尤効アリ假令タトヘバ左ノ方ノ如シ

幾那吉利詞參兒

幾那煎

四弓

幾那越幾斯劑

四錢

扁桃油

或阿利襪油

阿芙蓉丁幾去爾

五滴至十滴

右調和ノ吉利詞參兒トス。二時ニ一劑宛施スベシ

○小兒ハ幾那越幾斯劑一錢ヲ取テ温湯ニ溶シ阿

芙蓉丁幾去爾少許ヲ加ヘ吉利詞參兒トシ施スベ

シ。幾那劑ヲ内服メ治セザル症モ間速効ヲ得ルト

アリ○幾那ヲ琶布若クハ蒸湯劑トシ腹部ニ施シ

或ハ浴湯トメ間歇熱ニ良効アリ小兒ハ二弓。大人

ハ五弓ヲ取り煮テ琶布トシ數日は腹ニ貼スベ

シ但是ニ熱湯ヲ濕メ貼シ乾ケバ更ニ數濕スベシ

或云間歇熱ニ幾那十六弓ヲ取り煮テ琶布トシ布

片ニ夾ニ適宜ニ温メ。胃ノ部ニ貼メ速効ヲ得タリ
 或云。小兒ノ間歇熱ニ幾那ヲ葡萄酒ニ煮テ胃ノ部
 ニ貼メ多ク治驗アリ。或ハ是ニ龍腦ヲ加ヘ貼メ多
 久疣蟲ヲ下スヲアリ。或云。間歇熱ニ幾那一比ヲ水
 煎メ間日ニ數患者ノ脚ヲ浸シ暫ク摩擦ノ大効ヲ
 得タリ。或云。小兒ノ間歇熱ニ幾那ノ末一二ヲ絞
 布ノ縹絆ニ縫内レ著セシメテ治スト。○間歇熱。治
 ノ後。再發ヲ防グガ爲ニ暫ク幾那ヲ用ヒ。或ハ症ニ
 隨テ下劑ヲ與ルヲアリ。通例ノ間歇熱ハ治シ易シ
 ト雖モ再發ヲ防グハ甚ダ難シ。熱性ノ患者。再發ス

ルハ赤幾那散劑ヲ服量多ク用ベシ。但是ヲ服ノ頭
 旋痞懣等ヲ發シ多ク用難キ者ハ左ノ方ヲ用ベシ

雙幾那散

赤幾那

黃幾那

各十二錢

霸王鹽

四錢

右散劑トシ分テ二十五服若ハ三十服トシ。熱間歇
 セル時。半時ニ一服宛飲液ニテ送下ス。○頑固ノ日
 發熱。間日熱ハ治ノ後。第十日ニ再發シ。三日熱ハ治
 ノ後。第十四日ニ再發スルヲ多シ。故ニ日發熱。間日
 熱ハ治ノ後。一週毎ニ幾那ヲ用テ三週或ハ四週ニ

至ルベシ三日熱ハ十日毎ニ用フヘシ○秋ノ間歇熱
 ハ幾那ヲ用テ治メ後動モスレバ再發シ患者終ニ羸
 瘦ノ粘液質トナリ且幾那ヲ嫌ヒ惡ムヲ多シ此症
 ハ幾那ヲ用テ効ナシ唯韃爾答越默室或ハ乙百葛
 格安那ヲ少許宛數用テ惡心嘔氣ヲ起サシメ是ヲ
 以テ内部諸器ヲ衝動メ其潜伏セル膠粘ノ膽液及
 粘稠液ヲ溶解メ排泄セシメ其後苦味ノ越幾斯劑
 ニ中和鹽或ハ硃砂ヲ加ヘ用テ峻効アリ假令バ左
 ノ方ノ如シ

解凝排毒飲

接骨木花水 六勺

珊篤里越幾斯劑 五錢

硃砂 一錢

舍利別 一勺

右調和シ半時ニ一匙宛用フ是ヲ用テ熱勢減シ或
 ハ回復スル片ハ患者ヲ高燥ノ地ニ移メ新鮮氣ヲ
 受シムベシ右ノ劑ヲ用テ仍全治セザル者ハ復幾
 那劑ヲ用テ良効アリ○間歇熱頑固ニメ發作ノ時
 刻少モ違ハザル症ハ阿芙蓉金硫黃等ヲ用テ其時
 刻ヲ變移セシムレバ治シ易シ乃左ノ方良驗アリ

芙蓉金硫散

金硫黃

阿芙蓉

各二匁

沙糖 一匁

右散劑トシ分テ二服トシ發作ノ半時前ニ一服ヲ與ヘ四分時過テ又一服ヲ與フベシ。是ヲ用ヒテ發作ノ時刻變スル片ハ其後數幾那ヲ用ヘシ或ハ此劑ニ幾那ヲ加テ良驗アリ假令バ左ノ方ノ如シ

芙蓉幾那散

金硫黃

十六匁

阿芙蓉

三匁

加密列

黃幾那

各八匁

三香散

此劑桂薑益智各等分調和シ散劑トス

四匁

右調和シ散劑トシ分テ十六服トシ熱歇ム時ニ於

テ半時ニ一服宛飲液ニテ送下ス經久ノ間歇熱モ大抵三四劑用レバ治ス

發歇往來諸病凡ソ時日ヲ定テ發スル病ハ幾那ヲ

用テ治スルノ亦間歇熱ノ如シ即發止時アル癩喘急疫效瘵攣搐掣等ノ如シ或ハ發作スレバ發熱煩渴飲衝ノ諸症ヲ現ハシ或ハ肢體勞倦懈惰顔色黧澹ナル者アリ或ハ頭痛心腹痛眼耳痛失血等ヲ發シ或ハ痛風傷冷毒痛ヲ發シ間歇ノ時ハ脉平常ノ如シ其發熱飲衝等ノ症ハ間歇熱ノ飲衝性膽液性ノ治法ヲ施ノ後幾那ヲ用ヘシ勞倦懈惰ノ症ハ秋

發スル頑固ノ間歇熱及寒粘液性ノ療法ヲ施ノ後。幾那ヲ用テ治スベシ。○發歇アル昏睡。發狂。痙攣。搐掣等ノ頭腦。神經ニ係ル病ハ刺絡。發泡。打膿法。脚湯ヲ兼施ノ病毒ヲ導泄シ。熱性ナラザル患者ハ幾那ニ神經劑ヲ兼用スベシ。即チ刺賢。堙兒精。鹿角精。琥珀精。葛私多。樓謨等ヲ擇ムベシ。搐掣ノ諸症ハ鎮痙劑ヲ兼用スベシ。即チ精製阿芙蓉。舍電發謨。阿芙蓉液。實亞格。日温。白罌粟。舍利別等ヲ擇ムベシ。○凡血液腐敗ニ傾キ。諸症發止往來ノ解セザル病ハ幾那ノ強壯收瀋防腐ノ効力ヲ以テ患者ノ精力ヲ挽回

ノ治スルノ宛モ間歇熱ノ如シ。然レ胃腸ニ病毒アル者ハ是ヲ疏滌シ多血家ハ刺絡ヲ施シ壯熱。焮衝アル氏ハ清涼劑ヲ與ル等。各對症ノ治法ヲ施ノ後。幾那ヲ用ベシ。○毎日。時ヲ定メテ各部暫ク焮痛スル症ハ幾那ヲ用テ多ク捷効アリ。毎年若クハ毎月發スル症モ是ニ同シ。○一男子劇キ偏頭痛ヲ發スルヲ毎日四時許。幾那ヲ用テ速ニ治ス。○一男子毎日午時ヨリ偏頭痛ヲ發メ堪忍ビ難ク曉ニ至テ休ム。諸藥効ナク。阿芙蓉劑ヲ用レバ稍寬解スレ。凡全治セズ。終ニ幾那ノ越幾斯劑ヲ用テ其痛速ニ解散

シ回復ス○一婦人毎日晚間クレガタ頭ノ右邊及右腕疼痛
 シ夜中増劇シ早朝漸ク減シ午前ニ解散ス刺絡發
 泡蒸湯藥其他内外方法寸効ナシ終ニ幾那ヲ用テ
 全治セリ○一男子毎日眼盲スルト一時許幾那ヲ
 用テ治ス○一男子毎夜大ニ顫振シ次テ發狂スル
 一時半許ニノ解ス晝間神思樂マズ沈黙鬱悒シ
 怯怖スルト小兒ノ如シ此症孕礬酒石ヲ蜜ニ溶シ
 幾那煎ニテ送下シ治効ヲ收ム○七歳ノ女兒數搗
 搦ヲ發シ荏苒トノ治ヒズ幾那ヲ水ニ浸シ其液二
 手ヲ取テ忽弗ホツフ滿鎮痛液少許ヲ滴シ加ヘ數内服セ

シメテ回復セリ○頭眩眩暈肢體顫掉心動悸癢痛
 等ノ神經病時ヲ定テ發スルト宛モ間歇熱ノ如キ
 症ハ皆幾那ヲ用テ奇効ヲ得ル經驗說甚々多シ
 喘急時日ヲ定テ發スル乾喘重訂内科撰要喘急篇
 是ナリハ發作ナキ時幾那ニ開達ノ神經劑鎮痙
 劑解凝ノ鹽劑開達神經劑ハ葛松多樓謨鹿角精琥
 珀精撒瓦百奴謨樓謨安沒尼亞幾那
 爾技奴謨阿魏沒藥等ヲ云鎮痙劑ハ阿芙蓉劑ヲ云
 解凝鹽ハ霸王鹽孕礬酒石亞爾鎔鹽酒石鹽等ヲ云
 ヲ兼用ノ胸中ノ壅塞ヲ開通シ或ハ發泡膏ヲ胸背
 ニ貼シ或ハ脚湯ヲ施ノ効アリ○三日一發ノ喘急
 ニ神經劑解凝劑ヲ用ヒテ後左ノ方ヲ與ヘテ屢治

西名物考

風雲堂

驗ヲ得タリ

幾那救喘飲

幾那 未

亞爾鮮鹽

瀉利鹽

右調和ノ煉膏トシ發作セザル時。坐時毎ニ胡桃大

ヲ與フ。一少年毎日午時喘急ヲ發ス。然レ脈甚ダ

變セズ平常ノ如シ。幾那ヲ用テ速ニ治ス。一濕喘ハ

多ク粘痰ヲ吐キ古苔アリ。此症ハ粘液多ク胃腸ニ

壅滯スル故ニ吐劑下劑。開達劑。解凝劑ヲ用ヒテ肺

胃ノ粘液ヲ驅除シ其後喘急劇發セザル時。幾那ヲ

用テ良驗アリ。其開達劑ハ越謨安沒尼亞幾。瓦爾拔

奴謨。撒瓦百奴謨。阿魏。沒藥。酒石鹽。亞爾鮮鹽。葛爾儒

鹽。孕礬酒石。等ヲ擇ムベシ。解凝劑ハ結爾茂斯。密涅

刺列。金硫黃。勿搦祭亞石鹼。睡菜越幾斯劑。水蒿苴越

幾斯劑。碎米薺越幾斯劑等ヲ擇ニ用ベシ。吐劑ハ乙

百葛格。安那。韃爾答。越默室。安質沒扭酒。默他兒雜腹

蘭酒。等下劑ハ瓦老別里鹽。瀉利鹽。等ナリ。或ハ幾那

ニ右ノ諸藥ヲ擇ニ加ヘ若ハ互ニ用ベシ。一幾那ハ

初少許宛用テ漸ク加フベシ。一頓ニ多ク與フレバ

胸腹ニ停滯シ呼吸不利痞滿等ヲ發シ肺及ビ胃腸
 ノ分利排泄ヲ妨レバナリ○往年小兒ノ喘息大ニ
 流行シ毎日劇ク發作ス此症ニ阿魏ヲ飲液ニ和シ
 用ヒ或ハ吉利詞參兒トシ施メ多ク良驗ヲ得タリ
 是ヲ用テ治セザル症ハ皆左ノ方ヲ用テ驗アリ

薄荷幾那飲

薄荷水

六錢

幾那

末

一錢

洋石竹舍利別

花ヲ用フ製法董菜舎

同シ

二錢

右調和ノ飲劑トス此劑ヲ用レバ喘急淹滯セズ或
 ハ經久頑固ノ症モ亦殊効アリ○經久ノ喘急ハ發

作中ニ龍腦清涼飲世部ヲ用ヒ發作セザル間ハ健

質亞那ナア珊篤里サント葛爾儒亞爾鮮ケルルニ亞兒尼加アールニカ橙皮土木香

根及ビ越栗失爾赫篤立エリキシルヒツト等ノ苦味ノ藥ヲ用テ胃用

健運シ又幾那ニ鐵劑ヲ加テ纖維ノ弛弱ヲ強壯ニ

シ全功ヲ成スベシ或ハ經久ノ喘急終ニ勞瘵様ト

ナル症幾那ニ沒藥ヲ加ヘ用テ全愈セル者アリ

疫效此病小兒ニ多シ初起病毒ノ刺戟甚フノ嗽衝

様ノ諸症劇盛ナル者ハ幾那害アリ然レ病勢漸ク

衰ヘ諸症番替ヲ發止往來スルニ至レバ幾那良効

アリ又麝香阿芙蓉藥ヲ加テ神經ヲ揮發シ痙攣ノ

運動ヲ鎮定ノ殊ニ良○此病發歇アルノ間歇熱ノ如キ者ハ粘穢汚物胃中ニ鬱滯ノ刺戟衝動シ發スル者多シ故ニ吐劑及ビ下劑ヲ與ヘテ汚液ヲ條除シ其後開達發汗利尿ノ劑間歇熱ノ條ニ出ツヲ用テ粘液ヲ稀釋シ壅滯ヲ疏通シヨク病毒ヲ驅除メ後其效仍休ザル者ハ幾那ヲ用テ大効アリ或ハ神經劑鎮痙劑ヲ加ヘテ其劇キ效ヲ靜止スルモ亦良

痙攣搐掣 痙。子宮衝逆等皆痙攣病ニ屬ス。幾那ヲ用テ良驗アリ左ニ其治驗ヲ舉グ○一患者年十八嘗テ十歳ノ時驚駭ニ由テ痙ヲ發シ人事ヲ省セス爾

來數發シ十六歳ニノ痙トナリ其症仍數發作ス是ニ幾那ヲ與ルノ一月許其發作ノ劇症漸ク減シ其後全治セザレモ稀ニ輕ク發動スルニ至ル○一婦人年十八熱病後數子宮衝逆ノ症ヲ發シ諸藥効ナシ終ニ幾那ヲ用ルノ半月許ニノ回復ス○一婦人子宮衝逆ニ罹リ其症數發メ經年治セズ幾那ニ撒兒末爾扶斯ト益智ヲ加ヘ用ルノ三週ニ全愈ス○一男子年二十一痙ヲ患ルノ二年幾那ニ鐵草ヲ加ヘ與ルノ十日ニノ諸症大ニ寛解シ爾後全愈セザレモ其劑ヲ連テ稀ニ輕ク發スルニ至ル○

右ノ經驗說ヲ以テ觀レバ少モ欬衝ノ候ナク他病ヲ兼ザル搖掣病ハ幾那ノ峻効アルヲ知ルベシ

神經病 幾那ハ幾多人神經病ニ治驗多シ。凡ソ疑體纖維ノ脆弱ニノ神經感動シ易キ者ハ動モスレバ憂愁忿怒驚恐等ノ神思ノ擾動ニ由テ頭眩眩暈。搐掣。急衝。逆精神鬱重。悵悶。心腹痛等ノ症ヲ發スル

ト多シ是神經ノ感動甚フメ靈液ノ運行常度ヲ失フヨリ發スルナリ。此症ハ專ラ幾那ヲ用テ疑體纖維ヲ健固シ殊ニ神經質ヲ強壯ニシ又香竄揮發ノ神經藥ヲ兼用メ幾那ノ効ヲ資益スベシ。即チ額草。

茉莉刺那。山柰。菩提樹花。橙皮。沒藥。撒瓦。百奴謨。乳香。阿魏。琥珀。葛私多。儂謨。刺賢。埵兒精。鹿角精。及ビ鐵劑ノ如シ。然レ内藏壅塞アリ或ハ侵刺衝動スル内因アリテ此症ヲ發スル者ハ先ツ其因ヲ除治メ幾那ヲ用ルニ非レバ効ナシ○神經病ハ幾那煎ニ亞兒加利鹽及ビ揮發ノ神經藥ヲ加テ殊効アリ。假令ハ左ノ方ノ如ク製メ甚ダ驗アリ

香竄幾那飲

幾那

酒石鹽 二錢

右水適宜ニ加メ煮メ其液十四弓ヲ取り左ノ藥ヲ

加フ

默藥

二錢

揮發香竄精

三錢

阿魏

一錢

橙皮舍利別

二錢

右調和シ一小茶碗ヲ用ル下日四次此劑中ノ阿魏
丁幾去爾ヲ去テ葛私多儂謨丁幾去爾。二錢ヲ加レ
バ其効尤峻ナリ

腹痛 痙攣ノ運動ヨリ發スル腹痛ハ幾那ニ鎮痙藥

及ビ神經劑ヲ加ヘ用ヒテ捷効アリ○蛇蟲ヨリ發
スル腹痛モ幾那殊効アリ但粘液ヲ溶化スル劑及
ビ下劑殺蟲劑ヲ兼用スベシ即チ開達ノ越謨類

安^ア没^モ尼^ニ亞^ア幾^キ瓦^カ爾^ニ拔^バ奴^ヌ謨^モ撒^サ勿^フ擲^チ祭^セ亞^ア石^シ鹼^{ケン}孕^ニ禁^ニ酒^ニ石^シ。
瓦^カ百^{ハク}奴^ヌ謨^モ阿^ア魏^ヱ沒^モ藥^{ヤク}等^ト云^フ勿^フ擲^チ祭^セ亞^ア石^シ鹼^{ケン}孕^ニ禁^ニ酒^ニ石^シ。
以上解 瀉利鹽。瓦老別里鹽。落葉松耳。盧會。若傑禮需
疑藥 以上解 瀉利鹽。瓦老別里鹽。落葉松耳。盧會。若傑禮需
謨。以上劑 纈草。攝絲施那。加羅蔑兒。甘汞。草麻油。以上殺
等ナリ宜ク其症ニ隨ヒ擇ムベシ

萎黃病 總テ萎黃病ノ類。及ビ失苟兒陪苦ハ纖維弛

弱ノ血液ノ良性ヲ失ヒ運行怠慢ニノ壅滯スル病
タルガ故ニ幾那ヲ用テ開達衝動收固強壯防腐ノ

良効ヲ奏スルナリ。或ハ其症ニ隨ヒ温煖開達防腐

劑 昆^{クニ}答^カ刺^シ越^エ兒^ニ發^ハ根^ニ良^ニ薑^ニ健^ニ質^ニ亞^ア那^ニ珊^ニ篤^ニ里^ニ沒^ニ藥^ニ吐^ニ劑^ニ。

下劑。利尿發汗劑ヲ兼用シ或ハ鐵劑ヲ用テ幾那人

効力ヲ扶クベシ此病ニ熱ヲ兼ル者ハ腐敗熱ノ藥劑ヲ與ヘテ的當ス

瘰癧瘰癧腫及ビ其毒ヨリ險惡ノ諸症ヲ發スル者

ハ幾那多ク良効アリ然レ其毒既ニ深ク滋蔓シ大

ナル腺ニ壅結ノ惡厲ノ硬腫トナル者ハ幾那害ア

リ○各部ノ腺ニ膿ヲ成シ荏苒タル内伏熱ヲ發シ

日ニ虛羸ニ就ク症ハ幾那ヲ的當トス黴毒ニ因テ

右ノ如ク虚損スル者或ハ汞劑ヲ用ヒテ吐涎過多

ナル者ハ皆幾那ヲ用ヒテ其精カヲ保護シ脱泄ヲ

防クニ尤良

多汗尿崩此兩症ハ汗及ビ小便ヲ排泄スル細管大

ニ弛弱縱解セルヨリ發シ或ハ血液甚ダ稀薄ナル

ヨリ發ス故ニ幾那ヲ用ヒテ收固強壯ノ偉効アリ

或ハ其症ニ隨ヒ阿芙蓉ヲ加ヘ或ハ礮性ノ酸精ヲ

加ヘ清涼收斂ノ殊ニ驗アリ

失血吐血衄血崩漏孕婦產後墮胎ノ崩血痔血外傷

失血等多血ニ血液沸騰妄行シ發スル症ハ刺絡

ノ治スベシ幾那害アリ焮衝ノ症去テ仍失血甚ク

ノ止ザル者ハ幾那煎ニ綠礬精若クハ硫黃精ヲ加

ヘ或ハ阿芙蓉劑亞刺比亞釐謨或ハ阿煎藥赤石脂

血竭等其症ニ隨ヒ擇テ加ヘ用ヒテ血ノ運行ヲ抑
 制シ治スベシ。○内部諸器ノ脉管大ニ弛弱シ血稀
 薄ニシテ細絡ノ末梢ニ滲出シ或ハ血絡破裂ノ失血
 ヲ爲ス者ハ專ラ幾那ヲ用ヒ或ハ玫瑰舍利別ニ研
 和シ與ヘテ殊効アリ。○
 肺瘍 肺ノ潰瘍ハ幾那良効アルヲ必カラズ。是レ纖
 維ヲ強壯シ腐壞ヲ遏メ創ヲ愈シ肺靜脉ヨリ血中
 ニ吸收セル膿ヲ排泄シ。潰瘍ノ周圍ヲ收固メ腐爛
 ヲ防ギ良膿ヲ醸スルヲ諸潰瘍ニ用テ良驗アルガ
 如シ。然レ此病甚ダ增長メ精力虛脱シ惡症ヲ現ス

者ハ不治トス。○此病ハ起居攝養ヲ慎ミ淡薄ノ飲
 食ヲ用ヒ殊ニ一切肉類ヲ禁シ麥類蔬菜及ビ乳汁
 ヲ與ヘテ腐敗ヲ防ギ血熱ヲ清涼ニシ。藥劑ノ効ヲ
 扶ルヲ最要ノ先務トス。○肺瘍潰破シ効メ其膿ヲ
 咯出スルハ最良トス。否ラザレバ其腐壞ノ酷厲毒
 肺ニ鬱蓄メ侵蝕シ其瘍愈増展スレバナリ或ハ其
 膿小便ヨリ通泄スルモ亦良。但下利若ハ汗ヨリ排
 泄スルヲアレ此兩道ヨリ數多ク出ルハ必ズ佳
 事ニ非ズ是ニ由テ治スルヲ稀ナリ。○多ク膿ヲ吐
 ク症ハ幾那良効アリ但是ニ緩和ノ効アル藥ヲ加

へ用テ効ノ急迫ヲ緩メ且、幾那人收瀉ニ因テ吐痰
 非障碍ナルヲ久ヨク略出セシムベシ即チ亞刺
 比亞、越、謨、達、刺、侃、篤、甘草膏、遏爾託亞、葵類、石長生等
 煎劑トシ若ハ舍利別ト爲スガ如シ○其膿、小便
 排泄スル症尿ヲ濾器ニ取リハ屋施、兒、海葱、蜜
 民埵、列、利、精、甘、消、石、精、消、石、錠、霸王鹽、等ヲ擇テ幾那
 ニ加ヘ用テ其排泄ヲ扶クベシ○此病、壯熱ヲ發シ
 若ハ肺中壅塞スル處アルヨリ吐痰ヲ妨ケ略出シ
 難キ症ハ先是ヲ治スベシ。痰ヨク略出スルニ非レ
 幾那ヲ用テ害アリ○肺瘍甚ダ增長セザル者ハ

右ノ如ク意ヲ用テ幾那ヲ與レバ多ク良驗ヲ奏ス。
 幾那ノ肺瘍ニ効アリト稱スルハ皆右說所ノ症ナ
 リ○胸内瘍重訂内科撰要第百六十四章ニ出ハ幾那ヲ用テ間全治
 ス。痰ノ臭氣多キ症ハ殊ニ効アリ○肺中ノ各處、化
 膿スベキ硬結腫ヲ生メ勞效トナル者、並ニ焮衝性
 ノ病アリテ肺ニ膿ヲ成ス者ハ幾那害アリ
 勞效、勞效及ビ勞療様ノ羸瘦病、凝體纖維ノ虛弱弛
 解セルヨリ發シ或ハ瘰癧毒ノ潜伏メ侵襲スルヨ
 リ發スル症ハ幾那良効アリ○痰ヨク略出シ或ハ
 膿ヲ交ヘ其熱間歇往來シ若ハ時ヲ定テ増發シ脉

弱。精力缺脱スル症ハ幾那ヲ用テ驗アリ。○吐痰甚
 ダ多ク夕脉弱。精力缺脱スル者殊ニ幾那適應ス。
 吐痰甚ダ多クレバ精力是ガ爲テ虚脱シ其潰瘍ヲ
 愈スベキ善膿ヲ化釀スルヲ能ハザレバナリ。○幾
 那ノ散劑ハ其熱ヲ増發シ胸中促進ヲ起シ吐痰ヲ
 阻遏スルヲアル故ニ煎劑トシ用フ者。是ヲ沸湯
 ニ浸メ煎スレバ殊ニ効多シ假令ハ左ノ方右如シ
 幾那和胸飲 六十四卷ニ出ルハ幾那天潤全成
 幾那幾那 一子
 沙列布根 一錢此根關ルハ
亞刺比亞越謨ヲ用ハ

右幾那ニ適宜ノ沸湯ヲ加ヘ浸ス7八時ニシテ沙列
 布根ヲ加ヘ煮ル7八分時。漉テ其液十四子ヲ取リ
 舍謨字點謨舍利別。十二錢ヲ攪和シ一時半或ハ二
 時毎ニ半茶碗ヲ服ス 按ニ白及沙列布ノ一族ナリ
 ○患者體質乾涸ノ痰出難ク或ハ效劇クノ痰稀キ
 ハ沙列布其他緩和ノ藥ヲ加ヘ用ベシ全軀羸瘦甚
 ク。胃弱キ者ハ依蘭苔ヲ加フベシ。○幾那劑ハ甘草
 ヲ加テ宜シ是ニ由テ其苦味ヲ甘和シ又吐痰シ易
 カラシム。○幾那ノ煎劑ヲ用テ熱減シ痰ヨク咯出
 スル者ハ幾那ノ末ヲ飲液ニ和シ或ハ煉膏ニ和シ

日二三回用フベシ。○幾那ヲ用テ後。冷氣ニ冒感シ吐痰俄々止ニ煩悶スル者ハ過爾託亞甘草。或ハ亞刺比亞越謨ノ末ニ甘草膏ヲ加ヘ用テ肺ノ癢急ヲ緩和メ痰ヲ滑利セシメ。痰ヨク出ルニ至テ復幾那ヲ用フベシ。○幾那ヲ用テ發熱減シ炊衝ノ候ナク脉甚ダ急疾ナラズ呼吸促進セズ痰ヨク出ル者ハ左ノ方ヲ用フベシ。

越謨幾那丸 休限十二粒。越謨ノ一。半粒。ハ二。本丸幾那一。多。ハ八。合。亞刺比亞越謨。四。各二錢。甘草膏一錢。

龍牙草越幾斯劑 二錢。製法。蒲公英。右調和シ舍利別ヲ加ヘ三氏ヲ一丸トシ。六丸若ハ八丸宛用ル。一日ニ三回。○顔色黧澹灰白。熱ナク血液沸騰ノ候ナキ者ハ左ノ方ヲ用テ驗アリ。

乳沒越幾斯劑

乳糖 一多半
沒藥越幾斯劑 四錢

右調和シ一刃或ハ半錢宛用。一日ニ三回。但以前ニ吐血ノ症アル者ハ沒藥ノ量ヲ減スベシ。○勞瘵ノ汗多ク出ル症ハ幾那煎ニ越栗失爾赫篤立少許ヲ加ヘ用テ殊効アリ。○勞瘵ニ拔爾撒謨劑ヲ與レバ

其熱ヲ増發シ良効ヲ得ルヲ稀ナリ○患者熾熱乾
 效胸痛之脉稍力アル者ハ刺絡ノ後緩和ノ効アル
 和胸劑ヲ用ベシ此症ハ幾那ノ類總テ收瀦ノ藥ハ
 吐痰ヲ妨ゲ害アリトス○凡勞效ニ幾那ヲ用テ吐
 痰減シ熱及ビ渴ヲ發シ呼吸短促發汗等增長スル
 ハ幾那害アル候トス速ニ是ヲ休ムベシ○右ノ如
 久戒慎注意ノ幾那ヲ用レ凡其熱増發シ諸症日ニ
 加ハリ精力漸ク缺脱スル者ハ不治トス斯ノ如キ
 患者ノ死體ヲ剖觀スルニ肺藏ニ癭樣ノ潰瘍及ビ
 硬結腫夥ク生スレバナリ○右説ク所ノ如ク病性

各差別アル故ニ幾那モ亦功害途ヲ異ニス醫家此
 藥ノ大功アルヲ稱シ或ハ大害アリトシ排斥スル
 下アルハ皆是ガ爲ナリ○勞瘵ニ用テ多ク良驗ヲ
 得ル藥ハ依蘭苔亞兒尼加越栗失爾赫篤立ナリ
 條ニ故ニ是ヲ幾那ニ加ヘ用テ治驗多シ
 出ツ故ニ是ヲ幾那ニ加ヘ用テ治驗多シ
 虛損羸瘦病在苒タル虛羸ノ諸病ニ幾那ヲ用テ間
 殊効ヲ得ルアリ遺精白帶下等漏泄ノ諸症久キ
 ヲ經テ羸瘦スルガ如キハ幾那ニ緩和滋養ノ藥ヲ
 加ヘ用テ多ク効アリ即チ乳汁雞子黃過爾託亞依
 蘭苔ノ如シ其症治スレバ幾那ニ鐵劑ヲ加ヘ用ベ

シ内藏壅塞ナク唯血液枯涸維弛弱ヨリ起ル云○小兒ノ羸瘦ハ多ク内藏ノ壅塞硬結ヨリ起ル故ニ幾那害アリ。此症ハ苦味石鹼質ノ解凝劑及ヒ中和鹽類共ニ上ノヲ用テ治スベシ○内藏ニ較著ノ壅塞硬塊ナク唯凝體纖維ノ弛弱虚衰セルヨリ發スル諸病ハ幾那良効アリ即チ諸器脉管ノ衰弱ヨリ發スル水腫尿管尙悽病或ハ失苟兒ボイ陪苦クノ病後虚羸セル者或ハ虚弱ヨリ起ル荏苒タル下利失血多汗痰夥ク出テ虚罷セル者或ハ失血過多ニメ虚衰セルヨリ發スル諸症ノ如キハ皆幾那ヲ用テ回復ス○内藏虚弱ナ

ルヨリ發スル諸病荏苒トメ治セズ終ニ宿疾滯患トナル者ハ幾那ヲ用テ治スル者多シ然レトスノ如キ症多クハ粘液留飲等胸腹諸器ニ壅滯スル故ニ先ツ是ヲ除治メ後幾那ヲ用ルニ非レバ効ナシ○胃腸ノ虚弱ナルヨリ發スル諸症假令バ飧泄下利嘔吐噫氣腹鳴痞脹食進マス或ハ化シ難ク或ハ善饑異嗜狗饑此症内科撰要善饑異嗜篇ニ出ツ疝腹痛ノ如キ惡液汚物ノ壅滯ナク唯胃腸ノ神經及ビ纖維ノ虚弱ナルヨリ發シ荏苒トメ治セザル者ハ幾那良効アリ又温壯香竄ノ諸藥ヲ加テ其効ヲ助クベシ即チ桂橙

皮、肉、豆、蔻、山、柰、丁、香、益、智、及、ビ、苦、味、健、胃、ノ、品、鐵、劑、等、其、症、ニ、隨、ヒ、擇、ニ、加、フ、ベ、シ

痛風、傷冷毒痛 此病、焮衝多血壯實ノ症アルハ幾那害アリ。然レ、凡、諸、疏、滌ノ方法ヲ施メ後、其痛淹滞メ解散セズ患者漸ク虛衰シ汗多ク出ル症ハ幾那大効アリ。○傷冷熱ノ腐敗ニ傾ク症或ハ失、苟、兒、陪、苦ヲ患ル者、傷冷毒ノ諸症ヲ兼テ甚ダ頑固ナル症ハ專ラ幾那ヲ用テ甚ダ驗アリ。○傷冷毒痛ト徽毒痛ト兼併セル症多シ。是ハ先ツ水銀劑ヲ用テ徽毒ヲ除キ、其痛仍治セザル者ハ安質没扭劑雙鸞菊越幾斯

劑、失、鳩、答、越、幾、斯、劑、阿、芙、蓉、劑、等、其、症、ニ、隨、ヒ、擇、テ、幾、那、ニ、加、ヘ、用、テ、全、功、ヲ、收、ム、ベ、シ

焮衝 胸脇焮衝等總テ實症ノ焮衝病ハ幾那害アルニ論ナシ。然レ、凡、一、種、虛、症ノ焮衝アリ。是ハ纖維諸管弛緩、虛弱ニ病性劇盛ナラズ甚ダ慢緩ナリ。此症ハ少ク刺絡ヲ施シ又一兩次吐劑ヲ與ヘテ病毒ヲ驅除シ其後幾那煎ヲ用テ捷効アリ

痘疹、發斑 痘瘡麻疹モ亦元運力虛乏ノ其毒發越シ難ク或ハ内攻スル症ニ幾那ヲ用テ大効アリ。或ハ腐敗ニ傾キ若クハ斑ヲ兼ル痘ニハ殊ニ峻効アリ

凡痘ノ結痂ノ頃ニハ幾那多ク適應ス。實症ノ痘ト雖モ此時ニ至レバ精力虚損スル者多ク或ハ其膿ヲ血中ニ吸收スルト過多ニハ所謂膿熱ヲ發スル者多キ故ニ幾那ヲ與ヘテ其惡症ヲ防グニ甚ダ的當スレバナリ。又其虚弱ノ輕重ニ隨ヒ纈草セトル攝爾扁セ答セ龍腦セ阿芙蓉セ硃砂セヲ幾那ニ加ヘ用ヒテ尤モ驗アリ。其他發斑。瘡疹類ニ幾那ヲ用ル標的皆右說ノ所ル如シ。

遠西醫方名物考卷二十終

地... 考... 物... 考... 探... 月...

春... 三... 十...

志... 郡... 志...

州... 州... 州...

觀... 觀... 觀...

野... 野... 野...

廣... 廣... 廣...

Vertical columns of faint text on the right page, likely bleed-through from the reverse side.

遠西醫方名物考標目

卷二十一

幾那

目

鱈草

主治

鱈亞

鱈味

咽喉

喉焮腫

痢

鱈草

潰瘍

腹瘍

腎膀胱潰瘍

潰爛痔

壞疽

水腫

神經熱

貴藥龍幾散

顯草消毒散

壯神解毒飲

龍亞幾那飲

顯草壯神飲

壯神消毒飲

揮發回神膏

幾那壯神飲

鎮痛和胸飲

卷二十一

遠西醫方名物考

遠西醫方名物考卷二十一

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕菴校補

幾那

咽喉焮腫腐敗性ノ病ニ惡性ノ咽喉焮腫若ハ鷺口

瘡ヲ兼テ虚憊セル症ハ幾那煎ニ海鹽精ヲ滴シ加

テ適意ノ酸味ト爲シ用テ奇効アリ

痢疫性ノ痢ハ先ツ胃腸ニ鬱蓄セル病毒汚物ヲ淨

掃スルニ吐劑若ハ下劑ヲ用ヒ或ハ吉利詞參兒ヲ

施スベシ吐劑ハ乙百葛格安那若ハ韃爾答越默室

遠西名物考

ヲ良トス。是特ニ吐スルノミナラズ。ヨク膠粘液ヲ
 溶解スレバナリ下劑ハ大黃。答未林度ヲ良トス。防
 腐清涼ノ効ヲ兼レバナリ。吐下劑ハ初發ノミナラ
 ズ其症ニ隨ヒ時々施スベシ。○胃腸ヲ淨掃ノ後焮
 衝ノ諸症漸ク退キ患者虛罷スル氏ハ腐敗ヲ防ギ
 虛脫ヲ復スルニ幾那ヲ用ヒ或ハ疫毒腐敗熱ヲ兼
 ル者ハ幾那ニ礮性酸精綠礬精。硫黃。精。鹽精。等。ヲ加ヘ施ス
 腐敗熱ノ條後ニ說出如クスベシ。但患者ノ虛憊及
 腐敗ノ多少ニ隨ヒ服量ヲ加減スベシ。右二品ノ收
 瀋ノ効ニ由テ憊弊セル腸ヲ強壯シ腐敗ヲ防止ノ

病毒ノ夥ク腸ニ聚リ來ルヲ阻遏シ且其酸性ヲ以
 テ亞兒加利性ノ酷厲毒ヲ剋制シ相抱合ノ一種ノ
 中和鹽性トナリ刺戟セザラシム又緩和鎮痛ノ劑
 ヲ兼用スベシ是ヲ以テ其酷厲毒ヲ包攝ノ刺戟セ
 ザラシメ且其傷爛剥裸ノ感觸甚キ腸ニ遍ク塗布
 ノ劇痛ヲ鎮メ攀急ヲ甘解スレバナリ其劑ハ亞刺
 比亞ビ越ゴ謨ム達タ刺ラ侃ガ篤ト過アル爾ル託タ亞ア錦キ葵イ根ム舍ケ謨ム字ズ點テ謨ム根
 點テ失シ刺ラ越ゴ葉エ等ト煎ニ劑ニ若カ舍ケ利リ別トトシ用ルガ如シ
 或ハ阿利イ襪フ油ユ甘扁カン挑テウ油ユ等モ亦良効アリ鎮痛藥ハ
 阿芙蓉劑ヲ用ヘシ○此病毒ハ多ク大腸ニ凝聚ス

ルカ以テ内服劑ヲ吉利詞參兒トシ肛門ヨリ注輸
入飲劑ノ効ヲ扶クベシ○神經熱ヲ兼ル者ハ幾那
ニ壯神發汗劑ノ後ノ神經熱ヲ加ヘ用テ尤効アリ○
凡、漏泄甚キ諸症ハ胃腸ヲ淨掃シ焮衝ノ候退テ後
對症ノ藥劑ニ幾那ヲ加ヘ施メ効アルト右説ク所
ノ如シ也且其効驗極大ニ焮衝甚クシテ
潰瘍幾那ハ華爾斯。越謨。及鐵ヲ含テ一種ノ技爾撒
謨質ヲ成ス故ニ腐敗ヲ遏止シ纖維ヲ充張セシメ
テ諸器ノ運營ヲ强健ニシ善膿ヲ化釀ス。他ノ技爾
撒謨ノ刺戟ノ焮熱ヲ發スルガ如クナラズ故ニ纖

維虛衰ノ愈難キ潰瘍ニ峻効アリ○凡、外部ノ潰瘍
膿汁多ク漏泄ノ精力虚損スル者或ハ侵蝕滋蔓ノ
腐骨疽ヲ兼ル者ハ幾那ヲ用テ峻効アリ。或云一患
者。股ニ潰瘍ヲ發シ腐骨疽ヲ兼テ胯骨脫臼ノ疼ニ
堪ズ遷延タル消耗熱ヲ發シ大ニ瘦削ノ骸骨ノ如
シ乃チ幾那ヲ久服セシメテ全愈セリ。又云潰爛セ
ル癌ニ幾那ヲ用レバ治セズト雖モ諸症増劇セズ。
總テ斯ノ如キ症ハ幾那ニ阿芙蓉ヲ加テ劇症ヲ鎮
メ或ハ越栗失爾。赫篤利。綠礬精。拳參根。亞兒尼。加桂。
等ノ酸性。強壯。收瀋ノ藥ヲ擇ニ加テ幾那ノ性功ヲ

扶クテ尤良○凡、險惡頑固ノ潰瘍ハ幾那ヲ用テ精
力ノ虚損ヲ保護シ善膿ヲ釀成セシメ或ハ其膿ヲ
血中ニ吸收メ發スル諸惡症ヲ治スルニ峻効アリ
○大ナル創傷ノ膿潰シ或ハ肢節ヲ截斷メ虚衰シ
或ハ瘦瘠ノ汚液多ク漏泄シ或ハ大ナル潰瘍ノ膿
夥ク溢レ滿ル症ハ皆幾那ヲ饒多ニ用ヒテ腐敗ヲ
遏メ精カヲ挽回メ全功ヲ收ムベシ
腹瘍 肝及膽ノ潰瘍ハ幾那ヲ用テ効多シ肝ノ潰瘍
ハ先、肝硬腫ノ痛ニ荏苒トメ消散セズ終ニ膿ヲ釀
メ外部ニ潰破シ或ハ其膿、總管ヨリ十二指腸ニ通

泄シ或ハ其通泄ノ路壅塞スレバ停滯メ胃ヲ侵蝕
シ其膿、胃中ニ漏泄ス。或ハ横膈ヲ侵蝕メ肺ニ連及
シ肺瘍トナル者アリ。此症ハ幾那ニ石鹼質、解疑、開
達劑ヲ加用、ベシ。即、蒲公英、越幾斯劑、失格列、乙、越幾
斯劑、睡菜、越幾斯劑、莖葉ヲ用フ。製法、失、山、菴、菜、昆、設
爾、弗、酸、模、昆、設、爾、弗、如シ。蓄留熱ヲ發メ潰瘍、逾、增
張スル者ハ酸性石鹼質ノ藥、酸模、答、未、林、及、礦性、酸
精ヲ用、ベシ。内部ニ鬱聚スル膿ヲ排泄ス扶ルニハ
清涼下劑ヲ良トス。又前ニ舉ル利尿劑ヲ用、ベシ○
腹部ノ膿瘍。皮上ニ潰發メ經久愈ズ瘦瘠トナリ或

其瘍。膽ニ穿透メ膿ニ膽液交リ外泄スル症ハ幾那
越幾斯劑ニ的列竝底那ヲ加ヘ丸藥トシ輕下劑ト
更五ニ用テ甚ダ驗アリ。又拔爾撒謨碌加的刺ヲ綿
撒絲ニ塗テ瘡口ニ貼シ若把兒麻膏ヲ以テ蓋ヘシ
腎膀胱潰瘍此症ハ初發各其患部焮腫メ遂ニ膿瘍
トナリ其膿ヲ小便ニ通泄メ淋瀝刺痛シ或ハ小便
閉ヲ兼ヌ。是ハ緩和劑ヲ與テ其攣急刺痛ヲ解シ其
膿ヲ通利シ易カラシムベシ。即チ過爾託亞錦葵葉。
亞麻子。甘草。茴香等ノ如シ或ハ是ニ幾那ヲ加ヘ用
ヒテ防腐排膿ノ効ヲ取ルベシ。○膀胱裏面ノ潰瘍

ニ右ノ療法ヲ施シ荏苒タル症ハ緩和劑ノ煎湯ニ
拔爾撒謨少許ヲ加ヘ水銃ニテ尿道ヨリ膀胱ニ注
入スレバ治スルヲ速ナリ。○
潰爛痔。潰爛ノ劇痛アル症ハ幾那ヲ内服シ或ハ
吉利詞參兒トシ施メ排膿愈創ノ一良藥トス。或ハ
重墜努責ヲ兼子疼痛甚キ症ハ拔爾撒謨碌加的刺
的列竝底那甘扁桃油阿利襪油玫瑰蜜雞子黃等ヲ
擇ニ加テ捷効アリ。
壞疽 重訂内科撰要第 幾那ハ善膿ヲ釀スル殊能ア
二十五章ニ註ス。ル故ニ壞疽ニ用レバ壞肉ト生肉トノ間ニ多ク膿

風雲堂藏 卷二十一

ヲ釀シ壞肉自ラ分テ剥脱ス。即チ前説ノ諸潰瘍ニ
良効アルガ如シ内服ハ煎劑トシ外用ハ蒸湯劑ト
シ施スベシ。凝體纖維弛緩虚弱ノ甚キホド逾効アリ。
故ニ熱壞疽ノ如キ熱多ク乾燥ノ渴アル症ハ幾
那害アリ。熱壞疽ハ即チ寒壞疽ノ初發ニ未ダ凝
流ニ體ノ運動廢絶セズ脉絡牽張ノ血液焮熱スル
症ナル故ニ唯其患部ニ凝聚セル血液ヲ疏散シ牽
張セル脉絡ヲ緩弛ノ寒壞疽ニ至ラシメザルヲ專
要トス既ニ寒壞疽トナリ患部盡ク壞肉トナリテ
痛痒ヲ覺エザル者ハ幾那ヲ用テ腐壞ヲ遏止シ生

肉ヲ防護シ死肉ヲ分析セシムルニ確實ノ効ヲ稱
ス。但、其輕重ニ隨ヒ服量ヲ増減シ或ハ強壯ノ効アリ
ル藥ヲ加テ幾那ノ功ヲ補助スベシ。龍腦モ亦此症
ニ殊効アリ。幾那ヲ外用スルニハ蒸湯劑或ハ琶布
トシ施シ或ハ薄荷。亞爾鮮。砒砂。龍腦。醋。赤葡萄酒。及
礦性、酸精等其症ニ隨ヒ擇ニ加テ峻効アリ。是ヲ以
テ焮衝。打撲等ヨリ發スル壞疽ノニナラス乾壞疽
ト稱スル乾枯ノ症モ亦効アルヲ少カラズ
水腫凡、水腫病ハ幾那的當セズ然レハ間歇熱ヨリ來
ル水腫ハ治驗多シ。其熱仍舊留スル者ハ殊ニ効アリ

リ但服量多カラザレバ効ナシ又利尿温壯ノ藥ヲ兼用ノ尤良。即チ健質亞那^{ゲンチア}良薑^{リョウキョウ}乾薑^{ケンキョウ}薄荷油及鐵劑ノ如シ。○水腫ハ先ツ利尿劑或ハ驅水下劑ヲ用テ其停水ヲ導泄スベシ。利尿劑ハ海葱。霸王鹽。孕礬酒石。氏^シ埤^デ列^レ利^リ精等ヲ擇ムベシ。驅水下劑ハ即^チ葯^{ヤク}刺^シ巴^バ蘇^ス甘^{カン}沒^モ扭^ニ。廬^ロ會^エ。藤^{トウ}黃^{キョウ}等ヲ擇ムベシ。停水通泄ノ後ハ其病因ヲ除^クベシ。是ハ内部諸器ノ壅塞或ハ水脉ノ縱弛破裂及諸脉纖維ノ虛弱セル等ナリ。故ニ解凝開達ノ劑^{上ニ}出^ツヲ與^テ其壅塞ヲ疏通シ次ニ幾那ヲ用^テ水脉諸管ヲ收固ノ繕縮セシメ。虛弱ヲ回復シ

再發ヲ防グベシ。又收瀋香竄ノ藥ヲ加テ尤良^ニ即チ健質亞那^{ゲンチア}。珊^{サン}篤^{トク}里^リ亞^ア兒^エ尼^ニ加^カ。葛^カ爾^ニ儒^{ニョ}龍^{リョウ}牙^ヤ草^{ソウ}。土^ツ木^{モク}香^{キョウ}根^{コン}。益智^{イシク}。苗^{ミョウ}香^{キョウ}。葛^カ縷^{リョ}子^シ。良^{リョウ}薑^{キョウ}。橙^{テイ}皮^ヒ。拳^{ケン}參^{サン}根^{コン}。及^チ鐵^{テツ}劑^ジ等ノ如シ。或ハ再發ヲ防グニ發汗利尿ノ藥ヲ加ヘ用ルモ良。○鼓脹ハ風氣ノ鬱積ニ因ラズ唯腸ノ潰瘍及腐壞ノ處アリテ發スル症ニハ幾那良^ニ驗^{アリ}。又酸性清涼防腐。石^シ鹼^{ケン}質^{シツ}ノ劑^ジ出^ツニ加^テ。珠^{シュ}的^{テツ}當^{トウ}ス。神經熱^{シニ}。神經熱ト腐敗熱トノ症候ヲ鑒別セザレバ諸熱ノ病性ヲ辨識スルヲ能ハズ。施療多ク紛錯ヲ致スナリ。是諸熱病危險ニ至レバ右兩種ノ病性ニ

遠西名物考 卷二十一 六 風雲堂藏

罹レバナリ。○其症。初發患者未ダ卧床ニ就ス。神
思沈重鬱悒シ惘然トシ樂マズ志意好子セズ。微惡
寒シ或ハ忽チ發熱ノ往來定マズ。夜中快寢セズ。全
軀疲倦懈惰ノ舉動ニ堪ヘズ。漸ク頭痛困重ニ眩暈
ヲ兼子或ハ前頂疼云或ハ頭後痠痛麻痺ノ冷ルヲ
覺エ。飲食味ヲ失ヒ或ハ惡心嘔氣アリ若ハ吐スレ
バ唯淡水出ツ。渴ナク若ハ微渴アレハ煩渴引飲ノ
症ナシ。次テ頭眩困重發熱等増劇シ夜分殊ニ甚シ。
顔色慘悽。精神更ニ沈垂メ微煩シ呼吸不利ノ屢大
息シ。時ニ鬱冒ノ睡ルガ如シト雖モ患者少モ睡ル

トヲ覺エズ。或ハ頰頰焮熱ノ顔赤色ナルトアレハ
鼻頭耳輪四末微冷シ額冷汗出ツ。脉弱ニメ數搏度
齊ハズ。病勢增長スレハ頭旋上衝耳鳴甚クノ時ニ
謔語ス然レハ狂躁ニ非ズ唯思慮錯誤セル呢喃ノ菴
言示メ時ニ自ヲ醒復ス胸中壓迫苦悶シ肢體顛振
瞤動ノ億困シ僅ニ轉側スレハ昏眩メ冷汗出ツ。漸
危篤至シハ脉極テ細數ニメ振蕩シ驅趨スルガ
如シ。或ハ飲液咽下ノ難久或ハ舌ヲ出セハ振搖
或ハ舌縮テ出ス不能メ眼鼻陷削メ四肢冷或
ハ頻頻呃逆ヲ發シ或ハ顛振筋惕甚クメ搐掣或

ハ譫語休テ昏睡シ或ハ四肢冷テ粘汗漏泄シ或ハ
 數烈ク水瀉シ或ハ大小便淡覺エテ漏泄シ或ハ精
 神昏瞶メ視聽分明ナラズ或ハ初視聽メ感觸過甚
 公ハ僅ハ光暉物響ニ堪ル者今瞪視耳聾ノ少モ
 通徹セザルハ此即纖維諸管衰弊罷極シ括約衛固
 ノ元力ヲ失ヒ諸液崩壞焯解ノ死ニ瀕キハ候トス
 ○舌初ハ乾燥セズ色變セズ或ハ微白ノ滑苔生ス
 病勢増劇スレバ黯赤色ニシテ甚ダ乾燥シ裂紋ヲ生
 ス或ハ邊焦黃ナル者アリ唇舌甚ダ焮熱スレバ渴
 セス○小便黦澹ニシテ濁リ逆ナシ但病勢劇盛ナル

片ハ濃色ニシテ粘著ス○凡熱病ハ人ノ稟賦ニ隨テ
 病性ヲ異ニス。纖維脉管強剛充張メ血液醇厚饒多
 ノ人ハ血中揮發ノ鹽油ヲ含ム尤多クメ運動ノ勢
 力強健ナリ。故ニ疫氣ニ感染スレバ是ヲ抗拒スル
 勢力強盛ニシテ大過ノ運動ヲ逞發シ血液大ニ沸騰
 ノ壯熱焮衝等劇盛ナル諸症ヲ發ス。即熾盛熱焮衝
 熱是ナリ但血液大ニ酷厲ナル人ハ其壯熱ノ沸蒸
 ニ因テ血中ノ鹽油速ニ凝聚シ變メ亞兒加利性ノ
 酷厲毒トナリ劇ク血質ヲ腐敗ス即腐敗熱是ナリ
 神經熱ニ罹ル患者ハ元來纖維諸管柔弱弛緩ニシ

遠西名物考 卷二十一 風雲堂藏

揮發ノ鹽油匱乏シ血質淡薄ニノ醇厚ナラズ神經
 液及水樣諸液殊ニ薄弱ナリ大ニ神思ヲ困苦シ形
 適セズ饑飽節ヲ失ヒ或ハ失血其他甚キ脱泄房勞
 過度或ハ瘴霧雨濕多キ地ニ住等ニテ天稟ノ纖維
 血質ヲ虧損スル者故ニ疫毒侵刺スト雖モ大過ノ
 殊多ク此病ニ罹ル故ニ疫毒侵刺スト雖モ大過ノ
 運動ヲ憤起ノ欸衝壯熱等ノ劇盛ナル諸症ヲ發見
 スルヲ能ハズ。是ニ由テ血質速ニ腐敗ニ罹ラズ唯
 神經液及水樣液之イ沕イ等膠粘ニノ凝固シ運行甚急
 慢ニノ脉管ニ壅滯停滯シ漸腐敗ノ酷厲臭穢ノ液
 トナリ危險ノ諸症ヲ發スルナリ故ニ神經熱ハ其
 毒水樣液ニ在テ病性遷延慢緩ヲ致シ腐敗熱ハ其

毒血質ニ在テ速ニ腐敗シ病性劇盛ナルヲ其諸症
 ニ徵ノ察スベシ○或ハ神經熱ト腐敗熱ト合併ス
 ル症アリ。此ハ纖維諸管柔弱弛緩ニノ血質甚酷厲
 ナル者。疫氣ニ感染スレバ血中ノ鹽油速ニ變ノ酷
 厲トナリ大ニ侵刺スレバ大過ノ運動ヲ發スルヲ
 能ハズ。腐敗熱ノ諸症ヲ兼發ノ危險ニ至ルト雖モ
 病性慢緩ナリ斯ノ如ク患者ノ體稟強弱厚薄多少
 交錯スルヲアル故ニ病性諸症モ每人多少ノ差異
 アリト知ヘシ○其治法。初發惡心嘔氣アリ。心下痞
 滿等。胃中鬱滯ノ症アル者ハ輕キ吐劑ヲ用テ胃ヲ

遠西名物考 卷二十一 九 風雲堂藏

淨掃スベシ。下劑ニ比スレバ害ナシ即チ^イ百葛^ケ格^コ
 安^ア那^ナ十五^ハ瓦^ハ若^ハ二十^ハ瓦^ハヲ與ヘ。或清涼湯吐飲^世出^ツ
 二三匙宛與ヘ。其症仍^ホ休^ヤザル者ハ二日若^ハ三日ニ
 一回用^ベシ。吐劑ヲ服シ難キ者ハ大黃^ト神^ト那^ト等ノ
 泡劑^ヲ與テ胃腸ノ汚液ヲ滌除シ。鬱滯ナキニ至テ
 幾^{フリ}那^タヲ用^ベシ。爾後大便壅滯スル者ハ兩三日ニ一
 回宛^ド綏^ク和^キ吉利^{リス}詞^ス爹^テ兒^ルヲ施メ病毒ノ鬱滯ヲ通スベ
 シ。此病ハ峻攻ノ下劑ハ大害アリ殊ニ初發妄ニ瀉
 下スレバ精力速ニ虛脱ノ昏睡等ノ惡症ヲ發ス。○
 神經熱其他虛人ノ熱病。初發ヨリ神經大ニ虛憊^ノ

ル諸症ヲ見シ或ハ發斑熱ノ甚ダ惡厲ニシテ精力大
 ニ缺脱セル症ハ胃腸ヲ淨掃ノ後幾那ヲ用ヒテ驗
 アリ。然^レモ動^ヤ輒^スバ初發病性分明ナラズノ幾那ヲ投
 メ害ヲ致シ或ハ初發ニ用テ效^ヲアレモ病勢増劇セ
 ル者ニ用テ害ヲ爲ス事アリ。故ニ諸症ノ轉移傳變
 ニ注意メ病性ヲ察スル^ル肝^ノ要^ナリ。○虛弱ノ患者
 幾那ヲ服メ下利スル^ル此^ノ未^レ合^ハ利^ト別^トヲ加^テ煉
 膏トシ香竄阿芙蓉液少^シ許^ヲ加^ヘ與^ヘシ。○此病ハ
 神經ヲ强健シ粘稠液ヲ稀釋シ蒸氣及^ヒ汗^ヲ發ス
 ル劑ヲ用テ全功ヲ收ムベシ。蒸氣及^ヒ微汗^ヲ發ス

遠西各物考 卷二十一
 風雲堂

レバ徐々ニ病毒敗液ヲ排除ノ神經血液ノ失常ノ
運動ヲ鎮メ煩悶ヲ除テ安眠セシム其藥ハ昆答刺
越兒發攝爾扁答額草雜腹蘭葛私多樓謨ノ如シ又
龍腦清涼飲壯神清涼飲共ニ世的里亞カ鎮痛和胸
飲後出テ人如キモ良効アリ但阿芙蓉劑ヲ過用スレ
ハ大ニ害アリ不寐ヲ兼ルト雖モ戒慎ノ服量ヲ斟
酌スベシ○患者虛憊スル症ハ左ノ方尤驗アリ

龍幾散

攝爾扁答額草 各十瓦
昆答刺越兒發 各十瓦

龍腦

各十瓦

右散劑トシ二時毎ニ一劑ヲ與フ○左ノ方亦殊効

壯神消毒飲

- 攝爾扁答額草 各十瓦
- 昆答刺越兒發 各十瓦
- 葛私多樓謨 五瓦
- 雜腹蘭 六瓦

右細末トシ適宜ニ舍利別ヲ加テ煉膏トシ一服ト

ス。二時若ハ二時半ニ一服宛用フ○左ノ方亦良

額草消毒散

額草 一日

雜腹蘭

葛私多 僂謨 各四匁

右細末トシ調和ノ一服トシ日三四服。飲液ニテ送下ス○病勢増劇ノ顫振睨動甚ク或呃逆。神經掣引等危篤ノ症ヲ發スル者麝香六匁ヨリ一匁マデ一服トシ日二三用テ奇効アリ。或左方ヲ用ベシ

揮發回神膏

麝香 十五匁

龍腦 三匁

鹿角鹽 六匁

右研和シ舍利別ヲ加テ煉膏トシ一服トス。此劑搗掣ヲ鎮メ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利メ病毒ヲ驅散ス或ハ左ノ劑亦捷効アリ

壯神解毒飲

鹿角鹽

雜腹蘭

刺賢 堙兒精 一錢半

橙汁 三錢

解毒水 亞鉛條ニ出ツ 一多半

右解毒水ト橙汁ヲ調和シ。鹿角鹽ヲ加ヘ沸騰シ了
テ餘藥ヲ攪和シ一服トス。二三時ニ一服宛用フ又
壯神清涼飲^{出上}ニ兼用ノ良或ハ揮發香竇精ヲ葡
萄酒若ハ白芥子ノ煎湯ニ滴シ用テ殊効アリ○精
神萎靡錯語休^ガル者ハ瓦爾^カ技奴^バ謨^ヌニ龍腦少許ヲ
加ヘ用ヒ。芫菁膏ヲ項窩。耳後等ニ貼シ。鹿角膠或ハ
乳清或ハ大麥煎ニ葡萄酒若ハ橙汁ヲ加ヘ頻リニ
與^フヘシ是ニ由テ酷厲液ヲ潤灌ノ清爽活潑シ蒸氣

微汗ヲ發ノ病毒ヲ排泄ス○病勢漸減ノ其熱發止
往來スル者ハ橙汁ニ亞爾鮮鹽^{アルセム}ヲ加ヘ沸騰止ムヲ
度トシ用レバ其熱長ク暫留セズ。此劑粟疹ヲ兼ル
ニ用テ尤良○病勢漸ク退テ其熱發止往來シ或ハ
發汗等ノ排泄ニ因テ精力虛憊スル者ハ幾那末半
錢若ハ一錢宛日四五次赤葡萄酒ニテ服スベシ。若
末ニテ服シ難キ者ハ此末一ヲ取テ列印^レ設酒^イ若
ハ赤葡萄酒一勃^ボ的里斯^{テリス}ニ浸ス^リ兩三日。憑^コテ滓ヲ
去リ頻クニ一盞宛用^フベシ或ハ左ノ方亦治驗多シ

幾那壯神飲

幾那

去リ 纈草 二錢
 雜腹蘭 一錢
 橙皮 四錢
 右細末トシ 燒酒十勺ヲ加ヘ浸ス 一三四日。漚テ滓ヲ去リ 二卵匙宛 赤葡萄酒一盞ニ加ヘ與ル 一三日 四次 或ハ幾那ヲ煎劑若ハ浸劑トシ 揮發衝動防腐 藥ヲ加ヘ用テ効アリ 假令ハ龍腦ヲ亞刺比亞 護漿ニ研和シ 幾那煎ニ加ルガ如シ。但是ヲ燒酒ニ 溶ス 一勿レ。斯ノ如キ精烈ノ液ニ溶ノ煎湯ニ加フ

レバ其氣速ニ耗散スレバナリ 〇險重ノ神經熱。腐敗熱。其他虛罷甚キ熱病ハ幾那煎ニ揮發衝動ノ峻藥ヲ加ヘ用テ殊効アリ。假令ハ左ノ方ノ如シ

龍亞幾那飲

幾那 尋常者 赤幾那 各一勺半

右水適宜ニ加ヘ煮テ滓ヲ去リ 左ノ藥ヲ加フ 煎 纈草 六錢
 右浸ノ藥氣ヲ出シ。滓ヲ去リ。其液二十勺ヲ取リ。又

左ノ藥ヲ加フ
 橙皮 舍利別

龍腦上好者二月亞刺比亞
越謨漿ニ溶化スル者
亞的兒ニ錢

右調和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ服ス○右ノ諸劑ハ
徐々ニ衝動ノ纖維諸管ノ運動怠慢乏弱ナルヲ振
起醒覺シ血液ヲ稀釋ノ微汗ヲ發シ筋惕顫搖煩悶
等ヲ治ス○右ノ療法ヲ施ノ舌潤ヒ驚口瘡等口中
ノ諸患ナクノ多ク痰唾ヲ咯キ皮膚温ニノ遍ク潤
澤アルハ最モ善徵トス此病ハ微汗及ビ痰唾ノ排
泄アルヨリ佳キハナシ患者耄昧昏惑スト雖モ死
ヲ免ルベシ或ハ病勢漸ク減スル時輕ク下利ノ患

者虛疲セズ或ハ鼻唇等ニ皴疹若ハ腫瘍ヲ生シ或
ハ耳聾ノ耳中及ビ耳邊ニ膿腫ヲ發スルハ皆善徵
トス斯ノ如キ排泄アル片ハ滋養津潤ノ飲液ヲ多
ク與テ精氣ヲ活潑助長シ且其排除ニ因テ日夜ニ
多ク費耗セル津液ヲ補充シ逾内托分利ノ全功ヲ
成サシムベシ○此病ニ大汗ヲ發スルハ甚ダ害ア
リ殊ニ辛熱慄悍ノ發汗劑銳烈竄透ノ露精類ヲ投
以發汗スレバ速ニ血液ヲ焯解渙崩ノ危篤ニ至ラ
シム或ハ初發熱勢増進スル時大ニ發汗セシムレ
ハ精力頓ニ虛脱シ精神昏聩筋惕顫振戰慄冷汗等

ヲ發ノ終ニ昏睡トナリ或ハ焮衝熱ヲ發メ胸中苦悶呼吸促迫漏汗不寐譫語等ヲ兼ルヲ宛モ肺焮衝内科撰要ノ如シ。是神經攣急ノ衝逆スルヨリ發スル症ニメ子宮衝逆ノ呼吸促迫苦悶ト同シ。又咳嗽ナキヲ以テ肺焮衝ニ非ルヲ知ベシ。此症ハ上ニ舉ル壯神劑ヲ擇ミ用テ神經失常ノ運動ヲ靜止シ治スベシ。○大抵第七日以後粟疹ヲ發メ病毒排泄スル下多シ。此症ハ輕キ強壯潤灌ノ飲劑ヲ多ク與ヘ或ハ的テ里亞リ加若カハ左ノ劑ヲ兼用メ諸險症ヲ靜止シ蒸氣微汗ヲ進テ粟疹ヲ發スベシ。

鎮痛和胸飲

安息香華 各一錢
 阿芙蓉 各一錢
 龍腦 二錢
 苗香油 半錢
 燒酒 再釀者 二地
 右浸メ藥氣ヲ出シ。臨時ニ瀝シ。一卵匙宛飲液ニ和シ服スル。日ニ三次。○粟疹ヲ發セントスル時。胸中苦悶呼吸不利煩躁スルヲ多シ。或ハ粟疹内攻スレバ必ず右ノ諸症ヲ發ス。此亦右ノ劑。並ニ前ニ舉

ル壯神劑ヲ用キ。且強壯潤灌ノ飲劑ヲ兼用メ驅發
 不谷^シ斑疹^ノア^ル症ニ微汗ヲ發スルハ利益アル
 氏大ニ發汗スルハ甚害アリ。或ハ夥キ發汗連綿ノ
 休マズ其間ニ粟^ノ砲^ヲ發スル^ト二三回^ド病患必^シモ減
 セズ。精力大ニ虚憊セル者アリ。或ハ發汗劑ヲ投メ
 汗止^マカル^ト三四十日。其間粟疹ヲ發スル^ト三四回^ド
 ニノ精力大ニ虚脱セル者アリ。斑疹ナキ神經熱モ
 熱性ノ發汗劑ヲ投メ大汗ヲ發シ危險ニ至ル者少^ク
 カラズ故ニ汗甚多キハ病毒排泄ノ症ニ非ズノ血
 液崩解シ精力虚耗スル候トス赤色或ハ白色ノ粟

砲夥クノ且數發スルハ特ニ病毒多キ候トシ。又辛
 熱走竄ノ劑ヲ過用スルヨリ發スル^ト稀^クナラズ或
 ハ汗多キニ因テ粟疹ヲ發スル者アリ。是^レ皮中ノ細
 腺其發汗ニ因テ腫起メ疹ノ如ク見ユルナリ。此猶
 平人ノ夏月汗多キ者汗疹ヲ發スルガ如シ。○右ノ
 如キ精力虚耗ノ漏汗ヲ發シ或ハ病勢退ク時汗漏
 泄メ虚憊スル者ハ數上好ノ赤葡萄酒ヲ與ヘ或ハ
 幾那壯神飲^上ニ用^フベシ。ヨク汗ヲ減メ強壯ス。或
 ハ幾那^ヲ幾^ク去^ル爾^後ニ雜^カ腹^ヲ蘭^ヲ攝^ル爾^扁答^ヲ加^シ少^ク許
 宛^テ與^フ精力ヲ資補スベシ。○凡^ソ病毒ノ排泄過度ニ

因テ患者虚憊スルレバ徐々ニ是ヲ抑遏スベシ。假令ハ下利甚キ者ハ的里亞加等ヲ用テ微汗ヲ發スレバ下利自ラ止ムカ如シ。然レモ漫ニ收瀉劑ヲ過用ノ是ヲ閉止スレバ其毒忽チ内攻ノ他部ニ轉移シ危症ヲ發ス。假令ハ烈キ收瀉劑ヲ用テ卒ニ下利發汗ヲ閉止シ或ハ冷氣ニ觸レ若ハ寒冷ナル衣衾飲食ヲ用テ斑疹ヲ内攻セシムレバ忽チ痙攣ノ運動ヲ發メ惡寒戰慄胸中苦悶煩躁譫語昏聩或ハ惡心嘔逆心腹痛ヲ發スルカ如シ○依百七名經驗說ニ云、幾那ハ神經熱ニ多ク偉効ヲ稱スレモ其功一様

ナラズ。嘗テ經驗セル一二ノ患者ヲ左ニ略舉ス○一婦人年二十一。乳養ノ兒アリ。神經熱ヲ患ヒ。第七日ニ當テ精力大ニ虚憊シ呼吸寒難數大息シ乾欬及輕キ下利アリ。脉百四動晝夜平分、時半時ヲ六十ニテ密扭焉ト云フ。密扭焉ノ間ニ脉搏ツル百四動ナルヲ云。西洋ノ醫家常ニ三針ヲ具ル自鳴鐘ヲ帶テ患者ノ脉動ヲ算ルナリ。舌潤小便並アリ。此症幾那ノ末ヲ取、一時半毎ニ半錢宛用フ。第十日ニ至テ脉百八動。呼吸逾寒難ニ熱増發シ微渴アリ。翌日脉百十二動。睡リ難ク微譫語シ。小便並ナク。舌燥キ。下利益甚シ。因テ幾那ノ害アルヲ察シ。是ヲ休ム。其後右ノ

漢名物考 卷二十一 風雲堂藏

諸症暫留スルヲ五日。終ニ病勢漸減シ。日ヲ經テ回復ス。○一患者年二十。神經熱ニ罹リ頭痛及心下疼。微效アリ。小便濃濁ニシテ艱澁ス。第六日ノ夜微譫語ヲ發シ。脉弱ニシテ百二十動。第七日ニ當テ幾那ノ末一錢ニ水ヲ加テ研磨シ一服トシ。二時半ニ一服宛與フ。翌朝脉百二動。其夜百十動。第九日ハ脉百八動。手腕潤澤アリ。多ク睡眠ス。幾那ヲ用テ以來毎夜微譫語ヲ發ス。第十日ハ脉九十四動。總身遍ク蒸氣ヲ發メ潤澤アリ。第十一日脉八十七動。大汗ヲ發シ臭氣アリ。其睡眠及譫語仍歇ガレ皮膚益潤澤ヲ生スル故ニ幾那ノ良効アルヲ知ル。若應セザレバ皮膚乾キ呼吸不利スレバナリ。爾後日ヲ經テ其熱漸減シ諸症解散メ全愈セリ。○一患者年二十一。神經熱ニ罹リ第七日ニ當テ韃爾答越默塞ヲ與テ輕ク吐セシム。第十三日脉九十二動。乃二時毎ニ幾那末半錢ヲ與フ。第十四日脉八十動。頭痛減ス。第十五日小便夥ク逆ヲ生シ是ヨリ日ヲ經テ其熱並ニ諸症解散シ回復ス。○一婦人年二十四。神經熱ニ罹リ舌乾キ微汗アリ。呼吸不利シ時ニ呃逆ヲ發シ小便濃濁。夜中譫語ス。第十二日。是ヲ診ニ脉百八動ニシテ弱。

スル故ニ幾那ノ良効アルヲ知ル。若應セザレバ皮膚乾キ呼吸不利スレバナリ。爾後日ヲ經テ其熱漸減シ諸症解散メ全愈セリ。○一患者年二十一。神經熱ニ罹リ第七日ニ當テ韃爾答越默塞ヲ與テ輕ク吐セシム。第十三日脉九十二動。乃二時毎ニ幾那末半錢ヲ與フ。第十四日脉八十動。頭痛減ス。第十五日小便夥ク逆ヲ生シ是ヨリ日ヲ經テ其熱並ニ諸症解散シ回復ス。○一婦人年二十四。神經熱ニ罹リ舌乾キ微汗アリ。呼吸不利シ時ニ呃逆ヲ發シ小便濃濁。夜中譫語ス。第十二日。是ヲ診ニ脉百八動ニシテ弱。

顫振觸動ス。乃、幾那、末一錢ヲ取テ飲液ニ和シ二時半毎ニ用フ。第十三日脉百二十八動徹夜譫語シ聲嘶嘎ス。然、舌潤ヒ筋惕稍減ス。第十四日脉百三十動。皮膚乾キ熱增長ス。第十五日脉百四動。大便平生ノ如ク通利シ稍食ス。第十六日脉百十動。大汗ヲ發シ。大便通スルヨ三回。第十七日ニ至テ脉百動。熱減シ諸症漸、寛解シ日ヲ經テ回復ス。此症幾那ヲ與、テ二三日ハ其熱及諸症増劇シ皮膚乾キ聲嘎レ譫語逾、甚シ然、舌益潤ヒ筋惕顫動減スル故ニ幾那ノ適應スルヲ知ル。此症自然良能ノ病毒ヲ排泄ノ

回復スルヲ固ヨリ論ナシト雖モ幾那亦其運營ヲ扶ルヲ少カラズ。○右ノ經驗ヲ以テ考レハ幾那ノ効用一様ナラズ。第一ノ症ハ呼吸蹇難増加スルヲ以テ幾那ノ害アルヲ知ル他病ニ於テモ幾那ヲ用テ此症ヲ發シ病勢増進スルハ幾那害アル候トス。故ニ神經熱ノ初起少ク炊衝ヲ兼子或ハ呼吸蹇難不利スル者ハ幾那害アル一徵トスルナリ。○神經熱ニ幾那ヲ用テ總身發汗アルハ善徵トス。○此病ハ渴少ク或ハ渴ナク筋惕顫動。脉弱ニシテ數患者數大息スル者多シ。是皆幾那良候アル症トス或ハ病

未ニ至テ其熱發止往來ヲ爲ス者モ亦幾那適應ス
其熱少モ往來ナキ症ハ荏苒ト以解セザル者多シ
○凡、幾那ノ効アル病ハ葡萄酒モ亦良効アリ。幾那
害アル症ニハ葡萄酒モ亦害アリ。但、幾那ハ葡萄酒
ニ比スレバ効力慢緩ナリ。○扶歇蘭度扶歇蘭度名人云一種危
險ノ神經熱アリ。此症腸大ニ虛衰初ヨリ下利ヲ
兼ヌ。初發、傷冷熱ノ如ク寒熱往來肢節疼痛シ全軀
疲勞甚ク。神思困重。頭痛堪忍ビ難ク肌熱漸、増發シ
脉疾數ニ搏度齊ハズ。小便稠濁ナリ。次テ譫語ヲ
發シ筋惕顫振。目ニ明ヲ惡シ耳ニ物響ノ微スルヲ

甚ダシ病勢最危劇ニ至レバ下利益甚クノ重墜努
責ヲ兼子或ハ發斑衄血。下血。大便失禁。舌燥黑。尿尿
汗唾皆惡臭アリ。發斑以下血液腐敗ノ微或ハ精神蒙昧昏聩摸
床撮空昏睡呃逆及粘汗漏泄ノ死ス。此病譫語セザ
ル者ヲ第一等トス。既ニ譫語スル者ヲ第二等トス。
腐敗ノ徵及危劇ノ諸症ヲ發スル者ヲ第三等トス。
第一等ノ症ト雖モ三週ヲ經エマハリザレバ病勢減セズ。第
三等ノ症モ三週ヲ過レバ死ヲ免ルベシ。脉ノ疾數
一等ヲ加レバ病勢一等深シト知ルベシ。故ニ脉漸
緩ナレバ佳徵トス。小便艱澀或ハ小便閉ヲ爲ス者

了リ是其部ノ學急甚キ候トス熱毒惡厲ナル者ハ
 毎日兩次諸症増劇ス。午前若ハ午時ニ一發シ。日晡
 若ハ夜中一發スルガ如シ小便初發ヨリ病未ニ至
 ルマデ膠ヲ水ニ溶スガ如シ。病危篤ニ至ルバ小便
 逾稠厚ナリ。其色麥酒ノ如ク。白渣アル一手指横徑
 許。粘リテ膠ヲ加ルガ如シ病勢増劇ノ小便忽チ澄
 清トナルハ搗搗謔妄ヲ發スル候トス小便漸ク澄
 渣渣逾減ノ稀クナリ終ニ枸櫞色ノ如ク其底ニ純
 白ノ渣少許アルハ回復スベキ善徵トス精神朦昧
 ノ諸部麻痺不遂スルハ死候トス數乾嘔ニ飲食藥

汁ヲ吐スルハ危候トス耳聾ハ善徵トス。然レ此症
 變ノ物響徹觸スルヲ甚クナルハ病人増進スル徵
 トス三週ヲ經テ痰欬多ク出ルハ佳候トス。是ヨリ
 病毒分利スレバナリ或ハ病毒解散セントスル時
 總身發汗ヲ諸症輕快ヲ覺ルハ善徵トス治法ハ揮
 發衝動ノ藥ヲ與ヘテ患者ノ精力ヲ維持挽回シ又
 腸ノ罷弱ニ意ヲ用テ其下利ヲ止ルヲ一六要鍵夕
 リ第一等ノ症ハ左ノ方ヲ與フ

續草壯神飲

古蘇續草

四錢

沸湯

六

右磁罐^三内^レ蓋閉シ浸^ス水^ニ八分時。濾^テ滓^ヲ去^リ放^冷夕^左ノ藥^ヲ加^ス。午前^若ハ午時^ニ一發^シ。日^中民^ニ堙^レ利^リ精^ク。一^手忽^{ホツ}弗^フ滿^{マツ}鎮^{チン}痛^{ツウ}液^ニ。病^一錢^至。右調和^シ一^時。匙^ニ宛^{ツク}服^セ。又接骨^水花^ノ泡^ヲ湯^ニ。葡萄酒^ヲ加^ヘ温^服セ^シ。ホ^ベシ^レ民^ニ堙^レ利^リ精^ク。用^テ下^利増^長ス^ル者^ハ是^ヲ除^クベ^シ。○第二^等ノ症^ハ右^ノ方^中。纈^草。鎮^痛液^及ビ葡萄酒^ノ量^ヲ増^シ。又攝^ル爾^扁答^利亞^ヲ加^用フ^ベシ。○第三^等ノ症^ハ極^テ揮^發衝^動ノ峻^効アル藥^ヲ用^テ其^垂絶^罷極^ノ元^運氣^ヲ挽^回ス^ル非^レハ治^シ難^シ。即^チ麝^香。龍^腦。

亞^ア的^テ兒^ル。亞^ア爾^ル箇^コ兒^ル。硃^砂。阿^阿芙蓉。桂^露等^ノ如^シ然^レ。凡^ス斯^ノ如^キ藥^ハ極^テ慎重^ニ戒^懼ノ服^量ヲ些^ス少^ニシ。纈^草。攝^ル爾^扁答^利亞^ヲ泥^菖根^等テ作^ル前^方ノ如^キ飲^劑ニ加^ヘ或^ハ葡萄酒^ニ和^メ其^揮發^ノ峻^性ヲ抑^制シ甚^ク刺^戟セ^シメズ^ノ徐^クニ其^元運^力ヲ醒^覺振^起メ挽^回セ^シム^ベシ。但^シ服^量少^許ニ^シ數^回用^ルヲ佳^トス。○阿^阿芙蓉^ハ衝^動ノ性^力尤^モ峻^ニノ頑^凝潛^結石^ノ邪^毒ヲ揮^發メ潰^散シ易^カラシメ又^下利^及ビ腸^ノ諸^症ヲ寬^解シ神^經熱^ニ殊^効アル藥^トス。然^レ凡^ス其^酷厲^毒ノ衝^動ノ性^力尤^モ峻^{ナル}ヲ以^テ精^練ノ醫^家服^量ヲ斟^シ

本草綱目卷之二十一 二十

酌ノ其症ニ的當セシムルニ非レバ効ナク却テ衰
 弊罷散ノ元運力ヲ殘害スト知ルベシ。若シ是ヲ用
 テ精神冒昧。昏睡。多汗。四肢麻痺。脉益細數トナル片
 ハ其服量多クメ衝動ニ過ル候トス。故ニ速ニ其量
 ヲ減シ或ハ暫ク休ムベシ。○麝香ハ其性甚ダ揮發
 ニメ神經熱ニ的當ノ藥トス。阿芙蓉ノ如キ元運力
 ヲ殘害スル毒ナシ。虚脱ノ甚キ症ニハ是ヲ以テ阿
 芙蓉ニ代用テヨク元運力ヲ揮發メ醒復セシメ。一
 ハ阿芙蓉ノ毒ヲ解シ一ハ諸筋ノ動惕。危篤ノ顫振。
 譫語。狂妄。或ハ腠理緊縮ノ汗ナク或ハ胸中促迫。欬

嗽喘急等痙攣ノ運動アルニ奇効ヲ奏ス。○龍腦ハ
 神經熱。危劇ノ諸症ニ用テ麝香ト共ニ殊効ヲ見ハシ
 阿芙蓉毒ヲ解シ他藥ノ揮發衝動ノ効力ヲ資益ス。
 脉細ニメ弱。腠理弛開メ汗アリ。耳聾シ睡眠多ク。虚
 罷殊ニ甚キ症ニ用テ其精力ヲ挽回スルメ捷効ア
 ルメ阿芙蓉。麝香ニ優レリ然レテ脉細ニメ緊。腠理閉
 塞メ汗ナキ症ハ麝香ヲ的當トス。龍腦ハ熱勢メ増
 發シ汗管ヲ開弛スルメ麝香ニ若カズ。又過用スレ
 バ胃ニ觸テ惡心嘔噦眩暈ヲ發ス。故ニ服量少許ニ
 メ芳香ノ諸藥ヲ加ヘ用ベシ。○葡萄酒ハ揮發メ殊

能アリテヨク元運カヲ維持保護シ酷厲刺戟ノ害
 ナクメ殊ニ神經熱ニ峻効アリ。是ニ鹿角膠ヲ加ヘ
 用テ大ニ滋養ノ効ヲ稱ス。○硝砂ハ尤モ揮發衝動ノ
 峻藥ニシテ神經熱ニ用レバ効用阿芙蓉ニ近シ。故ニ
 戒慎ヲ加テ用ベシ過服スレバ衝動大過ニシテ血液
 溶解シ汗漏泄ノ虚脱スルノ恐レアリ。○但右ノ諸
 藥モ唯一藥ノニニ固執メ久ク用レバ其藥ノ偏性
 ナレテ殊効ヲ奏セズ。故ニ右ノ諸品ヲ配合シ或ハ
 更互ニ用ヒ或ハ効力緩和ナル藥品ヲ加ヘ若ハ兼
 用ノ其漸次ニ沈淪スル元運カヲ喚發メ回復スベ

シ。○礬性ノ酸精出ツニハ其下利ヲ増ス故ニ多クハ
 用ズ。然レハ衄血崩漏等過多ニシテ逾々危篤ヲ爲ス症ハ
 是ヲ用テ極テ驗アリ或ハ收斂亞的兒ヲ粘滑ナル
 液ニ和シ與フベシ其効。綠礬精ニ勝レリ。或礬性ノ
 酸精ヲ用テ腹痛下利ヲ起スコトアルハ亞爾箇兒
 ヲ加ヘ與テ是ヲ治スベシ。神經虚罷スレバ甚ダ多
 血ニシテ血絡大ニ盈脹スル者ハ右ノ酸精良効アリ
 但熱性衝動ノ藥ハ大ニ害アリ。○劇キ神經熱ニ於
 テ脉洪數。壯熱。譫語。衄血ヲ發スル者ハ收斂亞的兒
 ニ阿芙蓉六分ノ一ヲ溶シ一時毎ニ六滴宛粘滑ノ

本草綱目卷二十一 鹿雲堂藏

液ニ加ヘ與テ殊効アリ○下利ニ重墜努責ヲ兼ル
 症ハ專ラ揮發衝動ノ峻藥ヲ用テ上ニ説ク如クス
 ベシ。此神經熱ニ幾那及ビ其他收瀰ノ強壯藥ヲ用
 レバ虚憊ノ胃腸是ヲ消化スルヲ能ハズ。愈下利
 ヲ増シ煩悶ヲ發ス或ハ下利ナク胃腸ノ虚憊甚シ
 カラザル症ト雖モ是ヲ用レバ熱勢増劇ノ煩悶ス。
 此神經熱ハ幾那ノ如キ收瀰ノ藥ヲ投メ治スベキ
 輕易緩慢ノ病ニ非レバナリ乃チ其害アル所以ヲ
 察スルニ大凡虚憊ノ症ニ二種アリ真虚ト真虚ニ
 非ルトナリ所謂真虚ハ專ラ精力ノ虚耗缺損スル

己^{分ハダ}甚^キヨリ發スル神經熱ニノ病毒ノ體中ニ盤
 潜セザル者ナリ。此症ハ危篤ニ至ル者ト雖モ幾那
 ヲ與テ功ヲ收ムベシ。然^レ凡^ク斯^{コト}ニ舉ル所ノ神經熱ハ
 真虚ニ非ズメ嘗テ感受セル邪毒ノ内藏諸器ヲ暗
 襲潛侵メ恣ニ剽掠劫奪スル故ニ元運力是ヲ攘^{ハラ}ヒ
 除ントメ相攻伐シ大ニ罷弊メ爲ス所ノ虚憊ナリ。
 故ニ揮發衝動ノ峻藥ヲ以テ其罷弊セル元運力ヲ
 喚發振起メ邪毒ヲ攘除セシムルニ非レバ回生ノ
 績ヲ致シ難シ又其諸藥ハ當ニ元運力ノ罷弊ヲ資
 補培養スルノニナラズ其潜伏沈滯セル邪毒ヲ揮

散發越ノ排除シ易カラシム然ルニ幾那ヲ與レバ其
憤起ノ充張スベキ元運力ヲ收固ノ澁滯セシメ重
テ一層ノ衰弱ヲ増シ或ハ邪毒ヲ凝滯ノ逾體中ニ
淹留セシム然レ病毒漸ク解散シ胃腸消化ノ機轉
ヲ得。脉力漸ク生メ稍緩ナルニ至テハ幾那等ノ收
固強壯ノ藥劑ニ香竈ノ諸品ヲ調和シ葡萄酒若ハ
適宜ノ丁幾去爾ニ加ヘ用フベシ。以テ前記ノ
遠西醫方名物考卷二十下終

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭醫範提綱 棟齋宇田川先生著 全三冊 理學入門 植學啓原 宇田川榕庵先生著 全三冊

同 内象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 全一冊

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療正始 沖齋伊東先生著 全五冊

遠西醫方名物考 同上 全十冊 泰西名醫彙講 熱川其作先生著 全六冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 玄軒大槻先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微 同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町二丁目

