

遠西醫方名物考

之二

卷二十五



No. 1404

499.2
En-4
9

RE 13

遠西醫方名物考

九篇

九篇

風雲堂藏版 青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷二十五

麝香

麝形状

產地

香囊

麝香

鑒法

偽品

香說

主治

幾那麝香丸
魏角麝香丸
排毒蘭麝飲

麝香鎮痙飲


製造麝香

遠西醫方名物考

卷二十五

標目

風雲堂藏



富士川文庫
3312

製造麝香丁幾失爾

附 龍涎香

試法 偽品

產地 秤量

試質 原始

主治 龍涎香丁幾失爾

龍麝膏

卷之二十五

遠西醫方名物考卷二十五

榛齋先生譯述

男

宇田川

榕

榕菴校補

麝香

モスヰス羅蘭

麝

ミスヰスボッキイ

蘭

麝形狀

形牝鹿ノ如ク又野羊ニ似タリ。長三尺許。身

幹狹窄。頭面長ク尖リ。牙口外ニ出テ野猪ノ如シ。耳

長ク兔ニ似タリ。尾短ク二拇指長アリ。脚瘦一尺許。

蹄分裂ス。毛長サ一拇指半横徑許。背毛三拇指橫徑

許。他獸ニ比スレバ太ク且、纏縮シ乾剛ニメ折レ易

ク。赭白色駁雜ス

產地 支那ノ東京或ハ榜葛刺止白里ベリイ勃烏丹ボウタシ百兒西亞ペル其他亞細亞洲ノ諸國及ビ魯西亞レア地方ノ山林ニ住ム。東京勃烏丹ノ產ヲ上品トス。榜葛刺產是ニ次々。魯西亞ロシアノ產ヲ下品トス。

香囊 膜ノ臍下陰處ノ邊ニ一膜囊アリ。形圓ク大サ鵝卵ノ如ク。大ナルハ雞卵ノ如シ腹皮内ニ在テ囊底僅ニ一拇指横徑許。皮外ニ隆起ス或云其囊臍邊ト隆處トノ間ニ在リ。或云腹ノ下部陰處ノ傍ニ在ト或云後脚ニ近キ處ニアリ。或云囊長三拇指横徑。横徑許指獵戶此獸ヲ獲レバ其囊ヲ剜出シ曝乾シ或ハ囊ヲ截テ香液ヲ出シ曝乾メ復囊ニ内レ四方

ニ貨ス故ニ其截タル處絲ニテ縫合セル者アリ。是舗ヒイトケト呼フ者○囊黯灰色ニノ其底ニ毛皮著ク者多シ。是真麝ノ囊タルヲ見スガ爲ナリ。是レ囊底ノ毛者ナリ其餘周圍ハ腹皮ラ著テ縮出ス者アル故ニ毛皮ナシ○囊ヨク乾キ。大ナラズ膜薄ク膜ヲ成ス其毛少ク。赭褐色ニメ短ク纏縮スル。上品トス。是東京勃烏丹榜葛刺ニ出ル者トス。香氣尤烈ニノ價タガ亦貴シ。是レ藥舗ニテ本口ト呼フ者囊大ニメ膜厚ク白毛多クメ太ク長キハ下品トス。是レ止白里魯西亞ロシア等出ル者トス。或云榜葛刺產ノ者ハ白毛アリト。是藥舗ニテ白毛ト呼フ者皮厚ク毛多キホド逾下品トス。偽品或云或ハ囊ニ小

孔ヲ穿テ鉛ヲ入レ秤量ヲ重クスル者アリ○囊中薄膜アル者ヲ真品トス。香液此膜ニ著テ凝結スレバ大リ或云、囊ノ外邊ニ一種ノ腺アリテ香液ヲ血
中ヨリ分泌シ、一ノ脈管ヨリ囊中ニ送リ薄膜ニ著テ凝結ス或云、囊中ニ細腺アリテ香液ヲ分泌ス。

麝香其質硫黃氣油氣揮發鹽ヲ混和メ成ル所ノ膽液様ノ液ナリ。杏囊中ニ在テ釀熟シ凝結メ殆ント敗血ノ如シ。麝死ノ直ニ其囊ヲ剖キ見レバ黯赭色ノ凝血ノ如シ。是ヲ曝乾スレバ鬆疏輕脆ニノ碎屑トナリ乾ケル血ノ如シ。眞好ノ品ハ碎屑中ニ多ク顆粒ヲ雜ヘ其質華爾斯ノ如シ乾ケビ粘潤アリ是漢人所

謂當門子ナリ黯赭色或黯鐵鏽色ニノ微光澤アリ或云、煤
黯灰色ニノ赭ヲ帶ブ、或云、黑灰色ニノ紫ヲ帶ブ香氣極テ竄透シ味苦シ○大抵一囊ニ乾ケル麝香一錢ヨリ三錢許アリ○麝香ハ囊ニアルテ用ベシ是ヲ取出シ販者ハ偽品多シ鑒法麝香少許ヲ取テ烙鐵上ニ置ケバ唯其香氣ノニノ異臭ナク速ニ燃テ其質殘ルハ必久或ハ盡ク消スルハ真品トス。速ニ燃ズ炭ノ如クニメ多ク殘ルハ偽品トス。或ハ絲ヲ葱汁ニ浸シ是ニ針ヲ附テ香囊ヲ貫キ通シ其縫ノ葱汁氣味盡ク消スルハ真品トス否サルハ偽品トス。或ハ小刀ヲ以テ擦リ或

少嚙カクテ沙ノ如クナヒハ偽品トス賈人ハ是ヲ掌上ニ置テ秤量ハガリ或ヘ手指ニ觸テ其質ヲ驗コロミ或ハ其氣味ヲ以テヨク真偽ヲ辨識ス

偽品通例ノ偽品ハ多ク乾ケル血ヲ雜ヘ或ハ肉類ヲ細無剗ハシメルテ雜ヘ製ス或ハ鉛末土沙等ヲ雜ル者アリ是ヲ炭火ニ投スレバ乾血肉類ハ其臭氣アリ。鉛ハ烊ヨクテ殘リ土沙ハ質ヲ存ス。其他偽造ノ品モ焼テ知ルベシ或ハヨク乾キタル剥篤亞斯少許ヲ加ヘテ研磨スルニ慄悞氣揮發シ鼻ヲ衝久ハ乾血或ハ肉類ヲ雜ヘテ偽ル者ナリ真品ハ此氣ヲ發スル「ナシ

キナメ字茶ハ煤中者リノト亭左清較舗ニズ或
者利館ニ褐七色品三出皮スノノ雅ス販輸價云支
ハ一ノ觀色八ニト品シナ藥說說ノレクサ亦貴
上種色閑ノ分ノスアタリ舗ニヲ說バ所貴クニ於
品黑ノケ細許徑ルリ。麝シテ云參ヲ其ノ故ニ
ト色如バ毛アリ。一者者上品ヲ考シニ銀ト對換
トスノシ内許秤カニリヲコ囊臍ハ其記來數品
是本ボ中麝毛上ノ品甚ダルダ麝香稀ナリト
是アリアカアカアリ。其囊ノ量アリ四分ヲ口呼ニ香ア下考大
間ト麝在トル真證約吻合。麝香ヲ以テ研
下品口呼粉毛リ寸云品呼粉麝囊鑒フス
アフノナ七四〇ヲアノ香ニ識宜故テ○
ト是如キ八五本白〇如皮入スクニ右按
右呼多シ處錢分口毛藥シトタベ西藥ノニ非他
ニブク紫許偏小囊云ニヲハト〇ニ樂說本バニ
品香ハ黑色十圓近販囊此全樂據只ニ邦他輸
ノ氣上色文ニルク來クヨ囊形只テ亭比藥邦サ
碎強品ニ文ニルク來クヨ囊形只テ亭比藥邦サ

リ毛^ス子其短毛^{ニバケ}際^リレズア稀^ト甚香
是ノ稀或ナ内クアメ是トノ○者上リナ一ダ氣
ハ極^ニハク^ノシリ大^ニ呼^レ哉本ア品其^リ錢大強
外上此前香麝タ本サ拘^アレ口リ^ナ色○餘^ナキ
面品囊^ニ氣香^ル口中リ是^タ並^リ鉛^リ鴉囊^其ル者
ニナヨ說甚紫者^ニ等難^ニル^ニノ○翠中^内者ア
毛^リリクダ黒^ノ比^ノシモ^ヲ白^シ大^サ囊^ノ竹^ノヲリ
ナ往出雜弱色如斯白○上絲毛黑中如膜麝見是
キ年^ル腹^シ或^シレ神白品^ニト豆^ノク^ノ杳^タハ
皮白^ノ蘭諸ハ偏^バノ毛^アテ呼^レ麝光如モリ^上
毛^アノ藥絕面毛如トリ縫^ア如香澤キ上囊^品
テ麝^リ乾^ニ黑^ハ太^シ呼^レ縫合者^クニア薄品^ノト
圓香^キ調^ニ毛^ク皮^ア際^スモ^一細^リ膜^ナ徑^ス
ク^ノ氣^タ合^メナ多厚者ナル囊^毛此ニリ^一○
包奇弱^ルメ碎^クク^ハキ者^ノ三^雑膜^三斯^寸往
ニ品^シ色香^粉皮長硬囊^者ア毛五^リア枚^ノ七年[・]
合^モ然^ノ氣^ノ茶^キク^ノモリ^ア粒^或ル^龍如^八本[・]
際^見庄^如速^如褐毛^偏形下^是ルアハハリキ分^口
ナル是^キニ^ク色^ヲ面扁^品ヲ處^ル鉛麝著^ハ許[・]麝
麻^ノハ^ア消當^十截^ニク^アイ^ノ者^ヲ杳^ク甚[・]粹[・]杳
絲^ア白^シ散門^リテ白^シ摺^レト交^ア雜必者^ダ量^ノ

如分^ルス潤^ニリ的是大^セ是^シ氣^テリ^シ小^スナ粉
ク^許或^シ麝^ナ非^是里^レシ^バヲ又^ハ和^ラ雜^共粒^本利^リ中^ニ大^サ
白^シ秤^ハ香^クズ^ヲ亞^ア間^此上^ベ一^カ腹^ニ口^ヲ是^ニ
ク^量數^ヲ其^然指^加山^品品^ト種^ニ蘭^最爲^ニ大^サ
鹽^一十^嘴內^庄ニ^ノニ^香ノト^黒メ^ノ上^シ非^當門^黒
ヲ^錢年^試ノ^香テ如屬^氣コ^レ呼^ク上^年品^碎レ門^黑
フ四貯^ル麝^氣押^クス^ボ軟^ガ品^ヲ十^粉バ子豆^ノ
キ^五ヘ^ニ香^強セ其^ルク^レ香^ニナ經^リナ此^ト如^キ
タ^分タ^枯口^キ巴^中者^或ト^氣ノリ^テ或^キ物^呼如^キ
ル囊^ル燥^克ハ柔^ニナハ^ナ強^甚然^レ乾^ハ者^ナア^キ
如^乾麝^メテ上^ニ無^リ鬱^クダ^庄キ^{アシ}此^粒
ク^テ香^沙香^品メ患^或敗^然ノ粘^碎タ^カリ^或粒^ア
是^硬ノ^ノ氣^ト觸^子ハ^サ氣^庄上^リ粉^ルフ^或ハ^多リ
ヲ^ク囊^如強^スク^許此^ア是^品泥^ノ色^ノハ稀^ク元^テ
麝^其圓^キ或^ナノール^ニノミ^ノ一^細ニア是^ニ
内^クハ^者ハ^ル圓^種ハ^ハ者^如ニ如^種粒^當ル^ノ
沙^ノ小^下ア囊^是塊^湿上^必アキメ^キ微^ノ門^ハ截^レ
ノ^麝ク^品リ乾^レ出^潤品^スリ^麝當^者赤^ニ子最^レ
如^香徑^ト上^テ當^ル多^ト當^是香^門ア^色ノ^ノ上^バ
ク^沙六^ス品^少門^者ク^セ門^ナア^子リ^ヲ品^柔
メ^ノ七^然トモ^子アメズ^子乾^{カリ}ナ^香帶^ア大^ト

ノシ非杳シハ杳バ口ナメク者ニ杳ノ皮其バニ
洗或ズニ〇此悉其麝リ泥粗ハトト如ト毛其テ
汁、〇白一獸ク餘杳故ノ劣囊毛呼ク膜ア内縫
ニ赤俗毛種ノベハニ如ニ及長ア紫トル空合
浸小說麝マ毛トベ斤中シメビク者黑ノ皮盧シ
シ豆ニ杳ジ皮ノトニ品年清麝其ア色間ヲニ形
焼ノ鹿ヲリヲ者下テトヲ爽香内リニ翻ノ扁
酒寒ノ雜ト其ア間囊ス經ノノ囊メ最ノ偏カク
ソ晒膝へ呼囊リ山三是テ氣形麝ノ香上包面メ
許ノ皮タブニ〇ト十本乾ナ色香形氣ムニ大
ヲ粉ニル者附囊雜許口固ク本甚今烈麝者遍ナ
加或テヲアテノルアノス巒口ダノナ杳ナクリ
ヘハ白云リ截偏者リ下ル敗ト鮮泊リアリ三其
煉朽毛他是リ面ナ大品者氣同ナ毛又リ其寸絲
合木麝物ハ取リ抵ナモア様シト往皆皮許ヲ
メノ杳ヲ上リ毛或上ル本リナ〇呪年小ノノ截
麝末ノ雜品タアハ品者口又レ間ア稀粒底白リ
杳ヲ囊ヘノルル一半ナノ濕庄山者ニノテ毛間
ヲ麝ヲタ本著皮斤斤リ品リ杳トノ朝當截キアキ
偽杳偽ル口著ツノア〇ト軟氣呼如鮮門レリ見
製皮造ニ麝如ク麝レ本異ニ弱ブク麝子バ是レ

香說

呼び者アリ。此亦右ノ類ニ近シ。○麝香ヲ嚙テ味微
苦ク。香氣清炎ニメ強ク。或ハ火ニ投メ臭氣ナク。唯
麝香ノ氣ハニテ微腥臭アルヲ上品トス。嚼テ氣
味微ク。或火ニ投メ香氣ナク。或鬱敗氣アルハ偽品
トス。○麝香ハ戀テ清舶品ナリ。洋舶ニハ稀ナリ。
香說 香囊ヲ取り乾スニ兩三日ノ間ハ其氣酷烈ニ
メ當リ難シ。其乾ケル者モ多ク。覶^カク片ハ其氣烈ニ
メ臭ニ近シ。但香氣減シ或ハ他物ニ加ヘ或ハ遠ク
隔ツキハ甚ダ芬芳馥郁ニメ賞スベシ。是香氣過多
ナレバ其精微ノ氣烈ク竄透シ。觸神經ヲ刺戟スル
刀甚フメ牽縮セシムル故ニ自ラ厭ヒ惡テ臭氣ヲ
覺ルナリ。香氣微ナレバ其精微ノ氣散漫シ徐くニ

禊神經ヲ開達ノ精氣ヲ健運セシムル故ニ自ラ爽快ニメ佳香ヲ覺ルナリ○或云。麝香ノ香氣脫スル者ハ是ヲ圍房カバヤノ天井ニ掛ル。數日ニメ故ニ復ス。是麝香ハ屎ト同性ナレバナリ。故ニ凡屎ヲ食フ禽獸ノ屎ハ麝香ノ氣アル者多シ○麝香ハヨク風化メ香氣速ニ消散ス。故ニ硝子壠若ハ鉛盒ニ收メ固封シ貯フベシ。乾耗セズメ香氣脫スル。ナシ○或云。勃烏丹ボウタツ特立タツリ韃而輶中タケルノ圖ツ。多ク麝マツヲ產ス。其地冬月積雪丈餘。此獸深山幽谷ニ蟄ス。春末漸ク積雪消スルニ至テ林麓山阨ニ出テ縱歟ス。故ニ春末夏初

多ク是ヲ捕フ。此時ハ其血沸騰ノ酷熱スル故ニ其香更ニ酷烈ニメ數日曝乾セザレバ其氣ニ耐難シト○或云。此獸遊牝ノ時至レバ香囊腫起ノ痒悶ニ堪ズ自ラ木石ニ觸テ其囊ヲ擦破シ香液滴リ下ル者日乾ヒルテ凝固シ此香ヲ成ス。或云。麝遊牝ノ時至レバ香囊膿腫ヲ生シ搔痒ニ堪ズ自ラ木石ニ觸テ其囊ヲ剔破シ膿。淋漓シ下テ乾固シ香ヲ成スト。右兩件人事絶テナシト言ベカラズト雖モ是偶然ルノ云。其故ハ凡麝香ハ悉ク其淋漓セル香液ヲ採ル者ナル也ハ或ハ此獸ノ蹄跡ヲ蹤蹟メ深山幽谷峻阻

山幽谷ニ住ム異獸尋常獲易カラザル者皆一麝ニ
一囊ヲ採テ悉ク其數ニ供給スベキニ非ズ故ニ其
夾雜ノ有無ニ於テハ姑ク疑ヲ存メ後考ヲ俟ツ
○按ニ往年月池君西哲列墨カ伊著ス所ノ獨祿
厥烈印ニ就テ自ラ麝ノ圖ヲ摹メ先考槐園先生
ニ贈ラル。先生又其書ニ就テ麝香ノ説ヲ譯シ且
首ニ西説ノ覈實ナルヲ贊シ併セテ其圖ニ題セリ
因テ是ヲ左ニ舉テ考證ニ備フ

○夫詢事考言必與名與物。苟外乎此。徒事鼓頰也。則空理之亡藝。終始反復。誰居不眩其亡。端倪者。此其究必至利嘴長舌。卒得擅場燐金銷骨之言。市虎

卵毛之辯。紛紜乎不可窮詰。否則齊是非同彼此厲。與西施胥皆爲伍。楚之與楹道通爲一。此其理雖可悅辭雖可觀。亦唯玉卮之亡當均之歸於不濟用耳。故衆言之淆亂折諸聖。聖也者。一平夫實者也。而非有希夷窈妙之道存焉於其間。天下之事。一斷諸實。碎由引繩墨而正枉曲乎。握規掣矩而懸權衡以爲方圜。以校輕重乎。誕罔譎張奇衷狹僉之徒。莫不入焉而弱且窮矣。亡他故。斷諸實而已。是故能言而要諸實者。方外聖人之徒也。能言而不歸諸實者。洙泗蠻貉也。予驩于月池君。君語次必及其所爲翻譯之事。

事。每稱蘭人所以精絕乎衆者。曰。事必顥門。人不貳能。其操心以爲與其飾。不我狎者。名吾技。則豈不得以其母以名技者乎。則病者乎。是以有所不爲。然後有以爲也。爲之弗能明覈彰著於名與物。以獲其實弗措也。予於是乎感。逃彼西土之子。鳩其舌而左其衽。猶且進於技於實之果然乎。則殆乎。亡害爲聖人之徒矣。會君就西書自摹麝圖以見贈。予譯其說以題之。列墨力伊獨裸厥烈印者。志藥物者也。其言曰。麝之香也。取諸一胞。大如雞卵。此其膽液質之敗血。替瀦其胞。乃成是物。其爲獸也。如牝鹿然。其毛曲局。

長視小兒指常處山林人獲之輒剔取其胞傾出其
香以暴諸日及其乾鬆如粉色成黯赤而後還實諸
胞中以居以貨亞細亞諸國並有之而勃烏丹最多
焉其捕之必於春夏之交云地多雪積至十尺若十
二尺者貫乎時而不釋也麝阻食迨春末流澌之時
承其怒飢之後大嚼縱噉以逞貪婪也則鬱攸之所
煽血液之所蒸其香以成矣捕之所以必於春夏
之交也得香之始不風不暴則氣過乎烈不可得而
當焉或云麝父方遊牝之時苦其胞腫痒不可忍也
自觸木石以救其憇香液潰而下其所淋漓亦結成

香

主治

性溫極。揮發竄透。稍衝動腦神經。心強壯。痙攣。鎮。稠厚。血液。稀釋。汗。發。風氣。驅。精力。乏弱。復。精神。鬱重。欣慰。快。○失氣。眩晕。昏冒。心動悸。寒性。昏睡病。卒厥。肢體。顫振。鬱憂病。發狂。癇。病。腹痛。痛風。傷冷。毒痛。內攻。虛弱。肺燶。衝。疫。欬。壞疽。一切咬傷。毒等。療。陰臭。虛寒。溫壯。○服量輕症ハ一氏ヨリ四氏ニ至ル。小兒ハ一氏ヨリ三氏ニ至ル。但六氏マデ用。テ害ナシ。然ニ輕症ニハ少許用。テ効アリ。大人ハ一時或一時半。毎ニ

四氏ヨリ十六氏マデ用フ。或ハ半錢マデ用テ危篤
ノ諸症ヲ救フコアリ』服量少許ニテハ捷効ナシ。大
抵十六氏マデ用レバ大ニ發汗メ諸症寛解ス極メテ
虛罷セル患者ハ四分時ニ六氏ヨリ十氏マデ用コ
或云。一次ニ六氏ヨリ少ク用レバ効ナシ。是ヨリ加
テ十氏餘ニ至レバ峻効アリ』ヨク表發ノ蒸氣ヲ排
泄メ熱ヲ誘發セズ精神ヲ爽快シ痛ヲ止メ發汗メ
安眠セシム。或ハ其汗麝香氣アリ或ハ發汗十五時
若クハ二十時モ止ザル者アリ然ニ安眠メ發スル
汗方レバ患者虛脱ノ恐ナシ○麝香ニ沙糖二三倍

ヲ研和シ用ヒ或ハ阿芙蓉。龍腦ヲ加ヘ散劑若ハ丸
藥トシ用ヒ或ハ葡萄酒。若モシハ適宜ノ蒸餾油ニ溶シ
用ニ或ハ桂丁幾。去爾ニ加ヘ用テ尤効アリ』麝香ハ
總テ尋常ノ飲液ニハ溶化シ難ク且是ヲ服スレバ
其未咽喉口舌ニ著テ氣味久ク口中ニ残リ患者嫌
惡ムト多シ。但焼酒ニ浸セバヨク溶化スル故ニ丁
幾去爾ト爲シ用ヒ製法葛叔多僕謨丁幾去爾ト同シ或ハ桂丁幾去
爾ニ和スレバヨク溶化シ味佳クメ服シ易シ○或
云。麝香ニ阿芙蓉ヲ加ヘ老人ノ虛衰セル寒壞疽ニ
大効アリト。然ニ其効アルハ多ク阿芙蓉ノ關ル所

ナリ故ニ此症ハ麝香ヲ用ルニ及バズ適宜ノ香竄
藥ニ阿芙蓉ヲ如ヘ用テ良効アリ○總テ壯實多血
ハ人ニ麝香ヲ用レバ上衝厥熱頭痛等ヲ發ス。婦人
ハ殊ニ嫌ヒ惡ム者多シ○凡、虛衰七ル熱病。發斑熱。
腐敗熱。神經熱。其他在苒タル病ニ用テ神經ヲ強壯
シ精力ヲ回復スルニ偉効アリ。然ニ其病既ニ危篤
ニ至リ生氣脫メ挽回シ難キニ至テハ効ナシ○壯
熱劇盛ニメ脉強實ノ症及ビ壯實ナル厥衝ノ諸症
ハ皆用テ害アリ然ニ其病日ヲ經テ漸ク虛弱ニ涉
リ或ハ患者素ヨリ虛弱ニメ病性淹滯シ脉小數ニ

メ弦ヲ帶ビ。呼吸不利ノ苦煩シ小便黽滯色病毒化
熟セザ候ルニメ多ク通シ若クハ濃色ニメ艱澁シ精力逾虚
損スル者。或ハ神經熱。腐敗熱。右ノ諸症ヲ發スル者
ハヨク胃腸ノ汚物ヲ淨掃ノ後。此藥ヲ用テ良効ア
リ總テ衰弱ノ候逾加ル者ハ神經劑ニ此藥ヲ兼用
メ尤良○痙攣ノ運動。搐掣ノ諸症。筋惕肉瞶等ヲ發
シ殊ニ口角牽引スル症ニ効アリ是病毒腦中ニ侵
襲スル候ナレバナリ○麝香ニ中和鹽ノ類及清涼
酸收ノ藥ヲ加用レバ効ナシ。是性能相反スル故
ニ麝香ノ効力ヲ減損スレバナリ○麝香ハ揮發竈

透ノ神經ノ閉塞ヲ開達シ鎮痙ノ一良藥トス。虛弱ニ屬スル痙攣ノ諸症。肢體拘攣不遂。咬牙。子宮衝逆ノ諸症等。鎮痙諸藥ヲ用テ効力キ。症ニ間奇効アリ。但其好ノ品ヲ擇ムベシ。下品ヲ用テ効力キ。ト多シ。○此藥六爻ヨリ十六爻マデ用テ捷効アル。鎮痙藥トス。六爻餘ヲ用テ搐搦ニ奇効ヲ得ル。ト多シ。又神經掣引痙攣運動ヨリ發スル。呪逆ニ六爻ヨリ十六爻マデ用テ多ク速効アリ。但煥衝及ビ創傷ヨリ發スル。呪逆ニハ効ナシ。一貴婦在蓐タル熱病ヲ患ニ體質甚ダ虛羸シ連ニ呪逆ヲ發シ諸藥寸効ナシ。因テ麝

香六爻ヲ舍利別ニ和シ與レバ少間ニメ呪逆止ニ。安眠ス其後七日ヲ經テ冷氣ニ感冒シ呪逆再發ス。前劑ヲ用テ治シ爾後再發セズ。○凡、搐掣、牙關緊急、昏冒、犬咬傷等。總テ藥劑ヲ嚥下ス。能ハザル者ハ麝香丁幾去爾ヲ吉利詞爹兒トシ。肛門ニ注輸ノ速効アリ。○痙攣ノ諸症。肢體顫振、麻痺不遂。粘液質ノ卒倒昏睡等ハ臭氣アル。趨謨趨謨安尼亞幾瓦爾謨等。○麝香ヲ加ヘ用ヒ或ハ幾那麝香丸次ニ趨謨。○麝憂病。脾病。子宮衝逆等未發作大時ハ麝香試驗ナシ。又其諸病。稟賦ニ得

ル者ハ効ナシ但其發作セザル時。是ヲ神經強壯劑トシ用テ良驗アリ右ノ諸症ハ左ノ神經強壯劑

幾那麝香丸

卒厥麝香一錢
幾那越幾斯割
右三瓦又一丸トシ銀箔ヲ衣トシ硝子壇ニ内貯
五丸宛用ル四次○神思鬱憂病ノ不寐或ハ癇ヨリ起ル狂症ニ麝香八瓦マデ用上。或ハ鬱憂病ノ頭旋眩暈。或ハ神經ノ症多キ胃癆ニ用テ殊効アリ
○癇ニ多ク奇効ヲ稱ス。然ニ病因一ナラサル故ニ

悉ク適應スルニ非ズ○卒厥ノ肢體強直。少モ轉側シ難キ症ハ是ヲ用テ捷効アリ○發止時アル喘息ニ用テ驗多シ。小兒此症ヲ發シ甚ダ危篤ニメ殆ド救ハレザル者。麝香二瓦ヲ少許ノ沙糖ニ研和メ一服トシ一時ニ一服宛用テ奇効ヲ得ルアリ。但上品ノ麝香ニ非レバ効ナシ○痙攣ノ運動ヨリ發スル喘急。初發惡寒ノ痰沫ヲ吐キ終ニ發汗メ解スル症ニハ麝香ヲ用テ多ク治ス○痛風ノ酷厲毒ヨリ發スル喘急ニ用テ多ク殊効ヲ稱ス。此症並ニ總テ麝香ヲ用ベキ症ハ左ノ方殊効アリ

魏角麝香丸

ア魏

近所纈草越幾斯劑

健質亞那越幾斯劑ト同シ

麝香

鹿角各十兵

結爾幾斯密涅刺列

安質沒挺

阿芙蓉各五兵

右調和シニ兵ヲ一丸トシ蟬姑石未ヲ衣トス一時
ニ三丸若ハ四丸宛用ノ殊ニ麝香ノ的當スル症ハ
其量ヲ增加フベシ○痛風傷冷毒痛等ノ患者虛弱

テ久其毒力泄不此ト能ハズ潛伏内攻メ胸中苦
悶胃痛劇キ等ノ症ヲ發スル者ハ麝香ヲ燒酒少許
ニ加ヘ用テ大効アリ或ハ左ノ方亦良

排毒蘭麝飲

八瓣薄荷水根三弓
橙皮舍利別半弓
印雜腹蘭根一刀
麝香杏仁叶五錢
燃燒亞的兒火一束
右調和シ四分時
一匙宛用ノ病毒發泄シ諸症解

散不此又度トス○諸發斑。痘瘡等ノ肉攻及諸瘡
癆。發出ノ多少ヲ論セス。患者虛弱ナルトハ脉ノ遲
數ニ隨ヒ右ノ如キ劑ノ服量ヲ加減シ用テ峻効ア
リ○患者虛弱ニ因リ或ハ癰癩ノ運動ニ因テ發出
スベキ瘡疹快發セズ。若クハ潛伏内攻スル者モ亦右
ノ如キ劑ヲ用テ捷効アリ。但其諸症ハ雜腹蘭丁幾
去爾テウル前二出ノ峻効アル故ニ是ニ亞的兒及ヒ亞兒加利
鹽ノ揮發。精砂精等。外加テ麝香ニ代用メ殊効ア
リ○麝香ノ効略阿芙蓉ニ似タリ。然能阿芙蓉ヲ服
スレバ神思鬱重肢體勞倦等ノ症ヲ發スル故ニ是

ニ比スレバ麝香ハ害ナシトス。但麝香ノ性功甚ダ
實百兒油鹿角精
ノ條ニ出ニ近シ○凡睡ラシムベキ諸症ニ
ノ阿芙蓉ノ害アル症ハ麝香ヲ用テ良○一婦人四
十三歳。體質薄弱ニメ子宮衝逆ニ乾喘ヲ兼子患ル
ト數年。偶春末痛風ヲ發シ四肢劇痛メ轉側スルト
能ハズ又頭痛心腹痛ヲ發シ十一月三日ニ至テ
胃痛増劇シ又呃逆及ビ搗掣ヲ發シ背ニ甚キ鼓動
チ覺エ。攀急漸ク喉ニ上衝メ呼吸窒塞センコト恐
ヒ。日夜卧ス。不能ハゞメ机ヨ靠ル。稍頭ヲ傾側スレ
バ痛殊ニ甚クメ常ニ頭ヲ扶持セシム。又脚大ニ腫

起ス。但脚腫微減スレバ喘ヲ發ス。患婦從前諸藥驗
ナキ故ニ唯溫煖ニ保護シ葡萄酒少許寃用テ其劇
キ胃痛ノ減スルヲ疾人^{マツ}ニ。同月二十一日ノ夜ニ至
テ予始テ左ノ劑ヲ與フ 次ノ麝香鎮^{ソウキン}
煙飲^{ソウ}ニ云 但患者甚ダ虛
羸セル故ニ半劑ヲ用ヒ 次テ燒酒少許ヲ與フ。其後
胃痛呃逆搐掣頗ニ解散ス。三時ヲ經テ又半劑ヲ用
ヒ。翌朝一劑ヲ一次ニ用ヒ爾後二時ニ一劑寃用フ。
四劑ヲ用ルニ至テ太ニ發汗シ次テ机ヲ去リ卧床
ニ就テ安眠スルヲ得タリ。其後前症發セズ其汗
二十二日ノ午後ヨリ連続メ二十四日ノ夜ニ至テ

麝香鎮痙飲

若銀朱五升

麝香

上好者

舍利別

右研和シ一劑トス此方右ノ如キ神經病ニ數治驗
ヲ得タリ○狂犬咬傷ニ麝香銀朱各十六仄調和メ
一服トシ用テ大効ヲ稱ス。嚥下シ難キ症ハ吉利詞
爹兒アーレトシ直腸ニ注輸スベシ○咬傷毒及ビ創傷ニ
由テ瘡ウツニ發スル者ハ麝香ニ阿芙蓉ヲ如ヘ用テ驗
多シ。阿芙蓉一味用ルニ比ズレバ良効アリ○麝香
ヲ綿ウツニ包ニ耳中ニ挿テ聞聲ヲ治ス伍枝揭布

製造麝香 甲子二年正月二十日ニ至ニ患音敷胃脹

上好ノ麝香ハ貴價ニメ尋常多ク用難シ。故ニ一種
ノ藥劑ヲ製ノ麝香ニ代用ス。是ヲ製造麝香ト曰フ

性功麝香ト同一般ナル故ニ麝香ヲ用ベキ病ニ多
ク施スヲ得。但真品ニ比スレバ氣味差佳ナラズ
或云真品ニ比スレバ功力差劣レリ故ニ服量ヲ増シ用フベシ故ニ丸藥トシ用ヒ
或ハ丁幾ドウ去爾トシ與ベシ。神經及瘡攀ノ諸症。牙關
緊急。疫欬等麝香ヲ用テ効ナキ症ニモ聞殊効アリ

製法

琥珀油

再餽者新

消石精

六弓七弓作其故喜其故喜其故喜

右琥珀油ヲ磁孟ニ内レ消石精ヲ一二滴宛加ヘ每
滴硝子棍ヲ以テ速ニ攪和スルハ滾動沸騰シ大ニ
蒸氣ヲ發ス。故ニ風氣閻達ノ處ニテ製シ其蒸氣ヲ

遯クベシ。右二品ヨク混和スレバ稠厚ノ液トナル。是ヲ靜定スルコ十二時自ラ凝結シ上面黃色ニメ華爾斯様ノ質トナリ麝香ノ氣アリ。其底ニ酸味少液アリ。其華爾斯様ノ者ヲ取リ剥篤亞斯ノ稀キ溶液^ハ剥篤亞斯少許ヲ以テ洗淨メ盡ク其粘著セル酸味ノ液ヲ去リ。次ニ溫湯^ハテヨク洗ヒ。其湯必モ酸味ナキニ至テ乾^カシ硝子壠ニ收メ固封シ貯フ^依

製造麝香。丁幾先爾

製造麝香 適宜

封^ハ燒酒 八倍

右調和メ溶化セシム○服量六滴ヨリ四十滴マデ
葡萄酒等ニ點服ス^依

○按ニ龍涎香ハ性功大抵麝香ト同シ。和蘭近來
是ヲ用ルト稀ナレ^ミ古方書ニ多ク載テ奇効ヲ
稱シ且^シ本邦沿海諸地モ亦是ヲ產ス。蘭山本草
啓蒙云。九州海面ニハ自テ浮ベル者多シ又云今
肥前平戸。土州羽根浦。及ビ紀州熊野。三輪崎。大地
浦。等ニテハ「マカクジラ」一名「ヤカウクジラ」或曰
鰐^ト呼^ト左^ノ譯說^ニノ腹中ヨリ取出ス。他鯨^ハ
所謂加失碌篤^{ナリ}。腹中ヨリ取出ス。他鯨^ハ
ナシ。即^チ有大魚腹中剖得者珍ト云モノナリ。其形

ハ薄片ヲ層疊メ成ル如キ者アリ。外面粗糙灰色或
ハ黑色ヲ帶ビ。裏灰白色ニノ黒色ノ斑點及び條紋
若クハ小白點アリ或云顯微鏡ニテ觀レハ灰白ノ
芒狀ノ條理アリ或ハ黑著キ味ナク又香氣微ナリ。
白黃ノ斑點條紋アリ。然此是ヲ摩擦シ或ハ掌中ニ温メ或ハ微火氣ヲ被
レバ柔ナル。蠟ノ如クニメ微甘様ノ香氣ヲ發ス。
或ハ末トシ他藥ニ加レバ芬香又生ス。或ハ是ヲ火
ニ投スレバ速ニ燃生テ鮮明ノ焰ヲ發シ。其烟灰色ニ
ノ佳香アリ或云燈火ニ燃セバ鮮明ノ焰ヲ發ス。ヨク燃レバ烟少シ。

試法

此物少許ヲ取テ熱セル小刀上ニ置バ溶テ蠟

凝結ノ松脂ノ如シ。色白キ者ヲシラス土州ト云。色
淡赤ナルヲアカフト云。黑白相間ルモノヲゴマ
フト云以上啓予紀州ノ海邊ニ漁スル真甲鯨ヨ
リ取ル者ヲ見レニ西說ニ舉ル灰色ニメ上好ノ
品ナリ。藥用ニ供スベシ。故ニ左ニ是ヲ附錄ノ考
證ニ備フ

龍涎香

アムブラ・ゲレ・ロ

○此物大小塊片ヲ成シ上品ハ淨潔ニノ乾キ。蠟ノ如ク凝固シ脂氣ア
リ。嚼バ柔ニメ蠟ノ如ク齒ニ粘著ス。然此輕クメ水
ニ投スレバ浮ニ又破碎シ易ク粉末トナリ易シ或

ノ如ク。佳香アリ或ヘ是ヲ銀匙ニ入レ蠟燭ノ火上
ニ置バ盡ク烊テ泡沫ナク黃色若クハ灰白トナリ
或ハ烙鐵版上ニ置バ烟ヲ生シ燃テ其質殆不消シ
灰殘ル。甚外劣キハ皆上品トス。其灰多ク或ハ石
灰様ノ白土殘ルハ偽品トス。或ハ此物ニ燒針ヲ刺
シ貫テ香氣アル粘脂流出シ或ハ其針ヲ貫クニ粘
著滯滯セザルハ上品トス。或ハ磁壺ニ沸湯ヲ盛リ
此物ヲ刮リ入テ暫ク蓋閉スレバ盡ク溶化ノ上面
ニ浮ムハ上品トス。○白色ニメ香氣微ナルハ未ダ
熟セサル者ニメ効力劣レリ。藥舗ニ是ヲウツテ。ア

ムベル白龍涎ト名ク或ハ黑色滑澤キノ堅ニ類シ
重實ニメ華爾斯ノ如ク是ヲ破バ裏黒色或ハ赭黒
ニメ班點條紋ナキハ總テスワルテ。アムベル黑龍
延香義ト名ク。或ハ鬆疏ニメ水棉ノ如キアリ。共ニ皆下
品ニメ速ニ溶化セス泥土等ノ渣滓多シ。此品榜葛刺
哥魯漫得爾亞細亞洲地名巴爾巴里亞大海ニ多ク出ツ○
總テ淨潔ナラズ汚物雜リ軟ニス濕者ハ下品トス
僞品此物僞品多シ或ハ蠟ニ蘇合香。安息香。其他芳
香ノ油ヲ加テ造リ或ハ蠟。華爾斯晒シ製スル者

云フニ蘇合香。麝香ヲ加製シ或ハ麝香。失歇篤出ツ沈

香。蘇合香ヲ以テ贋造ス或ハ是ヲ採未だ日ヲ經
ズ軟ナル時他物ヲ雜ヘ造ル者多シ然ニ是ヲ燒キ
ハ皆其香氣ヲ以テ偽リ雜ル品ヲ知ルベキナリ
產地 亞細亞洲諸國ノ海邊ニ多シ上品ハ蘇門答刺
麻打葛失葛爾_{アカスカル} 亞弗利加_{アブリカ}
爾馬路古島_{アラマロク島} 亞細亞_{アツイア}
黑海歐羅巴_{ヨーロッパ} 亞細亞_{アツイア}
諾耳勿入亞莫斯箇未_{アモスビ} 亞等ノ海ニ出シ_{アツシテ}

秤量 其最モ大ナルハ秤量百八十二尤_{アラ} 或ハ百九

四尤_{アラ} 或ハ二百尤許アルヲ採ルトアリ。檢弗兒_{アブル} 人ノ
說ニ日本ノ海濱ニテ百三十尤及ビ百八十五尤ア
ルヲ採ルトアリト云

試質 此物水ニハ溶化セズ。沸湯ニ浸セバ漸ク溶テ
油人如シ尋常ノ燒酒ニハ是ヲ加テ煮ルニ非レバ
溶化セズ。亞爾箇兒_{アーレコレ} 純粹燒酒ニハ溶化ス。是ヲ火ニ上セ
温レバ殊ニヨク溶化ス然レバ滿ノ如キ黑色ノ塗生
シ其溶タル者モ漸ク稠クナリ。時ヲ經レバ雲ノ如
ク白キ塗生シ猶凝結ス。是レ其燒酒漸ク風化ノ消
散スレバナリ。其凝結セル者ヲ取テ乾カセバ光澤

アル脂トナリ其質。宛モ斯百兒麻攝的^{ペルマセラテ}失碌^{マツシ}鴛^{マツシ}ノ脳^{コル}アリ。取爾脂^{カトリ}ノ如シ或ハ此物ヲ亞爾箇兒ニ投シ。亞兒加利鹽若クハ蒸餾油ヲ加テ研和スレバヨク溶化メ丁幾去爾トナル^{テシキテラル}。榨油ニハ溶化セズ蒸餾油ニハ溶化ス。亞的兒^{アーテル}綠^{グリーン}茶^ツ條ニハ速ニ溶化ス。是ニ燒酒ヲ加レバ白クメ蠟^{クダラ}ノ如キ者沈ム。此物ヲ蒸餾スレバ初ニ水液出ツ。次ニ酸精出ツ。是ニ甚ダ香氣アル。帶黃色ノ稠^{コロコロ}キ油及ビ鹹酸味ノ揮發鹽雜^ル。宛モ琥珀精ノ如シ^{或云龍涎香一錢ヨリ油二刀半出ツト}。其列篤兒^{トルト}多ノ底ニ黑色光澤アル。渣塊殘ル。是卽チ毘^ヒ黒密那^{ヒマツニ}琥珀條^{琥珀條}也。註^ス

ナリ。則チ其質琥珀ノ如タルヲ以テアムベル。ゲレイス^スノ名アリ。アムベルハ琥珀ナリ。ゲレイス^スハ珀^ヲ蒸餾^{スレバ}右ノ如キ酸性^ノ精油[。]揮發鹽出レバナリ然^{レバ}琥珀ハ滑澤透亮ニメ香氣ナシ。龍涎香ハ是ニ反ス。然^{レバ}此物ハ唯許多ノ粗朴ナル鹽質ト毘^ヒ黒密那質トヲ以テ精微揮發ノ油鹽^ヲ包攝^メ。一種ノ精微香竄人硫黃質^ヲ成ス者ナリ。毘^ヒ黒密那及^ヒ油^ニ硫黃^ヲ含有^ス。凡^シ者大リ芳^ヒ香^スノ者ハ皆精微ノ硫黃質トス。

原始 龍涎香ハ多ク海上ニ漂漾シ或ハ海巖ニ懸留シ或ハ海濱ニ簸揚シ或ハ鯨ノ一種。如失碌^{ロツ}篤^ト上^ル攝^ム甲鯨ナリ。斯^{ベヤケル}百兒麻^マノ腸ニアリ。然^{レバ}其說古來一

様ナラズ。今是ヲ左ニ歴舉シ。就テ其原由ヲ論定ス
○或云。亞細亞地方ノ蜂。窠ヲ海岸ノ巖窟ニ作り。其
蜜及蠟。風波ニ蕩滌セラレテ海ニ流レ泡沫トナリ
大陽ノ暖氣ト海鹽トニ由テ化釀シ凝固ノ此物ト
爲ル。故ニ稀ニ其塊半バ蠟ヲ雜ヘ或ハ蠟ト蜂窠ト
雜ル者アリ。是其未ダ熟セザル者ナリ。又龍涎香ヲ
純粹ノ燒酒ニ浸セバ稠厚ノ液其底ニ沈テ宛モ蜜
ノ如シ。或ハ加失碌カレロット篤ノ腹中ヨリ出ル者モ蠟ノ如
キ者雜ルコアリト。○或云。麻打葛失葛爾及ビ馬兒
地襪。諸島萬ニ於テ香草ヲ食フ諸鳥ノ屎。海ニ入テ

凝固シ此物トナル加失碌篤其鳥屎ヲ呑ム片ハ糞
トナリ。海ニ浮漾メ是ヲ成スト。○或云。一種ノ膠粘
ナル樹脂。海岸ヨリ海ニ流溢シ凝固ノ成ルト。或云。
是レ香氣アル樹脂ニハ羯布羅カブラノ一種ナリト。或云。
此物草木ノ脂類ナル片ハ琥珀ノ塊片ノ如クナル
ベシ。龍涎香ノ如クナルベカラズト。或云。委亞那ギイナ南
墨利カリ加洲カ洲ニ產スルキト名。クル樹脂ハ香氣龍涎
香ノ如シ。是ヲ蒸餾メ出ル精及ビ油。龍涎香ノ精及
ビ油ト同シ。此樹脂ノ碎塊。暴風雨ニテ海中ニ流レ
大魚是ヲ呑テ其腹中ニ凝結シ或ハ糞トナリ海上

ニ漾ヒ此物トカシト○或云鯨ノ交接ノ精液海中ニ流溢シ時ヲ經テ凝固シ是ヲ成スト○或云此物ハ加失碌篤上ニノ膀胱中ニアリ膀胱ハ長三四尺許濶二三尺許其内ニ橙皮色ニメ油ノ如キ液アリ液中圓塊アリ多キモ四個ニ過ズ其少ナルハ三拇指横徑許大ナルハ十二拇指横徑許秤量一比半ヨリ二十七比許アリ是ヲ破レバ薄片層疊シ葱蒜ノ根ノ如シ其膀胱中ニアル庄ハ臭氣甚ダシ是ヲ取出シ日ヲ經テ乾ケバ佳香アリ是自テ膀胱ヨリ海中ニ通洩スレバ數個粘著メ自ラ大塊トナル或云

是レ結石ノ類ニメ多ク是ヲ生スレバ其魚病テ死ス人ノ膀胱ニ結石ヲ生スルガ如シ○或云加失碌篤ハ好テ烏鰌。蝸牛ヲ呑ム故ニ大塊ノ龍涎香中ニ偶鳥鰌ノ嘴。蝸牛殻雜ル者アリ是レ龍涎香ハ此魚ニ生スル明證ナリト又云烏鰌ノ膽液質ノ汁此魚ノ糞ニ雜リ凝固ノ龍涎香トナル凡ソ尿類ニ含メシ膽液久々日ヲ經テ化釀スレバ其臭變メ香竄メ氣ヲ生スト○或云此物ハ加失碌篤ノ腸ヨリ分泌シ出ル一種ノ脂液凝結ソ其糞ニ雜リ海中ニ通洩スル者ナリ故ニ此魚ナキ海邊ニハ龍涎香ヲ產セ

ズ。又此魚ノ腸中ニ一塊八十比或ハ百比人龍涎香
え得ルトアリ。又檢弗兒人ノ說ニ日本海ニテ一塊
百三十比アル。此魚ノ腸ヨリ採ルトアリ。又其糞
ト大リ天太塊ヲ成シ。其海邊ニ漾フ者ヲ採ルトア
リ。其新オルハ軟ニノ牛屎ノ如シ。日本ニテ是為鯨
糞。主名^{シタ}。其他亞細亞地方。東南ノ諸島ニテハ是ヲ
魚糞ト名^{シタ}。按^{シタ}。猶若水本綱別集載^{シタ}。大魚腹中剖出
市^{シタ}。○時珍^{シタ}。綱目云。有大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠
黃白色。乾則成塊。黃黑色。○山村氏增譯采覽異言。四
明井子^{シタ}。加矢^{シタ}。砾^{シタ}。篤^{シタ}。ノ轉^{シタ}。則^{シタ}。我邦^{シタ}。テ鯨^{シタ}。ノクジラ^{シタ}。ト云^{シタ}。リト
○或云。一種ノ技爾撒^{シタ}。謨^{シタ}。樣人脂液。海巖ノ鱗際ヨリ

海中ニ流溢シ鹽氣ニテ凝固シ此物トナルト。○龍
涎香ノ絲テ生スル所ノ諸說異同アル。右ニ舉ル
如シト雖モ製煉術ニテ是ヲ蒸餾シ^{前ニ出ツ}蒸餾ノ說其質
ヲ研究スレバ此物ハ地中ヨリ出ル毘^{シテ}密那^ナ脂油
ニメ一種ノ華爾斯^{ハルス}ナリ。是レ地中ノ火氣及ビ大陽
ノ暖氣ニテ海底ヨリ湧出シ初ハ油ノ如ク流動シ
膠粘ニメ潮水ノ沫ニ混和シ^シ或云油質ノ液。潮水ニ
丁^シ油様ノ沫ノ如^シ波濤ノ漂蕩。海鹽ノ泡釀。大陽ノ
暖氣ニ因テ漸ク化熟シ凝結ノ體ヲ成シ海上ニ浮
漾ス。故ニ或ハ鯨類ノ大魚其沫ヲ呑ム片ハ腹中ニ

テ漸々烹釀凝固ノ此物ヲ成シ或ハ糞トナリ復海上ニ漂漾ス或云加失砾篤此沫ヲ呑テ吐下セバ腹死スト其海底ニ出ル脂液モ其地ニ隨テ六様ナラズ故ニ此物モ或ハ灰色ニノ輕ク或ハ黑色ニメ重キ毘ビ黙密那鑿ミタマツカノ如キアリ或ハ稀ニ小石角骨爪甲介殻魚嘴蜂窠等此物ノ中心ニ在ル者アリ是レ海中或ハ魚腹中ニテ其膠粘ノ脂液右ノ諸物ニ纏著メ凝固シ塊ヲ成ス者ナリ按=物理小識云外紀出如脂至海凝塊有千斤者

主治大抵麝香ノ如シ故ニ麝香ノ的當スル諸症ニ

用フ麝香ニ比スレバ刺戟スルヲ少キ故ニ體質感動シ易キ患者ニ用テ腦神經ヲ強壯シ精神ヲ爽快シ鎮痙ノ効ヲ摶ス又神思鬱憂病ニ殊効アリ○精力消耗シ元運生氣ノ怠慢虛乏ナルヲ回復ス○失氣眩冒等ノ神經諸病總テ衰弱枯瘦セル患者ニ偉効ヲ摶シ男女陰具ノ虛弱ナルヲ強壯ス○此藥麝香ニ比スレバ効劣弱ナリ故ニ近來是ヲ用ルヲ稀ナリ唯香料並ニ粧顏料ニ加ヘ用フ○服量通例豌豆大ヲ用ヒ或ハ二丸ヨリ一丸マデ用フ。但是ヨリ多ク用レ圧較著ノ害ナシ或ハ沙糖。雞卵。葡萄酒等

ニ和シ用フ或ハ一瓦ヲ取り乾淨消石十瓦ニ加ヘ
毎日用フ○天質薄弱ニメ感動シ易キ人及ビ婦人
ハ此藥ノ香氣ヲ嫌フ者アリ。斯ノ如キ人ノ眩運昏
冒子宮衝逆。心動悸。鬱憂病。脾病等ニハ是ヲ用テ害
アリ○一味燒酒ニ浸シ丁幾去爾トシ渣ヲ去リニ
三滴ヨリ十滴マデ葡萄酒或ハ桂露ニ點服メ良或
ハ複方丁幾去爾ヲ製シ用フ左ノ如シ

龍涎香イシキテウル

又「テインキテウル・レギア」羅「ゴー
ニンギレイキテインキテウル」蘭

龍涎香ニタ

麝香スカツ

沙糖イシキ

一錢

桂油スカツ

六滴

右龍涎香ヲ燒酒ニ加ヘ煮テ溶シ次ニ餘藥ヲ加ヘ
浸シ硝子壘ニ内レ固封シ大陽ニ暴シ或ハ煖處ニ
置フ數日ニメ藥氣ヲ出シ濾過シ固封シ貯ヘ十滴
マデ白湯ニ點服ス○左ノ方亦峻効アリ

龍麝膏

龍涎香イシキ一錢
麝香スカツ一錢
桂油イシキ五滴
沙糖イシキ二弓半
薔薇露イシキニ浸ス

右研和シ硝子壘ニ收メ貯ヘ。十瓦ヨリ二十瓦マデ
用フ○右二方。精神爽快シ胃ノ健運シ神思鬱憂

物
香

遠西醫方名物考標目

卷二十六

香靜粉

主治

失歇篤

雙酒散

主治

靈貓

產地

性情

食料

熟鴨

香囊

採香

香質

失鳩答

黃藥主治

主治療

失鳩答

越幾斯劑

解毒法

失鳩答

主治

失鳩答膏

失鳩答

越幾斯劑

服量

附 艮若答

性 滴答

形狀 滴答 主治

服量 對 鞣毒丸

夫歎答

艮若散
龍麝艮若散

艮若越幾斯劑

蒸餾醋

香囊

林杏

香貢

靈鵲 製法

試法

醇精醑

夫焰燒

性 雙酸清涼飲
主治 香醑飲

卷二十六

香囊

香竈醑

遠西學外敷諸法

遠西醫方名物考卷二十六

孫齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

失歇篤蘭

シベテム 羅

○按失歇篤ハ靈貓ノ兩陰間ニアル囊中ノ香

液ナリ靈貓一名香狸。和蘭ニモスクリカット又シ

ヘット。カットト名クモスクタス。カットハ貓

ナリ失歇篤ノ氣麝香ニ似タルヲ以テナ川正本

邦ニテ是ヲジヤカウ子コト呼ブニ相符也。和雍詳

ナラズ薩州及ヒ長崎ニ稀ニ舶來アリ。平云久

靈貓 形チ貓ニ似テ稍大。鼻端ヨリ尾末端マデニ尺

餘頭短久鼻長夕眼小稍長シ耳小貓耳ニ似テ尖ズ牙尖利ニメ狗ノ如シ脚短小前脚殊ニ短ク五指横徑許五指アリ爪直ニシテ尖リ黑白毛二様アリ一ハ長ク硬粗ニメ黑白茶褐ノ三色雜リ白斑及ビ條紋ヲ爲ス一ハ短ク柔細灰色ニメ赭色ヲ帶ビ纏縮メ長毛ニ間ル頭ノ兩脇ニ大ナル黒斑アリテ眼ヲ闊ム體軀頸及ビ尾ハ毛長ク硬粗ナリ頭ハ毛短ク灰色ニメ黑色間ル鼻灰白其端黒色耳ノ外面黒ク裏白シ頸黑白ノ斑ヲ爲シ尻ト腹ハ黒シ。

尾ノ上面ハ黒色兩側及ビ下面ハ白毛雜リ或ハ黑白ノ輪紋ヲ爲ス脚ハ毛短ク頭ノ如シ

產地

此獸ハ亞弗利加洲ノ諸國殊ニ加依魯陀日多烏匿亞亞墨利加洲ノ伯西兒新伊斯把泥亞字露或ハ支那其他亞細亞洲諸國ノ山野ニ穴居ス多ク子ヲ産ム小獸諸鳥ヲ食トシ缺レバ果類菜草ヲ食ワ係蹄ヲ以テ捕ヘ鐵檻ニ内レ他邦ニ貨ス性情性兇悍ニメ馴レ難ク人是ニ觸レハ抓破シ或ハ咬傷ス但幼ヨリ畜テ檻ヲ放チ漸ク慣レシムレバ馴テ戲ルノ貓ノ如シ然モ少々怒レバ動モスレ

バ人ヲ咬ム其狀貌柔弱懶惰ナル如シト雖モ蟲鼠鳥類ヲ捕此ニハ奔跳飛越ノ輕敏ナルノ貓ニ減セズ。夜視眼光アルノ亦貓ト同シ。

【食料】牛乳及ビ雞卵ヲ最良トス。肉類及ビ穀果蔬菜等ニテ畜々バ失歇鴛シカトノ意ヲ用テ良食ヲ與へ畜ヘハヨク國ニ輸ルト雖モ意ヲ用テ良食ヲ與へ畜ヘハヨク生育ノ失歇鴛シカトヲ取レト產地ニ異ナラズ然庄元來暖國ノ產ナル故ニ寒地及ビ寒暖中和ノ國ニ來レハ精力稍減メ子ヲ產セズ。

【香囊】牝牡庄ニ陰具ト肛門トノ間ニ一披溝アリ内

ニ短毛被オホフ其左右ニ膜囊アリテ皮上ニ隆起シ溝ノ唇ヲ爲ス。其囊長タク三拇指横徑許。濶二拇指半横徑許。其内。鵠卵シカト容ルベシ或云此囊牡ハ大ニメ牝ニ倍スト囊ノ内外幾多ノ腺アリ又溝内ノ左右ニ二腺アリテ共ニ失歇鴛シカトヲ分泌シ囊中ニ藏ム。溝内ノ兩側ニ各一孔アリテ兩囊ニ通シ失歇鴛シカトヲ溝ニ流泄ス。

【採香】失歇鴛シカトヲ取ルニハ其檻ノ前ヨリ棍ボウヲ入テ是ヲ後邊ニ遂行リ檻後ノ格子ノ間ヨリ其尾ヲ把住シ板二枚ヲ檻ニ入レ此獸ノ兩脇ヲ夾テ動搖セザラシメ。後脚ヲ格子ニ結縛シ小匙ス以テ徐々ニ溝内

ヲ刮コロタリ其液ヲ抄アツクヒ取ルナリ。或ハ時候ノ寒暖ニ隨テ其液出ル。多少アリ故ニ毎日或ハ隔日或ハ三日ニ一次取りイチド大抵ニ日ニ一錢許出ツ。此獸山野ニ在テハ自ラ木石ニ觸テ此液ヲ剔出スト云
香質失歇シレツ篤トクハ其質蜜ノ如ク牛酪ニ似タル稠厚ノ液ナリ新鮮上好ノ品ハ白色及黃白色。其氣烈ニメ麝香ノ如ク且ツ琥珀油ノ如キ臭ヲ帶ブ。味苦シ。上品ハ白色ナレ。凡時ヲ經レバ漸ク黃色トナリ終ニ赭色トナル。或ハ帶黃灰色或ハ赤色ヲ帶ル者アリ。凡諸色多キホド逾下品トス。是ヲ紙ニ攤タクテ平等ニメ

粒塊大久脂ノ腐敗セル如キ臭氣大キヲ上品トス此液ニ酪及ビ脂類ノ雜ヘ偽リ販ク者多シ。○乳汁及ビ雞卵シラス以テ畜フ者ハ失歇シラツ篤白色ニノ上品ナリ。肉類果菜シラス以テ畜フ者ハ其液赭色ニメ其香及ビ性功効ヒリ。○多ク香料ニ用フ。少許ヲ取テ他ノ香料ニ主ヒサ治油氣揮發鹽多シ。鎮痛。解凝。緩和ノ良効ヲ奏シ神經ヲ強壯ス。疝痛。小兒腹痛。子宮硬腫及ビ衝逆等者多シ。○多ク香料ニ用フ。少許ヲ取テ他ノ香料ニ如レバ佳香ヲ生メ麝香ノ如シ。○此物燒酒ニハ溶

化セズ。油脂類生ヘヨ。久落化ス。

伍

叔

普參通。參也香根也。根也帶也。帶也香根也。

伍

叔

失麌答羅。根也。又ゲアミクテシ。翁ルリク蘭。

形狀

此草高ニ三尺許。圓莖滑澤。葉中虛。苗杏並。

ニ似テ太々。節アリ。是叶傍枝ヲ生メ逐次亦極
ヲ分メ。淡綠色ニメ紅紫若ハ赭色ノ斑アリ。宛モ蛇
皮ノ如シ葉ハ芹葉ニメ粗糙。光澤アリ。テ羊齒狀ヲ
爲シ面綠色ニメ背淡綠色。揉テ覓ゲバ嫌ヒ惡ムベ
キ毒様ノ臭氣アリ。貓尿若ハ芫菁ノ臭ノ如シ。味辛
苦ニメ微甘。莖枝共ニ莖衣アリ。葉柄ノ著ク處ハ凹

ハカマ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

ニメ莖ヲ包圍ス。莖枝頭ニ五瓣ノ小白花ヲ開キ大
ナル繖ヲ爲ス。花後子ヲ結ブ過泥子。トイス 茴香ニ似テ差大ニ似 テ アリ アリ根太サ指ノ如クニ三寸。若ハ七
八寸許。白色。其氣苛烈ニメ味微甘ヲ帶ブ。嫩根ハ乳
白色ノ汁ヲ含リ平原荒野ノ陰地。路傍溝池ノ邊ニ
生シニ年ニメ枯レ新苗生ス。園生ノ者ハ藥用トセ
ス○此草種類多ク相似テ眞ヲ亂ル。ヨク擇ムベシ
莖ニ斑アレ。臭氣ナキハ本種ニ非ズ。斯篤爾窟名
人說ニ此根人生汁ヲ舌ニ滴スレバ苦辛ニメ舌麻
痺シ次テ腫痛拘強ノ言フ。能ヘス。本種ニ非レバ

此苛烈ノ味ナシト云、リ一、種ギクチヘ。ワトトレシケルリンダト名ル草アリ全形失鳩答ノ如クニメ莖ニ斑ナク葉ノ臭氣微ナリ莖ニ稜及ビ條理アリ。根ニ近キ處赤色ヌ帶ビ葉差^ヤ長ク鋸齒アリ。根黑色。按指大ニメ末尖リ鬚根アリ。截レバ焦黃色ノ汁出ツ。味苦シ_{榕按ニ是レ本邦ニ}產スル毒芹ト呼フ者和蘭及ビ勿能泥亞都_{入爾馬}於テモ誤テ是ヲ失鳩答ニ充テ用^ヒテ効驗ナシトスル者多シ。一種ベドウルムデ。トインシケルリンクト名ル者ハ葉黑綠色ニノ背光澤アリ。一種ベドウルムデ。ペイ・ブコロイドト名ル者ハ莖葉共ニ毛

草アリテ粗糙ナリ。又一種根太クノ卵圓形ノ者アリ。此皆其種類ニメ藥用トセズ。○凡ソ野草ヲ食フ獸類ハ自ラ此草ノ毒アルヲ知テ是ヲ避ク。

○榕按ニ本邦ニ大芹^{オホセリ}毒芹^{トクセリ}。芹葉鈎吻ト呼ブ草。毒アリテ形狀失鳩答ニ似タリ故ニ失鳩答ニ充ル者アレ庄其莖ニ斑ナク葉ニ貓尿ノ如キ苛烈ノ臭氣ナシ。是右ノ譯說ニ舉ル一種ニノ藥用ニ充ザル者ナリ。和蘭ニ於テモ誤テ是ヲ本種トシ用^ヒテ効ナシトル者アリト云江戸郊外ニ於テ未本種ニ充ベキ者ヲ見ズ。故夫姑久其形狀ヲ記

此後來充當ノ考證トス。福云失鳩答越幾斯劑ノ効用雙蘭菊越幾斯劑前ニノ如シト。又茛菪モ一種ノ毒草ニメ療癒毒。腺腫ヲ治スル効失鳩答ノ如シ。故ニ是ヲ失鳩答主治ノ後ニ附ノ参考ニ備。性失鳩答ハ一種ノ酷厲毒アリテ過服スレバ眩暉シ失鳩答速ニ救療ヲ加ヘザレバ死ス。其麻痺酷厲毒ノ性。茛菪番木鼈人類ニ屬シ凝體諸器ヲ溶解シ血液ヲ渦崩シ神經ヲ虛衰セシムル。自餘ノ酷厲ナル麻痺毒アリテ解凝ノ効ヲ爲ス諸藥ノ如シ。故ニ

虛弱ノ人及び神經感動シ易キ者ニ是ヲ用フレバ兼用ノ藥ヲ以テ其害ヲ防クベシ。

解毒法若シ是ヲ過用メ瞑眩烈キ者ハ微溫湯ニ油若ハ蜜ヲ加ヘ與テ吐セシメ或ハ吐劑ヲ用テ其毒ヲ除ケバ治ス。或ハ橙汁。醋等酸味ノ液ヲ與フベシヨク其毒ヲ解ス。海葱蜜モ亦良。又清涼緩和ノ吉利詞爹兒ヲ施メ腸ノ煥衝ヲ治スベシ。

主治刺戟衝動シ麻痺セシメ疼ヲ止メ睡ラシメ。血中ノ酷厲毒ヲ驅除ス。○凝結ヲ溶解稀釋スル峻藥トス。癌様ノ硬腫。頑固ノ腺腫療癒ヲ消散ス。○斯篤

爾窟人此藥ヲ用テ癌腫ニ奇効ヲ奏シ其經驗說甚多シ。然ニ医家或ハ是ヲ用テ効ナク或ハ潰破ノ癌瘡ニハ却テ腐敗ヲ增長メ害アリトシ是ヲ詆誹スレ者必カラズ。是究竟癌腫ト腺腫トノ區別明白ナテザレベナリ。真ノ癌腫ハ失^{シキウ}答及^{シキウ}、良苦等ニテ治大ルト稀ナリ。唯癌ニ似タル腺ノ硬腫、瘰癧腫ニハ効驗アルト毫疑ナシ。患者甚ダ衰弱スレニ較著ノ酷厲毒鬱蓄セル候ナク其腺劇キ焮衝ナキ者ハ是ヲ用テ殊効アリ○酷厲ナル瘰癧毒ヨリ來ル腺ノ硬腫ハ此藥ヲ用テ治スルト古今明哲ノ經驗甚ダ

多シ傑泄兒名云。一患者乳房ニ瘰癧毒ノ硬腫ヲ發シ寃モ乳癌ノ如シ。諸醫多ク不治トス。此藥ヲ内服セシメテ其腫半消散シ半善農ヲ釀ノ潰破シ治ス。其他瘰癧腫及其毒ヨリ發スル諸惡症或ハ乳癌ノ如キ症ヲ治シ或ハ幾那ヲ加ヘ用テ効アル經驗說甚ダ多シ○頑固ノ腺腫、瘰癧腫ハ外敷藥ニテ愈スノナク唯此藥ヲ内服セシメテ消散シ或ハ潰破臭氣近^シベカラズ劇痛。燒^シカ如キ症ニ此藥ヲ内服外敷シ其酷厲稀涼ノ敗血漿ヲ和解メ善農ト爲シ

治スルノアリ。内服ニハ是ヲ越幾斯劑トシ用ルヲ良トス。小兒ハ沙糖ヲ加、舍利別トシ或ハ昆設爾弗ト爲シ用ベシ。○子宮口ノ硬結腫痛ノ漸癌瘡ノ如ク臭穢ノ汚液流泄ノ惡性ノ白帶下トナル者ハ此越幾斯劑ヲ用テ全治スル者多シ。○瘰癧毒ニ因テ唇ニ癌様ノ腫ヲ發スル者多シ。其症下唇ヨリハ上唇多ク腫起シ中間坼裂ノ疼痛シ其毒漸眼ニ浸淫シ焮痛ノ潰爛ス。便チ此越幾斯劑ニ趙謨安沒尼亞幾ノ乳劑製法扁桃乳ト同シヲ加用テ多ク治ス。是尋常失苟兒陪苦ノ毒ヨリ發スル症ト異ナリ。○癌様ノ硬結

セル腺腫ニ此藥ヲ外敷ノ消散シ其痛ヲ甘解ス或ハ此草ヲ末トシ玫瑰蜜ニ和シ癌様ノ硬腫潰瘍等ノ邊圍ニ塗テ劇痛ヲ解散ス或ハ頑固ノ乳房硬腫ニ此越幾斯劑ノ膏藥ノ如クシ貼ノ消散スル者多シ。乳房ニ乳汁凝結ノ發スル硬腫ハ殊ニヨク消散ス或ハ打撲傷。其他外傷ニ因テ硬腫トナリ疼アル者右ノ諸症何モ是ヲ貼メ發泡スル日火傷ノ如キ者ハ其泡自乾マデ其膏ヲ貼レハ消散ス。若シ發泡セザル者ハ數是ヲ貼メ發泡セシメ乾シ愈スベシ。○内藏諸腺ノ壅塞硬腫ニ峻効アリ。ヨク其凝結ヲ

溶解シ壅滯ヲ疏散ス。小兒ノ肝脾、腸間膜等ノ腺壅塞ノ腹肚脹硬滿シ肢體羸瘦スル症ニ良驗アリ。○瘍瘻毒ヨリ發スル勞效ニ間偉効アリ。然レ病勢既ニ增長スル者ハ驗ナシ。○肝脾、腸間膜等ノ硬腫ニ此藥ヲ蒸湯劑トシ或ヘ此越^{アキハ}幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ貼メヨク消散ス。○或云。眞ノ癌腫ハ固ヨリ治スベカラズト雖モ古今ノ醫家此藥ノ治驗ヲ稱スル。甚ダ多シ或ハ癌ト腺腫ト相似テ混同スル故ニ癌様ノ腫ト雖モ未増長セズ甚ダ危險ニ至ラザ止症ハ先^ツ此藥ヲ試用^ミベシ。縱^タ良効ヲ得ズト雖モ

他ニ治スベキ藥ナケレバナリ。是ヲ用テ諸症逾增進スル疣ハ唯緩和鎮痛ノ劑ヲ投メ當時ノ患苦ヲ安撫シ劇症ヲ甘解シ其酷厲稀涼ノ液ヲ化熟ノ稠膿トナラシメ腐敗ヲ防護シ精力ヲ保續セシムベシト。○或云。醫家此藥ヲ用テ良驗ヲ得ザル所以ノ者數件アリ。是一ハ眞ノ失^{ナカタ}答^{ナカタ}ヲ鑒識セズノ誤テ其種類ヲ充^チ用レニ因リ。一ハ患者虛羸シ此毒藥ニ堪^ハズメ久服スルヲ能ハザルニ因リ。一ハ病毒極^ハテ猛惡ニメ藥力是ヲ剋制スルヲ能ハザルニ因ル。是猶水銀幾那。阿芙蓉等モ百發的當ノ効ヲ得難キガ

如シ。或ハ患者ノ稟賦異常ニメ峻攻ノ藥ト雖モ効ナキコアリ譬^{タク}バ徽毒ニ水銀ヲ用テ寸効ナク又毫モ眼眩セザル者アルガ如シ○此藥ハ酷厲毒ノ各部ニ凝結メ牢固頑滯スルヲ溶解シ疏散スルノ峻効アリ故ニ痛風傷冷毒痛經久治セズ腫痛甚^ク諸藥効ナキ症ニ用テ捷効ヲ得ル者多シ或ハ頑固ノ臂痛諸藥効ナキ者初ニ此越幾斯劑少許ヲ用ヒ漸加^ムテ日ニ半錢ニ至リ三週ニメ全治スル者アリ或ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ體股等ノ痛風ニ貼メ消散スル者多シ○徽毒ニ因テ諸部疼痛往冉ト

ノ解セズ或ハ徽毒經久ノ潰瘍瘰癧硬腫鼻中潰爛ノ骨ヲ腐蝕スル等其他諸惡症水銀劑升汞等ヌ多ク用テ効ナキ者ハ此越幾斯劑ヲ與テ大効ヲ得ルト多シ。或ハ此越幾斯劑効ナキ者ハ此葉ノ末一錢ヲ取テ蜜一弓ニ和シ用テ速ニ治スルトアリ其劇痛休マザル症ハ此越幾斯劑ニ阿芙蓉ヲ加用テ捷効アリ○此藥ハ凝結ヲ溶解シ蒸氣ヲ發泄シ疼痛ヲ止ル効アル故ニ徽毒ノ潰瘍ノミナラズ總テ經久惡厲ノ潰瘍腐骨疽等ニ内服外敷メ間偉効アリ或ハ脚ノ瘻瘍諸藥効ナキ者ニ是ヲ用テ速ニ治スル

アリ。○惡厲ノ疥癬、頭瘡。經久ノ瘡瘍。頑固ノ皮病。尋常人藥劑ニテ治セザル者ハ是ヲ用ヒ。元驗多シ。○經久ノ瘡瘍。一切頑固ノ皮病ニ左ノ方。殊効アリ。

失鳩答膏

失鳩答末

二錢

白蜜

二弓

水

右調和シ一卵匙宛服スル。丁日二次。○痘瘡後。其毒滯著メ諸惡症ヲ發シ。或ハ小兒佝僂。或ハ頑固ノ黃疽。水腫。癰。久效。惡性ノ白帶下。黑障眼ノ初發。經久ノ陰痿等解凝ノ諸藥。寸効ナキ症ニ左ノ越幾斯劑。

用テ間奇効ヲ得ルアリ

失鳩答。越幾斯劑

エキスタラクト。ハニ。ドルレケルフ。山蘭。

失鳩答 生鮮者

右花候前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布袋ニ内レ絞テ汁ヲ取り磁鍋ニ内レ火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煎熬メ。蜜ノ稠ト爲シ放冷シ此膏二十弓ニ失鳩答乾葉ノ細末五弓ヲ攪和シ丸藥ト爲ヘキ稠ト爲シ固封シ貯フ。○或ハ乾葉ノ末ヲ加ズ絞汁ノニ煎熬メ膏ト爲。良大約絞汁六北ニテ此劑一北ヲ製ス。服量此越幾斯劑八日一丸ヲ用ヒ漸加テ一錢ニ至

ル或ハニ兵ヲ一丸トシ朝夕一丸完茶湯ニテ送下
シ三日毎ニ一丸完増加テ患者頭目困重昏暈惡心
等。瞑眩ノ症アルヲ度トシ服量ヲ減シ若ハ暫ク休
其症治メ復用ヘシ。此藥ハ瞑眩スル許ニ用テ諸器
血液ノ運動ヲ變化セシムルニ非レバ頑固ノ壅塞
ヲ溶解スルヲ能ハザレバナリ或云日一錢或ハ一
半用或ハ日一弓完數月用テ必モ害ナキ者アリ又
錢半完用テ瞑眩セザル者アリ或ハ日三錢完一年
半用或ハ日一弓完數月用テ必モ惡症ヲ發セザ
一婦人病中此劑五十比許用テ必モ惡症ヲ發セザ
ル者アリト是漸此劑ニ慣テ瞑眩セズ又越幾斯劑

ハ煎熬メ製スル故ニ苛烈ノ藥氣蒸散スレバナリ
○服量度ニ過ギ或ハ患者ノ資稟此毒ニ堪ヘズ或
ハ病性ニ的當セザレバ是ヲ用テ惡症ヲ發ス○丸
藥ヲ嫌フ者ハ此越幾斯劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ煉
膏トシ用ベシ○或ハ花候前ニ生草ヲ取り火氣ニ
テ速ニ乾シ太キ莖ヲ去リ未トシ硝子壙ニ内レ貯
用フ。服量越幾斯劑ト同シ。但越幾斯劑ニ比スレバ
藥力差峻ナリ或ハ乾葉一握ヲ取テ沸湯二十弓ニ
投シ泡湯トシ朝夕小茶碗ニ二碗完用ス。生草ハ尤
酷烈ナリ○或云此草ノ花ヲ越幾斯劑トシ用テ利

水ノ峻効アリ。殊ニ肢節ノ水腫ニ良。○或云此越幾斯劑ノ性功大約。雙鬱菊越幾斯劑ノ如シト。○外敷メ腫瘍堅硬腫ヲ消散シ潰瘍ヲ淨刷シ治ス。此草ノ濃キ泡湯ヲ蒸漏劑トシ或ハ此草ヲ煮テ琶布トシ貼シ或ハ越幾斯劑ヲ膏藥ノ如ク貼シ或ハ是ヲ石灰水ニ溶シ布ニ濕メ貼シ或ハ生草ノ絞汁ヲ取テ硬膏軟膏トシ貼シ或ハ此草ト花ヲ採リ蒸餾メ露水ヲ取り施ス等ナリ。

度物淑依核
叔布伍福

貢茗

ペルラドンナ又アトラバベルラドンナ羅ドルマケンテナクトシカーデ蘭○和名ハシリトコロ

形状此草圓莖叢生シ高サ二三尺許直立シ黓赤色粗糙枝多シ葉龍葵葉ニ似テ大ナル。三倍柔ニメ汁多シ粗糙ニメ毛茸アリ短梗著ク葉間數梗ヲ抽テ花生ス筒様五出黓紫或ハ黃白色萼五出花後圓子ヲ結ブ大サ葡萄ノ如シ熟スレバ黑色ニメ光澤アリ裏ニ汁アリ味甘ヲ帶ブ數核アリ根太ク長ク塊節様ニメ栓アリ淡白色或ハ黃色ヲ帶ブ葉根子共ニ較著ノ氣味ナシ或云葉根共ニ臭氣是龍葵ノ一種ナリ山林原野及ビ垣籬ノ陰地ニ生ス

性葉根子共ニ大毒アリ少許服スレバ咽喉乾燥舌

拘強。煩悶シ。次テ眼昏。眩運。睡眠メ後。太ニ蒸氣ヲ發泄ス。多ク服スレバ精神錯亂。發瘡。咽喉胃腸劇痛シ。次テ皮膚及ニ肺肝腸間膜等焮衝メ内外壯熱。耐忍ビ難ク。大渴ノ嚥下ス。能ハズ。食ヲ惡ニ。肢體頑麻不遂。昏睡。搐搦ヲ發メ死ス。其屍速ニ腐壞シ肢體各部紫黑色。肌皮坼裂シ諸竅ヨリ敗血汚液漏泄ノ臭氣甚シ。或云此草四錢ヲ服スレバ死ス。此草ハ酷烈ナル麻痺毒ヲ含メリ根殊ニ甚シ。或云。此子五六個ヲ服スレバ發狂シロ。眼掣引ノ大ニ笑ヒ。總身漸ク搐搦シ。發熱燥ク。如シ速ニ救療セザレバ十二時

中ニ死ス。○此毒ヲ解スルニハ酸味ノ液。醋。橙汁等ヲ多ク飲シムベシ。失鳩答解毒法ト同シ。

主治葉ヲ藥用トス。或ハ根ヲ用フ。揮發鹽及油アリ。葉ハ内服メ解凝緩和ノ藥トス。或ハ生葉ノ絞汁ニ沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ用テ鎮痛催眠ノ効ヲ稱シ。外敷メ焮腫ヲ消散ス。生葉ヲ貼メ止痛消散ノ効アリ。○癌様ノ硬腫ニ内服外敷メ焮痛等ノ惡症ヲ緩解ス。然レ真ノ癌腫ハ効ナキ。失鳩答ノ如シ。○腺ノ硬腫。瘰疬様腫ニ試用ルニ少モ害ナク。毎ニ良驗。奏ス其腫。癌瘡トナラズノ惡性ノ潰瘍トナル症

モ此根ヲ用レバ腐蝕セズ增長スルコナシ總テ腺ノ腫瘍。瘰癧様ノ壅塞ヨリ發スル諸症ハ皆峻効アリ是ヲ用テ驗ナキハ此草ノ陳久脫性ノ者若^{モシ}ハ園生及ビ肥土ニ培養セル者ヲ用レバナリ然レ患者甚ダ薄弱ニメ病毒極^メテ惡厲ナルキハ此藥モ効ナク漸ク惡症ヲ發スベシ故ニ仔細ニ診察メ是ヲ施ス^ト肝要ナリ○子宮口ノ硬腫ノ初發ニ用テヨク其腫ヲ消散ス此症增長スレバ癌瘍様ノ白帶下トテリテ治シ難シ子宮ヨリ惡性ノ汚液漏泄メ頑固ノ白帶下トナル者ハ此葉ノ末一味用ヒ或ハ水銀

劑ヲ加用テ治驗多シ一婦人子宮口ニ惡性ノ硬腫ヲ生シ交媾ヲ妨ル^ト數年此葉ノ末ヲ用テ全治セリ○葉ヲ水煎メ内服外敷シ或ハ乾葉ヲ末トシ少許ヲ取テ水ニ和シ服シ或ハ葉ヲ搗貼ス腺ノ硬腫ヲ溶解シ惡性ノ潰瘍ヲ治ス○發狂及ビ神思鬱憂病ハ腹部諸瘻又壅塞^{モシ}ノ痔血月經產後惡露等ノ閉滯及ビ瘡瘍ノ内攻ヨリ發スル者甚ダ多シ皆此藥ヲ用テ間大効アリ○鬱憂悲悶シ人ヲ避^{ササ}テ沈默獨處ヲ好ム狂症ハ此藥多ク良効アリ然レ狂躁暴亂大甚^{ハシ}キ症ニ用レバ搐掣ヲ發スルコアリ或云此

子ノ絞汁。沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ。發狂ニ用。テ奇効ヲ得ル。○アリト。○癪ヨリ發スル狂ハ此藥ヲ用。テ治スル者多ニ。癪モ亦良驗アリ。但此藥ニ慣ル片ハ再發スルアリ。○痙攣。搐掣ノ諸症及ビ癢不遂モ亦治驗少カラズ。或ハ疫效ニ間。奇効ヲ得ル。○アリ。○子宮水腫ヨリ發スル小便閉ニ甚ダ驗アリ。○徽毒頑固ノ諸症ニ効多シ。或ハ甘汞ヲ加用フ。殊ニ其侵蝕スル潰瘍ヲ治ス。○乾癬ニ尤。効アリ。大黃ヲ加用。テ殊毒良。又總テ頑固惡厲ノ皮病ヲ治ス。○黒障眼ニ効又ル。○失魄答ノ如シ。○古賢用之。○黑障眼ニ効又ル。○失魄答ノ如シ。

〔服量〕多々越幾斯劑トシ用フ。葉ノ末ニ比スレバ効差緩ナリ。日一仄ヨリ四仄マデ用フ。或ハ初八日半仄。若モシハ一仄ヲ用ヒ漸加テ瞑眩スルニ至ル。○或ハ葉半刃ヨリ一刃マデ沸湯十弓ニ浸ス。○八分時濾テ其液ヲ取り毎朝二匙宛服ス。○服量少許與ル。ニハ根末良トス。葉ニ比スレバ其効差峻ナリ。○漸ク服量ヲ加。テ患者咽喉乾燥頭旋眩暈眼花閃發スルヲ覺ルハ藥力充足メ良効アル。微トス。是ヨリ服量ヲ増下勿レ。但其症甚キ者ハ服量ヲ減シ或ハ暫休テ温乳汁ヲ與ベシ。若シ服量ヲ加用レ。压右ノ諸症

ヲ發セザル。此藥ノ性力弱セル者、ヲ用ルカ或ハ
服量仍足ザル候トス。故ニ其新鮮ノ草ヲ採用ヒ或
ハ其三分一ノ量ヲ増與ベシ。○或ハ生草ノ絞汁ヲ
煎熬メ蜜ノ稠ト爲シ或ハ此草ヲ蒸餾メ露水ヲ取
一匙宛用フ。或云根二錢マデ用テ瞑眩セザル者ア
リ。此葉メ末ヲ醋ニ加ヘ服スレバ吐劑トナル。○近
來犬咬傷。其他諸獸咬傷ニ此根ヲ經驗メ奇効ヲ奏
ス。是ヲ用レバ其症增長セズ狂躁等ノ惡症ヲ發セ
ズメ治ス。又宜久的當ノ外治法ヲ兼施スベシ。是ヲ
用テ眼眩甚キ者ハ三四日モ此藥ヲ休メテ復用ヒ斯

ノ如クメ數週用ベシ。此病既ニ發狂シ飲液ヲ服シ
難キ等ノ症ヲ發スル者ハ差其服量ヲ増シ數日服
セシムベシ。發汗利尿吐涎等ニ因テ速ニ其毒ヲ排
泄シ治ス。此根ヲ細末トシ野生者ノ宿根ヲ採リ陰乾ス四歳以下
ノ兒ハ二晝夜ニ一丘ヨリ三丘マデ用フ。四歲ヨリ十
五丘マデ大黃ヲ加用ヒ或ハ阿芙蓉麝香ヲ加テ良
効アリ。或ハ初半丘ヨリ一丘マデ用ヒ漸加テ患者
咽喉乾燥。眼花閃發スル度トシ其量ヲ增ス勿レ
或云大人ハ五丘ヨリ十六丘マデ一眼トシ二晝夜

過テ復其量ヲ用ベシ。其後咽喉大ニ乾燥スルハ服

量過度ノ候トス動モスレバ是ニ次テ精神錯亂眼

昏等ヲ發スルコアリ若シ此症ヲ發セバ吐劑ヲ用

ヒ。吐ヲ發セバ水若クハ乳汁ヲ多ク冷飲セシムレバ

速ニ治ス○薙草タル間歇熱ハ左ノ方偉効アリ十

〔**葛根散**

〔**葛根散**〕一錢ミ自三錢ミ水煎ヘ。即愈ニ止

斯メ葛根葉末八丸未付。〔**葛根散**〕四錢以不

好。沙糖二刀麻糬和蜜漿。〔**葛根散**〕其毒無非

右調和シ分テ四服トシ間日ニ朝夕一服宛飲液ニ

テ送下ス○左ノ方亦良

〔**龍麝葛根散**

〔**龍麝葛根散**〕大蜜八丸ト角半粒半熟蜜八錢半亞云。謂四十

〔**龍麝葛根散**〕葛根葉十六丸。〔**葛根散**〕一錢。謂二十

〔**龍麝葛根散**〕葛根香各四十丸六錢。

沙糖四刃

右調和シ分テ八服トシ一服宛用。一日三次○總テ

葛根ヲ用。氏ハ大便ヨク通スルヲ肝要トス故ニ右ノ散剤ヲ用。間ハ時々大黃或旃那等ノ末ヲ用ベシ

〔**葛根越幾斯剤**〕製法失憶。答越幾斯剤ト同シ

〔**葛根越幾斯剤**〕伍叔淑揭依

蒸餾醋

アセトム・ディスティルラテウム・羅
フルシユル又オーフルゲハールデ・アセイニ蘭

○按ニ西洋ニ於テハ通例葡萄酒ヲ以テ醋ヲ造
ル但葡萄ヲ產セザル國ニテハ穀類又以テ造釀
シ日用飲膳及ビ藥劑ニ供スト云然ハ米醋亦藥
用ニ供スベシ

製法 醋 適宜

木炭 極細末

醋ノ十六分一

右攪和シ硝子若クハ磁製列篤兒多ニ内レ兜及ビ承
餾壇ヲ接合シ沙火ニテ慢緩ニ蒸餾シ或云重湯ニ
バ焦署初ニ出ル淡薄ノ液ヲ除キ亞云醋四十丸ヲ
セズ

淡薄ノ液ハ丸ヲ除クト但醋ニ強弱アレバ承餾壇
其氣味ヲ試テ是ヲ除クニ多少アルベシ承餾壇
ヲ換ヘ火ヲ増シ蒸餾ノ焦臭生スレバ速ニ火ヲ下
シ蒸餾ヲ取り硝子壇ニ收メ固封シ貯フ此醋ヲ
餾スレバ氣味淡薄トナリ格兒弗ニ殘ル醋ハ醇厚ナリ

試法

蒸餾醋ニ鹹蓬鹽晶ノ末八分一人量ヲ加テ其

沸騰止ニ少モ滾動セザルハ上好適宜ノ醋トス云
右ノ如ク鹹蓬鹽晶ヲ加ヘ少モ滾動セザルニ至テ
放冷シ透明ノ芒ヲ結ブハ其醋上好適宜ノ候ナリ
止ト國云蒸餾醋ニ弓ニ剥鴛亞斯一錢ヲ加ヘテ沸騰
鹹蓬鹽晶ヲ加ルト一錢ニ至ラズメ沸騰止ム者ハ
其醋薄弱ノ候トス是ヲ加ルト一錢ニ至レ庄沸騰

至リ磁壺ニ入文火ニ上セ煎熬メ乾固ノ鹽ト爲シ
是ヲ列篤兒多ニ内テ半ニ充シメ。再餾綠藜油石膽
ヲ取テ徐々ニ是ニ滴シテ右ノ鱗蓬鹽量ノ半ヲ加
ルニ至リ。濶大ナル硝子ノ承餾壠ヲ其列篤兒多ニ
接合シ。其合際ヲ塗封メ沙火ニ内レ。初メ文火トシ
漸ク火ヲ加テ武火ト爲シ蒸餾ノ終ニ霧ノ如キ蒸
氣承餾壠ニ透見セズ且^レ列篤兒多ノ頸ニ少モ蒸露
ヲ見ハス^レナキニ至テ火ヲ下シ承餾壠ヲ放テ。其
醋ヲ取り硝子壠ニ内レ固封シ貯フ。是醋ノ極テ悍
烈ナル者ナリ○其列篤兒多ニ殘リタル渣塊ヲ取

仍止ザルハ其醋過^ア悍烈ナル候トス。故ニ其薄弱
ナル者ハ醇精醋次ニヲ加テ悍クシ。悍烈ニ過ル者
ハ初餾ノ淡薄ナル液ヲ加ヘ若^レハ水ヲ加ヘ復前法
ノ如ク鹽晶ヲ加ヘ試テ適宜ノ度トナルニ至^{マタ}硝
子壠ノ口マデ滿シメ固封シ貯フ拔
醇精醋 アゼムラデカーレロアゼインシウル又
製法 アゼムラデカーレロアゼインシウル又
鱗蓬鹽晶亞斯ニ作ル ホーリストフルステルケンデアゼイン蘭
是醋ノ極テ悍烈ナル者ノ義剥剥 アゼムラデカーレロアゼインシウル又
蒸餾醋 各適宜

右鹽晶ヲ取リ少許宛醋ニ加テ少モ滾動セザルニ

水ニ溶シ是ニ剥篤亞斯ボツトアスノ末ヲ加テ少モ沸騰セザルニ至リ紙ニテ濾テ其液ヲ取り文火ニ上セ煮テ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷メ芒ヲ結バシム。是卽孕礬酒石ナリ拔是酒石ノ條ニ舉ル孕礬酒石ト同シ依云醋ハ酒石一丸燒酒再餾者一丸半水ヲ合和メ成ル。即チ酒石一丸燒酒再餾者一丸半沸湯十六丸右酒石ヲ湯ニ溶化シ放冷ノ燒酒ヲ處ニ硝子壇ニ内紙ニテ其口ヲ蓋ヒ上ニ小孔ヲ穿、緩火シ置テ化釀セシムレバ醋トナルヲ以テ知ルベシ性醋ノ性ハ酒ト相反ス。酒ヲ蒸餾スレバ初ニ銳烈ハ精液燒酒出テ後ニ淡水出ツ。醋ヲ蒸餾スレバ初ニ淡水出テ後ニ銳烈人醋出ツ。燒酒ニ火ヲ點スレバ燄ヲ發ス。醋ニ火ヲ點スレバ撲滅ス。酒ハ血ノ運行

ヲ増盛シ熱ヲ生シ人ヲノ醉眠セシム。醋ハ血ノ強盛ナル運行ヲ靜止シ清涼ニシ酩酊ヲ解ス。燒酒ヲ血中ノ沯モイ刺絡ノ出ル血中ノ鹹液ニ加レバ忽チ凝固ス。是ニ蒸餾醋ヲ加レハ速ニ溶解スル等ヲ以テ知ルベシ主治清涼滋潤シ津ヲ生シ渴ヲ止メ汗ヲ發シ凝血ヲ稀釋シ腐敗ヲ遏メ精神ヲ爽快シ燥熱ヲ解スル良藥トス。○蒸餾醋ハ尋常ノ醋ニ比スレバ氣味緩和ナレ。其質精微ニヨク竈透シ味好クノ服シ易ク諸飲劑ニ加ヘ用ルニ宜シ。○醋ニ水ヲ加テ稀クシ或ハ沙糖ヲ加ヘ甘美トシ諸熱病ノ飲料トシ

渴ヲ止メ燥ヲ潤シ熱ヲ解ス○虚憊ニ屬スル諸疫
熱腐敗熱。惡性熱ヲ治ス○焮衝病ノ膽液過多及腐
敗ノ帶ル症ニ尤良。但尋常壯實多血ノ焮衝病ハ初
發ニ發汗ノ害アリ故ニ初發ハ是ヲ斟酌スベシ○
清涼メ血液腐敗ヲ遏レニ峻効アリ故ニ膽液熱液
腐敗ノ發膽液腐敗ヨリ發スル諸症。及腐敗熱液
病ノ熱スル熱病膽液腐敗ヨリ發スル腹痛下利ニ左ノ方尤
尠アリ○尤^モ驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施^{アヒナメル}蔑兒^{前ニ出ツト}爲シ膽液熱ニ多ク用フ○膽液熱及膽液腐敗ノ酷
厲ナルヨリ發スル腹痛下利ニ左ノ方尤^モ驗アリ

雙酸清涼飲

- 蒸餾醋 二弓
密涅刺爾^{チヤウル}鎮痛液 二勺
酒石鹽 一錢
舍利別 四錢
沸湯 四弓

右調和シ半時ニ一匙家用フ○發斑熱及ビ冒寒傷
冷毒ノ諸症ニ醋ヲ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解シ腐敗ヲ
防テ良効アリ。殊ニ龍腦ヲ加テ發汗防腐ノ功尤^モ峻
大リ。腐敗熱ニハ胃腸ヲ淨刷ノ後是ヲ用ベシ。又右
ノ諸病ニ於テ專ラ蒸氣及ビ汗ヲ發スベキ症ハ左

ノ方良効アリ

香竄醋

アゼカムアンチセペチキム羅
スペセレインアゼイン蘭

菖蒲根

各六錢

白芷

二弓半

亞爾鮮

三弓半

撒爾非亞

二弓

芸香葉

二弓

府利

二錢

蒸餾醋

八北

右硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ固封シ慢火上ニ置テ

浸ス日二日。絞テ其液ヲ取り紙ニテ濾シ左ノ藥液

ヲ加フ

羯布羅丁幾牛爾

四錢

右合和シ固封シ貯フ枝又此劑傳染疫毒ヲ驅散シ
腐敗ヲ防ク効アル故ニ傳染病流行ノ時。毎日數匙
宛内服シ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ是ヲ温メ蒸氣ヲ
居室ニ薰スレバ其病ニ傳染スルヲ無シ○發斑熱。
惡性熱。冒寒傷冷等ノ蒸氣及ビ汗ヲ發スベキ症
ハ左ノ方亦良効アリ

香醋飲

香香竈醋

二弓半
前ニ出

ハ志接骨木花傑列乙

二弓

惡卦密涅刺爾鎮痛飲

一錢半

母室沸湯

一比

右調匀シ半時ニ一匙モジ若々三匙完服ス依○傳染腐敗熱惡性熱ハ醋ヲ一匙宛飲液ニ加用テ精神ヲ清炎シ汗ヲ發^シ病毒ヲ排泄シ血液狀腐敗ヲ防護ス凡熱病不患者虛罷ノ煩渴シ津液燥涸スル症ハ醋一匙ヨリニ^ニマデ一眼トシ用テ良○痘瘡麻疹ノ腐敗ヲ帶ル症及狂犬蝮蛇等ノ咬傷ニ醋ヲ用テ峻

効アリ或ハ的里亞加ニ加ヘ内服メ解毒ノ効ヲ稱ス○腐敗熱痘瘡等ノ血液腐壞爛崩ノ酷厲トナリ血脉ヲ穿蝕メ下血吐血衄血尿血ヲ發スルニ用テ腐敗ヲ遏メ血液ヲ收斂メ其症ヲ治ス○血液運行急慢ニメ腐敗セルヨリ發スル失苟兒陪苦ヲ治ス航海ノ徒ノ如キ身體ヲ運動セズノ此症ヲ發スル者多シ○醋ハ氣味竈透シ清涼收敛スルヲ以テ鎮痙ノ良効アリ。蒸餾醋ニ舍利別ト密涅刺爾鎮痛液少許ヲ攪和シ用テ諸痙攣ノ症及上衝頭痛不寐或ハ神思鬱憂病。狂癇ニ良驗ヲ奏シ又清涼降鎮ノ効アルヲ以テ阿芙蓉劑ノ用ヒ

難キ諸症ニ尤^モ効アリ。○醋、橙汁及^ヒ醋人製劑ハ皆過酒メ沈醉スルヲ解ス。醋ニ水ヲ加テ服シ或ハ鼻孔塗テ良又阿芙蓉毒火瞑眩ニ内服メ速効アリ其他亞兒^{アーリ}加利性ノ辛熱酷厲ニメ麻痺昏睡發狂セシムル諸藥卽チ雙鷺菊^{ツバキ}失^シ鬱答^{タマ}巔茄^{タマヒナ}蓑^{スミ}苔^{カク}等及^ヒ甲介類ノ毒ヲ解ス。但^シ中毒ノ甚キ者ハ初^メニ先^メト吐劑ヲ與^ヒ快吐セシメテ後醋劑ヲ用ベシ。又烟氣ニ咽^ヒテ呼吸窒塞スルニ卽効アリ。○醋ハ凝血ヲ溶解スト雖モ乳汁及ビ脂油質ノ液ニ加レバ忽チ凝固ス故ニ乳汁ヲ服スル人或ハ乳養ノ兒ニ是ヲ與フレバ乳

汁。胃中ニ凝固ノ消化セズ停滞ノ酸敗液トナリ病患ヲ發ス。

外敷 頭旋眩運或ハ昏冒卒倒等ハ患者ニ醋ヲ嗅シメ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ面ニ噀^{ハキ}テ醒解ス。是ニ用ルニハ悍^{ヅヨ}キ醋ヲ良トス。ヨク竄透スレバナリ。醋ニ銅^コ精ノ末少許^{ツバ}宛加ヘテ少^シモ沸騰セザルニ至リ磁製ノ格兒^{ルフ}ニテ蒸餾スレバ其醋甚ダ悍烈ナリ。是ヲ硝子壠ニ收メ固封シ貯テ聽用スベシ。是諸金ヲ腐蝕スルニ用フ。○劇^ハキ頭痛ニハ醋ヲ温メテ嗅^カシメ或ハ醋ニ水ヲ加ヘ消石^{ソウ}硝砂各少許ヲ研和シ布片

ニ 薙ヒツノ貼シ或ハ頭ヒ匪ヒテ捷効アリ。○醋ハ竈透刺
戦メ脉管ヲ收斂シ止血ノ効アリ。是ヲ綿ヒダニ浸シ深
ク鼻孔ニ挿サシテ衄血ヲ止ム。是ヲ布片ニ蘸ヒタクシ頭ヲ縛
スルモ良。○醋ニ水ヲ加ヘ温メ含漱メ斷頸等ノ出
血ヲ止ム。外傷ノ輕キ出血モ是ヲ貼ノ効アリ。○婦
人崩漏。孕婦及産後ノ崩血ハ醋ニ水ヲ加ヘ稀クシ
温メ水銃ヲ以テ子宮ニ注輸メ治ス或ハ産後子宮
收縮セズメ崩血止ザル症ハ冷醋ヲ布片ニ蘸ヒタクシ腹
部ニ貼ノ効アリ。○醋ハ凝血ヲ溶解ス故ニ打撲傷
ニテ血絡破裂シ其血皮中ニ泛濫メ青斑ヲ發スル

者。及ビ諸焮腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。醋ニ水ヲ加テ稀
クシ温メテ布片ニ蘸ヒタクメ數換貼ス。或ハ燒酒或ハ消
石砕砂各少許ヲ加テ研和シ施スモ良。○金創ヲ洗
フニハ醋ニ多ク温湯ヲ加フベシ否ラザルバ大ニ
刺戦メ焮熱ヲ發ス。○醋ハ骨ヲ軟ニシ硬骨ヲメ軟
骨ノ如クナラシム。故ニ骨傷ニ久シ是ヲ外敷スレ
バ骨ノ堅剛メ質ヲ失ヒ而復セザラシム。又佝僂病
アル小兒ニ酸味ノ飲食ヲ與フレバ諸骨逾軟弱ニ
メ其病增長ス但、胼胝様ノ硬腫ハ是ヲ外敷メヨク
軟化シ消散ス。骨ハ土質ヲ以テ成ル酸物ハ土質ヲ
溶化ス故ニヨク骨ヲ軟化ス。魚骨等

酒ヲ醸醋ニ淹セバ軟ナルヲ以テ知ルベシ。是ニ及メ燒
ムシ。○醋ニ苦味收瀉ノ藥品ヲ加テ外敷不レバ殊ニ
ヨク腐敗ヲ遏シ幾那ノ末ヲ加レバ其効尤峻ナリ。
諸潰瘍ノ腐壞ヲ遏ルニ用フ。或云夏月肉類ヲ醋ニ
アルヲ以テ防腐膚ノ効アル。○知ルベシト。○眞珠。珊瑚。蠣殼。卵殼等
ヲ醸醋ニ淹セバ軟化ス。○疫熱流行ノ時石ヲ燒テ
醋ヲ撒ケ其蒸氣ニテ居室ヲ薰シ傳染惡氣ヲ驅逐
スルノ効ヲ稱ス。依叔淑伍揭

遠西醫方名物考卷二十六終

遠西醫方名物考標目

卷二十七

失格列シコレ失格列シコレ

蒸餾水

失格列シコレ

西瑪爾拔皮

紫堇越幾斯劑

紫堇昆設爾弗

瀉利鹽

即諸厄利

舍利別世出

收斂鐵液

收斂亞的兒石膽

收斂皓礬水上同

升鐵鹽

升汞水銀

升汞撒爾弗上同

赤降汞上同

朱

上同

惠

諸厄利斯瀉利鹽

越栗失爾剥祿布利姐

鉛糖

水銀

鉛醋

附密陀醣

越列密

越列密膏

越列密

越列密膏

越沒里膏

越沒里膏

燕窩

燕窩

依蘭苔

附圖

甘草蘭苔飲

幾那蘭苔飲

越栗失爾

越栗失爾

治勞蘭苔飲

幾那蘭苔飲

越列密

越列密

越列密膏

越列密膏

列水銀

列水銀

越扶屋布斯

越扶屋布斯

越扶屋布斯

越扶屋布斯

越扶屋布斯

密涅刺

遠西醫方名物考卷二十七

男 宇田川 榕
榕菴校補

蒸餾水

アスクデステイルラタ羅

ゲソイフルデ

蘭

製法

雨水ヲ取り硝子若ハ磁製ノ格兒弗ヲ以テ

蒸餾

其水ノ四分ノ三分ヲ取り

或云初出ル

壌

ノロマデ滿シメ固封シ貯ワ

或云

クニ至レバ罐底ニ泥土殘ル故ニ數

蒸餾メ必モ土氣ナキニ至ルベシト

○凡水ハ臭味

大々淨潔ナルガ如シト雖モ土氣鹽氣硫氣ヲ含ミ

或ハ諸礦氣ヲ帶ル者アリ故ニ蒸餾メ其汚物ヲ去

藥用前供スベシ○水ノ臭味アル者或ハ濁テ異色
ヲ帶ル者或ハ是ヲ貯テ泥土粘汚ノ塗ヲ生スル者
ハ皆惡水ニノ汚物多ク雜ル候トス。飲料ニ用ルカ
勿レ○雨水ハ天造ノ蒸餾水ナル故ニ最モ輕清淨
潔ナリ。但大氣中ノ酸性鹽ニ固性硝砂ト固性消石
トヲ含故ニ自餘ホガノ水ニ比スレバ竄透シ粘膩脂膏
蒸餾スル等其他製煉術ニ多ク用フ。然而旱後ノ暴
雨ハ夥々蒸氣ヲ含ミ且土氣等ノ汚物ヲ夾ム故ニ
淨潔ナラズ○雪水モ亦雨水ノ如ク固性ノ二鹽ヲ

含故ニ大抵雨水ト同シ。但大氣中ノ酸性鹽ヲ含ム
カシ云泉河雨露ノ水ハ石灰質ナシノ上ヲ帶タル消石少許ヲ含ム○泉水ノ岩罅
石縫ヨリ遡出大心者ハ土氣即結固性硝砂。海鹽酸
性鹽ヲ帶ブ泉ノ沙中ヨリ出ル者ハ土氣及固性硝
砂ヲ脫除メ海鹽ト酸性鹽少許ヲ帶ル。凡泉ハ
直ニ地中ヨリ滲出スル故ニ極テ清冽ノ澄清ナ
レ凡瀾熟セズ。飲液ニ用テ凝固シ易ク消化シ難ク
ノ停滯ス。常ニ是ヲ用レバ細絡纖管ニ壅塞メ癧痛
風。疝痛。結石等ヲ患心者有リ。或ハ銅鐵鉛等諸金類
人氣ヲ帶ビ或ハ硫黃石膽。明礬等ヲ含ム者アリ。故

ニ異常ノ氣味アル水々皆飲料ニ用ル勿レ○井
水ノ石縫ヨリ湧出スル者ハ泉ニ舍メル三種ノ鹽
氣ヲ帶ビ或ハ石灰及ビ消石氣ヲ含ミ或ハ諸礦氣
ヲ帶シ者なり。故ニ泉ト同シ○河水ハ右ノ諸物ヲ
含ムト雖モ沙上ニ長流渙濁メヨク泡熱シ且ツ太陽ノ
照耀煦温ノ氣ヲ含テ融解シヨク滑利流動ノ汚物
ヲ淨除ス。故ニ消化シ易シ。但微鹽氣ヲ帶ル故ニ閑
達微利ノ効アリ。資稟壯實ニノ膽液多キ人ハ早旦
空心ニ一平碗ヲ服ア胸中ヲ潤涼シ酷厲液ヲ和解
シ大小便秘利ス。但沙氣泥臭アルハ用ル勿レ又

泉井ノ水ニ比スレバ融解濶熟スル故ニヨク石鹼
ト合和シ脂垢ヲ滌刷ス。故ニ布帛ヲ晒シ石鹼ヲ造
ルニ多ク用ヒ又画家洗匠ハ大抵河水ヲ用テヨク
碧綠黃等ノ色ヲ鮮麗ニス。但絳赤等ノ收瀋ノ宜キ
色ハ井泉ヲ用フ○湖澤陂池之水ハ前半舉ル諸物
ヲ含ムノニナラズ草木蟲類多ク水底ニ沈テ腐敗シ
又硫氣鐵氣及油鹽等多シ。故ニ飲料ニ用ル勿レ
○凡良性ノ水澄清淨潔ニテ粹量輕タ。火ニ上セテ
速ニ煮沸シ又速ニ冷ヘ。穀肉蔬菜ヲ煮少速ニ化熟
ス。故ニ飲液ニ用テ消化シ易久速ニ運輸ノ胃ニ重

滯セズヨク諸竈ニ排泄ス。水ノ量輕キハ土氣粘脂等ノ汚物雜ラザレバ大リ。或云。水ニ風化揮發ノ物及銳烈剽悍ノ物ヲ含ムハ其量輕シ。故ニ輕清ノ水上雖モ純潔ナラズル者アリト。然則水中多ク右ノ如キ精微ノ物質ヲ含ムハ其氣揮發竈透スル故ニ必ズ香臭アリ。然バ輕清ニメ杳臭ナキ水ハ設令精微ノ物混スルヲアリニ甚。微少ニメ水外良性ヲ害スルニ足。ズト謂ベシ。沙ヲ以テ水未濾スキハ汚濁塵土等皆沙ニ留リテ其水清潔大リ。然則是モ亦全純粹トナルニ非ズ。其故ハ水氣ノ漸漬浸透セル

細沙自剥裂ノ石質ノ液トナリ。水ニ和メ滲漏ス。故其液承溜甕ノ底ニ粘著シ時日ヲ經ルニ隨ニ漸凝固ノ石英狀ヲ成者アリ。又水中ニ含ムノ精微ノ物質ハ水ニ混ノ洞然トノ沙隙ヲ透過シ下ル。ノ以テ唯其夾雜セル粗大ノ汚物ヲ除ノミナレバナリ。○水ノ汚物ヲ去ルハ蒸餾スルヲ最良法トス。然則是モ亦其夾雜セル凝體物ヲ除ノミ。其故ハ水中ニ含ム所ノ極テ精微ニメ水ノ如キ物質ハ水ト凡ニ蒸升シ出レバナリ。但沙ヲ以テ濾過スルニ比スレバ蒸升氣化ノ出ルガ故ニ一切凝體ノ物質ヲ脫メ最淨潔大

リ。但文火ニテ蒸餾シ唯精微ノ蒸氣慢緩ニ升化シ徐々ニ餾滴スルヲ度トスベシ。若火候ニ意ヲ加ズ忽卒ニ蒸餾スレバ汚物モ其ニ蒸升シ出斯ノ如ク蒸餾ノ其格兒弗ニ必モ塗渣ナキハ其水大抵汚物ナキ候トス○温湯ハ内飲外用ニ緩和スル効アリ○浴湯ノ主用ハ第一。皮膚ノ汗管ヲ淨除メ蒸氣ヲ開達シ第二。凝體纖維。脈管ノ強硬攣急ヲ緩弛解シ疼痛ヲ止ム。假令バ勞動歩趨ノ肢體拘急攣痛スル者。湯ニ浴メ治スルガ如シ第三。血液ヲ融解渙釋メ運行ヲ進輸増盛シ蒸氣及ビ汗ヲ發ス。故ニ血

液ヲ衝動メ沸騰シ運行ヲ增進メ害アル病ニハ是ヲ禁スベシ叔括
淑伍

失格列乙 蘭 ジコリウム 羅

○按ニ此草。洋萬荳オランダチサノ一種ナリ。物叔度云。此草洋萬荳ニ比スレバ葉粗糙ニメ差長ク。缺裂深クノ且宿根ス。○性功大抵洋萬荳及ビ蒲公英ト同シ。此ニ品多ク失格列乙主治ノ病ニ用ス。淑云此草葉ノ性功蒲公英。羊鬚サイセン譯名花戶ヒヤガタラト同シト。皆代用スベシ。蒲公英スイセンノ性功蒲公英ヒヤガタラ越幾。

形狀此草二種アリ○第一種ハ春月葉生シ洋萬芭

オランダ千サ

葉ノ如クメ差深ク缺裂ス。但其淺深多少一様ナラズ或ハ缺又少キモアリ。淡綠色ニメ稍粗糙或ハ黯赭ノ斑紋生ス。梢葉ハ小クメ缺裂少ク或ハ刻缺ナシ葉間太キ圓莖ヲ抽_ト一二三尺許中虛粗糙稍轉捩シ枝ヲ分葉多ク生ス。枝梢ノ葉間ニ重瓣美碧色ノ花簇生シ瓣端ニ鋸齒アリ。花白色或ハ黃色ノ者アリ。後變メ毛絮トナリ萼中ニ子ヲ結ブ。白色ニメ稜アリ。根白ク長ク太サ指ノ如ク鬚アリ。根葉莖皆味苦ク折レバ乳様ノ白汁出ソ。此草原野ニ生シ或ハ藥トス。故肝脾ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ。脾病依剥昆_{イボコノデ}坪

種ヲ下シ培植ス。二三年宿根ス。根葉共ニ蔬菜ニ用フ○第二種ハ葉小ニメ缺裂深ク莖短ク白刺アリ其他第一種ト同シ沙地海邊ニ多ク生ス。宿根セズ主治根或莖葉花モ用フ性涼。收斂ス。消石様ノ鹽氣ヲ含清涼滋潤シ軟化稀釋シ稍刺戟_ス粘稠液内藏ニ壅塞シ殊ニ腸。腸間膜ニ滯著スルヲ疏解シ間歇熱ヲ治ス○膽液ノ油質稠厚ナルヲ稀済シ其敗液ヲ大小便ニ排除ス。故膽液腐敗ノ酷厲毒ヨリ發スル諸症ニ効アリ○血中ノ惡液ヲ淨刷シ清血ノ良藥トス。故肝脾ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ。脾病依剥昆_{イボコノデ}坪

兒鬱憂病。黃疸。水腫。粘液腫ヲ治ス。○煥衝病ノ酷厲ナル血ヲ涼解シ壯熱。煥衝熱。肝脾煥衝。遊走熱。胃熱鬱蒸嘈雜及勞瘦消耗熱ヲ解散ス。○胃腸粘液酸敗液ヲ驅除シ蟲ヲ下ス。○蒸餾ノ露水ヲ取。眼ニ點メ煥腫赤爛ヲ祛。翳膜ヲ消ス。○根水煎シ或露水。舍利別。昆設爾弗等ニ製用フ。葉及花モ亦効アリ。○大黃ヲ加。舍利別トシ用テ諸煥衝ヲ涼解シ膽液過多及胃中不化。敗液ヲ滌除シ黃疸尤効アリ。又初生兒胎屎ヲ下スニ多用。○根末トシ酒石英ヲ加。黃疸及水腫ニ用ヒテ殊効アリ。○子ニ大麥煎汁ヲ加。搗テ汁ヲ絞。

取乳劑トシ熱病ニ用テ清涼滋潤シ渴ヲ止ム。
失格列ヒ。越幾斯劑。製法蒲公英。越幾斯劑ト同シ
主治失格列ヒ。主治所說同シ。

西瑪爾技皮。シマロウババ羅。

是ハ南亞墨利加洲ニ產スル一種人喬木。皮ナリ。其狀菩提樹皮ノ如ク厚。輕柔韌ニ。革ノ如シ。表皮粗糙ニ。ノ皺アリ。帶黃白色。メ香氣大。味苦。稍收澑ス。拔爾撒謨樣油氣アリ。或云是根皮ナリ。一尺許ニ歲。テ輸ス。近來是ヲ用ヒ。稀ナリ。

主治

緩和ノ收澑シ。腸火。攀急腹痛ヲ解シ。虛症ノ赤

痢及經久ノ下利ニ偉効アリ。但初下劑ノ用病毒ヲ驅除シ胃腸ヲ淨刷メ是ヲ用サレバ効ナシ又赤痢後腸ニ潰瘍ヲ生シ多膿ヲ下スニ用テ効アリ○壯熱燃衝ナク膽液及粘液ニ血ヲ交ヘ下ス赤痢ヲ治ス○服量四錢ヨリ一弓半許ヲ水煎シ用フ或ハ一弓西ヲ水一升ニ煮テ半弓減シ服ス煎汁温ナル間ハ白色粘滑殆ト乳汁ノ如シ冷レバ帶赤色トナル或ハ末トシ半錢ヲ三服トス叔氏法

決勝○按ニ此樹皮末詳ナラズ依云加密列ハ赤痢及下利久ノ下利ニ用脫泄ヲ收回シ痛ヲ止ル効アリ

諸尼ノ西瑪爾技皮ニ勝リト○又按ニ此藥虛弱ノ下利赤痢ヲ治スル功大抵幾那ノ如シ代用スベシ

紫堇越幾斯劑

正キスタクトドイヘケルフル蘭製法生草莖葉ヲ以テ製ス其法蒲公英越幾斯劑ト同

主治粘液及ビ膽液ヲ疏釋シ皮表ノ鬱毒ヲ排泄シ太小便ヲ利シ腐敗ヲ遏メ強壯ス○萎黃病黃疸ヲ治シ肝脾腸間膜等ノ閉塞ヲ開通ス○一切瘡疹類經久頑固ニノ愈ザル皮病ニ朝夕ニ弓穴用テ能ク其酷厲毒ヲ驅發シ治ス蜀羊泉用莖ヲ及ビ安質沒扭

術安質沒扭^フ用ヒ或ハ安^フト加ヘ用テ殊ニ効アリ
間歇熱ニ良驗ヲ稱ス○肝脾門脈ノ壅塞ヲ兼ル

胸脇焮衝熱ヲ治ス○黃疸ニ効多シ。殊ニ粘液多シ
胃腸ニ鬱滯ノ太便通セズ腹部痞悶ヲ覺ル者八下

劑ヲ加ヘ用ベシ○腎痛結石ニハ大黃石鹹^{アヤメ}_{アヤメ}亞者^{アヤメ}利尿^{アヤメ}茶^{アヤメ}
力加ヘ用テ殊効アリ○苦^{コク}外火鹹^{アヤメ}ノ帶^{アヤメ}ノ生絞汁^{アヤメ}ハ二味^{アヤメ}

灸湯ト^ト用ヒテ亦効同シ

紫董昆設爾弗製法^{アヤメ}生葉ヲ以テ製ス其法山荊菜昆設^{アヤメ}福^{アヤメ}主治蒲公英ト同シ此草味^{アヤメ}依^{アヤメ}亞^{アヤメ}

爾弗ト同シ主治紫董越幾斯劑ト同シ

惠

譜厄利斯^{エリス}渴利鹽^{カルカタルチキム}

^{サルカタルチキム}又^{サル}アンゲ
リキム羅^{リキム}エングエルス^{エングエルス}ピルゲール

ソウト蘭^{ソウト}

○榕按ニ是卽漢人所謂凝水石ナリ。時珍綱目
凝水石條別錄曰。生常山山谷。時珍曰。別錄言凝水
鹽之精也。陶氏亦云。鹵地所生碎之似朴消。范子計
然云。出河東河東鹵地也。獨孤涓丹房鑑源云。鹽精
出鹽地。狀如水精據此諸說則凝水即鹽精石也。一
名泥精。昔人謂之鹽枕。今人謂之鹽根。生於鹵地積
鹽之下。精液滲入土中。年久至泉結而成石。大塊有
齒稜如馬牙。消清瑩如水精。亦有帶青黑色者。皆至

暑月。凹潤入水。浸久亦化。○小野蘭山。本草綱目啓蒙云。凝水石。八真人寒水石也。卽鹽ノニガリ。凝テ石ノ如キ者ナリ。年久ク食鹽ヲ多ク積置シ下。或ハ土中ニアリテ白色透明ナル。石蜜明礬輩ノ如ク。又重カラズ。味微苦ニメ鹹ナラズ。暑中ニモ解ケズ。濕ラズ。水中ニ投スル。久シケレバ融化ス。諸州鹽戶主多シ。市中鹽販ニモアリ。又播州赤穂ニ冰柱ノ如クニ長廿五寸許。中ニ稻草一條ヲ包モノアリ。○榕按ニ下總小松川ノ邊ニ元海鹽ヲ以テ和芒硝ヲ製シ亦凝水石ヲモ製シ。

多ク藥舗ニ販ク。左ノ譯説ト參考メ知ルベシ。瀉利鹽ハ一種ノ泉鹽泉ヲ煮テ取ル鹽ノ總稱ニナリ。漢人所謂井鹽ノ類也。ノ天造人工ノ二種アリ。天造ノ者ハ諸厄利亞國名也。越貌宋ト云。ル鑛泉ノ傍ニ凝結シ。或ハ山谷中ニ生メ消石ノ如ク。凝結ス。其天造ノ越貌宋鹽ハ鑛性ノ亞兒加利鹽ト礮性ノ酸收鹽ト抱合セル。一種ノ中和鹽ナリ。人工ノ者ハ古昔ハ越貌宋ノ泉ヲ煎熬メ結芒セシメ製ス。然此鹽ヲ得ル。少キ故ニ今ハ諸厄利亞ノ製煉家。海水ヲ煮テ食鹽ヲ取りタル後ニ殘ル苦汁ヲ以テ製ス。此亦礮性ノ酸性鹽ト苦味ノ

土トヲ以テ成ル一種ノ中和鹽ニメ其性天造ノ品ト同レ此鹽潔白光瑩殆ト雪ノ如ク味苦クノ滲透シ乾固ナルヲ上品トス。其質消石ニ類シ渴利ノ効アリ。ヨク水ニ溶化ス。火ニ投スレバ烊テ泡起シ焰ヲ發セズ爆聲オク重固ノ質消シ輕虛ニメ綿絮ノカシ。亞兒加利鹽液ニハ溶化セズ。大氣ニ觸テ風化セズ。○是ヲ水ニ溶シ汚物ヲ淨凍ノ精製後ニ出ツスレバ芒ラ結テ潔白瑩徹。後ヲ成シ或ハ方形ヲ成シ瓦老別里鹽前ニ出ツノ如シ故ニ藥局家是ヲ瓦老別里鹽ニ代テ販クアリ。

製法 海水ヲ取り是ニ粗朴ノ海鹽ヲ適宜ニ加ヘテ溶シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾固ノ鹽ト爲シ此鹽ヲ取テ再ビ水ニ溶シ濃コシテ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至テ放冷メ芒ヲ結ハシメ其芒ヲ取り乾シ貯フ。是ヲ瓦老別里鹽ト名ク。其剩餘ノ芒ヲ結バザル液ヲ取り火ニ上セ水氣ヲ消メ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷シ芒ヲ結バシメ其芒ヲ取り乾シ貯フ此即チ渴利鹽ナリ。説云。譜厄利斯及ビ煮ア食鹽ヲ製スル後ニ残ル苦灰汁ヲ以テ造ル。

精製法 尋常ノ譜厄利斯渴利鹽ヲ適宜ニ取。是ト

等分ノ沸湯ヲ加テ溶シ温ニ來メ濾過シ放冷メ芒
ヲ結バシメ其芒ヲ取り貯ヘ又其汁ヲ火ニ上セ
氣ヲ蒸散シ試ニ是ヲ冷石上ニ滴ノ凝結スルヲ度
トシ其液ヲ放冷メ芒ヲ結バシム。數斯ノ如クメ終
ニ少モ結芒セザルニ至テ悉ク其芒ヲ取り集メ乾
シ貯フ其剩餘ノ汁ハ麻煩^{マグチ}失亞^{アラ}過爾^バ技ヲ製スル
ニ用ベシ^國

又法 潟利鹽 一九 沸湯 三九 右溶化メ火ニ上
セ煮テ上面膜ヲ生スルニ至リ紙ニテ濾シ放冷ノ
芒ヲ結バシメ大約半北許ノ芒ヲ取ルベシ潔白透

瑩水ニ溶化シ易キヲ上品トス ^臣 ○此鹽ハ氣ニ觸
レバ濕ル故ニ固封シ貯フベシ ○瓦老^{カラウベ}別里鹽ノ下
品ナルヲ此鹽ニ充テ偽リ敗ク者アリヨク擇ムベ
シ是ヲ驗スル法。其鹽ヲ水ニ溶シ剥篤亞斯^{ボウトアス}ヲ水ニ
溶シタル液少許ヲ取テ是ニ滴シ加ルニ忽チ其底
ニ苦味ノ塗タ生スルハ眞品トス。其水澄清ニメ塗
ナキハ下品トス

主治

清涼下劑トス。味苦ク稍刺戟シ効力峻ナラズ
メヨク渴下ス。華爾^ル斯質ノ下劑^{蘆薈、芍藥、巴龍骨木}
ハ多ク腹攣急絞痛ヲ發スレ压此鹽ハ少モ腹痛ヲ

發せズ。又嘔吐ヲ起ス。ナシ。故ニ暫留熱。腎火衝。酷

烈ナル。傷冷毒痛。脾病。水腫。黃疸。等ノ熱症ノ兩便不

利及ヒ内藏ノ壅塞ヨリ發スル。桂芍タル。諸病。疝痛

等ニ用ヒ。太便ヲ利スルニ尤良。是ヲ服メ。嘔氣ヲ發

スル者ハ杏竈ノ藥ヲ加ヘ與フベシ。桂姜益智等ヲ云。

○服量一錢ヨリ一弓マデ。水若^{モレ}ハ適宜ノ飲液ニ溶シ或

ハ飲劑ニ加ヘ用フ。依^叔技^製亞^國

^エ越栗失爾剥祿布利恒

^エリキシル。ポロブリタチス
ラセルシ羅^アルゲメ子

^エリキシル。又サーメン^シゲス

テルデエリキシル。ハシアロエ^アロ^エテインキテウラ。アロ

製法

盧會末

^{エスコム}
ホシタ蘭

沒藥末

雜腹蘭

各一弓
叔雜腹蘭四十度者

燒酒

三十弓

右雜腹蘭ヲ細ニ剉ニ硝子壘ニ内レ燒酒ヲ加ヘ微火上ニテ浸ス。十二時濾テ液ヲ取り。盧會。沒藥ヲ加ヘ時々振蕩シ淹ス。三日紙ニテ濾シ其液ヲ取硝子壘ニ内固封シ貯フ。國

又法。前方ノ藥液一弓ヲ取り硫黃精若^{モレ}ハ綠礬精

十滴ヲ加フ

又法

前方中ノ沒藥ヲ硝子壘ニ内レ硫黃精ヲ加
濕シ置、一二日ニメ盧會。雜腹蘭ヲ加ヘ。是ニ燒酒ヲ
注キ加テ其藥料ノ三指横徑上ニ至リ。微溫沙火中
ニ置、七八日。其間數振蕩シ其浸染セル燒酒ヲ他ノ
硝子壘ニ寫シ内レ。其滓ニ又前ノ半分量ノ燒酒ヲ
加ヘ浸ス。前法ノ如クシ。終ニ其兩回ノ燒酒ヲ取
テ合和シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。右後ノ二方ヲ
エリキシル。ホロブリータチス。キム。アシチウムト名ク。
是レ方中ニ酸收ヲ加ルノ
義ナ。酸收ハ硫黃精ヲ云。○右ノ方中、硫黃精ヲ加

ヘズ。酒石液二錢ヲ以テ右ノ三昧ノ藥末ニ加ヘ濕
ス。十二時ニノ焼酒ヲ加ヘ復浸ス。前法ノ如ク
ス。是ヲエリキシル。ホロブリータチス。キム。アルカリ
スムト名ク是レ方中亞兒加利液ヲ加ル義
ナリ。亞兒加利液ハ酒石液ヲ云。酸收ヲ
用テ害アル諸症ハ此方ヲ用ルナリ。○

主治健胃ノ要藥トス。又內藏ノ壅塞ヲ開達シ粘液
ヲ稀解シ大便ヲ利シ汗ヲ發シ腐敗ヲ遏メ飲食ヲ
消化シ血中ノ惡液ヲ祛キ蛇蟲ヲ殺シ寒粘液質ノ
人及ヒ子宮病經閉ニ良驗アリ。○内外創傷。潰瘍ヲ
淨刷シ愈スニ尤効アリ。○此症ニハ硫黃精若クハ酒
石液ヲ加ヘザル方ニ宜シ

○服量五十滴ヨリ五十滴マテ適宜ノ飲液ニ點服
ス効用大約律比丸リップヒ_{前ニ}出ツト同シアカ_伍

又法
盧會

沒藥 各一弓

右細末トシ硝子壙ニ内レ孕鹼酒石液若ハ酒石葉
液一弓ヲ加ヘ固封シ微温沙火中ニ置キ泡熟ノ藥
料ヨク溶化スルニ至リ。燒酒度者二十ニ加ヘ浸ス
八六時ニノ其液ヲ他ノ硝子壙ニ寫シ内レ其渣ニ
又新ニ燒酒ヲ加ヘ浸メ其液ヲ取ル。前法ノ如ク
シ數斯ノ如クノ其渣盡ク消化シ唯汚物ノニ殘ル

ニ至テ其液ヲ合シ文火ニ上セ其量ノ半ヲ減耗シ
硝子壙ニ收メ固封シ貯フ

主治 是レ開達疏通ノ峻効アル藥ニノ纖維細管ニ
竊透シ凝結ノ敗液ヲ溶解シ經久頑固ノ壅塞ヲ疏
解シ往復淹滯ノ廢疾ニ殊効アリ。○的里亞加ヲ加
ヘ用テ汗ヲ發シ下劑ニ加ヘ汚滯ヲ滌除シ乳清ニ
和シ服メ小便ヲ利ス

鉛糖

「サカリムサカレニ羅」
「サカドソイクル蘭」

製法

鉛粉 一北

蒸餾醋 十九

右鉛粉ヲ磁鍋ニ内レ蒸餾醋ヲ加ヘ煮テ酸味消シ甘味トナルニ至テ紙ニテ濾其液ヲ文火ニ上水氣ヲ蒸散メ上面膜ヲ生スルニ至リ。再濾シ放冷ノ芒ヲ結シメ其芒ヲ取貯フ。又其餘ノ液ヲ煮テ結芒セシムルノ前法ノ如クシ其芒ヲ取集乾カシ貯フ。○鉛丹若シハ黒錫ニテ前法ノ如ク製スル者アレ压鉛粉テ製スルヲ上品トス。○此藥ハ一種礦性ノ中和鹽ニメ潔白微透亮ノ芒針ヲ結ビヨク水ニ溶化ス。若潔白ナラザル者ハ蒸餾醋ト水ト等分ニ合是ニ其

芒ヲ投ヘヨク溶シ紙ニテ濾火ニ上水氣ヲ蒸散メ結芒セシムルノ前法ノ如クスレバ潔白トナルナリ。主治味甘收斂清涼ス。外敷ノ焫熱ノ涼解シ血液ノ酷厲毒ヲ甘和シ疼痛ヲ止ム。故ニ一切焫熱腫痛及び小皰赤疹等ヲ收斂メ消散シ潰瘍ノ侵蝕スル敗膿ヲ淨掃シ乾愈ス。○焫腫眼ニ是ヲ薔薇水ニ溶メ眼ニ黒シ或ハ鉛糖硝砂各四氏水八弓研和シ眼黑ノ殊効アリ。○咽喉焫腫ニ管ヲ以テ此末ヲ咽喉ニ吹入テヨク腫痛ヲ消散ス。○淋疾ノ酷厲毒ヲ消シ焫腫ヲ止ルニ薔薇水若シハ乳汁ニ鉛糖一氏

ヲ和シ水鏡ニテ陰莖ニ注入メ驗アリ○是ヲ薔薇
水ニ溶シ面部ニ塗テ皮膚ヲ美澤ニシ。汚斑瘡痕小
胞赤疹等ヲ消散ス○膏藥及ビ塗藥ニ和シ外敷ス
水ニ溶シ用テ効力羅度窓篤爾^{トアレ}固ニノ如シ^{ロ度}
主治ト參^{ロス}○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越メ病
考スベシ○羅斯其他焮腫瘡瘍類皮表ニ發越メ病
毒排泄シ治スベキ症ニ此藥ヲ外敷メ消散セシム
レバ其毒忽チ内攻ノ諸惡症ヲ發ス^{遇云鉛糖鉛粉}其
性功大抵同様ナリ外敷メ收斂シ濕^ヲ乾^カシ臭汗及
ヒ腋臭ヲ消シ羅斯焮腫等ヲ治スレバ其毒ヲ潛伏
メ内攻セシムルアル故ニ常ニ戒慎ヲ加^ハ施スベシ○此藥一日ニ半仄ヨリ
五六仄マデ内服メ痘癩ノ運動ヨリ發スル諸症癪

及ニ寧急ニ因テ嚙下ヲ妨レ症ニ効ヲ稱シ又纖維
諸脉ノ弛緩虛弱ニノ感動シ易キヨリ起ル諸症ニ
良効ヲ稱ス。然レ凡其鉛毒ニ因テ動モスレバ内藏ヲ
閉塞シ烈キ癌痛。癰不遂等ヲ發スルアル故ニ内

服スルト稀ナリ

亞叔矣

キスミラクト・サウル「又アゼム・サウル
ステルク・フルイ・エント・アセイ・フニ

製法 微 密陀醣 次二適宜出

適宜出

右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ油若クハ
蜜ノ稠ト爲ス逐

蜜ノ稠卜爲又

拔

又法 密陀僧 適宜

蒸餾醋 四倍

右磁鍋ニ内レ文火ニ上セ煮テ酸味ナキニ至リ紙ニテ濃シ文火ニ上セ水氣ヲ耗散ノ蜜ノ稠ト爲ス

亞

又法 密陀僧 一比

醋 二比

右文火ニ上セ攬セ煮テ半ヲ減ス

度

主治密陀醤ト同シ。但收斂ノ効峻烈ナルノニ

度

爾ト参考

スペシ

密陀醤

アゼチム・リタリゲイリ又アゼチム・ブリュ

ムビ羅

コウド・ゲリット・アゼイン又フル

〔製法〕

密陀僧 十三

醋 四十弓

イエンド・アゼイ

＝フニール・ロード

蘭

右頸窄キ硝子ノ格兒弗ニ内レ數振蕩ノ淹ス二十時慢火上一二時煮テ放冷シ是ヲ青紙

藥店アイ紙ト云者

ニ浸少モ色不變ニ至紙テ濃シ渣硝子壘固封貯

國

〔又法〕

密陀僧 半比

アゼチム・リタリゲイリ又アゼチム・ブリュ

ムビ羅

コウド・ゲリット・アゼイン又フル

右磁壺ニ内レ數攬和シ酸味消スルニ至テ靜定シ

其上清ヲ取リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

亞

主治 收斂ノ嘔スベキ甘味アリ。外敷ノ收斂清凉シ

焮腫ヲ消散ス。焮腫眼ニ黒シ。咽喉焮腫ノ漱藥トシ

痔焮痛。湯火傷。凍瘡。淤瘡。指疽。腺腫等ヲ治ス。水ヲ

加ヘ稀クシ皮膚顏面ニ塗テ赤胞小疹及ビ腫瘍。潰

瘍。毒蟻刺咬ヲ愈シ長途歩行メ踵蹠焮熱。水庖腫痛

スルヲ治ス或ハ洗藥。蒸湯藥トシ或ハ油ヲ和メ軟

膏硬膏トス

過底

越列密レミ ゴム立レミ 又レムニ 羅

是ハ黒地兀皮亞アフリカ 亞弗利加アフリカ 伯西兒アフリカ 新伊斯巴尼亞アフリカ 共

亞墨利加アフリカ 產スルアルボル立レムニ ト名ル 樹ヨリ自然ニ流滴シ或ハ其樹皮ヲ鑽刻メ取ル華爾斯大川。其樹阿利穢アフリカ 樹ノ如ク葉長狭。淡綠色。或ハ銀色ヲ帶ヒ小赤花ヲ開ク。實亦阿利穢アフリカ 樹ノ如シ或云是レ 兀皮亞アフリカ 阿利穢アフリカ ト名ク。其樹皮縱タテ = 坎裂スル處多々メ宛モ鑽刻スルが如シ。是ヨリ華爾斯多々流溢ス。上品ハ淨潔ニノ微透亮。淡黃色ニノ綠色ヲ帶ヒ且、白色ニノ透亮セザル顆粒間錯メ大塊ヲ爲シ。質重ク外面乾キ。裏軟ニメ粘潤アリ。味苦ク。香氣拔爾撒謨様アフリカ ノ齒香人如シ依云。灰色ニノ綠色ヲ帶ヒ其氣瓦爾拔奴謨アフリカ ノ如シ

蘭蕉葉或ハ椰樹葉ニ卷テ四方ニ貨入○或ハ伯西兒新伊斯巴尼亞其他南亞墨利加洲ノ諸島ニ產スルイシカリバト名クル樹ノ華爾斯ヲ越列密ト名ケ貶タ者アリ其樹葉梨樹ノ葉ノ如シ淡黃花ヲ開キ實ハ阿利磯ノ如シ其華爾斯微黃透亮軟ニ粘リ甚ダ松脂ニ似タリ久ヲ經レバ乾固ノ磨碎スベシ前種ニ比スレバ下品トス又火ニ温メテ香氣的列並底那ノ如キハ偽品トス

○按此樹脂和漢產未詳ナラズ舶來ノ用ベシ主治性溫油氣鹽氣多シ外敷ノ凝結ヲ疏解スル殊

効アリ膏藥若ハ塗藥トシ稍衝動ノ腫瘍ヲ消散シ疼痛ヲ止メ堅硬ヲ軟ゲ或ハ膿ヲ釀シ腐敗ヲ淨除シ創ヲ愈ス良藥トス又神經ヲ強壯シ頭創神經創及ビ骨傷脱臼ニ尤_モ驗アリ頭痛齒痛肩背痛等ノ患部ニ外敷メ其疼ヲ消散ス燒酒若ハ油ニ溶シ塗テ良効ヲ稱ス雞子黃ニ研和シ用_フ或ハ水ヲ加ヘ蒸餾メ芳香ノ露水及ビ精微ノ油ヲ取ル右ノ諸症ニ

權効アリ或云蒸餾メ十六伍物斐越列密膏エムフラストユレ_モ羅

製法

越列密エレミヲ取文火ニ溶若把兒麻膏ニ煉和ス
主治ミセイ越列密主治ニ舉ル諸症ニ外敷ノ良驗アリ

阮エン日多膏

エシギエン左ムエゲブテキム羅

製法銅綠細末

酒石英三北

右水適宜ニ加ヘ煮テ盡ク溶化スルニ至リ。濾テ汁
ヲ取リ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ乾クニ至リ。又風
日ニ曝サラメ自ラ溶化セシメ。濾コシテ滓ヲ去リ蜜十二北
ヲ加ヘ攪和シ軟膏ト爲ス

援

又法

銅綠細末五弓

醋七弓

蜜十四弓

右文火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煮テ軟膏ト爲ス

亞

主治汚穢腐爛ノ潰瘍ヲ淨掃シ膿ヲ排ヒ壞肉ヲ祛
キ好肉ヲ生シ水棉様肉ヲ除キ熱壞疽癌樣及ビ黴
毒ノ腺腫潰瘍口中斷頸爪諸骨ノ腐爛ヲ淨除スル

貼ノ良驗アリ

庚底

味々軟膏十數大

越沒里膏エンシグエン左ムエモーリンス羅

白藥

製法

阿利穢油

五分

白蠟 二分

右文火ニ上セ。烊化シ攪和メ軟膏ト爲ス。亞
括
主治外敷メ緩和止痛ノ捷効ヲ奏シ。堅硬ヲ軟化シ
焮熱腫痛ヲ消散シ或ハ善膿ヲ釀メ潰破セシメ或
ハ皮膚皺揭甲錯枯澁汚斑赤泡小疹瘡痕火傷凍瘡
等ヲ治シ肌膚ヲ滑澤ニス。○他ノ薬品ヲ加テ諸膏
藥ヲ製スルニ用フ。房
叔布

燕窩

「スワリ立子スト」

蘭○人家屋簷ニ架スル燕
巢ナリ。燕窩菜ニ非ズ。

主治堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ疏散ス。琶布トシ頸ニ貼
メ咽喉焮熱ヲ消散ス。是レ燕屎ニ酷厲ナル鹽氣。土
氣アリテ凝血及ビ粘液ヲ驅散スレバナリ。医

依蘭苔

「リセニイスランデキム羅
エイスランドセモス蘭」

○榕按ニ是和名ハナゴケト呼ブ一種ノ苔ナリ
深山巖石林中地上老木等ニ生ス。西洋ニ於テハ
往昔始テ依蘭地オスランド歐羅巴洲ニ採リ和蘭ニテエイ
スランドセモスト名クモスハ苔ノ義卽チ依蘭地
苔ナリ。今是ヲ略譯メ依蘭苔ト名ク

形狀

形ナ鹿角菜ノ如ク花又ヲ爲シ花又大

分テ二種トス

圓ノ邊ニ微細ノ毛刺アリ

蘭紹色或云一面ハ淡綠若ハ灰白

暗赭

味苦微收澑粘滑ニメ杏氣ナシ

水ニ浸シ若ハ

水煎スレハ粘汁出テ

鹿角菜ノ如シ。日乾シ或ハ水

若ハ沸湯ニ浸シ淘洗スレバ

苦味減ス

依蘭苔圖



生齒

莖葉皆無根生

根生

產地

此苔往古ハ依蘭地ニ採ルト雖モ今ハ歐羅巴

洲ノ北方諸國ノ山地巖石。磽确瘠土。荒野及ビ松林

中ニ多ク生ス

主 治

油。酸性鹽。許多ノ水。及ビ些少ノ土ヲ含ニ又趨

謨及ビ華爾斯

アリテ其苦味ヲ生ス○人及ビ畜類共ニ食料トシヨク身體ヲ榮養ス。生鮮ノ者ハ微利

人効アリ。一晝夜水ニ浸セバ苦味消シ下利ノ効去

テ唯粘液ノニ殘ル

此粘液ヲ以テ諸蒸餾油及ビ龍腦ニ研和シ水ニ加レバヨク水

ト混但乾腊ノ者ヲ用フレバ下利スルヲ稀ナリ○

此藥内服ノ消化シ易ク。大ニ滋養シ虛損ヲ補充シ

諸酷厲液ヲ包攝。綏和スル殊能アリ。故ニ飲食消化
力衰ヘ羸瘦スル諸病及ビ勞歎ノ要藥トス。○勞
歎ノ初發及ビ經久頑固ノ歎嗽ヲ治スルニ近來是
ヲ用テ經驗甚ダ多シ。○水煎ノ粘液ニ乳汁ヲ加ヘ
テ稀クシ。勞瘵様ノ病ニ毎日飲料トシ用テ全治ス
ル者少カラズ。○胃ノ虛弱ナル者ハ乳汁ト雖モ消
化シ難シ。此藥ハ良性ノ榮養液ヲ釀生スル殊効ア
ルヲ以テ乳汁ヲノ消化シ易カラシム。故ニ此藥一
味乳汁ニ煮テ用。或ハ左ノ如キ劑ニ乳汁ヲ加用フ
ベシ。其古ハ丸蘭吸之。

甘草蘭苔飲

依蘭苔 一弓

陳年甘草 三錢

右苔ニ水一升半ヲ加ヘ煮テ十四弓ト爲シ。火ヲ下
シ甘草ヲ加ヘ浸ス。十六分時ニノ濾過シ用フ。○
羸瘦消耗熱。肺傷久歎。血液ノ虛損ヨリ發スル荏苒
タル虛羸病。下利止マズ瘦削スル等ヲ治ス。○傷冷
毒ノ酷厲液。肺ヲ刺戟シ歎嗽クノ虚憊七レ症ニ的
當トス。患人體稟薄弱ナル者殊無良。或ハ是ヲ用テ
效治セザル者モ唯肺及ビ全軀ヲ滋養シ精力ヲ保

續ア虚脱セシメザル爲ニ用テ良驗アリ○歎嗽及
口勞歎ニ効アレ。逆歎衝ニ傾ク症^{ムカシ}ハ適應セズ。脉
弦數ニメ頗ル力アリ。舌及皮膚乾キ。總テ鐵維充
張ノ候アル者ハ此藥ノ粘液質ハ妨ゲザレ。其收
濁強壯ノ効ハ害アレバナリ。唯患者ノ天質薄弱ニ
メ感動シ易ク。且腹部ノ諸藏及ビ肺虛損メ粘痰多
ク湊リ。モ歎衝ノ候ナキ症。或ハ傷冷毒ノ酷厲波
刺戟メ肺虧損スル症ハ此藥ヲ用テ大ニ輕快ヲ致
スナリ○肺虛弱ニメ感觸シ易キヨリ漸ク勞歎ニ
罹リ吐痰過多ナル症ハ此藥大効アリ。但^シ他ノ病毒

ヲ夾テ肺ヲ刺戟スル者ハ先ツ對症ノ藥ヲ與ヘ其
毒ヲ驅除メ後是ヲ用テ殊ニ的當ス○肺歎衝ノ劇
キ諸症退テ後毎ニ是ヲ用テ効多シ。是ニハ肺ノ
虛損ヲ回復シ。一ニハ肺ニ壅滯セル膿ヲ排ヒ腐爛
ヲ除キ淨掃ノ愈セバナリ○凡ソ肺瘍大ニ膿潰ス
ル症ハ此藥ヲ用テ曾テ害アル者ヲ見ズ○總テ歎
衝ヲ兼ザル勞歎ハ是ヲ用テ肺ノ虛損ヲ補充シ膿
質ノ酷厲液ヲ消ス○勞歎ニ幾那ヲ用テ應セザル
序ハ此藥ヲ加ヘテ幾那ノ効ヲ扶ケ用テ良効ヲ得
此ト多シ○肺ノ虛弱ナルヨリ勞歎ニ罹リ夥ク粘

痰ア咯ク症ハ幾那ヲ加ヘ殊効アリ。假令バ左ノ方人如シ華火吸ヘテ幾那ハ痰ア咯出テ用ヒ更改善す。

幾那蘭苔飲

樹木幾那 一弓
海藻依蘭苔 四錢

右水ニ丸ヲ加ヘ煮ルヲ四分時ニメ十六弓ト爲シ濃過メ滓ヲ去リ遏爾託亞。舍利別。一弓ヲ調和シ一時毎ニ一小茶碗ヲ温服ス○肺癆勞歟ノ既ニ膿ヲ成ス症ハ動モスレバ痰甚ダ膠粘ニメ咯出シ易カラザル者多シ。此症ハ總テ強壯收瀦ノ藥ハ害アリ

故ニ右ノ飲劑ノミナラズ此藥一味與フト雖モ呼吸促迫煩悶等ノ惡症ヲ增發ス○乾歟及ビ痰咯出シ難キ勞歟。麻疹後ノ乾歟休マザル症ハ此藥四錢ヲ取り甘草二錢ヲ加ヘ水ニ丸ヲ以テ煮テ十六弓ト爲シ半時毎ニ一小茶碗ヲ温服ノ殊効アリ多ク痰ヲ咯シムベキ症ハ海葱蜜少許ヲ加フベシ假令バ此藥一弓ヲ取り水十六弓ヲ以テ煮テ一丸ト爲シ海葱蜜四錢マデ加ヘ一時ニ一弓宛用フ。總テ羸瘦消耗熱ハ歟ノ有無ヲ論セズ右ノ飲劑ヲ與ヘテ患者ノ精力ヲ保護シ消耗脱泄ノ汗ヲ止ムベシ又

左ノ泡劑良驗アリ

治勞蘭苔飲

依蘭苔イラン一弓

甘草

蜀羊泉スツヤンクエン

各六錢

黑失刺カツシラ蓮葉レンザ

乙切草ヒツヅクソウ各三錢

茴香穗イフウスイ二錢

右件調匀シ沸湯ニ泡出ス○肺ニ害ナキ諸般ノ羸瘦病モ亦病毒ノ所生ニ拘ラズ依蘭苔イランヲ用テ多ク

効アリ○腹部ノ諸藏若クハ腸間膜、腺ニ膿瘍等ヲ生スルニ因テ荏苒タル内伏熱ヲ發シ。身體消耗枯瘦スル症ニ是ヲ用ヒ治驗多シ○此藥腐敗熱ニハ峻効ナシ是防腐ノ性力慢緩ナレバナリ。然ニ病毒漸ク退キ。唯其榮養ノ虧損スルヲ培補シ精力ノ虛缺ヲ回復スベキ症ニハ大効アリ○飧泄下利、肝崩等ノ脱泄ニ因テ胃腸ノ運化虛衰シ全軀ノ榮養ヲ失フ者ハ此藥甚ダ驗アリ。其病性分明ナラザル者モ是ヲ連服セシメテ効ヲ得ルヲ多シ○痛痢、赤痢ノ初發ハ此藥的當セズ。先ヅ吐劑或ハ大黃劑ヲ用

テ胃腸ノ酷厲毒ヲ驅除スベシ。否ラズメ早ク此粘
涎ノ強壯藥ヲ投スレバ其毒逾壅鬱ノ病患淹滯シ
惡性トナレバナリ。故ニヨク胃腸ヲ淨掃メ是ヲ用
レハ腸中ノ粘液剥脱ノ傷爛セルヲ填補シ精力ヲ
強壯メ大効アリ○赤痢ノ膿ヲ下ス症ハ此藥良驗
アリ石灰水石灰ノ條出ニ煮テ用レハ殊ニ良○痢疾惡
性ナラズ。唯傷冷毒ヨリ發メ其酷厲液ヲ和解スベ
キ症。及ビ患者疲勞シ胃腸虛衰スルが爲ニ薺苺ト
メ治セザル症ハ此藥ヲ用テ偉効アリ。亞兒アレ尼ニカ。若
クハ幾那ナヲ加ヘテ殊ニ良

服法此藥一斗ヲ取り水一升ニテ煮ルト四分時。布
片ニテ絞リ瀝セバ大約七八斗ノ粘汁トナル。或ハ
茲養ノ効ヲ取ルニハ乳汁モジ若クハ乳清一升ヲ和シ
毎日飲料トス○苦味ヲ惡ム者ハ沸湯ニ浸ストハ
分時ニメ苦味ヲ去リ水煎シ服スベシ効力脫スル
トナシ小兒ニ與ルニハ右ノ如ク苦味ヲ去リ水煎
ノ稀ウスキ粘汁ト爲シ。桂水少許ト沙糖トヲ加ヘ一茶
匙宛數用フベシ○此藥ヲ連服メ味ヲ惡ム者ハ乳
汁ヲ以テ煮テ用ヒ或ハ水煎メ沙糖ヲ加ヘ甘美ト
爲シ或ハ香竈ノ諸藥ヲ加ヘ水煎メ消化シ易カラ

シムベシ○或云。泡瀬ト爲セバ効力醇厚ナラズ濃
煎スレバ甚ダ膠粘ニメ是ヲ服メ細絡纖管ニ滲入
シ難シ或云水ニ浸シ用レバ味淡薄ニメ服シ易シ

福依淑

遠西醫方名物考卷二十七終

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭文酉範提綱

株齋宇田川先生著

全三冊

理學

植學啓原

富川裕庵先生著

全三冊

同 内象銅版圖

同上

全一帖舍密開宗

同上

全三冊

增補和蘭藥鏡

同上

全八冊醫療止始

同上

全五冊

遠西醫方名物考

同上

拿麻泰西名醫彙講

株齋伊東先生著

全六冊

同 補遺

同上

全九冊要術知新

玄齋大槻先生著

全三冊

瘍醫新書

玄澤大槻先生著

金冊西音發微

同上

全二冊

江戸淺草茅町二丁目

書賈

青藜閣

須原屋伊八

