

西遠

醫方名物考補遺

卷三

✕

e 16


499.2

En-6

1



川島文庫
3319



榛齋宇田川先生著

初篇

遠西
醫方

名物考補遺

風雲堂蔵版

青藜閣發兌

藥品ノ分量ハ家藏亞謨斯アムス的爾達謨ルダムノ藥秤ニ據

考定スト雖モ其法フ馮各少差アリ意フニ英製

未夕精巧ヲ盡ス者ニアラズ加之彼邦近來ノ著

書往々新ニ度量ヲ革ルヲ載ス然レハ新舊差異

大凡ハ知ベシ是ヲ以テ再ヒ其度量ヲ算メ從前

一人脱漏ヲ補フニ意アリ奈セニ余算數ニ拙シ子素

リ數學ニ長ス願クハ諸書ヲ考証メ新舊ノ度量

ヲ算定シ余カ志ヲ繼ケト章唯々又臘月上漸

先生溘焉トメ館舍ヲ捐ツ豈料ヤ先生ノ囑竟

ニ遺命トナラシトハ章不才何ノ遺命ノ重キ奉

初篇補遺

卷一

風雲堂蔵

スルニ耐ヤ但薰蒿悽愴復々辭スベキ所無シ乃
 ホルクスメイトキンデ子デルドイツセ・アポテキ
 等ノ書ニ據テ度量ヲ算定シ更ニ其要領ヲ略載
 ス天保六年乙未孟春 備中緒方三平 章謹識
 一千七百九十八年 寬政十年 佛蘭西。伊斯把尼亞。和蘭意
 太里亞。第那瑪爾加。雪微。設兒。トスカ。以上ノ學士
 輩大ニ集會ノ盡夕闔國度量ノ舊制ヲ改革シ新ニ
 歐邏巴諸國。通用新制ノ度量ヲ建シト議リ一千七
 百九十九年 寬政十一年 竟ニ羣賢ノ衆議決著シ其制全
 成ルト云其法地周ノ四千萬分一ヲ會爾ト名ケ尺

度量衡。皆此ヨリ算出ス

會爾

按ニ本邦天學家。地ノ一度ヲ二十八里二
 分ト定ム然レバ地周ハ一萬三千一百五十

六萬九千九百二十尺ニ其四千萬分ノ一ハ三尺
 二寸八分九釐二毛四弗八ナリ然レバ今舶來ノ新
 制尺ト我京都ノ念佛尺ト比較スルニ我三尺二寸
 八分八釐八毛九弗弱ニ當ル念佛尺。精密ノ曲尺

耳埵

十會爾 我三分八釐九毛弱

迷爾

百耳埵 里ト譯ス我九町

把爾半

會爾之十分一 掌ト譯ス我三寸二分

兒母

把爾半之十分一 我三分二釐八

秘多列比

兒母之十分一 我三釐二毛八

○凡ソ容器ニ液料。乾料ノ別アリ秤量ニ雜貨。藥品

ノ別アリ液料ノ容器ハ

罕 把爾牟立方 我五合四

末苗 罕之十分一 我五勺弱

實傑爾弗度 末苗之十分一 我五才弱

發篤 罕之十倍 我五升四合

○乾料ノ容器ハ

骨弗 罕ト同シ

末苗 液料ノ末苗ト同シ

失結兒百爾 發篤ト同シ

冊屈又繆的 失結兒百爾之十倍 我五斗四升八

刺斯篤 三十冊屈 我十六石四斗六升

○雜貨ノ秤量ハ坊間商賈ノ通用スル處ナリ蒸餾

水把爾牟立方ノ重ヲ封度トシ此ニ基テ其他定ム

封度 前日念佛尺ノ寸立方容器數様ヲ造テ蒸餾

五分アリ今之ニ據テ秤ハルニ彼把爾牟立方ノ

蒸餾水ハ我二百六十七錢八分一釐四毛四弗

穩斯 封度之十分一 我二錢六分六釐

羅獨 穩斯之十分一 我二錢六分六釐

瓦蘭馬又微苦苗 藥羅獨之十分一 我二錢六分六釐

古爾列兒 瓦蘭馬之十分一 我二錢六分六釐

一千八百十七年文化十四年和蘭王國中ニ令ノ舊制ノ

藥秤ヲ改革ス其制商賈通用封度ノ八分三即三百

瓦蘭馬ヲ以テ新制藥秤ノ封度トス云今左ニ新舊

藥秤比較ノ表ヲ載ス

新封度 三百七十五瓦蘭馬 我百錢零零零

舊封度 三百六十九瓦蘭馬 我九十八錢四

新穩斯 封度之十二分一。即三十一瓦蘭馬 我

錢三分三釐八毛許

舊穩斯 三十瓦蘭馬七六 我八錢二分

新達刺屈末 十穩斯之八分一。即三瓦蘭馬九零六一 我

錢零四釐
二毛強

舊達刺屈末 三瓦蘭馬八四五 我一錢零二釐六毛許

新須屈爾百兒 達刺屈末之三分一。即一瓦蘭馬三

零 我三分四釐七毛強

舊須屈爾百兒 一瓦蘭馬二八二 我三分四釐二毛許

新傑列尹 須屈爾百兒之二十分一。即瓦蘭馬ノ千

分之六十五 我一釐七毛三弗強

舊傑列尹 瓦蘭馬ノ千分之六十四 我一釐七毛一弗弱

右ハ尺度ニ原テ算定スル所ナリ尺度ニ毛弗ノ差

無キヲ能ハズ是人目ノ得テ視ベカラザル所ナリ

尺度ニ毛弗ノ差アリハ重量亦必ス差無ク能ハズ
故ニ和蘭新制藥秤ノ如キモ他日精巧ノ器ヲ得テ
始テ其密合ヲ言ベシ尚別ニ證說アリ
○按ニ本編採用スル所篤窠涅泊昆福等ノ如キ一
千八百十七年藥秤改革以後ノ鏤板ニ係ル書ハ其
方法ノ分量新制藥秤ニ憑ルベク其余ハ皆舊制ノ
藥秤ナリト知ベシ

醫考補遺 卷一 凡例 五
篤窠涅泊昆福等ノ如キ一
千八百十七年藥秤改革以後ノ鏤板ニ係ル書ハ其
方法ノ分量新制藥秤ニ憑ルベク其余ハ皆舊制ノ
藥秤ナリト知ベシ

遠西醫方名物考補遺標目

卷一 客類 甲子 牛膽

牛膽 牛膽驗黃丸 解疑魏膽丸 健胃殺蟲丸 盧膽驅蟲膏

牛膽 牛膽驗黃丸 解疑魏膽丸 健胃殺蟲丸 盧膽驅蟲膏

實艾答利 實艾驅水散 實艾驅水散 實艾驅水散

實艾答利 實艾驅水散 實艾驅水散 實艾驅水散

實艾答利 實艾驅水散 實艾驅水散 實艾驅水散

實艾答利 實艾驅水散 實艾驅水散 實艾驅水散

薩爾沙根 薩爾沙根 薩爾沙根 薩爾沙根

華尼利 華尼利 華尼利 華尼利

○引用書符號。名物考藥鏡ニ遺漏セル者ヲ左ニ舉ク

依依百乙舍密全書 篤篤隆母斯獨爾弗舍密局方

宓宓篤爾藥性主治書 涅涅垓爾獨乙都局方

泊泊爾拔烏兒藥性論 葛葛華戾私經驗書

蒲蒲爾母羅垓兒經驗書 昆昆斯蒲律偈外科書

別別爾林治療書 呂呂乙詞物產說

施施迄蒲斯治療經驗書

撰撰訂外鏡和蘭名遠西醫方補同上
科撰要藥鏡名名物考補遺

○客歲甲午仲冬 榛齋先生病篤シ 湯藥ニ左

右ニ侍ス病間 章ヲ召テ囑曰名物考凡例載ル所



遠西醫方名物考補遺卷一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

牛膽 ヘルタウリインスピカ
左ハ羅オセガル蘭

牛膽ノ性甚人膽ニ近シ。綠色膠粘ニノ臭氣アリ味

甚苦シ生鮮ノ者ハ腐敗シ易キ故ニ磁鍋ニ入火ニ

上セ水氣ヲ蒸散メ越幾斯劑ノ稠トシ貯フ。然モ大

氣ニ觸レハ濕氣ヲ引テ麝臭ヲ生シ腐敗スル故ニ

固封シ貯ヘシ。○病牛ノ膽ハ臭味不佳ニノ毒アリ

丹服スレハ毒氣侵襲スルヲ宛モ傳染毒ノ如シ故

二無病ノ牛膽ヲ擇ミ用フヘシ

○按ニ藥舖清雅大坂屋四郎兵衛云真ノ牛膽ハ近江彦

根ヨリ出ツ。牛膽ヲ取り速ニ竿ニ掛テ日乾ス。四

季共ニ粘潤。甘味ヲ帶ヒ。藥舖ニ販ク。此品闕ニ遇

ハ藥舖ニ甘琥珀ト呼フ熊膽ヲ用ヘシ是牛膽ヲ

壓扁メ乾ス者ナリ

試効性石。鹼樣ニノ竄透刺戟衝動シ苦味強壯解凝

淨刷ノ効力アリテ鎮痙ノ一良藥トス○諸酸酸味

酸性塩明礬酒石英類硫酸苦土凝水金屬塩綠礬皓礬升汞

塩酸加爾幾重土及單寧蘭名ロイスト植物

リヲ含メル液ヲ牛膽ニ加用レハ膽ノ稟性崩壞ノ効力脱失ス○胃虚粘液過多。酸敗液。風氣痞脹大便閉ヲ治ス○肝脾及門脉ノ壅塞。黃疸依剝昆垤兒諸

蟲症。腸間膜腺閉塞。小兒腹脹四肢羸瘦等腹内諸器

ノ病ヲ治ス○諸藏壅塞中殊ニ肝ノ壅塞ヲ疏解シ

膽液ノ虚乏ヲ資補ノ酸敗液ヲ消シ。飲食烹釀消化

ヲ扶ケ又殺蟲ノ効ヲ稱ス○腹内諸藏壅塞アリテ

大便閉ヲ兼ル症ハ牛膽ヲ解凝下劑ニ加用ヘシ。即

牛膽紫堇丸鏡卷十五條或牛膽鹼黃丸次ノ如シ○肝

壅塞。黃疸。粘液留飲病ハ牛膽鹼黃丸ヲ朝夕半錢ヨ

壅塞。黃疸。粘液留飲病ハ牛膽鹼黃丸ヲ朝夕半錢ヨ

壅塞。黃疸。粘液留飲病ハ牛膽鹼黃丸ヲ朝夕半錢ヨ

リ二月々テ與ヘシ此劑殊ニ黃疸ニ峻効アリ

牛膽鹼黃丸 牛膽 石鹼 勿擲祭亞者 大黃 一錢

右研末シ二氏ヲ一丸トス 人身ノ膽液ハ常ニ腸中

粘稠ヲ稀釋シ其刺戟衝動ノ性ヲ以テ胃腸ノ蠕動

機ヲ獎發シ飲食ヲ消化ス故ニ膽液虧損ニ或其性

力乏弱ナレハ飲食消化セズ酸敗液粘液風氣等鬱

滯シ肝藏漸ク壅塞ノ遷延諸病ヲ生ス然ハ飲食消

劑ニ難ク酸敗液アル症ハ牛膽ヲ健胃 ○胃中酸敗

液刺戟ノ胃痙痛 腹ヲ發シ衆藥効ナク經年不治其

症發動スレハ心胸苦滿心下刺疼痞氣衝逆吞酸懊

悶惡心或酸汁ヲ吐シ大便秘閉スル症ハ牛膽ニ阿

魏大黃ヲ加用テ効多シ即其治驗ヲ左ニ舉ク ○一

學士三十六歲諸症前說ノ如ク時ニ發動ノ酸汁ヲ

吐シ大便秘結シ酒ヲ飲ハ頻發シ百藥驗ナク數年

荏苒タリ先左ノ健胃解凝劑ヲ與フ

解凝健胃飲

亞爾鮮越幾斯劑 酒石液 各三錢

薄荷水 甘消石精 各一錢

右調和シ一匙宛服スル一日三次又每夜麻屈涅失

亞名 ヲ一匙宛用ヒ蔬菜類ヲ減シ肉類ヲ許與ヘ數

日ヲ經テ諸症漸ク寛解ス因テ後方ヲ與フ

解凝魏膽丸

牛膽

阿魏

上好者
細末

大黃

細末
各四錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ朝夕十九宛用テ數週ニ
 ノ心下苦悶刺痛。吞酸盡ク治シ大便順利ス。因テ漸
 蔬菜類ヲ許シ酒少計宛與テ病發動セス。然レ仍此
 丸劑ヲ長服セシメテ全治シ患者精神輕爽面色健
 旺ス。或酸物ヲ食ノ稀ニ其症發動スルトアレレ此
 丸劑ヲ用テ即治ス其病原ヲ推究スルニ膽液ノ分
 利匱乏ノ胃ノ消化力ヲ失ヒ酸敗液ヲ釀生ノ便秘
 スルナリ○一婦人三十餘歲胃瘕ヲ患テ三年時々

胃痛ヲ發シ飲食消化シ難ク萎黃病胃虛ノ諸症ヲ
 發シ大便每常三四日通セス鎮瘕止痛ノ諸藥阿芙蓉
 蓉液名等ヲ與レハ劇痛休ト雖モ復發動シ。制酸解
 凝ノ諸藥亦驗ナシ。因テ前說ノ魏膽丸朝夕十九宛
 與ヘ連服十四日ニメ胃痛盡ク休ミ大便日順利シ
 今既ニ半歲ヲ經テ再發セス萎黃病ノ諸症及色澤
 回復ノ精神健旺セリ○一男子五十歲居常大便閉
 ヲ患ヒ其屎灰白色ナリ此症亦膽液ノ分利匱乏シ
 諸管寧急ノ發スルヲ察シ前方丸劑ヲ用テ三週ニ
 ノ全愈ス○牛膽ハ殺蟲ノ殊効アリ峻下ノ藥ヲ加

テ能蟲ヲ驅泄シ且其萌生ヲ制止ス。即藥刺巴名ヲ
等分ニ加ヘ小兒ハ二匁ヨリ四匁トテ用ヒ大人ハ
量ヲ増ス。或丸藥トシ與フ。後方ノ如シ。

牛膽驅蟲丸

牛膽二錢 藥刺巴細末一錢

右研和ノ三匁ヲ一丸トシ五丸宛用ル日三次或朝
夕十九宛與フ。但諸症ノ輕重ニ隨ヒ増減ス小兒ハ
二味等分一匁ヲ一丸トシ桂末ヲ夜トシ四丸ヨリ
八丸トテ舍利別等ニテ送下ス。右ノ丸劑ニ苦味
健胃ノ藥ヲ加テ尤良。否ラレハ瀉下已甚ク且蟲症

ハ胃腸ノ運營罷弱ノ元力健運充張セサルヨリ生
スル故ニ特ニ胃腸ヲ健運シ一ハ丹藏ノ壅塞ヲ疏
通シ酸敗液ヲ驅除スヘシ喻ハ後方ノ如シ。

健胃殺蟲丸

健質亞那名

乾白撒兒末爾扶斯名

括失亞越幾斯劑補

藥刺巴各細末一錢

牛膽一錢半

薄荷油十二滴

右研和ノ三匁ヲ一丸トシ喇蛄石末ヲ夜トシ四丸
若ハ其餘用ル日四次。或經久遷延ノ神經病。癩
症等ニ牛膽ヲ用テ良効ヲ稱ス然レハ虻蟲若ハ丹藏

壅塞ヨリ發スル症ニ非レハ効ナシ

服量生牛膽ハ日一錢ヨリ四錢マテ香竄ノ露水或

葡萄酒ニ加ヘ服ス乾牛膽ハ丸藥トシ或他藥ニ加

日一二錢用フ吉利詞參兒ハ半錢許ヲ藥液一弓ニ

溶シ施ス軟膏擦藥ハ二錢ヨリ四錢マテ家猪脂四

弓若ハ六弓ニ和シ擦ス○苦味竄透ノ藥ヲ腹部ニ

擦ハ殺蟲ノ効アルヲ猶峻下ノ藥ヲ腹ニ擦レハ直

ニ腠理ノ喻收管ヨリ腸中ニ吸入メ劇ク瀉下スル

カ如シ故ニ左ノ劑ヲ腹部ニ擦テ驅蟲ノ殊効アリ

格磔驅蟲膏

牛膽

二弓

格磔董篤

細末

盧會

細末

各一弓半

家猪脂

一比

亞爾鮮油

製法

同列

二錢

右研合ノ軟膏トス是ヲ腹部ニ擦レハ瀉下スル故

ニ大人大便閉ノ症ニ適應ス但小兒感動シ易ク瀉

下ノ害アル者ハ左ノ膏ヲ擦スヘシ

盧膽驅蟲膏

盧會

上好者

極細末

牛膽

精製者

二比

石腦油

各三弓

家猪脂

精製者

二比

右先文火ヲ以テ家猪脂ヲ烱シ盧會牛膽ヲ加手ヲ

休メス攪和シ火ヲ下シ放冷メ石腦油ヲ和ス○或
 牛膽ヲ水ニ溶シ臍部ニ塗モ亦大便ヲ通シ小兒虻
 蟲ヲ殺シ下ス或此液ニ多許ヲ吉利詞參兒トシ施
 スモ良○牛膽ヲ外敷ノ腺ノ硬腫ヲ疏散ス○牛膽
 ニ蜜ヲ和シ角膜斑點ニ擦メ消散ス○牛膽ニ乳汁
 ヲ研和シ綿絮ニ蘸シ耳孔ニ挿テ耳鳴ヲ治ス○鰻
 鱺膽性効牛膽ノ如シ按ニ鰻及鯉ノ膽亦牛膽ノ効アリ
 膽液稟性試說分析術ニテ牛膽ヲ剖解スレハ水液
 苦蜜味甘苦是ヲ以テ黄色ノ華爾斯是ヲ以テ膽液
 塩酸、燐酸、硫酸、炭酸ヲ含ル曹達塩酸ハ後ニ出テ硫酸
 炭酸ハ後ニ出テ硫酸

ハ綠礬油曹達ハ礬蓬塩燐酸加爾幾少許酸化鍍共ニ出テアリ此諸
 物混和抱合ノ膽液ノ石鹼質ヲ結成ス殊ニ曹達ハ
 華爾斯ト水ヲ合和セシメテ石鹼質ヲ成ス故ニ能
 水ニ溶化ス。膽液ヲ諸酸酸性ニ加レハ稍滾動ス。是
 膽液ニ炭酸曹達ヲ含ムニ因ル依○或云。人類。獸類
 ノ膽液ヲ試ニ全ク石鹼ト同様ニメ亞兒加利性ノ
 一液ナリ。即動物ノ油ト山物亞兒加利塩礬蓬ヲ基
 資トシ海塩。乳糖性塩。及少許ノ鍍ヲ含ル加爾幾石
 動物ノ傑列乙膠粘液ナリ○膽液六比少許ヲ混和
 ノ成ル○膽液ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ

煮テ放冷スレハ亞兒加利塩ヲ結フ。其性尋常石鹼
 ニ含ル鹹蓬塩晶名ト同シ○石鹼ハ鹼蓬塩晶ト生
 石灰ト油ヲ以テ製ス製法名出白石鹼ハ初メ水ヲ以テ
 鹹蓬塩晶ト生石灰ヲ合ノ煎スル故ニ石灰ヲ以テ
 鹹蓬塩ニ含ル炭酸後ヲ吸收シ去リ鹹蓬塩ノ亞兒
 加利性極テ悍烈トナル。是ヲ濾石ノ渣ヲ去リ更ニ
 火ニ上セ。水氣ヲ蒸散シ油ヲ加レハ速ニ亞兒加利
 塩ト抱合ノ凝結シ石鹼トナル故ニ亞兒加利性夕
 ルト知ヘシ○綿布ニ染汚セル油膩脂膏類ヲ膽液
 ニテ洗ハ速ニ淨潔トナリ尋常石鹼ト雖モカヨル澡雪シ

難キ污垢モ能除ク。是石鹼質ノ明證ナリ○凡酸物
 ハ膽液ノ亞兒加利塩性ヲ尅制ス。體中酸敗液アレ
 ハ是ヲ以テ膽液ノ油質ヲ分離シ亞兒加利性虧損
 ノ凝固スルト宛モ石鹼ニ酸味ノ液ヲ加レハ其油
 質分離ノ凝固スルカ如シ故ニ胃腸ニ酸敗液アリ
 テ膽液ノ性力虧乏シ發スル諸症ハ牛膽ヲ用テ其
 膽液ヲ資補スレハ酸敗液自ラ消化ノ治ス○或云
 膽液ハ酸性多キ故ニ尋常石鹼性ト異ナリト。然レ
 數膽液ヲ試ルニ曾テ酸性ノ微ナシ。即左ノ試説ハ
 如シ○牛ヲ屠テ尚温ナル膽液ニ多ヲ取テ牛乳十

弓ニ加ヘ能振蕩ノ良久静定スレハ乳汁微モ粒塊ヲ生セスラ分泌ノ粒々凝塊ヲ爲ス尚是ヲ火ニ上煮沸一時半許ニメ放冷スレハ凝塊ナシ唯膽液ノ脂油斯華爾ニテ酥ノ如キ者ヲ生スルハ牛乳ニ蒸餾醋一二滴加レハ忽チ凝聚ノ粒塊ヲ生ス。是ニ牛膽液ヲ加火ニ上煮沸スレハ粒塊忽チ消散ス。是膽液ノ亞兒加利性ニテ酸性ヲ制服スル顯微ナリ或右ノ醋ヲ加タル牛乳ヲ火ニ上前説ノ膽液燒灰汁ヲ加レハ其粒塊消散ス。是尋常鹹蓬塩汁酒石塩汁名酒液等ヲ加ト同シ或新ニ取タル牛膽液

ニ三四倍ノ水ヲ和シ是ニ青紙藥舖アイ紙一名ハ餹水ニ浸シ稀キ青汁ト爲シ白ヲ浸セハ綠色トナ紙ヲ添メ用フ是ヲ青紙ト爲シ白ヲ浸セハ綠色トナル是膽液酸性ナキ徵ナリ。若微モ酸性アレハ青紙必ス赤色トナル即右ノ膽液ハ弓中僅ニ綠礬油一滴ヲ加是ニ青紙ヲ浸セハ忽チ赤色トナルヲ以テ知ヘシ然ハ膽液ハ毫モ酸性ナク亞兒加利性タル明白ナリ然レ右ノ乳汁酸敗スルカ若ハ膽液腐敗セル者ヲ合スレハ粒塊ヲ生シ酸性ノ徵ヲ見ハスナリ即陳久變敗ノ石鹼ハ油質酸敗セル故ニ是ヲ乳汁ニ加レハ凝塊ニ新製ノ石鹼ヲ加レハ些モ凝

塊セサルカ如シ
 ◎膽液ハ腐敗シ易シ夏月秋初ハ
 殊ニ泡醸變敗ノ酷厲トナルヲ猶陳腐ノ石鹼ノ如
 シ◎無病健康ノ人ハ膽液黃色亞兒加利性ニシテ石
 鹼様苦味甚ク膠粘ニシテ水ニ溶化シ易ク牛乳ニ加
 テ酸性ノ微ナシ膽液綠色ナルハ膽液變敗ノ酷厲
 トナリ且酸敗液アル候トス

實^チ芟^タ答^リ利^スス
「チギタリス」
 「ロドヒンダル」
 「ドコロイド」

形狀此草高二三尺莖太拇指ノ如ク稜様中虛數枝
 ヲ分子微赤色粗糙毛茸アリ葉濶大橢圓黯綠柔ニ

ノ皺糙毛茸及刻缺アリ香臭ナシ
 味或云氣味辛辣微苦
 葉ノ絞汁ヲ服スレハ口舌咽喉胃焮腫ス夏月鐘樣

五出ノ唇花ヲ開キ或云花筒様辦端缺又アリテ圓

如四雄蕊ニハ一雌蕊アリ雄蕊ハ網第一目○皮箍ノ

ハ心蕊ナリ鬚蕊頭ヲ絲頭ト曰フ雄雌ノ頭ノ花粉ヲ心

蕊頭ニ受容ノ子實ヲ生ス故ニ雄雌ノ名アリ○西

洋ノ物産家林娜斯雄蕊ノ多少雌蕊ノ有無多少種

子ノ形狀等ヲ分チ其綱ニ屬シ又雌蕊ノ有無多少種

網目ニ據テ一切草木ノ種類ヲ分ツ但單辦ノ花ヲ此
 採テ是ヲ徵ス單辦ノ花ハ重辦ヲ徵ス凡西洋ノ
 草木ヲ以テ和産ノ草木ニ充ルハ先ツ是ニ因テ
 種類ヲ分ツニ非レハ確當ノ攷證ヲ得ヘカラス故
 註^ス此編草木花形ノ說アル者ハ每條其綱目ノ數ヲ
 花紫色裏面白點アリ莖梢ノ偏面ニ攢生ノ長穗

ヲ爲シ萼五瓣。萼葉及短梗アリ。花後被子ヲ結フ。木草
ノ子ニ被子裸子アリ被子ハ其子被室ニ在ルヲ云
喻ハハ胡麻牽牛等ノ子ノ如シ裸子ハ子室ナク直
ニ萼中ニアルヲ云。喻ハ紫蘇荊芥等ノ子ノ如
ニ第十四綱第二目ニ屬スル者皆被子ナリ
 卵圓
 ニノ細毛アリ熟スレハ破綻分裂ノ二室トナリ幾
 多ノ細子ヲ收ル根鬚多ク味苦シ二年ニノ枯ル。歐
 羅巴洲諸國ノ山地林中ニ生ス。

麻痺毒眼眩此草酷厲ノ麻痺毒アリテ神經ヲ刺戟
 ス故ニ過服スレハ惡心嘔吐或劇ク吐下シ或口舌
 咽喉胃腸焮腫ノ涎沫ヲ吐キ頭痛眩暈眼昏瞳子散
 大眼花閃發視物綠色ヲ現シ小便過多粘冷汗漏泄

呃逆肢體顫振厥冷搐搦ヲ發ス○麻痺毒ヲ以テ心
 藏動脈ノ運動ヲ弛弱シ。脈動遲緩澁滯ス故ニ服量
 適宜ニ與レ氏一日或兩三日ヲ經テ脈遲緩トナリ
 休藥後モ尚數日遲脈退カサル者アリ

試効花前ニ葉ヲ採リ藥用トス或花及莖味辛苦侵

蝕ス。此藥麻痺ト利尿ノ兩効ヲ兼又故ニ醫家はヲ
 麻藥ニ屬シ或利尿藥ニ屬ス○醫家多ク利尿ノ効
 ヲ稱シ水腫ニ用フ或云水腫ニ用ヒテ每常驅水ノ峻
 効アリ或云利尿ノ効アレ氏害アルト少カラス故
 ニ他ノ通藥ニ優リテ殊効ヲ推稱シ難シト但是ヲ

幾多ノ水腫ニ質驗スルニ患者ノ體稟各異ナルニ
 隨ヒ當否功害一樣ナラス。大抵患者體質虛弱ニノ
 驂澹色。脉弱。或間歇之肌膚冷テ弛弱。瘧然トノ浮腫
 スル症ニ効アリ。○水腫ノ腹内諸藏壅塞ヲ兼ル症
 或衰弱ヨリ發スル遷延ノ水腫。經閉ヨリ發スル水
 腫殊ニ胸水ニ効アリ。是利尿ノ効ノミナラス多ク
 右ノ諸病ニ兼ル痙攣ノ運動ヲ降鎮スレハナリ。○
 此藥ノ酷厲毒ヲ以テ諸腺ノ壅塞ヲ疏通シ尿道ノ
 諸器ヲ開達シ又劇ク大便ヲ瀉下ス故ニ水腫ニ用
 テ利尿ノ一峻藥トス。但患者焮衝性ナラス脉亦強

實ナラサル水腫ニ効アリ多ク左ノ方ヲ用フ

實芟驅水散

實芟チギク答利タリ斯ス 細末 沙糖 一弓半

右研和ノ散劑トシ分テ二十服トシ朝夕一服宛用
 患者資稟薄弱感動甚キ症ハ右服量ノ半ヲ用ヒ。壯
 實ニノ感觸鈍ナル者ハ漸ク服量ヲ増スヘシ。是ヲ
 服ノ嘔氣若ハ下利甚キ者ハ阿芙蓉少許ヲ加テ藥
 氣ヲ抑制スヘシ。○一少年。間歇熱ヲ患ヒ淹滯ノ終
 ニ腹水トナリ患者虛憊ノ瀉水術腹部ニ針ノ水ヲ
 施スノ能ハス。因テ右ノ實芟驅水散ヲ與レハ小便

速ニ快利ノ治ス或云此藥ヲ服メ腫脹ノ部ニ規吉
撒爾弗（名）ヲ擦レハ利水ノ効更ニ快捷ナリ○小便
ヲ利シ水腫ヲ治スルニ左ノ數方皆捷効アリ

芟黃驅水散

實芟（名）答利（名）斯（名）末（名）一（名）分（名） 金硫黃（名）半（名）分（名）

甘汞（名）四分（名） 沙糖（名）一分（名）

右研和メ散劑一服トシ朝夕一服宛與メ一服宛用

芟姜驅水散

實芟（名）答利（名）斯（名）末（名）一（名）分（名） 乾姜（名）末（名）八（名）分（名）

沙糖（名）一分（名）

右研和メ一服トシ日ニ三服宛服ス

芟桂驅水飲

實芟（名）答利（名）斯（名）末（名）一（名）錢（名） 桂丁（名）幾（名）劑（名）

右先ツ實芟答利斯ニ沸湯半比メ加浸ス

去桂丁幾劑メ和シ一匙宛用一日兩次○近來海

葱ヲ加用テ屢奇効ヲ得タリ即後方ノ如シ

芟葱利水散

酒石英（名）末（名）三（名）錢（名） 海葱（名）末（名）十二（名）分（名）

實芟（名）答利（名）斯（名）末（名）六（名）分（名）

右調和メ散劑トシ分テ六服トシ一服宛用一日三

次飲液ニテ送下ス海葱ノ驅水劑中。此劑尤著實ニ
ノ危懼ナシ是ヲ服ノ惡心嘔吐ヲ發スル者ハ半劑
或四分一ヲ與フヘシ

實芝驅水煎

實芝答利斯 一錢 水煎 一匙半

右煮減シ濾過ノ其液三分一トナルニ至リ燒酒再
者四錢ヲ攪和シ貯ヘ。用ルニ臨テ此劑一弓。薄荷水。

洋芹水鏡 各二弓 過爾托亞舍利別名 二錢ヲ和勻シ

一時每ニ一匙宛服ス

實芝利水飲

一日二三服宛服ス

實芝答利斯

一錢 沸湯 八弓

右調和シ煖處ニ置テ浸ス一八分時。濾テ燒酒再
一弓ヲ攪和シ朝夕ニ匙宛服ス

實芝消杜飲

甘消石精名 二錢 杜松實油名 半錢

實芝答利斯名 一錢

右調和シ三十滴宛服スル一日四次○赤癩瘡羅

種麻疹ニ似テ大ノ後。發スル水腫及頭水。腦水ハ此

藥ニ甘汞及清涼藥ヲ加用テ殊効アリ○頑固ノ黃

疸ハ左ノ方ヲ用テ惡心或嘔吐ヲ發シ或下利ノ諸

症解散之治スル者多シ

芟翁解凝飲

實芟答利斯葉絞汁

白頭翁水

莖葉ヲ蒸餾ス製法
薄荷水ト同シ

舍利別

少許

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス○胸水腹水ニ此葉末二錢ヲ取り水百六十錢ニ浸ノ藥氣ヲ出シ一時毎ニ一匙ヲ服シ吐瀉スルニ至レハ小便快利ノ治ス腹水ハ腫脹減スルニ隨ヒ腹部ニ繃帶ヲ施シ水ノ停ルヲ防クヘシ

○此藥ノ麻痺ノ効カハ尿管質ノ抗張力ヲ減損ノ脈動ヲ遲緩シ熱及譫語ヲ減ス故ニ替留熱間歇熱ノ肌膚甚タ熱シ乾燥脈疾數譫語舌燥渴小便稀少或失血ニ傾ク症ヲ治ス然レ數脈減スル片ハ服量ヲ減シ脈六七十動トナル片ハ此藥ヲ休ムヘシ○
焮衝病ノ焮衝中ハ此藥必ス害アリ多ク防焮衝法刺絡清涼ヲ施メ諸症減スレレ血液ノ焮衝荏苒ト劑下劑等ヲ遺留シ尿管質ヲ刺戟メ他症ヲ萌發スル危疑アル者ハ此藥劑中ニ水銀劑ヲ加用テ尤効アリ○或云壯熱焮衝病其他劇病ニハ的當セス且瞑眩スレ

ハ其害速ニ除カス數日復シ難シ○凡、虛罷衰弱ノ諸病殊ニ神經感觸甚ク諸筋ノ觸動機劇キ諸症又見シ或初血液運行過盛ニシテ脈駛數ナル者漸ク減メ虚衰シ緩和降鎮ノ諸劑ヲ與シ氏治セザル症ハ此藥ヲ與テ間偉効ヲ得ルナリ○此藥ハ心藏ノ觸動機ヲ減除メ動脈ノ搏動ヲ遲緩ス故ニ心藏或大幹動脈ノ貌、屈ニ撰百息肉塊腫等ヲ生メ烈キ心動悸ヲ發スル症ハ是ヲ用テ動悸ヲ鎮定スル一良藥トス○神經感觸甚キヨリ發スル欬血吐血等諸失血ヲ治ス○虚症ノ失血、急ノ衝動ヲ脈管痙攣樣

兼ハ脫血殊ニ婦人崩漏及墮胎ヲ恐ル症ヲ治ス○肺藏結腫及吐血ヨリ發スル勞欬ヲ鎮靜ス○肺勞ハ患者天質感觸甚ク或吐血或先天毒ヲ兼子屢冒寒ニ罹リ胸痛スル症ヲ治ス然レ既ニ虚憊シ多ク敗膿ヲ咯キ消耗ノ漏汗下利ヲ發スル症ハ害アリ○經久欬嗽癩癩頑固ノ神經病精神錯誤或黑障眼、瘰癧腫內藏膿瘍頑癬侵蝕瘡等ニ効ヲ稱ス○總テ腺病ニ殊効アリ能ク水液及涕ヲ分利シ腺ノ塊腫瘰癧腫腸間膜腺腫ヲ消散ス○肺氣管咽喉等ノ腺腫腺病鼠蹊腫等喘急或小兒腹膨脹硬滿ハ惡液多キ症ニ

効多シ○瘰癧毒ノ諸症ニ是ヲ内服外敷ノ殊効アリ。一少年瘰癧腫ヲ發シ數處膿潰シ愈サズ既ニ十年。又其毒右脚ニ蔓延メ腐爛劇痛シ衆醫是ヲ不治ニ屬ス終ニ此草ノ絞汁一匙ヲ大麥煎十多ニ和メ温服シ其絞滓ヲ取テ毎日脚ノ患處ニ換貼ス是ニ因テ患者劇ク吐瀉シ又涎沫ヲ吐キ口中糜爛ス然レ一兩日ヲ經テ其疼止ミ膿減シ諸症輕差ス。十四日ヲ經テ又其絞汁ヲ内服メ吐瀉ス。是ヨリ諸症漸ク退キ不日ニ全治セリ。其他頑固ノ瘰癧腫二人皆此藥ヲ用テ治ス。或云。一少年遺毒ニ因テ險重ノ

瘰癧ヲ發シ此藥ノ煎劑ヲ長服メ表被剝脱シ全治セリ○近來頑硬腫ニ此草ノ絞汁ヲ用テ殊効ヲ稱ス。但乳癌ニハ効ナシ一婦人兩乳房ニ硬腫ヲ生シ乳癌トナルヲ恐テ是ヲ截リ除ントス然レ先試ニ此草ノ絞汁一匙ヲ與レハ大ニ吐ス是ヨリ十二時中數夥ク赭色ノ膠粘液ヲ吐シ隨テ乳房硬腫一ハ盡ク消散シ一ハ縮收メ移動ス。是其病毒上腹ノ諸器ニ壅鬱メ發セルヲ灼然タリ○一婦人乳房及頸ニ幾多ノ頑硬腫ヲ生シ又耳下腺腫起硬結スルヲ既ニ二年。失鳩答。莨若石灰水石鹼水銀劑等ヲ用レ

氏寸効ナシ終ニ實^チ芟^ギ答^ク利^リ斯^スノ花葉根ノ絞汁一匙
 ヲ水十六弓ニ攪和ノ稀シ早朝頻々ニ服ス。是ニ由
 テ夥ク粘液ヲ吐シ眩運及^レ痙攣ノ諸症ヲ發シ次テ
 劇ク下利シ翌日下テ止マヌ。糊ノ如ク灰色ニノ宛
 モ黃疸ニ瀉スル如キ汚物ヲ夥ク通利ス。因テ毎日
 其絞汁ノ服量四分一宛^ツ與ヘ。是ヨリ十二時中瀉下
 十次吐一次アリ。是ヲ連服スルト十八日ニノ大便
 平常ノ如ク。硬腫盡ク消散シ全治セリ。右兩件ノ經
 驗說ヲ熟察スルニ此藥癌性ノ硬腫ヲ消散スル
 信據シ難シ。其初症ハ真ノ頑硬腫^{性癌}タルト分明ナ

ラス。後症ハ瘰癧腺腫ニ近シ然ハ是レ癌腫ヲ治ス
 ルニ非ス。經久硬結ノ瘰癧腺腫ニ効アルナリ故ニ
 諸藥効ナキ經久頑固ノ腺腫ハ是ヲ試用ノ性功ヲ
 推廣スヘシ。殊ニ峻吐下ノ効アル故ニ解凝疏散ノ
 偉効アリ然^レハ劫擊ノ毒性アル故ニ每^ツ常^ニ戒慎ノ妥
 投セス。患者資稟ノ強弱。年齢ノ壯衰ヲ料^カリテ服量
 ヲ増減シ瞑眩ニ因テ自然良能ノ機力ヲ損壞セサ
 ルヲ肝要トス。○或云此藥ハ多量ニ與テ吐瀉スレ
 ハ捷効アリト。然^レハ是ニ由テ胃腸及^レ神經ヲ虚損メ
 復シ難キ者アリ故ニ少許宛^ツ與テ漸其量ヲ加ヘシ

服量葉ヲ取り散劑。泡劑。浸劑。煎劑。丁幾劑トシ用フ
○散劑。丸藥ハ患者ノ強弱ニ隨ヒ八分氏ヨリ三分
マテ一服トス或云初メ四分氏宛日兩三次與ヘ漸
加テ日四氏與ヘ連用ノ功ヲ見スニ至ル但功驗ノ
多少ニ隨テ増減シ。瞑眩スルキハ暫ク休メ其症退
テ復用ヘシ○煎劑泡劑ハ一乃ヨリ一錢マテ水六
多ヨリ十多ヲ以テ製ス○連服スルニハ香竈揮發
ノ藥ヲ加テ瞑眩ヲ防クヘシ○浸劑ハ二十氏ヨリ
一錢或一錢半ヲ取り水四多ニ浸メ藥氣ヲ出シ薄
荷水或桂水一多若ハ二多ヲ加ヘ用フ是ニ由テ吐

瀉等ノ瞑眩ナシ或症ニ隨ヒ甘消石精阿芙蓉甘朮
等ヲ擇ミ加ヘシ○或此葉一錢ヲ沸湯十六多ニ浸
ス一ニ時許ニノ滓ヲ去リ一匙宛日二三次服ス○
丁幾劑ハ十滴ヨリ二十滴ニ至ル但單方復方アリ

實芟答利斯丁幾劑

單方 實芟答利斯葉 細判者 燒酒 十五度者

右硝子壘ニ丹レ煖處ニ置テ浸ス一ニ日。搾リ濾テ
滓ヲ去リ固封シ聽用ス

複方 實芟答利斯葉 細判者 燒酒 十五度者

桂水 各三多

右硝子壘ニ内レ煖處ニ置テ浸ス一四日。搾リ濾テ
滓ヲ去リ固封シ聽用ス

外敷腺腫。瘰癧腫。潰瘍。腐爛ノ浸淫瘡。頑癬等ハ此草

生葉ヲ搗テ貼シ或煮テ琶布トシ或乾葉ノ末ニ脂

類ヲ和ノ軟膏トシ或花葉共ニ家猪脂ニ加煮テ軟

膏トシ患部ニ摩擦ノ峻効アル一多ク先哲ノ試説

ニ載ル如シ 華叔叔酒 俄福僕國

薩爾沙根

サミラクス。サルサパリル。サパリル。シラ

○榕按ニ薩爾沙根。和産未タ詳ナラス先輩是ヲ

三 金剛刺或粘魚鬚ニ充レ氏確當セス薩爾沙根。羅
主甸スミラクス。サルサパリルト名ク。スミラク
料スハ此類ノ統名ナリ。サルサパリルハ其一種
ナリ。此類十三種アリ其中充當スル者四種アリ
三 卽チスミラクス。シナハ土茯苓スミラクス。プセ
兼ウド。シナハ牛尾菜スミラクス。シホデハ細葉牛
尾菜スミラクス。ヒルロサハ和名ヒメカガラ。山梨
一 兒ノナリ往歲門人芬木牛尾菜根ヲ採リ薩爾沙
根ニ髣髴タルヲ以テ予ニ當否ヲ質ス。予應テ曰
牛尾菜ト薩爾沙ト固ヨリ同屬異種ナレモ今此

根ノ形質氣味ヲ熟察スレハ薩爾沙根ト殆ト差
異ナシ是ヲ以テ薩爾沙根言代用スル片ハ効驗
必ス相伯仲ノ薩爾沙ノ下ニ在サルヘシト云

形状 蔓生ノ灌木。數莖叢生シ綠色硬靱。小柔刺アリ。
葉互生。橢圓ニノ未微尖リ長三四寸或六七寸。黯綠。
三縱道アリ葉梗ノ本ニ兩卷鬚アリテ傍木ニ絡セ。
小莖ニ小白花攢簇シ瓣大シ。萼六瓣アリ。此木雌雄。
株ヲ異ニス。雄木ハ雄花ノミ生シ雌木ハ雌花ノミ
生ス雄花ハ雄蕊アリテ雌蕊ハ是ニ反ス雄花ハ六雄蕊雌花ハ
三雌蕊アリ第二十二目雌木ハ軟實ヲ結フ。大櫻子ノ

如ノ繖ヲ爲ス初綠後紅終ニ黑色トナル。裏ニ核アリ
或云裏三室アリ根頭。拇指大ニノ塊節勁硬。是
ヨリ柔靱ノ細根叢生錯綜ノ土中ニ蔓延シ長一二
尺許。太キ者ハ鶯管ノ如ク細鬚縱橫交錯シ外面皺
糙褐色。裏白色。其質粉樣ニノ指間ニ摩スレハ碎テ
落葉松耳ノ如シ較著ノ香臭ナク味淡微甘。嚼テ粘
滑ナリ上品ハ太鶯管ノ如ク纖鬚少ク淨潔ニノ黑
色ヲ帶ヒス裏實ノ白色。破碎シ易ク輕虚空疏ナラ
ス李嘉露伯西兒墨是可非爾入尼亞共洲ノ國名等ニ
産ス

試効頭根ノ塊節ヲ去リ長條細根ヲ取用フ○發汗清血ノ一良藥トス能ク粘液ヲ稀釋分利ス水煎若ハ浸劑トシ用テ黴毒經久痼滯ノ諸症ヲ治ス黴毒未タ久ク經サル症ハ水銀劑ヲ用テ治スレ氏經久頑固ノ症ハ峻効アル發汗排毒ノ煎劑ヲ長服スルニ非レハ治シ難シ動スレハ効力劣弱ナル緩性ノ煎劑ヲ久服ノ無益ノ治療ヲ施スヲアリ○黴毒水銀劑ヲ投メ治セス或是ヲ誤用スル症ハ此根ヲ用テ効アリ大抵山牛蒡根朴窟福烏篤薩撒弗刺斯瑞香蜀羊泉等ヲ加ヘ一二ヲ取テ水一斗ニ投シ煎

服ス○水銀劑ヲ用ヒ難キ症喩ハ水銀劑ヲ久服ノ虛憊甚キ者或夜分頭痛若ハ骨痛劇キ症ハ此藥ヲ用テ殊効アリ○此藥ハ水銀劑ノ胃腸ニ侵襲スル害ヲ防キ能ク水銀ノ効力ヲ皮表ニ布達ス○尋常ノ黴毒諸症ハ此藥ニ水銀劑ヲ兼用メ治ス殊ニ近來醫家升汞ヲ兼用メ多ク治驗ヲ稱ス○土茯苓薩撒弗刺斯ノ如キモ薩爾沙根ニ比スレハ峻効ナシ此根及朴窟福烏篤ハ能ク黴毒ヲ根治ス或云此兩品中一品アレハ殆ト治功ヲ濟スニ足ル故ニ二品合劑トシ用フ喩ハ後方ノ如シ

薩朴排毒煎

中一薩爾沙根二錢 朴窟福烏篤一錢

右判ニ水四十多ヲ加テ慢火上ニ置キ藥氣ヲ出ス

十二時ニノ二十多ヲ取り服用ス〇微毒經久ニ

ノ頑固潛結スル症ハ左ノ飲劑尤驗アリ

薩爾沙根二錢 朴窟福烏篤一錢

薩爾沙根

薩爾沙根二錢 朴窟福烏篤一錢

右二味沸湯ニ浸ス〇十二時ニノ後藥ヲ加ヘ煮テ

半ヲ減シ服用ス

亞刺比亞四錢 薩撒弗刺斯二錢

又右煎劑ノ滓ニ水適宜ヲ加ヘ煮テ日常ノ飲料

ス毎日午前ハ右ノ煎劑百六十錢ヲ服シ午後ハ再

煎ヲ飲料トシ適意ニ服ス壯實多血ノ患者ハ刺絡

下劑及浴湯ヲ施スヘシ但體稟薄弱瘦削若ハ纖維

弛緩スル者ハ刺絡下劑等適應セス飲食ハ緩和ス

ル者消化シ易キ者粉麩類ヲ與ヘ保護溫暖ニノ能

ク蒸氣ヲ發スヘシ朴窟福烏篤ノ辛味ヲ嫌フ者ハ

亞刺比亞二錢 薩爾沙根一錢

亞刺比亞二錢 薩爾沙根一錢

亞刺比亞二錢 薩爾沙根一錢

亞刺比亞二錢 薩爾沙根一錢

亞刺比亞二錢 薩爾沙根一錢

適意ニ加テ發汗舍利別トシ與ヘ。殊ニ著實ノ効ヲ
 取ント欲セハ升汞溶劑等ノ水銀劑ヲ兼用スヘシ。
 微毒輕重アレ氏右ノ煎劑大抵三月許モ連服セサ
 レハ特效ナシ。尚且居恒温煖ニ保護メ蒸氣ヲ驅散
 スルヲ肝要トス若冷氣ニ觸テ蒸氣ヲ抑遏スレハ
 多服スレ氏驗ナシ○遷延頑固ノ痛風傷冷毒痛ニ
 是ヲ煎服メ汗ヲ發シ血中ノ毒液ヲ排泄シ治ス。殊
 ニ水銀劑ヲ多服メ功ナキ症ニ良○水銀劑ヲ長服
 メ發スル疼痛或硬結腫。瘰癧腺腫ノ諸症。子宮ノ硬
 腫。腐蝕ノ潰瘍。頑癬類。惡厲ノ膿瘍等經久ノ皮病ニ

効アリ左ノ煎劑モ亦排毒清血ノ殊効アリテ治驗
 多シ

薩朴瑞香煎

薩爾沙根 剉搗者 常春 朴窟福烏篤 鮑屑

甘草 各一弓 水 十斤

右水ニ浸ス一三時煮テ半ヲ減シ後藥ヲ加フ

薩撒弗刺斯 一弓 瑞香皮 三錢

右ニ味ヲ加テ火ヲ下シ蓋閉メ冷定シ濾過メ滓ヲ
 去リ四五弓宛服スル一日三四次

服量 散劑ハ一月ヨリ一錢マテ日三四次服ス○煎

劑ハ一多ヨリ一多半マテ水十多或十二多ニ加ヘ煎服ス

薩爾沙根越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑

依叔華密 依叔華密 依叔華密

華尼利 ハニリ 「エ」ピデシンドロムハニルラニルハニリイ又

形狀一種ノ蔓草ニノ常春藤ノ如シ蔓莖徑三四分

許硬韌破折シ難ク綠色粘汁アリ每節數枝分テ蔓

延シ節ニ卷鬚生ノ傍木ニ絡ヒ木皮ニ著テ津液ヲ

吸収シ滋蔓ス葉橢圓末尖リ老利兒葉 ラウリイ ハニル 葉ノ如キヲ

云ノ如ク厚ク柔韌滑澤美綠色ニ葉節ヲ抱テ生ス

花五辨枝梢ニ生ス外面帶綠裏面清白中心白色ノ

一辨尾ノ如ク勾リ垂ル是蜜槽ナリ 蜜槽 蜜ノ條

花中ノ一辨垂テ蜜槽ヲ爲ス者多シ萼ナク苞アリニ

雄蕊ノ下端一雌蕊ニ著テ生ス 第一目 花謝ノ莢

ヲ結フ是ヲ藥用トス太小指ノ如シ差勾屈ノ本末

狹ク扁ニ長四五寸許潤半拇指橫徑 或云一分 柔

脆肉樣微粘著シ縱理アリ熟スレハ赭赤或黧赭光

澤アリ裏沙粒ノ如キ幾多ノ細子充テ黑色光澤佳

香亭露拔爾撒謨ノ如シ味香竄樣ニ微酸ヲ帶ヒ

脂氣アリ秋冬莢ヲ取り乾ス月若ハ二十日許
 時々掌間ニ摩メ徐々ニ壓扁ハ半乾ク氏椰子油ヲ
 擦リ再乾シ貯フ否サレハ濕氣ヲ含テ腐敗シ易シ
 此莢五十個ヲ以テ一裹トシ販ク熟スル頃採摘セ
 サレハ自ラ拆裂シ黑色佳香ノ拔爾撒謨様液流滴
 ス是ヲ鉢ニ承テ取貯レハ漸ク凝結ス是ヲ拔爾撒
 謨トシ用フ○上品ハ新鮮ニノ佳香竄透シ太ク長
 クノ重ク肥實ノ皺紋少ナク黑色ナラス油氣粘著
 セス微柔ニノ甚夕乾枯セス莢ヲ破レハ拔爾撒謨
 ノ如キ液アリ是ニ細仁充ツ○此莢乾淨ノ處ニ貯

ヘシ濕氣ニ觸レハ微生ノ損敗シ佳香脱ス但外面
 鹹味ノ粉生スルトアリ是微ニ非ス莢ニ含メ味揮
 發塩鬱蒸ノ溢泄スルナリ夏月殊ニ多シ○牙埋加
 加麗涅等南亞墨利加洲ノ諸國及印度地方ノ樹陰
 水邊濕地ニ生ス

○榕按ニエピデンドムハ此草類ノ統名ニシテ
 種屬三十餘種アリ華尼利ハ其第一種ナリ和産
 未夕詳ナラス此種屬中和産アル者ハ石斛麥斛
 蘭花釵子股白及等ナリ然氏皆華尼利ニ代用シ
 難シ但是ヲ以テ其花形等ヲ類推メ知ルヘシ

試効 英ヲ藥用トス。香竄揮發。拔爾撒謨性ノ油ヲ含
 之壯神溫補ノ良藥トス。揮發衝動ノ壯神劑。的當
 ノ諸病ニ用テ精力ヲ補充シ殊効ヲ稱ス。神經熱及
 虛冷ノ腦病。神經病。依剝イボ昆垤コンヂ兒ル 擧第六章等ヲ治ス。○
 神經熱ハ神經感動ノ敏銳ト遲鈍ヲ論セス用テ峻
 効アリ一時毎ニ四氏ヨリ八氏ニテ與フ峻効ノ揮
 發衝動劑ヲ與テ捷功ナキ症ニ間奇驗ヲ得タリ○
 胃ヲ健運シ飲食ヲ消化シ風氣ヲ驅散シ不化ノ惡
 液ヲ化熟シ總テ胃虛ノ諸症ニ効ヲ奏ス○虛症ノ
 經閉ヲ通シ。催生分娩シ。胞衣ヲ下ス。叔格刺亞度ド香
 竄

ノ飲料ノ名擧第二章ニ加テ香竄料トス○焮衝熱ニ過
 用スレハ焮熱増劇ス○服量散劑ハ一錢マテ一服
 トス或水葡萄酒其他適宜ノ飲液ニ浸シ二錢マテ
 用フ 華 叔 依 涅

蘇西醫云水燻蒸餅監卷世其
 神神滋補入之良藥也其神神
 諸病者用之精方也補元氣
 虛弱之症病神神病者用之
 神神無不神效誠助人之良藥
 也其法一將餅二四八或十與
 水燻蒸餅四餅其法將餅十
 十或水燻蒸餅其法將餅十
 餅入之其法將餅十餅入之
 二十正章二餅其法將餅十
 餅入之其法將餅十餅入之

