


遠  
醫  
方  
名  
物  
考  
補  
遺

卷二




499.2  
E m-6  
2

No. 1463  
1月 16



富士川文庫

3320



遠西醫方名物考補遺標目

卷二

赫爾波外爾斯密

菲阿斯失亞密丁幾隋

菲香鎮痘飲

菲亞定痛飲

菲永定痛丸

安質菲阿斯飲

菲阿斯鎮痘散

甘亞菲阿斯散

治例棋六則圖

菲阿斯鎮痘飲

纈草健胃湯

菲阿斯越幾斯劑

菲阿斯膏

菲阿斯油

非阿斯子

催睡菲阿斯乳

菲器玫瑰膏

菲阿斯失亞密圖

黑列僕利

黑列僕利越幾斯劑

拔設利丸

黑列僕利丁幾劑

攝爾列拔爾撒謨丸

遠西醫方名物考補遺卷二

棟齋先生譯述

男 宇田川 榕  
榕菴校補

ヒラスシアミ  
アスニアミ  
スワルスニアミムニグムロイド  
アスニアミムニグムロイド  
アスニアミムニグムロイド

**形狀**此草圓莖叢生三四尺。莖太々枝多々毛茸アリ。

葉長ク闊大。缺又多シ莖ヲ抱テ生シ粗糙遍ク毛茸  
被シ厚ク柔脆ニシ粘脂アリ。手ニ觸テ粘著ス。淡綠

或  
黑  
綠  
或  
青  
色  
之  
帶  
白  
色  
人  
脉  
理  
天  
リ。  
六  
七  
月  
花  
開  
キ

漏斗様。多々ハ五出。淡黃脉理紫赤。羅紋ヲ爲シ。五雄蕊。雌蕊アリ。第一目花梗ナク或短梗アリテ莖梢

攢簇シ。萼五齒様。花開ケハ萼腫脹シ卵圓ノ蒴ヲ  
結ヒ頂ニ蓋アリテ閉ルカ如シ。熟スレハ閃開シ裏  
二房ニ分レ灰白色。圓様人細子多ク充ツ根長直。太  
外粗糙。黯赤裏白色。歐羅巴洲諸國ノ原隰廢苑荒野。  
路傍籬邊自生繁衍。二年ニノ枯ル。○此草嫌ノ  
ヘキ麻痺毒ノ臭氣アリ。鼠甚夕其氣ヲ惡ニ避々味  
微苦甘ニメ辛ヲ帶ヒ燒ケハ焚<sup>モエ</sup>テ爆鳴シ消石ノ如  
シ。此草ノ絞汁ニ青紙ヲ浸セハ赤色トナル。是酸性  
アル徵ナリ。○莖葉根子皆麻毒アリ。殊ニ根ニ多シ  
但多ク莖葉子ヲ藥用トス

麻痺毒瞑眩生草。毒尤峻。乾葉亦性力甚夕減セス過  
服スレハ恶心嘔吐シ大ニ脳。神經ヲ麻痺ノ精神憊  
昧。眼昏眩暉。瞳子散大。顏筋搐掣顫振。脉細數。頑麻昏  
睡或精神錯亂譫語狂躁搐搦等ノ危症ヲ發メ死ス  
感觸劇クノ虚憊甚キ症ハ殊ニ危篤ノ諸症ヲ發シ  
其害阿芙蓉ニ減セス。或云其毒。良菪ニ減セス然ニ  
良菪ニ比スレハ害少シ。或云妄ニ此藥ヲ投スレハ  
脳ヲ抑壓メ溫素ヲ減損シ。諸器脈管ノ機轉ヲ減損  
メ血液稀釋溶崩。諸液脫泄。下利尿崩。漏汗等ヲ發ス  
或云此藥ハ大ニ脳質ヲ損壊メ精神狂錯。昏憤。下血

等ヲ發メ死ス然ニ牛馬羊豕等ノ畜類ニハ害ナシ  
**解毒**此藥ヲ過服メ瞑眩甚キ者ハ速ニ吐劑ヲ與テ  
 吐セシメ或醋等ノ酸液類ヲ與レハ速ニ醒解ス○  
 過用スレハ大害アルト右ノ如シト雖モ服量ヲ慎  
 ミ病症ヲ精察メ用レハ醫家日用ノ要藥トス  
**試効**葉ヲ越幾斯劑トシ用フ○此藥ハ麻痺毒ヲ以  
 テ脳及神經ヲ鎮痙止痛催眠ノ一要藥トス阿  
 芙蓉ニ比スレハ心藏及血脉ヲ刺戟衝動セス血液  
 ノ運行ヲ增進セス熱ヲ發セス大便ヲ壅塞セス唯  
 神經ヲ麻痺メ感觸ノ銳敏ヲ鈍シ鎮痙止痛ノ効  
 ヲ爲シ却テ諸管血液大過人運動ヲ減損シ酷厲液  
 ノ刺戟ヲ抑制ス故ニ煥衝壯熱等一切運動過盛ノ  
 諸病ニ用ヒ動脈ノ感觸甚キヲ鎮定シ劇痛ヲ祛キ  
 攣急ヲ緩弛シ失血脫泄ヲ靜止シ總テ神經ノ常調  
 ヲ失ヒ感動太甚諸筋ノ觸動機劇盛ナル諸症ニ奇  
 効ヲ奏ス○凡ア芙蓉ヲ用ヒ効ナク或害アリテ用  
 ヒ難キ症ハ每常此藥ヲ用ス先哲是ヲ阿芙蓉ト比  
 較メ優劣ヲ論シ或互ニ換用メ功害ヲ驗シ各自主  
 能ノ異同ヲ辨晰セリ即チ左ノ所說ノ如シ○阿芙

蓉ハ劇痛ヲ止メ痙攣擣掣ノ運動。顫振瞞動等ヲ鎮メ諸液ノ脫泄。特ニ虛憊ノ下利。失血。多汗ヲ止メ皮表ノ蒸氣ヲ發メ肌膚枯燥ヲ滋潤シ不寐ノ精神罷勞セルヲ安眠セシメ精力ヲ資補ス。然ニ熱性ノ酷厲毒アリテ血液ノ運行ヲ増盛シ内熱ヲ釀シ大便ヲ壅閉スル等ノ妨害アル故ニ施シ難キ症多シ。或云阿芙蓉ハ焮衝ヲ制止スト。然ニ是諸筋ノ觸動機ノ大過ヲ降鎮スル故ニ焮熱ノ刺戟暫ク寛解スルナリ。焮衝ヲ制スル藥ニ非ス。又劇痛ヲ止メ攣急ヲ解スル故ニ緩和ノ効ヲ稱スレ。凡暫時過レハ再發

メ故ノ如シ。且遷延病ニ數用ヒ或久服スレハ其麻痹毒ニ因テ諸竅ノ分利漸々壅滯シ水腫ヲ發ス。○阿芙蓉ハ華爾斯質ニ熱性閉澁ノ酷厲毒アリテ諸竅ヲ壅塞ス。菲阿斯ハ華爾斯ナキ故ニ起熱ノ性ナク酷厲毒アレ。氏閉澁壅塞セス却テ大便ヲ渴シ小便ヲ利シ表發ノ蒸氣ヲ增進ノ病毒ヲ排泄ス故ニ大便等壅滯メ害アル症ハ是ヲ用。○或云菲阿斯ハ阿芙蓉ニ比スレハ麻痺スル少ク又少許ノ阿芙蓉ニ是ヲ用テ神經虛憊スル少ク又少許ノ阿芙蓉ニ瞑眩スル症モ菲阿斯ハ較著ノ瞑眩ナシ。○

疝腹痛。貌僂屈。レウ 摺百吐糞病。霍亂。失血等ノ神經感觸。

ノ劇症刺痛座撓掣 不寐錯狂等 二章 鎮止スルニ阿芙蓉ヲ用レ

ハ諸竅壅塞ノ害アル症ハ菲阿斯ヲ用テ劇痛ヲ鎮メ  
痙攣急ア弛メテ大小便等壅閉ノ患ナキカ如シ○  
諸熱病。殊ニ神經熱ニ痙攣ノ運動。神經ノ諸症。劇キ  
頭痛譫語。不寐。搖掣。痙性ノ欬嗽。嘔吐等ヲ兼ル症ヲ  
靜止ス○煥衝熱ハ多ク防煥衝ノ治法前出 施ノ後。  
痙攣ノ運動。刺戟疼痛仍休下サルヲ祛クニ用ス○  
神經熱等ニ虛煥衝鍋卷十煥衝合併編ニ出 ナ發シ精神蒙昧。譫語アル症ヲ治ス○此藥壯熱煥衝病ニハ固ヨリ適

應セス防煥衝法 然ニ眞虛ノ病。眞虛ノ熱病ニモ的當セス。唯假虛ノ症病毒壅鬱。若クハ痙攣ノ運動ニ因ニ真ノ虛脱ニ非ルノ云 及熱病ノ虛實交錯セル症。或神經感觸甚ク。痙攣ノ運動。疼痛不寐等ヲ兼ル症ニ的効アリ。凡熱病ノ神經諸症ヲ兼ル者ハ此藥適應スル1阿芙蓉ニ勝アサ レリ○此藥鎮痙止痛ノ効大抵阿芙蓉ヲ用如クナレ氏脳。神經ノ虛憊甚キ症ニ數六 阿芙蓉ヲ用レハ逾罷勞ス。菲阿斯ハ其害微ナシ。消耗汗虚脱ノ泄ス ル症ノ如キハ特ニ是ヲ推稱ス○凡精神知覺ニ係リ若ハ痙攣搐掣ノ如キ諸筋ニ關ル病ハ皆神經病

二屬ス。總テ痙攣ノ運動アレハ血液凝泣メ流利セス。病毐ノ分利ヲ妨ク。此藥ヲ用テ攣急ヲ除キ神經ノ諸症寛解スレハ筋脉舒暢メ血液流利シ諸竅開通ス。殊ニ腸ノ分利ヲ增進メ病毐能ク排泄ス故ニ阿芙蓉及自餘ノ鎮痙藥ニ超過メ良驗ヲ稱ス○小兒發熱搐掣或生齒透出シ難クメ發スル搐搦等ヲ治ス。此類ノ諸症ハ左ノ方殊ニ捷効アリ。

### 菲香鎮痙飲

茴香水名一  
半  
消石精製者  
半錢  
麻僵涅失亞名一  
錢  
滿那名

薄荷舍利別各四錢 菲阿斯越幾斯劑 ニ氏  
右調和シ半時毎ニ二三茶匙宛用フ○劇キ搐掣。阿芙蓉ヲ用テ験ナク或小兒發熱搐搦。呵芙蓉ヲ用難キ症ハ此藥特ニ効アリ○神經病ニ熱ヲ兼ル症。及不寐。偏頭痛ニ効アリ。阿芙蓉ハ血ヲ頭腦ニ上衝シ動スレハ厥衝ヲ發スレハナリ○神經病。殊ニ子宮病ノ劇キ偏頭痛。其他一處ニ滯著スル頭痛ハ此藥ヲ神經劑ニ加用テ効アリ。喻ハ後方ノ如シ。

### 菲亞定痛飲

亞的兒名

纈草丁幾劑

鏡

各二錢

## 菲阿斯越幾斯劑

一錢

草丁幾斯

右研和シ時々十五滴宛服ス。或患者ノ堪ルニ隨ヒ  
増減ス。凡遷延病ノ輕キ鎮痛藥ヲ用フヘキ症ハ此  
劑尤良。○劇キ傷冷毒痛。痛風。顔痛。齶齒痛等ヲ治ス  
殊ニ痛風。傷冷毒痛及腺腫ハ扶歇蘭度<sub>後出人此</sub>名此越幾斯  
劑ヲ用テ試驗ヲ稱ス。又安質<sub>後出人此</sub>菲阿斯飲<sub>或後方ヲ</sub>  
與<sub>テ</sub>其劇痛ヲ祛キ病毒ヲ疏解メ多ク治ス。

## 美菲汞定痛丸

本關朴窟福烏鵲脂

名

失鳩答越幾斯劑

名

阿魏

各一錢

甘汞

十五氏

## 菲阿斯越幾斯劑

半錢

右研合ノ百九トシ三丸宛用。一日三次。吐涎ノ候頸  
等<sub>等</sub>焮腫アレハ服量ヲ減ス。雙鸞菊越幾斯劑<sub>名</sub>ノ効ナ  
キ症ハ殊<sub>ニ</sub>驗アリ。○菲阿斯ハ胸腹諸器攣急ノ諸症  
ヲ治ス。殊肺氣管ノ攣急ヲ治スル故ニ咳嗽。痙攣急  
スル發<sub>ヨリ</sub>端ヲ寬解ス。喉中怕痒メ發スル欬ハ一二氏用  
テ治ス。○胃寒傷冷毒ノ欬嗽。胃欬。勞欬等劇<sub>ノ</sub>呼吸  
壅悶スル症及<sub>ヒ</sub>疫欬<sub>百日</sub>小兒痙喘<sub>羅甸名アストマ</sub>  
ヒ<sub>ト</sub>治ス。○頑固ノ疫欬ニ特効ノ一藥トス。但初發  
病毒過盛ニメ熱性若ハ焮衝ヲ帶ル者日ヲ經テ漸

虛衰シ寒粘液性及痙攣<sup>癲急ヨリ</sup>發スル飲トナル者ハ此藥

的當ス。然レ肺氣管大ニ罷弊メ弛弱シ飲嗽荏苒ト

メ治セサル症ハ適應セス。專ラ幾那等ノ強壯劑ヲ

用テ治スヘシ○劇キ飲嗽。疫飲。痙攣。喘ハ此藥ニ  
安質沒扭酒ヲ加用テ甚夕験アリ此劑服シ易クノ

毎常幾多ノ患兒ヲ救治セリ又痙攣搐掣等總テ神  
經ノ諸症ヲ治ス即チ左ノ二方共ニ殊効アリ

**安質菲阿斯飲**

菲阿斯越幾斯劑 半刀

安質沒扭酒 補 二錢

右研和シ五滴ヨリ十滴マテ用フ

**菲阿斯鎮痙散**

菲阿斯越幾斯劑 一丸

乙百葛格安那 細末

沙糖 半刀

右研和メ散劑トシ一時毎ニ一眼宛與フ○劇キ飲  
嗽喘急及胸脇焮衝等ハ菲阿斯越幾斯劑ニ安質沒  
扭劑<sup>安質沒扭酒</sup>若バ乙百葛格安那ノ末少許  
ヲ加ヘ亞刺比亞護謨漿<sup>名</sup>阿利機油等ニ研和シ用  
ヒ或安質菲阿斯飲<sup>前出</sup>ヲ用テ飲ヲ鎮ノ吐痰ヲ進ム。

○或肺嗽衝ノ困難ナル痙攣ヲ鎮メ吐血ヲ防クニ  
用フ ○或云胸脇嗽衝ハ此藥ニ消石硝砂ヲ加用テ  
良効アリ ○麻疹嗽及是ヨリ發スル勞嗽様ノ症ニ  
効多シ ○勞嗽様ノ熱病ハ嗽嗽吐血及痙攣ノ運動  
ヲ鎮定スルニ用フ或和胸藥鎮痙藥ヲ加テ尤効ア  
リ 喻ハ後方ノ如レ

甘亞菲阿斯散

伊里斯弗魯連底イリス・フローレンチ細末○缺ルハ亞刺比亞護  
甘草甘草各二錢 補謨モモク代用ス  
甘阿斯越幾斯劑ヒュース・エキス各十氏 亞鉛華アラチカ名

右調匀メ散劑トシ時々一小刀尖宛服ス ○效血ノ  
症神經感觸甚ク。肺氣管ノ劇キ攣急ヨリ發スル者  
ハ此藥ヲ用ヒテ胸腹諸器ノ攣急ヲ靜止シ牽痛ヲ緩  
弛メ治ス ○吐瀉霍亂劇キ吐血。其他失血過多等。痙  
攣ノ運動甚キ症ハ此藥ヲ與ヒテ攣急ヲ緩弛シ治ス  
○遷延諸病ノ發熱嗽衝ナク唯痙攣ノ運動及鈍痛  
ヲ兼ル症。或内部攣急牽痛アリテ經年治セス葛私  
多儂謨トーリウム阿魏尾爾拔奴謨ガエルバヌム等ノ鎮痙藥ヲ長服メ  
驗ナキ症ニ此藥効アリ。總テ頑固ノ病ハ阿芙蓉ノ  
如キ壅塞スル藥ハ久服シ難シ菲阿斯ハ服量ヲ慎

テ數用且長服スレ氏發熱煥衝便秘ノ害ナク却テ諸竅ヲ疏通シ病毒ヲ排泄スレハナリ○瘻症。瘻症心腹子宮衝逆劇キ嘔吐或攣急ニ因テ尿閉若ハ小便澁滯スル等ハ此藥ヲ用テ其發動ヲ靜止シ治メ後大便瀉シ或痔血通スル者アリ○腹内諸器ノ攣急。腸痛等。阿芙蓉ノ驗ナキ症ハ此藥ヲ用テ治ス但過用スレハ下利ス。故ニ阿芙蓉ト同効トシ矣。ニ下利痢疾ニ投スレハ害アリ○神經病ニ胃痛若ハ腸痛ヲ兼子飲食化シ難ク風氣痞脹噫氣苦満ヲ患ル者ハ毎夜此越幾斯劑ヲ取テ一氏ヨリ二三氏

マテ用ヒ朝モ亦少許宛用テ治スヘシ。阿芙蓉ニ比スレハ止痛ノ効少シト雖モ便秘ノ害ナシ○疝腹痛ハ焮衝ノ候ナク粘液壅滯及攣急ヲ兼ル症ニ効アリ每發阿芙蓉ヲ用テ効アル症ハ漸ク是ニ慣テ多量ヲ用ヒサレハ験ナシ。此症少量ノ菲阿斯ヲ用レハ每次効アルト多量ノ阿芙蓉ニ勝レリ○瘻攣性ノ疝痛ニ大便閉若バゾウク前出狼傳屈ゾウツク前出兼ル症ハ阿芙蓉能ク其疼ヲ鎮止スレ逾壅塞ヲ増ス。故ニ菲阿斯三氏ヲ取テ一服トシ與レハ其疼立ニ消ノ大便利シ。痔血壅滯アル者ハ痔脉開破ス。故ニ疝痛ノ攣

急甚夕及。痔血壅滯ヨリ發スル症ハ此藥ヲ用テ擘  
乳汁ニ煮テ吉利詞<sup>キリツ</sup>爹兒<sup>ターリル</sup>トシ施メ亦良○内外諸部  
ノ腺毒<sup>瘰癧等</sup>壅塞結腫。腺腫。瘰癧。癌樣硬腫。疼痛若々  
ハ頑固ノ歛衝<sup>ク</sup>ノ兼ル症。總テ腺及水脉<sup>ワツ</sup>乙管多キ  
部ノ病ヲ治ス。此藥鎮痛軟化ノミ十<sup>1</sup>ラス解凝疏散  
イ効アリテ腺ノ壅塞ヲ開通スレハナリ。殊ニ肺藏  
中ノ結腫及是ヨリ發スル欬嗽ニ効ヲ稱ス○此藥  
腦。神經ヲ麻痺壓鎮スル故ニ搐掣攣急アル遷延神  
經病。瘻症。癰。發狂。神思憂悶病。痴迷等ノ精神及諸筋

ニ保ル病ヲ鎮定メ酷厲毒ノ內鬱ヲ泄ス。故ニ未  
經久沈痼セサル症ハ治スル者多シ極テ險惡ノ症  
ハ固ヨリ藥力ノ治スヘキニ非ス。然ニ此藥ヲ投メ  
毫モ効ナク或害アリトシ擯斥入心者ニレ由其的  
効ヲ知サルニ因ル左ニ舉ル如<sup>シ</sup>○傑列陳<sup>ザグ</sup>人云、  
神思鬱憂痴迷錯狂及癰ニ狂<sup>ハ</sup>兼ル症ニ此藥ヲ試  
用ル下四十人許大抵初一氏宛日三次長服スルニ  
隨ヒ漸々加<sup>シ</sup>十八氏<sup>ノ</sup>至レ凡<sup>ハ</sup>驗十シ或頭腦ノ患  
症差減シ或陰症輕差外得心者凡<sup>ハ</sup>非亦心効十シ  
體稟ヲ損害シ殆<sup>ハ</sup>瞑眩<sup>ハ</sup>爲スニ非亦心効十シ

然ハ是著實穩當ノ藥ニ非ス貨墨ホトトギス名モ亦云。是ヲ搗  
掣ノ諸病ニ用テ良功大ナシ。或云此藥癇ニ大効ヲ稱  
スレ。氏是ヲ投シ却テ増劇ノ危症ヲ現シ。或暫ク發  
作ヲ抑遏ス少トアレ。氏無幾劇發ス。○然則古來諸  
名哲。癲癇發狂。神思憂悶。痴迷等ニ用テ治驗ヲ得ル  
說甚多シ。殊ニ右人ホトトギス貨墨ホトトギス名ホトトギス人說ハ僅ニ兩三人ニ  
試之。且ヒテ、ヨコス阿斯子ヲ越幾キ斯劑スケトウ用心得故ニ正ク其  
徵ヲ取ルニ足ラス。又高明ノ斯篤爾窟スドウルク人多ク歷試  
ノ癰癥ノ諸症ニ確實ノ治驗ヲ稱ス。卽チ云。癇發狂  
神思鬱悶痴迷及撻掣失血等ニ此藥初一氏宛日ヒタツ兩

三次與ヘ漸ク加テ十五氏ニ至リ治スル者十三人  
其後又八人ニ試ミ不治ノ症アレ。氏驗アル者居多  
凡癇及小兒驚駭ヨリ發スル撻搦ハ殊ニ治驗多シ  
○或云神思抑鬱。慍怒等ヨリ發スル狂病ニ此越幾  
斯劑ニ氏ヲ取テ沙糖半錢ニ和シ與ル。數日ニノ  
治ス。扶歇蘭度ラント人云。發狂諸藥驗ナク阿芙蓉亦効ナ  
キ症。此藥半刀ヲ薄荷水六弓ニ溶化シ與ヘ漸ク加  
テ一刀ニ至リ全治セリ。○或云神思鬱悒悲悶錯狂。  
不寐擊急シ筋肉强硬肌膚乾燥スル症ハ此藥的効  
アリ。阿芙蓉ノ如キ起熱ノ品ハ鬱熱壅塞ノ諸症增

發ス○谷爾林人云、痘癬發狂相思錯認迷罔及失血等ニ此藥ヲ與テ殊効多シ。一僧六十歲、頭瘡乾愈メ頭旋眩運ヲ患ル。殆ト二十年、衆藥効ナシ乃、此藥ヲ與ル。一日、一氏漸ク加テ連服シ。一月餘ニメ宿患脱然。爾後再發セス○凡、鎮痘劑必用ノ症ニメ阿芙蓉驗ナク菲アスヲ用テ効アル治例左ニ六則ヲ舉ク。

**第一** 一婦人焮衝病ニ罹リ清涼劑ヲ投シ刺絡ヲ施シ治メ。後時々劇キ搐搦ヲ發スル。半時餘或終日誓留ス。諸鎮痘ノ峻劑及衝逆ヲ降鎮スル劑ヲ内服。

外敷スレ氏寸効ナシ。但、阿芙蓉ヲ與ハ差驗アレ氏全治ノ功ナシ。因テ菲アス越幾斯劑ヲ取テ初朝夕半氏宛與ヘ漸ク加テ五氏ニ至レハ搐搦發スレ止速ニ醒解シ且、病勢漸ク減メ其驚怖スヘキ劇症十四日ヲ經テ全治セリ。

**第二** 一男子五十八歲。稟賦虛弱矮小。蚤歲ヨリ聰敏不凡。一兩年以來哮喘ニ罹リ且膝脚刺痛ノ誓留シ夜中劇痛堪難ク短氣促迫殊ニ甚ク毎朝起坐スル不能ハス。十月頃千八六年百喘息短氣增長シ不食虛羸季肋下亦鈍痛シ吸氣ニ胸痛スル。肺創ノ刺戟ス

ルカ如シ又腕臂及膝以下冰冷シ温毛布ヲ纏ヒ或毛皮ニテ裹ムト雖モ温ナラス。發作劇キキハ肢節顫振心動悸苦悶烈ク呼吸促迫ノ室塞ヲ恐レ或暫ク知覺ヲ失フ。大抵發作四分時ニメ解散ス。一晝夜一發或二發尚其餘數發スルトアリ。始終毫モ熱ナシ。從來鎮痙藥阿芙蓉葛私多僂纈草阿魏等ヲ試テ微功ナク發作逾增劇ス因テ先ツ試ニ菲阿斯越幾斯劑十氏ヲ取テ纈草濃浸劑六弓ニ溶化シ一時毎ニ一食匙宛與テ次ノ發作大ニ減ス。是ニ由テ其越幾斯劑十五氏或二十氏マテ纈草浸劑六弓ニ溶化

シ葛私多僂丁幾劑亞的兒各四錢ヲ加ヘ用テ烈キ喘急盡ク解散ス。其後越栗失爾赭鴛立沃利固ヲ用テ全治セリ。爾後四年間喘息發スルト兩次仍前劑ヲ用テ治シ竟ニ再發セス

**第三**一貴婦五十歲稟賦強壯肥胖シ神思爽輕ナリ。十一月十八年診察ス其症体軀甚夕羸瘦虛憊脉遲ニメ一密扭篤ニ三十八動或四十動許密扭篤名卷二十一二註ス精力虛乏語音續セス聽了シ難シ脚ニ粘液腫ヲ發シ臍部ヨリ心下ノ右邊マテ重痛ヲ患ヒ數年毫モ休マス今漸ク增長シ劇キキハ屢々死セントス然

氏其疼截<sup>ル</sup>カ如ク焚<sup>ガ</sup>如クナラス唯鈍痛ノ腹底ニ  
在リ。又子宮病ヲ兼テ神思鬱重憂悶シ。時ニ錯誤ス。  
此症或阿芙蓉ヲ取テ散劑若<sup>ハ</sup>丁幾劑ニ加ヘ與レ  
ハ毎ニ其疼止ムト半時許ニノ復劇發ス。或鹿琥精  
鹿琥漿ト<sup>シ</sup>葛私多僂<sup>トカズ</sup>。阿魏<sup>ヲ</sup>丸トシ多服ノ驗ナシ。且<sup>シ</sup>  
諸醫ヲ延キ多年施療スレ氏輕差ヲ得ス。終ニ患婦  
危篤ニメ數日續命シ難ク見ニ予意、ラク阿芙蓉服  
量足ラスノ効ナシト。因テ一時毎ニ二氏宛與レハ  
患者吐スルヲ三次大ニ憊困ス。故ニ又阿芙蓉丁幾  
劑ト香竈丁幾劑ヲ等分ニ和ノ一時毎ニ三十滴宛  
與ルト兩次復吐ス。是ニ於テ菲阿斯<sup>ヒアス</sup>越幾斯劑ト薄  
荷等分溫葡萄酒ニ和ノ琶<sup>ハ</sup>布トシ胃部<sup>心下</sup>ト腹肚ニ  
貼シ。又菲阿斯<sup>ヒアス</sup>越幾斯劑十氏ヲ取テ桂冰一弓ニ溶  
シ四分時毎ニ十滴宛用ス。是ヨリ患者精力回復シ。  
三日ヲ經テ欒痛盡ク消散シ。爾後唯一次發動スル  
ノミ。其脚腫モ亦對症ノ藥ヲ與テ全治シ患者復肥  
腴ノ體力壯健。精神輕爽ナリ。利<sup>ト</sup>天行下利ニ罹<sup>リ</sup>治メ三月後復下  
利シ亦治メ後屢瀉利ノ僅ニ粘液ヲ通シ肛門及腸  
寬裕。八月<sup>千八百</sup>七年天行下利ニ罹<sup>リ</sup>治メ三月後復下  
利シ亦治メ後屢瀉利ノ僅ニ粘液ヲ通シ肛門及腸

絞痛。裏急後重ヲ兼子下利セサレハ大便秘結シ久  
外閉滯メ治セス衆醫投藥經年驗ナシ但下利劇發  
止スルノミ。是ニ由テ便秘ヲ患フ。數醫診ノ皆不治  
トス。予吉諭。趨護謨。格綸僕。安倔斯。黜刺葛。斯加栗刺。共  
等ヲ單用シ或ハ對症ノ劑ニ合シ阿芙蓉ヲ加用ヒ。  
刺戟性ノ軟膏ニ綠礬ヲ加テ少腹ニ擦シ又槲皮ノ  
浸劑ヲ以テ少腹ヲ蒸湯シ互ニ施ス。一月餘ニノ  
病勢寬解セス。其後煅鉛。鉛ヲ陶坩ニ入攢セ煅テ灰  
オセイデ。一錢ヲ取テ薄荷水四弓ニ溶シ亞刺比亞  
パリムビ。

護謨三錢。阿芙蓉一錢ヲ加ヘ一時毎ニ一茶匙。宛與  
テ諸症大ニ寬解セリ。然レ連服十四日ニノ下利再  
發ス。仍此劑ヲ與ル。一四週ニメ煅鉛總計一弓ヲ用  
レ。氏下利往苒タリ。是ニ於テ阿芙蓉劑ヲ休メ。菲阿  
斯。越幾斯劑。鉛醋。少許ヲ和シ與レ。ハ腸痛頓ニ  
消シ。裏急後重休ミ。下利モ亦治メ大便秘閉セス。今  
既ニ一年ヲ經テ壯健ナリ。二月十一日。十八年半  
多。僂。亞鉛華。鹿琥精。收斂亞的兒。等ヲ屢試之用テ  
痛ヲ患ヒ。數醫施治メ全愈セス。二年以來阿魏。葛。私  
物考補遺

驗ナシ。但患婦去歲始テ懷妊シ。其間諸症退キ藥劑ヲ服セス壯健ノ兒ヲ產シ。躬<sup>ミガカ</sup>テ乳養セリ。然ニ產後舊病再發甚クメ一切食物ヲ惡ミ此モ強テ與レハ胃口牽縮攣痛メ恶心嘔噦ス。三月十一日千八百九年予ニ診治ヲ請フ。產後四週ヲ經テ今尚卧床ニ在リ。予阿芙蓉液ヲ取テ一時毎ニ四滴宛與ヘ。都合一錢ニ至ヒ。氏驗ナシ。患者云前醫モ亦屢此藥ヲ用レ。氏驗ナシト。因テ菲阿斯<sup>ヒアス</sup>ヲ試シト欲シ。後方ヲ作テ一時毎ニ十五滴宛用ヒ。又湯劑ヲ兼用シ。前說ノ第二治例中ノ琶<sup>バ</sup>布<sup>バ</sup>胃部ニ外敷セリ。

菲阿斯鎮痙飲

菲阿斯越幾斯劑

薄荷	一 弓	細末	八 錢	中條二 出ツ	八 錢	纈草ノ 條二 出ツ	一 錢○	纈草 蒸餾油	一 錢○	纈草 蒸餾油	一 錢○	纈草 糖油劑	一 錢○
葛私多	ト	多	リ	丁幾	四	劑	名	葛私多	ト	多	リ	丁幾	四

右調匀入

纈草健胃湯

纈草根塊  
白芷

菖蒲根  
鏡

右調和シ四錢ヲ取テ沸湯百六十錢ニ投シ蓋閉シ

浸スト半時。其液ヲ取リ連用十四日ニノ諸症回復シ爾後發動ノ候ナク健康ナリ

**第六** 一貴官ノ處女十四歳未夕月經ヲ見ス二月十四日千八百十一年顯著ノ起因ナクノ大ニ噫氣ヲ發シ響鳴メニ密扭篤ノ間連縲シ毎ニ休ムトハ分時ニメ復發ス。是胃管ノ劇キ痙攣ノ運動ニ因テ風氣ヲ生シ胃中ヨリ奔騰シ出ルナリ。初發餘症ナシト雖モ日ヲ經テ漸ク心部疼ニ。步行スレハ勞倦ノ脚痠痛シ心部ノ疼。日ニ増劇シ噫氣スレハ大ニ苦悶シ頭痛ヲ兼ヌ然ニ寒熱ナク食味變セス渴及恶心ナク

舌苔生セス診脉及大小便平全ノ如シ但表發ノ蒸氣減メ肌膚潤澤ナシ。予下劑ヲ投シ大便通スルト六回ニメ午後幾那複方丁幾齋鑑卷七叶一葉ト越栗失爾赫篤立沃利名卷二十九叶十二葉等分合メ用一二日半。諸患減セス其疼逾增劇ス。因テ阿芙蓉液ヲ取テ三滴宛半時毎ニ與ル。病症毫モ減セス。是ニ於テ菲阿斯越幾斯劑十氏ヲ取テ桂水ニ溶シ一時毎ニ五滴宛與ヘ漸ク加テ患者眼昏暗ナルマテ試ミ用ントス。然ニ十二時ヲ經テ噫氣劇疼大ニ寬解シ唯微シグ噫鳴頻發スルノミ。次テ此劑一時毎ニ十五滴マテ

用ニ至テ諸、患症全治シ爾後些モ發動ヲ見ス

**服量**越幾斯劑。三氏ヨリ二氏マテ、一服トス。或、症ニ隨ヒ漸

フ或云、半氏ヨリ二氏マテ、漸加テ十五氏或其餘モ用

加テ五六氏若ハ十二氏ニ至ル。芳香ノ露水或適宜ノ飲液ニ溶シ用或丸藥トス。○小兒ハ一氏ヨリ漸加テ四氏ニ至ル。或云一歲ノ兒ハ日ニ二氏、寃與ヘ二歲以上ハ漸ク加テ日ニ四五氏マテ用フ小兒ハ多量ニ耐テ、眞眩少シ。

**菲阿斯越幾斯劑** 製法

花前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布巾ニ包ミ、搾器ニ内、搾テ稠粘ノ汁ヲ取り磁鍋ニ

内慢火ニ上セ、水氣ヲ蒸散ノ稠厚ト爲シ火ヲ下メ放令シ。菲阿斯乾葉ノ細末ヲ取テ右ノ搾汁、四分一ノ容ヲ加テ攪和シ適宜イ越幾斯劑ノ稠トナシ硝子壠ニ内、固封シ貯フ。此劑揮發塩多シ故ニ日ヲ經テ凝固スルニ隨ヒ其塙ノ結芒ヲ現ス。

**外敷** 菲阿斯越幾斯劑ハ外敷ノ鎮痛緩和、軟化、解凝疏散ノ良藥トス。肢節痛、顫振ヲ兼ル症或脚麻痹等ニ失禮答。加密列亞麻子粉ヲ加ヘ琶布或蒸湯藥トシ施メ治ス。其他葉ノ効ト同シ。○葉ハ外敷之血液過盛ハ運行ヲ鎮靜シ、焮腫ヲ消シ、清涼止痛鎮痙緩

和軟化疏散ノ峻藥トス○痛風傷冷毒等ノ劇痛ヲ  
止メ或、硬結腫。癌瘡。腺腫。瘰癧腫等ヲ軟化シ或、消散  
シ或、其疼ヲ祛キ或、其疼アル潰瘍ヲ治シ或、瘰癧毒  
ノ燃衝眼。羅斯様ノ燃腫。劇痛アル腫瘍。乳房硬結腫  
痛ヲ消散シ若ハ化膿ス○乾葉ハ花前ニ採リ速ニ  
乾シ或、細末トシ硝子壠ニ内レ固封シ聽用ス。生葉  
ハ搗テ貼シ或、莖葉花根子共ニ採リ用ナ或、蒸湯劑。琶布。細末。或、軟  
膏トシ或、加密列。接骨花ヲ加ヘ搗テ沸湯若ハ乳汁  
ニ擂和シ琶布トシ貼ス○痛風。傷冷毒痛等ニ此葉  
ヲ水ニ煮テ蒸湯シ或、乳汁ヲ加、煮テ琶布トシ患處

ニ貼ノ治ス。一男子頭痛劇ク且、手臂痛險重ニノ經  
久治セス此琶布ヲ貼ノ捷効アリ。一女兒流走痛ヲ  
患ル。十三年衆藥驗ナシ此藥ニ蒸餅心ト乳汁ヲ加  
ヘ煮テ琶布トシ頻ニ貼ノ治ス○一婦人全軀顫振  
甚クメ嘔噦休マス面部ニ汗淋漓ス。右ノ琶布ヲ肢  
節ニ貼シ三日ニメ治ス○乳房硬結腫痛ニ此葉ヲ  
貼メ効多シ。一婦人產後乳房劇ク燃腫ス此琶布ヲ  
貼メ速ニ消散ス○茺蔚ヲ過用ノ小便頻數淋瀝劇  
キ症。右ノ琶布ヲ内服外敷ノ治ス又龍腦阿芙蓉ヲ  
兼用メ尤良。○小便閉ニ劇痛或、燃腫ヲ兼ル症ハ此

葉ヲ乳汁ニ加ヘ煮テ琶布トシ溫ノ腹部ニ貼メ能  
ク小便ヲ利ス○瘻癰様ノ疝腹痛。腹内諸藏ノ攣急  
痛ニ葉或葉ノ末一錢ヲ沸湯若ハ乳汁三弓ニ煮テ  
吉利詞爹兒トシ施メ緩和止痛ノ効ヲ奏シ治ス○  
耳痛ニ葉ノ絞汁ヲ耳孔ニ滴メ治ス○葉ノ膏藥ト  
シ患部ニ貼メ前說ノ諸症ヲ治シ殊ニ焮腫ヲ消ス  
腺ノ焮腫尤良。又陰囊貌僂屈腫。盲痔及胼胝様ノ  
硬肉。魚目等ノ焮腫劇痛ヲ消散ス

**菲阿斯膏**

拔

ニ娘若把兒麻膏

名

黃蠟

各一丸重二錢

**阿利襪油**

名六弓

右調和ノ火上ニ烊化シ能融和メ火ヲ下シ殆冷ル  
ヲ俟ヒ後藥ヲ加フ

**菲阿斯葉**

乾末一丸

右煉和メ硬膏トシ硝子壠ニ入固封シ貯フ

**菲阿斯油****製法**

菲阿斯草生鮮者

六弓

阿利襪油

ニ七

右磁壺ニ内蓋閉メ固封シ重湯煎數時ニメ取出シ  
搾テ油ヲ取り放冷シ濾テ滓ヲ去リ硝子壠ニ内固  
封シ貯フ 涼試効内服外敷ノ鎮痙止痛降鎮緩弛ノ

偉効ヲ稱シ血液過盛ノ運行ヲ靜止ス。或此油ヲ越  
沒里膏モリヤク名ニ和シ擦藥トス。○腹部ニ擦テ蛇蟲ヲ殺  
シ。婦人月經過多ニ腹腿合縫ノ部及腰ニ擦テ治ス。  
腺腫ニ擦テ消散ス。○腸燃衝ノ劇痛擊急メ大便閉  
八日諸藥効ナキ症ニ解散ス。○一婦人產後身體下部風氣  
鬱蓄メ壓迫シ大ニ攣痛ス。此油ヲ溫メ頻ニ患處及背ニ  
擦テ治ス。○菲阿斯子ハ搾リテ油ヲ取ル。ナシ此  
搾油ハ麻痺ノ効微ナク罂粟子油。蓖麻子油ノ如キ  
滑利緩和ノ効ノミナレハナリ。

**菲阿斯子** 試効 麻痺毒尤峻ナリ鎮痙止痛催眠ノ一  
藥トス細末トシ一二氏ヨリ一刃テ服ス。○癪ニ  
此末日六氏ヨリ一刃テ數日連服ノ治驗ヲ得。○  
痛風傷冷毒痛。腎痛ヲ治ス。○此末ニ麝香。甘汞ヲ加  
テ丸藥トシ或桂水若バ安質沒扭酒ニ加テ飲液ニ  
滴シ用テ鎮痙解凝ノ峻効アリ。○乳劑トシ催眠止  
痛ノ一良藥トス後方ノ如シ。

**催眠菲阿斯乳**

菲阿斯子

一刀

甘扁桃甘皮

二錢

右研和ノ乳劑

製法鏡卷十四

清涼子ノ條

トシ濾メ六弓トシ半

時ニ一匙完服ス○吐血崩漏勞欬等ニ左ノ煉膏奇効ヲ稱シ又鎮痙止痛催睡ノ良薬トシ通用ス

**菲臘玫瑰膏**

白臘栗子 菲阿斯子 各半錢

麗春花舍利別

圖

玫瑰昆設爾弗

各半錢

右研和シ胡桃大完服スル一日兩次○齶齒痛ハ此子ニ蠟少許ヲ和シ炭火ニ投シ漏斗ヲ蓋テ其烟ヲ

齶齒ニ薰メ即効アリ

依 淑 葛 蒲 泊 華 拔

菲阿斯失亞密寫眞圖



舶來乾腊菲阿失亞密圖

搭菴寫



**黑列僕利**

「ヘルレボラス・ニグラム」羅  
「ヘルレボラス・ニグラム」蘭

**形狀**

此草長莖叢生。多液紫斑アリ莖頭六七葉或九

葉攢生シ長キ梗アリ繖布ノ手指ヲ開ク如シ老利

兒葉ニ似テ鋸齒アリ黯綠滑澤厚固硬勒。春月太キ

莖ヲ抽ク一指長。莖頭一二花或數花攢生ス五瓣或

多キ者薔薇様淡紅或白色或白色ノ條紋或白斑駁アリ

雄蕊二十以上多雌蕊アリ第十三綱第七目花後角様ノ子室四五

個簇生メ直立シ穂斗菜角ノ如シ。裏ニ多ク卵圓黑色ノ種子アリ根塊球様大廿肉豆蔻ノ如シ是ヨリ

枝節アル幾多外條根生シ是ニ遍ク毛様ノ鬚根生ス外黒色。裏白色。味姦辛微苦。嘔スヘキ臭氣アリ。鬚根ヲ藥用トス。球根條根ハ峻効ナシ○或此根ニ似タル草根ヲ以テ偽ル者甚多シ。偽品ハ鬚根直ニ塊根ヨリ生シ。真品ハ鬚根皆條根ヨリ生ス。偽品ハ塊根小サク纖鬚甚夕多ク。特ニ黒色ニメ裏甚夕白色。味辛苦。微甘ヲ帶ヒ臭氣甚シ○此草經年枯レス獨ひ都諸國雪微設兒蘭上ツイツセルランド歐羅巴洲國名ノ牙而白アーベン地名ニ生ス試効細根ヲ用フ。吐下ノ峻効アリ但藜蘆ニ比スレハ酷厲毒少ナクノ危懼ナシ。生根ヲ過用スレハ烈

ク吐瀉シ。眩運嘔逆。胃腸熬衝ヲ發ス。故ニ熬衝病ニハ害アリ。乾根ハ其毒減耗ス○水腫ニ用テ大小便ヲ利シ停水ヲ除クニ駄効アリ殊ニ脈管纖維ノ虛弱縱緩ノ粘液留飲壅滯シ發スル症ニ的當ス此症ハ差多量ヲ用テ停水ヲ大小便ヨリ驅除スヘシ○此藥散劑トシ用ルノ稀ナリ。通例二錢ヲ取り水六弓ニ煮テ滓ヲ去リ用フ○此根越幾斯劑トシ用フレハ藥力緩ニメ危懼ナク其効亦著實ナリ水腫ニ云散劑ノ量十氏ニ過レハ瞑眩ス。越幾斯劑ハ半錢氏ヨリ八氏マテ日兩三次用テ能ク小便ヲ利ス或

若バ其餘モ與ア妨害ナシ

**黑列僕利越幾斯劑製法健質亞那**越幾斯劑名十同

○水腫ニ左ノ丸劑利水ノ峻効アリト本鄭ニ

**拔設利丸**

**黑列僕利越幾斯劑** 没藥 上好者 各二錢

葛爾儒名細末十瓦

右調和シ一瓦ヲ一丸トシ毎日一丸ヨリ三十九テ用ヒ其効ノ多少ニ隨ヒ増減ス 依**一方黑列僕利越幾斯劑** 没藥越幾斯劑名各二弓 葛爾儒細六錢 右一氏ヲ一丸トシ朝夕一丸宛與ヘ漸々加テ

日八丸或十丸ニ至ル。水腫ニ峻効ヲ稱ス 涅 ○此根ハ經閉ノ一良藥トス。體稟虛弱。血脉縱弛ノ血液健運セス稠粘トナリテ壅滯シ或粘液腹内諸器ニ壅塞ノ發スル經閉ハ殊ニ是ヲ用テ脉管ヲ衝動シ血液ヲ稀釋ノ子宮ニ驅逐ス。其壅塞疏通スレハ肢體懈惰。腰痛。腹脹等ノ症ヲ發ス是月經通スル前候ニメ此藥ノ効アルナリ。痔血壅滯ノ諸症ヲ發スル者モ是ヲ用テ通泄スルト經閉ト同シ ○此根ヲ丁幾剤トスレハ服シ易ク。前說ノ經閉ニ効ヲ稱シ通經ノ一峻藥トス大抵二十滴宛適宜ノ飲液ニ點服ス

ルノ日、兩次漱次ニ加テ惡心嘔噦下利等ノ瞑眩アルニ至ル。或云此劑一卵匙宛與ヘ或三十滴ヨリ八十滴マテ飲液ニ點服ス。或云是ヲ服メ効ナキ者ハ瘀血ヲ他ノ部ニ驅逐メ失血ヲ發スルヲアリ。

**黑列僕利丁幾劑**

**製法** 黑列僕利末細剉或細適宜燒酒十五度者右硝子壠ニ内固封シ浸スト八日或云四日濾テ渣ヲ去リ貯フ○經閉及痔血壅滯ニ黑列僕利越幾斯劑三氏ヨリ八氏テ用テ能通利ス或攝爾列人ノ拔爾撒謨丸亦殊効アリ

**攝爾列拔爾撒謨丸**

黑列僕利越幾斯劑十盧會上好者

硝鍊華各四錢

雜腹蘭二錢

阿芙蓉精製者

右各別細末メ合和シ大黃丁幾劑鏡ヲ加テ捏和シ二氏ト一丸トシ甘草ヲ衣トシ日五丸ヨリ十二丸テ服ス○痔血壅滯ニ因テ瘀血上衝シ心胸苦悶等ノ諸症ヲ發スル者ハ黑列僕利越幾斯劑ラ盧會越粟失爾上好盧會ニ錢ヲ蒸餾水八錢ニ溶和スル者ニ加ヘ服スレハ直腸ヲ衝動シ瘀血ヲ導洩メ治ス○經久頑固ノ痛

風脚痛ノ熱ナキ症ニ間偉効アリ○此根峻吐下ノ効アル故ニ癇。癲狂。脾病。黑膽液病。神思憂悶。錯狂痴迷等諸器脈管ノ觸動機。頑鈍ナル症ニ用テ膠粘液黑膽液等ノ病毒ヲ蕩滌シ治スルニ卓異ノ大効ヲ稱ス。然ニ過用スレハ瞑眩甚キ故ニ服量ニ注意スヘシ○神思鬱憂病撰第69章 黑膽液病 羅甸名  
點朗格里亞卽十神思鬱憂悲悶

迷罔ハ此越幾斯劑五氏ヲ盧會越栗失爾上出ニ加用ノ症ハ此越幾斯劑五氏ヲ盧會越栗失爾上出ニ加用テ効アリ○癲狂ニ治驗多シ一婦人ノ發狂ニ此越幾斯劑一刀ヨリ一錢ヘテ七日ニ一次或二次宛用テ治ス。或云此浸劑或散劑ヲ狂躁ノ患者四人ニ用テ皆全治セリ。或云黑膽液ヨリ發スル神思鬱憂悲悶錯亂ノ症ニ此根ヲ煎劑或越幾斯劑トシ用ルト日十五氏ニ至リ其毒ヲ瀉下ノ治驗ヲ得ル者甚タ多シ或此根ノ丁幾劑ニ酒石葉名ヲ加用テ極テ偉効ヲ稱ス○或惡厲ノ頑癬類ヲ治ス一小女惡厲ノ癬ヲ發シ潰爛臭穢甚タシ此越幾斯劑ヲ長服ノ愈ユ。或云此藥癩ニ用テ治驗甚タ多シ○小兒蛇蟲諸症ニ此越幾斯劑一刀撒兒末兒挿斯名半刃葛爾儒水名一弓右溶化シ蜜一錢ヲ加テ甘美トシ空心ニ一茶匙ヲ用テ殊効アリ○粘液質ノ睡疳卒倒ニ此

根ノ煎湯ヲ吉利詞<sup>キリ</sup>爹兒<sup>アーリ</sup>トシ腸<sup>ヲ</sup>刺戟<sup>ノ</sup>ノ大便<sup>ヲ</sup>導<sup>ス</sup>  
泄<sup>シ</sup>醒復<sup>ス</sup>○潰瘍瘻瘍ハ此煎湯ヲ蒸湯藥<sup>トシ</sup>排  
膿淨刷<sup>ノ</sup>良藥<sup>トシ</sup>或堅腫<sup>ヲ</sup>軟化<sup>ス</sup>○小兒惡厲潰  
爛ノ頭瘡ハ此煎湯ニテ蒸湯シ清血劑<sup>ヲ</sup>內服<sup>ノ</sup>治  
ス○此根ヲ搗<sup>テ</sup>麥粉<sup>ト</sup>葡萄酒<sup>ヲ</sup>加<sup>、</sup>琶布<sup>トシ</sup>腹部  
ニ貼<sup>メ</sup>水腫<sup>ノ</sup>停水<sup>ヲ</sup>驅泄<sup>シ</sup>治<sup>ス</sup>

**服量**細末ハ一二氏ヨリ十氏マテ服<sup>ス</sup>。越幾斯劑<sup>ハ</sup>  
半錢或二刀マテ用フ泡劑浸劑ハ三四錢マテ用フ  
依<sup>イ</sup>叔<sup>ソク</sup>淑<sup>ス</sup>華<sup>ハ</sup>密<sup>モク</sup>施<sup>シ</sup>

遠西醫方名物考補遺卷二 終

