

西 遺

醫方名物考補遺

卷三

✕

e/6

F 3  
E-19

卷26

499.2  
Em-6  
3

No. 1464  
18 e 16



富士川文庫

3321

遠西醫方名物考補遺標目

卷三

魚膠

附 獸膠

骨膠

鹿角膠

鹿角煎

鯨魚鱈亞喇蛄飲

制酸膠麥飲

諸厄利斯膏

安息香丁幾劑

括失亞

括失亞 皓姑飲

括失亞 麻橙散

括失亞 越幾斯劑

括失亞 丁幾劑

強壯藥總說

揮發衝動藥

保固強壯藥

單苦味藥

粘苦味藥

香竄苦味藥



收瀋苦味藥

葛斯加栗刺

葛斯加栗健胃丸  
葛斯加栗健胃丸  
葛斯加栗健胃丸  
葛斯加栗健胃丸

葛斯加栗西蓉丸  
葛斯加栗西蓉丸  
葛斯加栗西蓉丸  
葛斯加栗西蓉丸

葛斯加栗桂蓉丸  
葛斯加栗桂蓉丸  
葛斯加栗桂蓉丸  
葛斯加栗桂蓉丸

葛斯加栗丁幾刺  
葛斯加栗越幾刺

安偃斯黥刺  
安偃斯黥刺  
安偃斯黥刺  
安偃斯黥刺

安偃斯黥刺越幾刺

吉訥獲謨  
吉訥獲謨  
吉訥獲謨  
吉訥獲謨

吉訥獲謨丁幾劑  
吉訥獲謨丁幾劑  
吉訥獲謨丁幾劑  
吉訥獲謨丁幾劑



遠西醫方名物考補遺卷三

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

魚膠 一名魚鰾 又 鰾膠  
「イクステイオコルラ」羅

製法 「レイムヒス」膠魚ノ義一名「ホイセン」  
「ペンセル」或云「鰾」ノ

種 一名「クル」太魚ノ鰾ヲ取り洗淨シ半乾シ卷纏重

襲メ圓條ト作シ乾シ貯フ或其腸モ亦右ノ如ク疊

襲メ製ス或「ベリ」ト名クル魚ノ鰾ヲ取り製シ或

其皮腸胃鰭尾等ヲ取テ截判ミ湯ニ浸シ慢火ニ煮

テ盡ク溶化シ糊ノ如クナルニ至テ展テ幘ニ張り

殆ト乾キタル片<sup>ナ</sup>絢索ノ如ク卷テ能ク乾シ固封シ貯フ。大氣ニ觸レハ漸ク濕リテ黴腐ス。○上品ハ透亮白色乾固シ臭氣ナク味淡沸湯及水燒酒ニ溶化ス。尋常ノ品ハ微黃白色。下品ハ黃色ニノ臭氣アリ。黑色ヲ帶ル者ハ亞硫酸<sup>精</sup>硫黃ノ蒸氣ヲ薰スレハ故<sup>モト</sup>ノ如ク清白色トナル。○葡萄酒濁ル片ハ魚膠ヲ以テ清澄ト爲ス。其法魚膠ヲ適宜ニ溶シ是ヲ葡萄酒ノ桶中ニ注キ加レハ自ラ膜ヲ結ヒ酒中ノ渣濁ト共ニ漸ク沈テ凝結ス是ヲ毛篩ニテ濾シ去レハ其酒清澄ナリ。○魚膠ヲ水ニ溶シ沙糖ヲ加ヘ煮テ黃

色透明ノ膠汁トシ是ヲ紙ニ塗布シ乾シ適意ニ小ク截テ貯ヘ臨時ニ口津ニテ濕シ書簡ノ封膠ニ用テ簡便トス。○獸膠ノ上好ニメ潔白透亮ノ者ハ性効魚膠ト同シ藥用トスヘシ。諸<sup>ニ</sup>厄<sup>リ</sup>利亞<sup>ア</sup>國<sup>ニ</sup>テ上好ノ獸膠ヲ製ス其法左ノ如シ。○**獸膠製法**井池等ニ石灰ヲ投シ是ニ老獸ノ皮ヲ浸漬シ<sup>石</sup>灰<sup>ヲ</sup>加<sup>ル</sup>ハ皮<sup>ノ</sup>脂<sup>油</sup>ヲ除<sup>ク</sup>爲<sup>ナ</sup>リ。少<sup>シ</sup>壯<sup>ノ</sup>老<sup>獸</sup>ハ皮<sup>骨</sup>筋<sup>肉</sup>等<sup>ノ</sup>纖維<sup>硬</sup>取出<sup>メ</sup>能<sup>ク</sup>乾<sup>シ</sup>大<sup>ナ</sup>ル銅鍋ニ水ヲ入<sup>レ</sup>其皮ヲ投<sup>メ</sup>煎煮シ取出<sup>メ</sup>能<sup>ク</sup>搾<sup>リ</sup>其汁ヲ煎熬<sup>メ</sup>稠厚ト爲シ是ヲ平潤ノ銅鍋ニ

寫シ放冷ノ凝固セシメ適意ノ形ニ截テ網ニ付レ  
 掛テ乾固セシム○或獸骨。鹿角。象牙。野猪牙。鮫皮。特  
 牛脚。獸尾。革類ヲ以テ上好ノ膠ヲ製シ或兔皮ニテ  
 透亮清白ノ膠ヲ製ス。此類多クハ屠肉舖。諸骨匠。象  
 牙匠。皮革匠等ノ屑片ヲ取集メテ製ス或諸獸ノ膜。  
 腱。軟骨。關節ノ勒帶等ノ白色柔靱ノ者モ亦粘膠ア  
 リ且水ニ煮テ溶化シ易キ故ニ多ク膠ヲ製ス○獸  
 骨ヲ以テ亦上好ノ膠ヲ製シ魚膠ニ代用ス但尋常  
 ノ品ハ多ク黒色ヲ帶フ。故ニ上好骨膠ノ製法ヲ左  
 ニ舉ク。象牙膠。鹿角膠。モ是ニ同シ

骨膠製法

獸骨細屑六比 水二十四斤 右鍋ニ入  
 浸ス丁二日ニメ火ニ上セ煮丁四時半許。火ヲ下シ  
 放冷亦四時半許。渣盡ク沈ミ上清澄明ナルニ至  
 テ是ヲ傾寫シ其滓ヲ除ケハ上清十四斤アリ滓ヲ  
 絞レハ又二斤出ツ是ヲ鍋ニ付レ火ニ上セ水氣ヲ  
 蒸散メ稠厚ト爲シ火ヲ下シ放冷スル丁四分時ニ  
 メ是ヲ淺濶ノ盤ニ寫シ冷處ニ置凝固スルニ至テ  
 適意ニ截リ排置スレハ大抵十四日許ニメ乾固ス  
 骨屑六比ニテ透白膠十五弓半許ヲ製ス。象牙屑ハ  
 六比ニテ膠一比ヲ製ス○尋常下品ノ膠ハ水ノ量

ヲ多クノ皮骨等ニ含メル膠質ヲ盡ク煎出シ或武  
 火ニテ速ニ稠厚ト爲ス故ニ黃赭色トナル凡膠ノ  
 黃赭色トナルハ水多クメ久ク煎熬スルニ因リ又  
 長ク風乾スルニ因ル上好透白ノ膠ヲ製スルハ水  
 量ヲ少クスル故ニ煎煮久シカラスメ稠厚トナリ  
 又盤ニ寫スモ薄ク展テ速ニ乾固セシム尚是ヲ鮮  
 白色ト爲ニハ亞硫酸硫黃精少許和シタル水ヲ加ヘ  
 能ク振蕩メ混和シ煮ルナリ或初皮骨等ヲ浸ス水  
 ニ亞硫酸少許ヲ加レハ膠質能ク融解メ透白色ト  
 ナル○上好ノ膠ハ水ニ浸ス一兩日ニメ溶化セ

ス唯膨脹スルノミ然レ沸湯ニハ速ニ溶化ス硝子  
 器ノ破裂ヲ鐸テ固著シ能ク水ニ堪フ或膠水ニ格  
 綠波尼亞結麗土共名ヲ等分ニ加ヘ鐸テ尤良

○榕按ニ魚膠洋船ノ品ハ腐衣ノ如キ薄片ヲ卷  
 テ圓條ト爲シ長四五寸許徑五六分許勾屈メ輪  
 狀ヲ爲シ其兩端接スル處ヲ外側ニ反折メ是ニ  
 串ヲ刺シ掛テ乾シタル者ナリ微透亮潔白ニメ  
 臭味ナシ本邦ノ弓工等用ル者ノ比ニ非ス然  
 氏魚膠戸ニ命メ精製セシメハ多ク洋品ノ如キ  
 精好ノ膠ヲ出スヘシ本邦弓工用ル所ノ海鰻

鰔及鮫鰔ト稱スル者ハ共ニ魚膠ナリ海鰔鰔ヲ  
 上品トシ鮫鰔是ニ次ク鮫鰔ハ方ニ寸許厚四五  
 分許淡黃褐色微透亮ニノ腥臭ナク味淡泊洋品  
 ニ次ク故ニ洋品ニ代用ノ可ナリ此物藥舖ニ貯  
 ヘス弓材弓弦等ノ舖店ニアリ藥舖ニ販ク鮫鰔  
 魚鰔ト云者ハ皆黑濁ニノ汚臭アリ藥用ニ堪ヘ  
 ス弓工ノ鮫鰔ト混シ錯ト勿レ○漢渡ノ黃明膠  
 古渡新渡ノ阿膠上品ハ洋船ノ魚膠ニ代用スヘ  
 シト雖モ近來上品稀ナリ尋常ノ品ハ臭氣アリ  
 テ性味魚膠ニ劣ル故ニ藥用ニ充難シ○和製ノ

牛皮膠鹿膠及下品ノ鹿角膠龜膠等其質黑濁ニ  
 ノ腥臭アリ藥用ニ堪ヘス○又按ニ弓工用ル鮫  
 鰔ハ洋品ニ次ト雖モ是ヲ精製ノ鹿角膠ニ比ス  
 レハ劣レリ鹿角膠ハ西洋ニテ飲膳調理ニ供ス  
 故ニ食膠ト曰フ腥臭ナク清潔ニノ味佳シ尚且  
 潤涼滋養ノ効恐ハ魚膠ノ下ニ在ラス予西洋法  
 ニ擬メ試ニ鹿角膠ヲ製ス味清淡ニノ香臭ナシ  
 性味西洋ノ魚膠ト異ナラス即チ左ニ舉ル如シ  
 鹿角膠製法清潔淨白ノ鹿角屑ヲ取り清楚ノ磁  
 鍋ニ丹水適宜ヲ加煮テ軟化スルヲ候ヒ濾テ渣

各物考補遺 卷三 風雲堂藏

ヲ去リ。清液ヲ取テ文火ニテ煎熬シ。粘稠稀錫ノ如キニ至テ放冷スレハ凝固ス。是ヲ截テ適意ノ形トシ陰乾シ貯フ。

**鹿角膠** **試効** 滋養潤補ノ消化シ易シ熱病類ノ胃腸

感觸甚クノ飲食藥劑ニ堪ナル症或嘔吐下利腹痛等ヲ兼子或諸脫泄失血過多ニ因テ虛脫スル症ヲ治ス或沙糖。枸橼汁。列印設酒等ヲ加美味トス。鹿角煎モ亦効力鹿角膠ト同シ多ク後方ヲ用フ。

**鹿角煎**

鹿角煎 コクク。チム。アル。ヒム。セイ。デン。ハ。ミ。シ。ロ。デ。コ。ク。ト。コ。ル。ス。セル。ヒ。コ。ム。ポ。シ。ト。シ。ロ。

**鹿角屑**

白蒸餅心

各三勺

右煮減水ニ此トシ沙糖一系半攪和ス。

○藥舖清雅云魚膠ハ粘リ甚キ故ニ弓工是ヲ鹿

膠ニ交入用フ魚膠漢渡者上品者ス皆福建

南産ナリ往古ヨリ時々齊來ル。○和産ハ魚膠牛膠

共ニ攝州大坂玉造邊ニテ製ス。故ニ魚膠大

坂鰵ト呼ヌ。諸魚ノ白鰵ヲ以テ製ス。黒色ニ

者下品ナリ。○鮫鰵及海鰻鰵上品ナリ弓工ノ説

云鮫ノ裏皮ヲ削キ取テ製ス。ト云。海鰻鰵是ニ

如同シ京攝ニテ多ク海鰻鰵トス。故ニ海鰻



鋪ニテ海鰻鰔ヲ製シ又泉州堺ニテモ製ス上云  
 是皆魚鰔ナリ○藥鋪ニ京鰔ト呼フハ鯨鰔ヨリ  
 出タル名ナルヘシ曝鰔ト呼フ者ハ黃色ナリ是  
 ヲ黃鰔ト云上品ナリ一種灰色ノ者アリ黃鰔ニ  
 次ク○又鹿膠毛膠ハ大坂北方穢多町ニテ鹿皮  
 及牛馬皮ヲ以テ製ス上云○味鹹魚鰔ト云  
 試効魚膠獸膠効同シ凝體諸器ヲ滋養シ血液虧損  
 ヲ補充シ孳急ヲ緩弛シ酷厲液ヲ包攝シ枯燥ヲ津  
 潤シ疼痛ヲ和解シ諸液ノ稀涼酷厲ヨリ發スル諸  
 病勞效及羸瘦消削病或諸管弛虛ノ發スル諸竅ノ

分利脫泄過多ノ症ニ用フ但動物ノ藥類ハ腐敗ヲ  
 助ル故ニ腐敗ニ傾ク症ハ適應セス○欬嗽胸痛吐  
 血或淋疾小便艱澁刺痛或下利痛痢ヲ和解ノ治ス  
 ○咽喉口中胃管胃腸等ノ裏面剝脫潰爛ヲ愈シ赤  
 痢ニ用ルル亞刺比亞護謨等ノ樹膠類ノ如シ故ニ  
 愈創ノ一良藥トス○酷厲毒及酸敗液ヨリ發スル  
 胃痛腸痛ヲ治ス沸湯或水ニ溶シ服ス此藥ヲ嫌フ  
 者ハ桂水等ヲ加與フ○酸敗液胃ヲ刺戟ノ嘔吐休  
 マサル症ハ制酸藥ヲ加用テ殊効アリ喻ハ後方ノ  
 如シ亞刺比亞護謨

鯽亞刺姑飲

刺姑石

或刺姑爪 三錢

茴香水

六勺

魚膠漿

水二溶ス者 一十勺

亞的兒

二十五滴

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス。但イッモ每次其硝子壘ヲ振蕩スヘシ。否ラサレハ刺姑石塗渣トナル。○勞效様病ニ酸敗液ヲ兼ル者ハ左ノ方。治驗多シ。

制酸膠麥飲

大麥煎

十二勺

魚膠漿

水ニ溶ス者 二勺

桂舍利別

一勺

刺姑石

末 四錢

阿芙蓉液

二十滴

右調和シ半時若バ一時毎ニ二匙宛服ス。○近來間歇熱ニ魚膠ヲ用テ殊効ヲ稱シ幾那ノ代用藥ノ如クス。其法上好ノ魚膠十錢ニ水二勺ヲ加ヘ文火ニ溶化ノ糊ノ如シ。沙糖及香竄藥桂末ヲ適宜ニ加テ甘美トシ分テ三服トシ一服ヲ取テ發作ノ四分時前ニ與ヘ。一服ハ發作後十二分時ヲ經テ與、一服ハ其後六分時ヲ經テ用フ。次ノ發作亦右ノ如ク服ス。此劑間歇熱ノミナラス總テ往來熱。稽留熱ニモ良驗ヲ稱ス。但魚膠ノミナラス斯ノ如キ動物ノ膠類。傑列乙ノ精製淨潔ナル者皆右ノ如ク服メ効アリ。

ト云然<sup>レ</sup>此藥幾那ノ如キ効アル<sup>レ</sup>遵信シ難シ患  
 者原<sup>モト</sup>失血脫泄等ノ病アリテ血液虧損シ或貧家衣  
 食匱乏ノ饑寒ニ堪ヘス體力虛損ノ專ラ滋養補充  
 スヘキ間歇熱ニ良効アルナリ○魚膠ヲ吉利詞<sup>キ</sup>參<sup>テ</sup>  
 兒トシ危篤ノ赤痢ヲ救<sup>フ</sup>多シ其方魚膠<sup>ニ</sup>細<sup>判</sup>ヲ適  
 宜ノ大麥煎ニ加<sup>フ</sup>文火ニ煮<sup>テ</sup>濾<sup>テ</sup>八<sup>分</sup>ヲ取<sup>リ</sup>阿利<sup>キ</sup>襪  
 油<sup>ヲ</sup>蜂蜜<sup>ヲ</sup>攪和シ兩<sup>次</sup>ニ施ス○膀胱直腸等  
 ノ潰瘍亦吉利詞<sup>キ</sup>參<sup>テ</sup>兒<sup>ヲ</sup>殊効アリ其方魚膠<sup>者</sup>一<sup>分</sup>溶<sup>ス</sup>  
 沒藥油<sup>一</sup>錢<sup>蒸</sup>錮水<sup>六</sup>右調和シ施ス  
 外敷皮膚損傷剝脫或枯燥皺揭皸裂及火傷ヲ治ス

○此藥細末或水ニ溶シ或硬膏トシ施ス

**諸厄利斯膏** 肌皮摩傷剝傷淺膚ノ創傷等ハ此膏

ヲ貼ノ粘固牢著シ剝脫セス能ク蓋封ノ愈合ス輕  
 キ切<sup>キ</sup>割<sup>ハ</sup>是ヲ貼ノ針線縫合ノ術ヲ施サス能ク乾  
 愈ス水或津唾ニ濡シ患處ニ貼スヘシ

**製法** 魚膠 安息香<sup>丁</sup>幾劑 各等分

右合ノ磁鍋ニ内<sup>レ</sup>慢火ニ上セ膠能ク烱化スルニ  
 至リ毛刷ニテ黑色ノ光絹ニ塗リ貯ヘ聽用ス

**安息香<sup>丁</sup>幾劑**

**製法** 安息香<sup>末</sup> 適宜 燒酒<sup>二十度者</sup> 八倍

右硝子燻ニ丹蓋閉シ浸ス一六日。渣ヲ去リ固封シ

貯フ拔依福窓  
叔叔伍施

括失亞「クダシア。ア。マ。ラ。リ。ダ。ヌ。ム。多。シ。イ。ピ。ト。キ。ル。ニ  
ア。エ。ク。ス。セ。ル。サ。シ。羅。多。シ。イ。ホ。ウ。ト。蘭

〔形状〕南亞墨利加洲ニ産スル灌木ナリ葉小ニノ長

ク柳葉狀。三四對宛莖ニ排生シ皂葉狀ヲ爲ス梢末

葉ナシ葉梗ノ兩側托葉葉ニ似テ少アリ花十雄蕊  
耳ノ如キ者

一雌蕊第十綱  
第一目木皮灰白。薄ク粗糙。剝ケ易シ木材淡

白或灰黃。硬固ニノ輕シ根材ハ灰色味甚タ苦ク。香

氣ナシ。細キハ羽管ノ如ク太キハ腕ノ如シ太キ者  
苦味甚

根材形狀。幹ト同シ。○黧灰。青色。赭色ノ者或帶黑色

ノ條理アリテ苦味微ナルハ朽敗セル者トス或

ス。メト。ヒム樹ノ材ヲ以テ偽リ販ク者アリ偽品ハ  
名

皮滑澤ニノ黑色ノ斑點アリ。水ニ浸メ綠礬ノ溶液

ヲ加レハ黑色トナル。眞品ハ色微シモ渝變セス○

此樹。須里那模。及加利比設嶋共ニ南亞墨利ニ産ス  
加洲ノ地名

〔試効〕幹材。根材。皮共ニ用テ單苦味ノ保固強壯藥ト

ス性刺戟セス虛弱ヲ強壯シ胃ヲ健運シ飲食消化

ヲ扶ケ胃腸ノ敗液ヲ復シ苦味甚シト雖モ他ノ苦

味藥ニ比スレハ緩性ニメ胃ヲ妨ケス。尿管血液ヲ

刺戟セス。熱ヲ増發セス。大便ヲ瀉利セスノ胃腸ヲ健運ス。凡、苦味健胃劑的當ノ症ニ殊効アリ。是ヲ以テ間歇熱。胃虛及酸敗液ノ諸症。或腹痛ヲ兼子。或風氣痞脹苦滿。或萎黃病。依剝昆垓兒。子宮病。白帶下。黃疽。痛風。傷冷毒痛ニ甚夕驗アリ。或云性効健質亞那亞那珊篤里ノ性味効力。劇病後及漸久回復スル括失亞格綸僕ト同シ。劇病後及漸久回復スル症ニ用テ健胃ノ効ヲ稱ス。他人苦味藥ニ比スレハ尤胃腸ニ堪易シ。○春月ノ間歇熱ハ是ヲ用テ治ス。或云間歇熱ヲ治シ殊ニ發作次序ナキ頑固ノ往來熱ニ用テ熱毒ヲ驅除スルヲ殆ト幾那ノ如シ。○或

云顯著ノ發作ナクノ遷延暫留シ。感觸甚クノ虛罷スル熱病ニ多ク驗アリ。○黃疽及腸ノ虛罷セル下利ヲ治ス。○頑固ノ下利及勞瘵様ノ諸液溶崩ノ發スル下利。或殮泄多汗羸瘦スル症ニ此藥殊効ヲ稱ス。制酸收斂ノ品ヲ加テ尤良。喻ハ後方ノ如シ。

括失亞皓帖飲

括失亞 一錢半

右沸湯五弓ニ浸シ藥氣ヲ出シ濾テ後藥ヲ加フ

桂丁幾劑 三錢  
刺帖石 一錢

皓礬 七氏

右調和シ能ク攪合シ分テ三服トシ一服宛服スル  
 1日三次○劇キ下利ハ阿芙蓉ヲ加用テ捷効アリ  
 斯ノ如キ症ハ大抵煎劑トシ用フ然レ散劑ヲ好ム  
 者ハ後方ノ如ク製シ與ヘシ

**括失亞麻橙散**

麻屈涅失亞或蜚蝥石 橙皮黃 各二錢

括失亞四刀

右各別細末ノ合和シ分テ十四服トシ適宜ノ飲液  
 ニテ一服宛服スル1日四次○水腫ハ海葱ニ此藥  
 ヲ加用テ殊効アリ○胃腸虛罷諸管弛弱ノ諸病及

血液脫泄下利等收斂劑的當ノ症ハ後方尤良ト

**括失亞拳參丸**

括失亞越幾斯劑三錢 拳參根末 一錢

右研和メ三氏ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ一時毎ニ  
 六丸宛服ス○一婦人六十歳既ニ二十年以來胃  
 虛弱ニメ輕軟ノ食物モ重滯シ呼吸不利ス其後劇  
 キ胃痛ヲ發シ頻ニ嘔噦シ飲食受容難ク時々冷  
 水或赤葡萄酒白蒸餅少許ヲ嚥下スノミ精力虛罷  
 脉弱搏度齊ハス其疼由テ安眠セス小便黧澹  
 メ差濁リ大便平常ニ如茲是胃ノ神經纖維虛脆ニ

ノ感觸甚久。大ニ痙攣ノ運動ヲ發スル症ナス。故ニ括カク失シ亞ア丁テ幾劑三弓ヲ取リ一時毎ニ五十滴宛赤葡萄酒少許ニ滴シ與レハ此劑末夕三弓ヲ服シズ。胃痛嘔吐解散シ能ク食メ重滯セズ。因テ尚飲食ヲ節慎メ不日ニ全愈セリ。一男子四十四歲。資稟壯實。七週以來食進マズ。僅ニ食スレハ胃中ニ重滯者妨悶シ或胃口ニ梗塞メ下ラズ。故ニ飲食甚ク少ク或屢食ヲ絶ツテアリ是ニ由テ顔色黧澹。精力虛疲。全身羸瘦シ僅ニ舉動スレハ困倦メ臥床ニ偃シ或倚坐ス脉小數。大便軟。小便平常人如シ。乃括失亞丁幾

劑二弓ヲ取リ一時毎ニ五十滴宛葡萄酒少許ニ點服スルヲ三日ニノ精神輕爽。食ヲ欲メ胃ニ重滯セス。但大便三日通セス故ニ飲食ヲ節慎セシメ健胃下劑ヲ兼用ス。其方瓦爾拔奴謨ワールバヌモ律比九料リツヒ各二錢。右越栗失爾剝祿布利怛エリキシルポロブ利ト適宜ヲ加テ三氏ヲ一丸トシ沒藥末ヲ衣トシ每朝四丸宛服ス。尚其丁幾劑ヲ與フルヲ數日ニメ諸症回復シ全治セリ。其他炊衝ノ症ナキ胃病ニ此丁幾劑ヲ與テ治驗ヲ得ル者甚ク多シ。服量散劑トシ用テ稀ヒナリ多ハ泡劑。浸劑トス一刃

ヨリ半錢マテ沸湯或水八弓ニ投メ藥氣ヲ出シ用  
 不浸劑ハ一二匙宛服スル一日ニ數次或此藥四錢ヲ  
 取リ水十二弓ニ浸テ一夜ニメ用フ。水ニ浸シ搗ハ  
 苦味沸湯及水煎ヨリ多シ○越幾斯劑ハ一月ヨリ  
 一錢マテ丸藥トシ或桂水薄荷水葡萄酒等ニ溶シ  
 用フ○丁幾劑ハ十滴ヨリ六十滴ニ至ル○此藥水  
 ニテ蒸餾スレハ黃色苦味ノ露水出ツ

**括失亞越幾斯劑**

**製法**

括失亞クッシヤ細屑ニ比水二十比

右煮テ半ヲ減シ濾テ液ヲ取り其滓ニ水二十比加

煮テ半ヲ減シ液ヲ取ル。斯ノ如ク四回ニメ其液ヲ  
 合シ再濾シ慢火ニテ水氣ヲ蒸散メ密ノ稠トシ此  
 液五錢ニ亞刺比亞護謨ニ弓ヲ合和シ聽用ス亞此  
 材十六弓ヲ煎熬スル下四回ニメ越幾斯劑三弓半  
 出ツ。皮ハ是ニ倍ス。此劑僅ニ一氏ヲ取テ水四比ニ  
 溶セハ其水盡ク苦味トナリ黃色ヲ帶フ○或云此  
 劑前法ノ如クノ兩回煮レハ純粹ノ越幾斯劑トナ  
 ル。若三四回煮レハ必ス酒石酸純精酒酢漿酸酢漿  
 如キ酸性塩ノ加爾幾其液ニ出テ純粹ナラス

**括失亞丁幾劑**濕



製法

括失亞

搗碎者

燒酒

十五度者

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置テ三日渣ヲ去リ

固封シ貯ス

濕拔華叔施 依福叔窓

○按ニ括失亞格綸僕等ハ苦味ハ保固強壯藥ニ

屬ス但強壯藥ヲ數種ニ分ツ左ニ其說ヲ舉ク

強壯藥總說凡神經筋纖維其他諸器ヲ衝動シ生運

元力ノ頽弛沈衰セルヲ警發振起シ各自ノ運營ヲ

回復スル藥ヲ統テ衝動藥

蘭名「ブルケレン」強壯藥ノ總稱ト

曰ス是ヲ分テ二種トス一ハ揮發衝動藥トシ一ハ

保固強壯藥トス

揮發衝動藥

蘭名「ブルケレン」

此藥ハ全身諸器

殊ニ神經ヲ刺戟衝動ノ揮發活潑シ保固強壯藥ニ

比スレハ虚脱ヲ挽回スルヲ迅速峻捷ナリ然レ精

微揮發竄透ノ性多キ故ニ保固強壯藥ノ如ク體中

ニ保任持重スルヲ能ハスノ速ニ揮散ス即揮發衝

動ノ諸藥香氣竄透ノ鎮痙藥皆是ニ屬ス

揮發衝動ノ諸藥鏡

卷七ニ出ツ此藥ハ虚脱危劇ニ速ニ峻補セサレハ回

生シ難キ諸症或劇病ニテ諸液脱失精力虚竭或虚

憊甚ノ自然良能病毒ヲ分排スルヲ能ハサル症或

元運力罷弊沈衰ノ全身若ハ各部觸覺ヲ失ヒ昏冒

名物考補遺 卷三 風雲堂藏

不省人夏或諸器ノ運營衰損ノ壅塞若ハ脱泄ニ罹  
 リ或粘液質ニノ諸器ノ運營遲緩怠慢遷延病ニ傾  
 ク症ニ用フ。但虚極ノ症ニ用テ一旦的効ヲ得ル片  
 ハ恬然トシ是ヲ連進スルト勿レ否サレハ此藥ノ  
 峻力ヲ以テ大ニ生氣ヲ揮發ノ驅散シ逾危極ニ至  
 ルト宛モ生氣ヲ攻伐スル藥ノ如シ故ニ保固強壯  
 藥的當ノ症ハ揮發衝動藥。害アリ又初緩性ノ品ヲ  
 用ヒ効ヲ得ルニ隨テ漸々峻藥ニ移リ。既ニ的効ヲ  
 得ル片ハ復漸々緩藥ニ轉スヘシ。又時々藥品ヲ變  
 更スヘシ同性ノ藥ニ慣テ峻効ナケレハナリ。又外

敷藥モ長ク一處ニ施スナク其部ヲ變易スヘシ

**保固強壯藥**

蘭名トニセ。フルステルケニ  
 デシテレン。鏡卷七ニ出ツ 此藥ハ收

固性アリテ効力體中ニ保住持重シ。人身諸器ノ纖

維殊ニ筋纖維ノ張力筋纖維ノ運營ヲ  
 遲發スル牽張カ弛虚ノ縱緩

セルヲ保固ノ強健ニス。然レ保固力。收瀆藥ニ比ス

レハ緩弱ニノ衝動強壯力。揮發衝動藥ニ比スレハ

銳敏ナラス速ニ揮散セス唯自性ノ衝動力ニテ生

氣ノ衰弊頽弛ヲ強壯保固シ諸器ノ運營ヲ増發シ

平全ノ常調ニ復セシム○植物ノ保固強壯藥ニ含

メル苦味質ハ胃腸ヲ衝動健運メ飲食消化ヲ獎起

ス故一ニ健胃藥ト名ク。但苦味ノ多少ニ隨ヒ是  
ヲ分ツテ左ノ如シ

單苦味藥保固強壯藥中ノ苦味質尤多キ者ナリ

即括失亞格綸僕後健質亞那珊篤里睡菜等名

粘苦味藥保固強壯藥ノ苦味質ニ粘液質ヲ含テ

滋養緩和ヲ兼ヌ但發熱熾衝アリテ脉管大ニ刺

戟ヲ被ル症ハ害アリ即チ依蘭苔等ノ如シ

鹹苦味藥苦味質ニ塩質ヲ含ム者即チ單苦味質

ト中和塩ト合併ス故ニ保固強壯ニ解凝ノ効力

ヲ兼ヌ殊ニ胃腸ヲ衝動健運ノ粘液ヲ分利疏解

ス。胃腸ノ虛弱及粘液壅滯ノ發スル諸症ニ用フ

即チ葛爾儒失格列名紫堇蒲公英名麻爾羅名

傑尼斯託補動物ハ牛膽等ナリ

香竄苦味藥苦味質ニ華爾斯質及精微揮發ノ油

ヲ含ミ衝動起熱ノ性アリ故ニ保固強壯藥ナレ

ト揮發衝動藥ニ近シ。多血熾衝性ニメ大ニ脉管

ヲ刺戟スル諸症ハ戒慎ノ用ヘシ。粘液質ニメ血

液運行遲緩。溫暖氣減シ諸器ノ運營怠慢ノ症ニ

適應ス即チ桂土木香水楊梅根菖蒲根橙皮枸櫞

皮名葛斯加栗刺安屈斯名刺名攝爾扁答加名密列

亞爾鮮撒爾非亞名共ノ如シ

收瀉苦味藥苦味ノ保固強壯質ト收瀉質ノ合併

スル者ナリ總テ弛虛衰弱ノ諸病ニ用フ。但胃腸

ニ敗液汚物若ハ膽液質ノ惡液壅鬱スル症焮衝

病體質壯實ノ諸症。飲食消化ニ難キ症ニハ害アリ

然レ氏瀉下劑揮發衝動劑單苦味藥等ヲ加合シ

用レハ間良効ヲ得即チ幾那揚皮七葉樹皮共鳥

霍烏爾失補等ナリ收瀉苦味藥及ニ香竄苦○凡苦

味ノ保固強壯藥ハ劇疾緩病ヲ論セス病後若ハ

病勢漸ク退キ險症解散ノ後虛憊ヲ回復シ諸器

ノ運營ヲ助長シ或胃腸ノ虛弱ヲ強健ニシ飲食

消化ヲ増進シ或輕キ間歇熱ヲ制服シ或解凝ノ

効力ヲ以テ腹内諸器ノ壅塞ヲ疏解シ或惡液質

ノ水腫失苟兒陪苦諸腺病ヲ治スルニ用フ。外敷

ノ纖維弛弱經久愈サル潰瘍寒壞疽等ヲ治ス但

多血焮衝性ノ症ハ是ヲ禁ス

葛斯加栗刺レコロトシカスカリルラクムテアヘ

形狀亞墨利加洲ニ産スル灌木ノ皮ナリ此樹高七

八尺許。葉狹長ニシテ末尖リ刻缺ナク梗アリ淡綠色

背毛茸アリ。一樹ニ雄花雌花生ス。雄花ハ五瓣或云六瓣ノ小白花ニメ雄蕊十ヨリ十五ニ至リ上分下合ノ一體トナル。萼圓柱狀ニメ五齒アリ。雌花ハ瓣ナク一雌蕊分テ三頭トナル。萼瓣多シ花後實ヲ結フ淡綠色。大豌豆ノ如シ三室ニ分レ三子ヲ收ム第二十第一綱第

九〇此皮卷テ管ヲ爲シ長二三寸許。厚一分許。秤量目特ニ重シ。外面苔アリ糙皺。淡白。裏面滑澤。黯赭。粗皮ヲ去レハ銹銹色。破碎スレハ肌理滑澤ニメ華爾斯樣ナリ。味苦微辛。香竄樣。燒ケハ殊ニ佳香アリ或云此

ケハ微麝香及ヒ龍涎香ノ氣アリ是此樹字露把

ヲ眞品トス或煙草ニ雜テ佳香ヲ稱ス

刺寡乙共ニ南亞墨花地北亞墨利等ニ産ス〇此皮護謨及華爾斯多シ。一比ヨリ護謨七弓五錢二刀出。

越幾斯劑トスレハ苦味。越幾斯質其皮ノ三四分一出水ニテ蒸餾スレハ精微揮發ノ油出。綠色竄透ニメ枸櫞ノ香氣アリ。但シ多ク露水ニ混スル故ニ純粹ノ油ヲ得ルト甚尠ナシ。又酸性塩及些少ノ土質アリ燒テ淋灰汁トスレハ亞兒加利塩トナル其

**試効**香竄苦味ノ保固強壯藥トス。温煖收瀋壯神健胃ノ効ヲ稱シ生力ヲ活潑シ汗ヲ發ス。〇温煖氣減シ諸器ノ運營遲弱ノ症ニ適應ス。〇古來鎮痙ノ効

ヲ稱シ又幾那ノ代用藥トス今尚是ヲ襲用ス○性  
 功幾那ノ如クニメ精微揮發ノ油及ニ拔爾撒謨質ヲ  
 含ム故ニ幾那ニ比スレハ揮發衝動性多クメ壯神  
 健胃ノ効アリ是ヲ以テ幾那ニ堪ルル症ニ用フ其  
 揮發油及ニ華爾斯質拔爾撒謨ハ性熱メ溫壯收瀉シ大便  
 ヲ閉澁ス○體稟薄弱胃腸感觸甚キ者ニ幾那ヲ投  
 メ消化シ難ク重滯スル症ハ此藥ヲ與テ効ヲ取ル  
 アリ故ニ或幾那ニ勝ルト云○胃腸虛弱ニ因テ發  
 スル遷延病ニ用フ喻ハ飲食消化シ難ク或酸敗液  
 ヲ生シ或風氣痞悶胃瘕二種ノ腹痛二種ノ疝腹痛或屢嘔吐ス

ル等ノ如シ○凡、溫壯健胃ノ劑的當ノ症ハ左ノ數  
 方ヲ擇ミ用フヘシ

**葛斯加栗健胃丸**

葛斯加栗カスカリ末一 健質亞那ケンシツナ越幾斯劑ニ錢

右研和シニ氏ヲ一九トシ二十九宛用一日三次

**葛斯加栗健胃煎**

葛斯加栗カスカリ末一 桂丁幾劑各 錢

右水十弓ヲ加ヘ煮減以六弓ヲ取リ後藥ヲ加フ

右調和ニ時ニ一匙宛服ス○纖維諸管弛緩脆弱

粘稠液過多ノ諸病。下利諸失血。神經熱。間歇熱。發斑熱。胃腸熱等ノ虛憊スル症ハ是ヲ以テ幾那ニ代用スルニ用フ。○間歇熱ニ良効ヲ稱ス然レモ驅熱ノ効幾那ニ比スレハ劣リ唯胃腸甚々虚憊ノ幾那ニ堪サル症或數惡心嘔吐シ或劇ク下利シ或閉塞ヲ兼テ幾那ヲ用ヒ難キ症ニ適應ス。○頑固ノ間歇熱ハ此藥功ナシ但幾那ニ加レハ大ニ其効力ヲ扶ク或腹内諸藏壅塞アリテ幾那ノ害アル症ハ此藥ニ石

鹼質ノ解凝藥ヲ加與フヘシ。○此藥温壯衝動ノ性多シ然レモ過服スルニ非レハ熱ヲ發動セズ。肺氣管等ニ粘液痰飲過多壅滯セル經久ノ粘液病ニ用ヒ痰ヲ豁<sup>ハ</sup>易カラシム。故ニ遷延ノ胃寒效。痰效。痰涎壅盛ノ喘急。疫效ノ病毒ヲ驅除ノ後用。且頑固ノ傷冷毒ヲ緩解シ治スルニ鎮痙藥ノ如シ。○胸肺ノ諸症ハ此藥ヲ丁幾劑トシ三四十滴宛與テ驗アリ。海葱蜜ヲ加レハ肺ヲ疏通シ吐痰ヲ湧起メ尤良。○此藥ノ越幾斯劑一錢ヲ水一弓ニ溶シ用テ胸肺ノ諸症及吐血下血等諸失血ヲ治ス。○瘦削病殊ニ粘

液勞多ク痰ヲハ此藥能適應之他ノ強壯藥ニ勝リ  
 又幾那ニ比スレハ堪易ク又妨害ナシ○腸弛虛  
 以發スル諸症大便不調屢瀉下或下利荏苒トノ  
 宿疾トナリ或食消化セス溏泄スルヲ治ス○下利  
 及赤痢ニ効多シ殊ニ病末腸弛虛ノ保固ノ機力ヲ  
 失フ症ニ用テ强健ニ遷延頑滯セサラシム○下利  
 痢疾ハ病毒汚物ヲ滌掃ノ後此丁幾劑ヲ用ヒ胃腸  
 ヲ健運メ多ク治ス或忽弗滿液名ヲ加毎日二三  
 用テ尤良○赤痢ノ胃腸ヲ淨刷スレハ其毒尚除カ  
 サル症ハ毎夜左ノ丸藥ヲ與テ罷勞ヲ防護シ晝日

ハ排毒疏滌ノ劑ヲ與テ治ス

葛斯加栗芙蓉丸

葛斯加栗越幾斯劑二氏

阿芙蓉精製者 一氏

右研和ノ丸藥トシ一服トス○下利赤痢腸虛罷  
 荏苒タル症ハ此越幾斯劑ニ對症ノ藥ヲ加用テ殊  
 効アリ喻ハ左ノ二方ノ如シ

葛斯加栗西蓉丸

西瑪爾拔皮名

ニ錢

拔爾撒謨篤露一錢半

阿芙蓉精製者 八氏

葛斯加栗越幾斯劑三錢

右研和ノ百二十九トシ石松子鏡末ヲ衣トシ五丸



宛與 一日四次

葛斯加栗桂蓉飲

阿芙蓉液

半刀

桂水

四手

橙皮舍利別

半手

葛斯加栗越幾斯劑

三錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス○斯ノ如キ劑ニ大黃ヲ加用ル者アレハ的當セス。既ニ胃腸ヲ疏滌ノ効ナク收瀉劑ヲ與ル故ニ下劑ハ與フ當ラサレハナリ○腸瘍及腎膀胱尿道ノ膿瘍患部弛虚ノ遷延治セサル症ニ用テ健運強壯メ治ス○月經痔血過多。下血其他諸液脱失。諸竅排泄過度或潰瘍敗膿夥

ク漏洩スル勞瘵様ノ熱病或失血過度後及劇病後ニ發スル諸症ヲ治ス○血脉弛弱メ發スル粘液腫萎黃病。白帶下。或瘰癧諸症。依剝昆垚兒失苟兒陪苦等ヲ治ス○諸脱泄。失血過多ニ左ノ方捷効アリ

葛斯加栗收斂飲

明礬

一錢

加密列水

四手

亞刺比亞護謨

橙皮舍利別

各四錢

葛斯加栗越幾斯劑

一錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス

服量散劑ハ一刃ヨリ一錢ニ至ル或他藥ノ末。苦味

越幾斯劑ヲ加へ丸藥トス○泡劑煎劑ハ一弓ヲ水  
 八弓ニ煮テ濾過シ服ス。藥氣蒸散スル故ニ蓋閉シ  
 製スヘシ或揮發ノ藥液ヲ加用フ。水ニテ浸劑ト爲  
 スモ其量同シ○越幾斯劑ハ苦味ニメ香氣ナシ一  
 刀若ハ一錢ヨリ二錢ニ至ル丸藥トシ或他藥ヲ加  
 或桂末桂浸劑阿芙蓉液亞的兒其他健胃藥ヲ加用  
 ○丁幾劑ハ三十滴ヨリ六十滴ニ至ル○浸劑ハ此  
 藥ヲ粗末トシ煖處ニ置テ十二時ニメ濾シ用フ

葛斯加栗丁幾劑

製法

葛斯加栗細末  
 一弓

燒酒二十度者  
 八弓

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置キ浸ステ六日滓  
 ヲ去リ固封シ貯フ溼

葛斯加栗刺越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑名ト

同シ溼  
叔華  
叔華  
福華  
依華  
泊華  
密華

安僣斯點刺コルテクス。アニギスス。ララアンギスス。

形狀南亞墨利加洲ニ産スル一種ノ樹皮ナリ。此皮

卷テ圓管狀ヲ爲シ徑殆ト一拇半橫徑或云一長四

五寸許厚一分許或云五厘許。或云皮平潤外面粗糙

凹條アリ灰黃或淡白色ニメ灰色ノ斑アリ裏面滑

澤淡黃赭色肌理緻密。破碎スレハ纖條様ノ肌理ナ  
 久滑澤ニノ華爾斯様ナリ。味苦微辛鑽透シ稍香竄  
 様。桂ニ似テ不佳ナリ較著ノ香氣ナシ細末トスレ  
 ハ其色大黃末ノ如シ○姦高間大毒アル樹皮ヲ雜  
 へ販ク。是ヲ用レハ大害アリ或死ス。此品膚理麤ク  
 眞品ニ比スレハ濶ク厚ク或外面鍍鏽色ノ斑アリ  
 破碎スレハ滑澤ナラス纖條様ニメ灰白或鏽色ノ  
 斑點アリ味甚タ苦クノ嘔スヘク香竄様ナラス研  
 末スレハ乙百葛格安那或葯刺巴ノ末ノ如シ綠礬  
 ヲ水ニ溶シ是ヲ浸セハ黑綠色ヲ帶テ底ニ沈ム。是

ヲ以テ偽品ヲ辨スヘシ○此樹屈媽那及加祿泥亞  
 爾答瓦刺那多麻埤爾安偃斯黠刺嶋共ニ南亞墨  
利加洲地名ニ  
 産ス○此皮苦味ノ越幾斯質多シ是ニ粘液及華爾  
 斯。香竄質少許ヲ含メリ故ニ煎熬ノ光澤アル苦味  
 ノ越幾斯劑多ク出ツ。但收瀋質ナシ  
 試効香竄苦味ノ保固強壯藥トス。性功葛斯加栗刺  
 上一般ニノ揮發性アル故ニ葛斯加栗刺ノ効アル  
 諸病ニ用ヒ亦幾那ニ比スレハ性温熱ノ揮發衝動  
 シ重滯壅塞ノ害少シ○間歇熱。膽液熱。腐敗熱。殊ニ  
 發歇往來アル熱病ノ胃腸ヲ淨刷スレハ虛憊ノ淹

滯スル症。飲食消化ノ機力尚存スル症ハ殊ニ能ク  
 此藥ニ堪テ良驗ヲ得。間幾那ニ勝リテ効ヲ取ル  
 方ニ○間歇熱ノ胃腸大ニ虚罷シ幾那ニ堪サレ症  
 或劇キ下利ヲ兼ル症ヲ治ス○凡熱病胃腸ヲ疏滌  
 ヲ虚罷スル症ハ散劑トセズ越幾斯劑若ハ煎劑ト  
 シ用ヲ喻ハ後方ノ如シ

安偃橙荷飲

安偃斯皮 越幾斯劑 三錢  
 檳榔 六錢  
 橙皮水 六錢  
 薄荷 舍利別 六錢  
 右調和シ一時ニ一匙宛服ス○劇病後虚憊退力サ

ル症或胃腸虚衰ノ發スル下利其他胃虚ノ諸症。飲  
 食消化シ難キ症。依剝昆垚兒。子宮病。總テ幾那ノ効  
 アル症ニ驗アリ越幾斯劑トシ用テ尤良○發歇往  
 來アル頭痛。耳痛。齒痛。眩暈ヲ治ス○諸管纖維弛虚  
 血液酷厲毒アリテ發スル諸竅ノ漏泄病。殊ニ赤  
 痢ニ効アリ輕症ハ大黃ヲ加テ治ス○痢疾腐敗性  
 ニノ穢物稀ク水ノ如ク臭氣甚ク。黯赭色ニノ黑點  
 ヲ雜シ或多ク血ヲ下シ小便赭色。脉細弱。肌膚燔熱  
 ヲ粘著スル症ハ此藥適應ス。喻ハ後方ノ如シ

安桂芙蓉飲

安偃斯皮

桂

各四錢

右沸湯八勺煮減之六勺和濾之次以藥ヲ加フ  
 亞刺比亞護謨一錢 小舍電阿芙蓉液一錢  
 橙皮舍利別一錢 臭麻甚一錢  
 右調和シ半時毎ニ一匙或症ニ隨ヒ服量ヲ增加ス  
 服量散劑ハ一日ヨリ二錢ニ至ル。或一日宛但數次  
 用フ但消化シ難キ故ニ香竄驅風ノ藥ヲ加用フ是  
 ニ由テ胃ニ痞滯セズ煎劑泡劑浸劑ハ半勺ヨリ  
 一勺マテ水八勺ヲ加ヘ製シ滓ヲ去リ亞的兒等以  
 揮發劑ヲ等分ニ加ヘ用フ。或香竄ノ露水若ハ葡萄

酒ニ浸シ用フ ○越幾斯劑ハ丸藥トシ或他藥ニ合  
 シ一二錢宛用フ

安偃斯黥刺越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑名溼ト

同シ ○外敷ノ經久腐敗ノ潰瘍壞疽等ヲ治ス依福 華宛

吉訶護謨「ギムミキノ」 羅「キノ」 蘭「セゴム」

形狀一種ノ樹脂ニメ其質護謨華爾斯凡例ナリ

三種アリ ○第一種ハ亞弗利加洲ノ瓦模昆亞河ノ

邊ニ産スル樹ヲ鑽刻メ採ル。故ニ是ヲ「ゴムガムビー

ン」ト名ク。此品小塊ニメ硬固疏脆。黥赤帶黑色。

透亮ナラス。然<sup>レ</sup>氏微赤透亮ノ細塊ヲ雜フ。嚼<sup>メ</sup>ハ響アリテ半溶化シ津唾染色セス。甚タ收漚ノ佳味アリ。香氣ナシ。○第二種ハ北亞墨利加洲ニ産スル樹ヨリ出ツ。此品大塊ヲ爲シ黯赭色。破碎スレハ光澤アリ。華爾斯様ニメ邊透亮。磨ノ碎ケ易ク赤赭色ノ末トナル。嚼テ響アリ。初酸ヲ帶ヒ次テ甚タ苦ク收漚シ終ニ甘ヲ帶フ。二種共ニ燒酒若ハ水ニ溶化シ味收漚ニメ赤色トナル。是ニ綠礬ノ溶液水ニ溶ヲ加<sup>レ</sup>ハ綠色ノ渣トナリテ器底ニ沈ム。○或華爾斯類ヲ以テ是ヲ偽リ販ク者アリ。是ハ嚼テ粘著シ種

ク香氣アルヲ以テ知ルヘシ或血渴ヲ雜ル者アリ是ハ水ニ溶化セス眞品ハ能水ニ溶化ス。○第三種ハ新和蘭ヨリ輸ス。其塊大小齊シカラス。汚物ヲ雜ヘ黯赭色。嚼テ響ナク齒ニ粘著ス。但細砂雜リテ響ヲ爲者アリ味收漚シ後甘ヲ帶フ是ヲ下品トス

**試効性**收漚シ經久下利。虛脫ノ失血。婦人崩漏。淋疾疼痛。嗽衝治メ後。膿様ノ液止マサル症及白帶下ヲ治ス。○經久頑固ノ下利ハ每朝乙百葛格安那末二氏ニ沙糖少許ヲ和メ服シ每夜阿芙蓉劑ヲ用テ治シ或胃腸粘汚鬱滯ノ候アル者ハ吐劑若ハ下劑ヲ

與テ胃腸ヲ淨刷シ次ニ炒大黃ニ阿芙蓉ヲ加テ數  
日用ヒ仍治セサル症ハ收斂鎮痛劑ヲ與テ効ヲ取  
ルヘシ喻ハ後方ノ如シ

收斂鎮痛飲

桂水 六勺  
忽弗滿鎮痛液 二勺

吉訥護謨

精製者 赤石脂 三錢  
過爾託亞舍利別 一勺

右調和シ硝子壘ニ內固封シ貯ヘ用ルニ臨テ其壘

ヲ振蕩シ一時毎ニ一匙宛與ヘ且症ニ隨ヒ増減ス

○劇キ失血及諸竅脫泄過多ノ症ハ左ノ二方極テ

捷効アリ

吉訥蓉蓉散

明礬 一錢  
吉訥護謨 二十二分

阿芙蓉

二分  
右散劑トシ分テ六服トシ一時半毎ニ一服宛用フ

吉訥收斂散

固持ニ數實ニ置テ數日敷  
吉訥護謨 四分  
明礬 半刀

右研和ノ一服トシ一時半毎ニ一服宛與フ○吉訥

ニ苦味健胃ノ藥ヲ加ハ間歇熱ニ用テ良効ヲ稱ス

服量細末八十分ヨリ半錢ニ至ル或ニ三分宛明礬

沙糖ヲ加ヘ散劑若ハ丸劑トシ用フ○丁幾劑ハ一錢ヨリ二錢マテ一服トス

吉訥護謨丁幾劑

製法 吉訥 搗碎者 一匁

燒酒 二十度者 八匁

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置キ浸ス一三日。濾テ渣ヲ去リ聽用ス

又法 吉訥 一匁

燒酒 六匁

右硝子壘ニ内レ固封シ浸ス一三日。濾過シ其液ヲ取ル是レ醇厚ノ丁幾劑ナリ。又其滓ノ護謨質ニ水ヲ加浸ノ醇厚ノ溶劑 浸四匁ヲ製ス

外敷 吉訥護謨ニ亞刺比亞護謨ヲ加ヘ水ニ溶シ施

シ 吉訥ハ水ニ十分溶化セス一分ハ底ニ沈ム 創傷 是ニ亞刺比亞護謨ヲ加レハ能ク溶化ス

失血ヲ止ム ○此藥ヲ以テ阿煎藥或血竭ニ代用ス

ル一アリ (依) (福) (涅) (拔) (昆) (華) (威)



和蘭醫方及味考補遺卷三  
 一、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 二、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 三、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 四、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 五、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 六、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 七、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 八、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 九、和蘭醫方及味考補遺卷三  
 十、和蘭醫方及味考補遺卷三

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭內景醫範提綱

榛齋宇山先生著

全三冊

即學門植學啓原

全三冊

同 內象銅版圖

同上

全一帖

舍密開宗

每篇三冊完  
自初篇至七篇

增補和蘭藥鏡

同上

全六冊

醫療正始

每篇三冊完  
自初篇至七篇

遠西醫方名物考

同上

全五冊

泰西名醫彙講

全八冊

同 補遺

同上

全九冊

要術知新

全三冊

瘍醫新書

玄澤大觀先生著

全四冊

醫方研幾

每篇三冊完  
初篇二篇

蘭學階梯

同上

全二冊

同方劑篇

全二冊

蘭學佩觿

同上

全一帖

西音發微

全二冊

幼幼精義

素堂堀内先生著

每篇三冊完  
初篇二篇

病學通論

初篇三冊出來  
二篇三篇四篇  
世に出

濟生三方

杉田成卿先生譯

全四冊

青藜閣

須原屋伊八

