


遠西醫方名物考補遺

卷四



499.2
王4-6

No. 12 1465
e 16

卷26

遠西
醫方

名物考補遺

樸齋宇田川先生著

二篇

風雲堂藏版

青藜閣發兌

遠西醫方名物考補遺標目

卷四

石腦油

那布答

魏腦掃蟲飲 魏腦掃蟲丸

格綸僕

格綸僕健胃飲 格綸僕揮發飲

膽液熱 格綸僕排毒散

嘔吐 吐瀉病 下利赤痢

治例 五則

格綸僕試性說

富士川文庫
3322



格綸僕・浸液試說

格綸僕・越幾斯劑

格綸僕・丁幾劑

應的刺皮 附白桂

拔爾撒謨・篤露

拔爾撒謨・篤露・丁幾劑

拔爾撒謨・篤露・舍利別

拔爾撒謨・加拿太

拔爾撒謨・刺加失刺

拔爾撒謨・黑加拿大

遠西醫方名物考補遺卷四

揅齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石腦油

「ペトロレウム」羅

「ペーテルオリイ」蘭

性毘黙密那

〔名〕琥珀

人一種。土中華爾斯質ノ液ナリ。

地中ニ涌出スルヲ土油ト曰フ。性琥珀油ノ如シ。赭赤或赭黑色琥珀油ノ氣アリテ臭氣甚シ。黯黑色多キハ其質粗劣稠粘ニメ精微揮發ノ氣少々下品トス○一種。那布答ト名クル者ハ石腦油ノ上品ニメ氣味上好



ノ琥珀油ノ如ク精微稀薄透明白色ナリ。但是亦黃色ヲ帶ル者多シ。或云其白色ト云者モ大抵黃色ヲ
帶ヒ硝子壠ニ入レハ透白ナリ。但蒸餾スレハ白色トナル然此性能尋常ノ石腦油ニ勝レリ。是ニ硫酸油綠礮ヲ滴メ黑色トナラス熱淬ス。亞爾箇兒及燒酒ニハ溶化セス。上固ニ浮テ膜ノ如シ。煮沸スレハ蒸升メ飛散ス。水ヲ雜レハ自ラ分レテ上固ニ浮ム。或他ノ油類ヲ雜テ偽ル者アリ。赭色ノ琥珀油ヲ雜ル者ハ是ニ消石酸消石精ヲ滴スレハ麝臭ヲ生ス。的列竝油ビンヲ雜ル者ハ火ニ上セ熱メ的列竝ノ臭ヲ發シ且亞爾箇兒ニ滴メ溶化ス。其他粘油ヲ雜ル者ハ斯トナリ麝香氣ヲ生ス。琥珀油ヲ以テ製スル名ノ
製造麝香ト同シ。是ヲ以テ石腦油ト琥珀油ト同ル。那布答ニ硫酸若バ消石酸ヲ加レハ大ニ熱淬メ一種ノ華爾斯トナリ麝香氣ヲ生ス。琥珀油ヲ以テ製スル名ノ
性タルト知ルヘシ。○那布答ニ水ヲ加ヘ蒸餾スヒハ清稀ニノ精微竈透殆ト亞的兒ノ如キ油出ツ。植物ノ油兒亞的ニ比スレハ質重ク微酸性アリテ琥珀鹽ノ酸性ト同シ。焚燒スレハ烟ニ煤多シ其蒸餾壠底ニ黒色。華爾斯様ノ土質殘ル。此油久ク日ヲ經レハ精微ノ氣消散メ漸ク黒色ヲ帶ヒ粘稠トナル。

大氣ニ暴^{サラ}セハ凝固ノ瀝^{ナシ}ノ如シ○石腦油ハ那布答^{ナブダ}ニ比スレハ粘稠黒赭色臭氣甚シ。又硫黃ヲ含ミ能火氣ヲ引テ焰ヲ發ス此油ノ出ル地ヲ深ク堀レハ硫黃石炭鑿琥珀等アリ。是皆土中ノ華爾斯^{ハルス}ノ成ル所ニメ同種類ノ者トス○石腦油ハ油類拔爾撒謨^{ハルサム}類華爾斯類ニハ混和シ易シ其氣甚夕竄透シ木石磁器等ニ入貯^フハ速ニ透漏ス故ニ硝子壠ニ内固封シ貯^フヘシ。是亦大氣ニ暴セハ凝固ノ瀝^{ナシ}ノ如シ○此油ニ水ヲ加蒸餾スレハ精微稀薄ニノ揮發竄透スル油出ツ黃白色ニメ香氣アリ

試効甚夕竄透刺戟シ小便ヲ驅泄シ性効殆ント琥珀油ノ如レ又強壯驅風稀釋淨刷愈創ノ効アリ○驅蟲ノ峻藥トス竄透ノ臭味ヲ以テ能蟲ヲ刺戟シ膠粘ノ油質ヲ以テ蟲ノ氣孔ヲ遏絶シ大便ニ驅泄ス。蛇蟲ニハ五滴許宛飲液ニ點服ス條蟲ハ八十滴テ用フ。又是ヲ臍部ニ擦テ殊ニ良○一男子條蟲ヲ患殺蟲劑ヲ投スルヲ數週。唯蟲ノ碎片ヲ下スノミ因テ石腦油ト的列竝油各半錢ヲ調和シ分テ三服トシ用テ蟲ノ全形盡ク下リ治ス○一婦人條蟲ヲ蟲ヒ早朝右ノ油劑三十滴ヲ用テ蟲下ラス因テ午

時頃四十滴ヲ與レハ死蟲一丈四尺餘ヲ下ス○蟲症ニハ阿魏ヲ加用テ殊ニ良凡、蛇蟲、條蟲共ニ左ノ方峻効アリ

魏腦掃蟲飲

石腦油 半錢 阿魏丁幾劑(名) 六錢

右調和シ一時毎ニ一卵匙宛白湯ニ點服ス○此臭氣ヲ惡ム者ハ丸剤一シ用ベシ後方ノ如シ

魏腦掃蟲丸

石腦油 二錢 阿魏 末 三錢

健質亞那(名) 未 適宜

右研和シ三氏ヲ一丸トシ一時ニ三丸宛服ス○條蟲ハ月ノ下弦ニ石腦油二十滴若バ三十滴ヲ水ニテ一次ニ服シ是ヲ三日連服ノ第四日ニ下剤ヲ用レハ蟲大便ニ下ル。若シ下ラサレハ又翌月ノ下弦ニ前法ノ如ク服スヘシ蟲必ス下ルナリ
 ○痛風。傷冷毒痛。流走痛。腰痛等ノ熱性煥衝人候十
 ク纖維諸管弛弱ノ症ハ此油ヲ内服シ若バ患處ニ
 擦メ治ス○水腫。小便閉ニ是ヲ内服シ或臍及腎部
 ニ擦テ能小便ヲ利ス○婦人經閉ヲ通スル一良藥
 トス。十滴ヨリ十五滴マテ飲液ニ點服ス

外敷溫緩強壯シ凝血ヲ疏散シ疼痛ヲ止ム。効力的
列竝底那油ニ減セス○肢節麻痺不遂或寒腫冷痛。

焮熱ナキ痛風等ノ患部ニ擦メ効アリ○凍瘡皸裂
皸跟等此蒸餾油ヲ擦ハ精微ノ硫氣竄透ノ壞液ヲ

排除シ潰爛ヲ遏テ乾愈ス或酷寒風雪ヲ冒メ各部
腫起強拘癆痺疼痛スル者ハ是ヲ患部ニ擦テ治ス

○齲齒痛ハ是ヲ綿ニ浸シ齲孔ニ挿テ治ス○角膜
斑翳ニ是ヲ點メ消散ス

羅依福國

格縫僕コロムボタルトル蘭

形状灌木ノ根ナリ然氏尚未詳ノ植物ニ屬ス或云
蒲里阿尼亞アノ一種ニメ始メ亞墨利加洲ニ產シ。
錫蘭ノ格弄坡ニ移植シ是ヨリ諸國ニ培殖ス
度南海ノ島名格弄坡ハ印錫蘭ノ西南瀕海ノ都府也
云。メニスペル江ム。バルベ左ムト名クル灌木ノ根
ナリ瑞利杻斯嶼ア弗利加ノ島名ニ產ス○此根太ク長シ
是ヲ横斷ノ扁圓ノ切片トシ曝乾ス。徑小ナルハ四
五分許。大ナルハ二寸三四分許。兩面粗糙淡黃色或
綠黄中心髓様綠黃ニメ柔嚼メハ粘滑其外圍ハ木
樣黃色其邊ハ皮ニメ厚ク水棉様ニ皺縮シ外面黯

赭色。右三個ノ質。各帶黑色ノ輪紋周匝ノ區分ス。乾
固スレハ邊高ク中凹ナリ。厚キ切片ハ小孔ヲ穿キ
串ニ貫キ乾固ス○味苦。微辛。收濁不佳。稍白芥子ノ
味ニ似テ微香竈氣アリ。陳久ニメ揮發油脫スレハ
鑽透セス。硝子壠若バ 盆ニ内レ固封シ貯サレハ香
氣脱シ蛀敗ス○此根苦味ノ越幾斯質多シ。亞兒加
利塩ヲ帶テ赭赤色。粘滑ノ粉麪質ヲ含テ粘液多シ
故ニ煎劑ハ腐敗シ易シ○水ニ浸セハ香氣アリ然レ
蒸餾ノ精微ノ油出ルト大シ。
試効單苦味ノ保固強壯藥トス虛弱ヲ強壯シ胃腸

ヲ健運シ腐敗ヲ防止シ粘滑質ヲ含テ緩和鎮痛ノ
効アリ○腐敗酷厲ノ膽液ヲ回復シ酸敗液ヲ消シ
嘔吐下利ヲ止メ吐瀉霍亂ヲ治シ風氣ヲ驅散ス○
胃腸虛罷ノ消化ノ機力虧損シ食欲ヲ失フ症。殊ニ
膽液變敗ノ諸症ヲ兼ルニ用フ○飲食消化シ難ク
ノ汚液ヲ生シ恶心嘔吐腹痛。風氣痞悶心下苦滿腹
脹等ヲ患ル者ハ此藥ヲ散劑トシ香竈ノ藥ヲ加用
テ殊効アリ或症ニ隨ヒ大黃丁幾劑鏡若ハ壯神健
胃ノ下劑ヲ兼用メ良○膽液虧乏ノ飲食消化セス
右ノ諸症ヲ發スル者ハ牛膽ヲ加丸藥トシ用ヘシ

飲食能ノ消化ノ食欲生シ諸症治ス○善饑異嗜及口味失常ノ症ヲ治ス○胃中酸敗液アリテ風氣痞悶腹痛不食等ヲ患ル者ハ此藥ニ香竄佳味ノ藥ヲ加殊ニ橙皮桂等ノ健胃藥ヲ加ヘ或症ニ隨ヒ蛔蟲石麻煩涅失亞等ノ制酸藥ヲ加ヘ或亞刺比亞趨謨等ノ粘滑緩和藥ヲ加ヘ或甘酸精越栗失爾赫篤立遏設印亞的兒等揮發壯神夾涼劑ノ云皆名ニ出ト加ヘ或阿芙蓉液等ノ鎮痙止痛藥ヲ加ヘ用ヘシ○右ノ諸症ニ後方多ク治驗アリ

格綸僕健胃飲

格綸僕越幾斯劑一錢 桂水 四弓

扁桃舍利別名 四錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス○依剝昆姪兒ニ此根及括失亞偉効ヲ稱ス是ヲ用テ酸敗液ヲ驅除シ風氣痞滿大便不調下利等ヲ治ス感觸甚キ症ハ煎劑トシ亞刺比亞護謨等ノ粘滑緩和ノ藥末ヲ溶化シ用ヘシ感觸遲鈍ノ症ハ能ク刺戟ノ藥ニ堪テ良驗アリ喻ヘ後方ノ如シ

格綸僕揮發飲

格綸僕 四錢

亞兒尼加花名 一錢半

右水適宜ヲ加煮テ五弓ヲ取り滓ヲ去リ後藥ヲ加

揮發香竄精 圖一錢半 橙皮舍利別

鏡五錢

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス○此根膽液腐敗ヲ挽回スル奇効アリ故膽液酷厲毒ノ諸病ヲ治ス膽液熱膽液熱ノ一良藥トス。此熱病ニ罹レハ大抵此藥ヲ投メ病毒ヲ驅除シ治ス。殊ニ腹痛アル症ハ中和塩ヲ加テ酷厲毒ヲ驅泄メ尤良。喻ハ後方ノ如

格綸僕排毒散

格綸僕 細末

孕鹼酒石

各一錢

右研和シ分テ六服トシ二時毎ニ一服宛冷水ニテ

服ス或此根十五氏若ハ二十氏ニ中和塩孕
鹽等等分。若バ一倍量ヲ加ヘ一服トシ其症外緩急ニ隨ヒ二時或二時半或三時毎ニ服スヘシ。凡中和塩ハ煖熱ヲ涼解シ煩渴ヲ滋潤シ大便ヲ滑利メ熱毒ヲ驅逐シ格綸僕ハ虛罷ヲ資補ノ保護シ速ニ胃腸中腐敗ノ沸釀ヲ制止ノ惡心嘔噦ヲ降鎮ス。此劑ヲ服メ大便開利スル外此根ヲ泡瀉トシ收斂亞的兒名ヲ加テ微酸味ト爲シ用ベシ○近年一種ノ膽液熱流行ス。勉テ胃腸ノ汚物、酷厲ノ膽液ヲ驅除スレ由仍惡寒發熱往來歇々ス。其症宛王間歇熱ノ

如シ。幾那ヲ與レハ熱勢却テ増劇ニ舌乾燥ス。然ニ
格綸僕ヲ與レハ惡心嘔噦懊憹苦悶忽チ寛解。熱
勢漸ク潰散シ諸症隨テ輕快ス。是膽液ノ腐敗酷厲
ヲ回復シ。熱毒ノ虐勢ヲ挫剋シ胃及全體ノ諸管纖
維ヲ收固メ強健シ病毒復存陷ノ襲戟スルヲ防止
スル殊能アトハナリ故ニ幾那及安質沒扭ノ如ク
驅熱ノ偉効アルヲ毫疑ナシ○亞墨利加地方ハ極
テ惡厲ノ膽液熱流行ス。其症惡心懊憹烈ク頻ニ嘔
逆ノ夥々膽液ヲ吐シ或嘔吐連綿ノ沙間モ休不ス
或暫時ニ驚異スヘキ多量ノ膽液ヲ湧吐シ。熱勢児

猛煩悶極テ烈ク幾那ヲ與レハ毫モ胃ニ受容セス。
咽ニ下レハ卽吐ス。此病總テ格綸僕ヲ與レハ能ク
受容メ諸惡症速ニ寛解シ回生ノ奇効ヲ得ルヲ邦
人ノ知ル所ナリ

嘔吐 酷厲ノ膽液ニ因テ嘔吐シ腹痛ヲ兼ル症和蘭
ルコレハ此藥殊効アリ但シ安那少許ヲ與ヘ次テ格綸僕ノ泡劑ヲ用レハ胃ヲ
灌刷メ能ク吐スルヲ加密列泡劑ヲ與ルカ如シ是
膽液湧溢ノ刺戟ニ因リ若バ吐劑ニ因テ發スル劇
キ攣急ヲ防止スレハナリ或腹痛ニ乙百葛格安那

少許宛用ヒ微惡心ヲ發スル時至テ鎮痛ノ効ヲ取
フアリ。然ニ或是ニ由テ大ニ嘔吐ヲ發メ更ニ險重
ノ諸症ヲ啓發スル者アリ然ニ乙百葛格安那ニ香
竄佳味ノ藥ヲ加ヘ。格綸僕ホウボクノ泡劑ヲ以テ送下スレ
ハ右ノ如キ過誤ナシ○胃ノ感觸甚クメ發スル嘔
吐及酸敗液ヲ兼ル嘔吐ハ此藥ニ香竄藥ヲ加用ヒ
テ治ス○遷延嘔吐。或胃虛衰ノ麻痺シ飲食ヲ受容
スレハ轉輸スルト能ハサルニ因リ或胃ノ感觸甚
フメ飲食ノ受容ニ堪サルニ因リ或津唾汚液アリ
テ口味惡キニ因リ或酸敗液。酷厲ノ膽液。脾液。過多

腐敗等ニ因テ發スル經久淹滯ノ嘔吐ハ此藥ニ香
竄藥若バ鍊劑。制酸劑ヲ加ヘ用ヒ治スヘシ○腎痛
ニ因テ屢々嘔吐スル症ハ緩和劑及輕キ利尿劑効ア
リ然ニ格綸僕ホウボクヲ稀キ薄荷水ニ浸シ用ヒ捷効ヲ得
ルト多シ○姪婦ノ惡心嘔吐甚キ症モ亦此藥ヲ稀
キ薄荷水ニ浸シ用ヒ効アリ但麻僵涅シヤク失亞シヤヲ用ヒテ
常ニ大便ヲ通利シ甚夕多血症ハ刺絡ノ捷効アリ
吐瀉病此藥吐瀉霍亂ニ奇効アリ。腐敗膽液ヨリ發
スル吐瀉病ヲ治スレハナリ○児猛ノ吐瀉病羅甸
屬スレラモル即チ膽液腐敗酷厲ノ病ハ預メ吐下劑ヲ用ヒテ
霍亂吐瀉是ニ

膽液、醋厲毒ヲ驅除スルニ及ハス。直ニ此藥ヲ用ヒテ吐利、急腹痛等危劇ノ諸症ヲ寛解シ。胃腸失常ノ運動ヲ靜止シ。頓ニ精力虛脱ヲ挽回ス。印度地方ノ貢舶時々此病一般流行シ毎日死スル者甚夕多ク治スル者稀ナリ。然ニ始テ此藥ヲ試用ヒ死スル者鮮ク大抵救活セリ。斯ノ如キ必死ノ病ニメ回生ヲ得ルハ實ニ此藥ノ殊能ニ係ルト顯然タリ。此根細末トシ病勢ノ緩急ニ隨ヒ半錢ヨリ二錢トテ一服トシ。一時半或二時毎ニ用フ○虛弱ノ小兒嘔吐及下利劇キ者ハ麻僵涅_{子レア}失亞・蟬蛻石等ヲ加用ヒテ多ク驗

アリ○小兒生齒ニ因テ嘔吐或下利ヲ發シ諸藥効ナキ症_ハ此藥ヲ用ヒ治ス此症大抵酸敗液ヲ兼ヌ。此藥ハ酸敗液ヲ消スル効極_テ峻カリ麻僵涅失亞若_ハ結麗土少許ヲ加_テ尤良_ト○此藥諸腸ノ弛虛罷弱ヲ強健_ス。經久下利或赤痢。痛痢。重墜努責等ノ病末ニ用ヒ効アリ。症ニ隨ヒ阿芙蓉ヲ加_テ良_○此藥收斂スレ氏鎮痙ノ効アル故ニ胃腸失常ノ運動_ハ鎮靜メ下利赤痢ヲ治シ初發收濁劑害アル症_ト雖_ハ閉澁_タ妨害ナシ但専ラ虛憊_ヲ挽回シ腐敗ヲ防_ハニ_ハ病毒大抵減メ後

用テ殊ニ良○膽液酷厲毒ヨリ發スル下利赤痢ハ
中和塩類ヲ加ヘ症ニ隨ヒ増減シ用テ治スヘシ○
勞瘵ノ病末。發スル溶崩下利ヲ止ル一良藥トス○
下利ニ風氣痞滯ヲ兼子溫沫ヲ雜、テ水瀉シ食欲ナ
キ症遷延ノ滯患十ナル者ハ是ニ肉豆蔻若ハ百
葛格安那少許ヲ加ヘ用テ治驗多シ○下利赤痢ハ
症ニ隨ヒ香竈藥阿芙蓉劑鍊劑ヲ加用テ良○此根
嘔吐下利ニ經驗セル治例ヲ左ニ略舉スヨウジ大亞
第一 一男子八月大ニ勞力發汗メ冷氣ニ胃觸シ劇
ク吐瀉メ腹痛シ煩躁休マサルト十二時精力大ニ

虛脫ス乃チ格綸僕末ニ刃ヲ取テ薄荷水ニ和シ一
時半或二時毎ニ與レハ諸症解散シ速ニ回復ス其
後勞力ノ所業ヲ爲シ復前症ヲ發ス即チ前方ヲ與
テ全愈セリ十六處以良藥善之

第二 一男子八月下旬偶下利ヲ發シ三日ニノ大ニ
增劇シ腹痛極テ甚シ又頻ニ嘔吐メ四肢痙攣ヲ兼
ヌ即チ此藥ヲ散劑トシ一刀ヲ與レハ吐下半ヲ減
ス因テ二時毎ニ一刀宛用ヒ九服ニノ回復ス

第三 一婦人四月下旬產後腸痛ヲ發シ腹脹苦滿メ
數下利シ便色及其稀稠酥ノ如シ舌白苔アリ肌膚

枯燥灼熱シ脉百動ヨリ百十五動許。下利。腹脹痛。夜分殊ニ甚シ。此症乙百葛格安那ヲ與テ吐セシメ。又阿芙蓉劑。越栗失爾赫篤立沃利。收濇劑。清涼劑ヲ投メ寸効ナシ。因テ格綸僕ヲ取テ桂ノ泡劑ニ浸メ濃ク泡出シ一茶碗ヲ用ヒ。毎ニ下利腹痛輕差シ連服五日ニメ全治セリ。

第四 一男子二十六歳六月酷暑ノ候偶、往來熱ヲ發ス。一醫吐劑及下劑ヲ與ヘ又中和塩類ヲ飲劑トシ與ル。凡三日。些モ輕快ヲ得ス。頻々恶心嘔噦ノ屢。綠色ノ膽液ヲ吐シ舌苔アリ。肌膚灼熱乾燥。大便壅閉。

頭痛劇ク。且背疼ミ。肢體懈惰疲困甚シ。脉百二十動許。乃チ吉利詞爹兒ヲ施シ。孕礬酒石二刀ヲ取り。格綸僕ノ泡劑三匙ニ研和メ一服トシ與レハ恶心嘔噦頓ニ輕差ス。因テ二時毎ニ一服宛用フ。是ニ由テ下利シ。其熱及諸症悉ク解散ス。但第十一日ニ當テ大便血ヲ交ヘ下ス。下兩次。患者疲困ス。因テ幾那ヲ取テ對症ノ收濇劑ニ加ヘ與レハ便血止テ體力漸ク復シ平愈セリ。

第五 一小兒二歲。六月二日。生齒ニ由テ劇ク吐瀉スル。三日。虛憊甚シ。因テ格綸僕末五氏。蟹爪末三氏

ヲ調和シ與レハ嘔吐頓ニ止ミ次テ下利止ミ兩日

中ニ回復ス

格綸僕試性說 **第一** 七月酷暑ノ候。幾那ト格綸僕ノ冷浸劑各一弓ヲ取り各別ニ兩個ノ硝子壠ニ呑レ牛肉ヲ細ニ剉ミ二錢宛加ヘ南窓ニ置ク二日二夜格綸僕浸ノ牛肉ハ稍腐臭アリ。幾那浸ノ牛肉ハ完好ニメ臭氣ナシ。其後五時ヲ經テ仍腐敗セス。然ハ幾那ハ肉類ノ腐敗ヲ防クト格綸僕ニ勝レリ。但牛肉二錢ヲ冷水ニ浸シ置ケハ一晝夜ニノ腐敗ス。**第二** 幾那上格綸僕ノ冷浸劑一弓宛各別ニ硝子壠

ニ呑レ又右ノ冷水ニ浸ノ腐敗セル牛肉ヲ等分ニ取テ前說ノ兩浸劑ニ加ヘ浸メ三時ヲ經レハ俱ニ臭氣減消ス。但格綸僕ハ差臭氣アリ **第三** 小硝子壠四個ヲ取り各腐敗ノ牛膽液三錢唾液二錢宛内レ唾液ノ性胃液是ニ幾那浸劑。格綸僕浸劑。加密列浸劑。泉水一弓宛各別ニ加ヘ重湯罐中ニ置ク(重湯ノ華氏驗溫器)百度トシ。幾那浸ハ其膽液唾液ニ混ノ忽チ凝固シ臭氣増益ス。加密列浸ハ膽液ノ腐敗及稀稠惡臭少シモ渝變セス。格綸僕浸ハ能ク膽液唾液ニ混和メ速ニ腐敗ヲ制止シ臭氣消去ス。然ハ是膽液腐敗

ヲ制止回復スル性力最モ秀偉トス○右ノ諸浸剤。
重湯中ニ在レ一時半許ニメ臭氣大ニ減ス。唯泉ノ
浸液ノミ臭氣除カス三時ヲ經テ皆臭氣消ス。但泉ノ
ノ浸液ノミ臭氣アリ。幾那浸ハ多ク漚沫泡起シ化
釀ノ酒氣生ス。六時ヲ經レハ格綸^ボ僕及如密^{ヒカミル}列浸ハ
膽液ノ慄悍氣增加メ毫モ惡臭ナシ。幾那浸ハ其漚
沫ノ泡釀減シ酒氣差^ヤ消ス。十二時ヲ經テ泉浸甚ク
腐壞シ。幾那浸ハ酸敗ス。格綸^ボ僕浸^ム加密^{ミル}列浸ハ尚腐
敗氣ナシ。然レ十五時ヲ經テ腐敗シ二十四時ニメ
極^ヨテ惡臭ヲ生ス○格綸^ボ僕浸ハ右ノ如ク膽液ノ腐

敗ヲ挽回スルノ峻駛ナルヲ以テ兇猛ノ吐瀉病霍
亂。暴厲ノ膽液熱等。一切膽液泛溢腐敗ヲ兼ル諸病
ニ奇効アルト知ルヘク又膽液諸病ノ初發吐劑及
下劑等ニテ腐敗ノ膽液ヲ驅除セス直^ナ此藥ヲ用
テ捷効アル所以ヲ明證スルニ足ル○幾那浸ハ腐
敗ノ膽液速ニ凝固シ惡臭增發スルヲ以テ觀レハ
前說ノ亞墨利^{アーリカ}加地方ノ兇暴ナル膽液熱^ノ吐^ク脣液
ニ醫家屢^シ幾那ヲ投スレ氏胃ニ受容セス絶^タテ効驗
ナキ所以ヲ曉了スルニ足ル。然ニ格綸^ボ僕ヲ與^レハ
忽チ膽液ト混和ノ腐敗ヲ回復シ惡臭ヲ奪去シ良

性ト爲ス故ニ其惡厲危劇ノ病患ヲ救活スル一聖藥タルト亦顯然タリ第四幾那浸格綸僕侵。加密列浸。及冷水各一弓宛。各別ニ四個ノ硝子壠ニ内レ。是ニ各牛膽三錢。唾液二錢。宛加ヘ。爐ノ邊。大抵血溫度口中ノ處ニ置。三時。即チ其浸液皆泡釀ス。幾那浸ハ多ク溫沫泡起シ酒香生ス。格綸ボ僕浸ハ泡釀微ナリ。水浸ハ十二時ニノ腐敗ス。幾那浸ハ二十四時ニノ酸敗シ。加密列浸ハ微腐敗ス。格綸ボ僕浸ハ微モ變敗セス。其氣佳好ナリ。○右ノ諸試說ヲ以テ觀レハ幾那浸ヲ新鮮ノ膽液ニ加フ。レハ凝固シ腐敗膽液ニ

加フ。レハ凝固殊ニ甚シ。又幾那ハ肉類ノ腐敗ヲ防止スルト。格綸ボ僕及加密列ヨリ峻ナリ。然氏格綸ボ僕ハ幾那ノ如キ泡釀ノ變化ナクノ膽液ノ腐敗ヲ防止ス。是ヲ以テ能ク膽液腐敗ノ諸病ヲ治シ又腐敗膽液及津唾ノ變性缺乏等ニテ飲食消化シ難キヨリ發スル諸病ニ効アリ第五格綸ボ僕ト加密列。白芥子ト飲食ノ烹釀消化ヲ扶ル効力ヲ比較シ試心。アリ。其法。石臼四個ヲ取り各蒸餅心二錢。炙羊肉者細搗二錢。唾液四錢。宛内レ。是ニ一ハ格綸ボ僕浸。一ハ加密列浸。一ハ白芥子浸。各一弓宛加ヘ。一ハ水四錢ヲ加

ヘ各熟研合和シ。是ヲ各別ニ硝子壠ニ内レ置ケハ其水浸劑ハ六時中ニ泡釀シ他ノ三劑ハ十五時中ニ泡釀ス。但格綸僕浸ハ泡釀最モ遲シ。水浸劑ハ二十四時ニメ酸敗ス。加密列浸ハ三日ニメ酸敗ス。然ニ格綸僕浸白芥子浸ハ些モ變敗セス。爐邊ニ置ク十日ニメ尚酸味生セス。腐敗セス毫モ變化ニ罹ルナシ。格綸僕ト白芥子ハ其味相似タルヲ以テ試ル。右ノ如シ。然ハ此二品ハ飲食消化ヲ妨ケスノ烹釀ヲ抑制スル者ナリ。○格綸僕ハ右ノ試効アル故ニ胃中ノ飲食泡釀過甚ニノ大ニ風氣ヲ生シ痞

滿腹脹攣急拘痛シ及酸敗液ヲ兼ル症ニ殊効アル。丁他ノ苦味藥ノ比ニ非ス。又胃ノ飲食ヲ傳輸スル衝動力蠕動虧損スル症飲食停滞痞悶ノハ此藥ニ香竄佳味ノ藥及白芥子ヲ加テ良効アリ。第六此藥ハ諸液ノ酸敗ヲ防遏シ。既ニ酸敗スル者ハ是ヲ中和塩ト爲ス異能アリ。其試法。格綸僕浸。加密列浸。幾那浸一弓宛。各別ニ硝子壠ニ内レ。是ニ醋二十滴宛。加フ。格綸僕浸ハ醋酸盡ク凝固ノ結朮シ中和塩トナル。加密列浸ハ其酸味差減ス。幾那浸ハ酸味酸臭尤顯著ニノ右ノ格綸僕浸ニ醋二十滴ヲ倍加スル

二非レハ同等ノ酸味トナルフナシ第七格綸僕ヲ内服ノ心藏及動脉ニ感觸スルヲ試ルニ予空心ニ
メ且勞動セス靜坐スルト半時許ニメ夜六半時ニ
至リ。格綸僕末一刀ヲ取り。泉水一小盞ヲ以テ送下
シ。脉ヲ診スレハ七十動ナリ。尚靜坐四分時ニメ脉
状差異ナシ。翌夜同時。右ノ如クノ此未半錢ヲ服ス
ルニ脉八十動ナリ。十二分時ヲ經テ脉状差異ナシ。
但七十七動ハ同様ニメ三動ハ既ニ遲緩ナリ。然ハ
此藥脉動ヲ増進セス又起熱ノ藥ニ非ス。故ニ勞欬
羸瘦消削病等ノ内伏熱ニ投ソ起熱ノ害ナク能ク

酷厲液ヲ消化シ胃腸ヲ健運ス○幾那心胃ニ鬱滯
シ或瀉下スルトアリ。格綸僕ハ些モ胃腸ヲ攪擾セ
ス。風氣痞滯ヲ驅散シ。酸敗液ヲ消化ス。右ノ試說ヲ
以テ前件ノ諸病ニ推當運用久逾殊効ヲ驗スヘシ
格綸僕浸液試說。格綸僕ヲ再餾燒酒ニ浸セハ其質
融化シ出ルト最多シ。是ニ次テ尋常燒酒。葡萄酒。蒸
餾水。醋。泉水ハ其融出スルト逐次減少シダツ其試
法。右六種ノ液各四弓ヲ取リ各別ニ六個瓦硝子壠
ニ内レ。格綸僕二錢宛投シ浸透十二時ニ火薙紙
ニテ濾シ。秤量ヲ衡レハ再餾燒酒ノ浸劑最重也。

其他ノ五種ハ秤量逐次ニ輕キ。是以テ是處知也。故ニ再餾燒酒ノ浸劑ハ其氣味尤醇厚ナリ。○水浸劑ハ藥氣速ニ消散シ十二時ヲ經ルハ多餘渣生シ二十四時ニノ溷濁出徵ノ如シ。○此藥ニ橙皮夷加ヘ浸劑トスレハ氣味尤佳ナリ。卽此末一弓橙皮黃四錢燒酒二弓。水十四弓。煖氣方假斯浸ス。十六時紙ニテ濾シ聽用ノ尤佳味ノ浸劑トス。水浸劑六時半錢マテ日三四次服ス。但散劑ヲ用ト稀ナリ多クハ葡萄酒或水ニ浸シ服ス。○煎劑ハ此根四錢。水一比。煮テ半ヲ減シ一二匙完。

服ス。或云。浸劑。煎劑ハ此根四錢ヨリ一弓マテ水八弓ニテ製シ用フ。○越幾斯劑ハ一錢ヨリ二錢マテ九藥或飲液ニ溶化シ或他藥ニ加用フ。

格綸僕越幾斯劑 製法 此根十二弓粗末トシ再餾燒酒三升ニ浸ス。四日濾テ液ヲ取リ其滓ニ水適宜ヲ加テ煎煮シ濾テ其液ヲ取り慢火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ大抵其四分一ヲ減シ火ヲ下シ又重湯ニノ煎熬シ稠厚トナルヲ候ヒ前ノ燒酒浸液ヲ取テ徐々加テ煎熬シ放冷メ丸藥トナル許ノ稠ト爲シ聽用ス。是ニ由テ香味脫セス焦臭ナシ。此根十二弓ヲ

以テ越幾斯劑八弓二錢出フ。効力大抵散劑ト同シ

格綸僕丁幾劑

密

製法

格綸僕

細剉

二十錢

燒酒

二十度者
三十二弓

右硝子壠ニ内固封シ浸スト十四日。滓ヲ去リ固封シ貯フ。健胃劑ノ藥液ニ滴シ加服メ良。

華涅泊密依福賢

應的刺皮

「コルテクス・キンテラヌス・シニナモム・マ

ゲルラニキム」

羅^{キン}、キンテランセ・バスト・蘭

形狀

麻竭郎

洲南亞墨利加

ニ產スル

「ウインテラ・アロマ

チカト名^{クル}樹ノ皮ナリ。往昔。譜厄利亞ノ加比丹。應的爾^人名^{麻竭郎}ノ海邊ニテ始テ此樹皮ヲ採ル故

ニ此皮ノ名トシ又麻竭郎桂ノ名アリ。其樹大ナルハ五丈許。濶二尺半許ノ板トナル。小ナルハ灌木ノ如シ。葉常綠。香氣アリ。老利兒葉ニ似テ大ナリ。花五瓣紫色。十六雄蕊。一雌蕊アリ。第十一綱萼三瓣。花後軟實ヲ結フ。裏三室アリ各二子ヲ收ム。味辛。竄透^ス或^云實ノ形^ハ實^ス。○此樹皮藥鋪ニ販ク者ハ大ニノノ如シニ核アリ。此樹皮藥鋪ニ販ク者ハ大ニノ長^ナ。三四母徑甚^タ厚ク^リ。或^云厚サ五釐許ヨ。硬固。外面皺アリ。淡白色。香氣アリ。研磨シ或^カ嚼メハ香竄ニノ丁子及桂ノ如ク氣味辛熱ニメ暫ク舌ニ殘留ス。水ニ浸セハ藥氣出ル。燒酒ヨリ多シ。蒸餾スレハ精

微ノ油。水面ニ浮ム。數月ヲ經レハ半白脂ノ如ク凝
聚メ底ニ沈ム。○白桂モ亦此樹ノ同種トス。

白桂

「ガ子ルラ・アルバ」又「コルテクス・ウ

北亞墨利加洲ニ產スル樹ノ皮ナリ。樹大中等。葉
長叶一母指半。闊一拇指。淡綠色。葉本ニ五瓣ノ白花
攢簇ス多雄蕊二十及多雌蕊アリ第十三綱實淡綠
熟スレハ黑色。核アリ。葡萄核ノ如シ。花葉實佳香ア
リ味辛。○此皮ハ白斑アル粗皮ヲ削リ去リ裏皮ヲ
日乾シ卷縮メ小管狀ヲ爲ス。硬固輕脆ニメ外黃色。
或淡白色ニメ帶赤色ノ横理アリ。裏面淡白色破碎

スレハ白色。氣味辛。微香竄様ニメ丁子ニ似タリ研
磨シ若バ水煎スレハ殊ニ甚シ。蒸餾スレハ露水桂
及丁子ノ香氣アリ。黃色ノ油其底ニ沈ム。此樹北亞
墨利加洲ノ煖地牙埋加。加祿利那古巴等ノ諸島ニ
產ス。○應的刺皮ト白桂ハ醫家同種同効トシ或種
類甚夕相近トス。但物產家ハ是ヲ別種トス

試効二種ノ皮氣味性効大抵同様トシ相代用ス。○
溫煖衝動壯神健胃ノ一良藥トス。○胃腸諸器ノ纖
維虛衰シ蠕動機頗弛セル諸症ヲ治ス。○內藏及乳
糜諸道ニ寒粘液凝聚メ壅滯スルヲ稀釋シ發汗ノ

驅散ス○痘腹痛。子宮病。失苟兒陪苦。冒寒等ニ良効ヲ稱ス○此藥單用シ或苦味衝動ノ藥ヲ加ヘ用フ

○服量定準ナシ。散劑煎劑浸劑泡劑。丁幾劑トシ用フシ(或云應的刺皮ハ白桂皮ヨリ熱性多)一次ニ一刃ヨリ多ク用ル1勿レ

白桂丁幾劑

製法

白桂適宜燒酒(八十度者)

右硝子壙ニ内レ固封シ煖處ニ置キ浸ス1六日。渣

ヲ去リ用フ

拔叔華依亞

拔爾撒謨

篤露

「バ」ルサミムトリウ「ロ」バルセムトワ

形狀篤露及加兒答竭那(共ニ南亞墨ニ產スルトリュ利加洲地名)

イヘラ・バルサミムト名ヅクル樹ヲ鑽刻メ取ル華爾斯液ナリ(或云此樹松)故ニ篤露拔爾撒謨又加兒答竭那拔爾撒謨ト名ヅク。初メハ流動メ稠厚ノ的列竝底那(名)ノ如シ時ヲ經レハ凝固シ微赤黃金色(或云是爾撒謨ト名ヅク他ノ拔爾撒謨ハ黒色ナレハナリ透亮。佳香甚夕竄透シ拘櫻及蘇合香ノ氣アリ嚼メハ柔ニメ粘著シ微甘ニメ辛ヲ帶ヒ味佳クメ他ノ拔爾撒謨ノ如キ嘔スヘキ氣味ナシ焼酒ニ浸メ盡ク溶化ス○是ニ二種アリ一ハ軟ニメ半流动ス(或云指ニテ小壺盧ニ内レ輸ス是ヲ上品トス。一ハ經久ニメ凝固シ疏脆ノ碎

塊トナル此品居多シ是ヲ乾拔爾撒謨ト名ク○或
格碌波尼亞名ヲ雜テ偽ル者アリ炭火ニ投スレハ
的列竝ノ氣アルヲ以テ知ルヘル

試効凝結ヲ疏解シ肺癆ニ用テ愈創排膿淨刷ノ効
孛露拔爾撒謨名ノ如シ。但孛露及其他拔爾撒謨類
ハ熱性ニメ刺戟衝動ス。此拔爾撒謨ハ緩性ニメ刺
戟セス味佳クノ服シ易ク諸内癆ニ用テ愈創ノ良
効ヲ奏シ諸拔爾撒謨ニ勝レテ推稱ス○喘急ニ三
四滴宛飲液ニ點服メ効ナリ。或沒藥。護謨安沒尼亞
幾金硫黃等ヲ加ヘ丸薬トシ用フ○或丁幾劑トシ

十五滴若バ二十滴一服トシ前說ノ諸症ニ用フ

拔爾撒謨篤露丁幾劑

拔

拔爾撒謨篤露

一弓

燒酒二十度者

右硝子壠ニ内レ浸ス六日。滓ヲ去リ聽用ス

拔爾撒謨篤露舍利別

涅

製法

拔爾撒謨篤露

一弓

亞刺比亞護謨四錢

水一弓

舍利別六十四弓

右拔爾撒謨ト護謨ニ水少許宛加テ研合シ乳白液

トナルニ至テ舍利別少許宛研和ス

○外敷ノ腰髓痛風傷冷毒痛ノ治シ一切創傷ヲ愈

シ膿ヲ排ヒ殊ニ腱及神經多キ部ノ毀傷ニ偉効ヲ

稱ス 依涅叔伍

拔爾撒謨 加拿太 カナルサミス・カナデ・セ・ロ

形狀 加拿太 カナダ・北亞墨利加ニ洲ノ國名 產スル ビ・ス・バルサメ

アト名クル樹ヲ鑽刻メ取ル華爾斯液ナリ是的列
竝底那ノ最精微揮發ノ者ニメ透亮粘稠微黃白色
揮發油ヲ帶ヒ的列竝ノ香アリ味微苦香竈様ニメ
諸拔爾撒謨類ノ如シ

試効 尿道虛弱弛緩ノ諸症。小便淋瀝漏精白帶下等

ヲ治ス性効。拔爾撒謨格淋霍ト同シ二十滴ヨリ三十滴マテ日ニ三次沙糖ヲ加ヘ香竈ノ露水ニ滴シ
服ス否サレハ飲食消化ヲ妨ク或雞子黃或亞刺比
亞譙謨漿 名ニ加ヘ水適宜ヲ研和シ用ヒ或飲液ニ
點服ス。但熱性ニメ刺戟衝動スル故ニ多血焮衝性
ノ症ハ是ヲ禁ス○外敷メ纖維弛虛衰弱ヲ強健シ
經久ノ潰瘍等ヲ治ス

拔爾撒謨 刺加失刺 カナルサミム・ラカシラ・ロ

形狀 亞墨利加洲ニ產スル一種ノ拔爾撒謨樹ヲ鑽

刻ノ取ル華爾斯液ナリ。其質重々赤赭色透亮柔軟
膠粘ノ絲ヲ引キ嚼テ粘著ス。味微苦收濁シ香竄ニ
メ稍格辨霍。拔爾撒謨ノ如シ壺蘆ニ内輸ス

○榕按ニ此拔爾撒謨ハ漢人所謂篤耨香ナリ
試効胸肺ヲ強壯シ小便ヲ利ス。徽毒淋治ノ後淋瀝
止々數月困難淹滯スルヲ治ス。毎日十氏尚其餘
モ服シ或對症ノ藥ニ加入丸劑トシ用フ

依華

拔爾撒謨默加
「バ」ルサミム・タカ「オ」ボ「バ」ルサミム「羅
拔爾撒謨默加
「バ」ルセム・ギレ「アド」五「ダイ」クスヒ「デ
ア「オ」ボ「バ」ルサムトウツテ「バ」ルセム
ヨードセミ「バ」ルヒム「蘭」

形狀

亞刺比亞

亞細亞洲國名ノ默加名地ニ產スルアメイリ

ス・バルサミムト名グル灌木ヨリ自ラ滲出シ或
鑽刻ノ取ル華爾斯液ナリ。此品甚夕稀ク透明鮮白
或淡黃色或云微赤佳香アルト諸拔爾撒謨ニ勝リ
甚夕鑽透シ拘櫻及薄荷ノ氣アリ味辛微苦香竄久
ヲ經レハ稠粘ニメ的列竝底那或蜜ノ如ク絲ヲ引
キ流動シ難名氣味微才リ○眞品ノ新鮮ナル者ハ
其質精微ニメ輕キ故ニ是ヲ一盞ノ水ニ滴スレハ
沈降セス或沈ムト雖モ忽チ復浮テ水面ニ布漫シ
膜ノ如シ。八分時ヲ經レハ鳥羽ヲ以テ是ヲ刷取ル

破碎セス。或掌上ニ滴メ摩スレハ稠固ニノ酥ノ如ク乳白色トナル。經久メ品ハ稠厚ニメ水ニ滴スヒハ直ニ沈ミ。膜トガラス〇此拔爾撒謨ハ其樹ノ一刻痕ヨリ出ル。日旦三四滴。一良木ト雖モ僅二十錢若バ十五錢出ルノミ。故ニ國禁アリテ他方ニ輸ス。ヨリ許サス。或其葉及細枝ヲ水ニ煮テ鮮白ノ脂液浮キヲ取ル。是亦多ク得難キ故ニ輸ス。罕ナリ。或其煮タル枝葉ヲ取テ再煎シ湯上ニ浮ム油液ヲ取り製ス。此品多ク諸方ニ輸シ販ク然ニ稠厚ニノ精微ノ氣味少ナシ。下品トス。上品ハ罕ナル。故ニ偽

造ノ品多シ。或胡麻油ヲ雜ヘ或駝鳥脂ヲ加テ偽製スル者多シ。宜ク前説ノ鑒法ヲ以テ辨識スヘシ。試効熱性衝動ノ汗ヲ發シ月經ヲ通シ虛冷沈痼ノ疼痛ニ内服外敷ノ殊妙アル。大抵的列並格。洋洋霍加拿太拔爾撒謨ノ如シ。〇胸肺諸病。喘急欬嗽。勞欬。吐血ニ用ヒ。肺管ニ泛満セル粘稠液ヲ消化シ酷厲液ヲ緩解シ痰ヲ疏豁ス。外敷ノ創ヲ愈スニ奇効アリ。但筋肉多キ部ノ打撲傷ハ効ナシ。又纖維弛弱ノ潰瘍ヲ治シ顔面小胞ヲ消シ皮膚ヲ滑澤ス。然ニ此藥起熱衝動スル故ニ熾衝ノ症ハ是ヲ禁ス。又腎膀胱

胱ノ潰瘍ニハ甚夕害アリ○此拔爾撒謨ハ近來用
ルノ少シ。是眞品ハ罕ニメ下品多ク。且格洋霍亨露。
篤露。加拿太等皆眞品ヲ輸シ性効モ亦優多ナレハ
ナリ○此樹實ヲカルボバセムト名ケ販タ稍拔
爾撒謨ノ効アリ又蝮蛇等毒蟲刺咬ヲ治ス其大豌
豆ノ如ク末尖リ小梗アリ外面四條理アリ初綠熟
スレハ赭色皺縮シ裏白色ノ仁アリ味辛佳香拔爾
撒謨ノ如シ○此樹ヲキセイロバルセムト名ク細
ク皮粗糙灰色。中心白色然正焚セハ佳香アリ依福
遠西醫方名物考補遺卷四終

