e11
499.2
En-1
1
F 1
エ-21
Kitasato Memorial Medical Library

3冊 499.2 Em-1 1

文久二壬戌晩秋新雕

遠西方彙

侍醫法眼伊東貫齋譯

原本紀元一千八百五十二年鏤行

廣胖堂藏

初帙

富士川文庫
3255

慶應義塾大学医学情報センター

題言

我皇國舜平數百年。仁風波及異域。洋人獻方物以請互市者。接踵而至自布帛兵器至凡百奇工。無不舶輸者。而醫家諸科書。亦不可擧算。余幼志於醫學。博撿洋書。其窮理試治。日新用精以及今日。實洋外醫術之精。可謂至其極矣。然藥方之書。約綴而可供常用之便者未嘗見也。由是初學徒臨病。范々不知所下手者亦不少矣。余有憾于此。嘗得蒲薜幾氏日用方叢譯之爲一帙。既公于世焉。或曰是方叢之書也。極簡極約而日用之要無所不備。可謂初學之必携也。然各方不詳其主治用量等。恐臨病施治之際。有隔靴搔痒之憾。子請補之。余曰不然。

Kitasato Memorial Medical Library

不書主治用量者。所以尚簡約也。若主治悉擧。則不免冗長用量歸一。則僅々二百數十方豈可以應酬長幼百出之疾乎余別有所志。子姑待焉。既而得獨乙國安頓氏所著方彙。閱之。於各症編首。畧述攝養治法等。其尾詳録洋外諸家之驗方。及主治服量。其方數千。雖似冗長。依症分類。以為日用之便。別集婦人小兒病為續編。寔初學之標準也。乃欣然譯之。以成往日之志云爾

文久紀元歲在辛酉十月　翬塘伊東貞識

凡例六則

一書中藥名病名。有漢名不詳者。皆從先輩之譯。加密列。葛私加栗剌。聖京倔。僂麻質斯之類是也。其未經譯者。今新定其字。格列剌。謁設剌。設篤拉里揑之類是也。舊譯不穩當者則正之。蘓魯林改作格魯林之類是也。或前譯稱呼不便者則換之。謁哥利斯亞設爾利油改作肝油之類是也。若夫未經譯者。槩用南洋所考正之字音。覽者幸勿怪其紛錯。

一前譯誤字音者。往々不尠。今改之則恐初學之徒迷眩。故依舊。亞爾苫。諳沒尼亞等誤作亞爾鮮。安沒尼亞之類是也。

一方中西洋新驗之藥品往々有焉。就洋舶新齎之諸書。撿索

Kitasato Memorial Medical Library

其製法効驗。詳附録。藥名下記附號者是也。

一書中加愚按註釋者。首尾記號。以分之。譯原註者不別設符號。讀者勿混同。

一漏刻皆從皇國。但不論春秋。平分晝夜而為十二時。分一時而為百二十分。謂之暋昵或密扭篤。分一密扭篤而為六十分。謂之設昆度。

一如尺度量衡。古人譯書已詳矣。今不復贅焉。

辛酉十月　貞識

遠西方彙目次

○卷之一

○第一編

熱性病

第一　熱病

單純刺衝熱　焮衝熱　僂麻質斯熱

聖京倔熱　腸胃熱　○薩滮爾剌列熱　○膽液熱

○粘液熱

○卷之二

神經熱　・敏性神經熱　鈍性神經熱　○鈍性神經熱係腦

Kitasato Memorial Medical Library

症○鈍性神經熱係肺症　○鈍性神經熱係腹內症
○卷之三
腐敗熱　間歇熱　慢性熱
○卷之四
第二　局處焮衝病
肺焮衝　胸膜焮衝○胸膿ニツトルホリスト　橫膈膜焮衝
喉頭焮衝○氣管焮衝　○肺管焮衝　義膜咽喉焮衝
心臟及心囊焮衝　舌焮衝　咽喉焮衝
○卷之五
腦焮衝○酒狂　○急性腦水腫　脊髓焮衝
胃焮衝　腸焮衝○痢
○卷之六
腹膜焮衝○網膜焮衝　○腸間膜焮衝
肝焮衝　脾焮衝　膵焮衝
腰筋焮衝　腎焮衝　膀胱焮衝
子宮焮衝○卵巢焮衝　僂麻質斯（レウマチス）
胯痛
○卷之七
第三　熱性皮膚病
痘瘡　麻疹　猩紅熱

Kitasato Memorial Medical Library

律別阿刺　羅斯　帶狀羅斯
粟疹　蕁麻羅斯　謁設刺
水疱疹　鵞口瘡

○卷之八

○第二編

慢性病

第一類

慢性病係脈管系症

第一　心臟慢性病

心悸動　胸内逼迫

第二　多血畜積病
第三　失血病
衂血　咯血　嘔血
黑病

○卷之九

痔　血尿　血斑病
子宮出血　月經不調

○卷之十

第四　萎黃病

第二類

Kitasato Memorial Medical Library

慢性病係神經系症
第一　係腦髓及脊髓症
卒中風　腦髓軟化　頭旋　昏冒
麻痺　○舌痺　○膀胱麻痺
○卷之十一
第二　痙攣病
癲癇　舞蹈病　聖反倔
○卷之十二
口噤　痙强　落法尼亞
恐水病
○卷之十三
喘　○痙攣喘　○粘液喘　○密兒刺爾喘
○骨布喘
百日欬
○卷之十四
吃逆　胃痙　疝　○鉛毒疝
吐糞病
○卷之十五
第三　神經痛
面痛

Kitasato Memorial Medical Library

第四　係神經核系症
依朴昆垤兒　歇倚私的利
○卷之十六
第五　精神病
第三類
慢性病係補給器系症
第一　係諸液分泌器症
〔甲〕粘液太過症
鼻孔及氣管粘液太過症　○聖京倔　○欬嗽
肺臟粘液勞　胃腸粘液鬱積　膀胱聖京倔
○卷之十七
痳　久痳　包莖　龜頭箝窄
睪丸焮衝　攝護腺焮衝　黴毒焮衝眼
龜頭淋　白帶下
○卷之十八
〔乙〕排泄失常症
慢性嘔吐　泄瀉　○劑藥　完穀下利
乳糜利　肝崩　○泉石
○卷之十九
格列刺　○特發格列刺　○流行格列刺

Kitasato Memorial Medical Library

○卷之二十
便秘　黃疸　膽石　小便失禁
小便濇滯　小便淋瀝　小便閉　○尿石
尿崩　遺精　○陰萎　吐涎
○卷之二十一
第二　蟲
蟯蟲　蚘蟲　絛蟲
○卷之二十二
第三　無熱皮病　髮病
疥癬　頑癬　頭瘡

湮面瘡（ダイウウクハム）　蔓延堙面瘡
○卷之二十三
癤　銅色疹　夏月斑（雀斑之類）　肝斑
皮膚搔痒　癩　縮髮病
禿瘡
第四　風氣脂肪及水液畜積病
風脹　鼓脹　肥滿　水腫
○卷之二十四
皮膚水腫及腹水　○蒲利屈篤病　胸水　○心囊水腫
慢性頭水　卵巢水腫

Kitasato Memorial Medical Library

○卷之二十五
第五　削瘦病
虚衰病　勞
○卷之二十六
第六　慢性病係毛様絡者
腺病　○疳勞　○佝僂病　瘰癧腫
○卷之二十七
第七　依倔篤（イクツト）
第八　矢苟児陪苦（シケウルボイク）
○卷之二十八
第九　黴毒　上
○卷之二十九
黴毒　下
○卷之三十
第十　結節腫（クヌーストゲスウエル）　癌腫　○胃結節腫　○胃癌腫
○附篇
服量　製法

遠西方彙目次　終

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之一

獨乙　加。幾。安頓（カ。キ。アントン）　著
和蘭　傑。婪婆都（ゲ。ラム。ゼウツ）　譯
侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯
南洋伊東亨健夫　參校

第一編

熱性病

第一　熱病

單純刺衝熱（フェブリス。アキュタ。シンプレキス。チアリア羅エンホウヂヘ。プリケル。コールツ蘭）

Kitasato Memorial Medical Library

此症ハ專自然ノ良能ニ委任シテ醫ノ用心唯自然ノ妙機ヲ妨ゲサルヲ要トスル者多シ」故ニ唯患者ノ身心ヲ安靜ニシ病床ニ就テ接骨木花或ハ菩提樹花ノ單浸劑ヲ温服セシムルニ宜シ」然レ氏其症必醫藥ヲ須ツ者ニ在テハ清涼劑ヲ投スベシ即里歇利飲一方沸騰散二方三方或ハ純精酒石等是ナリ蓋純精酒石ハ佳味ナル結晶水四方ニ作ル者最良トス」若發因冒寒ニアルヿ確著ノ症ハ民垤列利精ヲ伍シタル發汗密幾斯去爾五方ヲ佳トス」民垤列利精ハ此症彌留セル者慢性刺衝熱ニ最稱用セリ」患者甚多血ニシテ血液胸部或ハ頭上ニ畜積シ兼テ大便秘結セル者ハ清涼中和塩ニ

硝石ヲ加フヘシ六方刺絡及ビ局處ノ放血ヲ要スル者ハ少シトス」腸胃ニ汚物欝積セルヿ確著ナルトキハ排泄ノ便路ニ從ヒ或ハ輕吐劑七方或ハ下劑八方ヲ撰用スベシ

○第一方〔戰歇蘭度〕里歇利飲

炭酸剥篤亞斯二錢　枸櫞汁新絞者適宜飽和為度　蒸餾水三弓

覆盆子舍利別一弓

右調匀毎一時服二食匙

○第二方〔同上〕沸騰散

過炭酸曹達十五氏　純精酒石　白糖各一刃

右調和為散加水一盞乘沸騰服之

Kitasato Memorial Medical Library

○第三方〔暫毋暴律私〕沸騰散

過炭酸曹達十五匁　枸櫞油糖十匁

右為散分四裹每半時取一裹枸櫞汁一小食匙送下

〔主治〕惡心連綿トメ止サル者殊ニ効アリ胃化衰弱セル者モ前方一方ニ較フレハ能ク之ニ堪フ枸櫞汁ニ些ノ水及ヒ沙糖ヲ和シ里謨那垤ヲ作リテ先之ヲ用ヒ直ニ水少許ヲ以テ沸騰散ヲ服スルモ亦可ナリ

○第四方〔獄歇蘭度〕結晶水

純精酒石半弓入新土器以井水五北煮至溶化加後味

枸櫞一個絞汁　白糖六弓

右調和為飲料

○第五方

民垤列里精　屋施蔑爾各半弓　菩提樹花水四弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕冒寒症發汗劑ニ供ス ベシ

○第六方〔私傑福傑爾〕

精製硝石一錢　芒硝半弓　覆盆子水五弓　接骨木子舍利別　枸櫞酸舍利別各六錢

右調和每一時服二食匙

〔主治〕清涼瀉下ヲ兼ヌル緩發汗劑トシテ單純刺衝熱ノ

Kitasato Memorial Medical Library

重症ニ用フベシ

○第七方

吐酒石一匁至二匁　以加密列水二弓溶化加後味

吐根一刃　海葱蜜半弓

○右調和毎十密扭篤服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

主治　舌上厚苔アリテ惡心スル者之ニ宜シ

○第八方

旃那葉末一刃至半錢　複方旃那昆設爾弗一弓　附

○右調匀毎一時或一時半服一茶匙以至得瀉

主治　舌上厚苔アリ肚腹緊脹メ雷鳴シ大便秘結セル者

之ニ宜シ

焮衝熱フェブリス。インフランマトリア。シムブレキス羅オントステーキングス。コールツ蘭

強實ノ人既ニ焮衝熱ヲ發セル者ハ先放血シテ血中非常ニ倍加セル纖維質ヲ減殺スルヲ以テ療法ノ第一義トス兼テ清涼ノ攝養ヲ施シ五官ノ刺戟ヲ避ケ食餌ヲ減シ滋味ヲ禁シ且冷水ニ果實ノ舍利別ヲ和メ多服セシムルヲ要トス放血ノ後或ハ輕症ニシテ放血ヲ要セザル者ハ病ノ初起直ニ消石ヲ用フベシ但粘滑藥ニ和スルヲ最妙トス九方。十方。十一方。十二方。十三方。病始メテ降和スル片ハ腸ヨリ分利セシムルヿヲ促スヘシ蓋消石ヲ覇王塩十四方芒硝六方。五方。十瀉利塩或ハ純精酒石等十七

Kitasato Memorial Medical Library

方ニ配スルヲ好トス」又全ク消石ヲ用ヒズメ上ニ列擧スル所ノ塩類或ハ殊ニ孕鹼酒石十八方及ヒ燐酸曹達十九方ノミヲ與ヘテ適當スル症モ亦少カラズ」症ニ應メ消焮ノ灌腸法ヲ行フモ亦可ナリ廿五方。廿六方。廿七方。○若肺臓ノ聖京倔ヲ兼併セル症此症數之アリハ硇砂最好トス或ハ之ニ吐酒石ヲ配スベシ廿方。廿一方。」病ヲ表ヨリ分利セシムルハ民垤列利精五方。廿二方。最効アリトス或ハ塩類ノ溶液ニ小量吐酒石ヲ加フル者十八方。廿一方。亦佳ナリ」弗里度児陽人名ハ治療熟練ノ名哲ニシテ方今世間以テ摸範トスル所ナリ此人表ノ分利ヲ促スガ為ニ安質没尼若波列廿五方ヲ稱用セリ今茲ニ此方ヲ記載スルモノハ余先哲ノ功ヲ湮滅セシムルヿヲ欲セザレバナリ」表ノ分利止ミテ焮衝症既ニ緩解セル者ハ龍腦一氏或ハ二氏若ハ之ニ硝石二三氏ヲ加ヘテ廿四方毎晩之ヲ與フヘシ

○第九方（瞥。母。暴律私）

精製硝石二錢　以常水八弓溶化加後味

砂糖舎利別半弓

右調匀毎半時服一食匙

○第十方（弗。嚕剌歇）　消焮飲

精製硝石一錢半至二錢　亜剌毘亜蘰謨半弓　以覆盆子水六

Kitasato Memorial Medical Library

弓溶化加後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

○第十一方〔別連杜〕

甘扁桃乳六弓以甘扁桃一弓製之　精製硝石一錢　遏兒托舍利別一弓

右和勻每一時服一食匙

○第十二方〔瞥。弗蘭屈〕

大麥未熟者一弓　以井水適宜煮熟濾過取一北溶化硝石一錢加後味

屋施蔑爾半弓

右調和每一時服半盞

○第十三方〔羝歇蘭度〕

精製硝石一錢　吐酒石一匁　遏爾托根煎四弓溶和加後藥

扁桃舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕第九方ヨリ第十三方迄焮衝熱ノ初起及ヒ局處ノ焮腫ニ宜シ

○第十四方〔羝歇蘭度〕消焮散

Kitasato Memorial Medical Library

硝石　覇王鹽各二錢　純精酒石一弓

右調勻為散每一時乃至一時半取一小茶匙水半盞和服

○第十五方〔蛾歇蘭度〕

精製硝石一錢　芒硝半弓　吐酒石一氏　蒸餾水六弓溶化

加後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服一食匙乃至二食匙

○第十六方〔同上〕

荅麻林度　上好滿那各半弓　芒硝一弓　以井水十二弓

煮至八弓濾過加後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服二食匙以至得効

〔主治〕右三方十四方十五方十六方　焮衝熱症大便ヲ促スニ宜シ

○第十七方〔弗噶剌歇〕　消焮水

精製硝石一錢　純精酒石半弓　井水六弓溶和加後藥

老利兒水一錢　黒櫻實舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

○第十八方

孕鹼酒石半弓　吐酒石一氏　精製度碌布半錢

右蒸餾水四弓溶和每一時服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕以上二方十七方。十八方。八燃衝熱ノ末期大便ヲ促スニ宜シ此方前方十四方。十五方。十六方。ニ較レハ效力緩ナリトス

○第十九方

燐酸曹達半弓　蒸餾水四弓溶化加ニ後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和毎ニ一時服ニ一食匙

〔主治〕用法前方ニ同シ其能力モ亦緩ニメ且味佳ナリ

○第二十方

精製硇砂一錢　橙花水四弓溶化加ニ後味

扁桃舍利別一弓

右調和毎ニ一時服ニ一食匙

〔主治〕燃衝熱症硝石食機ヲ害スルノ恐レアル者或ハ燃衝熱ニシテ胸部ノ聖京倔ヲ合併セル症之ニ宜シ

○第二十一方

精製硇砂　精製度碌布各一錢　吐酒石一瓦

右蒸餾水六弓溶和毎ニ一時服ニ一食匙

〔主治〕能力前方ニ同シ。燃衝熱ノ末期分利ヲ促スモ亦之ニ宜シ

○第二十二方〔刺鼈私〕

民垤列利精　屋施蔑爾各六錢　接骨木花水四弓

Kitasato Memorial Medical Library

主治皮膚ノ分利ヲ促スニ宜シ

○第二十三方〔弗陽〕

扁桃乳三弓　精製硝石一錢半至三錢　安質没尼若波列半錢至一錢半　砂糖舍利別六錢

右調和毎半時服一食匙乃至二食匙

主治焮衝熱已ニ放血ヲ行ヒ消焮劑及ヒ下劑ヲ投シテ焮衝減却シ脈緩且徐トナリ肌熱口渇モ亦已ニ消解シ自然ノ良能表ヨリ病毒ヲ分利スルノ機能ヲ扶クルハ安質没尼若波列ヲ以テ特効ノ奇藥トス

○第二十四方

龍腦細碎者一匁至二匁　精製硝石三匁至五匁　白糖十匁

右調和為散分三服蠟紙包裹臨卧取一包接骨木花或菩提樹花泡劑和服

主治分利ヲ促ス

○第二十五方〔戾兒〕

加密列花二弓　亜麻子研末一弓　井水適宜煮濾過取六弓加後味

瀉利鹽半弓　亜麻子油新製一弓半

右調和為灌腸藥

○第二十六方〔戾兒〕

Kitasato Memorial Medical Library

○裸燕麥煎八弓　瀉利鹽二錢　勿搦祭亜石鹼半弓

右調和為灌腸藥

○第二十七方（戻兒）

裸燕麥煎六弓　醋二弓

右調和灌腸

主治第二十五方ヨリ第二十七方マデ　皆焮衝熱症大便ヲ促スニ宜シ

僂麻質斯熱フェブリス。レウマチカ羅レウマチセコールツ蘭

此症治法專抑壓セル蒸氣ヲ發越スルヲ要トス間焮衝性ヲ帶フル者アリ匆々看過スル「勿レ」多血ノ人或ハ劇症ニ於テハ放血ヲ行ヒ硝石ヲ用フベシ九方。十方。十一方。十二方。十三方。廿八方。

熱勢緩ナル者ハ民垤列里精五方。廿二方。廿九方。卅方。卅一方。或ハ少量吐酒石十八方。廿一方。卅二方。卅三方。ヲ良トス」窒卒德氏ハ安質沒尼若波列ヲ稱用セリ卅四方」熱少微ノ者ハ雙蘭菊良効アリ卅五方」龍腦ヲ用フルハ大ニ謹愼ヲ加フベシ然レ氏熱緩ナル者ハ之ヲ硝石ニ配シテ屢偉効アルヲ驗セリ廿四方。卅六方。卅七方。」僂麻質斯熱ヲ治スルノ本法ハ恚篤計氏ニ依テ世人防テ之ヲ知レリ卅八方」以上ノ法方ヲ行フノ外發汗浸劑ヲ用ヒテ以テ治ヲ助クベシ」局處ニ劇痛アル者ハ弗剌涅爾或ハ羊毛ヲ以テ患部ヲ覆フヘシ又症ニ從フテ白芥子及ヒ芫菁膏ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

貼シ或ハ間蜞吮吸角ヲ施ス者之アリ」硬膏塗擦藥ノ類ハ病邪ヲ〆内部ニ轉移セシムルガ故ニ其害少シトセズ然レ氏臧歇蘭度氏ハ感覺過敏ニ因テ疼痛スル者ニ麻醉硬膏ヲ稱用セリ 世九方

○第二十八方〔私傑福傑爾〕

精製硝石八刄 精製硇砂一錢至四刄 蝋蛄石末一錢 黒櫻實水六弓 罌粟花舍利別 遏爾托舍利別各一弓

右調和毎半時服二食匙

〔主治〕焮衝性僂麻質斯熱ニ先放血シテ后此方ヲ與フ福傑爾氏ハ荅麻林度或ハ純精酒石ヲ以テ乳清ヲ作リ平常ノ飲料ト為シ上方ト並用セリ

○第二十九方〔臧歇蘭度〕

精製硝石二錢 民垤列里精一弓 安質没尼酒一錢 接骨木花水 蒸餾水各四弓 橙花舍利別一弓

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕僂麻質斯熱重症之ニ宜シ

○第三十方〔遏傑福傑兒〕

民垤列里精二弓 薄荷水四弓 栗鼈子舍利別六錢

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕僂麻質斯熱未龍腦ヲ用フベカラザル症此方偉効

Kitasato Memorial Medical Library

アリ尚且蘆根煎ニ些ノ沙糖及ニ枸櫞汁ヲ加ヘテ味ヲ適シ意ヲ放テ多飲セシムルヲ佳トス

○第三十一方〔曾別倫回母〕

接骨木花半弓　熱湯適宜浸出濾取四弓加後味

民垤列里精一弓　安質没尼酒一錢　接骨木子昆設兒弗一弓

右調和毎一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕僂麻質斯熱聖京倔ヲ帯ブル症及ヒ他ノ諸僂麻質斯初症之ニ宜シ

○第三十二方〔遏傑福傑兒〕

吐酒石三匁　接骨木花水八弓溶化加後味

砂糖舍利別一弓

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕焮衝性僂麻質斯熱放血及ヒ第二十八方ヲ用ヒテ其熱已ニ減退セル者之ニ宜シ間之ガ為ニ悪心或ハ嘔逆スル者アルモ損ナシ却テ益アリトス

○第三十三方〔質列乳斯〕

硝石二錢　吐酒石一匁半至三匁　接骨木花水五弓溶化加後味

砂糖舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕僂麻質斯熱及ヒ其他急劇ノ僂麻質斯ヲ治ス但薩爾撒巴里兒剌ノ如キ稀釋發表ノ飲劑ヲ兼用スベシ

○第三十四方〔窒卒德〕

安質没尼若波列半錢　接骨木花水五弓　海葱蜜一弓

右調和毎一時服半盞子

〔主治〕僂麻質斯熱及ヒ聖京倔熱ヲ治ス然レ氏弗里度兒陽人名ハ此方緩ニ過タリトシ上方ヲ以テ優レリトス

○第三十五方〔狀歇蘭度〕

雙蘭菊越幾斯八氏　安質没尼酒二錢

右調和毎一時半服十滴乃至二十滴

〔主治〕僂麻質斯熱血脉ノ衝動緩ナル者之ニ宜シ

○第三十六方〔遏傑福傑兒〕

甘扁桃去皮者半弓　白罌粟子　大麻子各一錢　龍腦一刀至半錢

加覆盆子水十弓搗爛作乳劑更加後味

精製硝石二錢　滿那舍利別二弓

右調和毎一時服二食匙乃至半盞子

〔主治〕僂麻質斯症熱勢輕ク脈軟ニ頭腦關係ナキ者之ニ宜シ患者能ク龍腦ヲ服スルニ堪フルトキハ効驗更ニ偉ナリ然レ氏之ヲ用フル其時ニ應セサレハ却テ大害ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

招クカ故ニ症ニ對シテ最謹愼ヲ加フヘシ

○第三十七方〔臧歇蘭度〕

龍腦六氏　精製硝石一錢　白糖二錢

右調和為散等分為六包毎一時乃至一時半服一包

〔主治〕上方ニ同シ

○第三十八方〔恚篤計〕

硫酸規尼捏十五氏　鹽酸十滴至十二滴　接骨木花水四弓至六弓

精製硇砂一錢至二錢

右溶和毎一時服一食匙

〔主治〕僂麻質斯熱及ヒ急性僂麻質斯ニ宜シ或ハ其症間

歇病性ヲ帶ビ且脊髓及ヒ脊髓神經ニ關係アル者ハ殊ニ良ナリ〔恚篤計〕氏右ノ症ニ此方ヲ用ヒ一夜大率十二時内ニメ已ニ尿中涇渣ヲ見ハシ熱勢疼痛倶ニ減退スルヲ實驗セシヿ屢之アリト云フ

○第三十九方〔臧歇蘭度〕

菲阿斯硬膏一弓　阿芙蓉半錢

右捏和貼痛所

〔主治〕僂麻質斯熱ニ於テ毎ニ傍發スル所ノ局處疼痛神經ノ感觸過敏ニ因ル者之ル宜シ

聖京倔熱ブリスカタルラス羅シンキンクコールル蘭

Kitasato Memorial Medical Library

抑壓セル蒸氣ヲシテ平復セシムルハ聖京倔熱ニ於テモ亦醫治ノ要務トスル所ナリ」是故ニ發汗ノ浸劑ヲ與フルノ他民垤列里精五方。廿二方。廿九方。卅方。卅一方。四十方。四十一方。少量吐酒石十八方。廿一方。安質没尼酒卅一方。四十一方。等亦此症ニ適應ス次ニ精製硇砂ニ精製度碌布及ヒ吐酒石ヲ配スル者廿一方。四十三方。諸種ノ和胸散四方。四十五方。及ヒ粘滑ニシテ咳嗽ノ刺衝ヲ緩鬆スルノ和胸浸液等四十六方。四十七方。四十八方。ヲ用ヒテ以テ通例此症ニ傍發スル所ノ肺臓聖京倔ヲ減消スルヲ此症ノ治法トス

○第四十方〔茉兒鳩私〕

民垤列里精一弓半　接骨木花浸四弓　遏兒抱舍利別半弓

右調和每半時服一食匙

○第四十一方〔同上〕

安質没尼酒一刀　民垤列里精一弓　接骨木花水四弓　遏兒抱舍利別半弓

右調和每半時服一食匙

○第四十二方〔久刺劉斯〕　清涼飲

精製硇砂二刀　精製硝石四刀　覆盆子水六弓　橙花舍利別三錢

右調和每一時服一食匙

〔主治〕僂麻質斯熱聖京倔熱。發疹熱。ノ初期熱勢ヲ緩解シ

Kitasato Memorial Medical Library

且適宜ニ蒸氣ヲ催發スルニ宜シ

○第四十三方

精製硇砂　精製度碌布各半錢　過児托根煎四弓溶化

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕聖京倔熱ノ欬嗽ニ宜シ

○第四十四方

菲阿斯越幾斯　金硫黄各三匁　亜剌毘亜蘧謨末一錢

甘草末三錢　白糖六錢

右調和為散毎一時半取一茶匙和胸泡劑和服

〔主治〕聖京倔熱欬嗽ヲ鎮静スルニ宜シ

○第四十五方〔獣歇蘭度〕和胸散

硫黄華六錢　茴香子　伊里斯弗魯連底那根　甘草各半

弓　旃那葉三錢

右調和為散毎一時半乃至二時服一茶匙

〔主治〕聖京倔症之ヲ用ヒテ痰ヲ利シ大便ヲ促ス

○第四十六方

過児托根三弓　亜麻子二弓　甘草半弓

右研和為和胸飲料

○第四十七方

過児托根三弓　歇爾拔斯屈謨花二弓　甘草三錢　茴香二錢

Kitasato Memorial Medical Library

右研和為和胸飲料

○第四十八方（羽栽歇蘭度）

歇爾拔斯屈謨花　接骨木花　黜失刺蘧葉　甘草

遏兒托根各一弓　伊里斯弗魯連底那根　茴香各六錢

右研和為和胸飲料

腸胃熱（フヅリス、ガストリカ羅　ガストリセ、コールツ蘭）

凡腸胃熱ニ三種ノ別アリ第一（薩瀧爾刺列熱）腸胃ニ鬱積セル汚物ニ因ル者第二（膽液熱）非常ノ膽液分泌ニ因ル者第三（粘液熱）腸胃中粘液分泌太過ニ因ル者是ナリ

第一薩瀧爾刺列熱（フェブリス、サビュルラリス羅　サビュルラ、コールツ蘭）

薩瀧爾刺列熱ノ因專飽食ニアル者ハ早ク吐劑ヲ用ヒテ全病頓ニ除クヿ間之アリ然レ𪜈汚物既ニ腸中ニ傳ル者ハ緩性ノ清涼下劑。中和塩類。旃那。滿那。等ヲ與フベシ蓋大抵所謂解凝劑即醋酸加里液（四十九方）孕鹼酒石ニ解凝越幾斯類ヲ合スル者或ハ吐酒石ヲ配スル者（十八方。五十方。五十三方。）等此ニ適當セリトス此劑ヲ與ヘテ古醫ノ所謂汚物易動ニ至ルベシ若汚物逆上ノ徴アル𪜈ハ吐劑ヲ與ヘ（六十二方。七十三方。）順下ノ證アル𪜈ハ酒酸加里曹達（五十四方。五十五方。）芒硝（五十六方。五十九方。）瀉利塩（六十方。六十一方。）或ハ複方旃那浸ル下劑ヲ投スベシ但服量ハ大便日ニ二三行乃至四行ヲ得ルヲ以テ度トス汚物鬱畜

Kitasato Memorial Medical Library

ノ證除カザルノ間ハ解凝藥ヲ排泄藥ヲ交換シ用フベキ者間之アリ吐藥ハ吐酒石吐根ノ合劑最適當トス特ニ吐酒石一味ヲ用フルトキハ及テ下利ヲ發シテ嘔吐セザル者屢之アリ本復ノ期ニ及テハ其症ニ應シテ苦味藥ヲ投ズ

七十四方。七十六方。

○第四十九方

蘆根流動越幾斯 附 三錢　醋酸加里液 半弓　蒸餾水 四弓

右調和每一時服一食匙

○第五十方

蘆根流動越幾斯 附 孕鹼酒石 各半弓　蒸餾水四弓溶解

右調勻每一時服一食匙

○第五十一方

蒲公英流動越幾斯 附 三錢　孕鹼酒石 半弓　精製度碌布 一錢　吐酒石 一氏　蒸餾水四弓溶解

右調勻每一時服一食匙

○第五十二方 遏。傑。福傑兒

蘆根越幾斯　蒲公英越幾斯 各一錢半　孕鹼酒石 三錢　接骨木花水六弓溶化加後件

屋施蔑兒 三弓

Kitasato Memorial Medical Library

右合和每一時服一食匙乃至二食匙

○第五十三方

孕鹼酒石半弓　蘆根煎八弓溶解加後味

砂糖舍利別半弓

右調勻每一時服二食匙

〔主治〕右ノ諸方八四十九方至五十三方　觸動過敏ノ人ニ於テ腸胃熱ノ初起解凝劑トシ用フルニ宜シ

○第五十四方〔茉兒鳩私〕

酒酸加里曹達一弓　上好滿那二弓

右井水八弓溶化每一時服二食匙

○第五十五方〔別連杜〕

酒酸加里曹達半弓至六錢　上好滿那一弓至二弓　茴香水四弓溶解加後藥

橙皮舍利別一弓

右調和先取半劑頓服後每一時服一食匙以至見効臨服宜振蕩

〔主治〕此二方五十四方五十五方　汚物順下ノ徴アル者ニ宜シ但感觸過敏ノ者ニ與フベシ

○第五十六方

精製芒硝半弓　常水四弓溶化加後味

Kitasato Memorial Medical Library

枸櫞汁舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕壯實ノ人腸胃熱症ニ宜シ」每服一食匙ニシテ功用未大便ヲ利スルニ足ラザル片ハ加ヘテ二食匙ニ至ル

○第五十七方〔戾兒〕

芒硝一弓　白糖半弓　新製枸櫞汁一弓半　裸燕麥淡煎一面收爾〔量名未詳〕

右調和每一時服一盞以至得下

○第五十八方〔戾兒〕

芒硝一弓　井水四弓　新製枸櫞汁　栗鼈子舍利別各一弓

右調和每一時服半小盞以至得下

○第五十九方〔臧歇蘭度〕

芒硝一弓　上好滿那　荅麻林度各半弓　旃那葉二錢　井水適宜煮濾取七弓加後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服一食匙以至收全効

○第六十方〔弗陽〕

瀉利鹽一弓　吐酒石一氏　粧密列水六弓溶化加後味

砂糖舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和毎半時服一食匙强

〔主治〕腸胃熱舌苔硬固ニメ稍乾燥シ嘔氣アリ或ハ吐スルト雖其症寛解セザル者ニ宜シ

○第六十一方〔戾兒〕

上好大黄一錢　旃那葉二錢　瀉利鹽半弓　井水適宜煮濾取六弓加後件

上好滿那二錢

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕第五十六方ヨリ第六十一方至ハ汚物下行ノ徴アル者ヲ治ス但患者感觸過敏ナラザル者ニ用フヘシ

○第六十二方〔戾羽〕歇蘭度

上酒石二匁　吐根末一刀　海葱密半弓　蒸餾水二弓

右調和毎八分時服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

〔主治〕汚物逆上ノ徴アル者之ニ宜シ第一回ノ吐ヲ得テ四分時ヲ經再吐セザル時ハ更ニ又一食匙ヲ與フ此法如クシテ吐ヲ得ルヿ三回ニ至ルベシ毎吐後加密列泡劑一盞ヲ飲服セシムルニ宜シ然レ𪜈之ヲ過服スル時ハ吐藥ノ効力ヲ減耗シ或ハ全ク其能ヲ失ス且未吐氣アラザル前ハ必之ヲ與ルヿ勿レ若燉衝性ノ合併病アリテ脈緊實ナル者ハ吐藥ヲ與ルノ前放血ヲ行フベ

Kitasato Memorial Medical Library

ニ又便秘セル者ハ灌腸ノ瀉ヲ得ルノ後ニアラザレハ吐劑ヲ與フルヿ勿レ然ラザレバ胸部及ビ頭上ニ多血蓄積ノ症ヲ發スレバナリ

○第六十三方（同上）

吐酒石一匁　蒸餾水一弓半乃至二弓溶解加後件

吐根末一刃　海葱蜜　覆盆子舍利別各半弓

右調勻每十密扭篤乃至十五密扭篤服一食匙以至得吐三回或四回臨服宜振蕩

○第六十四方

吐酒石二匁　吐根末二刃　加密列水二弓　莖菜舍利別半弓

右調和每八分時服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

○第六十五方（戾兒）

吐酒石三匁　蒸餾水二弓半　海葱蜜半弓

右調和取半劑頓服餘半劑每八分時服一食匙以至得吐

○第六十六方（葛私百兒）

吐根一錢至一錢半　熱湯適宜浸漬八分時濾過絞取一弓加後藥

安質没尼酒二錢　海葱蜜半弓

右調和每十密扭篤乃至十五密扭篤服一食匙以至得吐三回

Kitasato Memorial Medical Library

○第六十七方〔弗漢蠶弗〕

吐根粗末一錢半　橙皮二錢　純精酒石半錢　蒸餾水五弓

浸漬濾取四弓加後味

海葱蜜半弓

右調和頻々用一食匙以至得吐數回

○第六十八方〔別連杜〕

吐根末一刀至二刀　默栗薩水二弓　遏施印亞的兒八滴

右調和每十密扭篤服一食匙以至得吐數回臨服宜振蕩

〔主治〕感覺過敏ノ人殊ニ柔脆ノ婦人之ニ宜シ

○第六十九方〔戾兒〕

吐酒石二匁　吐根末一刀　白糖二刀

右調和為散等分十包每八分時服一包以至得吐

○第七十方〔臧歇蘭度〕

吐酒石一匁　漿粉一刀

右調和為散頓服

〔主治〕胃ノ感觸甚鈍ナル者之ニ宜シ其漿粉ヲ加フル者ハ吐酒石久ク胃中ニ停留シテ効力更ニ倍加スルニ因ル

○第七十一方

吐酒石一匁　吐根末二刀　漿粉半錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散等分三包每八分時服一包以至得吐

〔主治〕上ニ同シ

○第七十二方〔福倔篤〕

吐酒石二匁　海葱根末一匁　吐根半錢　白糖一錢半

右合匀為散等分六包每五密扭篤乃至十密扭篤取一包加密列飲和服以至得吐三回

〔主治〕第六十二方ヨリ七十二方至汚物逆行ノ候アル者ニ用フ

○第七十三方〔狨歇蘭度〕

吐根末一刀

右頓服

〔主治〕吐藥ヲ怠リ汚物久ク胃中ニ停留シテ胃ノ感覺遲鈍トナリ且患者下利スルカ如キハ吐藥中殊ニ吐根多量ヲ取テ頓服セシムルヲ要ス若之ニ吐酒石ヲ與フルトキハ下利愈加ハルガ故ニ用フルヿ勿レ患者甚下利シ易ク且胃ノ感覺過敏ナルトキハ吐藥ヲ用フルノ前胃部ニ芫菁膏ヲ貼シ阿芙蓉液二三滴ヲ内服セシムベシ

○第七十四方〔戾兒〕

新鮮牛膽半弓　濾過加後件

桂水三弓半

Kitasato Memorial Medical Library

右調和分數服一日服盡

主治病本復ノ期ニ及ヒ膽液ノ功用稀淡ニシテ消食機損敗シ腸ノ運機鈍滯シテ便秘ノ癖ヲナス者之ニ宜シ

○第七十五方（獵歇蘭度）

蒲公英越幾斯　睡菜越幾斯各二錢　大黄酒製丁幾

忽弗滿液各三錢　薄荷水四弓

右調和毎服一食匙日四次

主治病本復ノ期ニ方リテ胃腸ヲ補益ス

○第七十六方

括矢亜屑半弓　井水適宜煮下火浸漬八分時濾過取ニ八弓加後藥

大黄酒製丁幾三錢　忽弗滿液半錢　橙皮舍利別一弓

右調和毎服二食匙日四次

主治醫治ノ終末之ヲ用ヒテ功ヲ収ムベシ

第二膽液熱（フヒブリス、ビリオサ羅ガルコールツ蘭）

總テ膽液熱ハ薩滮爾剌列熱ト同一般ノ治法ニ依テ之ヲ療スヘシ憤怒劇シキニ因テ致ス所ノ者ハ吐劑ヲ用ヒテ全病ヲ驅除シ得ルヿ間之アリ但始大抵左ノ清涼中和鹽類ヲ與ヘ爾後吐藥ヲ與フルヲ要ス即醋酸加里（四十九方七十七方）孕鹼酒石（十八方。五十方至五十三方。八十二方。）孕硼酒石（七十八方）酒酸加里曹達

Kitasato Memorial Medical Library

五十五方。八十方。八十五方。霸王鹽七十九方芒硝五十六方至五十九方硇砂廿方。廿一方。等是ナリ或ハ始少量ノ吐酒石或ハ之ヲ上ノ中和塩ノ一味ト合シ八十方至八十二方用フベシ」膽液熱モ亦腸胃熱（按スルニ專薩澎爾剌列熱ヲ云）ノ治ト相似テ再次吐藥ヲ用フベキ者間之アリト雖或ハ吐藥ヲ禁スル者之アリ即肝臟ノ焮衝症状盛ニシテ全體焮衝性ノ熱ヲ帶ル者舌上乾燥ノ其色赤ク肝部ニ疼痛アリテ大ニ苦悶スル者ノ如キ是ナリ」此ノ如キ症ニ於テハ間放血ヲ要スルアリ肝部ニ蜞鍼ヲ用フルハ最欠クベカラズトス而ノ温暖ノ罨法及ヒ緩和灌腸法モ亦施スベキナリ」蜞鍼口癒テ后患部ニ水銀膏八十三方ヲ塗擦スベシ」

内服ニ甘汞劑四十八方且症ニ從フテ清涼鹽ノ溶液八十五方ヲ用フヘシ」焮衝性ノ衝動已ニ靜止スルトキハ即吐藥六十二方至七十三方。八十六方至八十八方。ヲ施スベシ」胃ニ拘攣症アル者ハ吐藥ヲ忌ムヘキ者間之アリ此ノ如キ症ハ沸騰散二方三方或ハ炭酸剥蔦亜斯ノ飽和液ニ吐酒石ヲ伍スル者八十九方。九十方ヲ稱用セリ」若貌僂窟或ハ姙娠等ノ為ニ吐劑ヲ用フルヿ能ハザル者ハ之ニ代ルニ下劑九十一方至九十五方ヲ以テス總テ膽液下行ノ徵アル者ハ吐後必下劑ヲ投ノ大便ヲ利スルヲ要トス○植物酸ハ膽液病ニ一種ノ奇効アルガ故ニ此ニ列擧セザルヿヲ得ズ就中荅麻林度ヲ以テ尤物トス九十三方九十六方」輓近

Kitasato Memorial Medical Library

ニ至リテ大ニ塩酸九十七方ヲ稱譽セリ病本復ノ期ニ至リテ
ハ大黄九十八方九十九方ヲ用ヒテ大便ヲ利スベシ

○第七十七方（私。傑。福傑爾）

醋酸加里一錢半　吐酒石一匁至三匁　上好満那一弓半　熱
湯六弓溶解

右調匀毎一時服一食匙

○第七十八方

蘆根流動越幾斯三錢（附）　孕硼酒石半弓　蒸餾水四弓溶
解

右調和毎一時服一食匙

○第七十九方

蒲公英流動越幾斯三錢（附）　覇王鹽二錢至三錢　蒸餾水四
弓溶化

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕第七十七方ヨリ第七十九方至皆解凝劑トシテ膽
液熱ノ初起ニ用フベシ

○第八十方（私。傑。福傑爾）

酒酸加里曹達半弓至一弓　吐酒石二匁至四匁　茴香水六弓
溶解加後藥

満那舎利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎一時服一食匙

○第八十一方〔私。傑。福傑爾〕

攝度里都鹽或瀉利鹽半弓至一弓　吐酒石一匁至三匁　橙皮

水五弓溶解加後藥

滿那舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕右ノ二方八十方。八十一方ハ粘液或ハ膽液ヲ帶ビタル汚物胃腸ノ裏面ニ膠着セル症ニ適當ス其症舌苔固着シ嘔氣。水瀉。舌上乾燥等ヲ以テ察スベシ」上ノ方ハ其汚物ヲ疎解シテ之ヲ排除シ易カラシム」症ニ應ノ塩劑及ヒ吐酒石ノ量ヲ増減スベシ」最初之ヲ服メ已ニ吐逆ヲ起ス者往々之アリト雖然レ氏其吐ハ漸次ニ鎮止シ胃中清潔トナリ且胃腑モ亦吐酒石ニ慣ルヽニ從フテ瀉下ノ効ヲ奏スルニ至ル」此他沙滮爾刺列熱ノ條下ニ擧ル所ノ數方亦解凝ニ供スベシ

○第八十二方

吐酒石一匁至二匁　孕鹼酒石半弓　蒲公英流動越幾斯三錢

〔附〕蒸餾水四弓溶解

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕膽液熱ノ初期解凝劑ニ供スベシ

Kitasato Memorial Medical Library

○第八十三方

水銀膏　遏(アル)兒(タ)抱軟膏各三錢

右合勻朝夕塗擦肝部

○第八十四方

甘汞六氏　白糖一錢

右調和為散等分六包每一時服一包

〔主治〕右ノ二方八十三方八十四方ハ膽液熱肝臓ノ焮衝ヲ帶ブル症ニ吐劑ヲ與フルノ前預之ヲ用フベシ○甘汞ヲ用フルトキ酸類ヲ忌ムハ固ヨリ論ナシ

○第八十五方〔私。傑。福。傑爾〕

酒酸加(ヰ)里曹達(ソーダ)　精製硝石各一錢半　黒櫻實水六弓溶化

加後藥

新製枸櫞汁　覆盆子舍利別各一弓

右調勻每一時服二食匙

〔主治〕熱熾盛ナル者之ニ宜シ殊ニ發作ノ時煩熱ヲ清涼セシムルニ之ヲ用フ

○第八十六方〔私。傑。福。傑爾〕

純精酒石半錢　吐酒石二氏至四氏

右調和為催吐散分二服

○第八十七方〔私。傑。福。傑爾〕

Kitasato Memorial Medical Library

○芒硝ヲ吐根末各一刀

右調和為催吐散頓服

○第八十八方〔私傑。福傑爾〕

大黄末半刀　吐根末一刀　吐酒石一氏

右調和為催吐散頓服

〔主治〕病者吐逆ノ証ヲ見ハシ醫モ亦膽液様ノ汚物ヲ胃及ヒ十二指腸ヨリ排泄セシメント欲スルトキハ上方ノ一八十六方至八十八方ヲ用フヘシ其他腸胃熱ノ條下ニ擧グル所ノ吐劑六十二方至七十三方モ亦可ナリ

○第八十九方〔遏。傑。栗屈的兒〕

精製炭酸剥蔫亜斯半錢　枸櫞汁適宜但飽和為度　蒸餾水二弓

吐酒石三氏

右調和先取半劑頓服後毎八分時服一食匙以至得吐

〔主治〕酷厲膽液性ノ汚物過多ナル者之ニ宜シ其症ハ口苦非常。舌苔厚固ニメ且緑色ヲ帯ビ心下苦悶堪フベカラズ前額疼痛アルヲ以テ徴スベシ此ノ如キ症ニ尋常ノ吐劑ヲ與レバ之ガ為ニ或ハ劇吐ヲ發シ或ハ全ク吐セズメ悪心ニ苦悩シ加之更ニ神經証ヲ併發スルヿ間之アリトス

○第九十方〔遏。傑。栗屈的兒〕

Kitasato Memorial Medical Library

○精製炭酸剥篤亜斯一刃　新絞枸櫞汁適宜但飽和為度　吐酒

石三氏　接骨木花水二弓　上好麝香四氏　加密列舎利別

六錢

右調和取半劑頓服後毎八分時服一食匙以至得吐臨服

宜振蕩

〔主治〕胃ノ拘攣ニ由テ吐スルヿ能ハザル者此方ヲ與ヘ

兼テ發泡膏ヲ貼シ以テ患者ヲ救フヿ往々之アリ又此

ノ如キ症ハ先芫菁膏或ハ蒸餅心ヲ胃部ニ貼シ其刺戟

始テ見ハルヽニ至リテ吐劑ヲ用フルヲ佳トス

○第九十一方〔私。傑。福傑兒〕

純精酒石　大黄末各一錢

右調和為散等分三包毎一時服一包

○第九十二方〔遏。傑。栗屈的兒〕

純精酒石　麻倔涅矢亜各半錢

右調和為散分六包先毎半時服一包大便利後毎一時服

一包

○第九十三方〔私。傑。栗屈的兒〕

荅麻林度一弓至一弓半　純精酒石半弓　熱湯六弓溶和加後

味

覆盆子舎利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻每半時服一食匙强

○第九十四方〔遏。傑。栗屈的兒〕

瀉利鹽六錢　上好滿那一弓半　井水四弓溶化

右調和先服半劑後每一時服一食匙

〔主治〕第九十一方ヨリ第九十四方至膽液樣汚物下行ノ徵アル者之ニ宜シ

○第九十五方〔遏。傑。栗屈的兒〕

精製苣硝一弓　井水四弓溶化加後件

櫻實舍利別半弓

右調和先服半劑後每半時服一匙强

〔主治〕膽液熱瀉スベキノ証アリテ熱勢熾ナル者之ニ宜シ病焮衝熱ニ傾ク片ハ精製硝石一錢ヲ配スベシ

○第九十六方

精製荅麻林度半弓　遏兒把膏末二弓〔附〕　熱湯二北溶解

右調和為飲料

〔主治〕總テ酸性ニメ瀉下ノ効ヲ具セル品ハ膽液熱ニ於テ最必須ノ者トス〔譬ヘハ冷水ニ屋施蔑爾ヲ加フル者。純精酒石。西國米煎。沙列布煎。米汁。或ハ裸麥煎ニ多量枸櫞汁ヲ加フル者ノ如キ是ナリ〕又煮ル果實及ヒ果實製ノ傑列乙等此ニ屬ス

Kitasato Memorial Medical Library

○第九十七方〔里篤阜〕

發烟海鹽精一錢　覆盆子水六弓　覆盆子舍利別一弓

右調和每半時或一時服一食匙

〔主治〕膽液太過ノ症ヲ治ス〔里篤阜氏膽液熱ニ塩酸ヲ用ヒテ他藥ヲ要セズ吐下藥ヲ與フルヿナク特此劑ヲ施シテ膽液太過ノ証漸次ニ退キ全治ヲ得シ者擧テ筭スベカラザルヲ證セリ

○第九十八方〔哿蘭篤〕

大黄　菖蒲根各一錢半　熱湯適宜浸漬濾取三弓加後藥

醋酸加里液一弓

右調和每服一食匙日四次

〔主治〕病癒ルノ期ニ方リテ胃ヲ補益シ大便ヲ利スルニ宜シ又腸胃病ニ於テ消化ヲ進ムル劑トシテ之ヲ與ヘ又消食器衰弱症之ニ宜シ

○第九十九方〔過傑栗屈的兒〕

酒製大黄丁幾　複方橙皮越栗幾矢爾〔附〕薄荷水各一弓

右調和每服一食匙日三次

〔主治〕病癒ルノ期ニ方リテ胃ヲ强壯ニシ大便ヲ利スルニ宜シ第七十四方ヨリ第七十八方ニ至リ功用相同シ

Kitasato Memorial Medical Library

第三　粘液熱（フェブリス。ピトイトサ。スレイム。コールツ蘭）羅

粘液熱ノ療法ハ始吐劑（六十二方至七十三方）ヲ與フルヲ通例トス後更ニ粘液蓄積スル氏ハ再三スルニ宜シ」吐後ハ硇砂ヲ以テ最適當ノ劑トス之ニ吐酒石ヲ配シテ更ニ佳ナリ（百方至百五方）下藥ヲ用フルハ最謹愼ヲ加フヘシ何トナレバ容易ニ過度ノ泄瀉ヲ致シ生力速ニ沈衰スレバナリ」然レ氏瀉劑ノ已ムベカラザルニ至テハ大黃ヲ佳ナリトス症ニ從テ甘汞若ハ葯剌巴根モ亦配伍スベシ（百六方至百八方）」私昆列印氏ハ大黃煎ニ酒酸加里曹達ヲ配スルヲ稱賛セリ」肺臟粘液ノ蓄積太過ナル者ハ金硫黃並ニ結兒默斯密涅剌列（百九方）偉効アリ

○第百方（私。傑。福傑爾）

甘扁桃（去皮者一弓）　覆盆子水（十弓）　爲乳劑溶後味

○精製硇砂（二錢）　白糖（適宜味佳爲度）

右調和每一時服二食匙

○第百一方（遏傑栗屈的兒）

精製硇砂　精製度碌布（各二錢）　菩提樹花水六弓溶化

右調和每一時服一食匙强

○第百二方（設兒列）

精製硇砂　安質沒尼酒（各一錢）　加密列水（十弓）　屋施蔑

Kitasato Memorial Medical Library

兒弓二

右調和毎半時服半盞子强

○第百三方

精製硇砂　精製度碌布各一錢　吐酒石一匁至二匁　加密

列水四弓溶化

右調和毎一時服一食匙强乃至二食匙强

○第百四方〔私傑福傑爾〕

精製硇砂一錢　吐酒石一匁　遏兒托膏半弓　黙栗薩水六弓

右溶和毎一時服一食匙强

〔主治〕第百方ヨリ第百四方至粘液ヲ疎解ノ之ヲ上下ニ

排泄シ易カラシム

○第百五方〔茉兒鳩私〕

吐酒石一匁　硇砂一錢　黒接骨木子昆設兒弗半弓〔附〕　黒

接骨木花水八弓溶解加後藥

○遏兒托舎利別半弓

右調勻毎半時服二食匙强

〔主治〕粘液熱ニ之ヲ用ヒテ粘液ヲ疎釋シ且皮表ノ運營

ヲ發揮スルニ宜シ

○第百六方〔私傑福傑爾〕

大黄末一錢半　精製硇砂四刃　遏泥子油糖半錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散等分四包每一時乃至一時半取一包冷水和服

○第百七方（遏傑栗屈的兒）

大黃末十六氏　甘汞二氏至三氏　橙皮舍利別適宜

右為塊頓服

○第百八方（遏傑栗屈的兒）

葯刺巴根末十二氏至十八氏　甘汞二氏　白糖十五氏

右調和為散頓服

〔主治〕第百六方ヨリ百八方至ハ粘液熱ニ下劑トシ用フヘシ然レ𪜈大黃及ヒ葯刺巴ノ如キハ肌熱微ナル時ノミ用ヒテ適當ナリトス

○第百九方（遏傑栗屈的兒）

結兒蔑斯密涅刺列一氏　孕鹼酒石　地榆根末各一刃

右調和為散分六包每服一包日一次乃至二次

〔主治〕粘液熱熱勢減退スルノ后粘液膠着セル者ヲ疎解シ分利ヲ促サント欲スル時之ニ宜シ

遠西方彙卷之一

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之二

獨乙　加。幾。安頓　著
和蘭　婪婆都　譯
侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯
南洋伊東亨健夫　參校

神經熱（フェブリス。子ルホサ羅セーニューコトルツ蘭）

世人通知セルガ如ク此症二種ノ別アリ○一ハ敏性神經熱（フェブリス。子ルホサ。フェルサチリス羅）○一ハ鈍性神經熱（フェブリス。子ルホサ。スチュピダ○チピュス羅）是ナリ二症共ニ腦及ヒ神經系ニ係ルト雖然レ氏敏

Kitasato Memorial Medical Library

性神經熱ハ生力虛衰シ覺機亢進スルノ症ヲ謂ヒ鈍性神經熱ハ生力虛衰シ覺機遲鈍ナルノ症ヲ謂フ右ノ二症ハ唯病ノ輕重ニ由テ異ナル乎或ハ其本性ヲ殊ニスル乎未之ヲ確定セズト雖輓近解體病理論家顯微鏡ヲ以テ發明セシ說ニ據レハ鈍性神經熱ノ本性ハ血液ノ調和變常ニ係ルトス是恐クハ單純神經熱ニアラサル所以歟

第一敏性神經熱（フェブリス。子ルホサ。フェルサチリス羅セーニューコールツ蘭）

此症輕易ノ者ハ格魯林水（百十方）ヲ以テ適當ノ劑トス稀鹽酸（百十一方）モ亦同性ナル者ニメ列乙屈氏ハ殊ニ之ヲ稱賛シテ格魯林水ニ代用セリ」病腦ヲ侵スヿ甚キ者ハ耳後ニ蜞鍼ヲ施シ。項窩ニ芫菁膏ヲ貼シ。頭上寒罨法。両脚温湯ニ浸シ。遍體諸部ニ芥子泥ヲ貼シ。殊ニ下肢ニ於テ交替シ貼スベシ」往昔多ク稱用セシ所ノ纈草。白芷。攝爾扁太里亞。亞兒尼加。亞的兒等ノ如キ衝動藥ハ（百十二方至百十五方）大ニ神經系ヲ衝動セシメ且麻痺ヲ遺シ易キガ故ニ用ニ臨テ最謹愼ヲ加フベシ」爾。噦。刷屈斯（人名）ハ大ニ實芰荅利斯ヲ賛美メ（百十八方）唯神經熱單純ナル者ニ用フルノミナラズ猩紅熱僂麻質斯熱ヲ合併セル症ニモ亦稱用セリ」理篤皁（人名）モ亦同ク之ヲ賞シ或ハ實芰荅利斯ヲ鹽酸ト配伍シ舌上稍苔ヲ帶ブル症ニ與フ患者甚安靜ナラズメ不寐ナル症ハ菲阿斯

Kitasato Memorial Medical Library

越幾斯百十九方百二十方ヲ用ヒ著シク痙攣証ヲ見ハス者ハ麝香ヲ與フ百廿一方百廿二方但衝動劇シキ症ハ之ニ甘汞ヲ伍シ百廿三方皮膚弛緩シテ粘汗ヲ發スル者ハ龍腦ヲ加フルニ宜シ百廿四方

肸爾私人名多血頭腦ニ畜積セル症ニ吐酒石ヲ用ヒ漸次ニ加増メ毎一時半氏乃至毎半時七氏ヲ與フルヿヲ稱譽セリ然レ氏唯血脉ノ生力抑壓セラレテ真ノ虚脱ニアラサル者ノミ之ヲ投與セリ○聖京倔僂麻質斯及ヒ腸胃汚物ヲ合併セル者ハ對症ノ療法ヲ施スベシ百廿五方至百廿七方

○第百十方〔瓶歇蘭度〕

格魯林水半弓至一弓　蒸餾水七弓　覆盆子舎利別一弓

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕單純神經熱ノ輕症ヲ治ス此他身體ヲ安息シ仰卧セシメ寒暄不齊ナカラシメ下肢ニ芥子泥ヲ貽スベシ

毎ニ只此簡易療法ニ由テ全癒スル者少シトセス

○第百十一方〔列乙屈〕

稀鹽酸二戔　蒸餾水八弓　覆盆子舎利別二弓

右調和毎一時取一食匙粘滑煎汁和服臨服宜振蕩

〔主治〕神經熱ヲ治ス

○第百十二方〔瓶歇蘭度〕

纈草粗末半弓　加熱湯蓋閉文火煮八分時濾過取八弓

Kitasato Memorial Medical Library

加後藥

民垤列里精六錢　忽弗滿液一刃　砂糖舍利別半弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕格魯林水百十方ヲ用ヒテ効ヲ収ムルニ足ラザル氏ハ此浸劑ニ轉ズベシ且微温浴ヲ施シテ發汗ヲ促スニ宜シ皮表ヨリ分利セシムルヲ最簡要トス」然レ氏合併ノ症殊ニ腸胃汚物ノ有無ニ着眼シ若之アル者ハ吐劑或ハ適宜ノ下劑ヲ與ヘテ之ヲ驅除スベシ

○第百十三方〔春姪隣〕

纈草三錢　雜腹蘭半錢　熱湯適宜浸放冷加後藥

遏設印亜的児半錢　橙花舍利別半弓

右調和每一時服一食匙

○第百十四方〔別連杜〕

亜児尼加花二錢　熱湯適宜浸漬濾取六弓加後藥

亜刺毘亜蘧謨二錢　橙皮舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

○第百十五方〔臧歇蘭度〕

亜児尼加根末半弓　水十弓煮至八弓加攝爾扁太里亜根末二錢上文火濾過加後味

忽弗滿液一錢　橙皮舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕第百十三方ヨリ百十五方至敏性神經熱ニ謹愼シラ與フベシ

○第百十六方〔春姪隣〕

醇醋二錢至三錢〔附〕　覆盆子水五弓　遏設印亜的兒半錢至一錢

覆盆子舍利別二弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕敏性神經熱ニ甚之ヲ稱用ス

○第百十七方〔別連杜〕　安没尼亜加枸櫞密幾私去爾

硇砂揮發華水〔附〕或鹿琥精半刃　枸櫞汁三錢

右調和乘沸騰服之

〔主治〕揮發衝動ノ方ニノ敏性神經熱ニ用ヒテ超絶ノ發汗劑トス

○第百十八方〔爾嚩刷屈斯〕

實芰荅利斯四刃　熱湯適宜浸濾取四弓加後味

遏兒托舍利別半弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕敏性神經熱ニ宜シ○刷屈斯氏累年實驗メ確定セシ說ニ云ク敏性神經熱ニ實芰荅利斯ヲ用フルトキハ其効他藥ニ卓越セリ初起之ヲ十分ニ用フレバ其危險ニ

Kitasato Memorial Medical Library

陷ルヲ預防シ已ニ危篤ニ及ブ者モ亦之ニ由テ佳候ニ轉ズト約メ之ヲ言ヘバ實芰荅利斯ハ是此症ニ一種ノ奇藥タリト刷屈斯氏病初直ニ之ヲ多量施用セリ即四刄ヨリ增加メ二錢ニ至リ濾液四弓ヲ取リテ十二時間ニ全量ヲ服盡セシム但毎服時刻ヲ遠隔セシム○然レ氏余之ヲ考フルニ所謂服量二錢ニ至ルハ危險ナリ余若之ヲ用フルヿアラバ理篤阜人名ニ傚ヒ半錢乃至一錢ヲ以テ濾液六弓ヲ取リ毎一時一食匙ヲ服セシムベシ然レ氏吾ガ此論モ亦實驗ニ出ヅルニアラズ何トナレバ鈍性神經熱係腹内症既往流行セシ以来余未單純ノ敏性神經熱ヲ療セザレバナリ

○第百十九方

菲阿斯越幾斯八氏　白糖四刄

右調和為散等分八包毎服一包日四次

○第百二十方〔過。傑。栗屈的兒〕

菲阿斯越幾斯　雜腹蘭東方産者各三氏　白糖一刄

右調和為散分六包毎一時服一包

〔主治〕右二方ハ敏性神經熱興奮機亢ブル者及ヒ不寐譫語ニ宜シ○余以為ラク方中菲阿斯越幾斯ノ服量稍過多ナリトス更ニ小量ヨリ始メテ唯日ニ三次或ハ四次

Kitasato Memorial Medical Library

之ヲ與フベシ一時毎ニ用フルヿ勿レ

○第百二十一方

麝香八氏至十二氏　白糖四氏

右調和為散等分八包毎一時服一包

○第百二十二方〔別連杜〕

麝香六氏　揮發鹿角鹽半錢　纈草油糖或桂油糖一錢

右調和為散等分為六服蠟紙包裹毎一時一服

〔主治〕敏性神經熱及ヒ神經性ノ皮疹ニ宜シ

○第百二十三方

麝香八氏至十二氏　甘汞六氏至八氏　白糖四刀

右調和為散等分八包毎一時服一包

〔主治〕敏性神經熱神經証ヲ見ハスヿ甚シク且興奮力亢盛スル者ニ宜シ

○第百二十四方

麝香八氏至十二氏　龍腦細碎者二氏至四氏　白糖四刀

右調和為散等分八包毎一時乃至一時半服一包

〔主治〕神經熱皮膚弛緩シテ粘汗ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百二十五方〔私幾欣獨蒲〕

吐根粗末六氏至半錢　熱湯適宜浸漬八分時濾取六弓

右毎一時服二食匙強

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕聖京倔熱神經症ニ轉移スル者此方奇特ノ劑トス

○或ハ亜刺毘亜蘧謨漿半弓或ハ橙皮舍利別二錢或ハ沙糖少許ヲ配伍スルモ可ナリ或ハ症ニ從ヒ吐根飽熟スル時過児拖煎ヲ加ヘ或ハ纈草或ハ龍腦三氏ヲ和シ用フ

○第百二十六方〔曾別倫回母〕

蔔萄草葉浸五弓浸ニ蔔萄草葉半弓製之　民垤列里精一弓　加密列舍利別六錢

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕神經熱輕症殊ニ聖京倔及ヒ僂麻質斯症ヲ合併セル者之ニ宜シ

○第百二十七方〔同上〕

纈草三錢　熱湯適宜浸濾取四弓加後藥

民垤列里精半弓　過設印亜的児一錢　雜腹蘭舍利別一弓

〔附〕

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕神經熱輕症僂麻質斯ヲ合併セル者及ヒ神經性疹ニ用ヒテ皮膚ノ運機ヲ挑起スルニ宜シ

第二　鈍性神經熱一名重証神經熱フェブリス子ルホサス壬ピダ羅チピュス蘭

此症興奮機ノ强弱ト外来ノ諸件トニ由テ種々其景況ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

殊ニス」或ハ病邪觸動機及ヒ補給機ヲ侵スヿ專ニシテ知覺機ニ係ルヿ却テ少ク諸見証遍ク全體ニ關係スル症アリ」或ハ專ラ頭腦（鈍性神經熱係腦症）肺臟（鈍性神經熱係肺症）若クハ腹内（鈍性神經熱係腹内症）ニ係在スル症アリ」蓋此病ハ世間困窮ノ時殊ニ戰場及ヒ凶年ニ一般流行ス又都會軍陣ノ圍ヲ受クル時大ニ此症ヲ患フルヿアリ或ハ病院及ヒ獄中ニ行ハルヽ者アリ其症最傳染シ易シ（傳染神經熱）」或ハ往々一種ノ疹ヲ發シ（發疹神經熱）或ハ斑ヲ發スル者（發斑神經熱）アリ」或ハ最モ恐怖スベキ證状ヲ見ハシテ腐敗性ヲ帶ビ加之東方疫（オーステルスベスト）發黄熱ニ類似セル者モ亦間之アリ○此症品類繁冗ナル此ノ如シト雖疾醫ノ要ハ之ヲ分チテ係腦症係肺症係腹内症ト為スヲ最適當ナリトス

（甲）鈍性神經熱係腦症（チピュス、ケレブラリス羅ヘルセン、チピュス蘭）

此症一千八百十五年ノ役和講以來之アルヿ稀ナリト雖其以前一千八百六年及ヒ七年殊ニ一千八百十二年ヨリ十五年至大ニ流行シ弱齡壯實ノ徒此症ニ罹リシ者最多シ」其熱始七日間焮衝性ヲ帶ヒテ多血頭腦ニ畜積シ或ハ真腦焮衝ヲ發シ之ガ為ニ神經性諸証ヲ見ハスニ至レリ此ノ如キ症ハ初起身體及ヒ室内病床倶ニ清涼ニ保護シ被衾ヲ輕クシ飲料ニ冷水ヲ與フルヲ須要ナリトス」頭ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

寒罨シ全身ヲ冷洗シ桶中ニ坐シテ灌水シ水節ヲ以テ冷水ヲ射注スル等皆即効ヲ奏セリ」蓋此諸法ハ皮膚乾燥メ熱シ面色赤クシテ頭熱灼クガ如ク昏々眠ヲ嗜ミ或ハ狂妄ヲ發シ且血管ノ熱熾盛ナル症ニ佳ナリトス」頭腦ノ疾患順良ニシテ肌膚微熱ヲ帯ビ滋潤セル者ハ微温湯中ニ浸坐シ即時冷水ヲ灌注シテ更ニ効アリ○又此症刺絡ヲ必要トセリ之ヲ施セバ焮衝將ニ發セントスルヲ預防シ已ニ發スル者ハ之ニ由テ除クヿヲ得其瀉血焮衝皮ヲ生セシ者之アリ此ノ如キ者ハ真焮衝ノ為ニ死セリ但此ノ如キ症ハ當時モ亦之アルヿ甚鮮シ」方今間之アル所ノ鈍性神經熱係」腦症ハ今時ノ流行性ニシテ昔年ノ病性ニ異ナリ容易ニ刺絡スベカラズ」故ニ真ニ刺絡ノ定証ヲ具ヘズ麻痺甚シク譫言狂妄スル症面色赤クメ熱シ焮衝狀ヲ見ハシ弱齡强實ナル者ハ顳顬或ハ耳後ニ放蜞八頭ヨリ十二頭若クハ十五頭至其飽落後モ亦少間出血セシムベシ數次蜞吮ヲ要スル者モ亦間之アリ若蜞ナキトキハ吸角法モ亦可ナリ」兼テ項窩芫菁膏。腓腸芥子泥。足蹠温暖琶布ヲ貼スル等適當ナリトス」大便通利ニ注意スルヿ最簡要ナリ腸胃ノ汚物或ハ膽液ヲ帯ブル症ハ殊ニ然リ」但緩ナル旃那浸ニ酒酸加里曹達ヲ加フル者百廿八方或ハ旃那煉膏ニ

Kitasato Memorial Medical Library

茶匙ヲ服セシムルニ宜シ」頭上血液壓迫アルガ故吐劑ハ嚴ニ忌ムベキナリ◯先放血シ「按ずるに蜱吸ヲ云」頭上ニ寒罨法ヲ施スノ后甘汞一氏乃至二氏若ハ三氏ヲ與フルヒハ効ヲ奏スル者多シ甘汞ハ大便ヲ利スルヲ以テ殊ニ益アリトス」其症ニ隨ヒ甘汞一味百廿九方ヲ與フル者多シ或ハ小量阿芙蓉ヲ加ヘ用フ百十三方阿芙蓉ヲ伍スル者ハ練歷愼重ナル(ラヂ)歇蘭度(ラン ド)氏殊ニ稱賛スル所十リ◯格魯林(コロリン)水百十方稀鹽酸百十一方燐酸百廿二方等ノ如キ鑛酸ハ熱勢活潑發汗太過失血太甚腐敗ニ傾ク症等ニ甚稱譽セリ然レ氏溶崩下利ニハ適當ナラズ大便通利適宜ナラザル片ハ酒石酸百廿三方苔麻(ト)林度(リンド)百廿四方苔麻林度(リンド)乳百廿五方果實煎ノ飲料等ノ如キ植酸ヲ服用セシメテ効アリ◯劇シキ痙攣疼痛單ニ神經ノ刺衝ニ因ル者ハ阿芙蓉百廿六方莫爾比(モルヒ)捏百廿七方麝香百廿一方至百廿四方葛私篤謨(ストレキニン)百廿八方等ヲ用ヒ兼テ蒸餅ヲ貼シ酒精劑(アルカリ)亜的兒(アトロピン)劑ヲ塗擦シ鎮痙藥ヲ灌腸スル等ニ由テ上方ノ効ヲ扶ク可シ但衝動藥ヲ用フルハ最謹愼ヲ加フベシ」既往流行ノ神經熱ニ衝動劑ヲ誤用シテ大害ヲ致セリ蓋衝動劑ハ殊ニ神經系ノ麻痺及ヒ腐敗ニ傾ク症ニ於テ必適當ス」衝動藥ニ屬スル者ハ即纈草百九方。百十二方。百十三方。百廿七方。百廿九方至百四十方。白芷百四十一方。百四十二方。百四十三方。百四十四方。攝爾倫(セルアリン)太里亜(ペンタリア)百四十五方亜兒尼加(アルニカ)百四十六方。

Kitasato Memorial Medical Library

百四十六方諸種ノ亞的兒(アーテル)劑百十六方。百四十九方。百安没尼亞(アムモニア)劑百四十八方至百五十二方燐百五十五方是ナリ然レ圧重症ニ在テハ衝動劑却テ害アリ之ガ為ニ病加重スル者數之アリ唯龍腦ハ之ニ異ナリ皮膚粘滑ニシテ脈小。疾。弦。ナル者。眠瘡。或ハ手足指頭寒壞疽ノ症ニ十二時間ニ十氏乃至十二氏ヲ用ヒテ偉効アリ加之病毒分利ヲ催進ス或ハ之ヲ單用シ百五十六方或ハ之ヲ醋ニ加ヘ百五十七方或ハ症ニ應ジ麝香ニ配伍ス百五十八方○病本復スルノ時ニ方テハ苦味ノ越幾斯劑百五十九方菖蒲根百六十方ヲ用フ但大ニ衰弱セル者ハ幾那浸劑百六十一方或ハ煎劑百六十二方ヲ用フルヿヲ稱譽ス其他飲食ヲ節スルヿ簡要ナリ

○第百二十八方

旃那一錢　熱湯適宜浸濾取三弓加後味

酒酸加里曹達二錢至三錢　滿那舍利別半弓

右調和毎一時服一食匙以至得下

〔主治〕鈍性神經熱係腦症腸胃汚物ヲ合併シ及ヒ便秘スル者之ニ宜シ

○第百二十九方〔臧歇蘭度〕

甘汞八氏至十六氏　白糖四匁

右調和為散等分八包毎一時乃至一時半服一包

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕頭腦ノ焮衝性疾患及ヒ神經熱ニ適應ノ消焮法ヲ施スノ后腦ノ關係連綿トシ退カサル者之ニ宜シ

○第百三十方〔同上〕

甘汞八匁　精製阿芙蓉二匁　白糖四匁

右調和為散等分八包毎一時服一包

〔主治〕頭腦焮衝性ノ疾患アリシ症變シテ敏性神經熱或ハ鈍性神經熱ト為ル者頭面ノ赤色及ヒ肌熱減退シ脈小且軟トナルトキハ小量ノ阿芙蓉ニ甘汞ヲ配伍スル者ヲ主藥トス此方無比ノ偉効ヲ奏スルヿ屢之アリ」兼テ項上ニ芫菁膏ヲ貼スベシ

○第百三十一方〔朴瀧私〕

精製燐酸二錢　覆盆子舍利別二弓

右調和毎一時取一茶匙冷水和服

○第百三十二方〔同上〕

精製燐酸二錢　覆盆子舍利別二弓　遏児把煎五弓煮遏児把一錢取之

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕右二方百卅一方百卅二方　敏性神經熱及ヒ鈍性神經熱ニ宜シ」燐酸ハ十二時間ニ一二錢乃至三錢ヲ用フベシ」燐酸ハ甚佳味且爽快ノ藥ニシテ肌熱アル者。多血一部

Kitasato Memorial Medical Library

畜積セル者。身心不安。ニ宜シク且煩渇ヲ消シ胃モ亦能之ヲ受クルニ堪フ

○第百三十三方

酒石酸一錢　覆盆子水五弓溶和加ニ後藥

覆盆子舍利別一弓

右調和毎ニ一時服ニ一食匙強

○第百三十四方

精製荅麻林度一弓半　純精酒石二錢　覆盆子舍利別適宜

右作ニ軟煉膏朝夕服ニ一茶匙乃至二茶匙

○第百三十五方　荅麻林度製乳清

牛乳二北　入ニ壺煮沸後加ニ荅麻林度髓四弓更上ニ火攪和

至ニ凝聚濾過

右毎ニ一時服ニ半盞子

主治　右三方百卅三方至百卅五方。　焮衝熱。膽液熱。神經熱ノ焮衝ニ傾ク者。慢性肝臓病。及ヒ其他ノ症ニ於テ清涼且瀉ヲ要スル者之ヲ用フ

○第百三十六方

精製阿芙蓉一匁　白糖二匁

右調和為ニ散等分四包朝夕服ニ一包

○第百三十七方

Kitasato Memorial Medical Library

醋酸摸爾比捏一匁　白糖四刀

右調和為散等分八包應症朝夕服一包

○第百三十八方

葛私篤僂謨二匁至四匁　白糖半刀

右調和為散分八包每一時乃至二時服一包

〔主治〕右三方百卅六方至百卅八方　疼痛痙攣單ニ神經ノ刺衝ニ由ル者ヲ鎮靜スルニ宜シ○麝香百廿一方至百廿四方モ亦佳ナリ

○第百三十九方〔職歇蘭度〕

纈草粗末二錢　白芷粗末　亜兒尼加花各一錢　注熱湯蓋閉上文火煮四分時濾取四弓加後藥

硇砂加過泥子精　忽弗満液各半錢　砂糖舍利別半弓

右調和每一時服一食匙

○第百四十方〔福倔篤〕

纈草　白芷各半弓　注熱湯適宜浸漬濾取六弓加後藥

鹿琥精　忽弗満液各二錢　麗春花舍利別六錢

右調和每一時服一食匙

○第百四十一方〔別連杜〕

纈草半弓　熱湯適宜浸漬濾過取五弓加後藥

醇醋二錢　過設印亜的兒一錢　橙花舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和毎一時服一食匙臨服宜振蕩

主治右三方（百廿九方至百四十一方）敏性症ト鈍性症トノ論セズ總テ順症神經熱ニ用フベシ然レ𪜈其症些モ燃衝ノ候ナク純粹神經性ノ者ニ用フベキノミ○臙歇蘭度人名ハ之ニ兼テ洗滌法。心窩香竈藥卷法。芥子泥。（十二時毎二之ヲ施シ急劇ノ症ハ六時毎ニス）弱壯藥灌腸法。且微温湯浴（二十八度）等ヲ殊ニ稱用セリ並ニ滋養衝動ノ食餌。雞卵水ニ酒ヲ加フル者。肉羹汁等ヲ與フ○然レ𪜈テスレバ總テ是等ノ衝動藥ハ敏性神經熱鈍性神經熱俱ニ容易ニ用フベカラズトス蓋此ニ右ノ三方及ヒ左ノ一二方ヲ列擧スル所以ノ者ハ一ハ此書ヲ全備セシメンニハ治法ノ来歴ヲ示スナリ且予ガ徒豈臙歇蘭度福倔篤（別連杜陽栗屈的）爾氏等ノ如キ大家ノ意ニ反ク他方ヲ擧クルヲ得ンヤ況ヤ復既往流行セシ神經熱ニ於テハ衝動強壯ノ療法偉効ノ奏セシヿ明確ナルヲヤ後来復神經熱ヲ療スルニ衝動強壯ノ療法ヲ須ツヿナキヿ能ハジ

○第百四十二方（佛陽）

白芷（半匁）熱湯四匁浸漬濾加二後藥

櫻實舍利別（半匁）

右調和毎半時服二食匙強

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕陽氏云ラク神經熱腸胃汚物ヲ兼ヌル症及ヒ腐敗性ノ症ニ於テ汚物已ニ大抵除キ脈小ニシテ軟且振慄シ。舌或ハ清潔或ハ黒色或ハ舌上ニ粘液附着シテ顫振シ。皮膚汚穢皺縮シ或ハ微冷シ或ハ灼熱シ或ハ乾燥シ或ハ粘濕シ。呼吸苦悶。面色慘憺且羸瘦シテ常形ヲ失シ。眼目或ハ濁リテ光ヲ失ヒ或ハ硝子ヲ覆フガ如ク或ハ水ヲ充ツルガ如ク。尿不熟ニシテ灰白或ハ甚溷濁ナル者等此方用フベシ已ニ此ノ如ク殆活路ノ望ヲ失フ者モ白芷ノ奇驗アルヿ驚クベシト

○第百四十三方〔同上〕

白芷　纈草　攝爾扁太里亜各二錢　注熱湯六弓蓋閉煮濾過加後藥

硫酸亜的兒一錢　橙皮舎利別三錢

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕惡性神經熱或腐敗熱症脈沈ニシテ震慄シ。呼吸不齊或ハ疾速或ハ障碍スル所アリ。喃々譫語シ。皮膚冷或ハ粘汗潤フ者之ニ宜シ

○第百四十四方〔過。傑。栗屈的爾〕

白芷　菖蒲根各三錢　熱湯八弓浸漬又煮四分時濾過加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

硫酸亜的児二刃　橙皮舎利別半弓

右調和毎半時服一食匙

○第百四十五方〔同上〕

攝爾扁太里亜六錢　熱湯八弓浸漬暫時煮沸濾加後藥

忽弗満液二錢

右調和毎半時服一食匙

○第百四十六方〔訶倫〕

亜児尼加花半弓　熱湯適宜浸濾過取六弓冷定加後藥

鹿琥精二錢　硫酸亜的児一錢

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕第百四十四方ヨリ第百四十六方至神經熱鈍性衰弱ヲ帯ブル者之ニ宜シ

○第百四十七方〔羝歇蘭度〕

桂油十滴　龍涎香越仙扶亜或麝香越仙扶亜半錢　忽弗満抜爾撒謨非荅一錢　硫酸亜的児一錢半　舎電阿芙蓉液一刃

右調和毎一時乃至一時半服三十滴

〔主治〕神經熱麻痺ノ候極度ニ至リ生力虚脱ノ死ニ瀕シ意識並ニ知覺運動ヲ喪失シ且肚腹膨脹ノ二便失禁セル症右ノ藥液ヲ以テ左法ト兼子施ストキハ回生ノ効ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

收ムルヿ間之アリ即古列印酒ヲ匙抄シテ與ヘ。發疱膏四枚一齊ニ貼シ。一ハ心窩其他ハ足蹠ニ貼ス香竄藥湯ニ蔔萄酒若クハ燒酒ヲ加ヘテ猛烈ノ浴法湯温ニ十八度ヲ行ヒ。蔔萄酒二三弓ヲ灌腸トシ。肚腹及ヒ頭上ニ氷冷罨法ヲ用ヒ加レ之頭上ニ烙鉄ヲ施スベシ

○第百四十八方〔遏。傑。栗屈的爾〕

揮發鹿角鹽半錢　亜剌毘亜蘧謨漿二錢　桂水四弓　雜腹蘭舍利別一弓

右調和毎半時服一食匙强

○第百四十九方〔列墨爾〕

揮發鹿角鹽四匁　麝香二匁　纈草油糖半刀

右調和為散等分八服蠟紙包裹毎半時一服

〔主治〕右二方百四十八方百四十九方ハ鈍性神經熱著シク神經証ヲ見ハシ且皮膚鈍性衰弱ノ症ニ宜シ

○第百五十方〔遏。傑。栗屈的爾〕

東方産麝香二刀加白糖適宜研和　揮發鹿角塩半刀至一刀　黙栗薩水四弓　桂丁幾　阿芙蓉舍利別各半弓

右調和毎半時服一食匙臨服振蕩

〔主治〕鈍性神經熱大ニ神經証ヲ發スル者脈小。弱。ニシテ結代シ。四肢冷。小便灰白。呼吸痙攣ヲ帯ヒ。昏々嗜眠スル

Kitasato Memorial Medical Library

者之ニ宜シ

○第百五十一方〔速別倫回母〕

龍腦細碎三匁　揮發鹿角鹽五匁　纈草油糖半刀

右調和為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

〔主治〕鈍性神經熱熱性疹ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百五十二方〔同上〕

龍腦一刀　亜刺毘亜蘧謨末二錢　合和加接骨木花水六弓作乳劑再加後藥

鹿琥精二錢　雜腹蘭舎利別一弓

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕神經熱麻痺証ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第百五十三方〔福倔篤〕

攝爾扁太里亜六錢　法尼利二錢　古依斯巴尼亜酒適宜

上文火浸漬二時屢振蕩之爾後絞搾取十二弓加後味

龍腦半錢以再餾燒酒適宜溶解　過設印亜的兒一錢　桂舎利別半弓

右調和每四分時之三服二食匙

〔主治〕鈍性神經熱患者年老已ニ衝動藥一習慣セル者之ニ宜シ

○第百五十四方〔朴瀝私〕

Kitasato Memorial Medical Library

○攝爾扁太里亞六錢　燒酒五弓　水適宜　上文火飽熟八分
時之三濾過取六弓和後藥
龍腦半錢　拔爾撒謨孛露半錢至一錢　亞剌毘亞蘧謨末二錢
右合作乳劑更加遏設印亞的兒一錢每四分時之三服一
食匙
〔主治〕前方ニ同シ前方ハ法尼利及ヒ依斯巴尼亞酒ノ為
ニ其價貴シ但法尼利ハ拔爾撒謨孛露ヲ以テ代用スベ
シト雖桂舍利別ニ至テハ缺クベカラザルガ故ニ貧家
ニ處スル片ハ此方ヲ以テ福倔篤氏ノ製方ニ優レリト
ス

○第百五十五方〔曾別倫回母〕
燐一氏至二氏　白罌粟子油三錢　微温溶解投亞剌毘亞蘧
謨末徐々搗和加後藥
雜腹蘭舍利別一弓　白芷浸六弓以白芷半弓取之
右為乳劑更配伍鹿角精二錢每一時服一食匙臨服宜振
蕩
〔主治〕鈍性神經熱及ヒ同種ノ熱症神經系ノ衰弱ヲ兼子
或ハ麻痺ニ類似セル者之ニ宜シ
○第百五十六方
龍腦六氏至十二氏　白糖一錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散等分六包每一時服一包

〔主治〕鈍性神經熱ニ用ヒテ病邪ノ分利ヲ進メ殊ニ皮膚粘膩脈小。疾、弦。ナル症ニ宜シ又寒壞疽ヲ治ス

○第百五十七方〔孤刺律私〕里布私氏龍腦醋密幾斯去爾

龍腦六氏　亜刺毘亜蘧謨一錢　常水　蒸餾水各三弓　砂糖舍利別半弓

右調和作乳劑每一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱發斑症上方主治ノ諸証ヲ具フル者之ニ宜シ

○第百五十八方

龍腦六氏　麝香十二氏　白糖一錢

右調和為散等分六服每一時一服

〔主治〕鈍性神經熱皮膚粘膩シ痙攣証ヲ見ハシ生力大ニ虚脱スル者ニ宜シ

○第百五十九方〔戻児〕

葛児儒別越幾斯六錢　加薄荷水四弓溶解加後藥

民垤列里精二弓

右調和每一時服一食匙強

〔主治〕鈍性神經熱快復ノ期ニ方リテ強壯ノ効ヲ奏シ且皮膚ノ機能ヲ助クルニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第百六十方（曾別倫回母）

菖蒲根（二錢）以熱湯適宜煮將熟加菖蒲根黃橙皮各一錢濾取六弓冷定更加後藥

複方幾那丁幾（一錢）　甘硝石精（半錢）　橙皮舍利別（一弓）

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕粘液熱神經熱ノ重症及ヒ他ノ虛衰病後之ヲ用フルニ宜シ○然レ氏先麻爾羅歇及ヒ睡菜越幾斯等ノ如キ衝動セザル者（七十五方。七十六方。九十八方。九十九方。）ヲ與ヘ後漸ク香竄苦味ニシテ更ニ衝動スル劑ヲ與フルヲ最佳ナリトス

○第百六十一方

赭色幾那（粗末四錢至六錢）注熱湯適宜蓋閉安暖所浸漬八分時濾過取六弓加後件

桂舍利別（半弓）

右調和每一時服一食匙

○第百六十二方

赭色幾那（粗末半弓）常水適宜煮八分時濾過取四弓加後藥

忽弗滿液（半錢）　桂舍利別（半弓）

右調和每一時半服一食匙

〔主治〕右二方（百六十一方。百六十二方。）○鈍性神經熱快復ノ期ニ方リ

Kitasato Memorial Medical Library

テ生力虚衰スルヲ治ス○但煎劑ハ服シ難キガ故ニ浸劑ヲ優レリトス

○第百六十三方〔遏傑。栗屈的爾〕

硇砂揮發華水　芫菁丁幾各半弓　捲垤兒精三弓

右調和塗擦脊椎及両股

〔主治〕神經熱鈍性衰弱ニ傾ク者之ヲ用ヒテ效アリ

○第百六十四方〔爾噦刷屈斯〕

硇砂加石灰精一弓至一弓半　阿芙蓉丁幾一錢至一錢半　燒酒四弓

右調和洗顔面及顳顬

〔主治〕惡性神經熱及ヒ腐敗熱。輓近ノ傳染神經熱。惡性猩紅疹。其他皮膚ヲ衝動シ其運機ヲ挑起スベキ症ニ宜シ

○刷屈斯氏ハ其宜ニ應シ燒酒ニ代フルニ白芷精ヲ以テ之尚且此ニ忽弗滿拔爾撒謨非答ヲ加フ

○第百六十五方〔福倔篤〕

褸方白芷精四弓　酒製硇砂精一弓〔附〕

右調和洗前額及両掌

〔主治〕鈍性神經熱及ヒ虚性神經症ニ宜シ

○第百六十六方〔春姪隣〕

龍腦一刃　加後藥溶化

再餾燒酒二弓　醋八弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和温洗両掌胸部肚腹等日一次

〔主治〕鈍性神經熱皮膚機能ヲ失ヒ且弛緩セル症ニ宜シ

○第百六十七方〔遏傑栗屈的兒〕

〔主〕龍腦半錢　精製阿魏一錢　加雞子黄適宜捏和更加黄幾那煎四弓以幾那半弓製之

右調和微温灌腸

○〔主治〕神經熱ニ宜シ

○第百六十八方〔福倔篤〕

上好麝香十氏　纈草細剉半弓　漿粉半錢

右調和為芳香劑入硝子壜貯毎二時乃至三時取三分一以熱湯浸出灌腸

〔主治〕神經熱痙攣ヲ帯ビ嚥下困難ナル者之ニ宜シ

〔乙〕鈍性神經熱係肺症チピュスピュルモナリス羅ロンゲレチピュス蘭

鈍性神經熱流行スル時多血頭腦ニ畜積スル症多ク之アルガ如ク血液肺ニ逼迫シテ焮衝ヲ起シ所謂鈍性神經熱兼肺焮衝症ヲ發スル者亦之アリ按スルニ此症ハ即求弗健蒲律篤人名ノ所謂遏兒扁私扶骨病名ト同症タリ此症ヲ療スルニ放血セザル者罕ナリト雖之ヲ施ストキハ概子謹慎ヲ加フヘシ蜞鍼ノ如キハ諸症通用シテ可ナリ之ヲ行フテ後大量ノ甘汞百九十方ヲ稱用シ又小量甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍用

Kitasato Memorial Medical Library

スルヲ佳トス（百三十方）涅優滿氏ハ此方及ヒ龍腦（百五十六方。百五十八方。）ヲ稱用スルノ他阿魏（百六十九方）ノ偉効ヲ賞ス聖拍咄私澎兒倔（地名）ノ醫室兒滿（人名）ハ亜兒尼加花浸ニ吐酒石ヲ加ヘ用ヒ（百七十方）肺臓已ニ肝（ヘパテサ）質ニ變セル者ハ亜兒尼加花浸ニ安息香花ヲ加フルヲ好トス」祛痰ヲ促スハ金硫黄（百七十一方）遠志（百七十二方）等ヲ用フヘシ」衝動强壯ノ療法ハ不可ナリ

又喉頭及ヒ食道頭ニ係ル症間之アリ（鈍性神經熱係ニ喉頭及食道頭症）」頸圍ニ蜞鍼ヲ施シ甘汞ヲ與ヘ緩和蒸劑含漱劑等ヲ用フベシ」然レ𪜈此療法通例効ヲ収ムルヿナシ頸圍ニ疾患見ルノ后十二時或ハ二十四時ニシテ死ニ歸スルヲ常トス」

理篤阜（リートザウ）氏ハ此症ノ初起頸圍ニ猛烈ノ芫菁硬膏ヲ貼シ大量甘汞ヲ服セシムルヲ稱賛ス此法モ亦必然ノ効ヲ期スベカラズト雖理篤阜（リートザウ）氏嘗テ鈍性神經熱係ニ喉頭症ノ初起之ニ由テ患者ヲ救フヿヲ得タリト云フ

○第百六十九方

阿魏（半錢至一錢）　亜刺毘（アラビ）亜蘧（アゴ）謨（ハ）漿（半弓）　加ニ水四弓一丁寧研

和加ニ白糖半弓

右調和為乳劑毎ニ一時服ニ一食匙

〔主治〕涅優滿（子ウマン）氏阿魏ヲ以テ鈍性神經熱係肺症ノ良藥トシ十二時間ニ阿魏四刃至ヲ與ヘ且皮膚ヲ摩擦シテ誘

Kitasato Memorial Medical Library

導ノ効ヲ奏セシム

○第百七十方〔窒児満〕

亜児尼加花二錢至三錢　熱湯適宜浸濾取六弓溶化吐酒

石六匁後加後藥

桂水二錢

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱ニ屢合併スル所ノ真肺焮衝ヲ治ス○

窒児満氏吐酒石ニ堪ヘザル者ハ亜児尼加單味ヲ用ヒ

或ハ硇砂加過泥子精ヲ伍用セリ

○第百七十一方

金硫黄四匁至八匁　菲阿斯越幾斯三匁至六匁　白糖四刀

右為散等分八包毎一時半乃至二時服一包

〔主治〕鈍性神經熱係肺症及ヒ他ノ胸病ニ於テ祛痰ヲ促

スニ宜シ

○第百七十二方〔曾別倫歇愔〕

遠志三錢　以水八弓煮濾過取六弓放冷後加後藥

龍腦細末一刀　亜刺毘亜蘧謨末二錢

右作乳劑更加鹿琥精二錢雜腹蘭舎利別一弓調和毎一

時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕鈍性神經熱虚性ノ胸患ヲ兼ヌル者ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

丙鈍性神經熱係腹內症チヒスバアブドミナリス羅アバドミナールチヒス蘭

方今此症最多シ或ハ專此症流行スル地アリ」往昔此症ニ醫療ヲ專要トセシ時ハ衆醫ノ說病初衝動劑ヲ以テ之ニ處スルヲ佳トセリ○然レドモ其效驗ナキヲ確定セシヨリ漸他ノ諸般ノ療法ニ轉移ス其中良效ヲ得ル者間之アリト雖又竟ニ之ヲ自然ノ良能ニ委スルヲ本法トシ其功用ヲ確徵スルニ至レリ其甚シキニ至テハ鈍性神經熱係腹症ヲ療スルノ最勝法ハ一事モ施為セザルニ在リト公然夸言スル者亦之アリ」吾輩モ亦多般ノ技倆ニ勞センヨリハ寧一事モ為スナカラン假令之ヲ為スモ獨衝動セザルノ法方其害少シト謂フベシ又按ズルニ其兩間ニ於テ中庸ヲ取ル者鈍性神經熱係腹內症ヲ療スルニ於テ最良工タルベシ漢都氏小冊子ヲ著ハシ此症ヲ治スルノ簡易法ヲ載セリ○理篤阜氏ノ療法モ亦簡易適度ニメ賞スベシ其法初起病勢甚興奮ノ稽留熱ノ証狀ヲ見ハスキハ小心ニ刺絡ヲ行フテ放血シ頭痛劇シキ者ハ兩耳後ニ放蛭三頭ヨリ四頭至諮語甚シキ症ハ頭上ニ寒罨法ヲ施スヤリ○咳嗽甚シキ者ハ胸上ニ蛭鍼ヲ施シ心窩ニ芥膏ヲ貼シ乳劑ニ硝石ヲ伍シテ十一飲服セシムベシ○腸ニ著大ノ關係アル者ハ甘汞一分至一時乃至一時半毎ニ之ヲ與

Kitasato Memorial Medical Library

ヘ肚腹ノ痛所ニ芫菁膏ヲ貼シ或ハ吐酒石膏ヲ塗擦シテ發疹スルニ至ルベシ」爾後舌苔厚キ症ハ格魯林水ニ亜刺毘亜蘧謨漿ヲ和スル者（百八十六方）精製食鹽（百八十七方）或ハ粘滑ノ煎汁ニ鹽酸ヲ加フル者（百八十八方）ヲ用フベシ」劇シキ下利ヲ止ムルニハ漿粉ノ灌腸（百九十八方）ヲ行フベシ但阿芙蓉ヲ加フルヿ勿レ」皮膚燥熱灼クカ如キ症ハ灌水ヲ施シテ速ニ之ヲ拭ヒ弗刺涅爾（毛布ヘ名）ヲ以テ身體ヲ纏ヒ病床ニ就カシムルニ宜シ然レ𪜈患者惡寒ヲ訴ル者或ハ皮表潤ヘル症ハ灌水スルヿ勿レ」五時乃至六時ヲ過テ后再灌水セシムベキ症モ間亦之アリ」若故アリテ灌水ヲ忌ム𪜈ハ冷水ニ醋ヲ加フル者格魯林水。海塩精。葡萄酒。燒酒。等ノ清冷洗滌法ヲ行ヒ粘汗出ル者ハ微温洗法ヲ施スベシ」病毒分利ノ期ニ方リテハ微温ノ灌法或ハ洗法ヲ施シ民垤列里精（五方。三十方。卅一方。四十方。四十一方。）及ヒ龍腦（百八十九方）ヲ服セシムベシ但龍腦ハ特ニ覺機甚沈衰セル症ニ與フベシ」病本復ノ期ニハ嚴ニ食餐ヲ節シ衰弱甚シキ者ハ幾那（百六十一方。百六十二方。）ヲ用フベシ○或毎服時刻ヲ遠隔シテ大量甘汞（百九十方）ヲ施スヲ稱譽ス甘汞ハ大ニ肝ノ運營ヲ振起セシムルガ故ニ膽液ヲ合併セル症ニ殊ニ簡要トス」或ハ小量ノ甘汞（八分氏一。四分氏一。半氏。一氏ヨリ二氏至。）一時毎ニ與ヘテ効ヲ得ル者アリ○暴鱈爾田氏

Kitasato Memorial Medical Library

ハ硫酸規尼捏（ニヂ）百九十方ヲ稱用シ其他ノ醫ハ硝酸銀百九十二方鉛糖百九十三方明礬百九十四方外鉄鹽百九十五方及ヒ青酸鉄百九十六方ヲ賞賛セリ殊ニ腸瘍ヲ治シ下利ヲ制スルニ之ヲ用ヒ然レ𪜈此ノ如キ人體ヲ害スルノ藥劑ハ吾輩ノ容易ニ處セサル所ナリ且鈍性神經熱ノ下利ヲ停ムル功用亦甚微ナリトス○別（ベツ）爾（ル）氏及ヒ歇（ケ）倚涅（ヂ）氏ハ植物炭百九十七方ノ効アリン症ヲ經驗セリ○高名ノ醫病初ニ吐劑ヲ稱用スル者アリト雖却テ害ヲ為シ易シ○婪（ラム）忽（ボル）兒（ド）突（ト）氏ハ肌熱熾盛腸胃ニ汚物欝滞ノ候確然タル症ニ孕（エム）鹼酒石ノ偉効ヲ自驗シ一ヲ迄水ニ溶化シ水六甘汞ヲ用フルノ后少頃アリテ頻々食匙ヲ以テ之ヲ服用セシム又婪忽兒突氏醋酸加里。醋酸曹達。ヲ用フ此劑ハ下利ノ効甚微ナリト雖大ニ蒸發氣ヲ催進スル而ノ身温中度ニシテ假令之ヲ衝動セザルモ動輒衰弱ニ陷ラントフル者之ヲ用フレハ其効力他藥ニ超絶ス病虚性ニ遷ル片ハ林（リン）氏婪忽兒突氏醋酸加里ニ代ヘテ民（ミン）垤（デ）列（リ）里精ヲ用ヒ或ハ其症ニ隨ヒ緬草。亜的兒劑。葡萄酒。其他強壯ノ諸藥ヲ併用シ胸内ニ較著ノ關係アル片ハ民垤列里精ト共ニ礪砂。遠志。安息香。等ヲ用ヲ（敷スルニ婪忽兒突氏下利ス）ル症ヲ療スル片ハ恐ラク（ベシ）ハ中和塩ヲ除クナルベシ○皺軋（サンエル）爾氏ノ説ニ擾レハ敷度利阿達（リオンスボット）私剥篤亜斯（アス）ハ鈍性神經熱ノ奇藥ト云フト雖此劑

Kitasato Memorial Medical Library

下利及ヒ衰弱ヲ来スガ故ニ害アリトス○末鯊垤氏祿温顋爾毒土氏ハ水銀膏一錢乃至二錢ヲ以テ一時毎ニ之ヲ塗擦シ急ニ流涎ヲ起サシメ専之ヲ施シテ其効ヲ竢ツト雖然モ此療法ハ決メ歴驗ニ出ルニアラズ寧ロ軟膏ニ升汞ヲ和シ百九十九方塗擦スルヲ優レリトセシ芫菁膏芥子泥。吐酒石膏等ヲ以テ盲腸ノ部ニ擦スルモ亦同効アルベシ

○第百七十三方〔漢都〕

遏爾托一錢半　常水適宜煮将熟加吐根六匁飽熟四分時濾過取六弓加後藥

蒲公英流動越幾斯半錢〔附〕　蘆根流動越幾斯三錢半〔附〕　醋酸加里液六錢　遏爾托舎利別半弓

右調和毎一時服一食匙

○〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ニ聖京倔及ヒ腸胃汚物ヲ合併セル症初起之ニ宜シ

○第百七十四方〔同上〕

菲阿斯越幾斯二匁　安質没尼酒一刃　苦扁桃水半錢至一錢　遏児托舎利別　菩提樹花水各一弓半

右調和毎半時乃至四分時之三服一茶匙

〔主治〕鈍性神經熱聖京倔ヲ帯ブル症呼吸器ノ刺衝連緜トメ止マザル時之ヲ鎮静スルニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第百七十五方〔同上〕

實芰荅利斯葉四匁至八匁　熱湯適宜浸濾取六弓加後藥

剥篤亜斯與新製枸櫞汁飽和者半弓至一弓　苦扁桃水二刀至四刀　遏兒托舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱帶聖京倔症及ヒ係腹内症呼吸器ニ血液畜積スルヿ頑固ナル者ニ宜シ

○第百七十六方〔同上〕

新絞枸櫞汁與剥篤亜斯飽和者一弓　蒸餾水四弓　苦扁桃水四刀　遏兒托舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱帶聖京倔症胸膜肺臓肺管或ハ氣管ニ輕易ノ焮衝性關係アル者之ニ宜シ其症ニ随テ局處或ハ全身ノ放血モ亦施スベシ

○第百七十七方〔同上〕

沙列布末半刀　常水適宜煮将熟加吐根六匁加密列一錢半飽熟四分時濾取六弓更加後藥

蒲公英流動越幾斯半錢〔附〕　蘆根流動越幾斯　醋酸加里液各一錢半至三錢

右調和毎一時服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕聖京(シンキング)倔性ヲ帶ビタル鈍性神經熱ノ初起腸胃汚物ノ徴アリテ兼テ下利ニ傾キ且肚腹ニ惡ムベキ關係ヲ覺ユル者之ニ宜シ症ニ應シテ醋酸加里液ヲ去ルベシ

○第百七十八方〔同上〕甲

甘扁桃(去皮二箇)　白罌粟子(三錢)　石臼搗爛加蒸餾水六弓

作乳劑加後件

菲阿斯越幾斯(ヒオスヱ)(二匁)　白糖(三錢)

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症發生ノ期ニ用ヒテ之ヲ防止スルニ宜シ且左法ニ從ヒ小量ノ吐根ヲ兼用スベシ

○第百七十八方〔同上〕乙

吐根末(一匁至一匁半)　白糖(一錢)

右調和為散等分六包毎服一包日三次乃至四次

〔備考〕之ヲ用ヒテ其証仍頑滯セル片ハ上ノ乳劑ヲ連服セシメ兼テ此散各包中龍腦四分匁ノ一乃至半匁ヲ加用シテ効ヲ得ルヿ間之アリ

○第百七十九方〔同上〕

精製阿芙蓉　吐根末(各六分匁一。四分匁一至半匁)　白糖(半刀)

右調和為散分六包毎服一包日二次乃至三次

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症下利太過ノ者ニ宜シ但此方

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ用フルヿ下利適宜ニ減スルヲ度トス全ク之ヲ遏スルニ至ルヿ勿レ○發熱ヨリ第五日至ニ下利ヲ發シ之ヲ診スルニ腸ノ粘液膜未死壞ノ証ヲ見ハサズ且溶渙ノ性ヲ帶ヒス腹痛劇甚ナル者ハ始ノ此散各包中ニ甘汞六分氏一乃至四分氏一ヲ加フルヲ佳トス

○第百八十方〔同上〕

甘汞六分氏一。四分氏一。半氏至一氏　白糖一刃

右調和為散分ニ六包每服一包日一二次乃至三次

〔備考〕鈍性神經熱ニ甘汞ヲ用ヒテ或ハ大便ヲ促シ或ハ胸腹諸器ニ焮衝ノ候アル者ヲ主治ス」蓋大便ヲ促スヰハ小量ニ與ヘ灌腸法ヲ兼用シテ之ヲ扶ケ焮衝性疾患ニ用フルヰハ稍其服量ヲ加増スベシ

○第百八十一方〔同上〕

甘扁桃去皮二箇　白罌粟子三錢　蒸餾水六弓　作乳劑加後藥

龍腦一氏半加ニ亜刺毘亜蘧謨漿捏和為泥　苦扁桃水二刃至四刃　遏兒抱（アレタ）舍利別一弓

右調和每ニ半時乃至一時服ニ一食匙

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症生力脱衰（コルラプシュス）甚シキ者或ハ將ニ脱衰セントスル者ニ宜シ」之ニ兼テ芥子泥ヲ貼スベシ

Kitasato Memorial Medical Library

○第百八十二方

龍腦六分氏一。四分氏一至半氏。　麝香四分氏一。半氏至一氏。　白糖半刀

右調和為散分六包每服一包日二次乃至三次

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症生力沈衰シ且昏睡状ヲ見ハス者ニ宜シ

○第百八十三方〔漢都〕

格魯林水半弓至六錢　蒸餾水六弓　遏兒把舍利別一弓

右調和毎半時若四分時之三服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症抗抵力沈衰シ溶渙失血ヲ發シ或ハ凡テ血液溶崩ノ候確著ナル者ヲ治ス

○第百八十四方〔同上〕

沙列布末半刀　水適宜煮將熟投纈草二錢黄幾那半弓乃至六錢濾過取六弓冷定加後藥

忽弗滿液半錢至一錢半　遏兒把舍利別一弓

右調和毎一時半服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱係肺或腹内症生力全ク虚脱シ咽喉及ヒ口中鵝口瘡ヲ生スル者ニ宜シ之ト共ニ龍腦半氏一氏乃至一氏半ヲ與フルヿ日ニ數次

○第百八十五方〔同上〕

硼砂二錢　撒爾非亜水二弓溶解加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

没藥丁幾二錢　玫瑰蜜一弓

右調和為塗液

〔主治〕鈍性神經熱ニ併發セル鵞口瘡ニ宜シ

○第百八十六方

格魯林水一弓至一弓半　亜剌毘亜蘧謨漿　遏兒托舍利別各一弓　蒸餾水三弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ニ宜シ」十二時間ニ一弓乃至一弓半ヲ服盡スベシ」之ニ兼テ格魯林ヲ洗法トシ用フヘシ」○第百十方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十七方〔末爾屑矣兒地名忽的兒稉優〕

精製食鹽一錢　蒸餾水五弓溶化加後藥

遏兒托舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱ノ第二期ニ方テ此方奇効アリ但之ヲ用フルヿ一二日ニ過グベカラズ」理篤阜氏モ亦之ヲ稱用セリ

○第百八十八方

稀鹽酸一錢　遏兒托煎六弓　覆盆子舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕鈍性神經熱係腹裏症ニ宜シ○第九十七方若ハ第百十一方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十九方

龍腦四氏至八氏　白糖四刃

右調和為散等分八包毎一時乃至一時半服一包

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症分利ノ期ニ方リテ覺機甚沈衰セル者ニ宜シ

○第百九十方〔列設爾〕

甘汞一刃　白糖半刃

右調和為散分四包早旦服一包隨其症晡時又與一包

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ニ宜シ○先刺絡シテ后再施スルモ亦可ナリ甘汞一刃ヲ取リ早旦ニ與フベシ更ニ劇甚ノ症ニ至テハ半錢ヲ與フルモ亦可ナリ其症ニ随ヒ晡時又一刃ヲ與ヘ下利スル者ハ阿芙蓉一氏乃至二氏ヲ配伍スヘシ大便増多セザル時ハ三時乃至四時ヲ經テ后扁桃油密幾私去爾〔附〕若ハ複方旃那浸ヲ與フベシ○列設爾氏上法ノ如ク之ヲ施シテ劇熱鎮降スルニ至ル二日乃至三日之ヲ持重スル症アリ又更ニ久ク連用スル症アリ但流涎ヲ發スレバ後服ヲ停ム列設爾氏此療法ヲ用ヒテ四十九人ヲ治セリト云フ○屋兒弗氏ハ此法ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

改革シテ朝五半時ヨリ四半時至四分時間ニ甘汞半刃ヲ與フルヿ二次重症ニ至テハ又晩ニ及ンデ再服セシム生力沈衰スル時ハ毎服龍腦一氏乃至三氏ヲ伍シ或ハ龍腦乳ヲ兼服セシム甘汞ヲ用ヒテ吐逆スル者ハ之ニ薄荷油糖ヲ配伍ス蓋此時ニ當テ通常水銀劑ヲ用フルト一般攝生調護ヲ善クセシム即暖室ニ居リ。飲液ヲ温服セシメ。温浴法ヲ施シ。口内ヲ洗浄スル等是ナリ上法ノ如クニシテ汞劑ヲ連用スルヿ五日ヨリ七日ニ至ル若生力沈衰スル者ハ更ニ時刻ヲ遠隔シテ日ニ一次或ハ二次之ヲ與フ或ハ甘汞ヲ屏ケテ用ヒサルヿモ亦之アリ病者本復ノ期大率此症本復スルヿ容易ナラス假令復スルモ多日ヲ延クベシニ方リテハ龍腦攝爾扁太里亜ヲ用ヒ次テ強壯藥ヲ施シ謹テ攝生ヲ善クセシム○好弗人名呂私同失設列爾同私葛爾老同等モ亦大量ノ甘汞ヲ稱用ス苦列私人名婪忽兒突同等ハ甘汞ノ効ヲ見ズ蘧魯思娶倚謨人名噎別爾茉倚爾同ハ却テ其害アルヿヲ試驗スト云フ

○第百九十一方〔暴鱗爾田〕

硫酸規尼捏八氏至十氏　扁桃油密幾私去爾八弓〔附〕

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕神經熱係腹内症ニ甚之ヲ稱用セリ○病ノ極期ニ

Kitasato Memorial Medical Library

至テ或ハ硫酸規尼捏必要ノ症アリ或ハ然ラザル者アリ大率硫酸規尼捏ヲ用フル適當ノ證候今世未一定セサルナリ

○第百九十二方

結晶消酸銀二氏〔附〕沙列布煎六弓溶化

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕葛兒篤氏神經熱係腹内症ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得シ者二十人ニ過タリト云フ或ハ間硝酸銀ノ量四氏ヨリ六氏至ヲ施用セリ○上法ニ兼テ硝酸銀ヲ灌腸トナシ之ヲ五氏至沙列布煎六弓ニ和シ用フ盖之ヲ施ストキハ長管ノ水銃ヲ用ヒ極メテ深ク腸中ニ送ルベシ○噎別爾私人名謁爾私訶兒斯同昏攩謨同モ倶ニ之ヲ賞譽セリ腸ノ知覺過敏ノ者ハ最初ノ灌腸液ニ阿芙蓉少許ヲ加フベシ

○第百九十三方〔弗。那私設〕〔私。那私設〕

精製鉛糖四分氏一至半氏　上好吐根末九氏

右調和為散分八包毎服一包日三次乃至六次

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症第二期ニ至リ下利スル者ニ宜シ下利ヲ治スルハ通例服量二氏ニシテ足レリ○呵兒設爾人名ハ鉛糖一氏日一三服スルヲ常法トセリ而ノ

Kitasato Memorial Medical Library

急卒ニ下利ヲ遏止セザルガ為メニ更ニ蓖麻油ヲ兼用セリ

○第百九十四方〔獨蒲列爾〕〔思歌達〕

明礬五氏　乳糖半刃

右調和為散分十二包乃至十四包毎半時服一包

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ノ初期殊ニ之ヲ用フ極メテ危險ノ症ニ至テハ明礬一錢水一北ニ溶化シ毎一時灌腸シテ五回ニ及ブベシ〔酵瞥爾人名〕ハ別ニ預療法ヲ行フヿナク鈍性神經熱ノ患者ニ概シテ明礬ヲ與ヘ特之ニ由テ數人ヲ治セリ其効驚クベシト云フ

○第百九十五方〔列設爾〕

升銕鹽二錢　蒸餾水三弓溶解

右調和毎服半食匙或一食匙日三次乃至四次臨服宜振蕩

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ノ下利及ヒ腸瘍ヲ治ス○知覺過敏虚弱ノ人及ヒ小児モ亦能ク此方ヲ服スルニ堪フ

○第百九十六方〔同上〕

青酸銕五氏至十氏　白糖半刃

右調和為散分八包毎服一包日三次乃至四次

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症腸瘍ヲ發シ下利スル者之ニ宜シ

○第百九十七方〔別獎爾〕〔回母〕

精製木炭二匁至五匁　甘草半刃

右調和為散分十二服蠟紙包裹毎一時一服

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ノ第二期生力著シク脱耗シ舌上乾燥下利悪臭アリ之ニ兼テ肚腹腐敗様ニ膨脹シ下腹ノ感覺過敏ナル者之ニ宜シ

○第百九十八方

漿粉一錢至二錢　水三弓至四弓

右上火溶化分為二劑供灌腸

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症下利太過ノ者ニ用フ○此灌腸劑藥局ニ於テ製スルヿナク病家ニ之ヲ作ルヲ佳トス何トナレハ長路昝ヲ移セバ變メ糊トナレハナリ漿粉ヲ熱湯ニ溶シ微温ニ至ルヲ俟テ直チニ注射スルヲ更ニ妙トス

○第百九十九方〔紂爾〕

升汞半錢　家猪脂半弓

右調勻毎一時取少許塗擦肚腹

〔主治〕鈍性神經熱係腹内症ニ反對刺戟法トナシ用フ塗

Kitasato Memorial Medical Library

擦スル部焮熱赤色ヲ見ハス六時ヲ過グレハ即チ疹ヲ發シ水様液之ニ充ツ

○第二百方〔別跨突篤〕

龍腦半錢　的列並油　硇砂加石灰精各半弓

右調和作軟膏塗擦肚腹

〔主治〕稽留神經熱係腹内症第二期ニシテ發スル所ノ腸瘍ヲ治ス

遠西方彙卷之二

遠西方彙卷之三

獨乙　加。幾。安頓　著

和蘭　傑。婪婆都　譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯

南洋伊東亨健夫　參校

腐敗熱フェブリスプュトリダ○チピュスコトリタ羅ロットコールツ蘭

腐敗熱ヲ療スルニ醫ノ用心專病室ニ淨潔清涼ノ氣ヲ引クニアリ」之ヲ治スルノ藥品鑛酸類ヲ以テ第一トス就中稀硫酸二百一方硫酸密幾私去爾〔附〕三百二方収斂亜的児ヲ以テ代用スルモ亦可ナリ」腸

Kitasato Memorial Medical Library

胃ノ汚物及ヒ膽液合併ノ症ハ殊ニ稀鹽酸九十七方。百十一方。二百三方。二百四方ヲ用ヒ兼テ冷水ヲ以テ身體ヲ洗フニ宜シ醋或ハ格魯林(ロリン)モ亦之ニ加フベシ」溶崩ノ候ヲ見ハスヒハ最明礬二百十六方。二百十七方ヲ稱賛ス」斯篤(ストケス)計私氏ハ麥酒酵(ビールギスト)ヲ以テ最止腐劑ニ稱用シ或ハ之ヲ内服セシメ毎一時半一茶匙或ハ之ヲ灌腸劑ニ加フ○古昔ノ醫腐敗熱ヲ療スルニ初メ吐劑ヲ與ヘ後中和鹽ニ小量ノ吐酒石ヲ加用ス八十方至八十二方。二百六方ト雖此療法ハ特リ真ニ腸胃汚物ヲ挿ム症ニ適當ス」峻下劑ハ大ニ害アリトス之ニ反メ純精酒石。答麻林度(クマリント)九十三方。百三十四方。二百七方ノ良効アルハ屢歴驗シテ確定スル所ナリ○先輩又幾那ヲ主

藥トシ殊ニ之ヲ衝動藥ト配伍ス二百八方至二百十一方ト雖幾那ハ唯疾患快路ニ趣キ血管統系ノ刺衝腸胃ノ汚物除キテ後深ク沈衰セル生力ヲ補助スルニ至リテ適當ナリト」衝動藥ハ中ニ就テ殊ニ亜児尼加花(アルニカ)二百四方、二百十二方龍脳百五十六方至百五十八方ヲ稱用ス若其他ノ藥方二百十三方至二百十五方ヲ謾投スルトキハ却テ害ヲ爲シ易シ」唯脈細弱。顔貌羸瘦シ大ニ衰弱セル者ハ葡萄酒ヲ許シ與フベシ○血脈系ノ興奮機亢盛シ加之失血スル者ハ何等ノ症ヲ論セス飲酒ヲ禁スベシ」内部ニ焮衝アル者ハ蜞鍼。吸角。寒罨法ヲ施シ溶崩下利ハ明礬二百十六方二百十七方亜児尼加根(アルニカ)二百十八方至二百二十方鹽酸銕百九十五方沙(サー)

列布（レップ）ニ赤葡萄酒少許ヲ加ヘテ飲料トシ漿粉ノ灌腸法（百九十八方）及ヒ下腹ニ香竄蒸溻法ヲ施スベシ出血スル者ハ稀硫酸或ハ明礬ヲ用ヒ寒罨法及ヒ冷水射注法ヲ行フ（肚腹メテオリ）風脹スル者ハ硇砂加石灰精或ハ氷粒（エイスピレン）ヲ與ヘ（腫瘍ヲ發スルノ景況アル者ハ燒酒醋枸櫞汁燒酒ニ雞子白ヲ和スル者。（二百廿一方）格魯林加爾基（コロリンカルキ）ノ溶液。（二百廿二方）稀淡ノ木酸。（二百廿三方）等ヲ以テ洗フニ宜シ

○第二百一方

稀硫酸（一錢至二錢）　沙列布（サーレップ）煎（四弓）　覆盆子舍利別（一弓至一弓半）

右調和毎一時服一食匙

○第二百二方（弗陽）

収斂亜的兒（アーテル）（三錢）　覆盆子舍利別（一弓）

右調和取一茶匙乃至二茶匙強加水一北一日服盡

〔主治〕右ノ二方ハ腐敗熱ノ腸胃汚物ヲ帶ルヿナク而メ頭痛壓重面色赤クメ青ヲ帶ビ。脈緊ニメ小或ハ大ナルガ如クニシテ其實ハ虛シ。肌熱灼クガ如ク。呼氣惡臭ヲ帶ビ。排泄物モ亦惡臭アル症ニ宜シ

○第二百三方（同上）

鹽酸（三錢）　覆盆子水（三弓）　覆盆子舍利別（一弓）

右調和毎半時取一食匙強粘滑煎液和服

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕鈍性神經熱ニ宜シ殊ニ其症流行シ傳染腐敗ノ性アリ。皮膚乾燥ノ熱シ。渴アリ口内上顎及ヒ咽喉乾燥シ。頭痛狂妄。血行平穩ナラズ。溶崩ノ景況アリテ出血スル者ニ宜シ又此ノ如キ証状ノ發疹熱就中痘瘡症ニ之ヲ與フベシ

○第二百四方〔曾別倫歇愔〕

亜児尼加花浸五弓但亜児尼加花二錢浸漬製之　龍腦密幾私去爾半弓

〔附〕稀鹽酸二錢　遏施印亜的児半錢　覆盆子舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕鈍性神經熱腐敗ヲ兼ル症及ヒ同性ノ皮疹病ニ宜シ

○第二百五方〔樞屈拔爾託〕

醇醋一弓〔附〕　櫻實舎利別二弓

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕腐敗熱。鈍性神經熱ニ宜シ

○第二百六方〔弗陽〕

精製硇砂一錢半　吐酒石二匁　接骨木花水五弓溶和加後件

民垤列里精一弓　遏児托舎利別六錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每半時服一食匙強

〔主治〕腐敗熱。神經熱ノ初起頭痛劇ク。面赤ク。眼光火ノ如ク。脈實シ。苦悶甚シク。而ノ患者體格強實ナル者之ニ宜シ

○第二百七方〔同上〕

纈草根半弓　熱湯適宜浸漬濾過取四弓加後件

荅麻林度　枸櫞舍利別各半弓　亜的兒一錢

右調和每半時服一食匙強

〔主治〕神經熱。腐敗熱。腸胃汚物ヲ挿ム者之ニ宜シ

○第二百八方〔同上〕

幾那越幾斯三錢　蓬酸一錢半　醇醋一弓　接骨木花水十弓

接骨木子舍利別一弓

右調勻每半時服一食匙強

〔主治〕腐敗熱膽液様ノ汚物ヲ排除スル后之ヲ用ヒ又鈍性神經熱真ノ衰弱ニ係ル者之ニ宜シ

○第二百九方〔爾。遏。福傑兒〕

幾那一弓　水一比煮濾取四弓加後件

新絞枸櫞汁三弓　列印設酒　覆盆子舍利別各一弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕腐敗熱腸胃ノ汚物ヲ排除スル后皮膚稍滋潤シ。生

Kitasato Memorial Medical Library

力始テ沈衰シ。脈細數。眼中混濁且常形ヲ變シ。喃々譫語スル者之ニ宜シ。胃腸汚物鬱積セル者其他脈實緊。苦悶甚シク。眼面赤色。或ハ狂妄ニ似テ譫語スル者ハ幾那ヲ忌ムベシ

○第二百十方〔羝歇蘭度〕

王幾那末一弓　水十六弓煮耗至八弓加攝爾扁太里亞末亞兒尼加根末各二錢飽熟濾過更加後件

複方幾那丁幾三錢　生明礬二錢　忽弗滿液一錢　桂舎利別一弓

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕腐敗熱生力沈衰セル者之ヲ振起シ溶崩ヲ防止スルニ宜シ此方ハ峻藥ノ合劑タリ宜ク謹慎シテ用フベシ

○第二百十一方〔遏傑栗屈的兒〕

赭色幾那一弓　水一比煮耗至七弓加白芷攝爾扁太里亞各二錢飽熟濾過放冷更加後件

遏施印亞的兒一錢　桂舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕腐敗熱ニ宜シ

○第二百十二方〔別連杜〕

Kitasato Memorial Medical Library

○亜兒尼加花錢二　熱湯適宜浸漬濾過取六弓加後藥

亜刺毘亜蘧謨錢二　橙皮舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱及ヒ腐敗熱ニ宜シ

○第二百十三方〔曾別倫歇情〕

白芷半弓　熱湯適宜浸漬濾過取六弓放冷加後藥

○桂加酒水一弓〔附〕　甘海鹽精二錢　龍腦細碎半刀至一刀　雜腹蘭舍利別一弓

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕鈍性神經熱腐敗ヲ兼ヌル症ニ用フ

○第二百十四方〔弗陽〕

麝香六氏至十氏　純精酒石半錢　甘消石精一錢半　覆盆子水弓　覆盆子舍利別三錢

右調和每半時服一食匙

〔主治〕神經熱及ヒ腐敗熱ニ宜シ

○第二百十五方〔別連杜〕

上好麝香六氏至廿四氏　亜刺毘亜蘧謨一錢　叮嚀擣和漸次加後件

默栗薩水二弓　橙花舍利別一弓　遏施印亜的兒半刀

右調和每半時若一時服一食匙強臨服宜叮嚀振蕩

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕衝動劑トシテ腐敗熱神經熱ニ用フ

○第二百十六方〔私屈呂垤兒〕〔私傑。福傑兒〕〔陽〕

幾那越幾斯半弓　生明礬二刃至四刃　桂水八弓　榲桲舍利別或遏兒托舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕腐敗熱失血及ヒ溶崩下利溶崩汗アリ而メ患者硫酸ニ堪ヘザル者之ニ宜シ○腸中汚物及ヒ内臓閉塞アル者ハ此方禁忌スベシ

○第二百十七方〔私。傑。福傑兒〕

亜剌毘亜蘰謨　阿仙藥末各半錢　生明礬末一錢　薄荷水四弓溶化加後件

上好列印設酒二弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕腐敗熱溶崩下利ニ宜シ

○第二百十八方

亜兒尼加根二錢至半弓　水九弓煮濾取六弓加後味

橙皮舍利別一弓

右調和毎一時服一食匙

○第二百十九方〔別連杜〕

亜兒尼加根　格綸僕各二錢　葛私加栗剌三錢　熱湯適

Kitasato Memorial Medical Library

宜浸漬濾過取六弓加後件

橙皮舍利別一弓

右調和每一時半服一食匙

○第二百二十方（惡揭爾滿）

攝爾扁太里亜末　亜兒尼加根末　薄荷油糖各二錢

右調和為散等分十裹每一時服一裹

（主治）右三方二百十八方至二百廿方ハ腐敗熱ノ下利ヲ停ムルニ用フ

○第二百二十一方（垤。覇惆）

雞子白二箇　振蕩上文火攪攪不住徐々加燒酒六弓

右局部發赤色帶疼痛者宜塗之

○第二百二十三方

格魯林加爾基一弓　水八弓溶化

右洗痛所

○第二百二十三方

木醋一弓　加密列浸四弓至六弓

右調和洗痛所

（主治）右三方二百廿一方至二百廿三方ハ腐敗熱。神經熱。其他危險ノ症眠瘡ヲ發スル者之ヲ用フ

間歇熱フェブリス。インテルミッテンス羅　チツセンポーセンデコールツ蘭

Kitasato Memorial Medical Library

此症焮衝性ヲ見ハス者ハ希ニアル所ナリ若之アルトキハ
硇砂。吐酒石。二百廿五方 人如キ輕易消焮法。荅麻林度九十三方 純精
酒石九十二方 滿那等ノ清涼下劑ヲ用ヒテ勉メテ之ヲ防グベシ」
焮衝劇度ニ進ミ或ハ之ニ加フルニ發作ノ際肺焮衝ノ景
況及ヒ胸脇痛ヲ以テスル者ハ精製消石ヲ用ヒ且發作中
若クハ免熱時小心シテ刺絡ヲ施スモ亦簡要ナルベシ但悪
寒ノ時期ハ嚴ニ之ヲ禁忌スベシ 然レトモ局處ノ瀉血ヲ優レリトスル症多
シ○間歇熱ハ腸胃汚物ヲ兼ヌル者最多シ汚物頗盛ナル
トキハ必之ヲ和解シテ以テ熱ノ發作ヲ妨グルナカラシム
ベシ」此症硇砂ヲ與フルヲ佳トス但小量ノ吐酒石二百廿四方至

二百廿六方ヲ伍スレバ更ニ妙ナリ若其汚物頗膽液ヲ兼ヌル
トキハ孕鹼酒石十八方。五十方至五十三方ヲ與ヘ後吐劑ヲ用フベシ」之
ニ由テ熱解スル者多シ若解セザルトキハ硫酸規尼捏ヲ以
テ制伏スベシ」春時發スル所ノ輕易ノ間歇熱ノ如キ健康
ノ人唯冒寒ニ因テ之ヲ得ル者ハ解凝藥ヲ要スルヿナク
直ニ硫酸規尼涅ヲ與ヘ次デ熱毒及ヒ腸胃ニ鬱積セル汚
物ヲ除クニ宜シ」四日熱ハ腹裏ノ慢性病ヲ合併セル者多
シ之ヲ治スルニ截熱以前久シク預療法ヲ施スヲ要トス
但腹裏ノ疾患熱勢ノ為ニ緩解シ或ハ全ク退ク者屢之ア
ルガ故ニ此ニ驅熱劑ヲ與フルハ慎マサルベカラス○夫

Kitasato Memorial Medical Library

驅熱藥ハ大率之ヲ舉クルニ二種トス即幾那皮並ニ其亜爾加祿乙(ルカロイデン)甸ノ規尼(キニヌ)捏(ム)○聖叔尼捏(セントニコラ)又ハ砒石是ナリ」幾那皮就中王幾那皮諸種ノ中ニ就テモ幾那ハ規尼捏ヲ含蓄スルヿ最多シ　ハ殆ニ百年来間歇熱ニ的中ノ良藥トス帝國ニ熱ノ發作ヲ過ムルノ功用確實ナルノミナラズ其再發ヲ禦ギ又亦他藥ニ優レリ蓋幾那ノ功用ハ專間歇熱ノ素因ヲ驅除スルニ由ルナリ二百廿九方至二百五十方」幾那ヲ以テ浸劑煎劑ニ作ルニハ驅熱ノ力ヲ生スルヿ十分ナラズ實物ヲ散藥ト為ス者最確實ノ効アリ蓋胃ハ單味ノ幾那末ヲ受クルニ堪ヘズ強テ之ヲ與レバ後胃部ノ壓迫。便秘。下利。其他悪ムベキ証ヲ發スル者屢之アリ宜ク香竄藥大黄或ハ症ニ隨ヒ阿芙蓉ヲ配伍ノ之ヲ防クベシ」然レニ亜爾加祿乙甸ヲ發明セシ以來今世醫流幾那皮ヲ用ルヿ稀ナリ亜爾加祿乙甸ハ間歇熱ヲ治スルノ効力十分ニシテ之カ為ニ惡ム可キ患ヲ生スルヿナケレバナリ」亜爾加祿乙甸ノ中ニ就テ最硫酸規尼捏ヲ勝レリトス　一百五十五方至一百八十九方　其他ノ者ニ　一百七十方至二百八十九方ヲ用フルヿ勘シ」規尼捏ハ免熱時ニ方テ與ノベシ中度ノ服量大人ハ六氏ヨリ十二氏小兒ハ三百卅二方至三百卅三方二氏ヨリ六氏ニ至ル」硫酸規尼捏ハ内服ノミナラズ亦腎垤兒麻質私法トナスアリ殊ニ患者嚥下シ得サル者或ハ規尼捏ヲ服

Kitasato Memorial Medical Library

スルヿヲ欲セザル小兒ノ如キハ此法ヲ宜シトス」其法胃上或ハ脊椎近傍ニ小ナル發泡膏ヲ貼シ其經一度乙謨ヲリ一度乙謨半至表皮ヲ剥キ去リテ硫酸規尼捏四氏ヲ撒敷シ蠟紙小片ヲ以テ之ヲ掩ヒ小ナル英吉利硬膏若ハ膠着硬膏一二片ヲ以テ其上ニ貼定スルナリ」若尚多量ノ規尼捏ヲ用ヒント欲セハ數所ニ之ヲ施スヲ良トス一所ニ撒敷スルヿ多量ニ過レバ厚痂ヲ結ビテ其吸收ヲ妨グ○嚥下艱難ノ症ニハ規尼捏ヲ灌腸三百廿九方至二百卅一方ニ用スルヿ亦可ナリ○往昔唯自國ノ藥物ノミヲ採用スルノ學派コンチ子ンタルステルスル行レシ時其探索シ得タル代用藥ハ輕易ノ

症ニ効アリト雖然ヒ幾那ニ代フベカラズ」即翡歇蘭度ノ人造幾那二百五十一方二百五十二方水楊梅根二百九十方至二百九十二方水楊皮二百九十三方至二百九十五方撒里矢捏二百九十六方至二百九十八方七葉樹皮二百九十九方至三百一方設篤拉里捏三百一方等是ナリ」龍腦三百三方至三百五方必百力捏三百六方白芥子三百七方番椒三百八方至三百十方苦扁桃三百十一方墨列僕里三百十二方弗魯里矢捏三百十三方阿芙蓉三百十四方燐三百十五方格魯林曹達三百十六方銕屑三百十七方青酸銕即精製洋靛三百十八方至三百廿方金硫黄三百廿一方三百廿二方膽礬三百廿三方三百廿四方硇銅礬三百廿五方等ハ驅熱ノ効症ニ從テ優劣アリ○砒石ハ幾那及ヒ其亜爾加孫乙甸ノ効アラザル症ヲ治スルヿ間之アリ私昆列印氏ハ

Kitasato Memorial Medical Library

痙強狀及ヒ癲癇狀ノ間歇熱又間歇熱頑固ニシテ局處ノ疾患ヲ帶フル症ニ之ヲ稱賛セリ」但砒石ヲ用フレバ腹内諸器ノ損害。水腫。及ヒ全身血液腐敗等ノ如キ危重ノ症ヲ遺スガ故ニ之ヲ用フルハ忌ムヘキナリ予此ニ三四方ヲ掲クル者ハ專此書ヲ全備スル所以ナリ（三百廿六方至三百廿八方。三百卅五方）

○惡性間歇熱ノ療法ハ唯再次ノ發作ヲ遏止スルヲ主トス故ニ第一發ノ後速ニ硫酸規尼捏多量ヲ用ヒ第二發ノ前半時許ニ至テ規尼捏ノ量ヲ一倍シ阿芙蓉一氏若クハ二氏ヲ配伍スベシ」發作ノ間患者直視シ。鼾聲高ク。脈小ニメ間歇シ。全身強勁ノ症ハ阿芙蓉ノ効アルヿ經驗スル所ナリ（二百四十六方甲乙。三百十四方）世上惡性間歇熱ヲ治スルノ方多シ醫士能ク之ヲ撿査ノ症ニ應シ適當ノ者ヲ撰用スベシ

○間歇熱後脾臟ノ腫起ヲ遺ス者アリ亦幾那（三百三十九方）規尼捏若クハ鉄劑（三百四十方。三百四十一方）ヲ用ヒテ療スベシ鉄劑ハ脾臟軟化ヲ兼ヌル症ニ最適應ス○間歇熱後ノ水腫モ亦幾那或ハ規尼捏ヲ利尿劑及ヒ強壯劑ト配伍シ（三百四十二方至三百四十四方）與フベシ」金硫黄（三百四十六方）モ亦効アル症間之アリ

○第二百二十四方（遏。保。栗屈的兒）

蒲公英流動越幾斯（附）（半弓）　精製硇砂（一錢至二錢）　加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

溶解

橙花水五弓

右調和毎一時服一食匙

○第二百二十五方〔同上〕

吐酒石一匁　精製硇砂　精製度碌布各二錢　加茴香水四弓溶解

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕右二方二百廿四方二百廿五方間歇熱ニ驅熱藥ヲ與ヘシト欲スルトキ預用フベシ」醋酸加里液四十九方　孕鹼酒石十八方五十方至五十三方。其他解凝ノ効アリテ適宜ニ大便ヲ促ス所ノ中和鹽ノ如キモ亦同上ノ意ヲ用ヒテ與フベシ」若汚物逆上ノ証アル者ハ吐劑ヲ兼用スベシ六十二方至七十二方又胃中汚物ノ有無ヲ論セス吐劑ハ腹内神經ノ機運ヲ轉變セシムルヲ以テ截熱ノ功用最偉ナリトス

○第二百二十六方〔私傑福傑爾〕

精製硇砂　健質安那越幾斯各二錢　加蜜列水八弓　橙皮舍利別一弓半

右調和免熱之間毎一時乃至一時半服一食匙乃至三食匙強

〔主治〕同上

Kitasato Memorial Medical Library

○第二百二十七方〔同上〕

珊篤里葉　葛兒儒別葉　尋常亞爾鮮葉　睡菜葉各一握　尋常加密列二撮　旃那葉　墨列僕里根各半弓　幾那一弓　孕鹼酒石六錢　白蔔萄酒二比至三比　常水一比

右浸漬二三日而後濾過免熱日飲服一小盞日三次

〔主治〕間歇熱黑膽液畜積シ及ヒ便秘ヲ兼ル者ニ宜シ

○第二百二十八方〔弗陽〕

收斂亞的兒一刃至二刃　甘硝石精四刃　玫瑰水四弓　玫瑰舍利別半弓

右調和毎四分時服一食匙强

〔主治〕清涼姑息ノ藥トシテ間歇熱症發熱ノ時期ニ用フベシ但其熱焮衝ヲ帶ル者殊ニ之ニ宜シ

○第二百二十九方〔臧歇蘭度〕

新王幾那細末一弓

右等分為八裹毎一時服半裹

〔主治〕免熱ノ時之ヲ用フ若其免熱暫時ノ症ハ半時毎ニ一包ヲ服スベシ最後ノ一服ハ其量ヲ增加シ發作前ニ切近ノ服スルヲ好トス若幾那ヲ服ノ下利ヲ發スル者ハ一時半乃至二時毎ニ阿芙蓉丁幾一滴ヲ加フ或ハ之ガ為ニ便秘スル時ハ毎服大黃二三氏ヲ伍用シ胃部壓

Kitasato Memorial Medical Library

迫惡心或ハ嘔吐ヲ起ス者ハ桂皮ヲ加ヘ若ハ毎服強葡萄酒一匙ヲ以テ送下スルヲ佳トス痙攣証ヲ見ハス者ハ纈草或ハ葛私篤僂謨ヲ配伍ス惡性間歇熱インテルミツテシスペルニシオサモ亦王幾那一弓ヲ以テ免熱ノ間ニ服盡セシム但發熱前一服ハ其量ヲ一倍シ且阿芙蓉二氏ヲ加フルニ宜シ

○第二百三十方〔篤垤〕

上好幾那末一弓　橙皮舍利別適宜

右為煉膏毎半時餘服一茶匙強直下宜令飲葡萄酒一食匙

○第二百三十一方〔獵歇蘭度〕

新王幾那細末一弓　桂舍利別適宜

右為煉膏毎一時服一茶匙

○第二百三十二方〔結列都茉兒〕

王幾那半弓　蒸餾水九弓稀硫酸一錢煮耗至四弓放冷加後藥

忽弗滿液一錢

右調和食匙抄頻服

〔主治〕第二百三十方ヨリ第二百三十二方至免熱ノ時ニ用ヒテ發熱ヲ遏止スルニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第二百三十三方〔叔密篤滿〕

王幾那一錢　攝爾扁太里亞根　硇銕花各六氏　薄荷油糖一刃

右調和為散分八裹免熱時用之至再發作前一時半盡之

〔主治〕此方截熱ノ効最確實ナリト稱ス蓋叔密篤滿氏舍電阿芙蓉液ヲ取リテ上方ノ第一服ニ一滴第二服ニ二滴第三服ニ三滴第四服ニ四滴第五服ニ五滴第六服ニ六滴第七服ニ七滴第八服ニ十二滴ヲ加フ二百七十三方ヲ照スベシ

○第二百三十四方〔栗屈的兒〕

赭色幾那一弓　葛私加栗剌二錢　水十六弓煮耗至八弓濾過加後藥

加密列舍利別一弓

右調和每一時餘服二食匙强

〔主治〕間歇熱幾那散ヲ服ノ瀉スル者之ヲ用フルニ宜シ

○第二百三十五方〔別連杜〕

王幾那六錢　黃橙皮油糖三錢　舍電阿芙蓉液二十四滴

右調和為散分十二包免熱間每一時服一包

〔主治〕單純神經性間歇熱ニ宜シ

○第二百三十六方〔弗陽〕

Kitasato Memorial Medical Library

幾那末一刀　精製硇砂半刀

右調和為散分六裹每一時服一裹至發熱前半時

〔主治〕間歇熱久ク稽留スル症ニ宜シ

○第二百三十七方〔竭傑栗屈的兒〕

大黃末一錢　精製硇砂一刀　幾那末一弓

右調和為散分八服每一時一服

〔主治〕間歇熱幾那ヲ服ノ便秘スル者之ニ宜シ

○第二百三十八方〔福倔篤〕

赭色幾那末六錢　精製硇砂二錢　桂皮末一錢　橙皮舍利別三弓

右調和為煉膏每服一茶匙强日四次

〔主治〕間歇熱或ハ神經病ニ宜シ

○第二百三十九方〔栗屈的兒〕

赭色幾那細末六錢　纈草末　橙皮越幾斯各一錢　橙皮舍利別適宜

右攪和為煉膏每半時服一茶匙

〔主治〕間歇熱患者ノ胃幾那散ヲ受クルニ堪ヘザル者之ニ宜シ

○第二百四十方〔弗陽〕

幾那一弓半　半夏　墨列僕里根　健質安那各二錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散每一時服半錢乃至二錢

○主治　頑固間歇熱ニ宜シ

○第二百四十一方（阿西安姪爾）（瘧歇蘭度）

王幾那四刃　莨菪葉二氏

右調和為散分四服每二時一服

○主治　間歇熱頑固ニメ其症數次發スル者ニ宜シ殊ニ四日熱ニ好トス

○第二百四十二方（弗。陽。倣ニ忽弗滿）

幾那一刃　生安質没尼（五氏至二十氏）

右調和為散分八包每服一包日二次乃至三次

○主治　頑固ノ間歇熱及ヒ感覺遲鈍ニシテ脆薄ノ人慢性痿痲質斯ヲ患フル者之ニ宜シ

○第二百四十三方（屋兒弗）

加密列　赭色幾那各半　阿芙蓉八分氏之一至六分氏之一　金

硫黄一氏。一氏半至二氏　芳香散五氏

右調和為散分十二包免熱之時服六包乃至八包十包或十二包

主治　頑固間歇熱ニ宜シ

○第二百四十四方（遠幾私列乙）

別爾多婪根末二錢　赭色幾那末一弓　橙皮舍利別適宜

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為煉膏每一時服一茶匙

〔主治〕經久頑固ノ間歇熱其症屢々發シ腹内神經系著シク遲鈍ナル者之ニ宜シ

○第二百四十五方〔葛。傑。涅優滿〕

王幾那末一弓　姜末十五氏至廿氏　拂郎西赤葡萄酒八弓

白糖一弓

右調和四時服盡臨服宜振盪

〔主治〕惡性間歇熱速ニ遏止スルヲ要スル者之ニ宜シ」初發作ノ發汗減スルヲ俟テ始メテ之ヲ與フベシ而メ再次ノ發作前半時ニ方リ阿芙蓉一氏ヲ用フルニ宜シ

○第二百四十六方甲〔謨私篤〕

赭色幾那　王幾那　赤幾那各半弓　水二北煮耗至一北半濾過加列印設酒六弓

右調和每一時服二食匙强

○第二百四十六方乙〔同上〕

硫酸規尼捏一二氏至六氏　精製阿芙蓉四分氏之一至半氏　麻倔涅

矢亜六氏　橙皮　白糖各半刃

右調和為散分十六服每一時一服

〔主治〕右二方惡性間歇熱ニ互用ス一次煎方ヲ服シ一次散方ヲ用フベシ」此他幾那煎ニ硫酸規尼捏三氏乃至四

Kitasato Memorial Medical Library

瓜ヲ和メ一時半毎ニ灌腸スルヲ好ミス」又發疱膏ヲ以テ表皮ノ一處ヲ剥キ幾那ノ亜爾加禄乙甸（アルカロイテン）（○規尼捏○聖叔尼捏○規尼阿乙實捏）ヲ撒布スルモ亦可ナリ」且鹽酸及ヒ硝酸ヲ温水ニ加ヘテ脚ヲ浸ス日ニ三次（鹽硝酸倶ニ一食匙強ヲ加フベシ）右ノ療法ニ由テ大抵第二發ヲ遏止スベシ第三發ノ如キハ其効愈確實ナリ○多血ノ患者ニ在テハ發作中尺澤ヲ刺テ適宜ニ放血シ頭上ニ蜞鍼ヲ施シ以テ目前ノ危險ヲ救フヘシ」若其証狀痙攣ヲ帶ブル者ハ發作中阿芙蓉四分瓜ノ一乃至半瓜ヲ取リ半時若クハ一時毎ニ與フベシ（三百十四方ヲ照スベシ）

○第二百四十七方

赭色幾那（一弓）　吐酒石（一瓜）

右調和為散分八服毎一時乃至一時半一服

〔主治〕間歇熱腸胃汚物ノ証徴未除カズ或ハ肚腹内ニ閉塞ノ恐レアル者之ニ宜シ

○第二百四十八方（蒲列剌）

王幾那（末一弓）　吐酒石（二瓜）　精製阿芙蓉（一瓜）

右精密調和分六服毎一時一服

〔主治〕險惡ノ間歇熱免熱暫時ノ症之ニ宜シ

○第二百四十九方（叔渦耳杜）

Kitasato Memorial Medical Library

○赭色幾那一弓　精製硇砂乾者一錢　吐酒石十五氏至廿氏

右調和為散分十包每服一包日三次乃至四次

主治　頑固ノ四日熱ニ宜シ　此方ノ配合舍密術ノ法則ニ背違スル所アリ又吐酒石ノ量甚過多ナリトス

○第二百五十方　名四日熱圓

幾那末一弓　吐酒石十六氏　炭酸剥篤亜斯一錢　亜爾鮮舍利別二弓

右調和作圓如梧子大每服一箇日三次乃至四次

主治　頑固ノ四日熱ニ宜シ

○第二百五十一方　獵歇蘭度人造幾那煎

水楊皮　七葉樹皮各粗末半弓　菖蒲根　水楊梅根各粗末二錢

右水十六弓煮至八弓濾過每一時服二食匙

主治　間歇熱及ヒ諸般ノ虚衰病ニ宜シ

○第二百五十二方　獵歇蘭度人造幾那散

水楊皮　七葉樹皮　健質安那　菖蒲根　水楊梅各細末半弓

右調和玻璃壜收貯間歇熱發作前茶匙扨服四次至六次

主治　同上

○第二百五十三方　阿山

Kitasato Memorial Medical Library

○複方幾那丁幾　亜爾鮮丁幾（各半弓）

右調勻取四十滴葡萄酒一食匙和服日二次

〔主治〕間歇熱ノ素因ヲ除キ再發ヲ防グニ宜シ○又阿山氏幾那酒浸劑ヲ與ヘテ同上ノ効ヲ得タリト云フ

○第二百五十四方〔謁。訶倫〕

丁子油（一刃）　阿芙蓉液（半錢）　硫酸亜的兒（一弓）

右調和幾那服用之時最後二三貼此液二十滴乃至三十滴和服

〔主治〕間歇熱單ニ王幾那ヲ久服スレ𪜈數次發スル者之ヲ用ヒテ確効アリ○訓戛氏ハ殊ニ沙蘿葡酒ヲ稱用シテ再發ヲ防止セリ」用法新鮮沙蘿葡屑三盞乃至四盞强ヲ取リ（通例之ニ橙皮四錢ヲ加フ）上好赤葡萄酒一壜ヲ加ヘテ浸漬シ毎服一小盞强日ニ三次乃至四次數週之ヲ連用スト云フ

○第二百五十五方〔刺胄私〕

硫酸規尼揑（三氏至十二氏）　白糖（二錢）

右調和為散分六包免熱之時用之

〔主治〕間歇熱及ヒ神經衰弱ニ宜シ但神經衰弱症ニ用フルハ朝夕一包ニ止マルベシ○此散黒哥喜ニ和服セシムルヲ最妙トス此ニ由テ規尼揑ノ苦味稍掩ハルレバ

Kitasato Memorial Medical Library

ナリ

○第二百五十六方

硫酸規尼捏二氏　橙皮黄半刃

右調和為散分三服免熱之時與之

〔主治〕順正間歇熱ニ宜シ

○第二百五十七方〔獵歇蘭度〕

硫酸規尼捏一刃　度碌布適宜

右為二十丸衣石松粉每一時或一時半服一丸

○第二百五十八方〔皿兒墨爾〕

硫酸規尼捏十二氏至十八氏　吐酒石一氏至一氏半　健胃散〔附〕

白糖各一錢至一錢半

右為散分六包每服半包日四次

〔主治〕菖蒲根浸ニ並用シテ間歇熱ヲ治スベシ

○第二百五十九方〔謨私篤〕

硫酸規尼捏六氏　吐酒石二氏　麻倔涅矢亜一錢　白砂糖二錢

右調和為散分十二包每半時或一時服一包

〔主治〕諸種ノ間歇熱ニ用ヒテ良効アリ

○第二百六十方〔護刺〕

硫酸規尼捏半刃　吐酒石三氏　茴香一錢半　加密列油加

Kitasato Memorial Medical Library

枸櫞油六滴〔附〕

右調和為散分六服蠟紙包裹免熱之時每一時一服

〔主治〕間歇熱ニ用ヒテ確實ノ効アリ最初一服吐下ヲ發スル者多シ

○第二百六十一方〔祆設兒〕

硫酸規尼捏十五氏　桂皮半錢　王幾那越幾斯適宜

右為三十九衣桂末每一時乃至二時服四丸

○第二百六十二方〔弗昕爾田蒲蘭度〕

硫酸規尼捏十二氏　睡菜越幾斯一刃　菖蒲根末適宜

右為十二丸衣桂末每一時服一丸乃至二丸

○第二百六十三方〔盧屈私荅度土〕

硫酸規尼捏二氏至三氏　芳香散半刃　苦扁桃油一滴　珊篤里越幾斯適宜

右為十九衣桂末發熱前服二丸

○第二百六十四方

硫酸規尼捏三十二氏　砂糖舍利別一北

右調和名麻健耋人名規尼捏舍利別

〔主治〕間歇熱ニ宜シ大抵六匙ヲ服メ截熱ノ効ヲ得ルニ足ル

○第二百六十五方〔朴滮私〕

Kitasato Memorial Medical Library

硫酸規尼捏八氏加後味溶化

越栗幾矢爾必篤里阿利半錢　再餾燒酒一錢半

右濾過取十二滴乃至二十四滴或應症更取多量和甘味燕麥汁若稠厚砂糖水與之

〔主治〕右諸方二百五十五方至二百六十五方免熱ノ時ニ用ヒテ間歇熱ヲ遏絶スルニ宜シ

○第二百六十六方甲〔靈田別爾倔〕

硫酸規尼捏半刃　默栗薩水三弓半　收斂亜的兒半刃　砂糖舍利別半弓

右調和毎一時服一食匙强

○第二百六十六方乙〔同上〕

硫酸規尼捏　橙皮黄各一氏　白糖半刃

右調和為散分十服毎一時一服

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○靈田別爾倔氏病ヲ視テ其性間歇ヲ帶ブルヲ占ムルトキハ日發間日ノ二症ニ於テ舌苔ノ有無ニ拘ラズ惡心ヲ論セズ預療法ヲ處セズ免熱ノ時ニ方テ硫酸規尼捏半刃甲方ヲ與フ之ニ由テ再次ノ發作ヲ遏止セリ假令全夕歇マザルモ其証更ニ輕シ再次ノ發作ヲ經レハ假令復發スルモ恐怖スルニ足ラズトス

此ノ如ク之ヲ用フルノ后第五日ニ至リテ再硫酸規尼

Kitasato Memorial Medical Library

捏(子)半刃ヲ以テ散藥(乙方)トナシ與フ」爾後毎週同日(第五ニ日)方リテ規尼(キニ)捏(子)散同量ヲ與フルヿ六回ニ至ル最初ヨリ之ヲ算スレバ七回ニ及ブ但其間他藥ヲ服スルヲ須タズ」此ノ如ク之ヲ療スルモ毎症必シモ再發ヲ防止スルヲ得ズト雖然モ其復發スル者極メテ稀ナリ」四日熱及ヒ昏睡性卒中性喘息性間歇熱ノ如キ確實ニ遏止センヿヲ要スル者ハ靈田(リンデン)別爾倔(ベルグ)氏病初一刃ヲ用フルヲ稱賛セリ」間歇熱治ヲ誤リ或ハ治ヲ加ヘザルニ由テ慢性熱(コロニス。スロイニペンテコトルツ)ニ變スル者間之アリ其症モ亦他ノ療法ヲ要セス但患者能ク上ノ療法ニ堪フベキノ時ヲ候フテ之ヲ施スベシ」此法三十九年間ノ經驗ニ出テ而メ一千人ヲ治セシ所ナリ

○第二百六十七方〔速別(ソベ)倫(ヘイ)歇(ム)惰〕

硫酸規尼(キニ)捏(子)二氏　大黄五氏　葛(カ)縷(ル)子油糖半刃

右調和為散分二服蠟紙包裹免熱之間與之

〔主治〕間歇熱腸胃汚物ヲ兼子大便秘スル者之ニ宜シ

○第二百六十八方〔模。噎。遏。那(ナ)優(ウ)満(マン)〕

硫酸規尼(キニ)捏(子)一氏　上好幾那十五氏　大黄　薄荷油糖各五氏

右調和為散分八包毎服一包日四次

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕間歇熱舌苔全ク除カズ大便不利ノ症ニ用ヒテ發作ヲ遏止スルニ宜シ

○第二百六十九方〔布刺傑〕

硫酸規尼捏十五氏　稀硫酸十二滴　薫餾水六弓　覆盆子舍利別一弓

右溶和毎半時服一食匙

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○硫酸ヲ加フル者ハ規尼捏ヲ溶解シ易カラシムルナリ

○第二百七十方〔涅優濡〕

硫酸規尼捏三氏　精製阿芙蓉一氏　橙皮黄油糖半刃

右調和為散蠟紙包裹發作前服之

〔主治〕惡性間歇熱ニ宜シ

○第二百七十一方〔弗。四篤私〕

硫酸規尼捏四氏　莨菪根末一氏　橙皮黄一刃

右調和為散分四包免熱之間用之

〔主治〕間歇熱經久頑固ニメ數回發スル症之ニ宜シ

○第二百七十二方〔謨私篤〕

硫酸規尼捏一氏半　精製阿芙蓉半氏　甘汞　番木鼈越幾斯各一氏　麻倔涅矢亜　白糖各半刃

右調和為散分八包毎一時半服一包

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕間歇熱甚頑固ノ症ニ宜シ

○第二百七十三方〔叔密篤満〕

硫酸規尼揑三氏　摂爾扁太里亜根末　硇銕華各六氏

右調和為散分五服免熱之間用之

〔主治〕叔密篤満氏感觸鋭敏ノ人ニ規尼揑ヲ用フレハ其効幾那ニ優レリト云フ腸胃虚弱ノ者殊ニ然リ舎電阿芙蓉液ヲ取リ之ヲ上方第一服ニ一滴。第二服ニ四滴。第三服ニ六滴。第四服ニ八滴。第五服ニ十二滴和用セシム

○然レ𪜈叔密篤満氏以為ラク規尼揑ハ間歇熱ヲ遏絶スルノ効幾那皮ノ如ク適切ナラズ且規尼揑ヲ服セシ者ハ幾那皮ヲ用ヒシ者ニ比スレバ再感シ易シト第二百三十四方ヲ照スベシ

○第二百七十四方〔侃私恒篤〕

硫酸規尼揑十五氏　桂水二弓溶化加後件

硫酸十五滴　覆盆子舎利別半弓

右調和頓服

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○初メ發作後直ニ之ヲ服シ翌日免熱日又之ヲ服シ故ニ間日熱ハ第一服ノ後十二時又次日発熱日ニ至リ發作前半時規尼揑五氏ヲ用フベシ

○第二百七十五方〔叔密土〕

Kitasato Memorial Medical Library

○硫酸規尼捏（十二氏）再餾燒酒半弓溶化加後藥

舍電阿芙蓉液（十二滴）

右調和晨夕服二十滴

〔主治〕惡性間歇熱流行ノ時預防方トシテ之ヲ用フ

○第二百七十六方〔獵屈〕

硫酸規尼捏（十五氏）常用鼻煙（一弓）（タバキステルニュタトル）

右調和嗅之五日乃至六日

〔主治〕間歇頭痛ニ宜シ

○第二百七十七方〔私丕兒滿〕

鹽酸規尼捏（八氏）苗香水（五弓）甘海鹽精（一錢）白糖（半弓）

右調和毎一時餘服一食匙

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○別爾列印（國名）加里的（地名）ノ病院ニ於テ試驗セシ說ニ據ルニ鹽酸規尼捏ヲ硫酸規尼捏ニ比スレバ其効力夐ニ優リテ峻烈ナリト

○第二百七十八方〔謨私篤〕

鹽酸規尼捏（一氏）麻倔涅矢亜（各四氏）桂皮（各四氏）精製阿芙蓉（四分之一）白糖（一刃）

右調和為散分十二服如法用之

〔主治〕秋候ノ膽液性間歇熱ニ宜シ○謨私篤氏再次ノ發作前一時ニ方リテ先吐劑ヲ與ヘ後免熱日一時毎ニ幾

Kitasato Memorial Medical Library

那末半錢至ヲ用ヒ次ノ免熱日ニ至テ一時毎ニ上方一包ヲ服セシム

○第二百七十九方〔邏難垤爾〕

丹寧酸規尼揑　胡椒末　亜爾鮮越幾斯各半錢

右為三十丸衣石松粉毎一時半服三丸

〔主治〕經久頑固ノ間歇熱ニ宜シ

○第二百八十方〔謁兒噦爾篤〕

規尼阿乙實揑一刃〔附〕　葛縷子油糖或菖蒲油糖半弓

右調和為散分十二服毎一時乃至一時半一服

○第二百八十一方〔同上〕

規尼阿乙實揑一刃　精製阿芙蓉氏　葛縷子油糖或菖蒲油糖半弓

右調和為散分十二服毎一時乃至一時半一服

○第二百八十二方〔涅血兒滿〕

規尼阿乙實揑　硫酸規尼揑各一氏　莨菪根　阿芙蓉各四分氏之一至半氏　芳香散三氏

右調和為散分二十服免熱之時毎一時一服

○第二百八十三方〔刺曹私〕

規尼阿乙實揑　王幾那各一錢

右加燒酒少許為三十丸衣白桂末毎一時服三丸乃至五

Kitasato Memorial Medical Library

九

〔主治〕右四方（二百八十方至二百八十三方）間歇熱ニ宜シ

○第二百八十四方〔同上〕規尼阿乙實揑丁幾

規尼阿乙實揑（一錢）　亜爾箇兒（一弓）

右溶化毎服取一茶匙赤葡萄酒或砂糖少許和服日二三次

〔主治〕此方間歇熱ヲ治スルノ効規尼揑ニ優ルヿ屢之アリ

○第二百八十五方〔那篤耳布〕

收歛亜的兒（一錢）　規尼阿乙實揑丁幾（二百八十四方）　薄荷水（各一弓）

右調和茶匙抄服如法

〔主治〕間歇熱ニ宜シ日發熱ハ毎一時。間日熱ハ毎一時半。四日熱ハ毎二時一茶匙ヲ服ス發汗ヲ過テ直下始メテ之ヲ用フルニ宜シ○小兒ニ與フルハ薄荷水ニ代ヘテ他ノ甘味液ヲ加フルヲ好トス

○第二百八十六方〔不戾私滿〕

規尼阿乙實揑　硫酸規尼阿乙實揑（各一錢附）　健質安那末　菖蒲根末（各一刃）

右調和二氏為一丸衣菖蒲根末毎一時服三丸

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕間歇熱ニ宜シ通例上方半劑ヲ用ヒテ熱ヲ截ルニ過タリトス

○第二百八十七方〔獨戾噎爾〕

規尼阿乙實揑一刃

右加忽弗滿液五刃溶化免熱之時服之

〔主治〕間歇熱極メテ頑固ニメ屢發スル者之ニ宜シ

○第二百八十八方〔拂蘭計〕

莨菪越幾斯二氏　苦扁桃水一弓溶化加後藥

規尼阿乙實揑丁幾半弓至六錢〔第二百八十四方〕

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

〔主治〕間歇熱甚頑固ニメ數回發スル者之ニ宜シ殊ニ四日熱ニ用ツベシ

○第二百八十九方甲

硫酸聖叔尼揑三氏　橙皮黃半刃

右調和為散分三包免熱間服之

〔主治〕順正間歇熱ニ宜シ○訥惡氏ノ說ニ據ルニ硫酸聖叔尼揑ハ患者感觸銳敏ニメ虛弱ノ症ニ適當ス殊ニ腸胃汚物ヲ挾ミ且腸ノ衰弱ヲ兼子血脉ノ感覺過敏ノ症此方良効アルヲ證セリ

○第二百八十九方乙

嬰爾滬耳倔截熱丁幾

Kitasato Memorial Medical Library

○嫂爾滬耳倔氏ノ說ニ據ルニ此丁幾劑ハ植物四種ノ越幾斯質ヲ亞爾箇兒ニ溶化シテ以テ製スルナリ而ノ此植物ハ獨西印度ニ産シテ歐羅巴洲中未之アルヲ見ズ」且此方驅熱ノ奇効アルヲ稱メ印度ノ土人ニ示セリト云フ」用法發熱前一時半ニ方テ二錢半ヲ服シ將ニ發作セントスルニ及テ再同量ヲ用フ大抵此二服ニメ發作ヲ防止スルニ足レリ」此劑ヲ服スル前蓖麻油適宜ヲ用ヒテ悉腸胃ノ汚物ヲ除去スルヲ要ス蓋二服ヲ終フル至總テ他ノ飲食ヲ禁ズベシ○官ヨリ設クル所ノ諸邑ノ病院ニ於テ千八百四十六年一千餘人ニ此劑ヲ試驗シ間歇熱最頑固ノ症ニ良効アルヲ確定セリ但其症極メテ經久既ニ衰弱。腹滿。水腫等ヲ繼發セル者ヲ撰ミテ之ヲ驗セシニ大率二服ニシテ再次ノ發作停止セリ其第二發ヲ致ス者ハ千百中一二ニ過ギズ」且此劑ハ間歇熱衰弱ノ加ハル者ニ最佳効ヲ奏シ畜水ノ諸症。脾臟ノ腫脹モ亦能ク消散セリ○然レ𪜈百列私滬爾倔地名ノ經驗ニ據レハ上欵ノ如ク之ヲ稱譽スベカラズ蓋之ヲ用フルモ他ノ截熱藥ト一般ニ其再發セル者屢之アリシニ由テナリ

○滬弗涅兒氏此丁幾丟爾ヲ精査シテ次件ノ說ヲ發明

Kitasato Memorial Medical Library

セリ第一此液ノ君藥ハ聖叔尼捏ニシテ兼テ硫酸脂。及ヒ亞爾箇兒ヲ含ム第二規尼捏ノ外聖叔尼捏ヲ含ムヿ疑ヲ容レズ第三龍腦及ヒ雜腹蘭其佐藥タリ而シテ此二品ヲ含有スルハ確實ナリトス第四方法ヲ秘スルガ爲ニ尚他ノ染色。苦味。香竄ノ者此藥液ニ混淆ス蓋蘆薈及ヒ沒藥ヲ加フルヿ疑ヒナシ其香味ヲ以テ考フルニ恐ラクハ良姜ノ如キ香竄藥之ニ混スルナルベシ第五之ヲ溶解セシ者ハ亞爾箇兒タルヿ確著ナリ第六是故ニ唯植物ノ元分ヲ酒精ニ溶化スル者ナルヿ昭々タリ第七製法ハ五幾那ヲ硫酸ト水ニ浸漬シ此浸液ヲ蒸發シテ以テ極メテ稠厚ナラシメ加爾基ト剥篤亞斯ヲ加ヘテ硫酸ノ一分ヲ去リ更ニ些ノ龍腦。雜腹蘭等ヲ加ヘ之ヲ純粹猛烈ノ酒精ニ混和スルナリ此說最信用スベシ○又澎弗涅兒氏法ヲ以テ之ヲ撿査シ規尼阿乙實捏ヲ硫酸二三滴ニ和メ猛烈ノ燒酒ニ溶化シ之ヲ些ノ龍腦。雜腹蘭丁幾。沒藥丁幾。及ヒ蘆薈丁幾ト混合シ以テ嫂爾澎耳倔氏ノ截熱液ニ酷類似セル全ク同品ニアラスト雖一種ノ丁幾丟爾ヲ製シ得タリ○殷結列兒氏及ヒ嬰年地名ノ合藥家狨屈私氏モ亦之ヲ分離セリ其論全ク澎弗涅兒氏ノ試驗ニ同シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第二百八十九方　丙　病院用截熱丁幾

蘆薈一弓半　龍腦十六刃　橙皮　土木香粗末各八弓　燒酒十五北

右飽熱十日絞取液加後藥

硫酸規尼捏六弓　稀硫酸十六弓　舍電阿芙蓉液一弓半

〔主治〕屢年地名ノ堡砦ニ附屬セル最大ノ病院第四局ニ屬スル醫爾理倔列耳人名此丁幾劑ヲ以テ間歇熱ヲ治シ其試驗說ヲ世上ニ示セリ」左法ニ依テ硫酸規尼捏ヲ用フレバ其効力更ニ强シ〔第一〕溶化シ用フ〔第二〕硫酸ヲ加ヘテ過硫酸規尼捏トナラシム〔第三〕他ノ緩性强壯藥香竄

揮發ニシテ衝動ノ効アル者ヲ配伍ス〔第四〕發作前ニ切近メ之ヲ與フ」已上件々確徵スル所ナルガ故ニ私榻歇兒度醫官名骨篤埋爾人名ノ命ニ從ヒ軍用藥劑書中適當ノ品ヲ撰ミテ此丁幾劑ヲ製シ嫂爾滮耳倔截熱丁幾丟爾ノ如ク之ヲ用ヒ間歇熱ノ患者百四十六人ニ偉効ヲ奏セリ皆此劑ヲ服スルノ后顯著ニ小疱ヲ發セリ其狀眞ニ熱性汗疱スウェートブラーシーースニシテ他種ノ者ニアラズ○普呂弗刺倔私揭人名及ヒ合藥家拔屈人名舍密法ヲ以テ之ヲ分離ス其一定說ニ據レバ此丁幾劑ノ成分ハ嫂爾滮耳倔ノ秘藥截熱液ニ類似スト云フ

Kitasato Memorial Medical Library

○第二百九十方　颮爾突氏貧家應用驅熱散

水楊梅根六錢　精製硇砂二錢

右調和為散每一時乃至一時半服一小哥喜匙

○第二百九十一方〔噦。遏。法設〕

水楊梅根細剉一弓　水十二弓煮濾過取八弓加後藥

水楊梅越幾斯或幾那越幾斯二錢　忽弗滿液一錢

右調和每一時服二食匙

○第二百九十二方〔私屈拔爾託〕

水楊梅根末一弓　桂末二刃　橙皮舍利別三弓

右調和為煉膏每半時服一茶匙强

〔主治〕右三方二百九十方至二百九十二方間歇熱輕症ニ用フベシ

○第二百九十三方〔遏。傑。栗屈的兒〕

水楊皮細末二錢　橙皮黃末半弓　橙皮舍利別適宜

右攪和為煉膏免熱之間茶匙抄服

〔主治〕間歇熱殊ニ消食器衰弱セル者之ニ宜シ

○第二百九十四方〔蒲列墨爾〕

水楊皮末五弓　燒酒八弓　水十六弓

右盞閉飽熟六時加水三十弓煮耗至十五弓濾過免熱時小盞抄服

〔主治〕間歇熱頑固症ニ與ヘテ良

Kitasato Memorial Medical Library

○第二百九十五方（栗屈的兒）

水楊皮半弓　熱湯一北浸漬六時煮耗七弓乘煮熟加水楊梅根三錢濾過絞搾取液六弓加後藥

酒製大黃丁幾三錢　橙皮舍利別五錢

右調和每一時服二食匙

〔主治〕間歇熱頑固ノ症ニ宜シ

○第二百九十六方（弗格呂謨保兒私）

撒里矢捏十二瓜　白糖二刃

右調和為散分四包每服一包日三次

〔主治〕間歇熱衰弱ヲ帶ル症ニ宜シ

○第二百九十七方

硫酸撒里矢捏二刃　甘草越幾斯四刃

右調和為六十丸衣桂末每服二丸乃至六丸日一次至五次

〔主治〕同上

○第二百九十八方

撒里矢捏一錢　枸櫞酸半刃　健質亞那越幾斯二錢　水楊梅根適宜

右為九十丸衣菖蒲根末玻璃壜収貯每服十丸日三次

〔主治〕間歇熱ノ患者規尼捏ヲ服スルニ堪ヘス又數間歇

Kitasato Memorial Medical Library

熱ヲ發スル者之ニ宜シ

○第二百九十九方〔獵歇蘭度〕

七葉樹皮半刃　姜末或　芳香散三氏

右調和為散分二十四裹免熱間毎半時服一裹

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○此散ヲ服ノ胃中壓迫ヲ覺ユル者ハ亜爾鮮丁幾十六滴乃至二十滴若クハ葡萄酒少許ヲ服スルヿ日ニ二次吐逆ヲ發スル者ハ舍電阿芙蓉液ヲ加フベシ

○第三百方

七葉樹皮一弓　水適宜煮濾取六弓冷定加後件

菖蒲根丁幾一錢　橙皮舍利別六錢

右調和免熱間用之臨服宜振盪

〔主治〕間歇熱輕症ヲ治スルニ宜シ

○第三百一方〔戾兒〕

七葉樹皮越幾斯一錢　桂水一弓

右調和免熱間毎一時半服六十滴

○第三百二方〔繆兒列爾〕

設篤拉里捏〔依蘭苔苦味質〕　亜利毘亜蘧謨各二氏　白糖半刃

右調和為散分八服毎一時一服

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○設篤拉里捏ノ効之ヲ規尼捏ニ較

Kitasato Memorial Medical Library

レバ緩ナリト雖胃甚能ク之ヲ受クルニ堪フ

○第三百三方〔拔臘私〕

龍腦一瓦半至二瓦　亞剌毘亞蘧謨二錢半　白糖一錢

右調和為散分二包蠟紙包裹當再次發熱前三時二時及一時毎次服一包

○第三百四方〔同上〕

甘扁桃乳六錢以甘扁桃一弓製之　龍腦一瓦至二瓦　白糖三錢

右調和取半劑當再次發熱前三時服之其餘半劑方發熱前一時半用之

○第三百五方〔同上〕

龍腦二瓦

右加亞剌毘亞蘧謨末半錢研和為十丸衣桂末當發作前二時及一時毎次服二丸

〔主治〕右三方三百三方至三百五方間歇熱ヲ遏止スルニ用フ

○拔臘私氏ノ說ニ據レバ龍腦ノ幾那ニ優レルヿ三件アリ

〔第一〕龍腦ヲ以テ治スレバ其症ノ再發スルヿ甚罕ナリ

〔第二〕龍腦ハ幾那及ビ規尼捏ノ如ク後患ヲ遺スヿナシ

〔第三〕幾那ニ比スレバ其價廉ナリ○拔臘私氏一患者ヲ療セシトキ龍腦二瓦亞剌毘亞蘧謨末二刃合和頓服セシメ爾後二日毎日龍腦一瓦ヲ二丸ト為シ與フト云

Kitasato Memorial Medical Library

フ○澎加列私篤（地名）ノ合藥家私哆傑氏間歇熱ニ龍腦ノ効ヲ稱賛シテ拔臘私氏ノ名ヲ世ニ顯ハセリ」伊太利亜（國名）ノ旅客モ亦大ニ龍腦ヲ賞譽セリ

○第三百六方〔幾壓巴〕

必百力揑（二氏四氏至十氏〔附〕）菖蒲油糖（半刃）

右調和為散分六服蠟紙包裹免熱時用之

〔主治〕間歇熱飲食不化及ヒ不食症ニ宜シ○間歇熱腹内運營遲鈍ノ症ニ必百力揑ノ効アルヿ黙利氏顎爾篤列氏優篤薜爾氏蒲魯謨氏倔戾涅爾氏等確定セシ所ナリ」然ヒ噦魯涅屈氏及ヒ刺胄私氏ノ經驗ニ據レバ必百力揑ノ効規尼揑ニ較レバ甚劣レリト云フ○又黒椒十粒乃至十五粒ヲ取テ免熱時嚥下セシムルヿ日ニ三次ヨリ四次至或ハ發熱前ニ切近メ胡椒十粒乃至十五粒枸櫞汁ヲ以テ送下スルヲ稱賛セリ」然ヒ此ノ如キ療法ハ獨感覺遲鈍ノ症ニ適應スルノミ

○第三百七方〔窒兒滿〕

黒芥子末（二刃）安息香末（一刃）

右調和為散赤葡萄酒或燒酒一盞和服

〔主治〕土設爾尼顆（地名）ノ政府ニ於ケル結列都醫（官名）冷牠私揭等頑固ノ間歇熱ニ規尼揑及ヒ其他對症ノ藥ヲ用ヒ

Kitasato Memorial Medical Library

テ治シ難キ者ハ此方ヲ與ヘテ良効ヲ得タリ」冷牠私揭此方ヲ一老婦ニ傳受シ發熱前ニ切近シテ之ヲ服サシム假令再次ノ發熱アルモ必ス輕ク且此症ヲ復發スルヿナシ此方大抵一服ニメ治ス後服ヲ要スル者ハ甚稀ニシテ唯經久ノ症ニ間之アルノミ」冷牠私揭氏此法ニ從ヒ八年間ニ一百十二人ヲ治シ爾後復害アルヲ見ズト云フ」小兒ハ上方ノ半量ヲ服スベシ○窒兒滿氏ノ云ク芥子ハ古來屢間歇熱ニ用ヒシヿ世人ノ知ル所ニシテ此方ノ君藥タリ殊ニ單純腸胃性間歇熱ノ如キハ之ヲ一味用ヒテ同上ノ効ヲ奏スト

○第三百八方〔弗。肸爾田蒲蘭度〕

番椒越幾斯　亞爾鮮越幾斯各一錢　綿荅幾里私布水〔薄荷ノ一種六弓〕　水製大黃丁幾一弓

右調和毎一時服二食匙

○第三百九方〔同上〕

番椒越幾斯　珊篤里越幾斯各半錢　黙栗薩水六弓　忽弗滿液一刃

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕右二方間歇熱腹内諸器ノ運機遲鈍ナル症ニ宜シ

○第三百十方〔蹩爾舊私〕

Kitasato Memorial Medical Library

○番椒六氏　老利兒二刃

右調和為散分三服初日惡寒之始一服次日一服又次日一服每服須同時與之

主治　頑固ノ惡性間歇熱ニ宜シ

○第二百十一方　弗蘭屈　獵歇蘭度

苦扁桃去皮一錢半　加水適宜作乳劑一弓溶後藥

珊篤里越幾斯半刃至一刃

右調勻當發熱前三時頓服

主治　間歇熱ニ用フ○發熱前ニ切近ノ苦扁桃一二箇ヲ用ヒ截熱ヲ得シヿ屢之アリ

○第三百十二方　別跨突篤

墨列僕里越幾斯　硇砂各二錢　亞爾鮮越幾斯一錢　薄荷水五弓

右調勻每一時服一食匙強

主治　四日熱ニ宜シ此方ヲ用ヒテ后大抵第二發乃至第四發ニシテ解散ス之ヲ用フレバ血液腐敗及ヒ肚腹膨脹等ノ症モ亦預防スルヲ得ベシ幾那或ハ莨菪ヲ要スル者稀ナリ

○第三百十三方　哿寧屈

精製弗魯里矢捏十二氏至十五氏　附　白糖半刃

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散發熱前服一包乃至二包

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○第一包ヲ用ヒテ効ナキ者ハ發熱後ニ至テ第二包ヲ與ウベシ多キモ第三包ヲ用フルニ過キズ之ニ由テ熱ヲ除ク日確實ナリ」憑私人名劉天私同上呻涅倔剌弗同上ノ試驗說モ亦哿寧屈人名ノ說ニ符合ス

○第三百十四方〔狨歇蘭度〕

精製阿芙蓉八匁　白糖四刀

右調和為散分八包每一時服一包

〔主治〕卒中狀間歇熱ニ先免熱時王幾那末一弓或ハ硫酸規尼捏十匁乃至二十匁ヲ與ヘテ後發作中此方ヲ連用ス」蓋此症ハ眞ノ卒中性ニアラズシテ唯痙攣性ノ証タリ故ニ之ヲ治スルニ阿芙蓉ヲ以テス」患者嚥下スルヿ能ハザル片ハ阿芙蓉液二錢ヲ加ヘテ灌腸ヲ施スベシ」但甚多血ノ人ハ免熱時適宜ニ放血ヲ行フベシ然レ𪜈是唯病勢ヲ緩和スル為ニシテ全治ノ法ニアラズ

○第三百十五方〔同上〕

燐一匁　的列並油一錢溶和

右每服取十滴遏爾托煎一小盞和服日四次

〔主治〕頑固ノ間歇熱諸藥効ナキ者此方最奇驗アリ

○第三百十六方〔落剌私結〕

Kitasato Memorial Medical Library

○格魯林曹達（半錢至半弓）　蒸餾水四弓溶化

右調和免熱時毎半時服一食匙

〔主治〕間歇熱ニ用フ殊ニ脾臓腫起スル者ニ宜シ○格兒損人名（ソン）　翎憂邪（同上）　格魯林曹達ノ効力ヲ論定セリ○然レ𪜈頑固症ニ於テハ其効規尼捏（キニ子）ニ代ルヿ能ハズ

○第三百十七方〔弗。陽〕

銕屑（半弓）　蓍草越幾斯　加密列越幾斯（各二錢）　番木鼈越幾斯（十六氏）

右調和二氏為一丸衣桂末毎一時半服三粒乃至五粒

〔主治〕頑固ノ間歇熱ニ用フ殊ニ四日熱經久且幾那ヲ用ヒテ却テ激スル者之ニ宜シ

○第三百十八方

青酸銕（一氏至三氏）　大黄（二氏）　菖蒲油糖（半刃）

右為散分九包蠟紙包裹毎服一包日三次

〔主治〕頑固ノ間歇熱其熱勢輕ク然レ𪜈大ニ虚衰メ神經ノ感覺亢進セル者之ニ宜シ

○第三百十九方〔加。弗。土戾噦爾〕

青酸銕（二氏）　硫酸規尼捏（三氏）　大黄（五氏）　白糖（半刃）

右調和為散分八包蠟紙包裹免熱時用之

〔主治〕間歇熱幾那劑ヲ與ヘテ治セリト雖復屢發スル者

Kitasato Memorial Medical Library

土戾噦爾（ドレイヒル）（人名）此方ヲ用ヒテ超絶ノ効ヲ得タリ○通例ニ
劑ヲ用ヒテ截熱スルニ足ルト雖土戾噦爾（ドレイヒル）頑固症ヲ療
スルトキハ第二劑ヲ作リテ用フ其頑固ナラザリシ者モ
○亦第二劑ヲ與ヘシコトアリ」爾後暫睡菜葉浸ヲ少許宛與
ヘテ功ヲ終ヘリ

○第三百二十方〔弗四篤私（フストス）〕

青酸銕（一ヶ半）　硫酸規尼捏（キニネ）（二ヶ）　大黄（六ヶ）　菖蒲油糖（半刃）

右調和為散分八服蠟紙包裹毎服一裹日三次乃至四次

○〔主治〕第三百十八方ニ同シ

○第三百二十六方〔熅摂爾（ヒルル）〕　名驅熱散

金硫黄　孕礬酒石　精製牡蠣末（各半錢）

右調和為散分四包

〔主治〕金硫黄ハ幾那ニ代ハルベク又頭之ヲ用フレバ幾
○那ノ効力ヲ扶クルノ一藥トシテ熅摂爾（ウンセル）（人名）之ヲ稱賛セ
リ」汚物逆上ノ徴ヲ見ハス者ハ熅摂爾（ウンセル）氏先吐劑ヲ與フ
他症ハ始ヨリ此方ヲ處セリ」日發熱ノ免熱時短ナル者
ハ此散二包ヲ與ヘ餘ノ二包ハ次ノ免熱時ニ及テ之ヲ
與フ」其第一包ハ發作後二時ニ方テ用ヒ第二包ハ其後
四時ニ及テ服サシム」三日熱四日熱ハ免熱時中四包連
進ノ之ヲ盡サシム但四日熱ハ免熱二日ノ間毎日二包

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ投スベシ」此方ヲ與ヘテ或ハ吐シ或ハ瀉シ或ハ發汗及ヒ利尿ヲ增スベシ」大抵之ニ由テ發作止ムナリ」其熱再次却テ劇發スル者モ亦間之アリト雖後ノ發作ニ至テ歇ム若再次發スル片ハ次ノ免熱時ニ至リ幾那ヲ與ヘベシ」頑固ノ四日熱モ亦此療法ニ由テ解スベシ但頑固症ニ在テハ此散久服スルヲ要スル者屢之アリ

○第三百二十二方〔獵歇蘭度〕

金硫黃八氏　精製阿芙蓉二氏　幾那末　加密列末各四刃

右調和為散分八包免熱時用之

〔主治〕間歇熱ニ効アルノ一方トス

○第三百二十三方〔過傑栗屈的兒〕

膽礬　精製阿芙蓉各半氏　白桂一氏　亞剌毘亞蘧謨末一刃

右調和為散分六服朝暮一服

〔主治〕間歇熱最頑固ノ症ニ用ヲ」膽礬及ヒ阿芙蓉ノ量增シテ一氏ニ至ルモ亦可ナリ

○第三百二十四方〔過駘耳〕

膽礬六氏　蒸餾水適宜溶解加後藥

菖蒲根末二錢　甘草越幾斯適宜

右為九十丸衣石松粉貯玻璃壜毎服四丸乃至七丸免熱

Kitasato Memorial Medical Library

間三次乃至四次

〔主治〕間歇熱極メテ頑固ノ者之ニ宜シ

○第三百二十五方〔蒲列剌〕

砒銅礬一匁　甘草末一刃　砂糖舍利別適宜

右為八丸衣石松粉貯玻璃壜毎二時服一丸

〔主治〕間歇熱甚頑固ニシテ且發作不齊ノ症腹内ノ閉塞及ヒ腺病ヲ夾ム者之ニ宜シ

○第三百二十六方

白砒　酒石鹽各六十四匁

以上二呆加蒸餾水六弓安沙火煮溶之小心濾過冷定加後件

刺賢垤兒精半弓　蒸餾水適宜但度十六弓

右名福烏列爾氏砒石溶水

〔主治〕間歇熱ニ宜シ○此液七十滴乃至八十滴中砒石大率半匁ヲ含ム小兒二歳ノ者ハ二滴ヲ與フルヿ日ニ二次大人ハ十滴ヨリ二十滴ニ至ル○盖砒石ヲ用フル片ハ專謹慎ヲ加ヘ已ムヲ得ザルノ症ノミ之ヲ與ノベシ

○第三百二十七方

白砒細末　精製酒石鹽各半錢　蒸餾水六弓煮濾過加桂水適宜

Kitasato Memorial Medical Library

右調和作液八弓名顳爾列斯人名改製蒲列刺砒石溶水

○第三百二十八方

白砒末　酒石鹽各一錢　加蒸餾水半北安沙火溶解砒石冷定加後藥

複方白芷精〔附〕一弓　蒸餾水適宜

右合作液一北名歇愔人名砒石溶水

〔主治〕間歇熱ニ宜シ大人一時毎ニ五滴ヨリ十五滴至小兒一滴ヨリ二滴至免熱時之ヲ用フ

○第三百二十九方〔別連杜〕

幾那煎四弓煎幾那半弓取之　雞子黄一箇　王幾那細末三錢　舍電

阿芙蓉液十二滴

右調和供灌腸

〔主治〕惡性變形間歇熱ニ宜シ

○第三百三十方〔冷度〕

幾那越幾斯二錢　蒸餾水四弓　阿列襪油半弓　單方阿芙蓉丁幾十二滴

右調和供灌腸

〔主治〕間歇熱胃幾那ニ堪ヘザル者之ニ宜シ

○第三百三十一方〔福爾墨兒〕

硫酸規尼捏十一氏　加後藥捏和

Kitasato Memorial Medical Library

雞子黄一箇　菖蒲浸八弓　舎電阿芙蓉液十二滴

右調和供灌腸

主治　頑固ノ間歇熱及ヒ幾那ノ内服ニ堪ヘザル者之ニ宜シ

○第三百三十二方（春姪隣）

硫酸規尼揑六氏　醋酸加里一錢　茴香水三弓　橙花舎利別一弓

右溶和免熱時毎半時或一時服一糖匙強

主治　小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十三方（優篤薛爾）

鹽酸規尼揑一刃　薄荷水或桂水半弓溶化

右毎一時服二十滴乃至六十滴

主治　小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十四方（私窒蹩兒）

赭色幾那三弓至六弓

右為粗末水煎濾過毎日一劑加浴湯

主治　小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十五方（歇愔）

歇愔砒石溶水一刃百廿八方（第三）　蒸餾水一弓半　拔爾撒謨舎利別半弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每一時服一茶匙强

〔主治〕小兒間歇熱ニ宜シ然レ𪜈余輩決ヲ小兒ニ砒石ヲ用フルヿナシ

○第三百三十六方

上好幾那一弓　橙皮黄二錢至三錢

右細剉加葡萄酒一壜浸漬每服一盞强日二次

○第三百三十七方

寒製幾那越幾斯二錢　橙花水一弓　硫酸亞的兒一錢

右調和每一時服二十滴乃至六十滴

○第三百三十八方〔篤姪〕

幾那越幾斯三錢　桂加酒水十四弓〔附〕

右調勻朝暮取六十滴葡萄酒和服

〔主治〕右三方三百三十六方至三百三十八方慢性間歇熱及ヒ其他大病後ノ衰弱ヲ治スルニ宜シ

○第三百三十九方〔噦乙天越蹩兒〕

赭色幾那細末一弓　桂末一錢

右調和為散分八服每一時半一服

〔主治〕間歇熱後肝臟若クハ脾臟ノ腫脹セル症之ニ宜シ

○第三百四十方〔瓜隣〕

硇銕華一錢　赭色幾那末一弓　健質亞那末三錢　海葱蜜

Kitasato Memorial Medical Library

橙皮舍利別各適宜

○右調和為煉膏每一時服一茶匙臨服宜振盪

〔主治〕頑固ノ間歇熱脾臟腫起及ヒ水腫症ヲ兼併セル者之ニ宜シ

○第三百四十一方〔孤刺律私〕孤刺律私強壯解凝丸

硇鐵華　蘆薈水製越幾斯各一刃　白屈菜越幾斯四刃

瓦爾拔奴謨　勿搦祭亜石鹼各二錢

右調和二氏為一丸衣桂皮末貯玻璃壜朝夕與六丸

〔主治〕慢性間歇熱後腹内諸器殊ニ脾臟腫起シ其質軟化セル者之ニ宜シ

○第三百四十二方〔瞥。弗蘭屈〕

幾那粗末一弓　水適宜煮濾過取八弓加後件

幾那細末三弓　純精酒石二錢至三錢　白糖三錢

右冷定再加甘海鹽精二錢調勻每一時服一食匙臨服宜揚盪

○第三百四十三方〔遏。傑。栗屈的兒〕

幾那細末半弓　菖蒲根末半錢　海葱蜜半弓　杜松子傑列乙二錢　水適宜

右為煉膏每一時乃至一時半服一茶匙臨服宜攪和

○第三百四十四方〔設。傑。湼優滿〕

Kitasato Memorial Medical Library

○海葱末六匁　精製阿芙蓉二匁　鹽酸規尼捏三十六匁　薄荷油糖二錢

右調和為散分十二褁每服一褁日三次乃至四次

○第三百四十五方〔失鰲蘧志都〕

七葉樹皮細末半弓　菖蒲根末半錢　杜松子傑列乙三弓〔附〕

右調和作煉膏每一時服一茶匙臨服宜攪和

〔主治〕右四方三百四十二方至三百四十五方水腫間歇熱ニ因スル症ニ宜シ

○第三百四十六方〔涅優滿〕

金硫黄　孕礬酒石　牡蠣末各半錢

右調和為散分六服晨夕一服

〔主治〕間歇熱後ノ水腫幾那ノ過服ニ因ル者之ニ宜シ此散ヲ服スルヿ二三日ノ後更ニ幾那若クハ規尼捏ヲ用フベシ

慢性熱フェブリス。レンタ羅スレ。ペンデ。コールツ蘭

慢性熱ハ每常他ノ本病アリテ之ニ因スル所ノ見証ナリ

或ハ局處ノ疾患一部ノ慢性嫩衝或ハ排除スベキ病毒ノ鬱積皮膚病ノ抑壓。潰瘍及ヒ打膿速ニ癒ユル者。常習ノ出血若クハ脚汗卒ニ遏止スル者等或ハ諸液ノ過泄血液。精液。乳漣等或ハ心思鬱憂慾心遂ゲザル者等殊ニ此ニ屬ス此症ノ原因タリ

慢性熱ノ因テ起ル所以ノ者其レ此ノ如ク差別アルガ故

Kitasato Memorial Medical Library

ニ各症ニ適應スル一定ノ方法ヲ擧クルヿ能ハズ要唯其症ヲ誘起シ其レヲシテ保續セシムル所ノ病根ヲ索メ從テ的當ノ方法ヲ撰ムヲ醫ノ伎倆ニ任スルナリ」是故ニ余ハ唯此病ニ多々採用スル所ノ治方ノミヲ將テ此ニ記載ス乃滋養法强壯法是ナリ但其方法毎症必シモ施スベカラザル者モ亦之アリト雖中ニ就テ最簡要ノ者ヲ揭ケ且附考ヲ設ク

〔第一乳養法〕新ニ乳ヲ絞リテ未冷ヘザル者ヲ最佳トス」患者朝夕三小盞(コツヒー)乃至四小盞ヲ白蒸餅ト俱ニ用ヒ氣力歩行ニ堪フベクンバ好日乳湩ヲ服メ后清爽氣中ヲ緩歩スベシ」驢馬乳ヲ最消化シ易シトス之ニ次グ者ハ

山羊(ヤギ)乳。牛乳是ナリ」婦人ニ就テ直ニ哺乳セシムルハ吾輩欲セザル所ナリ患者弱齢ノ男子ナラバ殊ニ之ヲ忌ムベシ」乳養法ヲ施スノ間ハ鹽酸味香竄及ヒ多脂ノ食物或ハ果實麥酒等ヲ嚴禁スベシ」若胃乳汁ニ堪ヘザル者ハ之ニ代ヘテ乳清三百五十六方至三百五十八方ヲ與フベシ

〔第二精麥粉〕一食匙乃至二食匙ヲ取リ牛乳。山羊(ヤギ)乳。若クハ驢馬乳一北或ハ稀淡ニシテ脂肪少キ肉羹汁ヲ加ヘ微炭火ニ上セ手ヲ住メズ攪和シテ稀粥ノ稠トナス但之ヲ沸騰セシムルヨナク而メ氷糖ヲ加ヘ甘味ナラシメ之ヲ朝暮ノ餐食ニ代ヘテ用ヒシム」多脂ノ物。酸性ノ物。及ヒ風氣ヲ釀ス物ハ禁ス

Kitasato Memorial Medical Library

ベシ〔第三亜兒魯粉〔附〕亜兒魯粉一錢半ヲ取リ冷水一食匙ヲ加ヘ攪和シ更ニ熱湯九弓ヲ加ヘ再振盪シ一密扭篤間之ヲ飽釀セシメテ清澄ノ粘汁ヲ得之ニ砂糖ヲ和メ佳味ナラシメ食匙ニ抄ヒ服セシム」或ハ冷水ニ代ヘテ肉羹汁ノ脂肪ヲ去ル者若クハ乳汁モ亦用フベシ○小兒ヲ療スルトキハ冷水一食匙ニ亜兒魯粉纔ニ一茶匙強ヲ用フベシ

〔第四以幾那及規尼捏治慢性熱考〕起因脱液ニアリテ此ニ焮衝証。腸胃汚物。或ハ膽液性ノ証狀ヲ帶ビサル者ハ幾那浸百六十一方幾那煎百六十二方偉効アリ」但之ニ反スル者ハ幾那必害アリ」幾那鹽ハ禁忌ノ症甚少シ」貴要ノ内臓ニ不治ノ器敗病アリテ慢性熱ノ本因ヲナス者ノ外ハ幾那鹽ヲ久服セシメテ全癒ヲ得ル者間之アリ始硫酸規尼捏六氏乃至十氏ヲ服シ後暫ノ間日ニ二氏乃至四氏ヲ用フベシ

○第二百四十七方〔鹹欬蘭度〕

○蝲蛄石二錢　枸櫞汁適宜　飽和加後件

菩提樹花水六弓　甘草舍利別一弓

右調和毎一時服二食匙

○第三百四十八方

精製炭酸剥篤亜斯一錢半　新製枸櫞汁適宜　飽和加後

藥

Kitasato Memorial Medical Library

大麥煎一比半　覆盆子舍利別一弓半

右為飲料

○第三百四十九方

收歛亜的兒半錢　沙列布煎四弓　覆盆子舍利別一弓

右合勻每一時服一食匙

○第三百五十方

新大麥一弓半以熱湯數次洗之　蘆根半弓　水五比煮耗至四比濾

過加後藥

屋施蔑兒二弓

右調和每次與一小盞

〔主治〕右諸方三百四十七方至三百五十方　焮衝性慢性熱ニ宜シ

○第三百五十一方〔私。傑。福傑爾〕

蒲公英越幾斯一錢半　旃那瀉下飲〔陌〕二弓　滿那舍利別一弓

右調勻每一時乃至一時半與二食匙

〔主治〕慢性熱腸胃汚物ニ起因シ且之ガ為ニ其熱稽留セル者ニ用フ

○第三百五十二方〔同上〕

幾那末一弓半　大黃末半弓　水三比煮耗至一比濾加後

藥

Kitasato Memorial Medical Library

茴香舎利別二弓

右調和毎一時乃至一時半服半小盞

〔主治〕慢性熱腸中ノ汚物ヲ排泄スベキ症ニシテ生力大ニ沈衰セル者之ニ宜シ○然レ𪜈幾那不當ノ症ニ之ヲ用フル𪜈ハ其利ヲ得ルヨリ害ヲ招クヿ多シ忽ニスベカラズ」殊ニ感動甚シキ症。熱肝盛ノ稽留セル者。肌熱熾ナル者。重大ノ閉塞アル者。及ヒ腹臓ニ硬結腫アル者ハ皆幾那ヲ與フヘカラズ其熱較著ニ間歇アリテ而メ肌熱甚輕ク。脈小ニメ軟ナル者ハ幾那ノ効更ニ偉ナリ

○第三百五十三方〔理篤阜〕

實芟荅利斯葉半錢　赭色幾那半弓

右熱湯六弓浸漬濾過毎一時乃至一時半與一食匙

〔主治〕慢性熱脈狀觸動機ノ微弱ヲ見ハシ且一處ノ畜血等アル症ニシテ其他ハ幾那適應ノ証候備ハル者之ヲ與フルニ宜シ」實芟荅利斯ノ効力ハ久々保持スルガ故ニ久服スヘカラズ五六日乃至九日ニシテ休ムベシ

○第三百五十四方〔遏。傑。栗屈的兒〕

吐酒石一瓦　孕硼酒石半弓

右蒸餾水四弓溶和毎一時與一食匙

〔主治〕慢性熱腸胃汚物ヲ夾ム症之ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第三百五十五方〔弗。陽〕

民垤列里精一弓　過設印亞的兒一錢　橙花水二弓　橙花舍利別三錢

○右調勻每半時服一食匙

〔主治〕緩慢神經性ノ症患者虛弱依剥昆垤爾若クハ歇私的里ヲ帶ヒ脈小ニシテ稍緊ナル者ニ用ヒテ皮膚運營ノ減衰ヲ挑起スルニ宜シ

○第三百五十六方　暴劉私甘乳清

犢牛胃乾者半弓　冷水六弓浸漬五時乃至六時取浸液一弓加後藥

新鮮牛乳九北

○右安微温所飽熟至凝聚取上澄濾過

〔主治〕毎日一北乃至二北ヲ取リ微温ニメ服用セシムル

ヲ宜トス但最初ハ少許宛早旦空心ニ飲マシメ服後屋外ヲ緩歩セシムベシ」此方ヲ用フルトキハ總テ難化ノ食物。油膩。鹽味酸味ノ物。多脂肉。炙肉。果實。精液。及ヒ麥酒ヲ禁忌ス」專蔬菜。雛肉。犢牛肉。白蒸餅等ヲ以テ奉養スルニ宜シ○摂爾都兒水。洎爾私蒲淪泉。麻里印泉。等ノ如キ鑛泉ヲ以テ上方ニ合和シ適應スル症モ亦多シトス

○第三百五十七方　暴劉謨甘和乳清

Kitasato Memorial Medical Library

○牛乳三北

右上火沸騰初加純精酒石一錢令凝結畧冷後濾過更加雞子白適宜煮沸至雞子白凝聚濾加後藥

牡蠣末適宜飽和為度

○第三百五十八方

橙皮黄四錢至六錢

右加甘和乳清三百五十七方二北乃至三北煮沸濾過一日服盡

〔主治〕甘乳清三百五十六方ヲ服メ后胃化困難ナル者之ヲ與フ

○第三百五十九方　酒石乳清セシム。ラクチス。タルタリサチュム。

新鮮牛乳三北　煮加後藥

純精酒石二錢　枸櫞汁適宜

右作乳清加大麥糖〔附〕適宜味佳為度

○第三百六十方

甘乳清以牛乳製者二北　白屈菜葉汁新絞濾過者二錢　桂水一弓

右合勻朝暮服半劑臨服宜振盪

〔主治〕慢性熱肝臓ノ疾患ヲ夾ム者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

○第三百六十一方〔鑣蘱私丁〕滿那乳清

上好滿那一弓　純精酒石半弓　酒石乳清〔三百五十九方〕六弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調匀毎一時與半盞以至得下

〔主治〕清涼下劑トシテ熱性病焮衝病ニ用フ

○第三百六十二方

沙列布末一錢半　水適宜煮為傑列乙加後味

栗鼈子舎利別一弓

右調和茶匙抄服

〔主治〕胸病ヲ患ヒテ衰弱羸瘦セル者此方滋養包摂スルニ宜シ

○第三百六十三方　訥弗氏沙列布傑列乙

沙列布末二錢　蒸餾水八弓煮沸濾過加後藥

橙皮舎利別半弓

○第三百六十四方〔弗。噶刺歇〕

上好鹿角菜細製半錢　新鮮牛乳九弓　煮耗至五弓濾過加後藥

白糖半弓至一弓　苦扁桃水濃厚者一刀〔附〕

右調匀安冷所頻々茶匙抄服一日盡

〔主治〕經久ノ嘶嘍。乾欬。痙攣性欬嗽。肺勞。下利痢疾等ノ如キ重病後ノ羸瘦脱力ヲ治スルニ宜シ

○第三百六十五方〔同上〕

上好鹿角菜細製一錢半　水十二弓煮濾過取五弓加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

覆盆子舍利別一弓半至二弓　苦扁桃水濃厚者一刃附

右調和安冷所每日茶匙抄服

〔主治〕上方ニ同シ

○第三百六十六方〔械羽歇蘭度〕

鹿角菜二錢　乳汁一北煮作傑列乙加後味

白糖一弓　苦扁桃二箇

右每日飲服

○第三百六十七方〔朴澁私〕

鹿角菜一錢半　水適宜浸漬五密扭篤再加水五弓煮濾

取三弓加後藥

櫻實舍利別六錢　老利兒水一刃

右安冷所作傑列乙貯白玻璃壜一日服盡

○第三百六十八方〔孤刺律私〕

葛加阿膏四弓〔附〕　鹿角菜細末六弓　上微火煮四分時加後

藥

白糖四弓　白法里那〔砂糖之一種適宜〕〔六弓〕

右半弓為一錠乾貯水及乳汁煮服之

〔考〕感觸靈敏ノ人鹿角菜ヲ用フル片ハ依蘭苔ニ優レリ

此ニ依蘭苔ヲ用フレバ衝動ニ過タリトス

○第三百六十九方　依蘭苔傑列乙

Kitasato Memorial Medical Library

○依蘭苔一弓　注精製炭酸剥篤亜斯溶液（剥篤亜斯二錢熱湯適宜）浸漬一時半濾去液丁寧洗淨再加水適宜煮耗至六弓加後味

○白糖一弓半　遏泥子油糖半弓

右調勻每服一茶匙

〔考〕依蘭苔ヲ炭酸剥篤亜斯ニ浸セバ其固有ノ苦味ヲ脱ス○又之ヲ煎スル前依蘭苔ニ熱湯ヲ加ヘテ攪撓スルモ亦其苦味ヲ除クヿヲ得ベシ

○第三百七十方〔朴淲私〕

依蘭苔一弓　水十六弓煮濾取五弓加沙列布末半錢冷水一弓溶化者搗和不住手強攪令沸釀更加後味

○橙皮油糖一弓半

右安冷所為傑列乙一日服盡

○第三百七十一方

依蘭苔一弓　加熱湯六弓飽熟四分時投鹿角屑洗潔者半弓加水十四弓煮濾取六弓加雞子白適宜再濾過加後味

○桂油糖一弓

右安冷所為傑列乙一日服盡

○第三百七十二方〔孤刺律私〕

Kitasato Memorial Medical Library

○依蘭苔傑列乙　白糖各二弓　亞剌毘亞蘧謨末二刃

右安暖所令乾固為細末每服一哥喜匙日四次乃至六次

○第三百七十三方〔朴濾私〕

依蘭苔一弓　水二北煮濾取一北加後藥

甘草舍利別一弓

右調勻每一時服一食匙乃至二食匙

○第三百七十四方〔同上〕

依蘭苔六錢至一弓　格綸僕二錢　水十六弓煮濾取十二弓

冷後加後藥

忽弗滿液一錢　桂舍利別一弓

右調和每一時服二食匙

○第三百七十五方

依蘭苔二弓　魚膠一錢　水適宜煮一時溶白糖四弓加雞子白一箇濾過加赭色幾那一弓桂皮二錢再煮八分時濾取八弓

右分八服每日四服

○〔主治〕右諸方三百六十六方至三百七十五方　慢性熱羸瘦或ハ全身衰弱。慢性粘液太過。及ヒ經久潰瘍ヲ帶フル者ニ宜シ

○第三百七十六方

蛞蝓八箇　細剉熱湯能洗淨水適宜煮一時半加後味

Kitasato Memorial Medical Library

紫菫葉　木香各二錢

○右煮沸八分時濾過取一北半毎服一小盞強日四次温服

〔主治〕慢性熱。勞症。及ヒ羸瘦病ニ宜シ

○第三百七十七方〔朴濾私〕

魚膠一錢　水十六弓煮濾取十二弓溶化白糖半弓更加

後藥

列印酒一弓

右調和毎服一小盞

○第三百七十八方〔同上〕

魚膠三錢　水九弓煮濾過取三弓加後藥

枸櫞汁新絞濾過者二錢　枸櫞油糖一弓

右安冷所為傑列乙白必幾失垤器名收貯毎一時服二茶匙

〔主治〕右二方三百七十七方三百七十八方滋養包攝ノ劑ニノ太過ノ泄瀉ヲ停ムルニ宜シク又慢性熱。削瘦症。肺勞。等ニ用ヲベシ

○第三百七十九方〔穀優蘭篤〕

鹿角屑二錢半　葛私加栗刺半弓

右調匀分三包毎日取一包水一北半煎耗濾取一北服盡

〔主治〕慢性熱。削瘦。諸液溶渙。老衰症。等ニ宜シ

○第三百八十方〔弗蘭屈〕

Kitasato Memorial Medical Library

鹿角屑一弓　水四北煮耗至二北濾加白糖適宜味佳為度服

主治　滋養包摂ノ劑タリ宜ク慢性熱。削瘦等ニ用フベシ

○第三百八十一方　舍電發謨白煎（倣結列印之方）

鹿角屑　白蒸餅心各三弓　水五北煮濾過取三弓加後

藥

枸櫞汁舍利別（適宜味佳為度）

右調和飲服

主治　滋養包摂ノ劑トス慢性熱。削瘦。劇欬。疝。下利。胃焮衝。

腸焮衝。腎焮衝等ニ之ヲ稱用ス

○第三百八十二方　鹿角傑列乙

鹿角屑（以熱湯洗者二弓）　水十六弓煮耗至八弓濾過強力絞

濾加雞子白及枸櫞汁適宜振盪令清澄再加後味

白糖二弓

右再煎熬為適宜稠取他一器預盛些少香竄藥宜移之

遠西方彙卷之三

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之四

獨乙　加。幾。安頓　著
和蘭　傑。婪婆都　譯
侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯
南洋伊東亨健夫　參校

第二　局處焮衝病

肺焮衝（フ子ウモニア羅ロンダオントステーキング蘭）

他病ニ在テハ此症ノ如ク普ク消焮方法ヲ要スル者ナシ

先刺絡ヲ以テ專務トス其症ニ準シ數次之ヲ行フテ可ナ

Kitasato Memorial Medical Library

リ而後胸上ニ蜞鍼ヲ施シ或ハ發疱硬膏モ亦貼スベシ」内服ハ精製硝石九方至十三方。三百八十三方。三百八十四方。三百八十六方。三百八十八方ヲ專一トス蓋之ニ吐酒石十三方。三百八十三方。ヲ伍スルヲ最適當ナリトス」其後解釋ノ効ヲ佐ケンガ爲ニ精製硇砂ヲ吐酒石ニ伍シ二十一方。百方至百四方。三百八十九方或ハ大便ヲ促スベキ者アラバ孕鹸酒石ヲ吐酒石ニ配伍スベシ三百八十七方」世醫或ハ瀉ヲ促スニ孕礬酒石ト硝石ヲ調和シ與ル者アリ三百八十八方」百失幾爾氏書載セシ療法三百九十方ノ如キハ毎症稱用スベカラズ殊ニ其法放血ヲ兼用セザレバナリ」又栗篤摂爾氏ニ倣テ鉛糖三百九十二方ヲ用フルハ吾輩欲セザル所ナリ」甘汞ハ尤賞用スベシ其症已ニ娎巴窒鯊質肺質ノ肝質ニ変化スル義トナル者ハ更ニ偉功アリ症ニ應メ阿芙蓉三百九十四方三百九十五方若クハ菲阿斯越幾斯及ヒ金硫黄三百九十三方モ亦配伍スベシ○咯痰ヲ促進スルハ金硫黄ヲ除クノ他遠志三百九十八方三百九十九方殊ニ効アリ生力深沈衰セル者ハ之ニ龍腦四百方。四百一方ヲ和シ與フベシ」肺臓麻痺ニ傾ク者ハ安息香酸往昔尤物ノ名アリ四百二方至四百四方娎巴窒鯊質ヲ治スルハ之ニ亜兒尼加花ヲ配合ス四百五方

○此症ハ本復ノ期ニ至テ强壯法ヲ用ヒザルヲ常トス○膽液性肺焮衝ハ刺絡ヲ行フニ謹慎ヲ加フベシ」甘汞ハ肝臓ノ機運ヲ挑起スルガ故ニ吐酒石ト同ク殊ニ此ニ効ア

Kitasato Memorial Medical Library

リ○神經性肺焮衝ハ鈍性神經熱ノ條ニ揭ク○嬰兒肺焮衝ハ胸上ニ蜞鍼二三頭ヲ施シ後硝石（四百八方 四百九方）ヲ用フ但甘汞ハ用フベカラズ○虚性ノ肺焮衝ハ一定ノ治法アラザルガ故ニ症ニ從テ之ヲ療スベシ

或ハ輓近ノ醫肺焮衝ニ刺絡ヲ棄テ用ヒズ總テ祛痰ノ療法ヲ專要トスル者アリ殊ニ嬰年（エーマン地名）ノ欲摂秩篤爾（ヨーセフ・エートル人名）之ヲ用フト雖其法疑フベキナリ假令効ヲ奏スルモ姑息ニ過ズ恐ラクハ却テ大害ヲ招ク者多カラン」秩篤爾（ケートル）氏ノ政録ニ據レハ肺焮衝ニ罹リテ死スル者ノ員數一千人中刺絡ヲ施シテ死スル者二百零四人吐酒石ヲ用ヒテ死スル者二百零七人專摂養ヲ守リ祛痰ノ法ヲ處シテ死スル者七十四人トス○然レ𪜈數年間時々流行セシ所ノ腸胃性神經性等此説ニ關係セザル乎此二性ヲ帶ブル者ノ如キハ純正ノ焮衝ニアラザルガ故ニ之ニ刺絡ヲ施スハ固ヨリ謹慎スベキナリ○秩篤爾（ケートル）氏ノ異論ノ如キハ多年千萬人ノ實驗ヲ經ル後ニアラザレハ治療ノ本法ヲ破ルヿ能ハス○吾今此書ヲ梓行スルニ肺焮衝ノ新治法二件ヲ左ニ畧載シテ以テ世醫ニ示サントス」其一ハ鋭仙惡（エイセンアク地名）ノ疾醫母。微質（サチ人名）ノ法トシ其二ハ弗列（フ）滮爾窟（ロエルダ地名）ノ大醫袍謨噶爾（ハウムガル）篤涅兒（トネル人名）ノ法トス」微質（サチ）氏ハ刺絡及ビ局處ノ瀉血ヲ禁シ

Kitasato Memorial Medical Library

テ而メ病ノ時期ヲ論ゼズ甘汞ヲ奇藥ト稱メ之ヲ專用ス甘汞服量大人ハ一服六氏至小兒一歲ヨリ五歲至ハ一服二氏ヨリ四氏至」蓋其服數ハ究理家ノ試法ヲ用ヒ焮衝ノ廣狹ヲ定メテ以テ之ニ準ジ又呼吸ト脈至ヲ比較シ肺臟運機ノ障碍ヲ計リテ以テ定ムルナリ」是故ニ此治法ハ能ク究理家ノ試法ヲ以テ胸内ヲ推究スルニ熟セザレバ試用スルヿ能ハズ」焮衝既ニ蔓延シ其經過モ亦速ナルヰハ三服各服甘汞六氏ヲ含ム者ヲ取リ麻倔涅失亞ヲ配伍シテ一時毎ニ服セシメ翌日之ヲ停メテ病狀如何ヲ候ヒ其勢鎮定スル者ハ後服ヲ停メ愈亢盛スル者ハ更ニ同上ノ量ヲ投與シテ其勢解散スルニ至リ或ハ流涎ヲ發スルニ至リテ止ム」其治七日ヲ出ル者稀ナリ唯發黃娎巴窒鯊質病証ノ名ハ一週内ニ治スルヲ得ズ」微質氏此自說ヲ證センガ爲ニ二十三人ノ治驗ヲ詳録セリ㊀袍謨噶爾篤涅兒ノ發明セシ治法ハ劉兒氏ノ裝置或ハ他ノ器ヲ用ヒテ數次硫亞的兒或ハ格魯福兒謨ヲ吸引セシムルナリ大抵十密扭篤間吸引スルヲ法トス但此法ハ空氣ト亞的兒氣ト混淆スルヲ以テ大概病者麻醉スルヿナシ若麻醉セントスルヰハ其吸引ヲ停ム」然レ𪜈袍謨噶爾篤涅兒氏ハ大抵刺絡ヲ施シテ之ヲ佐ケ以テ的効ヲ奏セシメント欲セリ」若夾雜ノ症アル

Kitasato Memorial Medical Library

片ハ相當ノ法ヲ以テ之ヲ除クベシ」之ヲ吸引スルノ後直チニ胸中ノ逼迫寛解シ欬嗽減退シ胸痛消散シ咯痰及ヒ熱モ亦鎮静ス」奢爾並倔人名不魯窒狐同上叔密土同上惋怯魯同上嬰別兒同上越爾蹩兒同上及ヒ烏設列兒同上等皆上ノ治法偉効ヲ得而ノ刺絡及ヒ他ノ醫藥全ク無益ニ屬スト云フ

○第三百八十三方〔臧歇蘭度〕

吐酒石三錢　精製硝石二錢　蒸餾水四弓溶化加後件

遏兒托舍利別　甘草舍利別各一弓

右調勻毎一時服二食匙

〔主治〕肺焮衝刺絡ヲ行フテ後直チニ之ヲ與フ是此症ノ主治ニメ實ニ一奇藥トス」之ヲ用ヒテ其証全ク退カザレハ患部ニ大發疱膏ヲ貼スベシ」更ニ輕易ノ症ハ最初直チニ此方ヲ用ヒテ全治スル者多シ若治セザル片ハ放血スベシ

○第三百八十四方

精製硝石一錢　孕鹼酒石　老利兒水各二錢　安質没尼酒一錢　井水七弓　度碌布三錢　遏兒托舍利別一弓半

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕肺焮衝興奮機亢盛ノ時期及ヒ其他局處ノ諸焮衝ニ用ヒテ鴻益アリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第三百八十五方〔蛾歇蘭度〕

甘扁桃油一錢　亜刺毘亜護謨漿適宜　研和加後味

井水　扁桃舍利別各一弓　菲阿斯越幾斯四匁

右調和為舐劑每一時服一茶匙

〔主治〕痰質水様酷厲ニ變シ患者其刺戟ニ由テ連綿欬嗽スル症咯痰ヲ促スニ宜シ兼テ胸上ニ發疱膏ヲ貼スベシ

○第三百八十六方

甘扁桃去皮半弓　黒櫻實水六弓　如法製作乳剤溶化後藥

硝石一錢　白糖六錢

右調和每半時或一時服一食匙

○〔主治〕諸般ノ焮衝症殊ニ肺焮衝ニ宜シ

○第三百八十七方

吐酒石一匁　孕鹼酒石六錢　精製度碌布一錢

右加蒸餾水四弓溶化每一時服一食匙

〔主治〕肺焮衝ニ用ヒテ咯痰ヲ促シ大便通利ヲ進ムルニ宜シ

○第三百八十八方〔謨私篤〕

精製硝石二錢　孕礬酒石半弓　遏爾扡煎七弓　扁桃乳舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調匀毎半時服一食匙乃至二食匙強

〔主治〕肺焮衝放血後直チニ之ヲ用フ

○第二百八十九方〔同上〕

精製硇砂　精製度碌布各二錢　吐酒石一匁　加接骨木

〔主治〕花水肥束布水各三弓溶化更加後件

〔主治〕遏兒拖舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙強

〔主治〕肺焮衝ノ第二期ニ用ヒテ咯痰ヲ進ムルニ宜シ

○第三百九十方〔百失寄爾〕〔爹爾利兒〕

吐酒石六匁至十二匁十五匁　加密列浸四弓乃至六弓溶化加

後件

遏兒拖舎利別一弓

右調匀毎一時服一食匙若發吐逆者毎一時半與之

〔主治〕肺焮衝ニ宜シ○百失寄爾氏ハ毎日吐酒石ノ量三匁ヲ增加ス」第二日若クハ第三日ヲ經テ通例吐逆ヲ發シ爾後瀉下ノ効ヲ奏ス瀉セザル者モ亦間之アリ若瀉セザレハ瀉藥ヲ與フ」發汗ニ傾ク者ハ硝石亜的兒〔附〕格魯林亜的兒或ハ亜施應亜的兒ヲ加ヘ胸中大ニ苦悶スル者或ハ不寐ノ症ニハ大量ノ阿芙蓉ヲ與ヘ小便難澁且肌膚燥熱スル者ハ硝石ヲ與フ」芫菁硬膏ハ間亦用フ

Kitasato Memorial Medical Library

Kitasato Memorial Medical Library

ト雖刺絡及ヒ局處ノ放血ハ絶エテ行フヿナシ○吾輩ハ決メ此療法ニ倣フヿヲ得ズ而メ此ニ之ヲ揭クル者ハ唯治療ノ來歷ヲ示スノミ

○第三百九十一方〔麻私葛倔尼〕

炭酸剥篤亜斯（ポツトアス）二錢至半弓

右加蒸餾水二北溶化食匙抄頻服十二時間盡之

〔主治〕肺焮衝症之ヲ用ヒテ佐藥トス○炭酸剥篤亜斯ハ焮衝質（オントステーキングブラスマ）ヲ解渙スルノ一藥ニメ又挼巴窒（パチサ）鯊質（チナ）ヲ禦キ且解散セシムルノ一藥タリ○麻私葛倔尼（マスカグニ）氏ハ毎常此溶液ヲ以テ扁桃乳舎利別一哥喜（コヒ）匙ニ和服セシム

○第三百九十二方〔栗篤摂爾（リトセル）〕鎮痙密幾斯（ミキス）去爾（イヂル）

鉛糖三瓦至四瓦　黒櫻實水四弓溶化加後藥

舎電阿芙蓉液一刃至半錢　甘草膏二錢

右調匀毎一時半乃至二時半服一食匙

〔主治〕肺焮衝刺絡ヲ行フテ後之ヲ用フ○設法魯里兒（セフロルリール）別而傑兒（ルゲル）等モ亦此治法ヲ稱賛セリ然レモ他醫ノ説ニ據レバ鉛糖ハ肌熱苦悶及ビ欬嗽ヲ増長シ且其欬之ガ爲ニ變メ乾欬トナルガ故ニ此方全ク棄テズバアルベカラズト云ヘリ

○第三百九十三方

Kitasato Memorial Medical Library

○甘汞一氏　金硫黄　菲阿斯越幾斯各半氏　甘草末半刃

右調匀為散分十二包每一時乃至一時半服一包

〔主治〕肺焮衝ノ第二期ニ之ヲ用フ

○第三百九十四方〔戩歇蘭度〕

甘汞六氏　精製阿芙蓉二氏　白糖二錢

右調和為散等分六包每一時或一時半服一包

〔主治〕肺焮衝及ビ胸脇痛適宜ニ放血シテ后胸部ノ刺痛未全ク除カズ脈小ニメ軟ナル者此方ヲ連服セシムル

ヿ一二日ニシテ通例焮衝ノ殘餘及ビ此ニ滲出セル列印巴ヲ駆除スルニ足ル○他ノ局處焮衝殊ニ腹臓焮衝ニ之ヲ用ヒテ亦偉効アリ

○第三百九十五方〔葛剌弗土〕

甘汞二氏　揮發鹿角鹽五氏　精製阿芙蓉　結兒蔑斯密涅剌列各半氏

○右調和為散分六包每一時半乃至二時服一包

〔主治〕肺焮衝胸膜焮衝心嚢焮衝ノ末期列印巴ノ吸收ヲ進ムルニ用フ

○第三百九十六方〔膚噦索斯〕

菲阿斯越幾斯半刃至一刃　硇砂加遏泥子精一刃至一錢　遏兒抱舍利別或白罌粟舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每服一茶匙强日二次

主治　肺焮衝及ヒ肺管焮衝ニ於テ已ニ焮衝性ノ所患ヲ防ギシ者。及ヒ神經熱。胸中ノ疾患。百日咳ノ末期。勞瘵ノ煩咳。慢性肺臟聖京倔。喘息。窒息聖京倔ニ宜シ。其他風氣鬱畜。皷脹。及ヒ瘰癧性ノ諸症ニ用フ

○第二百九十七方（託爾）

龍腦　金硫黄各一匁半至二匁　精製硝石半錢至一錢　亜刺毘

亜護謨　白糖各一錢

右調和等分六服每一時一服

主治　倭麻質斯性ノ肺焮衝其熱已ニ降鎮シテ后之ヲ用フ

○第三百九十八方（獵歇蘭度）

遠志一錢　井水十四弓煮耗至八弓濾過加後件

硇砂　安質没尼酒　老利兒水各一錢　遏兒抱舎利別

精製蜜各一弓

右調和每一時服二食匙

主治　肺焮衝ノ証狀緩慢治セザル者ニ用ヒテ肺臟ノ分利ヲ促ス宜シ祛痰劑

○第三百九十九方（速剔倫歇憶）

遠志半錢　井水適宜煮濾取六弓溶化後藥

Kitasato Memorial Medical Library

硇砂一錢半　吐酒石二氏　甘草膏三錢

○右調匀毎一時服一食匙臨服宜振蕩

主治　肺焮衝ノ第二期ニ用ヒテ咯痰ヲ進ム並ニ肺臓及ヒ肺管ノ慢性焮衝症ニ聲唖及ヒ乾欬ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第四百方　謁。忽倫

遠志二錢至半弓　井水適宜煮濾過取六弓加後件

龍腦一刃　亜刺毘亜護謨漿一弓　鹿琥精二錢

○右調匀毎半時若一時服一食匙

主治　肺焮衝末期ニシテ咯痰止ミ肺臓將ニ麻痺セントシテ脈弱ニシテ軟全身衰弱セル者之ニ宜シ之ニ兼テ發疱膏ヲ貼スベシ○但遠志及ヒ其他ノ衝動藥ヲ用フルコト早キニ過クレバ大害ヲ招ク

○第四百一方　遏。傑。栗屈的兒

遠志末　白糖各十五氏　龍腦一氏

○右調和為散分三服毎一時半一服

主治　肺焮衝分利ノ時期咯痰スルコトナク且胸中逼迫及ヒ乾欬ヲ發スル者ニ用フ然レ𪜈著シク熱アリテ刺絡ノ証徴見ハルヽ者ハ遠志必用ニ中ラズ

○第四百二方　謁。忽倫

Kitasato Memorial Medical Library

○安息香酸六匁　金硫黄半匁　茴香油糖半刃

右調匀為散分六服以蠟紙包裹毎服一包燕麥粘汁和服日四次

主治　神經性肺焮衝咯痰スルヿヲ得ズ大衰弱ニ因ル者之ニ宜シ

○第四百三方（別建杜）

○安息香酸六匁　龍腦　金硫黄各一匁　茴香油糖半刃

右調匀為散分六服以蠟紙包裹毎一時一服

主治　虚性肺焮衝肺臓麻痺スルヿ始ニ用フ

○第四百四方（速別倫歇壇）

安息香酸六匁　龍腦二匁至三匁　遏泥子油糖半刃

右調和為散分六服以蠟紙包裹毎一時一服

主治　肺焮衝第二期或ハ第三期ニ在テ呼吸困難咯痰鎮止シ肺將ニ麻痺セントスル者之ニ宜シ又粘液性痙攣性ノ喘息及ヒ胸水病窒息ノ危險アル者ニ用ヒテ好シ

○第四百五方（窒兒滿）

亜兒尼加花一二錢至三錢　熱湯適宜浸漬濾取四弓加後藥

安息香酸一刃至半錢　遏兒托舎利別或遠志舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙臨服宜振蕩

主治　肺臓ノ挼巴窒鯊質ヲ治スルニ宜シ　亜兒尼加花

Kitasato Memorial Medical Library

ハ髪細管ヲ衝動メ以テ血ヲ大脈管ヨリ誘退シ又血ヲ新陳交代及ヒ其吸收機ヲ進ムルガ故ニ此ニ良トス安息香酸ハ更ニ腦ノ第十對神經ヲ衝動メ能ク亜兒尼加ノ効ヲシテ肺ニ達セシム」之ニ由テ咯痰ヲ催シ肺中滲出ノ列印巴能ク驅除セラルヽナリ蓋之ヲ咯出スルヿナクメ自ラ除ク者モ亦往々之アリトス（第二百九十一方ヲ參照スヘシ）

○第四百六方〔別連杜〕

精製硝石一錢　大麥煎五弓　屋施蔑兒一弓

右溶和供灌腸

〔主治〕肺焮衝。腦焮衝。其他焮衝症ニ用ヒテ腸管ニ誘導スルニ宜シ」第二十五方ヨリ第二十七方マデ亦皆之ニ倣フベシ

○第四百七方〔都兒〕

揮發鹿角鹽　安息香花各四氏　結兒蔑斯密涅刺列半氏　白糖半刃

右調和為散分十服毎半時或一時一服

〔主治〕虚性肺焮衝ニ於テ苦悶及ヒ胸中逼迫漸ク増長シ脈不齊咯痰止ミ將ニ窒息セントスル者之ニ宜シ

○第四百八方〔佛録收斯〕

Kitasato Memorial Medical Library

○硝石一刃　甘草浸遏兒抱煎各一弓溶化加後藥

屋施蔑兒半弓

右調和毎一時服一兒匙

主治　二歳兒ノ肺焮衝ニ宜シ○解散ノ後ハ硝石ニ代ヘテ民垤列里精ヲ用フベシ

○第四百九方（篤優爾點亜兒）

硝石十二八　遏兒抱煎一弓溶化加後藥

遏兒抱舎利別半弓

右調勻毎一時服一茶匙

主治　嬰兒ノ肺焮衝及ビ他ノ焮衝病ニ宜シ

胸膜焮衝（プレウリチス羅ボルストフリトス。オントステーキング蘭）

附　胸膿（エムピエマ羅エツトル。ボルスト蘭）

胸筋焮衝ハ通例痛處ニ蜞鍼二三頭ヲ施メ治スルニ足レリ僂麻質斯ニ起因セル者ハ荒菁硬膏ヲ貼スベシ○然レ𪜈焮衝胸膜ニ在テ其熱熾ナル者ハ消焮療法ヲ切要トス但刺絡ハ行ハズメ可ナル者多ク大抵局處ノ放血ニシテ足レリ而後荒菁膏ヲ貼スベシ内服ニハ吐酒石消石三百八十三方或ハ硇砂三百八十九方ヲ合和スル者ニ宜シ又更ニ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍スルヲ良トス三百九十四方○依質倔損人名ハ胸膜焮衝ヲ左右二症ニ分チ隨テ治法ヲ變ズ四百十方。四百十一方

Kitasato Memorial Medical Library

○胸膿症ハ勉メテ吸收機ヲ促メ以テ之ヲ防クベシ」胸膜焮衝對症ノ方法其功ヲ逞シク(セ)ザル片ハ大發疱膏ヲ貼メ打膿セシメ艾灸モ亦施スベシ」上法ヲ行フモ尚効ヲ奏セザル片ハ轉メ沃胄(ヨヂウム)謨ヲ用フベシ」斯篤(スーケ)揭私(スイ)人名ハ沃胄(ヨヂウム)謨ヲ含蓄セル劉(リユ)蘰(ヂ)兒(ル)地名ノ鑛水一瓜(クワ)爾(ル)篤(ト)容量名半ヲ飲服セシメ兼テ沃胄(ヨヂウム)謨膏ヲ痛處ニ擦ス」微(ヒ)兒(ル)里(リ)暗(アム)斯(ス)人名ハ敝(ヒ)度(ド)利(リ)阿(オ)托(ダ)私(ヤ)剥(ハ)篤(ト)亜(ア)斯(ス)ヲ取リ一服二氏乃至三氏ヲ與フル〇日ニ三次ヨリ四次ニ至ル」患者甚衰弱セルハ沃胄(ヨヂウム)謨鉄ヲ優レリトス○胸膿症施術ハ胸中逼迫漸ク増長シ病愈進ミ患者日ニ虚脱シテ外部ニ膿瘍ヲ發スルノ懼アル時ニ於テスベシ

○第四百十方〔別爾列印地名依質倔損〕

金硫黄　菲(ヒ)阿(オ)斯(ス)越幾斯各二氏　阿芙蓉一氏半　枸櫞油糖二錢

右調勻為散等分六包毎半時乃至一時服半包

〔主治〕左側ノ胸膜焮衝ニ用フ此症ニ於テハ脾臓モ亦連累セラルヽヲ常トス」爾後茲ニ切迫スル所ノ見証ヲ制スルノ後歇(イ)惰(ム)人名ノ寧嗽丸四百十一方ヲ與フベシ○右側ノ胸膜焮衝ハ小量吐酒石若クハ硇砂ト吐酒石金硫黄等ヲ配用ス」右側ノ焮衝ニ在テハ肝臓モ亦連累セラルヽ

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ常トス

○第四百十一方〔歇憎〕

土木香越幾斯二錢　實芰答葉末吐根末各半刃　阿芙蓉五氏

右調和一氏為一丸衣石松粉毎一時半服一丸

横膈膜焮衝（ヂアプラグマチチス羅オントステ　ヽキング。ブハン。ヘット。ミッテンリフ蘭）

十分ニ防焮療法ヲ處シ。第一刺絡メ多量ノ放血シ。腹部及ビ横膈膜ノ邊縁ニ蜞鍼ヲ施シ。吸角法。緩和鎮痛ノ琶布。及ヒ塗擦剤。發疱硬膏。蒸餅母等皆供用スベシ」其他精製硝石ヲ乳剤ニ和スル者三百八十六方或ハ屋施蔑兒ニ加フル者四百十二方油性乳ニ菲阿斯越幾斯ヲ加フル者三百八十五方老利兒水四百十三方甘汞四百十四方等ヲ用フベシ」更ニ又消焮ノ灌腸法二十五方至二十七方。四百六方ヲ行フニ宜シ

○第四百十二方

精製硝石一錢半至二錢　蘆根煎六弓以蘆根半弓取煎液六弓溶化加後件

屋施蔑兒一弓

右調勻毎半時服一匙

○第四百十三方

菲阿斯越幾斯五氏至半刃　老利兒水半弓溶化

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每服十二滴至十五滴日四次

〔主治〕痙攣性ノ疾患ヲ治ス殊ニ横膈膜焮衝吃逆煩劇ノ症ニ宜シ

○第四百十四方〔謨私篤〕

甘汞　金硫黄各半氏　失鳩荅越幾斯一氏　甘草末一刃

右調勻為散分八服朝夕一服

〔主治〕横膈焮衝ノ末期病勢已ニ衰ヘテ后滲出スル所ノ列印巴ヲ解釋スルニ宜シ甘汞阿芙蓉ノ合剤モ亦甚適當トス三百九十四方

○第四百十五方

龍脳油一弓　阿芙蓉丁幾一錢

右調和為塗擦剤

〔主治〕横膈膜焮衝ノ痙攣証ヲ鎮定スルニ宜シ之ニ兼テ微温浴ヲ行フベシ

喉頭焮衝ラリンギチス羅オントステーキング。フハン。ヘッー。ストロッテンホトフド蘭

氣管焮衝タラセイチス羅リュクトヘイフス。オントステーキング蘭

肺管焮衝ブロンキチス羅オントステーキング。デル。リュクトベイプスタケン蘭

右三症ハ其症ニ從ヒ刺絡。蜞鍼ヲ施シ緩和蒸剤及ビ遏兒抱葉錦葵葉ノ煎液ニ乳汁若クハ水ヲ加ヘテ其温蒸氣ヲ吸引セシムベシ内服ニハ緩和粘滑油性藥即遏兒抱煎。沙

Kitasato Memorial Medical Library

列布煎。含油乳剤。或ハ遏兒拖舎利別ニ亜刺毘亜護謨漿ヲ加ヘタル舐剤或ハ甘扁桃油ニ非阿斯越幾斯ヲ伍スル者等並ニ宜シ」而後精製硝石及ビ精製硇砂ニ甘草膏及ヒ吐酒石ノ配伍シ三百八十九方與ヘ列印巴滲出ニ臨ム片ハ甘汞三百九十三方。三百九十四方ヲ用ヒ或ハ水銀膏ヲ塗擦ス」生力沈衰セル者ハ龍腦三百九十七方ニ宜シ咯痰止ム者ハ遠志三百九十八方至四百一方硇砂加遏泥子精三百九十六方安息香酸四百二方至四百四方等ヲ處スベシ義膜咽喉焮衝ラリンキチス。エト。タラセイチス。エキスシュタトリア。インフハンチュム○アンギナ。メンブラナセア羅フリーシヘ。ケールオントスラーキング蘭又名コローブ

喉頭ニ蜞鉞二頭四頭六頭乃至八頭ヲ適當トス但之ヲ胸骨上ニ施セハ更佳ナリ」大兒ニ在テハ刺絡モ亦行フベシ」或ハ放血ノ後直チニ吐酒石製四百十六方膽礬製四百二十四方。四百二十五方ノ吐藥ヲ與フル者アリ或ハ甘汞四百十七方至四百十九方ヲ稱用スル者アリ甘汞ヲ用ヒテ大ニ喘鳴ヲ發スルニ至リ直チニ後服ヲ停メテ遠志四百二十六方四百二十七方或ハ安質母尼剤即小量ノ吐酒石。安質母尼酒。結兒蔑斯密涅刺列四百二十八方若クハ金硫黄四百二十九方等ヲ與フルニ宜シ」蓋此ニ至レハ金硫黄ヲ與ヘテ毎日一二吐セシムベキ機會ヲ得タリトス恐ラクハ最初之ヲ施スニ優レリ○又輓近ニ至リテ膽礬ヲ以テ吐藥ト為シ加之此症ノ奇藥ト稱ス四百二十三方至四百二十五方」肝

Kitasato Memorial Medical Library

色硫黄（四百三十方至四百三十四方）モ亦偉効アリ」蓋肝色硫黄ノ効ヽ吾輩自驗スル所ニアラズ吾輩ニ在テハ蜞鍼。甘汞。金硫黄或ハ安質母尼酒ヲ他ノ解釋藥液少許ニ和シ良効ヲ得シ者多シ○外用ハ左法ヲ專一トス即頸圍ニ水銀膏ヲ塗擦シ。芫菁膏芥子泥。足蹠煎湯法。酒醋ノ灌腸等是ナリ或ハ焮衝ノ勢已ニ衰ヘリト雖肺臓麻痺ノ懼レアリテ其症危險ナルトキハ瀉水浴ヲ行フベシ

○第四百十六方（臧歇蘭度）

吐酒石（一氏）　煎餾氷一弓溶化加後藥

海葱蜜　砂糖舍利別（各半弓）　吐根末（一刃）

右調勻毎八分時與一茶匙以至得吐

主治三歳乃至四歳ノ兒ニ於ケル義膜咽喉焮衝纔ニ其証徴見ハルレハ即直チニ之ヲ投スベシ」三歳以下ノ兒ニ在テハ吐酒石ヲ去リ或ハ臧屈毛（人名）ノ安質没尼酒ニ水液少許ヲ和シ與フ之ニ兼テ接骨木花煎ノ温蒸氣ヲ吸引セシメ頸圍ニ蜞鍼ヲ施シ尓後甘汞ヲ用フヘシ」醋一食匙ヲ取テ灌腸スルモ亦鴻益アリ」最幼稚ノ兒ハ醋半食匙ヲ以テ冷水一小盞ノ四分三ニ和シ施ス」此方法ヲ行フテ后十二時ヲ經テ尚緩解スル所アラズバ乃膽礬ヲ用フルモ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第四百十七方〔依。膚。毘私骨弗〕

甘汞半氏至一氏　白糖半刃

右調和為散分六服每一時一服

〔主治〕蜞鍼ヲ施シテ後直チ此方ヲ處スベシ兼テ緩和劑ヲ以テ頸圍ヲ蒸湯シ誘導灌腸法ヲ行ヒ腓腸ニ蒸餅母ヲ貼シ兩脚ヲ蒸湯シ頸ノ兩側ニ水銀膏ヲ塗擦スベシ

○第四百十八方

甘汞八氏　金硫黃四氏　白糖四刃

右調和為散等分八包每一時服一包

〔主治〕六歲乃至八歲ノ兒ニ於ケル義膜咽喉焮衝ニ宜シ兒更ニ幼稚ナレハ隨テ其服量ヲ減殺スベシ

○第四百十九方〔噦魯涅屈〕

甘汞半刃　白糖一刃　丁寧調和加後藥

沃曹謨半氏

右研和五密扭篤間為散等分十包每一時服一包

〔主治〕義膜咽喉焮衝及ビ頭水ニ宜シ

○第四百二十方〔依。膚。毘私骨弗〕

甘扁桃乳三弓以甘扁桃二錢製之　亞剌毘亞護謨漿　遏兒托舍

利別各二錢至三錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎一時服一兒匙

○第四百二十一方（同上）

遏兒托根（一錢半）　井水適宜煮濾取三弓加後藥

遏兒托舎利別（半弓）

右調和毎一時服一兒匙此方當與甘汞互用

主治右二方（四百二十方四百二十一方）八他ノ主藥ニ兼用スベシ

○第四百二十二方（同上）

硫黄乳　甘汞（各半氏至一氏）　白糖（半刃）

右調和為散分六服毎一時一服

主治列印巴滲出スルノ始メ義膜ノ元質ヲ解釋シ皮表ノ蒸發ヲ促スニ宜シ其他硫黄ハ善ク汞毒ヲ解ス

○第四百二十三方（顯忽弗滿）

結晶膽礬（十二氏）　白糖（四刃）

右調和為散等分四包如法服之

主治義膜咽喉焮衝ニ宜シ先一包ヲ與ヘ其後第二包ヲ取テ冷水三食匙ニ溶化シ半時毎ニ一食匙ヲ與フ再發作アリテ窒息セントスルトキハ又一包ヲ與フベシ

○第四百二十四方（骨布）

膽礬（一氏一氏半至二氏）　乳糖（二刃）

右調和為散等分八包毎八分時服一包以至得吐

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕一歲乃至七歲ノ兒義膜咽喉焮衝ニ用フ○翌日ニ至テ聲啞未復セス且胸中苦悶スル者ハ更ニ一包ヲ取テ四分ノ三時毎ニ服セシムベシ

○第四百二十五方 甲方〔設爾祿〕

膽礬三氏至四氏　亞剌毘亞護謨散半刃〔附〕

右調勻為散頓服

〔主治〕義膜咽喉焮衝ニ宜シ○吐後左ノ散藥乙方ヲ與フベシ

○第四百二十五方 乙方〔同上〕

膽礬三氏　護謨散二錢〔附〕

右調和為散等分九包毎一時與一包以至焮衝諸証全解散

○第四百二十六方〔依。膚。毘私骨弗〕

遏兒扡根二錢　遠志十二氏　井水適宜煮濾過取三弓加後藥

遏爾扡舍利別半弓

右合和毎一時與一兒匙

〔主治〕義膜質解釋シテ後其咯出ヲ促スニ用フ之ニ兼テ氣管ノ上ニ沿フテ小發疱膏ヲ貼スベシ海葱蜜。硇砂加遏泥子精。鹿角精〔附〕。金硫黄。結兒蔑斯密涅剌列。安息香酸

Kitasato Memorial Medical Library

モ亦同効アリ

○第四百二十七方〔遠突土〕

遠志一錢半　熱湯適宜浸濾取四弓加後件

安質没尼酒二刃　遏兒抱舎利別一弓

右合匀毎一時服一小匙强

〔主治〕義膜咽喉焮衝ノ第二期ニ用フ

○第四百二十八方〔遏兒別爾私〕〔索斯〕

結兒蔑斯密涅剌列三八　龍腦四八　加後味精密研和

亜剌毘亜護謨漿半弓　遏兒抱舎利別一弓

右調匀毎一時服二茶匙臨服宜振蕩

〔主治〕義膜咽喉焮衝氣管始メテ喘鳴ヲ生スル時之ヲ用フ

○第四百二十九方〔設爾禄〕

金硫黄二氏　橙花水一弓　精製度碌布一錢

右溶和時々服一茶匙臨服宜振蕩

〔主治〕此方ヲ用ヒテ義膜咽喉焮衝ノ治ヲ終フ

○第四百三十方〔依。膚。毘私骨弗〕

肝色硫黄六氏　遏爾托舎利別一弓溶化

右硝子壜收貯○毎一時與一哥喜匙强

〔主治〕大率一歳小兒ノ義膜咽喉焮衝ニ用フ○肝色硫黄

Kitasato Memorial Medical Library

臭味不佳ナルヲ以テ服スルヲ嫌惡ス故ニ獨此症蜞鍼甘汞ヲ用フト雖驗ナクメ列印巴將ニ滲出セントスル証狀持續シ而メ患兒下利太過流涎ヲ將出シ來リ隨テ生力虛脫シ此ニ由テ甘汞モ亦復連進シ難キ者之ヲ用フルニ宜シ○但此方ヲ嫌惡セザル兒モ亦間之アリ

○第四百三十一方〔思屈拔爾託〕

肝色硫黃一錢　蜜去泡沫五錢

右合勻為舐劑每一時服半茶匙强

○第四百三十二方〔弗。覇件〕

結兒蔑斯密涅刺列半刃　肝色硫黃一刃　遠志舍利別二弓

硇砂加遏泥子精一刃

右合勻每一時服一茶匙强

〔主治〕大兒ニ用フ

○第四百三十三方〔葛鬱西爾〕

肝色硫黃半錢　橙花水六錢　白糖二弓

右合勻每一時半與一茶匙

〔主治〕三四歲兒ノ義膜咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百三十四方〔骨布〕

肝色硫黃一錢　遏兒抱根末一刃　甘草越幾斯二刃

右調勻為六十丸衣依利斯弗魯連底那末硝子壜收貯○

Kitasato Memorial Medical Library

一歳乃至二歳兒毎半時或一時取一丸以林檎製母斯若梨子製母斯少許送下

心臟焮衝（カルヂチス羅オントステーキング。フアン。ヘット。ハルト蘭）

心嚢焮衝（ペリカルヂチス羅オントステーキング。フアン。ヘット。ハルテサッキー蘭）

心臟焮衝ノ治法大抵肺焮衝ニ同シ」殊ニ數回大量ノ放血ヲ主トス若外証衰弱ヲ見ハシ。脈沈伏シテ或ハ診シ得ベカラズ。或ハ時ニ眩暈ヲ發シ。或ハ四肢厥冷等ノ証アルモ之ヲ懼レテ放血ヲ怠ルヿ勿レ」尓後尋テ蜞鍼ヲ施スヲ要トス」次ニ硝石二錢乃至三錢ヲ取リ多量ノ水液ニ溶化シ十二時間ニ服セシメ終ニ甘汞二三氏ヨリ四氏至之ヲ半時毎ニ與ヘテ毎日數次粥様ノ大便ヲ利セシムルニ宜シ」水銀膏塗擦モ亦稱用ス」又解釋ノ効アル飲料ヲ多服セシメ以テ扶治法トス○心嚢焮衝ノ治モ亦上ニ同シ○其他肺焮衝ノ條ニ列載スル所ノ方法ニ從事スベシ此ニ一二方ヲ掲クル者ハ畧其不足ニ充ツルノミ

○第四百三十五方（謨私篤）

實芰答利斯（十五氏至二刃）　熱湯適宜浸濾取六弓加後件

精製硝石（一錢）　孕礬酒石（二錢）　亜刺毘亜護謨漿　屋施

蔑兒（各一弓）

右合勻毎半時與一食匙乃至二食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕實性心臟焮衝第一回ノ刺絡後直チニ之ヲ與フ

○第四百三十六方〔速兒蒲里倔〕

實芰答利斯六氏　熱湯適宜浸漬濾取三弓加後藥

硝酸曹達一錢　吐酒石四分氏之一　格兒失屈謨子酒一刃

覆盆子舍利別一弓

右調勻毎半時與一小兒匙

〔主治〕小兒ノ心臟諸膜及ヒ其近部ノ僂麻質斯性焮衝ニ用フ其症甚危險ニ臨ムトキハ先刺絡ヲ行ヒ後蜞鍼ヲ施シ而メ后此方ヲ用フ蓋五歳乃至七歳ノ兒ニ就テ云フナリ其後甘汞ヲ用ヒテ滲出ノ列印巴ヲ解渙スルヲ適當トス

心臟ノ部位ニ打膿法ヲ施シ十四日間持久スベシ發病第四日或ハ第五日ニ方テ此打膿法ヲ施ストキハ再發ヲ防グノ効最確實ナリトス

舌焮衝グロスシチス羅トングオントステトキング蘭

刺絡メ多量放血シ舌上或ハ顎下ニ蜞鍼ヲ施シ窒息ノ懼レアラバ舌ヲ截開シ長ク深ク截ルベシ燕麥ヲ乳汁ニ煮テ頸圍ヲ慰シ緩和藥ノ蒸氣ヲ吸引セシメ衝動藥ニ醋ヲ加ヘテ灌腸シ頸ニ水銀膏ヲ塗擦シ罌粟子油槇楂核汁及ヒ他ノ緩和劑ヲ以テ數回舌上ニ塗ルベシ患者若嚥下ヲ得ルニ至ラハ直チニ硝石ニ吐酒石ヲ配伍スル者九方至十三方清涼下劑

Kitasato Memorial Medical Library

十五方十六方及ヒ甘汞一氏乃至二氏一時毎ニ與フベシ○其誘因ニ注目スベキハ固ヨリ論ナシ

咽喉焮衝アンギナ羅ケールオンドステトキング蘭

此焮衝ハ其証狀刺絡ノ援ヲ須ツニ至ル者稀ナリ通例放蜞六頭八頭或ハ十二頭ニシテ功ヲ收ムルニ足レリ」扁桃腺上顎及ヒ懸壅垂ヲ亂刺スルハ其効更ニ偉ナリトス」焮衝更ニ劇度ニ進ム者ハ精製硝石四百三十七方清涼下劑十五方十六方ヲ用フベシ」然レ氏此症ハ聖京倔性ノ者多シ大抵民垤列里精四百三十八方四百三十九方ヲ用ヒテ足レリ」扁桃腺焮衝ハ癒瘡木脂四百四十五方ヲ奇藥トス英人嘗テ稱譽スル所ナリ○外用ハ含漱若クハ射注法ニ宜シ四百四十七方至四百六十三方蓋病性ニ從ヒ或ハ緩和劑ヲ撰ミ或ハ衝動劑ヲ用フベシ」兼テ弗刺涅兒毛布ノ名ヲ以テ頸圍ヲ被覆シ解凝膏四百六十四方ヲ貼シ解凝劑四百六十五方四百六十六方ヲ塗擦シ將ニ化膿セントスル氏ハ温暖緩和ノ琶布四百六十七方ヲ行フベシ」○習癖咽喉焮衝ハ冷水或ハ氷片ノ罨法良効アリ○耳後腺焮衝ハ温暖ニ保護シ發汗劑及ヒ硇砂四百四十六方等ヲ用ヒテ効アリ

○第四百三十七方

精製硝石半錢至一錢　吐酒石一氏　蒸餾水四弓溶化加ニ後件

Kitasato Memorial Medical Library

屋施蔑兒（半弓）

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕咽喉焮衝ニ宜シ先頸圍ニ蜞鍼ヲ施シ次テ項上ニ發疱膏ヲ貼シ兼テ脚浴ヲ行ヒ緩和藥ノ蒸氣ヲ吸引セシメ弗剌涅兒（毛布ノ名）ヲ以テ頸ヲ纏フベシ放蜞后吐劑ヲ用ヒテ超絶ノ効ヲ奏スルヿ間之アリ

○第四百三十八方

民垤列里精　屋施蔑兒（各半弓）　菩提樹花水（四弓）

右調勻毎一時服一食匙

○第四百三十九方

民垤列里精　接骨木子昆設兒弗（各半弓）　安質没尼酒（一錢）　接骨木花水（四弓）

右調和毎一時與一食匙

〔主治〕右二方（四百三十八方　四百三十九方）聖京倔性咽喉焮衝ニ用フ

○第四百四十方〔狨歇蘭度〕

屋施蔑兒（一弓）　桑椹舍利別（二弓）

右調勻時々服一茶匙

〔主治〕扁桃腺焮衝懸壅垂焮衝或ハ食道頭焮衝皆其病勢中等ノ者ニ用ノ

○第四百四十一方〔同上〕

Kitasato Memorial Medical Library

○地榆越仙祭亜一錢半　遏兒托舍利別三弓

右調勻毎四分時服一食匙

〔主治〕聖京倔性ノ扁桃腺焮衝或ハ懸壅垂焮衝ニ用フ

○第四百四十二方〔同上〕

地榆越仙祭亜二錢

右取十五滴和砂糖含之令漸徐溶解

〔主治〕聖京倔性ノ扁桃腺焮衝或ハ懸壅垂焮衝ニ用フ

○第四百四十三方

地榆越仙祭亜三錢　孕鹼酒石半弓　吐酒石一氏　精製度

碌布半錢　蒸餾水四弓

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕腸胃性及ヒ膽液性咽喉焮衝ニ宜シ此症吐劑必須ノ者多シ

○第四百四十四方〔虜、噦、索斯〕

明礬　龍腦各二氏至三氏　白糖一刃

右調和為散分十包毎日服二三包

〔主治〕扁桃腺焮衝癖習トナル者之ニ宜シ

○第四百四十五方〔拔爾列度地名別兒〕

癒瘡木脂末三錢　亜刺毘亜護謨漿　砂糖舍利別各二弓

桂水　常水各四弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎二時服二弓

〔主治〕別兒人名格兒利爾同上加爾損同上等扁桃腺焮衝ノ奇方トシテ之ヲ賞用ス○方中癒瘡木脂ノ量過多ナリ

○第四百四十六方

精製硇砂　精製度碌布各二錢　吐酒石一瓦　蒸餾水四弓溶化

右調勻毎二時服一食匙

〔主治〕耳後腺焮衝ニ用フ○但棉布若クハ弗剌涅兒毛布ノ名ヲ以テ患所ヲ被覆スベシ○焮衝勢及ビ熱勢甚シキトキハ精製硝石ヲ用フベシ○其熱腸胃性ヲ帶フル者ハ解釋劑四十九方至五十三方緩下劑又症ニ從テ吐藥ヲ用フ」神經性ニ傾クトキハ黙栗薩葉若クハ纈草浸ニ民垤列里精ヲ加フル者小量龍腦等ヲ與フベシ

○第四百四十七方

大麥煎十六弓　屋施蔑兒一弓

右調勻為含漱劑

〔主治〕咽喉焮衝中等ノ症此方適應スル者多シ

○第四百四十八方〔穢歇蘭度〕

接骨木花浸十弓　硝石或硇砂一錢半　屋施蔑兒二錢

右調和供含漱劑或射注劑

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕扁桃腺及ビ懸壅垂焮衝若クハ食道頭焮衝中等ノ症ニ宜シ兼テ弗刺涅兒（毛布ノ名）ヲ以テ厚ク頸圍ヲ纏ヒ硇砂揮發膏ヲ塗擦シ症ニ準シテ頸圍ニ放蜞スベシ

○第四百四十九方〔哿蘭篤〕

撒爾非亜葉（半弓）　錦葵葉（一弓半）

右剉為含漱劑料

〔主治〕聖京倔性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十方〔別連杜〕

椄骨木花（一弓半）　無果花（一弓）　牛乳煮沸者適宜浸漬

右濾過取二北為含漱水

〔主治〕聖京倔性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十一方〔微兒那（地名）羅遠私的印〕

吐酒石（二氏至三氏）　蒸餾水一北溶化加ニ後藥

蜜（去泡沫一弓）

右調和為含漱水

〔主治〕頑固ノ僂麻質斯性或ハ聖京倔性咽喉焮衝他藥効ナキ者之ニ宜シ○又羅遠私的印（人名）ハ緩慢ナル鼻孔閉塞殊ニ鼻孔甚乾燥ヲ覺ユル者ニ吐酒石溶水ヲ射注シテ良効ヲ得タリト云フ

○第四百五十二方

Kitasato Memorial Medical Library

接骨木花一弓　熱湯適宜浸濾取六弓放冷加後件

地榆丁幾二錢　屋施蔑兒一弓

右調和為含漱水

〔主治〕咽口聖京倔性疾患扁桃腺及ビ懸壅垂ノ腫瘍ニ用フ

○第四百五十三方〔狨歇蘭度〕

撒爾非亜葉　接骨木花各半弓　井水適宜煮沸濾取二北加後藥

地榆越仙祭亜一弓　生明礬三錢

右調勻為含漱劑或射注劑

〔主治〕聖京倔性咽喉焮衝ニシテ扁桃腺若クハ懸壅垂ノ焮衝未退カザル者ニ宜シ

○第四百五十四方〔福倔篤〕

明礬一錢　撒爾非亜水六弓　地榆丁幾半弓　桑椹舎利別六錢

右調和供含漱

〔主治〕虚性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十五方〔同上〕

白地榆根半弓　裸麥六弓　井水適宜煮濾取八弓加後藥

別爾篤婪丁幾六錢　玫瑰蜜一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和供含漱

〔主治〕虚性麻痺性ノ咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十六方〔戻兒〕

明礬二刃　撒爾非亜葉煎六弓溶化加後藥

玫瑰蜜一弓

右調勻為含漱水

〔主治〕虚性咽喉焮衝ニ宜シ○血兒百奥人名ハ指頭ヲ濡ホシテ明礬末ヲ附著シ焮衝セル粘液膜上ニ塗附スルヿ毎日二回次テ明礬溶水ヲ以テ含漱セシム

○第四百五十七方〔獗歇蘭度〕

生明礬二錢　井水一北　桑椹舍利別一弓

右調勻朝夕含漱

〔主治〕習癖咽喉焮衝ニ宜シ」兼テ弗剌涅兒若クハ絹ヲ以テ頸圍ヲ絡纏シ且冷水ヲ以テ毎日頸ヲ洗ハシム

○第四百五十八方〔福倔篤〕

蓍草穗　常用加密列各半弓　井水適宜煮沸濾過取八弓溶和後藥

蓬砂二錢　玫瑰蜜一弓

右調勻供含漱

〔主治〕咽喉潰瘍ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第四百五十九方〔別連杜〕

撒爾非亞葉半弓　熱湯適宜浸濾過取六弓加後藥

格魯林水半弓　玫瑰蜜一弓

右調和供含漱或射注

〔主治〕虛性咽喉焮衝及ヒ鵞口瘡ニ宜シ

○第四百六十方〔遠突土〕

撒爾非亞葉　私格爾需謨葉各半弓　熱湯適宜浸濾取六弓放冷加後藥

發烟海鹽精一錢半　桑椹舍利別二弓

右調勻為射注藥

〔主治〕寒壞疽性咽喉焮衝ニ用フ

○第四百六十一方〔同上〕

寒製幾那越幾斯二錢　撒爾非亞水二弓　甘海鹽精二錢

玫瑰蜜一弓

右溶和振蕩以筆塗患處

〔主治〕寒壞疽性咽喉焮衝ニ用フ

○第四百六十二方〔同上〕

赭色幾那粗末半弓　井水適宜煮濾取四弓放冷加後藥

沒藥丁幾一錢　山葡菜精二錢　桑椹舍利別六錢

右調和振蕩為射注藥

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕小兒寒壞疽性咽喉焮衝ニ用フ

○第四百六十三方〔骨布〕

硇銅礬八氏　薩毘那水六弓溶化

右為含漱劑

〔主治〕慢性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百六十四方

水銀硬膏三錢　失鳩答硬膏半弓　草零陵香硬膏一弓

右捏和攤革貼頸圍

○第四百六十五方

硇砂揮發膏一弓　舎電阿芙蓉液一錢

右調和塗頸圍

○第四百六十六方

硇砂揮發加龍腦膏一弓

右為塗擦劑

〔主治〕右二方咽喉焮衝ヲ解散ス或ハ弗剌涅兒ヲ此軟膏ニ醮シテ頸圍ニ貼スルモ亦可ナリ

○第四百六十七方

亜麻仁四弓　錦葵葉　遏兒拖葉各一弓

右細末調和常水或乳汁煮為琶布

〔主治〕咽喉焮腫將ニ釀膿セントスル者之ニ宜シ○此他

Kitasato Memorial Medical Library

裸燕麥ノ琶布ヲ以テ慰スルモ亦最簡易トス○或ハ温
煖緩和ノ蒸氣ヲ吸引セシムベシ

○

○

遠西方彙卷之四

遠西方彙卷之五

獨乙　加幾安頓　著
和蘭　傑婆婆都　譯
侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯
南洋伊東亨健夫　參校

腦焮衝（エンセハリチス羅ヘルセンオントステキング蘭）

刺絡及ヒ頸顳耳後或ハ項窩蜞鍼頭上寒卷（四百六十八方）灌水及
ヒ瀉水浴（ストルトバット）蓋瀉水浴ハ衝動シ易キガ故ニ之ヲ施スハ最小
心ヲ要スベシ其水高キヨリ瀉スルトキハ殊ニ然リ）ヲ行セ

Kitasato Memorial Medical Library

或ハ之ニ兼テ脚湯ヲ施ス等皆腦焮衝第一等療法トス」然レ𪜈消石。硇砂。芒硝。瀉利鹽。及ヒ其他ノ瀉下鹽類（四百六十九方四百七十方）ヲ大量ニ與ヘテ毎日大便二三行ヲ得シ」亦怠ルヘカラス」而後甘汞（四百七十二方）一二氏ヨリ三氏至（マテ）一時毎ニ服セシムベシ甘汞ハ欽クヘカラザル症多シ」兼テ又両足ニ温煖琶布ヲ貼スベシ」安度刺（アンドラ）兒氏ノ説ニ據レハ腦焮衝生力亢進セル症ニ皮膚刺戟法ヲ以テ誘導ノ効ヲ要スト云フ其説甚信シ難シ何トナレバ皮膚ニ彌蔓セル神經末端ヲ刺戟スレハ腦モ亦同ク之ヲ感受スルニ由テナリ（○）生力沈伏セル者ハ全ク上法ト異ニシテ瀉水浴（ストルトバット）ヲ行ヒ頭髪ヲ剃リテ大發疱膏ヲ貼シ或ハ之ヲ項窩若クハ肩胛間ニ貼シ又腓腸ニ蒸餅母ヲ貼スル等皆相當ノ治法トス」此ノ如キ症ニ於テハ亜（アル）兒尼（カニ）加（カ）花（四百七十七方）ヲ内服セシムル者屢之アリ

○第四百六十八方　宿繆結爾（スクシュウケル）人名寒罨法

粗製消石（弓）　硇砂（弓半）　冷水四北溶化加醋一北

右調和四折若六折麻布醮為頭上寒罨法毎五密扭（ミミト）篤乃至十密扭篤（ミミト）換之

主治　腦焮衝頭腦激動頭創等ニ宜シ

○第四百六十九方

Kitasato Memorial Medical Library

瀉利鹽一弓

右遏爾拖根煎八弓溶化每半時服一食匙乃至二食匙以至得下

主治　腦焮衝刺絡后之ヲ用フルニ宜シ○腦焮衝ハ頭上ニ蜞鍼及ヒ寒罨法ヲ施シテ後腸ニ誘導スルヿ最簡要ナルガ故ニ鹽性瀉藥ヲ用フルヲ妙トス其効夐ニ精製消石精製硇砂等ニ優レリ

○第四百七十方　戻兒

瀉利鹽一弓　麥芽飲附三北以麥芽二弓製者　吐酒石三氏　阿芙蓉丁幾三滴

右溶和每一時服一小盞以至得下

主治　腦或ハ眼ノ焮衝ヲ治シ又腹内ノ痙攣性閉塞症ニ宜シ

○第四百七十一方

精製消石二錢　芒硝半弓　井水六弓溶化加覆盆子舍利別六錢

右和匀每半時服一食匙

主治　腦焮衝及ヒ其他焮衝諸病ニ宜シ

○第四百七十二方

甘汞一氏至二氏　白糖半刃

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散等分六裹每一時服一裹

〔主治〕之ヲ與ヘテ多量ノ大便數行ヲ得ルニ至ルベシ或ハ瀉下ノ効ヲ扶ケシカ為ニ各裹ニ葯刺巴根二匁ヲ加ヘ若クハ旃那葉ヲ兼服セシムベシ

○第四百七十三方〔依。魯。毘私骨弗〕

蘆根　答麻林度各一弓　井水適宜煮濾過取八弓和芒硝二錢再加後藥

覆盆子舍利別半弓

右合匀每半時服二食匙

〔主治〕腦焮衝ノ下利止ムヿ早キニ過グル者之ニ宜シ

○第四百七十四方〔同上〕

亜兒尼加根三錢　纈草根二錢　熱湯適宜浸漬濾取八弓加後藥

亜刺毘亜蘧謨漿　地亜格實温各半弓

右調和每一時服二食匙强

〔主治〕腦焮衝下利ヲ兼併セル者及ヒ將ニ神經症ニ移ラントスル者之ニ宜シ

○第四百七十五方〔同上〕

格綸僕根三錢　井水適宜煮投纈艸根三錢濾取八弓再加後件

Kitasato Memorial Medical Library

單方桂水　亞刺毘亞蘧謨漿各一弓

右和勻每半時服二食匙强

〔主治〕同上

○第四百七十六方〔同上〕

亞兒尼加根三錢　熱湯適宜　浸漬濾過取八弓加後味溶化

精製硇砂一刃　白糖二錢

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕腦焮衝神經性ヲ兼子且下利シ生力將ニ脫衰セントスル者之ニ宜シ

○第四百七十七方〔同上〕

亞兒尼加花二錢　熱湯適宜浸漬濾過取六弓加後味

吐酒石一瓜　孕礬酒石三錢

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕腦焮衝生力抑壓セル者之ニ宜シ

〔甲〕酒狂エンセファリチス。パタトリュム。ス。デリリウム。テレメンス羅ソイプルスウアレンシン。メット。ベレセンク蘭

此症固ヨリ真腦焮衝ト看做スベカラスト雖盖腦焮衝ノ一種變化セル者ナリ」故ニ大率腦焮衝ノ治ニ準メ療スベシ」但刺絡ヲ要スル者ハ鮮シトス顳顬若クハ耳後蜞鍼頭上寒罨法等切須メ症多シ」腸胃汚物ヲ兼併セル者ハ孕鹼

Kitasato Memorial Medical Library

酒石醋酸加里等ノ如キ解釋劑ヲ用フベシ但老利兒水ト配伍スル者最適當トス」吐藥四百八十一方ヲ與フル醫アリト雖然モ些ノ吐酒石四百八十二方ヲ用ヒテ微々呕氣ヲ促スヲ更ニ好トス」衰弱甚シキ者ハ纈艸浸ニ鹿琥精ヲ和スル者亜兒尼加花浸四百七十七方四百八十三方等ノ如キ衝動劑ヲ用ヒ加之慎テ時々些ノ燒酒ヲ飲ムヲ許スベシ」又鑛酸類四百八十四方ハ確實ノ益アリ」輓近實芰答利斯四百八十五方及ヒ羌活四百八十六方ヲ称譽スル者屢之アリ」私倒倔頓人名忽布丁幾ヲ賞用シ拂來法乙爾及ヒ佛祿繆兒列爾並ニ人名ハ菲阿斯越幾斯弗血兒仙人名ハ硇砂華遠突土人名ハ阿魏ヲ賞賛セリ」此他不眠ヲ治スルヲ

專ニスヘシ但先清涼劑下劑等ヲ用ヒテ後阿芙蓉四百八十七方至四百八十九方ヲ與ヘテ尤佳ナリ○私珍鎮倔氏一種ノ療法ヲ作為セリ其法瀉下アラザル者ハ炭酸剥篤亜斯六氏乃至七氏ヲ取リ煆製麻倔涅失亜十氏ト配合シ一時毎ニ粘滑飲液ニ以テ送下セシメ毎服後冷水ヲ飲マシム」六時乃至十二時ヲ經テ后水瀉スレ氏患者意識本復セズ或ハ戰慄休マザル氏ハ復前ノ方法ヲ施シ項窩ニ芫菁膏ヲ貼ス諸証緩解スル氏ハ前方ヲ與フルヿ一時半毎ニシテ而メ芫菁膏ヲ去ラシム」但尚瀉セザル氏ハ四分三時毎ニ又前方ヲ與フ」固ヨリ瀉スルノ症ハ煆製麻倔涅失亜ニ代ヘテ牡

Kitasato Memorial Medical Library

蠣末十匁ヲ以テ炭酸剥篤亜斯ニ和用ス」之ヲ施シテ大抵第二日第三日ニ至リ食欲ヲ生ス此時ニ至リ蒸餅。菜蔬。肉類ノ如キ食餌ヲ喫セシムルニ宜シ亜兒篤麻（アルトマ）地名ノ病院ニ於テ此法ヲ用ヒテ二十三人ヲ療ス其二十二人ハ二日乃至六日ニシテ治シ他ノ一人ハ六時ニシテ全愈セリ

○第四百七十八方〔依拂朗屈〕

炭酸剥篤亜斯半錢　新鮮枸櫞汁適宜飽和更加後件

井水九弓　覆盆子舎利別一弓

右調匀毎一時服二食匙

〔主治〕酒狂症全身熱シ頭上及ヒ肝臓ニ畜血アル者之ニ宜シ

○第四百七十九方〔同上〕

純精酒石一弓　消石一錢　朱砂二十四匁

右調匀為散等分十二裹毎一時乃至一時半服一裹

〔主治〕酒狂症ニ用ヒテ神經系ノ刺衝ヲ減殺スルニ宜シ

○刺胄私（テチウス）人名此方ノ效驗ヲ確定セリ

○第四百八十方〔依魯毘私骨弗〕

蘆根　蒲公英根各一弓　水適宜煮濾過取八弓溶後藥

瀉利鹽六錢

右調和毎一時服一食匙乃至二食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕酒狂症ノ初期便秘スル者ニ宜シ

○第四百八十一方

吐酒石六氏至八氏

右蒸餾水四弓溶化毎半時服一食匙

〔主治〕酒狂症之ヲ連進シテ吐ヲ得後患者安静シ或ハ安眠スルニ至ルベシ○過兒栗屈的兒人名ハ患者ヲ温湯中ニ坐シテ灌水セシムルヲ称用ス

○第四百八十二方〔倔刺歇私〕

吐酒石四氏　阿芙蓉丁幾二錢　龍腦密幾私去爾三弓〔附〕

右調匀毎一時服一食匙

〔主治〕酒狂病ニ宜シ○頭腦ニ實性ノ畜血アル者ニ用フル片ハ倔刺歇私人名吐酒石ノ量ヲ加増シテ阿芙蓉ヲ減殺ス之ニ反スル者ハ神經証ノ過盛セル所ヲ制ス○通例吐酒石五氏乃至六氏ヲ取リ水五弓乃至六弓ニ溶解シ半時毎ニ一食匙宛與フ○求兒度別爾倔人名ハ毎服吐酒石半氏ヨリ二氏至半時若クハ一時毎ニ用フ拔爾屈蒿仙人名ハ更ニ吐酒石ノ量ヲ加ヘ時期ヲ遠隔シテ之ヲ用ヒ患者ノ意識本復ノ后モ猶暫ク連服セシム○吐酒石ニ代ヘテ皓礬ヲ賞用スル者モ亦多シ

○第四百八十三方〔依魯毘私骨弗〕

Kitasato Memorial Medical Library

○亜兒尼加花二錢　熱湯適宜浸漬濾取八弓溶後味

瀉利鹽三錢　吐酒石一匁　蘆根流動越幾斯半弓

右調和每一時服一食匙

主治　熱性酒狂病先頭上ニ蜞鍼及ヒ寒罨法ヲ施シ以テ畜血ヲ制スルノ后之ヲ與フ

○第四百八十四方

硫酸密幾私去爾一錢至一錢半附　櫻實水五弓　覆盆子舍利別二弓

右調和每一時服一食匙

主治　酒狂症頭腦ニ神經性畜血アル者之ニ宜シ

○第四百八十五方　苦列私

實芰答利斯半錢至一錢　熱湯適宜浸漬濾取六弓加櫻實舍利別一弓

右調和每一時服二食匙

主治　熱性酒狂症ニ宜シ○之ヲ連服ノ瞑眩ノ候ヲ見ハスニ至ル○苦列私人名此法ヲ以テ十二人ヲ治セリ噦亜私頓人名朽思同祿斯同等モ亦實芰答利斯ヲ称用セリ○噦蒲私的爾人名實芰答利斯ヲ大量丁幾失爾ニ製スル者六十滴以ク時半中二次ニ用フ二與ヘテ患者ヲ睡眠セシム吾輩此法ニ倣ヘ堪ヘ

Kitasato Memorial Medical Library

○第四百八十六方〔思四答〕

羌活一弓半　熱湯適宜浸漬濾過取八弓放冷加菖蒲根

下幾一錢　實芝答　味甘大量六十畝以上　卜幾尖　半中　大小苦

右調和每一時服一食匙

〔主治〕酒狂症ニ宜シ

○第四百八十七方〔拔爾屈蒿仙〕

精製阿芙蓉半氏　白糖半刃

右調勻為散分十二裹每一時服一裹

〔右調〕酒狂症ニ宜シ○若效アラザル時ハ阿芙蓉ヲ加増

○メ毎服一氏ニ至リ危急ニ臨ム時ハ更ニ加ヘテ二氏ニ

至ル此ノ如キ大量ノ阿芙蓉ヲ服スルヿ四次ニメ猶眠

ヲ得ザル時ハ再減メ一氏若クハ半氏ト云之ヲ持重

メ分利ノ期ニ至ルベシ此療法ヲ行テ効驗アラザル時

○ハ晩ニ方ヲ又大量ノ阿芙蓉ヲ與ヘ功ヲ收ムルヿ間之

アリ但晩ニ大量ヲ與レハ翌日ヨリ服量ヲ減メ大率半

氏ヲ與フルヿ日ニ二次ヨリ四次ニ至ル舌上厚苔ヲ帶

ビ其他腸胃汚物ノ候アル者ハ先吐藥ヲ與ヘ後阿芙蓉

ヲ用フベシ○抳縵人名ハ阿芙蓉下幾上纈草加亜的兒下

幾〔附〕ヲ等分和シ用フ

○第四百八十八方〔私幾牝度蒲〕

Kitasato Memorial Medical Library

○精製阿芙蓉六氏　土根十二氏　白糖一錢

右調勻為散等分六裹每一時服一裹

主治　酒狂症先焮衝証或ハ腸胃汚物証ヲ治メ后神經系ノ興奮機ヲ鎮降スルニ宜シ此方ヲ連進メ患者熟睡ヲ得ル與至リ或ハ病愈増進スルニ由テ阿芙蓉ヲ忌ムベキ時期ニ至ルベシ

○第四百八十九方（福倔篤）

精製阿芙蓉一氏至二氏　消石六氏至十氏　白椒四氏　甘草半刃

右調和為散分十二裹每一時半取一裹稀淡哥喜和服

主治　酒狂症ニ宜シ

○第四百九十方（繆爾別苦）

喝刺扶阿刺越幾斯三氏　孕鹼酒石一刃

右調勻為散分八裹每半時取一裹冷水溶和服

主治　虚性酒狂症阿芙蓉ヲ用フベカラザル者之ニ宜シ

○第四百九十一方（依拂朗屈）

硫酸亜的兒　鹿角精各錢　薄荷水六弓　舎電阿芙蓉液十刃

右調和每半時服一食匙

主治　酒狂症後補劑トシ用フ

乙　急性腦水腫エンセフハリチス。インフアンチユム。エキスシユダトリアヒドロプス。フエントリキユロリユ

Kitasato Memorial Medical Library

ム。セレブリ羅ヘテ。ヘルセシウアートルシユクト蘭ハ

此症主治蜞鍼一二頭ヨリ二頭至病兒ノ年齢ニ準メ兩耳後ニ貼シ後甘汞ヲ實芟荅利斯四百九十三方甲方。四百九十七方若クハ葯刺巴四百九十五方配用シ終ニ頭上ニ寒罨法ヲ施スヘシ但昏睡ノ状アル者ハ一線ノ冷水ヲ差高所ヨリ注下シ小兒ノ前頭及ヒ顱心ニ灌クベシ

此法歇愔人名福爾墨乙同上兩大醫試驗セシ所ニシテ他ノ衆醫モ亦之ニ倣フテ施療セシガ故ニ余茲ニ書載セザルヲ得ザルナリ然レ𪜈余理ヲ以テ之ヲ推スニ寒罨法及ヒ水線浴ハ其效ヲ奏スルヨリハ害ヲ為スヿ多シ何トナレハ幼兒ハ寒冷ニ堪ヘザレバナリ

是故ニ里篤曹人名ハ之ヲ戒シテ謾ニ試用セザラシム宜ナル哉

昏睡症ニ衝動藥殊ニ亜兒尼加花ヲ内外称用スル四百九十九方。五百方者亦之アリト雖吾ハ信ゼス○弗陽人名ハ沃曹謨ト甘汞ヲ配伍シ五百一方其吸收機ヲ催進ス弗。祿設爾人名及ヒ他ノ衆醫ハ敝度里阿達斯剥篤亜斯五百二方五百三方ヲ用フ僕結爾人名稱賛セシ所ノ格魯林水ハ他醫ノ試驗ニ在テモ良效アリシヤ否ヤ吾輩未之ヲ詳ニセズ○沕乙滲出ノ時期ニ方テハ項上或ハ顱心ヲ剃テ芫菁膏ヲ貼シ腓腸ニ蒸餅母ヲ貼シ又吐酒石膏ヲ塗擦スベシ五百五方

○第四百九十二方遠突土

Kitasato Memorial Medical Library

瀉利鹽二錢　滿那一弓　甘扁桃乳四弓

右溶和每一時服一兒匙若一食匙强

〔主治〕小兒腦焮衝及ヒ他ノ焮衝諸病ニ清涼下劑ト云テ用フ

○第四百九十三方甲方〔謨私篤〕

旃那瀉下飲一弓半〔附〕苗香水　滿那舍利別　大黃舍利別各一弓　芒硝五錢

右調勻每半時服半食匙乃至一食匙

〔主治〕大兒急性腦水腫ノ初期蜞鍼ヲ施ノ后乙方ト交換シ用フヘシ

○第四百九十三方乙方〔同上〕

甘汞六氏至十二氏　實芰荅利斯一氏半至二氏　麻倔涅失亞二刃

甘草十刃

右為散等分十二裹每一時乃至一時半服一裹

○第四百九十四方〔依魯毘私骨弗〕

精製消石十五氏　遏兒托煎三弓溶解加遏兒托舍利別半弓

右調勻每一時服一兒匙

〔主治〕四歲ヨリ六歲至ノ兒腦水腫ノ初期ニ用フ之ニ兼テ耳後蜞鍼頭上寒罨法ヲ施シ且甘汞半氏ヨリ一氏至

Kitasato Memorial Medical Library

一時毎ニ服セシムベシ

○第四百九十五方〔同上〕

葯刺巴末一氏半　甘汞半氏　白糖五氏

右調和為散分四褁毎一時服一褁

○第四百九十六方〔遠突土〕

醋酸加里液　滿那舍利別各一弓　蒸餾水二弓

右溶和毎一時服一兒匙

〔主治〕小兒急性頭水ニ甘汞ト交換シ用フ

○第四百九十七方〔護利私〕

實芰荅利斯二氏　甘汞四氏至八氏　乳糖四刃

右調和為散等分八褁毎一時服一褁

○第四百九十八方〔同上〕

遏兒托葉三錢　實芰荅利斯四氏　熱湯適宜浸漬濾過取

三弓半加阿訥尼私舍利別半弓

右調匀毎半時服一兒匙乃至二兒匙

○第四百九十九方〔同上〕

亜兒尼加花半錢　熱湯適宜浸漬濾取三弓加後味

橙皮舍利別半弓　甘消石精六滴

右調匀毎一時服一兒匙

〔主治〕小兒急性腦水腫末期ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百方〔設傑。涅優滿〕

亞兒尼加花半弓　熱醋三弓　熱湯五弓

右浸漬後煮沸暫時濾過放冷供頭上寒罨方須數次換之

〔主治〕小兒急性頭水ニ宜シ兼テ亞兒尼加花浸劑ヲ内服セシムヘシ

○第五百一方〔弗。陽〕

沃胄謨十六分　甘汞　實芰荅利斯各半　白糖半刃

右調勻為散分八褁每一時半服一褁

〔主治〕小兒急性腦水腫沕乙滲出ノ時期ニ用フベシ

○第五百二方〔弗。呂設爾〕

敝度里阿達斯剥篤亞斯一錢至二錢

右蒸餾水一弓溶和每一時服三十滴乃至四十滴

〔主治〕三歳乃至七歳ノ兒急性腦水腫沕乙滲出ノ時期ニ用フベシ

○膚矣歇爾土名秩篤里屈同遏別兒同沉茂爾滿同弗劉垤爾同屋尼傑爾同等モ亦敝度里阿達斯剥篤亞斯ヲ稱用セリ

○第五百三方〔遏茂綸倔〕

敝度里阿達斯剥篤亞斯半錢　蒸餾水三弓溶解加砂糖舍利別一弓

右調和每一時服一兒匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕三歲乃至四歲ノ兒ニ用フベシ

○第五百四方〔剌垤福爾母渦兒度地名僕結爾〕

格魯林水半弓　茯餾水　砂糖舍利別各一弓半

右調和收磁器每半時服一兒匙强

〔主治〕急性頭水ニ宜シ殊ニ七月乃至一歲ノ兒ニ供用スベシ更ニ年長ノ兒ニ與フルトキハ格魯林水ヲ加增メ一弓ニ至リ又大食匙ヲ以テ服セシムベシ○僕結爾人名ハ病ノ初起ニ之ヲ用ヒテ脈管ノ壓迫ヲ退ケ又沕乙滲出ノ期ニ用ヒテ其吸收ヲ催進セシム之ニ兼テ蜞鍼寒罨法ヲ怠ルヿナカラシム瀉ヲ促スハ複方旃那浸〔附〕ニ宜シ

○第五百五方〔密抎苦麻倚爾〕

吐酒石膏一弓

右每一時塗擦顋顬頭及項窩

〔主治〕甘汞ト内外兼用ス○窒兒失篤地名ノ首歇爾土人名ハ密抎苦麻倚爾人名ノ教示ニ據リ十四箇月ノ兒急性ノ内部頭水症ニ此方ヲ試用シ第四日ニ方テ始テ疹ヲ發シ昏睡及ヒ其他頭水諸証悉ク消散セリ之ヲ塗擦スルヿ六日ニ至リテ其疹潰膿シ痛最甚シク五週ニシテ平治セリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百六方

阿訥尼私根（オノニス）（二錢）　水適宜煮濾取四弓加後件

大黄水製丁幾　茴香舎利別（各半弓）

右調勻毎一時服一兒匙

〔主治〕四歳乃至六歳ノ兒急性脳水腫本復ノ期ニ及テ利尿及ヒ飲食ノ消化ヲ扶クルニ用フ

脊髓焮衝（メイリチス羅オントステイキング。ファン。ヘット。リュツヘメルグ蘭）

此症亦消焮法ニ從事スベシ」刺絡ヲ施シ水蛭十五頭ヨリ二十頭至（マデ）脊椎ニ沿フテ貼スベシ或ハ吸角法ヲ施シテ更ニ適當トリトス而メ後脊椎ニ寒罨法ヲ行ヒ内服ハ精製消石（九方。至十五方。十七方。三百八十三方。三百八十四方。四百十二方）及ヒ清涼下劑（十五方十六方五十六方至六十方）後甘汞一氏ヨリ二氏至（マデ）一時毎ニ與ヘ依（イ）。拂朗屈（フランク）（人名）ノ法ニ從テ亜兒尼（アルニカ）加花浸モ亦用フベシ」脊椎ノ兩側ニ水銀膏ヲ塗擦シ（毎一時一錢至二錢）瀉藥ヲ灌腸シ又發疱膏ヲ貼メ久シク癒ザラシムベシ」若生カ虚弱ニメ分利機ヲ起スニ足ラザル者ハ依（イ）。拂朗屈（フランク）（人名）龍脳硇鉄華ヲ配用シ並ニ的列（テレ）並（ビン）油ヲ加ヘタル灌腸方ヲ彌賛セリ

○第五百七方〔依。拂朗屈〕

的列（テレ）並（ビン）油（半錢）　蜜（一弓）　加密列（カミレ）浸（六弓）

右調和供灌腸

Kitasato Memorial Medical Library

胃焮衝（カストリチス羅マーグ オントステイキング）蘭

胃焮衝ニ數次多量放血スルハ適當ナラズトス何トナレハ此症血實ニ因ル者僅少ニシテ患部知覺過敏ニ因ル者多ケレハナリ」大抵小量刺絡ヲ行フヿ一回後蜞鍼ヲ施シ足レリ但蜞鍼ハ數多ヲ厭ハス且數次之ヲ施スニ宜シ」蜞鍼ハ胃ノ上部ヲ撰テ施スベシ然レ𪜈痔疾内陷或ハ月經閉止ニ因スル者ハ肛門内股或ハ陰部ノ近圍ヲ好トス」内服ハ假令極メテ緩和ノ藥品ト雖モ大抵胃之ヲ受クルニ堪ヘズ唯氷ヲ碎キテ胡桃子大ト作シ服スレバ良效ヲ奏シ且煩渇ヲ消ス但之ヲ喫スルニ暫時之ヲ口中ニ含ミ尖角ノ融消スルヲ待テ嚥下スベシ」而後鎮静ノ乳劑（五百六方）甘汞（五百九方）硝酸曹達（ソイダ）（五百十方）ヲ稱用シ肚腹ニ緩和蒸劑ヲ行フ患者若罨法（五百十一方）ニ堪フ可クバ之ヲ施スヲ佳ナリトス○胃焮衝ハ僂麻質斯ノ外部ヨリ内部ニ轉徙スルニ因ル者多シ此ノ如キハ直チニ胃ノ上部ニ大發疱膏及ヒ肛門ニ蜞鍼ヲ施スヲ要トス

○第五百八方（狨歇蘭度）

甘扁桃油（一弓）　水（八弓）　亜刺毘亜護謨漿（適宜）　作乳劑更加後味

菲阿斯越幾斯（六氏）　扁桃乳舎利別（半弓）

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎半時服一食匙

〔主治〕刺絡及ヒ局處ノ瀉血殊ニ吸角法ヲ行フテ后ハ之ヲ無比ノ良法トス患者能ク之ヲ受ルニ堪フ」兼テ胃部ニ鎮痛ノ罨劑及ヒ擦劑ヲ施シ蒸餅母及ヒ芫菁膏ヲ貼シ又緩和灌腸微温全身浴ヲ行フベシ」飲料ハ乳汁ニ水ヲ和シ用フ盖酪餘ヲ最佳トス

○第五百九方〔列設爾〕

甘汞　白糖各一刃至半錢

右調和為散分二裹朝服一裹又隨其症晩服一裹

〔主治〕胃ノ粘液膜焮衝ニ宜シ安涅私戾人名遏爾謨私德恕

倔同上等モ亦之ヲ稱用セリ若瀉劇シキ時ハ阿芙蓉一氏乃至二氏ヲ與フベシ」列設爾人名ノ經驗書中ニ詳ニスルカ如ク此方ヲ以テ此症ヲ療スルトキハ二三日ニノ復治シ殆他藥ヲ要スルヿナシ又之ガ為ニ惡証ヲ挑起スルヿナシト云フ」然レトモ實性胃焮衝ニ此ノ如キノ大量甘汞ヲ與フレハ恐ラクハ危險証ヲ發セン」少量ニ用フルトキハ下利スルモノハ阿芙蓉ヲ配伍ス其效誤ルヿナシ三百九十四方四百七十二方殊ニ慢性胃焮衝ニ宜シ

○第五百十方〔同上〕

硝酸曹達二錢至三錢　遏爾抱煎六弓溶和

Kitasato Memorial Medical Library

右毎半時若一時服一食匙

○主治　腸胃ノ粘液膜焮衝ニ先瀉血メ后之ヲ用フ又甘汞連服ヲ忌ム者之ニ宜シ

○第五百十一方

亜麻仁　遏爾托根（アルタイ）　常用加密列（カミルレ）　錦葵葉　草零陵　香葉（各半弓）　黒菲阿斯葉（ヒオス）（一弓）

右細剉調和取其一分水或乳汁煮為罨劑

腸焮衝（エンテリチス羅ダルムオントステーキング蘭）

此症腸中諸膜焮衝ト粘液膜焮衝トノ別アリ

○諸膜焮衝（エンテリチス。プレグモノサ）ハ胃焮衝ト同ク瀉血多量ナル

勿レ大抵刺絡一次ニメ足レリ」刺絡ノ後痛所或ハ症ニ隨テ直腸若クハ内股蜞鍼ヲ貼ス但蜞ノ多少ハ適宜ニ消息スベシ」蓋患部琶布罨劑（五百十一方五百廿五方）ニ堪ヘザル者多シ弗刺涅爾（ラヂル毛布ノ名）ヲ湯ニ醮シ絞リテ腹上ニ安シ數次之ヲ換フルニ宜シ」内服ハ甘汞（四百七十二方）ヲ第一トス之ヲ阿芙蓉ニ配スルモ（三百九十四方）亦佳ナリ然レ（モ）二品ヲ分テ各別ニ用フレハ更ニ適當ス何トナレバ甘汞ハ通例一時毎ニ一氏乃至二氏ヲ用ヒ阿芙蓉ハ疼痛ノ劇易及ヒ其他ノ証狀ニ準シテ一日ニ唯二三回多キモ四回ニ過キス其量モ亦半氏乃至一氏ニ止マレバナリ」之ニ兼テ緩和藥油質粘滑藥乳劑

Kitasato Memorial Medical Library

ニ老利兒水ヲ加フル者等ヲ服セシム五百十二方或ハ菲阿斯越幾斯五百十三方或ハ舍電阿芙蓉液五百十四方モ亦配伍スベシ」大便ヲ促スハ亜麻子油五百十七方ヲ用フベシ蓖麻油五百十八方五百十九方ハ更ニ佳ナリ鹽類ハ通例害アリ設令之ヲ與フルモ必油質藥ニ和スルヲ好トス五百二十方」又緩和灌腸ヲ施スベシ五百廿六方至五百廿八方冷水灌腸モ亦良效ヲ奏スルヿ屢之アリ」又水銀膏半錢ヨリ一錢至或ハ之ニ菲阿斯油ヲ和シ一時乃至一時半毎ニ徐々下腹ニ塗擦スルニ宜シ粘液膜ノ急性焮衝症アキユタエンテリチスミユコサハ刺絡ヲ要スル者罕ナリ大抵下腹ノ痛所ニ蜞鍼ヲ施メ足レリ」内服ハ油乳

ニ老利兒水五百十二方菲阿私越幾斯五百十三方或ハ阿芙蓉五百十四方ヲ加フ」甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍スル者三百九十四方亦良效ヲ奏スルヿ屢之アリ」外用ハ水銀膏及ヒ緩和灌腸ヲ佳トス○慢性粘液膜焮衝症コロニセエンテリチスミユコサモ亦上ノ治法ニ同シ經久過度ニ瀉スル者ハ硝酸銀溶液ヲ加ヘタル灌腸ヲ稱譽セリ五百廿方

○第五百十二方

白罌粟子三錢至六錢加黑櫻實水四弓乃至六弓搗爛作乳劑後加左藥

老利兒水一錢白糖二錢至半弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和毎一時服一食匙

○第五百十二方

甘扁桃油半弓　亞剌毘亞護謨漿適宜　加黒櫻實水四弓

○第五百十三方　作乳劑後加左藥

菲阿斯越幾斯四氏　遏兒拖舍利別半弓

右調勻毎一時服一食匙

○第五百十四方

甘扁桃去皮半弓　加黒櫻實水六弓研碎作乳劑後加左藥

舍電阿芙蓉二十滴　白糖六錢

右調勻毎半時乃至一時服一食匙

主治　第五百十二方ヨリ五百十四方至腸焮衝ニ用ヒテ

○刺衝。痙攣。疼痛。ヲ緩和鎮静スルニ宜シ○高醫私。傑。福傑爾人名數回經驗セシ說ニ據ルニ純粹腸焮衝ニ瀉血シテ后ハ阿芙蓉ニ勝リテ效ヲ奏スルモノナシ患者體質虚弱ニ病困倦麻質斯ニ在ル者ハ如キハ殊ニ然リトス

阿芙蓉ニ含畜セル華爾斯質ヲ惡ム氏ハ福傑爾氏水製越幾斯ヲ與ス若之ヲ吐スルトキハ灌腸藥ニ和メ用フベシ

○甘汞阿芙蓉ノ合劑三百九十四方モ亦能ク適當ス

○第五百十五方　謨私篤

精製阿芙蓉半氏　亞剌毘亞護謨末　白糖六氏

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻為散分六裹每服一裹日三次乃至四次

〔主治〕腸焮衝瀉血シテ后疼痛ヲ減シ神經系ヲ鎮静スルニ宜シ

○第五百十六方

龍腦二分四厘　精製阿芙蓉一匁　白糖二刀

右調和為散等分四服每日二三四服

〔主治〕腸焮衝症焮衝ノ勢已ニ退テ后之ヲ用フ其症僂麻質斯ニ因ス小殊ニ佳ナリ

○第五百十七方〔戒歇蘭度〕

新製亜麻子油二弓

右每一時與一食匙

○第五百十八方〔同上〕

蓖麻油二弓

右每一時與一食匙

〔主治〕右二方ハ刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施シテ后用フベシ

之ニ兼テ緩和鎮痙罨法ヲ施シ水銀膏或ハ菲阿斯油ト阿芙蓉丁幾ヲ合和シテ肚腹ニ塗擦シ三時每ニ油質粘滑藥ヲ灌腸シ又微温浴ヲ施スヲ尤佳トス後肚腹ニ大發疱膏ヲ貼スベシ

○第五百十九方

Kitasato Memorial Medical Library

○蓖麻油一弓　亜刺毘亜護謨漿適宜　加黒櫻實水四弓為乳劑再加後味

滿那舎利別半弓

右調匀毎一時服一食匙

〔主治〕腸焮衝症瀉ヲ促スニ用フ

○第五百二十方〔遏傑栗屈的爾〕

瀉利鹽半弓　水三弓半溶化加後藥

亜麻子油一弓半　阿芙蓉丁幾九滴　罌粟舎利別半弓

右調和毎四分時服一食匙強

〔主治〕腸焮衝症焮衝減シテ后瀉スル者之ニ宜シ○予按スルニ此方用フルニ堪ヘザル者多カラン

○第五百二十一方〔弗陽〕

白罌粟子半弓　菲阿斯子二錢　加菩提樹花水四弓搗爛為乳劑加後味

硇砂錢　亜刺毘亜護謨半錢　扁桃乳舎利別半弓

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕腸焮衝刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施メ焮衝已ニ去リ衰弱弛緩復セス血及ヒ粘液畜積セル症ニ宜シ即腸ノ感覺過敏ニメ尋常ノ刺戟物モ飲食感動鋭敏ニメ鈍痛壓迫スルガ如ク脈疾ニメ緊ヲ帯ブル者是ナリ良醫福傑爾

Kitasato Memorial Medical Library

氏ノ諭言ニ云ク腸焮衝ニ硇砂消石ヲ用ヒズ總テ鹽類ヲ與フルヿ勿レ灌腸モ亦復然リト善哉言也

○第五百二十二方〔謨私篤〕

甘汞一匁　失鳩答葉六匁　莨菪葉二匁　金硫黄半匁

白糖一刃

右調和為散分十二裹毎服半裹乃至一裹日三次

〔主治〕腸焮衝末期下腹ノ一處疼痛ノ發シ腸將ニ硬固質ニ變セントスル乎或ハ生着ノ懼レアル者之ニ宜シ○之ニ兼テ水銀膏ヲ塗擦スベシ

○第五百二十三方

蘆根流動越幾斯　蒲公英流動越幾斯各一錢半〔附〕　精製

孕鹼酒石半弓　蒸餾水四弓

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕慢性腸焮衝ニ宜シ○痛處ニ先蜞鍼若クハ吸角法ヲ施シテ後緩和下劑ヲ與フ但甘汞ヲ内服シ水銀膏或ハ硇砂揮發加龍腦膏等ヲ交換シ用フベシ

○第五百二十四方〔謨私篤〕

甘汞　金硫黄各半匁　菲阿斯越幾斯二匁　白糖一刃

右調和為散分十二裹毎服一裹日三次

〔主治〕慢性腸焮衝ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百二十五方

錦葵葉　草零陵香葉　失鳩荅葉　菲阿斯葉　白罌粟球各半弓

右細剉取其一分水若乳汁煮為罨劑

主治　腸焮衝下腹ニ貼ス但罨法ノ如ヤハ焮衝減ズルノ后ニアラズハ之ニ堪ヘザル者多シ五百十一方ヲ參照スベシ

○第五百二十六方

亜麻子半弓　水十弓煮耗至五弓濾過加後藥

亜麻子油一弓

右調和供灌腸

○第五百二十七方

蓖麻油一弓至一弓半　雞子黃二箇　加密列浸六弓

右調和供灌腸

○第五百二十八方

遏兒托葉　歇爾拔斯屈謨葉各一錢　罌粟球剉者三錢

雨水煮濾過取八弓加後藥

亜麻子油半弓

右調和供灌腸

主治　第五百二十五方ヨリ五百二十八方至腸ノ痙攣焮衝疝或ハ大便閉腸ノ感覺過敏ヲ兼ヌル者等ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百二十九方（別連杜）

蒲公英根煎　麥糠煎各四弓　阿魏一錢至二錢雞子黃溶和者

蓖麻油二三茶匙

右調和供灌腸

主治　腸焮衝大便閉止ニ因スル者ニ宜シ

○第五百三十方

結晶硝酸銀一匁　遏爾托煎四弓溶化

右供灌腸

主治　腸ノ粘液膜慢性焮衝經久下利スル者ニ宜シ○内服ハ侃私怛篤人名拕歇爾散及ヒ沙列布煎ニ阿芙蓉液二

三滴ヲ和スル者ヲ稱用シ又鹽酸鉄丁幾二十滴ヨリ三十滴至砂糖水ニ和シ與フルヿ三四次又鉛糖格綸僕ヲ用フ以上ノ諸方效アラザルトキハ硝酸銀ヲ日服スルヿ八分氏ノ一ヨリ四分氏ノ一ニ至ル但侃私怛篤氏ノ之ヲ用フルヿ速ニセズ

痢疾（ヂセンテリア）（羅ロトハ蘭）

病學家通例此症ヲ以テ慢性病中排泄異常症ノ屬類ニ充ツルト雖此症原（モト）血中一種ノ病毒ヲ生シ之カ為ニ大腸焮衝ヲ起スニ因スルヿ必然ナルガ故ニ之ヲ急性病中ニ算入シ腸焮衝ノ後ニ論列スルヲ當然ナリトス○單純聖京

Kitasato Memorial Medical Library

痼痢ニ油質粘滑ノ乳劑ニ阿芙蓉チ幾ラカ又(ル)者(五百三十四方)阿芙蓉ヲ吐根ト配伍シ(五百三十五方)或ハ甘汞ト合和セル者(五百三十六方)吐根浸劑(五百三十七方)若クハ吐根乳劑(五百三十八方)等ハ加フルニ要トス昔者蠟丸ヲ飲ヲ以テ用ヒタルトキハ雖方今廢棄シテ用フルコトナシ(濕秩列人名)

(ハ)雞子白ヲ稱賛セリ(五百四十五方)之ニ兼テ下腹ニ燕麥粉若クハ緩和藥ノ溫暖罨布ヲ施シ疼痛劇甚ナルトキハ罌粟(ケシ)葉或ハ鴉啥(キタ)葉ヲ炙キ加フ(五百五十一方至五百五十二方)(ニ)腸衝性痢ハ刺絡ヲ缺クベカラズ並ニ下腹肛門或ハ會陰ニ蛭(ヒル)ヲ施シ油質粘滑ノ乳劑ヲ用フベシ但寫血ヲ以テ腸衝ヲ制セシ後

ハ阿芙蓉ヲ加フルニ宜シ(五百四十六方至五百四十七方)又輓近ニ至リテ屢々硝酸曹達(ソーダ)ヲ稱譽ス(ホ)膽液性痢ニ初メニ吐劑(吐根寧)ヲ用フルヲ最適當トス而後油性粘滑劑(五百四十九方)ヲ配用スルヲ宜シ(ヘ)甘汞ハ茲ニ偉效アリ但症ニ應メ之ニ阿芙蓉ヲ加減スルヲ要スルガ如キ(五百五十一方)(ト)瀉藥ヲ要スルガ如キ(五百五十二方)麻痺(マヒ)度(ド)ノ甚キ者ハ阿片(アヘン)ヲ用ヒテ的效アリ(チ)番木鼈(ストリキニーネ)亦偉效アリ(リ)神經性痼疾ノ頻ニ草摸爾(セルベン)揙太里亞(アダリア)白芷龍腦麝香(ジャカウ)及ヒ他ノ衝動藥ヲ稱賛スルモ吾輩ハ之ヲ信ゼズ粘滑油質劑吐根小量阿芙蓉等ヲ雖モ吾輩ハ之ヲ信ゼズ粘

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ以テ更ニ緩裕ノ治ヲ處スルヲ妥帖トス（一）腐敗痢ハ亞兒尼加根（五百五十三方　五百五十四方）龍腦紺百設木（五百五十五方）菖蒲根格綸僕幾那等尤適當藥トス（昔者賞用セシ所ノ明礬ノ如キハ須要ノ症稀ナリ（五百五十八方至五百六十方）弗陽（人名）明礬ノ試驗說アリ宜ク參考スベシ（五百五十七八方）輓近撒里矢揑（五百五十七方）並ニ鉛糖（五百六十五方）ヲ用ヒテ效ヲ得タリ（二）此他諸種ノ外用方ヲ施ノ腹痛裏急後重等ヲ除クベシ（五百六十九方至五百七十三方）

（三）第五百三十一方（茉爾鳩私）

甘扁桃油（二錢）　鷄子黃（一箇）　亞剌毘亞護謨漿（半弓）　丁寧

捏和加黑櫻實水四弓作乳劑再加砂糖舍利別半弓

右調和每半時服一食匙

○第五百三十二方（同上）

甘扁桃油（一弓）　亞剌毘亞護謨（半弓）　丁寧捏和加黑櫻實水六弓作乳劑再加後件

砂糖舍利別或遏爾托舍利別（半弓）

右調勻每四分時服一食匙強

（主治）右乳劑（五百三十一方　五百三十二方）ハ茉爾鳩私（人名）范別爾倔（地名）ノ病院ニ於テ流行痢疾ニ稱用セシ所ニシテ他病ニ於テモ亦偉效アリ之ヲ他ノ有力ノ藥ト兼用スレハ更ニ佳ナリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百三十三方〔私。傑。福傑爾〕

甘扁桃油半弓　亜剌毘亜護謨一錢　雞子黄一錢半　茴香水一弓半　阿芙蓉丁幾十五滴　扁桃乳舎利別六錢

右調和作乳劑毎四分時若半時服一茶匙強乃至二茶匙強

○第五百三十四方〔同上〕

亜剌毘亜護謨二錢至半弓　白糖一錢至二錢　茴香水三弓溶化加後藥

民垤列里精一弓　阿芙蓉丁幾一刃

右調和毎一時乃至一時半服一食匙強

〔主治〕第五百三十一方ヨリ五百三十四方至單純聖京倔痢ニ宜シ

○第五百三十五方

精製阿芙蓉　吐根末各二氏至六氏　白糖四刃

右調和為散等分八裹毎一時乃至一時半服一裹

〔主治〕單純聖京倔痢ニ宜シ

○第五百三十六方〔設。傑。涅優満〕

甘汞八氏至十二氏　精製阿芙蓉二氏至三氏　牡蠣末二刃　白糖四刃

右調和為散等分八服毎一時一服

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕痢疾ノ初無熱ノ時期患者腹痛。裏急ニ苦ミ。粘液血ヲ帯ビテ泄瀉シ一種臭氣アリ。食欲ヲ失フ者之ニ宜シ」

其功ヲ收ムルハ大抵上方八服多キモ十二服ニシテ足レリ」裏急後重甚シキ症ハ兼テ會陰ニ蜞鍼ヲ施スト八頭ヨリ十二頭ニ至ル○求嫪（ザウヌウ）地名ノ邏的（ロテ）氏屢此療法ヲ自驗シ良效アルヲ證セリ○侃私（カンスミツ）怛篤（ヒツト）等衆醫甘汞半刃ヨリ一刃至日服セシムルト唯一次多キモ二次ニ過ギス

通例此一服ニシテ膽液様若クハ緑色ノ大便（所謂甘汞利）ヲ瀉シ患者大ニ緩釋シ腹痛裏急共ニ減セリ奏効此ノ如キハ復後服ヲ要セス大抵拕歇爾（ドルル）散ヲ油性乳劑或ハ緩和下劑ニ和用シテ全功ヲ收ムルニ足レリ」或ハ甘汞一服ニシテ效ヲ得ス裏急後重等愈加重スル者アリ然ルトキハ第二服若クハ第三服ヲ服セシム」甘汞ハ此種ノ症泄瀉ヲ要スル者ニ殊ニ的効アリ是故ニ総テ流行痢ニ之ヲ試用スト雖更ニ腸胃汚物膽液及ヒ蚘虫ヲ夾雜スル者ハ最宜シトス

○第五百三十七方

吐根（粗末一刃至半錢）　水四弓浸漬濾過加左藥

橙花舎利別（半弓）

右調勻毎八分時服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕痢疾ニ用ヒテ痙攣及ヒ疼痛ヲ鎮定スルノ奇藥ト
ス

○第五百三十八方〔弗陽〕

吐根 半錢　大黄 一錢半　注熱湯三弓更煮沸濾過加後味

亜刺毘亜護謨 末一錢　過爾拖舍利別 三錢

右調勻毎半時服一食匙強

〔主治〕痢疾嫩衝ヲ帶ヒズ唯微痛ニ止マリ下腹却テ緊脹
スル者之ニ宜シ又脈緩徐ニメ泄出物ニ血及ヒ粘液ヲ
帶ヒザル症ニ施シテ佳ナリ若之ヲ用ヒテ大便閉止シ
腹痛愈増長スレハ須ラク大黄ヲ去ルベシ

○第五百三十九方〔私。傑。福。傑。爾〕

安質没尼酒 三錢　阿芙蓉丁幾 一錢

右調勻毎一時半服三十滴乃至三十滴

〔主治〕單純聖京倔痢ニ宜シ

○第五百四十方〔傑。過。栗。瓜的爾〕

加密列越幾斯上好亜刺毘亜護謨 各二錢　加密列水
五弓溶化加白罌粟舍利別半弓

〔右調〕勻毎一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕泄瀉及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十一方

Kitasato Memorial Medical Library

○黄蠟半弓　牛乳熱者半北溶化

右毎一時服一食匙

主治　秩蔑爾蒲魯屈人名及ヒ爾遏福傑兒同上ハ蠟ヲ熱乳ニ和用セリ然レ𪜈私傑福傑兒人名ノ言ノ如ク蠟ハ能ク乳汁ニ溶化セズ且痢疾ニ用ヒテ毎症適當スル者ニアラズ

○一千六百三十五年蒲拉伴突地名ニ於テ痢疾流行セシ時伊荅里亜國名ノ醫蠟一錢ヨリ三錢至熱乳ニ溶化シ與ヘテ甚偉效ヲ得第一服若クハ第二服ニメ之ヲ治セリト云フ

○第五百四十二方　私傑福傑爾

○黄蠟半弓　入臼中加微火烊解和雞子黄六箇及綿荅幾里私布水六弓為乳劑更加後呆

雜腹蘭舎利別一弓

右調和毎服一食匙臨用宜振盪

○第五百四十三方　越垤僅度

亜刺毘亜護謨末一弓　入石臼注熱湯適宜溶解加黄蠟

○三弓　能鴉和再加後呆

麗春花舎利別一弓　耋百兒越列幾秩兒附適宜味酸為度

右調勻毎一時服一食匙強

主治　右二方五百四十二方五百四十三方包攝劑トメ痢疾ニ用フ設兒

Kitasato Memorial Medical Library

忽弗滿人名 弇拂同 等ハ大ニ蠟製乳劑ヲ稱用セリ」越垤僅度氏ハ上方ノ鴻益アルヲ自驗セリ」今時ニ至テ此方全ク棄レテ用フル者ナシ

○第五百四十四方〔福倔篤〕

黃蠟 阿列襪油各二錢 入熱白烊解加鷄子黃一箇又

○徐々加微温湯四弓為乳劑加後藥

鹿琥精一錢半 舍電阿芙蓉液一刀 遏爾拖舍利別三錢

右調勻每一時服一食匙强

〔主治〕慢性下利及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十五方〔懣秩列〕

鷄子白六箇 水二北 攪和濾過加後藥

砂糖舍利別三弓 橙花水適宜

右調和應症用之

○〔主治〕懣秩列人名 雞子白ヲ以テ痢疾ノ奇藥トシ啻ニ之ヲ包攝劑トスルノミナラズ病中大ニ泄出スル所ノ蛋清質ヲ補給スル者トシテ稱賛シ大人ハ十二時間上方ヲ飲服セシムルヿ三壜乃至四壜小兒ハ二壜之ニ兼テ鷄子三箇ノ蛋清ヲ取テ水ニ和シ毎日小量ニ灌腸セシム

○○蹩倫篤人名 及ヒ其他伊荅里亞國名ノ醫モ亦上方ヲ用ヒテ良效ヲ得タリ」然レ𪜈悅別兒人名ハ獨之ヲ取ラス却テ

Kitasato Memorial Medical Library

之ヲ為ニ腹痛ヲ倍シ又惡心嘔吐ヲ起スト云フ

○第五百四十六方〔暴訥爾田〕

硝酸曹達（二錢至六錢）　遏爾拖煎六弓乃至八弓溶化

右調和每一時服一食匙

〔主治〕焮衝熱性痢疾ノ初起直ニ之ヲ用フ大抵奇藥トシテ之ヲ稱譽セリ

○第五百四十七方〔迷謁爾〕

硝酸曹達（半弓至一弓）　遏爾拖煎八弓溶化加後味

達剌侃篤護謨（八匁至半刀）

右調和每半時服一食匙

〔主治〕痢疾差焮衝熱性ヲ帶ブル者ニ宜シ

○第五百四十八方

精製曹達　硝酸曹達（各半弓）　蒸餾水八弓溶化

右調和每半時服一食匙

〔主治〕焮衝性膽液痢ニ宜シ

○第五百四十九方〔獵歇蘭度〕

亞剌毘亞護謨漿　遏爾拖舍利別（各一弓）　水（七弓）　舍電

阿芙蓉液（十六滴）

右調和每一時服一食匙臨急則每半時服一食匙

〔主治〕僂麻質斯性膽液性痢ニ宜シ但先吐根ノ吐劑ヲ與

Kitasato Memorial Medical Library

ヘ而後之ヲ用フヘシ

○第五百五十方〔弗。陽〕

加密列越幾斯　亜刺毘亜護謨各二錢　加密列水五弓

溶化加後件

○荅麻林度　加密列舎利別各一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕膽液性痢疾先吐劑ヲ與ヘ後之ヲ用フルニ宜シ之ニ兼テ加密列。甘草。亜麻子。等ノ泡劑ヲ與ヘ且下腹ヲ加密列浸劑ニ浸スヲ佳トス

○第五百五十一方〔獅歇蘭度〕

水製大黄丁幾六錢　精製硇砂二錢　櫻實水七弓　舎電阿芙蓉液二十滴　遏爾抱舎利別一弓

右調和毎一時服二食匙

〔主治〕腸胃性或ハ膽液性痢疾尿中塗渣ヲ見サル者ニ宜シ

○第五百五十二方〔同上〕

水製番木鼈越幾斯半刃　接骨木花水六弓溶化加後味

亜刺毘亜護謨漿　遏爾抱舎利別各半弓

右調和毎一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕痢疾ニ宜シ○獅歇蘭度氏ハ之ニ兼テ粘滑藥ニ阿

Kitasato Memorial Medical Library

芙蓉或ハ番木鼈越幾斯三氏乃至四氏ヲ加ヘ少許宛灌
腸セシム」小兒ハ十二時間ニ番木鼈ヲ用フルヿ二氏ニ
至ル○顯倔私篤呂母人名阿垤劉私同阿別爾兜歇爾同阿
私渦兒度同忽倫同倔刺歇私同等モ亦番木鼈ヲ賞譽シ
テ阿芙蓉ト配用ス」兒拂郎屈人名ノ如キハ番木鼈ニ一種
ノ奇效アリト稱ス

○第五百五十三方〔同上〕

亞兒尼加根末八刃　白糖四刃

右調勻為散等分八服毎一時一服

〔主治〕腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十四方〔列墨爾〕

亞兒尼加根半弓　熱湯適宜　浸漬八分時濾取八弓加沙
列布根末半錢冷水少許搗爛者煮沸令溶解放冷加
後藥

舍電阿芙蓉液一刃　橙皮舍利別一弓

右調和毎半時服一食匙乃至二食匙

〔主治〕神經性或ハ腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十五方〔僭設〕

紺百設木一弓　水一比煮耗至八弓濾過放冷加後藥
龍腦一刃加亞剌毘亞護謨漿適宜研和者

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎一時服二食匙

〔主治〕腐敗性痢疾ニ宜シ又鈍性神經熱。腐敗熱等ノ后泄瀉腹痛アラザル症ニ用フベシ

○第五百五十六方〔弗。傑醞私〕

水楊皮弓ニ水適宜浸漬一宿翌日煮半時濾過取二十弓或十六弓乘温加後藥

達剌侃篤護謨四刃　遏爾托舎利別一弓　橙皮舎利別半弓

右調勻毎半時温服半盞强

〔主治〕腐敗性或ハ鈍性神經熱性ノ痢ニ宜シ大便ニ臨テ腹痛裏急後重甚シキ者ハ此劑一弓中阿芙容液二滴乃至三滴ヲ加ヘ十二時間ニ二十滴乃至六十滴ヲ用フベシ○楊皮ハ二年乃至三年ノ枝ヲ撰ビテ春日之ヲ採收スヘシ弗。傑醞私人名此方ニ幾那モ亦用フト雖楊皮收斂ノ效差幾那ニ優レリトス

○第五百五十七方〔微兒栗暗斯〕

撒里矢捏五氏至十氏　白糖半刃

右調和為散分六褁毎服一褁日三次乃至六次

〔主治〕痢疾ニ施シテ後重ヲ除クニ宜シ○順症ニ於テハ撒里矢捏ヲ用ヒテ全功ヲ收ムルニ足レリ他ノ鎮痛收斂藥效アラザル者モ亦之ヲ用ヒテ癒ユ

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百五十八方〔噶拉收倭私〕

明礬末一錢　阿仙藥半錢　達剌侃篤護謨二刃　橙皮水八弓

遏爾托舍利別一弓

右調和毎服二食匙日二次乃至四次

〔主治〕痢疾ニ宜シ」○此ニ弗陽人名ノ說ヲ揭ク云ク

痢疾ニ明礬ヲ用フルハ之ヲ泄瀉ニ施スニ比スレハ更ニ謹慎ヲ加フヘシ明礬ノ如キ收濇藥ヲ與フベキ者十中一ニ過キザルベシ但明礬ハ腐敗痢ニ尤適當トス括隣君ハ之ヲ忌ト雖余ハ明礬ヲ以テ腐敗痢ヲ治セシヿ屢之アリ」腸胃清淨ノ症或ハ患者危篤ニ臨ミ諸液著シク溶渙シ。肌熱熾ニ渴甚シク。脈小ニメ震慄シ。舌苔乾燥黑色ニメ紋裂ヲ見ハシ且震慄スル者ハ明礬ノ效更ニ硫酸ニ優レルヲ證セリ」余ハ明礬ニ配スルニ安倔斯黜剌。西瑪劉拔皮。龍腦等ヲ以テセリ

○第五百五十九方〔同上〕

亞剌毘亞護謨半錢　生明礬　葛私加栗剌越幾斯各一錢

加密列水四弓　橙皮舍利別半錢

右調勻毎一時服一食匙强」

○第五百六十方〔嬰別兒〕

精製阿芙蓉半氏　明礬半刃　亞剌毘亞護謨末半錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散分八裹每一時半乃至二時服一裹

〔主治〕右二方（五百五十九方。五百六十方）八鈍性神經熱性及ヒ腐敗性ノ痢疾ニ宜シ

○第五百六十一方〔弗。陽（ヤン）倣設（セル）兒（ル）列〕

吐根（四分）　精製阿芙蓉（半氏）　龍腦（一氏）　白糖（半刃）

右調和為散分八服每一時乃至一時半一服

〔主治〕痢疾ノ末期本來ノ熱性已ニ減退シ唯腸ノ衰弱弛緩ノ為下利未已マザル者之ニ宜シ

○第五百六十二方〔弗。陽（ヤン）〕

葛（カ）私（ス）加（カ）栗（リ）刺（ル）皮（ラ）（二錢）　水適宜煮耗至四弓濾過加後藥

甘硝石精（四刃）　橙皮舍利別（半弓）

右調勻每一時服一食匙強

〔主治〕下利及ヒ痢疾後腸ノ焮衝證已ニ退キ唯腸ノ衰弱シテ屢泄瀉スル者之ニ宜シ

○第五百六十三方〔烏里（ウリ）倔（ク）土（ト）〕

新製枸櫞汁（三弓）　食鹽（適宜但飽和為度）　已上合勻加左味

加密（カミル）列（レ）氷（一比）　白糖（適宜甘呆為度）

右每二時乃至三時服一盞

〔主治〕慢性痢疾腐敗ニ傾ク症ニ宜シ○獨老私（ドラウス）（人名）ハ枸櫞汁ト油ヲ配用シテ痢疾ヲ治セシヿ百人ニ過タリト云

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ

○第五百六十四方〔忽百〕

硝酸一錢　精製阿芙蓉二氏　水二弓

右調和毎服一食匙粘滑藥液和服日四次

〔主治〕緩慢虚性ノ痢疾ニ宜シ○欲熅倔人名モ亦酸類ヲ稱

贊ス

○第五百六十五方〔没忍〕

鉛糖四氏　水製阿芙蓉越幾斯二氏至四氏

右蒸餾水二弓乃至四弓溶化

〔主治〕遏里遜人名　滮爾結同　没忍同　等慢性痢ニ鉛糖ヲ稱用

セリ」没忍人名ハ實症ニモ亦之ヲ用ヒテ良效ヲ得タリト

云フ

○第五百六十六方〔福倔列爾〕

桂皮末二錢　阿仙藥一錢　精製阿芙蓉一刃　吐根末半刃

右調勻為散日服三次乃至四次八氏十氏乃至十五氏

〔主治〕痢後ノ泄瀉ニ宜シ○此方藥局ニ命ノ各服ノ量ヲ

分タシムルヲ最好トス

○第五百六十七方〔求勞地名　邏的〕

番木鼈水製越幾斯四氏至六氏　桂水三弓乃至四弓溶化

右調和毎日服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

主治　痢疾後腸衰弱ノ泄瀉過多。食欲虧損等ノ症ニ宜シ

○第五百六十八方（福倔列爾）治痢灌腸方

阿芙蓉一匁　阿仙藥一匁　漿粉煎四匁

右調和供灌腸

○第五百六十九方（骨布）

外汞六分匁之一至三分匁之一　蒸餾水一匁　亜剌毘亜護謨漿一匁

半　精製阿芙蓉末一匁

右調和取一盞強微温供灌腸

主治　痢疾及ヒ慢性下利阿芙蓉及ヒ其他尋常藥效ナキ者ニ宜シ

○第五百七十方（私。傑。福傑爾）福倔列爾氏鎮痙軟膏

新鮮鹿脂或牛脂半匁　新鮮無鹽酪三錢　漿粉一錢　阿芙蓉末半匁

右微温熔和取榛子大挿肛門

主治　痢疾ニ用ヒテ裏急後重ヲ減スルニ宜シ○又海綿ヲ以テ微温乳汁。阿芙蓉丁幾。或ハ緩和温暖ノ油。ニ醮シテ久ク肛門ニ挿置スルモ亦好シ」又諸藥ノ蒸氣ヲ用フルモ可ナリ

○第五百七十一方（謁。忽倫）

纈草一匁　熱湯適宜浸漬濾過取八匁毎一時半取半盞

Kitasato Memorial Medical Library

微温射注肛門

〔主治〕痢疾裏急後重ヲ除クニ宜シ

○第五百七十二方〔過傑。栗屈的兒〕

阿列襪油二弓　硇砂加石灰精二錢　單方阿芙蓉丁幾半錢

○龍腦

右調和塗擦肚腹

〔主治〕腹痛ヲ治スルニ宜シ

○第五百七十三方

龍腦一錢燒酒適宜溶化者　香竄膏一弓〔附〕

○右調勻塗擦下腹

遠西方彙卷之五

遠西方彙卷之六

獨乙加。幾安頓著

和蘭傑。婪婆都譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

腹膜焮衝ペリトナイチス羅ボイクフリトス。オントステーキング蘭

網膜焮衝オメンチハス羅オントステーキング。ファン。ヘット。ダルム子ット蘭

腸間膜焮衝メセンテリチス羅オントステーキング。ファン。ヘット。ダルムシケイル蘭

右三症治法他ノ腹内諸器ノ焮衝殊ニ腸及ヒ肝焮衝ト異

Kitasato Memorial Medical Library

ナルヿナシ唯患者ノ稟賦熱ノ本性及ヒ合併病等ノ為異變化アルノミ」刺絡蜞鍼或ハ吸角法緩和温暖ノ琶布若クハ蒸劑消散軟膏ヲ塗擦シ發疱膏若クハ蒸餅母ヲ貼シ灌腸法微温全身浴等普通ノ治法トス殊ニ水銀膏ヲ稱用セリ若劇痛ノ為ニ之ヲ塗擦スルヿ能ハザレバ布ニ塗リテ肚腹ニ貼シ一時半毎ニ之ヲ替換スベシ」拔設獨優人名ノ法ニ倣フテ水銀膏ヲ内股腋下。兩膊ノ内側等他ノ部ニ交代シ擦スルモ亦可ナリ五百八十方」内服ハ乳劑五百十二方至五百十四方。五百三十一方至五百三十三方及ヒ甘汞（症ニ從フテ或ハ阿芙蓉ヲ加ヘ或ハ去ル）五百七十九方ヲ第一トス」篤優爾點亞兒人名嘗テ小兒ノ腹膜焮衝及ヒ其他腹内ノ諸焮衝ニ稱用セシ一方アリ之ヲ左ニ掲ク

（三）第五百七十四方（篤優爾點亞兒）

罌粟球煎二分半　新絞甘扁桃油一錢至二錢　亞刺毘亞蘧謨適宜為乳劑加後併

消石十五氏　阿芙蓉舍利別半分（附）

右毎半時乃至一時服一小兒匙强

肝焮衝ヘパチヽス羅レトフルオントステトキング蘭

症ニ從フテ全身及ヒ局處ノ瀉血ヲ行ヒ殊ニ肝臓實質焮衝セル者ハ直腸ニ蜞鍼ヲ施シ酸性下劑五百七十五方至五百七十七方

Kitasato Memorial Medical Library

清涼鹽類（五百七十八方）乳清ニ純精酒石（二百五十七方至二百五十九方）或ハ答麻林度ヲ加ヘテ製スル者ヲ與フベシ但永劑内服（五百七十九方）（五百八十方）ハ肝焮衝ノ主藥タリ」之ニ兼テ菲阿斯及ヒ失鳩答ヲ以テ亜麻仁末ニ合シテ温暖琶布ヲ施シ消散硬膏ヲ貼シ龍腦油ニ阿芙蓉丁幾ヲ伍メ塗擦シ發疱膏及ヒ煎餅母ヲ貼シ灌腸ヲ行ヒ以テ其治ヲ佐クベシ」通例胸中苦悶ノ症アリ炭酸剥篤亜斯ノ飽和液（一方）並ニ沸騰散（二方三方）ヲ用ヒテ効アリ（十一）此症吐劑ヲ用フルハ大抵危險ナリトス○慢性肝焮衝ハ解凝藥（五百八十五方）小量ノ甘汞（五百八十四方）微々水銀膏ヲ塗擦シ及ヒ鑛酸ヲ加ヘタル脚浴法（五百八十七方）等殊ニ佳トス

○第五百七十五方〔遠突土〕

答麻林度（一弓半）　純精酒石（半弓）　覆盆子舍利別（適宜）

右調和為煉膏朝夕服一小哥喜匙

〔主治〕肝焮衝及ヒ其他ノ焮衝病ニ清涼下劑トシテ之ヲ用フ

○第五百七十六方〔設兒列〕

上好満那（一弓）　加密列水九弓溶化濾過加後藥

答麻林度（三弓）

右調勻毎服半小盞日二次臨服宜振盪

Kitasato Memorial Medical Library

○第五百七十七方

孕硼酒石半弓　橙皮油糖一錢　水六弓溶化加後藥

答麻林度一弓半

右調勻每一時服二匙臨服宜振盪

主治　右二方ハ肝脾ノ焮衝。膽液熱等ニ清涼下劑トシ用ヲ又酷厲膽液ノ刺戟ヲ制スルニ宜シ我邦多ク之有ルガ如キ輕易ノ肝焮衝ハ汞劑ヲ要セズ大抵蜞鍼及ヒ緩性ノ下劑ヲ用ヒテ足レリ

○第五百七十八方

消石半錢　純精酒石六錢　白糖半弓

右調和為散每服一茶匙強日二三次

主治　血脉系及ヒ膽系ノ焮衝性刺衝ニ宜シ

○第五百七十九方（俗密兒傾）

甘汞六匁至十二匁　精製阿芙蓉二匁至四匁　白糖二錢

右調和為散等分六裹每一時乃至二時服一裹

主治　肝焮衝及ヒ他ノ焮衝症殊ニ腹裏諸器ノ焮衝劇度ノ者ニ宜シ此方ヲ用フルトキハ放血ヲ除クノ外大抵他ノ諸藥ヲ要スルヿナシ甘汞ヲ服ノ后若緑色ノ大便ヲ瀉ストキハ更ニ其量ヲ減メ連服セシメ以テ流涎ノ前兆ヲ見ルニ至ルベシ或ハ全ク甘汞ヲ休メ之ニ代ヘテ

Kitasato Memorial Medical Library

蒲公英越幾斯或ハ蘆根越幾斯ヲ孕鹼酒石若クハ醋酸加里液ヲ配用シ或ハ答麻林度等ヲ與フベシ

○第五百八十方

水銀膏

右供塗擦藥

主治　焮衝症ニ水銀膏ヲ擦スルハ設爾列人名捉縵同上拔設獨優同上ノ倫試驗シテ確定セル所ナリ拔設獨優氏放血及ヒ對症ノ劑ヲ連進シ兼テ四分時乃至一二時毎ニ水銀膏二刃乃至一錢ヲ取テ漸次ニ四肢或ハ身幹ニ塗擦セリ但之ヲ塗ルハ皮膚細毛ノ向方ニ循フベシ肝肺胸膜及ヒ肺管喉頭ノ焮衝、義膜咽喉焮衝。脊髓若クハ眼耳焮衝羅斯等並ニ皆之ヲ施ノ殊ニ佳ナリ○腋下ニ塗擦スレハ吸收ノ能力最速ナリトス

○第五百八十一方

甘汞　龍腦各六氏　亜刺毘亜蘰謨末一錢

右調和為散等分六包毎服一包日二次乃至三次

主治　虚性肝焮衝衰弱甚シキ者宜シ

○第五百八十二方　過傑栗屈的兒

甘汞　金硫黄各一氏　失鳩答葉末六氏　白糖半刃

右調和為散分八服朝夕一服

Kitasato Memorial Medical Library

主治　肝焮衝ノ末期動輙閉塞ヲ生スル者アリ此方之ヲ消散スル宜シ

○第五百八十三方　列乙屈

鹽酸二錢　煎餾水八弓　覆盆子舍利別二弓

右調和毎半時取一食匙水或燕麥汁和服

主治　劇性焮衝ニ用フ焮衝熱モ亦之ニ宜シ

○第五百八十四方

甘汞六匁　菲阿斯越幾斯一刃　失鳩答越幾斯半刃　大黄末半錢

右調匀為三十丸衣石松粉毎一時半服一丸

主治　慢性肝焮衝及ビ肝ノ硬結腫ニ宜シ又子宮ノ壅塞及ビ定ニ起因セル月經太過ノ症並ニ子宮硬結腫ニ用

○第五百八十五方

蒲公英越幾斯　白屈菜越幾斯各一錢　純精酒石半弓

主治　栗薩水四弓

右調匀毎一時服一食匙

主治　慢性肝焮衝及ビ肝臓硬結腫ノ初起之ヲ連進スヘシ

○植物ノ絞汁及ビ弇拂氏ノ灌腸法モ亦兼用スヘシ

○第五百八十六方　思屈拔爾託

Kitasato Memorial Medical Library

○護謨安没尼亞幾　白屈菜越幾斯　各一錢半　勿搦祭亞石

鹼一錢

右調和為丸丸衣石松粉毎服八丸乃至十五丸日三

次

主治　腹裏ノ壅塞症又慢性肝焮衝後肝臟腫起セル症等

ニ宜シ此丸料一劑ニ大黃末一錢ヲ伍スル者諸症ニ通

○用之西藥適當ス

○第五百八十七方　私抄篤

鹽酸一弓　消酸藥舗ニ鬻者三弓

右調和加脚浴湯但浴湯酸味似醋為度

主治　肝脾脺ノ慢性焮衝ニ宜シ○患者脚ヲ浴スル𪜈四

分時ヨリ半時ニ至リ爛斑ヲ發シテ休ム但隔日之ヲ行フ

合シ

脾焮衝　スプレニチス羅　ミルトオンステーキング蘭

此症醫治大抵肝焮衝ニ同シ強實ノ人及ヒ此他或ハ刺絡

ヲ施スヘキ者モ亦間之アリト雖通例脾部或ハ肛門ニ蜞

鍼ヲ施スヲ要トス消石及ヒ殊ニ吐藥ヲ用フルヿヲ忌ム里

歇利飲方一十満那ニ答麻林度ヲ加ル者五百七十六方或ハ純精酒石

五百八十八方解釋越幾斯劑ニ緩性中和鹽ヲ加ヘ四十九方至五十五方五百八

十五方或ハ水製大黃丁幾ヲ加ル者等ヲ與フヘシ甘汞及ヒ

Kitasato Memorial Medical Library

水銀膏ハ特ニ急性ノ眞脾焮衝及ヒ腹膜外被ノ焮衝ニ稱用ス○慢性脾焮衝ハ鑛酸脚浴五百八十七方ヲ好トス之ニ次テ解凝丸五百八十六方ヲ佳ナリトス間歇熱ニ起因セル者ハ苦味越幾斯劑。幾那。規尼捏三百三十九方至三百四十一方ヲ與ヘ其後鐵劑及ヒ莨菪ヲ用フルヲ適當トス

○第五百八十八方〔遠突土〕

答麻林度一弓半　純精酒石半弓　覆盆子舍利別適宜

右作煉膏朝夕服一哥喜匙

〔生治〕脾焮衝及ヒ他ノ焮衝症ニ宜シ

膵焮衝パンクレアチヽス羅オントステーキング。フロン。デ。ボイクスペークセルキリール蘭

適宜ニ消焮法ヲ處シ痛所ニ屢蜞鍼ヲ施シ。緩和鎮痙ノ琶布水銀膏消散硬膏ヲ用ヒ。灌腸ヲ施ノ大便ヲ利スベシ内服ニ甘汞。炭酸剥篤亜斯五百八十九方緩性解釋越幾斯劑ニ老利兒水ヲ加ル者五百九十一方。五百九十一方。菲阿斯越幾斯等ヲ用ヒ兼テ乳汁ヲ飲マシムルニ宜シ○慢症ハ鑛酸脚浴五百八十七方殊ニ良トス沃甘謨膏或ハ水銀膏等ヲ塗擦スルモ亦佳ナリ

○第五百八十九方

炭酸剥篤亜斯或孕鹼酒石一錢　黙栗薩水四弓溶化加橙花舍利別半弓

右調和毎一時乃至一時半服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

第五百九十方

蒲公英流動越幾斯三錢　孕鹼酒石半弓　蒸餾水四弓溶化加老利兒水一錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

第五百九十一方

珊篤里越幾斯　蒲公英越幾斯各錢　醋酸加里液半弓　老利兒水一錢　黑櫻實水四弓　大黃舍利別半弓

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

第五百九十二方

老利兒水一錢至二錢　覆盆子水一弓半　覆盆子舍利別半弓

右調和每服一茶匙日四次

試効第五百八十九方ヨリ五百九十二方至急性膵焮衝

宜シ

第五百九十三方（鹿爾盤）

炭酸剥篤亞斯或孕鹼酒石二錢　默栗薩水五弓溶化加後藥

單方阿芙蓉丁幾三滴至六滴　複方橙皮越栗失爾半弓（附）

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

試効膵ノ慢性焮衝及ヒ硬結腫ニ宜シ兼テ水銀膏ヲ塗擦スベシ

Kitasato Memorial Medical Library

腰筋嫩衝ヅ。フヲン。デ。プソアス。スピール　蘭

最消嫩ヲ治法即刺絡吸角法及ヒ蛆鉞ヲ施シ精製滑石方丸至十方。五ヲ用ヒ灌腸廿五方至ヲ三方清涼瀉藥廿四方至廿七方。六ヲ用フルカ如キヲ佳トス

行ヒ又症ニ從テ發表劑ヲ與ヘ以テ分利ヲ促ス〔ベシ〕即晩ニ方ヲ飲爾散等ヲ用フルカ如キヲ佳トス

腎嫩衝ヲ羅ニル蘭ニ於テハ煙栗斜水亞ヲ容ル

刺絡ヲ行ヒ。蛆鉞ヲ施シ。亞麻仁。錦葵葉。菲阿斯葉。失鳩答ノ緩和鎮痙蒸劑ヲ施シ。微温浴ヲ行ヒ。蒸餅毋ヲ貼シ。水銀膏或ハ菲阿斯油ニ阿芙蓉ヲ幾ト龍腦ヲ和シ塗擦スル「ヘシ」肉服ス沙列布。邇爾託。蘆根等ノ粘滑煎或ハ舍電白煎。三百八十一方

油性粘滑ノ乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ル者。老利兒水。菲阿斯越幾斯等五百八方。五百十方ニ或ハ甘汞。又症ニ應シ阿芙蓉丁伍ス〔ル〕者三百九十四方。五百七十九方或ハ少量吐根百廿五方。百廿七方或ハ龍腦五百十六方等ヲ與フ〔ヘシ〕便秘セル者ハ答麻林度ニ滿那ヲ加ヘ者五百七十六方。蓖麻油五百九十六方等ニ宜シ〔シ〕但消石。炭酸酒石。硝砂諸種ノ中和鹽。酸類。殊ニ芫菁硬膏ノ如キ總テ利尿ヲ進ムル所ノ諸藥ハ悉皆之ヲ忌ム

○第五百九十四方〔邇。傑。栗屑的兒〕

甘扁桃去皮者　白罌粟子各半ヲ　加水一北揚爛作乳劑

加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

亜刺毘亜蘧謨三錢　遏爾托舍利別半弓

右調和毎服半小茶碗

〔主治〕腎焮衝。膀胱焮衝等ニ宜シ

○第五百九十五方〔私越秩鑵爾〕

達刺侃篤蘧謨漿二弓至三弓　熱湯一北　遏爾托舍利別一弓

右調和毎服半小盞日三次乃至四次或數次

〔主治〕腎焮衝。膀胱焮衝。小便不利。麻疾等ニ宜シ

○第五百九十六方〔依。拂朗屈〕

新絞蓖麻油二弓　亜刺毘亜蘧謨漿六錢

右調和後徐々加遏爾托煎一北毎半時服一小盞強

〔主治〕腎焮衝。膀胱焮衝。及ヒ其他ノ症ニ緩下劑ト為シ用フ

膀胱焮衝キスチヽス羅ブラース オントス テーキング蘭

此症治法總テ腎焮衝ニ同シ」小便閉止セルトキハ葛爹的兒ヲ後ニシテ先膀胱ノ部。會陰。肛門。ニ蜞鍼ヲ施シ。微温浴及ヒ局處蒸氣浴。鎮痙罨法及ヒ塗擦藥ヲ施シ緩和劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘテ灌腸スル等ヲ以テ其焮衝ト痙攣ヲ除クヲ專務トス」之ヲ治スルノ主藥モ亦甘汞阿芙蓉ノ合劑三百九十四方。五百七十九方トス」即左ニ二方ヲ掲ケテ以テ其治ヲ補フ

○第五百九十七方

Kitasato Memorial Medical Library

○大麻子三錢至六錢　苦扁桃四個　加水二北搗爛作乳劑加白罌粟舍利別二弓

右毎日飲服

主治　諸粘液膜殊ニ膀胱尿道ノ粘液膜焮衝及ヒ痳ニ宜シ

○第五百九十八方

大麻子三弓　遏爾托一弓　錦葵葉四弓

右細剉合勻取一食匙强以水四盞乃至六盞煮毎日飲服之

主治　上ニ同シ

子宮焮衝メトリチス羅オントステーキンダ。デル。バトルムードル蘭

卵巣焮衝オハポリチス羅オントステイキンダ。ファン。デン。エイエルストック蘭

右二症治法他ノ腹臓焮衝ニ同シ然レ𪜈子宮焮衝ハ産婦ニ最多々之アルカ故ニ殊ニ此ニ注意スルヲ要ス大概此兩症ニ於テモ亦甘汞ニ阿芙蓉ヲ配伍スル甘汞一氏阿芙蓉四分氏三日ニ三次ヲ首藥トス別ニ余ガ著ス所ノ一書アリ就テ參照スベシ

僂麻質斯レウマチスミュス羅レウマチスミュス蘭

僂麻質斯ヲ以テ神經病ニ附屬スルモ亦故ナキニアラズ然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

Kitasato Memorial Medical Library

意ヲ以テ之ヲ觀レハ此條ニ列序スルヲ適當トス碩學噦(アヽ)。
遏(アヽ)脩設(ハーセ)人名モ亦此症ヲ以テ焮衝性ノ病トセリ○急性僂麻
質斯其症焮衝性ノ熱ヲ帶ヒ而メ疼痛劇甚ナル者ハ刺絡
ヲ施シ且痛所ニ放蜞スルヲ簡要トス」放血後若放血ヲ要セザル者ハ
初メ治療ヲ下ス時謁(エ)忽倫(ホルヌ)人名メ歷驗ニ從ヒ數次吐藥ヲ用ヒテ奇効
アリ吐藥ハ其激動ノ爲ニ他ノ神經系ニ交感シテ誘導ノ
効ヲ奏スレバナリ」大率每二十四時吐劑ヲ與ヘテ八日乃
至十四日或ハ更ニ日ヲ延クモ三週ヲ出ズシテ平治セシ
ヲ經驗セリ」然レ𪜈其性質ニ由テ吐藥ヲ用フベカラザル
者ハ忽倫(ホルヌ)氏ニ倣フテ適宜ノ瀉藥ヲ連用スベシ亦能ク吐

劑ニ代リテ良効アリ○乾度閨(ゲンドリ)人名ハ大量消石六百二方ヲ以テ
僂麻質斯ヲ療ス此法予カ見ヲ以テスレハ特ニ急性焮衝
症ニ適當シテ慢性症ニハ相應スベカラス」格爾利侃(ルリガン)人名ハ
急性ノ關節僂麻質斯ニ大量阿芙蓉ヲ處セリ此治法更ニ
疑フベシト雖獨乙ノ醫モ亦佳効ヲ見タリト云フ六百七方○
熱勢劇シカラザル者ハ大抵民垤(ミンデレ)列里精五方。廿二方。廿九方至卅一方吐
酒石十八方。廿一方。卅二方。卅三方。六百一方等ノ如キ發汗劑ヲ用ヒテ驗アリ」
其急症變ノ慢性トナル者ハ殊ニ雙蘭菊六百四方至六百六方適當
ス○急性僂麻質斯ニ外用法ヲ施ストキハ大ニ謹愼ヲ加フ
ベシ」弗剌涅兒(フラ子ル)毛布名或ハ毛皮ヲ以テ患部ヲ纏ヒ或ハ木綿

Kitasato Memorial Medical Library

ニ香竄藥末ヲ撒ノ覆フモ亦可ナリ」急症變ノ慢症トナル
ヰハ乳香。琥珀。杜松子。芸香。等ノ薫法ヲ好トス」嫩衝性已ニ
退キテ其症慢性ニ傾クヰハ芫菁膏芥子泥モ亦並用シテ
可ナリ」塗擦法。浴法。硬膏等ハ急性僂麻質斯ニ於テ危險ナ
ルガ故ニ必施スヿ勿レ◯慢性僂麻質斯ハ大率頑滯シ易
シ其藥劑モ亦大量ニ與フルヲ稱譽ス但蒸發氣ヲ催進シ
兼テ他ノ排泄分利ヲ扶ケ或ハ鎮痙ノ効ヲ兼ル者ヲ撰用
スベシ」必初メ緩劑ヲ處シ漸次峻藥ニ移ルヲ通則トス」外
用ノ方法殊ニ塗擦藥及ヒ硬膏ノ如キハ大ニ此ニ適應ス」
此他僂麻質斯ヲ治スルノ方法枚擧ニ遑アラズ左ニ揭ル

所ノ方劑ニ就テ閲スベシ服量用法其最要ナル者ハ各方
附考アリ

○第五百九十九方（孤刺律私）栗布失煙斯氏病院用發汗
飲料
接骨木花二弓　過泥子一錢
右細剉合勻取一錢水一北浸出
主治　聖京倔及ヒ僂麻質斯ニ宜シ

○第六百方（同上）栗布失煙斯氏病院用發汗
密幾斯去爾
接骨木花二錢　熱湯適宜浸漬濾取五弓加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

民垤列利精六錢　屋施蔑爾半弓　甘硝石精二匁至一錢

右調勻每一時服一食匙

主治　聖京倔及ヒ僂麻質斯劇熱ナキ者ニ宜シ

○第六百一方

精製消石半弓至一弓　吐酒石一氏。二氏至三氏　接骨木花水四弓溶化加ニ後藥

屋施蔑爾半弓

右調和每一時服一食匙

主治　急性僂麻質斯ニ宜シ之ヲ用ヒテ吐逆ヲ發スレハ更ニ良効アリ

○第六百二方

精製消石半錢　大麥煎二北溶化加ニ後味

蜜去泡沫一弓

右調勻每日飲服

主治　焮衝性僂麻質斯ニ宜シ乾度閼人名ハ總テ僂麻質斯ヲ療スルニ大量消石罩味ヲ多量ノ水ニ溶化シ用フ此

用法　消石末ヲ服シ或ハ其稠厚溶液ヲ用フルガ如キ害アルヿナシト雖之ヲ上方ノ如ク配合スレハ皮膚腎或ハ腸ノ分利機ヲ進メ脈軟トナリテ疼痛モ亦鎮定ス○

私多別爾人名モ亦此方ヲ好トセリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百三方〔實的里屈〕

葛兒儒別新絞汁（莖葉俱絞者二弓）　橙花舍利別（一弓）

右調和每一時服一茶匙乃至一食匙

〔主治〕急性僂麻質斯宜ㇾ

○第六百四方〔扑虎私〕

雙蘭菊越幾斯（六瓜至十二瓜）　纈草浸六弓（浸纈草半弓製者）溶化加

後藥

民垤列利精（一弓）　雜腹蘭舍利別（半弓）

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕僂麻質斯症微熱ノ者ニ宜シ

○第六百五方〔弗。陽。之徒〕

雙鸞菊越幾斯（半錢至一錢）　安質没尼酒一弓溶化

右調匀朝夕服十五滴乃至二十滴

○第六百六方〔嬰別兒〕

雙鸞菊越幾斯（一刃至半錢）　格兒失屈謨子酒半弓溶化

右調和每服十五滴乃至二十滴日四次

〔主治〕右二方（六百五方六百六方）急性及ヒ慢性僂麻質斯ニ宜シ

○第六百七方〔結爾私典〕

精製阿芙蓉（一瓜）　白糖（半刃）

右調和為散分六服每一時半一服

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕急性關節僂麻質斯ニ宜シ○二患者内臓ニ焮衝及ヒ熱証等ヲ帶ヒザルヿ確著ナル症ニ結爾私典氏阿芙蓉ヲ試用セリ用法初毎一時半一氏漸ク加ヘテ一氏半ニ至ル此ノ如ク之ヲ用ヒテ良効ヲ得タ其ニ宜シ

○第六百八方　布律母蔑爾氏變機散

甘汞　金硫黄各六氏　白糖二錢

右調齊為散等分六包朝夕服半包乃至一包

〔主治〕慢性僂麻質斯。依倔篤。慢性皮膚病。瘰癧等ニ變機劑ト用フベシ○砂糖ニ代ヘテ麻倔涅失亜半錢ヲ加フルモ亦可ナリ

○第六百九方　布律母蔑爾氏變機丸

甘汞　金硫黄各半匁

右調和二氏為一丸衣甘草末朝夕服二丸

〔主治〕同上

○第六百十方　狨歇蘭度發汗散

精製硫黄二錢　金硫黄　龍腦各八氏　白糖二錢

右調和為散毎服一刀尖強日二次乃至四次

〔主治〕頑固ノ聖京倔。僂麻質斯及ヒ依倔篤症ニ宜シ

○第六百十一方　狨歇蘭度

癒瘡木脂三錢　硫黄乳　勿搦祭亜石鹼各一錢　蜀羊泉

Kitasato Memorial Medical Library

越幾斯（適宜）

○右二氏為一丸衣石松粉朝夕服十丸

主治　僂麻質斯症熱ナキ者ニ宜シ」兼テ左ノ外用法ヲ處スベシ」患部ヲ温覆シ或ハ弗刺涅兒（毛布名）獸毛。毛皮（但野猫皮）ヲ用ヒ（カテズ）等ヲ以テ之ヲ纏ヒ硇砂揮發膏ヲ塗擦シ（但龍腦ハ）

○（内陷ヲ促シ易キガ故ニ加フルヿ勿レ）菲阿斯（ヒオス）硬膏ニ阿芙蓉ヲ配伍セル者

三十九方　ヲ貼シ疼痛劇シキ者ハ鎮痙琶布ニ宜シ但之ヲ貼スルヿ一二時ニ過グベカラズ然ラサレバ或ハ慢症ニ變シ或ハ化膿シ易ケレバナリ」又芫菁膏ハ更ニ偉効アリトス」局處ノ瀉血ハ唯患部ニ赤熱アル者ノミ施スベシ○冷慰法及ヒ鉛劑ハ能ク速ニ疼痛ヲ減ズト雖病毒ヲ轉移シテ危險症ヲ誘起シ或ハ慢性局處病ヲ誘發スルナリ

○第百十二方（斯屈列西爾）

雙鸞菊越幾斯　癒瘡木脂　勿搦祭亞石鹼（各一錢）

右為六十丸衣石松粉毎服三丸日四次乃至五次

○第百十三方（別連杜）

癒瘡木脂（二錢）　亞刺毘亞蘧謨（三錢）　蒸餾水（七弓）　蜀羊泉

流動越幾斯（三錢）　遏兒托舍利別（一弓）

右調勻毎一時半服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百十四方〔狨歇蘭度〕

癒瘡木脂半錢　雙鸞菊越幾斯一氏　枸櫞油糖一刃　純精

酒石二刃

○右調勻為散分六包分一包為三服早旦午後及日晡一服

○第六百十五方〔穀優蘭篤〕

金硫黃二氏　癒瘡木脂　茴香子各二刃

○右調和為散等分八服朝夕一服

○第六百十六方〔狨歇蘭度〕

癒瘡木脂二弓　蜀羊泉莖半弓　水二北煮耗至一北半濾

過加後藥

升汞半氏　遏兒拖舍利別二弓

右調和每一時服半小盞日盡半劑

○第六百十七方〔薄剌狩斯〕

格兒失屈謨子丁幾　單方癒瘡木丁幾各三錢

右調勻每服三四十滴日三次

○第六百十八方〔謁墨利頻〕

癒瘡木加糖精丁幾

癒瘡木脂半弓　上好糖精一北至二北〔附〕

右入器蓋閉安暖所飽熟八日濾過每服一食匙日一二次

〔主治〕第六百十二方ヨリ六百十八方至皆僂麻質斯無熱

頑固ノ症ニ効アリ　癒瘡木ハ殊ニ粘液質ノ人ニ適當シ

Kitasato Memorial Medical Library

且依倔篤僂麻質斯混淆セル症ニ佳ス」癒瘡木ヲ多量ニ與フルトキハ瀉スル者之アリト雖尚之ヲ廢スルヿ勿レ

○第六百十九方〔獵歇蘭度〕

升汞二氏　蒸餾水適宜溶化加後藥

精製阿芙蓉二氏　白蒸餅心　蜜去泡沫各適宜

右為六十丸衣石松粉毎服三四丸日二次

〔主治〕蓮珍人名質列惆斯同上ノ輩慢性僂麻質斯ニ殊テ升汞ヲ稱用セリ」癒毒合併ノ症ニアラザルモ亦効アリ六百五十三方及ヒ六百五十四方ヲ參照スベシ

○第六百二十方〔弗肸爾田蒲蘭度〕

雙鸞菊越幾斯　金硫黄各半錢　阿魏一錢　蒲公英越幾斯適宜

右三氏為一丸衣石松粉毎服三丸日三次

○第六百二十一方〔婠兒栗松〕

格兒失屈謨根三氏至六氏　上好吐根末　薄荷油糖各半刃

右調和為散分六服蠟紙包裹朝夕一服

○第六百二十三方〔謁忽倫〕

鹿角油半錢　忽弗滿液二錢

右調勻毎一時乃至一時半服十五滴乃至三十滴

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕第六百二十方ヨリ六百二十二方至慢性關節僂麻質斯ニ宜シ

○第六百二十三方〔附〕私託兒氏神經丁幾

加里丁幾一錢　鹿琥精半錢

右調和每服十滴至三十滴燕麥汁半盞和服日三四次

〔主治〕僂麻質斯頑滯セル症ニ宜シ○此他私託兒人名ハ此丁幾劑ヲ以テ諸種ノ慢性病神經系及分泌器ノ運營不調ヲ兼ル者ヲ治セリト云フ

○第六百二十四方〔狨歇蘭度〕

含硫加爾幾安質沒扭半錢　達剌侃篤護謨漿適宜

右為六十丸衣石松粉每服五丸日二次

〔主治〕頑滯セル液質變性病。汞毒及ヒ其他諸種ノ鑛毒。腹臟壅塞。經久僂麻質斯等ニ宜シ

○第六百二十五方〔同上〕

肝油一名謁格栗斯亞設爾利油六弓

右每服一食匙日二次乃至四次

○第六百二十六方〔蒲列歇兒度〕

白肝油〔附〕依斯巴尼亞酒各四弓　亞剌毘亞蘧謨一錢

〔主治〕作乳劑加後藥

橙皮舍利別一弓　薄荷油糖二錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調匀毎服二食匙强日二三次臨服宜振盪

〔主治〕右二方（六百廿五方　六百廿六方）ハ經久僂麻質斯及ヒ依倔篤殊ニ分泌失常或ハ關節强拘セル者ニ宜シ（甲）肝油ヲ單用スル時ハ後薄荷少許ヲ與ヘ或ハ薄荷餅一二箇ヲ喫セシムベシ（合）肝油茶褐色ノ者之ヲ白色ノ者ニ較レハ其効力峻烈ナリト雖其味ニ至テハ白品ヲ佳トス（六百五十五方）

○ヲ參照スベシ

○第六百二十七方

葛兒儒別越幾斯　甘草末（各一錢半）　達剌侃篤蘧謨漿（適宜）

右為九十丸衣伊里斯弗魯連底那末毎服四丸日四次

〔主治〕慢性僂麻質斯ニ宜シ

○第六百二十八方（烏篤薛爾）甲方

硫黄亜爾箇兒（一錢）　再餾燒酒（半弓）

右調和毎一時服四十滴乃至六十滴

○第六百二十八方（同上）乙方

硫黄亜爾箇兒（二錢）　龍腦精（二弓）

右調和朝夕塗擦

〔主治〕此方僂麻質斯熱ナキ者或ハ熱微ナル者ニ宜シ（六百四十四方ヲ參照スベシ）

○第六百二十九方（別爾列印地名歇蠶屈）

Kitasato Memorial Medical Library

○敝度里阿達私剥篤亜斯一錢　蒸餾水四弓　砂糖舍利別一弓

右調和毎服一食匙日三次

主治　慢性僂麻質斯筋膜ニ係在セル者之ニ宜シ」關節ヲ侵スノ症ハ此方通例効アルヿナシ○又歇鑑屈人名ハ此方骨膜焮衝僂麻質斯ニ起因セル症ニ特効アリシヲ經驗セリ」骨膜ニ係リテ頭痛腰痛等ヲ發シ患部腫起シテ感觸過敏ナル者ヲ治セシヿ毎々之アリ」殊ニ一患者嚮ニ癥毒ヲ患ヒ爾後數回冒寒セシヨリ頭痛裂カ如ク兼テ左鼻骨腫起シ左ノ第五對神經第二枝別ノ彌蔓セル部總テ麻痺セル者ヲ平治セシ効確實ナリ其症ヲ療セシヰ歇鑑屈人名之ヲ診スルニ鑿骨ヲ被フ所ノ厚腦膜第五對神經第二枝ノ卵圓孔ヲ貫キテ膣ヨリ出ル部腫脹セル處アリ之ニ因テ前ノ癥毒ト後ノ僂麻質斯トニ着眼ノ敝度里阿達斯剥篤亜斯ヲ與ルヿ上方ノ如ク又半面ノ痛處ニ沃胃謨軟膏ヲ塗擦セリ之ニ由テ二三月ノ後患者平癒セリ○以上ノ數症ヲ療セシヰ敝度里阿達斯剥篤亜斯ノ量毎服六瓜日ニ三服スト云フ

○第六百三十方　屈律見別爾倔

○癒瘡木脂揮發丁幾　鹿琥精各二錢　阿芙蓉丁幾一錢

右調勻毎服十五滴乃至二十滴燕麥汁和服日三次

Kitasato Memorial Medical Library

主治　僂麻質斯齒痛ニ宜シ

○第六百三十一方　狨歇蘭度

癒瘡木脂半錢　硫黃乳半匁　純精酒石一錢　枸櫞油糖一匁

右調和為散分四裹朝夕服半裹

主治　僂麻質斯ノ素因アル者其症數々發作スルヲ防ク

ニ宜シ三週乃至四週毎ニ二三日此方ヲ服シ以テ毎日

一三行瀉スルヲ度トス之ニ兼テ日々冷水ヲ以テ全身

ヲ浴シ且遍體ヲ摩挲シ屢々襯衣ヲ換ヘ清淨ノ空氣ニ

觸レ身体ヲ運動セシムルヲ好トス

○第六百三十二方

琥珀　乳香各二錢

右調勻為粗末取半哥喜匙強撒敷患所以弗剌涅兒被覆

之

○第六百三十三方

龍腦粗末一錢　香竄合劑一弓

右調和用法同前

○第六百三十四方

安息香　鵠栗拔奴謨　乳香　龍腦各一錢

右調和為粗末玻璃壜收貯用法同前

主治　第六百三十五方ヨリ六百三十四方至慢性僂麻質

Kitasato Memorial Medical Library

斯及ヒ依屈篤ニ宜シ

○第六百三十五方　鑣典利篤氏吐酒石軟膏

吐酒石一錢　薔薇軟膏或家猪脂一錢四錢或六錢

右調勻作軟膏

主治　鑣典利篤氏原之ヲ百日欬ニ稱用セリ胡桃大ヲ取リ心窩ニ塗擦スルコト日ニ三次又他ノ諸病ニ於テ皮膚ニ峻烈ノ反對刺戟ヲ要スル者之ヲ用ヒテ可ナリ

○第六百三十六方　吐酒石硬膏

吐酒石一錢　癒創膏三錢至六錢

右丁寧捏和

主治　吐酒石軟膏ヲ用フル者ト一般ノ症ニ宜シ

○第六百三十七方　顯乃

吐酒石二刃　升汞二氏　家猪脂半錢

右調勻作軟膏以温暖弗刺涅兒毛布名摩挲肌膚以至見赤色擦之

主治　尋常ノ吐酒石軟膏ヲ用フル者皆之ヲ施シテ可ナリ蓋軟膏ニ比スレハ皮膚ヲ刺衝スルノ効速ナリトス

○第六百三十八方　骨布人名白降汞軟膏

白降汞一錢至四刃　實芰答利斯軟膏

右調和作軟膏塗擦日三四次以緑布被覆其部

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕吐酒石軟膏ニ代用シテ可ナリ然レ𪜈其効彼ニ較スレ公差緩ナリ」慢性僂麻質斯病。頑滯セル依倔篤。頑固ノ嘶嗄。氣管勞ノ初起。慢性肺臓聖京倔。百日欬。其他概ノ皮膚ニ誘導スルヲ要スルノ諸症皆之ニ宜シ

○第六百三十九方〔顯乃〕吐根膏

吐根末　阿列襪油各半弓　家猪脂七錢半

右調勻作軟膏塗擦八分時間日三四次

〔主治〕皮表ニ誘導シテ發疹セシム」之ヲ擦シテ十八時内外ニ其部小疱ヲ發シ二三日ノ後薄痂ヲ結フ」吐酒石軟膏ヲ用フルノ症皆此方ヲ用ヒテ可ナリ然レ𪜈其効力更ニ緩ナルガ故ニ殊ニ小兒及ヒ婦人ニ適當トス

○第六百四十方

水銀硬膏　默印失屈篤人發汗硬膏〔附各半弓〕

右調和攤革

〔主治〕腰痛及ヒ僂麻質斯性痔疾腰上ニ之ヲ貼ス

○第六百四十一方〔臧歇蘭度〕

瓦爾拔奴謨硬膏〔附一弓〕　龍腦　石腦油　揮發鹿角鹽

精製阿芙蓉各半錢

右捏和攤革貼痛所

〔主治〕慢性僂麻質斯ニ用ヒテ鎮痛ノ効アリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百四十二方〔羣的爾〕〔過爾泥蔑爾〕加爾幾加爹爾硬膏

黃蠟一錢半　烊解加後藥

爹爾一弓　格碌波尼亞〔附〕半弓　勿搦祭亞的列並底那三錢

丁寧調勻暫時冷定再加後味

○含硫加爾幾安質沒扭三錢

右攤革貼之當候自然剥落

〔主治〕所謂歇兒蘧蘭度地名依倔篤硬膏是ナリ此方ハ頑固ノ僂麻質斯諸症即胯痛腰痛顏面痛或ハ肺患焮衝ヲ帶ヒザル者喘息其他諸種ノ症ニ用ヒテ屢偉効ヲ得タリ

此硬膏ハ最解散ノ効アリ但之ヲ貼スレバ皮膚小疹ヲ發スル者多シ

○第六百四十三方〔獵歇蘭度〕

煙草葉一弓　水十六弓煮耗至八弓濾過微温慰患所

〔主治〕慢性僂麻質斯ノ疼痛ヲ鎮静スルニ偉効アリ

○第六百四十四方〔烏篤薛爾〕

硫黃亞爾箇兒二錢　阿列襪油或硇砂揮發加龍腦膏二弓

右調勻朝夕塗擦

○〔主治〕慢性僂麻質斯ニ宜シ第六百二十八方ヲ參照スベシ

○第六百四十五方〔福倔篤〕

蟻精〔附〕龍腦精各一弓半　芫菁丁幾一錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和温煖塗擦

〔主治〕虚性僂麻質斯。麻痱。等ニ宜シ

○第六百四十六方

硇砂揮發膏　老利兒油軟膏〔附〕各半弓　的列並油　龍腦各一錢　阿芙蓉丁幾一錢

右調和塗擦

〔主治〕慢性僂麻質斯ニ宜シ

○第六百四十七方

肝色硫黄二弓

右分ニ六劑入ニ玻璃壜ニ與之水適宜煮加ニ浴湯一

〔主治〕慢性僂麻質斯。依倔篤。皮疹。ニ宜シ。○浴ニ臨テ稀硫酸四弓ヲ加フベシ

○第六百四十八方〔没乙失束欲屈斯〕

德烏多沃胄謨一刃　家猪脂三錢

右調勻為軟膏塗擦

〔主治〕關節僂麻質斯。關節白腫。膝膕水腫。關節靭帶ノ腫起。關節海綿腫等ニ宜シ其他關節ノ疾患ニ消焮法ヲ外用ノ焮衝証退キタル者之ニ宜シ

○第六百四十九方〔速兒蒲里倔〕

安質没尼酒　格爾失屈謨酒各半弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和小兒至二歳者大抵毎服六滴。自三歳至七歳者毎服十滴乃至十五滴毎一時半用之

〔主治〕僂麻質斯性胸脇痛。心膜焮衝初起。僂麻質斯性嘶嗄及ヒ耳痛。其他小兒僂麻質斯病ニ宜シ。其症極メテ頑固ニシテ疼痛アル者ハ雙鸞菊越幾斯二三氏ヲ配伍スベシ。其症ニ隨ヒ先吐劑或ハ下劑ヲ與ヘテ可ナリ

胯痛（イスキアス○コキサグラ羅ヘウプウエー蘭）

此症唯僂麻質斯ノ變症ト見做スベシ故ニ其治法モ亦概シテ僂麻質斯ト一般タリ。輕易ノ症ハ毛布ヲ以テ關節ヲ纏ヒ腰上ニ發疱硬膏ヲ貼シ發汗劑ヲ服セシメテ全治スル者多シ然レトモ殊ニ此症ハ的列並油ヲ内外施用スルヲ賞譽セリ（六百五十六方至六百五十八方）更ニ焮衝証ヲ見ハストキハ腰ニ蜞鍼或ハ吸角法ヲ施スヲ最切要トス。(宜)神經性胯痛ハ發疱膏長六獨乙謨幅二獨乙謨乃至三獨乙謨ノ者三枚ヲ作リ一ハ腰ノ外部疼痛ノ經ニ循フテ之ヲ貼シ一ハ其后二三日ヲ過テ膝ノ上部外側ニ貼シ尚或ハ之ヲ要スル者ハ前ノ發疱癒ユルノ后其第三枚ヲ取テ更ニ外踝ニ貼スベシ

〔主治〕

○第六百五十方〔狨歇蘭度〕

安質没尼丁幾（三錢）　癒瘡木脂揮發丁幾（半弓）

Kitasato Memorial Medical Library

阿芙蓉丁幾一錢

○右調和毎服三四十滴燕麥汁和服日四次臨服宜振盪

〔主治〕胯痛ノ餘症ニ格椿尼氏ノ療法ヲ施シテ后之ヲ用フル宜シ

○第六百五十一方〔弗。陽。倣弗栗〕

雙鸞菊越幾斯二氏至四氏　硼酸一刃

右調勻為散分八包朝夕服一包

〔主治〕僂麻質斯慢症殊ニ胯痛腰痛ニ宜シ○方今硼酸ヲ用フルヿヲ廢セリ盖之ヲ棄ル者恐ラクハ未其効驗ヲ究メザル乎弗。陽人ノ名ノ説ニ云々此方胯痛腰痛ヲ治スルノ効速ニシテ且確實ナルヿ他ニ較スベキ者ナシ二三服ニシテ大ニ緩快ヲ覺ユル者多シト

○第六百五十二方〔葛。弗。歇兒綿私篤戻土〕

格魯林加爾幾一錢半　蒸餾水四弓

右調勻毎一時服一食匙強

〔主治〕頑固ノ神經性僂麻質斯。腰痛。胯痛等之ニ宜シ

○第六百五十三方〔斯屈列西爾〕

升永二氏　曼陀羅華越幾斯二氏至三氏　蒸餾水一弓半溶解

○右調勻毎一時服三十滴乃至五十滴

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百五十四方〔蒲。斯屈禰垤爾〕

升汞二八　桂水一弓半融解

右調勻每一時服三十滴乃至五十滴

〔主治〕右二方ハ胯痛假症。僂麻質斯顏面痛。其他總テ頑滯セル僂麻質斯及ヒ神經痛ニ宜シ六百十九方ヲ參照スベシ〔宜〕蓋爾噦刷屈斯人名ノ論ニ據レバ升汞ハ眞ノ胯痛ニ用ヒテ効アルヿナシト云フ

○第六百五十五方〔律私篤〕

肝油四弓至六弓

右頓服

〔主治〕經久僂麻質斯或ハ依倔篤ニ宜シ殊テ僂麻質斯性胯痛ニ効アリ其症頑固ノ者モ亦之ニ宜シ〔律私篤氏肝油ハ胯節ノ神經ニ一種ノ奇藥ト稱ス用法患者眼ヲ瞑シ鼻孔ヲ覆フテ毎朝之ヲ服シ直チニ冷水ヲ以テ含漱シ哥喜一盞ヲ飲シム〕此ノ如ク之ヲ用ヒテ數週間持重スレバ云フ第六百二十五方及ヒ第六百二十六方ヲ參照スベシ

○第六百五十六方〔茉爾質涅篤〕

的列並乳

的列並油三錢　鷄子黃一箇　薄荷舍利別　橙花舍利別各二弓　舍電阿芙蓉液半錢至一錢

右調勻每服一食匙强日三次

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百五十七方〔同上〕

的列並油三錢　鷄子黄一箇　薄荷水二弓　橙花舍利別一弓

舍電阿芙蓉液半刃至一錢

右調勻每服一食匙日二三次

〔主治〕右二方胯痛ニ宜シ○昔者既ニ的列並油ヲ胯痛ニ用ヲ殊ニ今ヲ距ルヿ三十年茉爾質涅篤人名之ヲ稱賛シ患者七十人ヲ集メ此方ヲ用ヒテ治セル者五十八人就中五十五人ハ之ヲ内服セシメ餘ノ三人ハ之ヲ塗擦セリ○此他佛蘭西獨乙ノ醫モ亦的列並油ノ効アルヲ確定セリ蓋多クハ其服量ヲ減少シ敷母別兒倔人名等ノ如キハ十五滴乃至二十滴ヲ用フルヿ日ニ三次スト云フ

○然レ𪜈余ハ的列並油ヲ用フルニ之ヲ煆製麻倔涅失亜ト合シ封糊ヲ以テ包裹シ服スルヲ最妙トス

○第六百五十八方〔忽默〕

的列並油一錢　橙花舍利別或精製蜜一弓

右調齊朝夕服一食匙

〔主治〕胯痛ニ宜シ○魯西亜ノ俗間ニ的列並油十二滴乃至十五滴ヲ以テ沙蘿蔔浸ニ和用スト云フ

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之六

遠西方彙卷之七

獨乙加幾安頓著

和蘭傑婆都譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

第三　熱性皮疹

痘瘡ファリオラ羅ポッケン蘭

痘瘡ノ治法大概其熱性ニ準ス攝養總テ清涼ニ宜シク病室常ニ風氣ヲ閏通スルヲ要トス但最注意シテ賊風ヲ避

Kitasato Memorial Medical Library

之ヲ要ス但風席ヲ開閉スルニ要イテ如何ヲ斟
單純良性ノ瘡ハ唯適宜清涼ノ攝養ヲ命ス。植物類ノ食餌。
稀釋ノ効アル飲劑蘆根煎汁。撰爾都兒水ニ乳ヲ和スル者。扁桃乳等
大便ヲ順利セシメ（其症ニ從ヒ旃那煉膏一茶匙ニ茶匙與フルモ可ナリ）大抵別ニ
醫藥ヲ須ズシテ經過シ去リ餘症ヲ遺スノ「ミ」但病未灌
膿ノ期及ヒ結痂ノ時ニ至ルカ下劑若クハ緩和灌腸ヲ施
シテ大便ヲ增多セシムルヲ簡要トス」起脹ニ至リテ擂劑
ヲ發スル者ハ亞鉛華六百六十四方（小量吐根六百六十方）若クハ小量吐根六百六十方
五方ヲ用フヘシ」然レトモ瘡瘡ハ大抵燃衝性殊ニ初期ヲ見ハス者
多シ燃衝性ノ症ハ硝砂ヲ以テ水液若クハ乳劑
ニ和シ與ヘ若燃衝性更ニ增劇シ或ハ局處燃衝ヲ發スル
ヤ瘢血小人（刺絡ニ宜シ）」灌膿ノ期ニ至ルマテ緩和消
燃ノ處置ニ從ヒ已ニ其期ニ至リ清涼中和鹽六百六十方
（苔麻林六百六十方）度ヲ屢ゝ瀉下セシムルヲ要
ス又此期ニ於テ鑛酸ヲ稱用ス六百六十七方但鑛酸ヲ用フルキ
ハ甘汞ヲ屏クヘシ」瀉ハ結痂ノ期ニ及ヒテモ亦持重スヘ
シ之ニ由テ能ク其餘症ヲ防止ス此時ニ當リテ最甘汞ヲ
稱用ス㊀腸胃瘀物鬱滯症ハ中和鹽醋酸加里液四十九方精製
孕嬰酒石五十三方。六百六十一方旃那煉膏（附）等ヲ用フヘシ」或ハ
其症ニ從ヒ初メ吐劑ヲ與フルモ佳ナリ㊁神經性ノ症ハ

Kitasato Memorial Medical Library

即神經熱ノ治ニ從フ」其攝養焮衝痘ニ較レハ更ニ温暖ヲ加フヘシ」其藥劑ハ民垤列里精。乳劑ニ龍腦ヲ伍スル者六百六十六方纈草六百六十九方攝爾扁太里亞。亞兒尼加六百七十方阿芙蓉。麝香六百七十一方幾那等ヲ稱用ス○腐敗痘ハ通例灌膿ノ期ニ至テ腐敗ニ傾タカ故ニ幾那。亞兒尼加。鑛酸類。明礬等ヲ以テ揮發刺衝藥ニ配用スルヲ要トス

○第六百五十九方〔弗。陽。倣私託爾結〕

民垤列里精一弓　安質没尼酒一錢

右調匀毎一時服四十滴乃至八十滴

〔主治〕痘瘡。麻疹。赤癍熱。總テ熱性皮疹病生力衰憊。肌熱足ラズ。且潰瘍ヲ兼ヌル者之ヲ用ヒテ發生シ易カラシム」此方大人ノ用ニ充ツ小兒ハ其服量ヲ減スベシ

○第六百六十方〔弗。陽。倣獵歇蘭度〕

孕驗酒石　麻倔涅矢亞各一錢　精製消石半刃　滿那六錢

蒸餾水二弓

右調匀毎一時服一茶匙

〔主治〕小兒ノ焮衝熱腸胃熱等清涼緩和及ヒ瀉ヲ要スル者之ニ宜シ殊テ生齒熱。聖京倔熱。順性痘。麻疹。赤癍熱。ニ用フベシ

○第六百六十一方〔獵歇蘭度〕

Kitasato Memorial Medical Library

○孕鹼酒石一錢半至三錢　蒸餾水二弓　滿那舍利別一弓

安質没尼酒二十滴

右調勻毎一時服一茶匙

〔主治〕痘瘡序熱ノ期之ヲ用ヒテ毎日瀉二行ヲ得ベシ○

適宜ニ甘汞ヲ與フルモ亦佳ナリ小兒ハ半氏乃至一氏大人ハ二氏乃至三氏ヲ服スル日ニ二三次トス

○第六百六十二方

○燐酸曹達二錢至三錢　覆盆子水四弓溶化加後藥

覆盆子舍利別六錢

右調勻毎一時服一食匙弱

〔主治〕痘瘡腸胃汚物ヲ夾ム者之ヲ用ヒテ瀉ヲ促スベシ

殊ニ八歳乃至十二歳兒之ヲ與フルニ宜シ○燐酸曹達

小兒ニ與ヘテ甚適當トス其効力甚緩ニシテ兼テ小

〔兒〕多クアル所ノ酸敗液ヲ制スルガ故ニ尤妙ナリ

○第六百六十三方〔遠突上〕

荅麻林度一弓至二弓　水適宜煮四分時濾過取六弓加

○滿那舍利別一弓

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕焮衝性痘ニ下劑トシ用ヒテ好シ大人小兒倶ニ通

用スベシ

Kitasato Memorial Medical Library

○第六百六十四方

亜鉛華三氏至六氏　白糖一錢

右為散等分六服日二服乃至三服

○第六百六十五方

吐根末三氏至六氏　白糖二錢

右調和為散等分十二裹每一時服一裹

〔主治〕右二方六百六十四方六百六十五方嬰兒痘瘡序熱ノ期皮膚ノ痙攣ヲ鎮メ又搐掣譫語ニ宜シ序熱ノ時期搐掣譫語ヲ發スル者往々之アリ此方ニ兼テ微温浴。腓腸蒸餅母。足蹠蒸溻法ヲ施スベシ」大兒モ亦供用スヘシ

○第六百六十六方〔弗。陽。倣。獵歇蘭度〕

亜鉛華　龍腦各一氏至二氏　甘汞半氏至一氏　白糖半刃

右調匀為散分八包每一時乃至一時半服一包

〔主治〕痘瘡見點ノ期熱微ニ。皮膚慘憺弛緩シテ冷。脉小。軟。

〔主治〕シテ震ヒ或ハ非常ニ遲。且痘點出没スル者之ニ宜シ」

大人此症ヲ得ル者ハ死ス

○第六百六十七方

收斂亜的兒一刃至半錢　覆盆子水六分　覆盆子舍利別一分

右調匀每一時服一小兒匙或一食匙

〔主治〕痘瘡灌膿ノ期膿熱旺盛。肌熱太甚。脉實ノ症之ニ宜

Kitasato Memorial Medical Library

シ大兒及ビ大人俱ニ其症ニ從テ之ヲ通用スヘシ

○第六百六十八方〔遠突土〕

龍腦六瓜　亜刺毘亜蘆謨漿　遏爾把舎利別各一弓　徐

○第六々揑和加扁桃乳四弓

右毎一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕十歳以上ノ兒童痘瘡鈍性神經熱狀ヲ帶フル者ニ

〔宜シ〕

○第六百六十九方〔同上〕

纈草二錢　熱湯適宜浸漬濾取四弓加後味

鹿琥精一錢　橙花舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕大兒ノ虚性痘ニ宜シ

○第六百七十方〔同上〕

亜兒尼加花一錢半　熱湯適宜浸漬濾取五弓加後藥

舎電阿芙蓉液六滴至十滴　亜刺毘亜蘆謨末　白糖各二錢

右調勻毎半時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕大兒痘瘡鈍性神經熱狀ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第六百七十一方〔遏傑栗屈的兒〕

上好麝香三瓜　舎電阿芙蓉液二十滴　鹿琥精三十滴　雜

腹蘭舎利別一弓半

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻每一時乃至一時半服一茶匙

〔主治〕神經性痘灌膿ノ期俄然ト陷凋スル者此方危險ヲ防クニ宜シ○涅優滿人名ハ此ノ如キ症ニ甘汞。葯剌巴脂各半刃ヲ用ヒテ之ヲ瀉シ以テ生命ヲ救フト云フ○葯剌巴脂ハ研末シ難キヲ以テ葯剌巴脂布剌巴落篤葯剌巴脂。甘扁桃。等分ヲ優レリトス但シ其服量ヲ一倍スベシ○栗屈的兒氏涅優滿氏ノ方ハ皆大人ノ服量ナリ

○第六百七十二方〔遠突土〕

王幾那一弓　水適宜煮八分時濾過加亜剌毘亜蘧謨末二錢

右調和取其四分一加水半小盞灌腸日三四次

〔主治〕小兒神經性痘ニ宜シ

○第六百七十三方〔私託爾結〕

鉛糖八氏　薔薇水二弓

右醮重布罨眼胞

〔主治〕眼焮衝ヲ防グニ宜シ

○第六百七十四方〔弼德禰爾〕

升汞三氏　煎餾水三弓溶化

右供罨法

〔主治〕痘毒眼ニ入ルヲ防キ且面部ノ結痂ヲ順良ナラシ

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕

○第六百七十五方〔涅優滿〕

龍腦半刃　加亜的兒二錢丁子油六滴溶化

右調和醮重布卷眼

〔主治〕痘瘡見點ノ期眼痛スル者或ハ結膜已ニ赤點ヲ見ハシ或ハ角膜ニ暗黒斑ヲ發スル者ニ宜シ

○第六百七十六方〔理篤卓〕

硼砂二錢　覆盆子舎利別二弓

右調和塗口中或供舐藥

〔主治〕痘瘡灌膿ノ期口内灼熱スル者ニ宜シ又覆盆子水四弓ヲ加ヘテ含漱劑ニ供ス

○第六百七十七方〔福倔篤〕

雞子黄二箇　新鮮無鹽酪三弓　没藥末　私百兒末攝多末各二錢

以文火煮至爲褐色以綿布絞濾加後藥

拔爾撒謨孛露半錢

右調勻塗痘顆間

麻疹ヒルビルリ羅マーゼレン蘭

痘瘡ニ在テハ其危險ヲ預防シ順良ノ經過ヲ得セシメンガ爲ニ清涼保護ヲ以テ治療ノ第一義トスレ𪜈麻疹ハ則之ニ反シテ適宜ニ温覆シテ以テ皮膚ノ運營ヲ催進スル

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ要トス」序熱ノ期搐掣ヲ發スルトキハ耳後ニ放蜞シ甘汞ヲ與ヘテ微瀉セシメ下肢ニ煎餅母ヲ貼シテ屢之ヲ交換スベシ」爾後欬嗽及ヒ眼焮衝アリテ退カザル者ハ殊ニ注意シテ治ヲ加フベシ」此他其病性ニ從フテ宜ク應當ノ治法ヲ立ツベシ

○單純順良ノ麻疹ハ醫藥ヲ須ズ」唯第六百七十八方乃至六百八十方ヲ與ヘテ欬ヲ制シ旃那煉膏（附）若クハ他ノ清涼下劑二三服ヲ與ヘテ大便ヲ進メ以テ功ヲ收ムルニ足ル者多シ」但其攝養ハ通例熱病ノ處置ニ從ヒ刺戟衝動ノ性ナク清涼食餌ヲ撰用シ飲料ハ枸櫞汁及ヒ砂糖ヲ湯ニ和スル者或ハ覆盆子煎汁。燕麥汁。大麥汁。遏兒抱根若クハ歇爾拔私屈謨花ノ煎液。接骨木花浸。菩提樹花浸。和胸浸劑其他熱勢ヲ緩和シ適宜ノ發表浸劑（五百九十九方）ヲ用フベシ」欬嗽劇甚ノ者ハ哥攝尼爾（六百八十一方）ヲ殊ニ稱賛ス○焮衝性ヲ見ハス者ハ刺絡及ヒ局處放血ヲ要スル者多シ肺臟。氣管喉頭。或ハ腦焮衝ヲ兼併スル者ノ如キハ殊ニ然リ」此他消石ヲ水或ハ粘滑煎液ニ溶化スル者（九方至十三方）硇砂ヲ度（ドロップ）碌布及ヒ吐酒石ニ配伍スル者（廿方。廿一方）結晶水（四方）清涼下劑（六方。十五方。十六方。五十六方至六十方）或ハ其症ニ從ヒ甘汞ヲ與フベシ但此諸藥熱勢ト患者ノ年齡ニ準シテ酢酌スベシ○腸胃汚物ヲ夾

Kitasato Memorial Medical Library

此者ハ稀釋劑ニ宜シ四十九方至五十三方吐下劑モ亦可ナリ五十四方至七十二方

○神經性麻疹ハ其初期衝動劑甚害アリ唯小心シテ消燃治法ヲ持重スベシ若麻疹俄ニ内陷スル時ハ衝動藥並ニ揮發鹿角鹽六百八十三方麝香六百八十四方等ヲ要スル者間之アリ然レ田予ハ此ノ如キ極メテ危險ノ症ニ温茶ヲ與ヘ兩足ヲ蒸湯シ。暖桶若クハ暖布ヲ以テ身體ヲ温保シ。屢諸部ニ蒸餅母ヲ貼スル等甚簡易ノ方法ヲ以テ其内陷ヲ喚起シ危急ヲ救ヒシヨリ往々經驗スル所ナリ

○第六百七十八方〔鞍歇蘭度〕

安質没尼酒三十滴　孕鹼酒石一錢半　接骨木花水二弓

遏兒托舍利別一弓

右調和毎一時服一茶匙

〔主治〕三歳内外ノ兒單純麻疹第一期ノ者之ニ宜シ

○第六百七十九方〔同上〕

扁桃油新絞一錢　水二弓　亜刺毘亜護謨漿適宜　作乳劑

○加後藥

菲阿斯越幾斯二氏　扁桃舍利別一弓

右調勻毎一時服一茶匙

〔主治〕四歳乃至六歳兒ノ麻疹欬嗽甚シキ症ニ宜シ

○第六百八十方〔躬孤〕

Kitasato Memorial Medical Library

甘扁桃油　亜刺毘亜護謨漿各半弓　遏爾把舍利別一弓

右調和每半時服一茶匙

〔主治〕麻疹ニ用ヒテ欬嗽ヲ防グニ宜シ」之ニ兼テ痙攣劇シキ者ハ菲阿斯越幾斯二氏ヲ加フ

○第六百八十一方　〔私孤戾歇爾〕

哥攝尼爾五氏　純精酒石半匁　白糖半弓　熱湯三弓

右調齊小兒每一時服一哥喜匙強大人一食匙強

〔主治〕麻疹欬嗽劇甚ノ者之ニ宜シ」越印結人名モ亦之ヲ稱用セリ

○第六百八十二方

民垤列里精　遏兒把舍利別各半弓　安質没尼酒一錢半

菩提樹花水三弓

右調匀每一時服一兒匙或一食匙

〔主治〕麻疹第一期頗神經性ニ傾ク者之ニ宜シ

○第六百八十三方　〔毘私蒲律屈〕

揮發鹿角鹽二錢　接骨木花水六弓溶化加ニ後藥

龍腦醋適宜。飽和為度　接骨木子昆設兒弗一弓

右調匀每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕大人麻疹神經性ノ者或ハ内陷セル者ニ宜シ　○内陷ニ由テ内部焮衝ヲ發スル者獨此方ヲ用フルトキハ害

Kitasato Memorial Medical Library

アリ此種ノ症ハ大抵放血シ消石及ヒ皮膚刺戟法（芥子泥發）
（疱膏）ヲ適當トス而シテ焮衝証退クノ后發表劑ヲ與ヘテ專
麻疹ヲ再發セシムヘシ之ヲ發スルハ龍腦消石ヲ配伍
ス者最佳ナリ

○第六百八十四方　〔獵歇蘭度〕

麝香（六氏）　白糖（一錢）　研和加後藥

〔鹿琥液（六十滴）〕　接骨木花水（五弓）　扁桃乳舎利別（一弓）

右調和毎半時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕神經性麻疹内陷シ尋テ痙攣ヲ發スル者ニ宜シ但
此服量ハ大人ノ用ニ充ル者ナリ

○第六百八十五方　〔叔列夫爾〕

雙鸞菊越幾斯（一氏）　乳糖（一錢）

右調勻爲散等分十二裹毎服半裹乃至一裹日三次乃至
四次

〔主治〕麻疹血行暴劇ノ症此方之ヲ鎮静セシメ脈至及ヒ
心悸疾速ヲ制スルニ宜シ此症雙鸞菊ノ奇效アル怪シ
ムヘキニ似タル者屢之アリ○此方小兒大人俱ニ用ヒ
テ害アルヿナシ

○第六百八十六方　〔同上〕

雙蘭菊丁幾（滴）　蒸餾水（一弓）

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每服一茶匙日三四次

○〔主治〕上方ニ同シ

○第六百八十七方〔聆孤〕

默印失屈篤發表膏〔附〕菲阿斯硬膏各半弓

右捏和攤革貼頸圍

〔主治〕麻疹輕易ノ扁桃腺焮腫ヲ兼發スル者ニ宜シ

○第六百八十八方

榠楂核汁一錢半　薔薇水二弓

右調和為眼水

○〔主治〕麻疹淚液酷厲ニシテ眼ヲ侵蝕スル者此方之ヲ防グニ宜シ

○第六百八十九方〔遏傑。栗屈的爾〕

失鳩荅越幾斯　精製硫黃各八氏　菲阿斯越幾斯二氏

白糖十二氏

右調和為散分十二裹每服一裹日三次

〔主治〕麻疹後慢性ノ乾欬アリテ嘶嗄スル者ニ宜シ按スルニ此方假令大人ノ用ニ供スルモ方中失鳩荅ノ量過多ナリ況ヤ小兒ニ於テヲヤ若峻力ノ越幾斯ヲ製藥局ヨリ得テ之ヲ用フルヿ此ノ如クノ多量ナル氏ハ恐ラクハ其益アルヨリ害ヲ招クヿ多カルベシ予慢性ノ胸

Kitasato Memorial Medical Library

患ヲ療スルニ先弗刺涅兒ヲ以テ胸部ヲ被覆シ發疱膏ヲ貼シテ冬々之ヲ持重シ或ハ打膿膏ヲ貼シ次テ摂兒都爾水ニ乳汁ヲ和スル者或ハ單味乳汁或ハ乳養法ヲ處ス患者若強ヒテ醫藥ヲ求ムルトキハ粘滑液ニ菲阿斯越幾斯若クハ歇爾蘭獨留謨越幾斯ヲ和シ與フ」其他此症ニ用フル所ノ方法肺勞條下ニ列載ス

猩紅熱シカルラチナ羅シカルラトケンコールツ蘭

此症大抵緩性消焮法ヲ處シテ的當トス假令微寒ト雖之ヲ冒スヨナク三四週間病床ニ在テ適宜ニ温覆シ時候良ナルモ落痂後八日至ハ病室ヲ離レズ時候濕冷ナレハ十四日至病室ニ在ラシムベシ」病ノ第一期ニ於テ吐劑ヲ稱用スル者多シト雖モ予ハ之ヲ取ラズ」殊ニ單純症ニ於テハ吐藥ヲ過タリトシ焮衝症ハ必害アリ神經性症ニ至テハ尤然リトス」故ニ獨腸胃汚物鬱滯ノ候尤較著ノ症吐劑ヲ用ヒテ可ナリ蓋其症モ亦適宜ノ清涼下劑ヲ優レリトス

○輓近硇砂華ヲ以テ六百九十一方猩紅熱ノ奇藥トシ諸種ノ症ニ稱賛セリ

○焮衝性猩紅熱ハ瀉血消石清涼下劑甘汞ヲ尤佳トス及ヒ清涼ノ洗滌法ヲ要ス然レモ洗滌法ノ如キハ毎常之ヲ施スニ謹慎ヲ加フベシ

Kitasato Memorial Medical Library

○腸胃汚物症ハ思窒倔栗都人名ノ方六百九十三方ヲ差改製シ施シテ最適當トス○神經性ノ症ハ鑛酸類殊ニ格魯林水五百九十四方冷滌法及ヒ鳩魯利氏ノ灌水法私昆列印氏ノ説ニ據レバ其症發疹遲滯シ或ハ發見セズ假令發スルモ僅々且灰白色ニシテ忽復消滅シ皮膚乾燥シテ灼熱アリ頸若クハ胸部ニ畜血アラザル者獨灌水法ヲ施スベシヲ以テ纈草。摂爾扁太利亞。龍腦。亞的兒。等ノ如キ衝動藥ニ優レリトス衝動劑ハ稀ニ眞ノ良効ヲ奏スルノミ極メテ惡症ト雖モ簡易法ヲ施スヲ最佳トス

○一千八百四十八年頂鱸歇爾地名ノ叔涅滿人名創メテ猩紅熱ノ治法ヲ發明シテ世ニ公ニセリ其法頭面毛髮ノ生スル部ヲ除クノ外朝暮遍體家猪脂ヲ塗擦ス之ヲ施スヿ病初第一日ヨリ始ムベシ此法功用未嘗テ此治法ノ害アルヲ見ス三件アリ一ハ之ニ由テ肌膚ヨリ他ノ病邪ヲ再感スルヿナク又白屑ヲ剥落セシムルヿナシ二ハ皮膚ノ運營絶エス他部殊ニ頸ニ交感シテ其部ニ良能ヲ呈シ之ニ由テ患者毎常暫時ニシテ癒ユ設日ヲ延クモ十日ヲ過クレハ外氣ニ觸ルルモ危險ノ證ヲ發スルヿナシ三ハ發病第三日乃至第四日ヲ過クレハ即疹消散ノ後他人ニ傳染スルノ恐レナシ何者病毒ノ殕殖ヲ制シ且其發揚ヲ防止スルニ因ルナリ私屈涅滿人名此法ヲ施スニ必病者ニ命メ左ノ三件ヲ守ラシム第一患者冷室ニ居リ列氏驗温器十三度ニ過ヰス毎日數次牖戸ヲ開キテ

Kitasato Memorial Medical Library

清氣ヲ延キ病床ニ在テモ亦其被覆暖ニ過クベカラス〔第二〕發疹ノ期熱ヲ帶フル間ノミ患者床中ニ居リ此期ヲ過クレバ即床ヲ出ツベシ但衣服暖ニ過ベカラズ〔第三〕惟熱アル時ハ嚴ニ食養ヲ守リテ稀淡ノ肉羹汁。熟果。白薫餅及ヒ冷水等ヲ用フベシ○此他大ニ頭腦ニ關係アル症ハ私屈涅滿人名刺絡及ヒ頭ノ寒罨法。薫餅母ヲ稱用シ肉服ニ硇砂ヲ與フ」咽喉ニ焮衝アレハ蜞鍼ヲ施シ吐劑ヲ與ヘ扁桃腺上ニ刺必私印歇爾那栗斯ノ溶液ヲ塗擦ス○良醫毛篤涅耳人名伊私屈禰滿ノ法効驗アルヲ論述セリ」噎別爾篤人名モ亦便列印地名ノ病院小兒局ニ在テ施治セシ時或ハ平日モ亦屢此法ヲ試驗シテ切ニ之ヲ稱賛セリ○獨頂鑑歇爾地名ノ奴別連突人名ノ之ニ反シテ異論アリ蓋其説頗學理ニ基ケリ

○猩紅熱ノ餘症殊ニ水腫ヲ預防スルニ白屑剥脱ノ時期ニ方テ温浴ヲ施ス者アリト雖咩私涅爾人名等ハ之ヲ不可ト」布列私彪爾倔地名ノ弗。格呂乙歇爾人名今ヲ距ルヿ殆ト年前自驗ノ一法ヲ世ニ公ニセリ之ヲ行フ時ハ後患ヲ防グノ效的實ナルベシ其法白屑始メテ剥落スルノ翌日午後ニ方リテ入湯法ヲ施スナリ但湯ヲ盈滿シテ患者ノ頤ニ及バシメ其温度ハ患者ノ意ニ適セシム」患者暫時湯中

Kitasato Memorial Medical Library

ニ在リテ冷ユルヲ覺ユルニ至レハ即遍身ヲ拭ヒ乾カシ暖床ニ就キ茶二碗ヲ温服セシメ愼テ十分ノ發汗ヲ俟シム」又翌日ハ其温二度ヲ減シテ之ヲ行ヒ爾後モ尚此法ニ隨ヒ毎湯二度ノ温ヲ減ズ」第三湯或ハ第四湯ニシテ患者ニ許シテ起立シ且室中ヲ歩セシムルヿ半時間」其次日ハ日中病床ヲ離レシメ又其次日ニ至レハ午前モ亦病床ヲ離レシム」第七湯ヲ經レハ近傍ノ凉室ニ出ツルヲ許シ美日ニハ晩間始メテ外氣ニ觸レシムルヿ八分時又其次日ハ入湯ヲ停メ屢新清氣ニ浴セシム但賊風及ヒ窻邊ヲ避クベシ」又其次日入湯セシメ湯後及ヒ次日（此日ハ入湯セズ）モ亦外ニ出テ逍遥セシム其後更ニ最後ノ湯ヲ施スベシ法ノ如ク之ヲ施シ來レハ其最後ノ浴湯ハ大抵發病第二十日或ハ二十二日ニ抵ル」嬰兒ハ入湯ニ代ヘテ洗浴ヲ行フモ亦可ナリ但其温度モ亦逐次ニ減シテ冷ナラシムベシ」此法ヲ施ストキハ舊肌膚軟化シ新肌膚ノ觸覺機減殺シ且其肌膚モ亦速ニ冷氣ニ習慣スルナリ」是故ニ此治法ハ啻ニ後患ヲ預防スルノミナラズ未之ヲ行ハサル時或ハ之ヲ行フノ際ニ方テ假令餘症ヲ發スルモ亦能ク之ニ因テ治スルナリ」水腫ヲ發セシ者大人ニ在テハ間瀉血ヲ要スルアリ小兒ハ（急性腦水腫ヲ除クノ外）之ヲ施スベキ者更ニ罕ナリ」内服

Kitasato Memorial Medical Library

ハ甘汞ニ實芰答利斯ヲ配スル者七百八方實芰答利斯浸ニ醋酸加里ヲ加フル者七百四方純精酒石七百二方刺發斯根七百五方七百六方杜松子及ヒ杜松子傑列乙等ヲ與フ」外用ハ足蹠ニ的列並油ヲ塗擦ス

○第六百九十方〔別跨突篤〕

莨菪越幾斯一匹　桂酒水〔附〕半弓溶化

右調和一歳兒朝夕與二滴乃至三滴其他從年齡毎一歳加一滴

〔主治〕猩紅熱ノ預防方トナス服量十二滴ヲ極トス」猴歇蘭度人名設爾呂同匹篤矢葛弗土同等モ亦其效ヲ確定セリ

○第六百九十一方

硇砂華一錢至二錢　薫餾水五弓溶化加後藥

遏爾托舍利別一弓

右調勻毎四分時乃至半時服一兒匙若一食匙既防得危險證後毎一時與之但臨服宜振盪

〔主治〕拍遏爾土人名微魯巾選同微的綸倔同弗歇印私別爾倔同爾噦索斯同叔列矢爾同弗暗門同母私德落兒同等此方ヲ稱譽シテ諸種猩紅熱ノ諸期ニ用フ」此方ヲ數回反覆シ用ヒテ四劑ヨリ五劑ニ至ル復他藥ヲ兼用スル

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ需メス

○第六百九十二方〔叔列眒傑爾〕

吐根末半錢至一錢　熱湯適宜飽熟四分時濾取一弓半加

後藥

覆盆子舍利別半弓

右調和毎八分時服一哥喜匙強

〔主治〕猩紅熱ニ宜シ○此方吐逆ヲ起サズシテ能ク熱ヲ解シ咽喉痛ヲ緩和ス

○第六百九十三方〔思窒倔栗都〕

瀉利鹽半弓至一弓　蒸餾水六弓乃至十二弓溶化加屋施

○蔑兒一弓

右調和毎一時與半小盞強以毎日令瀉三四行

〔主治〕猩紅熱ノ第一期ニ用フ○思窒倔栗都氏ハ先吐根ニ小量吐酒石ヲ配スル吐劑ヲ與ヘ而後三四日間上ノ下劑ヲ服セシム此ニ於テ熱勢増加セザル時ハ轉メ硇砂里歇利飲等ヲ投ス若熱勢益熾ナル時ハ朝暮甘汞一氏ヲ與ヘ硫酸ヲ以テ上ノ飲劑ニ和服セシメ且下肢ニ蒸餅母ヲ貼ス是故ニ下劑ハ停ムルニアラザルナリ○硫酸甘汞ヲ同時ニ服スルハ舍密術ノ則ニ違フト雖一千八百十三年我邦軍中神經熱オールロフスチピユス流行セシ時

Kitasato Memorial Medical Library

我邦ノ醫甘汞ヲ用ヒ冷水ニ收斂亜的兒ヲ和シ飲料ト
不他日伊醫ノ遁辭ニ曰ク人胃ハ舍密ノ列篤爾土（舍密器ノ
名ニアラズト）

○第六百九十四方（骨布）

格魯林水（二錢）覆盆子水（一弓半）槇楂核汁過爾托舍
利別（各六錢）

右調和毎半時或一時服一茶匙乃至一茶匙半

〔主治〕刺衝熱殊ニ猩紅熱及ヒ生齒熱ニ宜シ又三歳乃至
五歳兒ノ水癌（ワートルカンクル）ニ用フ

○第六百九十五方（緘歇蘭度）

稀硫酸（十滴）桑椹舍利別（二弓）

右調和毎服一食匙日數次徐々飲服

〔主治〕猩紅熱ニ併發セル咽喉焮衝ニ宜シ兼テ接骨木花
浸錦葵葉浸屋施蔑尓ヲ以テ含漱セシメ弗刺涅兒ヲ以
ヲ頸圍ヲ纏フヘシ更ニ劇甚ノ症ハ蜞鍼及ヒ芥子泥ヲ
施ス此方大人或ハ大兒ノ用ニ供スベシ

○第六百九十六方（肸設爾）

民垤列里精（六弓）精製硇砂（一錢）玫瑰蜜（一弓）

右調匀毎四分時取二羅獨（量名）許射注咽喉

〔主治〕猩紅熱ノ病者咽喉焮衝熾盛ノ症ニ宜シ大人ノ用

Kitasato Memorial Medical Library

ニ充ツ

○第六百九十七方〔拔耳篤〕

再餾木酸半弓　蒸餾水五弓　桑椹舍利別一弓

右調和爲ニ含漱水一

〔主治〕猩紅熱ニ合併セル腐敗性咽喉焮衝ニ宜シ」大人ノ用ニ供ス

○第六百九十八方〔遠突土〕

消石一錢　大麥煎八弓溶化加後件

桑椹舍利別一弓

右調和供ニ射注一

〔主治〕猩紅熱ニ合併セル咽喉焮衝症深紅色ヲ呈シテ而ノ未潰瘍ニ變セザル者之ニ宜シ

○第六百九十九方〔同上〕

接骨木花浸八弓　民垤列里精　玫瑰蜜各一弓

右調勻供ニ含漱一

〔主治〕猩紅熱ニ合併セル咽喉焮衝潰瘍ニ變スル者之ニ宜シ」右二方六百九十八方六百九十九方ハ獨大兒若クハ大人ノ用ニ供スベシ

○第七百方〔福倔篤〕

醋酸加里二錢　覆盆子水三弓溶化加ニ後藥一

Kitasato Memorial Medical Library

海葱醋二錢　覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服半食匙强

主治二歲乃至三歲ノ兒猩紅熱後ノ急性水腫ニ宜シ

○第七百一方（遠突土）

醋酸加里液　滿那舍利別各一弓　蒸餾水二弓

右調勻每一時服一小兒匙

主治猩紅熱後ノ急性水腫ニ甘汞ト更換シ用フベシ小兒ノ用ニ供ス

○第七百二方（布標歇耳）

純精酒石半弓　蒴藋舍利別　杜松子舍利別各二弓　砂糖舍利別一弓

右調和爲煉膏每半時服一茶匙乃至二茶匙

主治猩紅熱後ノ焮衝性水腫ニ宜シ大人及ヒ大兒ノ用ニ供ス

○第七百三方（遠突土）

木香一錢　熱湯適宜浸漬濾取四弓加後藥

炭酸剥篤亜斯與海葱醋飽和者半錢　橙花舍利別半弓

右調和每一時服一食匙

主治水腫及ヒ猩紅熱ニ宜シ小兒ニ用フベシ

○第七百四方（速別倫歇愔）

Kitasato Memorial Medical Library

實芰答利斯葉一双　熱湯適宜浸漬濾取五弓溶醋酸加
里半弓乃至一弓加後藥
海葱蜜六錢
右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪
主治　猩紅熱後ノ焮衝性水腫ニ宜シ大人及ヒ大兒ノ用
ニ供スベシ

○第七百五方（同上）
刺發斯根半弓　熱湯適宜浸漬濾取六弓溶化後藥
精製消石一錢半　海葱蜜一弓
右調勻每一時服一食匙

主治　焮衝性水腫ニ用フ殊ニ猩紅熱後ノ症ニ宜シトス
大人及ヒ大兒ノ用ニ供スベシ

○第七百六方（獨歇蘭度）
刺發斯根　杜松子各一弓　和胸劑料二弓
右細剉調齊
主治　猩紅熱後ノ水腫ニ宜シ大人ノ用ニ供ス小兒ニ與
フルトキハ刺發斯杜松子ノ量ヲ減スベシ

○第七百七方（同上）
纈草六錢　攝爾扁太里亜二錢　海葱或實芰答利斯半錢
注熱湯適宜飽熟八分時濾取六弓加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

民垤列里精一弓　甘消石精二錢　實亞格地温一弓

右調和毎半時服一食匙乃至二食匙

○主治　虚性猩紅熱落痂ノ期水腫ノ候ヲ見ハス者之ニ宜シ大人ノ用ニ供ス

○第七百八方

甘汞四瓦至八瓦　實芰荅利斯葉末二瓦至四瓦　麻倔涅矢亞八瓦至十六瓦　白糖四刃

右調和為散等分八裹毎服一裹日四次

主治　猩紅執後ノ水腫殊ニ急性脳水腫及ヒ胸水ニ用ヒテ峻効ノ一方トス蓋脳水腫胸水ノ如キハ之ニ兼ルニ放血ヲ以テ通治法トス○此方小兒ニ用フルトキハ服量ヲ減シ大人ハ増加スベシ

律別阿剌一名ロテルン

此病ハ猩紅熱ノ變症タリ」經過順良ナル者多シトス」治法大抵良性猩紅熱ニ同シ是故ニ防焮法ヲ處シ適宜ニ大便ヲ利シ且發表ノ劑ヲ用フベシ」然レ𪜈其熱焮衝性腸胃性神經性若クハ腐敗性ヲ帯フルトキハ各其性ニ從ヒ清涼疏利緩性衝動若クハ止腐ノ方法ヲ適當ナリトス

羅斯エリシペラス羅ロトス蘭

羅斯ハ其源通例異常ノ膽液分泌ニ關係スル所アルガ故

Kitasato Memorial Medical Library

ニ多クハ吐藥六十二方至七十二方及ヒ消焮下劑五十六方至六十一方。七百十方至七百十四方。七百十六方至七百十七方ヲ最適當トス」然レ𪜈顔面羅斯ニ於ケル如ク其熱較著ニ焮衝ヲ見ハシ又大ニ頭腦畜血ノ症ヲ兼ヌル者ハ吐藥ヲ與フニ謹愼ヲ加フベシ設令之ヲ投スルモ先耳後ニ蜞鍼或ハ小量放血ヲ要トス」吐劑ヲ服セシ后ハ消石芭硝ヲ配用シ十五方孕鹼酒石或ハ純精酒石ヲ與ヘ又諸種清凉ノ飲劑ヲ用フベシ○澎魯錄人名ハ此症ニ格兒失屈謨為散十五氏至二十氏ヲ曹達ニ刃至一錢ト合スル者ヲ稱用シ微魯巾巽人名ハ硇砂華ノ内服及ヒ其溶液ヲ以テ洗フヲ稱譽シ骨屈私人名骨布蘭度同上孚抎涅戾同上ハ大量ノ的列並油ヲ内服及ヒ灌腸ニ用フ○神經性腐敗性ノ羅斯ハ神經熱腐敗熱ノ治ニ準ス」外用藥ハ最謹愼ヲ加フベシ」木綿。弗剌涅爾毛布ノ名香竄藥末ヲ以テ患部ヲ被包シ以テ乾温法トスルハ最適當タリ」刺必私印歇爾那栗斯ノ散末及ヒ濃厚溶液ノ外用ハ皆之ヲ外用スレハ焮衝速ニ減シ二三日ヲ出テズノ消散ス危險ナリトス此他諸種ノ外敷藥皆同一般ニシテ頓ニ羅斯發見ノ機ヲ抑壓スルカ故ニ其害淺少ナラス輓近此症ニ格兒實捏ヲ稱用ス余意フニ本文ノ論之ニ據ル歟

○第七百九方〔私昆列印〕

精製消石二錢　蘆根煎六弓溶化加ニ後藥

Kitasato Memorial Medical Library

屋施蔑爾一弓

右調和毎半時服一食匙强

〔主治〕羅斯等ニ宜シ

○第七百十方〔謨私篤〕

芒硝一弓　旃那瀉下飲〔附〕接骨木花水各三弓溶化加

後味

滿那舍利別一弓

右調勻毎半時服一食匙乃至二食匙

〔主治〕焮衝性羅斯ニ宜シ症ニ從ヲテ先蜞鍼或ハ刺絡ヲ

施シ而ノ後腸胃汚物アル者ハ吐藥ヲ與フベシ○或ハ

此種ノ羅斯ニ寒罨法ヲ稱用スル者アリ之ニ由テ能ク

一時ノ快ヲ得ルト雖尋テ危險症ヲ發スルカ故ニ此法

廢シテ用フベカラズ

○第七百十一方〔弗陽微弗栗都〕

吐酒石三匁　瀉利鹽半弓至一弓　加密列水三弓溶化加失

格列乙舍利別三錢

右調勻頓服

〔主治〕羅斯ノ初起先之ヲ與ヘテ同時ニ吐下セシムルニ

宜シ但瀉血ヲ要スル症ハ先瀉血スベシ○蓋此方ハ獨

强實ノ人及ヒ熱勢熾盛ノ者ニ適當ス

Kitasato Memorial Medical Library

○第七百十二方〔朴彪私〕

荅麻林度二弓　常水十二弓煮濾取八弓溶化後藥

精製芒硝半弓　上好滿那一弓

右再濾過每半時或四分時服半小盞

○第七百十三方〔同上〕

純精酒石一弓　茴香末二錢　荅麻林度二弓　覆盆子舍利

○別〔適宜〕

右爲煉膏每一時服二食匙臨服宜攪和

〔主治〕右二方七百十二方七百十三方ハ羅斯ノ輕症ニ用ヒテ膽液ヲ復良シ且之ヲ排除スルニ宜シ之ヲ緩性ノ發表劑及ヒ清涼ノ食養ト兼用スル片ハ之ニ由テ治ヲ得ル者往々少カラズ

○第七百十四方〔弗陽〕

瀉利鹽三錢　接骨木花水三弓溶化加後藥

安質母尼酒一錢　民垤列里精　遏爾托舍利別各三錢

右調和每一時服一食匙强

〔主治〕熱性疹殊ニ羅斯及ヒ猩紅熱ニ治ヲ下スノ始腸胃汚物アル者ハ先之ヲ用フ

○第七百十五方〔茱兒鳩私〕

泡蹩爾乾私發表密幾私去爾

民垤列里精一弓半　黑接骨木花浸四弓　遏爾托舍利別

Kitasato Memorial Medical Library

○半弓

右調和每半時服一食匙强

〔主治〕聖京(シンキング)倔性羅斯(ロース)熱微ニシテ腸胃汚物アラザル者之ニ宜シ

○第七百十六方

孕鹼酒石半弓　蒸餾水四弓溶化加遏爾(アルタイ)抱舍利別半弓

右調和每一時服一食匙

○第七百十七方

孕鹼酒石半弓　吐酒石一匁　蒸餾水四弓溶化加精製蜜半弓

右調勻每一時服一食匙

○第七百十八方

純精酒石半弓　白糖二弓　水二北

右調和服半小盞(コツピ)日數次以至得瀉臨服宜振盪

○第七百十九方

純精酒石　麻倔涅(マクニア)矢亞(ヒアニ)謁陳佛(ヒヲンフ)各半弓

右調和為散每服一茶匙日四次

〔主治〕右四方七百十六方至七百十九方羅斯(ロース)輕症ニシテ腸胃性殊ニ膽液性ヲ帶ヲル者ニ宜シ

○第七百二十方〔胃布(ヲツプ)〕

Kitasato Memorial Medical Library

○實芰荅利斯葉末（十匁至十五匁）　甘汞（四匁至六匁）　白糖（五匁）

右調和為散等分十裹每半時服一裹

〔主治〕羅斯ニ宜シ殊ニ此症猩紅疹ト同時ニ流行シ且頭腦血鬱甚シキ者ニ宜シ後ハ唯實芰荅利斯ノミヲ用フベシ

○第七百二十一方〔弗陽〕

精製消石（一錢半）　龍腦（加亞剌毘亞護謨漿適宜研和者六匁）　接骨木花水（六匁）

右調和每一時乃至二時服一食匙

〔主治〕羅斯神經性ニ傾ク者之ニ宜シ

○第七百二十二方〔謨私篤〕

龍腦　甘汞（各四匁）　金硫黃（二匁）　精製阿芙蓉（一匁）　甘草膏（四匁）

右調和為散等分四裹每服一裹日三次乃至四次

〔主治〕羅斯神經性ヲ帶フル者ニ宜シ然レ𪜈此ノ如キノ症ハ治ヲ怠リ或ハ誤治ニ由テ偶之アリ或ハ惡性神經症流行ノ時稀ニアル所ナリ但上方ニ兼テ纈草浸亞爾尼加花浸等ヲ與フベシ眞ノ腐敗熱ハ幾那及ヒ鑛酸ヲ用フベシ

○外用ハ解毒藥ニ龍腦ヲ加ヲ

○第七百二十三方〔別鈴突篤〕

大黃末　茴香油糖各二

Kitasato Memorial Medical Library

○癒瘡木脂半弓　精製硫黃　大黃末　茴香油糖各二錢

右調勻為散每服一茶匙強日二次乃至三次

主治　常習ノ羅斯他ノ原由ナキ者之ヲ用ヒテ偉効ヲ奏スルヿ多シ常習羅斯ハ痔血若クハ月經ノ不調ニ係リ或ハ依倔篤毒及ヒ其他ノ惡液病ニ因スル者多シトス此病根ヲ能ク排除スルメ後ハ冷水洗浴法ヲ施シテ皮膚ヲ強壯ニシ且諸排泄ヲ適宜ニ促スヲ最要トス○獩歇蘭度氏ハ苦水ヲ稱用シテ四週每ニ二三日之ヲ服セシメ又八週每ニ吸角ヲ施シ此他發癮膏ヲ持重シ。瑞香皮ヲ貼シ。打膿スルヲ稱賛セリ

○第七百二十四方

接骨木花　加密列　豆粉各一弓至二弓　龍腦一刃至半錢

右搗碎粗末供藥枕子

主治　水泡羅斯虛性焮衝眼等ニ宜シ○輕症ノ羅斯ニ施ス時ハ龍腦ヲ去ル但鉛製劑外用ハ最危險ナリトス

○第七百二十五方

罌粟子油或亞麻子油　石灰水各一弓

右調和作軟膏供外用

主治　水泡羅斯ノ焮痛ヲ治ス輕症ハ酥ヲ外敷ノ足レリ帶狀羅斯ソヌテル羅ヲ作ル口ス蘭

Kitasato Memorial Medical Library

此症羅斯ト頑癬ノ中間ニ位ス」治法急性ノ症ニ在テハ尋常ノ羅斯ト一般ナリ」腸胃汚物ヲ排除シ。安質沒尼劑。汞劑七百廿七方至七百卅方木類煎七百卅八方等ヲ與フベシ

○第七百二十六方〔謨私篤〕

里歇利飲加醋三弓　接骨木花水四弓　吐酒石一氏

右調和每半時取一食匙強接骨木花泡劑和服

〔主治〕頑癬及ヒ帶狀羅斯。初起熱アル者ニ宜シ」後吐藥ヲ與ヘ尋テ硇砂溶液ニ吐酒石ヲ加用スベシ」外用ハ油藥ニ遏爾托煎ヲ加フ

○第七百二十七方〔泊魯陳傑兒〕

越質屋布斯密涅剌列　金硫黃各二刃　癒瘡木脂　勿搦祭亞石鹼各二錢　苦味越幾斯〔附適宜〕

右二氏為一丸衣桂末晨夕服十粒

○第七百二十八方〔骨布〕

越質屋布斯密涅剌列三錢　金硫黃一刃　癒瘡木脂　勿搦祭亞石鹼各一錢　蜀羊泉越幾斯二錢

右調和為百五十丸衣菖蒲根末早午晚服八粒

〔主治〕右二方ハ緩慢僂麻質斯性及ヒ依倔篤性ノ疾患或ハ經久ノ頑癬等ニ宜シ○外用ハ外汞水頑固ノ症ハ硝酸銀稀溶液ヲ良トス

Kitasato Memorial Medical Library

○第七百二十九方（布。弗蘭屈）

癒瘡木　越質屋布斯安質沒尼各一錢　蜀羊泉莖越幾斯錢

右調和加舍利別每丸二氏衣杜松子末朝夕服八九

主治　慢性帶狀羅斯。頑癬。其他經久ノ皮膚病及ヒ慢性依倔篤等ニ宜シ

○第七百三十方（春姪隣）

越質屋布斯安質沒尼二十四氏　曹達乾者十八氏　薩沙弗羅私皮末　白糖各一錢

右調和為散等分六裹每服一裹日二次

主治　帶狀羅斯。頑癬。及ヒ其他慢性皮膚病。ニ宜シ

○第七百三十一方（別聖）

醋酸莫爾比捏四氏　薔薇軟膏（附一弓）

右調勻供塗擦

主治　帶狀羅斯ノ焮痛ヲ減スルニ宜シ

粟疹（ミリアリア羅ギール　ストオイトスラフ蘭）

熱性粟疹或ハ本症ト為テ發シ或ハ傍症ト為テ生ス多クハ是他ノ熱性病ニ在テ温覆度ニ過レハ此症繼發スルナリ予ハ專其本症ト為テ發スル所ノ者ヲ以テ此ニ述フ或ハ之ヲ非スル者アリト雖亦是一種固有ノ証候ヲ具ル別

Kitasato Memorial Medical Library

症ニシテ各病ノ列ヲ擯斥スルノ理ナケレバナリ即發疹前或ハ發疹ノ始ニ方テ名狀スベカラザル苦悶ヲ發シ。酸汗太過。四肢攣痛シテ僂麻質斯痛ニ近似シ。指頭ニ刺衝ヲ覺ユル等ノ証是ナリ。○治法先其熱性ヲ視テ後疹性ニ注意スベシ」間熱性焮衝ニ傾ク者アリ其症ハ精製消石。精製硇砂。其他清涼劑ヲ要トス但小量ニ與ヘテ佳ナリ」或ハ小量刺絡ヲ行フベキ者亦之アリト雖多クハ蜞鍼ヲ好トス然レ𪜈通例其熱腸胃性ニシテ神經性ヲ夾ム者アリ宜ク吐劑六十二方至七十二方荅麻林度製ノ酸性瀉藥十六方。七百十三方。七百四十方酒石。孕鹼酒石五十方至五十三方。七百十六方。七百十八方。七百三十二方酒酸加里曹達五十四方五十五方孕硼酒石七百三十三方等ヲ與フベシ」或ハ里歇利飲一方ヲ用フベシ患者能ク之ヲ服ス」爾後其症ニ隨フテ緩性衝動藥ヲ投スベシ但適宜ニ鑛酸ヲ加ヘテ佳ナリ之ヲ以テ此症ハ諸液溶渙ニ傾キ易キヲ防ク」私昆列印名僂麻質斯性粟疹見點ノ時之ヲ治スル一方ヲ發明セリ此方今ニ至テ卓越ノ奇方トス即微温ノ刺必斯高私蟄屈斯水ヲ以テ洗ハナリ」其法刺必斯高私蟄屈斯一錢乃至一錢半ヲ以テ水一比ニ溶化シ漸々增加ノ半ヲ至ル先汗ヲ拭ヒ乾シテ后此溶液ヲ以テ全身ヲ灌洗スル下始一時毎ニ後一時半乃至二時毎ニス」之ヲ施シテ后輕易ノ僂麻質斯

Kitasato Memorial Medical Library

性神經性心臟疾患（心悸動ヲ發スル者甚多シ）ヲ生スル者間之アリ此症老利兒水皮膚刺戟法等ヲ施シテ防止スベシ或ハ胃痛嘔氣等ヲ發スル者アリ拕歇兒散ニ吐酒石軟膏ヲ兼用シテ良効アリ

○慢性無熱ノ症ハ多ク其起因タル病毒ニ注意スルヲ專務トス若其因依倔篤毒ニアレハ全身浴ヲ行ヒ數次角法ヲ施シ木類煎（七百三十八方）硫黃劑安質沒尼劑ヲ與ヘ且瀉劑ヲ兼用スルヲ殊ニ稱賛ス又越粟幾失爾蔑印失屈篤良効ヲ奏スル者往々之アリ

○第七百三十二方

孕鹼酒石（二錢至半弓）井水四弓溶化加後味

蘆根流動越幾斯（三錢）

右調勻每一時服一食匙

主治　解凝兼瀉下劑トシテ粟疹腸胃証ヲ帶フル者ニ用フ

○第七百三十三方

孕硼酒石（半弓）常水四弓溶化加後味

荅麻林度（一弓）

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治　同上

○第七百三十四方

Kitasato Memorial Medical Library

纈草三錢　熱湯適宜浸漬濾取四弓加後藥

〔主治〕收斂亞的兒一刃　櫻實舍利別六錢

右調和每一時服一食匙

〔主治〕緩性衝動劑トシテ之ヲ用フ此ヲ以テ溶崩症殊ニ發汗過多ヲ防止スルニ宜シ

○第七百二十五方

甘消石精半錢　收斂亞的兒一刃　覆盆子水五弓　覆盆子

〔主治〕舍利別二弓

右調匀每一時服一食匙

〔主治〕同上

○第七百三十六方

收斂亞的兒半錢至一錢　櫻實水五弓　覆盆子舍利別二弓

右調匀每一時服一食匙

〔主治〕清涼ニシテ且苦悶ヲ鎮清シ汗ヲ止ムルノ劑トシテ粟疹熱ニ用フ

○第七百三十七方〔頭摂爾〕

升汞半刃　精製硇砂二錢　蒸餾水六弓溶化

右調匀塗擦胸上

〔主治〕粟疹内陷ニ宜シ

○第七百三十八方

Kitasato Memorial Medical Library

○薩沙弗刺私屑　山牛房根　濱瞿麥根　蘆根　蜀羊
泉莖各一弓　甘草半弓　茴香二錢
右細剉取二食匙水二北煮日服
〔主治〕慢性粟疹ニ宜シ

○第七百三十九方
炭酸剥篤亜斯二錢至三錢　井水十二弓
右溶和供洗浴
〔主治〕同上

摹麻羅斯ユルチカリア羅子ツテルロス蘭
此症大抵吐下劑ヲ用ヒテ治ス七百四十方至七百五十三方然レ𪜈其變症ニ至テハ則潜伏スル所ノ病因ヲ探索シテ之ヲ除去スベシ即門脈系ノ閉塞。瘰癧毒依倔篤毒等是ナリ」鑛酸ヲ用ヒテ良効ヲ得ル者モ亦間之アリ」又皮膚ノ感覺過敏ヲ制シ遲鈍ナラシムルヲ要ス」毎日外氣ニ觸レ屢襯衣ヲ換ヘ。日々冷水ヲ用ヒテ遍身ヲ灌洗シ但其水漸次冷ユルニ宜シ或ハ脚ヲ浴スル等皆鴻益アリ

○第七百四十方
暴劉私人名旃那煉膏一名瀉利煉膏
旃那末一錢半　純精酒石半錢　李肉一弓半　砂糖舎利別半弓
右調勻準症毎半時服一茶匙乃至二茶匙以至得瀉

○第七百四十一方

Kitasato Memorial Medical Library

○精製芒硝（乾者半弓）　旃那煉膏（第七百四十方一弓）　覆盆子舍利別（適宜）

右作煉膏每一時服二茶匙以至得瀉臨服宜攪流

○第七百四十二方

精製芒硝（乾者半弓）　荅麻林度（一弓）　枸櫞汁舍利別（適宜）

右作煉膏每半時服二茶匙以至得瀉

考貧家ニ投スルハ李肉ヲ以テ荅麻林度ニ代フ

○第七百四十三方（保遏栗屈的爾）

純精酒石　旃那末（各二錢）　茴香末（四刃）　李肉（二弓）　砂糖

舍利別（適宜）

右作煉膏每半時服二茶匙臨服宜攪流

附考貧家應用ノ瀉利煉膏ト云

○第七百四十四方（歇惜）

酒石酸（二分）　白糖（一弓）　橙花水二弓溶化加後味

遏設印亞的兒（半弓）　旃那煉膏（七百四十方六錢至十錢）

右調勻茶匙抄服臨用宜振盪

主治緩下劑ト云テ感觸過敏ニ人殊ニ婦人ニ用ス

○第七百四十五方

燐酸曹達（一弓）　櫻實水四弓溶化加櫻實舍利別一弓

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至收全功

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕佳味ハ瀉劑トス貴婦ノ用ニ供ス

○第七百四十六方〔刺胃私〕

旃那細剉一錢　瀉利鹽六錢

右加熱湯二小盞浸出四分時毎半時服半小盞以至得瀉

○第七百四十七方

旃那一錢至二錢　和胸劑料一弓

右細剉熱湯少許浸漬一日服盡

○第七百四十八方〔春姪隣〕

旃那三錢　橙皮黄一錢　薄荷二錢　睡菜半弓

右細剉調匀取一食匙强水二小盞浸出毎日服盡

○第七百四十九方〔弗陽〕

旃那二錢至半弓　加熱湯二弓更煮沸濾加後藥

孕鹼酒石　失枯列乙舎利別各半弓

右調和頓服或分二服半時間服盡

〔附考〕小兒ハ其年齢ニ準シ半時毎ニ二三茶匙强ヲ與フ

○七百五十方〔私傑。福傑兒〕

旃那二錢　加熱湯六弓飽熟半時濾加後藥

孕硼酒石半弓　阿没勒六錢　滿那舎利別一弓

右分三四服暫時盡之臨服宜振盪

○第七百五十一方　瞥暴劉私複方旃那浸

Kitasato Memorial Medical Library

旃那二錢　熱湯二弓浸漬四分時濾過溶後藥

酒酸加里曹達二錢　滿那三錢　枸櫞油糖半弓

右調勻頻服一二時間盡之

○第七百五十二方　瞥拍暴劉私瀉下浸

旃那二錢　加熱湯四弓飽熟八分時濾過溶後味

精製芒硝　滿那各半弓

右再濾過服法同上

○第七百五十三方　瞥母暴劉私複方旃那浸

旃那二錢　熱湯四弓浸漬四分時濾過溶化精製芒硝六錢再加後味

砂糖舍利別半弓

右調和頓服或分再服

〔主治〕此方七百四十方至七百五十三方慢性蓴麻羅斯其他無熱ノ發疹病ニ瀉藥トシ用フベシ又諸病ニ應用少カラス

○第七百五十四方〔謨私篤〕

甘汞半氏　金硫黃　精製阿芙蓉各四分八　東方産大黃六氏

白糖一匁

右調和為散分十二服朝夕一服

〔主治〕經久ノ蓴麻羅斯ニ宜シ○搔痒甚シキ者ハ謨私篤氏間菲阿斯油ヲ皮膚ニ塗リ或ハ罌粟殼及ヒ菲阿斯葉

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ乳汁ヲ以テ煮微温蒸溺法トシテ之ヲ施セリ

謁設刺（エセラ）（エセラ羅ポルセレインギルストオイトスラス蘭）

此症亦急慢ノ二種ニ分ツ」治法全ク蕁麻羅斯（ロース）ニ同シ」無熱症ハ唯微瀉スルヲ以テ通例治スルニ足レリ慢性症ニ至テハ更ニ峻効ノ方法ヲ要ス殊ニ其原因ニ從フテ適當ノ方ヲ處スベシ

水疱疹（ペムピギュス羅ブラニ蘭ルオイトスラフ蘭）

此症或ハ熱アリ或ハ熱ナキ者アリ其無熱ノ症ハ經過緩慢ナリ」其熱燃衝狀ヲ見ハス者モ亦間之アリト雖大抵聖（シン）京倔（キング）性若々ハ腸胃性ノ者多シトス神經性腐敗性ノ者モ亦稀ニ之アリ」其熱ハ各症ノ定則ニ從フテ療シ其他腸中。

皮表。及ヒ腎ノ分泌ヲ催促スベシ」殊ニ里歇利（リヘリ）飲（一方。七百五十五方）及ヒ荅麻林（タマリン）度（ド）乳清（百三十五方）ヲ稱用ス」水疱ヲ摩擦シ或ハ抑壓スルヲ防クベシ但皮膚燃衝甚シキハ細鍼ヲ以テ小心シテ之ヲ破潰シ酷厲液ヲ洩スベシ○慢性水疱疹ハ痔疾。依倔（イグト）篤。腎石。膀胱石。ノ如キ深ク腹裏ニ根蔕スル所ノ病ニ因テ起ルヲ常トス」通例之ヲ療スルヿ大ニ難シトス之ヲ根治スルニ至テハ醫術ノ効アルヿ甚罕ナリ」刺絡。吸角。

汞劑。安質（アンチモニ）沒尼劑。（七百五十八方至七百六十一方）硫黄。硫黄製劑。石灰水。亞（ア）爾加里（ハカリ）。石鹼。烏白烏爾識（ウハウルシ）。實芰荅（ヂキタ）（七百五十六方七百五十八方）杜松子。金花

Kitasato Memorial Medical Library

草。木類煎等ヲ稱用ス」外用ハ微温浴。硫黄浴人造。天然俱ニ用フ六百四十七方ヲ最妙トス

○第七百五十五方〔謨私篤〕

里歇利飲ニ弓　接骨水花水　杜松子水各三弓　精製硇砂　精製甘草膏各一錢半　吐酒石一氏　滿那舎利別一弓

右調和毎一時服一食匙強

〔主治〕急性水疱疹其見點スル毎ニ更ニ熱ヲ帶フル者之ニ宜シ

○第七百五十六方〔同上〕

純精酒石一刃　蜊蛄石半刃　實芰荅利斯半氏至一氏　歇爾蘭獨留謨子六氏

右調勻為散分十裹毎服一裹日二次乃至三次

〔主治〕頑固水疱疹ニ宜シ之ニ兼テ硇砂揮發加的列並油膏ヲ以テ腎部ニ擦スベシ

○第七百五十七方〔阿別爾弇弗〕

木酸一錢　薄荷水五弓　砂糖舎利別一弓半

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕水疱疹ニ宜シ殊テ諸液溶渙ノ証微見ハルヽ者ニ用フ

○第七百五十八方〔過傑。栗屈的兒〕

Kitasato Memorial Medical Library

實芰荅利斯越幾斯二兩四匁至六匁　甘汞一匁　精製阿芙蓉半匁　白糖十五匁

右調勻為散分十二裹每服一裹日三次

主治　慢性水疱疹ニ宜シ　栗屈的兒人名此症ニ之ヲ用ヒテ即効ヲ得タリ　此方ヲ用ヒテ吐涎スルトキハ姑ク後服ヲ停メ兼テ杜松子浸ヲ飲マシムベシ

○第七百五十九方

甘汞　金硫黄各一匁至二匁　蜀羊泉莖末　白糖各十五匁

右調和為散分十二服朝夕一服

○第七百六十方　過傑栗屈的兒

硫黄安質没尼　蜀羊泉莖末各一錢　睡菜越幾斯二錢

右合勻二匁為一丸衣石松粉每服十九日三次

主治　右二方七百五十九方七百六十方慢性水疱疹ニ宜シ

○第七百六十一方　茉爾鳩私

越質阿布斯密涅剌列　麻倔涅失亞各五匁　白糖半刃

右調勻為散分十裹每服一裹日二次乃至三次

主治　慢性水疱疹ニ宜シ　茉爾鳩私氏此症ニ越質阿布斯密涅剌列ヲ試驗シ諸藥中ニ就テ最効アリト云フ

○第七百六十二方

槇楂核汁弓　薔薇水七弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和供外用

○主治　水疱疹疼痛灼クガ如キ者洗藥トシテ之ヲ用フ」鉛製劑及ヒ其他總テ疹ヲ内陷セシムル者ハ皆忌ムベシ」

水疱寒壞疽ニ變スルトキハ幾那煎ヲ用フベシ

○第七百六十三方（傑。過栗屈的兒）

苦扁桃（去皮半弓）　加蒸餾水八弓　搗爛

○右作乳劑供洗藥

主治　頑固ノ水疱疹ニ在テ遍身ノ搔痒緩慢日ヲ延ク者ニ宜シ又陰嚢搔痒ヲ治ス

鵞口瘡（アラタ羅ス　アリ　ー蘭）

此症本病トシテ發スル者ハ獨嬰兒ニアルノミ」摂養ヲ節シ數次浴湯ヲ施シ口中ヲ洗淨シ哺乳毎ニ乳頭ヲ洗ヒ又室中ヲ清潔ニスレバ大抵之ヲ未發ニ防グヿヲ得ベシ」其既ニ發スル者モ醫藥ヲ要スルヨリ專其摂生ヲ節スルトキハ速治スルヿヲ得ベシ」緩下劑（七百八十一方　七百八十二方）ヲ與ヘ並ニ制酸劑ヲ用ヒテ胃中ニ鬱滯セル酸敗液ヲ制シ及ヒ細筆ヲ以テ數次緩和液（七百八十三方　七百八十四方）ヲ塗ラシムヘシ」硼砂ハ内外俱ニ用ヒテ此症ノ一奇藥ト稱ス（七百八十方。七百八十五方至七百八十八方）

○然レトモ鵞口瘡モ亦毎症必シモ順良ナラス殊ニ盲人産婦等ヲ養フ舘内ニ在テ惡性ノ症間之アリ」其惡性症

Kitasato Memorial Medical Library

八幾那煎ニ硼砂ヲ配スル者。及ヒ石灰水七百六十八方七百六十九方稀鹽酸七百七十方格魯林水七百七十一方等ヲ加ヘテ外用スベシ○此症大人ニ在テハ通例他病ノ傍証ニシテ惡性神經熱腐敗熱等ニ發シ又羸瘦病及ヒ其他慢性病ノ末期ニ生スル者多シトス

○第七百六十四方〔羽歇蘭度〕

硼砂一錢　桑椹舍利分二弓

右調和毎一時服一茶匙

○第七百六十五方〔福倔篤〕

硼砂二錢　撒爾非亞水六弓　玫瑰蜜一弓

右調勻供含漱藥

〔主治〕大人鵞口瘡ニ宜シ

○第七百六十六方〔扑澀私〕

硼砂二錢　白糖末半弓　達剌侃篤蘧謨漿適宜

右為三十錠曬乾衣乳糖末取一箇入口中旋轉日四次乃至六次

〔主治〕右二方七百六十五方七百六十六方ハ大人鵞口瘡ニ宜シ

○第七百六十七方〔遠突土〕

硼砂二錢　撒爾非亞水二弓溶化加後藥

沒藥丁幾二錢　蜜去泡達一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和供塗藥

主治　肺勞等ニ傍發スル虚性鵞口瘡ニ宜シ

○第七百六十八方（同上）

石灰水　砂糖　舍利別各一弓

右調和供塗藥

○第七百六十九方（別連杜）（遠突土）

石灰水一弓至一弓半　亜刺毘亜蘧謨漿二錢　拔爾撒謨孛露

舍利別半弓

右調和供塗藥

○第七百七十方（福倔篤）

稀鹽酸一錢至二錢　玫瑰蜜一弓

右調勻塗口中

○第七百七十一方

格魯林水二錢至半弓　遏爾托舍利別一弓

右調勻供塗藥

○主治　右數方七百六十八方至七百七十一方ハ大人ノ鵞口瘡腐敗ニ傾キ惡色ナル者ニ宜シ但方中ノ藥量適宜ニ消息スル片

仝小兒モ亦用フベシ

○第七百七十二方（別連杜）

撒爾非亜葉半匁　熱湯適宜浸濾取六弓加後藥

Kitasato Memorial Medical Library

格魯林水半弓　玫瑰蜜一弓

右調勻硝子壜收貯以黒紙纏之供含漱及射注藥

主治　大人虚性鵞口瘡及ヒ咽喉焮衝ニ宜シ方中ノ藥量適宜ニ消息スル時ハ小兒モ亦用フベシ

第七百七十三方　過傑栗屈的兒　大人ノ鵞口瘡腹ニ頂

皓礬半氏　蒸餾水一弓　溶化

右塗鵞口瘡

主治　鵞口瘡膿潰スル者ニ宜シ大人ノ用ニ供ス之ヲ消息スル時ハ小兒モ亦用フベシ

第七百七十四方　別連杜

皓礬半刃　薔薇水　桑椹舎利別各一弓半

右調齊供塗藥

主治　大人惡性鵞口瘡ニ宜シ皓礬ノ量ヲ減シ二氏乃至三氏ヲ以テ製スル時ハ小兒モ亦用フベシ

第七百七十五方　蓮珍

寒製幾那越幾斯一錢半　紺百設木越幾斯一錢　硼砂半錢

沙列布薄煎四弓

右調和毎半時若一時服一二茶匙强

第七百七十六方

寒製幾那越幾斯一錢　亞剌毘亞蘧謨二刃　蒸餾水三弓

Kitasato Memorial Medical Library

甘海鹽精半錢　橙皮舍利別一弓

右調勻每一時服二茶匙

○第七百七十七方〔遠突土〕

寒製幾那越幾斯二錢　芸香水二弓　甘海鹽精二錢　玫瑰蜜一弓

右調和供塗藥

○第七百七十八方〔遏傑。栗屈的兒〕

幾那未一弓　井水十二弓煮耗至六弓加後藥

稀硫酸二錢　玫瑰蜜　没藥油各一弓

右調和供含漱

〔主治〕第七百七十五方ヨリ七百七十八方至皆鵞口瘡寒壞疽ニ傾ク者ニ宜シ」盖吾見ラ以テスルニ蓮珍氏製スル所ノ第七百七十五方ハ小兒ニ供用スベク但嬰兒ニ用フルヿ勿レ其他ハ皆大人ノ用ニ供スベシ

○第七百七十九方〔別連牡〕

赤幾那半弓　井水十弓煮濾取六弓加後藥

龍腦加亜剌毘亜蘧蒺研和者十二氏　地榆丁幾　單方幾那丁幾各半弓　玫瑰蜜一弓半

右調和為含漱水

〔主治〕大人惡性鵞口瘡及之寒壞疽狀焮衝ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第七百八十方〔同上〕

硼砂一刃或半錢乃至二刃　苗香水二弓　遏爾托舍利別半弓

右調勻每一時服一茶匙

〔主治〕小兒酸敗液及ヒ鵞口瘡ニ宜シ

○第七百八十一方〔遏傑栗屈的兒〕

氷製大黃丁幾半錢　蝴蛄石末二刃　雜腹蘭東方産者四匁　苗香水一弓　大黃舍利別七錢半

右調勻每四分時與一茶匙強以至小兒得安靜

〔主治〕同上

○第七百八十二方

燐酸菅達一錢　玫瑰蜜二弓

右調勻每一時服一茶匙

〔主治〕小兒鵞口瘡ニ宜シ

○第七百八十三方〔孤劉傑〕

撒爾非亞葉浸二弓以葉二錢裹者　砂糖舍利別一弓

右調和供塗藥

〔主治〕鵞口瘡ニ宜シ又之ヲ綿布ニ攤ヘ乳頭ノ潰瘍ニ貼ス

○第七百八十四方

胡蘿蔔汁一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右供塗藥

○第七百八十五方（別連杜）

硼砂一錢　胡蘿蔔汁一弓

右調勻供塗藥

○第七百八十六方（羝歇蘭度）

硼砂一刃　玫瑰蜜半弓　桑椹舍利別一弓

右調和塗數次

○第七百八十七方（福倔篤）

硼砂一錢至二錢　玫瑰蜜一弓

右調勻供含漱

主治　右數方七百八十四方至七百八十七方ハ小兒鵞口瘡ニ宜シ」大人モ亦用フベシ

○第七百八十八方（孤劉傑）

硼砂二錢　白糖半弓

右調和為散取一刀尖強塗擦小兒舌上日十次

主治　嬰兒ノ鵞口瘡ニ宜シ」或ハ哺乳前此散少許ヲ取リテ乳頭ニ撒布シ或ハ乳汁二三滴ヲ加ヘテ泥ト為シ乳頭ニ塗ルモ亦妙

遠西方彙卷之七

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之八

獨乙　加幾安頓　著
和蘭　傑婆都　譯
侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯
南洋伊東亨健夫　參校

第二編

慢性病

第一類

慢性病係血脈系症

Kitasato Memorial Medical Library

第一　心臟慢性病（モルヒ。コルヂス。コロニキ羅スレーペ。ヘルテン。フアン。ヘット。ハルト蘭）

慢性心臟病治法消焮誘退及ヒ鎮靜法等漸次ニ之ヲ施ス

ベシ變機法對當ノ症ハ最罕ナリトス」焮衝性心臟病ハ放血ヲ以テ根治法トスルガ故ニ數次刺絡シテ多量ノ血ヲ瀉スレ𪜈慢性症ニ至リテハ放血ハ唯姑息ノ効ヲ奏スルノミ故ニ獨已ムヿヲ得ザル症殊ニ窒息ノ懼アル者ノミ之ヲ施シテ可ナリ」之ニ反シテ少壯ノ人心臟ノ器敗症ニ罹ル者ハ小量ノ放血數次ニ宜シ放血ハ此症ノ危險ヲ防止シ或ハ其增進ヲ制スル的當ノ一法タリ（○）誘退法ノ中ニ就テ心臟器敗病ニ最偉効アル者ハ心部ノ打膿及ヒ串線法トス」但之ヲ施スモ其病ヲ根治スルヿ難シト雖其增進ヲ防キ且心臟病固有ノ發作ヲ鎮定スルヿヲ得ベシ

（○）實芰答利斯（ヤキタリス）ハ鎮靜藥トシテ心臟器敗症ニ奇藥ノ称アリ」實芰答利斯ノ心臟及ヒ血脈系ニ奇効ヲ奏スルヤ通例之ヲ用ヒテ心臟縮張ノ數ト脈動ノ減スルトヲ以テ徵スベシ蓋感觸過敏ノ人ニ在テハ之ヲ用ヒテ脈至先進ミ後ニ至リテ減少スルヲ常トス」過屈答刺設謨沙根（附）及ヒ格爾失屈謨（ジクムヒ）モ亦實芰答利斯ト同効アルベシト雖未其試驗ヲ究メス」病發作ノ時心臟感觸亢進シ神經証ヲ見ハス者ハ萵苣越幾斯。老利兒水。青酸等ヲ用フベシ阿芙蓉ハ心臟

Kitasato Memorial Medical Library

器敗症ニ適當ナラズトス○法魯撒爾聒氏ノ斷食法ハ生カ沈衰未甚シカラズシテ其症既ニ希望スル所ナキ者ニ試ムベキノミ」此他心臟病人ハ醫士善ク意ヲ加ヘテ其身心ヲ安靜ナラシムルヲ要トス

心臟器敗其由多端ニシテ之ヲ區別スルヿ甚難シ設令之ヲ辨別スルモ醫治ニ益ナシ故ニ今具論セサルナリ唯心臟慢性病二症ヲ揭ケテ治例ヲ示ス此二症ハ多ク醫治ノ關係スル所ナリ

心悸動パルピタチヲ。コルジス羅ハルトコロッピング蘭

此症多クハ他病ノ傍証ニシテ特發スル者罕ナリ蓋依朴昆垤兒歇私的利風氣鬱積下腹畜血痔脈畜血及ヒ心臟ノ器敗ニ併發スルガ故ニ專其本症ヲ攻ムルトキハ心跳モ亦隨テ治ス」若其レ本症タル者ハ實芰答利斯ヲ以テ經驗ノ奇藥トス

○第七百八十九方〔臧歇蘭度〕

實芰答利斯越幾斯　菲阿斯越幾斯　實芰答利斯葉末各半錢

右調和一氏為一丸衣石松粉早晩服一粒頑固症日服三丸乃至四丸

〔主治〕心悸動並ニ諸般ノ心臟無形病ニ宜シ」之ニ兼テ冷

Kitasato Memorial Medical Library

水ヲ外用スベシ

○第七百九十方（姪過爾甄）

實芰答利斯葉末　葛私篤僂謨各一　白糖半刃

右調勻為散分八裹每服一裹日二三次

〔主治〕神經性心悸動ニ宜シ

○第七百九十一方（匹篤失葛弗土）

白地榆丁幾半弓　苦扁桃水二錢

右調勻每一時服二十滴乃至三十滴

〔主治〕心悸動並ニ血脈ノ感觸過敏ノ症痔血ノ素因アリテ來ル者之ニ宜シ

○第七百九十二方　薩乙歇爾土人名丸

健質安那越幾斯半弓　牛膽三錢　蘓甘沒扭二刃

右調和為百六十二丸每服四粒乃至八粒早旦空心服

〔主治〕瞥弗蘭屈人名此丸藥ヲ用ヒテ心悸動難治ノ症下腹閉塞ニ起因セル者ヲ治セリ

胸内逼迫アンギナペクトリス羅ボルストケレム蘭

此症多クハ心臓或ハ大血管ノ器敗ニ因リ而シテ大抵依倔篤ヲ合併スル者ナリ治法小量ノ放血數次及ヒ蜞鍼心部ノ灌水誘退法殊ニ打膿ヲ施シ食餌ハ清涼ノ植物ヲ撰ムベシ其主藥ハ消石實芰答利斯七百九十四方至七百九十七方老利兒

Kitasato Memorial Medical Library

水。萵苣越幾斯。七百九十八方 七百九十九方 其他清涼鎮靜ノ劑ヲ最要ト
ス」輓近ニ至テ最結晶硝酸銀ヲ稱用セリ 八百二方 八百三方 ○其發
作ヲ鎮靖スルハ手脚ヲ温水ニ浸シ。胸上及ビ腓腸ニ蒸餅
母ヲ貼シ。胸上乾角法。足蹠温蒸藥或ハ胸部灌水等効アリ
又發作ノ終末ニ及テ薄荷水一食匙强遏泥子油一二滴ヲ
和用スルニ宜シ之ニ由テ能ク噯氣ヲ發シテ頓ニ其發動
ヲ鎮定スルナリ」魯母別爾倔人名ハ硫酸ヲ氣管ニ吸引セシ
メテ速効ヲ得タリト云フ」發作中適宜ニ放血スルハ毎症
大抵即効ヲ得ザルナシ又多血ノ人ニ在テハ大概放血ヲ
怠ルベカラズト雖多クハ是一時ノ快ヲ得ルノミニシテ

次後ノ發作更ニ急速且劇甚ニ至ルナリ

○第七百九十三方 弗陽

結爾蔑斯密涅剌列精製阿芙蓉各五瓦 麝香 鹿角
鹽各半匁 阿魏 癒瘡木脂 纈草越幾斯各一錢

右調和二瓦為一丸衣石松粉毎一時服三丸乃至四丸

主治 痙攣喘依倔篤毒ニ因ル者並ニ胸内逼迫ニ宜シ

○第七百九十四方

實芰答利斯末六瓦至十二瓦 白糖二錢

右調勻為散等分十二裹毎服一裹日四次

○第七百九十五方

Kitasato Memorial Medical Library

○實芰答利斯葉半錢至二錢　熱湯適宜浸漬八分時濾取四弓加過爾托舍利別半弓

右調和每服一食匙日四次

○第七百九十六方

實芰答利斯丁幾半弓

右每服十滴乃至二十滴日三次

〔主治〕右數方十百九十四方至七百九十六方　胸内逼迫及ヒ他ノ心臟器敗症ニ宜シ○實芰答利斯内服ニ堪ヘザル片ハ之ヲ丁幾劑ニ作リテ塗擦シ或ハ心部ニ芫菁膏ヲ貼シテ表皮ヲ剥キ去リ實芰答利斯末一氏若クハ二三氏ヲ撒布スル丁日ニ二次　賢垤兒麻質斯法

○第七百九十七方

實芰答利斯浸六弓以實芰答利斯葉半錢製者　老利兒水一錢　櫻實舍利別弓

右調和每一時服一食匙

○第七百九十八方〔私屈列呻傑爾〕

○萵苣越幾斯二氏　實芰答利斯末半氏　白糖半刃

右調勻為散分八裹每一時服一裹

○第七百九十九方

萵苣越幾斯十六氏　老利兒水半弓溶化

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻毎一時服二十五滴

主治第七百九十七方ヨリ七百九十九方至皆胸内逼迫。痙攣喘等ニ宜シ

○第八百方（匹篤失葛弗昔答利斯末半　白糖半）

阿芙蓉丁幾二刃　老利兒水二銭

右調勻毎一時服十滴乃至十五滴

主治胸内逼迫ニ宜シ此方ニ兼テ毎晩或ハ隔晩水製蘆薈越幾斯一氏ヲ用フベシ

○第八百一方（瞎豐爾田）

阿芙蓉丁幾　安質没尼酒　各一銭

右調勻毎晩臨臥服十滴乃至二十滴

主治胸内逼迫ニ宜シ其症間歇ノ間モ亦用フベシ

○第八百二方（骨布）

結晶硝酸銀三氏　蒸餾水二三滴溶化加後味二

蘘粉　甘草末各三十六氏　亜剌毘亜護謨漿適宜

右作三十六丸衣過爾托末早午晩服二丸

主治胸内逼迫胃神經病等ニ宜シ○硝酸銀ノ量漸徐ニ増加シテ六日半氏ニ至ル但一劑ヲ盡スノ後ハ姑後服ヲ停ムベシ」便秘スル者ハ苦味水ヲ用フルヲ好トス

○第八百三方（失布頡爾姪耳）

Kitasato Memorial Medical Library

○結晶硝酸銀（半刃）蒸餾水適宜溶化加後味

阿芙蓉（末六匁）癒瘡木脂（三錢）

右調勻二匁為一丸衣遏爾托末玻璃壜收貯朝夕服三丸

〔主治〕同上

第二　多血畜積病（コンゲスチオ子スサングイニス羅ブルトズオッポトピンゲン蘭）

實症ハ放血或ハ蜞鍼內服消石或ハ之ニ純精酒石ヲ伍スル者（九方至十二方。十四方。八百四方。八百五方）結晶水（四方）沸騰散（二方。三方。八百八方）中和鹽製清涼下劑（十五方。十六方。五十四方至六十方。八百十八方。八百十九方）答麻林度（十六方。九十三方。九十六方。五百七十五方至五百七十七方）複方旃那昆設兒弗（八方。七百四十方。七百七十一方）植酸（八百九方至八百十七方）等ニ宜シ又多ク冷水ヲ飲マシムベシ

且誘退法トシテ足心ヲ蒸湯シ若クハ温水ニ灰鹽或ハ石鹼ヲ和シテ脚ヲ浸シ又蒸餾母芫菁膏等ヲ貼スベシ○實性ニシテ感觸鋭敏ノ症ハ適宜ニ上ノ方法ヲ施用スルノ外鑛酸（八百廿方。八百廿一方）ヲ以テ鎮靜藥（血脈系ノ感觸過敏ヲ鎮定ス）ニ配伍セル者小量阿芙蓉實芰答利斯等最宜トス○虛症モ亦鑛酸類殊テ冷水外用（血頭上ニ逼迫スル者ハ宿繆結爾氏ノ寒罨法ヲ最稱用ス第四百六十八方ヲ參照）スベシヲ最的當トス○其他此症ヲ繼發スルノ懼レアル者並ニ血ノ畜積スル器ニ隨ヒ各症醫意ヲ加ヘテ治法ヲ下スベシ

○第四百八方〔茉兒鳩私〕

Kitasato Memorial Medical Library

精製消石　白糖各半刃

右調匀為散分八服每一時乃至一時半一服

○第八百五方（同上）

精製消石半刃　純精酒石　白糖各一刃

右調匀為散分八裹每一時乃至一時半取一裹冷水送下

（主治）右二方八百四方八百五方實性多血畜積症ニ宜シ

○第八百六方（同上）　清涼散

枸櫞酸加里二錢　孕礬酒石四刃　消石二刃　人造銀朱八氏

右調和為散等分八裹每一時乃至一時半服一裹

（主治）實性多血畜積ニ宜シ並ニ蒸氣閉塞セシ後未確著ノ見症ヲアラザル者ニ用フベシ○當今一般ニ此ニ銀朱ヲ伍スル者ハ怪シムベシト雖先輩既ニ銀朱ノ大ニ吸收管ノ運機ヲ振起シ且神經系ノ覺機過敏ヲ鎮靖スルノ効ヲ稱セリ輓近ニ至テ匹篤失葛弗土人名モ亦世醫之ヲ貶シテ醫藥ノ列ヲ除クヲ歎ゼリ

○第八百七方（同上）

純精酒石一刃　白糖半刃

右調和為散分八裹每一時乃至一時半取一裹冷水送下

○第八百八方（同上）　沸騰散ピュルフヰス。アーロポリュス羅

酒石酸半刃至一刃　麻倔涅失亜白糖各一刃至二刃

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻為散分八裹每一時乃至一時半取一裹投冷水乘沸騰服之

○第八百九方　里沒拏姪散

酒石酸二錢　枸櫞油糖三分

右調勻為散取一二茶匙和冷水作佳味酸液服

○第八百十方（扑滮私）

白糖四分　常水適宜煮為錠稠加後藥

酒石酸末二錢　枸櫞皮油十二滴

右作錠三十二個入私葛肘刺器名與之取半錠乃至二錠令含口善消渴清熱

○第八百十一方（同上）

酒石酸末二錢　白糖末四錢　達刺侃篤護謨漿適宜

右作錠八十個衣乳糖私葛肘刺器名收貯時々服一二錠善消行旅煩渴又清熱

主治實性多血畜積症感觸過敏ノ者之ニ宜シ

○第八百十二方（茉爾鳩私）

純精酒石半錢　孕礬酒石半刃　白糖一刃

右調和為散分八裹每一時乃至一時半取一裹冷水送下

○第八百十三方（福倔篤）

純精酒石　孕礬酒石各三錢　枸櫞油糖一錢　白糖五錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻為散入私葛肘刺器名與之每服取一茶匙强攝兒都爾水一盞和用

〔主治〕右二方八百十二方八百十三方胸部及ヒ頭上多血畜積ニ宜シ

○第八百十四方〔戾兒〕

酒石酸二錢　蒸餾水一弓融化加麗春花舍利別三弓

右加冷水合勻作佳味酸液服

○第八百十五方〔私傑福傑兒〕

酒石酸一錢　覆盆子水五弓溶解加覆盆子舍利別一弓

右調和每一時服一食匙强

〔主治〕右二方八百十四方八百十五方清凉劑トシテ多血畜積症ニ用フ

○第八百十六方〔栗屈的兒〕

枸櫞汁新綴三弓　覆盆子舍利別弓　井水四比

右調和為飲料

○第八百十七方

醋弓　井水二比　白糖適宜味佳為度

右調和為飲料

〔主治〕右二方八百十六方八百十七方渴ヲ消シ。血液ノ逼迫ヲ鎮メ。又發汗利尿ノ効アリ

○第八百十八方〔栗屈的兒〕

蒸餾水四　每症必消燥劑

Kitasato Memorial Medical Library

○孕硼酒石半弓　吐酒石一氏　蒸餾水四弓

右調和每一時服一食匙

○第八百十九方〔別連杜〕

精製芒硝一弓半　白糖三弓　常水十六弓溶解加枸橼汁新絞濾去渣半弓

右調勻為飲料名瀉下里没拏姪

〔主治〕右二方八百十八方八百十九方　血脈系ノ運機ヲ變更シ且瀉下ノ効アリ　胸部及ヒ頭上多血畜積症殊ニ之ニ宜シ

○第八百二十方

硫酸密幾私丟爾〔代用收斂亜的兒半錢〕　覆盆子舎利別二弓

右冷水和勻為佳味酸液

○第八百二十一方

稀硫酸半錢　常水北　白糖適宜味佳為度

右調勻為飲料

〔主治〕右二方八百二十方八百廿一方　實性及ヒ神經性多血畜積症ニ宜シ

第三　失血病ハモルラギアー羅ブルードフルーインゲン蘭

實性ノ失血ハ純一ノ消焮療法ヲ要ト〔ス〕放血。蜞鍼消石八百廿二方　清涼中和鹽八百廿三方　實芟答利斯。引赤劑。衝動脚浴等ニ宜シ

○實性失血神經力過敏ニ因ル者ハ毎症必消焮劑ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

要セズ若之ヲ用フルトキハ總テ謹愼ヲ加フベシ」内服ハ鑛酸八百廿四方八百廿五方ヲ以テ阿芙蓉。菲阿斯。實芰答利斯。小量吐根ノ如キ鎭痙藥ニ配スルヲ佳トス」誘退法モ亦施スベシ○虛性失血症血脈系ノ衰弱若クハ將ニ麻痺セントスルニ因テ來ル者ハ收嗇劑ヲ用ヒテ速ニ遏止スルヲ要トス若其前兆ヲ見ハストキハ隨テ即之ヲ用フベシ鑛酸モ亦此ニ宜シ其他明礬八百廿七方至八百廿八方刺達尼亞八百卅方至八百卅二方紺百設木八百卅三方八百卅四方吉納護謨八百卅六方阿仙藥。拳參。篤爾面窒兒刺八百卅五方結列阿速篤等是ナリ」外用寒罨法ニ宜シ○其他失血スル所ノ器ニ從フテ施治スベシ。肺血ハ實芰答利斯ニ宜シ。虛性子宮血ハ桂皮効アリ○畜血症條ニ載ル所ノ方法亦中等ノ實性失血ニ通用シテ可ナリ」

○第八百二十二方〔福倔列爾〕

吐根末三匁　酒石酸半刃　消石或孕礬酒石二錢　乳糖六錢

○右調勻為散每服一刀尖或一哥喜匙强日二三次

〔主治〕諸失血殊ニ痔血或ハ經血過多ノ症ニ宜シ

○第八百二十三方〔匹篤失葛弗土〕

芒硝四刃　精製阿芙蓉三匁

○右調勻為散等分四褁每服一褁日二三次

〔主治〕失血症先瀉血シテ多血ヲ防クノ后之ヲ處スルニ

Kitasato Memorial Medical Library

宜シ

○第八百二十四方〔孤刺律秘〕

稀硫酸一錢　黑櫻實水四弓　覆盆子舍利別一弓

右調勻每半時或一時服一食匙

〔主治〕失血實症虛症並ニ皆之ニ宜シ

○第八百二十五方〔遠突土〕

稀燐酸二錢　沙列布薄煎六弓　覆盆子舍利別半弓至一弓

右調勻每一時服一食匙强

〔主治〕實性失血虛症ニ傾ク者之ニ宜シ又吐涎及ヒ黴毒性腐骨疽ニ効アリ

○第八百二十六方〔戚結魯〕

勿搦祭亞的列並底那一錢　醇硫酸二錢　以上二呆調勻內玻璃器漸徐加後味

再餾燒酒一錢

右調和每半時取十五滴乃至二十滴粘滑藥汁和服

〔主治〕虛性失血ニ宜シ

○第八百二十七方　明礬乳清

牛乳二北　入壺煮沸加明礬末二錢攪和再煮至酪質全分離濾過加雞子白二箇清淨之

右服半小盞若一小盞日二三次

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕咯血。嘔血。虛性子宮出血。心臟及ヒ大動脈ノ廣張。勞瘵脫汗。溶崩下利。及ヒ尿崩等皆之ニ宜シ○明礬乳清之ヲ生明礬ニ較レ八効力更ニ緩ナリ

○第八百二十八方〔布。弗蘭厄〕

生明礬一錢　亞剌毘亞護謨半錢

右調勻為散等分四裹每一時半服一裹

○第八百二十九方〔列加鄧爾〕

明礬六氏　阿芙蓉越幾斯一氏　阿仙藥廿四氏

右調和為六丸衣石松粉分服數次十二時間盡之

○第八百三十方〔春姪隣〕

剌達尼亞根一弓　井水十六弓煮耗至八弓加後藥

收斂亞的兒一錢　桂舍利別一弓半

右調和從症每半時服一食匙

○第八百三十一方〔福倔篤〕

剌達尼亞越幾斯　阿仙藥各半刃　精製明礬四氏　甘草末半刃

右調勻為散分十五裹每服一裹日三四次

○第八百三十二方

剌達尼亞越幾斯二錢　明礬半錢　菖蒲根末一錢

右二氏為一丸衣桂末每一時半服五粒乃至十粒

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕八百二十八方ヨリ八百三十二方至虚性失血症ニ宜シ

○第八百三十三方〔弇拂〕

紺百設木越幾斯二錢　葛私加栗刺越幾斯一錢　幾那越幾斯三錢　甘草膏二錢　槇楂核汁適宜

右為煉膏每服一茶匙日三次臨用宜攪和

〔主治〕虚性粘液過泄及ヒ失血ニ宜シ

○第八百三十四方〔布闌倔列〕

紺百設木越幾斯三錢　桂加酒水一弓半〔附〕　井水七弓　阿仙藥丁幾二錢

右調和每一時服一二食匙

○第八百三十五方

篤爾面窒兒刺越幾斯二錢　薄荷水六弓　越栗失爾必篤里阿里半錢　薄荷舍利別半弓

右調勻每一時服一食匙

○第八百三十六方〔春姪隣〕

吉納半錢　阿芙蓉二氏　桂油糖一錢

右調和為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

〔主治〕八百三十四方ヨリ八百三十六方至虚性失血症ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

衄血（エピスタキス）羅子（ウスブルーチング）蘭

此症ハ強テ抑壓スベキ者甚罕ナリ少壯ノ人ニ在テ殊ニ然リトス故ニ畜血症條ニ列載セル方法及ヒ精製消石（九方。百八方。）（四方。九六方）ヲ與ヘ脚湯ヲ施シ失血ノ甚シキ者ハ足ノ絡ヲ刺シ適宜ニ放血スベシ痔血或ハ經血閉止セル者ハ肛門若ハ陰部ニ蛭鍼ヲ用ヒ（一方。十四方。）清涼下劑（十五方。十六方。五十四方。百五十方。）酸性（百二十方至百二十九方。）血虛候ヲ呈シ生力虛脫（百三十二方至虛性失血症ニ）ノ懼レアリ。顏面口唇灰白色ニ變シ。脈細結代。眩暈等衰弱ノ諸証見ハルヽ者ハ止血ノ法ヲ處スルヲ切要トス（即冷水ニ醋ヲ加ヘテ鼻中ニ吸引セシメ。冰或ハ雪ヲ以テ前額ヲ按シ項窩陰部ニ寒罨法ヲ施シ兩手ヲ微温湯ニ漫シ。明礬或ハ皓礬ノ收斂溶液ヲ鼻中ニ射注シ。已ムヲ得ザレハ駝朴（パッパ）ヲ造リ明礬蛋白ノ合劑ニ醮シテ之ヲ挿入ベシ（流墨紙（洋紙ノ名）一片ヲ咀嚼（ムルイスピー）セシノ即効ヲ得ル屢之アリ）俗間項上ニ冷鍵（クリス）或ハ葱ヲ置クノ法アリ亦稱用スベシ（涅倔利兒（タンクリバル）人名）衄血劇症ヲ治スル法其鼻孔ヲ視テ衄血ノ一方ノ腑ヲ直立セシム以テ適當法トシテ稱賛スル所ナリ（一）實性ノ衄血ハ内服ニ小量吐根（八百廿二方。八百六十方）實斐答利斯（七百九十四方。七百九十五方。八百五十方）等効アリ（虛症ノ麥奴（八百廿七方）八百廿八方）鑛酸（八百廿四方）八百廿五方）及ヒ其他ノ收斂藥

Kitasato Memorial Medical Library

ニ宜シ○衂血老人ニ在テ屢發スル者ハ打膿法ヲ持重スルヲ稱譽セリ」患者虚憊シ又血溶渙ニ傾ク者ハ幾那及ヒ鑛酸ヲ用ヒテ効アリ

○第八百三十七方〔賜帖剌尼〕

麥奴末一錢　白糖半錢

右調和為散等分八裹毎ニ一時半服ニ一裹

〔主治〕子宮失血。衂血。欬血。血尿。ニ宜シ

○第八百三十八方〔同上〕

麥奴四匁　白糖一刃

右調和為散分ニ六服毎ニ一時一服

〔主治〕小兒衂血過多ノ症ニ宜シ盖五六歳兒ノ用ニ供ス

○第八百三十九方〔剌胄秘〕

○篤爾面窒兒剌根末二弓

右供外用

〔主治〕衂血過多ノ症ニ宜シ」此散末ニ醋適宜ヲ加ヘ捏和泥ヲ作リ前額ヲ按スベシ

○第八百四十方〔蒲列剌〕

赤石脂末　剌達尼亜末各一錢　加玫瑰醋適宜捏和為ニ外敷藥

Kitasato Memorial Medical Library

右按前額

〔主治〕同上

○第八百四十一方〔倔栗匪篤〕

血石二錢　明礬　赤石脂各一錢　血竭半錢

右研末合和供鼻散

〔主治〕虛性衄血過多ノ症ニ宜シ

○第八百四十二方〔春姪隣〕

刺達尼亞一弓　井水十二弓煮耗至六弓加醋二弓

右調和供射注藥

〔主治〕衄血。子宮出血。尿道出血過多ノ者ニ宜シ

○第八百四十三方〔別連杜〕

撒兒麻爾扶斯半錢至一錢半　撒爾非亞水四弓溶化加亞刺

毘亞護謨漿半弓

右調和供射注藥

〔主治〕虛性衄血並ニ子宮出血等ニ宜シ

咯血ハトモスチシス羅ノルトドスチシヅ蘭

〔咯血嘔血欬血等ノ名義諸書說ク所一定ナラズ貞ガ學固陋何ヒカ其據ルベキ者ヲ知ラズ書中譯ノ咯血トナス者ハ專血肺竅ヨリ出ヅルヲ謂ヒ嘔血ハ胃中ヨリスル者ヲ謂ヒ欬血ハ欬ト共ニ出血スルヲ謂フ名稱其意

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ盡スベカラズト雖唯辨別ヲ肯トスルノミ書中悉之ニ倣フ看者又宇ヲ以テ之ヲ論ズル勿レ」

實症ハ放血ヲ首トス（湯藥及ブ膝上ニ並ニ兩膊ヲ温湯ニ浸シ。胸上脊推及ビ胃部ニ乾角法ヲ施シ。四肢ニ蒸餅ヲ貼シ。灌腸ヲ行ヒ。粘滑飲（米汁。深麥汁。沙列布。煎。燕麥汁。雞子白。）酸性飲（屋施蔑爾或ハ覆盆子醋ヲ冷水ニ和スル者ヲ飲料トス」内服ハ消石（九方至十二方。）十四方。八百四十方。）硇砂（百一方。百四十六方。）十五方。八百四十方。）油性乳劑ニ菲阿斯（ヒオス）越幾斯（エキス）ヲ加フル者（百八十五方。）百八十方。）等撰用スヘシ○實性若クハ痙攣性ノ者ハ實斐答利斯（ダキ）ヲ以テ首藥トス（七百九十四方。七百九十五方。八百五十七方。）

至八百六十方）之ニ次テ吐根ヲ宜トス（八百廿二方。八百六十一方。）」麥奴（八百三十七方。）

（八百三十八方。）（八百六十四方。）並ニ鉛糖（八百七十一方至七十三方。）亦稱用セリ實性ノ咯血ハ殊テ之ヲ宜シ」然レドモ余ハ鉛糖ヲ内服最危險ニ屬スト他ノ諸症ニ至テモ亦然リ○虛性咯血ハ鑛酸（八百廿四方。八百廿五方。八百六十七方。）明礬（八百廿七方至八百廿九方）食鹽（八百四十方至八百四十九方）結列阿（オ）速篤（八百七十方）紺百設木（八百三十方）八百廿四方。）刺達尼亞（八百廿四方至八百廿六方）其他收斂藥ヲ好トス」

外用ハ殊ニ胸上或ハ陰部寒冷法ヲ施スヘシ（蓋之ヲ胸上ニ施スハ每症危險十リトス唯其症已ニ希望スル所ノ者ニ於テ之ヲ試嘗スベキノミ）

○第八百四十四方（過傑栗屈的兒）

過兒托膏（三錢）熟湯六匁溶化加後藥

精製消石一錢至二錢

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕焮衝性咯血ニ宜シ

○第八百四十五方〔獵歇蘭度〕

精製消石三錢　純精酒石二錢　井水六弓溶化加後藥

實芰答利斯越幾斯一瓜至二瓜　過兒托舍利別一弓半

右調勻初每四分時後每半時乃至一時服二匙

〔主治〕咯血焮衝ヲ兼ヌル者ニ宜シ之ヲ與フルノ前放血及ヒ脚浴ヲ兼施スベシ

○第八百四十六方〔枲盼件別爾倔〕

精製硇砂　甘草末各一刃至半錢

右調勻為散分十二服每一時一服

〔主治〕實性咯血危重ノ者ニ宜シ鑛酸効アラザル者モ亦之ヲ用ヒテ能ク欬血ヲ止ムルヿアリ

○第八百四十七方〔魯葛孤刺律私〕

精製食鹽適宜

右每八分時服一茶匙强

〔主治〕咯血ニ宜シ

○第八百四十八方〔兒越索斯〕

精製食鹽一弓　井水十弓溶化

Kitasato Memorial Medical Library

右一二劑暫時服盡

〔主治〕欬血ニ宜シ殊ニ放血ヲ要スル症多ク之ヲ用フ之ニ兼テ二三日間稀淡ノ枸櫞製里謨拏姪ニ些ノ食鹽ヲ和服セシム

○第八百四十九方〔叔密篤滿〕

精製食鹽一刃至半錢　亜剌毘亜護謨末　甘草末各半刃　實芰答利斯葉末一匁

右調勻為散分八服毎一時一服

〔主治〕咯血ニ宜シ

○第八百五十方〔剌胄私〕

過硫酸加里半弓　覆盆子水四弓　覆盆子舍利別一弓

右調和毎四分時或半時服一食匙強

〔主治〕諸般ノ失血殊ニ肺及ヒ子宮出血症便秘スル者之ニ宜シ

○第八百五十一方〔謨私篤〕

純精酒石二錢　覆盆子水八弓

右調和毎四分時取一食匙強燕麥粘汁和服

〔主治〕實性咯血ニ宜シ

○第八百五十二方〔戚歇蘭度〕

酒石酸一刃　菲阿斯越幾斯八匁　井水四弓溶化加遏爾

Kitasato Memorial Medical Library

抱舍利別一弓半

○右調匀每四分時服一食匙

〔主治〕咯血痙攣ヲ帶ブル者ニ宜シ

○第八百五十三方〔顯爾列斯〕

菲阿斯油半弓　甘扁桃油一弓

○右調匀每服一茶匙日二次乃至四次

○第八百五十四方〔過傑栗屈的兒〕

菲阿斯油半弓　亞剌毘亞護謨末六錢　徐々搗和加後藥

遏兒抱舍利別一弓　黑櫻實水六弓

○右調匀每一時服一食匙

〔主治〕痙攣性欬血ニ宜シ○蓋菲阿斯油ニ代ヘテ甘扁桃油ヲ用ヒ且菲阿斯越幾斯二氏ヲ加フルヲ更ニ適當ナリトス

○第八百五十五方〔賊歇蘭度〕

甘扁桃油一弓　亞剌毘亞護謨一弓半　加井水十六弓搗和如法作乳劑加扁桃乳舍利別一弓

○右調匀每半時服半小盞

〔主治〕咯血症痙攣及ヒ胸痛ヲ兼ヌル者ニ宜シ之ニ兼テ胸上ニ鎮痙罨法兩膊ニ芥子泥ヲ貼スヘシ

○第八百五十六方〔遠突土〕

Kitasato Memorial Medical Library

○鳳仙花油二弓

右毎半時服一茶匙

〔主治〕痙攣性咯血ニ宜シ

○第八百五十七方

實芰答利斯葉五匁　熱湯適宜浸漬濾取十錢加後藥

亜剌毘亜護謨二錢　白糖半弓　舎電阿芙蓉液六滴

右調勻為舐劑毎一時半服一茶匙强

〔主治〕實性咯血。肺勞等ニ宜シ

○第八百五十八方〔臧歐蘭度〕

實芰答利斯葉半錢　井水適宜煮濾取液七弓加後藥

格魯林水二錢　老利兒水一錢

右毎一時服一食匙

○〔主治〕痙攣性咯血多血畜積ヲ兼ヌル者ニ宜シ先適宜ニ放血シテ後消石ニ菲阿斯ヲ加ヘ用フ此ニ於テ粘滑汁ニ收斂亜的兒ヲ配スル者或ハ上ノ方ヲ兼用スベシ

○第八百五十九方

阿芙蓉丁幾一刃　實芰答利斯丁幾二錢

右調勻早晩服十滴乃至十五滴

○第八百六十方〔謨私篤〕

葛私篤僂謨二匁　實芰答利斯一匁　孕鹼酒石六匁　亜剌

Kitasato Memorial Medical Library

毘亞護謨末　白糖各半刀

○右調和為散分六裹每服一裹日三次

○第八百六十一方〔獵歇蘭度〕

吐根一瓜　白糖二錢

○右調勻為散等分八裹每八分時服一裹

〔主治〕第八百五十九方ヨリ八百六十一方至痙攣性ノ咯血ニ宜シ

○第八百六十二方〔孤刺律私〕

實芰答利斯葉半錢　加熱湯適宜飽熟八分時濾取六弓

溶化刺達尼亞越幾斯半錢乃至一錢

右調勻每一時半服一食匙

○〔主治〕實性ノ咯血虛症ニ傾ク者ニ宜シ

○第八百六十三方〔哿寧倔私別爾倔地名孤羅屑〕

歇爾蘭獨留謨子二錢　熱湯適宜浸漬濾過取六弓

○右每一時服一食匙

〔主治〕血脈興奮機亢進セル症。咯血。及ヒ肺勞ニ宜シ

○第八百六十四方〔獵屈私〕

麥奴一錢　實芰答利斯十五瓜　熱湯適宜浸漬濾取五弓

溶化消石一弓半後加鑛舍利別〔未詳〕半弓

右調勻每半時服一食匙

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕勞瘵肺ノ失血ニ宜シ

○第八百六十五方〔篤姪〕

稀硫酸二錢　覆盆子舍利別十四錢

○右調和每服取一茶匙强令舐而緩徐嚥下次後與燕麥粘汁

○第八百六十六方

稀硫酸一錢　阿芙蓉丁幾二十滴至三十滴　菫菜舍利別二弓

○右調和每半時服一茶匙

○第八百六十七方〔獄歇蘭度〕

收斂亞的兒六十滴　舍電阿芙蓉液二十滴　井水四弓　麗春花舍利別二弓

右調和每四分時服二食匙

○〔主治〕右三方八百六十五方至八百六十七方　痙攣性咯血虛症ニ傾ク者ニ宜シ

○第八百六十八方〔同上〕

精製燐酸一錢　蒸餾水半弓　櫻實舍利別二錢

○右調勻每八分時服十滴乃至二十滴

〔主治〕虛性咯血ニ宜シ○又結毒夜間骨痛等ニ稱用ス

○第八百六十九方〔遏傑栗屈的兒〕

紺百設木越幾斯二錢至三錢　酒石酸一錢　黑櫻實水六弓

Kitasato Memorial Medical Library

覆盆子舍利別六錢

右調和每半時服一食匙強

〔主治〕虛性咯血ニ宜シ

○第八百七十方

結麗阿速篤六滴　白糖　過兒托末各一錢

右調勻為散等分三褁每服一褁日二三次

〔主治〕虛性欬血。肺勞ニ宜シ

○第八百七十一方〔過傑。栗屈的兒〕

鉛糖五氏　阿芙蓉半匁　蓍草越幾斯　甘草末各一錢

右調和為六十丸衣石松粉每二時服三丸

〔主治〕咯血肺ノ虛弱ニ因リ感觸過敏証ヲ兼ヌル者之ヲ用ヒテ再發ヲ防グニ宜シ

○第八百七十二方〔骨布〕

鉛糖六氏　過兒托末　遠志越幾斯各一錢

右調和為六十丸衣石松粉每服二粒乃至五粒日四次

〔主治〕咯血。虛性子宮出血。肺勞ニ宜シ○其症ニ從ヒ或ハ之ニ阿芙蓉二氏ヲ伍スルモ可ナリ此ニ由テ亦能ク鉛糖毒ヲ制ス

○第八百七十三方〔機利蔑爾〕

阿芙蓉四分氏　精製鉛糖二氏　醋酸曹達乾者三氏　乳糖五氏

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散分八裹毎一時取一裹封糊被之送下

○〔主治〕失血危重ノ症ニ宜シ○盖此散藥ハ唯病狀危篤ノ際連服スベシ久シキモ二日ニ過クベカラズ

○第八百七十四方〔孤刺律私〕

鹿角菜半錢　井水適宜煮濾取液六弓加後藥

燐酸曹達一錢半　阿芙蓉舎利別二錢至三錢

右調勻毎一時服一食匙

○〔主治〕欬血ニ宜シ但欬ノ間隙ヲ候ヒ用フ

嘔血ハーマテメシスハフラミチュスクリュヱンチュス羅ブルードブラーケン蘭

此症焮衝狀ヲ見ハス者ハ足ノ絡ヲ刺テ放血シ痔血閉若

クハ經閉ニ因ル者ハ肛門或ハ陰部ニ放蜞ス」其他脚浴。腓腸蒸餅母。胃部醋罨法ヲ施シ。粘滑ノ飲液。冷水ニ亞刺毘亞護謨漿ヲ加フル者。凉潤ノ舎利別。酪餘等ヲ與フルニ宜シ但之ヲ與フル皆小量ニ宜シク総テ硬固ノ食物ヲ忌ム」多般ノ醫藥ヲ要セズ唯里歇利飲一方或ハ其症ニ準シテ之ニ阿芙蓉液二三滴ヲ加フル者。沸騰散二方。三方。八百八方等ヲ用ヒ。後答麻林度煎ニ孕鹼酒石或ハ孕硼酒石八百七十五方八百七十六方ヲ伍スル者答麻林度乳清百卅五方。八百七十七方及ヒ酒酸加里曹達ニ滿那ヲ加ヘ八百七十九方用フベシ○痙攣性嘔血ハ至テ小量ノ吐根八百六十一方菲阿斯越幾斯八百八十方。八百八十五方老利兒水八百八十一方至八

Kitasato Memorial Medical Library

百八十六方攣痛甚シキ者ハ阿芙蓉及ヒ麝香ニ宜シ○收斂藥ヲ用ヒテ驟ニ嘔血ヲ遏止スルハ極メテ危シ唯虛性ノ症ニ在テハ細心ニ收斂劑ヲ用ヒ以テ之ヲ止ムベシ」明礬乳清八百廿七方ヲ最稱譽セリ之ヲ用ヒテ後鑛酸八百八十七方八百八十八方ヲ與ヘテ佳ナリ」又鉛糖八百七十一方至八百七十三方結麗阿速篤八百七十方的列並油八百八十九方八百九十方麥奴八百卅七方剌達尼亞八百卅方至八百卅二方等皆其症ニ從テ撰用スベシ○其他氷冷水ヲ囊ニ盛リ或ハ疊布ヲ醮シテ胃部ヲ按シ又氷ヲ細碎シテ急ニ嚥下セシムルヲ佳トス」凡此症小腹ノ閉塞ニ起因セルヲ以テ後治法ニ多ク解釋劑ヲ用フルヲ好トス即蒲公英蘆根珊篤里白屈菜等ノ越幾斯ニ緩性中和鹽ヲ伍スル者八百九十一方醋酸加里液酒酸加里曹達孕硼酒石等是ナリ」末期ニ至テ幾那ヲ用フト雖最緩方八百九十二方八百九十三方ニ宜シ」此症胃弱ヲ遺ス者多シ若之カ爲ニ欺カレテ衝動健胃藥ヲ用フルトキハ其害極メテ甚シ

○第八百七十五方

答麻林度二弓　常水十二弓煮濾取八弓溶化後藥

○孕硼酒石一弓

右調勻爲散每一時服一食匙

○第八百七十六方

Kitasato Memorial Medical Library

○孕硼酒石半弓　常水六弓溶化加答麻林度一弓半

右調匀毎一時服一食匙

○第八百七十七方〔炭兒〕

答麻林度二弓　答麻林度乳清六弓

右調匀毎一時服半小盞強

〔主治〕第八百七十五方ヨリ八百七十七方至嘔血ノ初起一二日之ヲ用ヒテ以テ腸ノ下部ニ漏出セル參爾様ノ血ヲ排泄スルニ宜シ又肝臓慢性症ニ用フベシ第百三十五方ヲ參照スベシ

○第八百七十八方〔弗。懣私〕

旃那一錢　純精酒石一錢半　満那　答麻林度各一弓半

砂糖舎利別適宜味佳為度

右調匀作煉膏毎服一哥喜匙強日二次乃至三次

〔主治〕嘔血及ヒ痔血ニ宜シ又痔脈ノ血鬱ヲ除カント欲スル時ハ之ニ精製硫黄二錢ヲ加フベシ

○第八百七十九方〔茱爾鳩私〕

酒酸加里曹達半弓　上好満那一弓　常水九弓溶化

右濾過毎一時服一食匙強

〔主治〕嘔血症之ヲ用ヒテ瀉ヲ促シ腸中漏出セル血ヲ排除スルニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第八百八十方

菲阿斯越幾斯四氏　白糖四刃

右調勻為散等分八裹每一時服一裹

○第八百八十一方

老利兒水一錢

右每服十滴乃至十二滴日四次

○第八百八十二方（謁愍倫）

老利兒水二錢　覆盆子舍利別一弓

右調勻每服一茶匙強日四次

○第八百八十三方

老利兒水二錢　亞剌毘亞護謨漿　遏爾托舍利別各一弓

右調勻每服一小　哥喜匙強日四次

○第八百八十四方

老利兒水三錢　煎餾水一弓半　櫻實舍利別一弓

右調和每服一茶匙日四次

〔主治〕第八百八十一方ヨリ八百八十四方至皆痙攣性嘔血ニ宜シ○蓋初學ノ徒ハ老利兒水單味ヲ用フルヨリ

○第八百八十二方乃至第八百八十四方ヲ撰用スベシ

○第八百八十五方

菲阿斯越幾斯一刃　老利兒水半弓溶化

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每服七滴乃至十四滴日四次

〔主治〕痙攣性嘔血ニ宜シ

○第八百八十六方〔謨和篤〕

老利兒水半弓　桂丁幾一弓

右調勻每服五十滴乃至六十滴日四次

〔主治〕嘔血症下血遷延持久シ且麻痺証ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第八百八十七方

玫瑰葉加硫酸丁幾〔附三錢〕　覆盆子水四弓　櫻實舍利別半弓

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕輕ク下血ヲ止ムルニ宜シ

○第八百八十八方

硫酸密幾私去爾半錢至一錢〔代用收斂亜的兒〕　沙列布煎六弓以沙列布一刃

製者　覆盆子舍利別一弓

○右調勻每一時服一食匙

〔主治〕同上此方收斂ノ効前方ニ優レリ

○第八百八十九方〔咯爾密葛兒〕

的列並油一錢　雞子黄一箇　攪和徐々加後味

甘扁桃乳四弓　橙皮舍利別二弓　精製曹達三匁　桂丁幾

Kitasato Memorial Medical Library

四滴

右調和毎二一時乃至一時半服二食匙

○考咯爾密葛兒人名　此方ヲ以テ的列並油劑中最適宜ノ方ト云

○第八百九十方　蒲羅揭

的列並油二十五滴　桂水一弓　橙皮淡利別一錢

右調和頓服

○主治　英國ノ醫ハ總テ麻痺性ノ失血症ニ的列並油ヲ稱譽シ就中腸胃ハ出血及ヒ血斑症ニ之ヲ稱用セリ　骨布蘭度人名ノ說ニ據レハ四分時毎ニ的列並油二十滴乃至三十滴ヲ與ヘ又之ヲ灌腸塗擦菴法ト云　噎魯利阿篤損人名ハ一時半乃至二時毎ニ二十滴乃至二十五滴ヲ與ヘ若之カ爲ニ惡心ヲ發スルトキハ青酸ヲ配用セリ　然レトモ的列並油ヲ用フルハ毎症最謹慎ヲ加フヘシ　獨粘液質ノ人ニ於ケル鈍性衰弱症ノ如キ分能ク之ニ堪フルナリ

○第八百九十一方　[illegible]傑。福傑兒

孕鹼酒石三錢　接骨木花水六弓溶解加ニ後藥

蒲公英流動越幾斯　蘆根流動越幾斯各半弓　屋施蔑爾一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻每一時服一盒匙臨服宜振盪

〔主治〕小腹ノ閉塞症通例嘔血ノ因タル本復ノ期ニ及ヒ之ヲ用ヒテ功ヲ收ヘシ

○第八百九十二方〔春姪隣〕

答麻林度二錢　寒製幾那越幾斯二錢　枸橼油糖六錢　遏施應亞的兒一錢

右調和作煉膏入器固封與之每一時服一茶匙臨服宜攪和

○第八百九十三方〔同上〕

上好亞剌毘亞護謨二錢　蒸餾水三弓　橙花水二弓　溶解加後藥

遏施應亞的兒半錢　寒製赭色幾那越幾斯三錢　橙皮舍利別弓

右調和每一時服一食匙

〔主治〕右二方八百九十二方病後身弱ノ者之ヲ用ヒテ補益スベシ　方中遏施應亞的兒ヲ去ルトキハ應當ノ症更ニ多カルベシ

黑病タラトナ○モルヲ。ニヌ。ニゲル。ヒボ。ヲ。ヨキテ蘭

此症治法畧嘔血ニ同上但放血スルヿ罕ナリ誘退法ト以テ蒸餅母ヲ貼シ手足ヲ刺戟藥湯ニ浸シ或ハ兩脚蒸溺法

Kitasato Memorial Medical Library

緩和灌腸等之ニ宜シ」[illegible]歇蘭度[illegible]ハ胃部ニ香竄麻醉ノ微温罨法ヲ殊ニ稱用セリ」遽ニ其失血ヲ抑遏スルヿ勿レ即之ヲ防クニ先答麻林茂乳清（百三十五方。八百七十七方）酒石酸（八百十四方。八百五十方）ヲ與ヘ後鑛酸（八百八十八方）極小量鉛糖。明礬。明礬乳清（八百廿七方。八百九十四方）刺達尼亜（八百廿方至八百廿二方）的列並油（八百八十九方。八百九十方）等ヲ撰用スベシ」腸管ノ觸動機ヲ鎮靖スル者ハ即謨爾比捏（八百九十五方）老利兒水（八百八十一方至八百八十六方）是ナリ蓋阿芙蓉ハ腸ノ運營ヲ遲鈍ナラシムル故ニ之ヲ忌ム」病持久シテ患者虚憊スルトキハ麥蘗湯浴及ヒ肉羹汁ニ雞子白ヲ加ヘタル灌腸ヲ行フベシ」内服ハ深化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那劑（八百九十六方。八百九十七方）依蘭台（八百九十八方）等ヲ好トス」小腹内閉塞症ハ大抵毎症之アリ能ク此ニ着眼スベシ」再發ヲ防グハ蓍草（八百九十九方。九百一方）ヲ良トス

○第八百九十四方

生明礬（二瓜至五瓜）　乳糖（半刃）

右調和為散分十二裹毎服一裹日四次

主治　腸中血ノ滲出ヲ防グニ宜シ」然レ𪜈多クハ明礬乳清（八百廿七方）ヲ以テ優ニリトス

○第八百九十五方

醋酸謨爾比捏（十二分瓜。八分瓜乃至四分瓜）　乳糖（半刃）

Kitasato Memorial Medical Library

右調匀為散分八服朝暮一服

〔主治〕黒病ニ用ヒテ腸ノ觸動機ヲ鎮靖スルニ宜シ

○第八百九十六方

〔赭色幾那二錢至三錢〕熱湯四弓浸一二時濾取液加橙皮舍利別半弓

右調匀毎一時服一食匙

○第八百九十七方

〔赭色幾那半弓〕井水八弓煮耗至四弓紋濾放冷加橙皮舍利別三錢

右調匀毎一時服一食匙

〔主治〕右二方八百九十六方八百九十七方患者本復ノ期ニ方テ生力ヲ振起スルニ宜シ

○第八百九十二方及ヒ八百九十三方モ亦用フベシ

○第八百九十八方

〔依蘭苔三錢至半弓〕格綸僕一錢常水八弓煮濾取六弓放冷加桂舍利別半弓

右調和毎一時服一食匙

〔主治〕病后衰弱ヲ補益スルニ宜シ○或ハ單純ノ滋養方三百六十二方至三百六十八方。三百七十六方至三百八十二方。適當スル者多シ

○第八百九十九方

Kitasato Memorial Medical Library

蓍草越幾斯一錢半　黙栗薩水四弓

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕黒病本復ノ期ニ方テ極メテ再發ヲ防グベシ此方之ニ宜シ

○第九百方

蓍草　蒲公英　紫菫各新葉二弓

右入石臼搗爛漸徐加薄荷水一弓半絞濾清定取上澄毎朝飲服

○第九百一方

蓍草葉　蒲公英葉各新絞汁一弓

右精細濾過清定取上澄更加薄荷油糖半弓溶解毎朝飲服臨服宜振盪

〔主治〕右二方九百方。九百一方　患者本復ノ期ニ。及ビテ小腹ノ閉塞ヲ解散スルニ宜シ

遠西方彙卷之八

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之九

獨乙加。幾。安頓　著

和蘭傑。安婆都　譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲　重譯

南洋伊東亨健夫　參校

痔ハーモルロイデ羅ハーモルロイダールシーキテ蘭

痔ノ療法二般ニ分ツ曰ク根治法曰ク姑息法是ナリ」其症根治法ニ宜シキ者ハ之ヲ用フルヿ固ヨリ論ナシ然レ𪜈痔既ニ深ク宿根シテ其全治ヲ望ムベカラズ而メ諸見證

Kitasato Memorial Medical Library

極メテ困難加之生命モ亦危キニ臨ムニ至テハ特ニ姑息法ヲ施スヨリ他ナシ

第一　根治法ハ攝養ヲ節スルノ外專小腹ノ血行ヲ進メ且大便ヲ利シ總テ腹臟ノ鬱積ヲ除クノ藥ヲ用フルニアリ即此ニ屬スル者ハ蘆根。蒲公英。麻爾羅歇越幾斯等ノ如キ緩性解釋藥ニ孕鹼酒石ヲ配スル者九百二方至九百四方硫黃九百五方至九百八方蘧謨安尼亞幾ニ大黃石鹼及ヒ解釋越幾斯劑ヲ配スル者九百十方至九百十四方蓍草九百十五方。九百十六方灌腸法九百十九方至九百廿二方殊ニ諸種ノ鑛泉例スルニ葛爾私泉及ヒ茉闍泉ノ如キ健身泉是ナリ」輓近ニ至テ弗蘭臼刺皮九百十八方尤物ノ名アリ

第二　姑息法　專痔血ヲ漏出セシメテ其困難危險ヲ防グヲ要トス」其之ヲ漏出セシムニハ温水ニ灰。鹽。若クハ石鹼ヲ加ヘテ之ヲ猛烈ナラシメ以テ脚ヲ浸シ。蒸氣ヲ以テ肛門ヲ温メ緩性刺戟藥ヲ腸ニ灌ヤ。四週毎ニ肛門ニ蜞鍼ヲ施シ又硼砂。蘆薈。沒藥。雜腹蘭。黑列僕里。銕劑九百廿四方至九百廿九方等ノ如キ所謂被血藥ヲ用フ○痔血多過ノ者ハ其症ニ準メ清涼劑九百卅方鎮痙劑九百卅一方或ハ收濇劑九百卅二方ヲ施シ已ムヲ得ザレバ鑛酸明礬モ亦用フベシ○所謂盲痔モ亦緩下藥殊ニ孕鹼酒石ヲ與ヘ而メ諸種ノ軟膏九百卅三方至九百卅八方ヲ痛所ニ貼スベシ冷水ヲ以テ肛門ニ灌キ。或ハ寒罨法。或ハ冷水灌腸ヲ施スハ皆其症唯局處ノ衰弱ニ因ル者

Kitasato Memorial Medical Library

ニ適當ナリ◎粘液痔ハ強壯藥九百四十方至九百四十一方ヲ處スルヲ常トス◎膀胱痔ノ治法大概直腸痔ニ同シ唯僅ニ酎酌アルノミ」即解釋劑ヲ用ヒテ素因ヲ除クヿヲ務メ以テ根治ヲ圖ルベシ然レ𪜈根治ノ効ヲ收ムルヿ罕ナルガ故ニ其畜血ヲ直腸ニ導引スルヲ常トス四週毎ニ肛門ニ錤鍼四條乃至六條ヲ施シ或ハ刺戟藥ヲ用ヒテ灌腸シ又管ヲ以テ緩和藥ノ蒸氣ヲ攝シ直腸ニ送入スレハ能ク其効ヲ達スルナリ此症ハ衝動藥ヲ坐藥ニ作リテ用フルモ亦適當ナルベシ」又膀胱ノ部位及ヒ陰部ニ冷水ヲ灌クニ宜シ」内服ハ荅麻林度五百七十五方至五百七十七方孕硼酒石。酒酸加里曹達五十四方。五十五方。七百三十三方孕鈴酒石九百二方至九百四方等ノ如キ緩性瀉藥ニ宜シ」痙攣証ハ油性乳劑ニ非阿斯越幾斯ヲ伍スル者五百八方。五百十三方老利兒結爾私水八百八十一方至八百八十五方小量吐根百廿五方。五百卅七方。八百六十一方等佳ナリ」此他尿道漏血太多カラサル者ハ慢ニ止血藥ヲ用フルヿ勿レ若其血過多ナルトキハ停止セザルヲ得ス即粘汁ニ硫酸ヲ伍セル者二百一方明礬八百廿八方或ハ明礬乳清八百廿七方桂丁幾ヲ阿芙蓉丁幾葛私篤僂謨丁幾或ハ老利兒結爾私水ト配伍スル者此症的當ノ方トス蓋之ニ兼テ膀胱ノ部ニ寒罨法ヲ行フベシ◎膀胱粘液痔即所謂膀胱聖京倔症ノ治法ハ直腸粘液痔ト一般ナリ上ニ載

Kitasato Memorial Medical Library

スル所ノ强壯藥ノ外烏萃烏爾失ハ奇特ノ効アリ」鑛泉ノ中ニ就テ恚爾順傑兒泉ハ猘歇蘭度氏稱用セシヨリ膀胱ノ粘液痔ニ嘉稱ヲ得タリ」他ハ膀胱粘液流出症條下ニ詳說スル所ノ方法ヲ參照スベシ

○第九百二方〔落優〕

孕鹼酒石一弓　蒲公英越幾斯或濱翟麥越幾斯或蘆根越幾斯半弓　黙栗薩水六弓

右和勻朝夕服二食匙

〔主治〕諸種ノ痔ニ宜シ

○第九百三方〔猘歇蘭度〕

蘆根越幾斯　蒲公英越幾斯　孕鹼酒石各半弓　蒸餾水　薄荷水各三弓

右調勻每服一食匙日四次

〔主治〕痔脈閉塞症ニ用ヒテ微利ヲ持續セシムルニ宜シ

○第九百四方〔肸爾姪蒲蘭突土〕

孕鹼酒石　麻爾羅歇越幾斯各二錢　黙栗薩水三弓溶解

右調勻朝夕服半劑

〔主治〕上方ニ同シ

○第九百五方〔猘歇蘭度〕

Kitasato Memorial Medical Library

○純精酒石一弓　硫黄華半弓

右和勻為散每服一茶匙日一二次

○第九百六方

精製硫黄一錢至二錢　孕鹼酒石六錢　茴香油糖一錢　白糖半弓

右調和為散每服一茶匙强日三四次

〔主治〕右二方痔脈ノ閉塞ヲ通暢シ大便ヲ導泄スルニ宜シ

○第九百七方〔獵歇蘭度〕

硫黄乳　麻倔涅失亜　純精酒石　枸櫞油糖各一刃

右調勻為散晡時冷水一小盞和服

〔主治〕神經質人ノ痔疾ニ宜シ

○第九百八方〔過傑栗屈的兒〕

純精酒石　麻倔涅失亜　沈澱硫黄　茴香各二錢　龍腦八氏

右調和為散等分十六包每一時半取一包蓍草浸劑和服

〔主治〕痔疾家甚虚弱ノ者之ニ宜シ

○第九百九方

結列印依朴昆姪兒散

孕鹼酒石　橙皮黄　大黄　茴香各二錢　加耶普的油八滴

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻為散早晚服一茶匙强

○第九百十方　設兒列（人名）疎釋散

純精酒石（三錢）　麻倔涅失亜　加密列　硫黄萃　大黄

（各一錢）　茴香油（十滴）

右調勻為散每服一茶匙强日二三次

〔主治〕右二方（九百九方　九百十方）門脉系閉塞。胃腸虚衰。風氣欝畜。大便不利。依朴昆姪（イポコンデル）兒等ニ偉効アリ

○第九百十一方〔窒卒德（チツソツト）〕

精製護謨（ゴムアンモニ）安没尼亜（アキ）幾〔宜〕　白石鹼　大黄（末各二錢）

右調和三氏為一丸衣伊里（イリ）斯弗魯（スフロレン）連底（テイナ）那根末每服六丸乃至八丸日三次

○第九百十二方

精製護謨安没尼亜幾　白石鹼（各一弓半）　蒲公英越幾斯

白屈菜越幾斯（各一錢）

右調勻二氏為一丸衣石松粉每服五丸乃至八丸日三次

〔主治〕右二方腹中閉塞殊ニ肝系門脉系ノ閉塞ニ宜シ○

或ハ水製蘆薈越幾斯半錢ヲ加フベシ

○第九百十三方〔私。傑。福傑兒（ルフ）〕

蒲公英越幾斯　睡菜越幾斯　纈草越幾斯（各一錢）　勿

搦祭（ヲチア）亜石鹼（半弓）　大黄（末一錢半）　過爾托（アルタリ）（末適宜）

Kitasato Memorial Medical Library

右二氏為一丸衣伊里斯弗魯連底那根末毎服十丸日三次

〔主治〕諸般ノ腹臓閉塞。膽液分泌ノ障碍。粘液鬱滯等ノ症ニ宜シ

○第九百十四方〔弇拂〕

蒲公英越幾斯　蓍草越幾斯　葛兒儒別越幾斯　亜兒尼加越幾斯各二錢　醋酸加里　精製硇砂各半弓　大黄末二錢

右調和二氏為一丸衣伊里斯弗魯連底那根末毎服十五丸乃至三十丸日一二次

〔主治〕腹内諸器粘液鬱滯或ハ閉塞アル症及ヒ痔疾等ニ宜シ

○第九百十五方

蓍草穗二弓

右細剉水煎供飲料

〔主治〕痔疾ニ宜シ早晩一小盞ヲ取リ冷服セシム但シ累月連進スベシ

○第九百十六方〔刺曹私〕

蓍草葉一弓半　瀉利鹽一弓　遏泥子一錢

右細剉水二北浸漬安熱所四分時玻璃壜收貯毎服取半

Kitasato Memorial Medical Library

小盞乃至半小盞餘濾過飲服日二三次

〔主治〕腹内諸分泌遲鈍ノ症。粘液鬱積痔疾等ニ宜シ

○第九百十七方〔肸爾姪蒲蘭度〕

精製瀉利鹽　水製大黄丁幾各一弓　黙栗薩水二弓

右調匀朝夕服二食匙

〔主治〕痔疾殊ニ盲痔便秘ヲ兼ヌル者ニ宜シ

○第九百十八方〔顚滮爾倔地名臼母布列屈篤〕

弗蘭臼刺皮半弓或六錢或一弓

右常水適宜煮濾取液六弓毎一時服一食匙以毎日得粥様便三四行為度

〔主治〕啻ニ臼母布列屈篤氏之ヲ稱用セシノミナラズ密優惆見地名噎魯蘭件同上尉魯寺滮爾倔等同上ノ病院ノ碩學及ヒ其他ノ醫家モ亦痔疾及ヒ他ノ少腹病ニ此方ヲ好トス」蓋此煎劑數週連用スルニ宜シ臼母布列屈篤氏病者ニ命スル所ノ用法左ノ如シ」弗蘭臼刺皮一弓半水一瓶半ヲ以テ煮テ一瓶ヲ取リ午前午後一盞強ヲ服セシメ一食匙半二食匙乃至三食匙以テ効ヲ得ルニ至ル○多血畜積症生力亢進セル者或ハ血脈系ノ感觸過敏ナル者ハ更ニ芒硝或ハ孕鹼酒石ヲ加フ○又屢胡蘿蔔ヲ兼用スルヲ大ニ稱賛ス○臼母布列屈篤氏或ハ胡蘿蔔ヲ擂爛シテ米

Kitasato Memorial Medical Library

飲若クハ肉羹汁ニ加ヘ。或ハ生根ヲ用ヒ。或ハ洋芹。些ノ酪。砂糖及ヒ些ノ食鹽ヲ合メ搗爛シ或ハ之ヲ冷浸シテ飲料トス冷浸法生根ヲ擂爛シテ桶ニ入レ冷水ヲ注キテ蓋覆シ冷所ニ安スルヿ六時後絞リ濾シテ沙糖ヲ和ス或ハ此液更ニ味佳ナルヲ要セハ洋芹根ヲ研爛シテ胡蘿蔔ト俱ニ浸出スルモ亦可ナリ此液半瓶乃至一瓶ヲ取テ一日ニ服盡セシムヘ風氣欝閉ヲ兼ヌル者ハ過炭酸曹達一刃乃至半錢沙糖水（甘味適宜）一麥酒盞強ニ和シ之ヲ上ノ煎方ト兼用スルヿ日ニ二四次シテ良効ヲ得タリト云フ○此煎方ハ弗蘭臼刺（フランギュラ）ノ幹皮乾枯セル者ヲ用フベシ（嫩枝ノ皮ヲ用フルヿ勿レ）生皮ヲ用フルハ嘔ヲ發ス

○第九百十九方（別連杜）

蒲公英（葉根俱用三弓）　麥糠（一弓）　井水十六弓煮耗至八弓乘沸加後藥

加密列（カミルレ）　纈草（各二錢）

右濾過二分灌腸

備考　此方ハ弇拂（カムフ）氏小腹閉塞ヲ治スル灌腸藥ノ變方ナリ○弇拂（カムフ）氏ノ説ニ據レハ多般ノ小腹病殊ニ依朴昆姪（イホコンテ）兒（ル）黒膽液病及ヒ痔疾ハ唯夫ノ灌腸法ノミヲ以テ癒ル

Kitasato Memorial Medical Library

ト云ヘリ此論偏固ニシテ形器説ニ原ツクト雖然ヒ當今之ヲ廢棄スルモ亦甚シトス高醫落優人名ハ弇拂氏ノ療法ニ拘泥セシ者ニアラスト雖亦夫ノ灌腸法ヲ以テ諸種頑固ノ小腹病。肝臓虚衰メ膽液減耗シ之カ為ニ便秘常習トナレル症。黄疸腸間膜腺ノ腫脹。盲痔等ヲ全治セリト云フ

○第九百二十方〔羽歇蘭度〕

蒲公英根　濱瞿麥根　歇爾拔斯屈謨花　加密列各一弓

右剉合供灌腸劑毎用取二茶匙強加小麥糠一握煎

〔主治〕所謂小腹閉塞及ヒ閉塞ニ係ル諸患ニ宜シ○蓋毎次小量六弓ニ射注シテ務メテ藥汁ヲ内ニ留メシムルヲ要トス之ヲ留ムルハ灌腸後四分時間患者ヲシテ右側臥セシムヘシ頑固ノ閉塞或ハ粘膠液蓄積セル者ハ石鹼。石灰水。ノ如キ峻烈ノ解釋劑及ヒ新鮮牛胆一食匙ヲ加フ

○第九百二十一方

蒲公英根　濱瞿麥根　纈草　黜失刺護各一弓

右細剉合供灌腸

○第九百二十二方

Kitasato Memorial Medical Library

○蒲公英根　濱瞿麥根　蓍草葉　葛爾儒別葉　加密列弓各一

右細剉合供灌腸

○主治　右二方上ニ同シ○此方症ニ隨テ種々加減ス珊篤里葉麻兒羅歇等モ亦加ヘテ可ナリ

○第九百二十三方　祇薑人名　奇効水アリクワリソテアギギニ羅

麻倔涅失亜三錢　井水二北半

右和勻徐々加稀硫酸九錢毎服一麥酒盞強日三次

主治　痔疾ヲ根治スルニ宜シ　謨私篤人名ハ同友福傑兒氏

上俱ニ此藥液ヲ歴驗シテ實ニ偉効ヲ得タリト云フ○

方中ノ稀硫酸ハ醇硫酸一分水六分トス○蓋安頓人名ハ未此水藥ヲ熟試セザルガ故ニ實ニ未其効ヲ知ラズト雖痔疾ヲ根治スルハ攝養ヲ節シ解釋劑及ヒ硫黄ヲ用ヒ小腹頑固ノ閉塞アル者ハ浴法葛爾泉浴ヲ最良トス ヲ施メ更ニ偉効ヲ奏セリ

○第九百二十四方　謨私德落兒

複方大黄越幾斯　水製蘆薈越幾斯各一錢　遏泥子油十六滴　開達格碌屈斯十二氏

右調勻二氏為一丸衣石松粉毎晩服一丸乃至三丸

主治　小服内閉塞症便秘ヲ兼ヌル者及ヒ上症ニ因テ發

Kitasato Memorial Medical Library

スル所ノ諸症ニ偉効アリ

○第九百二十五方〔狨歇蘭度〕忽弗滿人名拔爾撒謨丸

没藥　蘆薈　黒列僕里越幾斯各二錢半　葛爾儒別越幾斯　亜爾鮮越幾斯　紫菫越幾斯　珊篤里越幾斯　蓍草越幾斯各半弓　底列並的那　安息香　杜松子脂　常春藤脂各二錢　雜腹蘭東方産半錢

右丁寧調和上沙火二氏為一丸衣石松粉隨症毎朝服二丸乃至六丸

〔主治〕痔血ヲ促スニ宜シ

○第九百二十六方　設兒人名拔爾撒謨丸

雜腹蘭末半錢　阿芙蓉末五氏　精製硇砂　蘆薈透明者　黒列僕里越幾斯各一錢

右加水製大黄丁幾適宜調和一氏為一丸衣甘草末玻璃器收貯毎服八丸乃至十二丸

〔主治〕痔血及ヒ經血ヲ促スニ宜シ○毛皮ヲ以テ肛門ヲ摩シ痔血ヲ促スノ法ハ益アルヿ稀ナリ唯患者感觸遲鈍多血肥胖ニシテ粘液質ノ者ニ適當ス感觸鋭敏ノ者ハ脚浴ヲ行ヒ肛門ニ蒸氣浴ヲ施シ肛内ニ衝動藥ヲ射注シ肛圍ニ放蜞スベシ

○第九百二十七方　橙蒲人名丸

Kitasato Memorial Medical Library

○蘧謨安没尼亜幾ニ錢　蘆薈透明者　鐵屑各一錢　拔爾撒謨舎利別適宜

右三氏為一丸衣石松粉早朝服一二丸晩間二丸乃至四丸

〔主治〕閉止セル痔血ヲ挑起スルニ福傑兒人名大ニ此方ヲ稱賛セリ○又經閉症ニ弗陽人名之ヲ用フ

○第九百二十八方〔遏傑栗屈的兒〕

黒列僕里越幾斯　阿魏　透明蘆薈　撒兒末爾扶斯　雜腹蘭東方産各一錢　越栗失爾布魯布利篤適宜

右二氏為一丸衣桂末毎晩服八丸

○第九百二十九方〔同上〕

〔甲方〕

黒列僕里越幾斯二刃　没藥水製越幾斯　硼砂　桂油　糖各一刃　桂水三弓溶解加橙皮舎利別半弓

右調匀早午晩服一食匙强

〔主治〕右二方九百廿三方九百廿九方痔血及ヒ經血ヲ挑起スルニ宜シ○蓋此ノ如キ破血峻劑ヲ用フルハ最慎重スヘシ但感覺遲鈍ノ者ニ適當タルハ固ヨリ論ナシ

○又有名ノ秘方二三ヲ掲ケテ左ニ示ス痔疾及ヒ依朴昆垤兒有形ノ因ニ係ル者其他慢性諸病小腹閉塞ニ因

Kitasato Memorial Medical Library

スル者ニ在テハ屢誤用シ易シト雖効ヲ奏スル症モ亦往々之アリ即葩私人名ヲ説ニ據ルニ所謂上帝丸ケイゼルスピルレン一名噦涅爾人名清血丸ノ方左ノ如シ

乙方

格碌菫篤六錢　蘆薈　蘓甘没尼各半弓　益智一錢

右調匀取一爪半加甘求半爪作一丸

○寄束弗人名越仙祭亜ハ密優惆見地名合藥家ノ一方タリ其方惋乾地名合藥家噎蛭人名ノ説ニ據ルニ左ノ如シ

丙方

大黄讃私格玉産　健質亜那　雜腹蘭歐私天戻幾産各三弓　山奈落葉松耳　上好没藥　勿搦祭亜的里亜加各四弓　上好蘆薈十六弓

右細剉加拂郎斯燒酒三十六北飽熟

○越爾涅兒人名健身拔爾撒謨或ハ噦涅爾健身拔爾撒謨ト稱ス此稱適當ナラス

ハ噎蛭人名ノ言ニ據ルニ左方ヲ蒸餾シテ製スト云フ

丁方

秡爾撒謨孛露黒色者　同上白色者各六錢　蘓合香乾者　同上流動者各二錢　安息香三錢　桂皮　府利各六錢　護謨安没尼亜幾　上好蘆薈各一錢　上好没藥二錢　乳香半錢　酒石鹽二錢　乙切草花一握　良姜　白芷　亜爾加那根各一錢末

Kitasato Memorial Medical Library

詳　實久耽尼　鵠栗拔奴謨　雜腹蘭各半弓　癒瘡木
油　龍涎香　麝香各二十四匁　迷迭香　茉沃剌那　剌
賢垤兒花各半握

右細剉調勻

○第九百三十方〔設兒列〕

酒石酸一刃至二刃　蓍草油糖一弓

右調勻為散等分六裹每服一裹日三次乃至四次

〔主治〕痔血過多ノ症ニ宜シ

○第九百三十一方〔落優〕

鹿琥精二錢　葛私篤僂謨丁幾一錢　阿芙蓉丁幾半錢

右調和每四分時服十二滴

〔主治〕痔血過多ニシテ痙攣性ヲ帶ル者之ニ宜シ

○第九百三十二方〔弗陽。倣弗瓜隣〕

蓍草越幾斯一弓　鐵粉二錢

右調勻加桂末三匁為一丸衣桂末每服三丸乃至五丸日三次

〔主治〕虚性ノ痔疾失血最甚シキ者之ニ宜シ

○第九百三十三方

里那利膏〔附〕一弓

〔主治〕結核痔疼痛ヲ帶フル者之ヲ塗擦ス

Kitasato Memorial Medical Library

○第九百三十四方〔狄歇蘭度〕

里那利膏　菲阿斯油煮製者各半弓　鉛糖半錢

右調勻作軟膏塗擦盲痔

○第九百三十五方

雜腹蘭末一刃　龍腦二刃　菲阿斯油煮製者二錢　鉛糖膏六錢

右丁寧調勻塗擦

○第九百三十六方〔迷謁爾〕

菲阿斯油煮製者　斯百兒末攝多各二錢　葛加阿酪半錢

龍腦二刃　雜腹蘭一刃

右調勻作軟膏攤麻布貼每一時半更換

〔主治〕第九百三十三方ヨリ九百三十六方至結核痔疼痛ヲ帶フル者ニ宜シ」又單味ノ葛加阿酪。雞卵油。遏兒托軟膏及ヒ其他ノ緩和藥モ亦適當ナリ」肝爾姪蒲蘭突土人名ハ果實ヲ油煠シテ之ヲ搗爛シ赤葡萄酒ヲ和シ尻間ニ貼スルヲ稱譽ス」接骨木汁ヲ麻布ニ塗リ結核上ニ貼スレバ破潰出血シテ能ク緩解ス」若焮痛スル者ハ會陰ニ放蜞シ又結核上ニ寒罨法ヲ施シテ効アリ

○第九百三十七方〔依遏叔密土〕

明礬末半錢　新鮮無鹽酪一弓半

右調勻塗撒絲貼之日數次

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕痔疾痛ヲ帶ヒ稀液滲出スル者之ニ宜シ

○第九百三十八方〔律私篤〕

明礬末一錢半　阿芙蓉末半錢　鉛糖軟膏半弓

右調和塗麻布貼之

〔主治〕痔核箝窄ヲ治スルニ宜シ

○第九百三十九方〔骨布〕

甘汞一二氏至六氏　亞剌毘亞護謨末半弓　加纈草水一弓半

徐々搗和

右為灌腸劑

〔主治〕直腸内ノ痔疾痙攣疼痛ヲ帶フル者及ヒ直腸ノ腫起ニ宜シ蓋水節ニ之ヲ裝スル前先重湯ヲ以テ暖ムベシ

○第九百四十方

大黄末　白糖各一錢

右調勻為散等分六裹早晩服一裹

〔主治〕粘液痔ニ宜シ○直腸ニ焮衝性血積ヲ兼ヌル者ハ先清涼劑或蜞鍼ヲ施シテ以テ之ヲ制スベシ然ルトモ粘液痔ハ多々虚性ナルガ故ニ強壯ノ諸藥殊ニ蓍草九百十五方。九百十六方連錢草。洞庭藍。睡菜。括失亞。依蘭苔。幾那。擽子。製哿喜。刺達尼亞。鐵劑殊ニ鐵泉等ヲ用フルヲ要トス○又大黄ヲ用

Kitasato Memorial Medical Library

フベシ腸衰弱弛緩シテ粘液ヲ漏スヿ過多ナル者最驗アリ若此散藥ヲ飲ク氏ハ大黄小塊ヲ齟嚼スルヿ日ニ一二次或ハ次方ヲ用フルモ亦可ナリ

○第九百四十一方

大黄半錢　菖蒲根一錢半　熱湯適宜浸漬濾取三弓加橙皮舍利別三錢乃至四錢

右調勻每服一食匙日四次

○主治　胃腸衰弱症粘液痔等ニ宜シ

○第九百四十二方

格綸僕一錢半　大黄一錢　常水六弓煮濾取四弓後加橙皮舍利別半弓

右調和每服一食匙日四次

主治　胃腸衰弱酸敗液風氣鬱畜慢性泄瀉粘液痔等之ニ宜シ

○第九百四十三方　別私那爾突人名丸

撒兒茉爾秩斯　牛胆凝固者　蒲公英越幾斯　蘆薈越幾斯各半錢

右調勻二氏為一丸衣桂末隨症朝暮服二丸乃至六丸

主治　噶刺弗氏粘液痔ヲ治スルニ甚之ヲ稱賛セリ但小腹内諸器感觸過敏ノ者ハ蘆薈越幾斯ニ代ヘテ水製大

Kitasato Memorial Medical Library

黄越幾斯ヲ撰用セリ○落優人名ハ水製蘆薈越幾斯半氏至ヲ用フルヿ日ニ三四次兼テ蓍草浸。葛私加栗刺浸及ヒ大黄加桂皮浸。或ハ未熟橙ノ浸劑ヲ服セシメ又没藥。的列並底那。或ハ拔爾撒謨骨湃藿ヲ用ヒテ効ヲ得タリ」感觸甚遲鈍ノ症ハ越栗失爾布魯布利篤ニ薩毘那丁幾ヲ加ヘ。或薩毘那末ニ鐵粉雜腹蘭大黄等ヲ伍用シテ良効ヲ得タリ」蓋此ノ如キ症ハ兼テ胡椒五粒乃至八粒ヲ嚥下スルヿ日ニ二三次補益ノ食餌及ヒ葡萄酒或ハ健胃酒ヲ用フ」飲酒常習ノ者ハ落優氏時々燒酒少許ヲ與ヘリ燒酒ハ珊篤里。健質安那。未熟橙。薄荷等ニ優レリト云フ」弛緩甚シキ者ハ薦骨ノ部位ニ芫菁丁幾ヲ塗擦シ或ハ芫菁硬膏ヲ貼シ。脊椎ニ越列機的爾若クハ瀉水浴ヲ施シ内服ニ別私點燮人名ノ神經强壯丁幾。葛刺布呂篤人名神經丁幾ヲ用フベシ

○第九百四十四方〔依。遏。叔。密。土〕

土木香越幾斯三錢　幾那越幾斯二錢　阿魏　鐵粉各一錢

右調匀二氏為一丸衣桂末毎服五丸日三次

〔主治〕粘液痔ニ用フ」又萎黄病及ヒ白帶下ニ宜シ

○第九百四十五方

没食子弓　井水一北半煮濾取一北

Kitasato Memorial Medical Library

右分為二劑供灌腸

○第九百四十六方

主沒食子煎六弓　明礬半錢

右溶和供灌腸

主治　右二方九百四十五方九百四十六方粘液痔及ヒ直腸脱ニ用フ○粘液ノ漏泄スル者病毒分利ノ為ニシテ久シク癒ザル症ハ先全身ノ弛緩ヲ治シテ后灌腸ヲ行ヒ以テ直腸内粘液膜ノ弛緩ヲ復治スルヲ佳トス何者粘液ヲ抑壓スルヿ早キニ過グレバ喘息ノ如キ大害ヲ招クヿ往々之アレバナリ」且其灌腸モ亦始メ小量ニ施シ或ハ微力ノ品ヲ撰用シ漸次ニ強藥ニ移ルベシ」故ニ先冷水ヲ以テ灌腸シ其後唐茶浸。珊篤里。槲皮。水楊皮或ハ幾那浸ヲ用フベシ」明礬。鉛糖。及ヒ其他ノ收濇藥ヲ加フル者ハ罕ニ弛緩甚シキ症ニ稱用スルノミ」但含鐵泉ノ灌腸ハ偉効アリ含鐵泉ニ浴スルモ亦佳トス匹爾悶篤鑛泉名蒲劉摂那優同上ヲ尤佳トス

○第九百四十七方（春姪隣）

烏華烏爾失一弓半　蓍草穗一弓　井水三北煮耗至二北

加甘草一弓濾過再加桂舍利別二弓

右調勻二日服盡

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕膀胱痔並ニ總テ虚性ノ出血及ヒ粘液流出症ニ宜シ○孤刺劉私人名ハ烏華烏爾失ヲ實阿私麻〔附〕ト配合シ與ヘリ（膀胱麻痺條ノ方ヲ見ルベシ）

○第九百四十八方〔設倚迷謁爾〕

烏華烏爾失　連錢草葉各三錢　常水適宜煮八分時加橙皮黄二錢蓋閉浸漬八分時濾取八弓再加後味

亜刺毘亜蘰謨漿　過兒托舍利別各一弓

右調勻毎服半小盞强日四次

〔主治〕膀胱痔血或ハ粘液ヲ流出スル者ニ宜シ又白帶下ニ用フベシ

○第九百四十九方〔鑢護私丁〕

烏華烏爾失一刃　茴香油糖五氏

右調勻為散等分十二裹毎服一裹日三次乃至四次

○第九百五十方〔越遏脩設〕

烏華烏爾失一弓　井水十二弓煮濾取八弓

右毎一時服半小盞

○第九百五十一方〔速別倫歇愔〕

烏華烏爾失一弓　井水適宜煮濾取六弓溶化葛私加栗刺越幾斯二錢再加後味

拔爾撒謨孛露舍利別一弓

Kitasato Memorial Medical Library

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

○第九百五十二方〔狨屈私〕

石松粉二刃　雞子黃一箇　加烏華烏爾失煎煮三弓取液五弓

○搗爛加後藥

橙皮舍利別六錢

右調和每一時服一食匙

○〔主治〕第九百四十九方ヨリ九百五十二方至腎及ヒ膀胱ノ虛性粘液流出症ニ宜シ

○第九百五十三方〔福倔列爾〕

吐根末三匁　麻倔涅失亞一錢　白糖七錢　拘櫞油或遏泥子油六滴至十滴

右調勻為散玻璃壜貯每服一刀尖若一茶匙強日三次乃至四次

〔主治〕膀胱粘液痔。小便難澁。久痳。白帶下。ニ宜シ又呑酸及ヒ百日欬ニ用フベシ

血尿ハーマチユリア○ミユクチユスクリユエンチユス羅ブルードウロテレン蘭

此症原因多クハ痔ノ存スルニ係ル故ニ治法膀胱痔ト一般ナリ

燉衝性ノ者ハ放血シ且答麻林度製清涼瀉劑ヲ用フベシ九十三方。五百七十五方至五百七十七方

痙攣性ノ者ハ小量吐根百廿五方。五百卅七方。八百六十一方

油性乳劑ニ阿芙蓉液或ハ菲阿私越幾斯ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

加フ者五百八方。五百十三方老利兒結爾私水八百八十一方至八百八十六方等ニ宜シ弛緩ニ因ル者ハ蓍草葉浸九百十五方烏華烏爾失煎九百五十方明礬乳清八百廿七方幾那八百九十六方八百九十七方刺達尼八百卅方至八百卅二方等ヲ用フ此他甘扁桃油若クハ罌粟子油ヲ取リ早晩一食匙ヲ用ヒテ諸種ノ尿血症ニ甚偉効アリトス

○第九百五十四方〔春姪隣〕

刺達尼越幾斯六錢　桂水五弓溶化加後藥

硫酸密幾私生爾〔附〕一錢半　橙皮舍利別一弓半

右調匀毎半時服一食匙

〔主治〕尿血太過ノ症ニ宜シ

○第九百五十五方〔蒲列刺〕

大麻子一弓　井水適宜煮耗至一北加三色菫菜花〔不詳〕半弓少頃浸漬濾過加後藥

遏兒托舍利別半弓

右調匀毎服半小盞

〔主治〕經久尿血ニ宜シ

血斑病モルビュス。マキュロシュス。ウエルホヒー○ピュルピュラ。ハーモルラギカ羅ブルードフレッキシーキテ。フハン。ヱルホフ蘭

治法猛烈收斂ヲ要トス」是故ニ鑛酸及ヒ幾那ヲ最トシ其他明礬。刺達尼ヲ用ヒ冷水及ヒ醋ヲ以テ全體ヲ洗ヒ。又槲

Kitasato Memorial Medical Library

皮煎ニ浴スベシ（失血症ノ條ニ載スル所ノ方法ヲ參照スベシ）

○第九百五十六方

鹽酸（一錢至二錢）　遏兒（アルタ）托煎（六弓以ニ遏兒托根ニ錢ニ製）　覆盆子舍利別（二弓）

右調勻毎一時服一食匙

○第九百五十七方

稀硫酸（一刃至半錢）　幾那煎（四弓）　覆盆子舍利別（一弓）

右調和毎一時服一食匙

○第九百五十八方（刺曹（ラダウ）私（ス））

硫酸規尼（キニ）捏（子三匁至六匁）　加（カ）密（ミル）列（レ）水（或）　覆盆子水（五弓）　覆盆子舍利別（或）　黒櫻實舍利別（一弓）　稀硫酸（半刃至一刃或半錢）

右調勻毎一時乃至一時半服一食匙

〔主治〕右三方血斑症ニ用ヒテ諸液ノ腐敗ヲ防止シ且生力ヲ挑起スルニ宜シ

子宮出血（メトロルラギア羅バール　ムードルフルーイング蘭）

實性子宮出血症多血ノ婦人ニ在ル者之ヲ抑遏スルヿ早キニ過レハ危險ヲ致スヿアリ」宜ク自然ノ良能ニ從事スベシ設令藥劑ヲ與フルモ緩方ノ消石飲。純精酒石等ノ如キ清涼品ヲ處シ又清涼下藥ヲ用ヒテ毎日瀉ヲ促スニ宜シ」尺澤放血ヲ要スル症ハ甚罕ナリ」出血痙攣性ノ者ハ小

Kitasato Memorial Medical Library

量吐根八百六十一方殊ニ之ヲ阿芙蓉ニ配スル者九百五十九方甲實芰
荅利斯九百五十九方乙葛私篤僂謨葛私篤僂謨丁幾ヲ良トス等佳ナリ但血
脈系ノ興奮機盛ナル者ハ鑛酸九百六十方ヲ妙トス外用其症
痙攣性ノ者ハ胸上乾角法ヲ行ヒ下肢蒸餅母ヲ貼スルヲ
稱譽セリ兼テ下肢ヲ温水ニ浸スベシ○弛緩ニ因ル症ハ
出血發作ノ時ニ當テ桂丁幾ヲ以テ醫藥ノ魁トス蓋之ヲ
鑛酸及ヒ阿芙蓉丁幾ニ配スルヲ最妙トス九百六十一方至九百六十三
方後麥奴九百六十五方九百六十六方紺百設木八百卅三方。八百卅四方。九百六十七方刺達
尼八百卅方至八百卅二方。九百六十八方至九百七十方篤爾面窒兒刺八百卅五方。九百七十一方
等ヲ用フベシ○弛緩甚シクシテ危篤ニ臨ム者ハ薩毘那

九百七十三方至九百七十五方明礬八百廿七方至八百廿九方。九百七十六方至九百七十九方及ヒ撒
兒末爾扶斯九百八十方ヲ稱用ス○外用小腹ニ亜的兒ヲ塗擦
シ或ハ點滴シ。諸種ノ軟膏硬膏及ヒ射注劑ヲ施シテ効ア
リ九百八十九方九百九十一方又冷水ヲ以テ直腸或ハ陰門ニ射注シ或
ハ水。雪。若クハ氷屑ヲ取テ子宮上ニ寒罨法ヲ行フベシ蓋
此等猛劇ノ法ハ出血過多ノ為ニ生命危險ニ臨ミ前ニ擧
ル所ノ方法功用ヲ逞シクセザルニ至テ方ニ之ヲ試用ス
ベキノミ何トナレバ慢ニ之ヲ用ヒテ時宜ヲ得ザレバ却
テ之カ為ニ子宮焮衝。腹膜焮衝。腸焮衝其他困難ノ諸症ヲ
發スレバナリ」小腹及ヒ腰部ニ冷水ヲ灌クハ偉効ヲ得ル

Kitasato Memorial Medical Library

者多シ」形器法ノ此ニ施スベキ者ハ手掌ヲ以テ小腹ヲ摩擦シ。下肢ヲ纏絡スルヿ卑キヨリ高キニ至ル及ヒ栓ヲ挿ム等是ナリ但其絡纏挿栓ノ二法ハ子宮内ニ畜血ノ懼レナキ者ニシテ之ヲ施スベキノミ

○第九百五十九方〔謨私篤〕

〔甲方〕

上好葛私篤僂謨四匁　吐根二匁　精製阿芙蓉一匁　桂油糖二錢

右調匀為散等分十二裹毎八分時四分時若半時取一裹冷水和服

〔主治〕子宮出血感覺過敏症脈縮小シテ不齊。面色慘憺。皮膚冷エ且乾キ體質甚柔脆ナル者之ニ宜シ○此方ト更換シテ左ノ散方モ亦用フベシ

〔乙方〕

實芰荅利斯一匁　純精酒石　白糖各半刃

右調和為散分十二裹毎服一裹日二次乃至三次冷水送下

○第九百六十方〔遏傑。栗屈的兒〕

越栗失爾蔑印失屈篤半弓　葛私篤僂謨丁幾二錢　舍電阿芙蓉液一錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調勻每半時二十滴乃至三十滴冷水或粘汁和服

〔主治〕痙攣性子宮出血ニ宜シ

○第九百六十一方〔弗陽〕

桂丁幾三錢　收歛亜的兒一錢　阿芙蓉液一刃

右調和每四分時取二十滴冷水或粘滑煎汁少許和服

○第九百六十二方〔傑過栗屈的兒〕

硫酸密幾私去爾一錢　舍電阿芙蓉液一刃　桂丁幾二錢

右調和每半時取二十滴甘味燕麥粘汁和服臨服宜振盪

○第九百六十三方〔謨私篤〕

收歛亜的兒二錢半　舍電阿芙蓉液半錢　桂丁幾一弓

右調和每四分時取二十五滴。三十滴乃至五十滴燕麥粘汁和服

○第九百六十四方〔私滮爾達弗〕

精製燐酸二錢　桂丁幾二錢

右調勻每半時取三十滴沙糖水和服

〔主治〕第九百六十一方ヨリ九百六十四方至虚性子宮出血ニ宜シ

○第九百六十五方〔禄温顯爾毒土〕

麥奴六氏至十氏　白糖半刃

右調勻為散分六裹每十密扭篤服一裹

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕子宮出血ニ宜シ○咩私涅兒人名ノ歴驗ニ據レハ麥奴ハ孕胎ノ子宮ニ在ルニアラザレバ効アラス故ニ妊娠中若クハ分娩ニ臨テ失血スル症ニアラザレバ全ク功用ナシト云フ

○第九百六十六方〔布列私骨篤地名叔泥姪爾〕

麥奴一錢　井水適宜煮濾取四弓

右分三服毎十二密扭篤一服

〔主治〕分娩後ノ子宮出血ニ宜シ

○第九百六十七方〔春姪隣〕

紺百設木半弓　井水三北煮耗至二北加橙皮半弓濾過加後藥

精製燐酸二錢　桂舎利別二弓

右調勻毎服一小盞強日三四次臨服宜振盪

〔主治〕子宮出血弛緩ニ因ル症ニ宜シ

○第九百六十八方〔骨布〕

刺達尼六錢　井水二十四弓煮濾取八弓加後藥

刺達尼越幾斯二錢至三錢

右調和毎一時服二食匙強

〔主治〕虚性子宮出血。白帶下ニ宜シ

○第九百六十九方〔設倚迷謁爾〕

Kitasato Memorial Medical Library

刺達尼（搗碎一錢半）　常水適宜煮四分時濾取六弓加後藥

桂丁幾（二錢）　刺達尼丁幾（一錢半）　砂糖舍利別（一弓）

右調勻每一時乃至一時半服一二食匙强

〔主治〕虛性子宮出血ニ宜シ

○第九百七十方〔春姪隣〕

刺達尼越幾斯（六錢）　桂水五弓溶化加後藥

硫酸密幾斯丟爾（一錢半）　橙皮舍利別（一弓半）

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕子宮出血過多ノ症ニ宜シ又尿道出血頑固ノ症ニ妙トス

○第九百七十一方〔別連杜〕

篤爾綿黜刺（半弓）　井水十弓煮濾取六弓加後藥

桂丁幾（二錢）　橙皮舍利別（一弓）

右調和每一時服一食匙

〔主治〕子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第九百七十二方〔弗肸爾姪蒲蘭突土〕

赤石脂　大黃　麻倔涅失亜（各一錢）

右調和為散等分十二服日三服

〔主治〕同上

○第九百七十三方〔骨布〕

Kitasato Memorial Medical Library

○薩毘那葉半弓　桂皮二錢

右熱湯適宜浸漬濾取六弓毎半時服一食匙

主治子宮出血及ヒ子宮脱ニ宜シ○咩私涅爾人名ハ薩毘那ヲ用ヒテ出血増加スルヲ歴驗セルガ故ニ廢メ用ヒズト云フ

○第九百七十四方〔同上〕

薩毘那葉　赭色幾那各三錢　熱湯適宜浸漬濾取六弓

冷定加後藥

桂舎利六錢

右調和毎一時服一食匙

主治子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ症ニ應メ收斂亜的兒半錢若クハ一錢ヲ加フ

○第九百七十五方〔弗。越姪僅度〕〔瞎倚私土〕

薩毘那葉末三錢　薩毘那越幾斯二錢　薩毘那油一刃

右調和三氏為一丸衣石松粉毎服四五丸乃至十丸日三次

主治子宮出血定期アリテ太多ク而メ平常モ亦稀淡ニシテ惡色惡臭ノ血ヲ漏下シ面色慘憺ノ者之ニ宜シ

○第九百七十六方〔弗陽〕

精製阿芙蓉四氏　桂皮一刃　生明礬一錢

Kitasato Memorial Medical Library

右調和為散等分四裹每半時服一裹

〔主治〕子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ○明礬ハ其人筋纖維强實ニシテ多血ノ者ニハ適當セス唯虛弱弛緩ノ症ニ良トス腹臟壅閉スル所アル者モ亦之ヲ禁スベシ

○第九百七十七方〔拂連幾〕

生明礬二刃　桂丁幾　地亞格實温各一弓　薄荷水二弓

右調和每半時或一時服一食匙乃至二食匙

○第九百七十八方〔阿西安姪爾〕

水楊皮越幾斯一錢半　明礬半錢至一錢　桂水五弓　覆盆子舍利別一弓

右調勻每四分時服二食匙

○第九百七十九方〔福爾咩〕

明礬末　硇鐵華　芳香散　幾那越幾斯各半錢　桂油十滴

右調和二氏為一丸衣桂末朝夕服五丸乃至十丸

〔主治〕第九百七十七方ヨリ九百七十九方至虛性子宮出血ニ宜シ

○第九百八十方〔狨歇蘭度〕

桂皮半刃　撒兒末爾秩斯一氏　白糖一刃

右調和為散分四服每一時一服或隨症數服

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕子宮出血危險ニ臨ム者之ヲ遏止スルニ宜シ○或ハ其症ノ要スル所ニ從ヒ撒兒末爾秩斯ノ量漸次ニ倍加シテ可ナリ

○第九百八十一方〔謨私篤〕

桂油半錢　亜的兒半弓

右調勻毎ニ八分時服ニ二十五滴乃至三十滴

〔主治〕臨産ノ虚性子宮出血ニ宜シ之ニ兼テ小腹ニ龍腦精。硇砂揮發膏等ヲ塗擦スベシ

○第九百八十二方〔弗陽〕

蓍草越幾斯一錢半　桂水三弓溶化加ニ後藥

桂丁幾一錢　舎電阿芙蓉液一刃　橙皮舎利別三錢

右調和毎ニ一時服ニ一食匙強

〔主治〕虚性子宮出血小腹ニ經久ノ血積ヲ兼子又歇倚私的利性ノ感覺過敏。衰弱及ヒ痙攣証ヲ狹ム者之ニ宜シ

○第九百八十三方〔謨私篤〕

失鳩荅越幾斯　蜀羊泉越幾斯各一錢　老利兒結爾斯

水一弓半　吐酒石二氏

右調勻毎服二十滴乃至三十滴日三次

〔主治〕子宮出血腹臓ノ冒寒ニ因ル者之ニ宜シ

○第九百八十四方〔剌曹私〕

Kitasato Memorial Medical Library

○硫酸規尼(ニ)捏(子)十瓦至十五瓦　乾燐酸(二刃)〔附〕　遏(アル)兒(タ)托末或大黄末(四刃)　珊(サン)篤(ト)里(リ)越幾斯(二刃)

右調和為六十丸衣伊(イ)里(リ)斯(ス)弗(フ)魯(ロ)連(レン)底(テイ)那(ナ)末玻璃壜收貯每服三四丸乃至六丸日二三次

〔主治〕半産後ノ神經衰弱症出血セントスル者ニ宜シ

○第九百八十五方〔狨歇蘭度〕

王幾那(末一弓)　橙皮(末二錢)　井水十二弓煮耗至八弓濾過加後藥

收歛亜的兒(半錢)　桂丁幾(二錢)　橙皮舍利別(一弓)

右調勻每一時半服二食匙

○第九百八十六方〔同上〕

收歛亜的兒(二錢)　越(ヱ)乙(イ)土(ト)幾那丁幾(一弓)　橙皮丁幾(一錢)

右每服八十滴水一小盞和服日三次

〔主治〕右二方月經過多症子宮ノ衰弱及ヒ弛緩ニ起因セル者或ハ同因ノ子宮出血ヲ根治スルノ功用アリ

○第九百八十七方

蒲(ブ)剌(ラ)實(ジ)爾(ル)收歛皮(一弓)〔合歡木皮ノ一種〕　井水適宜煮濾過取八弓

右每一時服一食匙

〔主治〕麻痺性子宮出血後ニ用ヒテ再發ヲ預防ス

Kitasato Memorial Medical Library

○第九百八十八方〔狨歇蘭度〕

幾那越幾斯　刺達尼越幾斯　水楊皮越幾斯　阿仙藥各二錢　撒兒末爾秩斯二刃

右調和二氏為一丸衣桂末毎服十丸乃至十五丸日三次

〔主治〕月經太過或八子宮出血後虚憊甚シキ者之ニ宜シ

○第九百八十九方〔骨布〕

幾那越幾斯二錢　阿芙蓉越幾斯十二氏　薩毘那油一錢半　菲阿斯軟膏一弓

右丁寧調勻朝夕取二小哥喜匙强塗擦小腹

〔主治〕子宮出血並ニ子宮ノ衰弱弛緩ニ宜シ

○第九百九十方〔同上〕

香竄硬膏一弓〔附〕　薩毘那油一錢　薩毘那末二錢

右調和外敷

〔主治〕子宮弛緩及ヒ其レニ起因セル出血症ハ小腹ニ之ヲ貼ス

○第九百九十一方

麥奴細剉一弓至一弓半　熱湯三北乃至四北浸少頃煮沸濾過

右冷定射注

〔主治〕子宮出血並ニ衄血過多ニ用フ

月經不調メンストリュアチオ。アノマラ羅オンゲレーゲルデ。ストンデンフルード蘭

Kitasato Memorial Medical Library

此症四種ニ分ツ一ハ婦女已ニ嫁時ニ及テ月經不來」二ハ月經痛」三ハ月經方ニ來テ卒然閉止ス」四ハ月經太過是ナリ

第一　嫁時ニ及テ月經不來ノ症其原或ハ多血畜積ニ係リ或ハ痙攣ニ因リ或ハ弛緩シ感動遲鈍ナルニ因リ或ハ陰門閉鎖等ニ在リ○其多血畜積ニ因ル者ハ足ノ絡ヲ刺テ放血シ。陰部ニ放蜞シ。内股ニ吸角法若クハ蒸餅母ヲ貼シ。刺戟藥脚浴ヲ行ヒ。沸騰散（二方。三方。八百八方）孕硼酒石（七十八方。七百三十三方）茜根（九百九十三方。九百九十四方）等ヲ用フベシ○痙攣ニ因ル者ハ纈草。阿魏（九百九十五方）葛私篤僂謨（カストウム）吐根（百廿五方。八百六十一方。九百九十六方）硼砂（九百九十七方）等ヲ用ヒ。之ニ兼テ陰部ニ放蜞シ。全身温浴。脚湯及ヒ其他ノ誘退法ヲ施スベシ○弛緩ニ因ル者ハ鐵劑（九百九十八方）麥奴（千二方）硼砂（九百九十七方。千三方。千四方）雜腹蘭（九百九十六方。千四方。千五方）没藥（千一方。千五方。千六方）瓦爾拔奴謨（ガルバヌム）（千一方。千六方）歐羅巴産蔔蔔草（エウロツパ　セノボヂウム　オリシニム）（附）（千八方。千九方）蘆薈（九百廿七方。千十方）薩毘那（千十一方至千十八方）等ニ宜シ蓋此諸藥ハ其成方ニ就テ見ルベキガ如ク種々配合スベシ（此他黄胖條下ニ載スル所ノ方ヲ參照スベシ）

第二　月經痛モ亦鎮痙劑（九百九十六方。千十九方。千廿方）油性乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ（五百十四方）或ハ菲阿私越幾斯ヲ加ヘ（五百十三方）陰部及ヒ子宮ノ部位ニ温暖ノ鎮痙罨法ヲ施シ。微温半身浴等ヲ行フベシ

第三　經時ニ方テ經血遽ニ遏止スル者ハ焮衝証ヲ啓發スルヿ往々之アリ此症其機變

Kitasato Memorial Medical Library

ニ從フテ適當ノ治法ヲ下スベシ」設令焮衝ヲ發セザルモ亦足ノ絡ヲ刺テ放血シ或ハ陰部ニ放蜞シ若クハ内股ニ吸角法ヲ施シ以テ局處ヨリ放血スルヲ要ス」又之ニ兼テ蒸餅母ヲ貼シ。小腹及ヒ陰部ニ罨法ヲ施シ刺戟衝動ノ脚浴等ヲ施スベシ」内服ハ硼砂或ハ沸騰散ヲ與ヘ而メ唯感觸甚遲鈍ノ症ノミ上ニ列載セル破血藥ヲ與フベシ

第四

月經太過症ハ子宮出血ノ治ニ同シ

○第九百九十二方 別連杜

加密列　接骨木花各一弓半

右浸出供坐浴

主治 陰部及ヒ利尿諸器ノ痙攣痛。並ニ痔血經血ノ閉止ニ宜シ

○第九百九十三方

茜根 細剉半弓至一弓

右井水二十六弓煮耗至八弓濾過毎一時服二食匙

主治 經閉及ヒ月經痛等ニ宜シ」未熟ノ醫輩茜根ヲ以テ古藥ト稱シ全ク功用ナシト云フ者多シト雖訶墨人名歇耳私同弗陽同福倔列爾同阿西安姪爾同遏傑。栗屈的兒同等ノ先哲經閉症ニ茜根ノ効アルヲ主張シ殊ニ其症小腹ノ壅塞ニ因ル者ニ稱用セリ

Kitasato Memorial Medical Library

○第九百九十四方〔福ノ佩列爾〕

孕礬酒石半弓　茜根末　白糖各二錢

右調和為散每服一刀尖

〔主治〕經閉症熱ノ帶フル者之ニ宜シ○狨歇蘭度人名ハ茜根末每服半錢日ニ三服セシムト云フ

○第九百九十五方

阿魏　纈草越幾斯　勿搦祭亞石鹼　凝固牛膽　大黃末各一錢

右調勻二氏為一丸衣石松粉朝夕服五丸

〔主治〕痙攣性經閉症大便秘結スル者ニ宜シ

○第九百九十六方〔速別倫歇愔〕

雜腹蘭二錢　吐根五氏至十氏　井水適宜浸漬濾過取五弓

溶化孕硼酒石二錢更加後藥

加密列舍利別六錢

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕痙攣性ノ經閉及ヒ月經痛ニ宜シ

○第九百九十七方〔依設私託爾結〕

硼砂二錢　黃橙皮　茴香油糖各一錢半　白糖三錢

右調勻為散每服二食匙日三次

〔主治〕經閉ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第九百九十八方　狨歇蘭度沸騰散。ヒュルフサス。アーロポリュス。マルチリス。ヒュヘランヂ羅

麻倔涅失亜二錢　純精酒石半弓　鐵酒石附二錢

右調匀為散每服一茶匙强乘沸騰飲服日二三次

〔主治〕感觸遲鈍ノ婦女經閉及ヒ虛弱ノ症ニ宜シ

○第九百九十九方〔狨歇蘭度〕

亜兒尼加根一錢半　井水五弓煮耗至三弓濾過加後藥

加密列越幾斯　芸香越幾斯各二刃　鐵酒石附半錢

薄荷水一弓　橙皮舍利別半弓

右調匀每服二食匙日三四次

〔主治〕少女虛弱ニメ皮膚慘憺且微冷シ脈遲ニメ弱ナル者慾火亢盛ノ年期ニ及テ月經不來ノ症ニ宜シ

○第一千方〔篤姪〕

硇鐵華細末二錢半　桂皮半錢　白糖適宜煮為錠稠

右作扁圓錠ロチュラ羅四十個每服二三個日二次

〔主治〕經閉弛緩ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千一方　弇拂人名紅頰丸

撒兒末爾秩斯一錢　沒藥越幾斯末　瓦爾拔奴謨各三錢

橙皮舍利別適宜

右為二百十丸衣桂末玻璃壜收貯每一時半服六丸乃至

Kitasato Memorial Medical Library

六丸餘

主治 少女皮膚灰白感覺遲鈍ノ者月經閉止セル症ニ宜シ○又弗陽人名ハ此症ニ檵蒲人名丸九百廿七方ヲ與フ

○第一千二方 弗脂爾姪蒲蘭突

麥奴 白糖各半錢

右調勻為散等分三服朝夕一服

主治 經閉症子宮ノ神經系感覺遲鈍ニ因テ來ル者之ニ宜シ

○第一千三方 同上

著草越幾斯一錢 硼砂一刃 加密列水六弱

右調勻每一時服二食匙臨服宜振盪

○第一千四方 穢歌蘭度

硼砂半錢 雜腹蘭八氏 硫黃華 薄荷油糖各一刃

右調勻為散分三服早午晚一服

主治 右二方月經閉止ニ宜シ

○第一千五方 遏傑。栗屈的兒

雜腹蘭末 沒藥 硫黃華各一錢 凝固牛膽適宜

右為百五十丸衣雜腹蘭末玻璃壜收貯每服十二丸日一二次

主治 經閉及ヒ小腹内閉塞症ニ宜シ

Kitasato Memorial Medical Library

○第一千六方〔翡歌蘭度〕

没藥　瓦爾拔奴謨　黒列僕里越幾斯各一錢　蘆薈半刃

葛私篤僂謨一刃

右調匀二氏為一丸衣石松粉毎服十丸日二三次

〔主治〕感覺遲鈍ノ婦女經閉ノ症ニ宜シ

○第一千七方〔孤刺律私〕

利布西煙斯人名　病院常用通經丸

瓦爾拔奴謨五刃　雜腹蘭越幾斯一刃　没藥越幾斯二刃

黒列僕里越幾斯四刃

右調匀二氏為一丸衣石松粉早晩服六丸

〔主治〕經閉及ヒ萎黄病ニ宜シ

○第一千八方〔機利倔〕

蔔萄草丁幾

歐羅巴蔔萄草汁新絞者　燒酒等分

右飽熟二十四時濾過毎六時取三十滴温麥酒和服

〔主治〕經閉ニ宜シ　經期前十四日ヨリ始メテ用フベシ

○第一千九方〔同上〕

蔔萄草丁幾一千八方六錢　鹽酸鐵丁幾二錢

右調匀毎服三十滴日二次

〔主治〕經閉症體質大ニ弛緩スル者ニ宜シ

○第一千十方〔孤刺律私〕

水製蘆薈越幾斯一刃　水製没藥越幾斯　雜腹蘭越幾

Kitasato Memorial Medical Library

斯各一錢　硇鐵華二刃　尾爾拔奴謨三錢

右調和二氏為一丸衣桂末早晩服五丸

〔主治〕經閉ヲ治ス最妙トス然レ𪜈此方慎重シテ用フルヲ要ス但感觸遲鈍ノ者ニ適當ナリ

○第一千十一方〔骨布〕

薩毘那葉半弓　熱湯適宜浸漬濾過取四弓溶化後藥

硼砂二刃　白糖半弓

右調勻毎服一食匙日三次

〔主治〕月經痛子宮ノ虛弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第一千十二方〔同上〕

薩毘那葉半弓　纈草一弓　熱湯適宜浸漬濾過取八弓放冷加桂丁幾三錢

右調和毎半時服一食匙

〔主治〕經閉子宮ノ衰弱痙攣ニ因リ或ハ子宮ノ血絡弛緩ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千十三方〔獵歌蘭度〕

加密列　黙栗薩　薄荷各二錢　薩毘那葉一錢

右細剉熱湯二小盞泡出分二服朝夕一服

○第一千十四方〔同上〕

麻倔涅失亜一刃　純精酒石十六氏　薩毘那葉末　白糖

Kitasato Memorial Medical Library

各一刃

○右調和為散分三服早午晚一服冷水半小盞送下

○第一千十五方

薩毘那葉末二錢　薩毘那越幾斯適宜

右加達剌侃篤蘧謨漿少許為六十丸衣石松粉每服四五丸日二三次

○第一千十六方

薩毘那葉末二錢　鐵粉一錢　水製蘆薈越幾斯一刃　達剌侃篤蘧謨漿二刃

右調和二丸為一丸衣桂末每服三四丸日二三次

附考　一丸中薩毘那一氏鐵半氏蘆薈六分氏ノ一ヲ含畜ス

○第一千十七方

薩毘那葉末半弓　格碌屈斯末兒秩斯一錢半　薩毘那油三十滴　薩毘那越幾斯　甘草越幾斯各二錢

右調和為二百丸玻璃壜收貯每日已牌申牌酉牌及臨卧服用每服七丸

○第一千十八方　（狨屈私）

薩毘那油半錢　再餾的列並油一弓

右調和塗擦内股

Kitasato Memorial Medical Library

〔主治〕第一千十三方ヨリ一千十八方至經閉症弛緩ノ甚シキニ因ル者ニ宜シ

○第一千十九方〔甲〔訶兒地名紺爾〕〕

纈草　黙栗薩葉　綿荅幾里私布　加密列各一弓　甘草半弓

右細剉毎日取一食匙強水三小盞浸出服

○第一千十九方〔乙〔同上〕〕

甘汞　葛私篤僂謨各半氏　莨菪葉一氏　毘私繆篤二氏

纈草三氏　加密列六氏　遏泥子油糖半刃

右調勻為散分十二包毎一時半服一包

〔主治〕右二方處女月經痛ニ宜シ二方皆經期前四日ヨリ始メテ之ヲ用ヒ經血來レハ乃チ散方ヲ廢シ唯浸劑ヲ連進メ月事ノ過ギ去ルニ至ルベシ

○第一千二十方〔歆戾〕

甘汞一氏　葛私篤僂謨三氏　雜腹蘭東方産二氏　白糖一刃

右調和為散分三褁毎夜臨卧取一褁加密列泡劑和服

〔主治〕月經痛ニ宜シ○之ニ兼テ毎晩脚湯ヲ施シ又全體殊ニ兩足ヲ温覆スルヲ切要トス

Kitasato Memorial Medical Library

遠西方彙卷之九

伊東貫齋譯

文久三癸亥孟春新鐫

江戸芝神明前
和泉屋吉兵衛

Kitasato Memorial Medical Library

Kitasato Memorial Medical Library