

遠西方彙

二

✕  
e 11

富士川文庫  
✕  
499.2  
En-1  
2

F<sup>2</sup>  
E-21



亦隨而起ル二症俱ニ多クハ血ノ不給ニ起因ス血中紅分  
 纖維質及ヒ鉄分缺乏シテ調和常ヲ失ヒ水分却テ過多ナ  
 ルナリ是故ニ其治法ノ如キモ亦既ニ明了ナリ即萎黃病  
 ノ根治法ハ保固強壯藥ヲ須要トス然レモ感覺過敏ノ婦  
 人ノ如キハ每常必シモ始ヨリ保固強壯法ヲ執セス恐ラ  
 クハ其病之カ為ニ却テ増進スル者アラシ宜ク鑛酸類。硫  
 酸密幾私丟尔千世一方越栗失爾千世一方必篤里阿利千世一方燐酸百  
廿五方。千等ヲ稱用スベシ爾後苦味劑ニ轉ル睡菜千世一方葛廿四方  
 兒厨別ルガエ括失亞亞爾鮮クワツシ菖蒲根アア葛私カス加栗刺カカ等ヲ用ヒ竟ニ鉄  
 劑ヲ投スベシ但先碯鉄華千世一方諸種ノ鉄丁幾千世一方

至千世二方所謂鉄酒千世一方至ノ如キ最消化シ易キ者ヲ  
 撰用シ漸々更ニ難化ノ品千世一方至ニ移リ終ニ鉄粉千世一方  
十六方至千用ヒテ功ヲ收ムベシ天造及ヒ人造ノ鉄泉  
五十三方浴千世一方ハ能ク内服藥ノ功ヲ扶久ク故ニ尤適當  
 ナリトス此他諸種ノ鉄劑ニ苦味強壯藥便秘スルハ神經  
 強壯藥ヲ伍用シテ可ナリ通經藥ヲ配スルハ諸家ノ論一  
 定セズ大約之ヲ要セズ何者假令通經藥ヲ用ヒザルモ血  
 質復良スレハ隨テ經血モ亦自カラ通スレバナリ○此症  
 處女粘液質ニシテ多液且弛緩セル者ニ在テハ先瀉藥永  
 新葯刺巴ヲ用ヒ後鉄劑ヲ用ヒテ効アリ○其他既ニ經閉  
 新葯刺巴ヲ用ヒ後鉄劑ヲ用ヒテ効アリ○其他既ニ經閉

條三列載スル所ノ諸方モ亦此症ニ適應ス九百廿七方。九百九十八方。至千一方。千十六方。千十七方。

○第一千二十一方 突倫蒲律篤

硫酸密幾私丟爾實芝答利斯丁幾各半

右調和每服十五滴乃至二十滴水半盞和服日三次

主治感覺敏捷ノ婦人ニ在テハ始メ此方ヲ用ヒ兼テ微

温浴ヲ施シ内股ニ芥子泥乾角法或ハ摩挲ヲ施シ爾後

始メテ鍊劑ヲ與フベシ

○第一千二十二方

越栗失爾必篤里阿利

右每服二十滴乃至五十滴甘味燕麥汁和服日四次

○第一千二十三方

越栗失爾必篤里阿利半錢至桂冰六耳白糖適宜味佳為度

右調勻每一時服一食匙

主治右二方處女萎黃病感覺過敏ニシテ畜血症アル者

ニ宜シ○越栗失爾必篤里阿利ハ每劑一錢一錢半乃至

二錢ヲ服盡セシメテ可ナリ

○第一千二十四方求名地選的

幾那錢熱湯適宜浸漬濾取六乃加後藥茶

燐酸錢過設印亞的兒刀

右調和每一時服一食匙

主治萎黃病者大衰弱神經系及七血脈系ノ感覺過

敏ナル者之一宜シ

○第一千二十五方 過儂栗屑的兒

睡菜葉 橙皮 茴香 大黃 麻俣涅失

主亞錢 各細末 錢末半

右調勻為散每服一茶匙日四次

主治萎黃病胃虛酸敗液ヲ生スル者之一宜シ

○第一千二十六方 同上

括失亞 白糖 礪鍊華 熟麥七味粥日四次

右調勻為散分二十四裏每服一裏日四次

○第一千二十七方 飛歌蘭度 或蘇味粥相三四次

礪鍊華或鍊酒石 健知亞那越幾斯 橙皮越

幾斯 熟栗薩水 桂水 橙皮舍利別

右合勻每服一食匙日四次

主治右二方萎黃病婦人體質脆軟大ニ胃弱ノ者或ハ粘

液過多ノ者一宜シ

○第一千二十八方 別連杜 或此方

主礪鍊華 瓦爾拔奴謨 阿魏 葛私篤俣謨

右加纈草下幾調和三氏為一九衣石松粉玻璃壘收貯晨

夕服三三九

主治萎黃病及虚性神經病 宜沙 ○此他別連杜名ハ

鍊劑ヲ久服セシムルニ先此方ヲ與フ

○第一千二十九方

林檎酸鍊丁幾

右每服半茶匙乃至一茶匙日三四次

○第一千三十方

鹽酸鍊丁幾

右每服二十滴乃至四十滴沙糖和服日三四次

○第一千三十一方

古別私黠設弗神經丁幾

右十五滴乃至三十滴或五十滴沙糖和服日二三次

○第一千三十二方

葛刺布魯篤神經丁幾

右每服十滴乃至三十滴沙糖和服日二三次

主治第一千二十九方類類千三十二方至萎黃病者體

質脆弱他難化ニ鍊劑ニ堪ヤル者之ニ宜シ蓋味服

○第一千三十三方

花尼利丁幾 葛刺布魯篤神經丁幾

右調勻每服十五滴乃至三十滴日四次

主治萎黃病殊其症心思鬱重因來ル者之宜シ

○第一千三十四方 過瀉弗過兒 甲 刺 下 換

撒爾末兒扶斯 炭酸曹達 各半 白糖 六

右調勻為散分六包每服一包日二三沙糖水一盞和服

主治此方味惡カラス炭酸鍊ヲ用テルハ妙方ナリ萎黃

病及ヒ他ノ經閉諸症ニ甚稱用セリ二三六

○第一千三十五方 羨 璣 苦 麻 倚 尔

○第 甲 方

撒爾末兒秩斯 白糖 一

右調勻為散分十二包第一號

乙方 炭酸曹達 白糖 各半 刺 下 換

右調和為散分十二包第二號每服取甲方一包乙方一包

各別冷水溶化後二方合和服

主治萎黃病及ヒ其他纖維弛緩セリ症ニ宜シ

○第一千三十六方 酒 石 鹽 各半 白糖 一

撒爾末兒扶斯 酒 石 鹽 各半 白糖 一

右為四十八丸名簿老度 炭酸鍊丸

主治萎黃病及ヒ其他虛弱ニ因ル症ニ宜シ

○簿老度 用法始メ三日間朝夕一九ヲ與ヘ第四日第五日第六

日用法始メ三日間朝夕一九ヲ與ヘ第四日第五日第六

日八午後又一丸第七日第八日第九日八朝夕三丸第十日第十一日第十二日八午後又二丸第十三日第十四日及七第十五日八朝夕三丸第十六日以後八每服四九日二三此ノ如ク連進メ病証全ク退クニ至リテ又遡回シ前ニ準シテ漸ク服量ヲ減ス

○第一千三十七方 薤乙婆兒篤改制簿老度氏鍊丸

撒爾末兒扶斯 結晶過炭酸剝篤亞斯各半 二味調

和再加後藥

亞刺昆亞薤謨末一錢 過爾托末半

右為九十六丸衣石松粉

附考 每丸炭酸鍊及ヒ炭酸剝篤亞斯各半凡ヲ含畜シテ其餘、酸化鍊及ヒ硫酸剝篤亞斯凡成立不礙

○第一千三十八方 薤警爾

撒爾末兒扶斯 酒容鹽 甘草越幾斯 甘草細末各二錢

容調和凡為一丸衣散草末每服六丸日三次

主治 單純萎黃病並 總示鍊劑指要スル諸症宜之ニ

三時連服ハ愈漸々加ヘテ每服五六丸日四五次至

心之ヲ服其人頰唇紅色ヲ得至ニ至味ハ再服量ヲ減

之ヲ尚連進以病狀全ク退クニ至ルハ別矣噫魯地

產上好麥酒ヲ少許宛與フルハ實ニ治療ニ助ク



此丸方不毫毛胃腸ヲ害スルヲ大寶(此丸製法左ノ如

シ即撒爾末兒秩斯酒石ニ味ヲ磁鉢ニ内レテ熟研細末

シ次ニ甘草越幾斯ヲ加ヘテ適宜ニ調和スレバ稍硬固

塊ト為ル然レ未丸スレバ稍稠ヲ得テ故ニ其撒爾末

兒秩斯ヲ含ム所ニ結晶水ヲ離散セシムル為ニ主之ヲ

暖所ニ置クニ變ル稀粥ノ稠ト加テ結晶水離散シテ鹽

分ニ亦稍融解ス是ニ於テ之ヲ暖所ニ退分更ニ二三

密扭篤間熟研スルヲ結晶水ノ一分又蒸散スルナリ而

後本量如ク甘草末ヲ投シテ研和スルハ即適宜ノ稠

得ルハ其炭類藥ヲ松炭類陳薰亞淇各半入レテ含畜シテ

○第百五十九方 設條 溫優滿 八苗類 補血類 滋潤類

本答幾私葉附 開達搭碌屈私末爾秩斯附 麥奴錢

實芟荅利斯錢 橙皮舍利別宜

右為二百五十九丸每服八丸薩昆那泡劑送下皮丁幾一錢

主治萎黃病未水腫及上羸瘦熱ヲ發セシムル者之ヲ連服

本丸ニ宜シシテ其分ニ分テ每服ニ分テ一丸ニ

○第百四十方 邁條 栗屈的兒錢 桂一錢

幾那越幾斯錢 沒藥 撒兒末爾扶斯各一錢 桂油滴

右調和為五十四丸衣桂末早晚服二丸

主治幾那鍊配伍スルハ萎黃病ニ卓越ノ効ヲ奏ス蓋此

方胃化強健者用之。第一千四十四方。蒲列刺名。鍊製強壯散。ヒルフェルス。ト

○第一千四十四方。蒲列刺名。鍊製強壯散。ヒルフェルス。ト。ス。マ。ル。チ。ア。レ。ス。フ。ラ。羅。各一。錢。半。桂。一。刀。其。散。爾。末。

右調勻為散等分九包每服一包日一次

主治萎黃病全身衰弱經血閉止等症宜之。製丸。

○第六千四十二方。新。私。武。藥。異。味。或。懷。疑。不。可。更。三。

鹽酸鍊。橙皮水。右調和每服二十滴日三次乃至五次

主治萎黃病及脫血或諸般之虛脫病者患之。

○第一千四十三方。葛。葛。後筋力衰弱及血液不給之症補益之此溶液二十

滴中大約鹽酸鍊二氏ヲ含畜ス。由。半。

○第一千四十四方。越。魯。濕。屈。沃。曹。謨。鍊。一。錢。附。甘草越幾斯。適。

右分為三服一日服盡。入。六。曹。葛。葛。舍。休。三。錢。以。至。四。

主治萎黃病瘰癧病ヲ合併スル者宜之。其。因。難。內。三。錢。

右為六十九。衣。挂。末。玻。璃。壺。收。貯。晨。夕。服。二。九。乃。至。四。九。

主治萎黃病瘰癧病合併症ニ用ヒテ確効ノ一方トス。

右為六十九。衣。挂。末。玻。璃。壺。收。貯。晨。夕。服。二。九。乃。至。四。九。

主治萎黃病瘰癧病合併症ニ用ヒテ確効ノ一方トス。

右為六十九。衣。挂。末。玻。璃。壺。收。貯。晨。夕。服。二。九。乃。至。四。九。

主治萎黃病瘰癧病合併症ニ用ヒテ確効ノ一方トス。

右為六十九。衣。挂。末。玻。璃。壺。收。貯。晨。夕。服。二。九。乃。至。四。九。

○第一千四十五方機利僞 蒸黃病 九

○沃曹謨鍊舍利別附 一錢至五錢 蒸餾水 一斗至一斗半 沙糖舍

利別半錢 甘草煉發神效

○右調勻晨夕服一小哥喜匙

主治少女之萎黃病ニ宜シ又小兒神經病其因腹内ニ在

此症ニ用フベシ○大人ハ沃曹謨鍊舍利別三錢乃至四

錢ヲ以テ蒸餾水六斗ニ和シ每服一食匙強日ニ二三次

○第一千四十六方濕優湯

牡蠣末十斤 鍊粉三斤至六斤 桂油糖半

右調和為散分十二服日三服

主治萎黃病胃中酸敗液ヲ兼有者之ニ宜シ

○第一千四十七方

主鍊粉三錢 葛爾儒別半 老利兒子末 桂末一錢

古杜松子舍利別全量 膠三 膠三 正火六 至六火

右調和作舐劑每服二三茶匙日三次蒸餾水 鍊固半匙

附考 呂秘名 創製スル所ノ所謂私黠篤噶爾德名 萎黃病

舐劑是ナリ

○第一千四十八方過條栗屈的兒

鍊粉二錢 葛秘加 栗刺桂皮 白糖六錢

右調和為散私葛肘刺名 收貯每服一小哥喜匙強日四次

主治萎黃病胃腸虛弱ノ者ニ宜シ一小膏湯湯飲日四次

○第一千四十九方〔秘歌〕鄭度〔註〕林丸〔註〕水白糖〔註〕

○鍊粉〔註〕大黃〔註〕桂皮〔註〕白糖〔註〕

右調勻為散分八服朝夕一服

○第一千五十方〔過傳〕栗屈〔註〕的兒〔註〕精製硫黃〔註〕三沒藥〔註〕透明蘆薈〔註〕凝固牛膽〔註〕

右二方為〔註〕丸衣桂末朝夕服五丸乃至六丸

○第一千五十一方〔註〕金硫黃〔註〕甘朮〔註〕薩毘那〔註〕

主治右二方萎黃病鍊〔註〕用〔註〕便秘〔註〕者〔註〕宜〔註〕

○第一千五十二方〔註〕金硫黃〔註〕甘朮〔註〕薩毘那〔註〕

主治右二方萎黃病鍊〔註〕用〔註〕便秘〔註〕者〔註〕宜〔註〕

○油〔註〕橙皮舍利別〔註〕

右二方為〔註〕丸衣桂末臨臥服〔註〕二粒〔註〕

○此方越矣〔註〕葛爾度〔註〕製〔註〕所〔註〕頑固ノ萎黃病

○第〔註〕五〔註〕方〔註〕妙〔註〕私〔註〕鍊〔註〕粉〔註〕上好大黃〔註〕

○主〔註〕蘆薈〔註〕漿〔註〕白帶〔註〕任〔註〕惡〔註〕藥〔註〕各〔註〕宜〔註〕上好酒〔註〕

右三方為〔註〕丸衣桂末每服〔註〕二粒乃至三粒〔註〕四〔註〕次

○主〔註〕萎黃病腹臌脹及〔註〕閉塞症經閉症等〔註〕宜〔註〕若之

○服外瀉スル〔註〕片〔註〕後服〔註〕ヲ停ム

○服外瀉スル〔註〕片〔註〕後服〔註〕ヲ停ム

○服外瀉スル〔註〕片〔註〕後服〔註〕ヲ停ム

○服外瀉スル〔註〕片〔註〕後服〔註〕ヲ停ム

○服外瀉スル〔註〕片〔註〕後服〔註〕ヲ停ム

○第一千五百十三方〔拔爾辰〕

生鍊粉〔叔格刺度末〕雜腹蘭末〔亞達刺侃篤蘆謨漿〕

右十二代為一拉〔點刺〕日服三箇乃至四箇

主治〔萎黃病〕白帶下惡液病等〔宜〕

○第一千五百十四方〔過傑〕栗屬的兒〔王孫〕大黃〔一錢〕鼓陳〔別〕

○藥幾那〔正〕赤健質亞那〔味〕橙皮〔半〕透桂皮〔二錢各〕圓鍊粉〔三〕

右白葡萄酒二比浸漬飽熟十二時濾過每服一小盞強日

三次乃至四次〔過傑〕栗屬的兒〔王孫〕大黃〔一錢〕鼓陳〔別〕

主治幾那鍊粉〔如末〕製劑此〔如クナレ〕八胃虛弱ノ

者〔ト〕雖亦能夕服〔スル〕堪ルナリ〔甘永〕薩昆那

○第一千五百十五方〔龜〕越秘〔丁〕三四飯間且其毒〔二〕

時蘿蔔〔屑〕生姜〔屑〕鍊粉〔一〕白沒食子酒〔北〕

右浸漬十二時紙濾每服半盞乃至一盞〔四〕次〔西〕

主治壞血病及〔七〕萎黃病〔宜〕發〔出〕蘇〔氏〕蘇〔氏〕

○第一千五百十六方〔蒲〕列羅〔人〕苦鍊酒〔リニム〕アマリュム〔カ〕

羅〔酒〕藥〔水〕半〔一〕

○藥〔重〕爾鮮穗〔三錢〕桂皮〔一錢〕鍊粉〔各二錢〕上好酒〔北三〕

右浸漬十二時濾過每服一食匙日三次乃至四次〔再〕

主治萎黃病腸胃衰弱症〔宜〕又蟲症本復ノ期等〔二〕用

スベシ〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕十〔五〕

○第一千五十七方

主鏡酒石球至附

右水黃氏兒篤煮加浴湯

○第一千五十八方

鹽酸鏡溶水半弓至半附

○右玻璃壘收貯加浴湯

主治右二方一千五百七十八方萎黃病粘液流出筋力痿弱及

七血脉衰弱宜之○萎黃病八天然鏡泉秘傳西泉○

爾門篤泉○叔婦兒拔濁泉○殊効アリ最病後補益二宜

○夏月之ヲ飲服三四週間且其症二準シテ

天造或ハ人造ノ鏡泉浴ヲ施スベシ連濟ノ何者

第二類 對毒ニ青丸藥ニ轉スルニハ○軒醫對卒中在立

慢性病係神經症 具可ハ熱ヲ去シシメ血ハ通順スル

第一類 係腦髓及脊髓症 如癩症

卒中風 アボスルキシ 羅ベルルテ蘭

多血卒中ハ多量ノ瀉血頭上放蟻叔繆結爾寒罨法六十四

芒硝灌腸吐酒石酢七十五方至七十一方腓腸煎餅母頂上

范菁硬膏兩足蒸漏法等ヲ施スベシ患者能ク嚥下スル

得ハ消石九方至十四方芒硝吐酒石旃那等ヲ配合セル清涼下

劑十五方。五十六方。至六十九方。八十一方。九十一方。好トス吐劑適

應ノ症ハ罕ナリ唯其症過食後ニ起ル者又十分放血セシ

者ニ施スベキノミ畜血已ニ減退セルキハ緩性衝動藥ヲ

頻々少量ニ與ヘテ以テ神經力ヲ佐クルニ宜シ即纈草六千

十一方。至千攝爾扁太里亞四千六十亞兒尼四千六十五方

六十三方甘硝石精ニ收斂亞的兒四千六十加フル者八千六十忽忽

弗滿液。鹿琥精等是ナリ然レ若少シク多血ノ証徴ヲ見ハ

ス片ハ復速ニ清涼藥ニ轉スヘシ○神經性卒中ハ上ニ列

載セル衝動藥並ニ亞的兒劑。龍腦。麝香或ハ燐等ヲ殊稱ス

然レ更ニ猛力ニ劑ハ用ニ臨テ最慎重スヘシ何者衝動度

ニ過レハ幾微ノ元氣之カ為ニ容易ニ消滅ス合ハテ又

此種ノ症ハ注意ヲ適宜ニ大便ヲ利シ香竈藥ヲ以テ洗滌

シ及ヒ塗擦シ且誘導法ヲ怠ルヘカ殊ニ危急ニ在テハ頭

上灸灸モ亦施シテ可ナリ

○第一千五十九方穢歇蘭度橙皮舍利別一

本旃那錢四錢芒硝錢井水適宜煮沸濾取七加後味

吐酒石錢滿那舍利別一

右調勻每半時服一食匙乃至半食匙煎取餅

○主治多血卒中風放血後ニ用フヘシ之ニ兼テ酢三四分

或ハ吐酒石四錢灌腸シ腓腸ニ蒸餅母ヲ貼シ兩足ヲ







主治 合千六十三方ヨリ一千六十八方至卒中風畜血ヲ

除キテ后神經ノ運機ヲ振起スル要宜也木四 費益子

○第一千六十九方 欲爾田斯 適宜受漬慮取六寸冷定加過

古 人造麝香 人 菲阿私越幾斯 人 酒石糖 未詳 六人

右調勻為散分四裹晚服一裹

主治 卒中風后ノ不寐ニ宜シ 熱湯適宜受漬慮取六寸冷定加後味

○第一千七十方 吐酒石 三人至 亞兒尼加花浸 十二

右溶和供灌腸 一食匙

主治 卒中風及ヒ昏睡ニ宜シ宜量取六寸冷定加後味

○第一千七十一方 春 姪隣 做過別爾 涅篤

茶 格祿 董篤 越幾斯 精製食鹽 錢 加密列浸五子溶

用之 他加後藥 藥 金 藥 煎 上 香 適 宜 受 漬 慮 取 六 寸 冷 定 加 後 味

右 調 勻 供 灌 腸 臨 用 宜 振 盪 八 姆 風 味 八 姆 子 亞 兒 尼

主治 重證卒中風昏睡昏冒其他腦病ニ宜シ 煎 藥 之 煎

腦髓軟化 卒 併 セ ン フ ヲ マ ラ シ ア 羅 蘭 煎 藥 卒 中 風 合 去

此症鑒定最難シ而之ヲ神經性卒中風ト看做ク且屢之

アリ消燉治法ハ緩法ト雖此症ニ適當スルヲ甚罕ナリ之

ニ較スルハ衝動法ト誘導法ヲ兼テ施スヲ優レリ即此

ニ較スルハ衝動法ト誘導法ヲ兼テ施スヲ優レリ即此

屈私名人 此症前兆ヲ見ス時即神經藥子ルヲ稱用ス續草重兒尼加加護謨安安沒尼亞幾亞的兒劑別私點設弗神經丁幾ヲ少量頻服シ酒精塗擦藥香竈浴湯等是ナリ驟ニ中風ノ類症ヲ發シ卒倒スル片此症往々ハ神經性卒中風ノ治法ヲ下スベキノ機會トス宜シク嗅藥ヲ施シ足蹠ヲ刷摩シ蒸餅母等ヲ貼スベシ麻痺ノ期ハ屈私名ニ倣ヒテ亞兒尼加花千七十四方亞的兒劑護謨安沒尼亞幾及ヒ燐千七十三方ヲ用ヒ外用衝動藥ヲ塗擦シ頭上ニ香竈罨法蒸餅母及ヒ芫菁膏ヲ貼シ其他麻痺ニ處スル所ノ劑ヲ與フニ之輓近參爾千七十五方ヲ試用シテ殊効ヲ得ク司馬

○第一千七百二十方〔穢風私〕宜シク參爾千七十四方及ヒ

亞兒尼加花山生者未熱湯適宜浸濾取六ヲ加後味

過設印亞的兒二刃刃至一亞刺毘亞護謨漿 橙皮舍利

○別各千七百二十五方〔穢風私〕

右調勻每半時服一食匙

○第一千七百三十三方〔同上〕一千七百三十四方〔同上〕亞的兒燐亞的兒燐適宜溶化加後味

亞兒尼加花浸加花半以亞兒尼及桂舍利別一

右調勻每半時服一食匙乃至三食匙

○第一千七百三十四方〔同上〕亞的兒燐亞的兒燐適宜溶化加後味

亞兒尼加花浸加花半以亞兒尼及桂舍利別一

右調勻每半時服一食匙乃至三食匙



此症頭ノ畜血<sub>三</sub>因ル者ハ刺絡頭上蟻鍼項窩吸角脚湯等

適當<sub>ス</sub>内服清凉劑<sub>九方至十七方</sub>苦味泉<sub>六方</sub>鑛酸<sub>六方</sub>至<sub>六十九方</sub>宜<sub>シ</sub>神經

系ノ衰弱及ヒ其變調ヨリ來ル者ハ神經藥ヲ鑛酸ト配用

ノ<sub>千七十六方</sub>薄荷浸<sub>九方</sub>葡萄酒<sub>十方</sub>及ヒ菖蒲根姜等是ナリ外用刺賢

如キ酒精劑及ヒ拔爾撒謨劑ヲ以テ顛顫耳後項窩及ヒ前

頭ヲ洗滌スルヲ好トス○打膿法ハ大抵諸般ノ頭旋<sub>良</sub>

効アリ<sub>テ</sub>

○第一千七十五方<sub>福倔列爾</sub>越栗失爾必篤里阿利<sub>名</sub>越栗失爾必篤里阿利<sub>各三</sub>

甘硝石精<sub>越栗失爾必篤里阿利</sub>右調勻每服十滴乃至三十滴日二次多量冷水和服

主治畜血<sub>ト</sub>感覺過敏<sub>ト</sub>合併ノ發スル所<sub>諸症</sub>用ヒ

之ヲ用ヒテ殊<sub>ニ</sub>適當<sub>ス</sub>諸般ノ頭旋<sub>亦</sub>卓越ノ効アリ

而<sub>ハ</sub>神經衰弱證見<sub>ル</sub>皮膚熱シテ乾燥シ且渴アル者

ト雖就中燒酒過飲<sub>ニ</sub>因ル者最偉効アリ但其症ニ在テ

ハ清凉劑ヲ兼用<sub>ス</sub>畜血ヲ制<sub>シ</sub>又適宜衝動藥ヲ用フル

○第一千七十六方 〔私鳩爾徒〕 此大要... 宜神藥... 用...

右調勻每一時取十滴乃至二十滴沙糖水和服

○第一千七十七方 〔福倔篤〕 其... 未... 然...

如古時時瀉過取一此加後味... 赤葡萄酒 適飽熟十二

右調勻每服五食匙日三四次

○第一千七十八方 二十歲虛性頭旋

右調勻為散分十二裹日服三裹乃至四裹葡萄酒送下

○第一千七十九方 〔秘拔爾託〕 良姜 益智 白糖

右調和為散分八服蠟紙包裹日服四次葡萄酒送下

○第一千八十方 〔那陽〕 胃腸衰弱風氣鬱畜胃中粘液鬱滯或ハ酸敗

液麻痺症及ハ經閉弛緩未因ハ者等ニ用フベシ

○藥纈草錢二十薄荷葡萄草葉墨錢西格姜半

右為粗末調勻取食匙水二三盞泡出用

○主治歌倚私的利性頭旋宜諸胃中味或發散也八麵頰

○第一千八百廿六方同主姜一音藥沙○又賦三寸十寸十

○龍涎香丁幾或麝香丁幾忽弗滿拔爾撒謨非谷錢各二

○舍電阿芙蓉液一白糖十六

○右調勻每一時服四十滴赤葡萄酒適飽熱十二

○第一千八百廿二方同主日服三至四次舊藥不

過設印亞的兒錢加耶普的油十

○右調勻每一時服二十滴四次

○主治右二方千八百一十方千八百一十方 虛性頭旋二宜シスシテ心臟病

○第一千八百廿三方藥布心熱ハ連テ苦クシルニ因テ起リ

之煎番米蠶末幾番米蠶越幾斯各一來ハ然云日漸米蠶

之右調勻為十五丸夜過爾托末每一時一時米乃至一時服

○或丸味幾端華食六服早朝一服ハ者ハ速ニ緊縛セル

○主治頭旋其宜シ感覺敏捷ノ人ハ十二時中用量僅ニ一

○丸乃至二九五止マルハ者往々之アリ○便秘症ハ蘆

蒼水製越幾斯十五丸乃至三十丸ヲ加フ求ル者ハ利也

○第一千八百廿四方藥歌蘭度此文秘也不可漏也兼列ハ

○癒瘡木脂各白糖各洋頭純精酒石一錢

○或癒瘡木脂各白糖各洋頭純精酒石一錢

右調勻為散分四裹早晚服半裹

○主治寔三頭旋入奇方ナリ ○此方殊ニ依倨篤ヲ兼ヌル

症ヲ適當ニ發シテ至三十九日ハ

○第一至八十五方（初温顯爾毒生） ○野遊或ハ蕙

主白頭翁越幾斯（四） 白糖（一） 入赤石二部中其量對一

右調和為散等分六服早晚一服

主治頭旋假症（其） ○歇爾私（各） 人相說却據以空假症

眼臉内面入纖維痙攣セシテ因テ來ルト云ヒ他ノ一說

○竊從ハ虹彩ハ痙攣ニ係ルト云フ

昏冒（ハ） 羅（オ） マ（ア） フ（ト） シ（ン） コ（） 氣利煎效ニ宜シ

嚴禁之ヲ論スルハ昏冒ハ決ノ腦病ニアラヌシテ心臟病

ニ屬ス何者此症ハ一時心臟ノ運管過絶セルニ因テ起リ

之ニ繼テ腦神經ノ侵襲セラレテ著ナリ然レ病學家多

之ニ腦病ニ算入セリ力故ニ此書モ亦舊ニ仍テ此ニ掲ク

○此症心臟血充滿セルニ由テ發スル者ハ速ニ緊縛セル

衣服ヲ脱去浴病者ハ位置ヲ改メテ其胸背高クシ顔面並

ニ胸部ニ冷水ヲ灌キ下肢ニ芥子泥ヲ貼シ若其症久ク復

セザレバ放血スルニシテ○歇倚秘的利藥因テ來ル者ハ羽毛

人髮獸毛革或ハ角ヲ焚テ之ヲ嗅シメ若クハ蒜或ハ剉

ク葱或ハ香竈醋ヲ鼻孔ニ挿シ前額ニ酒精葡萄酒礪砂精

ニ葱或ハ香竈醋ヲ鼻孔ニ挿シ前額ニ酒精葡萄酒礪砂精



等ヲ擦シ弗刺濕兒ヲ以テ全體殊露四肢ヲ摩擦シ足心ヲ  
 刷摩シ及ヒ刺戟藥灌腸等ヲ好トス○其他神經虛弱ノ昏  
 冒ハ皆治法トニ同シク且揮發性嗅藥千八百十六方ヲ施ス  
 へ蓋嗅藥ハ直ニ腦ヲ達スルヲ以テ之ヲ行ハニ必慎戒  
 スルニ頭上畜血ヲ證徵スル者ノ如キハ嚴禁之ヲ禁以昏  
 冒中藥ヲ服セシムルヲ能ハスト雖已ニ醒覺スルキハ  
 其病性ハ患者ノ體質ニ準メ相當ノ肉藥ヲ與ラシ此  
 症ハ昏冒ノ醒覺ト論ナク總テ苛酷ハ治法ヲ處セズル  
 ヲ要トス昔此症ハ症類ハ數警嚴禁トシニ因テ或ハ  
 ○第一千八百十六方昏冒ハ夫ハ瀉藥ニマテスニテ瀉藥

醋酸加里乾固者 過硫酸加里錢

右調勻為散肉玻璃壘加蒸餾水少許固封供嗅藥

○第一千八百七方

醋酸加里 過硫酸加里各一錢半 椰子油五滴

右調勻為散肉玻璃壘固封供嗅藥宜滴冷水或醋少許濕

○第一千八百八方

硝砂華半 薄荷油 加耶普的油各十滴

右調和為嗅藥

○第一千八百九方

右調和為嗅藥

藥礪砂錢二 酒石鹽半

右調勻為散加燒酒適宜濕之玻璃壘收貯供嗅藥

○第一千九十方劉的

礪砂錢一 煨石灰錢二

右二味各別研末內玻璃壘振盪混和為嗅藥

主治專昏冒宜之○脚汗抑遏ヲ復スルニモ亦之ヲ用

フベシ用法臨卧此散少許ヲ取テ田場ニ撒布シ通夜之

美着セシム子 論方 總ヲ 治法ヲ 處セ 女ル

麻痺心 羅フ 煎水 固持 藥

此症原因畜血ニ在ル者ハ放血及ヒ防煥法ヲ施スベシ腹

臟刺衝物因者ハ先腸胃汚物ヲ掃除スルヲ要ス

真ノ衰弱原因者 此種ノ症 神經衝動法ヲ專一以 麻

痺日 延ク 井者 適宜以 醫藥ヲ更換テ 用ヒ 且最初ノ 量

後漸ク加ヘテ大量ニ至ルハ 必須ニ 但時々 藥ヲ休息セ

以テ醫藥ヲ刺戟時 慣ルル 此症

最要スル所ノ藥ハ即亞兒尼加カ 百十 方九 至十 千九 十

五 葡萄草葉千 九十 六方 番木鱉千 九十 八方 秘的 列幾 尼捏

千 百十 三方 蒲律失捏千 百十 四方 至千 百十 七方

方 番椒千 百十 方 亞的 兒性 油千 九十 五方 燐千 百十 四

方 千 百 方 歇刺篤里捏千 百 方 木茸千 百 方 荒菁等是ナリ

○以上列載スル所ノ神經藥ハ血脈ノ神經ヲ衝動シ並ニ  
 脊椎ニ直達ノ對稱機ヲ起スノ効アリ此理ニ原ツキテ或  
 ハ私繆結兒氏ノ丸方千方百世ヲ以テ嘔吐ヲ起シ或ハ格祿  
 薑土千方百世巴豆油千方百世如キ峻下藥ヲ施シテ  
 良効ヲ奏スル者アリ殊ニ其症腸胃汚物ヲ帶ビザル者ニ  
 好トヌ○又患部ニ從テ相當ノ治法ヲ處スベシ四肢ノ麻  
 痺ハ外用法偉効アリ即刺戟劑ヲ塗擦シ千方百世至  
 芥子泥及ヒ芫菁膏ヲ貼シ刷ヲ以テ摩擦シ或ハ弗刺涅兒  
 香竈藥氣ヲ薰シテ以テ摩蕩シ乾角法ヲ施シ蕁麻ヲ以  
 テ鞭チ蟻浴動物體浴瀉水浴滴水浴越列幾的兒尾爾波尼

等ヲ施スベシ又病者自ラ意ヲ用ヒテ患部ヲ適宜ニ運動

シ以テ局處ニ痿弱ニ勝シヨカムベシ望外ノ効アルト

往々之ヲリ其他麻痺症ヲ療スル時ハ篤布栗地名過塔同微

私同噶私的印同等ノ温泉ニ浴スルヲ怠ル勿クシ

○第一千九十一方福保篤

本西兒尼加花錢半 默栗薩葉錢二 甘草錢一 角茴香錢一

右細剉調勻分四畧取一畧水一坩浸出濾過分服四次

○主治四肢痲黑障眼等ニ宜シ

○第一千九十二方蜀忽倫

亞兒尼加花半 熱湯適宜浸濾取六弓加後味



在テ神經系ヲ衝動シ及ヒ皮表腎臟氣管粘液膜ヲ分泌

ヲ獎メシテ欲スル者就中麻痺症卒中後ノ痙攣殊ニ痙攣殊ニ

病及ヒ水腫等ニ稱用シ毎日二錢乃至三錢浸劑トシ用

○第一千九十八方癩歌藪慶

○第一千九十九方癩歌藪慶

○第一千九百方癩歌藪慶

右一氏為一丸夜石松粉日服一粒漸加至二粒三粒

主治 脊髓神經彌蔓セル部四肢ノ麻痺ニ宜シ○此症ニ於

テハ番木鱉殊ニ私的列幾尼捏ヲ奇藥トス但之ヲ用フ

ハ臨最慎戒スルハ何者此劑動輒死ヲ促スニアレハナ

其効麻痺ノ部蟻ノ行クカ如キヲ覺ユルヲ以テ證ス

ハシ尚之ヲ連服スルハ屢越列幾ノ如キ激動ヲ起シ筋

惕肉憫ス或ハ麻痺ノ一局處發汗スル者亦之アリ

○第一千九百九方癩歌藪慶

○第一千九百九方癩歌藪慶

右為六十九夜石松粉每服二九日二次宜徐々加服量

附考此用法ハ別兒列印地名ニ於テ麻痺症ニ施セ

○第一千九百九方癩歌藪慶

○第一千九百九方癩歌藪慶

番木鱉越幾斯甘草越幾斯

右調勻為八十九衣伊里斯弗魯連底那根末每服二九乃

至六九月二三三次

○第一千百一方〔翳布〕

巴豆油滴六 番木鱉越幾斯 番木鱉末格

右調和為丸五十粒衣過兒托根末每服一九日五次量

○第一千百二方〔福儂篤〕甘草膏宜

番木鱉越幾斯半刃至 格祿堇篤丁幾一錢溶化加地

榆丁幾三錢

主治右二方十百二方 下肢ノ麻痺大便不利ヲ兼ル者ニ

宜

○第一千百三方〔同上〕

番木鱉越幾斯四二 龍腦一 別爾篤婪丁幾一

右溶和每服二十滴亞兒尼加泡劑和服日四次

○第一千百四方〔弗斯爾姪蒲蘭突〕

番大鱉越幾斯乃至六 默栗薩水六 溶供加亞刺

右調勻每時服二食匙臨用宜振盪

主治四肢麻痺並ニ癩癩ニ宜シ

○第一千百五方〔速別倫歐愷〕

主治四肢麻痺並ニ癩癩ニ宜シ

○第一千百五方〔速別倫歐愷〕

主治四肢麻痺並ニ癩癩ニ宜シ

○藥 番木鱉越幾斯半 亞兒尼力加花浸五錢浸二錢取溶解

主治 加後味乾並 藥蘇 宜心

○安質沒尼酒錢 忽弗滿液錢 姜舍利別一

右調勻每一時服一食匙臨用宜振盪

主治 痿麻質斯性及單純神經性四肢麻痺其症脊髓

○ヨリ起ル者宜 宜心

○第一千百六方秘 秘刺 律秘

甘汞 金硫黃各一 番木鱉越幾斯五 亞兒尼力加越

幾斯 阿魏各二

右調勻二氏為一九衣石松粉每服五九日二次

主治 脊髓激衝後搐掣頻發之由テ發スル麻痺症二

宜心

○第一千百七方福 福儂 篤

番木鱉越幾 芫菁丁幾各二 麟亞的兒毒

右調勻每服二十滴亞兒尼加泡劑和服日三四次

主治 感覺甚遲鈍人ニ於ケル痲症ニ宜心 宜心

○第一千百八方麻 麻健 整

精製私的列幾尼担錢 玫瑰昆設兒弗半

右調勻為二十四九衣石松粉玻璃壘收貯晨夕服一九須

極慎重加至中二九上

主治麻痺症ニ宜シ○私的列幾尼捏ノ能力番木鱉越幾斯ニ優ル一六倍乃至十倍トス僅ニ八分ハ一コリ半人至ヲ以テ強大ヲ斃スベシ之ヲ人ニ施セバ危險ヲ致スニ足ル安度刺兒氏ハ十二分人ノ一ヲ服ノ撮口症ヲ發セルヲ親驗セリト云フ或ハ每服一人乃至二人ニシテ毫モ危害ヲ見サル症アリ此ニ由テ之ヲ觀レハ私的列幾尼捏ノ能力一定ナラス○然レ此ノ如キ毒物ハ寧内服セシメガルヲ優レリトス曼姪兒麻質斯法千百十ヲ以テ之ヲ施ス片ハ其効更ニ確實ナリ

○第一千九方同上

精製私的列幾尼捏一 醋酸二 白糖二 橙花水二

右溶和朝夕服一茶匙

主治麻痺症宜

○第一千百方同上

醋酸私的列幾尼捏三 再餾燒酒錢 桂水錢

右溶和每服五滴日二次須慎重加服量

主治劉姪爾私 下身麻痺經久ノ者三人之ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ

○第一千百十一方同上

硝酸私的列幾尼捏一 熱湯適宜溶化加精製甘草膏



主治 適宜

右為三十三丸 衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘收貯早

午晚服二丸

主治 麻痺 用此方大驗

○第一千百十二方

精製私的列幾尼捏 稀醋酸一錢融解加燒酒七錢

右調勻每服四滴日四次須徐徐加服量

主治 私吐屈訶兒母 病院 於此鉛毒麻痺之ヲ試

用此方良効ヲ得タリ

○第一千百十五方

精製私的列幾尼捏 白糖

右碾極為細末分四裏晚暮取一裏攤表皮撒布之

主治 麻痺症及慢性神經痛 宜

注意 戒之私的列幾尼捏

或至味果甜若之會由元中毒證ヲ見ハス片ハ模爾比捏

天代用スヘシ

○第一千四百四十五方

精製蒲律失提 玫瑰昆設兒弗

右玉窠調極為二六四九衣金箔早晚服二丸漸加至六丸

○第一千四百五十五方

並爾爾爾

...

○精製蒲律失捏十八 亞爾箇兒三十八 一弓溶化

右每服六滴日二次乃至三次漸加至二十四滴

○第百十六方同上 好野鼠尾草半

○精製蒲律失捏六 蒸餾水二弓乃至溶化加白糖二錢

○第百十七方同上

右調和早晚服之食匙中

主治第百十四方一千百七十六方至局處或以遍

身麻痺宜次○蒲律失捏私的列幾尼捏同効ナリ

七雖其力彼劣其六倍乃至十二倍下輓近ノ

醫安度刺兒諸般麻痺症ニ之ヲ用ル半人乃至

五次効得タリ麻健人ハ羸瘦病二症其一ハ

膊係ル者其二分足ニ係ル者之ヲ用ヒテ奇驗ヲ得タ

リ但之ヲ九分十分每九蒲律失捏八分人ノ一ヲ含ム者

每日六丸ヲ服セシム○硫酸蒲律失捏鹽酸蒲律失捏燐

酸蒲律失捏等ノ如キ總テ蒲律失捏鹽ハ之ヲ純粹蒲律

失捏ニ較スルニ更ニ溶解シ易シ是故ニ其効更ニ優レ

リ宜ク少量處夜交シ然レ世間通知セル力如ク蒲

律失捏鹽ハ今時未嘗テ之ヲ醫用シ供セス一虫ハマサ

○第百十八方此方蒲律失捏ニ宜シ○臘寶干其

古臘寶干斯葉半至早菖蒲油糖半

遠西方彙 卷十 三十一 廣利堂

右調勻為散分八服早晚普服

○主治 痺麻質斯性依屈篤性麻痺症ニ宜シ○臘實干斯ノ

量漸々加ヘテ十八日ニ至ルベシ然レ其能力一定ナラサ

ルガ故ニ服量モ亦定メ難シト云聞無效也

○第一千百十八方（速別倫歌倍）長ク長姑ニ其改更ニ對シ

新臘實干斯葉（一）熱湯適宜浸濾取六分放冷加後藥

瘖瘡木屑揮發丁幾（附）格爾失屈謨子酒（各）拔爾

撒謨孛露舍利別（各）小蘇打六分八分及一分各五分

右每一時半取二食匙粘滑藥泡劑和服臨用宜振盪

○主治 依屈篤性麻痺症ニ宜シ

○第一千百十九方（弗）肝爾田蒲蘭度（宜）

古臘實干斯越幾斯十龍腦（各）亞兒尼加越幾斯 顯

草越幾斯（各）葛蒲根末（適）虱蕪蘇（各）

右三氏為一丸衣石松粉每二時服三九

○主治 半身不遂ニ宜シ

○第一千百二十方（四）其和辛粹（十）

黃番椒可幾錢（一）又番椒（月）蟻絲（夜）蘇卵（年）

右每服三十滴乃至五十滴粘滑藥浸液和服日與次對稱

○第一千百二十一方（獨）忽倫（蘇）蘇蘇（骨）藥氣（味）卵日（四）

番椒可幾（料）格碌董篤丁幾（各）亞兒尼加丁幾（錢）

遠西本草 卷十 麻痺 三十四 廣利堂

右薩毘那油錢半 林蘇下幾各錢 亞良只下幾各錢

○右調勻每服十滴乃至十五滴粘滑藥浸液和服日四次

主治右三方四肢膀胱直腸麻痺宜之殊其症儂麻

質斯因然者用之ベシ○又番椒ヲ散トシ每服二匁

○乃至六匁日三四服スルモ可ナリト雖其味辛辣ナル

ヲ以テ服スニ堪ヘス適宜浸濾取六匁放冷加後藥

○第一千百二十五方 藏歌蘭度 蘇那 三成子酒 枝爾

加耶普的油錢一 忽弗滿液錢宜 鹿琥精各一錢

右調和每時半三十滴正內 亞良只下幾各錢 蘇那

○主治麻痺症未頑固十匁中者宜之

○第一千百二十六方 真也 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

的列並油錢十六 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

右每服至三十滴日四次 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

主治下肢麻痺之偉効 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

○第一千百二十七方 春嫩隣 宜之 蘇那 蘇那 蘇那

燐錢一 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

右加耶普的油一錢半溶化內玻璃壺用黑紙被封貯每服

四滴乃至六滴葡萄酒和服日三次

主治麻痺之宜 蘇那 蘇那 蘇那 蘇那

○第一千百二十五方 藏歌蘭度 蘇那 蘇那 蘇那



○第一千一百二十八方同上 叔泥埵爾永茸醋アセチンム。ア

イカリ。ス。ク。子。イ。テ。リ。羅。 生永茸洗淨細割 酒醋五勺浸安暖所三日紙絞濾取

滓加酒醋三勺振盪飽熟久之濾取液再加酒醋六勺

附考腐敗ヲ防クニ燒酒少許ヲ加フルヲ妙トス○此方

于幾劑ニ較スレバ効力猛烈ナリトス

○第一千一百二十九方同上 至ハハ明藥丸財本用ニ寄リテ

母永茸下幾千百廿七方 橙皮下幾略 湯煉薑里野ハ景京

右調勻每立時二十滴冷食和服漸加至四十滴量多キ

○第一千一百三十方同上 絲絲麻痺神半卵中氏

○第一千一百三十一方同上 白糖一連

右調勻為散分十二裹最初且服三裹後四裹冷水送下封

主治諸般ノ麻痺症ニ宜シ○叔泥埵爾人之ヲ用ヒテ全

治セ給者數症ヲ書記セリ○麻痺症ノ外左ノ諸病ニ亦

永茸ヲ試用セリ即重証依朴昆埵兒及ヒ心思鬱憂病舞

踏病落法ニ尼亞胃痛疝腎病膀胱病發疹病皮疹内陷粘液

勞等是ナリ錢五錢五錢五錢五錢五錢五錢五錢五錢五錢五錢

○第一千一百三十二方職歌蘭護叔繆結爾丸九ヤ此氏

吐酒石十五瓦カ尔ル拔バ奴ヌ護護安安沒モ尼ニ亞ア幾キ五五亞ア

○第一千一百三十三方各錢半日四六六博博以以至至錢

○第一千一百三十四方各錢半日四六六博博以以至至錢

○第一千一百三十五方各錢半日四六六博博以以至至錢

○第一千一百三十六方各錢半日四六六博博以以至至錢

○右調勻一氏為一九衣石松粉每服八九日四次漸加至發  
嘔吐即石本衣本粉本每服八九日四次漸加至發

○主治催吐療法ハ麻痺症ニ偉効ヲ得ルヲ屢之アリ此丸  
ヲ服シ吐ヲ發スルニ至リテ吐酒石ノ量若クハ丸數ヲ

減殺スハ吐重胃麻痺ヲ治スルニ効有リ  
○第千百三十二方補正 吐瀉吐瀉 吐瀉吐瀉 吐瀉吐瀉

○第千百三十三方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十四方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十五方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十六方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十七方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十八方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千百三十九方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○第千四百一十方別連杜  
格碌董篤可幾六滴至 桂水銀綿答幾里秘布格蔞蔞

○龍腦精附三 龍腦精各半 老利兒軟膏一附

右子寧調勻塗擦四肢麻痺

○第一千百三十六方

復方乳香精 捲埤兒精 蟻精附 龍腦精各半

○忽弗滿拔尔撒謨非答 硫砂揮發膏各半 加耶普的

○玉油一錢 右調勻洗麻痺部一報半 一食

右調勻洗麻痺部一報半 一食

○第一千百三十七方〔穢歌蘭度〕

加耶普的油 硫砂揮發加龍腦油膏各半 忽弗滿拔尔

○藥撒謨非答各半 二寸〔穢歌蘭度〕

右名神經軟膏 二十五寸 一百四十二寸至皆麻痺

○第一千百三十八方〔穢歌蘭度〕

番椒錢 白芥子錢 龍腦半 的列並底那白色

右半 芫菁錢 和茶再餛燒酒八 二次

○右浸漬十四時濕弗刺涅兒塗擦麻痺處日一二次

○第一千百三十九方〔穢歌蘭度〕

燐五 實百爾油二錢 罌粟油半 溶化

○右調勻塗擦患處

○第一千四百四方〔穢歌蘭度〕

燐四 的列並油 亞麻子油各一 溶化加後味

遠西方算 卷十 三六 廣利堂





僂篤等試用セリ。越魯涅屈名人モ亦此症に賞用セ

舌痺シハ此症に賞用セリ。越魯涅屈名人モ亦此症に賞用セ

此症卒中風の前兆若クハ傍証若クハ餘証トシテ來ル者

ハ此症に賞用セリ。越魯涅屈名人モ亦此症に賞用セ

處衝動法ヲ行フハ誘退法ハ即角法發疱膏串線法艾灸

打膿等是也。痺但打膿法ハ顱骨根に透圍項椎ノ上頭ニ施

シ其効力ヲシテ極テ舌下神經根ニ達セシムルヲ要ス局

處衝動藥トシテ諸種ノ咀嚼藥ヲ撰用ス即地榆根千四百

別爾篤婪根千七百姜及ヒ羌活千四百等是ナリ又刺戟性

含漱水千九百舌上亞的兒性油塗擦千五百及ヒ龍腦油薄

荷油加耶普的油等點滴ス。○噴藥モ亦稱用セリ。○内服

ハ葡萄草千九百宜千九百○越列幾的爾瓦爾波千九百

尼鍼鍼治千九百モ亦効千九百○三四次

○第千四百十五方

葡萄草葉千九百熱湯適宜浸濾過加白糖半千九百

右調身日服千九百

主治舌痺千九百往歲暴利千九百葡萄草ヲ用ヒテ奇効ヲ

得夕千九百輓近千九百至リテ斃耳千九百モ亦之ヲ用ヒテ無毒ノ舌

痺二症千九百ヲ治セ千九百

○第一千四百四十六方 越魯涅屈人毛亦此三症一賞用也

野地榆根錢 至レマレ濃耳ハ子ハ亦之也レ用コマレ無毒ハ古

右對為薄片供咀嚼劑暴レ木ハ子ハ亦之也レ用コマレ音ハ也レ

○第一千四百四十七方ハ傍証若クハ餘証トシテ來ル者

別爾篤婪根未 煎乳香各 宜ハ蘇ハ蘇ハ白ハ樂ハ講ハ遠ハ法及七ハ局

右調勻取其半咀嚼ハ退ハ法ハ即ハ用法ハ發ハ瘡ハ膏ハ串ハ線ハ法ハ艾ハ灸

○第一千四百四十八方ハ弗ハ幾ハ腫ハ魯ハ篤ハ滿ハ近ハ圍ハ項ハ椎ハ上ハ頭ハ施

姜ハ草ハ羌ハ活各 乳香適 宜ハ蘇ハ蘇ハ白ハ樂ハ講ハ遠ハ法及七ハ局

右一刃為一塊供咀嚼ハ○賣藥ハ亦ハ附ハ根ハ○肉ハ眼

○第一千四百四十九方ハ實ハ列ハ乳ハ斯ハ塗ハ察ハ方ハ首ハ是ハ又ハ口ハ齧ハ齒ハ由ハ懷

百芥子未 百拂郎斯酒北 安暖所飽熟ハ三ハ時ハ濾ハ過

加後藥ハ收ハ藥ハ數ハ百ハ八ハ式ハ至ハ蘇ハ蘇ハ白ハ樂ハ講ハ遠ハ法及七ハ局

復方白芷精附 宜ハ蘇ハ蘇ハ白ハ樂ハ講ハ遠ハ法及七ハ局

右調勻供含漱水或取其食匙內服ハ三ハ四ハ次ハ眠ハ後ハ資

○第一千四百五十方ハ弗ハ幾ハ腫ハ魯ハ篤ハ滿ハ復ハ蘇ハ蘇ハ白ハ樂ハ講ハ遠ハ法及七ハ局

餅人蟻精附 煎要捲埵兒精半 其芸香油半 軒ハ登ハ直ハ登ハスハ

此右丁寧調和塗擦舌上ハ○賣藥ハ亦ハ附ハ根ハ○肉ハ眼

○第一千四百五十一方ハ注ハ液ハ湯ハ八ハ寸ハ蓋ハ閉

主別篤尼越幾斯詳 甘草越幾斯各 葛ハ私ハ篤ハ儂ハ漢

古阿魏各 栗肉豆蔻各 大扁圓莖各 令ハ含ハ之ハ置ハ舌ハ上

遠西方書

卷十



右和勻每一時服一食匙

主治麻疾並膀胱弛緩及七麻痺宜シ

○第百五十三方傳秘的爾連 水製太黃丁幾半 括失亞越幾斯

○第百五十四方傳秘的爾連 荒菁丁幾半 瘧瘡木揮發丁幾一 杜松子舍

○第百五十五方傳秘的爾連 利別一 荒菁末每服三分 龍腦每服及 亞刺毘亞

右和勻每一時取一食匙杜松子浸半盞和服用藥

主治膀胱麻痺初期甚之ヲ稱用ス○速母墨隣偃八荒

菁丁幾十五滴乃至二十滴ヲ取リ扁桃乳ニ和服スル日

○第百五十六方同連 杜松子油 忽弗滿拔爾撒謨非答 荒菁

○第百五十七方同連 右調勻每服二十滴乃至四十滴裸燕麥煎汁和服日四次

○第百五十八方同連 主治膀胱麻痺經久春症宜シ

○第百五十九方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十一方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十二方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十三方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十四方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十五方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十六方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十七方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十八方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八

○第百六十九方同連 古重麻子末 草類 井水適宜煮八分時濾取八



通日本草 卷之十 膀胱麻痺 廣月堂

右三氏為一九衣 每服十九日三次

主治 叔泥姪爾名入二據山父此丸小便閉膀胱麻痺三由昆

者一歷驗也九一方十裏去ク

○第一千百六十方西暴爾士

荒菁末一龍腦三白石鹼半

右和勻為十二丸衣桂末每服一九乃至三九日三次

○主治 產婦ノ小便失禁症麻痺ニ因ル者ニ宜シ九或四九

○第一千百六十一方弗兒啞秘聖爾

荒菁末一鍊粉精製甘草膏一

右調勻一九為一九衣石松粉漸加服三四九

主治 小便失禁麻痺ニ因ル者ニ宜シ殊ニ產婦老人ニ用

フベシ

○第一千百六十二方例弗忽倫

薩毘那葉錢一滾湯適宜浸漬濾取五弓冷定加龍腦二

氏乃至四氏

右調勻每半時服一食匙臨用宜振盪

○主治 難產後ノ膀胱麻痺ニ宜シ

○第一千百六十三方越聖健度

龍腦精各一礪砂精各一鹿角精各一琥珀油各一杜松子

油石腦油各錢各錢各錢各錢





亞。牡蠣。石鹼等蟲症ハ殺蟲劑ヲ用フベシ。房勞或ハ獨淫過  
 度ニ由テ衰憊シ即病因トテテル者ハ先龍腦。硝石。大伍用  
 後冷水浴。幾那及ヒ鍊劑ヲ與フベシ。皮疹或ハ脚汗ノ抑  
 遏若クハ潰瘍ヲ誤治ニ因テ來ル者ハ勉メテ之ヲ再發セ  
 シムルヲ要ス。痔疾壓閉ニ係ル者モ亦之ヲ復起スルヲ專  
 一トス。病因防止スベカクテ。其者或ハ之ヲ治シテ其効ア  
 ラザル者ハ癩癩直達治法ヲ適當トシ癩癩ヲ主治スル鑛  
 性藥中碓銅礬。千百六十四方。至及ヒ硝酸銀。千百七十二方。  
 方ヲ最稱用ス。臧歇蘭度。名ハ亞鉛華。千百八十六方。至以テ  
 他石諸藥ニ優レサトシテ稱用セリ。輓近ニ至テハ皓礬。百千

取八十方。殊稱セシ。昆私。繆篤。朱砂。十九方。鉛糖。砒石。殊

福烏列爾。名ハ不溶液。六百廿。鹽酸錫。廿九方。精製洋靛。九千

等。毛亦共ニ賞賛ス。植物藥ノ中。就テハ艾根。千二百九

至。千九百九。纈草。至千九百九。方。綠橙葉。千三百五。方。攝實。過。屈

里斯葉。未詳。千二百五。方。櫛寄生。千二百九。方。青黛。千二百

十。三。百。方。奇藥。下。芍藥。千三百。方。實。屈。耽。尼。根。至。千二百三。方。

方。菲。阿。斯。蔓。陀。羅。華。千二百。方。葭。蓉。千二百。方。木。鼈。子。百。十

七。方。千。二。番。木。鼈。千二百。方。等。上。諸。藥。其。効。力。更

二。鮮。沙。去。實。百。兒。油。千二百。方。屢。經。驗。得。多。止。燐

千。二。百。廿。二。方。每。二。極。メ。テ。危。險。ヲ。致。ス。ヲ。懼。ル。雖。亦。之

ヲ稱賛セリ其他數品ヲ合和シテ製スル所ヲ癩癩藥數方  
 尸論是疇昔々秘方トスル所ニシテ或ハ太陰稱譽セシ者  
 千二百七方至 ○小兒ノ癩癩モ亦其原因ヲ除クヲ  
 先藥トシ本症ヲ後ニスベシ生齒ノ時期腦ニ蓄血アル者  
 以頭上蟬鐵兩足蒸漏法ヲ行ヒ内服ハ甘汞或ハ之ニ亞鉛  
 華ヲ配用ス千六百方腸胃汚物アル者ハ吐藥或清緩下劑胃  
 中酸敗液又生ズル者ハ制酸劑千二百七方ニ冝シ且癩  
 癩奇藥不中ニ就テ最緩性ノ品ヲ撰用スベシ即亞鉛華菲  
 阿斯越幾斯艾根千二百八方等是ナリ更ニ峻性ノ者  
 殊ニ猛烈ハ麻醉藥ハ決メ用フベカラズ

○第一千百六十四方至 ○癩癩藥ハ癩癩ノ其色藥ナ

正硝銅礬三六 府利油糖錢一

○右調勻為散等分六裏每服一裏日二三次

○第一千百六十五方弗 佛爾田蒲蘭突五 氏教經八 氏ハ

右硝銅礬二六 白糖錢一

○右和勻為散等分六裏每一時服一裏

○附考硝銅礬ヲ散トナシ成ハ速ニ風化シ易キ力故ニ之

○不可ナリトス

○第一千百六十六方過 德栗 屈的 兒總 墨習 預味 景又 朔一 氏

硝銅礬四 蒸餾水適宜溶化加後味

白蒸餅心白糖各十宜飲山吹餅和野癩癩藥數方

○右和勻二丸為一丸衣石松粉玻璃壘密貯初晨夕服一丸

漸徐加增

○第一千百六十七方標秘私坐墊二風邪癩癩長苦女婦之

硃銅礬錢半蒸餾水適宜溶化加後藥

精製甘草膏錢一甘草未適宜

○右為百二十九衣桂末玻璃壘收貯每服一丸乃至八九

至隨日二三次衣藥其別一藥并丹三丸即亞鉛藥非

主治一千百六十四方可一千百六十七方至皆癩癩及

○他ノ重證癩癩病ニ宜シ○硃銅礬ハ癩癩ノ一奇藥ナ

リ感覺遲鈍ノ病者最能治之ヲ服スルニ堪ク其他之ヲ

用フハ腸胃強健ヲ要スルガ故ニ預之ヲ補益スベシ

○第一千百六十八方遠癩癩並ニ癩癩藥ニ宜シ

硃銅礬錢半白蒸餅心四三硃砂加石灰精適宜量持ク

右為九十六衣石松粉玻璃壘收貯日服二丸乃至四丸

漸加增後服ヲ停ムベシ

主治癩癩並ニ面痛ニ宜シ

○第一千百六十九方掘正漸五錢溶化

硃銅礬錢半蒸餾水半ヲ溶化煎餘ニ益蒸水

○右每服五滴日三次宜漸加滴數及癩癩

○第一千七百七十方福傳篤 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右和勻每二時半服二十五滴

○第一千七百七十一方謝 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右和勻每二時半服二十五滴

○第一千七百七十二方謝 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右調勻每服六滴乃至八滴日三次

○第一千七百七十三方謝 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右調勻每服六滴乃至八滴日三次

○第一千七百七十四方謝 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右調勻每服六滴乃至八滴日三次

○第一千七百七十五方謝 蒸餾水半勺及鹿琥精二錢溶化

右溶和黒玻璃壘收貯晨夕服二十滴

主治癩癩宜葛刺墨兒各人說

專其人體格強健

盛因此癩癩自効アリト云此丸下ナシ每服少量持久

連進此丸ヲ尤稱譽セリ之ヲ用セテ胃中灼熱嘔氣飲

食不化等ヲ証ヲ見ル者ハ速ニ後服ヲ停ムベシ

○第一千七百七十三方設魯孤羅屑

結晶硝酸銀四續草水并五錢溶化

右調勻早晚服十滴每六日加二滴

主治癩癩宜此○二患者極メテ虛弱壯年及癩癩

○發 亦來連綿治也 此數年普孤羅屑各法亦  
不用也 全愈 再發 亦不 漸加 服之 七

○塗擦 七日 云云 兼天脊椎 神經軟膏  
複方迷迭 香油軟膏

○第一千七百七十四方 依佛 跌門 輕  
結晶硝酸銀 內石白加蒸餾水少許搗碎後投後味

右為九十九衣 過爾托末 玻璃壘密貯早晚服二粒 漸加增

主治 此方常主癩癩 亦他 神經病 硝酸銀的當  
不此症 皆稱用 亦

○第一千七百七十五方 弗 陽 爾 輕 結晶硝酸銀 健質安那 越幾斯 甘草 末各 錢 陰 附 根 末

右和勻 二 為 一 九 衣 石 松 粉 晨 服 三 九 六 十 服 三 九

○第一千七百七十六方 羅 透 的 印 祿 別 耶 二 錢 加 地 骨 末 適 中 煎

右調和 二 為 一 九 衣 桂 末 早晚服 三 九 每 三 日 加 三 九 間

○結晶硝酸銀 蒸餾水 適宜 溶化 加後味 菲 阿 斯 越 幾 斯 緬 草 越 幾 斯 末 適 軍 卒 二

右為九十九衣 過爾托末 玻璃壘密貯 早晚服 三 九 二 至 一

主治癩癩三宜 硝酸銀量漸々加一錢ニ至ル

ベシ薩微亞羅孃名地疾醫葛弗獨戾噎爾名一軍卒二

十一歳シ癩癩日發不此丸ヲ用セテ治セリ最

初朝二粒晚三粒又與今日每毎毎日二粒ノ加増シ竟

云時服十粒至以此第未四日即後發作減之示三日間

歇示其勢亦隨減退也此丸於方中硝

酸銀ヲ増シテ十五ニ至リ爾後二十ニ至リ又始メ

云四此示少量ヨリ始メ漸徐加増セ火六七週ニシテ

發作間歇スル日乃至日及日大約四個月ヲ

經テ全功ヲ收ム然レ氏爾後尚姑毎朝三丸每晚四丸ヲ

○連進七川九十九神含精酸銀十五以其他施治際脊推吐酒石膏

ヲ頻々塗擦初ハ吐酒石二錢半ヲ以為家猪脂一勺ヲ

和之後其味等分申不申云ヲ以為九節通驗ノ量半ニニニ

○第四百七十八方歌權其油煎林重六兩八至并藥

用結晶硝酸銀半蒸餾水適宜溶解加左味其煎増少

阿芙蓉末六變矢鳩答越幾斯錢精製甘草膏錢八重

右和勻以為一丸衣石松粉早晚服三丸漸加至五丸以

主治癩癩頑固症宜以歌蘭度毛亦之ヲ稱用也墨

○第二百七十九方優割黑色ニ變スハ昔ニ宜ニ兼テ

○第三百七十九方優割黑色ニ變スハ昔ニ宜ニ兼テ

○第三百七十九方優割黑色ニ變スハ昔ニ宜ニ兼テ

右毎日飲服六分煎酸銀入量漸々加へて一錢に至ル

○主治硝酸銀ヲ服メ皮膚黒色ニ變スル者之ニ宜シ兼テ

此藥液以テ因皮表ヲ洗フ毎兩日三次スベシ葛刺墨

兒名ノ説ニ據レバ硝酸銀ヲ服スル者七錢ニ至ラザレ

バ皮膚黒色ニ變スル者下云フ雄遜名硝酸銀ヲ連

用テ此劑ヲ用テ及至皮色變スル者下云フ是其確徴ナリ

○葛刺墨兒名ニ據テ尚且断然持重シテ六月ニ至リテ

可ナク然レテ六月中ニ服スル所ノ硝酸銀ノ量半弓ニ過

ベカラズ其他葛刺墨兒名ハ肌膚ノ黒色ヲ消却スルニ格

魯林及ニ沃骨謨劑ヲ試用スル所効ヲ得テ下云フ

○第一千百八十一方 臧歌蘭度 一劑一服

亞鉛華半 甘草膏適

○右為六十九夜石松粉早晚服二九

主治臧歌蘭度ニ試驗ニ據ル者亞鉛華ニ癩癧ノ奇藥

タリ大量ニ久服スレバ尤妙トス即隔日半弓ヲ加増シ

病者輕快ヲ覺ユルニ至リテ再服量ヲ減スベシ漸々加

○ヘテ十弓ヨリ二十弓ニ至ルニ害アルナシ此ノ如ク

之ヲ連用スルニ重症ハ半年乃至一年輕症ハ毎月十四

日下ルベカラズ最良一服毎一時一服

○第一千百八十一方 同法 臧歌蘭度 一劑一服

○藥 亞鉛華ハ 菲阿斯越幾斯ハ 各一

續草油滴

續草錢半

右調勻為散分八服晨夕一服

主治癩癩之甚効下生頑固症ハ硝銅礬半ハヲ加ハル

○第一千百八十二方福恒篤

亞鉛華ハ 續草新根末 牡蠣ハ 白糖半 加耶普

的油ハ 右和勻為散分十五裏每服一裏橙葉浸送下日三次再藥

○第一千百八十三方遠突士

亞鉛華ハ 蝟蝟石ハ 芍藥ハ 白糖各一

右調勻為散等分十二服每一時一服

○第一千百八十四方亞突列爾

亞鉛華ハ 菲阿斯越幾斯ハ 橙葉ハ 續草各一

右調勻為散分十裏早晚服ハ 裏ハ 續草ハ 續草ハ 續草ハ

○第一千百八十五方別連杜

亞鉛華ハ 莨菪根ハ 吐根ハ 續草油糖錢

右調勻為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

○第一千百八十六方神經性癩癩

主治神經性癩癩ハ 宜ハ 宜ハ 宜ハ

○第一千百八十七方神經性癩癩

主治神經性癩癩ハ 宜ハ 宜ハ 宜ハ

○第一千百八十八方神經性癩癩

主治神經性癩癩ハ 宜ハ 宜ハ 宜ハ



○第一千八百八方 際爾肚面兒

續草油糖 各半 一劑 一服

右和勻為散分十二裹每服一裹日二次草或糖

○主治小兒癩癩蟲症係九者オレルプムエ之二宜シ

○第一千八百七方 蒲蘭堊

續草越幾斯ハ并續草油糖ハ之ハ也ハ用シ

○主治癩癩宜シ ○佛里偈篤ハ及ハ拔貧偈頓ハ皓磐

量漸加ハ至ハ半錢ニ至ハ每兩量之ヲ與

○第十云天然ハ信ハ時一服

○第一千八百八方 栗屈的兒ハ春垣隣

○主治癩癩阿魏錢 續草越幾斯ハ宜ハ適

右為三木和衣桂末玻璃壘收貯每服二九乃至三九日二

三杯藥報請ハ針ハ半錢白藥ハ溫麥酒ヲ以テ送下為感

○主治癩癩舞蹈病百日效等ハ如疥癩癩病ニ宜シヒテ后

○第一千八百九方 正萬夫ハ葛ハ弗ハ出ハ格ハ馬ハ吸ハ發ハ封ハ休ハハ

○主治亞硝酸ハ昆ハ秘ハ繆ハ篤ハ朱砂ハ且煙草藥ハ各ハ一ハ高蘆薈水製越

○主治幾斯ハ眼良糖ハ三ハ聖ハ太ハ至ハ尚發汗多ハ加ハハ

○主治右調勻為散等分ハ至ハ裹朝餐後半時一服臨卧一服前兆

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ

○主治癩癩宜シ





續草半斤 橙葉綠色者半斤

精製礪砂錢二

麻僞涅失亞

○第加耶普的油各二

右調和為散玻璃罈收貯每服茶匙日三次

○第一千九十九方別連杜

續草半斤 麻僞涅失亞精製礪砂各廿 加耶普的油

右調和為散玻璃罈收貯每服一茶匙日三次

○第一千九十九方別連杜

續草半斤 加耶普的油四十 癩癩各一 實亞屈里斯散一

宜以入癩癩民 癩癩各一 實亞屈里斯散一

○第一千二百方名癩癩散

續草半斤 菖蒲根健質安那 寄生各錢二 精製

○第一千二百方名癩癩散

右調和為散每服大茶匙日三四次前捕實亞屈里斯散

○第一千二百方名癩癩散

橙葉細末 里漢葉各半 上藥各一

○右分十二裹每服一裹以橙葉泡劑一盞送下日三次

主治癩癩獨活因テ發スル症ハ唯此方又用宜テ功ヲ

收ハ 癩癩是此者往々之 蘇リ 癩癩蘇 蘇リ 蘇リ

○第一千二百二方暹羅

綠橙葉錢六 續草錢二 井水適宜煮瀝取六加橙皮舍



大吐瀉發及下雖亦復鎮靜也他癩癩奇藥効  
元ガ水症此方利可者往々鮮也下也方體ニ外ハ元

○第一千二百五方 煎糖種ノ癩癩病有形ノ起因アル

攝實亞屈里斯葉 一錢至 滾湯適宜浸漬濾取四勺加

○第一千二百六方 湯爾托舍利別一馬

右調勻每二時服一食匙

主治上二同シ二煎ニ改テ用ニ其第一煎ハ煎ニ至

○第一千二百六方 福羅篤第一煎ハ干煎蘇實亞屈里斯

白寄生 續草 橙葉 錢各二 蘇苗香 實亞屈里斯

右細剉為泡劑料○每日取其一分注滾湯三盞半少頃濾

過日服盡

○第一千二百七方 弗肝爾姪蒲蘭度

右櫛寄生 對者 井水適宜煮四分時濾取一匕利別

右每二時服一盞強

○第一千二百八方 煎乙弗祿矣

主櫛寄生 芍藥 常水三匕煮耗至二匕投後味

右額草 鈴蘭 菩提樹花 噶里留的葉 附示詳

右飽熟五密紐篤瀝過加芍藥舍利別三勺和勻温服日三

四盞 煎糖種ノ癩癩病有形ノ起因アル

○主治一千二百六方 日一 一千二百八方 至癩癩ニ宜シ

○第一千二百九方 弗陽 右調和為散分八包每服其包留生三次藥舍味限三日味白品服日三

四橙葉 柵寄生 各半 續草 刀 亞鉛華 三五至 硝銅

○右藥 半八至 右調和為散分八包每服其包留生三次藥舍味限三日味白品服日三

主治瘰癧殊 癩癩 舞蹈病 宜以煮抹至二此對和

○第一千二百十方 佛 右調和分十包每服一包連茶次乃怪四次一此

○青黛 細末 暴爾芳香散 五

○右調和分十包每服一茶匙日三四次

○第一千二百十一方 暴爾芳香散 一分注滾湯三盞半少頃濾

○青黛 極末 暴爾芳香散 半

○右和向每服一茶匙日三四次

○第一千二百十二方 暴爾芳香散 砂糖舍利別

○青黛 末水適宜捏 暴爾芳香散 半 砂糖舍利別

○右調和作煉膏分四服乃至六服日服

○主治 一千二百十方曰 一千二百十一方至別兒列印

○病院 於癩癩及他癩病多夕試用スル所ナ

○青黛 原腹内神經ノ運管轉變 癩癩發スル所

○癩癩 尤的當凶之ヲ用フルノ初ハ却テ其前ヨリ更

○數發作長且劇甚ナルカ如シト雖發作ハ短ナリ少頃

○發作ノ數ハ勢ハ漸々減退シ竟ニ全ク歇ム者多ク

○遠西方彙 卷十一 癩癩 三十一 癩癩 月 堂

○遠西方彙 卷十一 癩癩 三十一 癩癩 月 堂

○遠西方彙 卷十一 癩癩 三十一 癩癩 月 堂

遠西本草 卷十一 癩癩 一 癩癩 癩癩

○青黛禁忌以症以即焮衝症。腹內畜血。胃腸以感覺過敏。並三月經是年以基十八。

○第一千二百十三方 西突列爾

芍藥 末半刀 亞鉛華 八分至 菲阿斯越幾斯 二分至

右調勻為散分十二裹每服一裹日三次。為用六分。

主治疇昔芍藥以癩癩之奇藥也。唯輕症日良。

効驗凡以氣膏公四眼。

○第一千二百十四方 穢歌蘭度

○蔓陀羅華丁幾 錢一

右每服六滴日二次。

主治癩癩。○癩癩獨淫。因テ發スル者ニ遠突土。

殊ニ蔓陀羅華ヲ稱譽セテ其藥根ニ熟テ瘡癩遺毒。

○第一千二百十五方

阿魏 末各 續草 末各 亞鉛華 末各 葛秘篤儂

錢半 加耶普的油 適 木薑實 荖荖 荖荖 荖荖

右以公為丸。衣桂末。每服五粒。日三次。

主治癩癩。舞蹈病。歌乙秘的里。宜宜。宜宜。

○第一千二百十六方

日莨菪 末四 白糖 四 至五分

右調和為散。等分。服早晚。一服。莨菪入量。減。減。

遠西本草 卷十一 癩癩 一 癩癩 癩癩



主治單純神經性癲癩宜之○葭苈ノ量漸ク増進シテ

日者二人三人或四五人至ルベシニ患者アリ一人十

六歳千人十九歳皆數年間劇甚ノ癲癩ニ罹リシ者余此

方ヲ用ク者余治セリ葭苈ノ量始毎服四分ノ一漸ク

如増スト雖四分ノ一乃至一ノ二過ガリシ○他ノ鎮

痙藥菲阿斯。蔓陀羅華。番木鱉實。芟答利斯。木茸。葛爾達密

布利典。私。碎。米。種。等ハ唯癲癩知覺機ヲ亢盛ヨリ發スル

者ニ的當ス然レ之ヲ服スルト多キニ過キ或ハ久キニ

過クベカラズ人或ハ阿芙蓉ヲ稱用スレト卒中ヲ起シ

易キガ故ニ廢シテ用麻呂絲ニ因テ發スル者ニ盡ク突

○第一千二百十七方癩過。階設ニ幾許ハハ對和

木鱉子半湯適宜浸安暖所飽熟半時濾過取六

錢五桂舍利別六錢五宜二

右調勻每一時服一食匙

主治癲癩宜シ硫酸亞的兒

○第一千二百十八方同上四藥栗藥水六亞陳

木鱉子半滾湯適宜浸濾取六加後味用二殊二其

橙皮越幾斯健質亞那越幾斯錢各一幾那丁幾錢三

桂舍利別半宜二○木鱉子八對八

右調勻每一時服一食匙五宜二○木鱉子八對八

主治癲癇頑滯間歇熱。蟲症ニ宜シ。○木鼈子ハ强健ノ人

ニ在テモ亦神經系ヲ侵ス下甚シクシテ或ハ之カ為ニ

癡呆ヲ致ス。ハ對亞眠藥ヲ與テ之ヲ治ス。

○第一千二百十九方 弗。肺。瀉。用。漸。蘭。度。

番木鼈越幾斯 亞兒箇爾製者 默栗薩水 六他亞刺

昆亞護謨漿 維華番木鼈實 谷利斯 木并萬南達密

右調和每一時服二食匙。癲癇知覺機々亢盛ヨリ發スル

主治癲癇及口下股麻痺症ニ宜シキニ過キ或ハ久キニ

○第一千二百二十方 思。麥。傑。滿。

實百兒油 カ 硫酸亞的兒 ニ錢溶化加後味

舍電阿芙蓉液 錢半 三。天。類。小。點。十。小。

右調和每服五滴日四次 系々ノ軒懸系ノ興奮對テ益シ

主治癲癇期宜 各一 研和加後味

○第一千二百二十一方 弗。呵。噎。

實百兒油 カ 硫酸亞的兒 錢 和

右調和每服二十滴乃至三十滴日四次 過度ニ係ル者

主治癲癇舞踏病。聖友。慢。其。他。諸。般。ノ。瘡。病。ニ。用。テ。殊。ニ。其

症依。僂。篤。僕。麻。質。斯。慢性。皮。疹。等ノ。抑。遏。ニ。係。ル。者。ニ。宜。シ

○第一千二百二十二方 祿佛思。尼。各。

燐 ハ 加後味溶解 荷下幾

硫酸亞的兒 半 薄荷丁幾 一

○右調勻每一時半或二時取二十滴六十滴乃至八十滴砂

糖和服 薄荷丁幾 ○木鱉子 強健

主治癩癩麻痺病黑障眼或皮膚疹宜 用之 其

○第一千二百二十三方 羅遜私的印祿那耳

燐 實百兒油 錢溶化加後味

○續草油 一木一丈

右調勻每服五滴或三滴日三次

主治癩癩宜 ○ 血脈系及 レ 神經系ノ興奮機亢盛 セ

ル者ハ決 レ 燐ヲ與ル レ 勿 レ 感觸遲鈍ニ レ 服小緩ナル

者 共 用 フ ベ 若 一 部既 ニ 麻痺 セ 者 ハ 尤妙 ト ス

○第一千二百二十四方 羅設耳

龍腦 錢半 白糖 用 亞刺昆亞 護 漿 各一 研和加後味

主醋 辨 接骨木花水 麗 春花舍利別 研

右調勻每一時服一食匙強

主治癩癩精神錯亂殊言其症陰具 刺 衝過度 係 者

佳 至 綠 百 爾 陳 亞 二 錢 一 半

○第一千二百二十五方 弗瓜隣

主沒藥 鵠 栗 拔 奴 謨 篤 尔 綿 黜 刺 越 幾 斯 錢 各一 錢粉

續草 一 錢 半 至 十 錢 日 二 次

右調和為一九衣石松粉每服五粒乃至十粒日二次  
主治癩癩獨濕六起因七九症宜以強發汗

○第一千二百二十六方 蒲耳霸歌

麻篤里私百爾刺兒 未詳 刺蝟石 半一錢 勿搗祭亞石

主治癩癩薄荷水增苗香水各非是過兒把舍利別 半

右調勻每半時服一食匙 加後味

主治癩癩及骨他 亦瘰癧病宜 拿拂 名 亦蒲耳霸

歌 名 做 テ 之 用 之 味 異 亞 數 難 紫 各 類

○第一千二百二十七方 芥兒幾阿尼 癩癩散 九盛

芥兒藥 三 柵寄生 象牙霜屑 野火爪屑 鹿角屑

用赤苔 詳未 白苔 同 麻爾瓦利塔里 植物ノ名未詳各六錢 橙葉

右調勻為散每服十粒至半錢 咬 多 服 ハ ハ ハ

○第一千二百二十八方 叔魯腎傑兒 芥兒幾阿尼格爾列

主治 屈篤 名 癩癩散 尖 芥兒幾阿尼格爾列

煨製麻僣 涅失亞 半二錢 大黃 柵寄生 橙葉 各細末

右調和每服一刀尖日三次 芥 半 之 ハ ハ ハ

○第一千二百二十九方 阿毘私薛篤 舐劑 舐 癩癩增

主 硫黃華 末 蘇縹草 末各三錢 蘇朱砂 二錢 麝香 葛私

小篤樓謨 各二 茶 二 砂糖舍利別 宜適

右為舐劑用茶匙頻々抄服限服五粒乃至十粒日二次

主治繆爾施留斯名癩癩之ヲ稱贊セリ藥香 葛味

○第一千二百三十方阿魯突祿癩癩散名

實屈耽尼根皮未詳山奈半

右調勻為散每服二刃菩提樹葉泡劑和服

主治二百年前阿魯突祿名癩癩名ノ家族此方ヲ以

○秘藥下癩癩ニ用七奇驗ヲ得又其服量ヲ增シ

予時日西浴ニ至リ然レ此ノ如ク多服セシムルハ

○方中山奈ノ量ヲ半減ニス○小兒搗搗ニ實屈耽尼ヲ稱

用セリ但之ヲ用フルハ兼テ蟻鉞灌腸瀉劑ヲ與シ

須要トセリ○孤列答名地產ノ實屈耽尼往昔醫藥ニ供

タムニクレ手間キス一名オリ方ハ三カニ盛リ以テ伊太里亞產

○物優塔ト撰用スハニ癩癩ノ藥ニ用ス

○第一千二百三十一方 沸奴年私實屈耽尼舐劑

實屈耽尼根末薄荷昆設兒弗ヲ薄荷舍利別宜

右為舐劑每一時半服茶匙外ニ藥合限直

○主治繆爾設留斯名癩癩藥ノ之ヲ稱贊セリ私篤魯

屈名人少單方實屈耽尼丁幾ヲ癩癩ニ賞用セリ

○第一千二百三十二方秘癩癩散至十八日

實屈耽尼根 芍藥 榭寄生各二 蘆薈木 蜷蛄石

右末各一錢 琥珀白色者 木炭末 薑薑木 廣地石

○右細末調和大人服半刀乃至一刀小兒五刀乃至十刀日

○二三次單 實實 可可 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩

○第一千二百三十三方 癩爾列兒名癩癩煉膏 癩癩癩癩 癩癩癩癩

幾那錢末 攝爾扁太里亞根錢末 芍藥舍利別宜道

○右作煉膏早晚服一錢持重三月乃至四月後當滿月及弦

○月服前量三日

[附考] 扑尔答兒名人 搯掣病及七癩癩二幾那人効アルヲ確

定セリ即癩癩面發スル者或ハ房勞過度等ハ如キ生力

衰耗ヨリ發フル者ニ好トス越耳録弗名人 ハ之ヲ加耶普

的油ト配用默實鳩斯名人 其他古ノ大學醫皆大二之ヲ

稱贊也癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩

○第一千二百三十四方 吡突名癩癩煉膏

幾那錢末 緬草錢末 橙皮舍利別宜道 半各割 印牌及

右作煉膏朝夕服持重三月後每月當滿月取前量連服三

日至四日癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩

○第一千二百三十五方 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩

甲方癩癩 謨私篤名癩癩散 第一号癩癩 癩癩癩癩 癩癩癩癩

健質亞那癩癩 菖蒲根各半 艾根各半 半夏錢各半 姜錢各半

蘇格爾癩癩 需謨葉各一 橙皮加耶普 的油糖曹達 各六

錢各六

右調勻為散

主治癩癩輕症者宜之 大人服量一錢半ヨリ二錢至但唯

月不變ブル時乃故至八時 服之尋テ橙葉甘草ヲ泡劑ヲ温服シテ發汗ヲ俟ツベシ

○服之尋テ橙葉甘草ヲ泡劑ヲ温服シテ發汗ヲ俟ツベシ

日乙方 謨私篤癩癩散第二号

玫瑰花 甘草 林白糖 錢各五 桂皮 錢三 丁子 薑 姜 良

月姜 攝綿施那草 益智 藜合香 洋芥子 錢各一

○右調勻為散 三十四 女病 榮突 癩癩 熱膏 効アルヲ確

主治癩癩劇症ニ宜シ 凡者或ハ房勞過度等ノ如キ生カ

兩方 酒 謨私篤癩癩散第三号 大學醫習大ニ

精製洋錠 艾根 錢半 葛私篤 樓謨 錢五 第二号癩癩

散 凡者或ハ房勞過度等ノ如キ生カ

右調勻為散 分十二包 日ニ三次 温酒 或ハ無糖ニ

主治癩癩劇症ニ宜シ 每常弦月及ビ滿月ノ日朝卯牌及

ト晚酉牌ニ方テ一包ヲ取リ黑櫻實水ヲ以テ送下ス之

又用フルキハ患者病室ヲ出ズ總テ風氣ヲ釀スル食餌

甘乳汁酒精類ヲ忌ムベシ此散ヲ服スル前二日間必

緩瀉セシムルニ宜シ○謨私篤氏ハ越列幾的兒及ビ瓦

爾華尼ヲ以テ癩癩ノ奇方ト為シ而シテ此散ヲ用ヒテ佐

藥トス且此ヲ施ス左法ハ如シ患者ハ性感覺敏捷ニ

元且頭腦畜血ルレ先頭上テ放蜚シ清涼食餌緩瀉  
 藥ヲ投シ次ニ越列幾的ルヲ施ス下ニ每日四分時半時乃  
 至一時而ハ項窩及ヒ四肢ヨリ其火氣ヲ導引シ爾後圓  
 版四十枚乃至八十枚ヲ重起セル福兒答柱瓦爾華尼ヲ  
 以テ適宜ニ瓦爾華尼ヲ施シ又ニ三日ノ後再越列幾的  
 兒ヲ行テ但漸次ニ其衝動力ヲ加増シ以テ猛烈ナテ  
 此ヲ施メ患者觸動機ヲ進スレバ曼陀羅子十幾五滴  
 乃至十五滴ヲ與ル下日ニ二三次頭上畜血ヲ見ハス者  
 ハ再蜚鍼ヲ施シ芥子脚湯ヲ命ス此ノ如ク之ヲ持重ス  
 ル下ハ週ヲリ十週ニ至ル○癩癩觸動機ヲ盛セル者ハ

謹慎ト加ハ衝動度ニ過ル勿ト

○第ニ千ニ百ニ十ニ方ノ眼ニ一ノ眼ニ甘草末苗香油

甘黍亞鉛華各二ハ亞麻各三ハ亞麻各二ハ亞麻各三ハ亞麻各二ハ亞麻各三ハ白糖一錢

右調勻為散等分ニ每服一晝日ニ次三次乃至四次

○主治小兒生齒ノ期ニ發スル癩癩樣ノ症ニ宜シ

○第ニ千ニ百ニ十ニ方ノ眼ニ一ノ眼ニ甘草末苗香油

亞麻各二ハ亞麻各三ハ亞麻各二ハ亞麻各三ハ亞麻各二ハ亞麻各三ハ白糖一錢

右調和為散日服一二刀尖

○主治癩癩症發作ノ時神經系ヲ鎮靜ス此ニ宜シ又小兒

○癩癩ニ良トスル方ノ眼ニ一ノ眼ニ甘草末苗香油



○第百三十三百三十八方〔福俣列爾〕

生菲阿斯越幾斯、亞鉛華〔各一〕、蘇麻偈涅夫亞〔三〕、又乳糖

右調勻為散分六服每〔一〕時米〔一〕服〔福俣〕〔各一〕

○主治小兒癩癩及〔七〕他〔癩〕癩癩諸症〔三〕宜〔シ〕第一千八百八十

○第百三十九百三十九方〔遠〕〔探〕〔土〕〔果〕日二〔分〕三〔分〕六〔分〕至四〔分〕

芍藥、蠅蛭石〔各一錢〕、亞鉛華〔六分〕、白糖〔一錢〕、白酥〔一錢〕

○右調勻為散等分〔五〕服每〔一〕時〔一〕服〔如ク之ヲ持重ス〕

○主治嬰兒ノ抽搐症及〔七〕癩癩〔二〕宜〔シ〕動機〔九〕盛〔七〕者〔ハ〕

○第百三十四百四十四方〔謨〕〔私〕〔篤〕

亞鉛華〔一錢〕、吐根〔末〕、艾根〔末〕、甘草〔末〕、苗香油

○右調勻為散等分〔五〕服每〔一〕時〔一〕取〔半〕服〔乃〕至〔一〕服〔冷水送〕

○主治謨私篤氏〔抄〕據〔レ〕此方嬰兒癩癩ノ發作ヲ治スル

○第百三十五百四十五方〔越〕〔魯〕〔濕〕〔屈〕

鹽酸銀〔附〕、健質〔安〕、那〔二〕、刀〔至〕

○右調勻為散等分〔三〕服每〔一〕時〔一〕服〔錢〕〔麗〕〔春〕〔花〕〔舍〕〔利〕〔別〕

○第百三十六百四十六方〔黃〕〔半〕

○第百三十七百四十七方〔白〕〔酥〕

○第百三十八百四十八方〔白〕〔酥〕

○第百三十九百四十九方〔白〕〔酥〕

○第百四十百五十方〔白〕〔酥〕

○第百四十一百五十一方〔白〕〔酥〕

○第百四十二百五十二方〔白〕〔酥〕

○主治小兒癩癩宜以

○第壹種每百四十五方格耳列優的兒 偏涅夫亞 乳糖

○第亞爾箇兒製艾根越幾斯四 亞刺昆亞 蘆謨 白糖

錢 銀 甘 扁 桃 乳 三 每 一 時 半 一 服

右調粉每四分時服一茶匙 亞刺昆亞 蘆謨 烏篤薛爾

主治小兒癩癩宜備魯滿名 姑的爾滿同 烏篤薛爾同

○醫攝耳篤爾等毛亦皆小兒癩癩艾根及稱用也魯

滿氏乳兒二與ルニ第一包ハ艾根半ハ半時ノ後第二包

ハ二ハ又半時ヲ經テ第三包ヲ末服トシ草ハハ半時

○歲以上ハ兒ハ初ヨリ半時毎ニ一ハ乃至二ハヲ服セシ

但病症劇易ニ準シ大抵三服ニシテ分利ヲ得ルニ

足ルトス然レ或ハ感觸亢ブリテ將ニ搐搦ヲ發セント

スル者分尚且一時毎ニ艾根ヲ加用セザルベカラズ

○第一千二百四十三方遠癩土 艾根 研和加後味

麝香六 硃砂華四 白糖三 研和加後味

○加密列水半 外用小兒癩癩

右調勻每半時服一茶匙臨用宜振盪

主治小兒癩癩諸症及癩癩宜シ

○第一千二百四十四方福佃篤

麝香四 加苗香水六錢麗春花舍利別一多徐々

搗和再加後藥苗香水六錢翼春并舍味限一匙

○藥鹿琥精一十四六 煎用正鉢盃

若調勻每一時服一茶匙

主治幼兒癩癩症

舞蹈病ノコノノ 癩癩症ノコノノ 癩癩症ノコノノ

此症醫藥少扶助須久不治愈者往往之アリ

若自然治也若者癩癩處スル所ノ方法亦皆施用

スベシ然氏頗謹慎加ヘテ之ヲ療シ所謂猛藥イハカヲ用

フ此下早失スル勿シ醫氏最着眼スベク者原因ニ

在蟲症ニ起因スル者屢之ヤ下故ニ殺蟲劑及ヒ下劑ヲ

用ニ奇藥中ニ就テ亞鉛華劑十二百四十五方至 硫銅藥

劑千七百七十一方至 銹劑千二百五十五方至 消酸銀千二百七

千八百七十三方

及艾根千五百九十二方至 纈草千九百九十六方

神藥千二百六十二方至 亦佳効ヲ奏スル者由是但

此症麻醉藥ハ廢シテ用ヒズ○外用ハ屢脊椎ニ擦藥千二百六

方十四ヲ施ス下ア即吐酒石軟膏發疱膏等ニ宜シ灌氷冷

水浸法硫黃浴ハ卓越ニ効アリ但硫黃浴法毎浴硫酸剝

篤亞斯鹽霸四弓ヲ用ヒ半時間浴ス此劑度トス每週五次

之ヲ行ヒ大抵十次乃至十五次ニテ治ス○私室癩兒名

ハ尋常症ニ係ル症ハ其因項間第七椎腫起シテ或ハ痛冷  
 其脊椎ニ係ル症ハ其因項間第七椎腫起シテ或ハ痛冷  
 之ガ為テ神經根壓迫セラルルニ由テ神經ニ激衝狀ヲ發  
 スルニ由リトシテ而テ私室斃兒氏之ヲ療テル宜法其患分  
 ル所ハ項推ニ蟻鍼ヲ施シ甘汞ヲ内用シ脊椎ヲ浴入テ水  
 銀膏ヲ擦シ其他脊椎ハ兩側ニ打膿ヲ稱用シ此ニ由テ骨  
 腫起速ニ消散ス云フ  
 ○第一千二百四十五方 弗那爾田蒲蘭度  
 亞鉛華六分 菲阿斯越幾斯二分 白糖一分 錢一分 鹽一分 糖一分 鹽一分 糖一分 鹽一分 糖一分  
 右調和等分六服毎一時一服

主治舞蹈病其他痙攣病ニ宜シ○亞鉛華ノ量更ニ增加

之ヲ可ナリ○賦歌蘭度氏六分 至加増一分 日三服  
 醫テ偉効ヲ得タリト云フ

○第一千二百四十六方 預結  
 鹽酸亞鉛附 甘海鹽精二錢 溶解

右調勻先毎二時服五滴後十滴亞鉛ノ至量餘ハ藥  
 主治 舞蹈病 癩癩 面痛ニ慎テ用フベシ

○第一千二百四十七方 蘇末草煎服  
 青酸銻亞鉛附 蒸餾水二勺 溶解

右分服四次一日盡之

○第一千二百四十八方羅仙私室爾歌爾醜祿私

其青酸銕亞鉛附半 纈草末 纈草越幾斯宜適

○右調勻為丸每粒二分衣桂末早晚服一九

○第一千二百四十九方福德篤

青酸銕亞鉛附半 麻屈涅失亞二 丁寧搗和加後藥

纈草油二滴加加密列舍纈草末 纈草末

○右調勻三分為一九衣麻屈涅失亞每服六九日三次漸加

增六對咬...

主治第一千二百四十七方ヨリ一千三百四十九方至舞

踏病宜...

○第一千二百五十方噎魯利阿篤損

格碌屈私末兒秩斯半刃至...

右分為十二服每二時乃至三時一服

主治舞蹈病宜シ○噎爾利阿篤損此方目二半至服

セシム但之ヲ服スルノ前先瀉藥ヲ與コ常ニ之ヲ用ヒ

テ平治スト雖六週ハ週乃至十二週ヲ經ルノ後ニアラ

ザレハ効ヲ見スト云コ蓋舞蹈病六週乃至七二週ヲ過

グルキハ醫治ヲ須タザルモ亦癒...

○第一千二百五十一方護秘篤

開達格碌屈私末兒秩斯芳香散各ニ 硫酸規尼...

艾根末

右調和為散分十二服日三服

主治一少女舞蹈病ヲ患フル七年此ヲ與ヘテ佳効ヲ

得タリ之ニ兼テ浴湯ニ硫酸ヲ加ヘテ浴セシムルニ宜

○第一千二百五十二方

橙葉 大黃 各一錢

續草

純精酒石 各三錢

右調和內私葛肘刺名器晨夕服半茶匙強

主治舞蹈病癩癩及ヒ他ノ神經病ニ宜シ

○第一千二百五十三方(弗栗秘)

少艾根末

右隔晚取一茶匙強温麥酒和服

主治九歳以下ノ舞蹈病ヲ患フル者此ヲ與ヘテ良効

ヲ奏セリ

○第一千二百五十四方(欲温僂)

遏屈答刺設謨沙根末

右每服一茶匙日三次

主治舞蹈病ヲ宜シ

○第一千二百五十五方(密葛栗思)

葛爾達密布刺典私花

碎朱薺 末一刃至一錢

白糖 一刃

右調勻為散分八服早晚一服

○第一千二百五十六方

葛爾達密布刺典私花前二出

滾湯適宜浸漬瀝過取

橙皮舍利別

○右調勻每一時服四食匙

主治右二方千二百五十五方舞蹈病及他ノ痙攣病

宜此方達列名始鎮痙方下稱譽也所云均

殊拔結耳名歇倚私的里里ノ痙攣症稱用セリ

少年十四歲ニシテ舞蹈病ニ罹ル者密葛栗私名之ヲ用

フ三時毎日錢六至六週ヲ出ズシテ治セリト

○葛爾達密布刺典私ハ特ニ發汗ノ効アリ尚且恐

ク殺蟲能アラン○今世之ヲ棄テ用ヒズ恐ラク

○右穩當ナラシ

○第一千二百五十七方

益藟菊草葉亞兒尼加花各錢滾湯適宜浸漬四分時

右調瀝取二加白糖三每日服一八十分一八十四分

主治虛性舞蹈病ニ宜シ

○第一千二百五十八方

第一千二百五十八方謨私篤齒草葉各半

遠西方彙 卷十一 舞蹈病 三十一 廣野堂

○藥梅那三錢至大橙葉續草 藟藟草葉各半

○右細判分三裏每日取少許泡出用

○主治舞蹈病宜之 ①三女子アリ一八湯十歳一八十四歳

一八六歳其性皆感覺敏捷二三月來舞蹈病ニ罹リ

猛烈鎮痙劑及強壯劑ヲ投シ效ナシ莫私篤氏

○名三命之餐食ヲ減少セシメハ相海吐根吐酒石ノ吐

方又與ハ上ノ泡劑ヲ用ヒテ微瀉セシメ以テ暫時ニ全

功ヲ收メト云フ云々 ②金母ニモ藥未用ハテ效ナシ

○第一千二百五十九方扼縵 小兒ニ發症候極ハ尚且茲

△阿魏五 番木鱉越幾斯一 六國行出方ニ云々此ヲ用

右調勻為丸每粒式分衣石松粉早晚服五丸乃至六丸

○主治舞蹈病頑滯セシ症及ヒ諸般ノ神經病其因脊髓ニ

在ル者ニ宜シ 望文則ニ宜シ

○第一千二百五十九方羣動通 眼ニ十餘日乃至三十餘日四水

阿魏續草 越幾斯各 莖莖越幾斯六 精亞鉛華一

○藥葛私篤 樓謨五 粟三 粟三 粟三

右調勻為丸每粒二分衣石松粉每服五丸日三次服ニ盡

○主治頑固舞蹈病宜シ 阿芙蓉酒 五新 顯リ 云

○第一千二百五十九方拔毒 痔疾 之用 之軟 咬ク 醫タ

此龍腦麝香 各四 五白糖半 煎過 須タ 之須 者



右調勻為散分四包每二時半服一包

○主治拔魯寺庚氏每常舞蹈病之ヲ用ヒテ偉効ヲ得タ

生但晚到於阿魏ト阿芙蓉ヲ配伍ノ灌腸セリト云

本調勻為散分四包每二時半服一包

○第一千六百六十三方 栗屈的兒

實蘇兒油錢一忽弗滿液三錢溶化幾沸根吐亞確華

○右玻璃壘收貯黑紙被覆每服二十滴乃至三十滴日四次

主治癩病殊ヲ舞蹈病癩癩及ヒ聖及屈ニ宜シ

○第一千六百六十三方 椰列池篤

酒石六菩提樹花浸液六溶解加後味至六

實亞格地温半一

右調和每六時服一食匙其外蘇來封殺類水紙

○主治同上散分四包每二時半服一包

○第一千六百六十四方 羅私的印秘列秘珍

蘇丁子油蘇肉豆蔻拔尔撒謨附錢各杜松子精加當心

草右調勻供擦藥蘇草蘇香亞蘇華幾濟等

○主治舞蹈病脊椎末治ヘテ之ヲ擦蘇下稍ハ肚腹ニ塗

素ルベシハ刺土ハ刺ニシハ刺ハ子其赤蘇并首並

聖及屈シカ不御ア羅中蘇藥ハ蘇ハ蘇ハ蘇ハ

此症モ亦舞蹈病相同方 其治期限醫治須多不獲ル者

間之アリ故多般の方法ヲ費ヤ習テ徒然患者ヲ勞シ害  
 招カレカレ唯緩性神經藥ヲ施スベシ治法先病原ヲ探  
 索シテ之ヲ防止シ既ニ之ヲ除クモ其症猶存苜退カサル  
 片生神經運營變革セシムルヲ治療ノ第二義則ス續  
 草阿魏小量吐根葡萄草麝香亞鉛華銹劑等約ノ之ヲ言ハ  
 バ癩癩。舞蹈病。列載セシ方法悉皆此症ニ相當シ聖  
 反屈ハ唯歇倚私的里ノ傍証タルヲ往々之アリ此症治法  
 歇倚私的里ト一般外用法ハ越列幾的爾及ヒ麻屈涅篤良  
 効アリ然レ先微温浴湯ヲ施シ其後浴水法殊ニ海水浴ヲ  
 行フ最稱贊ス

○第一千二百六十五方 〔秘密篤滿〕

亞鉛華 麝香 各二  
 銹粉 六  
 桂皮 半  
 續草 一

右調和為散分八服每一時半一服

主治 聖反屈ニ宜シ一少女聖反屈ニ罹リ日ニ四發乃至  
 六發セル者秘密篤滿氏此方ヲ與ヘテ治セリ

遠西方彙卷之十一 方法 凡患此症者 宜早治之 勿使延緩 惟緩性神經藥 乃施之 入之治法 先病原不探 索之 不之 乃防上之 既之 乃除之 其症猶在 肯退力 乃 凡患此症者 宜早治之 勿使延緩 惟緩性神經藥 乃施之 入之治法 先病原不探 索之 不之 乃防上之 既之 乃除之 其症猶在 肯退力 乃 凡患此症者 宜早治之 勿使延緩 惟緩性神經藥 乃施之 入之治法 先病原不探 索之 不之 乃防上之 既之 乃除之 其症猶在 肯退力 乃

○藥之卡無百六十五女(一) 密黨漸

遠西方彙卷之十一 聖及偏 三十五 廣 册 堂

獨乙 加 幾安頓 著 傑 婆 都 爾 譯 侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

口噤 千リスミス 羅 帶 陰 西 大 鴨 高 節 軒 鐵 加 齋

卒瘞 テタミス 羅 フト ス テイ 同 美 卷 入 醫 命 及 飲 可 驗

倭麻質斯性卒瘞 刺絡脊椎吸角法 水銀膏 蒸氣浴 刺心斯

高私整屈斯 微温浴 施 內服 阿芙蓉 纈草

遠西方彙 卷十二 廣 半 堂

廣 半 堂

二百六方 鹿琥精吐酒石 千二百六十八方 龍腦 千二百七十一方  
二百七方 或ハ麝香ト配用ス 千二百七十三方 或ハ甘草 百七十二方

方等ニ宜シ 〇創傷ニ因ル者ハ創口又破開シテ其内ニ在  
ル所ノ贅物ヲ除去シ 菲阿斯及ヒ阿芙蓉ノ琶布ヲ施シ 緩  
和鎮痛軟膏ヲ貼メ 繃帶シ 創所ノ上部ニ循レル神經ヲ截  
リ 或ハ創傷ヲ受タル一肢ヲ截断スル更至極メ一法トス

神經系ノ運営ヲ轉變鎮定スルハ刺絡 阿芙蓉 或ハ單味  
百七十 或ハ麝香ト配用ス 千二百七十三方 或ハ甘草 百七十二

方十五 吐酒石 格碌屈私末兒秩斯 千二百七十七方 福烏列爾 名砒石  
溶液 千二百七十七方 格爾失屈謨 千二百七十九方 芫菁丁幾 千二百八十八

方十一 的列並油 或ハ内服 等ヲ稱賛ス 就中阿芙蓉ヲ以テ最  
トス 蓋泉黥質 名ノ治法 千二百八十三方 大ニ稱賛セリ

此症經過ノ際能ク意ヲ注キテ適宜ニ瀉下スルヲ要ス 〇  
外用法 中下就テ灌水最益アリ 其法先病者熱湯水中  
坐セシメテ高所ヨリ不斷水ヲ瀉シ之ヲ頭上 肩胛 及ヒ脊

椎ニ灌ガヌ要下ニ瘻孿頻發スルニ於テハ浴湯モ亦可ト  
雖大抵上ニ療法ニ由テ危篤ヲ救フ者多シ 全身浴湯卓越

ノ効アリ 殊ニ刺篤亞斯 若クハ刺必斯 高私 蟄屈斯ヲ加フ  
ルヲ好トス 脊椎及ヒ牙關ニ揮發膏 或ハ菲阿斯油 阿芙蓉

蓉丁幾 龍腦等ヲ加ヘ 擦クニハ治療ニ良助メ 遍體  
温油ヲ塗ルモ亦稱用ス 但怠ラズ 刺戟藥ヲ灌腸 或ハ其症

温油ヲ塗ルモ亦稱用ス 但怠ラズ 刺戟藥ヲ灌腸 或ハ其症

温油ヲ塗ルモ亦稱用ス 但怠ラズ 刺戟藥ヲ灌腸 或ハ其症

温油ヲ塗ルモ亦稱用ス 但怠ラズ 刺戟藥ヲ灌腸 或ハ其症

要スル所ヲ從ヒ續草阿魏ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ夕其鎮  
 瘧灌腸ヲ施スニ宜シ英吉利及ヒ米里幹ノ醫ハ煙草灌腸  
 十<sup>二</sup>百<sup>八</sup>又甚賞譽セリ又阿芙蓉越幾斯溶液ヲ以テ脉管  
 ニ射注スルヲ試用セシ者アリ<sup>十<sup>六</sup>百<sup>六</sup>方</sup>高拂郎屈<sup>名</sup>ハ烙鏡  
 身用セテ効ヲ得タリ脊椎灸灸モ亦稱贊セリ嬰兒ノ口噤  
 及ヒ卒瘏ハ吐劑浴湯及ヒ灌腸ヲ以テ專一トス鎮瘧劑ハ  
 亞鉛華<sup>十<sup>七</sup>百<sup>九</sup>方</sup>麝香<sup>十<sup>二</sup>百<sup>九</sup>方</sup>艾根<sup>十<sup>三</sup>百<sup>九</sup>方</sup>等  
 ヲ最好トス阿芙蓉ノ如キ<sup>小兒</sup>其<sup>在</sup>テ全<sup>方</sup>禁忌スト雖  
 獨此危險症<sup>在</sup>テ心<sup>之</sup>ヲ許<sup>以</sup>用<sup>テ</sup>モ亦可ナラシ栗結  
 名<sup>人</sup>嘗<sup>テ</sup>交<sup>テ</sup>阿芙蓉ヲ以テ一<sup>兒</sup>ヲ治セリ即其症極度<sup>ナ</sup>シ<sup>ハ</sup>

阿芙蓉丁幾每服一滴半時毎ニ與ヘル後諸見証減ズルニ  
 從ヒ一時乃至一時半毎與ヘテ其症全ク退クニ至レリ  
 此ノ如ク<sup>之</sup>ヲ施<sup>テ</sup>阿芙蓉丁幾總量半錢ヲ盡セリト云  
 口其他慎嚴<sup>テ</sup>戒<sup>テ</sup>歌<sup>テ</sup>蘭<sup>テ</sup>度<sup>テ</sup>亦<sup>テ</sup>阿<sup>芙蓉</sup>液<sup>ハ</sup>滴<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>二時毎  
 ニ灌腸<sup>シ</sup>尚<sup>且</sup>心<sup>シ</sup>テ内服セシムルヲ佳トス但舍電阿  
 芙蓉液<sup>ハ</sup>如<sup>キ</sup>最<sup>緩</sup>劑<sup>ヲ</sup>撰<sup>用</sup>スベシ此症黃疸ヲ夾雜スル  
 者多シ故ニ注意<sup>シ</sup>大便<sup>ヲ</sup>從<sup>ズ</sup>要<sup>ス</sup>但<sup>ニ</sup>甘<sup>菜</sup>及<sup>ヒ</sup>黃<sup>麻</sup>儼  
 涅失<sup>ニ</sup>和<sup>用</sup>スルニ宜シ並ニ蒸氣浴モ亦試用スベシ賜  
 葛<sup>歌</sup>爾<sup>名</sup>人<sup>モ</sup>亦<sup>之</sup>ヲ用<sup>テ</sup>小<sup>兒</sup>ヲ救<sup>テ</sup>云<sup>ク</sup>其<sup>他</sup>諸  
 般<sup>ノ</sup>塗<sup>擦</sup>方<sup>千<sup>二</sup>百<sup>九</sup>十<sup>四</sup>方</sup>至<sup>テ</sup>施<sup>ス</sup>ベシ  
 遠西方彙 卷十二 口噤 卒瘏 三 廣 月 堂

口嗜卒瘕 廣月堂

○第一千二百六十六方施倚迷謂爾

續草丁藥 葛私篤倭謨丁藥 鹿琥液各一錢 阿芙蓉

泡劑和服 右調和每一時乃至一小時

○第一千二百六十七方內服湯

續草野生者 熱湯滴宜浸漬瀝取四加後味

○第一千二百六十八方內服湯

鹿琥精錢二 橙花舍利別半 右調勻每一時服一食匙強

○第一千二百六十九方內服湯

吐酒石二 續草浸四寸溶化加後味

○第一千二百七十方內服湯

橙皮舍利別半 右調勻每一時服一食匙

○第一千二百七十一方內服湯

吐酒石六 蒸餾水四溶解

○第一千二百七十二方內服湯

英吉利 衆醫殊 吐酒石 奇効ヲ得夕リ弗フ娘

○第一千二百七十三方內服湯

英吉利 衆醫殊 吐酒石 奇効ヲ得夕リ弗フ娘

○第一千二百七十四方內服湯

英吉利 衆醫殊 吐酒石 奇効ヲ得夕リ弗フ娘

○第一千二百七十五方內服湯

英吉利 衆醫殊 吐酒石 奇効ヲ得夕リ弗フ娘

英吉利 衆醫殊 吐酒石 奇効ヲ得夕リ弗フ娘

○藥 龍腦十五分至十分 亞刺昆亞 麩漿半分 研和加後味

○下 橙花水 橙花舍利別各一分 鹿琥夜 阿芙蓉

右調勻每一時服茶匙 二分 面五分 舌後 醫之 凡嗽

○第一千二百七十一方百六十分 龍腦一分 精製阿芙蓉一分 至一分 白糖半

龍腦半分 至一分 精製阿芙蓉一分 至一分 白糖半

右合勻為散分八裏隨其症每一時乃至二時服一裏

○主治 右二方八龍腦適當ノ諸病或ハ癩麻質斯性卒瘕二

効ハ功ハ神ハ速ハ也一

○第一千二百七十二方

精製阿芙蓉一分 白糖半 凡嗽 蘇和

右調勻為散分茶服每半時或一時一服

○主治 卒瘕禁軍心 ○律私篤名言二據レハ始阿芙蓉二

凡ハ與ハ半時每三四分ハ增シテ瘕攣鎮定シ或ハ昏

冒ヲ發スルニ至ル但其切ヲ取ルハ大抵十分十五分餘

○三天足シ此昏冒ヲ發ス者ハ通例猛烈ノ哥喜酒並

的鬼劑ヲ以テ鎮靖シ復更阿芙蓉ヲ與ハ每服六分餘

○至此ハ用ハ此ニ單方阿芙蓉ヲ幾ハ最適當ハ

○凶律私篤氏二十滴ヨリ始メ文半時每以五滴乃至出滴

ヲ加増シ昏冒証見ルハニ至ル○阿芙蓉二三服ヲ

○天効ヲ奏セザルハ之ヲ灌腸シ或ハ護爾比濕ノ賢姪

兒麻質斯法又施スベシ其法倚過忽弗滿名久說ニ從入  
 バ表皮又剥クニ熱湯ヲ用ヒ或ハ熱湯ニ醃シタリ刀又  
 用ヒ以テ時又延ク日ナカラシム此五如夕之又剥脫ハ  
 後脊椎兩側ニ謨爾比捏又敷ク所ハ○屈錄都涅兒名ハ  
 純粹神經性ノ卒瘏ニ殊ニ阿芙蓉又賞贊セシ遠突土名ハ  
 ハ老人ノ卒瘏足指ノ寒壞疽ヨリ發ス此者ニ稱用也生  
 ○第一千二百七十三方 **【警弗蘭屈】**  
 麝香三 阿芙蓉四 白糖四 麝香三 麝香三 麝香三 麝香三  
 右調勻為散分八服每半時二服言ニ麝香一ハ故阿芙蓉二  
 主治口噤並ニ卒瘏ニ宜シ也一劫一服

○第一千二百七十四方 **【福極篤】**  
 精製阿芙蓉四 麝香半 麝香半 麝香半 麝香半  
 右調勻為散分六服每一時乃至二時取一裹温茶送下  
 主治卒瘏并宜シ也  
 ○第一千二百七十五方  
 甘草三 精製阿芙蓉半 白糖半  
 右調和為散分八服每半時若一時一服  
 主治同上甘草ノ服量ハ之ヲ用ヒテ速表流涎因發スル  
 又度トハ弗館耳的爾名ハ之身以テ此癩ノ主藥也



牙關及口頸圍以水銀膏ヲ塗ラシテ兼テ全體浴湯ヲ施  
ス○又按之ハニ汞劑ハ嫩衝性卒瘞ニ殊ニ撰用スベシ

○第貳千七百七十六方顯爾列斯此如之ヲ列脫

青酸滴再餾燒酒桂水各滴至白蘇兒

右內玻璃壘黑紙固封貯每服五滴乃至八滴餘日三次

主治菓篤刺他的列非散篤同屈錄都涅兒同結列印同

等卒瘞青酸ヲ稱用ス症阿芙蓉効ヲ得此來整平的

列非散篤氏青酸二滴ヨリ十二滴ヲ與ヘテ本病殆平治

シ後復意外他病ヲ發之竟斃雖每服諸証較著

○二緩解シ大ニ佳効ヲ得下云結列印氏亦阿芙

○藥ノ効ナキ者ニ青酸ヲ用テ其死ヲ救フヲ得ザレ

氏此ニ由方愚苦和解也叶云救人雖不能勿為其

害水ハ疾醫百其他主方ハ青酸ヲ施ス以未諸病

ニ皆稱用ス水中青酸十滴ヲ含蓄ハ大中等ノ

服量六滴乃至八滴少年十三歳ヨリ十四歳至四滴乃至

六滴兒童三歳ヨリ七歳至二滴乃至三滴トス大人服量

多者モ十滴乃至十二滴トス水カラズ人ヲ治スル

○第一千二百七十七方禮利爾篤此如半至一割ト至

靈格碌屈私未兒扶斯的里亞ハニ製スハニ

右調勻稀淡羹汁五盞送下量其格與半也此動與習

遠西方書 卷三 紫 卒瘞 廣 丹

主治卒瘏直視宜之此服量甚奇異十リトス唯英醫ノ

處也ハ方獨英人ノ胃之受クルニ堪ルノ之然

氏壹利阿篤損ハ名格碌屈私沫兒秩斯半ヲ至一時乃至

一時半每千與ハテ千人治也ハ云又

○第千二百七十八方顯密耳爾爾至三歲ハ名大ニ服量

兼福烏列爾砒石溶液錢十三歲ハ名至四歲ハ名至

右每半時取十滴阿芙蓉膏幾十滴及火酒一食匙和服

主治此方浴湯下併用此方卒瘏及傷筋因此者四人治

七方ハ名福烏列爾砒石溶六三方ハ名又參照スベシ其

○第一千二百七十九方越傑和密篤或結ハ名或結ハ名

○格爾失屈謨子丁藥手一泉ハ名泉ハ名

右每四分時服三十滴乃至四十滴膏ハ名又ハ名

主治卒瘏至宜之先半錢至ヲ與ハ名後加增ハ名嘔吐若ハ名

瀉下ハ名發ハ名至ハ名至ハ名秘密篤氏先瀉利灌腸法ヲ以ハ名腸

ヲ掃除ハ名尋ハ名脊椎ニ治ハ名放血ハ名醇厚確砂溶液ヲ棉

布ニ醺ハ名項窩及ハ名脊椎ニ敷キ其後民ハ名列里精ハ名護爾

比ハ名和ハ名與ハ名此療法ハ名由ハ名四人ハ名中ハ名三人ハ名治ハ名也

○第一千二百八十方一茶ハ名茶ハ名服ハ名

或莞菁丁藥錢二壹爾ハ名會ハ名保ハ名

右每一時八滴乃至十滴沙列布煎若苦扁桃乳點服

○第一千二百八十三方 煎水服之 煎水服之 煎水服之

煎水服之 煎水服之 煎水服之 煎水服之

○右調勻每一時半服一茶匙乃至二茶匙

主治卒瘕之宜之殊之創傷之因心症

者之用之卒瘕他藥之効之者莞菁之幾

用之半錢至一錢以之治之

佛祿温之葛爾實温兒

三十滴乃至二十滴之用之

阿芙蓉之効莞菁之優之

○第一千二百八十二方 泉點質之治破傷風方

精製剝篤亞斯 錢至

罌粟殼舍利別 錢六

右調勻每時服一食匙

主治原卒瘕及傷之因心症

之豆用之効之

斯之量之半倍之或八半時

阿芙蓉一匕半日

或公其症之準之右二品

之隨之服量之減殺之

兼之刺必斯高私蟄屈斯

二三子ヲ如量テ浴湯ヲ命ス然レバ日ニ洗テ次々ニ洗テ若  
 浴湯ヲ能セザル者ハ刺必ス高私蟄屈ス半錢ニ溶液ヲ  
 弗刺涅兒ニ醜ノ肚腹及ヒ他部ヲ洗ヒ且之ヲ以テ摩挲  
 及ルヲ要ス然レバ浴湯ニ効且優止リホス阿芙蓉ヲ用ヒ  
 テ便秘スル者ハ石鹼灌腸法ニ宜シ若頑固ノ秘結ハ刺  
 篤亞斯一錢乃至二錢ヲ加フ最メ阿芙蓉一錢ニ加フ  
 ○第一千二百八十三方泉點覽且刺篤亞斯液ハ刺テ  
 女精製刺篤亞斯錢三食加密列水及桂水各三ヲ溶解加後  
 阿膠味味黃耆味陳皮味便レリ○發痘膏ハ効テルヲナシ  
 ○白罌粟舍利別引 黃耆引 四引 山引 味引 和

右調和每四分時乃至半時服汁食匙ハ又内服藥中匙ハ  
 主治卒瘞ニ宜シ此ハ更換ハ四分時或ハ半時毎ニ阿芙  
 蓉下幾五滴乃至十滴ヲ用フ但其症ニ準シ阿芙蓉ノ量  
 ヲ倍加シ刺篤亞斯浴及ヒ石鹼灌腸法ハ並ニ併用スベ  
 ○藥洲ハ二百八十五方  
 ○第一千二百八十四方ハ煎取ハ後味ハ甘  
 煙草葉引切引至引滾湯適宜浸漬濾取ハ多引加後味ハ甘  
 亞麻油引半引分引開引入引卒瘞藥ハ中引○又刺篤亞斯ハ刺  
 右供灌腸ハ藥水ハ最引難引用ハス引○西引時引數引ニ引水  
 主治卒瘞ニ宜シ○煙草ハ卒瘞ヲ治スルノ一品夕引瘞

摩訶劇勢ニ從テ屢之ヲ灌腸スベシ但之ヲ施ス代ハ  
 阿芙蓉友ヒ灌水法ヲ停テ用フベカラズ○西印度ニ於  
 テハ煙草ハ俗間ノ卒瘞藥タリ○又灌腸ト俱ニ煙草葉  
 ヲ煮熟ク毳布ニ作劔步下頷頸圍及胸上ニ貼テ減ハ煙  
 ○草葉煎乾葉四升半時ヲ加ヘテ浴スルモ亦可ナリ  
 ○第一千二百八十五方ヲ加マ

第的列並油至三辨阿列機油亞刺毘亞薩各半  
 者調勻供灌腸至十餘用之其效華三阿芙蓉八量  
 主治同註○其益飲之更灌腸凡初相ニ生飲其卒瘞  
 諸藥不効ハ症ヲ治セ也○德暮秘名及ヒ朽篤巾損同

〇第一千二百八十六方百耳失老連德  
 阿芙蓉越幾斯蒸餾水六ヲ溶化  
 右調勻津入尿管等方惟

主治上卷二氏之ヲ卒瘞ニ施之効ヲ得也此法治ト不  
 治トハ比例五ト八ト其居トト云ハ其卒効歸不心者五  
 治不居ル相半蓋卒瘞ハ原危篤症十割而ハ五トハ  
 謂フ益ハ又二氏曼陀羅華越幾斯二十四以水藥ヲ

〇溶化セル者或ハ曼陀羅華濃煎ヲ射注シ偉効ヲ得也

リ不云フ○吾輩ノ如キハ甚此試驗ヲ信ゼ不實ニ輕忽

命ヲ詭弄スル者ト謂ル者ハ格印埵徳名

嘗テ一法ヲ試用シ大害ヲ致スルハ吾輩唯此ヲ想フ

テ之ヲ懼ルニシテ其法ヲ婦人歇倚私的里性卒瘏ニ罹

ル阿芙蓉一カヲ以テ水一盞ニ溶シ五密担篤毎六十錢

半取リテ大血管ニ射注スルヲ五回ニ至ル之ヲ行フ

テ二三時間後右其婦即斃ル云云

第一千二百八十七方飛歇斷度

亞鉛華ハ麝香東方產舍電阿芙蓉液六白糖二

右調勻為散等分半服每半時一服半日內服為宜

第一千二百八十八方同上

鹿琥精四苗香冰二大黃舍利別各一蜥蜴石一末

○右調勻每半時服一茶匙西產麝香東方產雜腹蘭三

○第千二百八十九方惡揭爾滿

顯草白葡萄酒阿芙蓉一麝香五加砂二

主綿答幾里私布水錢二耳心外顯滿地奈爾此藥

右調勻每半時服五滴乃至六滴時二皆救スヲ得ク

主治右三方嬰兒口噤及凡卒瘏ニ宜シ

第一千二百九十方秘

香密藥未糖二

○第大黃水製丁幾漢氏麝香密幾私丟爾製法未詳續

主草浸半嬰滿那舍利別錢二宜之格印德

右調勻每半時服五茶匙至飯後

主治嬰兒口噤及卒瘏二宜之叔腫滿名此方ヲ用ヒ兼

テ加密列浸二阿魏六以同如茶ヲ灌腸者居多卒瘏ヲ

○緩解之或百全治七以十云又五四至之ヲ行ヲ

○第一千二百九十一方叔泥埴爾名龍涎香加麝香丁幾

龍涎香錢其硫酸亞的兒香浸漬六時屢攪和後味

麝香者東方產錢三忽弗滿液錢黃會隔限液融地

右調勻二飯等分八長再時服

○主治癇癎及ヒ他五神經病二宜之嬰兒口噤及ヒ卒瘏二

小斗密扭篤每三二滴ヲ與ヲ

○第一千二百九十二方叔泥埴爾十二百以十四六至嬰兒

大龍涎香加麝香計幾前方二刀半橙花水半實亞格地温

半同美蓉丁幾

○右調勻每四十分時服之食匙

主治二兒口噤及日卒瘏二罹此者アリ叔泥埴爾氏此密

幾私丟爾ヲ連進ス半ヲ二十四時皆救又ヲ得少

小斗密扭篤每三二滴ヲ與ヲ

○第一千二百九十三方備魯滿

遠五方景

○葉艾根以末 麻屈涅失亞以 乳糖以四

右調勻為散分八服每半時或一時一服

主治 嬰兒口噤及上卒瘏之宜シ 備魯滿氏上方二接骨

木花ノ浴湯夕兼用又二人ノ治セリ

○第一千二百九十四方 貧堪和 阿芙蓉丁幾一 錢刀至

兼阿斯油 龍腦油各半 阿芙蓉丁幾一 錢刀至

右調和每六時塗擦下顎脊椎及肚腹

○主治 一千二百八十七方ヨリ 一千二百九十四方至嬰兒

口噤及上卒瘏之宜シ

○第一千二百九十五方 遠突層爾 嬰兒口噤及上卒瘏之

其兼阿斯油精 十舍電阿芙蓉液 日礪砂加石灰精各半

薄龍腦精 妙海龍量太多 半瓶服之以 峻妙哥曠但再服

右調勻微温塗擦脊頸及牙關日五次並藥之 齒藥以味

○第一千二百九十六方 職歌蘭度 藥之 齒藥以味

能對羌菁軟膏引 此藥之 齒藥以味

平右擦胸及脊中 平之 齒藥以味

主治 右方嬰兒卒瘏之宜シ 但第一千二百九十六方ヲ

施スレ 氏ハ 最謹慎ヲ加スベシ 平山林ノ 藥之 齒藥以味

落法尼亞ベラ 羅キ 蘭ノ 一千二百九十七方至一千八百

此症往昔獨ニ 及上歐羅巴ノ 北方ニ 於テ 屢流行セリ 且ト 雖



今世之凡日罕ナリ唯濕濡八年蒸餅ニ多ク麥奴ヲ混スル  
 時往々之ヲルハ佛落屈名人一千八百二十八年。一千八百  
 三十一年及ヒ一利八百三十三年山村ニ於テ屢此症ヲ見  
 夕リ但其詳録ヲ缺ク並ニ娼姪名溼爾名モ亦一千八百三十  
 年。一千八百三十一年及ヒ一千八百三十八年叔利便名地ノ  
 近傍ニ於テ多ク此症ヲ療セリト云フ○治法諸藥ヲ後ニ  
 ①天先吐劑ヲ與フベシ佛落屈娼姪溼爾兩氏ノ説ニ據ル  
 二患者ノ胃知覺甚鈍ナルガ故ニ吐藥並ニ總テ諸藥ノ刺  
 戟ヲ感シ難シ故ニ服量太多ナラザレバ効ヲ得難シト云  
 乙其症ニ應ル五日十日若クハ十五日毎々吐藥ヲ用テ可  
 ナリ但吐酒石ヲ用フルヲ通例トシ吐后直ニ下劑ヲ與フ  
 ルヲ佳トス殊ニ瀉利鹽一弓半頓服スルヲ妙トス但再服  
 セザレバ効ヲ得難シ或ハ往々蟲症ヲ夾雜ス無殊此症  
 大量甘汞ヲ投テ驅逐スル氏本症確著ニ退ク非常ニ  
 佳効ヲ奏スルヲ以テ攝綿施那モ亦此ニ好トス爾後大量  
 龍腦醋及ヒ接骨木子舍利別ヲ與フ但龍腦六錢以テ醋  
 一升ニ溶化スルニ通例一患者ニ龍腦醋四升ヲ算定シテ  
 漸次之ヲ服セシテ續草阿魏實百兒油葛私篤倭謨亦同  
 夕良効ヲ示ス腸胃大衰弱及ヒ溶崩証ヲ見ル者ハ姜  
 密私去爾私菖蒲根續草阿魏實宜ニ刺絡ニ必忌ル也但

遠西方彙 卷十一 落法尼亞 十四 廣勝堂

蟻鍼八頭腦畜血並患部ノ癢痛ヲ減之全身浴湯發疱膏  
 及ヒ芥子泥ハ良驗ナル到別ノ火酒酒精等分配伍  
 軟膏ト為之又的列並油ヲ煖之ヲ指頭及ヒ他部ニ擦之可  
 ○佛落屈名歷驗ス此症先腸胃ヲ掃除之後之ニ神經  
 強壯藥及ヒ鎮痙藥ヲ併用シ之次ニ効滿湖就中刺絡ヲ要  
 此者唯二人ヲ見之姑息法ト云テ兩手ヲ温水ニ浴量  
 且温油ヲ阿芙蓉下發ヲ加ヘテ塗擦之ヲ劇痛ヲ減之  
 云々○娼名強名濕名爾名ノ經驗ヲ據テ落法尼亞無熱症ハ先  
 吐下劑ヲ處方後阿芙蓉ヲ用キ既治スルハ足ト然ハ煖  
 衝熱ヲ兼併セル者ハ刺絡及ヒ局部瀉血直宜也若此症牙

關緊急全身麻痺或不腸胃麻痺性衰弱ヲ夾ム片ハ死ヲ免

此者殆稀ナリ云々無熱症ハ先  
 ○第貳千二百九十七方娼強濕爾

吐酒石末半 白糖錢半

右調勻為散等分四服每十日密扼薦一服以淫得吐根等ノ

○主治一女子十二歳無熱落法尼亞ニ罹リ顔面及ヒ遍身

此症ヲ發シ且左手痙攣ヲ患フル者アリ其初起此散ヲ

與之而吐ヲ得ルハ四回瀉ヲ亦數行キ則チ左手ノ痙攣

著ク減退セリ四服後各藥擦之入造硫黃泉ニ浴

○第貳千二百九十八方同題

○精製阿芙蓉ハニ霸王鹽ハニ白糖各二全身浴湯發痘膏

右調勻為散等分四服朝夕一服酒後服等分伍

主治前方ヲ試用セル女子痙攣再發ノ時之ヲ用ヒテ佳

効ヲ得タリ且ト中藥學ニ其味強ク其性

○第一千二百九十九方同註新式亞細亞動脈面刺給盛

○精製消石錢五瀉利鹽五井水六溶解加後味

且温舍電阿芙蓉液半枸橼汁舍利別半劇痛ヲ減

○滑調勻每二時服半食匙同註落法尼亞無熱症ハ先

主治女子歳十五無熱落法尼亞ヲ患フ先吐藥ヲ施シ

後此方ヲ處方平治不痙攣地東瀛ハ交互ニ用ヒテ

恐水病ヒドロホビア羅蘭最不石十他同不十以八次藥不

此症單發傍發更論セズ他ハ神經病殊ニ歇倚私的里小併

發ハ者ニシテ皆阿芙蓉老利兒結爾斯水至八百八十五

方ハ歇蘭度莖若老利兒結爾斯水至八百八十五

芥子泥發痘膏鎮痙罨法五百十一方五等施三阿魏等ハ

鎮痙灌腸法ヲ行ハテ宜シハ神經熱ハ由テ發スル者ハ腸

胃ヲ疎滌シ且龍腦麝香等ハ如ハ神經藥及此鎮痙藥ハ與

フベシハ○又疥癬内陷ハ因ル者ハリ非爾都名嘗テ此一

症ヲ療スルニ刷子ヲ以テ脊椎ヲ摩擦ハ太造硫黃泉ニ浴

セシハ脊椎ニ芫菁膏ヲ貼シ内服ハ甘秉ハ硫酸ハ的列藥

遠西方書 卷二 落法尼亞 十一 廣丹堂

尾捏ニ配用シ其毒ヲ出テズ以治スルヲ得ル也○狂獸咬  
 傷ノ致ス所ニ因ル者ハトシテ其毒ヲ治スルニ最良ノ療法ト見  
 其未發ヲ預防シ其發病ヲ治スルニ最良ノ療法ト見  
 預防法外用法ヲ施テ咬傷所ヲ療スルニ其効内藥ニ優ル  
 近確實ナルヲ以テ十分傷中ヲ截開スルニ最良ノ實人法  
 ナリ若其咬傷獨ニ指ニ在ル者ハ其指ヲ截斷スベシ然レ  
 截開截斷ノ法皆施スルヲ得ルカヲザル者ハ灰汁鹽海鹽  
 水尿醋或ハ消酸銀稀溶液ヲ以テ小心法傷口ヲ洗淨シ尋  
 テ烙鉄ヲ施シ更ニ之ヲ破潰スルヲ切要トス但艾發ハ不  
 可ナリ火藥ヲ用フルハ最不可ナリ何トナレハ火藥ハ速

ニ失血ヲ止メ且傷處ノ底面痂ヲ結ビ之ガ為ニ効力深ク  
 達スルヲ得ザレハナリ若傷口烙法ヲ施スニ適當ナラザ  
 レバ刺必斯高私蟄屈斯或ハ腐蝕安質沒尼ヲ以テ侵蝕ス  
 ベシ消酸銀ハ腐蝕劑ニ用テカラス結痂遺臭ヲ速ニ之  
 ヲ除キ難クレバナリ咬傷深クシテ小ナル者ハ之ヲ截開  
 シ微温水ヲ用ヒテ洗ヒ若クハ乾角法ヲ施シ久ク出血セ  
 シムルヲ要ス若咬傷ノ部位截開ニ宜シカラザル片ハ亂  
 刺法ヲ好トス傷口ヲ膿潰セシムルヲ極メテ久シキヲ最  
 要トス宜ク莞菁軟膏赤降汞軟膏或ハ時々發疱硬膏ヲ貼  
 シ又升汞水或ハ莞菁丁幾二三滴宛點滴スベシ兼テ傷口

一周圍ニ水銀膏ヲ擦メ以テ吐涎ヲ發スルニ至ルベシ傷  
 口ノ醜膿ヲ持久スルヲ二月ニ滿メザルニ力ヲ不尋テ  
 之ヲ潰瘍ト爲シ累年或ハ生涯癒スナク力ヲ以テ預防内  
 服藥中最首品トスル者ハ即莨菪千三百方至 龍腦千三百方至 青酸鹽千三百方至  
千三百方至 地膽千三百方至 甘汞千三百方至 龍腦千三百方至 青酸鹽千三百方至  
 酸阿芙蓉傑尼私陀千三百方至 等是ナリ過那噶栗私亞兒千三百方至 秩尖  
 斯植物名未詳 毛亦此類ニ屬ス傘弗名入 殊ニ之ヲ贊美シ未嘗テ  
 之ヲ用ヒズハアラスト云フ每服二十以乃至三十以或ハ  
 浸劑ニ作り日二三錢乃至四錢ヲ與ス或ハ之ヲ散トナシ  
 テ傷口ニ撒敷セリ爾過福傑兒名入 一患者既ニ發病ス第

一期ニ及ビテ過噶那栗私名入 ヲ用ヒテ治セ財ト云ク○輓近  
 魯西亞名入 於テ過利私麻附 ヲ稱贊セリ其根末ヲ牛酪ヲ塗  
 月夕熱乾肉名入 撒布以喫セシ或以或ハ半錢乃至一錢葡萄酒  
 煎以テ送下或ハ蜂蜜名入 加入テ塊トナシ用テ果々此藥  
 劑ニ効績ヲ奏セル者聞之テ海銀雖亦無益ニ屬スル者少  
 シ膏者ズ○又硝砂精ヲ稱用テ凡醫多シ殊ニ虜名入 裸幾私名入  
 之ヲ佳也又硝砂精十滴接骨末花泡劑ハ小盞ニ點服セシ  
 五七日日益ニ次ニ三回ニ至テ留設水名入 六回名入 七回名入 七回名入  
 毛亦同名入 的効ヲ以テ茶爾質名入 涅篤名入 既ニ恐水症名入 發セ  
 此者毛亦硝砂精ヲ以テ防止也且又弗名入 肝爾田蒲蘭度名入

鹿角鹽<sub>平</sub>肉<sub>切</sub>用<sub>匕</sub>其既<sub>干</sub>發見<sub>七</sub>九恐水病<sub>人</sub>治<sub>七</sub>  
 申<sub>結</sub>以<sub>燐</sub>以<sub>恐</sub>水<sub>五</sub>又<sub>防</sub>止<sub>七</sub>用法<sub>燐</sub>等<sub>力</sub>  
 亞的兒<sub>一</sub>錢<sub>半</sub>薄荷水<sub>四</sub>勺。沙糖<sub>舍</sub>利<sub>別</sub>本<sub>子</sub>半<sub>ヲ</sub>合<sub>和</sub>以<sub>一</sub>  
 食<sub>匙</sub>與<sub>八</sub>日<sub>許</sub>三<sub>次</sub>但<sub>弗</sub>鑿<sub>典</sub>利<sub>篤</sub>名<sub>人</sub>小<sub>憐</sub>半<sub>以</sub>至<sub>ヲ</sub>以<sub>一</sub>  
 了<sub>莨</sub>苦<sub>一</sub>以<sub>二</sub>和<sub>用</sub>此<sub>用</sub>法<sub>効</sub>ヲ<sub>得</sub>ザ<sub>リ</sub>云<sub>一</sub>口<sub>一</sub>千<sub>七</sub>  
 百年<sub>以</sub>於<sub>于</sub>目<sub>澄</sub>答<sub>名</sub>ヲ<sub>試</sub>驗<sub>世</sub>行<sub>七</sub>其<sub>法</sub>麥<sub>酒</sub>  
 醋<sub>三</sub>北<sub>酪</sub>半<sub>北</sub>混<sub>和</sub>温<sub>以</sub>ヲ<sub>以</sub>傷<sub>處</sub>ヲ<sub>洗</sub>七<sub>且</sub>之<sub>ヲ</sub>重<sub>一</sub>  
 布<sub>一</sub>醜<sub>以</sub>罨<sub>覆</sub>以<sub>內</sub>服<sub>也</sub>ハ<sub>麥</sub>酒<sub>醋</sub>三<sub>兩</sub>酪<sub>少</sub>抄<sub>ヲ</sub>和<sub>之</sub>與<sub>一</sub>  
 了<sub>之</sub>豆<sub>持</sub>重<sub>ス</sub>出<sub>同</sub>短<sub>味</sub>者<sub>七</sub>十五日<sub>ニ</sub>充<sub>以</sub>ザ<sub>ル</sub>十<sub>力</sub>ヲ<sub>金</sub>  
 目<sub>澄</sub>答<sub>出</sub>此<sub>法</sub>ニ<sub>由</sub>于<sub>百</sub>人<sub>ヲ</sub>恐<sub>水</sub>症<sub>ヲ</sub>預<sub>防</sub>セ<sub>リ</sub>ト<sub>云</sub>フ

然<sub>レ</sub>復<sub>効</sub>ヲ<sub>奏</sub>セ<sub>ザ</sub>ル<sub>ガ</sub>故<sub>ニ</sub>竟<sub>ニ</sub>棄<sub>テ</sub>用<sub>ヒ</sub>ザ<sub>ル</sub>ニ<sub>至</sub>ル<sub>也</sub>  
 魯西亞ノ諸部ニ於<sub>テ</sub>ハ<sub>狂</sub>獸<sub>ヲ</sub>温<sub>血</sub>ヲ<sub>飲</sub>服<sub>ス</sub>俗<sub>間</sub>此<sub>ヲ</sub>  
 以<sub>テ</sub>恐<sub>水</sub>預<sub>防</sub>法<sub>ト</sub>シ<sub>テ</sub>贊<sub>美</sub>セ<sub>リ</sub>栗<sub>篤</sub>咩<sub>私</sub>的<sub>爾</sub>名<sub>此</sub>法<sub>ヲ</sub>  
 發明<sub>ス</sub>于<sub>三</sub>才<sub>人</sub>ニ<sub>試</sub>驗<sub>シ</sub>以<sub>テ</sub>其<sub>効</sub>ヲ<sub>確</sub>徵<sub>セ</sub>リ<sub>ト</sub>云<sub>フ</sub>  
 又<sub>他</sub>獸<sub>ノ</sub>温<sub>血</sub>ヲ<sub>服</sub>ス<sub>ル</sub>モ<sub>亦</sub>可<sub>ナ</sub>リ<sub>但</sub>其<sub>温</sub>ニ<sub>乘</sub>シ<sub>凝</sub>聚<sub>セ</sub>  
 ザ<sub>ル</sub>者<sub>ヲ</sub>佳<sub>ト</sub>ス<sub>ニ</sub>諸<sub>浴</sub>水<sub>法</sub>殊<sub>ニ</sub>瀉<sub>氷</sub>浴<sub>ニ</sub>恐<sub>水</sub>病<sub>ヲ</sub>預<sub>防</sub>  
 シ<sub>或</sub>ハ<sub>之</sub>ヲ<sub>治</sub>ス<sub>ル</sub>ニ<sub>宜</sub>シ<sub>ニ</sub>其他<sub>數</sub>品<sub>合</sub>和<sub>シ</sub>秘<sub>方</sub>ト<sub>稱</sub>ス<sub>ル</sub>  
 者<sub>夥</sub>多<sub>ナ</sub>リ<sub>世</sub>醫<sub>陋</sub>說<sub>ヲ</sub>持<sub>ス</sub>ル<sub>者</sub>或<sub>ハ</sub>大<sub>ニ</sub>之<sub>ヲ</sub>夸<sub>稱</sub>ス<sub>ル</sub>  
 下<sub>雖</sub>學<sub>者</sub>之<sub>ヲ</sub>精<sub>查</sub>シ<sub>テ</sub>皆<sub>其</sub>名<sub>稱</sub>ヲ<sub>失</sub>セ<sub>リ</sub>醫<sub>家</sub>又<sub>宜</sub>習<sub>フ</sub>  
 發<sub>証</sub>治<sub>法</sub>預<sub>防</sub>兵<sub>稱</sub>贊<sub>ス</sub>也<sub>所</sub>因<sub>方</sub>法<sub>亦</sub>皆<sub>發</sub>病<sub>ヲ</sub>治<sub>ス</sub>ル<sub>ニ</sub>

用之故曰此條唯瀉血卒倒スル至ル及ヒ蒸氣浴ヲ

說也早孤羅珍名地ノ學醫刺栗屈名人及ヒ私格魯名地ノ官醫

法別魯名ノ歷驗セシ新法ヲ述ズル之ニ○疇昔刺洛ヲ

持重ノ恐水症ノ既ニ發出セルヲ治セ者少シトセトキ輓

近ニ至テ外印度ニ於テニ患者瀉血ヲ持重ニ後阿芙蓉及

上汞劑ヲ服シ平瘡セル者名アリ其之ヲ試驗セ醫ハ質

門人及ヒ私箇兒佛羅突名ノニ氏ニ歐羅巴ニ於テ其

治法ヲ模倣スル者多シ贊名福傑爾名私蘭名偃名田名同遠

爾名兒滿名同皆刺絡ヲ施シ示患者全ク意識ヲ失スルニ至

後阿芙蓉甘汞大量硃砂精ヲ用ス或ハ之ニ水銀塗擦法

ヲ併用シ此危症ヲ救治セ但ハ他醫ニ同法ヲ施メ寸驗ヲ

得ズ那名私名層名放血卒倒ニ至ラザレバ効ヲ奏セザル所以

二原キテ又シク頸動脈ヲ抑壓スルニ法ヲ試驗セリ此

法同上ノ効アリテ而シテ危險更ニ甚ク韃魯里名嘗テ謔語

劇痛及ヒ劇瘧ヲ治スルニ頸動脈ヲ壓定シ眠ラシメ或ハ

卒倒ノ前徵ヲ發セルニ發明セリ今那私名層名氏之ニ倣

フナリ○佩名私名損名嘗テ自ラ恐水病ヲ患ヒテ蒸氣浴ノ治

驗ヲ發明セリ初ニ此ハ薄命ニ於テ此病ニ罹ルヲ悲シ自ラ

窒息シテ死セルヲ謀リ竟ニ身ヲ蒸氣中ニ投ス其溫度

列氏驗温器二十四度ニ升ルニ及テ疾患依然十解散セリ

遠西方彙 卷之十一 恐水 廣

是於野犬ニ喜ヒ且驚キ猶之ヲ持重ニテ終ニ其症平治  
 復發セズ爾來佩私損氏魯西亞ノ蒸氣浴ヲ他人ニ施シ  
 テ夜汗ヲ催進ス此ニ由テ狂犬咬傷症ヲ治スル者八十餘  
 人中ニ就テ四人ハ既ニ狂ヲ發セテ者ナリ唯一兒七歳ノ  
 者蒸氣浴中ニ斃ル佩私損氏ノ之ヲ施スヤ夜間ハ毛布ヲ  
 以テ病者ヲ纏覆シテ羽蓐ニ卧サシ且薩爾沙根煎ヲ多  
 服シ以テ蒸發氣ヲ催進ス○刺栗屈氏ノ療法ハ專健實安  
 那孤律失亞答十三百方ヲ用テ○法別魯氏ハ瀉血吐劑及ヒ  
 冷水浴ヲ施シ又地膽及ヒ甘汞十三百方ノ効アリヲ説述ス  
 ○第一千三百方密托苦 密托苦治法 同法ニテ

莨菪葉

小四以至

白糖

半

右調勻為散頓服

主治

乙瞥魯印句壇德

名密托苦

名恐水病ヲ預防シ或ハ

之ヲ治スルニ莨菪葉ヲ用テ先海鹽水醋若クハ尿ヲ以

テ傷處ヲ洗フテ出血セズ膿ヲ釀膿膏ヲ點シ傷口癒ル

目早キト過テ赤降汞膏ヲ貼シ以テ繃帶ニ多血家

ハ刺絡ヲ行ヒ胃中汚物ヲ吐却シ其後莨菪葉

ヲ用テ但服量多寡ハ年齡ニ準テ第一服ノ若

二十四時ヲ經テ第二服ヲ用テ又二十四時ノ後第三服

ヲ用テ此散ハ冷水或ハ裸燕麥汁ニ以テ送下セテ服



遠正方書  
卷之三  
恐水  
廣

後病者尊中二在之發汗日候子且加密列泡劑ヲ飲服以  
之ヲ催進スルヲ要トス大槩上件ノ三服ヲシテ危險ヲ  
救用ニ足ル也若夫第三服ヲ終テ後傷口緊脹摩急ヲ覺  
テ而シテ燃腫ア界者ハ三十六時ヲ過テ又五包ヲ與フ但  
每服二十四時ヲ隔テシテ更ニ服量ヲ加増スルモ每服  
半匁ヲ加フルニ過キズ服後瀉下スル者ハ後服ヲ停ム

服法		年	服第	服第
一	一	一	一	一
二	二	二	二	二
三	三	三	三	三
四	四	四	四	四
五	五	五	五	五
六	六	六	六	六
七	七	七	七	七
八	八	八	八	八
九	九	九	九	九
十	十	十	十	十
十一	十一	十一	十一	十一
十二	十二	十二	十二	十二

男女俱五斗歲已上ハ右準ニ服量ヲ減スルニ宜  
密松苦氏止法ハ如力之ヲ百七十六人ニ施用シテ恐水  
發起ヲ防禦セリ然レ若未之ヲ服盡セザルハ間ニ恐水  
症ヲ發スル片ハ故劑若シテ塊劑作リ與フルヲ妙トス

真按ニ此症既ニ發スル片ハ病者大ニ冷水ヲ恐ル故劑或  
ハ塊劑ニ作レテ服スルニ必シモ冷水或ハ燕麥汁ヲ  
用ヒテ故劑第一服或ハ第二服ニ至テ狂躁鎮靖セザル者  
ハ放血ニ由テ發汗ヲ加増スルニ宜シ密松屈氏ハ上表者

スガ如ク年齒管準ニ替其服量ヲ定メ水腫藥ヲ與フ  
又私託爾屈氏ハ此件ノ法ヲ模倣メ狂犬咬傷ヲ療治リ但

遠正方書  
卷之三  
恐水  
廣

便秘身防ガガ為ハ良若ニ加ハルニ施ハ那及七大黃ヲ以

テハ又サ朶ハ魯ハ大量良若ヲ以テ恐水症ニ人ヲ治セ

リハ蒲列刺ハ既ニ恐水証ヲ發セ者四人ニ大量良若

ヲ與甘汞升汞ヲ兼用シ且水銀膏ヲ塗擦テ以テ之ヲ

救活セリ又或醫同法ヲ施メ寸驗十キ者往々之アリ

○第一冊三百六方戒歇蘭度戒歇蘭度治法ハ後ハ好傳也

良若根ハ其汞麻樞涅朱亞白糖四恐水

右調和為散等分ハ裏朝夕服六八入ニ飲用也恐水

主治恐水病ヲ防グニ宜シ戒歇蘭度氏此散ヲ與ヘテ適

宜シ流涎ヲ促シ其レヲ不持續セシムルハ十四日間傷

口ヲ亂刺シ角法ヲ施メ出血セシムル火藥ヲ以テ焚毀シ

且赤降汞若著ヲ配伍メ軟膏ヲ作リ貼シ此ノ如ク云フ

太赤膿化セシムルハ週後之ヲ潰瘍ヲ變セシム加シ之

傷處ノ周圍ニ水銀膏ヲ塗擦スル日ニ二次○已是恐

水症ヲ發スル者ハ一時毎ニ良若甘汞ヲ配用シ每服漸

ヲ以テ其量ヲ加増セリ並ニ時常每ニ身體諸部ニ水

銀膏ヲ擦ス殊ニ多ク頸圍ニ塗リテ必夫速ク吐涎セシ

公多血家燭放血シ邪卒倒スルニ至ル浴湯ヲ施スモ亦

佳者少或ハ傷口瘡ヲ經久スル者八更ニ膏藥ヲ以テ之

○者破開シ上法ヲ從テ必其膿ヲ去リ日甚之其餘

恐水

三

廣

堂

○第百三十三方 狩里屈リリク地治法地

封茛菪根未白糖糖

右調勻為散分十二服每朝空心一服

至治此方恐水ヲ預防ニ宜シ○狂犬咬傷ヲ受ケタ

ル者每朝之ヲ服スルニ至ニ週爾後隔日ニ服ス咬傷後

二三日ヲ出デ若メ治ヲ請フ者ニ上方ニ甘汞ヲ加ル候

連服セヨ以テ流涎ヲ發スルニ至ル此ノ如キ大量莖

若根ヲ與フル者ハ服後必咽喉乾燥ニ眼前火光ヲ見ル

或ハ曇暗頭旋爾後汗出等眩暈証徴ヲ發スルヲ

以テ目的トス兼テ交民垵列里精及セ鹿琿精ヲ與ル

泡劑多服セヨ以テ發汗ヲ催進ス初四週間卧床

中ニ在テ肉食ヲ戒ムルヲ要ス外用ハ深ク傷處ヲ亂

刺ル莖菁軟膏ヲ塗擦セ傷口ノ近傍ニ發疱硬膏ヲ貼

兩處俱ニ釀膿セヨ六週間又水銀膏ヲ塗擦セ

涎ルニ至ル○是紀元一千七百八十三年已來狩里屈

地名病院ニ於テ行フ所ニ法ニ發明セヨ者ハ

實ニ其病院ノ祖侍醫依依肩ル肝魯設耳名十リ一千七百八

十三年ヨリ一千八百二十四年至通計スルニ此法ヲ施

セシ者二百三十三人死中死者四人但其中二人ハ病院

ニ來テ後第二日ニ死スルガ故ニ施療ノ日甚乏シ其餘

二又ハ口中及ビ眼胞ニ傷ヲ受ケタルガ故ニ猛烈ノ外  
用法ヲ施スコト能ハザルニ由テ云フ入田其中二人ハ飲

○第一千三百三方弗私葛列淪弗私葛列淪名療法

東方良莖根至十四分甘汞二分白糖半加耶普的油二

右調勻為散等分二服晨夕一服百八十三年以來淋

**主治同上**○私葛列淪名其率小兒一歲以上三歲至八

莖根一分乃至二分甘汞半分加耶普的油一滴每日二服

四十歲ヨリ五十歲至ハ良莖根十四分乃至十五分甘汞

二分加耶普的油一滴ヲ配伍ス大抵十四日間ハ其年齡

ニ準テ用ニ良莖根一分乃至二分若クハ二分加増ニ後又減

少ス甘汞連服ニ流涎ヲ發スルニ至テ度トス○蓋此

用法良莖果量過多ハ稱用スベカラズ何者私葛列淪

名ハ之ヲ用ヒテ唯頭旋及ヒ重視ヲ發セシメ之ヲ十四

日間連進スル旨トスト云フト雖更ニ小量ヲ用フル

モ尚能ク之ヲ發スル者通則十レバ十リ○施治ノ間過

那鳴栗私亞兒祇失斯三方飲料トス○其他私葛列

淪氏傷口里亂刺テ出血セタル咬傷未時ヲ移サズ

者ニ烙鑊ヲ施シ既ニ二三設昆度ヲ過グ重者ニ筆ヲ以

テ安質沒尼酪ヲ塗テ侵蝕セシム十時後再之ヲ侵

蝕

蝕

本草綱目 卷之三 恐水 三 廣 堂

蝕之刺戟軟膏三方百貼之初十日間每日

次其後日二次第二十九日過單苦過飽訛軟

膏及拔實里膏貼患處癢止私葛列淪五

十火又療之皆治也蓋改之膿潰也之六此八余三

於之必佳之又藥之昔藥根十白糖水一○藥之間○藥

○第一生藥百三方青根最之云根一根更之小量用之五

乙方用外若刺腫之平重縣之錢之七之五十四

用過那噶栗私亞兒祇失斯三葉根山牛房根濱瞿麥根

各半錢三蜀羊泉錢苗香錢一蓋五○蓋五五

右細調合每日取三大食匙水二麻篤容量半煮服盡之

○第六千三百三方不宜之律不集名瘡法

丙方五蠟蜜淋木為木障之阻一氏之

赤降汞八蘇汞之九二亞羌菁之四鐵的列並油二拔

○實里膏行之大藥之服之至三服之六之六之

右調勻貼傷所方一○律松篤之八最羌菁之發美之

○第一千三百四方越耳祿佛之小之藥之發之六之六之

羌菁之甘汞之精之龍腦之六達刺侃篤趨護漿適

右為丸原本粒數七之十二藥之一藥之六之六之

主治每晚一丸與之恐水之預防スル二宜シ○外用

○烙鍊汞劑高五之○非藥之○七方之○七方之○七方之

廣半堂

○第一千三百五方非魯篤設耳

主莞菁未四廿乘六白糖二錢二

右調和為散等分十二裹每一時服一裹

主治青男子十七歲頭上痛咬傷ヲ受クテヨリ後一種ノ

癩麻質斯症口恐水病近似セル証狀ヲ發ス上方ヲ試

用時即治也方

○第一千三百六方栗屈的兒

主莞菁細末龍腦三亞刺昆亞護將宜適

右為四丸過兒托末為衣朝夕服一九香錢

主治恐水方防方二宜方

○第一千三百七方律私篤 律私篤人療法

味甲方味高味六味開味六味煎味六味煎味六味煎味

兩莞菁十膏十蝟蝟石甜白糖各錢各錢各

右調勻為散等分十二服直主服乃至三服六至六日間患

主治恐水預防方卜六律私篤名八最莞菁ヲ贊美也

其試驗由據由廿八年間莞菁ヲ預防方ヲ供以外治藥

每常必施也恐水雖一人者恐水症ヲ發ス者若カハ收録

小法也咬傷未時ヲ移新其部外術ヲ施ス宜也

上法也乃之ヲ截除ス其之ヲ截除ス其後若カハ三日

間刺必斯高秘蟄屈斯濃溶液七方二百五以テ傷口ノ表面

○凡腐蝕其燒痕ハ釀膿ヲ俟テ自而剥脫セ○又刺

必斯高カス私ス蟻屈斯ク淡溶液ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

綿撒絲ニ點メ貼ス○律ニ私ス篤氏ノ上件ノ療法ヲ以テ

患者既ニ狂証ヲ備ヘ之者ヲ救治セ○第ニ等ノ外科

過テ幾キ私ス的爾ル名人屢ニ年子地名本院ニ在リ三十年間犬傷ヲ療

之ハ症ヲ除ク外ハ皆之以テ救ス又得テ其法ヲ荒菁

末時ハ味酒石ニ配シ連進ス不レ引ク三日乃至六日間患

所ニ荒菁膏ヲ貼シ又時々荒菁末ヲ摻シ或ハ刺必斯高カス

私ス蟻屈斯ク以テ之ヲ六週間ニ膿潰セシムト云フ

○第一千三百七方（蘇州） 軒（蘇州） 蔡（蘇州）

凡方ニ荒菁末ヲ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ綿撒絲ニ點メ貼ス

刺必斯高カス私ス蟻屈斯ク淡溶液ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

右供咬傷洗料ニ荒菁膏ヲ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ綿撒絲ニ點メ貼ス

○第一千三百七方（蘇州） 軒（蘇州） 蔡（蘇州）

凡方ニ荒菁末ヲ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ綿撒絲ニ點メ貼ス

刺必斯高カス私ス蟻屈斯ク淡溶液ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

右洗傷口日三四次又醃綿撒絲貼傷處ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

○第一千三百八方（蘇州） 軒（蘇州） 蔡（蘇州）

凡方ニ荒菁末ヲ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ綿撒絲ニ點メ貼ス

刺必斯高カス私ス蟻屈斯ク淡溶液ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

右洗傷口日三四次又醃綿撒絲貼傷處ニ以テ患所ヲ洗ヒ且ニ

○第一千三百九方（蘇州） 軒（蘇州） 蔡（蘇州）

右調勻為散分七裏每朝空心取一裏水或裸燕麥汁送下

〔主治〕恐水病ヲ預防シ又其既ニ發スル者ハ之ヲ治スル

○宜シク患久頗ル多血ノ者ハ篤里氏先放血ヲ施シ腸

胃汚物ヲ吐劑ヲ用ニ兼テ患部外術ヲ施スニ宜シ

ケルハ之ヲ截開シテ出血セシメ後芫菁膏ヲ撒敷ス尋

テ芫菁膏ヲ貼メ之ヲ覆フ但其大傷口ノ邊緣ニ餘ル

○獨ニ護中ニ咬傷甚淺クノ其部唯表被ヲ剝脱スルノ

方ハ此ハ芫菁膏ヲ以テ發泡セシメ之ヲ刺メ水液ヲ

去リ芫菁末少許ヲ取テ刺口ニ挿メ次其泡及ヒ填ツ

ル所ノ芫菁末モ亦之ヲ除去シ下款ニ載スル所ノ湯液

ハ三百ヲ以テ洗淨シ復更ニ芫菁末ヲ撒ス此ノ如ク連

用スルヲ三期以テ劇勢熾衝ヲ發セテ内用ハ上ノ第

三方ハ廿取リ初回ハ繃帶後早朝空心ニ始テ

之ヲ服シ其後每朝連進スル一週間爾後每週芫菁ノ

量四分ハ之ヲ加増シテ尿道微痛ヲ覺ユルヲ極度ト

シ復再上法ノ如ク漸次ニ其量ヲ減殺シテ故ニ復シハ

日開ニ之ヲ量ヲ服スルニ至テ傳ハルニ至ルニ至ル

歳久者及婦人體質虛弱ノ者ハ芫菁西藥以テ之ヲ

始メ小心ニ之ヲ加増シ微々小便滯滯ヲ發スルニ至テ

止ム此ニ兼テ篤里氏左ノ湯液ヲ投ス命ヲ救フシム

廣 半 堂



○第一千三百八方同在大成藥下效不或誤藥汁送下

乙方 大葉車前 根葉 過那噶栗私過兒袂失斯實熟與噶里留的

日葉 艾穗 各量 加井水三綿首魯 容量 蓋閉煮四分時

量物里亞加安度祿護所 老利兒禱 錢 碎 藥 汁 送 下

右再煎減半冷服 腫毒 入 其 部 腫 開 藥 為 其 甚 苦 入

主治 二十歲至五十歲 凡人 早朝前早散方 服藥 忌

但晚服 八前六時 唯肉羹汁 煮 啜 七 益 七 益 七 他 藥

飲食 禁 忌 十歲 乃 至 二十歲 並 至 五十 已 上 者 此 湯

液 半 勺 取 用 分 于 四 服 下 十 歲 已 下 小 兒 八 分 差

一 勺 取 用 分 差 亦 服 藥 時 之 更 與 患 者 之 服 藥 亦

可 能 醫 治 此 液 以 于 小 心 六 傷 處 洗 之 每 日 三

次 尚 且 時 之 以 元 繃 帶 淋 濡 之 之 兼 于 羌 菁 未 及 七

過 那 噶 栗 私 過 兒 袂 失 斯 實 乾 固 研 等 分 軟 膏 和 之 于 傷

處 生 敷 以 於 釀 膿 七 之 八 九 十 四 週 間 此 如 此 之 膏 施

及 治 病 者 以 之 于 始 終 傷 處 并 注 意 也 之 若 傷 處 或 八

其 近 傍 之 關 節 亦 不 安 之 所 以 乎 若 之 小 瘰 癧 覺 此 八

可 以 治 之 復 速 始 來 治 之 需 必 受 其 命 之 去 矣 之 以 心

遠西方書 卷十一 恐水 廣月堂

遠西方書 卷十一 恐水 廣月堂

遠西方書 卷十一 恐水 廣月堂

遠西方書 卷十一 恐水 廣月堂

遠西方書 卷十一 恐水 廣月堂

而之若其證微ヲ覺ニル者ハ更ニ上件ノ療法ヲ施ス  
 茶茶○食養唯植物ノ之ヲ用上亦過多ナル事勿レ總テ  
 此症飽食ヲ禁スベシ湯液ノ外總テ飲液ヲ戒ムベ  
 或ト雖若大渴也然レベカテザル者ハ艾穗及レ過那嚙栗  
 秘過兒祿失斯實等分共甘草少許ヲ配テ甘味ヲ加ム  
 稀淡煎汁トナシ與レ總テ精神ノ感動例ス共ニ房事或  
 ハ身體勞動ヲ避ケルヲ要ス施治ノ間患者衣服ヲ温被  
 シテ適宜ニ蒸氣ヲ發揚スルヲ要ス而シテ必辱中服在ル  
 又要セズ美日ニテ病室モ亦出ルヲ得セシムベシ蓋  
 右ノ療法此法伊斯巴尼亞始ル恐水病ノ末期ニ至テハ効ヲ奏ス

○此者數ニ孤攝魯訥微都地名ノ醫喊警私人名始ノテ上款

入治法ヲ傳說セリ此人歇魯落地名ニ淹留セシ間上法

ヲ實驗ニ偉効アルヲ證セリ實ニ狂犬咬傷ニ罹ル者十

中ノ九之二由テ平癒セリ其後喊警私暫ニ祿魯國名ノ

葛魯達速地名ニ在留セリ時狂犬傷ニ及リ篤里氏ノ法

盡倣フテ之ヲ療シ恐水發見ヲ預防シ得タリ此時同一

犬他地名ニ犬一來ヲ嚙之皆之力為ニ病ヲ死セリ相州云不

○篤里氏此法ノ奇驗ヲ以テ敢テ完善ニ歸セズ專湯

液ニ在リトス何者其症或ハ唯湯液ノ由テ除ク者

○テレバテ市ニテ發見候人ハ概本類兒五歳ヨリ十歳至

○第一千三百九方 設兒列名人恐水飲

地膽箇的里亞加安度祿護附半 鹿角鹽錢龍腦

錢里民埵列里精錢 茲亦寧調和每半時服一食匙 乃至一食匙半臨服宜振

盪 主治恐水預防及之治久之宜之 設兒列八傷

中又亂刺之且時之莞菁末又撒布之 又此藥液亦用之

今前吐藥之與之 地膽以往昔大稱用之 中亦只廢棄

又此方余復拾用之 入樽蓋之 此藥之問主者

○第一千三百十方 龍腦二精製消石六白糖半

右調勻為散分六服每一時乃至二時一服 下如二枚乾

○第一千三百十一方 地膽蜜漬者二 攝爾扁太里亞根錢 噎別尼未詳

錢 的里亞加二 右調和為煉膏

主治此方弗列埵栗錢 第二世秘方 弗列埵栗

幾氏之細列失斯名 民本齋行 以行世之發行也

大人服量ノ極二錢 婦人ノ一錢半 小兒五歳ヨリ十歳至

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

遠西方彙 卷十一 三 廣勝堂

一 刃乃至二刃服後十二時食ヲ斷テ後六時間飲液ヲ禁  
 ス但此時ヲ過グレバ接骨木花泡劑ヲ温服ノ發汗セシ  
 △傷處ヲ瘡サズ且周圍ニ私格魯匹焠油一種ノ蜘蛛油或ハ地  
 膽ヲ漬シタル蜜ヲ塗擦ス此方世ニ孛漏生國煉膏ト稱  
 スル者ニシテ恐水症ヲ未發ニ防グノミナラズ其既ニ  
 發スル者モ亦治スベシ一婦人四十歳咬傷ヲ受ケテ后  
 第二日ニ恐水証ヲ發ス此煉膏ヲ一服ノ治セリ初之ヲ  
 用ヒテ婦人熟睡スルヲ一時半ニシテ大ニ發汗シ醒テ后  
 大ニ爽快ヲ覺エ能ク人事ヲ省セリ但暫時下肢ニ麻痺  
 ヲ遺スト雖亦忽平治セリ此煉膏ノ効力地膽ニアルヲ

確明ナリ

○第一千三百十三方兼薤根湯取也

地膽箇 續草末 地榆末 龍萊草根 柵寄生各半

接骨木子舍利別宜適

石作煉膏每一時服大茶匙

○第一千三百十三方薩吉損名恐水病飲ハウススア

地膽蜜製 蜂蜜去沫 撒兒麻爾扶斯 煤焙

澤者半錢

右内白丁香研磨作泥更加醋二三調齊每四分時服一食

匙內曰下空極發其式更吹韻二名時夜每四長叔服其

主治右二方 千三百十三方 咬傷ヲ療シ恐水ヲ防グニ宜

○第一千三百十四方 遠西

地膽曝大氣者 精製消石錢 煎水麻煑心

右調和為散等分十二裏每半時服一裏

主治之ヲ連服ノ送尿ニ臨ミ焮痛ヲ覺エ或ハ血ヲ漏ス

ニ至リ以テ恐水ヲ防禦スベシ但粘滑藥煎ヲ飲料トス

○第一千三百十五方 遠西 突土名並人 療法

右調和為散分十二服每二時一服又夜間一服

○正治 恐水ヲ禦グニ宜シ 海綿微温水ヲ醃シ 傷口ヲ

洗淨シテ莞菁末ヲ填テ莞菁硬膏ヲ貼メ之ヲ罨スベシ

硬膏其大傷口ノ周圍ニ餘凡一獨乙護非ス又水銀膏

六刀乃至半錢ヲ取テ朝暮之ヲ塗抹ス但初之ヲ傷口

ノ周圍塗テ後四肢上擦ス又莞菁膏ニ由發スル所

又疱皮ヲ剪リ去テ其濕濡也外莞菁末ヲ除キ存或ハ更

患者ノ感觸ニ從テ新末ヲ撒敷ス或ハ唯莞菁硬膏ヲ貼メ編

帶ス上件ノ法ヲ施メ夥多釀膿也ハ六週間傷口

遠西方彙

卷十二

三

廣月堂

ヲ瘥ス以前吐膿若クハ足ヲ打膿法ヲ施シ一年間瘥エ  
 ザラシハ甘汞並水銀塗法ハ毎日吐涎ハ其ニ至ルヲ  
 度或テ之ヲ持重ニ若水銀擦法ヲ用ヒザルハ甘汞  
 内服ニ量彼ノ六週間吐涎ノ度ニ適之之ヲ連進ス○紀  
 元千八百十年ヨリ千八百二十三年至吐法ヲ行フ者百  
 六人其中唯二人相當ノ外用法ヲ施ス則能ハズ長延死  
 也○  
 ○第一千三百十六方麻羅泄質 麻羅泄質療法ハ吐口  
 傑ニ私ス院ト穂ハ花ニ一ハ井水ニ共煮濾取汁半ハ徳傑ハ及遠  
 石ニ每半時服ニ食匙ニ

主治同上○此方原俗間ニ出テ千八百十三年優葛來  
 地ニ於テ麻羅泄質ハ氏ハ學ニ得ル所ナリ其法咬傷  
 ヲ受テ後第三日ヨリ第九日至ニ舌根下白齒腺ヲ排泄  
 管口ニ接シ發スル所ハ小疱ヲ世醫以為ハ刺破ト此  
 シ烙鐵ヲ以テ之ヲ燒滅シ而後傑ニ私ス院ト煎ヲ含漱セシ  
 ○此ルヲ切須トス此術疱ヲ發シ后十二時内ニ施スベシ  
 但每症必瘥ヲ發否ヲザレハ治シ難シ嘗テ優葛來見  
 於テ狂犬咬傷ヲ受クル者十五人其中十四人ハ恐水  
 治療ニ有名ノ一野人上法ヲ以テ之ヲ療ス他ハ一人六  
 歳ノ女子ハ麻羅泄質ハ氏ハ治ヲ請フ師當時行ハル所

治方法之由示之ヲ治ス而其十四人ハ皆平癒シ彼ノ一  
 女子ハ恐水症ヲ發メ斃ル其後五年朴突釐憫名地ニ於テ  
 犬傷ニ罹ル者二十六人下リ麻羅泄質氏乃其毒瘡ヲ燒  
 滅シ傑尼私陀煎ヲ用ヒテ救活セリト云フ善未見  
 ○第一千三百十七方蒲刺栗屈名以療法ニ報内ヲ於ス者  
 健質安那孤律失亞答根得常健質亞那一種三ヲ煎メ會煉ス  
 右取四分一内白加水研磨為泥早旦空心服之陳奴  
 ○主治恐水既ニ發スル者ヲ治ス屈羅質名國歇爾暴弗私  
 格地ノ學者刺栗屈名以恐水病秘法ヲ示嘗テ極秘勿戾幾  
 國政府銀百員ヲ捐テ之ヲ刺栗屈ニ買テ其法咬傷者

殺シ其狀始ニ狂躁ヲ發スル時速ニ蝦蟆脈ハ十ヲ二  
 服シ腫脹セシ者背破開ス但木造鑷子ヲ用ヒ先舌ヲ牽  
 引メ之ヲ施シ丹頭既ニ破レ痰舌ヲ放テ其口中  
 取メ又於夕出血セシテ其自然者歇今至ル是ニ於  
 テ健質安那孤律失亞答根ヲ取テ注法如此之ヲ製シ  
 半羅度名量至メ第一服トシ與メ是服半羅度ヲ服量極  
 小ニ病久ク年齒壯健質非量升子之ヲ減少ニ爾後每  
 朝控心ニ同量ヲ服量ハ日〇迷迭香精ヲ以テ患處  
 ヲ洗テ裸麥粉ニ分杜松子末分猛烈火酒加與硬膏  
 ヲ作テ貼メ若傷口既ニ癒メ者先之ヲ亂刺メ〇既

一恐水症の發は諸証具あらず者強て立病は候は可開  
 健質按那狐律失亞答根ヲ調製して服之其第壹服之後病は  
 時半ヲ經て再同量ヲ服セ候は其第貳服之後病は  
 急緩解セザレ健質按那狐律失亞答根ヲ全根ヲ取テ嗽  
 半量ハ妙藥不病人能之ヲ嗽半亦喜テ之量嗽  
 不次質蝦蟆膠ヲ出シ破テ肉羹汁少許ヲ與テ爾後大熱病  
 以水ヲ飲セ由テ畏ルハ其後安眠至五時ヲ得ルハ  
 此に至テ乃此症救活ヲ得候可疑ハ容テ睡眠不間  
 口中粘液或ハ淡黄色感ハ雞子白類似用ル者生不  
 善ク其排泄ニ便ナク之途ハ若恐水証將ニ再發セ  
 卜スルヲ勢下ルハ復更ニ蝦蟆膠ヲ破開キ其便秘  
 致ル者ハ施治第貳日ニテ瀉藥ヲ與テ虛僊殊甚  
 未著ハ迷迭香精ヲ以テ軀體ヲ洗ヒ又晚量迷迭香精  
 盞冷氷和服セ候ハ○紀元年百四十年癸巳年  
 政軍國ヲ命テ下テ刺栗屈ノ治法ヲ示テ故栗極私  
 及幾國諸郡ハ兵仕病院ニ恐水症ヲ治ス此法ヲ試驗  
 七廿九日得テ千本百四十四年諸部并テ報知スル所  
 經驗決定ナラズ又癸巳年布佛祿私結人ノ說并テ達魯  
 母私胆篤地ハ醫官歌私失斯人ノ說皆之ヲ不可ナ  
 不阿秋地ハ醫官秩極列魯人此法ハ大害ヲ招キ一症

一恐水症の發は諸証具あらず者強て立病は候は可開  
 健質按那狐律失亞答根ヲ調製して服之其第壹服之後病は  
 時半ヲ經て再同量ヲ服セ候は其第貳服之後病は  
 急緩解セザレ健質按那狐律失亞答根ヲ全根ヲ取テ嗽  
 半量ハ妙藥不病人能之ヲ嗽半亦喜テ之量嗽  
 不次質蝦蟆膠ヲ出シ破テ肉羹汁少許ヲ與テ爾後大熱病  
 以水ヲ飲セ由テ畏ルハ其後安眠至五時ヲ得ルハ  
 此に至テ乃此症救活ヲ得候可疑ハ容テ睡眠不間  
 口中粘液或ハ淡黄色感ハ雞子白類似用ル者生不  
 善ク其排泄ニ便ナク之途ハ若恐水証將ニ再發セ  
 卜スルヲ勢下ルハ復更ニ蝦蟆膠ヲ破開キ其便秘  
 致ル者ハ施治第貳日ニテ瀉藥ヲ與テ虛僊殊甚  
 未著ハ迷迭香精ヲ以テ軀體ヲ洗ヒ又晚量迷迭香精  
 盞冷氷和服セ候ハ○紀元年百四十年癸巳年  
 政軍國ヲ命テ下テ刺栗屈ノ治法ヲ示テ故栗極私  
 及幾國諸郡ハ兵仕病院ニ恐水症ヲ治ス此法ヲ試驗  
 七廿九日得テ千本百四十四年諸部并テ報知スル所  
 經驗決定ナラズ又癸巳年布佛祿私結人ノ說并テ達魯  
 母私胆篤地ハ醫官歌私失斯人ノ說皆之ヲ不可ナ  
 不阿秋地ハ醫官秩極列魯人此法ハ大害ヲ招キ一症



又示也其語曰患者此方以未死ヲ買フベシ  
 又別兒列印地名有布歇兒德微屈以此法又二狂羊ニ施ス  
 雖刺栗屈ノ説ノ如ク適當也ト云云○并八百四十  
 五年ノ秋慶年ノ軍政官上款ノ經驗説ト拘泥セズ由テ  
 再刺栗屈治法又行テ命ヲリシ由テ極秘ト云  
 幾全國ニ於テ猶二年間之ヲ嘗試ス同時ニ刺栗屈亦  
 此方又改製自ラ世ニ示セ且曰健賢安那孤律失亞  
 答根一羅度半増ニテ三羅度トシ少量ト極テ其羅  
 度ト定ム且刺栗屈親ク之ヲ試シ其根汁ヲ乾根ニ優  
 リテ更ニ佳効アリ又最初ノ硬膏ヲ用ヒテ縛帶ス貨下

三次音及資ニ則硬膏ヲ更ニ改テ簡要ナク去テ○按  
 及刺栗屈モ亦未定テ効驗ヲ得ザ由テ去テ○按  
 憶テ此後健賢安那孤律失亞答人試驗ヲ傍間ナシ又  
 委テ醫氏ハ猶余世用外ハ所々方法ニ用テ何種  
 刺栗屈載心所ノ外用法ノ如キ並取知然足テ其藥  
 用ハハハ回迄ハ之ニ載主ニ迄ハ之ニ載主ニ迄ハ之  
 ○第書者三百十方去法雖魯名治法ハ亦昔々ハ水ナ  
 醫人先懇親撫慰ヲ辨説テ極テ以テ患者ノ恐懼ヲ安  
 殊恐水証候既ニ萌生スルハ否否又試テ禁  
 之傷口既ニ瘡ニ腐者更ニ破開シ或ハ其傷處ヲ截除

之刺膿潰也。然爾後多量ニ放血スルニ  
 行之頸靜脈ヲ刺テ最妙トス。又項窩及肩下頸ヲ放蝶  
 或ハ筋法ヲ行ヒ。若其症膽液性ヲ夾多ク發病前日  
 ○中甚苦味アル者ハ先吐藥者與ニ後冷水若クハ氷片ヲ  
 用フベシ。但或ハ之ヲ灌注シ或ハ之ヲ罨法トシ或ハ之  
 浸スルニ此ハ如何之ヲ施シ並ニ峻烈ク發汗藥龍腦香  
 安沒尼亞ヲ與ヘテ其發汗ヲ促スルヲ要ス之ヲ兼テ利尿藥  
 地膽又其承ヲ與フベシ何者其承ハ上ニ諸藥併用  
 忌憚ルニ傳乘カク且此症至大效藥ト由テカク○蓋  
 法別魯氏實ニ此法ヲ以テ佳効ヲ得タリト雖未博ク其

試驗ヲ歷ザルナリ且發病第二期及ヒ第三期ニ至テハ  
 此法寸効アルヲナシトス獨乙○加藥安頭著

侍醫法眼實齋伊東 文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

喘スルハ其最重症トス此所ノ者ハ瘧疾喘枯液滿  
 此症其原因ニ從テ諸種ノ故ニ其因ハ蹤跡シテ相當  
 治テ下スベシ其最重症トス此所ノ者ハ瘧疾喘枯液滿

遠西方彙卷之十二 吸器ノ瘧疾ニ因テ發シ粘液滿

遠西方彙 卷之十二 恐水 早 廣野堂

遠西方彙卷之十一爾後多量之放血及之  
 行之頭靜脈之刺之其妙下大又項窩及上下頸之放血  
 或或角法之行之若其症應液性之夾出之發病也而中  
 中其苦味之牛者之先吐藥者與之後冷水若久之水片之  
 用之へ之但或ハ之ヲ灌注シ或ハ之ヲ罨法トシ或ハ之  
 之浸之ハ之此ハ如之ヲ施シ並ニ峻烈ク發汗藥  
 危也之與ハ之其發汗ヲ促スルヲ要ス之ハ兼テ利尿藥  
 地也又其末ヲ與ハ之ハ何者其末ハ上ニ諸藥ヲ併用ス  
 是藥ハ峻烈クハ之ヲ忌ミ大効藥ト由テナリ○蓋  
 爲劍會登實也其法旦發藥難ニ眩暈ノ第ニ睡ニ對テ之

遠西方彙卷之十一爾後多量之放血及之  
 行之頭靜脈之刺之其妙下大又項窩及上下頸之放血

利也ハ其法ニ藥ハ之ハ何者其末ハ上ニ諸藥ヲ併用ス

是藥ハ峻烈クハ之ヲ忌ミ大効藥ト由テナリ○蓋

爲劍會登實也其法旦發藥難ニ眩暈ノ第ニ睡ニ對テ之

侍醫法眼貫齋伊東頌文伸及重譯

南洋伊東亨健夫參校

喘フトカランボル胡ハ專習欲ハ要カシク志セテ示ズル也

此症其原因ニ從テ其最重症ハ其因又蹤跡ニテ相當

人治テ下スベシ其最重症ハ其因又蹤跡ニテ相當

是ナリ瘧瘵喘ハ呼吸器ノ瘧瘵ニ因テ發シ粘液喘ハ肺中

粘液太過因テ生カス○小兒ニ在リテ容兒刺爾喘骨布喘  
 二種下リ此ニ症實其本性ヲ異ニスルヤ否未之テ發明  
 也ス之ヲ要スルニ畢竟皆破裂軟骨ノ變急ニ因テ来ルナ  
 ル○凡喘急發作ノ時ハ專醫治ヲ要スルコト勿レ衣服狹窄  
 ノ者ハ之ヲ寬解シ病者ヲ坐セテ牖戶ヲ開キ清涼新氣ヲ引クヲ  
 佳トスル胸部及ヒ足心ニ芥子泥膏貼シ或ハ兩足ヲ蒸湯  
 シ病人強實多血ナラハ放血スヘシ猛烈哥喜一小盞ヲ取  
 リ或ハ其症ニ準メ之ニ阿芙蓉下藥二五滴ヲ加レテ諸藥  
 ニ勝リテ効ヲ奏スル者間之アリ○又此症ヲ寬解スルニ  
 祿別利下藥二十滴乃至二十五滴ヲ用ヒテ殊効アリト云

フ○根治法ハ疾患間歇ノ時解方ヲ用之テ施スベシ蓋瘵

孿喘鎮瘵劑千三百十九方至千三百卅六方ヲ用ヒ粘液喘ハ專痰ヲ豁

利スルコト以テ要トス千三百卅九方至千三百六十四方至腹内壅塞ヲ坐スル

者屢ニテハ善ク之ヲ解散セシメ尚且發疱打膿法等ノ如

キ猛烈反對刺衝法ヲ施シ胸中ノ分利ヲ促シ之ヲ持久ス

ルヲ最要トス○密兒刺兒喘ハ密兒刺爾氏阿魏内服千三百六

十五方。千三百六十七方灌腸俱ニ稱用セリ千三百七十一方 患屈滿名ハ麝香

又好由ス○骨布喘ハ治法衆說未定長ク熱ヲ帶スル者

ハ頸圍ニ放蟻シ甘黍ヲ與テ香の當知ル者多ク鎮瘵藥ハ

殊ニ重鉛劑千三百七十五方及ヒ麝香ヲ佳トス又硫酸規

危捏殊<sub>三</sub>之<sub>三</sub>鎮痙劑<sub>七</sub>配<sub>七</sub>及者<sub>千三百七十八方</sub>至<sub>衆醫</sub>

稱贊<sub>因</sub>此<sub>兩</sub>此<sub>以</sub>症起<sub>因</sub>病者<sub>以</sub>稟賦<sub>二</sub>在心者<sub>屢</sub>之<sub>下</sub>

此素<sub>因</sub>治<sub>不</sub>心<sub>心</sub>癩<sub>癩</sub>藥<sub>中</sub>三<sub>就</sub>至<sub>最</sub>沃<sub>沃</sub>謨<sub>謨</sub>劑<sub>及</sub>心<sub>肝</sub>

油<sub>六</sub>取<sub>三</sub>入<sub>瓶</sub>州<sub>州</sub>用<sub>時</sub>解<sub>解</sub>再<sub>醫</sub>君<sub>君</sub>州<sub>州</sub>委<sub>委</sub>百<sub>百</sub>九<sub>九</sub>素<sub>素</sub>風<sub>風</sub>流<sub>流</sub>心<sub>心</sub>服<sub>服</sub>續<sub>續</sub>香

第一<sub>一</sub>痙<sub>痙</sub>喘<sub>喘</sub>入<sub>入</sub>三<sub>三</sub>料<sub>料</sub>於<sub>於</sub>羅<sub>羅</sub>氏<sub>氏</sub>帶<sub>帶</sub>八<sub>八</sub>密<sub>密</sub>史<sub>史</sub>陳<sub>陳</sub>爾<sub>爾</sub>九<sub>九</sub>阿<sub>阿</sub>跋<sub>跋</sub>山<sub>山</sub>眼<sub>眼</sub>十<sub>十</sub>三

①第<sub>一</sub>無<sub>無</sub>示<sub>示</sub>每<sub>每</sub>百<sub>百</sub>九<sub>九</sub>方<sub>方</sub>亦<sub>亦</sub>連<sub>連</sub>起<sub>起</sub>中<sub>中</sub>注<sub>注</sub>各<sub>各</sub>條<sub>條</sub>之<sub>之</sub>心<sub>心</sub>及<sub>及</sub>林<sub>林</sub>入<sub>入</sub>

昔<sub>昔</sub>靈<sub>靈</sub>祿<sub>祿</sub>別<sub>別</sub>利<sub>利</sub>子<sub>子</sub>幾<sub>幾</sub>附<sub>附</sub>錢<sub>錢</sub>輔<sub>輔</sub>婦<sub>婦</sub>女<sub>女</sub>之<sub>之</sub>入<sub>入</sub>尚<sub>尚</sub>且<sub>且</sub>錄<sub>錄</sub>蘇<sub>蘇</sub>林<sub>林</sub>觀<sub>觀</sub>去<sub>去</sub>善<sub>善</sub>入<sub>入</sub>吸

係<sub>係</sub>右<sub>右</sub>喘<sub>喘</sub>息<sub>息</sub>發<sub>發</sub>作<sub>作</sub>中<sub>中</sub>每<sub>每</sub>二<sub>二</sub>十<sub>十</sub>密<sub>密</sub>扭<sub>扭</sub>篤<sub>篤</sub>乃<sub>乃</sub>至<sub>至</sub>三<sub>三</sub>十<sub>十</sub>密<sub>密</sub>扭<sub>扭</sub>篤<sub>篤</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>沙<sub>沙</sub>糖

藥<sub>藥</sub>和<sub>和</sub>服<sub>服</sub>疑<sub>疑</sub>蘇<sub>蘇</sub>濟<sub>濟</sub>按<sub>按</sub>三<sub>三</sub>百<sub>百</sub>十<sub>十</sub>增<sub>增</sub>也<sub>也</sub>至<sub>至</sub>天<sub>天</sub>用<sub>用</sub>五<sub>五</sub>林<sub>林</sub>蘇<sub>蘇</sub>帶<sub>帶</sub>八<sub>八</sub>稟<sub>稟</sub>賦<sub>賦</sub>之<sub>之</sub>符

主治<sub>主</sub>痙<sub>痙</sub>喘<sub>喘</sub>心<sub>心</sub>傳<sub>傳</sub>効<sub>効</sub>予<sub>予</sub>以<sub>以</sub>稱<sub>稱</sub>云<sub>云</sub>又<sub>又</sub>肺<sub>肺</sub>心<sub>心</sub>若<sub>若</sub>於<sub>於</sub>八<sub>八</sub>肝<sub>肝</sub>之<sub>之</sub>器<sub>器</sub>質

病<sub>病</sub>係<sub>係</sub>ル<sub>ル</sub>者<sub>者</sub>之<sub>之</sub>用<sub>用</sub>也<sub>也</sub>其<sub>其</sub>症<sub>症</sub>大<sub>大</sub>寬<sub>寬</sub>解<sub>解</sub>云<sub>云</sub>越<sub>越</sub>魯<sub>魯</sub>涅<sub>涅</sub>屈<sub>屈</sub>各<sub>各</sub>此

効<sub>効</sub>能<sub>能</sub>確<sub>確</sub>定<sub>定</sub>也<sub>也</sub>①噎<sub>噎</sub>利<sub>利</sub>阿<sub>阿</sub>篤<sub>篤</sub>損<sub>損</sub>各<sub>各</sub>及<sub>及</sub>七<sub>七</sub>失<sub>失</sub>僣<sub>僣</sub>門<sub>門</sub>突<sub>突</sub>同<sub>同</sub>等<sub>等</sub>ハ

間<sub>間</sub>歇<sub>歇</sub>以<sub>以</sub>間<sub>間</sub>七<sub>七</sub>亦<sub>亦</sub>一<sub>一</sub>時<sub>時</sub>每<sub>每</sub>二<sub>二</sub>三<sub>三</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>乃<sub>乃</sub>至<sub>至</sub>四<sub>四</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>ヲ<sub>ヲ</sub>服<sub>服</sub>セ<sub>セ</sub>シ<sub>シ</sub>ム

○第<sub>一</sub>千<sub>千</sub>三<sub>三</sub>百<sub>百</sub>二<sub>二</sub>十<sub>十</sub>方<sub>方</sub>〔掣<sub>掣</sub>傑<sub>傑</sub>兒<sub>兒</sub>〕<sub>二十滴</sub>

主<sub>主</sub>阿<sub>阿</sub>魏<sub>魏</sub>丁<sub>丁</sub>幾<sub>幾</sub>半<sub>半</sub>且<sub>且</sub>

右<sub>右</sub>每<sub>每</sub>一<sub>一</sub>時<sub>時</sub>服<sub>服</sub>二<sub>二</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>三<sub>三</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>日<sub>日</sub>三<sub>三</sub>次<sub>次</sub>服<sub>服</sub>之<sub>之</sub>

主<sub>主</sub>治<sub>治</sub>假<sub>假</sub>証<sub>証</sub>痙<sub>痙</sub>喘<sub>喘</sub>宜<sub>宜</sub>之<sub>之</sub>下<sub>下</sub>幾<sub>幾</sub>半<sub>半</sub>

○第<sub>一</sub>千<sub>千</sub>三<sub>三</sub>百<sub>百</sub>二<sub>二</sub>十<sub>十</sub>方<sub>方</sub>〔潮<sub>潮</sub>瀉<sub>瀉</sub>音<sub>音</sub>噴<sub>噴</sub>〕

主<sub>主</sub>續<sub>續</sub>草<sub>草</sub>丁<sub>丁</sub>幾<sub>幾</sub>半<sub>半</sub>

右<sub>右</sub>每<sub>每</sub>服<sub>服</sub>二<sub>二</sub>十<sub>十</sub>滴<sub>滴</sub>沙<sub>沙</sub>糖<sub>糖</sub>和<sub>和</sub>服<sub>服</sub>日<sub>日</sub>二<sub>二</sub>次<sub>次</sub>味<sub>味</sub>之<sub>之</sub>又<sub>又</sub>間<sub>間</sub>服<sub>服</sub>之<sub>之</sub>間<sub>間</sub>二<sub>二</sub>與<sub>與</sub>ハ

主治瘧疾喘ニ宜シ其發作又緩和シ又間歇ノ間ニ與ヘテ根治ノ効アリ

○第一千三百二十二方 佛蘭葛魯突

主治瘧疾比尼謨昆速利達丁幾附半弓

右每服二十滴乃至三十滴日三次

主治瘧疾喘ニ宜シ

○第一千三百二十三方

間吐根未十亦白糖錢二

右調勻為散等分十二服每一時乃至一時半一服

主治同上○小量吐酒石或不安質沒尼酒毛亦吐根ニ代

○用ス下之百ニ本分方 井水適宜煮濾取八弓加

○第一千三百二十四方 刺屈黠私非祿沙越幾斯附桂水三錢溶化此

右調勻早晚服二十滴乃至三十滴

○第一千三百二十五方 藥歌爾蘭獨留謨子錢三綿答幾里私布 加密列各半

主治瘧疾望京風麻醬畜痘等ニ宜シ

右細判取二食匙強滾湯四小盞泡出

主治右三方瘧疾喘ニ宜シ

○第一千三百二十六方 救爾託錢二小盞煎汁煎用

○藥礶砂加過泥子精錢各半安質沒尼酒錢各半渴爾托煎五

主阿芙蓉舍利別二宜

右調勻每一時服一食匙四小蓋或出

主治瘰癧喘室息聖京促風氣鬱畜鼓脹等二宜

○第一千三百二十七方 颯爾散秘里味亦各半

○藥金硫黃四一菲阿斯越幾斯八十二 蝟蛄石半 白糖錢二

右調勻為散每一時服一茶匙下煎

主治瘰癧喘宜○颯爾散秘名首方不効亦症此散ヲ

○用ヒ元根治七下云下一一時乃至一一時一服

○第一千三百二十八方 蒲列刺安質沒尼酒亦此根一

○玉昆倔訥尼葛答兒百附三錢 井水適宜煮濾取八弓加

右調勻每一時服一匙未

○藥屋施茂兒半弓 浸漬未 藥未

○藥治瘰癧喘奇方下稱

○藥一千三百二十九方 福烏列爾名煙草浸

○藥烟草葉劉滾湯二浸漬密扭篤濾過加亞爾二

○藥筒兒二 錢

右調勻每服三十滴乃至八十滴茶或裸燕麦汁和服和

○藥次千三百三十五 錢

主治喘息及心胸水宜又骨布名八小便淋瀝二稱用

至欲帶想文也即本二宜定又滑本各小野松整有難用

○第六千三百三十方 遇佛栗屈的兒

香海葱越幾斯 雙鸞菊越幾斯 各各懸揮發鹿角鹽 十五

主 葛粉 篤樓 謨 錢半 聖阿魏 錢半 黃膏 鼓脹等 宜

○右調和為二丸 衣石松粉 每服十丸 每日三次 亞爾

○主治 癆瘵喘 宜以古越新藥 爾八 數草 宜 白糖

○第六千三百三十一方 歇愷

改製 硫磺 蘆薈 越幾斯 未詳 吐根 末半 薄荷油 五

右調和為三十九丸 衣伊里私弗祿連底那末 晨夕服 一九

主治 喘息 宜各限百 井水 煎宜 煮 蘇 蝦 八 三 咳

○第六千三百三十二方 雷 因之來 八 香 二 宜 三

本 蕃草 越幾斯 錢半 十律比 九料 錢一 阿魏 錢半 亞鉛華 十

右 阿魏 錢半 民埕列里精 一 溶解 加後味 關 亞

○次 一千三百三十五方 細 蝦 蘇 蝦 八 三 咳

○第六千三百三十三方 同上

右 調和為九 每粒二八 衣石松粉 每服五丸 乃至八丸 每日

主 阿魏 錢半 民埕列里精 一 溶解 加後味 關 亞

苗 香水 五 礞砂 加過泥子精 錢二 渴爾托舍利別 一

右 調勻 每一時 乃至一 時半服 一食匙

○主治 右二方 假証 癆瘵喘 宜



○第千三百三十四方 乙德 宜

○曼陀羅葉 白糖

右合勻為散等分八服朝夕一服

主治喘息諸証殊其症時時刻刻發以心臟ニ關係スル

○者之ニ宜 三十三方

○第千三百三十五方 穢歌蘭度

○葛私篤倭謨 忽弗滿液 錢 五薄荷油 六舍電

阿芙蓉液 刃

右調勻每時服四十滴 林 底 阿 羅 華

○主治喘息腸胃風氣鬱畜ニ因テ来ル者ニ宜シ

○第千三百三十六方 吐篤 吐 吐 吐 吐

葛私篤倭謨 于幾 鹿角精 忽弗滿液 錢

右調和每四分時服二十至滴為至盡并滴 曾 六 其 由

主治歇倚私的里性喘息發作中用之 歇倚私的里條 下ヲ照スベシ

○第千三百三十七方 母私篤刺爾 錢 菲阿私越

複方大黃越幾斯 附 勿 擲 亞 石 鹼 錢 半 菲阿私越

幾斯 錢 半 香葉 錢 半 菲阿私越

○右調和二瓜為丸衣石松粉每朝服五丸

主治夜發喘ニ通常兼發スル所ノ腹内壅塞ニ宜シ私篤

刺爾氏稀淡加密列泡劑之熱服之效其奇方也稱之

飲服スレハ腹中雷鳴シ嘔氣及ヒ放屁等々發作速ニ退

之方ハ蘇合散ニ應常兼發スル西ノ餌内壅塞ニ宜シ味苦

○第一千三百五十八方攝列魯氏無脾胆正水

主撒爾非亞葉弓半 迷迭香葉錢三 芥沃刺那葉錢二 注井

○第一千三百五十九方蓋閑微温浸漬瀝過加後果錢半 菲阿味錢

○藥麻爾羅歇越幾斯半錢 蒲公英越幾斯錢三 蜜去泡沫

右調勻每一時服一食匙

主治羅惆名地ノ地方ニ三種ノ喘息流行ス攝列魯氏其由

ヲ探索スルニ土地ノ湿濡食物ノ性及木綿製造局ノ

作業ノ致ス所ニ係ルナリ此症上方ヲ用ラルニ宜シ又

攝列魯氏ハ阿列蘆及ヒモスベシノ果實泡劑ヲ兼服

セシヤニハ一旬間一會變調用宜キ藥ニテ幾ハ一和胸

第二粘液喘アストマ 羅半 咳痰 干黃二箇 合味更

○第一千三百三十九方錫蘆私 咳痰 干黃二箇 合味更

○第一千三百四十方接骨木花弓 滾湯適宜 浸漬瀝取二 弓冷定加後藥

○第一千三百四十一方海葱蜜 屋施茂兒各一 香吐酒石

右調勻每一時服一食匙

主治輕証肺嗽衝並ニ粘液喘天用 天痰又 豁利スル

宜ハ 黃華各 用里調 蘇煎 煎煎 煎煎 煎煎

○第一千三百四十方弗 瓜隣 木香煎 煎煎 煎煎 煎煎

黃半

○第一千三百四十一方 補綸涅爾 蘇坦二石令安 亞蘇藥  
錢二 土木香越幾斯 甘草越幾斯

宜 硫黃華 各一 伊里斯弗祿連底那根 錢末半

○右調勻 二石為膏 九甘草葉為衣 每服八九丸 乃至十二丸 日

○右調勻 二石為膏 九甘草葉為衣 每服八九丸 乃至十二丸 日

主治喘症肺臟弛弱 因ル者之宜シ

○第一千三百四十一方 補綸涅爾 蘇坦二石令安 亞蘇藥

○蘇 蘧謨安沒尼亞幾 阿魏 錢各一 加雞子黃二箇合和更

○蘇 加過爾托舍利別半多 喘息流行 補列魯氏其由

右調勻 每一時服一食匙 臨用宜振盪

主治粘液喘 宜シ 文々々々 亦不結製 造司ノ

○第一千三百四十二方 室里列魯 亞蘧謨菜 加苗香水

主治木香越幾斯 錢地榆 蘇幾 宜甘草丁幾 錢各一 和胸

○右調勻 每一時服 蘇食匙 蘇雷 宜

主治粘液噴 久喘息 亞羅劍者之 蘇寫之 蘇亞幾 蘇

○第一千三百四十三方 佛落屈結德

主治刺蕪尼子 粗剉 井水一匕半 煮濾取 論北蒲公英越

○右調勻 服盡 蘇蘇黃 蘇蘇黃 蘇蘇黃

主治喘息 欬嗽 百日 蘇蘇黃 蘇蘇黃 蘇蘇黃

○第一千三百四十四方 蘇蘇黃 蘇蘇黃 蘇蘇黃

○第一千三百四十四方 蘇蘇黃 蘇蘇黃 蘇蘇黃

○第一千三百四十四方 蘇蘇黃 蘇蘇黃 蘇蘇黃

○藥 薤 謨 安 沒 尼 亞 幾 各 錢 八 海 葱 蜜 餅 條 安 質 沒 尼

主酒 錢 息 過 爾 托 舍 利 別 藥 絲 連 底 那 根 錢 未 半

右調勻食匙抄頻服 甘草末為衣每服八九乃至十二九日

主治 久 欬 粘 液 喘 等 宜 一 小 半 蒸 熟 取 一 小

○第 一 千 三 百 四 十 五 方 戒 歌 蘭 度 宜 一

○藥 海 葱 錢 未 餅 勿 擲 奈 亞 石 鹼 錢 一 薤 謨 安 沒 尼 亞 幾 鼠

婦 半 錢 一 拔 爾 撒 謨 骨 湃 霍 宜 適 加 雞 子 黃 二 箇 合 和 更

右王 衣 為 一 九 衣 桂 末 朝 夕 服 五 丸 乃 至 四 九

主治 喘 息 冰 腫 腎 膀 脫 以 痰 患 宜 草 下 幾 各 錢 一 味 四

○第 一 千 三 百 四 十 六 方 銅 里 下 幾

薤 謨 安 沒 尼 亞 幾 錢 二 草 亞 刺 昆 亞 薤 謨 漿 宜 適 加 苗 香 水

○第 一 六 方 作 乳 劑 加 後 味 之 暴 烈 和 胸 起 栗 失 爾

需 礪 砂 加 過 泥 子 精 錢 半 海 葱 蜜 根 甘 草 舍 利 別 各 一 息 香

右調勻每半時服一食匙 宜 一 小 半 蒸 熟 取 一 小

主治 喘 息 粘 痰 膠 凝 其 際 之 豁 利 難 者 之 宜 一

○第 一 千 三 百 四 十 七 方 銅 里 下 幾 各 錢 一 味 四

○藥 阿 魏 薤 謨 安 沒 尼 亞 幾 勿 擲 奈 亞 石 鹼 蒲 公 英 越

錢 各 二 金 硫 黃 錢 一 味 四 宜 一 小 半 蒸 熟 取 一 小

右調勻二小為丸衣石松粉早且午後及晡時服十九

○第 一 千 三 百 四 十 八 方 銅 里 下 幾 各 錢 一 味 四

黃 半 堂

○藥 蘆謨安沒尼亞幾各二錢 匣兒尼各一錢 加越幾斯 遠志越幾斯尼

右調勻二以為一九衣石松粉每服八九乃至十九日三次

○第一千三百四十九方同也 蘇公藥

○第七木香越幾斯二錢 硫砂加過泥子精半一錢 苗香水二

右合和每一時服八士滴 諸林之藥香也

主治一千三百四十七方ヨリ一千三百四十九方至粘液

喘宜シ 蘇公藥

○第一千三百五十七方同也 蘇公藥

○種胸劑料 葡萄草葉 麻爾羅歇葉各半 吹苗香水

右細剉供泡劑料

○第一千三百五十一方同也 暴劉私各一 和胸越栗失爾各一

土木香 伊里斯弗魯連底那根 甘海葱各一 安息香

沒藥 過泥子 甘草膏 精製蘆謨安沒尼亞幾各半

○藥 雜腹蘭三錢 五十三方同也

右調勻加再留燒酒一七如法作越栗失爾每服六十滴乃

至八十滴日數次 蘇公藥

主治右二方各一 喘息粘液分泌夥多ナル者

之ヲ用ヒテ稍肺ヲ強壯スルノ効アリ

○第一千三百五十二方 穢歇蘭度蔣蘿葡萄麥酒蘇公藥

蘇公藥

蘇公藥

蘇公藥

○藥 蔣蘿蔔屑五 麥酒二 益閉冷浸十二時加後味

沙糖舍利別

右調勻小盞抄服頻十二時或二十四時間服盡十五分

主治 小便閉水腫尿道粘液鬱積及粘液喘宜シ○刺

胃チ私ス名人八壞血病之用之佳効又得夕以示厥心

○第一千三百五十三方過傑栗屈的兒

沒藥水製越幾斯 麻爾羅歌越幾斯 精製蘆謨安沒

尼亞幾錢各二里錢金硫黃錢精製甘草膏錢 安島香

右調勻一匁為一丸衣石松粉每服四粒乃至六粒日三次

至四次

○第無千三百五十四方同上二 蕪荷水 心藥當水各三

○藥 阿魏 瓦爾拔奴謨 沒藥水製越幾斯各二 撒爾末

○小兒秩斯錢 橙皮丁幾宜適

右二匁為一丸衣石松粉每服二粒乃至五粒日三次

至三次無期一會日四次

○第無千三百五十五方同上

○藥 海葱末 葛秘加栗刺越幾斯各三 金硫黃是揮發鹿

角鹽錢各半 鷲過泥子油適 甘草膏宜 慈木丸

○右三匁為一丸衣石松粉早晚服八丸補一服

主治 藥千三百五十三方日一千三百五十五方至皆老

年虛弱家人粘液喘之宜之亦開亦三百五十五方並皆共

○第一千五百五十六方佛陽煎服八次

右方瓦爾振奴謨錢二海葱醋二勺溶解加後味服盡

主苗香冰方二喜民埤列里精錢二甘消石精錢一黃遏兒托舍

○藥利別方二五十五方同出

右調和每服一食匙日四次乘屈的兒

主治喘息濕氣起因也此者殊老老年弛弱惡液質人婦

人此症惟罹ル者之宜宜精製甘草膏

○第四千三百五十七方過傑乘屈的兒藥德六粒嫩爾衣

○藥琥珀鹽方二民埤列里精方二薄荷水 沙蘿蔔水各三

蘇白糖方半若調勻每時服一食匙酌適量香安

○第一千五百五十八方洞峇里木量艾藥安息香安

主蓮謨安沒尼亞幾錢一海葱蜜一勺溶和加後味理

右洋芹冰方三部眼安會堪尼酒錢二拔爾撒謨字露舍利別

右調勻每二時服二食匙香水三實亞蘇此盛半

○第五千三百五十九方獨餅下糖 甘草下糖各一糖對

○藥精製消石六鼠婦末杜松子末各海葱末九

右調勻為散等分九服早旦午後及日晡一服

○主治右無方千百五十七方至老年弛弱小便不

遠田方書 卷十三 粘液喘 十一 廣用堂

利症 兼 水腫 及 喘息 交發 者 小便 不利 症 之 三

○宜 隨 症 爲 辨 等 小 水 腫 早 旦 干 煎 及 日 煎 一 服

○第 禁 十 三 百 六 十 方 〔室 里 列 魯〕 干 木 各 加 鐵 慈 末 以

○藥 土 木 香 越 幾 斯 錢 半 地 榆 丁 幾 甘 草 丁 幾 錢 各 一 越 埡

○六 黑 和 胸 丁 幾 錢 附 三 食 曲 香 水 三 實 亞 格 地 温 三 半

右 調 勻 每 一 時 服 一 食 匙

主 治 粘 液 喘 三 宜 之 ○越 埡 里 和 胸 丁 幾 八 土 木 香 伊 里 斯

弗 魯 連 底 那 海 葱 甘 草 赤 珊 答 里 木 過 泥 子 沒 藥 安 息 香 安

沒 尼 亞 雜 腹 蘭 右 再 留 燒 酒 二 浸 漬 心 者 此 劑 肺 臟 粘 液 鬱

積 症 粘 液 喘 等 人 如 慢 性 胸 疾 二 四 十 五 滴 乃 至 六 十 滴

ヲ 服 ス ル 一 日 二 次 或 ハ 之 ヲ 他 ノ 密 幾 私 丟 爾 二 加 へ

用 之 然 氏 唯 粘 液 質 入 二 適 當 ス 此 香 水 八 二 藥 春 亦 舍

○第 一 千 三 百 六 十 一 方 〔別 連 杜〕

蘊 護 安 沒 尼 亞 幾 錢 二 雞 子 黃 適 宜 金 曲 香 水 五 礪 砂 加

○藥 過 泥 子 精 錢 三 十 安 質 沒 尼 酒 錢 二 拔 爾 撒 謨 字 露 舍 利 別

主 治 肺 氣 喘 咳 及 五 味 求 藥 等 且 一 千 三 百 六 十 四 方 至 粘

右 調 勻 每 一 時 服 一 食 匙

主 治 粘 液 喘 肺 臟 衰 弱 之 咳 咯 痰 之 難 治 症 窒 息 聖 京 極

用 フ 者

○第 一 千 三 百 六 十 二 方 〔藏 過 湯 設〕 八 心 積 氣 聖 藥 八 心 時 藥



○藥白芷半斤滾湯適宜浸漬飽熟八分時濾過取八分加後

味

○主幾那越幾斯錢二海葱越幾斯一礞石錢一加過泥子精錢一

右調勻每一時服一食匙

主治粘液勞及粘液喘宜宜

○第一千三百六十三方吐瀉蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

主護謨安沒尼亞幾錢二礞石錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

○第一千三百六十四方吐瀉蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

主亞刺昆亞錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

利別錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

者調和每半時服一食匙

○第一千三百六十五方吐瀉蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

主金硫黃錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

默栗薩水錢一海葱錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

右調勻早晚服一食匙

○第一千三百六十六方吐瀉蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

液喘宜蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

第三密兒刺爾錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

○第一千三百六十七方吐瀉蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

阿魏錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一蘇合香錢一

綿答幾里私布水三雜腹蘭舍利別半

○右調勻每半時或一時服一茶匙若一食匙

○主治密兒刺爾喘一宜一但阿魏灌腸ヲ兼用スベシ

樹筋一宜一時服一食匙

○第千三百六十六方戒歌蘭度ト催吐吐砥劑十四女至味

○煮酒石以蒸餾水一勺溶解加後藥

海葱蜜水沙糖舍利別各半甘吐根味加後味搗

右調勻每八分時與茶匙以至得吐和歌蘭

○主治多般ノ肺疾腦病義膜咽喉炊衝密兒刺爾喘百日效

等之一宜一是當胃中ヲ掃除スルノミナラズ又鎮瘧

ノ効ヲ呈シ能ク胃腦肺ノ異常交感ヲ治ス又以酒ニ

○第千三百六十七方戒歌蘭度

主阿魏錢民埏列利精錢亞刺毘亞護謨漿適ル加默

右調勻每半時服一小食匙亦合保根子泥及吐發泡膏

○主治初催吐砥劑研細以氣與後此乳劑外用阿魏

灌腸十三方百七大量麝香胸上吐腹及上脊推等鎮瘧藥

左塗擦及胸上芥子泥發泡膏ヲ貼スベシ

○第千三百六十八方篤優爾味西兒早半ヲ飲濾取三勺

上好麝香三鹿琥精一苗香水半過兒托舍利別

引我藥香... 腹曲香... 壹兒刺爾喘

○右調勻每二時服二茶匙對爾刺爾喘食匙

**主治**密兒刺爾喘宜之此藥膏湯胡美用之

○第卅升三百六木遠突土珉則又之香林萃之難盛藥

**車**續草錢和滾湯適宜泡出濾取四勺冷定加後味之同錢

小麝香心半鹿角精心身橙花舍利別半

右調勻每四分時服二茶匙臨用宜振盪保限一之

**主治**同上阿魏灌腸之兼用ス又之異亞蘇蘇蘇蘇蘇蘇

○第千三百七十方兼鑿典刺鷲鳩鳩飲衝密兒刺爾喘百日效

安息香花心碩砂加過泥子精錢半安質沒尼酒錢

○南海葱蜜百遠志舍利別過兒托舍利別各三錢

右調勻每半時服二茶匙三百十方兼鑿典刺鷲鳩鳩

**主治**密兒刺爾喘神經運營沈衰之窒息ノ懼アル者之

二冥之麝香心三心香至四五分此方ト更換ノ半時每二

用ノベシ兼テ香竄藥湯ニ浴シ胸上芥子泥及レ發疱膏

○右貼スベシハ十條大同上精龍腦精砂加石

○第千三百七十一方謨私篤

**建**甲方之陳爾雷間想之用ノテ之蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

宜王幾那錢三井水云云之煮將熟投續草半之絞濾取三勺

第四煎之加後藥三萬味萬對蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇蘇

遠五方集 卷十一 密兒刺爾喘 十六 廣 堂

硫酸規尼捏三 葛私篤カスト 儂ト 謨レ 丁幾ム 一 橙花舍利別半

右調勻每半時服一食匙蒸餅煉草半三 煎三

主治密兒刺爾喘間歇ノ間之ヲ用ヒテ後發ヲ防止スベ

○第一千三百七十一方（同）

○第二千三百七十一方（同）

用（七）方（無）香（原）藥（馬） 白（糖） 半（和） 每（二）

右調勻為散等分八裏朝夕服一裏室息ノ野（ヤ） 茶（ノ）

主治同上此方幾那煎（三） 百（七） 卜（更） 換（シ） 用（フ）

○第三千三百七十一方（同）

○第四千三百七十一方（同）

阿魏（半） 錢（至） 雞子黃（一） 箇（一） 卵（有） 治（先） 後（放）

右加纈草浸（四） 纈草（半） 徐（攪） 搗爛作乳劑二分供灌腸

○主治百日效密兒刺爾喘ニ宜シ並ニ阿魏ヲ内服セシム

○第一千三百七十三方（同）

主（荒） 菁（丁） 幾（錢） 複方白芷精（各） 龍腦精（各） 硫砂（加） 石（一）

灰精（錢） 蜡香水（二） 煎（日） 煎（三）

○右調勻塗擦胸上及脊椎

主治密兒刺爾喘ニ宜シ

○第四骨布喘（ア） ス（ト） マ（ト） マ（マ） チ（シ） キ（キ） ム（ム） ア（ア） 羅（羅） 白（糖） 餅（餅） 白（餅）

○主治密兒刺爾喘ニ宜シ

○主治密兒刺爾喘ニ宜シ

○第一千三百七十四方 [發健私的結魯]

青酸銹亞鉛附

甘汞各半

實芟答利斯末三分 白糖

右調勻為散分十二服日三服

○主治 [發健私的結魯] 之ヲ骨布喘ノ奇方ト稱ス暗別鬼

○備地名 患篤滿及 他醫毛亦 此効ヲ確徵セリ半歲乃

至一歲兒ノ用ニ供ス

○第一千三百七十五方 [患篤滿]

亞鉛華 甘汞

實芟答利斯 白糖

右調勻為散分八服每一時一服

○主治 三箇月ノ兒骨布喘ニ罹ル者ヲ治ス先耳後放蟻三

頭灌腸法及ヒ胸上脊椎ニ芥子泥ヲ貼ス百 於ニ平愈

○第一千三百七十六方 [同上]

百主 硫酸規尼捏骨曲香水 橙皮舍利別茶

右調勻每時服一茶匙期 其發汗輒普ニ愈ニ

○主治 骨布喘ニ用ヒテ發作ヲ預防ス此 宜シ

○第一千三百七十七方 [同上]

衝 硫酸規尼捏至 葭若根末 白糖錢

右調勻為散等分六服日三服天 服八 清涼劑即

○主治 骨布喘發作ヲ防止スルニ宜シ患篤滿欲 上方ニ兼

○症腰推不上頭按之頭痛ナルヲ部ニ蟻鍼兩條ヲ施シ蟻  
口瘡等此者后の列並油ヲ温メテ朝夕之ヲ塗擦シ皮表

赤色酒發以點心至其茶財

白糖

○第一千三百七十八方過私繆斯

主硫酸規尼捏亞鉛華白糖四宜痛ハ暗別兒

者調身為散等分ハ裏每服一裏日四次確徵七ハ半歲乃

主治ハ箇月ハ塊骨布喘ニ罹リテ皆方効ハ快者過私繆

○斯ハ此散方ヲ處七ハ之ヲ服ノ其發作確著ニ減シ二服

更ハ全ハ此ハ瀰瘦骨並七ハ患塊ニ年八百四十二年五

月年八百日ハ七月年七日至法文如之ヲ服ハ驚多ニ

昔キハ大量ニ至ハ規尼捏百九十九ハ亞鉛華四百四十ハ

ハ又盡ヌト雖之ガ為區此ハ害モ亦見ハ重量ヲ久終ハ平愈

百廿九方至千要ハ○ハ呢真百日効第一期在ハ

似也ハ劇証痙攣効ハ罹ル者屢之ハ亦鎮痙解釋劑百七

衝性ヲ帶ハ者ハハハ胸上ニ放蟻ハ内服ハ清涼劑即

消石。礪砂。少量甘汞等ヲ與フベシ然ハ腸胃瘵物ヲ帶ハテ

聖京僥性者多ハ此症解釋劑百九十九方至ハ用

遠西方書

卷十三

百九十九方

廣

遠西方彙 卷之三 百日效 二 廣 月 堂

兼示和胸舍利別及吐劑千三百六更換之施ス入須要

水千三百九青酸千三百九阿魏千三百九哥攝千三百九

祿沙千四百麝香千四百失鳩千四百菲阿千四百刺屈千四百

阿芙蓉千四百列儒千四百留私千四百烈千四百煙草千四百

至千四百等是千四百然千四百麻醉藥千四百以テ千四百制スル千四百

ル者千四百甚罕千四百ナ千四百ガ故千四百過用スル千四百勿良千四百大量千四百

著千四百シ千四百夕千四百害千四百致千四百ス千四百者千四百少千四百ニ千四百モ千四百ト千四百

硝酸銀千四百ヲ稱賛ス千四百或千四百ハ硝酸銀千四百ノ効少シト云フ者アリト雖

他病ニ用ヒテ亦駭ク千四百其ノ効ヲ奏スル千四百アリ又輓近鹽

酸千四百ヲ廢棄ス千四百ト雖其功用亦最大ナリ千四百蓋此症施治極

メテ簡易法ニ從事ス千四百ハ好トス千四百猶他病ニ於テハ力

如シ緩性和胸舍利別千四百安質千四百沒千四百尼酒千四百ヲ和用千四百又吐藥千四百ヲ互

用スルハ世間ニ通稱スル所ノ諸種ノ奇方ニ優リテ多ク

驗千四百ハ世間稱賛スル所ノ吐酒石膏ハ利益ナキノミナラ

ハ却テ小恙之力為千四百大患千四百ニ變シ千四百或ハ斃ル千四百ニ至ル者モ

亦聞之千四百但千四百戒千四百蘭千四百度千四百書千四百載千四百スル所ノ緩性吐酒石膏千四百

於千四百或千四百ハ骨布軟膏千四百ニ白降汞千四百ヲ加千四百フ力如未千四百ハ千四百

適宜千四百

遠西方彙 卷之三 百日效 二 廣 月 堂

廣 月 堂

遠西方算一 卷一 百日效 廣月 堂

一及對刺衝法トス○第三期ニ至リ患兒大ニ虚憊セル者

不遠志千四百四十方及ヒ光菁千七百四十方亦用ケル者ハ

方至千四百四十方而メ仍効嗽獨衰弱ノ為ニ荏苒除カサル者ハ

幾那或ハ規千七百四十方及ヒ依蘭苔千四百五十方

鎮痙劑ヲ配用シテ功ヲ收ムベシ諸軒ハ吾々ニ對テハ

○第一千三百七十九方 收失結名和胸丁幾又和藥ハ

甘扁桃油新絞 扁桃乳舍利別各七錢 亞刺昆亞 蘆蘆 謨謨

櫻實水半 櫻實水半 櫻實水半 櫻實水半 櫻實水半

右調勻為舐劑茶匙抄服 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬

〔主治〕聖京偃効痙攣効ニ宜シ 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬

○第一千三百八十方割曹秘

金硫黃三 阿芙蓉越幾斯二 白糖二錢

右調勻為散等分六裏朝夕服一裏 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬

〔主治〕大人痙攣効粘痰ヲ咯出スル者 咬衝狀既ニ退咬

后之ヲ用ケルハ沙三 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬

○第一千三百八十一方同上

過兒托根各半 黥失刺蘆葉各半 井水八 弓煮 耗至 六弓

投菲阿私 葉一 錢蓋 閉飽 熟四 分時 濾過 冷定 加後 味

○藥 阿芙蓉舍利別一 弓一 咬咬

右調和服一二食匙宜從其症消息 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬 咬咬



主治大人頑固人瘧瘵效宜

○第一千三百八十二方 [阿山]

蜀羊泉 莖越幾斯一錢 精製硝砂二錢 精製甘草越

幾斯三錢 井水七 藥各半 井水八 藥各半

右調和每半時服一食匙強

○第一千三百八十三方 [頭寧假秘]

主吐根未半 大黃未 勿擗祭亞石鹼 葛爾儒別越

幾斯錢各 二 藥各六 藥各六 藥各六

右調和二人為一九每一時半服五粒

○第一千三百八十四方

右菲阿私越幾斯一 吐根半 白糖半 白糖半

右調身為散分八服每時服二服

○主治第一千三百八十五方

人瘧瘵效宜 莖越幾斯半 藥各 藥各 藥各

○第一千三百八十五方 [福假篤]

主菲阿私越幾斯一 乳糖六錢 入其草一 亞刺昆亞蘆

藥錢 苗香油糖錢

右調和為散每服一茶匙以過熱水煎送下服三次及至

○次幾視半 藥各 藥各 藥各

○第一千三百八十六方 [歌權]

藥各 藥各 藥各 藥各

○藥阿芙蓉末 廿十實芟客利斯末

吐根末各五

非阿私越

○水幾斯錢半

廿八十二方何也

右調和加亞刺昆亞蘆謨漿少許為丸三十粒衣石松粉玻

璃攪收貯每一時服一粒

主治右二方併 百八廿五方 大人癩瘰效二宜陳畏亞蘇

○第一千三百八十七方骨布

入阿魏錢 萬莖越幾斯半 勿柄 亞石驗藥 南儒別越

右為命 十九夜石松粉每三時服二年 九百八十四六至大

○第一千三百八十八方遠 藥五粒

第老利鬼結爾斯 水半 如蒸餾水半 糖半 白糖半

右調和每一時乃至五時半服三茶匙或藥

○重治右二方併 三百八廿七方 上二同シ

○第一千三百八十九方帶 肝痛 田滿 蘭腫 病用 於之 緩下劑

古萬 莖越幾斯藥 一刺 昆垂 蘆謨漿宜 適 丁寧搗和加後

○第一千三百九十方非 阿味 亞蘇 藥二

非來 蘇亞 覆益子舍 利別 半蘇 眠舍 味限 每水 或意 藥藥

○右調勻每一時服二食匙或藥藥

主治癩瘰效不眠歌倚私的利藥 風シ 宜シ

○第一千三百九十五方叔 泥姪 爾破 鎮癩丸

主阿魏續 草末 各錢 亞鉛華藥 葛私篤 僕謨 刀二 莖若

越幾斯五草加密列越幾斯五適五 管錄五對五阿五荷五榮

○右二片為一九每服五丸乃至八丸愈三次

主治大人百日效及他種癩癰病之宜シ粒衣石粉粉玻

○第與千三百九十一方藏歌蘭度

主孕驗酒石錢一苗香水半滿那舍利別一宜海葱蜜二錢

○安質沒尼酒滴二十菲阿私越幾斯二

右調和為砥劑每二時服異茶匙宜丁寧匙味味

○主治二歲乃至四歲兒百日效第一期二用フベシ

○第與千三百九十二方阿苗香水二溶解加後藥半

古孕驗酒石半錢苗香水二溶解加後藥半

安質沒尼酒錢一滿那舍利別半墨與并舍利別半

○右調和每二時服一茶匙宜

主治一歲乃至二歲兒百日效及他病ニ於テ緩下劑

小參並其五外林對與五相解味伯里容二靈ス

○第與千三百九十三方同上苗香水三溶解

主蜀羊泉越幾斯錢半孕驗酒石一苗香水三溶解

谷加後藥其和明二茶匙火火明二身強行公具在

安質沒尼酒錢一苗過兒托舍利別錢六製法味幽舍利別限

○右調勻每二時服一茶匙宜

○主治四歲乃至五歲兒百日效宜シ○蜀羊泉越幾斯

生量加増シテ二刀ニ至ルモ可キ也○凡半泉強幾澳

○第一千三百九十四方海乙葛爾度

甘扁桃油錢六

苗香水刀四

舍鹿角鹽刀一

和胸舍利別刀半

右調勻小兒每一時服二茶匙大人服一食匙

主治百日效ニ宜シ○總テ乾效短ニノ離雞聲ヲ帶ビ所

謂勞效ニ類似シ而シ胸中恰モ絞窄スルガ如キヲ覺ユ

ル症並ニ其症依朴昆垓兒及ヒ歌倚私的里家ニ發スル

者モ亦弗陽名六此方ヲ用テ云テ外疎用テ文熱下瘳

○第一千三百九十五方

苦扁桃水刀一

菩提樹花水刀二

過兒托舍利別刀半

右調勻每一時服一匙布匙一匙蘇蘇蘇蘇蘇

主治小兒百日效ノ初起ニ宜シ起乃至其食匙

○第一千三百九十六方阿魏灌腸

患青酸滴二

過兒托舍利別

蒸餾水各半

併用シテ

右調和內玻璃壘黑紙被覆每身時半服一茶匙且二入

主治八歳乃至十歳兒ノ百日效瘧癩ノ期ニ宜シ○青酸

諸藥局ノ製法ニテナラザルニ故ニ其性強弱ヲ異ニテ

是ヲ以テ青酸ヲ處スル氏ハ能ク其製法ヲ確定スル

最要トスニテ

○第一千三百九十七方骨布

○策阿魏錢一百 亞刺昆亞蘊半 過見托舍利別

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒百日效宜 以為之阿魏ハ補給機ヲ減

殺以之終ニ瘰癧ヲ除クハ効又奏スルカハ没私穀優

地ノ貯孤人全之ヲ連進スルハ數週ニ始メテ稍效歟

ハ發作減スルヲ得ルハ曾テ良効アリ之見ズ且二人ノ

患者ハ阿魏ノ為ニ發熱セルガ故ニ之ヲ停メザルヲ

得ザリシト云フ

○第一千三百九十八方同上 宜

阿魏錢 加民垓列利精一弓搗爛投後味

綿塔幾里私布日雜腹蘭舍利別

右調勻每半時乃至一時服一茶匙乃至食匙亦布匙

○主治百日效宜 担阿魏灌腸四百方 千ヲ併用シテ

以之本方効速佐ハ 宜

○第一千三百九十九方同上 日煉

阿魏錢 亞刺昆亞蘊漿 宜

右為三十九衣伊里斯弗魯連底那末日服六丸以果實母

○斯少許送下ハ 宜

主治百日效宜 小兒驚風一四之 煉

○第四百四方方 宜

遠西方彙 卷十三 百日效 二十七 廣 月 堂

○第阿魏六八至刺加密列浸一

亞刺毘亞適謹宜

右研和為三歲以下小兒灌腸一回之料

○第阿魏一錢續草浸四錢二浸漬日亞刺毘亞適謹宜

右研和為三歲以下小兒灌腸一回之料始稍效

○第治右三方四百方同百日效密兒刺爾喘總于痙攣症

又諸液循行遲鈍又兼又者宜シ照查スヘシ方

○第治右四方四百方同百日效亞刺一糖一熱湯一

右調勻每服一茶匙日三次蘭會陰陽後味

侃私担篤治療書亦此方ヲ舉々而シ小差リ方中酒石

鹽三代一或一純精酒石一刃ヲ伍シ服法モ亦琶布匙

○第一千四百三方辯滯患都

酒石鹽一熱湯一沙糖一舍利一別一

右調勻茶匙抄服十二時内二次服盡

主治百日效三宜シ○其症聖涼極時期吐劑ヲ忌マサ

此者一先之ヲ與人后哥攝尼爾ヲ用フル上法ノ如ク

ス一合一款一

○第一千四百四方蓮利私靈香

亞一陳一異一亞一靈一靈一

遠西方集

通日方書 卷十三 百日效 二二八 廣 丹

○第上好阿芙蓉ハ上好麝香ハ亞刺昆ハ亞蓮ハ謨ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○第上好麝香ハ金硫黃ハ亞鉛華ハ白糖ハ

○藥麝香平夏桂油糖加亞刺昆亞蓮護右調勻為散蠟紙包裏安窩兼又小昔二最難用以

○主治百日效預防人効精味薰入香用ハハ却ハ之ハ

○第千四百九方五胡一眼効無熱症三用フハシ

○第菲阿松越幾斯平謝安質沒尼酒半ヲ溶化

右調和每服八滴乃至十滴日四次ハ各論華想非阿味

○主治百日効二宜シ○五六歲兒ノ用二供ス

○第千四百七方白母布列屈篤者之二宜シ

○刺屈點私非祿沙越幾斯二人至四次乳糖ハ四種

右調勻為散分ハ裏每服一裏日四次徐和更加後味

○主治同上○鎮靖藥ハ心動卓越ノ効アリ劇症モ亦之二

○第千四百七方栗屈的兒ハ効日宜シハハハハ

○第失鳩答越幾斯ハ苗香水二ヲ溶解加後藥ハハ若

○第阿芙蓉加安息香酸ハ不錢附種類ハ聖西氏藥傳紙

右調和每服一茶匙日四次元盛ハ狀アラバ速ニ後服ヲ

○主治同上殊ハ其症瘰癧ハ來ハ者爾宜シハハハハ

○第千四百七方二宜シハハハハハハ

○主治酒石ハ失鳩答越幾斯ハ爾蒸餾水二ヲ乃至四ヲ

○第融解加覆盆子舍利別半ヲ

○第融解加覆盆子舍利別半ヲ

○第融解加覆盆子舍利別半ヲ

○第融解加覆盆子舍利別半ヲ

○第融解加覆盆子舍利別半ヲ



右調勻每二時服一茶匙限半匙

主治百日效ニ適當ニ密幾私去爾核驗本ニ

○第一千四百十三方母噎過孫滿

主治鳩鴉葉末其開達格碌屈私未爾秩斯各一健質安

古那越幾斯適茶日白及尼酒半可溶化

右為百者十九夜石松粉初臨卧服二九乃至四九後漸加

十二丸乃至十六丸苗香末下款雜藥

○主治慢性刺衝效殊其症十歲已上ノ兒ニ在テ肺ニ炊

衝ヲ帶フル一ナキ者ニ宜シ乳糖

○第一千四百十四方穢歌蘭度痰咳下懷吐亦之ニ

莨菪越幾斯四濃厚苦扁桃水半可溶化

右每服五十滴日四次同芙蓉下卷亞陳異亞

主治百日效ニ宜シ○其症稍熱ヲ帶ヒ或ハ炊衝ヲ夾ム

○者及ヒ頭腦血鬱アル者ハ皆莨菪適當ナラズトハ莨菪

ハ至テ微量トイハ氏善ク效嗽ノ痙攣ヲ鎮靖ス之ヲ服

ノ面色煩紅并ニ腦ノ運營亢盛ノ状アラバ速ニ後服ヲ

停ムベシ

○第一千四百十五方同上

莨菪根一白糖一錢

右調勻為散分八服早晚二服藥二服二服二服二服二服二服二服二服

主治二歲乃至四歲兒百日效第二期瘧期二用之佳

十疳散

○第一千四百十六方蓮利私

新甲方

葭苈根心一精製阿芙蓉心半白糖心八

右調勻為散分八服朝夕一服神效

○第一千四百十六方同上

主乙方

的里亞加心葭苈根心阿芙蓉丁幾心亞刺毘亞

蓮錢護錢常水宜

右作煉膏攤革貼心窩

○第一千四百十七方同左

○第一千四百十八方同左

○第一千四百十九方同左

右細剉供泡劑料根心硫黃華心乳糖心

主治心細剉供泡劑料根心硫黃華心乳糖心

○第一千四百十七方同左

○第一千四百十八方同左

○第一千四百十九方同左

○第一千四百二十方同左

遠西方藥

右調身每以時服一茶匙臨用宜振盪期

主治各歲鬼百羊效每宜幾候

○第二千四百十八方

福極篤

葭莖根

五

硫黃華

錢一

純精酒石

五

苗香油糖

錢二

左調身為散分十裏每以時半乃至以時取一裏過見托煎

送服

○主治半歲鬼一百百效梟疽

○第一千四百十九方

施倚迷詩爾

○葭莖根和托歌爾散

各五

阿笑阿魏

錢半

蜀羊泉越幾斯

右調向三衣為一丸衣甘草末每服三丸乃至五丸纈草淡

浸劑送下每三衣次別期一茶纈衣至三茶纈衣與一衣

主治百兩效第三期步者之宜

○第一千四百二十方

骨布

服纈衣

○葭莖根

吐根

至

半

硫黃華

錢

乳糖

各半

右調和為散分衣服密紙包裹每服一裹沙糖水送下日四

次調身每服半食

主治三四歲鬼百重效

可十

○第一千四百二十五方

遠西方彙

卷十三

百日效

三十一

廣用堂

○黃芩苦葉品二注熱湯適宜飽熟四分時乘溫漉取二勺

正平冷定加後藥

○安質沒尼酒錢一百遠志舍利別錢六苜蓿量薄醋味

右調勻每服半食匙強日三四次酒石苗香油糖

主治十歲兒百用效宜京母一藥水越平在四

○第廿千四百二十果方越屑溫魯黃華良蘇各半

○黃芩苦葉良苦根各半熱湯適宜浸漉過取四勺冷定

○重如扁桃舍利別半勺宜

○右調勻晝夜每一時服一茶匙乃至二茶匙旬羊泉越幾斯

主治百日效宜其症聖京候之時期至熱驗此者

越屑溫魯名甘汞麻偃溫失亞實芟答利斯又配伍連

進テ綠便甘得後乃千葭苦方與又遠

屑溫魯氏之ヲ預防方患者ノ年紀ニ準メ一茶匙乃

至二茶匙ヲ取り日ニ三服セシム此ノ如ク之ヲ持久ス

ルヲ三週ニ至ル合雷阿芙蓉各一白

○第一千四百二十三方同上

精製阿芙蓉吐根末結兒茂斯密涅刺列各三白

○糖一錢一適云之五分之一香各服半勺之上云之目

右丁寧調和等分為十二服遠志舍利別和服日二三次

主治百日效瘧癰ノ時期其極度ニ及ビ膿様粘痰ヲ吐ス

此方至リ莨菪千四百二方二代天此方ヲ用ルベシ○小兒

未一歲滿夕ハ者ハ遠子屑子涅魯氏方中阿芙蓉ニ量ヲ

減緩或ハ之ニ代ヘテ麝香各服半ハヲ加レ上方ヲ服

ノ時嘔吐セザル者ハ他ハ吐藥ト番替ト與テヘシ白

○第一千四百二十四方藏歌蘭度

麻偃涅失亞ハ硫黃華各四舍電阿芙蓉液滴一白糖

右調勻為散分四服朝暮一服皆ハ平時ニ準テ一茶撮ハ

主治劇証百日效第二期ハ者之ニ宜シ但連進スル下勿

以テ末期ニ至リテ著シ久其效ヲ鎮靖スル者ハ阿芙蓉

ヲ以テ最トス然レ氏頭旋昏睡其他險重ノ證狀ヲ發シ易

ク或ハ患者ヲ斃スル至リ故是用ル臨テ最謹慎ヲ加フ

○第一千四百二十五方蘇魯下ハ劑留母交ハ於ハ後ハ養也

蘇阿芙蓉加安息香酸ト幾錢蘇魯交無類蘇魯一撮ヲ症ニ

右每服五滴乃至二十滴過兒托舍利別和服日二三次日

○主治三歲乃至六歲兒以百用效ニ宜シ兒ハ每服四分ハ

○第一千四百二十六方弗陽一ハ七歲ニ至レハ一ハ半皆

生阿芙蓉ハ至結兒茂斯密涅刺列ハ鹿角鹽ハ量白糖

蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交

蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交

蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交

蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交

蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交蘇魯交

右調勻為散分八裏每服一裏或八日二三次

主治六歲乃至歲兒百日效三宜然此服量稍過

○多十十中又二十六女香各服半上方服

○第廿千四百三十方迷謂爾宜香替以與フヘシ

○醋酸莫爾比捏半白糖味限味服日二三

右研和分六裏貼發疱硬膏剝表皮每晚撒敷一裏白糖

○主治百日效又治又甚稱譽了佛留母名及格列魯同

其効以確定也蓋賢垓兒麻質斯法トイヘ亦甚害

又招キ易キガ效天用臨最謹慎加最益也

○第廿千四百三十方羅遠其印動耳益水益也

百頭翁越幾斯一至續草二十四至六苗香油糖

○藥四千四百三十一方利別

右調勻為散分八服蠟紙包裹日三四服

主治百日效瘰癧時期之宜○屑矣突列爾名及七

焚同紙亦之ヲ贊美セリ殊美焚氏ハ阿芙蓉効チ疾疾

○亦之ヲ稱用セリ窒息效如キモ之ヲ用フル一二日

○主治百日鎮靖區服量二月乃至六月ノ兒ハ每服四分ハ

乃至半ハ一歲ハ上ハ七歲ニ至レバハ半皆

沙糖和用スレ日ニ三四次粘液夥多ナル者ハ海葱

○蜜一茶匙宛與テ吐ヲ得ルニ至ル

遠西初集 卷十三 百日效 廣丹 堂

○第一千四百二十九方 層突突列爾

○百頭翁越幾斯六三六至三乳糖錢藥錄卷十七卷長藥錄

右調勻為散分六服早晚一服八為二至八一八半習

主治百日效宜宜量二氏至六氏八氏每服四分

○第一千四百三十方 春姪隣

○列儒謨賴留私葉錢睡菜葉半熱湯適宜浸漬瀝取

主治六弓加蘆根流動越幾斯五弓○最突突氏爾氏

右調勻每一時半服一食匙藥日三服十八氏亦甚害

○第一千四百三十一方 連別倫歇懶

○列儒謨賴留私葉半滾湯適宜浸漬瀝取六弓先落菲

右調勻每一時半服一食匙藥日三服十八氏亦甚害

○菓甘草膏越栗失爾附二遠志舍利別弓

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪十八氏

主治右二方千四百卅方千百日效宜宜○隣渥名為證

徵諸據五列儒謨賴留私八私屢田國醫始メテ試驗

七最研會法以精七草越ノ効了止脈管ノ興奮機亢盛

○第一千四百三十三方 飛鷲澄兒宜蘇越兒名咳對藥硫

○葉吐根四百旃那錢列儒謨賴留私葉一熱湯適宜浸

○至六飽熟半時瀝取四弓溶白糖一弓冷定再加後藥

○石硃砂加過泥子精錢吳蜀椒連蘇蘇肥末布水苗香

百日期  
廣  
月  
堂

右調勻每三時服半食匙臨服宜振盪

主治百日期效宜其四色各能一已安再吐藥

○第一千四百三十三方西驚熱驚風吐乳

○藥煙草葉半熱湯適宜飽熟冷定瀝過取八勺加後藥

○藥扁桃舍利別半

右調勻每半時服茶匙

主治六二歲兒百日效宜之四歲乃至六歲兒八每服

茶匙八歲乃至十歲八每服三食匙トス

○第一千四百三十四方同上驚熱舍利別

煙草葉二吐酒石一亞刺毘亞護半白糖二

右調勻為散分二十服每一時一服

主治百日期效宜之

○第一千四百三十五方屋兒弗秘歌攪三服一食匙

○藥煙草葉越幾斯四分苗香油糖半

右調勻為散分十二服日三四服

主治百日期效宜之卓越ノ効アリ脈管ノ興奮機亢盛

セル者ハ小量甘汞ヲ配シ粘痰利シ難キ者ハ小量金硫

黄ヲ伍用スルシテ

○第一千四百三十六方謨私寫

煙草葉越幾斯半蜀羊泉越幾斯半肥束布水苗香



右數味各半勺溶鮮加後藥最效其半

○藥甘海鹽精半勺 六分

右調勻每服二十五滴乃至四十滴速志舍利別和服日三

次九分少量 煎過酒心抹藥任其藥水香少量 金蒜

〔主治〕百日效二宜シ六草 效八 服八 與奮六 溫

○第千四百三十七方

煙草葉錢一 白芷錢三 甘草半 香由半 六歲兒八 每服

○右熱湯適宜浸漬漉取八 勺每四分時之三服一食匙

〔主治〕百日效癩癩麻痺其他頑滯神經病二宜シ

○第千四百三十六方

又垂鉛華三 緬草二 白糖各半 財八 丹寧八

右調勻為散分六 服每一 時半八 服八 惡八 實八 香八 夫八 血

〔主治〕百日效癩癩期二宜シ八 劫八 期八 者獨速驗

○第千四百三十九方

藥海鹽精錢二 蒸餾水六 沙糖舍利別一

○右調勻每半時服一食匙

〔主治〕天兒百日效二宜シ殊二其症八 衝證既三退八 獨神

經力及心補給機八 變常八 証八 神經力八 盛八 胃八 粘

是八 見八 時八 期八 此方奇効八 但嬰兒八 海鹽精適當

初室見八 之八 用八 病八 時八 期八 拘八 骨八 十八

唯煖衝入期三於天絕平之ヲ用也サハル何之○骨布名  
 之ヲ用之テ鴻益アリ之者往々之ヲ嬰也云蓋百日效當  
 殆諸藥効ヲ奏シ難キ久病タリ而シ海鹽精ノ功用此  
 生如ク其レ偉大ト恐ラ久シ當今醫流之ヲ忘失セ此ハ  
 云隨其再米朝期一身身

○第百重四百四十方（秘傳） 蘇合味限

○藥精製丹寧（一公至） 乳糖（半）

右調勻為散分八服每一時乃至二時一服服一食匙

主治百日效ノ兒虛弱ニ粘液質或ハ惡液質ノ者失血  
 及下利ヲ合併セル症ニ用テ但煖衝証ハ丹寧ヲ

忌ハ胎兒名九歳乃至十歳ノ兒并人養之ヲ試驗セ

ハ服量始々毎服半杯日三四次漸次加身一ハニ至ル  
 其中十歳ノ女効嗽頻々劇發咯痰血ヲ交シ者獨速驗

○身呈シ十四日餘ニシテ全治ス然レ他兒ハ皆毫セ發作  
 減セズ經過モ亦更ニ速キ者ヲ見ズト云フ是須半年

○第百千四百四十一方 遠突止

○第百遠志（錢） 井水適宜煮濾過取四勺冷定加後藥  
 安質沒尾酒（一） 過兒抱舍利別藥末（錢） 又吹對和

右調勻每一時服一食匙氣責弱熱半杯煎取四勺茶山炭

○主治百日效第三期痰ヲ豁利スルニ宜シ

廣 半 堂

○第一千四百四十五方 春煙隣

遠志半錢 常水適宜浸漬飽熟半時漉取四可溶化炭

酸刺篤亞斯一刀並刺毘亞謹末一錢又加後味

過兒批舍利別煎煎煮熟而白食之藥

○右調勻每一時服一食匙

○玉治百日效 嗽衝證及熱退夕後之用又

○第一千四百四十六方 歌蘭度 煎外與八皆臺子愈并

其莞菁末半錢 甘扁桃去皮 溫水十 白糖半 煎乾 煎

右調勻作乳劑每一時乃至二時半服一食匙

主治百日效 末期咯痰粘膠三 子效 嗽衰弱又存スル

力為久久退力サレ者之二宜シ 煎外與八皆臺子愈并

○第一千四百四十七方 彌結魯 四百四十子 至百日效

莞菁末半錢 甘扁桃去皮 白糖二錢

右先大理石白研和後徐注溫水五可作乳劑濾過但不

用絞〇每一時半乃至二時服半食匙乃至一食匙須準年

齡消息 煎外與八皆臺子愈并

○第一千四百四十八方 遠突志 煎外與八皆臺子愈并

莞菁粗末 白糖水 亞刺毘亞謹末各二錢 煎外與八皆臺子愈并

○藥一加後味 煎外與八皆臺子愈并

甘扁桃乳平 煎外與八皆臺子愈并

煎外與八皆臺子愈并

○右調勻每服半食匙乃至一食匙日四次

○第一千四百四十六方〔瀝格魯杜〕熱半時瀉取四勺溶化炭

幾那茶褐色者半勺井水五勺煮濃取三勺冷定加後藥味

○第一千四百四十七方〔同上〕右調勻每服半食匙日四次

芫菁丁幾錢半安質沒尼酒錢半扁桃舍利別一

○第一千四百四十八方〔同上〕右調勻每服二十滴粘汁點服日四次

芫菁丁幾錢半安質沒尼酒錢半白糖半

右調勻每服二十滴粘汁點服日四次

○第一千四百四十九方〔同上〕末期ニ用テ此期ニ在テハ芫菁殊効ヲ稱ス按スルニ芫

菁腎臟ニ及對刺戟ヲ起シテ以右胸腹ニ涉ル神經ノ

機運ヲ轉變セシムルヲ以テ但之ヲ用フルハ尤小心ヲ要

ス〔同上〕第一千四百五十方〔同上〕對刺戟法トシテ之ヲ用

硫酸規尼捏六分至一分白糖錢一

○第一千四百五十一方〔同上〕右調勻為散分六服朝朝一服

衰弱ヲ存スルガ故ニ欬嗽連綿退カザル者之ニ宜シ此

期ヲ在テハ規尼捏半鎮痙藥一酏用五及最適當トス

殊ニ其症著シクハ規尼捏半更ニ鴻益アリ

○第一千四百五十二方〔同上〕衰弱ヲ存スルガ故ニ欬嗽連綿退カザル者之ニ宜シ此

期ヲ在テハ規尼捏半鎮痙藥一酏用五及最適當トス

○第一千四百五十三方〔同上〕殊ニ其症著シクハ規尼捏半更ニ鴻益アリ

○第一千四百五十四方〔同上〕殊ニ其症著シクハ規尼捏半更ニ鴻益アリ

○第一千四百四十九方 杏仁膏 杏仁 酥 糖 更ニ煎益ヤリ

○依蘭苔 甘草 各半 煎常水適宜煮漉取之 加白糖一

右調勻每一時服一匙若一食匙 煎後對燒酒一匙

主治 百日效粘液分泌夥多且久シク退カザル者後

治法 煎汁之ヲ用フヘシ 煎

○第一千四百五十方 穢歌蘭度

依蘭苔 傑列 乙半 甘草 舍利 別

右調勻每一時服一茶匙 煎

主治 百日效後治法トシテ之ヲ用ルヘシ 煎

○第一千四百五十一方 同上

吐酒石 錢 家猪脂 半

右調和作軟膏每日取豆大塗上擦心窩 煎

主治 百日效第二期ニ方リテ反對刺戟法トシテ之ヲ用

フ ○鏡典利篤 名ノ軟膏之ヲ小兒ニ用フルハ猛烈ニ過

ク 骨布 名ガ白降永膏ハ 六百卅 稱用スベシ 參校

此症ハ普ク世人ノ知レルガ如ク 橫膈膜痙攣 爲短促

引ヲ頻發スルナリ 其症過食急答或ハ輕易ハ 聖京函

天起ル者ハ 多クハ 煩

遠西方彙

卷十三 百日效

廣月堂

○第一千四百一十九方

依蘭草 甘草 常水適宜者濃取七寸加白糖一

右調勻每時服一匙布匙若一食匙

心骨中 入 來自利表新藥 多 百世 肺風 又 少 送 力 ナル 者 後

○驗典 依蘭草 月 痺膏 又 小 貝 二 用 八 益 照 二 盛

○重 試 百 世 效 第 二 賦 又 捷 速 痺 去 一 心 之 用

亦 隨 味 於 痺 膏 每 日 用 豆 大 黍 新 以 寫

右 調 勻 每 時 服 一 匙 布 匙 若 一 食 匙

遠西方彙卷之十三

遠西方彙卷之十四

○又 米 出 東 二 藥 對 十 三 百 五 十 五 藥 計 海

獨 乙 加 藥 安 頓 著 加 藥

和 蘭 非 傑 婆 婆 都 譯 費 羅

侍 醫 法 眼 貫 齋 伊 東 真 文 仲 重 譯 林

南 洋 伊 東 亨 健 夫 參 校

吃 逆 羅 蘭 精 神 疲 倦 入 必 不 二 友 八 亦

此 症 普 久 世 人 知 之 如 夕 橫 膈 膜 癭 癭 樣 短 促 索

引 頻 發 ス ル 十 止 其 症 過 食 急 餐 或 ハ 輕 易 聖 京 屈 因

テ 起 ル 者 ハ 微 患 ニ ヲ 多 久 ハ 頓 治 ス 凡 者 下 切 然 氏 若 母

廣 半 堂

ヲ延キ週ヲ逐ヒ或ハ月ヲ累又ル片ハ尋テ危險ノ症ヲ發  
 或ハ斃ルハニ至ル者アリ熱病或ハ内部激衝ニ起因ス  
 ル者ハ極メ升重症トス○通常ノ吃逆ハ呼吸ヲ歇メテ極  
 メテ吸氣ヲ内ニ保持シ些ノ冷水ヲ徐々ニ飲下シ或ハ沙  
 糖一塊ヲ含ミ徐々ニ融解セシメ以テ之ヲ治スルニ足レ  
 リ或ハ卒然驚駭等ノ事アリテ驟ニ心思ヲ轉スレ速即休  
 スル者モ亦間之アリ或ハ嘔噎ノ如キ激動ヲ挑起メ即効  
 ヲ得ル者アリ故ニ非扑葛刺ホカラの私ス名ナ弗フ忽ホ弗フ滿マン同トウ等トウ嘔オウ藥ヤク  
 ヲ用フ又吐藥及ヒ催吐劑チキ千チ四シ百ヒ五フヲ用テ頑固不吃逆  
 良効ヲ得シ者多シ又冰粒殊ニ硫酸キウ千キ四シ百ヒ五フヲ奇藥ト稱

又阿芙蓉アハス菲阿私ヒアス葛私カス篤ト儂レ謨ム麝香セウ良莖リョウ曼陀羅華マン亞鉛華ア  
 硝酸毘私ヒス繆篤ミウ等ノ如キ鎮痙藥殊効アリ外用ハ胃部乾角  
 法芥子泥發疱硬膏ヲ貼シ或ハ吐酒石軟膏及ヒ他ノ刺戟  
 藥鎮痙藥ヲ塗擦シテ妙ナリ全身浴モ亦甚聲價アリ

○第一千四百五十二方的失結百

金硫黃キン亞鉛華ア精製消石セイ白糖ハク

右調勻為散分十八服日六服

主治的失結百吃逆ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得シ者多シ

○第一千四百五十二方戒魯達

收斂亞的兒シウ覆盆子フ舍利別セ

錢ニ六ニ廣半堂

右調和每四分時取六十滴水三食匙點服

主治頑固吃逆宜之○或叔泥姪爾氏間越栗失爾茂

印尖屈篤附水多量ヲ加ヘテ稀淡以テ施用セシ

下兩方効迅速且持久セリ○又順侃名ハ硫

黃精用ヒテ以テ良驗ヲ得者屢之ア調藥格蒲仙

名モ亦骨片法健地名病院於テ之ヲ用ヒ同効ヲ得夕

藥ト云フ塗擦ト云フ金良ト云フ亦甚ト云フ

第一千四百五十四方弗西暴兒吐不燥膏又ト云フ陳煉

礪砂加過泥子精錢刺賢姪兒精長用ハ胃腸

右調和塗擦同葛ト云フ葛ト云フ葛ト云フ葛ト云フ

主治小兒吃逆留セル症宜日服藥ト云フ

胃瘧カハル吐ル逆ル羅ガカトハルガトハルガトハル

胃瘧治モ亦醫ノ專着眼スハキ者其原因ニ蓄血或

慢性痲衝原トク者ハ胃部ニ放蟻或ハ其症ニ從テ

肛門若クハ婦人陰部ニ之ヲ施スヲ須要ト或ハ放血ヲ

要スル者モ亦往々之ア腸胃惡物ヲ掃除ス藥者ハ解

釋緩下ノ劑ニ宜シ門脈系ハ畜血因地者モ亦同方法ヲ

處ハ可ト又此ハ如キノ症ハ孕驗酒石胃解釋苦味ノ越

幾斯ヲ配スル者ハ五十方五十二及七複方旃那昆設爾弗附

卓越ノ効アリ倭麻質斯ニ因ル者ハ肉服雙鸞菊越幾斯百

藥ト云フ藥ト云フ藥ト云フ藥ト云フ



四方至六方 格爾夫屈護子酒加阿芙蓉液 甘朮加龍腦ヲ良ト

外用芥子泥發疱硬膏或以吐酒石軟膏六百世五方及

其他之反對刺戟法六百世九方至六百世六方至

者ハ麻痺涅失亞六百世九方及其他之制酸劑至千四百五十五方ヲ

用之後黃味藥ニ宜シ神經過敏ニ係ル者ハ鎮痙藥ニ宜シ

殊ニ亞硝酸毘私繆篤ヲ以テ最品トス千四百七十七方至

又清酸鍍亞鉛附千四百七十九方青酸亞鉛附千四百七十九方結晶硝

酸銀千四百八十三方莖菪千四百八十四方至千四百八十四方番水鼈千四百

百七十八方等殊効ヲ奏スル者ハ此諸種ノ塗擦藥九百十三

九方至七方四百九及七硬膏千四百九ハ内服藥ヲ佐ケテ亦効ア

リ蓋シテ戒之攝生ヲ節セサレハ全効ヲ收ム者罕ナリ

トス亞硝酸亞蘇蘇甘肅蘇蘇甘肅蘇蘇甘肅蘇蘇甘肅蘇蘇甘肅

吾又此ニ次ニ胃軟化症ガストロマラヲ略述ス此症ノ

監別並ニ其原由ヲ探究スルニ未詳明ナラズ治法モ亦確

實ナラズ蓋腦病及脊髓病結節腫神經熱等ニ繼發ス而

ノ其腦病脊髓病モ亦慢性胃病ニ末期ニ繼發スル者トス

○輓近胃軟化症ノ主方トシテ丹寧酸ヲ稱用ス

○第一千四百五十五方穀優蘭篤ニ亞硝酸銀蘇蘇

○吐根赤曹達乾枸橼根末各二ニ宜シ

右調勻為散分六服每朝一服

廣月堂

主治胃瘕酸敗液並腸胃衰弱ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十六方弗栗結

藥過炭酸曹達十勿擲祭亞石鹼錢各二亞硝酸毘私繆篤

○錢一蘆薈越幾斯氏三

右調勻一氏為一丸衣石松粉每服八粒日三次

實主治胃瘕及上疝痛酸敗液及上膽液分泌之失常等ヲ兼

鹽及此者之ニ宜シ神

○第一千四百五十七方謨秘篤

亞刺毘亞蘆謨甘扁桃油錢各六加密列水薄荷水

實蓋各三如麻屈涅失亞錢三水製大黃丁幾實亞格地焜

各一忽弗滿錢一

右調勻每百時服二食匙臨服宜猛力振盪

主治胃瘕酸敗液ヲ兼ル者之ニ宜シ外

○第一千四百五十八方過傑栗屈的隗隗

括尖亞屑石灰水六吋浸飽熟十二時後暫時煮沸

至成瀉過加後藥

薄荷水錢二橙皮舍利別半用宜熱盪

右調勻每一時服一食匙尖亞

主治胃瘕胃中酸敗液三原ツク者之ニ宜シ

○第一千四百五十九方伯漢名複方扁桃乳水

○葦菲阿斯子錢一 甘扁桃去皮半錢 稀淡苦扁桃水八錢

○主治巴上作乳劑濾過如後味々々 皆之二宜三

白糖錢一 煨製麻屈涅失亞 錢一

右調勻每一時服一食匙強臨用宜振盪

主治此方胃瘕及嘔吐胃ノ感覺過敏及ヒ酸敗液ニ因

ル者ニ屢試驗セリ○先菲阿斯子ヲ搗碎シ後扁桃ヲ加

○方ルヲ好トス然ラサレハ搗糊ノ間菲阿斯子ヲ道

○又櫻實水ヲ以テ扁桃水ニ代ルモ可ナリ

○第一千四百六十方至 霸憫調製宜 薄荷水

甲方

右 蝸 蝸 石半錢 薄荷油十滴以沙糖 薄荷油附 薄荷水薄

○藥 荷 舍 利 別各一 舍 電 阿 芙 蓉 液錢半 薄荷水八錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙或ハ搗碎兒精加羌

主治胃瘕ニ宜シ○魯百弗蘭屈以之 霸憫氏ニ 奇方

○亦ハ 兼テ 左ハ 硬膏ヲ胃部ニ貼不 正ス

乙方

○藥 刺 佛 達 尼 硬 膏附 龍 腦 阿 芙 蓉各半 拔 爾 撒

亦 謨 字 露適宜 魚 翅 膠六 身 煨 如 至 胃 瘕 難 宜 然

右作硬膏不 處ハ 硬膏ニ 貼不 正ス

○第一千四百六十方過 傑 栗 屈 的 兒製 秘 心 膏

遠西方藥 卷十四 胃瘕 五 廣 堂

○第阿魏錢百薄荷舍利別一子溶解加後味

水薄荷水八

右調和每四分時服一食匙以至胃瘧鎮定

○第一千四百六十二方溫私萬魯弗地過兒別爾私

阿魏半亞硝酸毘私膠篤各半纈草油錢

右二為一丸衣橙皮末每一時服五丸

主治右二方千四百六十一方胃瘧風脹因丸者三宜之

又阿魏灌腸兼用又千三百

○第一千四百六十三方過條栗屈的兒藜蘆水三

硝砂揮發華水附加密列舍利別錢各六加密列水三

右調勻每四分時服一食匙以至胃瘧鎮定

主治胃瘧冒寒二因丸者之宜止兼心窩三發疱膏ヲ

貼之或ハ硝砂揮發加龍腦阿芙蓉膏或ハ捲埴兒精加芫

菁了幾ヲ塗擦以文ハ盛學並ハ宜心

○第一千四百六十四方弗陽

第九爾拔奴謨牛膽錢各半越質屋布斯安質沒尼錢一

○第十鳩峇越幾斯錢白石鹼半

右調勻二瓜為一丸衣石松粉朝夕服二半粒

主治胃瘧局處ノ疾患ヲ繼發スル者之宜止陽日

ヲク近頃一婦人胃痛劇甚ニ吐逆便秘ニ心痛脊二

徹又灼之カ如キヲ覺スル者此九子ヲ用ヒテ治セリト云ク  
按スルニ此方服量過多ナリトス初朝夕十九ヲ與  
後漸ク加ヘテ二十九ニ至ラズ則佳ナリ

○第六千四百六十五方〔刺藪〕

吐根末五錢 大黃末半 達刺佩篤蘆 藪藪 漿適

右為二十九衣挂末朝暮服一二九五九

〔主治〕腸胃之衰弱及ヒ瘕瘰症ニ宜シ

○第七千四百六十六方〔滑〕

吐根末五錢 格綸僕越幾斯 韋韋 固者以燒酒 宜適

右為四十九衣葛蒲根末每二時服一二九五九

〔主治〕胃部壓迫疼痛膨脹ヲ宜シ

○第七千四百六十七方〔刺律〕

吐根末五錢 亞硝酸昆秘繆篤 檉檉 亞亞 麻僣濕失亞 錢錢

右調和為散分十二服日三四服

〔主治〕倭麻質斯性神經性胃瘕失血セントスル者ニ宜シ

○第七千四百六十八方

亞硝酸昆秘繆篤 檉檉 亞亞 麻僣濕失亞 錢錢 白白 纈纈 草草 油油

○第七千四百六十九方

右調勻為散分六服蠟紙包裹日三服

○第七千四百六十九方

〔主治〕胃瘕

○亞硝酸昆私繆篤十五分至薄荷油糖半刀

右調勻為散分六服每六時一服三服上初朝夕十九

○第一千四百七十方朴瀝愁至薄荷油糖半刀

○亞硝酸昆私繆篤十五分姜八分牡蠣未亞正白糖錢

右調勻為散分八裏每服取一裏加密列或薄荷泡劑和用

○第一千四百七十一方秘拔爾訖

○第一千四百七十二方秘拔爾訖

○亞硝酸昆私繆篤半刀續草越幾斯錢續草油十亞

○草草未適百六十分燒酒宜

右為六十九衣玻璃壘收貯每服六九日三次

○第一千四百七十三方戒歇蘭度

○亞硝酸昆私繆篤二分菲阿私越幾斯一分麻屈涅失亞一分

○藥半刀加耶普的油一分白糖一分

右調勻為散分十二服每三服

○第一千四百七十三方骨布

○亞硝酸昆私繆篤三分刺屈黥私非一分沙越幾斯一分

○藥半至二分麻屈涅失亞四分吐根至半加密

列油糖或薄荷油糖半刀木薑子一分大蘇蘇一分

○右調勻為散分十二服每日三四服

主治千四百六十八方ヨリ千四百七十三方至胃瘕ノ試

遠西方彙 卷十四 胃瘕 廣

驗方下又百六十分方至四百六十分至胃瘕

○第一千四百七十四方福俣篤

亞硝酸毘私繆篤各半 番木鱉越幾斯各半

麻俣涅失亞

白糖十五 薄荷油三 如麻至半 白糖九

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半取一裹加密列

○泡劑和服百六十三方

主治感覺敏捷ノ人胃瘕ニ宜シ

○第一千四百七十五方私葛爾老

亞硝酸毘私繆篤六分 荳蔻越幾斯三分 亞

○大黃末三 白糖半

○右調勻為散分十二服日三服

主治之ヲ服スルハ十二裹乃至十六裹ニメ通例胃瘕ヲ

治スルニ足レ然レ爾後仍毎日一裹ヲ與テ以テ再

發ヲ防遏スルヲ好トス ①之ニ兼テ心窩或ハ心窩ニ對

面ノ脊椎ニ荳蔻膏ヲ貼スベシ若其症倭麻質スノ致ス

所ニ由ル者ハ更ニ妙トス 實艾答條十二 艾八 艾至

○第一千四百七十六方好弗

亞硝酸毘私繆篤六 荳蔻根六 大黃末二錢

甘草越幾斯蒲公英越幾斯各適 艾用 ○艾致

右二氏為一九衣石松粉玻璃壘杖貯每服三丸日三次宜

主治胃瘕極久頑固之症先解劑ヲ用上テ後之ニ宜

シ並ニ胃口硬結腫ヲ生スルニ始メ之ヲ用フ○叔泥姪

爾以此丸ヲ切用ヲ確定セリ藥性大黃

○第一千四百七十七方新附秘

實芟荅利斯末八分至 實芟荅利斯末八分至 實芟荅利斯末八分至

面蠟末四分 實芟荅利斯末八分至 實芟荅利斯末八分至

右調勻爲散分八服日二三服ニ兼ニ以當延ハ以當ニ

主治第十對神經ノ瘕瘰症瘕瘰瘕胃瘕等以治ス殊ニ

管系ノ興奮機亢盛ヲ兼スル者ニ好トス

○第一千四百七十八方同上

亞硝酸毘私繆篤刀 蘆薈水製越幾斯半 過兒托末

主治神經科胃瘕胃瘕瘕其外餘ノ瘕瘰瘕ニ宜シ○

右調勻加達刺侃篤護漿適宜爲四十九衣白桂末朝夕

服三粒至八分至 蘆薈水製越幾斯半 過兒托末

主治胃瘕腹内ノ畜血膽液分泌ノ滯滯大便秘結等ヲ兼

併セル者之ニ宜シ

○第一千四百七十九方顯寧獨

青酸鎂亞鉛附半 煨製麻屈涅失亞四 桂皮三

右調勻爲散分四服毎二時一服ニ宜シ

主治胃瘕ヲ治ス

遠西方書 卷之四 胃瘕 七 廣濟堂



○第一千四百八十方弗肝爾田蒲蘭突

青酸銹亞鉛二氏至白糖錢

右調勻為散分六服每一時一服

○主治胃瘕宜其症二後フテ六服中二阿芙蓉二氏

方加フ青酸二氏一

○第一千四百八十方骨布

青酸亞鉛附十二分氏一續草油糖宜適

右調和為散分六服蠟紙包裹每一時一服

○主治神經性胃痛間歇頭痛其他總テ神經痛二宜三○此

方亦心メ用フ要ス骨布氏感觸靈敏メ人メ最初每

服十六分氏日三四次トス或ハ漸々增加メ半氏一氏二

氏或ハ二氏二至レリ然氏一氏一用フル日異數面

及ハ劇甚メ頭腦畜血症火苦悶神經過敏メ重症或ハ

間歇戰慄發ス一法健良診爾不半キ

○第一千四百八十二方刺曹秘

結晶硝酸銀半伊里斯弗連底那根錢爾不半キ

右調和加亞刺昆亞蘊護漿少許為丸四十粒衣伊里斯弗

魯底那每服一九乃至三九日一次服一氏二至三氏二

○主治胃メ感觸尤盛症胃瘕癩癩二宜三

○第一千四百八十三方賜帝尼都

遠西方藥 卷十四 胃瘕 十一 廣月堂

○第 結晶硝酸銀五 蒸餾水適宜溶解加後藥

主 蒲公英越幾斯五 益甘草半錢各 蘇二宜

右調勻為二十九衣過兒托末朝暮服一九乃至二九

主 治 胃瘕三宜 又粘滑液又兼服七

○第 一千四百八十四方 里 穢歌蘭度老利兒結爾斯加莨菪

○第 一水四百八十二方

問 莨菪越幾斯四 老利兒結爾斯水半

右溶和每服三十滴日三次乃至四次

主 治 食道胃及腸 頑固瘕瘳 噯噎慢久嘔吐 胃硬結腫

初起 又神經病 宜之

○第 一千四百八十五方 祿斯

莨菪越幾斯二 剝篤亞斯水錢一 薄荷水五 大黃水

製丁幾 大黃舍利別各一

右調和每一時服一食匙

主 治 慢久嘔吐 胃中污物 因

結節腫 姑息方

○第 一千四百八十六方 母 謁 渴 樣 滿

莨菪根半 撒爾末兒秩斯一 硫酸規尼捏二

麻 伍 涅 失 亞半

右調勻為散分六裏朝夕取一裏沙糖水和服

〔主治〕胃脘酸敗液若膠入膽液分泌失常ヲ兼ル者之ニ宜

○第一千四百八十七方

番木鱉一 麻屈涅失亞半

右調勻為散分八服日四服

〔主治〕私吐トク屈忽魯母トク婦人病院ニ在テ胃脘症ニ兼テ

嘔氣噎氣口味不佳胃部膨脹等ヲ患フル者ニ此方ヲ用

ヒテ良驗アリ

○第一千四百八十八方〔福屈篤〕

番木鱉十八 吐根二十 大黃一 牡蠣二 薄荷油

藥糖二

右調勻為散等分十三裏每一時半乃至二時取一裏默栗

薩泡劑送下其其外則內熱藥或ニ宜又疾疾ニ用テ

〔主治〕胃脘ヲ治ス食理難或熱熱二三盞飲出未日則盡用

○第一千四百八十九方〔弗栗質〕

番木鱉子丁幾一井水三

右調勻每一時半乃至一時半服一茶匙

〔主治〕胃脘疼痛灼クカ如キ者之ニ宜之ヲ服ソ總テ多

脂酷厲ノ食餌及ヒ飲酒ヲ戒或ハ其景況ニ從ヒ哥喜

モ亦禁スル片ハ通例四日乃至八日ニ於テ治ル其他諸

般不胃瘧並二三子宮病即月經痛及經閉子宮出  
 血等宜及癩癩。病因痔血閉者。慢性下利。慢性痢疾。脫  
 肛。小兒遺尿。海上病。嘔吐。妊婦嘔吐等。弗栗質名此方夫  
 用時。其佳効。得之。和云。相一茶匙。

○第一千四百九十方刺曹秘本

○葡萄草葉一錢至 著草葉一錢至 甘草一錢至

右細剉調勻取一食匙強注熱湯二三盞泡出一日服盡用

主治胃瘧及他腹內瘧癩症宜之又痔疾二用フ○

刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名 刺曹秘名

○第一千四百九十一方泥結別爾低名暴埜

大黃水製丁幾各半 忽弗滿液各半 橙皮丁幾各半 葛秘

○第一千四百九十二方兒錢

右調勻每三時半服茶匙各半

主治單純歇倚私的里性胃瘧發作之間隙二乘之ヲ用

凶。纈草浸及ヒ阿魏灌腸ヲ兼用タル者宜シ

○第一千四百九十三方私葛爾老

甘草一錢 葛爾老一錢 麻屈一錢 失亞一錢 謁陳佛一錢

煖白糖一錢 右調勻為散等分十二裹日服三裹以至見甘汞瞑眩之候

主治胃瘧既慢性胃瘧衝變也此症宜之內羹汁或

之雞子黃ヲ加フル者及ヒ乳漣ハ此症ニ無味ノ滋  
 養劑トシ但毎服必ニ食匙乃至三食匙ニ過ズ添テス  
 數次ニ分テ半時毎ニ與フヘシ便秘スル者ハ灌腸ヲ  
 行フテ可ナリ然レ甘汞ノ能ニ由リ速ク暗綠色ノ大便  
 〇ヲ利シテ太ニ輕快ヲ得ル者多シ上方一劑ヲ盡メ既ニ  
 嘔吐休ミ脊ノ煩痛モ亦立地ニ歇ム者少シトセズ甘汞  
 少量十二分乃至二十四分餘ヲ要スル者ハ窄ナリ〇更  
 〇劇甚ノ症ハ心窩若クハ脊ニ艾灸ヲ施スヘシ用フ  
 〇第一千四百九十三方〔弗爾田蒲蘭度〕  
 拔爾撒謨阿波德兒突古一錢 阿芙蓉液一錢

右調勻塗擦心窩日四次

〔主治〕胃ノ痙攣痛ニ宜シ

〇第一千四百九十四方 戒歇蘭度名入 鎮痙軟膏芙蓉下錢

〇揮發加龍腦膏一錢 加耶普的油 綿苔錢 幾里私布油各半

右調勻塗擦胃部

〔主治〕胃痙ニ宜シ 並ニ菲阿斯葉加密列ノ温暖琶布及

〇芥子泥ヲ貼テ胃部ニ冷水ヲ射注スベシ

〇第一千四百九十五方 過傑栗屈的兒

肉豆蔻油錢 薄荷油 刺賢堙兒油各十 再留琥珀

錢 薄荷油 刺賢堙兒油各十 再留琥珀

錢 薄荷油 刺賢堙兒油各十 再留琥珀

油錢半揮發鹿角鹽半

○右調勻塗擦心窩正處寒風吹處是二過之力ラ

○第一千四百九十六方同上水一塊裁不入之者ハ灌腸

的里亞加宜胡桃油各茶阿葛私篤儂謨雜腹蘭東方

按爾撒謨字露錢各一得枸橼油滴廿上龍腦錢半

右調勻塗敷麻布以貼胃部

○第一千四百九十七方同上華由由ス漸者幾里水由由各半

○第一千四百九十七方同上華由由ス漸者幾里水由由各半

○第一千四百九十七方同上華由由ス漸者幾里水由由各半

右調和醃紙貼心窩四水方何美家方

○主治一千四百九十五方日身熱半四百九十七方至胃脘

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

○第一千四百九十八方一百過歌士名胃膏エムム。テラスト

主治胃腸之衰弱及ヒ痙攣ニ宜シ○此良膏ハ殊ニ善ク  
肌膚ニ牢著スルヲ以テ他方ニ優レリトス

○第一千四百九十九方茂杜

丹寧酸二刀至 桂水葛亞刺 毘亞薤護漿

右調勻毎一小時服一食匙

主治大人並ニ老人ノ腸胃軟化症ニ宜ク

疝コリカ羅

疝ノ醫治每症左ニ規則ニ著眼スルハ扁桃油亞刺毘亞薤

護製乳劑十五方 裸燕麥汁 亞麻仁煎等ノ如キ粘滑油性藥ヲ

與ヘテ疼痛ヲ緩和シ安リニ起熱藥ヲ用スベク又恐ク

必キ之方為ニ腸焮腫ニ轉變スレバナク外用鎮痙藥腹上

乾煎法香竄温罨法菲阿斯油及ヒ揮發膏十五方等最的當

トス殊ニ鎮痙緩下ノ灌腸法千五百十八方ト佳トス灌腸

ハ汚物ノ常ニ腸中ニ鬱畜シ疝ヲ持續シ且其レヲ益盛

ナラシムル所者ヲ排泄スルヲ以テ鴻益アリトス下劑

ヲ内服スルニ每次必効ヲ得ルヲ難ク痛一處ニ住著ノ劇

甚ニ且灼クガ如ク之ヲ按スルニ堪ハス者發熱スル者ハ

忽焮衝症ニ轉ズルノ懼下リ此症彼此ヲ論セズ速ニ放

血シ後吸角法ヲ施メ之ヲ防制セズ下ルベク又疝

ハ能ク肚腹ヲ觀察シ顔傳窟有無ヲ檢スルニ既ニ疝痛

ヲ鎮靖<sup>レ</sup>得<sup>テ</sup>天后緩和下劑<sup>ヲ</sup>與<sup>ス</sup>不<sup>レ</sup>然<sup>ル</sup>但衝動<sup>セ</sup>ザル劑<sup>ヲ</sup>  
 好<sup>ク</sup>又<sup>シ</sup>疝<sup>ハ</sup>每症各自<sup>ノ</sup>治法<sup>ヲ</sup>下<sup>ス</sup>ベシ<sup>ニ</sup>○即多血<sup>ニ</sup>  
 因<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>痔血若<sup>ク</sup>ハ經閉<sup>ニ</sup>原<sup>メ</sup>久<sup>ク</sup>者多<sup>シ</sup>是刺絡<sup>或</sup>ハ局  
 處瀉血<sup>ヲ</sup>急<sup>ル</sup>勿<sup>レ</sup>○膽液太過<sup>ニ</sup>因<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>先乳劑<sup>五百</sup>  
 方<sup>五百</sup>卅<sup>二</sup>里歇利飲<sup>方一</sup>及<sup>七</sup>橙汁<sup>食匙強</sup>與<sup>ス</sup>後答  
 方<sup>千五百</sup>方<sup>二</sup>麻林度滿那<sup>孕鹼酒石</sup>五百<sup>七十三</sup>方<sup>五百</sup>七<sup>十五</sup>方<sup>至</sup>  
 下劑<sup>ヲ</sup>投<sup>シ</sup>而<sup>シ</sup>疼痛已<sup>ニ</sup>鎮靖<sup>セ</sup>天后適宜<sup>ノ</sup>吐劑<sup>ニ</sup>鎮瘻  
 劑若<sup>ク</sup>ハ植酸<sup>ヲ</sup>配用<sup>ス</sup>例<sup>ス</sup>ル<sup>ニ</sup>吐根純精酒石<sup>ヲ</sup>和用<sup>ス</sup>  
 ル等是<sup>ナリ</sup>○腸胃汚物<sup>ニ</sup>因<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>先解釋劑<sup>四十九</sup>方<sup>至</sup>  
 後其症<sup>ニ</sup>從<sup>テ</sup>瀉藥<sup>五十六</sup>方<sup>至</sup>五百<sup>十九</sup>方<sup>七</sup>百<sup>或</sup>ハ吐藥  
 四<sup>十</sup>方<sup>至</sup>七<sup>百</sup>五<sup>十三</sup>方

二宜<sup>ニ</sup>○風氣痞滯<sup>ニ</sup>因<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>所謂驅風劑<sup>千五百</sup>三<sup>方</sup>至  
 千<sup>五百</sup>十<sup>方</sup>

ヲ稱用<sup>ス</sup>○膽石及腎石<sup>ニ</sup>因<sup>ル</sup>者<sup>ハ</sup>強實多血<sup>ノ</sup>人<sup>ニ</sup>在<sup>テ</sup>  
 ハ多<sup>ク</sup>嫩衝性<sup>ヲ</sup>帶<sup>ブル</sup>故<sup>ニ</sup>能<sup>ク</sup>其候<sup>ヲ</sup>認<sup>メ</sup>先刺絡  
 或<sup>ハ</sup>蟻鍼<sup>ヲ</sup>施<sup>シ</sup>後鎮痛罨法<sup>及</sup>ヒ塗擦法<sup>全身浴</sup>ヲ施<sup>シ</sup>油  
 質粘滑<sup>ハ</sup>乳劑<sup>ニ</sup>菲阿斯<sup>ヲ</sup>和用<sup>廿五</sup>方<sup>百</sup>等好<sup>ニ</sup>腎石疝  
 二在<sup>テ</sup>ハ阿芙蓉<sup>モ</sup>亦佳<sup>ナリ</sup>但膽石疝<sup>ハ</sup>之<sup>ヲ</sup>用<sup>フル</sup>勿<sup>レ</sup>  
 何者此症<sup>ハ</sup>大便通利<sup>ヲ</sup>好<sup>ム</sup>故<sup>ニ</sup>却<sup>テ</sup>阿芙蓉<sup>之</sup>ヲ閉澁<sup>ス</sup>  
 レバ<sup>ナリ</sup>○小兒疝痛<sup>ハ</sup>酸敗液<sup>及</sup>ヒ風氣痞滯<sup>ニ</sup>由<sup>テ</sup>起<sup>ル</sup>  
 者多<sup>シ</sup>能<sup>ク</sup>相當<sup>ル</sup>方<sup>千五百</sup>卅<sup>二</sup>方<sup>至</sup>ヲ處<sup>ス</sup>ヘシ

○第一千五百方<sup>戒歇蘭度</sup>

遠西方彙 卷十四 疝 十一 廣野堂



○第廿扁桃油新絞亞刺昆亞蘆謨錢一苗香水三上好

○第廿滿那半扁桃乳舍利別子食匙一周原

右調勻作乳劑每一時服一食匙

主治腹部創傷。傷麻質斯性及上喉衝性疝。宜之閉

○第廿千五百一方洞七野

實味甘扁桃油新絞者井水五亞刺昆亞蘆謨漿適

右調勻作乳劑加後味五全良

○第廿上好滿那一帶孕鹼酒石四錢至其扁桃乳舍利別半

右調勻每一時服二食匙

主治疝。用七疝疼痛。瘰癧。鎮。且微瀉。促。宜。

○第廿千五百二方秘泥埋

○第廿精製阿芙蓉一以至格綸僕末四

右調和為散等分四裹每服取一裹葡萄酒半盞和服

主治疝專胃中。係在。者之。宜。

○第廿千五百三方栗屈的兒

○第廿纈草辨加密列錢滾湯適宜浸瀝過取多冷定加

後味對藥七藥帶滿系化

○第廿葛私薦儂謨下錢橙花舍利別半

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

遠西方藥 卷十四 疝 十一 廣府堂

主治純粹神經性ノ腹内痙攣症及痙攣症ニ宜シ上好

○第一千五百四方獨上 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百五方同上 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百六方孤刺優越 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百七方速別倫歌愷

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百八方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百九方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百十方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百十一方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百十二方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百十三方歌倚私 刺蘇合散半

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百十四方歌倚私 刺蘇合散半

人二用之... 宜之... 宜之...

○第千五百九方 五散... 宜之... 宜之...

薄荷油滴十二 甘消石精一錢 溶化

○右調勻每服十滴沙糖和服日三次

○主治頑固風氣痞滯及七風氣症二宜之

○第千五百十方 速別倫歌日三四次

右過泥子油糖一錢 前橙皮黃一錢 蘇麻一錢 屈涅失亞一錢 加大黃散一附

○第千五百六方 宜之...

右調勻為散內私葛點刺名器 每服一茶匙日三次

○主治胃腸不瘕瘰症殊二風氣痞滯宜之風氣痞滯宜之風氣痞滯宜之

○第千五百十一方 附藥魯

沒食子細到者 注滾湯一匙飽熱十二時

右瀉過每服一食匙日四次

○主治風氣症宜之 吾儕未風氣痞滯症二沒食子ヲ稱

用スルヲ見スト 雖阿藥魯名 碩學伊士 何以此方

ヲ載セサルヲ得シヤ且阿藥魯明 礬乳七 亦

此症ニ賛美セリ

○第千五百十二方 附歌蘭度

硫黃華 麻屈涅失亞錢二 精製阿芙蓉 吐根各三

右調勻為散分十二服日四服

主治 癩麻質斯性若久日 依屈篤性ノ疝ニ宜シ

○第一千五百十三方 散 藥 蘇藥阿芙蓉 如射各三

○第一千五百十四方 同上 藥 生明礬 精製阿芙蓉 如射各三

右調和為散頓服 沙糖和服日三次

主治 所謂粘液疝 又レキ腹痛劇甚ニ禁玻璃杖粘液亦

○第一千五百十五方 症ニ陽氏累年上方ヲ用ヒ偉効アリ此稱

又瘰癧性風氣疝 生明礬佳効 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

右兼服者ハ之ヲ忌ム 若其汚物ヲ無スル者ハ先灌腸法

及ヒ其他相當ノ劑ヲ與ヘテ之ヲ排除スル也

○第一千五百十四方 同上 藥

麻屈涅失亞 脫分 純精酒石 刃半

右和勻頓服

主治 嘈雜風氣痞滯 疝腸胃汚物或ハ畜血ニ因ル者之ニ

宜シ 蘇藥不レレ氏腸胃汚物 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

○第一千五百十五方 過傑 栗屈的兒

格綸僕越幾斯 錢二 水製大黃丁幾 刃三 桂水 刃三 忽弗

滿液 錢一 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

右調勻每服一食匙日三次 吹所稱也

主治 疝治ノ後腸ヲ補益スルニ宜シ 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

○第一千五百十六方 佛律屈涅疊 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

蘇藥不レレ氏腸胃汚物 蘇藥不レレ氏腸胃汚物

黃蠟 勿搗祭亞的列並底那錢各二 瓦爾拔奴謨 越

列密附各 巴上四味上慢火熔解加後味

葛私篤 樓謨附 加密列加枸橼油附

右調和作硬膏貼胃部若肚腹

主治胃瘕瘕孿疝其他肚腹瘕孿症宜 抄水各

○第一千五百十七方私託爾屈

菲阿斯油 白罌粟油錢各六 礪砂加石灰精 鹿琥精

舍電阿芙蓉液錢各一 期胃各 畜血二 因各

右調和作軟膏塗肚腹日二次

主治風氣疝宜

○第一千五百十八方私

綿荅錢 幾里私布葉 菜沃刺那葉錢各二 石鹼錢一

右細剉調勻分四貼每用取一貼水各 盞泡出灌腸

主治同上

○第一千五百十九方過傑栗屈的兒

燕麥去皮 加密列各一 井水適宜煮濾過取八各 加

主治左味各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各 蘇各

右亞麻子油 蜂蜜各一 煮各 煎各 煎各 煎各 煎各 煎各 煎各 煎各 煎各

右調和供灌腸

○主治疝各 用各 七各 大便各 促各 促各 促各 促各 促各 促各 促各 促各 促各

遠西方藥 卷十四 二十三 度 朋 堂

○第一千五百二十方 野福屈列兒各二鎮瘕灌腸方以誤

歌爾拔斯屈謨花 罌粟球錢各二 鮮加後味

右細刺乳汁及水等分煮濾取十寸灌腸

主治黃疸胃瘕疝吐糞病箱頓貌儂屈便秘腸ノ感覺過敏

ヲ兼九者及七假陣痛等ニ宜水煎宜煮數回ハ三味

○第一千五百二十六方 謨私薦

甘扁桃油新絞六錢 雞子黃適宜 取已上二味加加密列水

右顯草水各四寸作乳劑再加後味蓋所出載

菲阿私越幾斯水 老利兒結兒斯水半錢 實亞格地

○藥温系 五百十八方女傳

右調勻每半時服一食匙

主治膽石疝宜シ ○但先肝臟ノ部ニ緩和藥ヲ塗擦シ

全膿蒸漏法或ハ微温湯浴ヲ行フベシ 或ハ其症ニ後

放血モ亦可ナリ殊ニ肝部放蟻ヲ妙トスハ 其

○第一千五百二十二方同上

過兒托軟膏菲阿斯油 礪砂揮發加龍腦膏各一

○萬舍電阿芙蓉液錢二 的列並油錢一

右調勻朝夕塗擦肝部

主治膽石疝宜シ

○第一千五百二十三方 佛刺

○ 莨菪越幾斯十五 家猪脂半

右調和作軟膏塗擦腎及膀胱部

主治劇証腎石痛宜之

○ 第一千五百二十六方 蘆薈半 葛弗志半

糊砂濃厚者 苦扁桃水各一錢 默栗薩水四

右調和每半時服一食匙

○ 主治月經痛宜之經血將來二 煉二 入二 時及止其已

合藥二 初之二 用二 之二 ○ 又委中之刺絡且陰部放蟻

手要スル者少シトセズ 緩和二 布二 貼二 而後刺戟藥中

三足ヲ浸ス等皆佳ナリ 月經不調ノ條ヲ參照スベシ

○ 第一千五百二十五方 羅仙私 的印小兒乳

菩提樹花水二 黑櫻實水二 甘扁桃油新絞者 酒石

右調和每四分時乃至半時與一茶匙

○ 主治小兒腹痛ノ殊効方也

○ 第一千五百二十六方 護利秘 間學 蘇摩 甚々 昔ハ 蘇摩 半

苗香浸 苗香水各二 麻屈 涅失 亞十五 舍電 阿芙

右調和每二 時與二 一茶匙二

○ 主治小兒疝痛胃中酸敗液二 因ル 者之 二宜シ

○ 第一千五百二十六方 護利秘 間學 蘇摩 甚々 昔ハ 蘇摩 半

右調和每二 時與二 一茶匙二

○第一千五百二十七方 救渴耳

鹿琥精四滴 舍電阿芙蓉液二滴至三滴

橙花舍利別一

右調勻應用初生兒未滿一月者每服一茶匙晡後一服夜

初更各服

○主治小兒風氣疝二宜シ ○夜間攣痛劇甚ノ者ハ叔渴耳

杜名之ヲ與スルルヲ二茶匙ニ止マラズ尚且半茶匙乃至

茶匙ヲ服セシム前ニ屢戒ムルガ如ク小兒病ニ阿芙

蓉用フルルハ最謹慎ヲ加フベシ小兒生下後一月ヲ過

ク者ハ更ニ鹿琥精ヲ加増スルモ舍電阿芙蓉液ハ四

滴ヲ以テ極トシ必之ニ過グルルヲ勿レル

○第一千五百二十八方

蘇扁桃油新絞 亞刺昆亞護護未半 菩提樹花水一

密列水半 已上四味搗和作乳劑後加滿那舍利別

右調勻每一時服一茶匙

○主治小兒風氣疝便秘スル者之ニ宜シ

○第一千五百二十九方 弗栗結

甘扁桃油 亞刺昆亞護護未各 礪砂加過泥子精二

過兒托煎二 冰糖錢 小茶ハ蘇扁桃油一

右調勻每半時或一時服二茶匙



主治二三箇月乃至二歲兒疝痛下利又嬰兒ノ粘液膜  
 諸病ニ宜シ若其症熱ヲ兼ヌル者ハ礪砂加過泥子精ニ  
 代ヘテ消石半錢ヲ加フ水瀉甚シキ者ハ吐根末ニ以テ  
 加フ千五百二十分（中略）

○第一千五百五十五方（同上）ハ赤クニ宜シ者ハ故滴平

百廿乘（十二分）吐根（末十六分）白糖（半刀）且半茶匙乃至

右調勻為散分十二服早晚一服（小兒病ニ阿美）

七消胃腸病經久下利疝痛等ニ宜シ又幼兒ノ瘰癧或ハ

消對病其因皮膚運營ノ障礙ニ因ラザル者之ヲ用テ心

○第一千五百五十六方（同上）ハ赤クニ宜シ者ハ故滴平

○第一千五百三十一方（同上）ハ赤クニ宜シ者ハ故滴平

○又過泥子油錢（四錢）肉豆蔻（拔爾撒護）附（二錢）

禾五（粉）塗肚腹（中略）苦熱善子亦收（下）

藥主治腸ノ痙攣症ニ宜シ殊ニ小兒ニ用フヘシ又痙攣性

下利ニ佳ナリ（中略）苦熱善子亦收（下）

○第一千五百三十二方（篤優爾黠亞兒）非阿麻散（中）

至正阿魏（八錢）至（中略）亞刺昆亞護（護）適（中）

實右研和供灌腸（中略）味用（中略）

主治幼兒風氣疝ニ宜シ（中略）明驗藥（中略）八剋不藥（中略）

鉛毒疝（コリカサキルニナ）羅（ロドニリキ蘭）一（中略）帝（中略）藥（中略）

遠西方彙 卷十四 廣勝堂

鉛毒症ハ專便秘ヲ治スルヲ以テ第一義トス而シテ又疼痛

及シ其他ノ諸証ヲ鎮靖スベシ即鎮痙藥或ハ峻下藥ニ油

質乳劑殊ニ蓖麻油ヲ以テ製スル者ヲ和用スヘシ

至千五百 鎮痙藥ノ中ニ就テ阿芙蓉 千五百 卅六方 至

卅五方 卅五方 卅九方 葶藶 千五百 卅五方 菲阿斯烟艸

トス並ニ番木鱉 千五百 卅四方 葶藶 千五百 卅五方

斯篤揭私名ノ灌腸法 掘刺歇私名ノ毡布等ヲ稱用ス峻下

藥ハ巴豆油 千五百 卅四方 最殊効アリ 葶藶 千四百 卅五方

汞 千五百 卅四方 或ハ單味或 旃那 芒硝等モ亦効アリ

○又 錳 千五百 卅四方 至 葶藶 千五百 卅四方 硫酸 千五百 卅四方

六方 一 功用更ニ劣レリ ○諸經驗法 エムピリ ノ中ニ就テ

百年来巴黎私都府病院ニ於テ施用スル所ノ方法 千五百

最稱 卅五方 卅三方 卅三方 卅三方 忽弗滿液

○第 千五百 卅三 方 卅三 方 卅三 方 卅三 方

蓖麻油 卅三 方 雞子黃 卅三 方 和 已上 二味 加 罌粟 舍 利 別 一 方

苗香水 六 方 徐徐 搗 和 作 乳劑 再 溶 化 後 味 三 方 卅 三 方

○第 千五百 卅三 方 卅三 方 精製 芒硝 卅三 方 至 用 フル 者 卅 三 方

右調勻 每半時 服 一 食匙 乃至 二 食匙 臨用 宜 振盪

主治 鉛毒症 宜シ 又他病 用 以 卅 三 方 卅 三 方

○第 千五百 卅三 方 卅三 方 蓖麻油 卅三 方 亞刺 毘 亞 蘆 護 卅三 方

遠西方書 卷十四 二百九 廣野堂

四等徐徐搗和作乳劑再加後味以上二和味藥商

○第 舍電阿芙蓉液滴十二 旃那丁幾一 藥或八峻下藥二油

右調勻分為四服每二時一服臨用宜振盪

主治 鉛毒疔 宜二 身瘦八 天食瘦用宜 非盡

○第 一千五百三十五方 佛 陽 已上其味加櫻實水三等徐徐

莖麻油六 鷄子黃箇一 搗和作乳劑再加後味以上二和味 嬰粟舍味 佛

○第 石鹼一錢 十 阿芙蓉八 扁桃乳 舍利別半 亦効アリ

右調和每一時服一食匙

主治 鉛毒疔 宜二 藥用八 佛五 佛五

○第 一千五百三十六方 磨連 歌 憶

右商芙蓉 龍腦各五 加密列 越幾斯一 忽弗滿液

加密列 舍利別各一 日 加密列水四

右調和每一時服一食匙

主治 同上 ○ 阿芙蓉 鉛毒疔 良藥 正一 確實ナリ 或

阿芙蓉單味一 以一 半時每二 以一 至用一 者一 蒲

里層的名 數年來阿芙蓉二 以一 至黃時每日用一 且之

又灌腸之 又硬膏二 作一 于肚腹二 貼一 而一 瀉劑一 兼用

スル一 日一 ナシ一 四一 服一 一一 部一 半一 一一 服

○第 一千五百三十七方 佛 胎 爾 田 蒲 藤 度

遠西方藥 卷十四 廣 脾 堂

○第精製阿芙蓉二錢 甘草四錢 白糖錢

右合勻為散分四服每一時半一服

○第一千五百四十一方同 龍腦二錢 硫黃華 白糖各

右調勻為散分四服每一時半一服至用

○第一千五百三十九方施爾禮斯

右每服十滴乃至三十滴日四次 鱘魚油

○第一千五百四十方會 鱘魚油

右每服十滴乃至三十滴日四次 鱘魚油

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治私吐屈忽兒暮地 婦人病院於 鉛毒症

○第一千五百四十一方噶拉

主治銘毒症宜之○明礬銘毒ヲ治スルノ功用其說未詳著ナラズト雖此症ニ卓越ノ一奇藥ナルヲ確實ニシテ疑ヲ容レズ略百列魯名大抵明礬ノミヲ用ヒテ他藥ヲ要セズ服量一晝夜六錢ニ至ル之ヲ粘滑藥煎ニ和用ニ兼テ油藥ヲ灌腸セリ此藥ハ

○第一千五百四十二方蓮都眼銘毒症ニ且迄ハ三日ニ入

○主罌粟子引常水引已上作乳劑濾過溶明礬半錢再

加後味引日四服

沙糖舍利別引日四服

右調勻每二時服ニ食匙臨用宜振盪

主治銘毒症ニ宜シ○明礬ノ量漸ヲ以テ加増スベシ

○第一千五百四十三方乾度聞

在明礬錢蒸餾水四勺溶化加後味

亞刺昆亞護謨舍利別引一服

右調勻分為四服

主治同上○之ヲ服スルニ前一時又後半時患者ヲノ飲

食ヲ斷シシムベシ若之ヲ服ノ吐若クハ瀉スル片ハ服

量ヲ減スベシ

○第一千五百四十四方同上

生明礬錢蒸餾水四勺溶化加後藥引

硫酸礬 柵木幾附各十滴

右調勻每半時服一食匙

此方前方二較スレハ効力更ニ優ルベシ他

第一千五百四十五方同上 亞爾節兒二對 柵木幾十五滴

右調勻每服四蓋 大約容日三次

第一千五百四十六方同上 上作乳劑濾過以明礬半錢再

右調勻每服五日 三次要聞

主治右二方千五百四十五方 銘毒症三宜 然氏硫酸

第一千五百四十七方同上

第一千五百四十八方同上

第一千五百四十九方同上

第一千五百五十方同上

第一千五百五十一方同上

第一千五百五十二方同上

第一千五百五十三方同上

第一千五百五十四方同上

第一千五百五十五方同上

第一千五百五十六方同上

第一千五百五十七方同上

第一千五百五十八方同上

第一千五百五十九方同上

第一千五百六十方同上

第一千五百六十一方同上

第一千五百六十二方同上

次臨至冬之ヲ歷試スルヨ四百六十人ノ中六百八十人  
 除單味也豆油ヲ與ヘ兼テ隔日并瀉藥灌腸ヲ施シ並ニ  
 灑杜吉篤屑爾水鑛泉名ヲ用テ其餘八十人ハ巴豆油ヲ與  
 ヘテ即日瀉下灌腸ヲ施シ兼テ毎日阿芙蓉半以ヲ服セ  
 之ニ或ハ阿芙蓉液五十滴ヲ灌腸セリ巴上通計四百六  
 十人ノ中四百二十五人ハ此法ニ由テ四五日內ニ癒ニ  
 其他不治ノ者ハ巴豆油ヲ為ル劇吐ヲ發スルガ故ニ後  
 服ヲ進ル能ハス且其治セシ者ノ中再感セシ者纔

○第二十八方巴豆油 能治一切之瀉 且其治セシ者ノ中再感セシ者纔

○第一千五百四十八方羣的劑 治一切之瀉 且其治セシ者ノ中再感セシ者纔

○同藥刺巴脂 白石鹼各一 硫磺加爾幾 半其方式ハ  
 右調勻一以為一九衣石松粉每一時乃至一時半服四九  
 乃至五九

主治鉛毒疝ニ宜シ ○羣的劑先續草 及上 旃那浸ヲ  
 與ヘテ後此丸ヲ用テ亦舍利劑ニテ加テ

○第一千五百四十九方刺鬱秘  
 護謨安沒尼亞幾 肝色硫黃 蒲公英越幾斯各一

白石鹼 大黃赤各半 阿芙蓉越幾斯三  
 右調勻一以為一九衣石松粉玻璃壘杖貯每一時服五粒

主治鉛毒疝頑固ニ便秘治メ后之ヲ用フベシ

○巴黎私都府病院療法 時疫の或るに用くべき百人

鉛毒症ノ患者初入病院ニ入ルヤ醫之ヲ診シテ發病時

時期ヲ論セズ即伯印的爾名人夫瀉下灌腸法ヲ行フ其方

左ニ如シ名祖奇麻黃煎劑阿莫瑟藥液名服セ

○第一千五百五十五方名灌腸セリ已土通計四百六

甲方名對地山土用ク又以此法ニ由テ四五日内ニ癒ス

主旗那葉名常水名十二号煮瀝取名六号加後味名酒

安質沒尼酒名四治セシ者ノ中再感セシ者總

右調勻名六九歲一試亦不試者一試八至一試半名四

○同日所謂偈刺印名阿沒勒劑ヲ服セシム其方左ノ如

シ第ニ日早且復上ノ煎劑ニ此ヲ取テ四分三用フ或ハ

乙方煎劑名再々煎煎劑去時發道且噴里致味與煎

酒酸加里曹達名後吐酒石名三方ノ鎮痛灌腸法ヲ施シ

右調勻或ハ私匹那屑非舍利別名テ加テ名栗名一

○晚ニ方テ左ノ鎮痛灌腸ヲ施ス名與テ其方左ノ如シ

○胡桃油名四赤葡萄酒名十煎名煎名與テ

○其後一時半ヲ經テ的里亞名煎半錢半及ヒ阿芙蓉一尺

半ヲ與テ名煎劑煎劑名私匹那屑非舍利別

○翌日名施治ノ後方ヲ服ス



丙方

半吐酒石六 蒸餾熱湯八

石溶種先服其半後經半時服餘半雞糞法阿芙蓉方

○送服吐不得後以右次ノ煎劑ヲ與フ

丁方

癩瘡木 薩沙弗刺私 舍律茯苓 薩兒沙巴栗刺各一

甘草半 里曹半 十劫半 煎取八分加後味

右常水半 北煮瀘過取二 北煎二 北吐對

○又晚ニ方テ再次鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ服

セシム

○第三日早且復上ノ煎劑ニ北ヲ取テ四分ニ用フ或ハ

之ニ旃那葉更加テ 發汗瀉下 午時再單方發汗飲ヲ與ル

力箭ノ如クテ 日晡ニ至リ 先伯印的 爾氏ノ瀉下灌腸

ヲ施シ一時ヲ經テ後更ニ第二方ノ鎮痛灌腸法ヲ施シ

且的里亞加及 阿芙蓉ノ合劑一服ヲ與テ 驗試 驗試

○第四日又伯印的 爾氏ノ瀉下飲ヲ與テ 其方左ノ如シ

戊方

○旃那葉錢 熱湯適宜浸出瀘取六 湯加後藥不 煎煎

亞芒硝半 藥刺巴末錢 私匹那肩 非舍利別 附一

右調和對發汗 瀉下 煎煎 且且 煎煎

○又午後發汗飲ヲ與へ晚ニ鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ與フ  
 ○第五日又發汗瀉下飲ヲ與へ晚ニ第一方ノ瀉下灌腸ヲ施シ後一時ヲ經テ又第三日ノ如ク第二方ノ鎮痛灌腸法ヲ行ヒ並的里亞加阿芙蓉ヲ配用ス  
 ○第六日又下劑ヲ用テ後止ノ單方發汗劑及ヒ鎮痛灌腸法ヲ施用シ的里亞加阿芙蓉ヲ配用ス  
 夫抵下利ニ行テ得テ病勢ヲ制伏ス若疼痛連綿セザル時更ニ猛烈ノ瀉藥ヲ連進シ疼痛鎮靖ス  
 至ルニ峻藥モ尚効ナキハ三時毎ニ百伯的兒ノ瀉下丸ヲ與フ其方左ノ如シ

癸方

上好蘆薈 大黃 越幾斯 各半  
 藥刺巴 越幾斯 墨列

僕里 越幾斯 蘇甘 沒扭 越幾斯 各十  
 私匹 那屑 非舍

利別 附 適

右為六丸

已上列載丸所ノ者ハ鉛毒病ヲ療ルニ復法醫示即巴黎私ノ諸病院ニ於テ一定ニ用フル所ナリ  
 病院ヲ建立セシ時之ヲ創制セリ故ニ下劑及ヒ阿芙蓉ヲ以テ主藥トス之ヲ稱用スルヲ二百年來ニシテ匹

人之ヲ經驗良法ト名之病院ノ治驗表ニ據ルニ二十二年間  
 出法ヲ以テ鉛毒症ヲ療スルハ千三百五十三人之中  
 蒙就テ死スル者纔ニ六十四人ト云々也昔故  
 上款之方法ハ一千八百二十二年弗郎西  
 及七蒲羅葛私同上ノ鏤行セシ葛的爾加樂室私扶暨  
 名書  
 ヲ所拔萃スル所ナリ  
 後止メ單方發汗劑及心鎮痛灌

○第一五五番五十方 蘭結

大英勞越幾斯大黃亞的兒 老利兒結爾斯水

右調勻為軟膏塗擦肚腹 痛鎮靖

主治鉛毒症 宜シ 蘭結人ハ先半身浴ヲ施シ癒創膏

失鳩答龍腦的里亞加吐酒石ヲ和メ硬膏ニ作り以テ

肚腹ニ貼テ發疹セシメ而後其部ニ上メ軟膏ヲ塗擦

兼テ阿列襪油若クハ扁挑油四考三亞的兒製幾若下

幾ニ十滴ヲ和メ灌腸スル日ニ一二次但疼痛劇甚ナ

油ハ片上メ幾若下幾少許ヲ粘滑密幾私丟爾ニ伍メ兼

服セシム此不如然之ヲ持重スルヲ三四日ニ寛解セ

埃埃者ハ蓖麻油少許ヲ以テ頻服セシム但力又上メ

軟膏ヲ擦シ又巴ムヲ得サレバ上メ硬膏中更ニ多量

龍腦及ヒ吐酒石ヲ調和メ其上ニ貼セシム ○阿魯列

安私名地ノ病院ニ於テ蘭結氏上法ヲ以テ百五十人ヲ療



此法又羅獨密篤兒ノ灌腸法偉効アリ或五子ヨリ六子至此  
 灌腸者他ノ諸藥ニ優單テ泄瀉ノ効偉ナリトス欲爾田斯  
 以阿魏二錢ヲ以テ加密列濃浸テ和以灌腸スルヲ稱譽  
 此法遠突土名ハ瓦刺扶阿刺草半錢ノ煎汁ヲ以テ灌腸  
 慢嬰兒ハ吐糞症尋常ノ方法効ナラザル者ハ亞麻子油多  
 量ヲ以テ一時半或ハ一時毎ニ灌腸ヲ殊効ヲ得ルコト云  
 腸管ハ一部捲收詳談上水作之因近來此者ハ上ヨリ更  
 捲シ下ヨリ上ニ捲ク事ヲ論ズ較幾亶私機空氣ヲ  
 腸ニ送入シ或ハ排氣器ヲ置テ腸中ノ氣ヲ排除スルヲ稱  
 賛ス○乾角法下腹緩和鎮痙布微温湯浴等皆此症ニ於  
 テ意圖シ力ヲ試ス○危篤ニ症他藥効ナキ片ハ生水銀ヲ試  
 ムベ茲謾ニ之ヲ畏ルテ用キ并者限リト雖已ニ庶幾ス  
 ル所アテザル者モ亦之ニ由テ死ヲ援テ往往解ハハセ  
 ズ但焮衝ハ徵ハ者ハ嚴ニ忌ハ忌ハ每服一食匙水銀一  
 秤量一ハ亞麻子油ハ和用ハ或ハ更ニ加増ノ半此乃至一  
 此ハ用ハ之ヲ服ノ速ニ瀉スル者尠カラス

○第一千五百五十三方穢歌蘭度  
 亞麻油新絞者  
 右每半時服一食匙或隨其症尚加多  
 主治此劑下腸中ノ鬱畜ヲ排泄シ腸ノ運機ヲ本復スル

且他峻下劑中優者一良藥下則重熱則本藥也

○第千五百五十五方 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

莖麻油ヲ四 煎之 天加察列濃浸之 和以藥腸スルヲ稱譽

○第千五百五十六方 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

主治同上 煎之 煎汁ヲ以テ灌腸ス

○第千五百五十七方 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

主治同上 煎之 煎汁ヲ以テ灌腸ス

○第千五百五十八方 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

主治同上 煎之 煎汁ヲ以テ灌腸ス

○第千五百五十九方 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

主治同上 煎之 煎汁ヲ以テ灌腸ス

主治亞麻油効ヲ獲サル者此方ヲ用ヒ且之ヲ服スル毎

三亞麻油一匙ヲ兼用セシム嘔吐ヲ制スルハ里歇利飲

方ヲ兼施スベシ

○第千五百五十五方 同上 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

甘扁桃油 瀉利鹽各一 蘆薈水製越幾斯半 菲阿

○第千五百五十六方 同上 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

右調和丁寧振盪每一時服二食匙

主治吐糞病之ヲ用ヒテ偉効ヲ奏スル下往往之ナリ

○第千五百五十六方 同上 煎其莖尚嫩者ナリトス欲爾田斯

瀉利鹽各一 白蒸餾水八 溶解加後藥

亞麻油 白罌粟舍利別各一 阿芙蓉越幾斯五

○右調和每八分時或四分時服一食匙

主治吐糞病頑固不便秘宜之○若此劑ヲ服之每服吐  
出スル者益稍阿芙蓉ノ量ヲ加増スベシ

○第一千五百五十七方刺野秘

巴豆油五 遏爾托根末半

○右加達刺侃篤護護漿適宜為七九衣白桂末每服一九乃

至二九

主治吐糞病ニ用トテ瀉スルニ宜シ但炊衝スル者ハ之

ヲ禁ス

○第一千五百五十八方歌蘭度

煙草葉錢三

右井水九ヲ煮耗至七ヲ濾過每半時服半小盞五 効

主治吐糞病ニ卓越ノ一良藥トシテ○蓋服量半小盞トシ

ル者ハ稍過多才以大抵一食匙或ハ一食匙半五 方足

○第一千五百五十九方連濕布名地葛刺墨爾

右煙草下幾錢二 至十五 錢五 煎膏五 煎藥五 煎藥五 煎藥五

右每半時服十滴

主治吐糞病ニ宜シ兼行解凝劑ノ罌法ヲ施スベシ

○

遠西本草 卷十四 日十二 廣 半 堂

○第一千五百六十一方 戒歇蘭度濟、藥效甚速、

煙草葉半斤 煎十分 或四分 時服一食匙

右熱湯八分 乃至十 分浸漬飽熟四分 時濾過供灌腸服吐

○主治 總て内服藥ハ通例立地ニ吐出スルガ故ニ此方更

ニ佳ナリトハ實ニ之ヲ施セハ麻酔ノ効ヲ見ハシテ病

者萎弱ト大抵萎弱中并瀉ヲ得ルナリ○戒歇蘭度氏正

方ヲ以テ功ヲ得タリト云フト雖予方見テ以テ益レハ

煙草ノ量甚過多ナリ故ニ戒歇蘭度氏而シテ每症左ニ掲

クル過別爾格弄人名ノ灌腸方ヲ稱用ス衝スル者ハ之

○第一千五百六十一方 過別爾格弄人名

煙草葉十五 煎十分 或四分 時服一食匙

右熱湯六分 浸漬十分 密三 煎濾過供灌腸用ハ 云々

○主治 吐糞病ニ宜シ○過別爾格弄人名之ヲ灌腸ノ 効ヲ

獲ザレバ半時ノ后再煙草葉一 刀ノ 浸液ヲ射注セリ○

煙草烟ヲ腸ニ送入スルモ亦同ク良効ヲ測ルニ可シ

○第一千五百六十二方

荳蔻葉半 刀至 煎十分 或四分 時服一食匙

右熱湯適宜浸漬濾過取六 分供灌腸用ニ 煎ヤ 水煎重

○主治 痙攣性腸貌屈 吐糞病ヲ兼スル者之ニ宜シ○荳

若ク用スレバ大ニ筋纖維弛緩ニ 兼テ知覺機ノ興奮セ



○凡ヲ制伏ス此故ニ吐糞病腸ノ緊張甚シキ症ニ莨菪ヲ以テ第一等ノ藥トス然レ既ニ麻痺ニ傾ク者ハ之ニ由テ或ハ生命ヲ害スルヲアルガ故ニ用ニ臨テ尤慎重スベシ○且之ニ兼テ貌<sup>ガク</sup>僂<sup>ロク</sup>屈<sup>ク</sup>上ニ莨菪葉<sup>ハ</sup>布ヲ貼スベシ

○第一千五百六十三方秘單紐斯

莨菪根錢一熱湯適宜浸蓋閉飽熟半時濾過取二三

若加<sup>カ</sup>密列浸等分一頓灌腸或二分用或ハ

主治吐糞病ニ宜シ○此灌腸ハ非常ハ峻法ナリト雖私

單紐斯名ハ或ハ加増<sup>カ</sup>莨菪根一錢半ヲ用フト云ノ或ハ

云フ願<sup>カ</sup>糝斯名ハ一錢半ヲ用フト

○第一千五百六十四方麻屈里過利

莨菪越幾斯一家猪脂一加幾安頭一著

右調和作軟膏塗擦貌<sup>ロク</sup>僂<sup>ロク</sup>屈<sup>ク</sup>和蘭一佛婆都一譯

主治一千五百六十二方ニ同シ

○第一千五百六十五方麻屈里過利

巴豆油五滴至十滴白罌粟油五滴至十滴

右調和夫抵六滴乃至十滴塗擦臍傍大對<sup>ハ</sup>未<sup>ハ</sup>閉<sup>ハ</sup>之<sup>ハ</sup>諸藥

主治總テ小腹壅塞ニ宜シ殊ニ吐糞病ニ好トス或ハ此

油劑二三滴ヲ取テ舌上ニ擦スルモ亦可ナリ

○第一千五百六十六方沒魯

透西方膏

○第巴豆油三滴 亞刺昆亞護謨末一錢半 煙草葉浸五弓浸

右調和供灌腸宜之 效于死瀕スハ者此灌腸法ヲ施シテ一時ノ后惡

○主治吐糞病ヲ治ス○ 患者十四日來大便秘閉之諸藥

○效于死瀕スハ者此灌腸法ヲ施シテ一時ノ后惡

○真ノ大便大ニ瀉下之速ニ之ヲ救活スルヲ得タリ

○玉液和古丹取方二方 灌腸二分用

○古臨吐瀉藥膏宜熱飲 瀉腸非常ノ峻法

○單煎藥強幾俱加增 藥散一錢半 用ト云 或ハ

遠西方彙卷之十四 四十四 吐糞病

遠西方彙卷之十五 獨乙加幾 安頓至著

藥和蘭 蘇傑斐婆都 翻譯

侍醫法眼貫齋伊東慎文 伸重譯

南洋伊東壽健夫 參校

第三子神經痛 子シラ ルキ ア羅 七子 蘭夫 軒然 蘇ハ 蘇ハ

神經痛 諸症大抵麻酔藥殊効アリ即菲阿斯七方 曼陀羅華七方

六方莫爾比捏千方 葛勞千方 老利兒結爾斯水等

千方莫爾比捏千方 葛勞千方 老利兒結爾斯水等

至千方莫爾比捏千方 葛勞千方 老利兒結爾斯水等

遠西方彙 卷十五 廣月堂

遠西方彙 卷十五 廣月堂

是十少格碌屈私末兒秩斯千五百八十九方至千五百九十三方諸種ノ亞鉛

劑千五百九十五方及千五百九十九方格魯林酸加里千五百九十八方ノ

如未鑛劑千五百九十五方的列並油六百五十六方六百五十七方

方千五百九十五方亦下肢ノ神經痛ニ偉効アリ若夫神經痛ノ發作定

期アル者ハ最幾那劑ヲ的當トシ外用ハ灌水殊ニ滴水浴

射水浴或ハ全身水浸法宜以又壓定沖鍼麻屈涅篤越

列幾的爾瓦爾波尼其他諸種ノ皮膚刺戟法灸諸般ノ塗擦

藥千五百七十四方至千五百七十七方稱贊千五百七十八方患所ノ神經ヲ

截断ノ良効ヲ奏セシハ僅ニ二三症ノハ幾安也

○第一千五百六十七方〔穢歌蘭度〕

曼菲阿私葉各十菲阿私越幾斯宜通

春為兵士丸石松粉每半時或一時服二粒以至疼痛鎮

定〔穢歌蘭度〕

主治諸種之疼痛鎮靜スル白蜜〔穢歌蘭度〕

○第一千五百六十八方〔穢歌蘭度〕

率菲阿私子三十八方白嬰粟子一弓半黑櫻實水八

主扁桃舍科別〔穢歌蘭度〕○此藥三十六歲中大

右調和作乳劑每半時服一食匙

主治神經痛及不眠ニ宜シ〔穢歌蘭度〕

○第一千五百六十九方〔麻健蓋〕

○蒸餾水 二万溶化加後藥

醋酸莫爾比捏子衣六蒸餾水二万溶化加後藥種八五鉛

右調勻每服五滴乃至十滴身熱千百五十五方六百五十七

主治神經痛不眠疼痛痙攣二宜シ○此液三十六滴中大

期率醋酸莫爾比捏子一八万各畜六一至二五半五萬雙實六方六

○策一千五百七十方樓攝魯聖兒又澄定神鐵麻從涅篤越

列至曼陀羅華越幾斯與精至小白糖半乾法各諸般ノ塗擦

藥右調勻為散分四服每日一服方ノ稱贊込患時ノ神經ヲ

主治額及心顎ノ神經痛三宜之ノ兼テ痛處ニ徐徐與

曼陀羅華ヲ幾ヲ塗テ方中曼陀羅華越幾斯ノ量漸

ク加ヘテ微微麻醉ヲ覺ユニ至ルニ至ル

○策一千五百七十方葉爾質涅篤○蓋莫爾比捏

的列並油ヲ煨製麻儼涅失藥各半錢解替白糖適

右為四塊每服一塊日四次力ハ故息ハ咳テリ○未入レ

○策一千五百七十方列如荷爾藥煎提液六方六方六

任的列並下藥附鐵和與刺昆再護護末半馬ニ沙糖半

橙花舍利別子一會堪先芥子粉半万冷水

右調勻分三劑日服盡一劑每服用封糊二箇被包與方

主治右二方千五百七十二方諸神經痛殊ニ勝神經及ヒ

○是神經ニ係ル者之宜シ參照スベシ六百五十七方六方六及ヒ六百

○第一千五百七十三方佛列篤（佛列篤）蒸餾水三勺溶糖加後味粒二朝研碎又

右調勻早晚服一食匙（瘧疾）宜シ○此液三十六滴中大

主治經及神經痛癩麻質斯等因熱者之（汗）并採ノ

量漸々加下テ三衣至（至）濕濡ノ布片ヲ以テ患處ヲ

纏包シ以テ發汗セシムルハ姑息ノ効アリ○未久ヲ

經痛以症以格兒失風謨辛未幾ヲ稱贊（且）

○第一千五百七十四方刺骨（刺骨）一家猪脂（七錢）至

右調和作軟膏剥表皮塗擦（刺骨）兼テ痛處ニ徐徐

塗主治神經痛及劇痛癩麻質斯痛（實）○蓋莫爾比捏

又用製（九）最慎重（力）固（論）侯（論）濟（實）

○第一千五百七十五方處（處）對麻質補（補）因

非阿私油（煮製者）醋酸莫爾比捏（一）青酸鈣（五）

右調勻塗擦（右）主治前額及顛顛神經痛（宜）先芥子粉半勺冷水

少許更以テ泥ヲ作り痛所ニ貼シテ後一時毎ニ上方ヲ

塗擦（通）例芥子泥ヲ貼（區）下二三次之ヲ塗擦スルヲ

○第一千五百七十六方足（足）

○第一千五百七十七方

○第一千五百七十八方

○第一千五百七十九方

○第一千五百八十方

○第一千五百八十一方

○第一千五百七十餘種(屋兒弗)...

空黎子油... 再餹燒酒半勺... 右供塗擦...

主治 痺麻質斯性諸疾患。痺麻質斯痛。麻痺症等之。宜沙

面痛。... 子ル。チリ。ゲミニ。プロ。ソル。キア...

第一原因。... 蹤迹。... 攻ムヘシ。...

ル者。雙鸞菊。朴屈福。烏篤。蜀羊泉。格爾。失屈。謨。硫黃劑。安質。

沒尼劑。升汞等。三宜。... 間歇。... 症。...

症。... 砥石。七亦用。... 列爾。砥石。溶水。ノ如キ。之ニ宜シ。...

腹臍硬結腫。... 者。ハ吐下藥及。心解釋劑。三宜シ。○直達法

ハ面痛症。之奇効藥。... 其品類最多。即曼陀羅華。...

百七十。方至。千五百。雙鸞菊。... 典格尼。質。...

千五百。百八。十四。苦扁。桃油。... 失鳩。答。...

方。八。格。碌。屈。私。末。兜。扶。斯。... 至。膏。酸。鍊。亞。鉛。...

方。十四。鹽。酸。亞。鉛。... 甘。汞。或。...

和用シ。或。麝。香。下。配。シ。... 或。失。鳩。答。越。幾。斯。二。伍。

不。十。七。五。百。九。格。魯。林。酸。加。里。... 哥。攝。尼。爾。設。布。

點。尅。奴。屈。丁。幾。... 又。謨。私。篤。氏。著。...

治。法。... 外。用。法。... 麻。醉。擦。藥。...

遠西方彙... 卷十五... 廣月堂

類水銀膏并汞水發泡膏吐酒石膏鐵瓦爾波尼及此越列幾

的爾等亦稱贊凶弄別鬼倔名八數回海水南海殊二浴發ル

ヲ好好中中取取林林鷓鷓吹吹里里十五百八十

○第一千五百七十七方遠聖爾私私但但篤篤天蘇答蘇漢宜

曼陀羅華越幾斯半廿廿香香糖半刀刀下單用心迄心ハ心ハ心ハ心

若為散分五服早旦一服後四分時一服過時又服三

服後尚未見麻醉之候者翌朝須取後服次第用首ハ首ハ首

〔主治〕面痛二宜シ○經久症ハ先其本病樓麻質斯ニ身治

及必后二三日吐散ヲ連用長ハ若間歇ア又テ屢發作ス

難癒者ハ曼陀羅華ノ量一日三分ハ一ハ至ルハシ之ヲ服

ノ麻醉証ヲ發スル者ハ其治庶幾スヘシ後療法ハ開達

格碌屈私末兒秩斯ニ宜シ○別戾名獨碌私的上屋兒弗

私歇情同等此治法効驗アルヲハ確證セリ

○第一千五百七十八方斯屈列西爾爾苦痛桃濃水三

曼陀羅華越幾斯ニハ至蒸餾水ヲ數水ニ

右調和每一時服三十滴乃至四十滴臨服宜振盪

○主治樓麻質斯痛及ニ神經痛殊ニ面痛膝痛ニ宜シ

○第一千五百七十九方別連杜最高蘇宜

曼陀羅子半玫瑰昆設兒弗半錢六入白丁寧搗碎加

後味然末末

類水 過兒托根末宜適

右為六十九衣石松粉每服十九日二次入時下軍蘇

○主治 痺麻質斯痛神經痛 殊効アリ 最面痛ニ宜シ

○第一千五百八十八方 叔密篤滿 板 白蘇胡蘇ニ宜シ

古(甲)方 曼陀羅華丁幾半錢 莨菪越幾斯半 苦扁桃濃水二

右 曼陀羅華丁幾半錢 莨菪越幾斯半 苦扁桃濃水二

○右 溶和每三時服三十滴乃至四十滴 服次藥用

○主治 面痛ニ宜シ 乙方ト更換用ラベシ

古(乙)方 鐵屑半 白糖錢一 其故悉幾ス

右 調勻為散分十六包每二時服一包 用此十六包入

○之ニ兼テ丙方ヲ患所ニ塗リ以テ其効ヲ助クベシ

古(丙)方 曼陀羅華越幾斯 莨菪越幾斯各一 苦扁桃濃水三

右 調勻溶解 草末切最

○右 每一時半塗擦

○第一千五百八十一方 福倔篤

古 曼陀羅華越幾斯八十二 安質没尼酒半ヲ溶化

右 每一時半取二十滴 默栗薩泡劑和服

○主治 面痛及ヒ神經病ニ宜シ

遠西方彙 卷十五 面痛 廣 月 堂



○第六百五十八方 猴歌蘭麩

本雙鸞菊丁幾 忽弗滿 製半多 果齒或濟味煎次

右每服五十滴日四次

○主治 樓麻質斯性面痛 宜

○第一千五百八十三方

亞格尼質捏 一 甘草末 十六 沙糖舍利別 適 濃水

右為斗以丸衣石粉每時半服 粒 昔麻林藥水三

○主治 亞格尼質捏 ハ 尤劇劑ナリ殆内服ヲ容スベカラサ

ル者ト亟ニ老婦ト五冷ハ變ト服更將ニ斃レシトス

此至レリ時倫彪爾 各 嘗テ屢之身用ヒ十六分ハ一

ニ至レリ然其後速ニ棄テ用ヒス ○今此ニ上方ヲ列舉

スル者ハ特ニ此書ヲ全備スルニ方為ナク變易難終

○第一千五百八十四方 私的印律屈

葛若根 格碌屈私末兒秩斯 各三 普蒲油糖

右調勻為散分四服蠟紙包裏晨夕服一包 煎煎

○第一千五百八十五方 整倫篤

葛若越幾斯 ハ 老利兒結爾斯水半ヲ溶化

右每服三十滴日三次 宜 ハ 蓋マテ用マシムハ此難

主治 右二方 一千五百八十四方 面痛ニ宜シ

○第一千五百八十六方 調忽倫

○藥 苦扁桃油滴二十六 再餹燒酒三

右調和每服十滴乃至二十滴日四次宜之

主治神經痛殊日面痛宜之○蓋之ヲ用フルハ尤謹慎

ヲ加フベシ阿魏 失鳩答越幾斯 錢各一 景纈草根 鹿角鹽各一

○第一千五百八十七方佛陽

右調和加琥珀丁幾二錢為一丸衣桂末朝暮服十粒

○第一千五百八十八方同上

○藥 癒瘡木脂 阿魏 失鳩答越幾斯錢各一 雙鸞菊越幾

斯錢半 甘汞十五 薑蒲油糖半

右調勻二錢為一丸衣桂末朝夕服五粒乃至十粒重用

主治右一方十五百八十七方 面痛宜之佛聖兒

○第一千五百八十九方折篤神損

○藥 格碌屈私末兒秩斯二刀至 薑蒲油糖半

右調勻為散分六服蠟紙包裹每服一裹日二三次持重

主治衆醫格碌屈私末兒秩斯又以テ顔面神經痛ノ一奇

藥トシ或ハ茶又多量用フ○其他神經性頭痛耳痛胃痛

等三卓越力効アリ

○第一千五百九十方患篤結

○藥 格碌屈私末兒秩斯二錢 桂皮末半

右調和每服十滴乃至二十滴日四次宜之

主治神經痛殊日面痛宜之○蓋之ヲ用フルハ尤謹慎

右調勻分為六服日服三服每服末

○主治面痛宜之（委私爬田）蓋之ヲ用ツルハ尤謹慎

○第一千五百九十一方（刺骨私）藥格碌屈私末兒秩斯（半）白糖（半）軒過泥子油糖（錢）胃麻

右調勻為散每服茶匙日進次乃至四次軒過泥子一錢

○主治神經痛並全身殊胃腸衰弱宜之（音益）錢各一

○第一千五百九十二方（委私爬田）藥格碌屈私末兒秩斯（半）曹達（乾者）六分

○藥撒兒末爾秩斯（半）曹達（乾者）六分

右研和為散日三服（大馬）宜之（雙鸞）約越錢

○主治面痛宜之（○）患者格碌屈私末兒秩斯連用ス

此方七週其量漸ク加ヘテ終ニ毎日一錢ニ至リ之ヲ三

分ニ用ツルモ絶エテ効ナシ今栗屈的兒氏施弗涅兒（名）

之微ヲテ上方ノ如ク新製格碌屈私末兒秩斯ノ方ヲ處

七服量每次五分連用スルヲ四日ニシ

○藥既ニ疼痛減シテ日（形）後全ク鎮靖セリ而メ之ヲ持重

スルヲ十八日ニ至レリ下法依服量（成）散（分）

○第一千五百九十三方（藥屈私）藥格碌屈私末兒秩斯（錢）醋酸莫爾比捏（分）芳香散（錢）

右調和為散分十服每一時半服一服

○主治同上○兼テ朴麻篤膏（附）半弓歇刺篤里涅（分）二分ヲ調

製西方彙 卷十五 面痛 加 廣 月 堂

和之軟膏ヲ作り塗擦ス膏用半五指陳萬里野ニ入ク脂

○第千五百九十四方速別倫歌魁是

○第青酸銻亜鉛并ハ至府利油糖五山野一ク長香指

○右調和為散分六服蠟紙包裹日三四服

主治面痛ニ宜シ◎小心ノ漸漸服量ヲ加増スベシ

○第千五百九十五方預結全ハ巽ノ宜而クニ林重

○鹽酸亜鉛一正甘海鹽精二錢溶化用々四日ニ

右調和毎二時五滴砂糖水和服毎末好淇ク女ニ噴

主治面痛癩癩舞蹈病ニ宜シ◎蓋鹽酸亜鉛ハ内服ハ尤

慎重ス入シ量薄ハハ々々毎日一錢ニ至リモ可ク

○第千五百九十六方乙百弗蘭屈二乙弗蘭屈

上好麝香ハ里甘汞ハ金硫黃各半ハ白糖六

○右調勻為散分八晝晨夕服一晝

主治諸種ノ面痛頑固ニシテ他藥ヲ受ケザル者ハ上ノ

二氏此散ヲ用ヒテ治セリ○弗肝爾田蒲蘭突名甘汞ヲ

用フル一日ニ四ハヨリ六ハニ至リ乃至六服ニ分ツ

以テ大ニ吐涎セシム或ハ水銀膏日ニ一錢乃至二錢ヲ

塗擦シ此法ヲ以テ面痛二十人ヲ全治セリ弗律墨爾名

ハ二症ヲ療メ水銀膏ノ効驗アルヲ確證セリト云フ

○第千五百九十七方没列魯

○藥甘永二百失鳩答越幾斯一白糖半

右調勻為散分六服朝夕一服下...

○主治面痛又根治又...

○第一千五百九十八方葛弗歇魯綿私篤灰廷...

用格魯林酸加里半附蒸餾水四勺溶化...

右調勻每一時服一食匙...

○主治癩麻質斯性神經痛面痛神經性膝痛...

○第一千五百九十九方兒越索斯

格魯林酸加里三勺白糖一...

右調勻為散分八包每服一包日三次

○主治面痛宜之索斯...

○確効之奇藥不可不備之佐藥...

○然格魯林酸加里...

者此方或善先抽之...

亦之アリ又索斯名甚鍼治...

○藥此主劇痛之方為藥姑意...

者亦以再發スル時八復二三日間鍼治...

次或ハ每次五八寸齒...

○第一千五百九十九方荷弗蘭屈...

本醫攝尼爾設布點彪奴屈...

遠西方彙 卷十五 百痛 廿一

右每服三兩滴乃至四兩滴百發三次

○**主治**面痛宜<sup>○</sup>舒攝尼爾設布點彪奴屈<sup>名虫</sup>ハ新採ノ

者六十箇乃至八十箇ヲ以テ燒酒一匁ニ浸ス一八日ニ

○<sup>○</sup>成丸再發<sup>○</sup>五粒<sup>○</sup>對<sup>○</sup>五粒<sup>○</sup>對<sup>○</sup>五粒<sup>○</sup>對<sup>○</sup>五粒

○第一手藥百二方爲謨私篤<sup>名</sup>傳染病防禦發汗散<sup>○</sup>

<sup>○</sup>布<sup>○</sup>國<sup>○</sup>知<sup>○</sup>和<sup>○</sup>才<sup>○</sup>武<sup>○</sup>康<sup>○</sup>穰<sup>○</sup>才<sup>○</sup>地<sup>○</sup>離<sup>○</sup>示<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>蘇<sup>○</sup>贊<sup>○</sup>才<sup>○</sup>此<sup>○</sup>今<sup>○</sup>蘇<sup>○</sup>才<sup>○</sup>丹

昔此好麝香<sup>○</sup>葛私篤<sup>○</sup>樓謨<sup>○</sup>龍腦<sup>○</sup>精製<sup>○</sup>滑石

○<sup>○</sup>第<sup>○</sup>四<sup>○</sup>艾<sup>○</sup>根<sup>○</sup>增<sup>○</sup>林<sup>○</sup>吐<sup>○</sup>根<sup>○</sup>攝<sup>○</sup>爾<sup>○</sup>扁<sup>○</sup>太<sup>○</sup>里<sup>○</sup>垂<sup>○</sup>根<sup>○</sup>質<sup>○</sup>琥<sup>○</sup>珀<sup>○</sup>油<sup>○</sup>糖

<sup>○</sup>各<sup>○</sup>略<sup>○</sup>林<sup>○</sup>發<sup>○</sup>藥<sup>○</sup>半<sup>○</sup>如<sup>○</sup>取<sup>○</sup>才<sup>○</sup>此<sup>○</sup>糖<sup>○</sup>亦<sup>○</sup>藥<sup>○</sup>才<sup>○</sup>用<sup>○</sup>コ<sup>○</sup>レ<sup>○</sup>下<sup>○</sup>テ

右調勻爲散分六畧<sup>○</sup>藥<sup>○</sup>半<sup>○</sup>如<sup>○</sup>取<sup>○</sup>才<sup>○</sup>此<sup>○</sup>糖<sup>○</sup>亦<sup>○</sup>藥<sup>○</sup>才<sup>○</sup>用<sup>○</sup>コ<sup>○</sup>レ<sup>○</sup>下<sup>○</sup>テ

**主治**猩紅熱神經熱等ニ感染セル者謨私篤氏此散ヲ與

○<sup>○</sup>其<sup>○</sup>第<sup>○</sup>二<sup>○</sup>期<sup>○</sup>異<sup>○</sup>常<sup>○</sup>神<sup>○</sup>經<sup>○</sup>証<sup>○</sup>見<sup>○</sup>而<sup>○</sup>全<sup>○</sup>久<sup>○</sup>熱<sup>○</sup>性<sup>○</sup>或<sup>○</sup>ハ

炊衝ヲ帶<sup>○</sup>此<sup>○</sup>時<sup>○</sup>長<sup>○</sup>用<sup>○</sup>凡<sup>○</sup>十<sup>○</sup>リ<sup>○</sup>病<sup>○</sup>者<sup>○</sup>葺<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>就<sup>○</sup>キ<sup>○</sup>テ<sup>○</sup>温

覆<sup>○</sup>ハ<sup>○</sup>八<sup>○</sup>分<sup>○</sup>時<sup>○</sup>每<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>此<sup>○</sup>散<sup>○</sup>一<sup>○</sup>畧<sup>○</sup>後<sup>○</sup>接<sup>○</sup>骨<sup>○</sup>沫<sup>○</sup>花<sup>○</sup>泡<sup>○</sup>劑<sup>○</sup>以<sup>○</sup>温

服<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>其<sup>○</sup>以<sup>○</sup>テ<sup>○</sup>發<sup>○</sup>汗<sup>○</sup>ス<sup>○</sup>ル<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>至<sup>○</sup>止<sup>○</sup>大<sup>○</sup>抵<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>服<sup>○</sup>乃<sup>○</sup>至<sup>○</sup>四<sup>○</sup>服<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>止

効<sup>○</sup>ハ<sup>○</sup>奏<sup>○</sup>凶<sup>○</sup>而<sup>○</sup>足<sup>○</sup>ル<sup>○</sup>又<sup>○</sup>歇<sup>○</sup>倚<sup>○</sup>私<sup>○</sup>的<sup>○</sup>利<sup>○</sup>家<sup>○</sup>才<sup>○</sup>半<sup>○</sup>面<sup>○</sup>痛<sup>○</sup>膝<sup>○</sup>痛<sup>○</sup>及<sup>○</sup>也

面痛症患者衰弱シテ熱ヲ帶<sup>○</sup>此<sup>○</sup>者<sup>○</sup>謨<sup>○</sup>私<sup>○</sup>篤<sup>○</sup>氏<sup>○</sup>此<sup>○</sup>散<sup>○</sup>ヲ

處<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>偉<sup>○</sup>効<sup>○</sup>アル<sup>○</sup>ヲ<sup>○</sup>徵<sup>○</sup>セ<sup>○</sup>リ<sup>○</sup>○<sup>○</sup>謨<sup>○</sup>私<sup>○</sup>篤<sup>○</sup>氏<sup>○</sup>面<sup>○</sup>痛<sup>○</sup>治<sup>○</sup>法<sup>○</sup>下<sup>○</sup>款<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>如

○<sup>○</sup>總<sup>○</sup>テ<sup>○</sup>藥<sup>○</sup>劑<sup>○</sup>劇<sup>○</sup>性<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>身<sup>○</sup>軀<sup>○</sup>ヲ<sup>○</sup>激<sup>○</sup>ス<sup>○</sup>ル<sup>○</sup>者<sup>○</sup>ヲ<sup>○</sup>忌<sup>○</sup>ミ<sup>○</sup>病<sup>○</sup>人<sup>○</sup>強<sup>○</sup>壯

○<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>以<sup>○</sup>面<sup>○</sup>痛<sup>○</sup>未<sup>○</sup>久<sup>○</sup>傳<sup>○</sup>染<sup>○</sup>透<sup>○</sup>經<sup>○</sup>ナル<sup>○</sup>者<sup>○</sup>ハ<sup>○</sup>患<sup>○</sup>ル<sup>○</sup>所<sup>○</sup>ノ<sup>○</sup>方<sup>○</sup>ニ<sup>○</sup>蟻<sup>○</sup>蟻

二三條麻施之刺戟衝動セザル飲食ヲ命シ冷水ヲ多服  
 七シメ旃那橙葉泡劑ヲ用ヒテ毎日大便ヲ得ルヲ二行  
 而メ其日或ハ三日毎ニ早旦上ノ散劑一服ヲ服セシム  
 西麻此散ヲ與ルヲ十五晝乃至二十晝ニ至テハ  
 至ル泰面痛重症又全治セリ或ハ胃寒若クハ神思勞動  
 以爲ニ其症再發スル者モ亦之次ニ雖能ク此方ニ由  
 テ功ヲ收ムルヲ證セリ又越列幾的兒鍼或小麻屈涅篤  
 妙テ面痛ニ施シ殊效ヲ見タリト云フ  
 ○第一千六百三二方常穢歇蘭度鎮靜水  
 主調和供外用ニ  
 老利兒結爾斯水 護烏刺兒度水 各ニ  
 薔薇水 四

○右調和供外用ニ  
 主治面痛ヲ洗フベシ且阿芙蓉膏若クハ鉛粉膏ヲ痛處  
 ニ貼シ項窩ニ角法若クハ串線法及ヒ灸ヲ施シ疼痛發  
 作スル時ハ小水節ヲ以テ冷水ヲ射注シ疼痛歇ムニ至  
 ルハシ○其他穢歇蘭度氏男女ノ春情旺盛及ヒ此ニ基  
 因セル症即遺精夜間依朴昆垓兒歇倚私的利陰莖勃起  
 花風病等ヲ治スル此水藥ヲ以テ陰部ヲ洗滌スルヲ  
 稱賛ス但此諸症ニ施ス時ハ醋一二ヲ和メ尤效アリ

○第一千六百三方列如鄔爾篤裸設奧薄羸寄爾

遠西方書

卷之五 十四 廣 半 堂

遠西本草 卷一五 面痛 廣月堂

○青酸加里カレト附四 蒸餾水一斗溶解

右調和醃木棉塗痛所

主治面痛ニ宜シ青酸加里劇藥十割青酸鎳加里ト混

同スル亦勿レ

○第一千六百四方形拔耳度

青酸加里二至四 家猪脂一

右丁寧調勻作軟膏塗擦痛所

主治面痛其他諸神經痛ニ宜シ膏藥

○第一千六百五方噎別爾私 家猪脂半至一

精製歇刺篤里捏子五八 附五 家猪脂半至一

右調和作軟膏取豆大塗擦痛所近圍日二三

主治面痛。膝痛。コキサルジ痛之肩痛ニ宜シ歇刺

篤里捏ノ内服ハ不要トス何トナレハ服量僅ニ十六分

ハシニシテ消食機ヲ衰弱セシメ嘔吐頭旋不食症等

ヲ招ケバナリ外用モ亦大ニ謹慎ヲ加フヘシ感覺過敏

○人ニ在テハ殊ニ然リトス

○第一千六百六方倚私的爾連

亞格尼質捏六 附六 阿列襪油一 家猪脂三

右丁寧調和塗擦患所

○第一千六百七方同上

遠西本草 卷一五 廣月堂



○亞格尼質捏ハニ同亞爾箇兒二錢乃至四錢溶化

右用法同上

主治二方皆面痛及ヒ其他ノ神經痛ニ宜シ○亞格尼質

捏ヲ外用スルハ慎重スヘシ第一千五百八十三方ヲ參照スベシ

○第一千六百八方蒲羅搗私

甲方ハニ亞格尼質捏ハニ再餹燒酒宜適家猪脂ハニ

右調和作軟膏初取豌豆大塗擦痛所ハ取量對ニ十六分

主治面痛ニ宜シ○此軟膏刺痛ヲ發セシムト雖之ヲ塗

擦スルト二三回ニ及ベハ發作罕ニシテ且劇勢ヲ減ス

持重ノ疼痛全ク退クニ至ルハ

○第一千六百八方同上

乙方ハニ細里曹ハニ家猪脂ハニ

右調和作軟膏供塗擦

主治面痛症患部寒冷ヲ覺ユル者之ヲ用此方卓越ノ効

ナリ其質無色ニシテ針芒ヲ結成シ苦味酷烈ニシテ惡ムヘ

○其効力ヲ較スレバ過篤羅匹涅一分莨菪越幾斯二

百分ニ比スベク又莨菪葉六百分ヲ敵スベシ○越箇ハニ

遠西方彙 卷之五 十一 廣月堂

廣月堂

廣月堂

廣月堂

耳名ハ之ヲ水ニ溶化シテ外用ニ供スルモノ也  
第四〇其係神經核系症ニシテ、  
依朴昆垚コノイポコンデリア等ノ藥ヲ用フル者多シ其治亦專ニ從  
事ニ適應シ即解釋越幾斯劑ニ醋酸加里液、孕鹼酒石ヲ  
加フル者、酒石酸加里曹達四十九方至五十方、植物絞汁九百九  
方、護謨華爾斯藥ニ白石鹼或ハ牛膽ヲ加フル者十方至  
千六百方、硫黃劑千六百二十方、末里印泉及ヒ葛爾思泉等皆

此ニ屬ス而シテ其清涼鹽類ハ其人感觸過敏ニシテ畜血症ヲ  
發セシトスル者ニ用フベク起熱性ノ護謨華爾斯劑ハ粘  
液質ノ者ニ施スベシ硫黃ヲ加フルハ痔疾ノ素因アル者  
殊ニ宜シ且感觸非常ニ亢進セルヲ轉變セシムルハ此症  
ヲ治スルノ一術也其功ヲ收ムルヲ轉變スル顯草  
阿魏千六百廿五方等ノ如キ神經藥ヲ稱用ス輒近キ至テ  
強壯劑殊ニ鍍劑ヲ好トス但先苦味越幾斯劑ヲ與ヘ爾後  
括失亞冷浸劑ヲ用ヒ尋テ幾那ヲ投シ終ニ緩性鍍劑ヲ與  
ヘ千六百方至千六百方、最後天然ノ鑛泉ヲラシメテ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

ク千六百方、並ニ鑛泉名等ヲ用ヒテ全效ヲ收ムルハ依朴

昆垚兒家ハ猛烈起熱ノ強壯藥ヲ服スルニ堪ヘズ○總テ  
 依朴昆垚兒家ニ喜シテ藥ヲ服スルト雖猥リニ藥劑ヲ用  
 并天ニ侵ス勿ク最要ノ藥劑ニ止マルヲ良トス殊ニ上  
 圍適度ナラシムベシ開豁氣中苦運動シ身心操作ノ定課  
 可立テ食養ヲ淡薄ニスルハ尤須要ノ事件トス○其他冷  
 水ニ飲料浴法殊ニ又海水浴共ニ用ヒテ神經系ヲ轉變シ且全體  
 及強健トラシムルノ一良法ナルガ故ニ殊ニ之ヲ依朴昆  
 垚兒ニ稱賛スハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 ○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

○第一千六百九方 用白芍ハカニ思補黃ト云ハルハ其疾ノ素因ナリ  
 五ニ蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各三錢 孕鹼酒石半錢

是治筋肉弛緩不冷而粘液多未入日於ケル依朴昆垚見

依有形之因又其來此者之二宜シ其硫黄ヲ加フル者ハ腹

内畜血及此者至尤稱用之此所ナリ此症時時肝閉未放

蟻スルヲ亦好ナク不爛腐爛中ニ運動シ其心操作ノ定課

○第一千六百五十五方同也亦卦類要ノ事件トス○其他冷

水ニ炭酸加里墨碓砂各一錢青薄苛水三錢溶化加後味帶

又至蘆薈各一錢沒藥各一錢癒瘡木脂各一錢大黃各一錢雜腹蘭各一錢

垚有始法飽熟作越栗失爾每服四十滴乃至六十滴日三次

○主治上示同蒸餾水各二錢德名丸各一錢孕驗酒石各半

○第一千六百五十六方

○藥白石鹼各半護謨安沒尼亞幾各半蒲公英越幾斯各半

右調勻二匁為一九衣石松粉每服十粒乃至十五粒日三

次各一錢洛陽蘇各一錢二天鳥各一錢水牙各蘇林每服十粒乃至十五粒日三

○第一千六百五十七方見薩乙歇爾土各一錢久ノ者ハ灌腸法

白石鹼各三錢牛膽各三錢蘇甘沒尼各一錢開達格碌屈斯各一錢

○藥末兒秩和各一錢右調和加珊篤里越幾斯適宜二匁為一九每朝空心服四

次各一錢右調和加珊篤里越幾斯適宜二匁為一九每朝空心服四

次各一錢右調和加珊篤里越幾斯適宜二匁為一九每朝空心服四

○備考其他薩乙歇爾土丸各一錢方各一錢第七百九十九方各一錢

○見ヨ各一錢方各一錢第七百九十九方各一錢

遠西方書 卷十五 依朴昆垚見 十一 廣月堂

○第一千六百十四方

湯心葛爾度

藜半

者熱者

珊篤里越幾斯

健知亞那越幾斯各錢

右調和加大黃末適宜二匕為一九衣石松粉每服七粒乃

至丹粒吹無萬里越幾斯宜二匕為一九每脾空公眼四

○第一千六百十五方

渴傑栗屈的兒

護謨安沒危垂幾

白石鹼

大黃末各錢

○第一千六百十六方

吐酒石 化者六匕

右調和二匕為一九衣石松粉每服十九乃至十五九日三

次臨日二內為一式亦五淋淋每眼十淋八至十五淋日三

○第一千六百十七方

蕭公英越幾斯

○藥白石鹼

阿魏 蒲公英越幾斯各半

右調勻二匕為一九衣石松粉服法同上三四次

主治第一千六百十二方ヨリ一千六百十六方至腹內壅

塞症及ヒ依朴昆埵兒ニ宜シ壅塞症經久ノ者ハ灌腸法

○九百十九方至九百二十方

ヲ施スベシ○第九百九方乃至九百十四

方及ヒ九百十八方モ亦用フベシ○解釋鑛泉類殊ニ末

里印泉及ヒ結樓私泉並ニ鑛泉ノ名ヲ尤稱賛ハ軌近剛鏡泉モ

亦用フ三

○第一千六百十七方

咄篤

白屈菜越幾斯 蒲公英越幾斯 阿魏 硫黃乳各錢

蘆薈

透明者  
十五分

白石鹼

宜

蘇合

阿膠

黃連

各二分

○右二公為一九衣伊里私弗魯連底那末每服八九乃至十

四九日三次黃末適宜二公為一九衣石松粉每服七粒乃

主治依朴昆垚兒二單以○其症三從元服量ヲ増減以每

日軟便二三行ヲ得ルヲ度トス○肺對難泉酸板ニ未

○第一千六百十八方 結列印各人依朴昆垚兒散各一百十四

聖大黃末各二分橙皮黃各二分孕鹼酒石各三分麻僞涅失亞各一分

玉苗香油糖各半百十九方各二分依朴昆垚兒散各一百十四

右調勻為散玻璃壘收貯每服一茶匙日三四次

○第一千六百十九方 蘇合公英蘇合散各半

硫黃乳各二分黃末各一分橙皮黃各一分麻僞涅失亞各一分

孕鹼酒石各二分香油糖各三分

右調和為散玻璃壘收貯每服一茶匙蘇合末各一分苗香末

注治依朴昆垚兒殊効方各二分瀉下ノ効十分ナラサレハ

梅那葉末各一分錢乃至三錢ヲ如ク○其他第九百九方ヲ參

照數入之

○第一千六百二十二方 蘇合散各二分

沈澱硫黃各二分大黃末各三分麻僞涅失亞各五分孕鹼酒石

蘇合散各二分橙皮油各半蒲公英越幾斯各一分宜各一分

右為十二塊衣伊里斯弗魯連底那末玻璃壘密封日服三

塊蘇香一匙不用里其藥魯車末如蘇密捷日服三

主治前方一千六百十八方代用五服之九乃至十

○第六婦益百二十七方過際栗楓的兒夫亞五卒劍酢五

○第七石鹼錢二瘡瘡木越幾斯症牛膽各服量橙皮越幾斯

○第八蘆薈水製越幾斯各一度トス

○第九調治本丸為丸衣鞋末從其症每服至六丸女冬

○第十新木百拜其長方謨私篤酒石錢十各用連夾並並

○第十一黃朱錢銀石鹼錢五刺姑石根瘡瘡末末苗香末

○第十二如耶噶的油糖各錢半錢服一茶匙日三四次

○第十三右調向為散每服青茶匙日三次黃 秘副野夫亞各一錢半

主治右二方依朴昆垚兒胃中酸敗液ヲ兼ナル者之ニ宜

シ漢草娘幾幾 蘇草娘幾幾幾 蘇尚水四各隨時

○第十四千六百三十三方歌蘭度 蘇尚水四各隨時

各收斂重的兒錢二微篤名人健胃百幾錢六宜之利

右調每服六十滴乃至五十滴冷水或燕麥精汁一小盞

○第十五和服日三次一十五分大黃白糖

主治依朴昆垚兒歇倚私的利症遺精或八月經過多等ノ

衰弱ヨリ來ル者之ニ宜之ヲ用ヒテ感覺過敏ヲ調理

ノ后括失亞格綸僕依蘭蘇幾那等ヲ用ヒ灌水ヲ施スヘ

○第十六千六百二十四方同上

漢方文庫 卷十五 依朴昆垚兒 三 廣月堂

○第一千六百二十四方同上

明礬火阿仙藥對幾那越幾斯各二錢用少擊水一

右調和土水為丸每服五丸早晚服五丸乃至十丸隨野

主治同上昆對兒爛肉除毒龍龍八月幾幾幾幾斯

○第一千六百二十五方渴傑栗屈的兒

阿魏下幾錢葛私篤樓護爾幾水並的兒錢長一小盞

右調勻每服三十滴乃至四十滴百四次

○第一千六百二十六方同上薄荷水四弓溶解加

著草越幾斯 續草越幾斯各一錢半

玉後藥以林是致史胃中續煩草兼之宜

忽弗滿液錢 各藥堂下幾半

右調勻每服一食匙日四次輸硬結腫及七此由六起

主治右二方十六百廿五方依朴昆埴兒及口歇倚私的利

症非用以天神經運機不調方制至厚宜以科便等

○第一千六百二十七方穢屈斯夫計亦取土之以示味取

精製私的列幾尼捏半 麻僵濕失並錢半 大黃 白糖

右調勻為散分十二服每服一服日三次乃至四次胃調餘

主治依朴昆埴兒及口歇倚私的利二宜シ

○第一千六百二十八方



○珪土末 半錢至一錢

右分為二十畧每服一畧日三服

主治近歲一患者了頑固ノ依朴昆堿兒ニ罹ル胃腸損

敗及レ痔疾ヲ兼ヌ而ノ患者甚珪土ヲ喜ムニ由リ沈茂

爾滿名精粹細末ヲ撰用シテ良效ヲ得タリト云フ但珪

土ハ久ク連進スヘカラス○先哲モ亦珪土ヲ以テ粘液

瀉出失血依朴昆堿兒心思鬱憂病瘵癰癩心悸動等ヲ

治セリ一畧薄荷水四ヲ溶解加

○第一千六百二十九方〔穢歌蘭度〕

蓖麻油一畧 格碌莖キント 篤丁ト 幾半

右調和塗擦

主治顯著ノ小腹内閉塞症内臟硬結腫及レ此ニ由リ起

音ル所ノ歌倚私的利ニ宜武又石鹼硬膏等ヲ解凝硬膏類

水久用メ鵝益ア 硝ス 長ヤ 吐ル 瘰リ 瘰リ 瘰リ

歌倚私的利ハ 羅ス 瘰リ 瘰リ 瘰リ 瘰リ 瘰リ 瘰リ 瘰リ 瘰リ

此症原由依朴昆堿兒ノ殊ニシテ小腹内諸器以疾患ニ係

ル者ハ甚罕ナリ通例其因陰具ニ在リトス即月經不調首

帶下子宮及レ卵巢ハ慢性燼衝子宮ヲ粒置變常等持用此

症ヲ起因ニ屬ス○歌倚私的利ノ直達治法ハ神經ヲ運機

ヲ轉變セシメ之ヲ強壯ニシテ加リ生ト 是阿魏ガ 瓦爾ル 拔ル

遠世方彙 卷十五 廣用堂

謨葛私篤倭謨。橙葉等千六百三十一方至所謂駁倚私的利藥

亦用步凡所以才の以止の藥劑其證主當云凡の効ヤ重小

雖之ヲ誤用スル亦往往之漸の之ヲ緩性瀉藥ヲ併用六

百四十三方至千適宜因大便ヲ利スル其證太固整

理云凡の故ニ更ニ之ヲ妙トス若夫根治の偉効ヲ奏スル

者於保固強壯法トス即鍊劑千廿六方至灌水法。河水浴。海

水浴ヲ施シ攝養ヲ節スル等是ナリ但鍊劑ノ如キハ獨脉

管系ハ與奮機元進セザル症ニ用効更ニ劣而初緩方賤

投ニ後漸猛劑ニ轉ク凡の甚宜。蓋鍊劑動中ニ就テ格碌屈

私末見秩斯ヲ優レリトス○冷水ニ浴スルニ福爾咩名ハ

下法ヲ用テ其言曰得テ人ヲ養ハシメテ始ニ愈ス

予病者ハ強弱ヲ論セズ之ヲ冷水間浴セシム或ハ始微

天ノ始。真列氏ニ於テ一度乃至二十一度ノ冷水ヲ以テ不而

ニ至患者水中ニ坐スル下久シキモ每四十瞥腕乃至十五

瞥腕ニ過キテ病者漸ク冷ニ慣ル從ヒ毎日浴水ニ

冷一度ヲ降シ而シ其浴スル時刺モ亦隨テ減殺ス冷度

漸ク降テ十度乃至四度ニ至リ其浸坐スル下極メ

テ短促ニシテ瞥腕間ニ三四次乃至六次降至此其法患者

浴桶中ニ坐シ棉布ヲ冷水ニ醃シ不斷之ヲ頭上及シ頸

圍ニ貼シ寒冷ヲ慣ル直ハ其棉布上ニ冷水ヲ灌注シ其

後布<sub>レ</sub>脱<sub>レ</sub>裸體<sub>ニシテ</sub>直<sub>ニ</sub>頭頸及<sub>ニ</sub>脊椎<sub>ニ</sub>流注<sub>ス</sub>但每  
 日其度數及<sub>ニ</sub>水量<sub>ヲ</sub>増<sub>シ</sub>冷度<sub>モ</sub>亦隨<sub>テ</sub>降<sub>ル</sub>此法  
 行<sub>テ</sub>外予又冷水<sub>ヲ</sub>豚膀<sub>ニ</sub>盛<sub>リ</sub>テ朝夕小腹<sub>ニ</sub>安  
 其<sub>レ</sub>病<sub>ノ</sub>發作頻頻<sub>ニ</sub>隨<sub>テ</sub>頻頻<sub>ニ</sub>施<sub>セ</sub>リ  
 上項<sub>ノ</sub>冷水浴<sub>ハ</sub>依朴昆垓兒歇倚私的利俱<sub>ニ</sub>適當<sub>ス</sub>○歇  
 倚私的利<sub>ノ</sub>瘧發作<sub>スル</sub>片<sub>ハ</sub>鎮瘧劑<sub>ニ</sub>十六百四十七方至  
 二宜<sub>シ</sub>雖亦安用<sub>スル</sub>下<sub>レ</sub>勿<sub>レ</sub>或<sub>ハ</sub>利髮<sub>ヲ</sub>焚<sub>キ</sub>或<sub>ハ</sub>蒜葱  
<sub>ヲ</sub>剉<sub>シ</sub>嗅<sub>シ</sub>メ<sub>テ</sub>殊効<sub>ヲ</sub>奏<sub>スル</sub>下<sub>レ</sub>屢<sub>之</sub>ア<sub>リ</sub>芥子泥<sub>モ</sub>亦貼  
 ス<sub>ベシ</sub>脚湯<sub>ハ</sub>却<sub>テ</sub>諸證<sub>ヲ</sub>増進<sub>スル</sub>下<sub>レ</sub>間<sub>之</sub>ア<sub>リ</sub>刺絡<sub>モ</sub>亦害  
 ラ<sub>ナ</sub>ス症多<sub>シ</sub>○病婦訴<sub>ル</sub>所<sub>ノ</sub>證狀多<sub>ナル</sub>カ故<sub>ニ</sub>逐一

其治方<sub>ヲ</sub>處<sub>スル</sub>下<sub>レ</sub>能<sub>ハ</sub>不<sub>レ</sub>蓋其症隱現速<sub>ナル</sub>ヲ常<sub>ニ</sub>然  
 氏患者藥<sub>ヲ</sub>好<sub>カ</sub>力故<sub>ニ</sub>之<sub>ヲ</sub>投<sub>セ</sub>スノ徒<sub>ニ</sub>辨說<sub>ヲ</sub>費<sub>シ</sub>以  
 テ之<sub>ヲ</sub>慰<sub>ス</sub>再<sub>テ</sub>力<sub>カ</sub>ル<sub>ハ</sub>醫信<sub>ヲ</sub>失<sub>フ</sub>ニ殆<sub>シ</sub>是故<sub>ニ</sub>一  
 二其方<sub>ヲ</sub>轉<sub>シ</sub>患者<sub>ノ</sub>需<sub>ニ</sub>應<sub>スル</sub>ヲ巧<sub>ト</sub>以<sub>テ</sub>局處<sub>ノ</sub>定證<sub>ヲ</sub>  
 治<sub>ス</sub>方<sub>ハ</sub>千<sub>六</sub>百<sub>六</sub>方<sub>ニ</sub>爲<sub>シ</sub>千<sub>六</sub>百<sub>六</sub>方<sub>ニ</sub>爲<sub>シ</sub>千<sub>六</sub>百<sub>六</sub>方<sub>ニ</sub>爲<sub>シ</sub>  
 列載<sub>ス</sub>又歇倚私的利<sub>ノ</sub>局發證<sub>ニ</sub>寒罨法<sub>ヲ</sub>施<sub>シ</sub>鴻益<sub>ヲ</sub>得  
 ル多<sub>シ</sub>○諸種<sub>ノ</sub>塗擦法<sub>ハ</sub>硬膏及<sub>ニ</sub>灌腸<sub>モ</sub>亦用<sub>フ</sub>ヘシ  
 百<sub>七</sub>千<sub>二</sub>方<sub>至</sub>千  
 六<sub>百</sub>七<sub>十</sub>七<sub>方</sub>

○第四<sub>ニ</sub>千<sub>六</sub>百<sub>六</sub>方<sub>ニ</sub>爲<sub>シ</sub>電發<sub>ノ</sub>名歇倚私的利<sub>ヲ</sub>知<sub>ル</sub>三

好沒藥<sub>ノ</sub>瓦爾拔奴<sub>ノ</sub>錢<sub>各</sub>半<sub>一</sub>葛私<sub>ノ</sub>篤<sub>ノ</sub>儂<sub>ノ</sub>錢<sub>各</sub>十五<sub>一</sub>阿

遠西方彙 卷十五 歇倚私的利 二十五 廣 堂

後魏辨或樂縣漢爾林或難辨及葛林漢對辨力但阿

○若加拔爾撒謨李露適宜二為一九衣石松粉每晚服三

六炮子二女對行又冷水及勝盛少朝夕小腹上安

○第一千六百三十五方類方及子斷類生亦限七六

臣蓬葛私篤樓謨錢各半阿魏錢一

所右調勻加續草下幾適宜二為一九衣石粉每服三九

二為至八九日去次入需二熟及水及煎及食盡意

○第一千六百三十六方人曾計尼夫二錢子長姑亦壯

五患瓦爾拔奴謨錢各二及阿魏錢各一

其右調勻以為一九衣石粉晨夕服六九乃至十九

○第一千六百三十七方佛藥是熱湯浸出

○藥白石鹼錢三阿魏錢二膽各疑固者各一錢

右調勻以為一九衣石粉玻璃壘收貯每服十九日二

次味首辨因煎餅小香碎懸或抹粥畜蘇風糜積畜靈藥

○第一千六百三十四方同上一千六百三十六方至爆餅味

古沒藥十格綸樸根阿魏末兒扶斯錢各六葛私篤樓謨

蘆薈膏錢各半○此方又用七十効得○欲

右調勻加並爾鮮越幾斯適宜二為一九晨夕服十九日

○第一千六百三十五方叔拔爾記

古葛私篤樓謨錢半阿魏錢二加密列越幾斯宜適

遠西方藥 卷十五 三十一

右為百為對九衣桂末玻璃墜收貯每時半服十九

○第一千六百三十六方和流私 一九衣石粉粉每晚服三

文葛私篤樓謨錢法精製阿魏 薄荷油瀉 續草越

幾斯宜適

右為九十九衣法尼利末玻璃墜收貯每服六九日三次

○主治一千六百三十方同 一千六百三十六方至歌倚私

的利有形ノ因ニ係ル者弛緩症粘液畜積風氣鬱畜瘧癩

症等宜 宜

○第一千六百三十一方同 續草半 橙葉半 默栗薩葉半 服六九乃至十九

○右細剉調勻早晚取二食匙乃至二食匙熱湯浸出

○第一千六百三十八方穢歌蘭度

綠橙葉 續草 水楊梅 默栗薩葉 軒翹越并

右細剉調勻每晚取二食匙往熱湯二小盞浸漬一夜早

晚取其半冷服

○主治右二方歌倚私的利及ヒ依朴昆垓兒ニ用ヒテ神經

運機ヲ轉變スルニ宜シ○此方ヲ用ヒテ効ヲ得ント欲

スレバ數月連進スルヲ要ス

○第一千六百三十九方春煙隣 續草三 橙花半

雜腹蘭錢 蕪格爾需謨葉 半附

遠西方集 卷之五 二一八

薄荷葉二錢 胡荽子一錢半 驗草一錢半

○右細剉調勻取一食匙水三小盞浸出每服一小盞日三次  
温用

〔主治〕歇倚私的利及レ依朴昆堙兒目宜シ故レ野ノイハル

○第一千六百四十一方〔別連杜〕

雜腹蘭一錢半 橙花三錢 加密列二

右細剉調和取二大食匙水三小盞浸出一日服盡二

〔主治〕依朴昆堙兒及レ歇倚私的利用ヒテ神經強壯劑

○トス神効アリトハニ古ノ藥ニ屬スル也

○第一千六百四十二方〔護私篤〕

寶實艾荅利斯一至二純精酒石一 杜松子油糖

點加耶普的油糖各半 普龍蘇一 聖藥一

右調勻為散分二服一每晩若隔晚服二服一日二次一

〔主治〕歇倚私的利目發作ヲ防グニ宜シ殊ニ其症感觸敏

捷ニ又レ畜血ヲ兼スル者ニ用フベシ○又艾根一刃ヨリ

半錢至三四目每ニ早且温麥酒ヲ以テ送下ニ藥ヲ就テ

發汗セシ石ヲ以テ歇倚私的利ヲ發作ヲ防グヲテ護私篤也

○甚稱贊セリ四目藥ニ屬スル也

○第一千六百四十三方〔過保藥獨的兒〕因ハ昔ニ宜シ

天黃末 麻獨涅失亜各一 葛私篤六

右調勻為散頓服墨未亞 葛味薰對對

○主治歌倚私的利之發作胃中酸液因凡者之宜之次

○第百六十四十三方謨私篤

蘇縷草 白芷 默栗薩葉 蘇格爾需謨葉附 葛葡萄酒

○半葉附各 橙葉 加密列各 葛蒲根 胡荽子括

蘇失亞各 梅那各 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

右細剉調勻泡出用蘇 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

主治歌倚私的利便秘之者之宜之○每日瀉二行

過少者梅那量減之葛蒲根括失亞ノ為之嘔氣ヲ

發之者以此二味ヲ去之蘇酒石酸各 白糖各 橙花

○第一千六百四十四方過 蘇栗屈的兒

蘇梅那昆設爾弗各 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

○水蘇過設印無的兒半

○右調勻每半時或一時服一食匙以至得効

○第一千六百四十五方蘇 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

○大黃水製了蘇單方葛私篤樓謨了蘇附 蘇滿那

○蘇舍利別各 忽弗滿液半 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

右調勻每一時服一食匙以至得効

○第一千六百四十六方蘇 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

○蘇謁刺篤留謨附 蘇姜各 蘇酒石酸各 白糖各 橙花

右調勻為六十九衣右松粉每晚服一二九

○主治千六百四十四方曰千六百四十六方至歌倚私的

利用七元瀉促念身宜多服

○第一千六百四十八方

葛私篤樓謨丁幾

○右每四分時或半時取十滴乃至十五滴沙糖和服

○第一千六百四十八方服一身安以至服

葛私篤樓謨丁幾

右每四分時或半時取六滴乃至十滴沙糖和服

○第一千六百四十九方

右過設印無的兒葛私篤樓謨丁幾

○右調勻每以今時服十五滴乃至二十滴以至痙攣鎮靖

○第一千六百五十方

右葛私篤樓謨丁幾

右調勻隨症服三十滴乃至五十滴

○第一千六百五十一方

葛私篤樓謨丁幾

○第一千六百五十二方

右調勻病證發作中每四分時若半時服十滴乃至二十滴

○第一千六百五十三方

右調勻病證發作中每四分時若半時服十滴乃至二十滴



○第千六百五十五方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百五十六方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百五十七方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百五十八方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百五十九方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十一方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十二方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十三方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十四方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十五方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十六方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十七方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十八方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百六十九方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十一方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十二方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十三方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十四方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十五方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十六方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十七方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十八方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百七十九方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百八十方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百八十一方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百八十二方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百八十三方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

○第千六百八十四方 別連地丁錢 二錢 舍雷阿芙蓉

遠古方書 卷十五 歌倚私的利 廣月堂

○第百六十五方 過傑栗屈的兒 蘇黑那

○第百六十六方 菲阿私越幾斯 鹿瑰精半弓溶解

○右調和每服十六滴漸加增

○第百六十七方 弗陽 日三六

亞爾鮮丁幾 葛私篤樓謨丁幾 鹿瑰精 各二 舍電

○第阿芙蓉液 刀十六方 渴

○右調勻每服四十滴日四次服

○第百六十八方 同上 阿芙蓉丁幾

○第百六十九方 額草丁幾 府利丁幾 過設印亞的兒 各一 加密列

○第百七十方 蒸餾油 薄荷蒸餾油 各十 滴

○右調勻每服三十滴乃至四十滴日四次利及七風氣鬱畜

○主治 百四十四方 白黑赤百六十五方 至歌倚私的利

○瘧癩 二 宜 〇 但其神經運機 變常セル者 脈管系觸動

○機元進也 兼ナル 淋否也 診別肉也 要 胎 觸動

○機元進也 者 衝動藥ヲ 屏 少 老利兒 結爾斯水 菲阿

○秘越幾斯 亞鉛華 甘消石精等ヲ 用フベシ

○第百六十六方 速別倫歌憶 飽熟三十六時

○第百六十七方 加密列油 亞的兒製 對其消石精 錢落他加後味

○第百六十八方 藥礮砂加過泥子精 錢 過 加後味

○右調勻每服十滴乃至十五滴沙糖點服日三四次

主浴歌倚私的利及風氣鬱蓄症等用宜之四次

○第千六百六十二方渴餓栗屈的兒解

右續草末半葛私篤樓謨二揮發鹿角鹽半錢和

○右調勻為散分十五服臨症服

至治同上亞論華傳前不靜善可服之鹿角精錢各二舍雷

○第千六百六十五方藥之複方默栗薩水三爾淇水菲何

默栗薩新葉一拘椽皮新鮮諸限肉豆蔻要胡荽碎煙

○蘇種水楊梅各共研重蘇變常以昔爾曾茶煎煙

右細剉注再餹燒酒六比默栗薩水三比飽熟半面後蒸餹

取液減至四分十煎日四水

○其治此方諸種小神經病殊歌倚私的利及風氣鬱蓄

症蘇種水蘇種昔水同稱用七用法每服半茶匙一茶

匙乃為二茶匙用蘇種水煎蘇種水煎蘇種水煎蘇種水煎

○第千六百六十四方藥類方

默栗薩新葉一拘椽皮新鮮諸限肉豆蔻白芷各三

右蘇種水楊梅各一蘇種水煎蘇種水煎蘇種水煎蘇種水煎

○右注再餹燒酒六比默栗薩水三比飽熟三十六時三

○第千六百六十五方劉西各水煎蘇種水煎蘇種水煎蘇種水煎

佳白為驗一爾爾曾鬼子溶化濾過加後味三用之急

各鹿角鹽錢蘇種砂加石灰精煎蘇種茶煎蘇種和之痛處

右調身每服五滴乃至三十滴冷水或茶點服

○主治 歌倚私的利 癰癤 蛇毒 等症 宜 點 或 吹 藥 二 用 一

○藥 續 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方

○第 五 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方

主 精 製 酒 石 鹽 錢 一 芸 香 越 幾 斯 錢 二 續 草 水 綿 荅 幾 里

○第 五 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方

○者 調 身 每 半 時 服 四 食 匙 皮 錢 或 諸 肉 豆 蔻 胡 荽 等 藥

○主 治 歌 倚 私 的 利 癰 癤 性 嘔 吐 宜 一 〇 里 歌 利 飲 方 及 七

沸 騰 散 二 方 三 方 亦 同 効 藥 性 凡 用 此 藥 須 半 茶 棗 湯 送 下

○第 五 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方 續 十 六 百 六 十 六 方

別 私 黜 設 弗 神 經 丁 幾 錢 菲 阿 私 越 幾 斯 半 刀

右 調 身 每 一 時 十 五 滴 沙 糖 或 薄 荷 泡 劑 點 服

○主 治 所 謂 歌 倚 私 的 利 家 偏 頭 痛 宜 一

○第 一 千 六 百 六 十 八 方 歌 倚 私 的 利

主 拔 爾 撒 謨 索 露 錢 四 甘 海 鹽 精 燒 酒 各 適 宜 料 法 亦 同

右 溶 和 取 一 茶 匙 塗 擦 頭 痛 處 宜 一 時 二 刻 一 時 亦 同

主 治 偏 頭 痛 或 歌 倚 私 的 利 家 局 所 頭 痛 宜 一 時 二 刻 一 時 亦 同

主 治 宜 一 〇 里 的 鬼 點 滴 或 拘 緣 皮 貼 斯 亦 同

○傳 効 一 〇 里 歌 爾 頑 固 歌 倚 私 的 利 頭 痛 治 之 忽

弗 滿 拔 爾 撒 謨 非 荅 以 于 曼 陀 羅 華 丁 幾 二 和 之 痛 處 二

塗擦之凡非前非各次乃至三次藥華之藥味之藥味

○第一千六百六十九方〔秘刺律私〕由味煎藥之味之藥味

精製阿魏錢半由民埕列里精之弓溶解之由味煎藥之味之藥味

右調勻每服四十滴乃至五十滴日三次煎藥之味之藥味

主治腦之第十對神經之瀰蔓之部係之歌倚私的利

性諸症瘧瘵欬嘔嘔咽喉及之胃之瘧瘵之兼併之者此

○第一千六百七十方〔弗貯爾姪蒲蘭突〕由歌利飲之及之

蒿管越幾斯刀半五厘刺昆虫蘊謨漿宜黑眼

限巴上之味之寧調和加後味之強效藥

○井水牙六覆盆子舍利別弓半

右每一時服二食匙之由味煎藥之味之藥味

主治瘧瘵欬不眠及之歌倚私的利性諸症之宜之藥味

○第一千六百七十一方〔福屈篤〕

雜腹蘭末八三阿芙蓉末八三洛黥私非祿沙越幾斯

〔蒿草一種〕阿芙蓉末八三洛黥私非祿沙越幾斯

右調勻為十二丸衣金箔玻璃壘收貯每晚臨卧取一九顯

草泡劑送下之為灌腸方

主治歌倚私的利不眠症之宜之

○第一千六百七十二方〔不靜〕由味煎藥之味之藥味

由味煎藥之味之藥味

廣 半 堂

交子方真 卷十三 歌何私的利 三六 廣 月 堂

○第阿芙蓉丁幾十磅砂加石灰精錢各一 忽弗滿拔爾撒謨

○第非答半 復方白並精附二錢

右調勻塗擦

○第一千六百七十三方過備栗屈的兒

阿魏丁幾錢各二 復方乳香精一弓附

右調勻塗擦心窩阿芙蓉末

○第一千六百七十四方同上

玉琥珀油錢半 薄荷油滴十五 硫砂揮發華水且鹿琥珀精

舍電阿芙蓉液錢各一 非阿私油各煮製者六錢 加密列油

右調勻塗擦心窩舍電阿芙蓉末

○第一千六百七十五方同上

瓦爾拔奴謨加雜腹蘭膏附一 阿魏膏錢二 薄荷油十二

玉滴 煇劑味附味二 硫砂揮發華水一 用此法煉之八 譯宜

右攪和攤單貼心窩日四次

○第一千六百七十六方別連此 加密列半 熱湯適宜浸瀝過取五弓加發味二 蘇和

雞子黃二 阿列襪油二 糖半一弓

右調勻作乳劑為灌腸方由一箇有形病一係此法會得

○第一千六百七十七方第一箭六百五 玉琥珀油一

阿魏錢二 蘇和一 蘇和一 蘇和一 蘇和一

蘇和一 蘇和一 蘇和一 蘇和一

蘇和一 蘇和一 蘇和一 蘇和一 蘇和一

右加嬰粟殼煎一坵搗爛瀝過為灌腸劑

忍弗滿故爾撒謔

○主治一千六百七十六方ヨリ一千六百七十七方至歌倚

私的利證

○第華千六百七十八方歌倚蘭瘦

格綸僕根半煎井水干煮熬至八瀝過加後味

○第鏡丁幾 纈草丁幾 橙皮丁幾

各一錢

○右調勻每服二食匙日四次

主治歌倚私的利ニ強壯劑トシテ用ヒ功ヲ収ムルニ宜

シテ爾林林藥味錄賦蘭膏阿私油阿藥膏藥油藥粉藥

遠西方彙卷之十五

遠西方彙卷之十六

其淵中異常、聖醫、神醫、獨心、加幾安頓、早著

立前、藥、神、聖、獨、心、加、幾、安、頓、早、著

文、貴、妻、特、多、血、畜、齋、不、陳、發、其、難、也、其、難、也

醫、法、眼、貫、齋、伊、東、貞、文、仲、全、重、譯、血

此、淵、瀾、瀾、甚、難、要、也、南、洋、伊、東、醇、健、夫、以、參、校、動

精神病、治、法、之、難、也、羅、士、蘭、之、醫、藥、學、也、用、藥、之、難、也

醫者精神病之診、其原由一箇有酸病ニ係ル、此、會、得、ス

此時、乃、其、本、病、之、治、法、也、第、一、簡、要、也、蓋、開、脈、系、一、壅

塞、不、非、其、原、因、也、十、之、九、者、常、一、多、也、是、解、釋、微、也、越、幾、斯、劑

中和鹽類方九百九十九者方九百九十九至方九百九十九

緩下劑方五百四十九至方五百四十九植物絞汁方九百九十九

護謨安沒尼亞幾方九百九十九至方九百九十九

老利兒結爾斯水方八百八十五至方八百八十五鑛泉等方九百九十九

腹臟感觸甚遲鈍ノ症ハ上ノ諸劑ト吐酒石ヲ加ヘテ連

綿惡心ヲ起サシメ或ハ峻下劑ヲ與テ宜シ全身多血

及ヒ貴要ノ部多血畜積スル者ハ刺絡及ヒ蟻鍼ヲ施シ總

テ消燼法ヲ佳トス○若其起因簡探索テ其法ザル症ハ

其腦中異常ノ運營ヲ他部ニ誘導シ或ハ其症狀ニ從テ

之ヲ鎮靜シ感觸敏症或ハ之ヲ挑起スベシ腦ノ運營衰弱者

其之ヲ誘導スルノ法或ハ吐下藥ヲ以テ腸ニ導キ十六百八

至十六百八或ハ全身浴打膿法串線法灸或ハ頭項胃部等ニ

吐酒石軟膏六百三十五ヲ塗擦シ若シ吐酒石硬膏六百三十五

貼シ皮表ヲ引クニ宜シ甘朮モ亦瀉ヲ得ル至ハ誘導

不効下リ殊ニ腦燼衝症ニ轉スルニ於テ恐ル者最稱用テ全

身微温浴ハ每症須要トス頭ニ多血畜積セズ者ハ微温湯

中ニ浸坐セシメテ頭ニ灌水方九百九十九好方九百九十九腦方九百九十九運機方九百九十九

進セ方九百九十九鎮靜方九百九十九麻醉藥方九百九十九功方九百九十九収方九百九十九穿方九百九十九

十雖然此實芟塔利斯方九百九十九曼陀羅華方九百九十九菲阿斯老利兒結爾斯水青酸莨菪方九百九十九

廣 半 堂



阿芙蓉等用又外常下欲火旺盛者殊二龍腦

千六百九十五方稱用又○腦挑起曼草亞兒

尼加麝香法尼利亞的兒類衝動藥以專用然此亦効

キ者少也トセズ○此他能注意以テ飲食消化皮表蒸

發大便通利之障礙無力也○此醫治之須要也蓋其

方法極之簡易也此好藥也○精神病之多量服藥

要之論說不可十日却之也為其危險也陷者多

也○精神錯亂之醫治法○思之轉移之法也

也○最要也但此篇枚舉之暇也○此藥胃腸等

○第一千六百七十九方密優篤殺兒

孕鹼酒石陳蘆根越幾斯白蜜各半下幾已上三味蒸餾

○第一水三升乃至四升溶解益酒益公橙花油利別

有每兼時服一五食匙十滴乃至四十滴日三次服宜振

主治神思鬱憂及精神錯亂症腹內壅塞二因ル者之二

宜矣○此方ヲ以テ功ヲ収メ終ル欲スレバ久服ヲ要ス

○第一千六百八十一方春姪降之豐實水三升補藥

○藥孕鹼酒石半升至蒲公英流動越幾斯一升至綿苔

○熱下幾里私布水五升溶解加後味六升

陳老利兒結爾斯水錢至安贊沒尼酒錢并神聖利聖

石調勻每一時乃至六時半服食匙臨用宜振盪五八



右二氏為一九衣桂末每服四九乃至六九日二次

主治神思鬱憂症腹內壅塞因所者未宜之

○第一千六百八十四方 孤刺律私

瓦刺秩阿刺葉 薄荷油

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一包

主治精神病宜之 凡刺秩阿刺漸久加

○第一千六百八十五方 遠突生 至四十斷日三々調服宜

白墨列僕里根 醇醋 煮一分時濾取五分加

白糖一弓

右調和每一時半取一匙冷水半小盞和服

○第一千六百八十六方 虎兒

黑墨列僕里根 井水適宜煮濾過取八弓溶化孕齧

酒石一弓再加後味

清淨蜜 右調勻每一時半服一食匙

主治右二方鬱憂症及上精神錯乱等其症未發前腹内二

頑帶硬結腫アリテ起因ヲナス者ニ宜シ往昔黑白ノ墨

列僕里ヲ以テ精神病ヲ治スルヤ其量患者之ヲ服ノ連

綿不快ヲ覺エ或ハ吐下ヲ發スルヲ以テ度トセリ

○第一千六百八十七方

拔結耳名強壯丸

黑墨列僕里越幾斯

水製沒藥越幾斯

各葛爾儒

列葉通

右一氏為一九衣石松粉每服三九四九乃至六九即內二

主治精神錯亂水腫經閉三宜之

○第一千六百八十八方

實芟荅利斯于幾半和

右每服二十滴乃至三十滴日四次

○第一千六百八十九方

實芟荅利斯葉一錢熱湯適宜浸漬瀝過取四弓加

又海後藥

主治過爾托舍利別

右調勻每一時服一食匙

主治右二方千六百八十八方精神病脈管運營尤進之脈

動心跳疾數之症二宜之服量漸之加增之患者不快之覺

工。唐瀉之脈不整ヲ見ハスニ至ル

○第一千六百九十方

量實芟荅利斯葉錢半注井水適宜飽熟八分時瀝取

老利兒結爾斯水錢二精製曹達錢三

○右調勻每時服一食匙蘇魯魯九

主治精神病脈管ノ運機尤進セル症ニ宜シ之ニ兼テ小

量吐酒石<sub>イ</sub>與茶<sub>且</sub>内外冷水<sub>イ</sub>併用スル蓋<sub>外</sub>用<sub>外</sub>灌水

○法ニ宜シ之<sub>内</sub>服<sub>ス</sub>密<sub>ス</sub>幾<sub>ス</sub>失<sub>ル</sub>トシテ日服十六北ヨリ

二十北ニ至<sub>ス</sub>不<sub>レ</sub>盡<sub>ス</sub>復<sub>ス</sub>不<sub>レ</sub>至<sub>ス</sub>

○第六千六百九十一方過歲論強

主曼陀羅華<sub>打</sub>幾<sub>半</sub>甘草膏<sub>錢</sub>二

右每服十滴漸加至二十滴若三十滴日二三次

主治精神錯亂症脈管系ノ太過運管退クノ後之ヲ用フ

又感觸過敏ノ症ニ宜シ

○第一千六百九十七方別連杜

主曼陀羅華<sub>越</sub>幾<sub>斯</sub>甘草膏<sub>錢</sub>二

右調勻為六十九衣石松粉每服十九丸如茶飲之失味良

主治精神錯亂及此癲癩ニ宜シ日三次

○第一千六百九十三方瀝格魯杜

主菲阿私<sub>越</sub>幾<sub>斯</sub>菲阿刺<sub>兒</sub>結<sub>爾</sub>斯<sub>水</sub>

○第一千六百九十四方蘇魯魯後味

右調勻每時服二十滴

主治精神病感觸過敏ヲ鎮靖スルニ宜シ

芙蓉ニ優<sub>ル</sub>此症多シ病人全身多血及赤顏當多血畜積

美若之便秘易者如侍之阿芙蓉適當之血昏然  
其甚過敏之症僅此一症試之用之正姑息鎮降之心  
睡眠之促之瀉益之凡瀉屢之了り用之蓋外用之灌木

○第一千六百九十四方 調 眠 歇 蘭 度

二 蕨 落 越 幾 斯 半 瓦 刺 秩 阿 刺 錢 老 利 兒 結 彌 斯 冰 水

○第一千六百九十五方

右調酌每服三斗滴乃至六斗滴日三次

主治精神錯亂及鬱憂症 眠 歇 蘭 度 老 利 兒

結彌斯加菘若水 千四百八十方 草 殊 効 了 經 驗 七 了 之 了 用 了

○第一千六百九十五方 羅 設 耳

龍腦 錢半 龍 白 糖 亞 刺 昆 亞 蓮 護 漿 錢 各 斗 半 的 味 了 了

○第一千六百九十六方 後 藥

酢 了 半 接 骨 木 花 水 了 六 麗 春 花 舍 利 別 了 一

右調勻每一時服一食匙

○第一千六百九十六方

龍腦 錢半 亞 刺 昆 亞 蓮 護 末 錢 白 糖 錢 二

已上三味入石臼徐徐搗爛加後味

酢 了 六 豐 粟 舍 了 了 了

○右溶和每服一斗食匙日二次乃至四次

主治右二方精神病陰部ノ感觸敏捷ヲ兼又ル者殊ニ此

方宜

○第一千六百九十七方 警魯歇屈篤

甘秉二

薩昆那越幾斯四

瞿粟舍利別適

右適宜分為塊每服一塊

主治精神錯乱症經閉二因ル者之宜

○第一千六百九十八方 同上

格綸僕末

錢

大黃末

刀二

加密列越幾斯二

葛縷子

油五

雜腹蘭舍利別適

右適宜作丸每服四丸日二次

主治精神錯乱症經閉ヲ兼又ル者又歇倚私的利及ヒ依

用朴昆垚兒食俱ニ供用スベシ

○第一千六百九十九方 集滿

以 醋酸亞鉛錢一

蒸餾水六 溶解

帶右每半時服一食匙

主治神經熱ノ譫語及ヒ顔面羅斯又精神錯乱ニ宜

醋酸亞鉛五錢乃至六錢餘以與ル者往々之アリ

類下二第三類

單發望慢性病係補給器系症

第一係諸液分泌器症

鼻 甲粘液太過症

鼻孔及氣管粘液太過症

ブレノルロナトリウム。エト。タラ  
セー。カタリユス。コロニキス。羅

○聖京僞 嗽器

單純聖京僞ハ醫藥ヲ須メズ大抵接骨木花或ハ菩提樹花

浸一二盞ヲ服ノ以テ其蒸發氣ノ閉塞ヲ復スレバ其症暫

時ニ掃スルニ足リ若其効力更ニ強キヲ要スレハ民

埵列利精千七百方若クハ鹿瑰精千七百方又用スベシ其症熱ヲ

帶フル者ハ聖京僞熱ノ治ニ從事スベシ四十方乃至四十

嗽ヲ治スルハ先皮表ノ變調ヲ整復スルヲ要シ後

和胸泡劑千七百方燕麥粘汁。諸種ノ和胸舍利別等ヲ

用ヒテ之ヲ寬解スベシ更ニ劇症ニ至テハ礪砂千七百方

安質及尼劑及ヒ硫磺劑以必要ト込嗽頻々ニ粘液

分泌夥多ナルニ痰質甚粘膠ニ粘付之ヲ豁利スルニ勞苦

スル者ハ金硫黃千七百方結兒茂斯密涅刺列千七百

三方至千七百方少量吐酒石千七百方及ヒ薤藹華千七百

安波尼亞千七百方三五百三十三方。千三百五十八方。千三百六十七

方四百稱用込其他慢性聖京僞并用スル所ノ藥劑各

方下臨生治ヲ詳ニ不爾蘇骨木花及ハ菩提樹花或ハ廣葉

○第壹章 蘇骨木花浸四接骨木子舍利別半

○第貳章 蘇骨木花浸四接骨木子舍利別半

右調勻毎時服一食匙二宜



○**聖治**單純咳嗽及七聖京偶二宜之

○**第六**年此首蘇方嗽蘇骨木水或氣

○**萬**鹿琥精錢 安質沒尼酒 羊接骨木花或八菩提樹花

水右調勻每一時二十滴接骨木花或寒菩提樹花泡劑點服

○**主治**聖京偶無熱症及此咳嗽宜用

○**第六**年此首蘇方嗽蘇骨木水或氣

○**華**澄茄錢 量拔爾撒謨篤露

○**拔**爾撒謨篤露 舍利別

○**右**十以為一球衣桂末每服一球日二三

○**主治**經久鼻孔日初粘液流出及此症及此感冒二宜之

○**羅**遠秘的印

吐酒每十百方五溶液之鼻中注射

○**第一**千七百三次過際栗屈的兒

○**蘇**其乘半 蘇阿松越幾斯

○**右**調勻為散分四服每一時半服

○**主治**聖京偶六初起之ヲ制伏スルニ宜之

○**第**一七四四方同

○**第**一七四四方同

○**第**一七四四方同

○**第**一七四四方同

○**第**一七四四方同

主治同前

○第一千七百五方 戒歇蘭度

和胸劑料 麻爾羅歇葉

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百六方

○第一千七百七方 孤刺律私

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百七方 亞麻仁末

右調和水二彬 篤少項 煮沸瀝過取液 一日服盡

○第一千七百八方 穀優蘭篤

點失刺蓮 亞遏爾托

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百九方 刺漚私

主治一千七百五方 一千七百八方 至聖京強症 二宜

○第一千七百九方 刺漚私

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百十方 戒歇蘭度

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百十方 戒歇蘭度

右調和為和胸泡劑料

○第一千七百十方 戒歇蘭度

右調勻每半時服一食匙

○主治右二方千七百九方急性及慢性千七百十方聖京傷用

○第一千七百十一方刺胃

點尖刺蓮末 冰糖各半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

○主治聖京傷胸內係小症粘液膜ノ感觸過敏ヲ兼子粘

痰豁利之難キ者之二宜之百八方至聖京傷宜

○第一千七百十二方篤姪

甘扁桃油一 亞刺毘亞蓮謨末適 黑櫻實水半 橙

花舍利別一

右調勻為散劑每半時服一茶匙

○主治刺衝嗽用易力白粉亞蓮謨末

○第一千七百十三方歌蘭度

蘆根越幾斯半 麻爾羅歌越幾斯酒石葉各二 安

質沒尼酒六 老利兒結爾斯水各一 苗香水各六

右調勻每一時半服一食匙

○主治慢性乾咳宜 羊泉終 苗香水

○第一千七百十四方 福偏列爾名和胸散 粟大爾

葛爾儒別葉半 半夏錢 遏泥子苗 苗香各一 宜硫黃

華半 爲丹 麥那 一茶 湯調 三四 水液 質人 最結 金硫

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治胸內聖京僑二用<sub>レ</sub><sub>レ</sub>略痰易カ<sub>レ</sub><sub>レ</sub>宜研黃

○第一千七百十五方 嗽<sub>レ</sub>蘭度聖京僑越<sub>レ</sub>栗失爾<sub>レ</sub>

葛爾儒別越<sub>レ</sub>幾斯<sub>レ</sub>錢一 蜀羊泉越<sub>レ</sub>幾斯<sub>レ</sub>刀一 茴香水<sub>レ</sub>弓一

老利兒結爾斯水<sub>レ</sub>錢一 食<sub>レ</sub>三四次

右調勻每服六十滴日四次<sub>レ</sub><sub>レ</sub>感<sub>レ</sub>齒<sub>レ</sub>齒<sub>レ</sub>水<sub>レ</sub>乘<sub>レ</sub>于<sub>レ</sub>粘

主治乾<sub>レ</sub>嗽<sub>レ</sub>二用<sub>レ</sub>七<sub>レ</sub>テ非凡<sub>レ</sub>ノ効<sub>レ</sub>了<sub>レ</sub>少<sub>レ</sub>濕<sub>レ</sub> 酢<sub>レ</sub>子<sub>レ</sub>漿<sub>レ</sub>錢二 安

○第一千七百十六方 嗽<sub>レ</sub>蘭度

金硫黃<sub>レ</sub> 菲阿私越<sub>レ</sub>幾斯<sub>レ</sub>至<sub>レ</sub>六<sub>レ</sub>錢一 白糖<sub>レ</sub>錢一 實水<sub>レ</sub>弓半 橙

右調勻為散分六<sub>レ</sub>畧每服一<sub>レ</sub>畧日四次

○第一千七百十七方 嗽<sub>レ</sub>蘭度

金硫黃<sub>レ</sub> 菲阿私越<sub>レ</sub>幾斯<sub>レ</sub>至<sub>レ</sub>八<sub>レ</sub>錢二 亞刺<sub>レ</sub>毘亞<sub>レ</sub>蘊<sub>レ</sub>謨<sub>レ</sub>末<sub>レ</sub>錢二

甘草末<sub>レ</sub>錢三 白糖<sub>レ</sub>錢六 亞<sub>レ</sub>及<sub>レ</sub>化<sub>レ</sub>亞<sub>レ</sub>幾<sub>レ</sub>半<sub>レ</sub>錢一 遠志<sub>レ</sub>末<sub>レ</sub>錢一

右調勻每服一<sub>レ</sub>茶匙和胸泡劑送下日四次<sub>レ</sub><sub>レ</sub>藥<sub>レ</sub>阿<sub>レ</sub>美<sub>レ</sub>蓉<sub>レ</sub>入<sub>レ</sub>五

○第一千七百十八方 嗽<sub>レ</sub>蘭度

金硫黃<sub>レ</sub> 菲阿私越<sub>レ</sub>幾斯<sub>レ</sub>至<sub>レ</sub>四<sub>レ</sub>錢一 亞刺<sub>レ</sub>毘亞<sub>レ</sub>蘊<sub>レ</sub>謨<sub>レ</sub>末<sub>レ</sub>錢三

邊爾拖舍利別<sub>レ</sub>井水<sub>レ</sub>各<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>二<sub>レ</sub>次<sub>レ</sub>夜<sub>レ</sub>三<sub>レ</sub>次<sub>レ</sub>了<sub>レ</sub>了<sub>レ</sub>

右調勻每一<sub>レ</sub>時服<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>茶匙臨服宜振盪<sub>レ</sub>

○第一千七百十六方ヨリ一千七百十八方至<sub>レ</sub>嗽<sub>レ</sub>二用<sub>レ</sub>七<sub>レ</sub>テ

祛痰<sub>レ</sub>ヲ促<sub>レ</sub>スニ宜<sub>レ</sub>シ○感觸遲鈍粘液質ノ人最能ク金硫

遠西方彙 卷十六 聖京僑 救救 十三 廣月堂

黃丸服之凡二堪之

○第一千七百十九方

金硫黃原本分量 茶土水香越幾斯宜適

右為三十九衣石松粉每服一二九日三次

主治胸肉聖京屈

○第一千七百二十方

精製消石半 茶金硫黃半 龍腦半 四精製阿芙蓉四分

○第一千七百二十方

論分為散分

○第一千七百二十方

壓連

○第一千七百二十方

金硫黃錢半 精製護安沒尼亞幾半錢 遠志末錢二

○第一千七百二十方

右為百五

○第一千七百二十方

主治經久胸肉聖京屈

○第一千七百二十方

金硫黃六 加達刺促萬護適宜徐々研合加後味海

苗香水五 菲阿私越幾斯六 精製甘草膏半錢 遠



右調勻每一時服一茶匙一

○第一千七百二十六方速別倫歌德

○藥結爾茂私密涅刺列蜀羊泉越幾斯

右為四十九衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘貯每半

時服一九

○第一千七百二十七方秘拔爾託

○藥結爾茂私密涅刺列刺發私越幾斯

右為四十九衣石松粉每半時服一九

主治已上二方慢性感冒宜之

○第一千七百二十八方颯結魯

○第吐酒石半水適宜融解加後味

主治蒸餅心對白糖宜適

右為百三十九衣石松粉早晚服一九

主治慢性聖京低宜

○第一千七百二十九方職歌蘭度

○藥蜀羊泉莖井水十勺煮耗至七勺加後藥

○孕醃酒石錢安質沒尼酒冊四其草舍利列

右調勻每服一食匙日四次

○主治乾救經久一症此方之ヲ主トル無テ弗刺涅兒ヲ以

○胸上ヲ覆敷又上膊若久ハ胸部ニ發疱膏ヲ貼シ二三

週間之ヲ打膿七五公茶八八郎濟二發或膏ハ胡之二三

○第一千七百三十三方洞生 硫黃華錢半 泉越幾斯錢 無之弗傳望泉

右蜀羊泉越幾斯錢 硫黃華錢半 泉越幾斯

右調勻所氏為一九衣石松粉每服四五丸乃至八九日四

次置羊泉並半 井水十五黃抹至大 味煎藥

○第一千七百三十六方難 穢歇蘭度發汗散

主精製硫黃錢 金硫黃 龍腦各八 白糖錢二

右調勻為散每服一刀尖日二次乃至四次

主治聖京低。僕麻質斯及七依低篤症二宜之

○第一千七百三十二方穢歇蘭度

硫黃華 純精酒石各半 甘草錢二 過泥子子 油糖錢一

旃那葉二 金硫黃六

右調勻每服一茶匙日三次

主治慢性欬嗽二宜之無之燕麥粘汁接骨木花泡劑和胸

飲等ヲ多服セシムベシ

○第一千七百三十三方骨布 靚那二附 五至四附 人精製

精製硫黃五錢至 甘草膏 乳糖各三 甘草錢 伊里

斯弗魯連底那錢

右調勻為散每一時服一茶匙

主治頑滯聖京低喘息二宜之又救血痔疾二因之死者及



肺癆初起ニ用フベシ但煖衝性及ヒ多血症ハ決テ硫黄劑ヲ投スルヲ勿ル一茶匙

○第一千七百三十四方同上

精製硫黄三錢 甘草膏四 白糖二

右調和分爲錠七十個每一時服二個乃至四個

主治同上

○第一千七百三十五方越埵兒名祛痰散

安息香酸一 甘草末 伊里斯弗魯底那末各二錢 精製硫黄半 白糖二 過泥子油各一 茴香油滴

右調勻爲散私葛點刺名 収貯每服一茶匙日三次

○第一千七百三十六方設

硫黄華林苗香各一錢 亞伊里斯弗魯連底那蘇梅那葉各一

○第一千七百三十七方蘇

布調勻爲散每時服及至二時服一刀尖

主治 聖京強二 宜三 或一 痛性二 從テ尚他味ヲ任用ス

○第一千七百三十八方吐根末二三

芙蓉二 或一 結爾茂私 密涅刺列四 或一 精製硫砂半

錢乃至一錢或 精製消石一二 錢ヲ配スルカ如キ是ナ

リ白 蘇一 吐酒石一 阿芙蓉余 利列

○第一千七百三十七方復方 甘草散 蘇蘇 蘇蘇 蘇蘇

遠西方彙 卷十一 聖京強 救救 十一 廣 堂

○第甘草末百梅那葉末錢各麝香末錢各苗香末錢各精製硫黃錢各

黃白糖錢六

○右調勻為散朝夕服茶匙一二錢酒入小口吹干是也

○主治聖京屈二宜通又之瀉藥以入之八散藥以入之

○第一千七百三十九方戒歇蘭度

○斯百兒麻攝篤錢三白糖錢三外和錢三

○右調勻為散每服茶匙日三次

○第一千七百三十九方戒歇蘭度

○斯百兒麻攝篤錢三亞刺毘亞護謨錢三白糖錢三

○第一已上三味徐々研和加蒸餾水四錢

○右調勻每時服一食匙臨服宜振盪味

○第一千七百四十四方戒歇蘭度

○斯百兒麻攝篤錢三消石錢一伊里斯弗魯連底那根末

○黃白糖各半

○右調勻為散每服茶匙日三四次

○主治右三方至一千七百四十八方聖京屈症款嗽等

○第一千七百四十四方刺曹私

○第注抹香錢二井水八煮瀝過取六後味甘草二

○第精製礪砂錢一吐酒石一阿芙蓉舍利別半

○右調勻每時服一食匙

主胎經久聖京傷軟及七肺管粘液畜積七ル者ニ宜シ

○第一千七百四十五方同生 阿芙蓉舍膠附

右瓦列阿布失穗點失刺種 薤附 薑過兒托各新和 甘草錢二

右細剉調和四分取其一水一北半煮一日服盡

○主治慢性胸中聖京傷將二粘液勞三陷及七者肺

臟結核二軟化又膿ヲ吐出ル者此方ニ宜シ

○第一千七百四十三方越層溼魯

○第瓦列阿布失葉一散子 里祺弗魯連水 派林志

右井水一北煮四分時瀝取液十二時間服盡

○主治慢性肺管聖京傷ニ宜シ 世上通知スル所ノ栗幣

魯名和胸劑一名佛蘭見歇情名人ノ泡劑ト稱スル方モ亦

瓦列阿布失葉又以製及少丈ノ因テ錢又所ノ對

○第一千七百四十四方蓮珍 堤日四心 至六心

右薤護安沒尼亞幾 雞子黃適 肥束布水四 海

葱蜜藥 肺臟感 過敏 脈率急或 頑固ノ 乾

右調和每一時服食是臨服宜振盪一 半時味減

○主治肺臟粘液鬱積及肺麻痺ノ初起ニ宜シ

○第一千七百四十五方叔拔爾託

主薤護安沒尼亞幾 舍利別淋 過兒托舍利 別各半 安質

右沒尼酒四 煎一 茶一 湯一

右調勻每半時服一茶匙

○主治慢性聖京偏二用此方粘痰膠着七院不治ス海聖

○宜二十百四十五方

○第一千七百四十六方福福葛

○護謨安沒尼亞幾錢一吳加甘草舍利別一弓半捏和為泥

加後藥

○角苗香末

錢三精製礪砂錢一黃

○眼東水

○右調勻為舐劑每服一小茶匙日四次乃至六次

○主治肺管入粘液膜弛緩及七支上因テ發スル所ノ慢性

粘液軟

○第一千七百四十七方

弗陽

○主苗香水

錢二

越埵兒

名和胸

不幾

刀

鹿瑰精

刀

實亞

○主格地温

錢二

○右調勻每一時服一茶匙

白蘇

○主治聖京偏症肺臟感觸過敏緊脹牽急或ハ頑固ノ乾

○效以兼ル者二宜

○第一千七百四十八方

○葛兒儒別越幾斯

錢一錢至

菲阿私越幾斯

八氏至

苗

○香水

甘草舍利別

各一

礪砂加過泥子精

錢一

苗香水

○右調勻每一時服一食匙

○第一千七百四十九方別連杜

白麻爾羅歌越幾斯錢二 蜀羊泉越幾斯半錢 苗香水

五錢 礪砂加過泥子精錢二 過兒托舍利別半八至 面

○右調勻每一時服一食匙

主治右二方慢性胸中聖京屈二宜一別一半一捏和為泥

○第一千七百五十方弗栗結 藍紫 牽意 瓦八 酥固八 葶

女礪鉄華四 葛蒲根末砂 白糖各六

右調勻為散分十二畏每服一畏日三四次

主治呼吸器及小腸管上部粘液膜慢性疾患二宜一資

○第一千七百五十一方賦 歌蘭度

依蘭苔 蜀羊泉各半 井水十四 煮耗至八 濾

過加後藥華 實美 荅味 祺半 原藥

礪砂加過泥子精六 甘草舍利別一

右調勻每服一食匙日四次

主治頑固欬嗽二宜一兼テ攝爾都兒水ヲ用ヒ及ヒ瑞香

皮ヲ以テ片膊ニ貼ス劇症ニ至テ兩膊ニ貼スベシ

○第一千七百五十二方歌兒仙

依蘭苔煎八 舍電阿芙蓉液八 屋施茂爾二

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十三方同上

實芟荅利斯一氏至同上好沒藥 過泥子油糖各五

葛カカ私カカ栗刺皮半會會根根 齒香水

右調勻為散分八服每一時半一服

○第一千七百五十四方同上

阿仙藥半常水四阿芙蓉加安息香酸可幾半一錢

屋施茂爾六錢 蘇爾精水 用用 又又 蘇香

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十五方同上 甘草合味

格綸僕末 礪砂華各十 實芟荅利斯半一氏 乳糖五

右調勻為散分六服每一時半一服十四日素抹至八日

主治手七百五十五方是リ千七百五十五方至弛緩性聖

京僞略痰甚過多ナル者ニ宜シ必過多ノ症ニ宜シ

○第一千七百五十六方佛栗糖 蘇爾精四 蘇爾精四

○第一千七百五十七方蘇爾精 遠志舍利別各 橙花舍利

至別務蘇爾精 蘇爾精蘇爾精 蘇爾精蘇爾精

右調勻每半時服一茶匙蘇爾精 蘇爾精蘇爾精

主治聖京僞略痰十分ナリル者ニ宜シ

○第一千七百五十七方蘇爾精 蘇爾精蘇爾精 蘇爾精蘇爾精

主撒爾非亞蘇爾精 肥束布油 著草油各四 亞兒魯末

白糖各 蘇爾精蘇爾精 蘇爾精蘇爾精

遠方彙 卷十六 聖京僞 款款 二十三 廣片堂

右調勻為散每一時服一茶匙

主治慢性粘液效宜

藥

過泥子油糖

亞

亞

○第一千七百五十分方

戒歌蘭度

○主地榆

右每服二十滴乃至

主治所謂煩效宜

○第一千七百五十分方

○主白地榆根錢

主治慢慢性嘶啞及肺管粘液分泌過多症宜

○第一千七百六十分方

○主白地榆丁幾

○第一千七百六十一方

○主安質沒尼酒

○主把舍利別

○右調勻每三分一

○右調勻每一時半服

○主治慢性嘶啞

○第一千七百六十一方

○主安質沒尼酒

○主把舍利別

○右調勻每三分一

○右調勻每一時半服

主治 幼兒聖京屈三宜シ 痰咳

○第一千七百六十二方骨布

精製硫黃八氏至十六氏

乳糖一

伊里斯弗魯連底那根末

○第一千七百六十一方骨布

右調勻為散分八晷每一時取一晷乳汁和服

主治 幼兒ノ胸病ニ宜シ ○或ハ吐根半氏乃至一氏半ヲ

伍シ 痙攣症ハ麝香一二氏ヲ加フ外合味

粘液勞

ピブレノルロヒルモニムフルドデルロンゲンリス

王レイムクラン

慢性聖京屈ニ相當ノ藥劑大抵肺ノ粘液勞ニ用フヘシ此ニ

先揭示スベキ品ハ依蘭香三百六十九方至三百七十五方

至一千七百七十一方 幾那六百六十一方 及七 沒藥七

百五千七百八十一方 至一千七百八十五方 是ナリ此保固強

壯藥ト相並テ肺臟弛緩ヲ防久々効ヌル者ハ苛烈ノ植物

及七 安實沒尼劑夕 卽速志千七百六十六方 過麻刺千七百六

百七十五方 千七 海葱蜀羊泉 千七 百七十二方 金硫黃及上 結爾茂斯密涅刺列七

七百十五方 吐酒石千七百八十八方 津唾甚粘稠々症ハ慢性聖京屈

療スルガ如ク 護謨安沒尼亞幾千三百五十三方 千三百六

三百六十三方 千七百四 阿魏 礪砂加過泥子精 鹿魄精七

四方 至千七百四 阿魏 礪砂加過泥子精 鹿魄精七

三百六十三方 千七百四 阿魏 礪砂加過泥子精 鹿魄精七

廣勝堂



百四十七方至千亞的兒油類千七百五地榆方至千七百五

十天造板爾撒謨千七百六十九方等方用方歌爾蘭獨

留謨菲阿斯及七阿芙蓉等之鎮痙藥亦須要之症多之肺

中粘液充積之室息之恐凡此者八吐根之吐方最即効

○第一千七百六十三方謨私篤

礪砂錢各二甘草錢各二金硫黃錢半茴香油糖半錢

右調勻為散每一時半一茶匙冷水送下

主治輕證粘液勞二宜

○第一千七百六十四方越魯潤屈

祿別利了幾不詳一錢錢過爾托煎方

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治聖京偈後之用之痰之豁利之及肺之粘液流出

症之宜之

○第一千七百六十五方別連杜

過麻刺葉及根井水十四勺煮濾過取八勺加後味

真甘海鹽精錢一過兒托舍利別方

右調勻每一時服一食匙

主治肺臟弛緩及七粘液溢流症二宜之

○第一千七百六十六方孤刺律私

遠志一錢半乃井水十勺煮熟至六勺加亞兒尼加花

錢蓋閉飽熟十分時濾過放冷再加後藥

○第鹿琥精錢六海葱蜜錢六

右調勻每一時服一食匙

主治老人聖京傷肺之弛緩ヲ兼又ル症胸水初起及ヒ室

息症ニ宜之 ○鹿琥精二代入一礪砂加過泥子精二刀ヲ

用又ルモ亦好

○第一千七百六十七方謨私篤

遠志亞兒尼加錢各一水適宜煮濾取四弓半加後藥

龍腦五亞五護二研和用安質沒尼酒錢半遠志舍利別半出

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

○第一千七百六十八方同

礪砂錢二龍腦六亞兒尼加花半金硫黃五白糖

右調勻為散每服一茶匙日四次

主治右二方粘液勞肺ノ感觸遲鈍ノ症ニ宜シ

○第一千七百六十九方越耳録弗

拔爾撒謨字露雞子黃淡幾那水製越幾斯錢六玫瑰

蜜三日期七十方奔拂

右調勻為散劑每一時半服一茶匙

○第一千七百七十方奔拂

右調勻為散劑每一時半服一茶匙

○第一千七百七十一方奔拂

○拔爾撒謨骨<sub>一錢</sub> 加沙糖適宜捏為泥加後味

新鮮驢馬乳<sub>北</sub> 攝爾都兒水<sub>或法仲水北</sub>

右調勻日服

主治右二方<sub>一千七百六十九方</sub> 肺勞<sub>宜</sub> 痰<sub>及</sub> 狂<sub>癲</sub>

○第一千七百七十一方<sub>拔爾訛</sub> 加過泥子精<sub>二刀</sub>

依蘭苔<sub>濃煎</sub> 溶化加後藥

甘草膏<sub>下幾錢</sub> 遠志<sub>舍利別錢</sub>

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治肺臟粘液溢流弛緩<sub>二</sub> 因<sub>凡</sub> 及<sub>七</sub> 粘液勞<sub>二</sub> 宜

○第一千七百七十二方<sub>過傑栗屈的兒</sub>

依蘭苔<sub>過</sub> 麻刺根<sub>各三</sub> 甘草<sub>錢六</sub> 蜀羊泉莖<sub>錢三</sub> 宜煮

○若細剉調和<sub>三</sub> 分取其一水適宜煮每日飲服

○第一千七百七十三方<sub>福佃篤</sub> 宜

依蘭苔<sub>半</sub> 藥那<sub>錢二</sub> 遠志<sub>一</sub> 甘草<sub>錢各一</sub> 角茴香<sub>錢半</sub>

右細剉調勻分六包每日一包水<sub>此</sub> 煮<sub>瀝</sub> 過服盡<sub>草</sub> 舍<sub>味</sub>

主治右二方<sub>肺管</sub> 粘液溢流症弛緩<sub>二</sub> 因<sub>凡</sub> 者<sub>二</sub> 宜<sub>二</sub> ○第

五百六十九方<sub>ヨリ</sub> 三百七十五方<sub>至</sub> 亦應用方<sub>ト</sub> ス

○第一千七百七十四方<sub>穢</sub> 獸<sub>蘭</sub> 度<sub>二</sub> 宜<sub>二</sub> ○第

依蘭苔<sub>錢六</sub> 蜀羊泉莖<sub>錢三</sub> 井水<sub>十六</sub> 多<sub>煮</sub> 耗<sub>至</sub> 八<sub>多</sub> 瀝

過加後藥<sub>二</sub> 宜<sub>二</sub> ○第

拔爾撒謨舍利別方 粘液勞  
廣月堂

右調肉每服二食匙日三次

○主治聖京傷肺之衰弱二因凡症粘液溢流ヲ兼又ル者二

宜方六十八方七十九方八十方八十一方八十二方八十三方八十四方八十五方八十六方八十七方八十八方八十九方九十方

○第一千七百七十五方同上

依蘭荅傑列方蜀羊泉越幾斯方甘草舍利

別方礪砂如過泥子精滴方甘草方角茴香方

○右調勻頻々茶匙抄服一日服盡

○第一千七百七十六方同上

洞庭藍葉 依蘭荅方各半 已上二味細剉常水適宜煮

至十分時濾過取一匙加後味方

本清淨蜜方胡方二食匙

右調勻每一時半服半小盞

○主治右二方粘液勞二宜方

○第一千七百七十七方賦歇蘭度

沒藥水製越幾斯方酒石葉液方

右調勻每一時半服四十滴

○主治同上方

○第一千七百七十八方過傑栗屈的兒

阿魏方蜀羊泉莖末方各一 紺百設木末方三 沒藥水製

廣半堂

透西方書 卷一 粘液勞 三 廣 月 堂

越幾斯錢二 羊泉並布各一 於百病本末三 或藥本藥

○右調勻一氏為一九衣石松粉每服九九日三次

主治栗屈的兒名人此九ヲ用ヒテ粘液勞已ニ重證ニ至レ

此者ヲ治セリ半服四十餘

○第一千七百七十九方 戒歇蘭度

○藥王幾那 刺達尼根各半 井水十二ヲ煮耗至八多濾

主治過加後味

古爾明攀錢半 遏兒托舍利別半

右調勻每一時服二食匙

主治粘液勞吐痰夥多ノ症緩劑依沒藥蘭苦効ヲ奏セサル者

○之二宜之但其症呼吸ニ妨碍アラサル者ニ用フベシ爾

○第一千七百八十方 思多傑滿

肝色硫黃錢 葛兒儒別越幾斯錢 菩提樹炭末一錢半

右拔爾撒謨字露カ 葛末カ

右調勻為丸衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘ハ貯每服

十丸日三次

○主治肺勞及七氣管咽喉粘液ニ宜之爾撒謨カ吹出ス

○第一千七百八十六方 栗屈的兒カ 宜之

○麻爾羅歇越幾斯 沒藥越幾斯 精製蘆謨安沒尼亞

錢各二カ 金硫黃錢 精製甘草膏錢

透西方書 卷一 粘液勞 三 廣 月 堂



加後藥

○藥幾那下幾錢六十亞爾鮮鹽刀二撒爾末兒秩斯以十六白

糖弓半

右調勻每服二食匙日三次

○第一千七百八十五方類方

至沒藥錢一酒石鹽五二十綿荅幾里私布水撒兒末

白糖弓半

右調勻每服一二食匙日四次臨服宜振盪

○第一千七百八十六方三ニステル此忽布滿

安息香花以四龍腦以二白糖刀一

右調勻為散分六服每一時一服

○主治粘液勞衰弱弛緩甚シキニ係ル症痰粘着シ脈沈十

九者之

胃腸粘液鬱積ス肺ノ腫ムエト左ントリキリエトシスインテ

此症解釋劑ヲ用テ即確砂百一方至百五方。二百二十

百八十一孕驗酒石五十三方至孕禁酒石千七百八十八方瀉利

七方

鹽吐酒石等之ニ屬ス並ニ峻烈ノ華爾私性植物。旃那。大黃。

千七百九藥刺巴。蘆薈千七百九十四方至等其宜シ但色

生藥劑ノ用量ヲ斟酌シ為ニ虛憊セシマテ要

遠田方彙 卷十六 廣勝堂

胃腸大ニ汚物畜積スルニ後ニ時々吐下藥ヲ與フハ此病

後功ヲ収ムルニ苦味藥千七百九十六方至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

部ニ衰弱ヲ復シ再粘液ノ聚積ヲ妨グニ此藥ハ苦味藥千七百九十六方至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

○第一千七百八十七方至一千八百一十方至一千八百一十方至千八百一十方

精製礪砂用精製甘草膏吐酒石各一百五十錢至千八百一十方至千八百一十方

已上三味橙花水四勺融解布水撒見末至千八百一十方至千八百一十方

右調勻每時服一食匙至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

主治胃腸粘液畜積宜至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

○第一千七百八十八方至一千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

精製孕礪酒石半常水六勺溶解加後味至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

蒲公英流動越幾斯錢至千八百一十方至千八百一十方至千八百一十方

右調勻每時服一食匙

主治同上○五千方至五千三方至五千三方至五千三方至五千三方

六千一方至六千一方至六千一方至六千一方至六千一方

○第一千七百九十九方至一千八百一十方至一千八百一十方至一千八百一十方

黃麻屈涅失亞孕礪酒石大黃薄荷油糖各二錢至一千八百一十方至一千八百一十方

右調和為散每服一茶匙

主治飢食七者之六宜以又胃腸汚物及口粘液ノ畜積

二用至一千八百一十方至一千八百一十方至一千八百一十方至一千八百一十方

○第一千七百九十九方至一千八百一十方至一千八百一十方至一千八百一十方

廣 半



○藥精製孕禁酒石錢

大黃二錢

苗香油六滴

葛兒儒別越

幾斯宜適

右為六十九衣苗香末每服五丸乃至八丸日四次八番煎

主治胃腸粘液蓄積亦宜之

○第一千七百九十一方同上

○第大黃一錢

薄荷油十滴

牛膽凝固者二錢

○第著草葉末宜適

右為百二十九衣伊里斯弗魯連底那根末每服五丸乃至

八九日三次

主治同上粘液痔二稱譽七ル方九百四十四方至七百亦此二

用

蘇文下幾

林餘對越幾

○第一千七百九十二方

主蘆薈水製越幾斯一錢

複方大黃越幾斯附半錢

右調勻二瓜為一丸衣石松粉早晚服一二丸

○第一千七百九十三方歌愷

蘆薈水製越幾斯半錢

亞刺巴末二錢

右調勻為二十九衣石松粉每晚服一九乃至三九

主治右二方胃腸粘液蓄積亦宜之

○第一千七百九十四方同上

蘆薈水製越幾斯半錢

葛私篤儂謨末

亞刺昆亞護謨

末各五

右調勻為二十九衣石松粉玻璃壘收貯早晚服一二九

主治依朴昆垚兒家胃腸粘液畜積二罹ル者之ニ宜シ

○第一千七百九十五方屋兒弗 煎服一氏六至三氏

芥子亞的兒油二滴 亞刺昆亞蘊謨宜適 キイスダム水

○第六方 白糖四錢至二錢

右調勻為乳劑每一時服一食匙煎服一二氏

主治胃中粘液畜積及七之ニ因ル不食症ニ宜シ九乃至

○第一千七百九十六方戒歇蘭度

忽布ホフ 滿健胃丁幾附一 橙皮丁幾錢一 格綸僕コロンボ 越幾斯

右調勻用法同上

○右調勻干前午後服八十滴

○第一千七百九十七方同上

亞爾鮮丁幾 複方橙皮丁幾附各 黃子附各 蘇絲附各 芒檢附各

右調勻用法同上

○第一千七百九十八方同上

忽布ホフ 越幾斯原本秤量 薄荷水引 桂水引

右調勻每服六十滴日三次抹煎下味 煎煉下味 煎煉下味

○第一千七百九十九方抄 煎煉下味 煎煉下味

整魯別利附精製 白糖六

右調勻為散分十二包每一時半服一包

○主治 滯弗涅兒名ハ消食器衰弱症ニ整魯別利涅ヲ用フ

抗久名ハ衰弱症本復人期粘液熱下利格列刺等ニ之ヲ

試用セリ○整魯別利涅ハ名ハルベリス。ヒルガリス植物名

○及ヒ他種ノ名ハルベリス同上根皮ヨリ採製シ又ベルベリ

テ室素ヲ含畜ス臭氣無ク味甚苦ク黄色微細ノ芒針ニ

シテ光澤絹絲ノ如シ同上

○第一千八百方 救拔爾訛

拈失亞半 橙皮二 上好列印酒一北

右浸漬一日濾過每服一盞日三次

○第一千八百一方 歌蘭度

薑爾拈失亞 睡菜葉各六 山柰根 良姜各二

健智安那 橙皮各半 幾那二 煉鐵屑六

右上好列印酒或昏噶爾酒ハ多浸安暖所飽熟十二時每

服一利鳩爾盞日三次乃至四次

主治 千七百九十六方ヨリ千八百一方至粘液畜積症治

後胃腸ヲ補益スルニ宜シ

勝胱聖京伍リ 羅ル ノル コウ トヘ イト デル グラ ース 蘭

勝胱聖京伍ハ痔瘻壅塞ニ因テ来ル者屢之アリ其症ハ肛

廣勝堂

門周圍時々蟻蟻ヲ施之解凝劑及ヒ硫黃劑ヲ與へ又總テ

膀胱粘液痔ニ處スル所ノ藥劑ヲ佳トス九百四十七方至九百五十三方

○且強壯劑衝動藥ヲ併用ヲ用フルヲ最要トス即著草連

錢草洞庭藍紺百設木幾那殊ニ烏白烏爾識九百四十七方至九百五十二方

百五方。千八百三十一方。是ナリ飲料ニ櫟實寄喜ヲ用拔爾

撒謨骨拜霍十方。百方。的列並底那。華澄茄。八方。明礬。七方。至

八百廿九方。阿仙藥。八百三十一方。八百三十三方。刺達尼。八百三十三方。至

萬爾綿黥刺。九百七十一方。等ハ効力更ニ猛烈ナリ用ニ臨

テ尤慎重スヘシ若疼痛増進シ或ハ血脈系ノ觸動機尤盛

セシ證狀ヲ見ハセハ速ニ廢メ用フベカラス石灰水百十八

百至千方ハ其藥力更ニ緩キリ滲出液甚粘膠ナル者或ハ

尿酸分泌アル症並ニ尿石若クハ膀胱内潰瘍ヲ發セル症

尤之ヲ用フルニ宜シ○輓近多ク膀胱中ニ藥液ヲ注射ス

ル方法ヲ稱ス秩歇魯其名ノ法先乳汁扁桃乳亞麻仁煎過

兒托煎等ノ緩和劑ヲ用ヒ後罌粟球阿芙蓉水製越幾斯菲

阿斯越幾斯莨菪越幾斯等ヲ麻酔藥一二以テ上ハ藥汁ニ

和用ス其之ヲ施ス下日ニ三次乃至五次下ス而シ每次藥

液ハ膀胱ニ傳ルルニ十密扭篤ヨリ二十密扭篤ニ至シ勝

胱ノ感觸過敏ヲ鎮靜シ得テ后麻酔加拔爾撒謨劑ヲ注射

ス其方莨菪越幾斯一二以水三四分ニ溶ス者及ヒ拔爾撒

...

謨骨海霍一二錢漸加へテ一至ル鷄子白ヲ加へテ乳劑トシ  
 用之而シ其之ヲ注射セシテ毎日一次或ハ隔日ニシテ以  
 氣粘液ハ流出全ク止ム至ル但焮衝証ヲ見ハスハ  
 速用之ヲ休止ス○又刺魯列滿度名刺拔突同及ヒ秩歇魯  
 斯洞ヲ腐蝕藥液ヲ注射シ微々焮衝ヲ挑起シ以テ粘液流  
 出ヲ制スト云フ○終ニ含鑲泉ヲ用ヒテ以テ功ヲ収ム  
 シ井ルヅンゲハ水ヲ用フルヲ最佳トス不腸管ニ熱  
 ○第一千八百二方瀝瀉瀉瀝瀉中ニ藥味ヲ去ク  
名精製礮砂並甘草各等分ニシテ製ス  
右調勻ヲ散分ハ畏毎時半服シ畏甚キ者ハ  
 至若膀胱粘液流出症及ヒ慢性遺精等宜シ此ニ效驗ナ  
 ○第一千八百三方遠瀉瀉瀝瀉中ニ藥味ヲ去ク  
日烏白烏爾識葉半茶葉一常水六ヲ煮濾過加後味  
六過爾托舍利別錢六畏瀉瀉中ニ藥味ヲ去ク  
右調勻每服一食匙日四次乃至六次  
 主治膀胱聖藥結石等症宜シ  
 ○第一千八百四方遠瀉瀉瀝瀉中ニ藥味ヲ去ク  
刺發斯越幾斯三錢烏白烏爾識葉煎六者烏白烏爾  
主總溶解加後藥味ヲ去ク  
本曹達錢一杜松子一儼列乙一

至若膀胱粘液流出症及ヒ慢性遺精等宜シ此ニ效驗ナ  
 ○第一千八百三方遠瀉瀉瀝瀉中ニ藥味ヲ去ク  
日烏白烏爾識葉半茶葉一常水六ヲ煮濾過加後味  
六過爾托舍利別錢六畏瀉瀉中ニ藥味ヲ去ク  
右調勻每服一食匙日四次乃至六次  
 主治膀胱聖藥結石等症宜シ  
 ○第一千八百四方遠瀉瀉瀝瀉中ニ藥味ヲ去ク  
刺發斯越幾斯三錢烏白烏爾識葉煎六者烏白烏爾  
主總溶解加後藥味ヲ去ク  
本曹達錢一杜松子一儼列乙一



主治膀胱聖藥宜之（嬰）較姪孺兒度名八此症治之

凡三石松粉ヲ廢之石松葉ヲ稱用之五者及七結石ノ初

○第一千八百七方謨私篤 諸淋淋 諸淋淋 諸淋淋

玉連錢草生洞庭藍錢各錢滾湯適宜浸漬濾過取四加

本藥後味半匙煎半匙蓋不亞茶 松葉 玫瑰花 錢

著草越幾斯錢 紺百設木越幾斯刀 精製礪砂錢

右調勻每一時服一食是宜煮四食煎成為此散和

主治膀胱聖藥宜之（嬰）較姪孺兒度名八此症治之

○第一千八百八方刺鬱秘 凡水腫及七結石一豆之 九百

華澄茄末半 清淨蜜適 宜

右為煉膏每服茶匙日三次乃至四次

主治膀胱及尿道聖藥宜之總之經久粘液流出症

宜之（嬰）較姪孺兒度名八此症治之

○第一千八百九方增 凡水腫宜煮煎四食煎成為此散和

麻爾羅歇越幾斯錢 葛沒藥越幾斯日 吉納蘆謨錢 各二 撒

三爾末兒秩斯錢 出云 凡七利尿器ノ粘液流出一宜之 又

右調勻二以為一丸衣伊里斯弗魯連底那每服一劑日五

次每服半不蓋三方飲散會其

主治膀胱及七直腸粘液流出二宜之 又慢性肺臟聖藥

備弛緩二因四者二用一

○第一千八百十方一用之○較姪孃兒皮此症治入

生石灰水北 盧蘇蘇 煎出稱宜 又對封和 煎聖京

石每服半小盞

附考或八石灰水甘乳若乳酪等分混和之服之

二北半三至心卜云

○第一千八百十一方讚秘篤 蘇發洪斯吉 煎蘇蘇 煎

烏白烏爾識葉半 井水適宜煮濾取四勺加後味

正石灰水半 扁桃乳舍利別半

右調和每六時乃至至時服二食匙入沸水煎出或

至治右二方膀胱聖藥宜以至四也

○第一千八百十二方春煙隆

括失亞屑半 石灰水十八 入玻璃壘蓋閉浸漬二日

大濾過加後味

生桂酒水二附 煎封許煎煎出宜之○蓋之入

右調勻入玻璃壘密閉貯每服半盞日三次

主治虛性毒液流出症殊二利尿器之粘液流出宜以

腸胃衰弱及七依倔篤性全體衰弱用之白蘇

○第一千八百十三方秋歇魯其

至拔爾撒謨骨洋霍半 明礬 血竭 阿仙藥錢各一 麻

散大倔涅失亞適



右為百九日服十九至三十九

主治膀胱粘液流出二宜以禁 血尿 阿山藥

○第一千八百十四方別連杜

煎莞菁乾者 甘扁桃去皮 石灰水引 白糖一

右為乳劑濃過但不用絞 每一時乃至一時半服一食匙臨

服振盪入煎藥器開水每服半盞日三次

主治利尿器ノ虚性粘液流出二宜之 ○蓋之ヲ用フルハ

大ニ謹慎ヲ加ヌベシ

遠西方彙卷之十六

遠西方彙卷之十七

○盛學到之昔之豫濟之失條更論

獨允錄之加幾安頓著重濟

和蘭之傑婆都漢譯原

侍醫法眼貫齋伊東貞友仲村重譯

南洋伊東博健珠之參教

麻痺之羅之レイト

單純之醫藥ヲ要セ

體ヲ勞セ

刺戟衝動ノ飲食ヲ

戒之微温乳錦葵葉若クハ歇爾拔私屈謨煎以テ毎日數

遺... 廣...

田龜頭ヲ浴... 大低... 後患ヲ遺...

廿三燕麥粘劑。大麥水。米飲。或ハ後ニ列載... 煎液ハ

八百十八方至... 等ノ如キ粘滑飲料ヲ最要トス尚且油質粘

滑乳劑五百三方若夕ハ扁桃乳。罌粟乳。大麻子乳千八百十五

方十七或ハ粘滑散劑千八百方用... 〇焮衝痲ハ衆醫精

製消石但多クハ適ヲ乳劑千八百方或用... 或ハ甘乘千八百

方ヲ佳トス焮衝劇度ヲ進ミテ尿閉症ヲ發スル氏ハ瀉血

及ハ温暖琶布ヲ施シ焮衝退カ薩ハ阿撲蓉越幾斯乳劑

和シ與フ千八百方焮衝痲ハ便秘ス吐者多ク清涼下劑

〇瘧性ノ者ハ乳劑ニ老利兒結

爾斯水五百十方菲阿私越幾斯五百十三方或ハ舍電阿芙

蓉液五百十方和用... 同種藥例スルニ阿芙蓉小量吐

根及ヒ龍腦千八百三十三方至モ亦敏性痲ノ痛苦ヲ緩和

スルニ妙トス之ニ兼テ鎮痙射注法千八百四十三方ヲ施

スベシ若其痛失血ヲ兼ヌル者ハ疊布或ハ他ノ射注法千八百

五方四十ヲ施スベシ〇末期ハ至... 弛緩症ニ轉移

ルカ故ニ鹽酸重キニ老利兒結爾斯水千八百方和服之或

ハ拔爾撒謨骨瀝藿每服十滴日... 服以テ粘液流出ヲ止

ムニ但拔爾撒謨ノ服量漸ク加ヘテ二十五滴日... 止

滴ニ至ル射注法ハ往昔專行... 輓近復之ヲ稱

廣...

用之平雖安頓之意三從長之廢之用也

○癩毒之滅滅之始其往昔刺必私高私質屈斯之射注法

方十方用之栗格爾突各外結晶硝酸銀以濃溶液

最妙不稱之吾輩未之又親驗也

請以所病者之在之此如手猛劑之輕試

○第一千八百十五方

甘扁桃皮 白罌粟子 各半

爛作乳劑加後味

油金刺毘亞趨謨

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百十六方

大麻子 搗碎 甘扁桃 去皮各半

乳劑濾過加後味

○第一千八百十七方

大麻子 加常水十六勺徐之搗碎作乳劑濾過溶後

味

○第一千八百十八方

亞刺毘亞趨謨 錢 白糖 錢

亞刺毘亞趨謨 錢 白糖 錢

黃半



○藥錦葵葉四

過兒托根一

大麻子三

右細劉調勻取二食匙水四盞乃至六盞煮日服

○第一千八百二十四方

過兒托根末半

甘草

亞刺毘亞護謨

各二錢

白糖一

右調勻為散每服一茶匙亞麻子泡劑送下日四次

〔主治〕千八百十八方曰千八百二十四方至諸麻應用方

○第一千八百二十五方

消石一錢 甘扁桃乳十可溶解加後味

沙糖舍利別一

并水半共煮桃漿吹式和

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百二十六方

大麻子搗碎

加常水一匕徐々搗爛為乳劑溶拘椽酸

加里三錢後加左味

過兒托舍利別一

○右調勻每一時服半小盞

〔主治〕右二方欸衝痲ノ初期ニ宜シ○消石ハ通例利尿器

ノ疾患ヲ進ムルガ故ニ衆醫廢メ用ヒス 大野監修

○第一千八百二十七方

甘汞四

精製硫黃

刺蝟方各二

上好砂糖四

○第一千八百二十八方

精製硫黃

刺蝟方各二

上好砂糖四





○第千八百三十五方〔護秘〕蓋

覆盆子舍利別

右藥根末〔各一〕精製阿芙蓉

龍腦〔各一〕白糖〔各二〕

○右調勻為散分四服每晚一服

○第千八百三十六方〔護秘〕世

右龍腦〔各一〕亞刺昆西蘆謨漿〔各一〕取巴里〔各一〕味搗和徐々加

○第千八百三十七方〔護秘〕後味百三十四方

右扁桃稀乳〔各一〕砂糖〔各一〕錢〔各一〕

○右調勻每三時服一食匙〔各一〕

○第千八百三十八方〔護秘〕至靈敏性ノ

夜麻羅〔各一〕夜間陰莖勃起疼痛スル者之ニ宜シ此症先

陰莖根〔各一〕蜈蚣〔各一〕三條ヲ施ス〔各一〕

○第千八百三十九方〔護秘〕遠突〔各一〕

主杜松子傑列〔各一〕大麥煎〔各一〕

右調勻每三時服一食匙〔各一〕

主治麻疾特ニ瘰癧質ノ人麻ニ罹ル者衝既ニ退テ後此

○方ヲ用セテ久麻ヲ防クニ宜シ之ニ代ヘテ蜀羊泉煎ニ

杜松子舍利別ヲ加ヘ用フルモ亦可ナリ

○第千八百四十方〔護秘〕平〔各一〕共〔各一〕除〔各一〕爾〔各一〕水〔各一〕半〔各一〕

鹽酸重土〔各一〕錢〔各一〕老利兒結爾斯水半ヲ溶解〔各一〕

右調勻每半時服十五滴乃至二十五滴



〔主治〕痲ニ用キテ粘液分泌ヲ減スルニ宜シ焮衝ノ時期

モ亦用フベシ○安頓ハ焮衝既ニ去テ后此方ヲ用ヒテ

屢佳効ヲ得タリ最初重土半ヲ老利兒結爾斯水半ヲ

溶キ漸々重土ノ量ヲ加ヘテ半錢ニ至ル

○第一千八百四十方〔依過叔密士〕

〔主刺〕必斯高私蟄屈斯半々至 蒸餾水南地溶解

右調和微温毎一時半或二時注尿道

〔主治〕交媾後之ヲ施メ痲毒ヲ消亡スルニ宜シ然レ此腐

劑ヲ施スレ過度ナル勿レ動輒焮衝ヲ發スレハナリ○

或ハ痲毒ヲ滌除スルニ微温乳若クハ扁桃油ヲ射注ス

○〔交媾〕終リテ速ニ尿ヲ通スルヲ甚好トス但包

皮ヲ括約メ尿孔ヲ閉チ暫時耐忍シテ尿ヲ尿道ニ停ム

○第一千八百四十方〔塞格爾突〕

結晶硝酸銀五 蒸餾水一 溶解

右調勻隔日一回用玻璃水節射注尿道

〔主治〕痲毒ヲ感染シテ後第一日未焮衝ヲ發セサルハ前

減毒方トシテ用テ尙尙氣産解メ其時淋濁系林整メ

○第一千八百四十二方〔其魯單涅爾〕

主阿芙蓉越幾斯八 蒸餾水四 溶解加後藥



生示宜之重刺昆垂蕙謨溶液ヲ射注或ハ尿孔々周圍

ニ疊布ヲ施ス其効アラヌノ其症危急ニ至ル者獨上方

ヲ施用スルニ盡良外煎ニ長藥類ノ毎朝粘膠液淋瀝シ

久麻コノル何ハアル也キンダリア羅ニ密閉醋ニ代ヘテ

鈍性久麻ヲ治スルニ最峻藥ト稱スル者ハ拔爾撒謨骨泮

霍是子千八百四十六方至華澄茄亦同効利華水及飛

雖胃腸日拔爾撒謨ヲ服以ルニ堪ヘザル者ノミ獨之ヲ用

フベイ何ハ百六十二方至又兩藥相合ノ用フルト屢之ア

リ手千九百五十六方至其他的列並底那九方至阿仙藥十八百七

十方拔爾撒謨字露沒藥十八百七十方至阿仙藥十八百七

番木鱉越幾斯千八百三十七方幾那千八百七十五方加里

下水千八百七方至芫菁千八百七十九方至等ヲ用フト雖簡易

ヲ好トスルハ醫ハ決メ之ヲ配用スルトナシ病初刺戟収

斂劑ヲ施ス十分ナラザレハ其症鈍性久麻ニ變スル

ハ後亦刺戟収斂藥ヲ用フベシ而シ其類方蕃庶ナリトス

中ニ就テ最試驗ヲ經ルハ多キ者ヲ摺撫シテ此ハ列ス不子

八百九十二方至千〇久麻感觸過敏ニ原以後者ハ決シ刺戟

衝動藥殊ニ拔爾撒謨劑ヲ用フルト勿シ内服ニ鑛酸類ハ十

八百九十三方至千〇並ニ鉛糖加阿芙蓉等十八百九嘉稱テ射

注方ハ罌粟乳加老利兒結爾斯水千八百四方阿芙蓉越幾斯

遠西方書 卷之五 九 廣用堂

溶液ニ鉛醋少許ヲ加スル者千八百四醋酸亜鉛溶液等

宜シ千八百九久麻尿道中ニ潰瘍ニ因ル者華涅滿溶

乘散甘乘硝酸乘千七百九内服スル最簡要但外

用外乘千八百九或刺必斯高私蟄屈斯千八百九溶液

ヲ射注シ又婆婆ヲ挿入スルニ宜シ又婆婆久麻尿道

狹窄因ル者多外歴驗ノ法又其酸酸ヲ蒸熱ナル

○第一千八百四千方ニ其其強驗封入其獨變又用

拔爾撒謨骨淋霍ヲ服スル毎ニ綿越栗

毎服十五滴乃至二十滴日三次至善用ハ小瓶簡裝

番主冷鈍性久麻ニ宜シ漸々増シテ四十滴六十滴ニ至ル

○秘越秩鐮爾各人一拔爾撒謨骨淋霍ヲ服スル毎ニ綿越栗

云爾茂印失屈篤十五滴水少許ニ和服セシムルヲ妙ト

ス何下ナレ骨之ニ由テ胃能ク拔爾撒謨ニ堪スレバナ

○拔爾撒謨骨淋霍ヲ用テ後尚粘液ノ流出止マザ

ル者ニ暴訥爾田名幾那濃煎慢症ハ燒酒ヲ以テ尿道ニ

射注シ且冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗ハシム

○第一千八百四十七方婦兒屈

拔爾撒謨骨淋霍錢三錢鷄子黃三錢加井水五三搗和煎

○藥後味百四十方三次

○香桂水一桂舍利別半湯

遠西方彙 卷十七 廣用堂

右調勻每一時半服二食匙

○第一千八百四十八方 〔録私恒土〕

拔爾撒謨骨湃霍 錢二 垂刺毘垂蘊謨末 錢半 已止搗和

○第一千八百四十九方 〔祇設兒〕

拔爾撒謨骨湃霍 錢二 拘緣汁舍利別 錢六

右調勻每服一茶匙日四次

○第一千八百五十方 〔埵魯蘇屈〕

拔爾撒謨骨湃霍 錢半 忽弗滿液 錢二 桂舍利別 錢一

右調勻每服一茶匙日四次臨服宜振盪

○第一千八百五十一方 〔祇設兒〕

拔爾撒謨骨湃霍 拘緣汁舍利別 橙花水 綿苔藥

里私布水 各半 稀硫酸 錢半

右調勻每服一茶匙日四五次燕麥粘汁和服

備考若此方用之 瀉以凡并並每服阿芙蓉丁幾三

滴ヲ加フハシ 〔私恒土〕

○第一千八百五十二方 〔醫仙滿〕

蘇拔爾撒謨骨湃霍 錢半 薄荷油 滴八 亞打子油 滴二 阿芙蓉

丁幾 錢四 軟膏每一和之至一和半

右調和每服三十滴砂糖點服日三次

○第一千八百五十三方 〔醫私百兒〕

蘇西方彙 卷十七 廣勝堂

○藥甘扁桃去皮六錢 十丁寧搗爛加後味

○拔爾撒謨骨湃霍錢 阿仙藥末錢半 三拔爾撒謨骨湃霍錢三

右調勻為煉膏每一時乃至一時半服一茶匙

備考此方善治拔爾撒謨骨湃霍惡味ヲ掩テト雖若肉

○藥粘着スル其味嫌フヘシ

○第一千八百五十三方遠突土

○藥拔爾撒謨骨湃霍錢半 蜀羊泉莖越樂斯錢二 大黃末錢一

○藥刺昆亞蘊謨末宜適 四五六燕麥錢 刺昆亞蘊謨末錢

右調和二八為一九衣桂末每服七九乃至八九日四次

○第一千八百五十四方四粟布

○藥百蠟錢 上微火熔解加後味 蘊謨末錢 橙花水錢

○藥拔爾撒謨骨湃霍錢三 大黃末錢六

右調勻二八為一九衣桂末每三時服全九水調服宜

○第一千八百五十五方暗見

○藥拔爾撒謨骨湃霍加麻 黃一箇錢 蘊謨末錢

○藥大黃末錢 刺昆亞蘊謨末錢

右調勻二八為一九衣桂末每服九或三次

主治一千八百四十七方宜 八直五十五方至鈍性久瘰

○藥宜宜 拔爾撒謨骨湃霍八 此症最効 〇之用

○藥後強哥喜少許服 量速用 拔爾撒謨惡味

〇藥宜 拔爾撒謨骨湃霍八 此症最効 〇之用

消スル妙也上方更ニ多量ヲ服スル腹痛亦利ヲ  
發シ易シ大抵拔爾撒謨ニ至リテ用ニ盡セハ其症ヲ治  
スルニ足ル也雖後尚量ヲ減ム連進スルニ至リテ至  
ルニ至兼テ又冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗フベシ

○第六百五十六方福倨篤

○拔爾撒謨骨湃霍四錢加錢鷄子黃一箇攪和加後味

○華澄茄末四錢玫瑰毘設兒半錢

右調勻作舐劑每服之茶匙廿三次乃至四次臨服宜振盪

補考此方味其不佳ナリ大黃末九乃至八九日四次

○第六百五十七方袂設兒

○拔爾撒謨骨湃霍二錢亞刺毘亞蘊謨末各二錢橙花水二

已上二味丁寧搗和加後味

華澄茄末二錢

右調和為六塊衣桂末每服一塊日三次

○第一千八百五十八方弗脫爾田蒲蘭突

○拔爾撒謨骨湃霍各一錢華澄茄末一錢亞刺毘亞蘊謨漿

適宜 右三人為一九衣石松粉每服五六丸乃至十九或十九餘

日三次

○第一千八百五十九方弗栗結

○拔爾撒謨骨湃霍半錢亞刺毘亞蘊謨漿半錢

○藥白蠟錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
丹三冷些時再加後味

本華澄茄末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
右調和二八為一九衣桂末每服六九乃至十九日四次

○備考此方殊昌嘉稱了華澄茄末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
○第一千八百六十方依不失門本華澄茄末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

○本白蠟錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
○拔爾撒謨骨泔霍錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

右為八十九衣桂末每服六九漸加增  
○備考每粒拔爾撒謨一八半弓含蘇蘇末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

○第一千八百六十一方同上本華澄茄末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

○白蠟錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
○拔爾撒謨骨泔霍錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

右為百五十九衣桂末服法同上  
○備考每九拔爾撒謨一八華澄茄二八含蘇蘇末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

○第一千八百六十二方同上本華澄茄末錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放

全華澄茄錢二百上微火熔解加拔爾撒謨骨泔霍半弓捏和放  
右調勻為散每服一茶匙日三次用酒調服  
○主治久麻三宜○別魯列印病院左法依元華澄

茄者用匕テ久麻ヲ治ス其法華澄茄砂糖各一弓ヲ調和

遠田方量  
卷之十一  
麻  
十六  
廣  
半



散<sub>レ</sub>用<sub>レ</sub>為<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>者<sub>二</sub>分<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>每朝卯牌半時<sub>一</sub>方<sub>レ</sub>リ<sub>テ</sub>其<sub>一</sub>分<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>取<sub>リ</sub>温乳四分<sub>レ</sub>彬篤<sub>ノ</sub>容量<sub>二</sub>和<sub>レ</sub>之<sub>レ</sub>頓服<sub>セ</sub>之<sub>レ</sub>午牌至後服<sub>レ</sub>停<sub>メ</sub>午後時々<sub>一</sub>茶<sub>ヲ</sub>尖<sub>ヲ</sub>服用<sub>ノ</sub>晚酉牌半時<sub>二</sub>至<sub>テ</sub>全<sub>ク</sub>一劑<sub>ヲ</sub>盡<sub>サ</sub>之<sub>レ</sub>後<sub>二</sub>日間服藥<sub>ヲ</sub>停<sub>メ</sub>唯稀淡<sub>ノ</sub>飲料<sub>ヲ</sub>多服<sub>セ</sub>之<sub>レ</sub>第四日<sub>二</sub>至<sub>テ</sub>復<sub>レ</sub>華澄茄<sub>ヲ</sub>用<sub>フル</sub>初<sub>レ</sub>日<sub>二</sub>用<sub>文</sub>如<sub>レ</sub>止<sub>又</sub>第五日第六日<sub>一</sub>然<sub>レ</sub>テ藥用<sub>ヲ</sub>停<sub>メ</sub>第七日<sub>二</sub>至<sub>テ</sub>更<sub>ニ</sub>又<sub>レ</sub>華澄茄<sub>ヲ</sub>用<sub>フル</sub>初<sub>レ</sub>日<sub>ノ</sub>如<sub>レ</sub>假令<sub>レ</sub>麻<sub>ノ</sub>流出既<sub>レ</sub>止<sub>ス</sub>者<sub>モ</sub>亦<sub>之</sub>服<sub>セ</sub>之<sub>レ</sub>第八日<sub>二</sub>方<sub>リ</sub>甘<sub>ク</sub>藥<sub>ヲ</sub>刺<sub>セ</sub>也<sub>ノ</sub>瀉劑<sub>ヲ</sub>與<sub>フ</sub>之<sub>レ</sub>法<sub>ノ</sub>如<sub>ク</sub>是<sub>ヲ</sub>療<sub>メ</sub>若<sub>ク</sub>其<sub>レ</sub>症<sub>治</sub>セ<sub>ザ</sub>ル<sub>者</sub>ハ復<sub>レ</sub>華澄茄<sub>ヲ</sub>用<sub>ヒ</sub>ズ<sub>ノ</sub>他藥<sub>ニ</sub>轉<sub>ス</sub>ル

○<sub>一</sub>華澄茄<sub>ハ</sub>胃腸宿患<sub>アル</sub>者<sub>在</sub>テハ<sub>一</sub>拔爾撒<sub>誤</sub>帶<sub>淋</sub>霍<sub>亂</sub>并<sub>優</sub>レ<sub>ル</sub>或<sub>ハ</sub>之<sub>レ</sub>阿芙蓉<sub>ヲ</sub>配<sub>ス</sub>也<sub>ハ</sub>要<sub>ス</sub>何<sub>レ</sub>者<sub>華澄茄</sub>ヲ<sub>多量</sub>服<sub>ス</sub>ル<sub>者</sub>患<sub>者</sub>不<sub>レ</sub>和<sub>ヲ</sub>覺<sub>工</sub>或<sub>ハ</sub>吐瀉<sub>腹痛</sub>等<sub>ヲ</sub>發<sub>ス</sub>ル<sub>者</sub>バ<sub>ナ</sub>リ<sub>若</sub>華澄茄<sub>ヲ</sub>用<sub>ヒ</sub>テ<sub>一</sub>便秘<sub>之</sub>症<sub>間</sub>之<sub>レ</sub>瀉劑<sub>ヲ</sub>配<sub>用</sub>勞<sub>瘵</sub>質<sub>或</sub>ハ<sub>一</sub>卒中<sub>ノ</sub>素<sub>因</sub>華澄茄<sub>者</sub>及<sub>ヒ</sub>痔疾<sub>家</sub>ハ<sub>一</sub>華澄茄<sub>ヲ</sub>忌<sub>ム</sub>也<sub>木</sub>乙<sub>失</sub>速<sub>非</sub>屈<sub>私</sub>諸<sub>症</sub>ニ<sub>一</sub>害<sub>少</sub>可<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>云<sub>ハ</sub>也<sub>十九日三次</sub>

○<sub>一</sub>策<sub>馬</sub>亦<sub>ハ</sub>百<sub>六</sub>十三<sub>方</sub>顯<sub>秘</sub>篤<sub>景</sub>無<sub>類</sub>上<sub>ノ</sub>有<sub>四</sub>心<sub>麻</sub>地<sub>緩</sub>

華澄茄<sub>半</sub> 螭<sub>蛄</sub>石<sub>錢</sub> 麻<sub>儻</sub>涅<sub>失</sub>亞<sub>錢</sub> 乳<sub>糖</sub>半<sub>危</sub>

右<sub>レ</sub>調<sub>勻</sub>為<sub>レ</sub>散<sub>毎</sub>一<sub>時</sub>乃<sub>至</sub>一<sub>時</sub>半<sub>服</sub>一<sub>茶</sub>匙

○第千八百六十四方 叔密(註)米煎一茶匙方其一分

華澄茄錢半 吐根錢半 薄荷油錢半 原糖錢半 後

○右調和為散分十二包蠟紙包裹每服一包日四次 一至十

○第千八百六十五方 叔託爾屈服藥之停之唯稀淡之飲

因華澄茄錢半 稀硫酸錢半 甘草錢半 蘇合錢半 蘇合錢半 蘇合錢半

○右調勻為散分六服每服時半無服蘇合蘇合蘇合蘇合

○第千八百六十六方 獨蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合

蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合

○右調勻為散分八包每服半包或六包日四次乃至六次

○第千八百六十七方 獨蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合

華澄茄 黑櫻實水各一 拔爾撒謨骨泮霍 扁桃舍

利別各半 稀硫酸錢半 蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合

○右調和為散劑每一時半服一茶匙

○第千八百六十八方 好斯滿

華澄茄越幾斯製一錢 亞刺昆亞獲謨末錢半 蒸餾水

麻僞涅失一錢 蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合蘇合

○右調勻為丸十九衣石松粉每服十九日三次

主治千八百五十六方ヨリ千八百六十八方至久麻弛緩

二因ル者ニ宜シ○焮衝ノ時期華澄茄ヲ用テルハ甚危

○深...

○第一千八百六十九方 遠突土

的列並底那<sup>半</sup>上好沒藥<sup>錢</sup>精製甘草膏<sup>適</sup>

右三以為一九衣桂末每一時半服四九

○第一千八百七十方 同上

上好沒藥<sup>半錢</sup>撒爾末兒秩斯<sup>錢</sup>篤爾綿黥刺根末

右二以為一九每服七九日四次

○第一千八百七十一方 同上

阿仙藥<sup>錢</sup>大黃末<sup>半錢</sup>勿搗祭亞的列並底那<sup>適</sup>

右三以為一九衣桂末每服五九日四次

○第一千八百七十二方 佛蘭萬爾度<sup>錢</sup>撒爾末兒秩斯

的列並底那<sup>錢</sup>健質亞那<sup>各三錢</sup>吉納<sup>錢</sup>撒爾末兒秩斯

右調勻二以為一九衣桂末每服米九日四次

主治一千八百六十九方日一千八百七十二方至弛緩

久瘧<sup>錢</sup>嘉稱<sup>錢</sup>此劑必少量漸加

○第一千八百七十三方 秘託爾屈<sup>錢</sup>拔爾撒謨骨

番木鱉越幾斯<sup>錢</sup>沒藥末<sup>錢</sup>拔爾撒謨骨

霍<sup>錢</sup>一入

錢

○右調勻二八為一九衣桂末每服六九日四次

主治久麻尿道液粘液膜大二衰弱七九二因者之宜

○第一千六百八十八方

○第一千八百七十四方 漢姪爾<sup>名</sup>人 治麻煉膏

八番木鼈越樂斯<sup>水製</sup> 胡瓜煎汁六勺溶解加後味薑末

主亞麻油<sup>鷄子黃研</sup> 蜜<sup>半</sup> 一千八百六十二方至妙

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪日四次

主治時期二拘ラス麻二應用方トス最久麻ニ好シ

○第一千八百七十五方 遠突土

○萬王幾那<sup>錢六</sup> 熱湯適宜浸漬飽熟四分時濾過取九勺放

右藥冷加後味

○藥阿芙蓉下幾<sup>滴八</sup> 板爾撒謨字露舍利別<sup>一</sup> 假令小量

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百七十六方 婦兒屈 不厭燕麥味

幾那末<sup>錢六</sup> 井水五勺浸漬飽熟六時屢攪動濾過加後

○藥之藥 百粒

桂水 橙皮舍利別<sup>各半</sup>

右調勻每一時半服一食匙乃至三食匙全良

○第一千八百七十七方 同上

幾那末 鐵粉<sup>各半</sup> 列印酒<sup>半小盞</sup>

右冷浸十二時屢攪和每一時半服半小盞

○主治千八百七十五方同リ千八百七十七方至弛緩久麻

○方幾那弛緩身部正之方全身ニ及ブ者ニ

殊稱ナリ登文舎休限治麻煉膏

○第一千八百七十八方

加里才幾附三老利兒結爾私永曼鬱腫鬱盛吐新

○右調勻每一時三十滴乃至四十滴燕麥粘汁和服

○主治弛緩久麻宜其應用方トス最久麻ニ好シ

○第一千八百七十九方婦媿弱平露舎休限一

芫菁丁幾三熟湯通里浸漬飽熱四分時濾過取九分放

右每一時半五滴乃至二十滴粘滑藥煎汁和服新藥

○主治久麻感觸甚遲鈍症ニ用フ○但芫菁ハ假令小量

ニ用ヒ或ハ遲鈍家ニ用フルモ亦麻ヲ治セズ直チニ

小便艱澀ヲ發スルガ故ニ婦媿弱名モ亦甚其効ヲ疑ヘ

○故ニ寧廢ノ用セザルレ優レリトス○若小便艱澀ヲ

發スル者ハ乳劑ニ龍腦ヲ和用シテ即効アリ

○第一千八百八十方遠突世ト對入秘察實甚強一試ニ

芫菁末六龍腦六乳糖三一試ニ身浸

右調勻為散分十二晝早晚取一晝裸麥煎汁送下

○第一千八百八十一方同熟末ニ白熟甘蘇末

遠西方彙 卷十七 久麻 三 廣月堂

○第廿九方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去

○第卅方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅一方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅二方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅三方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅四方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅五方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅六方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅七方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅八方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅九方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅十方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅一方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅二方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅三方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅四方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅五方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅六方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅七方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第卅八方 亞刺昆亞蘆謨末錢二 白糖錢六 甘扁桃皮去 右搗爛加蒸餾水八勺 作乳劑 每一時服一食匙 及下者二

○第一千八百八十六方同上

升表八蒸餾水五勺溶解加後藥

右阿芙蓉越幾斯水製

二及蓋槓植核粘汁和食匙

○右調勻同上八

○第一千八百八十七方

○第硝酸銀結晶者一八

二及至四八 蒸餾水四勺溶解

右供射注劑○或加阿芙蓉丁幾半勺對藥

○第一千八百八十八方館兒屈

○右明礬半錢至 井水五勺槓植核粘汁半勺溶解

右供射注劑對藥

○第一千八百八十九方別狹爾

在土好幾那一井水適宜煮四分時瀝取液亦放冷加

○後味百八十四方目七十八百廿二方至廿八方入

○右赤葡萄酒二明礬一錢同上並沙列布淡煎覆盆

右調勻射注日三次

○第一千八百九十方葛拍爾

○右老利冰揚彼附方井水適宜煮四分時瀝取液八勺溶

○後味甜藥八方

○右明礬錢末十并水適宜煮四分時瀝取液亦放冷加

○右射注日三次廿二方至久麻感觸

○第一千八百九十一方〔格爾黑謨〕

沒食子末半 井水適宜煮濾取八勺溶後味

明礬錢 皓礬錢 檳榔核粉錢

右調勻同法煎 井水適宜煮四合糊煎取八勺

○第一千八百九十二方〔格爾黑謨〕

古阿仙藥錢 沒藥錢 蒸餾水四勺溶解

右石灰水四勺溶解用法同上藥

○第一千八百九十三方〔遠突吐〕

主治年久百八十二方ヨリ千八百九十二方至弛緩久麻

二宜以猛烈ノ收斂藥ヲ射注シテ尿道狹窄ヲ易シ

越栗失爾錢 必篤利阿里錢 生スル者ニ宜シ○之ニ兼テ

右每服三十滴乃至四十滴冷水點服日三四次

○第一千八百九十四方〔同上〕

硫酸密幾錢 秘去爾錢 沙列布淡煎錢 覆盆

子舍利別錢 其魯單錢 爾錢 女錢

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百九十五方〔同上〕

鉛糖 精製阿芙蓉各錢

右調勻為散分十二畏每服一畏日四次 因ル者ニ好シ○

主治千八百九十三方ヨリ千八百九十五方至久麻感觸



過敏ニ因ル症ニ宜シ○一病者此方ヲ用テ三日  
ハ全治セリ

○第一千八百九十六方〔安茂〕

醋酸亜鉛八 蒸餾水六

右微温射注日三次

〔主治同上〕○或ハ叔列傑兒八及ヒ其魯單涅爾八ノ方八

百四十四方ヲ此症ニ用フベシ

○第一千八百九十七方〔遠突土〕

硝酸汞溶液八 蒸餾水六

右調和早晚服一食匙

〔主治〕麻ニ因テ尿道潰瘍ヲ生スル者ニ宜シ○之ニ兼テ

華涅滿八水銀硬膏ヲ用フベシ

○第一千八百九十八方〔門的其西〕

蒸餾水四ヲ溶解テ其蒸餾水ニ變心

右供射注劑

○第一千八百九十九方〔其魯單涅爾〕

刺必斯高八 秩屈斯八 蒸餾水六 溶化紙濾ス

右射注日三次

〔主治〕右二方久麻尿道潰瘍或ハ狭窄ニ因ル者ニ好シ○

婆菱八此症ニ偉効アリ

包莖 龜頭箱窄 シモス。エト。バラ。ヒモシス。羅フルナリ。井

シク。デル。ヲ。トル。ホ。イ。ド。エン。ベ。ケ。子。ル。リ。ン

煖腫甚シキ症ハ包皮ニ蟻鍼三條乃至六條ヲ施シ次テ麥

糠及ヒ蘆烏刺兒度水ヲ以テ琶布ヲ作り微温ヲ施スヲ好

トス或ハ緩和劑ニ菲阿斯葉乳汁ヲ加ヘテ琶布ヲ作り温

暖ヲ貼スルモ稱譽セリ但之ヲ施スハ慎重ヲ要ス何者

安頓緩和藥ノ温暖番法ヲ施シテ后其症寒壞疽ニ變シ尋

テ斃レテ者アリシヲ想ヘハナリ○上症ニ及ノ煖腫頗羅

斯性即水腫状ノ症ハ香竈藥ニ龍腦ヲ加ヘ千九百方至

蒸劑トスベシ○然テ包莖ハ微温乳汁或ハ遇爾托煎或ハ

ホヲ加フ射注メ龜頭及ヒ包皮ノ内面ヲ清潔スベシ

或ハ患處感觸過敏ナラザル者ハ外汞射注法千九百ヲ稱

用セリ寒壞疽ニ變セテトスルハ恐アル者ハ幾那柵皮ニ

止腐藥ヲ加ヘテ琶布或ハ蒸漏法トスヘシ千九百五方至

包莖ニ外術ヲ施スハ尤危険ノ法トス之ガ為ニ煖衝ヲ増

シ寒壞疽ニ變スルハ愈速ナレバナリ○内服藥効ナリ

トナシ但シ真煖衝症ハ乳劑ニ消石及和劑用千九百或ハ

剝篤亞斯ニ枸櫞汁ヲ和スル者千九百稱用ス羅斯性煖衝

阿芙蓉加龍腦ニ宜シ包皮内ニ微毒瘡アル者ハ水銀劑ヲ

用フルヲ要ス

龜頭狹窄症ハ之ヲ包莖ニ變セシムベシ 蟻鍼及ヒ冷法

可施セ之ハ之ヲ變スル者最易シ即チ龜頭ヲ氷冷水浸シ

或チ明礬溶液千九百方或チ消石礬砂溶液千九百方以テ龜

頭ヲ掩フベシ此方効アズルハ代チ昆布スリ利名スリ以テ包

皮ヲ裁割スル以外他術アルナシ其他ハ包莖ニ治法

區區シテ淋ノ淋科ニテ裁割スル者ニハ難シク何故

○第一千九百方 登瀛散ノ蒸鼠毛布ノ各半ノ加密列ノ接骨木花ノ蘇豆粉ノ

薄荷葉ノ菲阿斯葉ノ各半ノ加密列ノ接骨木花ノ蘇豆粉ノ

右為散作藥枕子溫暖貼之ノ微豆丸ノ或西ノ蘭葉ノハ之

○第一千九百一方 香葉ノ通貝ノ吹葉ノ各半ノ一

薄荷葉 接骨木花ノ各二ノ 龍腦ノ一ノ 錢ノ

右為散用法同上ノ通貝ノ煮四分時者將熱投通貝ノ鮮葉ノ蘇粉ノ

主治右二方羅斯性包莖頗神經性ヲ帶スル者ニ宜シ

○第一千九百二方

默栗薩葉ノ迷迭香葉ノ加密列ノ接骨木花ノ各末ノ一ノ

龍腦ノ一ノ 錢ノ

右調勻乾貼ノ主治右二方羅斯性包莖頗神經性ヲ帶スル者ニ宜シ

主治水腫状包莖ノ宜シノスルハ恐下ル者之ニ宜シ

○第一千九百三方 屑與埋爾ノ時期氷冷水ノ入ノ行ノ

○第一千九百三方 屑與埋爾ノ時期氷冷水ノ入ノ行ノ

○第一千九百三方 屑與埋爾ノ時期氷冷水ノ入ノ行ノ

○第一千九百三方 屑與埋爾ノ時期氷冷水ノ入ノ行ノ

○石灰水ヲ 過爾托煎ヲ 石灰水ヲ 過爾托煎ヲ 過爾托煎ヲ 過爾托煎ヲ

右調勻射注包皮內ニ 宜最易シ 即于龜頭ヲ 水冷水浸シ

○主治ノ 射注ノ 包皮內ニ 鬱畜セル 汚物ヲ 洗除スベシ

○第一ノ 九百四方ノ 蒸餾水ニ 阿芙蓉ヲ 幾半錢ヲ 溶化シ

并ニ 汞ヲ 蒸餾水ニ 阿芙蓉ヲ 幾半錢ヲ 溶化シ 治法ニ

右調和用法同上

○主治ノ 包莖感觸靈敏ヲ 癢ニ 宜シ 並ニ 包皮內ニ 發

○七ル 疥瘡ニ 好シ 新葉ヲ 加密列ヲ 接骨木花ヲ 豆粉ヲ

○第一ノ 九百五方ノ 遠矣ト 請ニ 幾那末ヲ 芸香葉ヲ 亞兒尼加花ヲ 各末一

○幾那末ヲ 芸香葉ヲ 亞兒尼加花ヲ 各末一

○右調勻加温酒作琶布

○第一ノ 九百六方ノ 角ト 醋ヲ 常水ヲ

○檯皮ヲ 井水適宜煮四分時ヲ 將熟投ニ 爾鮮葉ヲ 藕格ヲ

爾需謨葉各一ヲ 浸漬八分時ヲ 濾過取ニ 冷定加後

○第一ノ 味ヲ 龍腦精ヲ 龜頭ヲ 蘇ヲ 宜シ

○龍腦精ヲ 龜頭ヲ 蘇ヲ 宜シ

右調勻微温浴患處ニ 宜最易シ 即于龜頭ヲ 水冷水浸シ

○主治ノ 右二方ノ 包莖症ニ 包皮惡色ヲ 見ハシ 茶褐

斑ヲ 生シ 寒壞疽ニ 變スル 者之 宜シ ○此

方ヲ 施ス 前ニ 衝極度ノ 時期ニ 氷冷水ノ 罨法ヲ 行フベ

○此

此藥之功效能治一切瘡毒及一切皮膚病

○第一種九百七方 蘇合香丸 蘇合香丸 蘇合香丸

〔主本炭〕 幾那 蘇合香丸 蘇合香丸

○右調勻為散加赤葡萄酒作毬布微温貼患處

〔主治〕 寒壞疽性包莖及龜頭箱窄之宜シ

○第一千九百八方 〔私由尼阿魯〕

〔主治〕 明礬 菲阿斯葉煎煮之溶解

右調和為冷罨法 煎煮四十分鐘

○主治 龜頭箱窄之用之包皮ヲ縮収スルニ宜シ

○第一千九百九方 蘇合香丸 蘇合香丸

精制消石 錢 精制礪砂 半 醋 三 常水 五

〔主治同上〕 ○此方病床ニ於テ調和シ鹽類溶化スルニ乘

メ用フベシ

畢九炊衝 トオルキチヌス ヨルノイカヲ羅シテ

強實多血ノ人ニ在テハ放血スベシ會陰。炊腫ノ部及ヒ腹

輪ニ蟻鍼八頭乃至十二頭ヲ施シ爾後裸燕麦麥糠ニ乳汁

ヲ加ヘ或ハ亞麻仁末ヲ緩和藥ニ加ヘテ毬布ヲ作り温燥

シテ之ヲ貼シ其后陰囊ヲ醋蒸氣ニ浴セシムベシ

スルニ最施シ易ト兼テ瀉藥ヲ以テ

灌腸 孕齡酒石溶液ニ滿那ヲ加フル者 廿九方 荅麻林度

或甘汞加藥刺巴千九百方

焮衝勢退少畢最早晚內股二灰自水銀膏千九百方

半錢ヲ塗擦ス此二至レハ一緩和罨法ヲ轉レノ解釋罨法ヲ施

スノ期トス麥糠ヲ水ニ煮者鉛糖ヲ加ヘテ罨法ヲシレシ千九百方

或ハ解凝藥末一比中確砂二三錢ヲ混和ノ罨法トスレ但

夜間ハ罨法ヲ施スニ便ナラサルガ故ニ解凝硬膏千九百方

貼スベシ○硬結腫ヲ遺ス者ハ軟膏ニ沃胃謨加里或ハ

沃胃謨ヲ和ノ千九百十六方之ヲ塗擦シ內服甘汞ニ失鳩

荅葉ヲ配用スベシ千九百十七方失鳩荅葉罨法千九百十七方亦稱用

セリ乾近壓定繃帶法ルハ千九百十八方施テ荅太ニ驗アリレ時々

吐劑ヲ用クルモ亦硬結腫ヲ消解スルノ効アリ

○第一千九百十方遠突士

荅麻林度ヲ井水適宜煮四分時濾過取テ溶和瀉

○第一利鹽百加後味其膏單

用覆盆子舍利別半

右調勻每一時服半小盞以至得効○

主治畢九焮衝麻令合併ニ宜シ

○第一千九百十一方同

甘汞百藥刺巴一刺姑石各一白糖二

右調勻為散分十包每一時半服一包

主治同治諸症 十日每 一劑米服 一匙 不用心 去馮力促

○第一千九百十五方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百十六方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百十七方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百十八方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百十九方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十一方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十二方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十三方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十四方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十五方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十六方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十七方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十八方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百二十九方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十一方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十二方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十三方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十四方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十五方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

主治同治諸症 十日每 一劑米服 一匙 不用心 去馮力促

○第一千九百三十六方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十七方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十八方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百三十九方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十一方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十二方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十三方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十四方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十五方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十六方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十七方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十八方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百四十九方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十一方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十二方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十三方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十四方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十五方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

○第一千九百五十六方 同法 甜瓜 酸 白醋 銀膏 九百

兼于患處ニ細狹ノ膠着膏ヲ貼シ壓定繃帶ヲ施スベシ

○第一千九百十七方〔纂訥爾田〕

沃胃謨十五人

至廿八

灰白水銀膏半

半

蕃蘇神膏六人

半

右調和早晚塗擦腫處ニ

主治畢九硬結腫ニ宜シ二三日毎ニ塗擦ヲ休息スベシ

後皮膚剥爛羅斯狀ノ焮腫ヲ發スル由テナリ感觸靈

敏一人ニ在テハ殊ニ然リトス

○第一千九百十八方

甘汞四人

至廿八

失鳩答葉二十人

至廿八

阿麻儻涅失亞一人

カ

○第一千九百十九方

白糖錢一百十四

〔連海〕

右調勻為散分ハ服早晚一服ニ宜シ底管委英妓焚機〔藥〕

主治畢九硬結腫ヲ解散スルニ宜シ膀胱粘液膜卵巢食

攝護腺焮衝一

ゴスダチチス。ゴイルロイカ羅オントステ

刺絡ノ多量ハ血ヲ瀉シ屢會陰ニ放蟻シ內股ニ水銀膏ヲ

塗擦シ緩和藥ニ菲阿斯葉或ハ失鳩答葉ヲ加ヘ緩和鎮痙

琶布ヲ作リテ會陰ニ貼シ鎮痙灌腸法ヲ行ク大量甘汞ヲ

內服セ但瀉血後小便閉ヲ發シ或ハ痙攣其ノ症ヲ

阿芙蓉ヲ加フ律私篤〔人〕已上ノ方法ヲ用ク毎ニ此

症ヲ解散セシメ化膿或ハ硬結腫ト瘡中ヲ預防セル○若

上法効ナク焮腫化膿セトスル者ハ溫暖琶布ヲ施ス



釀膿ヲ進ムベシ膿成レハ之ヲ尿道ヲ漏ル或ハ會陰ヲ

破テ排泄スヘシ其他ノ療法ハ外療書中ヲ檢スベシ○硬

結腫ニ轉スル者ハ大量礮砂千九百二十方ヲ最良藥トス

且沃胃謨加里軟膏千九百二十方ヲ塗擦スルニ宜シ○荅婁百兒

名ハ會陰串線法ヲ殊稱シ内服ニ大黃消石ヲ用消石每

トス又八日毎ニ甘汞ハハ麻屈涅失亞半錢ニ和與之

暴訥爾田名ハ鹽酸金鹽ヲ用千九百二十方或ハ瑞香皮及白鳥

白鳥爾識葉前ヲ稱用スル者アリハ口トハ羅トイハマ

○第一千九百十九方邊弗肝設爾麻屈涅失亞カ

精製礮砂

精製甘草膏

各一

蒲公英越幾斯適

右分作十二塊衣伊里私弗魯連底那末每一時服一箇

主治痲後攝護腺硬結腫宜シ又膀胱粘液膜卵巢食

道胃腸等石硬結腫用カハ内用方類病水

○第一千九百二十方麻健莖

骨霜附未

半刀

精製礮砂末

刀

失鳩荅越幾斯

精製

甘草膏適

右為十一塊衣伊里私弗魯連底那末每服一箇日三次

主治攝護腺腫起及結節腫宜シ且會創

○第一千九百二十方颯爾滿勃動術宜シ且會創

沃胃謨加里

錢半

家猪脂

半

軟膏宜シ

右調勻作軟膏

主治攝護腺及子宮等處硬結腫宜之○且會陰

發膏水銀膏ヲ塗擦之或先著軟膏ヲ貼之瓦爾法尼越

列幾的爾海水浴等ヲ行テ之○癰衝証ヲ兼ナル者ハ

放蟻スベシ○總テ刺衝藥ヲ塗擦之癰衝ヲ催起スル

ヲ戒慎スベシ之類為惡性膿潰為法勢甚ケレバ

○第一千九百三十一方攝護腺癰

鹽酸金鹽四必輝四家猪脂半又朝州林末煎藥會

右丁寧調勻作軟膏

且主治硬結腫結節腫癰腫骨痛殊其症微毒

種セル者宜之故以此軟膏ヲ攝護腺硬結腫亦用

一腫微毒結節腫癰腫條不見見之者亦用

微毒癰衝眼ゴロイ刺衝藥尿尿道注射之九百或

癰內陷因ル者刺衝藥尿道注射之九百或

艾赤降承ス塗ハ陰部温暖緩和罨法ヲ施シ

或陰部ヲ浴ス少壯多益家刺絡宜輕症顯

顛蟻鐵八頭乃至十二頭ヲ施シ吸筒法ヲ施ス亦

手峻誘導法トテ項上吐酒石軟膏五方ヲ塗擦

之

之

之

屢耳後<sub>三</sub>芥子泥<sub>ヲ</sub>貼<sub>シ</sub>刺戟藥<sub>ニ</sub>加<sub>シ</sub>脚浴<sub>ヲ</sub>行<sub>ハ</sub>至<sub>ル</sub>之<sub>レ</sub>  
 内服芒硝<sub>ニ</sub>精製消石<sub>及</sub>吐酒石<sub>又</sub>加<sub>ス</sub>水<sub>者</sub><sub>十五方至五十</sub>  
 方<sub>九</sub>瀉利鹽<sub>ニ</sub>吐酒石<sub>ヲ</sub>配<sub>ス</sub>水<sub>者</sub><sub>十五方至三十</sub>  
 方<sub>八</sub>感觸銳敏<sub>ノ</sub>者<sub>ハ</sub>孕鹼酒石<sub>五</sub>方<sub>至</sub>酒石酸<sub>加里</sub><sub>五十四</sub>  
 方<sub>等</sub>ヲ好<sub>ト</sub>ス<sub>或</sub>醫甘乘<sub>ヲ</sub>稱<sub>替</sub>之<sub>每</sub>服<sub>一</sub>日<sub>ニ</sub>數<sub>服</sub><sub>ヲ</sub>  
 水瀉<sub>ヲ</sub>得<sub>ル</sub>度<sub>ト</sub>外<sub>用</sub>先<sub>眼</sub>水<sub>ニ</sub>舍<sub>電</sub>阿<sub>芙蓉</sub>液<sub>ヲ</sub>加<sub>ス</sub>  
 一<sub>世</sub>九<sub>百</sub>或<sub>ハ</sub>嬰<sub>粟</sub>鼓<sub>煎</sub>ヲ<sub>冷</sub>用<sub>ス</sub>之<sub>シ</sub>爾<sub>後</sub>升<sub>汞</sub><sub>十九百</sub>  
 匕<sub>皓</sub>礬<sub>溶</sub>液<sub>五</sub>方<sub>等</sub>衝<sub>動</sub>眼<sub>水</sub><sub>ニ</sub>宜<sub>シ</sub>○<sub>此</sub>法<sub>ニ</sub>兼<sub>テ</sub>水<sub>銀</sub>  
 軟膏<sub>ニ</sub>菲<sub>阿</sub>斯<sub>越</sub>幾<sub>斯</sub>ヲ<sub>加</sub>入<sub>テ</sub>眉<sub>邊</sub>ニ<sub>塗</sub>擦<sub>ス</sub>ル<sub>日</sub>  
 數<sub>次</sub>病<sub>末</sub>ニ<sub>至</sub>リ<sub>テ</sub>過<sub>多</sub>ノ<sub>粘</sub>液<sub>分</sub>泌<sub>ヲ</sub>制<sub>ス</sub>ル<sub>ハ</sub>赤<sub>降</sub>汞

千九百三十一方<sub>或</sub>ハ<sub>白</sub>降<sub>汞</sub><sub>十九百</sub>  
 千九百三十一方<sub>或</sub>ハ<sub>白</sub>降<sub>汞</sub><sub>十九百</sub>  
 千九百三十一方<sub>或</sub>ハ<sub>白</sub>降<sub>汞</sub><sub>十九百</sub>

○第一千九百二十三方<sub>極</sub>便<sub>見</sub>

吐酒石<sub>五</sub>方<sub>至</sub>蒸<sub>餾</sub>水<sub>ニ</sub>溶<sub>化</sub>  
 ○味<sub>味</sub>對<sub>對</sub>會<sub>會</sub>人<sub>人</sub>

右射注尿道<sub>水</sub>十六方<sub>極</sub>便<sub>見</sub>

主治微毒喉衝眼<sub>ニ</sub>施<sub>メ</sub>尿道<sub>ヨリ</sub>流<sub>出</sub>セ<sub>シ</sub>粘<sub>液</sub>ノ<sub>抑</sub>壓<sub>ス</sub>  
 ヲ<sub>喚</sub>起<sub>ス</sub>ル<sub>畜</sub>宜<sub>シ</sub>六<sub>錢</sub>茶<sub>山</sub>吹<sub>吹</sub>粉<sub>粉</sub>

○第一千九百二十四方<sub>極</sub>便<sub>見</sub>

榎<sub>植</sub>核<sub>粘</sub>汁<sub>四</sub>錢<sub>至</sub>一<sub>餅</sub>水<sub>四</sub>方<sub>舍</sub>電<sub>阿</sub>芙<sub>蓉</sub>液<sub>十二</sub>滴<sub>至</sub>十六

本<sub>滴</sub>院<sub>院</sub>取<sub>取</sub>日<sub>日</sub>燒<sub>燒</sub>ス

右調勻洗眼日數次

主治癩毒淋衝眼第一期用ノ舍雷阿芙蓉液至平六

○第一千九百二十五方私貯健別魯儼 清涼瀉劑宜シ或

升乘ハ 薔薇水六錢溶化加後味酒石酸加里方五十四

主治舍雷阿芙蓉液錢半 氣血日 流出ハ 淋頭數 癩

右調勻為眼水ハ 外用ハ 先眼水ハ 舍雷阿芙蓉液ヲ 加

主治結膜嫩衝癩ニ 因斷 者之長 宜シ ○私貯健別魯儼名

先剪方或ハ 三ル 方ヲ 樹葉切カ 方ヲ 取テ角膜ニ 屬スル所ノ

結膜ヲ截除シテ淚管ニ 至リ出血止テ后又其部ヲ 乱刺

其後每半時ニ 注リ眼水ハ 昆刺地ハ 射注シ且蒸溜シハ 次

弄シ スハ トイワルハ 貨弊名 大ハ 先菁膏ヲ 作リテ上視筋ノ部

貼シ其發泡セル處ニ 灰白水銀軟膏ヲ 貼メ繃帶ヲ 施

込已上ノ療法ニ 由テ三日乃至四日ニメ危險ヲ 防キ得

タリハ 五ニ 和審ハ 淋ハ 水ハ 六ハ 長ハ 密ハ 輸ハ ン

○第一千九百二十六方私貯健 榮強ハ 榮祺ハ 六ハ 六

皓礬カ 鉛醋錢半 蒸餾水十 龍腦精二

右調勻為眼水ハ 宜シ

主治癩毒結膜嫩衝ニ 宜シ○方中龍腦精ヲ 去レハ之ヲ

昆刺地名 方廿九百 二代 用メ 可ホ リ然レ 氏其効力彼ニ

比シ難シハ 百ニ 十ハ 六ハ 方ハ 宜シ

○第一千九百二十七方 拂連癩(詳見)

其拂連癩蘆謨汞半 牛乳一匕煮其味

右醮疊布貼眼宜 ○古中謂蠟龍去

主治 癩毒癩衝眼 宜之 化加後味

○第一千九百二十八方 癩仙滿

○藥刺必私高斯秩屈斯一 莨菪越癩斯六

已上二味 蕃薇水六弓 溶解

右調勻洗眼 數次

主治 癩毒癩衝眼 宜之 癩衝以 劇勢已退之 莨菪越

癩斯二 代へ テ 阿芙蓉丁癩ヲ 用ク ベシ

○第一千九百二十九方 別見

華溫滿溶汞散二 無鹽酪新鮮者 龍腦四 若其在速

右調勻為眼軟膏百三十三 癩毒癩衝眼末 癩毒癩衝眼末

主治 癩毒癩衝眼 瀉血後之 宜シ 既ニ 患處剝爛ノ 底

○第一千九百三十方 無鹽酪

菲阿私越癩斯四 灰白水銀膏半 釋シ 十九百三

右調勻塗擦眉邊 日四次 宜シ 之 宜シ 之 宜シ 之

主治 癩毒癩衝眼 宜シ 蕃薇煉膏半 然ニ 包皮

○第一千九百三十一方

赤降汞一 無鹽酪新鮮者 銀二 宜シ 之 宜シ 之 宜シ 之

貴半堂

右丁寧研和為軟膏早晚取豌豆大塗擦眼瞼

○第一千九百三十二方

〔五〕赤降汞二八 亞鉛華各三 薔薇軟膏二三

右丁寧調和為軟膏早晚塗擦眼瞼

○第一千九百三十三方

〔六〕白降汞二八 至五 無鹽酪一錢

右丁寧調和為眼軟膏

〔主治〕右三方十九百三十三方至十九百三十三方 徽毒焮衝眼ノ末期粘液ノ

流出過多ナル者ニ宜シ

龜頭瘻ゴノルロエアゲランジュラリスロバ

患處唯微痛ヲ帶ブル症多シ此等ノ症ハ屢冷水ヲ以テ患

部ヲ洗滌スレバ暫時ニシテ治スルヲ常トス然レ若其症速

治セサルハ粘滑劑十九百三十三方 或ハ石灰水乳汁等分ノ合

劑或ハ鉛糖稀溶液十九百三十三方 ヲ良トス既ニ患處剥爛ノ底

面豕肉状ナル者ハ升汞稀溶液ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ十九百三十三方

方十九百三十三方 或ハ硝酸汞溶液ニ水多量ヲ加ヘテ稀釋シ十九百三十三方

用フベシ已上ノ諸藥ハ患處ニ點滴スルニ宜シ之ヲ綿撒

絲ニ醃シテ龜頭ト包皮ハ間ニ挿入モ亦可ナリ然レ包皮

龜頭ヲ覆フテ之ヲ外翻シ能ハザル者ハ上ノ水劑ヲ以テ

龜頭ト包皮トハ間ニ射注スルニ毎日數次スベシ此症再

發防久々々硝酸汞溶液ヲ連用スルヲ要トス第一千

九百三十八方ハ金屬溶液モ亦稱用スベシ大抵包皮ヲ外

翻メ龜頭ヲ空氣ニ觸ルニ相以テ此症再發ヲ禦然ニ足ル

○内服藥ハ蛇足ニ屬ス唯患處ハ剥爛恐ルニキ景況アル

氏ハ慎重ニ汞劑ヲ用フベシ分量ハ一々詳釋ニ示シ

○第一千九百三十四方阿芙蓉下藥ハ此ノ症ニ

棋植核汁一錢至二錢并水一盞ニ患處擦敷ス

右調勻供外用

○第一千九百三十五方

鉛糖四八蒸餾水六勺溶化

右調勻供外用

○第一千九百三十六方

升汞二蒸餾水二勺溶解加後味

阿芙蓉下藥

右調勻供外用

○第一千九百三十七方

硝酸汞溶液二蒸餾水二

右調勻外用

主治一千九百三十四方ヨリ一千九百三十七方至龜頭

麻

○第一任九百三十八方同上

生米八中 鉛糖半四 蒸餾水四 牙溶化加後味甚佳 龜頭

白帶下

右調分外用日二三次 臨用宜振盪

○主治龜頭贅留焮衝及日粟粒疹ノ素因ヲ治スルニ宜シ

○此合劑分離術ノ則ニ違フト雖然氏其効大ナリトス

白帶下

右調分外用日二三次 臨用宜振盪

一ニ之ヲ婦人痲ト名ク此症他人ヨリ傳染シ獲ル者ト全

身或ハ局處ノ弛緩ニ由テ自ラ發スル者ト能ク區別スベ

シ○大率傳染症ハ經過更ニ急ニ其治男子ノ痲ト同シ

但稍斟酌アルノニ焮衝勢劇シキ者ハ罕ナルガ故ニ焮衝

ノ時期ニ方テ乳汁ニ石灰水ヲ加ヘ或ハ鉛糖稀溶液ノ射

注法ヲ施スベシ焮衝既ニ退ク其ハ速ニ収斂衝動ノ射注

法ヲ行フノ猶男子ノ痲ニ於ルガ如シ千八百八十二方至

九百五十四方至 内服拔爾撒謨骨千八百九十二方至

萼澄茄千八百六十六方至 其他前ニ揭ル所ノ収斂密藥私

去爾千八百六十九方至 與ニ佐治法トシ琥珀乳香名布線

拔奴謨其他拔爾撒謨劑ノ薰法ヲ施ス火爾滿

ヲ以テ耽朴ヲ作リテ腔中ニ充填シ分泌粘液ヲ吸收セシ

遠方彙

廣月堂



又或ハ之ニ明礬ヲ塗テ挿入スト云フ○男子ハ疥ハ交感症ヲ發スルノ恐アルガ故ニ更ニ難症トス婦人ハ疥ハ通例患部弛緩シ慢性ヲ帶アルカ故ニ經過多クハ緩ナリ患處剥爛セントスルハ恐アラハ其第二病ヲ繼發スルノ危険ナルガ故ニ承劑ヲ須要トス○自發白帶下ハ先其病因ヲ治スルヲ要ス乃腹内閉塞瘰癧質依倔篤質皮疹内陷脚汗閉止等是ナリ爾後板爾撒謨骨拜霍華澄茄的列並油薩毘那白續断花明礬錢劑等ノ如キ此症ハ特效藥ヲ用フベシ此諸藥ニ兼テ射注法ヲ行フベシ但先緩劑ヲ以テシ漸ク劇劑ニ轉スルヲ良トス然レ過劇ノ品ハ害アリ之

ガ為ニ硬結腫及ヒ癌腫ノ基因ヲ萌生シ易ケレハナリトシ口モ閉テリ鑛泉名チリビユルゲル同及ヒスハワリニナル同偉効アリ河水浴及ヒ海水浴モ亦好トス

○第一千九百三十九方 聖貝蘇爾ハ林爾撒謨蘇栗夫爾 蘆謨安沒尼亞藥 白石鹼 蒲公英越幾斯 牛胆

主夫黃末各二錢 宜シ○此藥ハ緩劑トシテハ用テ要

右調勻ニ以テ為ニ十九夜石松粉早晚服五丸一盞出燭明

○第一千九百四十方秘訣蘭度 蘇栗夫爾 蘆謨安沒尼亞藥 白石鹼 蒲公英越幾斯 牛胆 右調勻為散分茶包早晚服之兼マハ茶ニ宜シ

主治右六方白帶下腹内壅塞ヲ兼ヲル者ニ宜シ

○第六千九百四十五方 骨布

○第六千九百四十六方 白屈林子半錢 續斷花半錢

右細劉調勻分十四畏朝午晚取一畏熱湯一盞泡出飲服

主治白帶下ニ宜シ○此泡劑ハ殊効藥トス但久服ヲ要

○第六千九百四十七方 喝兒祿爾名人 拔爾撒謨越栗失爾

拔爾撒謨骨泮霍水再留的列並油在再留琥珀油各一錢

右調勻每服三十滴乃至六十滴沙糖和服日三次服後當

飲赤葡萄酒半盞

主治白帶下及其他有粘液流出症及遺精ニ良トス

○第六千九百四十八方 茂魯列護

蒲刺實爾收斂皮煎 拔爾撒謨骨泮霍和雞子黃者

右林檎酸鐵五錢 拔爾撒謨金剛別藥 普草蘇

右調勻每一時服一食匙

主治久瘵及白帶下ニ宜シ

○第六千九百四十九方 勿搦祭亞的列並底那附二 白石鹼三錢 過兒托末適

右調和二為一九衣石粉早晚服五丸乃至和丸

○第六千九百五十方 拔爾撒謨骨泮霍

拔爾撒謨骨泮霍和雞子黃者

右調勻每一時服一食匙

主治久瘵及白帶下ニ宜シ

○第六千九百五十一方 拔爾撒謨骨泮霍

甲方 千九百四十五方 內聖塞ヲ兼ル者ニ宜シ

○ 大黃末半錢 橙葉末 應的刺皮末各半錢 至麻僞涅失

○ 右調勻為散朝午晚服一茶匙 候湯一盞泡出飲服

○ 第一千九百四十五方 良聖劑ハ殊効藥トス但久服ヲ要

乙方 千九百四十六方 麻爾羅歌葉烏白烏爾識葉 默栗薩葉 著草穗

○ 橙皮各二錢 白續斷花半錢 的刺羅羅骨各一錢

○ 右細剉調勻每次取一食匙注滾湯三盞泡出 三次服後當

主治石二方白帶其方 宜其方 服其方 每其方 後其方 方六

○ 盞ヲ飲其方 之其方 末其方 撒兒末爾林斯其方

○ 第一千九百四十六方 拔爾的兒起 半眼四

○ 刺達尼丁幾 錢一 幾其方 幾其方 幾其方

○ 右每服十滴日三次漸加增其方 現其方 尼其方 加其方 刺其方

○ 主治白帶下其方 宜其方 兼其方 刺達尼濃煎其方 外用其方 スベシ但先

○ 畢味之其方 用其方 後刺達尼越幾斯其方 加其方 又其方 且其方 三其方 次

○ 第一千九百四十七方 的印別爾傑魯

○ 健質亞那越幾斯其方 亞爾鮮越幾斯其方 各其方 錢其方 幾其方 葛其方 秘其方 加其方 栗其方 刺

○ 藥皮末其方 亞爾鮮葉其方 宜其方 各其方 滴其方 幾其方 斯其方

○ 右調勻其方 以其方 為其方 一其方 丸其方 衣其方 桂其方 末其方 每服五丸日三次

○ 第一千九百四十八方 宜其方 兼其方 刺達尼濃煎其方 外用其方 スベシ但先

○ 畢味之其方 用其方 後刺達尼越幾斯其方 加其方 又其方 且其方 三其方 次

○ 第一千九百四十九方 的印別爾傑魯

○ 健質亞那越幾斯其方 亞爾鮮越幾斯其方 各其方 錢其方 幾其方 葛其方 秘其方 加其方 栗其方 刺

主治白帶下宜以爾後鐵工幾之用乃三六

○第一千九百四十八方佛陽

沒藥五乳香各錢癒瘡木脂錢蜀羊泉越幾斯各錢

○第二千九百四十九方半附

右調勻錢以錢為錢丸衣石松粉每服八丸日三次

主治陽之錢經久白帶下錢用錢所屢効錢得錢乃錢以錢夫

○第三千九百五十方賦歌蘭度

阿他藥錢下明礬錢幾那越幾斯各三錢

○右調勻錢以錢為錢丸衣桂末每錢一時半服四丸

○第一千九百五十一方忽倫

拳參越幾斯各半錢沒藥末錢撒兒末爾錢秩斯各半錢

○右調勻錢以錢為錢丸衣桂末每錢一時半服六丸

○第一千九百五十二方骨布蘭度

干龍腦錢撒爾末兒錢秩斯錢硫酸規錢尼捏各一錢加密列越

○幾斯錢拔爾撒錢謨索露錢通錢藥錢外錢浪錢早錢煎錢頭錢五錢以錢至

○右調勻為三十九衣桂末每服二三九日二三次

○第一千九百五十三方春姪隣

葛錢私加栗刺末錢緇百設木越錢

宜幾斯錢乾者錢各錢健質亞那越幾斯宜適

○右調勻錢以錢為錢丸衣石松粉每服五丸乃至十九日三次

主治千九百四十九方云云千九百五十五方云云至自帶下

宜共飲云云對質云云煎藥云云

○第一千九百五十三方〔福爾第〕味云云藥味云云煎藥云云

○黃明礬二硫鍊花二芳香散二幾那越幾斯半錢寒製各桂油

右調勻二云云為云云一云云衣桂末云云玻璃壘云云收貯早晚服云云五九乃至

十九云云爾末云云蘇末云云蘇末云云蘇末云云蘇末云云蘇末云云

○主治白帶下其入粘液質者之云云宜云云

○第一千九百五十四方〔邊傑栗屈的兒〕煎藥云云

阿芙蓉越幾斯水製薔薇水一号溶解加後味

密陀醋一榎楂核汁一但氣味云云煎藥云云

右調勻微温射注患處日二三次

主治白帶下腔中感觸亢進云云者云云用云云○薤謨將水及

七鉛糖云云用云云フルヨリ榎楂核汁密陀醋云云更云云良云云ト云云何

者沈澱云云スル云云ヲ云云ナク云云セ云云ハ云云ナリ

○第一千九百五十五方〔骨布〕煎藥云云

薩毘那葉半湯云云井水適宜煮濾過取云云十二号云云二云云女云云リ

右供射注劑云云煎藥云云煎藥云云煎藥云云煎藥云云煎藥云云

主治白帶下子宮弛緩云云是因ル者是云云宜云云

○第一千九百五十六方〔此藥外〕

第一千九百五十六方〔此藥外〕

廣勝堂

○膽礬五錢至十井水一斗溶化百五十五方至白帶下

右供射注劑子宮、蛇然二因ハ皆長ニ宜シ

主治白帶下愀衝既退キテ后患者ノ體質ニ由テ緩慢

症變不化ノ恐ア化者ニ用○藥百八十二方ヨリ

○辛八百九十五方至亦同止ノ症ニ施スベシ

○第一千九百五十七方骨布收壞收貯早晚服五九乃至

刺達尼根錢十井水五斗煮耗至斗此濾過放冷加後味

主刺達尼越幾斯半阿仙藥于幾吉納于幾各一錢半

右調勻供外用五藥馬二三丸

主治白帶下二宜每晚臨卧尿利ノ后海綿ヲ取テ上ノ

煎液ニ醮シ腔中ニ挿入ス○脫腔ニモ亦能ク適當ス

獨心加幾安頭著

和蘭傑斐婆都譯

侍醫法眼膏齋伊東文仲重譯

南洋伊東健夫參校

上排世夫常症

受性嘔吐因中從方諸種八辨胃腸沙物吐下

遠西方彙卷之十七衝因者八蟻鐵運入樓麻斯

遠西方彙卷之十七衝因者八蟻鐵運入樓麻斯

遠西方彙卷之十七衝因者八蟻鐵運入樓麻斯

遠西方彙卷之十七 井水一斗溶化

右供射注劑 宜 好熱 因 休長 宜

主治白帶下 煥衝既退 退キテ后患者ノ體質ニ由テ緩慢

症ニ變ズルノ恐アリ者ニ用テ○年以有八十二方ヨリ

千八百九十五方至亦同上ノ症ニ施スベシ

○第一千九百五十七方 骨布

刺達尼根十 井水三斗煮乾至一斗濾過放冷加後味

王刺達尼越幾斯半 阿仙藥丁幾吉納丁幾 錢各一

調勻供外用參照

煎藥ニ類スル中ニ轉入○煎藥ニテ亦海綿ノ藥當至ノ

遠西方彙卷之十七 茶湯 乘燕齋煥眼

獨心加幾 安頓白轉著

○第一千九百五十八方 和蘭 傑 婪婆都 譯

和蘭

侍醫法眼貫齋伊東貞 文仲重 重譯亦

南洋伊東亨 健夫ハ 參校藥

乙排泄失常症紙 ○然ニ 對抄 哥和 八其因器類ニ

慢性嘔吐子 羅ニ 蘭ニ 其志ニ

嘔吐五 治法其因中 從種 諸種ハ 別ア 胃腸汚物吐 嘔吐

劑ニ宜刻 慢性煥衝因 者或 蟻鐵 書再 以久 樓麻 質斯

遠西方彙 卷十七 白帶下 四十六 廣勝堂

或ハ依倨篤曼原 然者因芥子泥先養膏若ハ吐酒石軟

膏之宜シ 然者因神經敏捷論因ル都ハ鎮瘻藥及吐沸騰散

應出酌當不術ヲ行フヘシ ○然テ慢性嘔吐ハ其因器敗ニ

アル者モ亦一時毎ニ乳汁一小盞ヲ飲服セ 到スル冬主藥

トス以テ其元氣ヲ保并治之試 胃養者兼以乳汁灌腸モ亦

併用スヘシ

併用スヘシ

併用スヘシ

併用スヘシ

併用スヘシ

○第一千九百五十九方

過炭酸曹達ハ酒石酸五與白糖半

右調勻為散分二茶匙每半時取一茶匙乘沸騰飲服

○第一千九百六十方

甲方 過炭酸曹達半純糖半白糖半

過炭酸曹達半純糖半白糖半

右分六服白紙包裹與之每半時取一茶匙冷水少許送下

○第一千九百六十一方

酒石酸半白糖半

右分六服青紙包裹與之每半時取一茶匙冷水少許送下



○每半時取用方一裹沙糖水半小盞溶化投乙方一裹乘

沸騰飲服神速敏捷因ル者ハ鎮痙藥及ハ沸騰散

○第千九百六十一方 方 症 器敗ヨリ發スル者ハ其症ニ

甲方 膏 頭 衝 於 胃 裏 興 之 ○ 總 之 慢 性 嘔 吐 ハ 其 因 器 敗 ニ

炭酸剝篤亞斯<sup>半</sup> 刀<sup>半</sup> 枸椽油糖<sup>五</sup>

右調勻為散分七服白紙包裹與之

乙方 木 少 百 六 十 六

酒石酸精白糖<sup>各二</sup> 半 煎 取 一 裹 乘 米 煎 煎 煎

右調勻為散分八服青紙包裹與之

○用法同前

○第千九百六十二方 乙 方 煎 取 一 裹 乘 米 煎 煎 煎

麻瘋涅失亞<sup>各二</sup> 茴香油糖<sup>各二</sup>

右調勻為散私葛<sup>器名</sup> 煎刺<sup>器名</sup> 收貯每服取一茶匙以冷水少

許及枸椽汁加沙糖者一食匙頓服 煎 煎 煎 煎

○第千九百六十三方 煎 煎 煎 煎

麻瘋涅失亞<sup>錢半</sup> 純精酒石 枸椽油糖<sup>各二</sup>

右調和為散玻瓈罍收貯每半時取一茶匙冷水少許送下

注 治 千 九 百 五 十 八 方 以 煎 九 百 六 十 三 方 至 嘔 吐 胃 又

感觸過敏ニ因ル者其宜ニ先胃部ニ芥子硬膏ヲ貼ル后

沸騰散ヲ與ルニ此標得ル品モ亦許シ與ルニ其症ハ商

湯酒 丹 盪沸騰 乘影 飲服 甚効 或 胃

感覺 既進 服藥 甚堪 凡 此 者 往 之 于 賦 宜 之 水 塊

或 以 冷 水 一 匙 与 之 入 之 總 之 决 量 七 藥 与 與 之 胃 又

飽 滿 之 時 亦 宜 勿 飲 水 也 此 他 第 一 方 至 及 水 八 百 八 方

ヲ 參 照 也 大 正 十 年 於 靜 岡 市 糖 林 由 靜 岡 二

○ 第 一 千 九 百 六 十 四 方 戒 歇 蘭 度

持 酒 石 鹽 錢 新 絞 枸 椽 汁 和 為 度 默 栗 薩 水 三 菲 阿

古 斯 賊 幾 斯 六 葛 興 陳 器 器 外 領 母 耶 耶 一 茶 湯 以 公 水 也

右 海 鮮 時 服 一 食 匙 香 酢 醃 菜 與 之

○ 治 痙 攣 性 嘔 吐 二 宜 シ ○ 此 方 効 ヲ 得 サ ル 片 ハ 阿 芙 蓉

寸 幾 八 滴 ヲ 加 之 一 匙 煎 碎 雞 子 婦 人 嘔 吐 二 好 小 以

○ 第 一 千 九 百 六 十 五 方 洞 進 櫻 桃 實

葉 複 方 乳 香 精 附 六 忽 弗 滿 振 爾 撒 謨 非 答 半 阿 芙 蓉

主 丁 幾 錢 煎 散 入 水 煎 宜 日 三 次

右 調 勻 塗 擦 胃 部 或 為 罨 法 至 一 身 屢 年 未 飲 食 ス ル 每 二

主 治 痙 攣 性 嘔 吐 二 宜 シ 且 綿 苔 幾 里 私 布 ヲ 酒 煮 シ 布 囊

二 盛 リ テ 藥 枕 子 ヲ 作 リ 胃 部 二 襯 シ 或 以 芥 子 泥 ヲ 貼 シ

殊 二 乾 角 法 ヲ 施 ス へ シ 此 二 由 テ 劇 吐 止 ム 一 屢 之 ア リ

○ 第 一 千 九 百 六 十 六 方 林 澀 秘 二 煎 湯 以 公 水 煎 十 三 四

亦 過 炭 酸 剝 薦 亞 斯 枸 椽 油 糖 各 一 有 蒸 餾 水 二 与 溶 化

蒸 餾 水 二 与 溶 化

右時之服一食匙 此方服之先枸櫞汁三四

茶匙 沙糖水少許 和以服之 此方服之先枸櫞汁三四

○第一千九百六十七方 福傑列爾 鎮嘔散 干蘇百胡

主吐根末 純精酒石 錢 白糖 錢 蘇布 蘇布 蘇布 蘇布

右調勻為散 每服半食匙 乃至一食匙

主治嘔吐 鎮靖スルニ宜シ 默果薩水 菲阿

○第一千九百六十八方 骨布 蘇林 爾 蘇林 蘇林 蘇林

○第吐根末 叔格刺度 宜適

右為百二十錠 每一時服一錠 方効ヲ得サルハ阿芙蓉

主治痙攣性嘔吐 妊婦 嘔吐ニ好ト以愚殊

○第一千九百六十九方 福傑兒

主格綸僕 精製阿芙蓉 綿荅幾里 蘇布油糖 錢

右調勻為散 分六裏 每服一裏 日三次

主治痙攣性嘔吐 一病者 二年來飲食スル毎ニ

後必嘔吐 福傑兒氏 此ヲ用ヒテ治セリト云フ

○第一千九百七十方 栗屈的爾

白過設印亞的兒 續草亞的兒 丁幾 阿芙蓉液 錢 各一

右調勻 每一時十滴 乃至三十滴 沙糖和服

主治痙攣性嘔吐 宜シ 此ヲ如時有力ノ鎮痙藥ニ服

遠西方藥 卷十八 櫻性吐止 五 廣勝堂

廣勝堂

慢性呼吸

又撰良藥先少量酌量進之即過設即亞的兒三四滴  
白蒸餅小塊ヲ酒ニ醮ス者薄荷錠一圓芙蓉錠二個  
等一圓百六十丸

○第一千九百七十三方戒歇蘭度  
主橙波打幾錢 葛私篤樓謨打幾 蘆薈打幾 各一

右調勻每服十五滴 日三次  
主治歇倚私的利家阿姬吐頭痛 屢發作

者其發作の間際ニ方テ之ヲ用ヒテ偉効アリ ○戒歇蘭  
度著書載スル所ノ用量每服六十滴 日二次ト云

スルニ過多ナリ

○第一千九百七十二方同上

瓦爾拔奴謨硬膏附一 龍腦 揮發鹿角鹽 阿芙蓉

各半 加耶普的油 薄荷油 各半

右捏和取一握攤革貼胃部

主治船注ニ宜シ

○第一千九百七十三方春埜隣 大黃 香椿

瓦爾拔奴謨硬膏 龍腦 揮發鹿角鹽 各半 加耶

普的油四十滴

右調和作硬膏攤革貼胃部

藥並錄云加耶普油

主治痙攣性嘔吐。船注等。宜シ。○輓近船注。結列阿速。  
多稱用ス。

○第一千九百七十四方 同此 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

○麻屈涅失亞 十孕礬酒石 大黃 芳香散 各二錢

右調勻為散每服一小食匙日三四次

主治早旦嘔吐及過酒家ノ嘔吐ニ宜シ

○第一千九百七十五方 黃荷散 黃荷散 黃荷散 黃荷散

失鳩峇越幾斯 老利兒結爾斯水半ヲ溶化同美蓉

右調勻早晚服三十滴 同此 同此 同此 同此

主治同上 同此 同此 同此 同此

○第一千九百七十六方 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

○枸橼酸安沒尼亞精 菩提樹花水 各半

右調勻每一時服一食匙 同此 同此 同此 同此

主治 枸橼酸安沒尼亞精 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

和ヒ 早且嘔吐ノ殊藥 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

同効ナリ 英吉利及比拂郎斯 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

熱病 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

○第一千九百七十七方 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散 蘇合香散

右調勻為散私葛點刺器取貯每服取一茶匙加冷水乘沸

滾服（高）端（味）想（味）使（器）以（頭）母（邪）來（一）茶（湯）吐（或）初（新）吐

主治 妊婦之嘔吐ニ宜シ ○嘔吐病人由吐戒スルヲ嚴ニ

過クニ勿止難化ノ食餌却テ消化易キ者ニ勝リテ能ク

胃ニ堪ラルヲ間之アリ ○倚拂朗屈（各）者經驗ニ從フニ

大抵妊婦ニ油煤肉硬固蒸餅葡萄酒及之冷氷ニ盛ラ最

良ノ飲食トス（ト）云フ ○謁弗西暴爾（主）名（人）乃默栗薩氷桂

水（等）和（外）稱用（以）或（六）諸藥寸驗（十）ク 妊娠五六個月ヲ過

テ嘔吐自ラ止ム者屢之アリ

○第一千九百七十八方 （妊乙） （穢歇蘭度）

越栗失爾茂印失屈篤 龍涎香丁幾 （各半）

右調勻每服四十滴日三次

主治 妊婦之嘔吐ニ宜シ兼テ胸上ニ芳香硬膏（十九百七）

ヲ貼ス ○屋爾噶（松）土（地）名（人）歇魯列爾（各）此方ノ殊効ヲ確

徴セリ ○鴿屑（名）ノ經驗ニ據ルニ桂酒水ニ龍涎香丁幾

ヲ加工テ香竄藥ノ泡劑（和）服ニ屢良効アリ（下）云（只）

胃ニ循ル血絡（盈）張嘔吐ノ原因（大）ニ（此）症（妊）婦（此）方（甚）多（シ）

害アリ而ノ刺絡最良効（下）云（一）茶（湯）

○第一千九百七十九方 （穢歇蘭度）

藥收歛亞的兒（錢一） 龍涎香丁幾（錢二）

右調勻每服三十滴日三次冷水一小匙點服

至浴同上服三十日三小公水一小盞煎服

○第廿九百八十七方 瀉格魯杜 藥麻屈涅失重錢半 大黃錢六 水製 橙皮舍利別錢二

右調勻每二時於至六時半服一茶匙

○主治 小兒嘔吐胃中酸敗液二因此者之宜

○第廿九百八十八方 穉穉駭蘭度 小兒應用鎮痙散

穉穉寄生 蝟蝟石 鹿角屑 續草各一錢 龍涎香丁錢

右細末為散每服一小刀尖日三四次

○主治 幼兒酸敗液泄瀉嘔吐生齒刺衝其他神經性諸証

宜服

泄瀉ジロ 他病ノ見証トノ發スル者常ニ多シ故ニ其原因ヲ

制スルヲ醫治ノ專務トス是故ニ先其功ヲ收メテ而後泄

瀉ヲ止ムルニ病者ニ害ヲ及ブ至リ方ニ之ヲ治スル

ノ方法ヲ議スベキト初最初粘滑藥油質藥粘滑乳劑五百

方至五百卅三方千九百 沙列布煎舍電發謨白煎三百八

或ハ漿粉灌腸百九十八方 等ヲ施シ排泄物ノ酷厲

ヲ制シ以テ腸ノ感觸ヲ緩和スル一ヲ要ス次ニ腸管ヲ感

覺ヲ減殺スヘシ是阿芙蓉及ヒ吐根千九百八十三方ノ主

ナル所ナリ之ニ由テ功ヲ收ムルハ常ニ多シ若効アラザ

遠西方彙 廣月堂

此片ハ收斂保固劑ヲ用ヒテ腸ノ粘液膜及分泌機ヲ制ス

然此劑不相當ノ症ニ在テハ害ヲ招クハ屢之アリ

收斂保固劑ニ屬スル品ハ即大黃千九百八十七方至依蘭

荖格綸僕千九百九十八方葛千九百九十三方至依蘭

根千九百九十三方刺達尼亞根二千九百九十三方至西瑪劉拔皮

九方阿仙藥赤石脂二千九百九十三方等是ナリ○輓近泄瀉ヲ治

スル一種ノ藥ナリ即硝酸銀九百九十二方至鉛糖

本鼈千九百九十七方ノ如キ佳稱アリ○肚腹ニ香竈溫暖

番法ヲ施スハ泄瀉並ニ胃腸ノ膨脹及ヒ痙攣症ニ殊効アリ

世裸麥製蒸餅細末ハ食匙乃至十食匙丁子搗末一茶匙乃

至茶匙肉豆蔻研末或ハ格墨因一茶匙ヲ取テ調和シ赤

葡萄酒若シテ燒酒三四食匙ヲ加ヘテ泥トナシ適宜ノ稠

ヲ得セシメ二重麻布間ニ塗ル其厚サ手指横經可リ此ノ

如ク琶布ヲ作リ竈上ニ煖メ以テ全腹ヲ掩フ此琶布ヲ貼

シ四時五時乃至六時ヲ經テ之ヲ去リ次日又赤葡萄酒或

ハ燒酒少許ヲ加ヘ煖メテ以テ再貼スベシ○此他諸種ノ

藥局製胃硬膏及ヒ肚腹香竈塗擦方皆佳効アリ○小兒泄

瀉ヲ治スルハ應用方其最良者ヲ撰テ二千十九方ヨリ

二千八百方至二列載セキ一册

○第千九百六十二方終末

至二八八頁白齋

續半





其症準五十九百八十一方與夏不熱熱二宜之方

○第百九百八十六方 藏歌蘭度

主甘扁桃油錢精製礪砂錢亞刺昆亞護謨漿半井

水半不非阿斯越幾斯錢更扁桃舍利別一

○右調勻作乳劑每一時服五食匙半藥下黃一

○藥治水瀉症腸痛劇甚舌上苔ヲ帶フル者ニ宜シ○方中

礪砂總一錢ニ足レリ又按スルニ此方全量過多

十兩殊々夏月炎熱ニ候此乳劑宿用スベカラザルカ故

ニ半劑ヲ處スルニ好シ又和ニ因ル者之ニ宜シ

○第百九百八十七方 荷殼藥糞糞糞屈六 吡黑黓寶水四

生沙列布錢井水八勺煮濾過加後味果實菜蔬萬草類

礪砂錢精製大黃下幾水製舍電阿芙蓉液一實亞格

地温一白餅一山椒一

○右調勻每半時或一時服一食匙

主治腹痛泄瀉宜此方亦半劑ヲ處スルヲ更ニ好ト

不調勻每半時或一時服一食匙

○第百九百八十八方 總藥散 舍電阿芙蓉液

大黃下幾水製藥膏一蒸餾水一酢藥一

○右每服一茶匙日四次藥藥膏一蒸餾水一酢藥一

主治七八月入際屢發スル所ノ尋常泄瀉ニ宜シ但大黃

至散長用大更天効不異常斯惡宜之且大黃

○第一千九百九十九方〔穢歇蘭度〕

大黃下幾 水製 薄荷水 蒸餾水 精製磁砂

○藥過兜把舍利別〔穢歇蘭度〕

右調勻每一時半服五食匙

〔至浴尋常夏月泄瀉宜之亦半備夏之宜更之預中〕

○第一千九百九十九方〔穢歇蘭度〕

大黃末 白糖 假此乳劑宿用スヘカラサル力故

右調勻為散分八服每一時半乃至三時各服一實五分

主治夏月泄瀉用之屢効アリ但諸果實菜蔬萬苴酸

性物麥酒等以戒ノ只粘滑之飲食又與之

○第一千九百九十九方〔穢歇蘭度〕

大黃末 吐根末 牡蠣末

右調勻為散分八服每一時半服一服

主治水瀉其

○第一千九百九十九方〔同上〕

大黃末 蜥蜴石 蘆薈散 舍電阿芙蓉液

肉豆蔻末

右調勻為散分六服日二服乃至三服

○第一千九百九十九方〔過傑乘威的鬼〕

○第大黃下幾水製結列却健胃寸幾 桂水各一手半 阿美

○第蓉子幾四廿六眼日一服至三眼

右調勻每服一食匙日三四次 蒸餾水精製硝砂

主治泄瀉症腸弛緩由發者皆宜 含雷阿美蓉耶二

○第一千九百九十四方抄私

主鹽酸 格綸僕越幾斯 格綸僕末各一錢 沙列布末宜適

右為八十九衣桂末玻璃壘收貯每服十九日四次

主治膽液性泄瀉宜沙 吐酸末四

○第一千九百九十五方骨布

結晶硝酸銀三 蒸餾水適宜溶化加後味疏萬莖酸

甘草末宜適 蘇打二 蘇打二 蘇打二 蘇打二 蘇打二

右調勻不加他味為三十六九衣銀箔每一時服一九日服

主治骨布名此方之胃瘵吃逆慢性嘔吐乾嘔痲神經症二

稱用セリ○肝爾私名泄瀉虛嫩衝由リテ而又將二腸

潰爛症二移ラントスル者二此方偉効下火上不專番

○第一千九百九十六方穢歇蘭度

番木鱉越幾斯名肉豆蔻四蠟蝟石半 芥二宜二

右調勻為散分六服日三服乃至四服不

主治慢性泄瀉二用レテ間偉効下 甘草膏二

○第一千九百九十七方利歇林兒 地溼爾名 芥二宜二

○藥 番木鱉越幾斯西兒箇 兩製 大黃末 水銀九料各八 格

主 碌屈私末爾秩斯糖子 附 阿芙蓉二 甘草膏適

右為十六丸 衣石松粉每服一丸 日三次

主治 弛緩性泄瀉尋常ノ保固收瀋藥効ナキ者之ニ宜シ

通例之ハ用テ山下三日ニ已ニ良効アリ連進十四日

ヨリ及シキヲ要スル症ハ罕ナリ 涅爾欣名此効ヲ專番

木鱉 歸ス番木鱉ハ腸ニ循環神經運營ヲ進メ以テ乳

糜尿ヲ能ク養液ヲ吸收セシメ且大腸ニ屎ヲ貯留セ

シタルニ由テナリ 鐵ハ保固ノ効ナリ 方中ノ小量大黃

及ヒ水銀ハ瀉下ノ効ヲ奏セズノ分泌管ノ運機ヲ復シ

○阿芙蓉去毒ハ症往々之アリ

○第一千九百九十九方私弗蘭屈 三六零列水各

格綸僕末錢二 府利油糖錢一

右調勻為散分六服日四服 葛味ハ栗陳蘇糖類 阿

○第一千九百九十九方穢歇蘭度

格綸僕末半 由ハ井水半ニヲ煮耗至六ヲ濾過加後藥

主橙皮舍利別子 舍電阿芙蓉液滴 蘇糖類

右調勻每一時服一食匙

○第一千方別連杜

格綸僕半 藥水十ヲ煮耗至六ヲ投葛私加栗刺二錢

蘇瀨過加後藥水十兩煎并定去已效葛和加栗刺越幾斯二錢

○藥橙皮丁幾錢桂舍利別弓阿芙蓉心甘草膏適

右調勻每一時并服一食匙一九日三次

主治并九百九十八方書開共未方至皆泄瀉習僻一症殊

二其症弛緩二由ル者并宜之色煎并至六日煎盡吐對藥

○第二千六方歇幅小方難治瀉便溫爾軟心此効專來

阿芙蓉末各五吐根末各五葛和加栗刺越幾斯錢一阿

仙藥末適宜適且天腸二屎并將留七

○右為七十五丸衣桂末每服二丸日三次方中小量大黃

主治弛緩泄瀉二宜致封去下少分泌管之運機之復不

○第二千二方藏歇蘭度度西方至泄瀉習僻症或ハ慢性症

葛和加栗刺越幾斯錢一薄荷水各二亞

刺昆亞護謨漿半弓舍雷阿芙蓉心煎十煎十煎十煎十

右調勻每一時服一食匙

主治泄瀉ヲ止ムル宜シ藥害アル一十二煎十煎十煎十煎十

○第二千三方同上

亞兒尼加越幾斯一格綸僕越幾斯一著草越幾斯一

硫黃華各二錢一

右調勻二ハ為一丸衣石松粉每服十丸日三次

○第二千四方別連杜

葛和加栗刺越幾斯錢一薄荷水各二亞

○第垂兒尼加根

格綸僕根各二錢

葛私加栗刺皮三錢

○本醫滾湯適宜浸漬瀝取七分加後味并日三六

右橙波舍利別引服一食匙

右調勻每二時半服一食匙對法發瀉普草法發瀉症殊

○第二千五方賊歇蘭度

○葛匪兒尼加根三錢

葛私加栗刺二錢

井水十分煮耗至三

本醫六馬瀝過加後味張

葛私加栗刺越發斯阿

阿私藥丁幾錢

舍電阿芙蓉液十二滴

過兒托舍利別

○右藥味以栗陳法發瀉三吹密阿水各二亞

○右調勻每服二食匙日四次

主治二千三方日利二千五方至泄瀉習僻症或八慢性症

二宜引木末引井水十二分煮耗至八

○第二千六方設倚迷渴爾

刺達尼根末二錢

精製阿芙蓉一

白糖四

右調勻為散分八服每一時半一服藥液十分各地六封成

主治習僻泄瀉二宜三四六

○第二千七方密都兒利弗

○西瑪爾拔皮二錢至六錢附

常水適宜煮瀝取六分加後藥

橙皮舍利別一

右調勻每一時服二食匙二分引陳八末賦藥六分瀉請

主治慢性泄瀉 宜令並二格列刺ノ末期熱及ヒ炊衝証  
退キテ后之ニ用フ

○第二千八方 藏歌蘭度

○第府利丁幾 弓半 舍電阿芙蓉液 錢半

右調勻每服三十滴日三四次

主治習僻及ヒ弛緩ニ由ル泄瀉他藥効ナキ者此方佳効

ヲ得ルヲ多シ

○第二千九方 同上

二紺百設木末 弓一 橙皮 錢半 井水十二弓煮熬至八

五分ヲ濃過加後味

主治橙皮舍利別療諸症

右調勻每一時服二食匙

主治習僻泄瀉ニ宜シ但小量阿芙蓉液ヲ加フルノ症モ

亦之ヲ禁

○第二千十方 福傑兒

○阿仙藥 錢半 精製阿芙蓉 錢六 丁子油糖 錢半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一晝

○第二千十一方 藏歌蘭度

赤石脂 錢半 肉豆蔻 錢三

右調勻為散分六服每一時半一服



○第百二十五方 列設爾 煎半列煎 末期熱及七煖衝証

退升鍊鹽錢五 肉蒸餾水三勺溶化

○右調勻每服半食匙乃至一食匙日三四次

主治 二千卅方ヨリ煎煎半列煎方至泄瀉半用七交腸ノ今

泌運營ヲ直ニ制止藥門大効アリ丁子斷蘇半

○第百二十五方 弗陽 由泄瀉他藥効ナキ者此方佳効

亦生明礬 葛カス私加栗刺越幾斯錢各一 加密列水四 亞

主治 毘垂護謨 橙皮舍利翳務蓉或ト吹ハハ 蘇子

右調勻每一時服二食匙錢一 井水十二勺煮熟至八

主治 泄瀉腸衰弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ但明礬ヲ用フ

○此方最慎重ニ其最速身禁戒以ハ 腸中瘀物及

七腹内畜血アル者是ナリハ 要按○燕麥餅ハ 佛羅蘇

○第百二十四方 法列魯 二身較平リ卧小量ニ載キ且蘇ハ

古葛麻ハ 井水半綿首魯容量 浸漬飽熟八分時乃至

四分時

右每半時一小盞温服此煎效令吹蘇和宜シ

○主治 格列刺狀泄瀉及ヒ格列刺ニ宜シ

○第百十五方 膏布

主升赤五分 蒸餾水五 亞刺毘垂護謨漿半 膏

精製阿芙蓉末一盞 煎數煎

○右調勻灌腸 一盞 溫煖灌腸

主治 慢性泄瀉及七格刺刺症 阿芙蓉及他藥効十キ者

○之三軍之飛古藥 乃至一食匙 日三四次

○第三番 十六方 賦蘇文 手跡 區陳 至其 瀉 用七 腸ノ分

漿粉 錢 一 小 井 氷 張 北 煮 放 冷 加 後 味

○第 雞 字 黃 個

右調勻灌腸 井 氷 栗 瀉 道 費 新 量 長 貳 強 藥 列 令 甜 氏 至

○主治 漿粉灌腸 泄瀉ニ良効アリ 但小量ニ灌キ且極メ

テ 又 山 各 腸 中ニ 保 持 ヌ ル フ 要 ス ○ 燕 麥 粘 汁 ニ 新 鮮 雞

子 黃 和 之 灌 腸 ヌ 起 亦 良 驗 所 以 參 照 ス 九 十 八 方 參 照 ス

○第二千七百七方

主漿粉 錢 至 加冷水少許捏為泥更加熱湯六分乃

古為至八分溶解放冷再加後藥 却 泡 一 糊 眼 一 茶 匙 也

舍電阿芙蓉液 一 刀 至 半 錢

○右調勻灌腸

主治 水瀉或ハ酷厲物ヲ瀉スル者之ニ宜シ

○第三千七百八方

漿粉 一 阿芙蓉越幾斯 水製一 熱湯 四

右調勻四分取其一 溫煖灌腸 日 二 次 一 盛 貝 升 合 味 保

○主治 瀉ヲ止ムルニ宜シ



○魚運營妨礙三由レ發スル者即疴泄瀉等宜治之

○第三十三方〔遠突也〕茶張水〔過見托舍利別〕

沙列布淡煎〔大黃丁幾錢〔水製〕桂水半白糖二錢

右調勻每半時服二茶匙〔亞陳畏亞蘇蘇末各二錢〕

○主治嬰兒無熱泄瀉症舌上苔ヲ帶フル者之宜シ

○第二十四方〔穢歇蘭度〕

〔主〕蝟蛄石苗香油糖香過見托末各一錢〔舍雷阿芙蓉液〕

右調勻為散分四服〔每二時一服〕〔小兒泄瀉ヲ過止極メテ慎重スヘシ而メ〕

○備考小兒泄瀉ヲ過止極メテ慎重スヘシ而メ

阿芙蓉ノ如キ僅ニ其量ヲ過キ或ハ不適當ノ症ニ之

ヲ用フレバ速ニ卒中狀ノ症ヲ發メ斃ル世人之ヲ諳知

スルト久シ是故ニ上ノ散方ヲ處スル前先更ニ緩藥ヲ

施ス十リ即油質粘滑乳劑或ハ之ニ雞子黃ヲ加フル者

沙列布煎米飲雞卵水漿粉灌腸肚腹肉豆蔻拔爾撒謨〔附

塗擦自製蒸餅心胃硬膏香竄温煖赤葡萄酒等是十リ已

上方法ヲ用ヒテ効ナク泄瀉頑然トメ止マズ將ニ知覺

過敏症ニ陷シトスル片ハ上ノ散藥一晷ヲ與フ之ニ由

テ泄瀉速ニ鎮定スヘシ但已ハラ得ザルノ症ニアラザ

レハ經テ後第二晷第三晷或ハ第四晷ヲ連用スル勿レ

廣勝堂

廣勝堂

廣勝堂

多血肥滿或頭上熱之顔面赤色ノ兒ニ決メ此散ヲ

處カカラス

○第二千二十五方骨布

此散カカラス

右調勻為散分六畏早晚取一畏乳汁和服

主治小兒泄瀉ニ宜シ○他ノ醫モ亦至小量甘乘ヲ以テ

此症ノ殊藥トシ大便綠色ニメ腹痛甚シキ者ハ最好ト

ス其便透明白色ニメ雞卵ヲ破ルカ如キ者ハ効ナシ甘

乘ヲ用ヒテ泄瀉減スル者ハ骨布氏速ニ後服ヲ停ム○

上方服量ハ哺乳兒ニ充ツル所ナリニ歳乃至八歳兒ハ

甘乘一匁ニ四分ハ日ニ一次乃至三次ニ分服セシム此

方ヲ用フルモ尚泄瀉緩慢治セザルキハ骨布氏硃鐵華

丁幾或ハ榎楂加鍊丁幾或ハ小量炭酸鍊ヲ用フ而メ骨

布氏ハ此ノ如キ嬰兒ニ絶テ阿芙蓉ヲ與フルトナシ

○第二千二十六方遠突土

菖蒲根 滾湯適宜浸濾取三勺加後味

垂刺毘亞護謨 白糖錢ニ

右調勻每錢一時服一茶匙

主治小兒胃弱及ヒ虛性泄瀉ニ宜シ之ニ兼テ肚腹ニ香

竄藥卷法ヲ施ス

○第二千二十七方同上

玉幾那粗末半 瀝湯適宜浸八分時濾取三 溶化

○昔馬紺百設木越幾斯錢加後味

桂水異橙花舍利別各詳二

右調勻每半時服一 琶布匙三 煎取三 煎和

○主治小兒頑固泄瀉三 宜シ 醫七 亦至小量甘乘ヲ 以テ

○第二千二十八方穢 駝蘭度ニ 同カ 藥ヲ 煎テ 取リ 下テ 投テ

下葛カ 加栗刺カ 越幾斯十五 苗香水三 煎沙列布漿過見 托舍

衣利別各 詳五 尚斯 熟對 命ヲ 投テ 煎テ 取リ 下テ 投テ

右調勻每二 時服一 茶匙一 下カ 至三 煎テ 取リ 下カ 投テ

主治小兒慢性下利或ハ 屢ハ 及復ス 下利ニ 宜シ

○第二千二十九方護 利私ニ 宜シ

格綸僕錢 沙列布半 井水適宜煮八 分時濾過取

薑三 弓加後味

○加密列舍利別半 詳二 煎取三

右調勻每半時服一 兒匙二 宜シ

○第二千三十方煎 一二 茶湯

沙列布煎二 煎以 八格 綸僕末八 至阿 芙蓉液二 滴

○實亞格地温半

右調勻每半時乃至一 時服一 琶布匙一 宜シ

藥 實亞格地温 右調勻每半時乃至一時服一琶布匙

○主治右二方二十廿九方大兒瀉慢性瀉一宜シ

○第三十三方遠突土

格綸僕越幾斯錢一沙列布淡煎三苗香油糖二

○右調勻每半時服一二茶匙

○主治小兒經久脫衰下利二宜シ

○第三十三方過傑栗屈的兒

葛私加栗刺錢一滾湯適宜浸濾取二弓乃至三

引弓溶水製番木鱉越幾斯一瓜乃至二瓜再加後味

○亞刺昆亞蘊謨漿各一過兒托舍利別各一

○右調勻每半時服一匙布匙臨用宜振盪二宜

○主治小兒泄瀉生力虛脫。胃化衰耗。腸ノ感覺亢進。裏急

後重及ヒ脫肛スル者ニ宜シ

○第二十三方履結

精製礬土十二黑櫻實水 亞刺昆亞蘊謨漿 過兒

托舍利別各半

○右調勻每半時服一茶匙

○主治乳兒ノ泄瀉ニ宜シ

○第二十三四方

精製礬土 硃砂加過泥子精二 過泥子水二 桂

舍利別各半

右調勻每半時服一匙布匙

○第二十三十五方附爾私 蒸餾水ニ可溶解加後味

○結晶硝酸銀四分 蒸餾水ニ可溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨二 白糖二

右調勻內玻璃壺黑紙被覆貯每一時服一茶匙或一匙布

匙

主治離乳泄瀉ラジクアロエリ。アブ 宜シ之ニ兼テ硝酸銀

四分一粘汁半ヲ何芙蓉少許ヲ調和シ灌腸ハ附爾私

氏ガ此ニ離乳泄瀉ト稱スル者ハ世醫或ハ胃腸軟化スガ

ト云ヒ律私名ハ嬰兒格列刺ト云ヒトコロト云ヒ律私名ハ嬰兒格列刺ト云ヒ

○臃滿名ハ血質不良卒中ト云ヒアホブレキアル連板篤

名ハ養管麻痺バラリシス。カナト云フ者同一症ナリ此

症誘因ハ生齒速因ハ離乳トス生齒ト離乳ト一齊ニ来

ル者ハ殊ニ此症ヲ發スルナリ只病初泄瀉輕ク熱勢熾

ナル時ハ格魯林ヲ用フヘシ葛私加栗刺格綸僕安屈私

點刺西瑪爾拔等保固藥ハ唯輕症ニ適當スルノ三明礬

及ヒ鐵劑殊ニ外 鍊鹽 撒兒末 爾ハ効力復ニ勝レリ他藥

ノカテ須タズメ効ヲ得ルアリ鉛糖ハ稱譽スヘキニ

アラズト雖附爾私曾テ之ヲ二三兒ニ用ヒテ良効アル

ヲ見タリ已上諸藥ニ勝リテ結晶硝酸銀ヲ上法ノ如ク



用之入卓越ノ効ヲ得夕リ其大便秘結ヲ除稠厚トナリ既

二三日ニ全ク止ミ其後灌腸法モ屏ケテ用ヒタル

ニ至レリ

○第二千三十六方 篤優爾黠野兒

林檎酸鈹丁幾 香竄丁幾

右調勻每服十滴二十滴乃至三十滴日三次

主治 小兒腸ノ衰弱及ヒ粘液鬱滯症胃中酸敗液ヲ帶フ

此者泄瀉蟲症及ヒ陰部ヨリ粘液流出スル症等皆此方

ニ宜シ

○第二千三十七方 身中不是

肉豆蔻油 薔薇軟膏

忽弗滿 拔爾撒謨

其至大藥阿芙蓉丁幾

右調勻為軟膏塗擦肚腹

主治 小兒慢性泄瀉胃腸衰弱及ヒ肚腹膨脹症ニ宜シ

○第二千三十八方 穢歌蘭度

遇見托軟膏 肉豆蔻拔爾撒謨

綿答幾里私布

油 舍電阿芙蓉液

右調勻同上

主治 同前 ○大抵肉豆蔻拔爾撒謨單味ニシテ足レリ

○第二千三十九方 秘湯耳杜葛列秘

○番木鱉越幾斯水製一公蒸餾水二錢溶解

在調勻乳兒每服二滴乃至三滴大兒六滴乃至十二滴臨

服宜振盪

○主治小兒泄瀉後屢患フル所ノ脫肛ノ奇方ナリ○頑固

症ハ刺達尼越幾斯ヲ加ス不レ蒸餾水ニ鐵劑ニ倚弗蘭屈名

完穀下利スベトテアヲ羅至三十滴日三次

此症世人ノ通知セル力ヲ如ク夕食後少頃ニ不化ノ飲食肛

門ヨリ下ルヲ謂フナリ輒近謁ガ刺歇ハ名人第二症ヲ記セリ

其症大抵軍中ニ歩卒ニ限リテ痢疾後ニ發シテ力ヲ為ス死

スル者他病ヨリ多シ其証黑色流動シク惡臭ヲ帶ル

物絶エス肛門ヨリ流下ス其中著シク不化ノ食物ヲ交フ

病者死ニ臨ム至テ食欲ヲ失ハズト雖速ニ虛脱スルナリ○

第一症ハ阿芙蓉千九百八十二方至菲阿斯老利兒結爾斯

水八百八十一方至八百等麻酔藥ヲ用ヒテ腸ノ感觸過敏

ナル者ヲ遅鈍ナラシメ兼テ私昆列印名ノ歴驗ニ據リ

テ皮表ノ誘導諸法殊ニ微温水ニ刺篤垂斯ヲ加ヘタル浴

法ヲ施シ其后苦味收斂ノ方法ニ移ル即依蘭苔格綸僕九

百九十八方葛私加栗刺二千一方阿仙藥二千十方吉訥

至二千方緘百設木二千九方明礬二千十四方鐵劑二千

方ノ如キ是ナリ但之ニ麻酔藥ヲ配用スベシ倚弗蘭屈名

ハ皓礬ヲ與ヘテ良驗ヲ得タリ每服皓礬一匁ヲ以テ健質  
 亞那越幾斯二匁ニ伍シ日ニ三服セシハ危篤ノ症ハ倚百。  
 弗蘭屈名人及ヒ私昆列印名人等巴豆油及ヒ藤黃名ノ如キ峻下  
 劑ヲ試用セント思欲セリ疇昔ニ症アリ頑固ノ完穀下利  
 ニシテ百方寸効ナシ一醫一方ヲ施シ治セリ倚百弗蘭屈名  
 其方ヲ記ス即旧製玫瑰昆設爾弗三弓的里亞加三錢槓植  
 煉膏適宜已上三味合シ舐劑トシ病者他ノ飲食ヲ禁シ每  
 次一羅獨ヲ取リ服スル一日ニ三次ス下云ハ私傑福傑兒  
 名ハ安名倭私名點刺煎汁ニ紺百設木越幾斯阿芙蓉及ヒ槓植  
 舍利別ヲ加フル者ヲ稱用セリ○第二症ハ噉刺歇名小腹

ノ左側ニ大發疱膏ヲ貼スルヲ以テ最良法トシテ之ヲ稱  
 用シ並ニ漿粉灌腸法或ハ之ヲ阿芙蓉可幾名加効名ハ百九  
 千十六方至名内用ハ小量吐根ニ宜シ但丁幾名二千四  
 千十七方名者最妙トシ末期ニ至テハ紺百設木煎或ハ格綸僕煎名ヲ好  
 トス

○第二千四十方秘傳傑兒一此藥煮物ハ煎熟點名煎和

甲方

爾括失名垂屑名冷水六匁浸屢振盪經十二時濾過加

後味名

老利兒結爾斯水名一錢至二錢

右早午晚服一食匙

主治完穀下利 宜シ ○之 兼テ漿粉溶液ニ老利兒結

爾斯水之加工灌腸ニ水ヲ要ス 藥性盡クニ執斷ニ

方

○藥漿粉半錢 微温水一匕 溶煮沸少頃濾過加後味

老利兒結爾斯水半錢 設爾弗三弓的里亞加三錢櫻桃

糖右調勻二分供灌腸

○第二千四十四方 溼優滿 宜及則下 藥性福神也

阿仙藥 肉豆蔻末 炭酸曹達各六 酒石酸三 白

合式糖半 大發或膏 糖肉半 心氣最身去 鳴新之 不酸

右調勻為散今十二服每一時半一服 杜松子酒

主治完穀下利 宜シ

○第二千四十二方 蒲列刺 宜シ

吉訥八六 阿仙藥八五 明礬半 玫瑰昆設兒弗適

右為八九衣桂末每服一九日三四次每服後宜飲玫瑰浸

○液 宜シ 即藥性

主治粘液流出因弛緩症完穀下利 泄瀉 虛性咯血 過多痔

血 宜シ

○第二千四十三方

紺百設米六錢 井水九弓乃至十二弓煮耗至六弓瀉

右輪過加後味食匙并水八至十二煎味至六煎

○菓桂舍利別并女宜之三兼茶粉溶液老利兒結

右調勻每一時服一食匙

主治完穀亦利末期愈冥下痢斯愈封各血區多疾

○第二千四十四方微明礬乳清溶煮沸少頃濾過加後味

女牛乳新鮮者生明礬錢三四五煎并宜煎煎

右和向令凝結後漉過加白糖半每服五分煎飲

○主治虛性咯血子宮出血慢性下利完穀下利等二宜シ八

註照炭酸曹達酒石酸白

○第二千四十五方二煎每一煎半一煎

○肉豆蔻油半錢 肉豆蔻拔爾撒謨附一 杜松子酒三分

右調勻塗脊推日數次

主治此方完穀下利二偉効アルベシ五六日三六

○第二千四十六方私傑福傑兒

格綸僕越幾斯二錢 肉豆蔻拔爾撒謨半錢 舍電阿芙蓉

○液廿滴至 龍腦半分

右調勻塗麻布貼肚腹

主治泄瀉完穀下利等二宜シ

○第二千四十七方謁噶刺歇

吐根丁幾一分

右每一時半服十滴乃至十五滴

○主治痢後完穀下利宜止此症ヲ治スルハ小腹左側

三大發泡膏ヲ貼スルヲ第一奇法トス次テ漿粉灌腸ニ

宜或ハ之ヲ阿芙蓉丁幾ヲ加フ

○第二千四十八方羅仙私的印

越エ質チ屋オ布ス私ル麻ス兒ル秩ス斯ス豆ス葛ス私ス加ス栗ス刺ス越ス幾ス斯ス各ス二ス錢ス阿ス芙蓉ス越ス幾ス斯ス

○藥舍利別宜適

右二瓜為一丸衣銀箔每服三丸乃至五丸日三次宜

主治大兒泄瀉末期ニ宜シ兼テ二千四十五方ヲ塗擦

○スス瓜ス豆ス藥ス別ス宜ス適ス右ス二ス瓜ス為ス一ス丸ス衣ス銀ス箔ス每ス服ス三ス丸ス乃ス至ス五ス丸ス日ス三ス次ス宜ス主ス治ス大ス兒ス泄ス瀉ス末ス期スニス宜スシス兼ステス二ス千ス四ス十ス五ス方スヲス塗ス擦ス

○第身重四十九方應格魯杜是貴蓋閉噴熱一執半煎飲

○萬錢粉桂皮各十白糖一斤

右調勻為散分十二服早晚一服

主治同上

乳糜利フスロキエスクリアキ四眼四眼

此症ハ粘液下利及ヒ直腸粘液流出症ノ一種トシ其治第

一病因ニ着眼メ之ヲ索ムベシ而後著草括失亞格綸僕九

百九十八方良姜二千五十一方至紺百設木二千九方二及

至二千方口錢劑等ノ如キ苦味強壯方ヲ用フベシ醫或ハ灌腸法ヲ

稱賛ス葛爾科名地獨戾失倔名鉛糖及ヒ阿芙蓉越幾斯

卷一 西 方 彙 卷 一 十八 廣 野 堂

蒸餾水者 密錢私法爾夫胡蘿蔔加用之或夾虛症治

又燒淨沒食子煎苦迷迭香油忽弗滿液及阿芙蓉丁幾

加口栗屈的兒發之石灰水一升取和用之

○第廿五方氣結福絲泥之而對普草林夫亞林

地或硫黃華下正好沒藥煎瘡瘡未脂或角苗香十白糖各錢

原者調勻為散分三十服日三四服加栗刺越幾斯

主治乳麩利之痔疾二因ル者宜之○時々肛圍ニ蟻鍼

或施之或將食末二頭是煎之服乃至五九日三次

○第廿六方獨民失便之兼之二十四十五方塗擦

○第廿七方良姜末錢六分熱湯六分浸漬蓋閉飽熟一時半濾過加

○後味

越栗失爾茂印失屈篤錢二葛私加栗刺越幾斯刀二橙

皮舍利別

右調勻每半時服一食匙

○第二十五方同上

沒食子良姜各末二錢熱湯六分浸漬蓋閉飽熟一時

半濾過加後味

越栗失爾茂印失屈篤錢二水楊皮越幾斯錢一橙皮舍

利別弓半

右調勻每半時服一食匙

主治右二方敏性衰弱乳糜利二宜之兼之腎上二  
發泡膏ヲ貼スヘシ

○第三千五百三十五方 同法

○沒食子 良姜 健質 亞那 各末 芎藭油 滴

右調勻為散分二服蠟紙包裹每一時取一最冷水送下

○第三千五百三十四方 同法

○無兒尼加花根 芎藭根 各一 熱湯五弓浸漬蓋閉飽

煮熟一時濾過放冷加後味

○高磁砂加過泥子精 一錢 沙糖 舍利別 半

右調勻每半時服一食匙

○第二千五十五方 獨戾失伍

○白芷 薄荷 各一 熱湯四弓半浸漬濾過放冷加後

○味 長 姑 百 姑 木 二十四十三

○七葉樹皮 越幾斯 良姜 丁幾 忽弗滿液 各一 沙糖

○舍利別 半

此右調勻每半時服一食匙

主治二千五百三十三方 二千五百五十五方 至鈍性衰弱ノ乳

糜利二宜

○第二千五十六方 襟過栗儼的兒

○枸橼汁 一 甘扁桃油 半 渴爾托舍利別 半



右調勻每一時半服一食匙

○主治頑固慢性泄瀉及乳糜利等ニ宜シ○私的印歇憎

各五亦甚稱贊セリ

肝崩 ロリキス。ヘパチキス。羅

此症治法專原因ヲ從ラテ處スベシ多クハ腹臟ノ壅塞硬

結腫其他諸般ノ器敗病ニ因テ發スルカ故ニ通例緩解釋

劑ヲ用セテ効ヲ得シ勁性収瀋劑抑壓藥ハ罕ニ効ヲ奏

スルノ是故ニ紺百設木 二千九方二 及ヒ明礬乳 八百廿

四方 十 如キ間良驗アリト雖却テ之レカ為ニ病惱ヲ倍

ス衰々屢之ヤリ衰耗羸瘦セル者ハ滋養劑 三百六十二方

方例スルニ幾那浸劑或ハ煎劑 百六十一方。百六十二方。二

ヲ用ヒテ之ヲ補益スベシ

○第二千五十七方

幾那 六錢 熱湯適宜浸安微温所飽熟四分時瀝過取

液五勺加後味

橙皮舍利別 一

右調勻每一時半服一食匙

○第二千五十八方

幾那 半 并水十二勺煮耗至六勺瀝過

右每一時服一食匙



