

遠西方彙

廿八

○卷之二十八

第九

徽毒_上

富士川文庫
✕
499.2
En-2
10

✕
e 12

F 10
E-22



富士川文庫
3267



499,2
Em-2
No. 1395
12 e 12



伊東瑤川院譯

遠西方彙

十帙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之二十八

獨乙 加。獎。安頓 著
和蘭 傑。婆。婆。都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

癩毒 シヒリス。〇リス。ヘ子。ア。羅。五。一。三。ス。シ。一。キ。テ。蘭。

輓近水銀ノ癩毒ニ奇効アルヲ疑議スル者アリ蓋癩毒ハ他病ト同ク諸種ノ療法ニ由テ能ク治シ汞劑ヲ用ヒザルモ亦能ク治ス殊ニ癩毒初起ノ者ハ大抵第三千方ニ由

テ能ク癒エト雖法ノ如ク善ク水銀ヲ用フルレハ實ニ癩
 毒ノ最勝通藥タルヲ知ルヘシ但其攝養ヲ戒スルハ其効
 功ヲ收ムルニ須要タリ則次件ニ注意スベシ(第一病人定
 温列氏十八度至二十度清淨氣中ニ常住シ(第二)嚴ニ食養ヲ節ノ食
 量氣味俱ニ度ニ過サルヲ要ハ氣味ヲ以テ之ヲ謂ハミ則
 淡薄肉羹汁ニ米裸麥或ハ大麥ヲ加フル者菜蔬淡味ノ肉
 類及ヒ白蒸餅少許ヲ與フベシ(第三)總テ身體ヲ勞動スル
 下勿ク殊ニ後証癩毒漢ニ所謂結毒ノ如キヲ云フノ如キハ蓐中ニ在テ
 靜息スベシ(靜息スレハ病者能ク減食ニ堪フ勞動スレハ
 腫瘍其他局處疾患アル者之カ爲ニ衝動セラレテ其症増

劇ス(第四)癩毒瘡ハ清潔スルヲ慢ル_一カレ○汞製ノ經驗

方法ハ序証後証俱ニ第三十一方乃至第三十三十六方ニ

列載ス○汞劑ノ外又他ノ金屬ヲ以テ癩毒藥ニ供ス即金

三千二十七方銀三千四十一方銕三千四十三方銅三千四十五方安質三千四十七方沒尼劑三千四十九方鹽酸

亞鉛三千四十一方及ヒ砒石等是ナリ此金屬單症ニ用フレハ或

ハ効ヲ奏スト雖竟ニ汞劑ノ聲價ヲ敝フ_一難シ○亞兒加

里劑殊ニ別私三千四十五方那爾度ノ殊稱セシ酒石鹽三千四十七方私三千四十九方那兒度癩毒_下

幾モ亦一タビ名譽ヲ得タリト雖爾後之ヲ歷試スルニ獨

輕症ヲ治スルニ足ル_一ミ○鑛酸ノ中ニ就テ硝酸三千四十六方

ヲ殊稱セリ實ニ之ヲ以テ偉効ヲ得ル者間アリト雖亦寸

驗ナキ者多シ失苟兒陪苦ヲ合併セル症並ニ緩慢汞毒症
 ノ如キハ殊ニ之ヲ的當トス○又燐酸八百廿五方。八百六
十八方。三千八十九
 方ヲ以テ骨節癩毒ニ稱用ス○往昔ヨリ此症ニ試用スル
 所ノ者ハ癩瘡木。薩沙弗刺斯。撒爾沙巴栗刺。阿列那里亞附
 山午房。濱瞿麥。瑞香皮。胡桃殼等是ナリ三千五十四方至
三千六十七方此
 等ノ煎液ハ最良佐タリト雖獨之ヲ以テ本病ヲ治スルニ
 足ラズ但之ヲ癩毒及ヒ汞毒合併症ニ於テ新食法ト併用
 スレハ根治ノ適藥タリ殊ニ悉蕩滿煎三十五
十八方名譽アリ○
 輓近沃胃謨加里三千四十七方至
三千五十二方ヲ以テ後証癩毒ヲ治ス
 ルノ藥劑トシテ世醫或ハ之ヲ稱シ水銀優レリト区法

ニ從テ之ヲ用ヒ攝養宜シキニ適スレハ最良効ヲ得殊ニ
 沒乙失束故屈斯名ノ療法
三十一方ニ倣フヲ稱賛スベシ○
 下疳。便毒。骨肉腫コソク
コソク等ノ的藥ハ三千六十八方乃至三
 千八十九方ニ列シ幼兒癩毒ニ用フル者ハ三千九十方乃
 至三千九十三方ニ開載セリ○劇甚吐涎ヲ止ムルノ方法
 ハ巳ニ二千二百八十方乃至二千二百九十七方ニ揭示セ
 且麻疾及ヒ白帶下通例此二症ヲ癩毒ニ
算入スルハ不可ナリニ處スル者モ亦
 上ノ千八百十五方乃至千九百三十八方及ヒ千九百三十
 九方乃至千九百五十七方ニ列舉セリ
 ○第三千方弗栗結簡易法不用汞劑

瀉利鹽一考 苗香水八考 溶解

右調勻每服一食匙日三服

主治癩毒序証後証俱ニ用フヘシ之ヲ服スレハ室中寒
 温變換ナク蓐中ニ在テ嚴ニ食養ヲ節スヘシ威瀝爾
地ノ病院ニ於テ病者醫治ニ就クノ初メ先白蒸餅四兩
 及ヒ淡薄肉羹汁ニ漿粉少許ヲ加ヘ每服一彬ビト日二三
 回。午時ハ菜蔬六食匙ヲ喫セシメ飲料ニ燕麥淡汁ヲ與
 ヘ麥酒燒酒及ヒ水ヲ與フルヲナシ腫瘍アル者之ヲ服
 メ將ニ消散セントスル片ハ稍加餐シ肉食モ亦許スヘ
 シ此溶液ヲ用ヒテ初毎日瀉二三行後一行ヲ得ルヲ要

ス若効ナキ片ハ一二食匙ヲ加増スヘシ峻下ヲ要スル
 一勿レ却テ其治ヲ妨碍孤律傑人別魯列印名地ノ病院
 ニ於テ上ノ治法ヲ施セリ其法初每一週爾後毎三日ニ
 瀉利鹽ヲ以テ苗香水ニ溶シ甘草膏ヲ加ヘテ與フルヲ
 瀉三行乃至五行ヲ得ルヲ度ト匹之ヲ施スニハ植物ノ
 食餌ヲ撰ミ蓐中ニ在テ温保シ寒暖不定ナカラシ患
 所ヲ清潔ニシ又屢微温湯ニ浴セシ或ハ微温湯若ク
 ハ之ニ接骨木花加密列ノ淡浸石灰水稀淡羅獨窠鷓見
 ヲ加ヘテ菴法ニ供匹瀉利鹽連進後口内鷓口瘡狀ニ
 剥爛スル片ハ後服ヲ停メテ収斂酸性ノ含漱水ヲ用ヒ

或ハ刺心斯印歇兒那粟斯ノ以テ爛疔ニ點ス○序証癩毒ハ大抵此治法ニ由テ十四日乃至二十一日内ニ根治ス後証モ亦平治スル者少シトセズ○瀉利鹽禁忌ノ症下款ノ如シ(第一)其人性質瀉利鹽一弓乃至一弓半ノ大量ヲ服メ纔ニ瀉一行ヲ得ル者此ノ如キノ大量ヲ服スレハ胃腸衰弱ノ或ハ腹水症ヲ發スル者アリ(第二)癩毒ニ間歇熱ヲ合併セル者此症瀉利鹽ヲ久服スレハ間歇熱荏苒連發スルニ由テナリ(第三)其人甚脆弱ニ腺病質ノ者並ニ癩毒ニ夫苟兒陪苦ヲ合併セル症(第四)孕婦ニ此下劑ヲ與レハ流産スル者屢之アリ(第五)後証癩毒

嚮ニ承劑ヲ多服スル者ハ之ヲ忌ム

○第三千一方布連幾

清淨水銀錢一 亞刺昆亞蘆謨 加蒸餾水少許研和至

不見星投後呆

失鳩答越藥斯錢一 甘草末適

右調勻二匁為一九衣甘草末早晚服六丸乃至十九

○第三千二方私括

清淨水銀錢一 漿粉錢一 亞刺昆亞蘆謨適

右為六十九衣石松粉每晚服二丸乃至三丸漸加至八丸

十九或二十九

主治 松氏ニ據ルニ此方布連幾名ノ薺謨水銀丸ニ代用
 シテ簡易ノ良方トス松氏頑固癩毒ノ序証及ヒ後証俱
 ニ皆之ヲ稱用ス且諸鑛劑中ニ就テ最服シ易シト云之
 ヲ服スレバ病者便秘スルヲ屢之アルカ故ニ三日或ハ
 四日毎ニ後服ヲ停メテ下劑ヲ要スルヲ多シ薺謨水銀
 ハ容易ニ吐涎症ヲ發スルヲナシ但之ヲ多量頓服セシ
 ムルヲ勿レ丸粒硬固ニメ溶解セズ以テ完利スルヲア
 レハナリ松氏ハ三藥ヲ以テ純粹癩毒及ヒ汞劑合併ノ
 癩毒ヲ根治スルヲ主張ス即布連幾名ノ薺謨水銀丸甘
 汞及ヒ水銀膏是也松氏二十五年間廣ク癩毒ヲ療ス

ルニ此三藥ヲ專用シ間外汞及ヒ赤降汞ヲ用フルノ外
 曾テ他藥ヲ要セザリシト云フ

○第三千三方 （癩毒）

華溼滿溶汞散ハ 精製甘草膏ニ 蒸餾水適

右為四十八丸衣石松粉朝暮服ニ丸漸加至六丸

主治 序証下疳ニ宜シ○四日毎ニ一丸ヲ増メ以テ吐涎

スルニ至ル瀉スル者ハ本方ニ阿芙蓉ニハ乃至四ハヲ

加フ○華溼滿溶汞散ハ甚緩藥ニメ甘汞ノ如ク容易ニ

瀉スルヲナク又忽チ吐涎スルヲナシ適宜ニ用フルハ

ハ序証ノ癩毒大抵之ヲ以テ治スルニ足ル

○第三千四方 遠突主

華涅滿溶汞散六 阿芙蓉末四 蜷蛄石末廿四 白糖三

右調勻為散分十二服日三服

主治序証癩毒ニ宜シ但三四日毎ニ服量ヲ加増シ之ヲ持重ノ吐涎ニ至ルヲ須要トス

○第三千五方 同上

甘汞十二 精製阿芙蓉末三 蜷蛄石末半 白糖三

右調勻為散分十二服朝暮一服 主治序証癩毒ニ宜シ○甘汞ヲ用フルモ亦漸々加増ス

ルヲ要トス

○第三千六方 暴律私人 甘汞丸

甘汞五 甘草末十五 精製甘草膏一 常水適

○第三千七方

甘汞一 精製甘草膏一 右調勻為八十九衣石松粉每晚服四九乃至八九漸加増

主治癩毒序証後証俱ニ用フベシ甘汞ハ水銀鹽中ノ最緩劑ナリト雖速ニ流涎スルノ害アリ○私人 振名ノ説ニ

據ルニ甘汞ハ九ト為スヲ最佳トス初毎服一氏乃至二

ハ晡時之ヲ服シ後毎日四今ハ一或ハ三今ハ一ヲ加フ
 此法ニ由テ後証癩毒未深ク宿根セサル症根治スル者
 尠シトセズ○尋常ノ用法甘汞ヲ散トシ晨夕半ハ一ハ
 或ハ二ハ一ヲ頓服セシムル者ハ癩ノ用フル一勿レ後汞
 毒症ヲ遺シ且癩毒依然トメ退カズ或ハ却テ増劇スル
 者アレバナリ

○第三千八方 [壹便樹糖]

甘汞ハニ 白糖半

右調勻為散午饌後即時頓服

主治序証癩毒ニ宜シ○之ヲ服メ翌日休シ第三日三ハ

ヲ服シ第四日休シ第五日四ハ第六日休シ第七日五ハ
 ヲ服ス此ノ如ク隔日ニ連用スル一第十四日ヨリ第十
 八日ニ至ル大抵甘汞五十但食養ヲ節シ總テ汞劑服法
 ノ如ク須要ノ攝生ヲ守ラシム

○第三千九方 越印忽魯度名治宿根癩毒法

病者卧前一時半ニ當リ甘汞十ハ砂糖十五ハニ和シテ
 空心ニ服シ尋テ温煖肉羹汁ニ蓋ヲ喫シ後四分時同量
 甘汞ヲ一服シ并ニ肉羹汁ニ蓋ヲ喫ス體質強壯ナレハ
 又四分時ノ後五ハヲ服ス翌朝哥喜二三蓋ヲ喫スベシ
 通例瀉三四行ヲ得ルナリ若瀉セサル者ハ葯刺巴孕驗

酒石各十五分乃至二十分ヲ散トシ與_レ二日休藥ノ後
 又前方ヲ服スル_レ上法ノ如シ四日毎ニ服スルナリ此ノ如ク連
 用スル_レ七八回ニ至ル即第四日第七日第十日第十三
 日第十六日第十九日及_レ第二十二日ニ至リ上方ヲ服
 シテ治ヲ終ルナリ_レ上方第二三回ヲ經レバ腸甘汞ノ刺
 戟ニ慣ル、ガ故ニ每服藥刺巴五六分ヲ加ヘサレバ瀉
 一行ヲ得ベカラ_レ此法ヲ施ス_レ半ハニ至レハ越_レ印忽
 魯度氏幾那淡煎ヲ與ヘ且肉食飲酒ヲ以テ補益ス然_レモ
 亦其量ヲ節ノ常用ノ半ニ過ル_レナカラシ_レ極メテ病
 者ノ早朝外出ヲ戒シ以テ蒸發氣ヲ催進ス但天氣朗清

ナラハ昼日外氣ニ觸ル、ニ宜_レ此法ニ由テ吐涎スル
 者罕ナリ唯嚮ニ水銀ヲ多服セル病者ハ吐涎スル_レア
 リ故ニ此等ノ病者ハ此法施ス_レ勿_レ止子淫優滿名越印忽
 魯度ノ此療法ヲ甚嘉トシ殊ニ貴要部毀損メ其症危險
 ナル者ニ的當シ第三四服ニシテ既ニ全癒スルノ經驗屢
 之アリト云_レ又慢性癩毒瘰癧眼及_レ鼻中瘡オガ初
 起鼻孔閉塞メ未腐骨ニ及ハサル者ニ稱用ス且咽喉潰
 瘍ニ好トス○暴訥爾名田名ハ頸圍ノ潰瘍ニ先中和鹽ヲ
 與フル_レ十四日乃至二十一日爾後上法ヲ施メ殊効ア
 リト稱_レ私名振名ハ上ニ反シテ此療法承劑ヲ服スルニ
須要ノ攝養ヲ怠

遠方毒ノ癩毒
論セズ最初ヨリ甘汞ノ量過多ニシテ屢汞毒熱危險症ヲ
發シ或ハ速ニ吐涎症ヲ發スルガ故ニ廢メ用フベカラ
スト云ヘリ

○第三千十方〔譚遠突士〕

升汞^ニ 酒製桂水^一 阿芙蓉丁幾^一

右調勻每服四十滴粘滑液點服日四次

○第三千十一方〔同上〕

升汞^ニ 蒸餾水四勺溶化加阿芙蓉丁幾一勺

右調和早晚服一食匙

〔主治癩毒序証後証俱ニ之ニ宜シ〕然レ序証ハ升汞ヲ

要セズ却テ緩和ノ汞製劑ヲ用フルニ宜シ且升汞ハ丸
トシ用フルヲ佳トス

○第三千十二方〔穢歇蘭度〕

升汞^ニ 蒸餾水適宜溶化加後味

精製阿芙蓉^ニ 清淨蜜^一 白蒸餅心^{適宜}

右為四十九夜過兒托末早晚服六丸乃至十九漸加至十
二丸

備考每丸升汞二十分ノ一ヲ含ム

○第三千十三方〔弗鄂賴獸〕

升汞^{脫秤} 蒸餾水二三滴溶加後味

精製阿芙蓉 龍腦各十 甘草末 甘草越幾斯各一

右調勻為六十九丸石松粉早晚取一粒以白蒸餅一二塊

送下

備考每丸升汞六分ノ一ヲ含ム

○第三千十四方遠突土

升汞 阿芙蓉各半 精製甘草膏四 蒸餾水適

右丸為百粒衣桂末早晚服一丸漸加至三四丸

備考每丸升汞十分ノ一ヲ含ム

○第三千十五方暴訥爾田

升汞 水製阿芙蓉越幾斯各三 蒸餾水適宜溶加甘

草膏末二錢

右每丸二分為六十九丸石松粉朝暮服三四丸漸加增

備考每丸升汞二十分ノ一ヲ含ム

○第三千十六方幾優列魯

升汞二 亞的兒一刀溶化加甘草末一錢搗和至乾燥

加精製甘草膏適宜

右為六十四丸衣甘草末玻璃壘收貯早晚服一丸漸加增

備考四丸中外汞八分ノ一ヲ含ム○此方ノ親和舍密

則ニ適フヲ以テ他方ニ優レリトス

○第三千十七方萊魯天私

升汞^三 亞的兒^一 刀溶解加過兒托末^一 刀搗和至乾
燥加後味

白糖末^半 亞刺毘亞蘆謨末^半

右加蒸餾水適宜為八十九夜過兒托末玻璃壘收貯早晚
服一丸漸加增

備考 葳優列魯^名ガ稱用セル方ニ比スレハ此九升汞ヲ
含ム一少シ

○第三千十八方荷形矢門

升汞^十 加沸滾蒸餾水少許石臼研和加後味

過兒托末 白糖^{各一} 蒸餾水^適

右為九十九夜過兒托末玻璃壘收貯早晚服一丸漸加增
備考 每九升汞九分^一ノ一ヲ含込此九モ亦舍密則ニ適
フヲ以テ好トス

主治 三千十二方ヨリ三千十八方至宿根癩毒深蝕潰瘍

惡性癩毒疹等ニ宜シ劇証退クノ後ハ更ニ緩劑ニ轉ス

ベシ○升汞ハ後証癩毒ヲ制刺スルニ速効アリ然レ根

治スルハ稀ニアル所ナリ升汞ヲ禁忌スルハ體質虛弱

○三ノ感觸靈敏殊ニ肺ノ感觸敏捷或ハ結節腫アル者歟

血及ヒ勞瘵等是ナリ越埵^名僅度^名及ヒ弗栗結^同ハ升汞

ヲ浴湯ニ加フ每浴三四錢皮膚無病ナレバ此療法的當

スト雖潰瘍状皮膚病アル者之ヲ施セハ吸収甚旺盛スル
ガ故ニ却テ肉攻セシムルトアリ

○第三千十九方 獨尊地名 治癩毒法

甲方

升乘十二 蒸餾水適宜溶化加後味

白蒸餅心 白糖各適宜

右為二百四十九衣桂末或石松粉

主治最初四九每九升乘二十分ヲ取り午饌後即時ニ水

或ハ麥酒少許ヲ以テ送下爾後ハ令時或ハ四分此ノ

如ク隔日一服毎服二九ヲ加増シ最後三十九升乘一

至テ巳ム廿七日ニシテ治ヲ終之ヲ服メ即吐スル者ハ少頃アリ

テ再三十九ヲ取り前法ニ仍テ阿芙蓉丁幾二三滴乃至

四滴ヲ加ヘテ送下ハ服後腹痛スル者モ亦阿芙蓉丁幾

二三滴ヲ用フルニ宜シ又薩兒沙巴粟刺一食匙水ハ碗

ヲ以テ煎メ三碗ヲ取り毎日服セシハ施治ノ間緩々蒸

發氣ヲ促スヲ要スルガ故ニ冬日ハ外出ヲ戒シ夏月ト

雖美日ノミ外出ヲ許シハ賊風ヲ避ケ玻璃障子ノ傍

モ亦遠隔シテ恒ニ重衣温保セシム又餐食ヲ半減シ殊

ニ朝暮ハ淡味ノ食少許ヲ與フ多キモ小乾餅一個ニ過

クルト勿レ豕肉。鴈。鴨。白製酪。乳汁。酸性物。標杆飲液ヲ禁

シ其他欲スル所ノ飲食ヲ許メ可ナリ外治ヲ施スナ
シ○獨尊地氏屢歴驗スルニ此法ニ由テ治スル者ハ決
メ他日再發スル者アラジト云フ但曾テ數回癰毒ヲ感
染シ而メ其治適當ナラサリシ人ニ在テハ本法ノ如ク
服シ終リテ尚數日連用スベシ或ハ二三週ヲ經テ後再
本劑ノ半ヨリ始メテ法ノ如ク服盡セシハ施治ノ間病
者寒ヲ冒スハ害ヲ招クコトアリ吐涎シ且口内潰瘍ヲ
生スル者多シ其症治スル追後服ヲ停ムベシ胃寒ニ由
テ足部膝等疼痛腫起スルハ亦之ヲ停メテ浴湯硫黃
阿芙蓉龍腦等ヲ用ヒテ發表スルニ宜シ癰毒既ニ除キ

テ後施治間ノ攝養適當ナラザルカ為ニ鼻孔唇口内等
ニ間潰瘍ヲ生シ其狀弛緩シテ瘡縁侵蝕シ忽滋蔓シテ
大患ヲ致ス者アリ獨尊地氏之ヲ治スルニ刺必斯高私
秩屈斯ヲ點シ以テ良方トス或ハ内服ニ供スルコト左方
々如シ

乙方

刺必斯高私秩屈斯錢ニ 蒸餾水ニ可溶化

右調勻晨夕取一茶匙加乳汁多量度舌上不覺灼熱與之
○五六月毎ニ加増メ終ニ毎服四五茶匙ヨリ六茶匙ニ
至ル

○病者前ニ多量承劑ヲ服シ且温保適宜ナラザリシ者
 ○獨尊地氏施治ノ前二週乃至三週間硫黃劑ヲ與スル
 卞左方ノ如ク一者或ハ他方ノ如クニ量異ナリ

(丙方)

硫黃華^或乳糖^{二錢} 阿芙蓉^{丁幾} 蒸餾水^四

右調勻每服一食匙日三服臨服振盪

卞又方

(丁方)

肝色硫黃^八 蒸餾水一^斗溶化加桂舍利別二錢

右調勻分三服每日服盡

又肝色硫黃一^斗ヲ以テ浴湯ニ溶和シ每晚或ハ隔晚ニ

浴セシメ浴後即蓐ニ就カシ^山便列^印名^地ノ病院ニ於テ

孤劉傑^名獨尊地ノ法ヲ歷試セシ説ニ據レハ此法他法

ニ優レルヲ見ス第十三員第十四員ノ病者ノ如キハ不

治ナリ孤劉傑氏按スルニ其効アラサル所以ノ者ハ外

乘ノ量微ニノ毎常全身ノ癩毒ヲ治スルニ足ラザルナ

リ故ニ孤劉傑氏ハ用ヒテ三十九ニ至リ其症治了スル

迄尚之ヲ持重シ漸ヲ以テ減殺ス此ノ如ク服法ヲ變メ

甚良驗ヲ獲タリ^{口内}咽喉鼻中等ノ^後証潰瘍骨腫及ヒ

著大ノ息肉等速ニ全癒シ其効他法ニ優レリ肺勞素因

胃腸虛弱及妊娠ハ此ヲ禁ス

○第三千二十方 基利碌名外承膏

外承錢一 家猪脂一

右玻璃白研和二十四時作軟膏塗擦足蹠治癩毒

主治基利碌氏此膏ヲ塗ルノ前浴湯及灌腸ヲ行フ

二三回兼テ清涼解釋飲ヲ用フル一四五日間軟膏用量

初一錢後漸増ノ二錢ニ至ル初日甲足ニ塗リ次日乙足

ニ擦シ第三日浴湯ヲ施ス此ノ如ク之ヲ持重ノ病全癒

スルニ至ル又發表飲ヲ服シ數次襯衣ヲ更換スルヲ要

ス此法蒸發氣ヲ進メ利尿ヲ促シ而メ吐涎スルヲナシ

基利碌之ヲ稱ノ最勝法トス秘松名ハ之ニ反シテ諸

治法中最不當ノ法ト稱ス

○第三千二十一方 檄歌蘭度改製基利碌名外承膏

升承 精製礪砂各二錢 薔薇水二多溶解濾過加精製

家猪脂二多入玻璃白上沙火研磨至薔薇水蒸散放

冷再加後采

枸橼油十五滴

右調勻作軟膏每晚取一茶匙塗擦足蹠

主治全身癩毒ニ宜シ此膏ヲ塗ル一諸証解散ノ後モ尚

數日持重スベシ效血及肺癆ノ恐アル者モ害アル

ナシ ○ 穢歌蘭度ハ頑固依屈寫其他惡液病ヲ治スルニ亦之ヲ稱賛ス

○第三千二十二方 [穢歌蘭度]

赤降承一 生安質沒尼末二 甘草越幾斯適

右為八十九衣石松粉每晚服十粒頑固症朝暮用之

[主治] 後証癩毒ニ宜シ ○ 赤降承ハ胃腸ヲ犯シ多量ナレ

バ胃瘻疝泄瀉ヲ發シ或ハ病人服スルニ堪ヘサル者間

アリ然レニ經久癩毒ニ屢殊効ヲ奏ス

○第三千二十三方 [遠突土]

赤降承二 精製阿芙蓉四 乳糖三

石調勻為散分十二服日三服 ○ 此方ハ五出方ニ

[主治] 頑固癩毒性皮膚病骨疾及ヒ總テ後証癩毒ニ宜シ體

質虛弱效血及ヒ總テ胸病ノ恐アル者慢久胃腸虛衰等

皆赤降承禁忌ノ症ニ係ル並ニ大量赤降承ハ服ニ堪ヘ

サル者多シ

○第三千二十四方 [薄刺狩斯]

赤降承四 加砂糖舍利別少許丁寧研和再加後呆

白蒸餅心 白糖各適

右為八十九衣桂末早晚服四九每五日加四九

[主治] 全身癩毒ニ宜シ症ニ從ヒ日服二十九ヨリ四十九

九

九

九

九

九

九

ニ至リ又之ニ準シ遡回ノ減殺ス

○第三千二十五方 便_名人_名治_名經久癰毒法

赤降_名承_名 硫黃安質没尼_附 白糖_名各_名八_名

右調勻為散分十六服日二服

主治鼻中經久ノ癰毒性潰瘍骨疾及ヒ皮病ニ最適當ス

○四日毎ニ_甚經久_症赤降承ノ量八分ハ一ヲ増シ終

ニ日服半ハニ至ル或ハ流涎スルヲ度トシテ已ハ快路

ニ向フ片ハ又上ニ準シ遡回ノ減殺ハ瀉スル者ハ本方

中阿芙蓉少許ヲ加フ之ニ兼テ蜀羊泉莖瑞香皮過列那

里根_附ノ泡劑ヲ飲服セシム○此法ハ吐涎及ヒ熱ヲ發

スル者多シ便_名人_名之ヲ施ノ十週乃至十二週内ニ頑固
ノ癰毒ヲ治セリト云フ

○第三千二十六方

赤降_名承_名 甘草越藥斯_二 甘草末_一適_宜

右為六十九丸衣粉末午餐後每四分時服_一丸_一中_一含_一赤_一

之三日

主治頑固癰毒胸間虛弱ニ外承ヲ用フベカラサル者

ニ便列_名印_名地_名病院ニ於テ上方ヲ施シ驗ヲ得タルヲ多シ

上方ノ如ク午饌後四分時毎ニ一丸ヲ服スルヲ三日ヲ

經レハ又加増ノ每服二丸ヲ用フルヲ三日此ノ如ク漸

加増ノ毎日赤降汞一匁半或ハ二匁ニ至ル若胃中或ハ口内疾患ヲ生スル者ハ後服ヲ停メ其症治メ後再小量ヨリ始メテ法ノ如ク此ヲ用テ本病癒エル者ハ前法ニ準シ又遡回ノ減殺ス

○第三千二十七方〔衛垣越索斯假設魯列〕

硝酸汞溶液廿 桂水五

右調勻朝夕服四十滴

○主治癩毒性腐骨疽ニ宜シ○毎日二十滴漸加増ス之ニ

兼テ癒瘡木薩沙弗刺斯過列那里附瑞香皮ノ煎液及ヒ生安質没尼ヲ與ヘ且水銀膏ニ失鳩客及ヒ龍腦ヲ和メ

瘡處ノ周圍ニ塗擦ス○蓋硝酸汞ハ獨體質強健腹臍知覺遲鈍ノ者ニ適當ニ此緩性汞劑ヲ適宜ニ用フルハ瘡處腐蝕ヲ防クニ甚好トス

○第三千二十八方〔栗格爾突〕

普洛篤沃胃謨 萬莖越幾斯各半

阿芙蓉越幾斯九

右調勻為三十六丸衣石松粉

○主治栗格爾突氏癩毒序証並ニ後症ヲ治スルノ良法トシテ稱用ス○普洛篤沃胃謨ノ服量每服八分匁ノ一ニ半匁乃至一匁日ニ二三回トス栗格爾突名ニ從ヘ八日服

六回ニ至ルヘシ○此劑ハ速ニ他物ト親和シ甚ク分離シ
易シト云水乙失速非屈私^{モイシソク}ハ曾テ普洛篤沃胃謨半以
沃胃謨加里二三以テ蒸餾水一弓ニ溶解シテ一時
毎ニ一食匙ヲ試用ス然レ二三日後服ヲ停ム何者
病者胃部壓迫ニ堪ヘ難ク咽喉縮収ヲ覺ヘ兼テ愛氣ヲ
發シ竟ニ嘔吐シテ此劑ヲ嫌惡スル^ル甚シキニ由テナ
リ又之ヲ強壯人ニ用フルモ亦同シク惡証ヲ發ス故ニ
木乙失非屈私^{モイシソク}按スルニ恐ラクハ是胃液ニ合フ分離
シ又更ニ一物ヲ生成シ隨テ一種ノ作用ヲ起スニ由ル
歟或ハ散方ニ作ルモ亦適當ナラズ故ニ世醫之ヲ丸ト

シ用フル者多シ蓋丸モ亦配合物ノ性ニ由リ普洛篤沃
胃謨ヲ分離セサル^ルヲ得ス丸料研和ノ間モ亦已ニ分
離スヘシ是故ニ爾後木乙失非屈私ハ普洛篤沃胃謨ヲ
内服ニ供セズノ軟膏ニ和シ外用ノ甚佳効ヲ得タリ通
例家猪脂二錢ニ普洛篤沃胃謨十以テ加ノ此膏毎日新
製セシム但家猪脂ハ新鮮純精ニシテ臭氣ナク腐敗セザ
ル者ニアラザレバ即分離シ此軟膏ハ刺戟衝動スル^ル
ナク大ニ吸収機ヲ催進スルヲ以テ癩衝症末期列印巴
滲出スル^ル甚シキ者ニ最効アリ又癩衝症旺盛ノ期蜂
窠體ノ腐蝕スル者例スルニ標痘^{パナ}チノ如キ之ヲ用ヒ

テ奇効アリ然レ軟膏腐敗スル片ハ刺戟甚シク之ガ
爲ニ劇痛ヲ發ス但筋纖維ノ焮衝症ハ効驗甚シ

○第三千二十九方備篤

普祿篤沃胃謨ハ 杜松子舍利別ハ 甘草末宜
右為八九衣石松粉初早晚服二丸後加增至三四丸

主治癰毒腺病合併症ニ宜シ

○第三千三十方同上

普祿篤沃胃謨ハ 家猪脂六錢

右調勻作軟膏

主治經久癰毒潰瘍緩慢治セサル者此方之ヲ主ル

○第三千三十一方秘制律秘

姪優篤沃胃謨ハ 亜的兒半ヲ溶解

右調勻每服四滴乃至六滴日二服

主治經久癰毒皮疹合併ノ症ニ宜シ○姪優篤沃胃謨用

量每服十六分ハ一乃至四分ハ一日ニ二服トス○

此劑連用暫クニモ既ニ胃中困難ヲ發スルハ普祿篤沃

胃謨ノ如クニモ彼ニ較レバ一層甚シシ木乙失速ハ非屈私

名之ヲ經驗セシニ効功アル者甚罕ナリ而シテ此効力ハ

沃胃謨加里ト復ニ殊ナルハラ微セリ更ニ補給機ヲ防

グノ力ナク却テ體質ノ收合ヲ妨クルハ甚シ故ニ解凝

ハ劑タリ慢久ノ吐涎症ヲ發スルモ亦甚速ナリ是故ニ
姪優篤沃胃謨ヲ内用スルハ適當ナラズトス然レ内部
硬結腫及ヒ結節腫ゲズエヲ治スルニ須要ナルベシ
但軟膏ニ作り外用スルキハ確功アリ軟膏用法ニ般ア
リ曰ク塗擦曰ク貼定硬膏ノ塗擦ハ洩乙膜焮衝症ノ末
期ニ於ケルガ如シ刺戟衝動セシメ強ク吸収ヲ催進セ
ント要スル者ニ的當ハ故關節焮腫ニ屢見ル所ノ列印
巴滲出ニ由テ關節硬腫スル者ニ亦好シ並ニ攝護腺津
唾腺肝臟等ノ如キ腺質器ノ焮衝後ニ遺ル所ノ硬結腫
ニ宜シ陰囊ニ此軟膏單味塗擦スルハ二三回ニノ焮腫

疼痛大水疱ヲ發スルガ故ニ的當ナラズ然レ此衝動ハ
大ニ益アリニ三日ニノ水疱乾収白屑剝離シテ腫起大
抵三分ノ一ヲ減スベシ再塗スルキハ焮痛更ニ少シト
雖病人再用ヲ喜バザル者多シ水銀軟膏ヲ加フレハ能
ク其猛カラ緩和ス但水銀膏中ノ酸化汞沃胃謨ノ一分
ニ和シ分離スト雖此合膏ハ假令分離スル者モ亦甚良
効ナリ便毒ヨリ粘液多ク流出スル者ニ尿道焮衝ノ時
期過テ后單方姪優篤沃胃謨膏ヲ用フルキハ佳驗アリ
姪優篤沃胃謨一錢單膏半ヲニ調和シ毎用一刃ヲ取り
塗擦スル一日二次乃至三次トス○貼定法ハ刺戟衝動

誘導吸収ヲ催進セント要スル症ニ適當ニ用法姪優篤
 沃胃謨一錢常用軟膏ニ和シ革蠟紙或ハ癒瘡膏ニ攤ベ
 厚刀背ノ如クシ之ヲ貼メ四分時乃至半時ノ後灼クカ
 如キノ痛ヲ發ス其痛一時若クハ一時半或ハ尚久シク
 持續セル後肌膚小疱ヲ發シ漸ク増大シ乳湮様液充實
 二第ニ日ニ至レハ起脹セル所ノ表皮厚固トナリ漸帯
 黄白色ノ痂ヲ結ビテ終ニ剥脱ス落痂スルモハ瘡痕既
 ニ新皮ヲ生シテ全瘡ニ但疱ヲ破ラズ落痂ニ及フ迄軟
 膏ヲ貼定セサレハ此ノ如ク經過順正ナラズ軟膏ハ始
 メテ貼スルノ後三日ニメ換フヘシ若疱剥爛スルモハ

遠西方書

卷六ノ瘡毒

三

瘡毒

甚シク痛ヲ發シ久シク膿化シテ癒エ難シ貼定法ハ
 衝症已ニ清涼劑ヲ用ヒテ其勢ヲ制刻セル者殊ニ癰毒
 焮衝眼耳焮衝ニ卓越ノ効アリ頸腫スコロツケヲ治スル
 モ亦他法ニ優レリ肉腫粘液滲出スル症ニ他藥寸驗ヲ
 見サル者姪優篤沃胃謨ヲ以テ治スベシ攝護腺ノ慢性
 腫起軟膏ヲ塗擦スルノ數回ニメ解散スベシ或ハ貼定
 ヲ要スル者モ屢之アリ又此軟膏ヲ以テ關節病ノ殊藥
 ト稱ス六百四十八方並ニ二千九
百十八方ヲ參照スベシ

○第三千三十二方越魯涅風

重蒲碌密優謨ニム 蒸餾水四

右每服十滴日二次漸加增至百滴

○第三千三十三方

重蒲祿密優謨附一 亞的兒一錢

右每日午饌後取十滴十五滴乃至二十滴水或ハ燕麥粘
汁和服

〔主治〕右二方總テ癩毒ニ宜シ然レ此方未經驗足ラザル
ガ故ニ其効確定シ難シ

○第三千三十四方〔列墨爾〕

磷酸汞二錢 葛私加栗刺皮末二錢

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕後証癩毒ニ宜シ○他ノ有力ノ汞劑効ナキ症ニ磷
酸汞屢驗アリ

○第三千三十五方〔遠突土〕

癩瘡木脂末 越秩阿布私安質沒扭 白糖各半

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕癩毒性發疹息肉肉腫コロンダ等ニ宜シ

遠西方彙卷之二十八

Handwritten stamp or mark.

1153

遠西方彙卷之二十九

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第三千三十六方

鯢弗利爾コックリル及劉私リウシ篤トク並人並人塗擦法ユイン

クチーキール。ワルゲンス。ロウフリール。エニス。ト蘭。

第一預備法

先葯刺巴二刀純精酒石一乃ノ緩下劑或

ハ非稠年チシ私シ人シノ瀉利水ヲ與ヘ翌日ヨリ毎日浴湯セシム但

湯温列氏二十九度ニ過キズ第十四日再下劑ヲ與フ若
 塗療法ヲ急ニセント要スル片ハ預備ノ日數ヲ縮メテ
 初日瀉劑及ヒ浴湯ヲ施シ第二日ハ唯浴湯シ第三日再
 瀉劑及ヒ浴湯ヲ施シ第四日單ニ浴湯シ尋テ直ニ塗擦
 法ヲ施スベシ食餌ハ肉羹汁ヲ以テ米。粿麥ヲ煮午時之
 法ヲ喫スルノ半瓜爾篤ノ容量日ニ三次ヲ度トメ之ニ過ク
 ルノナカラシム飲劑ハ唯薩兒沙巴栗刺煎或ハ牛房根
 過兒托。甘草ノ煎液粿弗利爾氏ニ宜シ○第二塗療法劉
 松篤氏ハ粿弗利爾氏ヨリ一等食規ヲ嚴ニス塗療法ヲ
 終ル至毎饌肉羹汁三小盞日ニ三次トシ上ノ煎藥三七

ヲ飲マシム獨虛弱ノ病者ノミ古葡萄酒一二食匙或ハ
 哥喜少許用フルヲ許シ幾利失私ノ後ハ緩煮鷄卵一二
 個ヲ與ヘ其他臍味ヲ嚴禁ス病室ノ温暖列氏十八度乃
 至二十度トシ病者居恒ニ外出スルノナカラシム牖戶
 ヲ閉テ新氣ヲ通セズ襪衣。病床。其他衣服ヲ換ルナ勿ラ
 シム之ヲ塗擦スルニ劉私篤ハ百。暴爾名ハ灰白水銀膏
 ヲ用ヒ粿弗利爾ハ家猪脂水銀等分ノ軟膏ヲ用フ軟膏
 量毎用二錢トス然レ已ニ水銀ヲ久服セル病者ハ初メ
 塗ルノ一錢第三日一錢半第六日ニ至テ二錢トシ順正
 ノ塗療法ハ左ノ次序ニ從ヒ第一日早朝之ヲ塗ルノ兩

足ノ踝骨ヨリ膝ニ至リ第三日膝ヨリ腰ニ至ル第六日
 早朝両手ノ腕骨ヨリ肩ニ至リ第八日早朝脊ニ塗リ第
 十日早朝又脛ニ塗リ第十二日股ニ塗リ第十四日膊ニ
 塗ル第十五日幾利^{キリ}失^シ秘^シ汗ヲ發ス宜ク温飲ヲ以テ之ヲ
 催進スベシ第十六日又脊ニ塗ル但晚間之ヲ施スヲ好
 トス何者前日ノ發汗連綿トメ十二時餘ヲ延ク者モ亦
 屢之アルガ故ニ早旦施ス片ハ恐ラクハ之ガ為ニ其汗
 ヲ妨グルトヤラシ第十七日朝瀉劑ヲ與ル第十八日晚
 間脛ニ塗リ第十九日下劑ヲ投ル第二十日晡時股ニ塗
 擦第二十一日早旦下劑ヲ用ル第二十二日膊ニ塗擦

此第二十三日朝下劑ヲ用ル第二十四日晚脊ニ塗擦シ
 第二十五日朝下劑ヲ用ル第二十六日微温湯ニ浴シ石
 鹼及ヒ燒酒ヲ以テ身體ヲ洗ヒ襯衣及ヒ病室ヲ換フ○
 蓋吐涎早ク發スルカ或ハ甚シキニ過ルカ若クハ他ノ
 危険証ヲ傍發スル等彼此ノ事故アリテ上欸ノ次序ヲ
 改メ或ハ暫塗擦ヲ停ムベキ者屢之アリ今其數件ヲ舉
 ケテ此ニ載スルニ違アラハ本法ノ如ク塗擦十二回ヲ
 要スル者ハ宿根ノ症ニ間之アルノミ大抵九回或ハ唯
 五六回ニメ全體ノ癩毒ヲ治スルニ足レリ○第三調理
 法病者ニ命ノ數週間冒寒ヲ戒シ唯暖日ノミ病室ヲ出

ルヲ許ス食餌ヲ加増シ補益スルハ漸ヲ以テスベシ
 本復ノ時期ハ屢觀衣ヲ換ヘ微温浴湯ヲ施シ下劑ヲ服
 スルヲ肝要トス吐涎持續スルノ間ハ殊ニ然リ口内承
 毒瘡ヲ發スル者ハ玫瑰蜜ニ沒藥丁樂ヲ和シ或ハ律私
 篤氏ニ倣ヒ龍腦一錢ヲ以テ扁桃油一匁ニ溶シ點スベ
 シ其他一切醫藥ヲ要セズ是元氣本腹スルノ非常ニ速
 ナレバナリ

此法屢全身ノ癩毒ニ試驗アリ然レ氏慎重ノ施サバレバ
 危險症ヲ遺シ易シ肺癆水腫卒中失苟兒陪苦等ノ素質
 アル者ハ必此法ヲ禁ズ

○第三千三十七方（孤列私珍）

鹽酸金一匁 石松粉十五匁

右調勻分十六裹每日取一裹塗舌上及齒齦

主治後証癩毒既ニ諸種ノ承劑ヲ用ヒシ者之ニ宜シ

○第三千三十八方（越魯涅屈）

奧私篤爾名鹽酸金鹽一匁至廿四匁 乳糖十六匁

右調勻為散分八裹每用取一裹塗舌或唇日二次

主治癩毒ニ宜シ

○第三千三十九方（樞秘涅兒）

鹽酸金鹽四匁 蒸餾水滴宜溶加後呆

雙鸞菊越幾斯半 蜀羊泉莖越幾斯一錢 過兒托末適宜
右為八十九衣石松粉每服三九日三服

主治宿根癩毒骨痛アル者ニ宜シ之ニ兼テ薩兒沙巴栗刺及ヒ蜀羊泉莖ノ煎汁ヲ與フ○偲敕涅兒子ト試驗ニ據ルニ此症ヲ根治スル鹽酸金鹽十ニメ足レリト云コ
鹽酸金鹽ハ深ク病的ノ補給機ニ達シ管ニ變質セル器ヲ復良スルノミナラズ豕肉狀骨腫オトメテアノ如キ病的ノ贅物モ亦能ク解散スルナリ

○第三千四十方（排印的） 玫瑰昆設兒弗半錢

私的列幾尼涅精製 鹽酸金鹽各二

過兒托末十四

右調勻為二十四丸衣過兒托末玻璃壘收貯早晚服一粒以漸小心加增

主治經久癩毒劇甚骨痛ヲ兼ヌル者骨腫エキツ腐骨疽等ニ宜シ

○第三千四十一方（弗栗造）

甲方

鹽酸布刺秧那鹽二 蒸餾水八

右調勻朝暮服一食匙

乙方

鹽酸布刺秩那鹽四 蒸餾水六

右調勻每服一食匙日四服

主治宿根癩毒經久癩白帶下宜之拂郎西ノ醫殊ニ鳩

兒列利爾人及及ヒ忽歇爾人等輒近上症ニ布刺秩那ヲ稱

用セシヲ以テ頗瀝爾地ノ病院ニ於テ復之ヲ試嘗ス

ト雖未其効驗アルヲ見ズ但左法ヲ以テ製スル所ノ鹽

酸布刺秩那鹽ヲ用フ即純粹布刺秩那半ヲニ鹽酸六ヲ

及ヒ硝酸三分適宜ハヲ加ヘテ十分溶解シ瀝過ノ精製食

鹽七錢ヲ加ヘ蒸氣ニ上セテ蒸散セシメ乾涸結晶スル

ニ至ル此ノ如ク之ヲ製ノ得ル所ノ量十四錢トス故ニ

其半ハ純粹ノ會水布刺秩那鹽ヲ會ムナリ○弗栗結人

ハ最初甲方ヲ與ヘ四日毎ニ服量一食匙ヲ加ヒ之ヲ用

ヒテ其害アラザレハ二三週ノ後始メテ乙方ニ轉シ亦

四日毎ニ服量一匙ヲ加増ス或ハ日服十匙ヨリ十一匙

ニ至ルトアリ○弗栗結氏鹽酸布刺秩那ノ効ヲ試ムル

ニ（第一）少量ノ鹽酸布刺秩那鹽ハ分ハ一ハ顯著ノ異証

ヲ挑起スルトナクメ唯微々消食機ノ障礙便秘胃部壓

迫等ヲ覺ユルトシ而メ其証亦速ニ消散ス但更ニ多量

ヲ與フレバ大害ヲ生スルト確明ナリ（第二）少量ハ一器

ニ持効アルト明ナラズ（第三）之ヲ用フレハ補給機ヲ轉

變スルナルベシ然レ未之ヲ確徵セズ(第四)効力持ニ一
 系例スルニ達スルヲ見ズ(第五)體中毒アリテ發スル所
 ノ贅肉或ハ器質變性等ニ著シク効ヲ顯ハスノナシ(第
 六)故ニ經久癩白帶下贅肉贅骨コンダ癩毒器敗等ヲ治
 スルノ効確實ナラズ宜シク病者ノ性ニ準ノ先他ノ根
 治法ヲ施シ而シテ鹽酸布刺秩那鹽ハ最後ニ用フベキナリ

○第三千四十二方(同上)

醋酸私的列幾尼捏一ハ再留燒酒半ヲ溶解

右調勻臨卧服三滴四滴二十滴乃至三十滴

主治劇甚ノ夜間骨痛ニ宜シ

○第三千四十三方

格屈林名密過私末秋加水二

碯銅礬水一錢

蒸留水十錢

右調勻初午饌後服一食匙後晡時服一食匙

主治經久惡液病殊ニ宿根癩毒潰瘍ヲ發シ承劑誤用ノ
 為ニ變性セル者之ニ宜シ一穢歇蘭度ハ之ヲ用ニ外腺病
 ヲ治ハ歇乙涅見名ハ發疹病ニ宜シトス

○第三千四十四方

鹽酸亜鉛二蒸留水四ヲ溶解

右調勻每服一食匙日四次

主治後証癩毒ニ宜シ○杖結名ハ鹽酸亜鉛四ハ乃至六

氏ヲ以テ蒸餾水四勺ヲ溶化シ毎日四食匙乃至六食匙
ヲ與フ然レ此服量過多ナリ

○第三千四十五方 別私那爾突名癩毒丁幾

精製酒石鹽各半 桂水各半 精製阿芙蓉一 酒製桂水

以上各別溶解混和上沙火時々振蕩飽熟三週之後濾過

去滓加後味去滓加後味

上好亞刺昆亞趨謨一 礪砂華半

右加桂水三勺溶化内器密封靜定二三日後濾過貯

主治癩毒ニ宜シ ○錦葵葉浸一盞ニ此丁幾去爾二十四

滴至ヲ點シ冷服セシマル一日ニ三次ト込又序証及口

後証ノ癩毒下疳使毒息肉等ノ洗水トス或ハ痲病射注水

ト込此劑容易ニ癩毒ヲ根治スル能アリ故ニ諸承劑ヲ

要セズ別私那爾突名癩毒丁幾氏累年經驗スト云フ然レ他醫往々

之ヲ試用スルニ或ハ寸効ヲ見ズ或ハ屢害ヲ致シ唯輕

易ノ症些子ノ下疳鼠蹊腺ノ輕腫殊ニ些子ノ骨腫息肉

等ヲ治スルニ用フベシト云フ ○既往拍乙利列名揮發

鹿角鹽ヲ稱用シ翳屑矣蔑爾名酒石鹽ニ礪砂揮發華

水及ヒ阿芙蓉ヲ加ヘ用フルヲ佳トス

○第三千四十六方

硝酸錢一

砂糖舍利別一

燕麥煎一匙煎燕麥半取液八勺

右調勻每半時或一時服一食匙

主治後証癩毒殊ニ其症永毒或ハ失苟兒陪苦ヲ合併ス

ル者ニ好シ二千九百九十一方及二千九百九十二方ヲ参照スヘシ用量漸加ヘテ

日服二錢或ハ三錢ニ至ル○磷酸ハ殊ニ癩毒腐骨疽ニ

宜シ八百廿五方八百六十八方及八百八十九方ヲ照查スヘシ

○第三千四十七方

煇兒刺屑

沃胃謨加里錢二

蒸餾水八勺溶化

右每服一食匙日四次臨服宜振盪水

主治經久變性癩毒症腺病及日永毒ヲ合併スル者ニ上

方ヲ用ヒ浴法及ヒ沙兒薩巴栗刺煎ヲ兼用ス獨煇兒刺

屑氏ノミナラス英吉利拂郎西及ヒ獨乙ノ醫モ亦之ヲ

殊稱ス

○第三千四十八方

穢歌蘭度

沃胃謨加里錢一

沃胃謨錢一

蒸餾水五勺溶化加罌粟

舍利別一勺

右調勻每服一食匙日三服

主治經久癩毒ニ宜シ

○第三千四十九方

弗栗結

沃胃謨加里錢一

錢至

沙兒薩巴栗刺煎三勺煎根一溶取之

鮮加砂糖舍利別半勺

○右調勻每服二食匙日四服

主治後証癰毒殊ニ汞劑誤用後ノ者之ニ宜シ又腺病及

律魁私病等ニ宜シ

○第三十五方〔實の里屈〕

沃胃謨加里三 漿粉半

○右調勻為散分九包每服一包日三服

主治後証癰毒ニ宜シ○每四日沃胃謨加里一二勺ヲ加

増シ終ニ毎日三十二勺ヨリ四十勺ヲ服スルニ至ル病

症退キテ后モ尚十四日間之ヲ持重ス但漸々減殺シテ

前量ニ回復スベシ

○没モ乙イ失シ束ソ欬ホ屈ク斯ス名メ用沃胃謨劑治癰毒法

始メテ陰部ニ潰瘍ヲ生スル者直下ニ其性ヲ確知スル

ハ良ニト雖亦能ハサルカ故ニ總テ不潔ノ交媾後陰部

ニ小疱ヲ發シ若クハ剝脫スル片ハ二三日間癰毒ノ治

ヲ試ムルヲ佳トス故ニ暖度齊整ノ室中ニ居リ諸種ノ

飲液清水砂糖水過兒托葉歇爾拔私屈謨花接骨木花ノ

淡浸劑或ハ蘆根煎等ヲ多服セシメテ以テ蒸發氣ヲ催

進スルヲ要ス大便ヲ促メ適度ナラシムルニ宜シ但澇

瀉セシムル勿レ恐ラクハ皮表ノ蒸發之ガ為ニ妨碍セ

ラレントヲ外治ハ温水或ハ過見拖根錦葵花煎汁等ヲ
 以テ患所ヲ洗浴スベシ但一時半毎ニ洗浴シ毎浴四分
 時間且屢浴液ヲ換ヘテ以テ温度ヲ平等ニシ且其分泌
 セル病毒ヲ再吸收スルヲ防クベシ浴セサル者間ハ上
 ノ藥液ヲ棉巾ニ蘸シ瘡所ニ置カシ込包莖者ハ藥液
 ヲ射注スベシ但包被ヲ截開スルハ之ニ優レリ○攝養
 法病者ニ許シテ平生ノ食餌ヲ與ヘ唯少シク食量ヲ減
 セシム但病室ヲ離ルハ下ナカラシム此ノ如ク此治法
 ヲ持重スル下數日ノ后其瘡癩毒性ノ者ニアラサレバ
 瘡面初則滑ナル者今ハ則凸凹トナリ白色ノ底面ニ陷

ル所アリ形状恰數點ノ小島ニ似タリ是瘡底ノ表肉既
 ニ腐穢シ裏面ニ膿ヲ醸スニ由テ表肉離ルガ故ナリ
 此腐肉剝離スレハ真ノ瘡底ヲ現シ良膿底面ヨリ滲出
 シテ速ニ瘡ニ是ヲ以テ本症癩毒ニアラサルヲ證スベ
 シ本症真ニ癩毒ナラハ上ノ証狀ニ及ノ瘡底ノ表肉上
 ノ如ク剝離スル下ナク瘡瘡未熟セサル片ハ稀淡不潔
 ノ水液夥ク滲出ス瘡面小ナレハ其滲出液ニ至テハ則
 居多ナリ此ノ如ク水液滲出スル下連綿持久シ其部終
 ニ十分潰爛シ盡クルニアラサレハ止マサルナリ此証
 狀ニ由テ其瘡瘡タル下明證セバ尚上ノ治ニ從事シ

テ之ヲ持重スヘシ但皮表ノ蒸癩氣ヲ促サシガ為ニ排
 毒飲ヲ温服セシムベシ即薩兒沙巴栗刺癩瘡木山牛房
 根阿訥尼私過列那里亞根謁久乙屑篤附煎及ヒ木類煎
 等ニ宜シ病者原健康ニメ惡液質ニアラサレバ患所ニ
 新生セル病的ノ分泌器此ニ於テ腐壞シ近部ニ純良ノ
 嫩衝ヲ發シ其運營ニ由テ剝離シ去ルナリ爾後自然良
 能ニ由テ暫時ニ癒エ後患ヲ遺スナシ此症ノ經過三
 週ヨリ四週ニ至ルベシ○其人若惡液質或ハ腐藥等ヲ
 施スニ由テ自然ノ經過ヲ謬ルキハ立地ニ其部ノ運營
 ヲ妨障抑壓シテ病毒容易ニ他部ニ轉移シ全身癩毒症

ニ罹ルニ至ル其轉移ヲ防遏スルハ上ノ治法ニ兼テ速
 ニ烈シク補給力ヲ挑起スルノ藥劑ヲ投スルヲ切要ト
 ス其功效ヲ収ムル者唯一品トス即沃胃謨加里是ナリ
 之ヲ多量内服セシメ或ハ浴法燻法ニ用フベシ
 若故アリテ疔瘡自然ノ經過抑制セラレ病的運機鼠蹊
 腺ニ轉移スルキハ病毒或ハ其力ヲ逞シウノ腺ノ一部
 及ヒ近圍腐壞シテ便毒ヲ發スルナリ宜ク速ニ破開ス
 ベシ便毒未發セサルキハ其腫起セル所ノ腺ニ水燻法
 或ハ温浴法及ヒ蒸漏法ヲ施シ以テ病的運營ヲ故所ニ
 喚歸スルヲ試ムヘシ之ヲ試ミテ功ナク既ニ腺中ニ水

液ヲ醸スルハ速ニ寒菴法ヲ廢シ温暖琶布ヲ貼ノ便毒ノ醸熟ヲ促スベシ若微々波動ヲ覺工周圍ニ赤色ヲ見ハスキハ破開スルニ宜シ但水液腫起ノ中央ニ聚マル者ハカヲ用ヒ膿道敷行ニ岐分スル者ハ腐藥ヲ用ヒテ以テ悉ク膿道ノ間隔ヲ穿透スヘシ便毒ハ自然ノ治ヲ俟ツベカラザルカ故ニ病毒ヲ吸収シテ全軀ノ症ニ轉スルヲ防ギ而シ沃胃謨治法ニ從事スルヲ須要トス○便毒破開ノ后ハ分泌液ノ排泄ヲ進ムルヲ以テ第一義トス屢洗潔シ緩和琶布ヲ施シ半身浴湯ヲ行フニ宜シ沃胃謨治法ヲ處スルニ或ハ預備法ヲ要スル者間之ア

リ其法病者便秘スルキハ之ヲ瀉シ及ヒ皮膚ヲ清淨スルニ宜シ瀉藥ハ旃那葉浸或ハ旃那瀉下飲附最適當ス皮膚ヲ洗滌スルハ石鹼湯浴ヲ好トス此法沃胃謨ヲ與フル前一日ニ方リテ施スベシ○沃胃謨ノ用法分テ五トス一ハ順正ニ沃胃謨加里ヲ内用スニハ沃胃謨鹽浴三ハ局處ノ症ニ沃胃謨溶液ヲ外用ス但此症自ラ各箇ノ治法ヲ要ス四ハ撮生ヲ節メ醫則ニ應スベシ五ハ適當ノ食餌ヲ用フ

第一沃胃謨加里順正内服法沃胃謨加里ノ服量ハ劇ク補給機ヲ催進シ而シ水脈系ノ運營ヲ促サザルヲ度

トハ少量ハ吸収カヲ進メ大量ハ補給機ヲ充進ス瘧毒
 ヲ治スルハ單ニ補給機ヲ進メルヲ要スルカ故ニ十分
 大量ニ與ルヲ好トス然レ左ノ二件ヲ計リテ其量ヲ斟
 酌スベシ一ハ胃能ク其量ニ堪フルヲ要ス病者之ヲ服
 メ毫モ不快ヲ覺エサルヲ要ス○最初ヨリ直キニ過度
 ノ大量ヲ與フレハ咽喉及ヒ胃中灼熱或ハ嘔氣ヲ發ス
 病人虚弱神經質ノ者或ハ胃中酸敗液多キ者ハ殊ニ然
 リトハ但真ニ嘔吐ヲ發スルニ至ル者ハ甚罕ナリ舍利
 別或ハ護謨漿類ヲ以テ沃胃謨加里ヲ送下レ若ハ香
 竈水液越幾斯劑収斂物等ノ配用ヲ禁スレハ大量沃胃

謨加里ヲ與フト雖亦病者速ニ慣レテ能ク之ヲ服スル
 ニ堪ル沃胃謨加里ニ堪ヘサルハ大抵其製ノ純精ナラ
 サルニ由ル者多シトス○每常最初衆人ニ處ス可キ限
 量一定シ難シト雖没乙失速故屈斯氏之ヲ歴驗スルニ
 十五歳已上ノ人日服一カニシテ可ナリ人皆此量ニ堪
 ヘ二三日連服スレバ既ニ著シク輕快ヲ覺エル者往々
 之アリ病者一カヲ服スルニ堪フルヲ見バ十カヲ加フ
 ベシ此量ヲ與ヘ兼テ沃胃謨ヲ合メル浴湯ヲ行フ片ハ
 數日ヲ過キズノ既ニ本病寛解ス若數日ヲ經テ著シク
 輕快ヲ覺エサル片ハ日服二カ五十カヨリ一錢ニ至ル

已ニ其極度ニ至レハ容易ニ其度ヲ過ルヲ要セシ此量
ヲ連進スレハ其症漸次ニ本復シ通例没乙矢速故屈斯
氏カ最初處スル所ノ方左ノ如シ

○第三千五十一方

(甲方)

沃胃謨加里^一 蒸餾水^三

右分為三服午饑前服盡

○每服一弓ノ藥液患者ニ於テ過多ナルヲ察セハ減
半ヲトスルモ亦可ナリ病ノ神經質ニメ屢胃瘳ヲ患ル
者ハ没乙矢速故屈斯氏蒸餾水ニ代ヘテ黑櫻實水ヲ用

乙テ佳効ヲ得タリ黑櫻實水ハ沃胃謨加里ヲ分離スル

下ナシ○上方ヲ服スルニ磁蓋ヲ用フベシ若鑛是ヲ用

スル下數回ニ及ベハ病者終ニ嫌厭シ匙モ亦真珠色ニ

變ス此方必饑前ニ用カレ所以者ハ胃中空虛ニシテ

藥カ十分ニ達スル由ニ藥液食物ト直ニ相觸ル、片

以消化ノ際夥多ニ分泌スル所ノ胃液ニ由テ藥液ノ成

分分解セラレ而シテ第一道ヨリ排泄スル所リ初第一服

ハ早且時宜ヲ量リテ飲服シ未服ハ午饑前凡一時ヲ隔

テ用ラベシ第一服後半時餘ヲ過ギテ淡薄ノ朝餐ヲ喫
スルニ宜シ○往昔没乙矢速故屈斯氏更ニ大量ヲ用ヒ

遠西方藥 卷七 癩毒 廣利堂

或ハ純精沃胃謨少許ヲ和用セシテ屢アリト雖之ヲ壓
驗スルニ多量ノ劑ハ消化シ難キヲ證ス

第三沃胃謨浴法 大人ハ最初一湯中ニ純精沃胃謨一錢
ヲ率トシ先沃胃謨ヲ以テ井水適宜ニ溶解ス但沃胃謨
加里適宜ヲ加ヘサレハ融解セサルナリ沃胃謨一錢十
分ニ溶化スルニ沃胃謨加里一錢半ヲ用テ浴湯ニ鹽ヲ
混和ス而シテ海鹽ト山鹽ト其量同シカラハ海鹽ハ極メ
テ苛烈ナルカ故ニ一湯ニ二比ヲ加ヘテ足レリ山鹽ハ
少キモ三比ヨリ下ル可カラズ海鹽ヲ搗搗シ一日前多
量ノ温水ヲ加ヘテ振盪シ以テ夜間十分ニ溶解セシメ

是ニ於テ微温湯ヲ浴桶ニ盛リ之ニ鹽水ヲ加ヘテ能ク
混和セシム浴湯温度ハ病者ノ意ニ随フベシト雖若其
度ヲ過ギテ上衝若クハ發汗ノ為ニ病者ヲ惱マス一ナ
キヲ要ス病者浴湯中ニ坐スルノ後浴桶上ニ細狭木板
ヲ横架シ又廣キ綿布ヲ重子テ桶ノ前ニ懸ケ病者ノ頭
ヨリ桶縁ニ垂ル木板ハ其綿布ノ湯中ニ垂下スルヲ支
ヘンカ為ナリ又別ニ綿布ヲ取りテ後ヨリ病者ノ項ニ
懸ケ結繃針ヲ以テ之ヲ頭ノ左右及ヒ前ニ於テ上ノ布
ト縫合シ唯病者ノ頭ヲ露出シテ浴湯ノ蒸氣昇騰スル
トナカラシム上ノ沃胃謨溶液ハ玻璃壺ニ入レ密閉シ

綿布ノ下ニ於テ病者ノ手ニ授ケ持セシメ藥液ヲ浴湯
 中ニ傾フケ出シテ適宜ニ湯ト混和セシム病者ノ浴湯
 中ニ在ル一凡半時トス浴湯冷ユレハ温湯ヲ加ヘテ可
 ナリ然レ其浴スルノ時限ハ延テ半時四分時ニ至ルモ
 可ナリ○其綿布ヲ以テ之ヲ遮障スルハ病者ヲシテ始
 終沃胃謨氣ヲ嗅引セシメサランガ為ナリ感覺靈敏ノ人
 殊ニ勞瘵質ノ人之ヲ嗅ケハ害アルベシ且綿布ヲ覆ヘ
 バ沃胃謨氣再復湯中ニ吸収セラレテ浴湯ノ効力モ亦
 倍加スルナリ○此浴湯法ハ必病者ノ居室中ニ於テ施
 スヘカラズ○浴湯ヲ終レハ速ニ其居室若クハ寢室ニ

往テ蓐ニ就キ發汗第一湯ノ後ハ未發汗セサル者間一
 過後起立シ蓐ヲ出テ日ヲ終フベシ通例第一湯ノ時
 既ニ微々搔痒及ヒ皮膚灼クカ如キヲ覺工暫時ニ止
 ムト雖浴湯後半時ニモ其証復大ニ發區間其証劇甚ニ
 ヲ恐ラクハ瞬間モ湯中ニ坐スルヲ能ハサルカ如キ者
 下雖此苦楚ハ大抵暫時ニモ去リ病者尚平時或ハ
 更ニ久シク湯中ニ在テ而モ惡ムベキヲ覺ユルヲナシ
 主ニ書載セル藥量ヲ以テ浴湯ヲ施ス一三日或ハ皮表
 稍灼クガ如キヲ覺ユルノ間之ヲ持重區病者若之ヲ覺
 工サレニ至レバ沃胃謨ヲ加増メ一錢半ニ至ル但沃胃

謨加里ノ量ハ沃胃謨溶解スルヲ度トシ鹽ハ唯病者ノ
 皮膚枯燥スルト甚シキキニ増スベシ第七日第八日ニ
 至リテ沃胃謨ヲ増メ二錢トシ沃胃謨加里ヲ三錢トシ
 第十日或ハ第十一日ニ至テ通例熱状ヲ發シ頭重ク身
 心不安煩渴シ。皮表感覺靈敏且眠ヲ得難シ。日中或夜間
 皮膚搔痒灼熱刺衝ヲ増シ既ニ猩紅色ノ疹ヲ發シ此疹
 屢出没シ第四日ニ至テ十分發生スルヲ通例トス大抵
 晨朝及ヒ浴湯後盛ク第十五日ニ至レハ最初發疹セ
 シ部已ニ白屑剥落シ第十七日遍身ニ及ブ是癩毒消除
 ノ徵ニメ則施治ノ結局ナリ但病人性質遲鈍肥満ノ者

及ヒ久シク嚙刺^{カサ}杖^{カサ}便^{カサ}傑^{カサ}兒^{カサ}名ノ飲水法ヲ用ヒシ人ハ上

ノ例ニアラズ第十七日ニ至リテ初テ大ニ發疹シ第
 二十一日ニ及シテ白屑始テ剥落シ第五湯或ハ第六湯
 ノ後既ニ両手暗黄色ニ變スルト確著ニシテ白屑剥落ス
 ルニアラサレハ其色消セサルナリ○没乙失速款屈斯
 氏劇症癩毒ヲ治スルニ上ノ浴湯法ヲ用ヒシ以來ハ嚙
 ニ内服ヲ專ニセシ時ニ比スレハ時日ヲ費スル其半ニ
 シテ足リヌト云フ

第三沃胃謨劑外用法骨腫及ヒ潰瘍ノ大ナル者鼻中瘡
 十^オ頸圍潰瘍息肉下疳泡等ハ沃胃謨内服ノ他外用セ

亦簡要ナリ宜ク純精沃胃謨及ヒ沃胃謨加里ノ濃溶液ヲ用フベシ患所溶液ヲ貼スベキノ面大ナルニ準シ益稀淡溶液ヲ用フベシ但藥液ノ濃淡ハ患所適宜ノ灼熱或ハ癢痒ヲ起スヲ度トハ序証癩毒ノ如キハ患所小ナルカ故ニ之ヲ綿撒絲ニ醃シ貼シ可ナリ此症没シ失速故屈斯氏ハ左法ヲ常用トス

乙方
精製沃胃謨^三 沃胃謨加里^六 蒸餾水^一
右溶化外用

其瘡所掌大ノ者ハ左方ヲ用フ

丙方

精製沃胃謨^八 沃胃謨加里^一 蒸餾水^七
右溶化外用

此溶液ヲ綿布ニ醃メ瘡所ニ貼シ其上ニ膏劑ヲ施シ一時毎ニ更換ス速ニ乾燥スル者ハ頻々更換スルニ宜シ鼻中瘡^{オサ}ノ深キ者ハ此液ニ温水少許ヲ加ヘテ之ヲ掬シ^{或ハ}小盞ニ盛リテ嗅引セシム此法モ亦一時毎ニ施スベシ口内咽喉及ヒ頸圍ノ潰瘍ハ半時毎ニ之ヲ口中ニ含マシメ或ハ含漱セシム温水ヲ加フルト要セズ

○息肉疔瘡後ニ發シ形状尖ル者ハ沃胃謨溶液ヲ綿

撒絲ニ醃シ貼スレハ即治ス蓋癰毒ヨリ来レル息肉腫
厚固ニメ形状大ニ雞冠ニ類似セル症ハ上ノ例ニアラ
ズ之ヲ治スルハ埴優篤沃胃謨軟膏ヲ要ス

(丁方)

埴優篤沃胃謨 一錢 至 單膏 半

右調勻外用

先硬膏ヲ攤へ中央ニ圓窓ヲ穿テ瘡所ニ貼定シテ以テ
周圍ヲ防キ其上ニ此軟膏ヲ貼スルヲ猶他ノ硬膏ヲ貼
スル法ノ如シ小ナル息肉ハ二三日ニメ治スルヲ恰モ
掃除スルカ如シ其大ナル者ハ數次軟膏ヲ貼スルヲ要

ス○頭髮ノ内ニ發スル所ノ癰毒瘡ハ頑固ナル者ナリ
遍身癰毒全治ノ後尚局處病トシテ久シク淹滯スル者
屢之アリ之ヲ治スルハ上ノ濃溶液ヲ點スルヲ日ニ數
回且隔日ニ埴優篤沃胃謨軟膏ヲ塗ルベシ○癰瘡名瘡
ハ通例内服藥ヲ以テ治スト雖亦上ノ溶液及ヒ毳布ヲ
施メ内藥ヲ佐クルヲ要スルヲ間アリ骨腫^{エキソ}炊衝
痛ヲ兼スル者ハ局處瀉血或ハ氷罨法ヲ施メ後沃胃謨
永軟膏ヲ用ス但初硬膏ノ如ク之ヲ貼定シ^{セル}或ハ蠟
紙^ニ瘡痂脱落ノ後^ニ軟膏ヲ貼スルガ故^ニ之ヲ塗擦ス
ベ用フ

第四飲食法嚴ニ断食スルハ没乙失速故屈斯ガ癰毒論

ト相反ス故ニ良性ニシテ消化シ易ク滋味ノ食餌ヲ用フ
 ルヲ好トス但其量モ亦能ク胃ニ堪フルヲ變トシ必胃
 ヲノ飽滿セシムルヲ勿シ食餌ノ性ヲ撰フテ更ニ簡要
 ナリ澱粉^{デンプン}ハ沃胃謨ヲ變化スルテ分離術ニ由テ
 明カナリ而シテ沃胃謨加里ハ之カ為ニ其性變ズルナキ
 一體外ノ試験ニ由テ世人知ル所ナリト雖然氏没乙失
 速款屈斯ノ實驗ニ據ルニ病人毎日沃胃謨加里一カ沃
 胃謨一カヲ服シテ穀粉製食餌ヲ用ヒシ者其服藥大抵
 糞屎ト共ニ泄下シ尿中ヲ檢査シ沃胃謨加里十五カヲ
 得タリ是ニ由テ總テ漿粉ヲ含メル食餌ヲ禁シ唯肉類

及ニ植物ヲ許スノ説ヲ立テリ之ヲ守レル病者ハ其糞
 屎中沃胃謨ヲ含ムヲナシ設令之アルモ甚輕微ナリ其
 効功モ亦大ニ異ナリ肉類ト植物トノミヲ餐セシ者ハ
 其病著シク治ス穀粉或ハ他ノ漿粉ヲ含メル物ヲ喫セ
 シ者ハ其癒ムルニ緩慢或ハ終ニ不治ノ者モ亦往々之
 ナリ没乙失速屈斯氏ハ左ノ食餌ヲ命ス朝饌ハ乳汁單
 果或ハ茶。歐爾拔斯屈謨花。菩提樹花。麗春花。泡劑等ヲ兼
 用シ空心ニ朝饌ヲ欲スルニ甚シキ者ハ犢肉羹汁及
 ニ雞卵或ハ哥喜乳^{ゴキルク}メルキ一盞ヲ用ヒ午饌ハ刺護優
 篤^{ウツ}煮汁若クハ犢肉汁ニ雞卵ヲ加フ夏月ハ菜蔬煮汁

ニ宜シ而後擯肉或ハ油煤肉ニ菜蔬或ハ其好ミニ應ノ
 蘿蔔若クハ果實ヲ加フルモ可ナリ病人蒸餅ノ嚴禁ニ
 堪ヘサル者ハ服藥後一時半ヲ過キテ乾餅一塊ヲ以テ
 肉ニ添ヘテ喫セシ止飲液ハ清水ニ宜シ或ハ食後少頃
 アリテ後醇酒少許ヲ飲ムモ亦可ナリ晚餐ハ茶乳汁肉
 羹汁ヲ用ヒ飢ルヲ甚シキ者ハ油煤肉一塊ニ果實ヲ加
 ヘ喫セシム

第五攝生法病者常ニ適宜温暖ノ所ニ居ルヲ要トスル
 カ故ニ室外ニ出ルヲ戒ス但夏月無風ノ日ハ昼一二時
 間外氣ニ觸ルモ可ナリ衣服ハ寒暖ニ準ズク又総

テ七情ノ感動ヲ避ルハ論ヲ待タス
 沃胃謨ヲ用フルヲ法ノ如クナレハ瘰癧毒ヲ治スル
 ノミナラス汞毒症并ニ癩毒ニ汞毒依倭篤腺病等ヲ合
 併セル變性症ニ一種ノ奇藥タリ之ヲ適宜ニ連服シ隨
 テ分離疹キリチセエキヲ發スル者ハ必本病再發ノ恐
 アルヲナシ三週乃至四週内ニ治ヲ終フヘシ治ヲ終ル
 后病者容貌旺盛シ強壯ナルヲ治ヲ受クルノ如シ後必
 調理或ハ消毒藥ヲ用フルヲ要セズ

○第三千五十二方壹那爾秘

沃胃謨 沃胃謨加里 各半刀 石鹼硬膏 錢二

右丁寧調勻攤革貼

○主治癰毒性或ハ依倨篤性贅骨及ヒ腺腫等ニ宜シ

○第三千五十三方

復方甘草散半勺 精製硫黃一錢至二錢

右調勻每服半食匙乃至一食匙日三服

○主治癰毒症誤治ニ由テ全癒セサル者ニ宜シ之ニ兼テ

隔日ニ微温硫黃浴一回ノ浴湯ニ肝色硫黃ヲ施シ十四

日ヲ過クルハ毎三日一浴ニメ可ナリ但爾後頑固皮病

アル者ハ硝酸浴硝酸一勺乃至二勺加フニ宜シ別魯列印地名ノ病

院ニ於テ此治法ヲ持重スル一三四週ニ至ル久シキモ

六週ニ及ヒテ尚癒エサル者ハ瀉利鹽ノ治三千ニ轉ズ

ト云フ

○第三千五十四方秘越秩鐮爾

薩爾沙巴栗刺根三 滾湯三七浸漬六時後煮耗瀝取

液ニ此日服

○主治諸癰毒及ヒ汞毒ニ宜シ

○第三千五十五方祇歌蘭度

薩爾沙巴栗刺根 山午房根 濱瞿麥根 甘草 癰

瘡木 蜀羊泉莖各二

右細剉合取一勺乃至一勺半水二匕煮日服

主治汞劑ヲ以テ癩毒ヲ治スルニ此方良佐タリ

○第三千五十六方刺倔涅鑊

薩爾沙巴栗刺根三 瑞香皮二 井水四匕煮熟投後

呆

胡荽子 甘草各一

右瀝過取液三十二勺每服一勺日四服

主治經久癩毒骨疾ヲ兼ヌル症及ヒ頑癬等ニ宜シ

○第三千五十七方穀優蘭篤

瑞香皮半 薩沙弗刺斯一 薩爾沙巴栗刺根二

六蜀羊泉莖三

右水煎供飲料

主治經久癩毒汞毒及ヒ骨痛ヲ帶フル者之ニ宜シ又惡液性皮膚病及ヒ粘液流出症ニ宜シ

第三千五十八方 悉篤滿煎

甲方

薩爾沙巴栗刺根十二 加井水四十八匕二 內錫

器飽熟十二時

礬糖附一

甘汞半 朱一

後三呆盛囊與煎藥併煮耗至十六匕八 綿投後呆

古旃那葉

細剉

過泥子

苗香

各搗碎

右下火投甘草一弓半冷定瀝過取液貯名峻方煎汁

乙方

峻方餘滓 薩爾沙巴栗刺根搗碎 加井水四十八匕

飽熟十二時後煮耗至十六匕投後呆

枸櫞皮 桂皮 益智各搗碎

右下火投甘草六錢冷定瀝過名緩方煎汁

主治經久癥毒永毒經久僂麻質斯及口依倔篤頑滯皮病

等三好シ○此煎液ヲ服スルノ前日左ノ丸ヲ用フ

主藥丙方

甘巴豆丸料未詳

甘永廿四

葯刺巴脂半錢

右調勻為八十九衣桂末頓服九粒乃至十二粒○次日未

蓐ヲ出テサルノ前峻方半瓜爾篤此ヲ温服シ發汗一過

ノ拭ヒ去ルベシ午後緩方一瓜爾篤此ヲ用ヒ臨臥ニ又

峻方半瓜爾篤此ヲ飲服ス但此二服ハ冷服ニ宜シ此ノ

如ク連用スル一四日ニノ次日治瘧ノ第六日再前ノ丸ヲ服シ

又前法ニ仍テ煎液ヲ用フル一四日第十一日ニ再九劑

ヲ用ヒ施治ノ間ハ病者唯粘滑美汁炙肉一小片白蒸餅

少許ヲ用フル一三日ニ三次午前ハ蓐ヲ出ル一ナク午後

ハ室内ヲ歩スルヲ許ス是緩方ヲノ能ク利尿ノ効ヲ達

セシムルカ為ナリ藥用終リテ後尚六日乃至八日間口

ヲ戒シ病室ヲ出ツル勿ラシ止一田治ヲ終ヘテ尚瘡
ハサルキ又半劑或ハ其症ニ準メ一劑ヲ與フ

○第三千五十九方 袂私入煎私入 魚膠一錢 亞刺昆垂錢 護二錢

薩爾沙巴栗刺根三 生安質沒尼四 盛緊 札盛

右井水六匕煮耗至三匕濾過取其半分為三服一日服盡

主治頑癬及七經久癩毒三宜三二服八合煎三宜七匕

○第三千六十方 朴材煎八 生安質沒尼各半 胡桃各半

薩爾沙巴栗刺根一 土茯苓一 生安質沒尼各半 胡桃各半

去滓再煮減半取上澄

已上五味細剉合加井水二綿首爾蓋閉煮四分時

右早旦空心及晚際服一匕

○第三千六十一方 栗屈的兒名改製朴材煎八 胡桃錢 硫黃安

薩爾沙巴栗刺根一 瘡瘡木錢 胡桃殼錢 硫黃安

質沒尼天造 井水三匕煮耗至二匕加後杲

桂水單 橙皮舍利別 各一

右調勻一日服盡

○第三千六十二方 穢歌蘭度改製朴材煎八 生安質沒尼末

薩爾沙巴栗刺根一 蜀羊泉莖 生安質沒尼末

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

井水二匕煮耗至一匕半加旃那葉半錢乃至一錢瀝
過取液加後杲

紫堇舍利別子

右一日服盡

主治右三方經久癰毒及口疳毒症二宜

○第三千六十三方

複方薩爾沙巴栗刺煎

薩爾沙巴栗刺根

過列那里亞根

暴爾名木類煎

各二錢 井水適宜煮耗至一匕加後味

旃那錢一

右瀝過日服

主治宿根全身癰毒及口疳毒鼻中及口咽喉潰瘍骨疾皮
病等二宜シ○便列印地名ノ病院ニ於テ之ヲ悉篤滿煎ニ
代用ス効力相同シ晨朝蓐中ニ在テ半劑ヲ温服シ發汗
一過ノ之ヲ拭ヒ去リ午後又半劑ヲ冷服シ室中ヲ歩ス
ルニ宜シ尋テ大抵瀉二三行ヲ得ルナリ通例此劑ヲ用
フルノ前瀉利鹽溶液ヲ飲マシムルヲ二三回

○第三千六十四方秘。麻利

薩爾沙巴栗刺根四 常水十二匕煮熟投甘草半子煮

耗至八匕放冷瀝過

右分為十六塊每朝空心飲服但每八分時用二塊

主治承劑ヲ用ヒス經久癩毒ヲ治スルニ宜シ○此劑ヲ用フルルハ室内ヲ歩シ或ハ午後屋外ニ出テ產業ヲ營ムモ可ナリ最後ノ一撮ヲ服シ後半時ヲ過テ平常ノ午饌ノ喫セシメ病人飲酒ニ慣ル者ハ一二盞ヲ許スモ可ナリ○此治法皮表ノ運營ヲ催進シ殊ニ能ク利尿シ癩毒性發疹及ヒ骨疾ニ最稱贊ス依ホ昆埵鬼家ノ如キ胃腸虛弱ノ者ハ此方ニ堪ヘザルカ故ニ之ヲ忌ム○暴

第三十六十五方

刺歇屈的優爾名癩毒舍利別

ヲ奏スト云フ

薩爾沙巴栗刺根九

土茯苓

癩瘡木

薩沙弗刺私

各六

赤幾那三

已上五果細剉加常水百四十勺浸漬二十四時煮耗

至三分之一乘温猛力絞瀝取滓再加水百四十勺煮

至三分之一瀝過取液與前液合加砂糖舍利別二比

并煎熬為舍利別之稠減至三分之二瀝過再煮沸移繆爾林

取暴爾來尼私花附一勺半及過泥子ハ刃囊盛浸

漬蓋閉至冷以木棍攪和內玻璃壘密閉貯之

主治經久癩毒ヲ治ス第四日大麥水

第一豫備法第一日及第二日苦味ハ大麥水撒刺那失

越幾斯ヲカフ二三麻篤ノ容量ヲ飲服セシム 第三日 甘汞

藥刺巴或ハ瀉利鹽ノ緩瀉藥ヲ用フ 第四日 大麥水ヲ與

ヘ多血家ハ瀉血シ胃腸汚物アル者ハ吐劑ヲ與フ○豫

備法ヲ施スノ間ハ飲食節シ植物ノ食餌ヲ用ヒ而シテ

汗飲液哥喜乳汁等ヲ禁ス

第二本治法 第五日 晨朝夕牌ニ方リテ上ノ舍利別ヲ取

リ男子ハ六匙婦人ハ四匙乃至五匙ヲ用ヒテ葶中ニ卧

サシ辰牌後四分時毎ニ薩兒沙巴栗刺ノ淡煎薩兒沙巴栗刺

二弓ヲ煎ノ液四九弓三小ヲ用ヒテ以テ煎液二十八瓜

爾篤容量ヲ取ルヲ服盡ナルニ至ル午牌油牒肉一小片自蒸餅

五六兩ヲ喫セシム但此時薩兒沙巴栗刺淡煎ノ飲液ヲ

用フルトナシ申牌ニ至リ再舍利別六食匙ヲ用ヒ又酉

牌ヨリ戌牌後四分時ヲ過クル迄四分時毎ニ薩兒沙巴

栗刺煎九弓ヲ與ヒ戌牌半ニ及テ食餌ヲ與フルト午時

ノ如シ第六日ヨリ第十四日至毎日療法第五日ノ如シ

第十五日ヨリ第十六日至食餐ヲ減シ唯薩兒沙巴栗刺

煎ヲ用フルト第十七日瀉藥ヲ與ヒ第十八日大麥煎

ヲ用ヒ第十九日ヨリ第二十四日至毎日第五日ノ如シ

○治法此ニ止マル然レ後尚十四日間薩兒沙巴栗刺淡

煎ヲ服シ口ヲ戒メ減食セシム○施治ノ間ハ注意ノ蒸

發氣ヲ催進シ唯温暖晴朗ノ日ハ外氣ニ觸レシムベシ
發汗過多ナルキハ薩兒沙巴栗刺煎ヲ減ス瀉甚シキ者
ハ舍利別ノ量ヲ減ス便秘症ハ晚餐前四分時ニ方リ灌
腸ヲ施ス熱ヲ帶フル者ハ肉ニ代ヘテ穀粉製食餌無ヲ
用フ○此法ヲ施セハ大抵平癒スルナリ○之ヲ悉篤滿煎
ニ比スレバ病者ノ體ヲ戕賊スルト少シトス

○第三千六十六方 優弗賊天

癩瘡木地

右井水ハ地浸漬一夜翌日上慢火煮至四比

主治 經久後証癩毒汞劑効ナク既ニ汞毒証ヲ發セル者

或ハ癩瘡及ヒ失苟兒陪苦ヲ合併セル症之ニ宜シ○早
晚蓐中ニ在テ此煎液半比ヲ温服シ其中間ハ緩煎本方
滓ヲ取リ水ハ比ヲ加テ以テ用フ○天氏曾テ親自
煎シ過ス之ヲ緩煎トス
病ノリシキハ癩瘡木五比ヲ用ヒ盡セリ他ノ病者ハ八
比乃至十六比ヲ用ヒシト云フ

○第三千六十七方

癩瘡木二 薩沙弗刺私 撒兒沙巴栗刺 蘆根各一

甘草 蜀羊泉各半 茴香二錢

右細剉調勻取二食匙加水二比半煮耗至二比一日服盡

○第三千六十八方 私越秘錫藥 黑腐蝕水

甘汞錢一 石灰水勺四
右調和外用

○第三千六十九方同上 黃腐蝕水

升汞錢十五 加石灰水一比溶解

右調勻外用

○第三千七十方律私篤 律私篤名人 黑腐蝕水

甘汞錢半 阿芙蓉錢二 石灰水勺二

右調勻醃綿撒絲貼患所日二三

○第三千七十一方遠突土 升汞錢二 加蒸餾水二勺融解加後味

阿芙蓉丁錢半 單方

右調勻外用

○第三千七十二方

甘汞錢一 阿芙蓉末錢半 家猪脂勺一

右調勻為軟膏外用

主治三千六十八方至三千七十二方 下疳宜シ○藥液ヲ綿撒絲ニ醃

シ患所ニ貼スル一日ニ數次○軟膏ヲ用フルモ亦之ニ

同シ

○第三千七十三方

赤降汞錢十五 朴麻篤膏附二

右調勻外用

主治 知覺鈍性下疳周緣高クノ臍胝状ヲナシ底面不潔

ノ者ニ用フ○此症赤降汞末ヲ撒布スルモ亦可ナリ

○第三千七十四分〔預結〕

鹽酸亜鉛_二 蒸餾水一ヲ溶解加後呆

鹽酸_一

右調勻醃綿撒絲貼患所日三四次

主治 下疳及ヒ其他汚穢ノ潰瘍ニ宜シ又預結氏ハ諸般

ノ癰毒_{千五百九十五方及ヒ三千}及ヒ慢性皮病。腺病。癌

腫等ニ鹽酸亜鉛ヲ内服スルヲ稱賛ス但毎常慎重ノニ

十今_一。十六今_一。十二今_一ヲ取り日ニ三服乃
至四服ス

○第三千七十五方〔律私篤〕

甘汞_{錢半} 阿芙蓉末_二 加石灰水三ヲ乃至四ヲ研和

右每用振盪射注龜頭及包被間

主治 包莖癰毒ニ用フ

○第三千七十六方〔遠突土〕

過兒托軟膏_附 水銀軟膏_{各半}

右調勻塗内外股日二次

○第三千七十七方〔同上〕

失鳩答硬膏 附 水銀硬膏 若癸論膏 各半

右調勻攤革貼患所

主治右二方經久便毒ニ宜シ○髒弗利爾人及ヒ私名

ノ説ニ據ルニ便毒ヲ療スルハ極メテ醫治ヲ加ルヲ

要セス唯自然良能ノ妙機ヲ妨ケサルヲ以テ旨トシ化

膿ヲ欲スルモ亦之ヲ催進スルハ適當ナラズ便毒ハ最

初之ヲ自然ニ委シ而メ焮衝増進シ結膿ノ前兆確著ナ

ルニ至リテ始メテ薤謨若癸論膏二片乃至四片ヲ貼ス

疼痛甚シキ者ハ温暖琶布ニ宜シ結膿緩慢ナレハ琶布

ニ葱綠石鹼若クハ芥子ヲ加フ膿化破潰自然ノ後尚暫

ク温暖琶布ヲ貼ノ縛帶ス但周圍ノ硬結減スレハ薤謨

若癸論膏ノ中央ニ孔ヲ穿ナテ之ヲ貼シ及ヒ蠟ヲ綿撒

絲ニ塗リテ瘡口ニ貼スベシ○諸般ノ小技ヲ施スハ益

ナク却テ害アル者多シ方今壓定帶ヲ施ノ便毒ヲ消散

スルヲ稱譽スト雖亦殊ニ害アリトス

○第三千七十八方 秘製

薤謨若癸論膏 附 一 芫菁硬膏 半

右調勻

主治鈍性便毒ニ用ヒテ焮衝及ヒ化膿ヲ振起スルニ宜

シ三十五十六方 秘製

○第三千七十九方栗格爾突

失鳩答硬膏大掌

吐酒石廿四

右為硬膏

主治鈍性便毒ニ貼シ衝動膏トスルニ宜シ

○第三千八十方推結

鹽酸亞鉛一錢

海鹽精半錢

薔薇軟膏一

右調勻為軟膏塗擦

主治便毒ニ宜シ

○第三千八十一方佛蘭葛爾突

蒸餅三

白芥子末二

黑石鹼一

右調勻為軟膏塗擦

右加井水及燒酒各適宜調和攤革貼

○第三千八十二方湯兒栗屈的兒

黑石鹼三

熱湯二

上文火煮少頃加後呆

葱

埋熟灰煨
細剉者

白芥子末各三

右再上微火煮少頃屢攪和作琶布

主治鈍性便毒膿化ヲ促スニ宜シ結倫突兒人ノ琶布ヲ

製スル法左ノ如シ葱ヲ以テ灰ニ埋ミ煨キテ細剉スル

者及ヒ芥子末各二兩二黑石鹼半兩ニ水ヲ加ヘテ琶布ト

シ熱湯ヲ以テ琶布
ニ作ル更ニ妙厚一度一乙謨二作リテ貼スベシ其温

ハ病者ノ堪フルヲ度トス又尋常温暖琶布ヲ以テ其上

ニ貼シ數回更換ノ以テ前ノ琶布ヲ温保ス前ノ琶布ヲ更フルハ一日一回トシ夜間ハ琶布ニ代ヘテ礪砂硬膏〔附〕ヲ貼スベシ

○第三千八十三方〔譯忽倫〕

琶布劑料ヲニ加井水適宜煮作琶布加後味

葱煨者 黑芥子末各一

右温暖貼定

〔主治〕鈍性便毒ノ釀膿ヲ促スニ好シ○但此琶布ヲ合藥

局ニ命メ製スルハ不佳ナリ

○第三千八十四方〔律松薦〕

升汞六分至十二分 蒸餾水適宜溶化加後呆

失鳩答越幾斯 加密列越幾斯各二錢 阿芙蓉丁幾一錢

半玫瑰蜜一

右調勻為塗液

〔主治〕頸圍ノ癩毒潰瘍其性急ニ廣大ヲ成シ其部竟ニ非常毀敗ニ及フ者之ニ宜シ○或ハ格魯林加爾幾ノ溶液ヲ以テ含漱劑トス

○第三千八十五方

薩昆那葉末二錢 蕃薇軟膏〔附〕六錢

右調勻塗綿撒絲每日貼之

主治癰毒贅肉ニ奇効アリ

○第三千八十六方弗突便倭倭拂連

升汞錢一 龍腦錢半 再縮燒酒一弓溶化

右調勻黑玻璃壘收貯點息肉日二回

主治緩慢贅肉ニ宜シ○大抵此方奇効アリト雖余輩

硝酸銀ヲ以テ優レリトス便列印地ノ病院ニ於テハ腐

藥ヲ用ヒテ后護烏刺兒度水ヲ重布ニ蘸メ贅肉ニ貼シ

結痂剥落スレハ又腐蝕藥ヲ施ス此ノ如ク數回ニテ贅

肉消滅スルニ至ル○但先彼ノ部ヲ療シ後一二日ヲ經

テ此部ヲ治シ一齊ニ其焮衝ヲメ甚瀰蔓セシムルヲ勿

○急性贅肉ハ上ノ溶液絶ニテ効アルヲナシ宜シク

其熟スルヲ俟テ而後腐蝕藥ヲ施スベシ其肉頭白色ヲ

呈スルヲ以テ熟スルノ徴トス剪刀ヲ以テ其肉ヲ截除

シ後硝酸銀ヲ以テ療スルハ最簡易法タリ小贅肉或ハ

肉脚廣キ者ハ最初ヨリ腐蝕藥ヲ用フルニ宜シ

○第三千八十七方浸侵私想地私驚爾驚列鬼

亞鉛華或亞硝酸毘私繆篤半 甘汞一 家猪脂錢一

右調勻作軟膏貼日一二回動ニ宜シ

主治贅肉ニ宜シ之ヲ用フレバ通例三日ニ癒ユ

○第三千八十八方遠突土芙蓉

水銀硬膏一錢 精製阿芙蓉一錢

右調和攤華貼

〔主治〕便毒及七其他ノ癰毒腫ニ宜シ

○第三千八十九方同上 稀燐酸二錢 沙列布淡煎六錢 覆盆子舍利別半錢至一錢

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕腐骨疽癰毒ニ因ル者之ニ宜シ八百二十五方及八百六十八方ヲ參照ス

○第三千九十方同上 華溫滿溶汞散三錢 喇咕石末半錢 上好砂糖三錢

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十一方同上 甘汞三錢 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十二方同上 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十三方同上 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十四方同上 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十五方同上 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

○第三千九十六方同上 薤護散附出

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕初生兒ノ癰毒ニ宜シ

主治塗擦胃與臍之間

○第三千九十二方〔辨屈私〕

華涅滿溶承散一八

甘扁桃油錢一

亞刺昆亞蘆蓼木

錢半 橙花水

櫻實水錢各六

扁桃乳舍利別詳 宜

右搗和作舐劑每一時半服一茶匙

主治初生兒ノ癩毒ニ宜シ

○第三千九十三方〔遠突土〕

清淨水銀錢六

羊脂弓半

入石臼研和至不見點加後杲

葛加阿油弓一

右四肢ノ内側沿吸收管塗擦

主治初生兒ノ癩毒ニ宜シ尋常ノ灰白水銀膏ハ用フル

ニ堪ヘス

遠西方彙卷之三十
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、

遠西方彙卷之三十

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

第十十の... 三十一... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十...

結節腫の癌腫 シキルリス。エト。カルシノマ。羅ク。タ。...

本性ハ結節腫及ヒ癌腫ハ 癌腫毒ニ傳染ノ發ス 皆全身ノ...

病ヨリ一毒ヲ生スルナリ故ニ全身病ヲ治スルヲ第一義...

ト此ニ屬スル藥劑ノ中砒石ヲ以テ第一品トス慎重シ
 テ之ヲ少量ニ久服スルニ宜シ福烏列爾名砒石溶液 廿六
 方三滴乃至五滴日ニ二三服或ハ亞細亞九或ハ三
 千九十四方ヨリ三千九十六方至用フベシ其功用砒石ニ
 近キ者ハ莨菪トス或ハ根毎日半分 乃或ハ越幾斯ヲ以テ
 老利兒結爾斯水ニ溶解シ用フ千四百 八青酸ハ砒石及ヒ
 莨菪ノ効ヲ佐クルニ最良ナリ沃胃謨至三千九十九方及ヒ
 鵬胡菜ノ如キ沃胃謨ヲ含蓄セル海草三千四百 八結節
 腫ノ萌症ニ用ヒテ殊効アリ金三千五百 八腺病及ヒ
 癰毒ヲ合併セル症ニ稱賛セリ肝油六百五十五方 八結節

腫性ノ硬結腫ニ稱用ス悉篤滿煎三千五百 方ヲ用ヒ断食法ヲ

行フ亦結節腫ノ萌症ニ効アリ燐酸銻格碌屈私末兒秩斯

三千百九方至及ヒ沃胃謨三千二百 方金盞花三千百十四方

失鳩答三千百十五方至 加爾剝亞扭麻里三千百十八方及

ヒ明礬二千八百 方ハ最鎮痛ノ驗アリ腫所ニ於テ毎々錕鉞ヲ

要スル者屢之アリ○第二義ハ刀若クハ腐藥ヲ以テ消滅

スルニアリ三千百廿一方至 但此法ハ獨截断ヲ施スベカ

ラサルノ部ニ行フベキハ論ヲ待タス又外部ノ結節腫其

根硬固ノ部ニ發セル者ハ縛帶ヲ施メ以テ腫中血管ノ開
 タク抑壓シ且其腫ノ軟化ヲ防クニ宜シ○第三義ハ姑息

法是ナリ癌腫ヲ治スルニ多ク之ヲ簡要トス即麻酔藥千

百廿六方至三千百廿三方ヲ内外ヨリ用ヒテ疼痛ヲ鎮靜シ白參卷法

ヲ行ヒ或ハ炭末三千四百格呂林加爾基溶液十三方等

ヲ用ヒテ惡臭ヲ去リ且毒膿ノ近部ニ侵襲スルヲ妨クヲ

要トス強壯滋養ノ食餌ヲ以テ生カヲ補フベシ各器ノ癌

腫ヲ治スルノ方法多シト雖此小冊子枚舉ニ違アラス宜

ク余ガ著セルヲスセシビエフ。アル。アウセレ。カラシクヘイ

テ書ノ癌腫條ヲ參照スベシ此書和蘭ニ於テ始テ翻譯梓行セリ故ニ此

編尾ニ於テ獨胃癌腫ノ治法一二ヲ掲クルノミ

○第三千九十四方

白砒一 蒸餾水一匕溶化

○右初毎服半食匙後一食匙乳汁和服

主治 癌腫ヲ生スルノ素因ヲ除クニ宜シ ○靈敏ノ人ニ

ハ毎服阿芙蓉液五滴乃至十滴ヲ加フ五百十々々

○第三千九十五方

白砒一 黑椒一 白糖一 渴兒抱末二 蒸餾水半

右調勻為六十九早晚服二丸

主治 癌腫ノ素因ヲ治ス

○第三千九十六方律秘寫

福烏列爾砒石溶液一 老利兒結爾斯水三

右調勻每服十六滴乃至二十滴日四服

○主治癌腫二宜

○第三千九十七方 亞細亞丸

白砒半錢 黑椒一錢 石臼研磨為細末加後呆

亞刺昆亞蘊謨漿半錢

右每丸二匹作八十粒衣白桂末早晚服一九

○主治癌腫二宜シ○此他ノ二方ハ二千五百十七方及

二千五百十八方ニ揭示セリ

○第三千九十八方 老利兒結爾斯水

老利兒結爾斯水一合

右每服三十滴用三四服百一

○主治總テ癌腫二好阿西安姪爾氏 殊子宮癌腫

稱用百一

○第三千九十九方

精製沃胃謨沃胃謨加里 蒸餾水半

右晨朝及午後取六滴砂糖水一盞和服

○主治結節腫頑癬等ニ宜シ○一週毎ニ每服二滴ヲ加ヘ

以テ三十滴ニ至六歲以下ノ兒ハ二滴乃至五滴ヲ服

○第七歲ヨリ十四歲至五滴乃至十六滴又服ス日服

○第三千百方

○精製沃胃謨四分沃胃謨加里一分蒸餾水八分

右調勻分二三服六日服盡漸加增十四日後須一日服盡

本量三十餘天至山空處效死八日二歲已至五歲已服

○第三千百一方同上

沃胃謨加里二分蒸餾水八分

右調勻服第三千百方之後四週乃至六週間分服此方每

日二三回

○第三千百二方

沃胃謨加里四分沃胃謨加里二分蒸餾水八分

右調勻頑固症服第三千百一方數週之後分服此方每日

二三回

主治三千百方ヨリ三千百二方至結節腫及頑固腺病

等ニ宜シ

○第三千百三方私屈品埵兒

鵬胡菜四錢六錢乃至八錢

右熱湯八寸浸漬五時乃至七時瀘過取液每服一盞日三

服食前一時半服之

主治結節腫及口瘡腫ニ宜シ

○第三千百四方同上

遠志一錢土木香一錢鵬胡菜半

右細劉調勻分六包水浸六時後煮五密托篤服之

○主治結節腫及癰腫ニ宜シ○晨朝卯牌空心ニ一服午

後未牌ニ一服又夜亥牌ニ一服每服三勺凡ニトハ四週

連用ノ後鵝胡菜ヲ増メ六錢ニ至止此ノ如ク累月持重

シ兼テ格碌屈私末兒秩斯煤焙及ヒ金蓋花越幾斯ヲ丸

トシ三十百用フ且隔日全身浴利篤亞斯ハヲ施スヘシ

但淡薄ノ食餌ヲ命シ大便ヲ促スニ宜シ

○第三千百五方律私篤

鹽酸金鹽一白糖二

右調勻分十二服日二服

主治潰爛癰腫ニ宜シ○鹽酸金鹽ノ癰腫ヲ治スルノ効

實ニ他藥ニ優レル者ヲ見ズト雖疼痛ヲ緩和シ且滲出

液ノ惡臭ヲ減スルハ甚好シトス

○第三千百六方遠突土

鹽酸金鹽六失鳩答越幾斯各一

右調勻加亞刺昆亞蕪膜漿適宜一為一丸衣石松粉朝

暮服一丸隔日增一丸

○主治腺ノ硬結腫及ヒ結節腫等ニ宜シ

○第三千百七方同上

鹽酸金鹽一蕃薇軟膏一

右丁寧調和作軟膏塗擦患處日數回

○主治結節腫及_レ其他諸硬結腫ニ宜シ千九百廿二方ヲ参照スベシ

○第三千八百八方

鹽酸金鹽一錢 白糖一錢

右調勻為散分十二包每日取一包塗舌上齒齦及兩頰內

面或唇

○主治諸瘰腫殊ニ子宮癌腫及_レ癰毒ニ宜シ金鹽ノ量漸

ク加ヘテ毎用半一或八二一ニ至ル

○第三千百九方列聖傳

格碌屈斯末兒秩斯 金盞花越樂斯 金盞花及葉末

○各一錢

右調和加亞刺昆亞邁謨漿適宜為丸十九衣粉末每服五

丸乃至八九日三服

○第三千百十方律私篤

格碌屈私末兒秩斯四 府利油糖半

右調勻為散分五服日二三服

主治右二方總_レ結節腫及_レ瘰腫并宜及_レ子宮癌腫

殊効_レ子_レ瘰_レ腫_レ及_レ癰_レ毒_レ○四_レ應_レ聖_レ傳_レ○或_レ欲_レ氣_レ風_レ休

○第三千百十一方衣石粉粉每服五六九日三服

格碌屈私末兒秩斯錢 煤焙末 金盞花越樂斯各三錢

○各一錢

○各一錢

○各一錢

○各一錢

右調勻為四百八十九丸粉末晨朝辰牌至夜亥牌每二時服六丸百十日其效如神

主治結節腫及七瘰癧二宜之○四週連服ノ后格碌屈私末兒秩斯ヲ加増之三錢ト之之兼五七八浸劑百

○第三千百十二方(東抄)

沃胃謨錢三錢至三錢蒸餾水九錢橙皮丁幾一錢

右調勻為飲劑頓服日三次

至治腺病結節腫瘰癧癰毒黃胖二宜之此方餘表每服五

○第三千百十三方(越私的林僞)

金盞花三錢井水適宜煮瀝過取液五勺加後味

橙皮舍利別半

右調勻每服二食匙日三服

主治癰腫殊ニ皮表ニ發スル者之ニ宜シ

○第三千百十四方(律私篤)

(甲方)

金盞花越幾斯 失鳩答越幾斯 格碌屈私末兒秩斯

各二錢 金盞花及葉末一錢

右調勻二勺為一九衣石松粉每服五六九日三服

主治破潰セル瘰癧腫ニ宜シ○之ニ兼テ左ノ軟膏ヲ外用

(乙方)

金盞花越幾斯 加密列越幾斯 失鳩答越幾斯各二錢

老利兒結爾斯水一 阿芙蓉丁幾一錢

右調和醮綿撒絲貼瘡口

○第三千百十五方嚙麻

失鳩答越幾斯二錢 甘汞半錢

右調勻一一為一丸衣石松粉晨夕服一丸漸加增

主治癩腫二宜シ

○第三千百十六方覺倫私的印

(甲方)

失鳩答越幾斯 薤謨安沒尼亞幾各一錢

白石鹼二錢 金硫黃半錢 大黃丁幾適宜

右二一為一丸衣石松粉晨夕服八丸

主治乳房結節腫打撲二因ル者此丸ヲ用ヒテ六週内ニ

治セリ漸ク服量ヲ加増シ第八日二十粒ニ至レリ之ヲ

持重スル一十四日ノ後疼痛去リテ腫モ亦動クニ至レ

爾後左ノ丸ヲ用ヒテ功ヲ収メ一三服後至一十日

(乙方)

失鳩答越幾斯 失鳩答葉末 瘡瘡木脂各一錢

蘊謨安沒尼亞藥各二錢 藥刺巴脂半錢 金硫黃一錢 亞

刺昆亞蘊謨漿宜通

右二以為一九衣石松粉每服八九日三服漸加至十九或

十二九餘十四日 對藥下 亦下 亦下 亦下

○第三千百十七方律私黨 藥八日二十餘至 一九

失鳩答葉末錢二 失鳩答越幾斯宜通 用ノ 六服 內

右二以為一九衣粉末每日服一九漸加至十九

主治結節腫腺病ヲ合併セリ症安質沒尼劑ト配用スベ

シ失鳩答越幾斯 藥下 亦下 亦下 亦下

○第三千百十八方越心屑

加爾剝亞扭麻里二以至 甘草半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹日二三服

主治乳癌及子宮癌ニ宜シ○癌腫ノ初起ハ獸炭鴻益

ア申下 亦下 亦下 亦下

○第三千百十九方麻健對

精製加爾剝亞扭麻里半 確砂末一 失鳩答越幾斯

以二 甘草越幾斯宜通 又下 亦下 亦下

右為暴律私衣伊里私弗魯連底那末分十二服日三服

主治攝護腺及尿道ノ結節腫ニ宜シ至 六以

○第三千百二十方穢私的爾

○明礬錢一 玫瑰昆設兒弗宜適

右為三十六丸衣桂末晨夕服二丸漸加至六丸

〔主治〕子宮頸ノ癰腫ニ宜シ○之ニ兼テ後ニ揭示スル所

ノ明礬水射注法世六十方ヲ施スベシ○又明礬浴ヲ稱用

ス每浴明礬ノ量ニ五ヨリ五至ル

○第三千百二十一 方 格私墨名砥石散

白砥刀二 朱砂錢二 血竭十 靴底霜八

右為細末収小玻璃壺号格私墨散供外敷

〔主治〕面部癰腫ニ最好○此散一分又取水少許ヲ加ヘ捏

テ泥トナシ筆ヲ以テ瘡上ニ塗ル厚刀背ノ如クスベ

○或ハ亞刺昆亞蘊護漿ヲ加テ泥トナスモ亦可ナリ

○第三千百二十二 方 祇密松度名 拔爾撒謨鎮瘻膏

〔甲方〕 煎黃華各一 蒸餾醋 藥酒醋膏各一

○蜜糖刀一 失鳩答越樂斯 拔爾撒謨字露各一 舍電

阿芙蓉液刀半 蠟膏刀一

右調勻作軟膏

〔乙方〕 祇密松度複方砥石膏各一

〔甲方〕 格私墨砥石散各一

右調勻為軟膏

〔主治〕祇密松度氏治法 律私萬氏之ハ効力更ニ緩慢ニ

破潰瘡腫、緩症ヲ治スルニ最好ト云此複方砒石軟膏、綿撒絲ニ塗リテ以テ瘡上ヲ掩フ但瘡縁外ニ餘マ
 ス一ニ列印、以テ翌日其綿撒絲ヲ去リテ結痂及ヒ腐肉
 ヲ除キ又前ノ如ク縛帶ス此ノ如ク連施スル下五日乃
 至八日ニ善ク其結痂ヲ去リ輕々格私墨散二十方
 外敷シ後瘡ヲ洗淨シ單ニ甲方ヲ塗リテ縛帶ス

○第三千百二十三方 暹爾涅滿下 膏各一 白砒各一 硫黃華各一 蒸餾醋 蜜陀醋膏各一 舍雷

右調勻薄攤綿布貼瘡上各一 林煎藥膏貼瘡上各一

主治破潰瘡腫、腐藥各一 下ス各一 下ス各一 下ス各一

○第三千百二十四方 配藥阿印

鹽酸亞鉛一分 漿粉五分、四分、三分 井水適宜、七十五滴、六十滴、四十五

○滴、十滴、二十滴、三十滴、四十滴、五十滴

右供腐藥

主治瘡腫、豕肉腫、纖維腫、軟骨腫ニ宜シ○梓ヲ以テ之ヲ
 半列印乃至四列印ノ厚ニ作シ此布ヲ貼スレハ十二
 時乃至四十八時内ニ結痂ス而シテ四日ヨリ六日至ニ剥
 落ス○此腐藥ハ劇痛ヲ發シ且其能力モ亦深ク通徹ス

○或ハ鹽酸亞鉛ヲ乾シ瘡面ニ撒布スレハ厚一列印亦

可ナリ百二十五方

○第三千二百二十五方同上

鹽酸亞鉛一分 安質沒一分 扭酪二分 漿粉五分 井水四分

宜適

右作泥供腐藥

主治破潰セル癰腫厚クノ瘡面不平ノ者ニ宜シ安質沒

扭酪ヲ加フレハ其泥能ク粘質ヲ得ルカ故ニ表面不平

ノ所ニ貼スルモ能ク粘着ス

○第三千二百二十六方律私寫

白砥八 加密列水十 老利兒結爾斯水三

右調勻供縛帶用

主治乳癌ノ姑息法トス

○第三千二百二十七方列聖

莨菪根一 井水適宜煮八分時濾取液一匕加後味

主治失鳩答越幾斯 加密列越幾斯各半

右調勻每一時半醮綿撒絲濡癰腫

主治潰爛セル癰腫ノ姑息法トス○或ハ生莨菪草及ヒ

失鳩答ヲ細剉シ乳汁ヲ以テ煮テ琶布トシ或ハ煎メ液

ヲ取り或ハ越幾斯二錢乃至三錢ヲ取り水一弓ニ溶メ

洗滌若クハ射注ニ供スルモ可ナリ

○第三千二百二十八方 總爾田私人 治破潰癰腫琶布

失鳩答葉一 生胡蘿蔔汁半 舍電阿芙蓉半

右調勻為布

○第三千百二十九方備過栗屈的兒

失鳩答越幾斯一 非阿私越幾斯半 葭若葉末錢

民埤列里精適

右作布取其半薄攤革貼患處

主治右二方破潰瘰癧腫人姑息法ト又半

○第三千百三十方秘

失鳩答葉 著草葉 點失刺龜 加密列花半

右細剉水煎取一碗加二亞麻仁油二匙灌腸

主治直腸狹窄及結節腫性硬結ニ宜シ○此方能ク痛

ヲ去リ後重ヲ緩メ粘液ノ漏泄ヲ減シ大便ヲ促ス

○第三千百三十一方結秘

老利兒結爾斯生葉一 滾湯半

右浸漬冷定濾過取液加清淨蜜一ヲ調勻醮細布或綿撒

絲貼患處

主治唇瘰腫ノ姑息法ト最妙

○第三千百三十二方弗

醋酸莫爾比一 水銀膏 蠟膏各二

右調勻作軟膏取豌豆大塗擦陰部日二次

主治子宮癌腫ニ施メ疼痛ヲ減スルニ宜シ○或ハ阿芙蓉殊ニ莫爾比涅ヲ以テ鎮痛藥トシ内服ニ供ス直腸癌腫ハ阿芙蓉一二分ヲ取テ朝暮肛門ニ挿入ス

○第三千百三十三方弗列結
忽布末ホツラ一分 家猪脂イノシシ三分

右上沙火飽熟二時半乃至三時濾過塗瀝定中

主治癌腫ノ疼痛ヲ鎮静スルニ宜シ

○第三千百三十四方爾爾滿

沃胃謨加里ハクイモカリ半 家猪脂イノシシ一分

右調和作軟膏供塗擦

主治子宮及ニ攝護腺癌腫ノ姑息法トス

○第三千百三十五方弗陽

沃胃謨ハクイモ三錢 水銀膏スイギンコウ二分

右調和取一茶匙塗擦日三四回乃至四回

主治結節腫ニ宜シ○陽氏此軟膏ヲ用ヒテ卵巢ノ大結節腫ヲ治セリ

○第三千百三十六方秘私的爾

亞麻子アマコ或過見托煎ヒニ 阿芙蓉液アハスビ六滴至八滴

右四分供注射

主治子宮頸ノ癌腫ニ用フ○或ハ明礬一弓乃至二弓ヲ

加ヘテ乳房腋下腺等ノ瘰癧ヲ洗フニ宜シ○之ニ兼テ
明礬二匁乃至五匁ヲ加ヘテ全身浴ヲ施ス三千百廿方
ヲ參照ス

○第三百三十七方 薄老度ラウ
ド名煤焙膏

煤焙 家猪脂各半 莨菪越幾斯一錢

右丁寧調和作軟膏塗綿撒絲

主治瘰癧腫ニ宜シ○薄老度氏或ハ本方ノ莨菪越幾斯ヲ
去ル

○第三百三十八方私的印

金盞花新絞汁一錢至
一錢半 新鮮無鹽酪一匁

右調和作軟膏塗瘡施縛帶日三次

主治皮表瘰癧腫ニ宜シ○之ニ兼テ金盞花一錢乃至一錢
半ノ煎汁ニ乳汁十八匁ヲ和メ内服ニ供ス

○第三百三十九方律私篤

孕礬酒石二錢至
六錢 水六匁溶化加後果

老利兒結爾斯水二匁 菲阿私越幾斯三錢

右調勻供縛帶用

主治乳瘰ノ姑息法トス

○第三百四十方叔碌埵兒

結列阿速多四滴 胡桃油二錢 葛加阿酪十四錢

右調勻作軟膏塗擦

主治 叔碌埵兒氏ハ前ニ載スル所ノ方法三千百三方。三千百四方。三千

百十方ノ外或ハ癰腫ヲ截除ノ后此軟膏ヲ用ヒテ佳驗ヲ

得タリト云フ

○第三千百四十一方紐爾

鹽酸白金一錢 石鹼硬膏附一

右調勻攤革貼患處

主治 總テ癰腫ニ宜シ乳癰ニハ最妙○之ヲ施セハ疼痛

漸ク減シ更ニ病勢ヲ制剋スルノ効アリ一驗ハ至一驗

○第三千百四十二方律私篤

蘓合香軟膏或拔實里膏 菩提樹炭末各一 加密列

末半 龍腦 沒藥各二 的列並油適

右調和作軟膏供縛帶用

主治 潰爛セル癰腫ニ用ヒテ惡臭ヲ去リ分離機ヲ復良

スルニ好シ

○第三千百四十三方同上

鹽酸加爾藥錢二 常水ニ化溶化加後果

老利兒結爾斯水二

右調勻射注

主治 子宮瘻ニ宜シ殊ニ臭氣ヲ去ルニ妙トス

胃癆シキルリス。エト。カルシウム。五シ 胃癆トリキユリ。マール。グカルシウム。五シ

胃癆ハ慢性胃癆衝後ニ發スル者多シ此症時々胃部ニ放

蟻シ灰白水銀膏ヲ塗擦シ甘汞ニ莨菪ヲ加ヘ千四百九 與

フルヲ以テ病勢ヲ防止スルハ適當法ト云其他液質不良

ラシカ等此病ノ原由ヲナスコトアリ此ニ注意スベキハ論

ヲ待ダズ胃癆一タビ發スレバ必本復ヲ望ムベカラズ此

症ニ殊稱スル所ノ藥劑ハ則莨菪殊ニ穢歇蘭度老利兒結

爾加莨菪水千四百八 莨菪加亞硝酸毘私繆篤千四百七十

七方 莨菪加酒石鹽水千四百八 尖鳩峇三千四百四十六方 至

金盞花越幾斯。結晶硝酸銀三千七百四 碓砂千九百 沃胃謨。解釋

植物越幾斯類。攝爾都兒水。ズシケンケン。エムス。マリトバツ

ト。カルスバツト。キツシゲン等皆鑛泉名 是ナリ叔密篤繆爾列兒

名及ヒ呵列爾名 第三千四百四十八方及ヒ三千四百四十九方

ヲ以テ佳効ヲ得シ者アリト雖亦之ヲ廢セリ或ハ強テ吐

下劑並ニ苦味健胃丁藥劑ヲ用フル醫モ亦アリト雖極メ

テ害アリ乳汁ヲ以テ最適當ノ補劑トス胃中酸敗液多キ

者ハ石灰水ヲ配用ス胃癆盛ナル時期ニ及 或ハ消化シ易

キ肉類ハ許シテ可ナリ諸酷厲酸味鹽酸香竇ノ食餌ヲ禁

ス其他ノ食物モ亦極メテ少量ヲ要トス○外用ハ胃部芥

子泥。發泡硬膏。吐酒石軟膏六百廿 及ヒ硬膏六百廿 劇症ニ

至テハ灸ニ宜シ累月嘔吐シ腹痛甚シキ者ニ臧歌蘭度氏
 嘗テ之ヲ施シテ非凡ノ偉効ヲ獲タルトアリ大便遲滯ハ
 灌腸メ之ヲ促スヘシ○病ノ末期ニ至テハ姑息法ヲ要ス
 腹痛嘔吐ヲ治スルハ沸騰散二方三方八百八方千九百五
 十八方至千九百六十三方
 里歌利飲千九百六
 十四方ノ沸騰ニ乗メ老利兒結爾斯水少許ヲ
 和シ或ハ小量攝爾都兒水ニ微温乳少許ヲ和スル者或ハ
 小量菲阿私越幾斯阿芙蓉失鳩答莨菪莫倔林丸五三十百
 五十方等
 ヲ與フルニ宜シ之ニ兼テ胃部ニ菲阿私葉失鳩答葉ニ白
 嬰球ヲ加ヘタル鎮痙布ヲ貼シ或ハ失鳩答硬膏芥子硬
 膏ヲ更換シ用フ此方法尚効ヲ見サル時ハ轉メ莫爾比捏

賢姪兒未秩斯法ヲ施スヘシ其吐百此所ノ物惡臭ナル者
 ハ珀疹汁ヲ取テ時々一茶匙ヅク用フレバ其臭即消ス病
 者諸食物ヲ吐逆スルハ枸橼ノ切片或ハ小氷塊ニ砂糖ヲ
 撒附メ以テ煩渴ヲ消スベシ此ノ如キ哀ムベキ病者ヲ養
 フハ肉羹濃汁ニ雞子黃ヲ加ヘ或ハ乳汁ヲ以テ灌腸シ又
 傑列乙浴每浴傑列乙一
 也乃至二七ヲ行クベシ

○第三千四百四十四方羣的屬

失鳩答越幾斯錢 精製瓦爾拔奴護 牛膽錢 一 亞

硝酸毘和繆篤錢 白石鹼錢

右調勻三以爲一丸衣甘草末每服三九日三服漸加至六

丸餘三百四十五方百速爾腹...

○第三千四百四十五方百速爾腹...

失鳩答越幾斯錢精製瓦爾拔奴謨牛膽...

黃安質波尼錢白石鹼半...

右調勻二衣一丸一石松粉每服八九乃至十九日三服

乃至四服...

○第三千四百四十六方空便頻...

失鳩答越幾斯四甘承如...

右調勻為十六九衣石松粉早晚服二丸...

主治三千百四十四方ヨリ三千百四十六方至胃瘻二宜

...

○第三千百七十七方帶總典利為...

結晶硝酸銀一蒸溜水六乃至八乃溶解加後味

甘亞刺昆亞蘆護漿一...

右調勻每服一食匙日三服乃至四服

主治胃瘻二宜シ〇總典利為氏硝酸銀ヲ以テ胃瘻ノ崩

症ニ殊効藥ト稱シ其既ニ發スル者ハ之ヲ用ヒテ姑息

ノ奇方トス

○第三千四百四十八方秘密篤繆爾列兒

甲方

醋酸加里

半一兩

失鳩答越幾斯

錢半

番木鱉越幾斯

蒲公英越幾斯

錢三

薄荷水

錢六

蒲公英舍利

別

半一兩

右調勻每一時服一食匙

乙方

莨菪葉末

錢三

白糖

錢一

右調勻為散分八服每日或隔日一服

主治右二方併用ノ胃痛ニ宜シ○叔密篤繆爾列兒氏或

ハ失鳩答及ヒ番木鱉ノ服量ヲ加増シ或ハ莨菪散ニ甘

承一ハヲ加フルヲアリ此方法ニ由テ以テ根治セル者

八人アリト云フ

○第三千百四十九方

甲方

阿芙蓉

錢一

甘承

錢半

右調勻三ハ為一丸晨夕服三丸

乙方

健質亞那越幾斯

錢半

苗香水

錢六

亞的兒

錢二

右調和每半時服十滴乃至十二滴

主治右二方胃痛ニ宜シ呵列爾氏ハ吐涎スル至丸藥ヲ

持重シ已ニ吐涎スレハ水劑ヲ與フ食養ハ米粥ヲ用フ

○第三百五十五方 莫儻林名丸 續草越幾斯亞鉛華各一錢

右調勻三以爲一丸 衣石松粉 日服一丸 隨服

主治 胃痛嘔吐ヲ鎮靜スルニ宜シ 又面痛ニ好シ 漸服量

ヲ加ヘテ六丸ヨリ八九至或醫本方ニ紫堇越幾斯

一錢ヲ加フルトアリ

○第...

遠西方彙卷之三十終

江戸芝神明前

書肆

和泉屋吉兵衛

