

遠西方彙

四

○卷之四

第二 局處焮衝病

肺焮衝 胸膜焮衝 ○胸膜

橫膈膜焮衝 喉頭焮衝

○氣管焮衝

○肺管焮衝

義膜咽喉焮衝

心臟及心囊焮衝


舌焮衝

咽喉焮衝

×

e 12

F 2
工-22



富士川文庫

3259



499.2

Em-2
2

No. 1387
e12

文久三癸亥益春新雕

侍醫法眼伊東貫齋譯

二帙

遠西方彙

原本紀元一千八百五十二年鑄行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之四

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第二局處焮衝病

肺焮衝

フ子ウモニア
オントステーキ
ング

他病ニ在テハ此症ノ如ク普ク消焮方法ヲ要スル者ナシ

先刺絡ヲ以テ專務トス其症ニ準シ數次之ヲ行フテ可ナ



リ而後胸上ニ蟬鉞ヲ施シ或ハ發疱硬膏モ亦貼スベシ内
 服ハ精製硝石九方至十三方。三百八十六方。三百八十八方。三百八十九方。三百九十一方。三百九十二方。三百九十三方。三百九十四方。三百九十五方。三百九十六方。三百九十七方。三百九十八方。三百九十九方。四百方。トス蓋之ニ吐酒石八十三方。三百ヲ伍スルヲ最適當ナリト
 ス其後解釋ノ効ヲ佐ケンカ為ニ精製硝砂ヲ吐酒石ニ伍
 シ二十一方。三百八十九方。四百或ハ大便ヲ促スベキ者アラバ孕蝕
 酒石ヲ吐酒石ニ配伍スベシ三百八十七方。世醫或ハ瀉ヲ促スニ
 孕礬酒石ト硝石ヲ調和シ與ル者アリ三百八十八方。三百八十九方。三百九十一方。三百九十二方。三百九十三方。三百九十四方。三百九十五方。三百九十六方。三百九十七方。三百九十八方。三百九十九方。四百方。
 書載セシ療法三百九十九方。ノ如キハ每症稱用スベカラズ殊ニ
 其法放血ヲ兼用セザレバナリ又栗篤栗篤授爾氏ニ倣テ鉛糖
三百九十九方。ヲ用フルハ吾輩欲セザル所ナリ甘汞ハ尤賞用ス

ベシ其症已ニ婁巴婁巴窒質肺質ノ肝質ニ變化スル義トナル者ハ更ニ

偉功アリ症ニ應ノ阿芙蓉三百九十四方。若クハ菲阿斯越

幾斯及ヒ金硫黄三百九十三方。モ亦配伍スベシ○咯痰ヲ促進ス

ルハ金硫黄ヲ除クノ他遠志三百九十九方。四百方。殊ニ効アリ生

力深沈衰セル者ハ之ニ龍腦四百方。ヲ和シ與フベシ肺

臟麻痺三傾ク者ハ安息香酸往昔尤物ノ名アリ四百方。

方婁巴窒質ヲ治スルハ之ニ亞兒尼加花ヲ配合ス四百方。

○此症ハ本復ノ期ニ至テ強壯法ヲ用ヒザルヲ常トス○

膽液性肺癆衝ハ刺絡ヲ行フニ謹慎ヲ加フベシ甘汞ハ肝

臟ノ機運ヲ挑起スルカ故ニ吐酒石ト同ク殊ニ此ニ効アリ

リ○神經性肺癆衝ハ鈍性神經熱ノ條ニ掲ク○嬰兒肺癆
衝ハ胸上ニ蟻鍼二三頭ヲ施シ後硝石四百八方ヲ用フ但
甘汞八方用フヘカラス○虚性ノ肺癆衝ハ一定ノ治法アラ
ザルカ故ニ症ニ從テ之ヲ療スベシ
或ハ輓近ノ醫肺癆衝ニ刺絡ヲ棄テ用ヒテ總テ祛痰ノ療
法ヲ專要トスル者アリ殊ニ嬰名地年名ノ欲授秩篤爾名人之ヲ
用フト雖其法疑フヘキナリ假令効ヲ奏スルモ姑息ニ過
ス恐ラクハ却テ大害ヲ招ク者多カラシ秩篤爾氏ノ政錄
ニ據レハ肺癆衝ニ罹リテ死スル者ノ員數一千人中刺絡
ヲ施シテ死スル者二百零四人吐酒石ヲ用ヒテ死スル者

二百零七人專授養ヲ守リ祛痰ノ法ヲ處シテ死スル者七
十四人トス○然レモ數年間時々流行セシ所ノ腸胃性神
經性等此說ニ關係セザル乎此二性ヲ帶ブル者ノ如キハ
純正ノ癆衝ニアラザルカ故ニ之ニ刺絡ヲ施スハ固ヨリ
謹慎スベキナリ○秩篤爾氏ノ異論ノ如キハ多年千萬人
ノ實驗ヲ經ル後ニアラザレバ治療ノ本法ヲ破ルヲ能ハ
ス○吾今此書ヲ梓行スルニ肺癆衝ノ新治法二件ヲ左ニ
畧載シテ以テ世醫ニ示サントス其一ハ銳仙名地惡名ノ疾醫
母名微質名ノ法トシ其二ハ弗列名澎爾窟名地ノ大醫袍名謨名噶爾
篤名涅兒名ノ法トス微質氏ハ刺絡及ヒ局處ノ瀉血ヲ禁シ

テ而ノ病ノ時期ヲ論ゼズ甘汞ヲ奇藥ト稱ノ之ヲ專用ス
甘汞服量大人ハ一服六分至小兒一歲ヨリ五歲至ハ一服
二分ヨリ四分至蓋其服數ハ究理家ノ試法ヲ用テ煥衝ノ
廣狹ヲ定メテ以テ之ニ準ジ又呼吸ト服至ヲ比較シ肺臟
運機ノ障碍ヲ計リテ以テ定ムルナリ是故ニ此治法ハ能
ク究理家ノ試法ヲ以テ胸内ヲ推究スルニ熟セザレバ試
用スルコト能ハズ煥衝既ニ蔓延シ其經過モ亦速ナル片ハ
三服各服甘汞六分ヲ取リ麻屈涅失亞シテヲ配伍シテ一時毎ニ
服セシメ翌日之ヲ停メテ病狀如何ヲ候ヒ其勢鎮定スル
者ハ後服ヲ停メ愈光盛スル者ハ更ニ同上ノ量ヲ投與シ

テ其勢解散スルニ至リ或ハ流涎ヲ發スルニ至リテ止ム
其治七日ヲ出ル者稀ナリ唯發黃嬰巴室鯊質病証名ハ一週
内ニ治スルヲ得ズ微質氏此自說ヲ證センガ為ニ二十三
人ノ治驗ヲ詳録セリ○袍謨噶爾篤涅兒ノ發明セシ治法
ハ劉兒氏ノ装置或ハ他ノ器ヲ用ヒテ數次硫亞的兒或ハ
格魯福兒謨ヲ吸引セシムルナリ大抵十密扭篤間吸引ス
ルヲ法トス但此法ハ空氣ト亞的兒氣ト混淆スルヲ以テ
大概病者麻醉スルコトナシ若麻醉セントスル片ハ其吸引
ヲ停ム然レハ袍謨噶爾篤涅兒氏ハ大抵刺絡ヲ施シテ之
ヲ佐ケ以テ的効ヲ奏セシメント欲セリ若夾雜ノ症アル

遠西藥彙
肺癆衝
慶朋堂

代ハ相當ノ法ヲ以テ之ヲ除クベシ之ヲ吸引スルノ後直
チニ胸中ノ逼迫寛解シ歎嗽減退シ胸痛消散シ咯痰及ヒ
熱毛亦鎮静ス昏爾並倔名不魯室狐上叔密土上惋怯魯上
嬰別兒上越爾整兒上及ヒ烏設列兒上同等皆止ノ治法偉効
ヲ得而ノ刺絡及ヒ他ノ醫藥全ク無益ニ屬スト云又

○第三百八十三方穢歇蘭度

吐酒石三錢 精製硝石二錢 蒸餾水四勺溶化如後件
過兒抱舍利別各一 甘草舍利別各一

右調勻每一時服二食匙

主治肺癆衝刺絡ヲ行フテ後直チニ之ヲ與フ是此症ノ

主治ニノ實ニ一奇藥トス之ヲ用ヒテ其証全ク退カザ
レハ患部ニ大發疱膏ヲ貼スベシ更ニ輕易ノ症ハ最初
直チニ此方ヲ用ヒテ全治スル者多シ若治セザル片ハ
放血スベシ

○第三百八十四方

精製硝石一錢 孕鹼酒石 老利兒水各二錢 安質沒尼
酒錢一 井水七 度碌布三 過兒抱舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治肺癆衝興奮機亢盛ノ時期及ヒ其他局處ノ諸癆衝

ニ用ヒテ鴻益アリ

○第三百八十五方

甘扁桃油錢一 亞刺昆亞護宜適 研和加後味

井水 扁桃舍利別各一 菲阿斯越幾斯四

右調和為舐劑每一時服一茶匙

主治痰質水樣酷厲ニ變シ患者其刺戟ニ由テ連綿欬嗽

スル症咯痰ヲ促スニ宜シ兼テ胸上ニ發癩膏ヲ貼スベ

シ

○第三百八十六方

甘扁桃去皮半 黑櫻實水六 如法製作乳劑溶化後藥

硝石錢一 白糖錢六

右調和每半時或一時服一食匙

主治諸般ノ嗽衝症殊ニ肺嗽衝ニ宜シ

○第三百八十七方

吐酒石八 孕鹼酒石六 精製度碌布一

右加蒸餾水四ヲ溶化每一時服一食匙

主治肺嗽衝ニ用ヒテ咯痰ヲ促シ大便通利ヲ進ムルニ

宜シ

○第三百八十八方

精製硝石錢二 孕礬酒石半 過爾托煎七 扁桃乳舍

利別一

透田... 肺... 廣... 堂

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

主治肺焮衝放血後直于二之ヲ用フ

○第三百八十九方同上

精製礪砂 精製度礪布各二錢 吐酒石一 加接骨木

花水肥束布水各三弓溶化更加後件

過兒ル捨舍利別弓

右調和每一時服一食匙

主治肺焮衝ノ第二期ニ用ヒテ咯痰ヲ進ムルニ宜シ

○第三百九十方百失寄爾麥爾利兒

吐酒石六八至十二 加密列浸四弓乃至六弓溶化加

後件

過兒ル捨舍利別弓

右調勻每一時服一食匙若發吐逆者每一時半與之

主治肺焮衝ニ宜シ○百失寄爾氏ハ毎日吐酒石ノ量三

氏ヲ增加ス第二日若クハ第三日ヲ經テ通例吐逆ヲ發

シ爾後瀉下ノ効ヲ奏ス瀉セザル者モ亦間之アリ若瀉

セザレハ瀉藥ヲ與フ發汗ニ傾ク者ハ硝石亞的兒附格

魯林亞的兒或ハ亞施應亞的兒ヲ加ヘ胸中大ニ苦悶ス

ル者或ハ不寐ノ症ニハ大量ノ阿芙蓉ヲ與ヘ小便難澁

且肌膚燥熱スル者ハ硝石ヲ與フ芫菁硬膏ハ間亦用フ

遠西方藥 卷四 肺癆衝

ト雖刺絡及ヒ局處ノ放血ハ絶エテ行ヌナシ○吾輩
ハ決メ此療法ニ働フヲ得ヌ而メ此ニ之ヲ掲ク此者
ハ唯治療ノ來歴ヲ示スニ由ルハ味ハ味中大ニ苦悶ハ

○第三百九十一方〔麻私葛偪尼〕

炭酸剥篤亞斯ニ錢至 半錢

右加蒸餾水ニ北溶化食匙抄頻服十二時間盡之

主治肺癆衝症之ヲ用ヒテ佐藥トス○炭酸剥篤亞斯ハ

煥衝質ヲ解渙スルノ一藥ニメ又安巴室黨質ヲ禦キ且

解散セシムルノ一藥タリ○麻私葛偪尼氏ハ每常此溶

液ヲ以テ扁桃乳舍利別一哥喜匙ニ和服セシム

○第三百九十二方〔粟篤授爾〕

鎮瘻密幾斯去爾

鉛糖三錢至 四錢

黑櫻實水四勺溶化加後藥

舍電阿芙蓉液一錢至 半錢

甘草膏二錢

右調勻每一時半乃至二時半服一食匙

主治肺癆衝刺絡ヲ行フテ後之ヲ用フ○設法魯里兒別

而傑兒名等モ亦此治法ヲ稱賛セリ然レモ他醫ノ說ニ

據レバ鉛糖ハ肌熱苦悶及ヒ欬嗽ヲ增長シ且其效之カ

為ニ變ノ乾欬トナルガ故ニ此方全ク棄テスバアルベ

カラズト云ヘリ

○第三百九十三方

甘永一 金硫黃 菲阿斯越幾斯各半 甘草末半
右調勻為散分十二包每一時乃至一時半服一包

主治肺癆衝ノ第二期ニ之ヲ用フ

○第三百九十四方職歌蘭度

甘永六 精製阿芙蓉二 白糖二

右調和為散等分六包每一時或一時半服一包

主治肺癆衝及ヒ胸脇痛適宜ニ放血シテ后胸部ノ刺痛

未全ク除カズ服小ニノ軟ナル者此方ヲ連服セシムル

一二日ニシテ通例癆衝ノ殘餘及ヒ此ニ滲出セル列

印巴ヲ驅除スルニ足ル○他ノ局處癆衝殊ニ腹臟癆衝

ニ之ヲ用ヒテ亦偉効アリ

○第三百九十五方葛刺弗土

甘永二 揮發鹿角鹽五 精製阿芙蓉 結兒茂斯密

涅刺列各半

○右調和為散分六包每一時半乃至二時服一包

主治肺癆衝胸膜癆衝心囊癆衝ノ末期列印巴ノ吸收ヲ

進ムルニ用フ

○第三百九十六方膏職索斯

主菲阿斯越幾斯半至 硃砂加過泥子精一至 過

兒抱舍利別或白罌粟舍利別一

遠西... 肺焮衝... 廣... 堂

右調和每服一茶匙強日三次

主治肺焮衝及ヒ肺管焮衝ニ於テ已ニ焮衝性ノ所患ヲ

防キシ者及ヒ神經熱胸中ノ疾患百日咳ノ末期勞瘵ノ

煩咳慢性肺臟聖京僣喘息窒息聖京僣ニ宜シ其他風氣

鬱畜鼓脹及ヒ瘰癧性ノ諸症ニ用フ

○第三百九十七方

龍腦 金硫黃 精製硝石 亞刺毘

至各一八半 至二八 半錢至 一錢

右調和等分六服每一時一服

主治倭麻質斯性ノ肺焮衝其熱已ニ降鎮シテ后之ヲ用

フ...

○第三百九十八方

遠志 井水十四弓煮耗至八弓濾過加後件

硝砂 安質沒尼酒 老利兒水 過兒抱舍利別

精製蜜

右調和每一時服二食匙

主治肺焮衝ノ証狀緩慢治セザル者ニ用ヒテ肺臟ノ分

利ヲ促スニ宜シ祛痰劑

○第三百九十九方

遠志 井水適宜煮濾取六弓溶化後藥

遠西... 廣... 堂

遠志

卷四

肺癆衝

七

鹿茸

鹿茸

硝砂半錢

吐酒石二錢

甘草膏三錢

右調勻每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治肺癆衝ノ第二期ニ用ヒテ咯痰ヲ進ム並ニ肺臟及

肺管ノ慢性癆衝症ニ聲啞及ヒ乾欬ヲ兼ル者之ニ宜

シ

○第四百方詩忽倫

遠志二錢至半錢

井水適宜煮濾過取六勺加後件

龍腦一錢

亞刺昆亞護護漿一錢

鹿琥精一錢

○右調勻每半時若一時服一食匙

主治肺癆衝末期ニシテ咯痰止ミ肺臟將ニ麻痺セント

シテ脈弱ニシテ軟全身衰弱セル者之ニ宜シ之ニ兼テ發

瘕膏ヲ貼スベシ○但遠志及ヒ其他ノ衝動藥ヲ用フル

コ早キニ過クレバ大害ヲ招ク事ヲ執リ服固難ク

○第四百方過糖栗鼠的兒

遠志末五分白糖五分龍腦一分

右調和為散分三服每一時半一服

主治肺癆衝分利ノ時期咯痰スル時及ヒ胸中逼迫及

ヒ乾欬ヲ發スル者ニ用フ然レモ著シク熱アリテ刺絡

ノ証徴見ハル者ハ遠志必用ニ申ラズ燕麥糖代味服

○第四百一方詩忽倫

蘇黃粉一分白芷一分丁香一分蘇合一分

遠志

卷四

七

鹿茸

鹿茸

遠山丸
神效
肺癆
肺癆
肺癆
肺癆

○安息香酸六錢 金硫黃半錢 茴香油糖半錢
右調勻為散分六服以蠟紙包裹每服一包燕麥粘汁和服
日四次
主治 神經性肺癆衝格痰多
之時宜少增合三服每包半一服

○第四百三方別建世 請潮一
○安息香酸六錢 龍腦各一錢 金硫黃各一錢 茴香油糖半錢
右調勻為散分六服以蠟紙包裹每一時一服

○第四百四方速別倫 散
主治 虛性肺癆衝肺臟麻痺又ル及始ニ用ハ藥ニ依ル
○第四百四方速別倫 散
主治 虛性肺癆衝肺臟麻痺又ル及始ニ用ハ藥ニ依ル

○安息香酸六錢 龍腦三錢 過泥子油糖半錢
右調和為散分六服以蠟紙包裹每一時一服亦各之二
主治 肺癆衝第二期或ハ第三期ニ在テ呼吸困難咯痰鎮
止シ肺將ニ麻痺セントスル者之ニ宜シ又粘液性痙攣
性ノ喘息及ヒ胸水病室息ノ危險アル者ニ用ヒテ好シ

○第四百五方聖兒湯 創ナミハ、セリ益ニマコ出ヌ
亞兒尼加花一錢 熱湯適宜浸漬濾取四多加後藥
安息香酸半錢 過兒托舍利別或遠志舍利別

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩
主治 肺臟ノ婁巴室鯊質又治スル宜シ
○亞兒尼加花

○亞兒尼加花
○亞兒尼加花

透
西
方
藥
卷
四
肺
癆
衝
肺
癆
衝
肺
癆
衝

ハ髮細管ヲ衝動ノ以テ血ヲ大脈管ヨリ誘退シ又血
新陳交代及ヒ其吸收機ヲ進ムル故ニ此ニ良トス安
息香酸ハ更ニ腦ノ第十對神經ヲ衝動シ能ク血兒尼加
ノ効ヲシテ肺ニ達セシム之ニ由テ咯痰ヲ催シ肺中滲
出入列印巴能ク驅除セラル、ナリ蓋之ヲ咯出スル
ナクノ自ラ除ク者モ亦往々之アリトス第百九十一方
○第四百六方別述杜大麥煎五屋施茂兒二
精製硝石錢一右溶和供灌腸藥

主治肺癆衝。腦癆衝。其他癆衝症ニ用ビテ腸管ニ誘導ス
ルニ宜シ第二十五方ヨリ第二十七方マデ亦皆之ニ効
フベシ第二十五方

○第四百七方都兒揮發鹿角鹽各四安息香花各四結兒各四茂斯密各四涅刺各四
白糖半

右調和為散分十服每半時或一時時服之ハ漸ク增長シ
主治虛性肺癆衝ニ於テ苦悶及ヒ胸中逼迫漸ク增長シ
脈不齊咯痰止々將ニ室息セントスル者之ニ宜シ

○第四百八方佛錄收斯

田方齋
卷四
肺癆
廣
肺
堂

硝石カ甘草浸過兒抱煎各一弓溶化加後藥

屋施茂兒カ右調和每一時服一兒匙

主治二歲兒ノ肺癆衝ニ宜シ○解散ノ後ハ硝石ニ代ヘ

テ民埜列里精ヲ用フベシ

○第四百九方萬優爾點垂兒

硝石カ過兒抱煎一弓溶化加後藥

過兒抱舍利別カ右調勻每一時服一茶匙

主治嬰兒ノ肺癆衝及ヒ他ノ癆衝病ニ宜シ

胸膜癆衝カ附胸膿カ胸筋癆衝カ外傷麻質斯カ正癆衝胸膜カ但刺絡ハ行ハズメ可ナル者多ク太抵局處ノ放血ニシテ

足レリ而後芫菁膏ヲ貼スベシ内服ニハ吐酒石消石カ或ハ硝砂カ芙蓉ヲ伍スルヲ良トスカ○依質僣損カハ胸膜癆衝

ヲ左右二症ニ分チ隨テ治法ヲ變カ

百七十一方カ

百七十一方カ

百七十一方カ

百七十一方カ

百七十一方カ

百七十一方カ

遠西方藥
卷四
胸膜焮衝附胸膜
世
廣
堂

○胸膜症ハ勉メテ吸收機ヲ促メ以テ之ヲ防クベシ胸膜焮衝對症ノ方法其功ヲ逞シクセザル片ハ大發泡膏ヲ貼
ヲ打膿セシメ艾灸モ亦施スベシ上法ヲ行フモ尚効ヲ奏
セザル片ハ轉メ沃胃謨ヲ用フベシ斯篤揭私ハ沃胃謨
ヨ含蓄セル劉越兒此ノ鑛水一瓜爾篤容量半ヲ飲服セシ
メ兼テ沃胃謨膏ヲ痛處ニ擦ス微兒里暗斯ハ敬度利阿
托私剝篤亞斯ヲ取り一服ニ込乃至二込ヲ與フル日ニ
三次ヨリ四次ニ至ル患者甚衰弱セルハ沃胃謨鉄ヲ優レ
リトス○胸膜症施術ハ胸中逼迫漸ク增長シ病愈進シ患
者日ニ虚脱シテ外部ニ膿瘍ヲ發スルノ懼アル時ニ於テ

又ベシ

○第四百十方別爾列印各地例價極摺

金硫黃 菲阿斯越幾斯各ニ 阿芙蓉半 枸橼油

糖錢ニ

右調勻為散等分六包每半時乃至一時服半包

主治左側ノ胸膜焮衝ニ用フ此症ニ於テハ脾臟モ亦連

累セララル、ヲ常トス爾後茲ニ切迫スル所ノ見証ヲ制

スルノ後歇悖名ノ寧嗽丸四百十方ヲ與フベシ○右側ノ

胸膜焮衝ハ小量吐酒石若クハ礪砂ト吐酒石金硫黃等

ヲ配用ス右側ノ焮衝ニ在テハ肝臟モ亦連累セララル、

遠西方藥 卷四 十五 廣半堂

ラ常トス
 横膈焮衝
 廿五
 廣

○第四百十一方駭憎
 實芙蓉葉末吐根末各半阿

芙蓉五土木香越幾斯錢

右調和二人為一丸衣石松粉每一時半服一丸

橫膈膜焮衝一アプラグマチチス羅オシトステ

十分二防焮療法ヲ處シ一刺絡ノ多量ノ放血シ一腹部及

ビ橫膈膜ノ邊緣二蟻鍼ヲ施シ一吸角法一緩和鎮痛ノ一琶布一及

ビ塗擦劑發疱硬膏蒸餅母等皆供用ス一ベシ一其他精製硝石

ヲ乳劑二和スル者三百八或ハ屋施蔑兒二加フル者四百二

方油性乳二菲阿斯三越幾斯四ヲ加フル者五百八老利兒水六百四

方三甘汞四百十等ヲ用フベシ一更二又消焮ノ灌腸法三五四方十

至二百七方一ヲ行フ二宜シ一甘汞一芙蓉一合一陳一衣一善一

○第四百十二方一末一取一蘇一葉一ヲ一煎一出一ス一ハ一油一

精製硝石一錢半隨蘆根煎六弓一以一蘆根一半一弓一溶化一加一後

件一金蘇黃一半一夫一蘇一葉一煎一出一ス一ハ一油一

○屋施蔑兒一右調勻每半時服一匙

○第四百十三方一蘇一葉一煎一出一ス一ハ一油一

○菲阿斯一越幾斯一半一弓一至一老利兒水一半一弓一溶化一

遠西本草
卷四
橫膈喉衝
十一

右調和每服十二滴至十五滴日四次

○主治瘧瘵性ノ疾患ヲ治ス殊ニ橫膈膜喉衝吃逆煩劇ノ

症馬宜シ

○第四百十四方護秘箋

甘永 金硫黃各半 失鳩各一 越幾斯一 甘草末一

右調勻為散分八服朝夕一服

○主治橫膈喉衝ノ末期病勢已ニ衰ヘテ后滲出スル所ノ

列印巴ヲ解釋スル五宜シ甘永阿芙蓉ノ合劑モ亦甚適

當トス三百九十四方

○第四百十五方護秘箋

龍腦油一 阿芙蓉丁幾

右調和為塗擦劑

○主治橫膈膜喉衝ノ瘧瘵証ヲ鎮定スルニ宜シ之ニ兼テ

微温浴ヲ行フ

喉頭喉衝ラリン ギチス オント ホト ド キ ン

氣管喉衝ラセ イト ス テ キ ト ヘ イ シ キ ン

肺管喉衝ラキ チ ス テ キ ト ヘ イ シ キ ン

右三症ハ其症ニ從ヒ刺絡蟻鍼ヲ施シ緩和蒸劑及過兒

抱葉錦葵葉ノ煎液ニ乳汁若クハ水ヲ加ヘ其温蒸氣ヲ

吸引セシムベシ内服ニハ緩和粘滑油性藥即過兒抱煎沙

卷五方藥 卷四 頁半

遠東藥房
喉頭氣管肺管喉
廣
堂

列布煎含油乳劑或ハ過兒拖舍利別ニ亞刺毘亞護護藥ヲ
加ヘタル紙劑或ハ甘扁桃油ニ非阿斯越幾斯ヲ伍スル者
等並ニ宜シ而後精製硝石及ヒ精製硝砂ニ甘草膏及ヒ吐

酒石ノ配伍シ三百八十九方與ヘ列印巴滲出ニ臨ム片ハ甘汞三百九十三方ヲ用ヒ或ハ水銀膏ヲ塗擦ス生力沈衰セル者

ハ龍腦三百九十七方一宜シ咯痰止ム者ハ遠志三百九十八方硝

砂加過三百九十六方安息香酸四百四十四方至等ヲ處スベシ

義膜咽喉燉衝ラトリンキチス。エト。タラセイチス。エキス。グ

トナセア羅フリシヘケールオン
トステークイング蘭又名コロップ

喉頭ニ蟬鍼二頭四頭六頭乃至八頭ヲ適當トス但之ヲ胸

骨上ニ施セハ更佳ナリ大兒ニ在テハ刺絡モ亦行フベシ

或ハ放血ノ後直チニ吐酒石製四百六十六方膽礬製四百二十四方

五方ノ吐藥ヲ與フル者アリ或ハ甘汞四百四十九方至ヲ稱

用スル者アリ甘汞ヲ用ヒテ大ニ喘鳴ヲ發スルニ至リ直

チニ後服ヲ停メテ遠志四百二十六方或ハ安質母尼劑四百二十

小量ノ吐酒石安質母尼酒結兒蔑斯密濕刺列四百二十八方若ク

ハ金硫黃四百二十九方等ヲ與フルニ宜シ蓋此ニ至レハ金硫黃

ヲ與ヘテ毎日一二吐セシムベキ機會ヲ得タリトス恐ラ

クハ最初之ヲ施スニ優レリ○又輓近ニ至リテ膽礬ヲ以

テ吐藥ト為シ加之此症ノ奇藥ト稱ス四百二十三方至肝

遠西本草
義膜咽喉燄衝
肝色硫黃
蓋肝色硫黃
効、吾

色硫黃四百三十四方至毛亦偉効了蓋肝色硫黃効、吾

輩自驗スル所ニアラス吾輩ニ在テハ蜚鉞甘永金硫黃或

ハ安質母尼酒ヲ他ノ解釋藥液少許和シ良効ヲ得シ者

多シ○外用ハ左法ヲ專一トス即頸圍ニ水銀膏ヲ塗擦シ。

芫菁膏芥子泥足蹠蒸湯法酒醋ノ灌腸等是ナリ或ハ燄衝

ノ執已衰ヘリト雖肺臟麻痺ノ懼レ又リテ其症危險ト

ル片ハ瀉水浴ヲ行フハシテハ水ニ部ニ發ステハ至ル直

○第四百十六方穢飲蘭度ハハ甘永四百三十四方

吐酒石ハ直蒸餾水ニ溶化加後藥藥ハハ四百二十四

海葱蜜ハ砂糖舍利別各半吐根末各亦ハ科ハハハ

右調勻每八分時與一茶匙以至得吐

主治三歲乃至四歲ノ兒ニ於ケル義膜咽喉燄衝ニ其

証徵見ハルレハ即直チニ之ヲ投スベシ三歲以下ノ兒

ニ在テハ吐酒石ヲ去リ或ハ穢屈蛇名ノ安質沒尼酒ニ

水液少許ヲ和シ與フ之ニ兼テ接骨木花煎ノ温蒸氣ヲ

吸引セシメ頸圍ニ蜚鉞ヲ施シ爾後甘永ヲ用フハシ醋

一食匙ヲ取テ灌腸スルモ亦鴻益アリ最幼稚ノ兒ハ醋

半食匙ヲ以テ冷水一小盞ノ四分三ニ和シ施ス此方法

ヲ行フテ后十二時ヲ經テ尚緩解スル所アラスハ乃膽

礬ヲ用フルニ宜シ

○第四百十七方夜磨匙秘骨弗

甘永半 白糖半

右調和為散分六服每一時一服合三

主治蜈蚣ヲ施シテ後直チ此方ヲ處スベシ兼テ緩和

劑ヲ以テ頸圍ヲ蒸湯シ誘導灌腸法ヲ行ヒ腓腸ニ蒸餅

母ヲ貼シ兩脚ヲ蒸湯シ頸ノ兩側ニ水銀膏ヲ塗擦スベ

シ

○第四百十八方

甘永八 金硫黃四 白糖四

右調和為散等分八包每一時服一包

主治六歲乃至八歲ノ兒ニ於ケル義膜咽喉焮衝ニ宜シ

兒更ニ幼稚ナレハ隨テ其服量ヲ減殺スベシ

○第四百十九方噦魯涅屈

甘永半 白糖一 丁寧調和加後藥

沃野謨半

右研和五密扭篤間為散等分十包每一時服一包

主治義膜咽喉焮衝及ヒ頭水ニ宜シ

○第四百二十方依魯匙秘骨弗

甘扁桃乳三 亞刺昆亞護謨將 過兒托舍

利別各二錢 至三錢

遠西... 卷四... 義膜咽喉燉衝

右調勻每一時服一兒匙

○第四百二十一方同上

過兒托根一錢半 井水適宜煮濾取二三勺加後藥

過兒托舍利別半

右調和每一時服一兒匙此方當與甘永互用

主治右二方四百二十方四 八他ノ主藥ニ兼用スベシ

○第四百二十二方同上

硫黃乳 甘永各半 白糖半

右調和為散分六服每一時一服

主治列印巴滲出スルノ始メ義膜ノ元質ヲ解釋シ皮表

ノ蒸發ヲ促スニ宜シ其他硫黃ハ善ク永毒ヲ解ス

○第四百二十三方顯忽弗滿

結晶膽礬十二 白糖四

右調和為散等分四包如法服之

主治義膜咽喉燉衝ニ宜シ先一包ヲ與ヘ其後第二包ヲ

取テ冷水三食匙ニ溶化シ半時每一食匙ヲ與フ再發

作アリテ室息セントスル片ハ又一包ヲ與フベシ

○第四百二十四方翳布

膽礬一八 乳糖二

右調和為散等分八包每八分時服一包以至得吐

遠方集
卷四
義膜咽喉焮衝
廣
用
堂

〔主治〕一歲乃至七歲ノ兒義膜咽喉焮衝ニ用フ○翌日ニ

至テ聲啞未復セス且胸中苦悶スル者ハ更ニ一包ヲ取

テ四分ノ三時毎ニ服セシムベシ

○第四百二十五方 甲方〔設爾祿〕ハ又一包ヲ與ヘン

膽礬三至四亞刺毘亞護護散半附刀食後ヲ與ヘ再發

右調勻為散頓服

〔主治〕義膜咽喉焮衝ニ宜シ○吐後左ノ散藥方ヲ與フベ

シ

○第四百二十五方 乙方同上

膽礬三護護散二錢附山蘇黃公善々采毒ヲ辨ス

右調和為散等分九包每一時與一包以至焮衝諸証全解

散

○第四百二十六方 依依盧毘私影弗入 吡蘇和蘇密蘇味

○遠過兒抱根錢遠志十二井水適宜煮濾過取三寸加

主治後藥即知焮衝ノ義膜咽喉焮衝

右合和每一時與一包匙合除限モ

主治義膜質解釋シテ後其咯出由促スニ用フ之ニ兼テ

氣管ノ上ニ浴フテ小發疱膏ヲ貼スベシ海葱蜜硝砂加

過泥子精鹿角精附金硫黃結兒蔑斯密涅刺列安息香酸

遠方集 卷四 廣用堂

義膜咽喉喉衝

○第四百二十七方〔速突士〕
 主 遠志一錢 熱湯適宜浸濾取四分加後件一之二集三

○安質没尼酒一 過兒抱舍利別一
 右合勻每一時服一小匙

〔主治〕義膜咽喉喉衝ノ第二期ニ用フ

○第四百二十八方 過兒別爾松〔素斯〕
 結兒蔑斯密涅刺列一 龍腦一 加後味精密研和

○亞刺毘亞護護漿一 過兒抱舍利別一
 右調勻每一時服一茶匙臨服宜振蕩以一至二煎三清四玉五全六煎

〔主治〕義膜咽喉喉衝氣管始メテ喘鳴ヲ生スル片之ヲ用

○第四百二十九方〔設爾祿〕
 金硫黃一 橙花水一 精製度碌布一錢

右溶和時々服一茶匙臨服宜振蕩

○第四百三十方〔依。肅。毘。松。骨。弗〕
 〔主治〕此方ヲ用ヒテ義膜咽喉喉衝ノ治ヲ終フ

肝色硫黃六 過爾托舍利別一 子溶化
 右硝子燻收貯○每一時與一哥喜匙

〔主治〕大率一歲小兒ノ義膜咽喉喉衝ニ用フ○肝色硫黃

義膜咽喉煖衝
遠志舍利別
三二

臭味不佳ナルヲ以テ服スルヲ嫌惡ス故ニ獨此症蟻鍼
甘永ヲ用ヌト雖驗ナクノ列印巴將ニ滲出セントスル
証狀持續シ而ノ患兒下利太過流涎ヲ將出シ來リ隨テ
生力虚脱シ此ニ由テ甘永モ亦復連進シ難キ者之ヲ用
フルニ宜シ○但此方ヲ嫌惡セザル兒モ亦間之アリ

○第四百三十一方愚屈拔爾託

肝色硫黄錢一 蜜去泡沫 五錢

右合勻為舐劑每一時服半茶匙

○第四百三十二方弗霸件

結兒蔑斯密涅刺列半 肝色硫黄錢一 遠志舍利別錢二

硝砂加過泥子精 甘永二三 列四 堅五 半

右合勻每一時服一茶匙強

主治大兒用フ

○第四百三十三方葛鬱西爾

肝色硫黄錢半 橙花水錢六 白糖錢二

右合勻每一時半與一茶匙同之 煎二 煖回 大量、 效血

主治三四歲兒ノ義膜咽喉煖衝ニ宜シ

○第四百三十四方骨布

肝色硫黄錢一 過兒托根末錢一 甘草越幾斯錢二

右調勻為六十九衣依利斯弗魯連底那末硝子燻收貯○

遠志舍利別
三二

一歳乃至二歳兒每半時或一時取一九以林檎製母斯若
梨子製母斯少許送下

心臓焮衝キカルヂチス羅オントステ
心囊焮衝キンダグハルト蘭

心臓焮衝キカルヂチス羅オントステ
心囊焮衝キンダグハルト蘭

心臓焮衝ノ治法大抵肺焮衝ニ同シ殊ニ數回大量ノ放血

ヲ主トス若外証衰弱ヲ見ハシ脈沈伏シテ或ハ診シ得ベ

カラス或ハ時ニ眩暈ヲ發シ或ハ四肢厥冷等ノ証アルモ

之ヲ懼レテ放血ヲ怠ル勿レ爾後尋テ蟻鍼ヲ施スヲ要

トス次ニ硝石ニ錢乃至三錢ヲ取り多量ノ水液ニ溶化シ

十二時間ニ服セシメ終ニ甘永二三匁ヨリ四匁至之ヲ半

時毎ニ與ヘテ毎日數次粥様ノ大便ヲ利セシムルニ宜シ

水銀膏塗擦モ亦稱用ス又解釋ノ効アル飲料ヲ多服セシ

ノ以テ扶治法トス○心囊焮衝ノ治モ亦上ニ同シ○其他

肺焮衝ノ條ニ列載スル所ノ方法ニ從事スベシ此ニ一ニ

方ヲ掲クル者ハ畧其不足ニ充ツル

○第四百三十五方護松篇

實チキ芟チキ答チキ利チキ斯チキ至十五匁熱湯適宜浸濾取六匁加後件

精製硝石錢孕礬酒石錢亞刺昆錢亞護錢護漿錢屋施

茂兒各一

右合勻每半時與一食匙乃至二食匙

〔主治〕實性心臟焮衝第一回ノ刺絡後直チニ之ヲ與フ

○第四百三十六方〔速兒蒲里屈〕

實^{キタ}答^カ利^リ斯^ス 六 熱湯適宜浸漬濾取三子加後藥

硝酸曹^ツ達^ツ 錢一 吐酒石 四分 格兒失^シ屈^ク護^ホ子酒 一

覆盆子舍利^一別^一

右調勻每半時與一小兒匙

〔主治〕小兒ノ心臟諸膜及ヒ其近部ノ痲質斯性焮衝ニ

用フ其症甚危險ニ臨ムハ先刺絡ヲ行ヒ後蜚鍼ヲ施

シ而ノ后此方ヲ用フ蓋五歲乃至七歲ノ兒ニ就テ云フ

ナリ其後甘永ヲ用ヒテ滲出ノ列印^レ巴^バヲ解渙スルヲ適

當トス心臟ノ部位ニ打膿法ヲ施シ十四日間持久スベ

シ發病第四日或ハ第五日ニ方テ此打膿法ヲ施ス片ハ

再發ヲ防グノ効最確實ナリトス

舌焮衝 グロスシチス 羅^トン^グ オントスマテ キン^グ 蘭

刺絡ノ多量放血シ舌上或ハ顎下ニ蜚鍼ヲ施シ窒息ノ懼

レアラバ舌ヲ截開シ 長ク深ク 燕^マ麥^マヲ乳汁ニ煮テ頸圍ヲ

慰シ緩和藥ノ蒸氣ヲ吸引セシメ衝動藥ニ醋ヲ加ヘテ灌

腸シ頸ニ水銀膏ヲ塗擦シ罌粟子油榧楂核汁及ヒ他ノ緩

和劑ヲ以テ數回舌上ニ塗ルベシ患者若嚥下ヲ得ルニ至

ラハ直チニ硝石ニ吐酒石ヲ配伍スル者 九方至 清涼下劑

遠西方彙 卷四 三十二 廣半堂
古喉衝咽喉喉衝
廣肝

十五方及七甘永一氏乃至二氏一時每二與フベシ○其誘

因ニ注目スベキハ固ヨリ論ナシ

咽喉喉衝アノキトトステノ羅キケル蘭オ

此喉衝ハ其証狀刺絡ノ援ヲ須ツニ至ル者稀ナリ通例放

蟻六頭八頭或ハ十二頭ニシテ功ヲ收ムルニ足レリ扁桃

腺上顎及ヒ懸壅垂ヲ亂刺スルハ其効更ニ偉ナリトス喉

衝更ニ劇度ニ進ム者ハ精製硝石四百三十七方三清涼下劑十五方

ヲ用フベシ然レモ此症ハ聖京個性ノ者多シ大抵民埜列

里精四百三十八方ヲ用ヒテ足レリ扁桃腺喉衝ハ瘡瘡木

脂四百五方ヲ奇藥トス英人嘗テ稱譽スル所ナリ○外用ハ

含漱若シハ射注法ニ宜シ四百四十七方至蓋病性ニ從ヒ

或ハ緩和劑ヲ撰或ハ衝動劑ヲ用フベシ兼テ弗刺涅兒

毛布ヲ以テ頸圍ヲ被覆シ解凝膏四百六方ヲ貼シ解凝劑四百

六十五方四百六方ヲ塗擦シ將ニ化膿セントスル片ハ温暖緩和

ノ琵琶布四百七方ヲ行フベシ○習癖咽喉喉衝ハ冷水或ハ氷

片ノ罨法良効アリ○耳後腺喉衝ハ温暖ニ保護シ發汗劑

及ヒ砒砂四百六方等ヲ用ヒテ効アリ

○第四百三十七方

精製硝石半錢至吐酒石一錢 蒸餾水四ヲ溶化加後

件

遠西方彙 卷四 三十二 廣半堂

屋施茂兒各半

右調勻每一時服一食匙

主治咽喉嫩衝宜先頸圍二蟻鍼ヲ施シ次テ項上ニ

發疱膏ヲ貼シ兼テ脚浴ヲ行ヒ緩和藥ノ蒸氣ヲ吸引セ

シメ弗刺涅兒名布ヲ以テ頸ヲ纏フベシ放蟻后吐劑ヲ

用ヒテ超絶ノ効ヲ奏スルノ間之ヲ以テ

○第四百三十八方

民埵列里精

屋施茂兒各半

菩提樹花水各半

右調勻每一時服一食匙

○第四百三十九方

民埵列里精

接骨木子昆設兒各半

安質沒尼酒

接骨木花水一錢

右調和每一時與一食匙

主治右二方四百三十八方聖京掘性咽喉嫩衝用フ

○第四百四十方

屋施茂兒

桑椹舍利別二

右調勻時々服一茶匙

主治扁桃腺嫩衝懸壅垂嫩衝或ハ食道頭嫩衝皆其病勢

中等ノ者ニ用ノ

○第四百四十一方

遠西方藥
卷四
咽喉燉
二
廣
丹

○地榆越仙祭亞錢一 過兒抱舍利別三
右調勻每四分時服一食匙

主治聖京偃性扁桃腺燉衝或八懸壅垂燉衝用フ

○第四百四十二方同上

地榆越仙祭亞錢二

右取十五滴和砂糖令之令漸徐溶解

主治聖京偃性扁桃腺燉衝或八懸壅垂燉衝用フ

○第四百四十三方

地榆越仙祭亞錢三 孕驗酒石半 吐酒石一 精製度

碌布錢半 煎餚水四 木子貝對藥各半 安寶各半

右調勻每一時服一食匙

主治腸胃性及ヒ膽液性咽喉燉衝宜シ此症吐劑必須

ノ者多シ

○第四百四十四方廣藏索斯

明礬各二 龍腦各二 白糖一

右調和為散分十包每日服二三包煎水四

主治扁桃腺燉衝癖習トナル者之宜シ

○第四百四十五方拔爾列度名地別兒

癒瘡木脂末錢三 亞刺昆亞護護漿 砂糖舍利別各二

桂水 常水各四

右調勻每二時服二勺

主治別兒名格兒利爾同上加爾損上等扁桃腺焮衝ノ奇方

トシテ之ヲ賞用ス○方中癒瘡木脂ノ量過多ナリ

第四百四十六方

本精製礞砂 精製度碌布各三錢吐酒石一錢 蒸餾水四

右調勻溶化

○右調勻每二時服一食匙

主治耳後腺焮衝ニ用フ○但棉布若クハ弗刺溼兒ノ毛布

ヲ以テ患所ヲ被覆スベシ○焮衝勢及ヒ熱勢甚シキ片

ハ精製礞石ヲ用フベシ○其熱腸胃性ヲ帶フル者ハ解

釋劑四十九方至五十三方緩下劑又症ニ從テ吐藥ヲ用フ神經性

ニ傾ク片ハ默栗薩葉若クハ纈草浸ニ民埵列里精ヲ加

フル者小量龍腦等ヲ與フベシ

○第四百四十七方

本大麥煎引十六屋施茂兒引一

右調勻為含漱劑

主治咽喉焮衝中等ノ症此方適應スル者多シ

○第四百四十八方

接骨木花浸引十 硝石或礞砂半錢 屋施茂兒二錢

右調和供含漱劑或射注劑

遠方藥
西方藥
卷四
咽喉喉衝
三十一
廣用
堂

主治扁桃腺及ヒ懸壅垂喉衝若クハ食道頭喉衝中等ノ

症ニ宜シ兼テ弗刺涅兒名布ヲ以テ厚ク頸圍ヲ纏ヒ確

砂揮發膏ヲ塗擦シ症ニ準シテ頸圍ニ放蟻スベシ

○第四百四十九方〔寄龍鱗〕吐酒石一ト蜜一ト

撒爾非亞葉半ト錦葵葉半ト右判為含漱劑料〔別連〕

○主治聖京倔性咽喉喉衝ニ宜シ

○第四百五十方〔別連〕與マ〔別連〕接骨木花半ト無果花一ト牛乳煮沸者適宜浸漬

右濾過取一匕為含漱水又或ハ藥ヲ用マ〔別連〕

○主治聖京倔性咽喉喉衝ニ宜シ

○第四百五十一方〔微兒那地羅遠秘的印〕吐酒石二ト至三ト蒸餾水一匕溶化加後藥

蜜去泡沫右調和為含漱水

○主治頑固ノ癩麻質斯性或ハ聖京倔性咽喉喉衝他藥効

ナキ者之ニ宜シ○又羅遠秘的印名ハ緩慢ナル鼻孔閉

塞殊ニ鼻孔甚乾燥ヲ覺ユル者ニ吐酒石溶水ヲ射注シ

テ良効ヲ得タリト云フ

○第四百五十二方

遠方藥

卷四

三十一

廣用

堂

接骨木花子一 熱湯適宜浸濾取六子放冷加後件
地榆丁幾錢二 屋施茂兒子一
咽喉焮衝
廣胆

○接骨木花子一 熱湯適宜浸濾取六子放冷加後件

地榆丁幾錢二 屋施茂兒子一

右調和為含漱水

主治咽口聖京偃性疾患扁桃腺及心懸壅垂ノ腫瘍ニ用

○第四百五十三方〔猊歌蘭度〕

撒爾非亞葉 接骨木花各半 井水適宜煮沸濾取二

北加後藥

地榆越仙祭亞子一 生明礬錢三

右調勻為含漱劑或射注劑〔宜〕

主治聖京偃性咽喉焮衝ニシテ扁桃腺若クハ懸壅垂ノ

焮衝未退カザル者ニ宜シ

○第四百五十四方〔福偃篤〕

生明礬錢一 撒爾非亞水子六 地榆丁幾子半 桑椹舍利別

右調和供含漱

主治虛性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十五方〔同上〕

白地榆根子半 裸麥子六 井水適宜煮沸濾取八子加後藥

別爾篤焚丁幾錢六 玫瑰蜜子一

遠西方彙 卷四 三三 廣半

右調和供含漱

主治虚性麻痺性ノ咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百五十六方辰兒

明礬ニ 撒爾非亞葉煎六ヲ溶化加後藥

玫瑰蜜一

右調勻為含漱水

主治虚性咽喉焮衝ニ宜シ ○血兒百奧名ハ指頭ヲ濡ホ

シテ明礬末ヲ附著シ焮衝セル粘液膜上ニ塗附スル

毎日二回次テ明礬溶水ヲ以テ含漱セシム

○第四百五十七方穢歌蘭度

生明礬ニ

井水北一

桑椹舍利別一

右調勻朝夕含漱

主治習癖咽喉焮衝ニ宜シ兼テ弗刺涅兒若クハ絹ヲ以

テ頸圍ヲ絡纏シ且冷水ヲ以テ毎日頸ヲ洗ハシム

○第四百五十八方福儂篤

主蒼草穂常用加密列各半井水適宜者沸濾過取ハ

蓬砂錢 玫瑰蜜一

右調勻供含漱

○主治咽喉潰瘍ニ宜シ

○第四百五十九方別連杜

撒爾非亞葉半 熱湯適宜浸濾過取六勺加後藥

格魯林水半 玫瑰蜜一

右調和供含漱或射注

主治虛性咽喉焮衝及鴛口瘡宜宜煮藥數日

○第四百六十方遠突土

撒爾非亞葉 秘格爾需漢葉各半 熱湯適宜浸濾取

六勺放冷加後藥

發烟海鹽精一 錢 桑椹舍利別二

右調勻為射注藥

主治寒壞疽性咽喉焮衝二用フ

○第四百六十一方同上

寒製幾那越幾斯二 撒爾非亞水二 甘海鹽精二

玫瑰蜜一

右溶和振蕩以筆塗患處

主治寒壞疽性咽喉焮衝二用フ

○第四百六十二方同上

赭色幾那粗末 井水適宜煮濾取四勺放冷加後藥

沒藥丁錢一 山萸菜精二 桑椹舍利別六

右調和振蕩為射注藥

主治小兒寒壞疽性咽喉焮衝ニ用フ

○第四百六十三方骨布

硝銅礬ハ 薩毘那水ハ 六子溶化

右為含漱劑

主治慢性咽喉焮衝ニ宜シ

○第四百六十四方

水銀硬膏錢三 失鳩答硬膏半 草零陵香硬膏一

右捏和攤革貼頸圍

○第四百六十五方

硝砂揮發膏一 舍電阿芙蓉液錢一

右調和塗頸圍

○第四百六十六方

硝砂揮發加龍腦膏一

右為塗擦劑

主治右二方咽喉焮衝ヲ解散ス或ハ弗刺涅兒ヲ此軟膏

ニ醃ンテ頸圍ニ貼スルモ亦可ナリ

○第四百六十七方

亞麻仁四 錦葵葉 遏兒托葉各一

右細末調和常水或乳汁煮為韃布

主治咽喉焮腫將ニ醃膿セントスル者之ニ宜シ○此他

遠西方彙
卷之四
咽喉喉衝
三十五
廣
胖
堂

裸燕麥ノ琶布ヲ以テ慰スルモ亦最簡易トス○或ハ温
煖緩和ノ蒸氣ヲ吸引セシムベシ

○第四百六十六式

主無...

重...

古...

○第四百六十六式

遠西方彙卷之四

遠西方彙卷之五

獨乙ノハ加幾安頓ノ著

和蘭ノ傑ノ婆都ノ譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

腦煖衝エンセハリチス羅ヘルセ

刺絡及ヒ顛顛耳後或ハ項窩蟻鍼頭上寒卷四百六灌水及

ヒ瀉水浴蓋瀉水浴ハ衝動シ易キカ故ニ之ヲ施スハ最小

心ヲ要スベシ其水高キヨリ瀉スル片ハ殊ニ然リヲ行ヒ

遠西方彙

卷之五

廣

或ハ之ニ兼テ脚湯ヲ施ス等皆腦燉衝第六等療法トス然
 レモ消石硝砂芒硝瀉利鹽及ヒ其他如瀉下鹽類九方四百六十
 方又大量ニ與ヘテ毎日大便二三行ヲ得シコ亦急ルベ
 カラス而後甘永十四百七一二日ヨリ三日至一時毎ニ服セ
 シムベシ甘永ハ飲クヘカラザル症多シ兼テ又兩足ニ温
 煖布ヲ貼スベシ安度刺兒氏ノ説ニ據レハ腦燉衝生力
 亢進セル症ニ皮膚刺戟法ヲ以テ誘導ノ効ヲ要スト云フ
 其説甚信シ難シ何トナレバ皮膚ニ彌蔓セル神經末端ヲ
 刺戟スレハ腦モ亦同ク之ヲ感受スルニ由テナリ○生力
 沈伏セル者ハ全ク上法ト異ニシテ瀉水浴ヲ行ヒ頭髮ヲ

或ハ之ニ兼テ脚湯ヲ施ス等皆腦燉衝第六等療法トス然
 廣 胖 堂

剃リテ大發疱膏ヲ貼シ或ハ之ヲ項窩若クハ肩胛間ニ貼
 シ又腓腸ニ蒸餅母ヲ貼スル等皆相當ノ治法トス此ノ如
 キ症ニ於テハ亞兒尼十四百七花十七方ヲ内服セシムル者屢之
 アリ

○第四百六十八方 宿繆宿繆結爾結爾寒卷法

粗製消石三硝砂半冷水四北溶化加醋一匙

右調和四折若六折麻布醃為頭上寒卷法每五密扭篤乃
 至十密扭篤換之

主治腦燉衝頭腦激動頭創等ニ宜シ

○第四百六十九方

廣 胖 堂

瀉利鹽引一

右過爾拖根煎入ヲ溶化每半時服一食匙乃至二食匙以至得下

主治腦焮衝刺絡后之ヲ用フルニ宜シ○腦焮衝頭上

ニ蟻鍼及ヒ寒菴法ヲ施シテ後腸ニ誘導スルヲ最簡要

ナルカ故ニ鹽性瀉藥ヲ用フルヲ妙トス其効實ニ精製

消石精製硃砂等ニ優レリ

○第四百七十方辰兒

瀉利鹽引一 麥芽飲附三 吐酒石引三 阿芙蓉

陳氏丁幾引三

右溶和每一時服一小盞以至得下

主治腦或ハ眼ノ焮衝ヲ治シ又腹内ノ痙攣性閉塞症ニ

宜シ

○第四百七十一方

精製消石錢二 芒硝引半 井水六ヲ溶化加覆盆子舍利

別六錢

右和勻每半時服一食匙

主治腦焮衝及ヒ其他焮衝諸病ニ宜シ

○第四百七十二方

甘汞引一 白糖引半

廣西方彙

卷五

廣半堂

右調和為散等分六裹每一時服一裹

主治之ヲ與ヘテ多量ノ大便數行ヲ得ルニ至ルヘシ或ハ瀉下ノ効ヲ扶ケンカ為ニ各裹ニ葯刺巴根二瓜ヲ加ヘ若クハ旃那葉ヲ兼服セシムヘシ

○第四百七十三方〔依魯毘秘骨弗〕

蘆根 答麻林度各一 井水適宜煮濾過取八弓和芒硝

二錢再加後藥

覆盆子舍利別半

右合勻每半時服二食匙

主治腦燉衝ノ下利止ムヲ早キニ過グル者之ニ宜シ

○第四百七十四方〔同上〕

亞兒尼加根錢三 纈草根錢二 熱湯適宜浸漬濾取八弓

加後藥

亞刺毘亞蘆謨漿地亞格實溫各半

右調和每一時服二食匙

主治腦燉衝下利ヲ兼併セル者及ヒ將ニ神經症ニ移ラ

ントスル者之ニ宜シ

○第四百七十五方〔同上〕

搭綸僕根錢三 井水適宜煮投纈艸根三錢濾取八弓再

加後件

遠田方集 卷五 廣野堂

單方桂水 亞刺昆亞趨護漿 各一

右和勻每半時服二食匙強

○主治同上十五方同上

○第四百七十六方同上

重兒尼加根 熱湯 浸漬過取八勺加後味溶

古時化

精製礪砂 白糖

右調勻每半時服一食匙

主治腦燄衝神經性ヲ兼子且下利シ生力將ニ脱衰セシトスル者之ニ宜シ

○第四百七十七方 同上

亞兒尼加花 熱湯適宜浸漬過取六勺加後味

吐酒石 孕礬酒石

右調勻每一時服一食匙

主治腦燄衝生力抑壓セル者之ニ宜シ

甲酒狂 此症固ヨリ真腦燄衝ト看做スベカラスト 雖蓋腦燄衝ノ

一種變化セル者ナリ故ニ大率腦燄衝ノ治ニ準メ療スベ

シ但刺絡ヲ要スル者ハ鮮シトス顛顛若クハ耳後蟻鉞頭

上寒罨法等切須ノ症多シ腸胃汚物ヲ兼併セル者ハ孕礬

酒石醋酸加里等ノ如キ解釋劑ヲ用フベシ但老利兒水ト
 配伍スル者最適當トス吐藥四百八方ヲ與フル醫アリト雖
 然モ些ノ吐酒石四百八方ヲ用ヒテ微々嘔氣ヲ促スヲ更ニ
 好トス衰弱甚シキ者ハ纈艸浸ニ鹿琥精ヲ和スル者更兒
 尼加花浸四百七十三方等ノ如キ衝動劑ヲ用ヒ加之慎テ
 時々些ノ燒酒ヲ飲ムヲ許スベシ又鑛酸類四百八方ハ確實
 ノ益アリ輓近實艾答利斯四百八方及ヒ羌活四百八方ヲ稱譽
 スル者屢之アリ私倒偃頓忽布丁幾ヲ賞用シ拂來法乙
 爾及ヒ佛祿繆兒列爾並ニハ非阿斯越幾斯弗血兒仙ハ
 硃砂華遠突土名ハ阿魏ヲ賞贊セリ此他不眠ヲ治スルヲ

專ニスヘシ但先清涼劑下劑等ヲ用ヒテ後阿芙蓉四百八

至四百八方ヲ與ヘテ尤佳ナリ○私珍鎮偃氏一種ノ療法ヲ

作為セリ其法瀉下アラザル者ハ炭酸剝篤亞斯六氏乃至

七氏ヲ取り煨製麻偃涅失亞十氏ト配合シ一時毎ニ粘滑

飲液ヲ以テ送下セシメ每服後冷水ヲ飲マシム六時乃至

十二時ヲ經テ后水瀉スレ凡患者意識本復セズ或ハ戰慄

休マザルキハ復前ノ方法ヲ施シ項窩ニ羌膏膏ヲ貼ス諸

証緩解スルキハ前方ヲ與フル一時半毎ニシテ而シテ羌

膏膏ヲ去ラシム但尚瀉セザルキハ四分三時毎ニ又前方

ヲ與フ固ヨリ瀉スルノ症ハ煨製麻偃涅失亞ニ代ヘテ牡

蠣末十匁ヲ以テ炭酸剝篤亞斯ニ和用ス之ヲ施シテ大抵
 第二日第三日ニ至リ食欲ヲ生ズ此時ニ至リ蒸餅菜蔬肉
 類ノ如キ食餌ヲ喫セシムルニ宜シ亞兒篤麻地名ノ病院ニ
 於テ此法ヲ用ヒテ二十三人ヲ療ヌ其二十二人ハ二日乃
 至六日ニシテ治シ他ノ一人ハ六時ヲシテ全愈セリ

○第四百七十八方依拂詔歷
 炭酸剝篤亞斯錢半 新鮮枸橀汁適宜飽和更加後件
 井水九 覆盆子舍利別一
 右調勻每一時服ニ食匙

主治酒狂症全身熱シ頭上及ヒ肝臟ニ畜血アル者之ニ

宜シ

○第四百七十九方同上

純精酒石一 消石一 朱砂二

右調勻為散等分十二裹每一時乃至一時半服一裹

主治酒狂症ニ用ヒテ神經系ノ刺衝ヲ減殺スルニ宜シ

刺曹私 此方ノ效驗ヲ確定セリ

○第四百八十方依魯思秘骨弗

蘆根 蒲公英根各一 水適宜煮濃過取八弓溶後藥

○瀉利鹽六

右調和每一時服一食匙乃至二食匙

〔主治〕酒狂症ノ初期便秘スル者ニ宜シ

○第四百八十一方

吐酒石六分至八分

右蒸餾水四勺溶化毎半時服一食匙

〔主治〕酒狂症之ヲ連進シテ吐ヲ得後患者安靜シ或ハ安

眠スルニ至ルベシ○過兒栗屈的兒名ハ患者ヲ温湯中

ニ坐シテ灌水セシムルヲ称用ス

○第四百八十二方〔僻刺歌秘〕

吐酒石四分

阿芙蓉丁幾錢ニ

龍腦密幾私去爾

右調勻毎一時服一食匙

〔主治〕酒狂病ニ宜シ○頭腦ニ實性ノ畜血アル者ニ用フ

ル片ハ僻刺歌秘名吐酒石ノ量ヲ加増シテ阿芙蓉ヲ減

殺ス之ニ反スル者ハ神經証ノ過盛セル所ヲ制ス○通

例吐酒石五勺乃至六勺ヲ取り水五勺乃至六勺ニ溶解

シ半時毎ニ一食匙宛與フ○求兒度別爾僻名ハ毎服吐

酒石半勺ヨリ二勺至半時若クハ一時毎ニ用フ拔爾屈

蒿仙名ハ人ハ更ニ吐酒石ノ量ヲ加ヘ時期ヲ遠隔シテ之ヲ

用ヒ患者ノ意識本復ノ后モ猶暫ク連服セシム○吐酒

石ニ代ヘテ皓礬ヲ賞用スル者モ亦多シ

○第四百八十三方〔依魯比秘骨弗〕

透... 亞兒尼加花... 熱湯適宜浸漬濾取八寸溶後味... 瀉利鹽... 吐酒石... 蘆根流動越幾斯... 櫻實水... 覆盆子舍利... 右調和每一時服一食匙... 主治熱性酒狂病先頭上... 畜血ヲ制スルノ后之ヲ與フ... 〇第四百八十四方... 硫酸密幾私去爾... 櫻實水... 覆盆子舍利... 別... 右調和每一時服一食匙... 主治酒狂症頭腦ニ神經性畜血アル者之ニ宜シ

亞兒尼加花二錢 熱湯適宜浸漬濾取八寸溶後味

瀉利鹽三錢 吐酒石一錢 蘆根流動越幾斯半寸

右調和每一時服一食匙

主治熱性酒狂病先頭上ニ蟬鍼及ヒ寒罨法ヲ施シ以テ畜血ヲ制スルノ后之ヲ與フ

〇第四百八十四方

硫酸密幾私去爾一錢至一錢半附 櫻實水五寸 覆盆子舍利

別

右調和每一時服一食匙

主治酒狂症頭腦ニ神經性畜血アル者之ニ宜シ

〇第四百八十五方〔苦列秘〕

實芟答利斯半錢至二錢 熱湯適宜浸漬濾取六寸加櫻實

舍利別一多

右調和每一時服二食匙

主治熱性酒狂症ニ宜シ〇之ヲ連服ノ瞑眩ノ候ヲ見ハスニ至ル〇苦列私人名此法ヲ以テ十二人ヲ治セリ噦エ亞ア

私頓人名栲思同祿斯同等モ亦實芟答利斯ヲ称用セリ〇

噦蒲私人名的爾名實芟答利斯ヲ大量丁幾去爾ニ製スル者六十滴以テ一時半中

用二次ニ二與ヘテ患者ヲ睡眠セシム吾輩此法ニ做フ

堪ヘズ八十六

○第四百八十六方思四苓

二 羌活半 一寸 熱湯適宜浸漬濾過取八分放冷加菖蒲根

六 煎丁幾一錢六 實六 苓六 桂六 枝六 木六 薑六 朮六 芍六 藥六 散六 湯六 煎六 湯六 適六 宜六 浸六 漬六 濾六 過六 取六 八六 分六 放六 冷六 加六 菖六 蒲六 根六

右調和每一時服一食匙○

主治 酒狂症二 宜シ 八寸 枝六 芍六 藥六 散六 湯六 煎六 湯六 適六 宜六 浸六 漬六 濾六 過六 取六 八六 分六 放六 冷六 加六 菖六 蒲六 根六

○第四百八十七方按爾屈蒿

精製阿芙蓉半 二白糖半

右調勻為散分十二裹每一時服一裹

主治 酒狂症二 宜シ ○若效アラザル片ハ阿芙蓉ヲ加増

○又每服一丸ニ至リ危急ニ臨ム片ハ更ニ加ヘテ二丸ニ

至ル此ノ如キ大量ノ阿芙蓉ヲ服スル一四次ニノ猶眠

ヲ得ザル片ハ再減ノ一丸若クハ半丸トナシ之ヲ持重

ノ分利ノ期ニ至ルヘシ此療法ヲ行テ効驗アラザル片

ハ晩ニ方テ又大量ノ阿芙蓉ヲ與ヘ功ヲ收ムル一間之

アリ但晩ニ大量ヲ與レハ翌日ヨリ服量ヲ減ノ大率半

丸ヲ與フル一日ニ三次ヨリ四次ニ至ル舌上厚苔ヲ帶

ヒ其他腸胃汚物ノ候アル者ハ先吐藥ヲ與ヘ後阿芙蓉

ヲ用フベシ○拈縵人ハ阿芙蓉丁幾ト續草加亞的兒丁

幾附ヲ等分和シ用フ

○第四百八十八方秘幾壯皮蒲

精製阿芙蓉六

吐根十二

白糖一錢

右調勻為散等分六裹每一時服一裹

主治酒狂症先煖衝証或ハ腸胃汚物証ヲ治メ后神經系ノ興奮機ヲ鎮降スルニ宜シ此方ヲ連進メ患者熟睡ヲ得ルニ至リ或ハ病愈増進スルニ由テ阿芙蓉ヲ忌ムベキ時期ニ至ルベシ

○第四百八十九方福僞葛

精製阿芙蓉一人至二人

消石六人至十人

白椒四人

甘草半

右調和為散分十二裹每一時半取一裹稀淡哥喜和服

主治酒狂症ニ宜シ

○第四百九十方繆爾那葛

噶刺扶阿刺越幾斯三人

孕鹼酒石一人

右調勻為散分八裹每半時取一裹冷水溶和服

主治虛性酒狂症阿芙蓉ヲ用フベカラザル者之ニ宜シ

○第四百九十一方依拂朗屈

硫酸亞的兒一鹿角精

薄荷水六

舍電阿芙蓉

液一

右調和每半時服一食匙

主治酒狂症後補劑トシ用フ至癒

乙急性腦水腫

エンセフハリチス。インフアンチユム。エキ
ス。ダトリアヒドロパス。イントキョロ

ム。セレブドリ羅下テ。ヘルセ
シウクトルシユクトル

此症主治蟻鍼一二頭ヨリ三頭至病兒ノ年齢ニ準ノ兩耳
後ニ貼シ後甘汞ヲ實芟答利^{四百九十三方}斯^{四百九十七方}若クハ藥
刺^{四百九十五方}巴^{四百九十五方}配用シ終ニ頭上ニ寒罨法ヲ施スヘシ但昏
睡ノ状アル者ハ一線ノ冷水ヲ差高所ヨリ注下シ小兒ノ
前頭及ヒ顱心ニ灌クヘシ此法歌惰^名人福爾墨乙^同兩大醫
試驗セシ所ニシテ他ノ衆醫モ亦之ニ倣フテ施療セシガ
故ニ余茲ニ書載セザルヲ得ザルナリ然レモ余理ヲ以テ
之ヲ推スニ寒罨法及ヒ水線浴ハ其效ヲ奏スルヨリハ害
ヲ為スコ多シ何トナレハ幼兒ハ寒冷ニ堪ヘザレバナリ

是故ニ里篤曹^名人ハ之ヲ戒シテ謾ニ試用セザラシム宜ナ
ル哉昏睡症ニ衝動藥殊ニ亞兒尼加花^名ヲ内外称用スル^{四百}

九^{十九方}者亦之アリト雖吾ハ信ゼス○弗陽^名人ハ沃曹謨^名

ト甘汞ヲ配伍^{五百}方其吸收機ヲ催進ス弗祿設爾^名及ヒ

他ノ衆醫ハ敝度里阿達斯^名剝篤亞斯^{五百}ニカ^{五百}ヲ用^僕結

爾^名稱^賢セシ所ノ格魯林水ハ他醫ノ試驗ニ在テモ良效

アリシヤ否ヤ吾輩未之ヲ詳ニセズ○洵乙^名滲出ノ時期ニ

方テハ項上或ハ顱心ヲ刺テ芫菁膏ヲ貼シ腓腸ニ煎餅母

ヲ貼シ又吐酒石膏ヲ塗擦スベシ^{五百}

○第四百九十二方遠突土

遠田方書

廣月堂

○瀉利鹽錢二 滿那一 甘扁桃乳四

右溶和每一時服一兒匙若一食匙

主治小兒腦燉衝及ヒ他ノ燉衝諸病ニ清涼下劑トシテ

用フヤ...

○第四百九十三方甲方 護秘蓋

辦那瀉下飲一 苗香水 滿那舍利別 大黃舍利

別各一 芒硝五

右調勻每半時服半食匙乃至一食匙

主治大兒急性腦水腫ノ初期琪鍼ヲ施シ后乙方ト交換

長シ用フヘシ

○第四百九十三方乙方 同上

甘永六 實芟六 荅利六 斯六 至六 一人半 麻偃六 涅失六 亞六

主甘草十

右為散等分十二裹每一時乃至一時半服一裹

○第四百九十四方依魯 秘骨 弗弗

精製消石十五 過兒托 煎三弓溶解加過兒托 舍利別

大半弓

右調勻每一時服一兒匙

主治四歲ヨリ六歲至ノ兒腦水腫ノ初期ニ用フ之ニ兼

テ耳後琪鍼頭上寒罨法ヲ施シ且甘永半弓ヨリ一人至

一時每二服セシムヘシ

○第四百九十五方同上

本藥刺巴末半 甘汞半 白糖五

右調和為散分四服每一時服一服

○第四百九十六方遠矣也

醋酸加里液各一 滿那舍利別各一 煎餾水二

右溶和每一時服一兒匙

主治小兒急性頭水ニ甘汞ト交換シ用フ

○第四百九十七方護利秘

實菱荅利斯八 甘汞八 乳糖四

右調和為散等分八服每一時服一服

○第四百九十八方同上

過兒托葉三 實菱荅利斯四 熱湯適宜浸漬濾過取

三弓半加阿訥尼私舍利別半弓

右調勻每半時服一兒匙乃至二兒匙

○第四百九十九方同上

重兒尼加花半 熱湯適宜浸漬濾取三弓加後味

橙皮舍利別半 甘消石精六

右調勻每一時服一兒匙

○主治小兒急性腦水腫末期ニ宜シ

透冊丸膏 卷五 腦水腫 癩 疔 瘡

○第五百方〔設傑濕優湯〕 末敗二宜

大聖兒尼加花半 熱醋三 熱湯五

右浸漬後煮沸暫時濾過放冷供頭上寒癩方須數次換之

主治小兒急性頭水二宜兼テ聖兒尼加花浸劑ヲ內服

セシムヘシハ

○第五百一方〔弗陽〕 一良ハ至二良

沃胃護十六分 甘汞 實芟谷利斯各半 白糖半

右調勻為散分八覆每一時半服一覆

主治小兒急性腦水腫洩乙滲出ノ時期ニ用フヘシ

○第五百二方〔弗呂設爾〕 其一規一是一

敝度里阿達斯剝篤亞斯一錢至

右煎餹水一弓溶和每一時服三十滴乃至四十滴

主治三歲乃至七歲ノ兒急性腦水腫洩乙滲出ノ時期ニ

用フヘシ○屑矣歇爾土秩篤里屈同遏別兒目沈茂爾

滿同弗劉埤爾同屋尼傑爾同等モ亦敝度里阿達斯剝篤

亞斯ヲ稱用セリ且ハ

○第五百三方〔遏茂綸僂〕 一良

敝度里阿達斯剝篤亞斯半 煎餹水三弓溶解加砂糖

舍利別一弓

右調和每一時服一兒匙

主治 三歲乃至四歲ノ兒ニ用フベシ

○第五百四方 抄垣福爾母湯兒度地僕結爾

格魯林水 各一 蒸餾水 砂糖舍利別 各一

右調和收磁器每半時服一兒匙

主治 急性頭水ニ宜シ殊ニ七月乃至一歳ノ兒ニ供用ス

ヘシ更ニ年長ノ兒ニ與フルキハ格魯林水ヲ加増メ一

引ニ至リ又大食匙ヲ以テ服セシムベシ○僕結爾 各一

病ノ初起ニ之ヲ用ヒテ脈管ノ壓迫ヲ退ケ又湧乙滲出

ノ期ニ用ヒテ其吸收ヲ催進セシム之ニ兼テ蟻鉞寒菴

法ヲ怠ルナカラシム瀉ヲ促スハ複方旃那浸 附ニ宜

シ

○第五百五方 密振苦麻倚爾

吐酒石膏 各一

右每一時塗擦顙頭及項窩

主治 甘永ト内外兼用ス○窒兒失篤 地ノ首歇爾土人ハ

密振苦麻倚爾 各一 教示ニ據リ十四箇月ノ兒急性ノ内

部頭水症ニ此方ヲ試用シ第四日ニ方テ始テ疹ヲ發シ

昏睡及ヒ其他頭水諸証悉ク消散セリ之ヲ塗擦スル

六日ニ至リテ其疹潰膿シ痛最甚シク五週ニシテ平治

セリ

○第五百六方

阿訥尼松根錢水適宜煮濾取四勺加後件各半

大黃水製丁幾各半苗香舍利別各半

右調勻每一時服一兒匙

主治四歲乃至六歲之兒急性腦水腫本復ノ期ニ及テ利

尿及ヒ飲食ノ消化ヲ扶クルニ用フ

脊髓燉衝メイトリス スロオシト スラキ

此症亦消燉法ニ從事スベシ刺絡ヲ施シ水蛭十五頭ヨリ

二十頭至脊椎ニ沿フテ貼スベシ或ハ吸角法ヲ施シテ更

ニ適當トリトス而ノ後脊椎ニ寒罨法ヲ行ヒ内服ハ精製

消石九方至十五方。十七方。三百八十二方。及ヒ清涼下劑十五方

至六十六方後甘永一瓜ヨリ二瓜至一時每ニ與ヘ依拂朗屈

名ノ法ニ從テ亞兒尼加花浸モ亦用フヘシ脊椎ノ兩側ニ

水銀膏ヲ塗擦シ每一時一錢瀉藥ヲ灌腸シ又發疱膏ヲ貼ノ

久シク癒ザラシムベシ若生カ虚弱ニシテ分利機ヲ起スニ

足ラザル者ハ依拂朗屈名龍腦磁鉄華ヲ配用シ並ニ的列

並油ヲ加ヘタル灌腸方ヲ彌贊セリ

○第五百七方依拂朗屈

的列並油半錢蜜八加密列浸六

右調和供灌腸

遠西方彙 卷五 十一 廣 堂

透肌膏
卷五
胃疾衝
十七
廣
月
堂

胃疾衝 カストリチス 羅マーグ
オントスライキング 蘭

胃疾衝ニ數次多量放血スルハ適當ナラストス何トナレ
ハ此症血實ニ因ル者僅少ニモ患部知覺過敏ニ因ル者多
クレハナリ大抵少量刺絡ヲ行フ一廻後蟻鍼ヲ施メ足
レリ但蟻鍼ハ數多ク厭ハス且數次之ヲ施スニ宜シ蟻鍼
ハ胃ノ上部ヲ撰テ施スベシ然レモ痔疾内陷或ハ月經閉
止ニ因スル者ハ肛門内股或ハ陰部ノ近圍ヲ好トス内服
ハ假令極メテ緩和ノ藥品ト雖モ大抵胃之ヲ受クルニ堪
ヘズ唯氷ヲ碎キテ胡桃子大ト作シ服スレバ良效ヲ奏シ
且煩渴ヲ消ス但之ヲ喫スルニ暫時之ヲ口中ニ含ミ尖角

ノ融消スルヲ待テ嚥下スベシ而後鎮靜ノ乳劑五百方甘永

九方硝酸曹達五百方ヲ稱用シ肚腹ニ緩和蘇劑ヲ行フ患者

若罨法五百方ニ堪フ可クバ之ヲ施スヲ佳ナリトス○胃

疾衝ハ傳麻質斯ノ外部ヨリ内部ニ轉徙スルニ因ル者多

シ此ノ如キハ直ニ胃ノ上部ニ大發疱膏及ヒ肛門ニ蟻鍼

ヲ施スヲ要トス

○第五百八方歌蘭度

甘扁桃油一水八亞刺昆亞護護漿適作乳劑更

加後味

菲阿斯越幾斯六扁桃乳舍利別半

右調勻每半時服一食匙

主治刺絡及ヒ局處ノ瀉血殊ニ吸角法ヲ行フテ后ハ之

ヲ無比ノ良法トス患者能ク之ヲ受ルニ堪フ兼テ胃部

ニ鎮痛ノ罨劑及ヒ擦劑ヲ施シ蒸餅母及ヒ芫菁膏ヲ貼

シ又緩和灌腸微温全身浴ヲ行フベシ飲料ハ乳汁ニ水

ヲ和シ用フ蓋酪餘ヲ最佳トス

○第五百九方 列設爾

甘永 白糖 各一匁 至半錢

右調和為散分ニ晝朝服ニ晝又隨其症晚服ニ晝

主治胃ノ粘液膜燉衝ニ宜シ安温私戾名過爾謨私德懇

偃同上等モ亦之ヲ稱用セリ若瀉劇シキ時ハ阿芙蓉一匁

乃至二匁ヲ與フベシ列設爾名ノ經驗書中ニ詳ニスル

力如ク此方ヲ以テ此症ヲ療スル片ハ二三日ニノ復治

シ殆他藥ヲ要スルヲナシ又之ガ為ニ惡証ヲ挑起スル

ヲナシト云フ然レモ實性胃燉衝ニ此ノ如キノ大量甘

永ヲ與フレハ恐ラクハ危險証ヲ發セシ小量ニ用フル

片ハ下利スルモノハ其效誤ルヲナシ三百九十四方殊

ニ慢性胃燉衝ニ宜シ

○第五百十方 同上

硝酸曹達 二錢至三錢 過爾名煎六匁溶和

右每半時若一時服一食匙

○主治腸胃ノ粘液膜焮衝ニ先瀉血メ后之ヲ用フ又甘汞

連服ヲ忌ム者之ニ宜シ

○第五百十一方

亞麻仁 遏爾托根 常用加密列 錦葵葉 草零陵

香葉 各半

黑菲阿斯葉

右細剉調和取其一分水或乳汁煮為罨劑

腸焮衝

此症腸中諸膜焮衝ト粘液膜焮衝トノ別アリ

○諸膜焮衝 胃焮衝ト同ク瀉血多量ナル

勿レ大抵刺絡一次ニ足レリ刺絡ノ後痛所或ハ症ニ隨

テ直腸若クハ内股蟻鍼ヲ貼ス但蟻ノ多少ハ適宜ニ消息

スベシ蓋患部琶布罨劑五百十一方ニ堪ヘザル者多シ弗

刺濕爾毛布ヲ湯ニ醮シ絞リテ腹上ニ安シ數次之ヲ換フ

ルニ宜シ内服ハ甘汞四百七方ヲ第一トス之ヲ阿芙蓉ニ配

スルモ三百九方亦佳ナリ然レモ二品ヲ分テ各別ニ用フレ

ハ更ニ適當ス何トナレバ甘汞ハ通例一時毎ニ一瓜乃至

二瓜ヲ用ヒ阿芙蓉ハ疼痛ハ劇易及ヒ其他ノ証狀ニ準シ

テ一日ニ唯二三回多キモ四回ニ過キス其量モ亦半瓜乃

至一瓜ニ止マレバナリ之ニ兼テ緩和藥油質粘滑藥乳劑

二老利兒水ヲ加フル者等ヲ服セシムニ五百十或ハ菲阿斯
 越幾斯ニ五百十或ハ舍電阿芙蓉液ニ五百十モ亦配伍スベシ
 大便ヲ促スハ亞麻子油ニ五百十ヲ用フベシ蓖麻油ニ五百十
 九方十八更ニ佳ナリ鹽類ハ通例害アリ設令之ヲ與フルモ
 必油質藥ニ和スルヲ好トスニ五百十又緩和灌腸ヲ施スベ
 シニ五百十六方至冷水灌腸モ亦良效ヲ奏スルヲ屢之アリ
 又水銀膏半錢ヨリ一錢至或ハ之ニ菲阿斯油ヲ和シ一時
 乃至一時半毎ニ徐々下腹ニ塗擦スルニ宜シ
 粘液膜ノ急性焮衝症ニアキユエンテハ刺絡ヲ要スル者
 罕ナリ大抵下腹ノ痛所ニ蟬鍼ヲ施メ足レリ内服ハ油乳

透而為膏
 卷五
 腸焮衝
 十一
 廣
 脾

二老利兒水ニ五百十菲阿斯ニ五百十或ハ阿芙蓉ニ五百十
 方ヲ加フ甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍スル者ニ三百九亦良效ヲ奏ス
 ルヲ屢之アリ外用ハ水銀膏及ヒ緩和灌腸ヲ佳トス○慢
 性粘液膜焮衝症ニアキユエンテモ亦上ノ治法ニ同シ經
 久過度ニ瀉スル者ハ硝酸銀溶液ヲ加ヘタル灌腸ヲ稱譽
 セリニ五百十

○第五百十二方
 白罌粟子ニ三錢至加黑櫻實水四勺乃至六勺搗爛作
 乳劑後加左藥

老利兒水一錢至白糖ニ半錢至

遠西方藥
 卷五
 廣
 脾

通西方藥 卷五 腸坂街 二十一 廣月堂

右調和每一時服一食匙

○第五百十三方

甘扁桃油半 亞刺昆亞護護漿宜適 加黑櫻實水四

○第五作乳劑後加左藥

非阿斯越幾斯四 邊兒抱舍利別半

○右調勻每一時服一食匙

○第五百十四方

甘扁桃去皮 加黑櫻實水六 研碎作乳劑後加左藥

舍電阿芙蓉滴 白糖六錢

右調勻每半時乃至一時服一食匙

主治第五百十二方ヨリ五百十四方至腸炊衝ニ用ヒテ

刺衝。痙攣。疼痛。ヲ緩和鎮静スルニ宜シ。○高醫私保福傑

爾名數回經驗セシ說ニ據ルニ純粹腸炊衝ニ瀉血シテ

后ハ阿芙蓉ニ勝リテ效ヲ奏スルモノナシ患者體質虛

弱ニメ病因僂麻質斯ニ在ル者ノ如キハ殊ニ然リトス

阿芙蓉ニ含畜セル華爾斯質ヲ惡ムキハ福傑爾氏水製

越幾斯ヲ與レ若之ヲ吐スル片ハ灌腸藥ニ和メ用フベ

シ○甘永阿芙蓉ノ合劑三百九十四方モ亦能ク適當ス

○第五百十五方 誤抄

精製阿芙蓉半 亞刺昆亞護護末 白糖六

通西方藥 卷五 廣月堂

右調勻為散分六裹每服一裹日二三次乃至四次

主治腸燠衝瀉血シテ后疼痛ヲ減シ神經系ヲ鎮靜スル

○第五百十六方

龍腦ニ人至 精製阿芙蓉人 白糖カニ

右調和為散等分四服每日三四服

主治腸燠衝症燠衝ノ勢已ニ退テ后之ヲ用フ其症痿麻

質斯ニ因スルハ殊ニ佳ナリ

○第五百十七方

新製亞麻子油

右每一時與一食匙

○第五百十八方

蓖麻油

右每一時與一食匙

主治右二方ハ刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施シテ后用フベシ

之ニ兼テ緩和鎮痙罨法ヲ施シ水銀膏或ハ菲阿斯油ト

阿芙蓉丁幾ヲ合和シテ肚腹ニ塗擦シ三時毎ニ油質粘

滑藥ヲ灌腸シ又微温浴ヲ施スヲ尤佳トス後肚腹ニ大

發疱膏ヲ貼スベシ

○第五百十九方

蓖麻油一

亞刺昆亞護謨漿適

加黑櫻實水四為

乳劑再加後味

費滿那舍利別半為

右調勻每一時服一食匙

主治腸癩衝症瀉ヲ促スニ用フ本藥膏ハ非洲諸國ト

○第五百二十方過儼栗屈的爾瀉利鹽半水三半溶化加後藥

亞麻子油半阿芙蓉丁幾九滴罌粟舍利別半

右調和每四分時服一食匙

主治腸癩衝症瀉減シテ后瀉スル者之ニ宜シ○予按

スルニ此方用フルニ堪ヘザル者多カラシ

○第五百二十一方弗陽

白罌粟子半菲阿斯子錢加菩提樹花水四搗爛

為乳劑加後味

硝砂錢亞刺昆亞護謨半扁桃乳舍利別半

右調和每半時服一食匙

主治腸癩衝刺絡及ヒ局處瀉血ヲ施メ煥衝已ニ去リ衰

弱弛緩復セス血及ヒ粘液畜積セル症ニ宜シ即腸ノ感

覺過敏ニノ尋常ノ刺戟物モ食感動銳敏ニノ鈍痛壓迫

スルカ如ク脈疾ニノ緊ヲ帶フル者はナリ良醫福傑爾

氏ノ論言ニ云ク腸焮衝ニ硝砂消石ヲ用ヒテ總テ鹽類ヲ與フルト勿レ灌腸モ亦復然リト善哉言也

○第五百二十二方〔謨秘篤〕

甘汞一 失鳩六 荻若葉二 金硫黃半

白糖一

右調和為散分十二裹每服半裹乃至一裹日三次

主治腸焮衝末期下腹ノ一處疼痛ノ發シ腸將ニ硬固質

ニ變セントスル乎或ハ生着ノ懼レアル者之ニ宜シ○

之ニ兼テ水銀膏ヲ塗捺スベシ

○第五百二十三方〔謨秘篤〕

蘆根流動越幾斯 蒲公英流動越幾斯各一錢 精製

孕鹼酒石半 蒸餾水四

右調勻每一時服一食匙

主治慢性腸焮衝ニ宜シ○痛處ニ先蟻鍼若クハ吸角法

ヲ施シテ後緩和下劑ヲ與フ但甘汞ヲ内服シ水銀膏或

ハ硝砂揮發加龍腦膏等ヲ交換シ用フベシ

○第五百二十四方〔謨秘篤〕

甘汞 金硫黃各半 菲阿斯越幾斯二 白糖一

右調和為散分十二裹每服一裹日三次

主治慢性腸焮衝ニ宜シ

遠田方藥 卷五 腸液衝 廣 膠 掌

○第五百二十五方

錦葵葉 草零陵香葉 失鳩苔葉 菲阿斯葉 白罌

粟球 各半

○右細剉取其一分水若乳汁煮為罌劑

○主治腸液衝下腹二貼區但罌法ノ如キハ煖衝減スルノ

・后ニアラスハ之二堪ヘザル者多シ 五百十一方ヲ参照スベシ

○第五百二十六方

亞麻子 半 水十弓煮耗至五弓濾過加後藥

亞麻子油 一

右調和供灌腸

○第五百二十七方

蓖麻油 一弓至一弓半

雞子黃 二箇 加密列浸 六

右調和供灌腸

○第五百二十八方

過兒托葉 歇爾拔斯屈謨葉 各一錢

罌粟球 劉者三錢

○三水煮熟濾過取八弓加後藥

亞麻子油 半

右調和供灌腸

○主治第五百二十五方ヨリ五百二十八方至腸ノ痙攣煖

衝。或ハ大便閉腸ノ感覺過敏ヲ兼ヌル者等ニ宜シ

透 西 方 藥 卷 五 腸 痙 攣 二 十 六 廣 濟 堂

○第五百二十九方別連杜

蒲公英根煎 麥糠煎各四 阿魏一錢至二錢 雞子黃溶和者

右調和供灌腸

古蓖麻油二三匙

主治腸痙大便閉止ニ因スル者ニ宜シ

○第五百三十方

結晶硝酸銀一 過爾托煎四 溶化

右供灌腸

主治腸ノ粘液膜慢性痙攣經久下利スル者ニ宜シ○内

服ハ侃私性篤人托歇爾散及ヒ沙列布煎ニ阿芙蓉液ニ

三滴ヲ和スル者ヲ稱用シ又鹽酸鉄丁幾二十滴ヨリ三

十滴至砂糖水ニ和シ與フル一三四次又銘糖格綸僕ヲ

用フ以上ノ諸方效アラザル片ハ硝酸銀ヲ日服スル一

八分一ノ一ヨリ四分一ノ一ニ至ル但侃私性篤氏ハ之

ヲ用フルヲ速ニセズ

痢疾チセンテリア 羅ロシンテリアア 痙攣チセンテリア 痙攣チセンテリア

病學家通例此症ヲ以テ慢性病中排泄異常症ノ屬類ニ充

ツルト雖此症原血中一種ノ病毒ヲ生シ之カ為ニ大腸痙

攣ヲ起スニ因スル一必然ナルガ故ニ之ヲ急性病中ニ算 入シ腸痙攣ノ後ニ論列スルヲ當然ナリトス○單純聖京

透 西 方 藥 卷 五 廣 濟 堂

西... 卷五... 痢... 廣...

偏痢ハ油質粘滑ノ乳劑ニ阿芙蓉ヲ幾ラ加フル者五百三
至五百三阿芙蓉ヲ吐根ト配伍シ五百三或ハ甘朮ト合和
セル者五百三吐根浸劑五百三若クハ吐根乳劑五百三等
ヲ與フルヲ要トス昔者蠟ヲ加ヘタル乳劑五百三
方ヲ稱用セリト雖方今廢棄シテ用フルヲナシ五百三憑稜列名
ハ雞子白ヲ稱贊セリ五百三之ニ兼テ下腹ニ燕麥粉若ク
ハ緩和藥ノ温暖毳布ヲ施シ疼痛劇甚ナレハ菲阿斯葉或
ハ矢鳩蓉葉ヲ之ニ加フ五百三○煖衝性痢ハ刺絡
ヲ缺クベカラズ並ニ下腹肛門或ハ會陰ニ琪鐵ヲ施シ油
質粘滑ノ乳劑ヲ用フベシ但瀉血ヲ以テ煖衝ヲ制セシ后

ハ阿芙蓉ヲ加フルニ宜シ又輓迄ニ至リテ屢々硝酸曹達
五百三稱譽ス○膽液性痢ハ初ノニ吐劑五百三
用フルヲ最適當トス而後油性粘滑劑五百三阿芙蓉ヲ
配用スルニ宜シ甘朮ハ茲ニ偉效アリ但症ニ應ノ之ニ阿
芙蓉ヲ加減スベシ五百三瀉藥ヲ要スル片ハ苔麻林度五百三
カ五百三阿沒勒酒酸加里曹達等ノ如キ緩和清涼酸性ノ者ニ
宜シ○粘液性痢ハ大抵阿芙蓉ヲ用ヒテ的效アリ番木鱉
五百三及ヒ菲阿斯越幾斯モ亦偉效アリ○神經性症ハ顯
草攝爾扁太里亞白芷龍腦麝香及ヒ他ノ衝動藥ヲ稱贊ス
ト雖モ吾輩ハ之ヲ信セス粘滑油質劑吐根小量阿芙蓉等

ヲ以テ更ニ緩裕ノ治ヲ處スルヲ妥帖トス○腐敗痢谷亞

兒尼加根五百五十三方龍腦紐百設木五百五十五方葛蒲根格綸

僕幾那等尤適當藥トス昔者賞用セシ所ノ明礬ノ如キハ

須要ノ症稀ナリ五百五十八方弗陽名明礬又試驗説アリ

宜ク參考スベシ五百五十八方輓近撒里矢捏五百五十七方並ニ鉛糖五百

六十五方ヲ用ヒテ效ヲ得タリ○此他諸種ノ外用方ヲ施又腹

痛裏急後重等ヲ除クベシ五百六十九方至五百七十三方至

○第五百三十一方萊爾鳩秘亞刺毘亞護護漿半丁寧

甘扁桃油錢二鷄子黃筒一亞刺毘亞護護漿半丁寧

捏和加黑櫻實水四ヲ作乳劑再加砂糖舍利別半ヲ

右調和每半時服一食匙半一食匙半

○第五百三十一方同亞刺毘亞護護漿半丁寧

甘扁桃油錢一亞刺毘亞護護漿半丁寧捏和加黑櫻實

水六ヲ作乳劑再加後件一齒香木三ヲ

○砂糖舍利別或過爾托舍利別半

右調勻每四分時服一食匙

主治右乳劑五百三十一方ハ萊爾鳩秘亞刺毘亞護護漿半丁寧

病院ニ於テ流行痢疾ニ稱用セシ所ニ於テ他病ニ於テモ

亦偉效アリ之ヲ他ノ有力ノ藥ト兼用スルハ更ニ佳ナ

遠西本草 卷五 痢 二册 廣 胆 堂

○第五百三十三方〔秘傳。福御所〕

甘扁桃油半 亞刺毘亞護謨一錢 雞子黃一錢 茴香

水一 阿芙蓉丁幾十五 扁桃乳舍利別六

右調和作乳劑每四分時若半時服一茶匙乃至二茶匙

強

○第五百三十四方同上

亞刺毘亞護謨二錢至半 白糖一錢至二錢 茴香水三 溶

化加後藥

○民埵列里精一 阿芙蓉丁幾一

右調和每一時乃至一時半服一食匙強

五百三十三方

主治第五百三十一方ヨリ五百三十四方至單純聖京偪

痢ニ宜シ

○第五百三十五方

精製阿芙蓉 吐根末各二錢至六 白糖四

右調和為散等分八裹每一時乃至一時半服一裹

主治單純聖京偪痢ニ宜シ

○第五百三十六方〔設。優。〕

甘永八錢至十二 精製阿芙蓉二錢至三 牡蠣末二 白糖

右調和為散等分八服每一時一服

遠西... 卷五... 廣... 堂

○第五百三十三方〔秘傳。福傳。〕

甘扁桃油半 亞刺毘亞護謨一錢 雞子黃半一錢 茴香

水一 阿芙蓉丁幾十五滴 扁桃乳舍利別六錢

右調和作乳劑每四分時若半時服一茶匙乃至二茶匙

強

○第五百三十四方同上

亞刺毘亞護謨二錢至半 白糖一錢至二錢 茴香水三 溶

化加後藥

○民埵列里精一 阿芙蓉丁幾一

右調和每一時乃至一時半服一食匙強

主治第五百三十一方ヨリ五百三十四方至單純聖京偪痢一宜

○第五百三十五方

精製阿芙蓉 吐根末各二錢至六錢 白糖四

右調和為散等分八裹每一時乃至一時半服一裹

主治單純聖京偪痢一宜

○第五百三十六方〔設。優。〕

甘永八錢至十二錢 精製阿芙蓉二錢至三錢 牡蠣末二 白糖

右調和為散等分八服每一時一服

〔主治〕痢疾ノ初無熱ノ時期患者腹痛裏急ニ苦シ粘液血ヲ帶ビテ泄瀉シ一種臭氣アリ食欲ヲ失フ者之ニ宜シ其功ヲ收ムルハ大抵上方八服多キモ十二服ニシテ足レリ裏急後重甚シキ症ハ兼テ會陰ニ蟻鍼ヲ施スヲ八頭ヨリ十二頭ニ至ル○求嫪名地ノ選的氏屢此療法ヲ自驗ノ良效アルヲ證セリ○侃私侃私怛怛篤等衆醫甘汞半刃ヨリ一刃至日服セシムルヲ唯一次多キモ二次ニ過ギス

通例此二服ニメ膽液様若クハ綠色ノ大便所謂甘ヲ瀉シ患者大ニ緩釋シ腹痛裏急共ニ減セリ奏効此ノ如キハ復後服ヲ要セス大抵抱抱歇爾散ヲ油性乳劑或ハ緩和

下劑ニ和用シテ全功ヲ收ムルニ足レリ或ハ甘汞一服ニシテ效ヲ得ズ裏急後重等愈加重スル者アリ然ル氏ハ第二服若クハ第三服ヲ服セシム甘汞ハ此種ノ症泄瀉ヲ要スル者ニ殊ニ的効アリ是故ニ總テ流行痢ニ之ヲ試用スト雖更ニ腸胃汚物膽液及ヒ蛭虫ヲ夾雜スル者ハ最宜シトス

○第五百三十七方

吐根粗末一刃 水四弓浸漬濾過加左藥

橙花舍利別半

右調勻每八分時服一食匙

遠古方集 卷五 痢 三十一 慶月 治痢疾ニ用ヒテ瘧癰及ヒ疼痛ヲ鎮定スルノ奇藥ト
ス

○第五百三十八方（弗陽）

吐根錢十 大黃半一錢

注熱湯三弓更煮沸濾過加後味

重刺毘亞護謨錢末一

過爾托舍利別錢三

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕痢疾焮衝ヲ帶ヒス唯微痛ニ止マリ下腹却テ緊脹
スル者之ニ宜シ又脈緩徐ニハ泄出物赤血及ヒ粘液ヲ
帶ヒザル症ニ施シテ佳ナリ若之ヲ用ヒテ大便閉止シ
腹痛愈增長スレハ須ラク大黃ヲ去ルベシ

○第五百三十九方（秘傳）

安質沒尼酒錢三

阿芙蓉丁錢一

右調勻每一時半服二十滴乃至三十滴

〔主治〕單純聖京傷痢ニ宜シ

○第五百四十方（秘傳）

加密列越幾斯

上好重刺毘亞護謨各錢二

加密列水

味用五弓溶化加白罌粟舍利別半弓

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕泄瀉及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十一方

黃蠟半 牛乳熟者半匕溶化

右每一時服一食匙

主治秩茂爾蒲魯屈人及七爾過福傑兒同ハ蠟ヲ熱乳ニ

和用セリ然レ氏私傑福傑兒人ノ言ノ如ク蠟ハ能ク乳

汁ニ溶化セズ且痢疾ニ用ヒテ毎症適當スル者ニアラ

○一千六百三十五年蒲拉伴突地ニ於テ痢疾流行セ

シ時伊答里亞國ノ醫蠟一錢ヨリ三錢至熱乳ニ溶化シ

與ヘテ甚偉效ヲ得第一服若クハ第二服ニ之ヲ治セ

リト云フ

○第五百四十二方抄。佛。福。傑。兒。

黃蠟半 入白中加微火烱解和雞子黃六箇及綿苔幾

里私布水六多為乳劑更加後呆

雜腹蘭舍利別子

右調和每服一食匙臨用宜振盪

○第五百四十三方越。埵。僅。度。

亞刺昆亞護護末 入石臼注熱湯適宜溶解加黃蠟

三多能搗和再加後呆

麗春花舍利別子 壹百兒附越列幾秩兒適宜味

右調勻每一時服一食匙強

主治右二方五百四十三方包攝劑トノ痢疾ニ用フ設兒

忽弗滿名人名俞拂同等ハ大ニ蠟製乳劑ヲ稱用セリ越塚僅
度氏ハ上方ノ鴻益アルヲ自驗セリ今時ニ至テ此方全
ク棄レテ用フル者ナシ

○第五百四十四方福保篤

黃蠟 阿列襪油各二錢 入熱臼烱解加鷄子黃一箇又

徐々加微温湯四弓為乳劑加後藥

鹿琥精一錢 舍電阿芙蓉液一錢 過爾抱舍利別三錢

右調勻每一時服一食匙

主治慢性下利及ヒ痢疾ニ宜シ

○第五百四十五方瀧樹列

鷄子白六筒 水北二 攪和濾過加後藥

砂糖舍利別三錢 橙花水適宜

右調和應症用之

主治瀧樹列名人名雞子白ヲ以テ痢疾ノ奇藥トシ管ニ之ヲ

包攝劑トスルノミナラス病中大ニ泄出スル所ノ蛋清

質ヲ補給スル者トシテ稱賢シ大人ハ十二時間上方ヲ

飲服セシムルヲ三壘乃至四壘小兒ハ二壘之ニ兼テ鷄

子三箇ノ蛋清ヲ取テ水ニ和シ毎日小量ニ灌腸セシム

○整倫篤名人名及ヒ其他伊答里亞名國ノ醫モ亦上方ヲ用ヒ

テ良效ヲ得タリ然レモ悅別兒名人ハ獨之ヲ取ラス却テ

之ガ為ニ腹痛ヲ倍シ又惡心嘔吐ヲ起スト云フ

○第五百四十六方暴訥爾 過爾拖煎六ヲ乃至ハヲ溶化

硝酸曹達六錢 過爾拖煎六ヲ乃至ハヲ溶化

右調和每一時服一食匙

主治 焮衝熱性痢疾ノ初起直ニ之ヲ用テ大抵苛藥トシ

テ之ヲ稱譽セリ

○第五百四十七方透湯爾 過爾拖煎八ヲ溶化加後味

硝酸曹達半ヲ至 過爾拖煎八ヲ溶化加後味

達刺侃篤護謨八分至

右調和每半時服一食匙

主治 痢疾差焮衝熱性ヲ帶アル者ニ宜シ

○第五百四十八方 精製曹達 硝酸曹達各半 蒸餾水八ヲ溶化

右調和每半時服一食匙

主治 焮衝性膽液痢ニ宜シ

○第五百四十九方穢歌爾度 亞刺昆亞護謨漿 過爾拖舍利別各一 水七 舍電

阿芙蓉液十六滴

○右調和每一時服一食匙臨急則每半時服一食匙

主治 慢麻質斯性膽液性痢ニ宜シ但先吐根ノ吐劑ヲ與

へ而後之ヲ用フヘシ此藥ニ宜ク用ルル者ニ

○第五百五十方弗陽 金銀調急限其半報頭一食匙

加カ密ミル列レ越ヒ幾シ斯ニ 亞ア刺ラ毘ビ亞ア護ゴ護ム 各各二ニ 加カ密ミル列レ水ス五五弓

溶化加後件ニ 亞ア刺ラ毘ビ亞ア護ゴ護ム 各各一一 木キ 舍セ電デン阿ア

荅カ麻マ林リン度ド 加カ密ミル列レ舍セ利リ別ベツ 各各一一

右調和每一時服一食匙

主治膽液性痢疾先吐劑ヲ與へ後之ヲ用フルニ宜シ之

ニ兼テ加カ密ミル列レ甘カン草ソウ 亞ア麻マ子シ等ト 泡ホ劑ジヲ與へ且下腹ヲ加

密ミ列レ浸イン劑ジニ浸スヲ佳トス

○第五百五十一方穢歇蘭度 亞ア刺ラ毘ビ亞ア護ゴ護ム 各各一一

水製大黃ニ丁ト幾シ 精製礞砂ニ 櫻實水ニ 舍電阿

芙蓉液ニ 過爾托舍利別ニ

右調和每一時服二食匙

主治腸胃性或ハ膽液性痢疾尿中塗渣ヲ見サル者ニ宜

○第五百五十二方同上

水製番木鱉越幾斯ニ 接骨木花水ニ 六弓溶化加後味

亞ア刺ラ毘ビ亞ア護ゴ護ム 過爾托舍利別ニ 各各半半

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治痢疾ニ宜シ ○穢歇蘭度氏ノ之ニ兼テ粘滑藥ニ阿

芙蓉或ハ番木鱉越幾斯三氏乃至四氏ヲ加ハ少許宛灌腸セシム小兒ハ十二時間ニ番木鱉ヲ用フル一ニ氏ニ至ル○顯屈私篤呂母人阿埜劉私同阿別爾兜啟爾同阿私濁兒度同忽倫同屈刺歇私同等モ亦番木鱉ヲ賞譽シテ阿芙蓉ト配用ス兒拂郎屈人ノ如キハ番木鱉ニ一種ノ奇效アリト稱ス

○第五百五十三方同上

亞兒尼加根末八分 白糖四

右調勻為散等分八服每一時一服

主治腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十四方列墨爾

亞兒尼加根半 熱湯適 浸漬八分時濾取八分 加沙

列布根末半錢冷水少許搗爛者煮沸令溶解放冷加

後藥

舍電阿芙蓉液一 橙皮舍利別一

右調和每半時服一食匙乃至二食匙

主治神經性或ハ腐敗性痢疾ニ宜シ

○第五百五十五方備設

主緋百設水一 水一匕煮耗至八分濾過放冷加後藥

龍腦一 加更刺昆亞護

右調勻每一時服二食匙

主治腐敗性痢疾ニ宜シ又鈍性神經熱腐敗熱等ノ后泄

瀉腹痛アラザル症ニ用フベシ

○第五百五十六方弗傑醞私

水楊皮三水適宜浸漬一宿翌日煮半時濾過取二十

或十六多乘温加後藥

達刺ラダ侃篤カク護護カ過爾カ抱舍利別一橙皮舍利別半

右調勻每半時温服半盞

主治腐敗性或ハ鈍性神經熱性ノ痢ニ宜シ大便ニ臨テ

腹痛裏急後重甚シキ者ハ此劑一弓中阿芙蓉液二滴乃

至三滴ヲ加ヘ十二時間ニ二十滴乃至六十滴ヲ用フベ

シ○楊皮ハ二年乃至三年ノ枝ヲ撰ビテ春日之ヲ採收

スヘシ弗傑醞私此方ニ幾那モ亦用フト雖楊皮收斂

ノ效差幾那ニ優レリトス

○第五百五十七方微兒粟暗斯

撒里矢捏五人至白糖半

右調和為散分六裹每服一裹日三次乃至六次

主治痢疾ニ施シテ後重ヲ除クニ宜シ○順症ニ於テハ

撒里矢捏ヲ用ヒテ全功ヲ收ムルニ足レリ他ノ鎮痛收

斂藥效アラザル者モ亦之ヲ用ヒテ癒ユ

○第五百五十八方（陽拉格假私）明礬末一錢阿仙藥錢半達刺侃篤護護二錢橙皮水八

主過爾托舍利別一錢右調和每服二食匙日二次乃至四次（辰至六次）

〔主治〕痢疾ニ宜シ○此ニ弗陽人ノ說ヲ掲ク云ク

○其痢疾ニ明礬ヲ用フルハ之ヲ泄瀉ニ施スニ比スレハ更ニ謹慎ヲ加フヘシ明礬ノ如キ收瀉藥ヲ與フベキ

者十中一ニ過キザルベシ但明礬ハ腐敗痢ニ尤適當トス括隣君ハ之ヲ忌ト雖余ハ明礬ヲ以テ腐敗痢ヲ

治セシト屢之アリ腸胃清淨ノ症或ハ患者危篤ニ臨

諸液著シク溶渙シ。肌熱熾ニ渴甚シク。脈小ニ震

慄シ。舌苔乾燥黑色ニメ紋裂ヲ見ハシ且震慄スル者

ハ明礬ノ效更ニ硫酸ニ優レルヲ證セリ余ハ明礬ニ

配スルニ安偲斯ス黠刺シ西瑪劉シ拔皮シ龍腦等ヲ以テセリ

○第五百五十九方（同上）亞刺昆亞護護錢半生明礬 葛私加栗刺越幾斯各一

亞刺昆亞護護錢半生明礬 葛私加栗刺越幾斯各一

加密列水四錢橙皮舍利別錢半

右調勻每一時服一食匙

○第五百六十方（癩別魁）精製阿芙蓉人半明礬半亞刺昆亞護護末半

精製阿芙蓉人半明礬半亞刺昆亞護護末半

右調和為散分八覆每一時半乃至二時服一覆

○主治 右二方五百五十九方。ハ鈍性神經熱性及ヒ腐敗性

ノ痢疾ニ宜シ

○第五百六十一方弗陽做設兒列

吐根四分 精製阿芙蓉半 龍腦一分 白糖半

右調和為散分八服每一時乃至一時半一服

○主治 痢疾ノ末期本來ノ熱性已ニ減退シ唯腸ノ衰弱弛

緩ノ為下利未已マザル者之ニ宜シ

○第五百六十二方弗陽

葛私加栗刺皮 水適宜煮耗至四分濾過加後藥

甘硝石精四分 橙皮舍利別半

右調勻每一時服一食匙

○主治 下利及ヒ痢疾後腸ノ煥衝證已ニ退キ唯腸ノ衰弱

シテ屢泄瀉スル者之ニ宜シ

○第五百六十三方烏里儼士

新製枸櫞汁三 食鹽適宜但飽 已上合勻加左味

加密列水北 白糖適宜甘

右每一時乃至三時服一盞

○主治 慢性痢疾腐敗ニ傾ク症ニ宜シ ○獨老私名人ハ枸櫞

汁ト油ヲ配用シテ痢疾ヲ治セシ百人ニ過タリト云

遠西方藥 卷五 痢

○第五百六十四方〔忽百〕

硝酸二錢 精製阿芙蓉二錢 水三

右調和每服一食匙粘滑藥液和服日四次

主治緩慢虛性ノ痢疾ニ宜シ○欲燼名人モ亦酸類ヲ稱

贊ス

○第五百六十五方〔忽百〕

鉛糖四錢 水製阿芙蓉越幾斯二錢至四錢

右蒸餾水二勺乃至四勺溶化

主治過里名人滌爾名同沒忍名同等慢性痢ニ鉛糖ヲ稱用

セリ沒忍名人ハ實症ニモ亦之ヲ用ヒテ良效ヲ得タリト云フ

○第五百六十六方〔福倭列爾〕

桂皮末二錢 阿仙藥一錢 精製阿芙蓉一錢 吐根末半

右調勻為散日服三次乃至四次八分乃至十五分

主治痢後ノ泄瀉ニ宜シ○此方藥局ニ命ノ各服ノ量ヲ

分タシムルヲ最好トス

○第五百六十七方〔精勞地運的〕

番木鱉水製越幾斯四錢至六錢 桂水三勺乃至四勺溶化

右調和每日服一食匙

遠西方藥 卷五 胃 廣 半 堂

主治痢疾後腸衰弱ノ泄瀉過多食欲虧損等ノ症ニ宜シ

○第五百六十八方 福俣列爾 治痢灌腸方

阿芙蓉一 阿仙藥一 漿粉煎四

右調和供灌腸

○第五百六十九方 影布

外水六分 蒸餾水一 亞刺昆一 亞護護漿一

精製阿芙蓉一

右調和取一盞強微温供灌腸

主治痢疾及ヒ慢性下利阿芙蓉及ヒ其他尋常藥效ナキ

者ニ宜シ

○第五百七十方 私傳福俣爾 福俣列爾氏鎮瘧軟膏

新鮮鹿脂或 牛脂半 新鮮無鹽酪三 漿粉一 阿芙蓉未半

右微温熔和取榛子大挿肛門

主治痢疾ニ用ヒテ裏急後重ヲ減スルニ宜シ○又海綿

ヲ以テ微温乳汁阿芙蓉丁幾或ハ緩和温暖ノ油ニ醃シ

テ久ク肛門ニ挿置スルモ亦好シ又諸藥ノ蒸氣ヲ用フ

ルモ可ナリ

○第五百七十一方 壽慈倫

顯草一 熱湯適宜浸漬濾過取八弓每一時半取半盞

微温射注肛門
主治痢疾裏急後重ヲ除クニ宜シ
第五百七十二方
阿列襪油
龍腦
右調和塗擦肚腹
主治腹痛ヲ治スルニ宜シ
第五百七十三方
龍腦
香竈膏
右調勻塗擦下腹

微温射注肛門

主治痢疾裏急後重ヲ除クニ宜シ

第五百七十二方

阿列襪油
龍腦
單方阿芙蓉丁幾

右調和塗擦肚腹

主治腹痛ヲ治スルニ宜シ

第五百七十三方

龍腦
香竈膏

右調勻塗擦下腹

遠西方彙卷之五

遠西方彙卷之六

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑 婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲 重 譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

腹膜焮衝
網膜焮衝
腸間膜焮衝

右三症治法他ノ腹内諸器ノ焮衝殊ニ腸及ヒ肝焮衝ト異

遠西方彙 卷之六 廣 半 堂

ナルコナシ唯患者ノ稟賦熱ノ本性及ヒ合併病等ノ為ニ
 變化アルノミ刺絡蟻鍼或ハ吸角法緩和温暖ノ琶布若ク
 ハ蒸劑消散軟膏ヲ塗擦シ發疱膏若クハ蒸餅母ヲ貼シ灌
 腸法微温全身浴等普通ノ治法トス殊ニ水銀膏ヲ稱用セ
 リ若劇痛ノ為ニ之ヲ塗擦スルコト能ハザレバ布ニ塗リテ
 肚腹ニ貼シ一時半毎ニ之ヲ替換スベシ抜設獨優名ノ法
 ニ做フテ水銀膏ヲ内股腋下兩膊ノ内側等他ノ部ニ交代
 シ擦スルモ亦可ナリ五百八十方内服ハ乳劑五百十四方五百至
 百三十三方及ヒ甘汞症ニ從フテ或ハ阿芙蓉ヲ加ヘ或ハ
 去ル五百七十九方第一トス篤優爾點亞兒名嘗テ小兒ノ腹膜

燉衝及ヒ其他腹内ノ諸燉衝ニ稱用セシ一方アリ之ヲ左
 ニ掲ク

○第五百七十四方篤優爾點亞兒

罌粟球煎ニ新絞甘扁挑油一錢至亞刺昆ニ

謨宜適為乳劑加後件ハ

消石十五阿芙蓉舍利別半

右每半時乃至一時服一小兒匙

肝燉衝ハハ直腸ニ蟻鍼ヲ施シ酸性下劑五百七十五方至

衝セル者ハ直腸ニ蟻鍼ヲ施シ酸性下劑五百七十五方至

清涼鹽類五百七十八方乳清二百五十九方純精酒石三百五十九方或二百五十九方至

麻林度二百五十九方加二百五十九方テ製スル者二百五十九方ヲ與二百五十九方スヘシ但承劑内服二百五十九方

ヲ以テ亞麻仁末二百五十九方ニ合シテ温暖毳布二百五十九方ヲ施シ消散硬膏二百五十九方ヲ貼

シ龍腦油二百五十九方ニ阿芙蓉丁幾二百五十九方ヲ伍メ塗擦シ發疱膏二百五十九方及ヒ蒸餅母

ヲ貼シ灌腸二百五十九方ヲ行ヒ以テ其治二百五十九方ヲ佐クベシ通例胸中苦悶二百五十九方

症アリ炭酸剝篤亞斯二百五十九方ノ飽和液二百五十九方方並ニ沸騰散二百五十九方ヲ用ヒ

テ効アリ○此症吐劑二百五十九方ヲ用フルハ大抵危險ナリトス○慢

性肝厥衝ハ解凝藥二百五十九方ハ小量ノ甘永二百五十九方ハ微々水銀膏

ヲ塗擦シ及ヒ鑛酸二百五十九方ヲ加ヘタル脚浴法二百五十九方ハ等殊二百五十九方ニ佳ト

ス

○第五百七十五方遠西方書

答麻林度二百五十九方純精酒石二百五十九方覆盆子舍利別二百五十九方宜適

右調和為煉膏朝夕服一小哥喜匙二百五十九方

主治肝厥衝及ヒ其他ノ厥衝病ニ清涼下劑トシテ之ヲ

用フ

○第五百七十六方遠西方書

上好滿那二百五十九方加密列水九二百五十九方ヲ溶化濾過加後藥

答麻林度二百五十九方

右調勻每服半小匙日二次臨服宜振盪

○第五百七十七方

孕礪酒石半

橙皮油糖錢一

水六勺溶化加後藥

答麻林度半

右調勻每一時服二匙臨服宜振盪

主治右二方ハ肝脾ノ喉衝膽液熱等ニ清涼下劑トシ用

フ又酷厲膽液ノ刺戟ヲ制スルニ宜シ我邦多ク之有ル

カ如キ輕易ノ肝喉衝ハ承劑ヲ要セズ大抵蟻鉞及ヒ緩

性ノ下劑ヲ用ヒテ足レリ

○第五百七十八方

消石半

純精酒石六

白糖半

右調和為散每服一茶匙強日二三次

主治血脉系及ヒ膽系ノ喉衝性刺衝ニ宜シ

○第五百七十九方

甘永六人至

精製阿芙蓉二人至

白糖錢二

右調和為散等分六裏每一時乃至二時服一裏

主治肝喉衝及ヒ他ノ喉衝症殊ニ腹裏諸器ノ喉衝劇度

ノ者ニ宜シ此方ヲ用フル片ハ放血ヲ除クノ外大抵他

ノ諸藥ヲ要スルコトナシ甘永ヲ服ノ后若綠色ノ大便ヲ

瀉スル片ハ更ニ其量ヲ減メ連服セシメテ流涎ノ前

兆ヲ見ルニ至ルベシ或ハ全ク甘永ヲ休メ之ニ代ヘテ

蒲公英越幾斯或ハ蘆根越幾斯ニ孕鹼酒石若クハ醋酸
加里液ヲ配用シ或ハ答麻林度等ヲ與フベシ

○第五百八十方

水銀膏

右供塗擦藥

主治焮衝症ニ水銀膏ヲ擦スルハ設爾列名捉縵上拔設

獨優上倫試驗シテ確定セル所ナリ拔設獨優氏放血

○及ニ對症ノ劑ヲ連進シ兼テ四分時乃至一二時毎ニ水

銀膏二刃乃至一錢ヲ取テ漸次ニ四肢或ハ身幹ニ塗擦

セリ但之ヲ塗ルハ皮膚細毛ノ向方ニ循フベシ肝肺胸

膜及ヒ肺管喉頭ノ焮衝義膜咽喉焮衝脊髓若クハ眼耳

焮衝羅斯等並ニ皆之ヲ施ノ殊ニ佳ナリ○腋下ニ塗擦

スレハ吸收ノ能力最速ナリトス

○第五百八十一方

甘永

龍腦

亞刺毘亞蘊

謨末

右調和為散等分六包每服一包日二次乃至三次

主治虚性肝焮衝衰弱甚シキ者ニ宜シ

○第五百八十二方

甘永

金硫黄

失鳩答葉

白糖

右調和為散分八服朝夕一服

主治肝厥衝ノ末期動輒閉塞ヲ生スル者アリ此方之ヲ
消散スルニ宜シ

○第五百八十三方列屈

鹽酸錢二 煎餹水八 覆盆子 舍利別二

右調和每半時取一食匙水或燕麥汁和服至五六

主治劇性厥衝ニ用フ厥衝熱モ亦之ニ宜シ

○第五百八十四方

甘汞六 菲阿斯越幾斯一 失鳩答越幾斯半 大黃

右調勻為三十九衣石松粉每一時半服一九

主治慢性肝厥衝及ヒ肝ノ硬結腫ニ宜シ又子宮ノ壅塞
及ヒ之ニ起因セル月經太過ノ症並ニ子宮硬結腫ニ用

○第五百八十五方

蒲公英越幾斯 白屈菜越幾斯各 純精酒石半

右調勻每一時服一食匙

主治慢性肝厥衝及ヒ肝臟硬結腫ノ初起之ヲ連進スヘ

○植物ノ絞汁及ヒ弁拂氏ノ灌腸法モ亦兼用スヘシ

○第五百八十六方思屈振爾誌

○蕪護安沒尼亞幾

白屈菜越幾斯各一錢半

勿搦祭亞石

錢一

右調和二氏為一九衣石松粉每服八九乃至十二九日三

次

主治腹裏ノ壅塞症又慢性肝焮衝後肝臟腫起セル症等

ニ宜シ此丸料一劑ニ大黃末一錢ヲ伍スル者諸症ニ通

用シテ甚適當ス

○第五百八十七方〔私抄篤〕

鹽酸三三消酸藥舖賣者

右調和加脚浴湯但浴湯酸味似醋為度

主治肝脾臍ノ慢性焮衝ニ宜シ○患者脚ヲ浴スルヲ四

分時ヨリ半時ニ至リ爛斑ヲ發メ休ム但隔日之ヲ行フ

ヘシ

脾焮衝

オスアレニチス羅キンク

此症醫治大抵肝焮衝ニ同シ強實ノ人及ヒ此他或ハ刺絡

ヲ施スヘキ者モ亦間之アリト雖通例脾部或ハ肛門ニ蟻

鉞ヲ施スヲ要トス消石及ヒ殊ニ吐藥ヲ用フルヲ忌ム里

歇利飲方一滿那ニ答麻林度方五加ル者方七或ハ純精酒石

方八方方八解釋越幾斯劑ニ緩性中和鹽方加ハ方五至方五

方五或ハ水製大黃丁幾方加ル者等方與スベシ甘汞及ヒ

水銀膏ハ特ニ急性ノ真脾燬衝及ヒ腹膜外被ク燬衝ニ稱

用ス○慢性脾燬衝ハ鑛酸脚浴五百八方好トス之ニ次テ

解凝丸五百八方ヲ佳ナリトス間歇熱ニ起因セル者ハ苦味

越幾斯劑幾那規尼捏三百三十九方至ヲ與ヘ其後鐵劑及

ヒ葭若ヲ用フルヲ適當トス報載論報時短也門門其

○第五百八十八方遠突土之鐵質ノ入タル地樹皮ニ陳積

報載答麻林度半一純精酒石半覆盆子舍利別適

右作煉膏朝夕服一哥喜匙

主治脾燬衝及ヒ他ノ燬衝症宜ナリハ則日々行ク

脾燬衝パンクアレアチクススペクセルキ報載論報時短也門門其

適宜ノ消燬法ヲ處シ痛所ニ屢蟻鍼ヲ施シ緩和鎮痙ノ琶

布水銀膏消散硬膏ヲ用ヒ灌腸ヲ施シ大便ヲ利スベシ内

服ハ甘朮炭酸剝篤亞斯五百八方緩性解釋越幾斯劑ニ老利

兒水ヲ加ル者五百九十一方菲阿斯越幾斯等ヲ用ヒ兼テ

乳汁ヲ飲マシムルニ宜シ○慢症ハ鑛酸脚浴五百八方殊ニ

良トス沃曹謨膏或ハ水銀膏等ヲ塗擦スルモ亦佳ナリ

○第五百八十九方一割半卵一食匙

炭酸剝篤亞斯或孕鹼酒石錢默栗薩水四溶化加

橙花舍利別半右調和每一時乃至一時半服一食匙

右調和每一時乃至一時半服一食匙

○第五百九十方

蒲公英流動越幾斯

錢三

孕鹼酒石

半

煎餹水四

化加老利兒水

錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

○第五百九十一方

珊瑚篤里越幾斯

錢各一

醋酸加里液

老利兒水

錢一

黑櫻實水

錢四

大黃舍利別

半

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

○第五百九十二方

老利兒水

錢一

覆盆子水

錢半

覆盆子舍利別

半

右調和每服一茶匙日四次

試効第五百八十九方ヨリ五百九十二方至急性脾癩衝

ニ宜シ

○第五百九十三方

炭酸利篤亞斯

或

孕鹼酒石

錢二

默栗薩水五

後藥

單方阿芙蓉丁幾

三滴至六滴

複方橙皮越栗失爾

附

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

試効脾ノ慢性癩衝及ヒ硬結腫ニ宜シ兼テ水銀膏ヲ塗

擦スベシ

腰筋焮衝グソノチチス羅オントスチキ
至方清涼瀉藥十四方至十七方五方用ヒ灌腸廿七方至

最消焮ノ治法即刺絡吸角法及ヒ蜈蚣ヲ施シ精製消石九方

行ヒ又症ニ從テ發表劑ヲ與ヘ以テ分利ヲ促スベシ即

晚ニ方テ牝歇爾散等ヲ用フルカ如キヲ佳トス

腎焮衝子プリチス羅ニルオ刺絡ヲ行ヒ蜈蚣ヲ施シ亞麻仁錦葵葉菲阿斯葉失鳩答ノ

緩和鎮痙蒸劑ヲ施シ微温浴ヲ行ヒ蒸餅母ヲ貼シ水銀膏

或ハ菲阿斯油ニ阿芙蓉丁幾ト龍腦ヲ和シ塗擦スベシ内

服ハ沙列布過爾訛蘆根等ノ粘滑煎或ハ舎電白煎三百八

油性粘滑ノ乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ル者老利兒水菲阿斯

越幾斯等五百八方五百十二或ハ甘汞又症ニ應シ阿芙蓉

ヲ伍スル者三百九十四方或ハ少量吐根百廿五方或ハ

龍腦五百十等ヲ與フベシ便秘スル者ハ答麻林度ニ滿那

ヲ加ル者五百七蓖麻油五百九等ニ宜シ但消石孕礬酒石

礪砂諸種ノ中和鹽酸類殊ニ芫菁硬膏ノ如キ總テ利尿ヲ

進ムル所ノ諸藥ハ悉皆之ヲ忌ム

○第五百九十四方過傑栗屈的兒

甘扁桃去皮 白罌粟子各半 加水一匕搗爛作乳劑

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

加後藥

亞刺昆亞蘆謨漿錢三

過爾托舍利別半

右調和每服半小茶碗三

主治腎厥衝膀胱厥衝等二宜シ

○第五百九十五方秘越秩鐵爾

達刺侃篤護謨漿三至三

熱湯北

過爾托舍利別一

右調和每服半小盞日三次乃至四次或數次

主治腎厥衝膀胱厥衝小便不利麻疾等二宜シ

○第五百九十六方依拂歐屈

新絞蓖麻油三

亞刺昆亞蘆謨漿六

右調和後徐徐加過爾托煎一北每半時服一小盞強

主治腎厥衝膀胱厥衝及其他ノ症ニ緩下劑ト為シ用

膀胱厥衝オキスチススキ羅フライスス四蓋六至六蓋茶日飲

此症治法總テ腎厥衝ニ同シ小便閉止セルキハ葛麥的兒

ヲ後ニシテ先膀胱ノ部會陰肛門ニ蟻鍼ヲ施シ微温浴及

ヒ局處蒸氣浴鎮痙菴法及ヒ塗擦藥ヲ施シ緩和劑ニ阿芙

蓉丁幾ヲ加ヘテ灌腸スル等ヲ以テ其厥衝ト痙攣ヲ除ク

ヲ專務トス之ヲ治スルノ主藥モ亦甘永阿芙蓉ノ合劑三

百七十四方五トス即左ニ二方ヲ掲ケテ以テ其治ヲ補フ

○第五百九十七方

○大麻子三錢至六錢 苦扁桃四個 加水二北搗爛作乳劑加

右每日飲服

主治諸粘液膜殊ニ膀胱尿道ノ粘液膜焮衝及ヒ淋ニ宜

○第五百九十八方

此藥大麻子三錢 過爾托一錢 錦葵葉四錢

右細剉合勻取一食匙 以水四盞乃至六盞煮每日飲服

之

主治上ニ同シ

子宮焮衝

卵巢焮衝

右ニ症治法他ノ腹臟焮衝ニ同シ然レモ子宮焮衝ハ産婦

ニ最多ク之アルカ故ニ殊ニ此ニ注意スルヲ要ス大概此

兩症ニ於テモ亦甘永ニ阿芙蓉ヲ配伍スル

次ニ首藥トス別ニ余ガ著ス所ノ一書アリ就テ参照ス

ベシ

樓麻質斯

樓麻質斯ヲ以テ神經病ニ附屬スルモ亦故ナキニアラズ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

然リト雖急性ノ症ニ至テハ必焮衝証ヲ帶ルガ故ニ予ガ

意ヲ以テ之ヲ觀レハ此條ニ列序スルヲ適當トス碩學噉
 過僭設名人モ亦此症ヲ以テ焮衝性ノ病トセリ○急性癩麻
 質斯其症焮衝性ノ熱ヲ帶ヒ而ノ疼痛劇甚ナル者ハ刺絡
 ヲ施シ且痛所ニ放蟻スルヲ簡要トス放血後若放血ヲ要
セザル者ハ
初メ若療時下ス時謁忽倫名人ノ歷驗ニ從ヒ數次吐藥ヲ用ヒテ奇効
 アリ吐藥ハ其激動ノ為ニ他ノ神経系ニ交感シテ誘導ノ
 効ヲ奏スレバナリ大率毎二十四時吐劑ヲ與ヘテ八日乃
 至十四日或ハ更ニ日ヲ延クモ三週ヲ出ズシテ平治セシ
 ヲ經驗セリ然レモ其性質ニ由テ吐藥ヲ用フベカラザル
 者ハ忽倫氏ニ倣フテ適宜ノ瀉藥ヲ連用スベシ亦能ク吐

劑ニ代リテ良効アリ○乾度名人ハ大量消石ニ六百ヲ以テ

癩麻質斯ヲ療ス此法予カ見ヲ以テスレハ特ニ急性焮衝

症ニ適當シテ慢性症ニハ相應スベカラス格爾利侃名人ハ

急性ノ關節癩麻質斯ニ大量阿芙蓉ヲ處セリ此治法更ニ

疑フベシト雖獨乙ノ醫モ亦佳効ヲ見タリト云フ六百

熱勢劇シカラザル者ハ大抵民埜列里精五方至二方吐

酒石十八方至三方六方一方至二方等ノ如キ發汗劑ヲ用ヒテ驗アリ

其急症變ノ慢性トナル者ハ殊ニ雙蘭菊六百四方至適當

不○急性癩麻質斯ニ外用法ヲ施ス片ハ大ニ謹慎ヲ加フ

ベシ弗刺名兒毛布或ハ毛皮ヲ以テ患部ヲ纏ヒ或ハ木綿

ニ香竄藥末ノ撒メ覆フモ亦可ナリ急症變ノ慢症トナル
 片ハ乳香琥珀杜松子芸香等ノ薰法ヲ好トス嫩衝性已ニ
 退キテ其症慢性ニ傾ク片ハ芫菁膏芥子泥モ亦並用シテ
 可ナリ塗擦法浴法硬膏等ハ急性痿痺質斯ニ於テ危險ナ
 ルカ故ニ必施ス勿レ○慢性痿痺質斯ハ大率頑滯シ易
 其藥劑モ亦大量ニ與フルヲ稱譽ス但蒸發氣ヲ催進シ
 兼テ他ノ排泄分利ヲ扶ケ或ハ鎮痙ノ効ヲ兼ル者ヲ撰用
 スベシ必初メ緩劑ヲ處シ漸次峻藥ニ移ルヲ通則トス外
 用ノ方法殊ニ塗擦藥及ヒ硬膏ノ如キハ大ニ此ニ適應ス
 此他痿痺質斯ヲ治スルノ方法枚舉ニ遑アラズ左ニ掲ル

所々方劑ニ就テ閱スベシ服量用法其最要ナル者ハ各方
 附考アリ

○第五百九十九方〔秘制律秘〕 栗布失煙斯氏病院用發汗

飲料

接骨木花五 過泥子一錢

右細判合勻取一錢水一北浸出

主治聖京偃及ヒ痿痺質斯ニ宜シ

○第六百方同上 栗布失煙斯氏病院用發汗

密幾斯去爾

接骨木花錢二 熱湯適宜浸漬濾取五弓加後藥

民埤列利精

六錢

屋施茂爾

半錢

甘硝石精

一錢

至

右調勻每一時服一食匙

主治 聖京偃及ヒ樓麻質斯劇熱ナキ者ニ宜シ

○第六百一方

精製消石

半

至

吐酒石

一

至

三

人

二

人

接骨木花水四

可溶化加後藥

屋施茂爾

半

右調和每一時服一食匙

主治 急性樓麻質斯ニ宜シ之ヲ用ヒテ吐逆ヲ發スレハ

更ニ良効アリ

○第六百二方

精製消石

半

大麥煎ニ北溶化加後味

蜜

去泡沫

右調勻每日飲服

主治 焮衝性樓麻質斯ニ宜シ乾度閏ハ總テ樓麻質斯

ヲ療スルニ大量消石單味ヲ多量ノ水ニ溶化シ用フ此

用法消石末ヲ服シ或ハ其稠厚溶液ヲ用フルカ如キ害

アルコナシト雖之ヲ上方ノ如ク配合スレハ皮膚腎或

ハ腸ノ分利機ヲ進メ脈軟トナリテ疼痛モ亦鎮定ス○

秘多別爾名モ亦此方ヲ好トセリ

○第六百三方 實の里屈

葛兒儒別新絞汁 莖葉俱絞者二三 橙花舍利別 煎取之

右調和每一時服一茶匙乃至一食匙

主治急性傳麻質斯之宜

○第六百四方 非海秘

雙蘭菊越幾斯 六分至十二分 纈草浸六分 浸纈草半多製者 溶化加

古臨後藥日效服

右民埵列利精 一 雜腹蘭舍利別 半

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

○主治傳麻質斯症微熱ノ者ニ宜シ

○第六百五方 弗陽之徒

雙鸞菊越幾斯 半錢至一錢 安質沒尼酒一弓溶化

右調勻朝夕服十五滴乃至二十滴

○第六百六方 屢別兒

雙鸞菊越幾斯 六分至半錢 格兒失屈謨子酒半弓溶化

右調和每服十五滴乃至二十滴日四次

主治右二方 六百五方 急性及慢性傳麻質斯之宜シ

○第六百七方 結爾秘典

精製阿芙蓉 一 白糖 半

右調和為散分六服每一時半一服

○主治 急性關節傳麻質斯 宜シ ○二患者内臟ニ焮衝及

ヒ熱証等ヲ帶ビザルニ確著ナル症ニ結爾私典氏阿美

○蓉ヲ試用セリ用法初每一時半一ハ漸ク加ヘテ一ハ半

ニ至ル此ノ如ク之ヲ用テ良効ヲ得タリト云フ

○第六百八方 布律母蔑爾氏變機散

甘永 金硫黃各六錢 白糖二錢 伏磁石半斤 磁石半斤

○右調齊為散等分六包朝夕服半包乃至一包

主治 慢性傳麻質斯 依屈篤 慢性皮膚病 瘰癧等ニ變機劑

ト用フヘシ ○砂糖ニ代ヘテ麻屈涅失亞半錢ヲ加フ

○ルモ亦可ナリ

○第六百九方 布律母蔑爾氏變機丸

甘永 金硫黃各半

右調和ニハ為一九夜甘草末朝夕服二九

主治 同上

○第六百十方 猓歇蘭度發汗散

精製硫黃二錢 金硫黃 龍腦各八錢 白糖二錢

右調和為散每服一刀尖日二次乃至四次

主治 頑固ノ聖京屈 傳麻質斯及ヒ依屈篤症ニ宜シ

○第六百十一方 猓歇蘭度

癩瘡木脂三錢 硫黃乳 勿搦祭亞石鹼各一錢 蜀羊泉

癩瘡木脂 硫黃乳 勿搦祭亞石鹼 蜀羊泉

遠古方類 卷六 傳麻質斯

越幾斯宜適

○若二氏為一九夜石松粉朝夕服十九

主治傳麻質斯症熱ナキ者ニ宜シ兼テ左ノ外用法ヲ處

スベシ患部ヲ温覆シ或ハ弗刺涅兒毛布獸毛毛皮但野

ヲ用フベ等ヲ以テ之ヲ纏ヒ碓砂揮發膏ヲ塗擦シ腦但龍

内陷ヲ促シ易キガ非阿斯硬膏ニ阿芙蓉ヲ配伍セル者

故ニ加ラレシカレシ者ハ鎮瘻布ニ宜シ但之ヲ貼

スルト一二時ニ過クベカラズ然ラサレバ或ハ慢性ニ

變シ或ハ化膿シ易ケレバナリ又芫菁膏ハ更ニ偉効ア

リトス局處ノ瀉血ハ唯患部ニ赤熱アル者ノミ施スベ

シ○冷慰法及ヒ鉛劑ハ能ク速ニ疼痛ヲ減スト雖病毒
ヲ轉移シテ危險症ヲ誘起シ或ハ慢性局處病ヲ誘發ス

○第百十二方斯屈列西爾

雙鸞菊越幾斯 瘡瘡木脂各一 勿擲祭亞石鹼錢

○右為六十九夜石松粉每服三九日四次乃至五次

○第百十三方別連杜

瘡瘡木脂錢二 亞刺昆亞護錢三 蒸餾水七 蜀羊泉

流動越幾斯錢三 過兒抱舍利別

○右調勻每一時半服一食匙

遠田考濟 卷六 倭麻質斯 廣肝堂

○第六百十四方 破歇蘭度 雙鸞菊越幾斯 枸橈油糖 純精

瘡瘡木脂 雙鸞菊越幾斯 枸橈油糖 純精

酒石 右調勻為散分六包分一包為三服早且午後及日晡一服

○第六百十五方 穀優鬱篤 金硫黃 瘡瘡木脂 茴香子 右調和為散等分八服朝夕一服

○第六百十六方 破歇蘭度 瘡瘡木屑 蜀羊泉莖 河水 北煮耗至一北半濾

過加後藥

右調和每一時服半小盞日盡半劑

○第六百十七方 薄抄狝斯 瘡瘡木脂 瘡瘡木丁幾 單方瘡瘡木丁幾

右調勻每服三四十滴日三次

○瘡瘡木脂 上好糖精 瘡瘡木加糖精丁幾

右入器蓋閉安暖所飽熟八日濾過每服一食匙日一二次

主治 第六百十二方 日六十八方 至皆倭麻質斯無熱

頑固之症 瘡瘡木八殊 粘液質 適當

瘡瘡木脂 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

瘡瘡木 瘡瘡木 瘡瘡木

且依偃篤僕麻質斯混淆セル症ニ佳效ニ癒瘡木多量

三與フル氏ハ瀉スル者之アリト雖尚之効廢スル物

以人器蓋閉安新沢頭瘰癧八日敷置毎週一食後日一二水

○第六百十九方〔穢歌蘭度〕 煎餅心 蜜去泡沫 各適宜

○第六百二十方〔穢歌蘭度〕 白蒸餅心 蜜去泡沫 各適宜

右為六十九衣石松粉每服三四丸日三次各三

○主治蓮珍名入質列憫斯ノ輩慢性僕麻質斯ニ殊テ升永

手稱用セリ癩毒合併之症ニヤアザルモ亦効アリ六百五十

三方及六百五十 四方ヲ參照スベシ告休限

○第六百二十方〔弗肝爾田蒲蘭度〕 雙鸞菊越幾斯 金硫黃各半 阿魏一錢 蒲公英越幾

斯適 右三氏為一九衣石松粉每服三丸日三次各半

○第六百二十一方〔鳩兒栗松〕 格兒失屈謨根六三 至高 上好吐根末 薄荷油糖各半

右調和為散分六服蠟紙包裹朝夕一服

○第六百二十三方〔謝忽倫〕 鹿角油半錢 忽弗滿液二錢

右調勻每一時乃至一時半服十五滴乃至三十滴對林

○第六百二十四方〔謝忽倫〕 鹿角油半錢 忽弗滿液二錢

右調勻每一時乃至一時半服十五滴乃至三十滴對林

○第六百二十五方〔謝忽倫〕 鹿角油半錢 忽弗滿液二錢

右調勻每一時乃至一時半服十五滴乃至三十滴對林

○第六百二十六方〔謝忽倫〕 鹿角油半錢 忽弗滿液二錢

主治第六百二十方ヨリ六百二十二方至慢性關節俾麻

質斯ニ宜シ

○第六百二十三方 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

○加里丁幾 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

右調和每服十滴至三十滴燕麥汁半盞和服日三四次

○主治 俾麻質斯頑滯セル症ニ宜シ ○此他私託兒名ハ此

下幾劑ヲ以テ諸種ノ慢性病神經系及分泌器ノ運營不

調ヲ兼ル者ヲ治セリト云フ 慢性俾麻質斯ニ殊テ外水

○第六百二十四方 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

○含硫加爾幾安質沒扭 半 達刺侃篤護護漿 宜 適

右為六十九夜石松粉每服五丸日二次 附 四日四次

主治 頑滯セル液質變性病 永毒及ヒ其他諸種ノ鑛毒 腹

臟壅塞 經久俾麻質斯等ニ宜シ

○第六百二十五方 同上

肝油 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

右每服一食匙日二次乃至四次 附 白品 附 白品 附 白品

○第六百二十六方 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

伯肝油 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

作乳劑加後藥 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

橙皮舍利別 附 錢 鹿琥精 半 鹿琥精 一 鹿琥精 一

右調勻每服二食匙日二三次臨服宜振盪

主治右二方六百廿五方ハ經久優麻質斯及ヒ依屈篤殊

ニ分泌失常或ハ關節強拘セラル者ニ宜シ○肝油ヲ單用

スル時ハ後薄荷少許ヲ與ヘ或ハ薄荷餅一二箇ヲ喫セ

シムベシ○肝油茶褐色ノ者之ヲ白色ノ者ニ較レハ其

効力峻烈ナリト雖其味ニ至テハ白品ヲ佳トス六百五十五方

○ラ參照二十五方同上ハ優麻質斯及ハ其器ノ運管下

○第六百二十七方質眞等ニ宜シ

○主葛兒儒別越幾斯甘草末各六錢半達刺侃篤蘆護漿宜適

右為九十九衣伊里斯弗魯連底那末每服四九日四次

主治慢性優麻質斯ニ宜シ

○第六百二十八方烏篤薛爾甲方

硫黃亞爾箇兒錢一再鎔燒酒半

右調和每一時服四十滴乃至六十滴

○第六百二十八方同上乙方

硫黃亞爾箇兒錢二龍腦精二

右調和朝夕塗擦

主治此方優麻質斯熱ナキ者或ハ熱微ナル者ニ宜シ六百

四十四方參照スベシ一

○第六百二十九方別爾列印名歌羅屈

○ 敝度里阿達私刺篤亞斯一錢 蒸餾水四 砂糖舍利別一

右調和每服一食匙日三次

主治慢性傳麻質斯筋膜ニ係在セル者之ニ宜シ關節ヲ

侵スノ症ハ此方通例効アルナシ○又歇蠶屈名ハ此

方骨膜燼衝傳麻質斯ニ起因セル症ニ特効アリシヲ經

○ 驗セリ骨膜ニ係リテ頭痛腰痛等ヲ發シ患部腫起シテ

感觸過敏ナル者ヲ治セシヨ毎々之アリ殊ニ一患者嚮

ニ癩毒ヲ患ヒ爾後數回冒寒セシヨリ頭痛裂カ如ク兼

○ テ左鼻骨腫起シ左ノ第五對神經第二枝別ノ彌蔓セル

部總テ麻痺セル者ヲ平治セシ効確實ナリ其症ヲ療セ

シ片歇蠶屈名ハ此之ヲ診スルニ鑿骨ヲ被フ所ノ厚腦膜第

五對神經第二枝ノ卵圓孔ヲ貫キテ腔ヨリ出ル部腫脹

セル處アリ之ニ因テ前ノ癩毒ト後ノ傳麻質斯トニ著

眼ノ敝度里阿達私刺篤亞斯ヲ與ルヲ上方ノ如ク又半

面ノ痛處ニ沃胃謨軟膏ヲ塗擦セリ之ニ由テ二三月ノ

後患者平癒セリ○以上ノ數症ヲ療セシ片歇度里阿達

私刺篤亞斯ノ量每服六爪日ニ三服スト云フ

○ 第六百三十方屈律見別爾僂

○ 瘰癧木脂揮發丁幾 鹿琥精各二錢 阿芙蓉丁幾一錢

右調勻每服十五滴乃至二十滴燕麥汁和服日三次

主治 傳麻質斯齒痛ニ宜シ

○第六百三十一方 鐵欬蘭度 硫黃乳半 純精酒石一錢 枸橛油糖一

右調和為散分四裏朝夕服半裏三服

主治 傳麻質斯ノ素因アル者其症數々發作スルヲ防ク

ニ宜シ三週乃至四週毎ニ二三日此方ヲ服シ以テ毎日

二三行瀉スルヲ度トス之ニ兼テ日々冷水ヲ以テ全身

ヲ浴シ且遍體ヲ摩淨シ屢々襯衣ヲ換ヘ清淨ノ空氣ニ

觸ル身體ヲ運動セシムルヲ好トス

○第六百三十二方

琥珀 乳香 各二錢

右調勻為粗末取半哥匙 撒敷患所以弗刺涅兒被覆

○第六百三十三方

龍腦粗末 香竈合劑

右調和用法同前

○第六百三十四方

安息香 鵝栗拔奴謨 乳香 龍腦 各一錢

右調和為粗末玻璃壘收貯用法同前

主治 第六百三十二方ヨリ六百三十四方至慢性傳麻質

遠西本草 卷六 廣 堂

斯及ヒ依屈篤ニ宜シ 六百三十四

○第六百三十五方 鍾典利篤氏吐酒石軟膏

吐酒石一錢 薔薇軟膏或家猪脂二錢四錢

右調勻作軟膏

主治 鍾典利篤氏原之ヲ百日效ニ稱用セリ 胡桃大ヲ取

日ニ三次 又他ノ諸病ニ於テ皮膚ニ峻烈ノ反對刺戟ヲ

要スル者之ヲ用ヒテ可ナリ

○第六百三十六方 吐酒石硬膏

吐酒石一錢 瘰癧膏三錢至六錢

右丁寧捏和

主治 吐酒石軟膏ヲ用フル者ト一般ノ症ニ宜シ

○第六百三十七方 顯

吐酒石二錢 升汞二錢 家猪脂半錢

右調勻作軟膏以温暖弗刺涅兒名毛布 摩挲肌膚以至見赤

色擦之

主治 尋常ノ吐酒石軟膏ヲ用フル者皆之ヲ施シテ可ナ

リ蓋軟膏ニ比スレハ皮膚ヲ刺衝スルノ効速ナリトス

○第六百三十八方 骨布名 白降汞軟膏

白降汞一錢至四錢 實芟名 答利斯軟膏

右調和作軟膏塗擦日三四次以綠布被覆其部

主治吐酒石軟膏ニ代用シテ可ナリ然レ其効彼ニ較

スレハ差緩ナリ慢性癩麻質斯病頑滯セル依偃篤頑固

ノ嘶嘔氣管勞ノ初起慢性肺臟聖京偃百日効其他概ノ

皮膚ニ誘導スルヲ要スルノ諸症皆之ニ宜シナリ

○第六百三十九方〔顯〕吐根膏〔附〕 家猪脂七錢

吐根末 阿列襪油各半 家猪脂七錢

右調勻作軟膏塗擦八分時間日三四次

主治皮表ニ誘導シテ發疹セシム之ヲ擦シテ十八時内

外ニ其部小疱ヲ發シ二三日ノ後薄痂ヲ結フ吐酒石

軟膏ヲ用フルノ症皆此方ヲ用ヒテ可ナリ然レ其効

力更ニ緩ナルカ故ニ殊ニ小兒及ヒ婦人ニ適當トス

○第六百四十方

水銀硬膏

默抑失屈篤人多發汗硬膏 〔附〕各半

右調和攤革

主治腰痛及ヒ癩麻質斯性痔疾腰上ニ之ヲ貼ス

○第六百四十一方〔顯〕龍腦石腦油

瓦爾拔奴謨硬膏〔附〕 龍腦 石腦油 揮發鹿角鹽

精製阿芙蓉各半

右捏和攤革貼痛所

主治慢性癩麻質斯ニ用ヒテ鎮痛ノ効アリ

○第六百四十二方 鬱的爾 過爾 爾 加爾 幾 加 多 爾 硬 膏

黃蠟 一錢 烱解加後藥

參爾 一 格碌波尼亞 附半 勿擲祭亞的列並底那 三錢

丁寧調勻暫時冷定再加後味

含硫加爾幾安質沒扭 三錢

右攤革貼之當俟自然剝落

主治所謂歇兒蕪蘭度 名地 依他篤硬膏是ナリ此方ハ頑固

ノ 僂麻質斯諸症即胯痛腰痛顏面痛或ハ肺患焮衝ヲ帶

ヒザル者喘息其他諸種ノ症ニ用ヒテ屢偉効ヲ得タリ

此硬膏ハ最解散ノ効アリ但之ヲ貼スレバ皮膚小疹ヲ

發スル者多シ

○第六百四十三方 穢歇蘭度

煙草葉 一 水十六ヲ煮耗至八ヲ濾過微温慰患所

主治慢性僂麻質斯ノ疼痛ヲ鎮靜スルニ偉効アリ

○第六百四十四方 烏篤薛爾

硫黃亞爾箇兒 二錢 阿列襪油 或 硫砂揮發加龍腦膏 二

右調勻朝夕塗擦

主治慢性僂麻質斯ニ宜シ 第六百二十八方

○第六百四十五方 福極篤

蟻精 附 龍腦精 各半 芫菁丁幾 一錢

右調和温煖塗擦

主治 虛性癩麻質斯。麻痺等ニ宜シ

○第六百四十六方

硝砂揮發膏 老利兒油軟膏各半 的列並油 龍腦

阿芙蓉丁幾各一錢

右調和塗擦

主治 慢性癩麻質斯ニ宜シ

○第六百四十七方

肝色硫黃二錢

右分六劑入玻璃壘與之水適宜煮加浴湯

主治 慢性癩麻質斯。依偃篤。皮疹。ニ宜シ。○浴ニ臨テ稀硫

酸四弓ヲ加フベシ

○第六百四十八方没い失束故屈斯

德烏多沃胃謨一錢 家猪脂三錢

右調勻為軟膏塗擦

主治 關節癩麻質斯。關節白腫。膝腫水腫。關節韌帶ノ腫起。

關節海綿腫等ニ宜シ其他關節ノ疾患ニ消煖法ヲ外用

ノ煖衝証退キタル者之ニ宜シ

○第六百四十九方速兒蒲里徇

安質沒尼酒 格爾失屈謨酒各半

右調和小兒至二歲者大抵每服六滴。自三歲至七歲者每服十滴乃至十五滴每一時半用之。

主治癩麻質斯性胸脇痛。心膜焮衝初起。癩麻質斯性嘶嘎及耳痛。其他小兒癩麻質斯病。宜其症極々頑固。ニメ疼痛アル者ハ雙鸞菊越幾斯ニ三以配伍スベシ。其症ニ隨ヒ先吐劑或ハ下劑ヲ與ヘテ可ナリ。

膝痛

イヌキアス
グアラ
羅ヘウ
プウ
キサ
蘭

三

此症唯癩麻質斯ノ變症ト見做スベシ故ニ其治法モ亦概シテ癩麻質斯ト一般タリ輕易ノ症ハ毛布ヲ以テ關節ヲ纏ヒ腰上ニ發疱硬膏ヲ貼シ發汗劑ヲ服セシメテ全治ス。

ル者多シ然レト殊ニ此症ハ的列並油ヲ内外施用スルヲ

賞譽セリ

六百五十六方
六百五十八方

至更ニ焮衝証ヲ見ハス片ハ腰ニ

蟻鍼或ハ吸角法ヲ施スヲ最切要トス。○神經性膝痛ハ發疱膏長六獨乙謨幅ニ獨乙謨乃至三獨乙謨ノ者三枚ヲ作リ一ハ腰ノ外部疼痛ノ經ニ循テ之ヲ貼シ一ハ其后二三日ヲ過テ膝ノ上部外側ニ貼シ尚或ハ之ヲ要スル者ハ前ノ發疱瘡ユルノ后其第三枚ヲ取テ更ニ外踝ニ貼スベシ。

○第六百五十方

癩麻質斯

癩麻質斯性胸脇痛。心膜焮衝初起。癩麻質斯性嘶嘎及耳痛。其他小兒癩麻質斯病。宜其症極々頑固。ニメ疼痛アル者ハ雙鸞菊越幾斯ニ三以配伍スベシ。其症ニ隨ヒ先吐劑或ハ下劑ヲ與ヘテ可ナリ。

安質沒尼丁幾

錢三

癩瘡木脂揮發丁幾

半

阿芙蓉丁幾

錢一

右調和每服三四十滴燕麥汁和服日四次臨服宜振盪

主治 膀胱痛ノ餘症ニ格椿尼氏ノ療法ヲ施シテ后之ヲ用

前フルニ宜シ

○第六百五十一方 弗陽 彼弗 夥

雙鸞菊越幾斯 四 氏 至 硼酸 一 氏 至

右調勻為散分八包朝夕服一包三時了藥ノ皆三時了非

主治 痺麻質斯慢症殊ニ膀胱腰痛ニ宜シ ○方今硼酸ヲ

實用ナルヲ廢セリ蓋之ヲ棄ル者恐ラタハ未其効驗ヲ

究メザル乎弗陽 名 人 人 說ニ云ク此方膀胱腰痛ヲ治スル

ノ効速ニシテ且確實ナルヲ他ニ較スベキ者ナシ二三
服ニシテ大ニ緩快ヲ覺ユル者多シト

○第六百五十二方 葛弗 歇 兒 綿 秘 篤 尉 止

格魯林 リ 加 爾 幾 一 錢 蒸餾水 四

右調勻每一時服一食匙

主治 頑固ノ神經性痺麻質斯 腰痛膀胱痛等之ニ宜シ

○第六百五十三方 斯 屈 列 西 爾

升汞 二 氏 至 曼陀羅華越幾斯 三 氏 至 蒸餾水 一 弓 半 溶

解

○右調勻每一時服三十滴乃至五十滴

○第六百五十四方〔蒲斯屈補至膏〕下散

升秉二桂水一弓半融解

右調勻每一時服三十滴乃至五十滴

○主治右二方〔膝痛假症〕僕麻質斯顏面痛其他總テ頑滯

セル僕麻質斯及ヒ神經痛ニ宜〔六百十九方〕蓋爾〔咳〕

刷屈斯〔人〕論ニ據〔升秉〕ハ真ノ膝痛ニ用ヒテ効〔ル〕

ル〔十〕云〔フ〕

○第六百五十五方〔律私篤〕

肝油〔四〕至〔六〕

右頓服

主治經久僕麻質斯或ハ依倔篤ニ宜シ殊テ僕麻質斯性

膝痛ニ効アリ其症頑固ノ者モ亦之ニ宜シ律私篤氏肝

油ハ膝節ノ神經ニ一種ノ奇藥ト稱ス用法患者眼ヲ瞑

鼻孔ヲ覆〔フ〕テ每朝之ヲ服シ直チニ冷水ヲ以テ含漱

シ哥喜一盞ヲ飲シ此ノ如ク之ヲ用ヒテ數週間持重

○第六百五十六方〔萊爾質濕篤〕的列並乳

的列並油〔錢〕鷄子黃〔一〕薄荷舍利別 橙花舍利別

各〔二〕舍電阿芙蓉液〔半錢至〕

右調勻每服一食匙日三次食

透西方藥 卷六 膝痛 三十一 廣 丹 堂

○第六百五十七方同上 三六食

的列並油錢三 鷄子黃筒一 薄荷水弓二 橙花舍利別弓一

舍電阿芙蓉液半刀至 錢一

○右調勻每服一食匙日二三次

主治右二方膝痛ニ宜シ○昔者既ニ的列並油ヲ膝痛ニ

用フ殊ニ今ヲ距ル一三十年萊爾質涅篤名之ヲ稱贊シ

患者七十人ヲ集メ此方ヲ用セテ治セル者五十八人就

中五十五人ハ之ヲ内服セシメ餘ノ三人ハ之ヲ塗擦セ

リ○此他佛蘭西獨乙ノ醫モ亦的列並油ノ効アルヲ確

定セリ蓋多クハ其服量ヲ減少シ較母別兒名等ノ如

キハ十五滴乃至二十滴ヲ用フル一日ニ三次スト云フ

○然レモ余ハ的列並油ヲ用フルニ之ヲ煨製名屈涅失

亞ト合シ封糊ヲ以テ包裹シ服スルヲ最妙トス

○第六百五十八方忽點

的列並油錢一 橙花舍利別或精製蜜

右調齊朝夕服一食匙

主治膝痛ニ宜シ○魯西亞ノ俗間ニ的列並油十二滴乃

至十五滴ヲ以テ沙蘿蔔浸ニ和用スト云フ

透西方藥 卷六 三十一 廣 丹 堂

至十五歲以上少壯者氣血未定

主治脚氣一宜之○魯西亞之谷間

本國膏障又服一食其○昔者

用治脚氣一登其命作限於膝

○第六百五十八卷

亞士命之捷路也以其意

○為之五余八節候並賦

遠西方彙卷之六至二十

