

遠西方彙

七

○卷之七

第三 熱性皮膚病

痘瘡

麻疹

猩紅熱

律別阿刺

羅斯

帶狀羅斯

粟疹

蕁麻疹

謁設刺

水疱疹

鵝口瘡

富士川文庫

499.2

En-2

3

×

e 12

F 3
E-22




富士川文庫
3260



499.2
Em-2
3

No1388
12 e12



伊東瑤川院譯

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之七

獨乙 加幾安頓 著
和蘭 傑 婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯

南洋伊東 寺健夫 參校

第三 熱性皮疹

痘瘡 フアリ
ポツケン オラ 羅

痘瘡ノ治法大概其熱性ニ準ス攝養總テ清涼ニ宜シク病室常ニ風氣ヲ開通スルヲ要トス但最注意シテ賊風ヲ避

単純良性ノ痘ハ唯適宜清涼ノ攝養ヲ命シ。植物類ノ食餌。稀釋ノ効アル飲劑蓋根煎汁。攪爾都兒水。乳ヲ與ヘ。日ニ大便ヲ順利セシメ其症ニ從ヒ。佛那煉膏一茶匙。乃至ニ茶匙與フルモ可ナリ。大抵別ニ醫藥ヲ須ズシテ經過シ去リ餘症ヲ遺ス了ナシ但病末灌膿ノ期及ヒ結痂ノ時ニ至テハ下劑若クハ緩和灌腸ヲ施シテ大便ヲ增多セシムルヲ簡要トス。起脹ニ至リテ擗撃ヲ發スル者ハ亜鉛華六百六十四方若クハ小量吐根六百六十五方用フヘシ然レモ痘瘡ハ大抵焮衝性殊ニ初期ヲ見ハス者多シ焮衝性ノ症ハ消石或ハ礪砂ヲ以テ水液若クハ乳劑

ニ和シ與ヘ若焮衝性更ニ増劇シ或ハ局處焮衝ヲ發スル片ハ瀉血大人ハ刺絡。小兒ハ琪鍼。宜シ灌膿ノ期ニ至ルマテ緩和消焮ノ處置ニ從ヒ已ニ其期ニ至リ清涼中和鹽六百六十六方至六百六十七方方六百六十八方或ハ甘永ヲ以テ屢瀉下セシムルヲ要ス又此期ニ於テ鑛酸ヲ稱用ス六百六十七方但鑛酸ヲ用フル片ハ甘永ヲ屏クベシ瀉ハ結痂ノ期ニ及シテモ亦持重スヘシ之ニ由テ能ク其餘症ヲ防止ス此時ニ當リテ最甘永ヲ稱用ス○腸胃瘀物鬱滯症ハ中和鹽醋酸加里液九方精製孕鹼酒石五方至五十三方佛那煉膏附等ヲ用フヘシ或ハ其症ニ從ヒ初メ吐劑ヲ與フルモ佳ナリ○神經性ノ症ハ

即神經熱ノ治ニ從フ其攝養煖衝痘ニ較レハ更ニ温暖ヲ加フヘシ其藥劑ハ民埜列里精乳劑ニ龍腦ヲ伍スル者六十方續草六百六十九方攝爾扁太里亞六百七十七方阿芙蓉麝香六百七十一方幾那等ヲ稱用ス○腐敗痘ハ通例灌膿ノ期ニ至テ腐敗ニ傾タカ故ニ幾那亞兒尼加鑛酸類明礬等ヲ以テ揮發刺衝藥ニ配用スルヲ要トス

○第六百五十九方弗陽做秘託爾結

民埜列里精一錢安質沒尼酒一錢

右調勻每一時服四十滴乃至八十滴

主治痘瘡麻疹赤癍熱總テ熱性皮疹病生力衰憊肌熱足

ラス且潰瘍ヲ兼ヌル者之ヲ用ヒテ發生シ易カラシム此方大人ノ用ニ充ツ小兒ハ其服量ヲ減スベシ

○第六百六十方弗陽做秘歌蘭度

孕險酒石一錢麻屈涅矢亞一錢精製消石半錢滿那六錢

蒸餾水二

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒ノ煖衝熱腸胃熱等清涼緩和及七瀉ヲ要スル

者之ニ宜シ殊テ生齒熱聖京屈熱順性痘麻疹赤癍熱ニ

用フベシ

○第六百六十一方秘歌蘭度

○安質沒尼酒至一錢半

蒸餾水至二錢

滿那舍利別至一錢

右調勻每一時服一茶匙

主治痘瘡序熱ノ期之ヲ用ヒテ毎日瀉ニ行ヲ得ベシ○

適宜ニ甘永ヲ與フルモ亦佳ナリ小兒ハ半氏乃至一氏

ヲ服スル日ニ二三トス

○第六百六十二方

○燐酸曹達二錢至三錢

覆盆子水四勺溶化加後藥

○覆盆子舍利別六錢

右調勻每一時服一食匙弱

主治痘瘡腸胃汚物ヲ夾ム者之ヲ用ヒテ瀉ヲ促スベシ

殊ニ八歳乃至十二歳兒之ヲ與フルニ宜シ○燐酸曹達

ハ小兒ニ與ヘテ甚適當トス其効力甚緩ニシテ兼テ小

兒ニ多クアル所ノ酸敗液ヲ制スルガ故ニ尤妙ナリ

○第六百六十三方遠突土

荅麻林度一至三水適宜煮四分時濾過取六勺加

滿那舍利別一勺

右調和每半時服一食匙

主治燉衝性痘ニ下劑トシ用ヒテ好シ大人小兒俱ニ通

用スベシ

○第六百六十四方

重鉛華三錢至六錢

白糖一錢

右為散等分六服日二服乃至三服

○第六百六十五方

吐根末三錢至六錢

白糖二錢

右調和為散等分十二裹每一時服一裹

主治

右二方六百六十四方嬰兒痘瘡序熱ノ期皮膚ノ癢

學ヲ鎮メ又搗掣謔語ニ宜シ序熱ノ時期搗掣謔語ヲ發スル者往々之アリ此

方ニ兼テ微温浴。腓腸蒸餅母。足蹠蒸溺法ヲ施スヘシ大

兒モ亦供用スヘシ

○第六百六十六方

重鉛華

龍腦各一錢至二錢

甘汞半錢至一錢

白糖半錢

右調勻為散分八包每一時乃至一時半服一包

主治 痘瘡見點ノ期熱微ニ皮膚慘憺弛緩シテ冷。脉小。軟。

主シテ震ビ或ハ非常ニ遲。且痘點出沒スル者之ニ宜シ

大人此症ヲ得ル者ハ死ス

○第六百六十七方

收斂重的兒半錢

覆盆子水六錢

覆盆子舍利別子

右調勻每一時服一小兒匙或一食匙

主治 痘瘡灌膿ノ期膿熱旺盛肌熱太甚。脉實ノ症之ニ宜

シ大兒及大人俱其症從天之日通用スヘシ

○第六百六十八方 遠突出 湯取一分

龍腦六 亞刺昆亞護漿 過爾抱舍利別各一分 徐

○第六百六十九方 右每一時服一食匙臨服宜振盪

右每一時服一食匙臨服宜振盪

主治十歲以上ノ兒童痘瘡鈍性神經熱狀ヲ帶スル者ニ

宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ 宜シ

○第六百六十九方 同上

顯草錢二 熱湯適宜浸漬濾取四弓加後味

○鹿琥精錢一 六橙花舍利別錢一

右調和每一時服一食匙

主治大兒ノ虛性痘ニ宜シ

○第六百七十方 同上

亞兒尼加花錢一 熱湯適宜浸漬濾取五弓加後藥

舍電阿芙蓉液六滴至十滴 亞刺昆亞護末 白糖各錢

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治大兒痘瘡鈍性神經熱狀ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第六百七十一方 過傑栗屈的兒

上好麝香錢三 舍電阿芙蓉液二十滴 鹿琥精三十滴 雜

腹蘭舍利別錢一

右調勻每十時乃至一時半服一茶匙

主治神經性痘灌膿ノ期俄然ト陷凋スル者此方危險ヲ

防クニ宜シ○名ハ此ノ如キ症ニ甘汞藥刺巴脂

各半ヲ用ヒテ之ヲ瀉シ以テ生命ヲ救フト云フ○藥刺

巴脂ハ研末シ難キヲ以テ藥刺巴脂布刺巴落篤藥刺巴脂甘扁

桃等ヲ優レリトス但シ其服量ヲ一倍スベシ○栗屈的

兒氏溼優滿氏ノ方ハ皆大人ノ服量ナリ

○第六百七十二方遠突也

主王幾那水適宜煮八分時濾過加亞刺昆亞邁謨末

本藥子錢一執瓶一會共

右調和取其四分一加水半小盞灌腸日三四次

主治小兒神經性痘且シ

○第六百七十三方私記爾結

○草銘糖ハ十蓄薇水ニ

右醃重布卷眼胞黒斑ハ發スハ皆ニ宜シ

主治眼焮衝ヲ防グニ宜シ昔方ハ註釋ヨニ有リ

○第六百七十四方彌德禰爾

升承ニ蒸餾水三ヲ溶化下平成六蠟密封也

○右供養法ハ

主治痘毒眼ニ入ルヲ防キ且面部ノ結痂ヲ順良ナラシ

○第六百七十五方 [溫優湯]

龍腦半 加亞的兒二錢丁子油六滴溶化

○右調和醃重布卷眼

[主治]痘瘡見點ノ期眼痛スル者或ハ結膜已ニ赤點ヲ見

ハシ或ハ角膜ニ暗黒斑ヲ發スル者ニ宜シ

○第六百七十六方 [理篤膏]

○礪砂錢ニ 覆盆子舍利別錢ニ

右調和塗口中或供舐藥

[主治]痘瘡灌膿ノ期口内灼熱スル者ニ宜シ又覆盆子水

計四弓ヲ加ヘテ含漱劑ニ供ス

○第六百七十七方 [福極膏]

雞子黃箇ニ 新鮮無鹽酪三 沒藥末 松ス百兒末搗多

六百末各ニ 以文火煮至爲褐色以綿布絞濾加後藥

○單拔爾撒謨露錢半

○右調勻塗痘顆間

麻疹マヒルゼレルリ蘭

痘瘡ニ在テハ其危險ヲ預防シ順良ノ經過ヲ得セシメ之
カ爲ニ清涼保護ヲ以テ治療ノ第一義トスレバ麻疹ハ則
之ニ反シテ適宜ニ温覆シテ以テ皮膚ノ運營ヲ催進スル

ヲ要トス序熱ノ期擗掣ヲ發スル氏ハ耳後ニ放蟻ニ甘永
 ヲ與ヘテ微瀉セシメ下肢ニ煎餅母ヲ貼シテ屢之ヲ交換
 然レシ爾後效嗽及ヒ眼焮衝アリテ退カザル者ハ殊ニ注
 意シテ治ヲ加フベシ此他其病性ニ從フテ宜ク應當ノ治
 法ヲ立ツベシ

○單純順良ノ麻疹ハ醫藥ヲ須ズ唯第六百七十八方乃至
 六百八十方ヲ與ヘテ效ヲ制シ旃那煉膏附若クハ他ノ清
 涼下劑二三服ヲ與ヘテ大便ヲ進メ以テ功ヲ收ムルニ足
 ル者多シ但其攝養ハ通例熱病ノ處置ニ從ヒ刺戟衝動ノ
 性ナク清涼食餌ヲ撰用シ飲料ハ枸櫞汁及ヒ砂糖ヲ湯ニ

和スル者或ハ覆盆子煎汁燕麥汁大麥汁過兒抱根若クハ
 歇爾拔私屈謨花ノ煎液接骨木花浸菩提樹花浸和胸浸劑
 其他熱勢ヲ緩和シ適宜ノ發表浸劑五百九十九方ヲ用フベシ效
 嗽劇甚ノ者ハ罽羅尼爾六百八十一方ヲ殊ニ稱賛ス○焮衝性ヲ
 見ハス者ハ刺絡及ヒ局處放血ヲ要スル者多シ肺臟氣管
 喉頭或ハ腦焮衝ヲ兼併スル者ノ如キハ殊ニ然リ此他消
 石ヲ水或ハ粘滑煎液ニ溶化スル者九方至十三方碓砂ヲ度碌布
 及ヒ吐酒石ニ配伍スル者廿一方結晶水四方清涼下劑十六方
方。十六方。五十六方。至六十六方。或ハ其症ニ從ヒ甘永ヲ與フヘシ但此諸藥
 熱勢ト患者ノ年齡ニ準シテ斟酌スベシ○腸胃汚物ヲ夾

ム者ハ稀釋劑ニ宜シ五十四方至五十九方吐下劑モ亦可ナリ五十四方
至七十方 ○神經性麻疹ハ其初期衝動劑甚害アリ唯小心シ
テ消焮治法ヲ持重スベシ若麻疹俄ニ内陷スル時ハ衝動
藥並ニ揮發鹿角鹽六百八十三方麝香六百八十四方等ヲ要スル者間之
アリ然レモ予ハ此ノ如キ極メテ危險ノ症ニ温茶ヲ與ヘ
兩足ヲ蒸漏シ暖桶若クハ暖布ヲ以テ身體ヲ温保シ屢諸
部ニ蒸餅母ヲ貼スル等甚簡易ノ方法ヲ以テ其内陷ヲ喚
起シ危急ヲ救ヒシト徃々經驗スル所ナリ

○第六百七十八方 襪歌蘭度

安質没尼酒三十滴

孕鹼酒石一錢半

接骨木花水二

○過兒托舍利別一

右調和每一時服一茶匙

主治三歲内外ノ兒單純麻疹第一期ノ者之ニ宜シ

○第六百七十九方 同上

扁桃油新絞一錢 水二 亞刺毘亞護適 漿適 作乳劑

加後藥

菲阿斯越幾斯心 扁桃舍利別一

右調勻每一時服一茶匙

主治四歲乃至六歲兒ノ麻疹欬嗽甚シキ症ニ宜シ

○第六百八十方 野我

○甘扁桃油ア亞刺昆ビ亞護ゴ護ム將ス各ハ半ニ 過爾ル托舍利リ別リ

右調和每半時服一茶匙ハ私ハ疾ク歌ル爾

主治麻疹ニ用ヒテ效嗽ヲ防クニ宜シ之ニ兼テ痙攣劇

シキ者ハ非阿斯越幾斯ス二ハヲ加フ

○第六百八十一方

哥攝コ尼爾ニ爾ル五ハ 純精酒石ハ半ニ 白糖ハ半ニ 熱湯ハ三ニ

右調齊小兒每一時服一哥喜匙强大人一食匙强

主治麻疹效嗽劇甚ノ者之ニ宜シ越印結ハ名ハモ亦之ヲ稱

用セリ

○第六百八十二方

民埵シ列レ里リ精 過兒ル托舍利リ別リ各ハ半ニ 安質ア没メ尼ニ酒ハ一ニ 錢ハ

菩提樹花水ハ三ニ

右調勻每一時服一兒匙或一食匙

主治麻疹第一期頗神經性ニ傾ク者之ニ宜シ

○第六百八十三方

揮發鹿角鹽ハ二ニ 接骨木花水ハ六ニ 溶化加後藥

龍腦醋ハ適ハ宜ハ飽ハ和ハ為ハ度ハ 接骨木子昆ハ設ハ兒ハ弗ハ一ニ

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治大人麻疹神經性ノ者或ハ内陷セル者ニ宜シ○内

陷ニ由テ内部焮衝ヲ發スル者獨此方ヲ用フル片ハ害

アリ此種ノ症ハ大抵放血シ消石及ヒ皮膚刺戟法泥子膏ヲ適當トス而メ炊衝証退クノ后發表劑ヲ與ヘテ專
麻疹ヲ再發セシムヘシ之ヲ發スルハ龍腦消石ヲ配伍
スル者最佳ナリ

○第六百八十四方 〔穢歌蘭度〕

麝香六錢 白糖一錢 研和加後藥

鹿琥液六十滴 接骨木花水五 扁桃乳舍利別一

右調和每半時服一食匙臨服宜振盪

主治神經性麻疹内陷シ尋テ痙攣ヲ發スル者ニ宜シ但
此服量ハ大人ノ用ニ充ル者ナリ

○第六百八十五方

雙鸞菊越幾斯一 乳糖一

右調勻爲散等分十二裹每服半裹乃至一裹日三次乃至

四次

主治麻疹血行暴劇症此方之ヲ鎮靜セテ服至及ヒ
心悸疾速ヲ制スルニ宜シ此症雙鸞菊ノ奇效アル怪シ
ムベキニ似タル者屢之アリ○此方小兒大人俱ニ用ヒ

○第六百八十六方

雙鸞菊丁幾一 蒸餾水一

同上方藥 蒸餾水

右調和每服一茶匙日三四次

○主治此方一同之

○第六百八十七方

默印失屈篤發表膏

非阿斯硬膏

○右調和攤革點頸圍

○主治麻疹輕易及扁桃腺焮腫ヲ兼發スル者ニ宜シ之

○第六百八十八方

榎楂核汁

蓄薇水

右調和為眼水

○主治麻疹淚液酷厲ニシテ眼ヲ侵蝕スル者此方之ヲ防

○第六百八十九方

失鳩峇越幾斯

精製硫黃

非阿斯越幾斯

白糖

右調和為散分十二裹每服一裹日三次

○主治麻疹後慢性ノ乾效アリテ嘶嘎スル者ニ宜シ按ス

ルニ此方假令大人ノ用ニ供スルモ方中失鳩峇ノ量過

多ナリ況ヤ小兒ニ於テヲヤ若峻カク越幾スヲ製藥局

ヨリ得テ之ヲ用フルト此ノ如クノ多量ナルハ恐ラ

クハ其益アルヨリ害ヲ招クヲ多カルヘシ予慢性ノ胸

透... 卷七... 痲疹... 廣... 堂

患ヲ療スルニ先弗刺涅兒ヲ以テ胸部ヲ被覆シ發疱膏
ヲ貼シテ久ク之ヲ持重シ或ハ打膿膏ヲ貼シ次テ授兒
都爾水ニ乳汁ヲ和スル者或ハ單味乳汁或ハ乳養法ヲ
處ス患者若強ヒテ醫藥ヲ求ムルキハ粘滑液ニ菲阿斯
越幾斯若クハ歇爾蘭獨留謨越幾斯ヲ和シ與ニ其他此
症ニ用フル所ノ方法肺勞條下ニ列載ス

猩紅熱 シカルラチナ羅シカル
ライケンコールツ蘭

此症大抵緩性消焮法ヲ處シテ的當トス假令微寒ト雖之
ヲ冒スコナク三四週間病床ニ在テ適宜ニ温覆シ時候良
ナルモ落痂後八日至ハ病室ヲ離レズ時候濕冷ナレハ十

四日至病室ニ在ラシムベシ病ノ第一期ニ於テ吐劑ヲ稱
用スル者多シト雖ト予ハ之ヲ取ラス殊ニ單純症ニ於テ
ハ吐藥ヲ過タリトシ焮衝症ハ必害アリ神經性症ニ至テ
ハ尤然リトス故ニ獨腸胃汚物鬱滯ノ候尤較著ノ症吐劑
ヲ用ヒテ可ナリ蓋其症モ亦適宜ノ清涼下劑ヲ優レリト
ス○六九 輓近礪砂華ヲ以テ十一方 猩紅熱ノ奇藥トシ諸種ノ
症ニ稱賛セリ

○焮衝性猩紅熱ハ瀉血消石清涼下劑甘禾 尤及ヒ清涼
ノ洗滌法ヲ要ス然レト洗滌法ノ如キハ每常之ヲ施スニ
謹慎者加フベシ

○腸胃汚物症ハ思室偃栗都名ノ方十六百九ヲ差改製シ施

シテ最適當トス ○神經性ハ症ハ鑛酸類殊格魯林水百五

九方冷滌法及ヒ鳩魯利氏石灌水法秘野神氏說

或ハ發見モ假令發スルモ僅々且灰白色ニシテ忽復消

滅シ皮膚乾燥シテ灼熱アリ頸若クハ胸部ニ畜血アリガ

ル者獨瀝水法ヲ以テ顯草根爾扁太利亞龍腦亞的兒等ノ

如キ衝動藥ニ優出トス衝動劑ハ稀ニ真ノ良効ヨ奏ス

ルハ極メテ惡症ト雖モ簡易法ヲ施ステ最佳トス

○一千八百四十八年預鯨歌爾地名ノ叔溼滿人名テ猩紅

熱ノ治法ヲ發明シテ世ニ公ニセリ其法頭面毛髮ノ生ス

ル部ヲ除クノ外朝暮遍體家猪脂ヲ塗擦ス之ヲ施スト病

初第一日ヨリ始ムベシ此法功用未嘗テ此治法ノ三件ヲ

一ハ之ニ由テ肌膚ヨリ他ノ病邪ヲ再感スルトク又

白屑ヲ剥落セシムルトナシ二ハ皮膚ノ運營絶エス他部

殊ニニ交感シテ其部ニ良能ヲ呈シ之ニ由テ患者毎常暫

時ニシテ癒ユ設日ヲ延クモ十日ヲ過クレハ外氣ニ觸ル

ルモ危險ノ證ヲ發スルトナシ三ハ發病第三日乃至第四

日ヲ過クレハ即疹消後他人ニ傳染スルノ恐レナシ何者病

毒ノ繁殖ヲ制シ且其發揚ヲ防止スルニ因ルナリ私屈涅

滿名此法ヲ施スニ必病者ニ命メ左ノ三件ヲ守ラシム第

一患者冷室ニ居リ列氏驗温器十毎日數次牖戸ヲ開キテ

清氣ヲ延キ病床ニ在テモ亦其被覆暖ニ過クベカラズ第
 二發疹ノ期熱ヲ帶フル間ノ患者床中ニ居リ此期ヲ過
 クレバ即床ヲ出ツベシ但衣服暖ニ過ベカラズ第三惟熱
 アル時ハ嚴ニ食養ヲ守リテ稀淡ノ肉羹汁熟果白蕪餅及
 ヒ冷水等ヲ用フベシ○此他大ニ頭腦ニ關係アル症ハ私
 屈ク温チ滿マ人リ刺チ絡リ及シヒ頭ノ寒ヲ餐フ法ニ蕪餅ヲ母テ稱用シ肉服ニ確
 砂ヲ與シ咽ノ喉ニ炊衛アレハ琪ヲ鍼ヲ施シ吐劑ヲ與ヘ扁桃
 腺上ニ刺ス必シ私印歇爾那栗斯ノ溶液ヲ塗擦ス○良醫毛篤
 温耳人伊私屈稱滿ノ法効驗アルヲ論述セリ噎別爾篤人
 毛亦便列印地ノ病院小兒局ニ在テ施治セシ時或ハ平日

モ亦屢此法ヲ試驗シテ切ニ之ヲ稱賛セリ○獨預熊歇爾
地ノ奴別連突人ハ之ニ反シテ異論アリ蓋其說頗學理ニ
 基ケリ

○猩紅熱ノ餘症殊ニ水腫ヲ預防スルニ白屑剝脫ノ時期
 ニ方テ温浴ヲ施ス者アリト雖啖私温爾人等ハ之ヲ不可
 ト布列私彪爾屈地ノ弗格呂乙歇爾人今テ距ルヲ殆十
 年前自驗ノ一法ヲ世ニ公ニセリ之ヲ行フキハ後患ヲ防
 グノ效的實ナルベシ其法白屑始メテ剝落スルノ翌日午
 後ニ方リテ入湯法ヲ施スナリ但湯ヲ盈滿シテ患者ノ頤
 ニ及バシメ其温度ハ患者ノ意ニ適セシム患者暫時湯中

ニ在リテ冷ユルヲ覺ユルニ至レハ即遍身ヲ拭ヒ乾カシ
暖床ニ就キ茶二碗ヲ温服セシメ慎テ十分ノ發汗ヲ俟シ
ム又翌日ハ其温二度ヲ減シテ之ヲ行ヒ爾後モ尚此法ニ
隨ヒ每湯二度ノ温ヲ減ス第三湯或ハ第四湯ニシテ患者
ニ許シテ起立シ且室中ヲ歩セシムルヲ半時間其次日ハ
日中病床ヲ離レシメ又其次日ニ至レバ午前モ亦病床ヲ
離レシム第七湯ヲ經レバ近傍ノ涼室ニ出ツルヲ許シ美
日ニハ晚間始メテ外氣ニ觸レシムルヲ八分時又其次日
ハ入湯ヲ停メ屢新清氣ニ浴セシム但賊風及ヒ窓邊ヲ避
クヘシ又其次日入湯セシメ湯後及ヒ次日此日ハ入湯モ亦

外ニ出テ逍遙セシム其後更ニ最後ノ湯ヲ施スヘシ法ノ
如ク之ヲ施シ來レハ其最後ノ浴湯ハ大抵發病第二十
日或ハ二十二日ニ抵ル嬰兒ハ入湯ニ代ヘテ洗浴ヲ行フモ
亦可ナリ但其温度モ亦逐次ニ減シテ冷ナラシムベシ此
法ヲ施スキハ舊肌膚軟化シ新肌膚ノ觸覺機減殺シ且其
肌膚モ亦速ニ冷氣ニ習慣スルナリ是故ニ此治法ハ膏ニ
後患ヲ預防スルノミナラズ未之ヲ行ハサル時或ハ之ヲ
行フノ際ニ方テ假令餘症ヲ發スルモ亦能ク之ニ因テ治
スルナリ水腫ヲ發セシ者大人ニ在テハ間瀉血ヲ要スル
アリ小兒ハ急性腦水腫之ヲ施スベキ者更ニ罕ナリ内服

ハ甘永ニ實菱答利斯ヲ配スル者ハ方百實菱答利斯浸ニ醋
 酸カカリヲ加フル者七百方純精酒石七百方刺發斯根七百方
 杜松子及ヒ杜松子傑列乙等ヲ與フ外用ハ足蹠ニ的列並
 油ヲ塗擦ス

○第六百九十方別錄突驚

葛若越幾斯ハ桂酒水兩半ヲ溶化實菱答利ス且其
 右調和一歳兒朝夕與二滴乃至三滴其他從年齡每一歳
 加一滴

主治猩紅熱ノ預防方大ニ服量十二滴極下ス披改

後蘭度人設爾呂同匹篤矢葛弗土同等モ亦其效ヲ確定セ

リ

○第六百九十一方

硝砂萃一錢至 蒸餾水五ヲ溶化加後藥

過爾托舍利別一

右調勻每四分時乃至半時服一兒匙若一食匙既防得危
 險證後每一時與之但臨服宜振盪

主治拍過爾土名人微魯中選同微的綸同屈同弗同歇印同私別爾

屈同爾同噦同索斯同叔列失爾同弗同暗門同母同私德落兒同等

此方ヲ稱譽シテ諸種猩紅熱ノ諸期ニ用フ此方ヲ數回
 反覆シ用ヒテ四劑ヨリ五劑ニ至ル復他藥ヲ兼用スル

遠西本草 卷七 猩紅熱 廣野堂

ヲ需メス

○第六百九十二方 〔秘列肺癆〕

吐根末半錢至 熱湯適宜飽熱四分時濾取一多半加

後藥

覆盆子舍利別半

右調和每八分時服一哥喜匙

主治猩紅熱ニ宜シ○此方吐逆ヲ起サスシテ能ク熱ヲ

解シ咽喉痛ヲ緩和ス

○第六百九十三方 〔思室掘栗都〕

瀉利鹽半多至 蒸餾水六多乃至十二多溶化加屋施オキシ

○第六百九十四方 〔思室掘栗都〕

右調和每一時與半小盞以每日令瀉三四行

主治猩紅熱ノ第一期ニ用フ○思室掘栗都氏ハ先吐根

ニ少量吐酒石ヲ配スル吐劑ヲ與ヘ而後三四日間上ノ

下劑ヲ服セシム此ニ於テ熱勢増加セザル片ハ轉メ碓

砂リ歇利飲等ヲ投ス若熱勢益熾ナル片ハ朝暮甘朮一

瓜ヲ與ヘ硫酸ヲ以テ上ノ飲劑ニ和服セシメ且下肢ニ

蒸餅母ヲ貼ス是故ニ下劑ハ停ムルニアラザルナリ○

硫酸甘朮ヲ同時ニ服スルハ舍密術ノ則ニ違フト雖一

千八百十三年我邦軍中神經熱オールピロス流行セシ時

遠西本草 卷七 廣野堂

我邦ノ醫甘汞ヲ用ヒ冷水ニ收斂亞的兒ヲ和シ飲料ト
ス他日伊醫ノ遺辭ニ曰ク入胃ハ舍密ノ列篤爾土_{舍密}
名ニアラズト

○第六百九十四方 〔膏布〕

格魯林水 錢ニ

覆盆子水 半一

覆盆子水 半一 檳榔枝汁 過爾托舍

利別 各六錢

右調和每半時或一時服一茶匙乃至一茶匙半

主治刺衝熱殊ニ猩紅熱及ヒ生齒熱ニ宜シ又三歲乃至

五歲兒ノ水痘カントルニ用フ

○第六百九十五方 〔穢歌蘭度〕

稀硫酸 十滴

桑椹舍利別 三

右調和每服一食匙日數次徐々飲服

主治猩紅熱ニ併發セル咽喉焮衝ニ宜シ兼テ接骨木花

浸錦葵葉浸屋施蔑尔ヲ以テ含漱セシメ弗刺涅兒ヲ以

テ頸圍ヲ纏フヘシ更ニ劇甚ノ症ハ蜚蟻及ヒ芥子泥ヲ

施ス此方大人或ハ大兒ノ用ニ供スベシ

○第六百九十六方 〔肝設爾〕

民埵列里精 六

精製礞砂 一錢

玫瑰蜜 一

右調勻每四分時取二羅獨量許射注咽喉

主治猩紅熱ノ病者咽喉焮衝熾盛ノ症ニ宜シ大人ノ用

ニ充ツ

○第六百九十七方〔拔耳驚〕

再鑑木酸弓半 蒸餾水弓五 桑椹舍利別弓一

右調和爲含漱水

主治猩紅熱ニ合併セル腐敗性咽喉焮衝ニ宜シ大人ノ

用ニ供ス

○第六百九十八方〔遠突土〕

消石錢一 大麥煎八弓 溶化加後件

桑椹舍利別弓一

右調和供射注

主治猩紅熱ニ合併セル咽喉焮衝症深紅色ヲ呈シテ而
ノ未潰瘍ニ變セザル者之ニ宜シ

○第六百九十九方〔同上〕

接骨木花浸弓八 民埵列里精各 玫瑰蜜各

右調勻供含漱

主治猩紅熱ニ合併セル咽喉焮衝潰瘍ニ變スル者之ニ

宜シ右二方六百九十八方ハ獨大兒若クハ大人ノ用ニ

供スベシ

○第七百方〔福僂驚〕

醋酸加里錢二 覆盆子水三弓 溶化加後藥

遠西方藥 卷七 猩紅熱 廣月堂

海葱醋錢二 覆盆子舍利別子一

右調和每一時服半食匙

主治二歲乃至三歲ノ兒猩紅熱後ノ急性水腫ニ宜シ

○第七百一方遠突土

醋酸加里液各一 滿那舍利別各一 蒸餾水子二

右調勻每一時服一小兒匙

主治猩紅熱後ノ急性水腫ニ甘永ト更換シ用フベシ小

兒ノ用ニ供ス

○第七百二方布標歌耳

純精酒石子半 滿蘆舍利別 杜松子舍利別各二 砂

糖舍利別子一

右調和為煉膏每半時服一茶匙乃至二茶匙

主治猩紅熱後ノ喉衝性水腫ニ宜シ大人及ヒ大兒ノ用

○供ス

○第七百三方遠突土

木香錢一 熱湯適宜浸漬濾取四子加後藥子大兒ノ用

炭酸剝篤亞斯與海葱醋飽和者錢半 橙花舍利別子半

右調和每一時服一食匙

主治水腫及ヒ猩紅熱ニ宜シ小兒ニ用フベシ

○第七百四方遠別倫歌情

廣月堂

遠西方藥 卷七 二二 廣 丹

○實芟答利斯葉一熱湯適宜浸漬濾取五弓溶醋酸加

主治里半弓乃至一弓加後藥心胃一用

海葱蜜六錢六熱湯適宜浸漬濾取五弓溶醋酸加

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治猩紅熱後之焮衝性水腫宜大人及七小兒ノ用

○供スベシ小兒

○第七百五方同上

刺發斯根半熱湯適宜浸漬濾取六弓溶化後藥

精製消石一錢半海葱蜜六錢六

右調勻每一時服一食匙

主治焮衝性水腫ニ用フ殊ニ猩紅熱後ノ症ニ宜シトス

大人及七小兒ノ用ニ供スベシ

○第七百六方刺發斯根

刺發斯根 杜松子各一和胸劑料各一

右細剉調齊

主治猩紅熱後ノ水腫ニ宜シ大人ノ用ニ供ス小兒ニ與

フル片ハ刺發斯杜松子ノ量ヲ減スベシ

○第七百七方同上

顯草六錢六攝爾扁太里亞一錢六海葱或實芟答利斯半錢六

注熱湯適宜飽熟八分時濾取六弓加後藥

遠西醫學 卷七 猩紅熱 廣 肺 堂

民埜列里精一錢 甘消石精二錢 實亞格地温一錢

右調和每半時服一食匙乃至二食匙

○主治 虛性猩紅熱落痂ノ期水腫ノ候ヲ見ハス者之ニ宜

シ大人ノ用ニ供ス

○第七百八方

甘朮四匁至八匁 實芟荅利斯葉末二匁至四匁 麻屈濕矢亞

白糖四匁至十六匁

○右調和為散等分八裏每服一裏日四次

○主治 猩紅熱後ノ水腫殊ニ急性腦水腫及ヒ胸水ニ用ヒ

テ峻効ノ一方トス蓋腦水腫胸水ノ如キハ之ニ兼ルニ

○此方小兒ニ用フル片ハ服量

ヲ減シ大人ハ增加スベシ

律別阿刺一名

此病ハ猩紅熱ノ變症タリ經過順良ナル者多シトス治法

大抵良性猩紅熱ニ同シ是故ニ防痂法ヲ處シ適宜ニ大便

ヲ利シ且發表ノ劑ヲ用フベシ然レモ其熱燄衝性腸胃性

神經性若クハ腐敗性ヲ帶フル片ハ各其性ニ從ヒ清涼疏

利緩性衝動若クハ止腐ノ方法ヲ適當ナリトス

羅斯エリス 羅斯ロリス

羅斯ハ其源通例異常ノ膽液分泌ニ關係スル所アルガ故

遠正方藥 卷七 律別阿刺。羅斯 二廿四 廣 胎 堂

三多クハ吐藥六十一方至七十二方及ヒ消焮下劑五十六方至六十七方至七百十七方至七百十七方最適當トス然レハ顔面羅斯ニ於ケ

ル如ク其熱較著ニ焮衝ヲ見ルシ又大千頭腦畜血ノ症ヲ

兼ヌル者ハ吐藥ヲ與フニ謹慎ヲ加スベシ設令之ヲ投ス

ルモ先耳後ニ蟬鍼或ハ小量放血ヲ要トス吐劑ヲ服セシ

后ハ消石鹵硝ヲ配用シ十五方孕鹼酒石或ハ純精酒石ヲ與

ヘ又諸種清涼ノ飲劑ヲ用フベシ○澎魯錄名ハ此症ニ格

兒失屈謨為散十五人ヲ曹達一錢至ト合スル者ヲ稱用シ

微魯中異名ハ礪砂華ノ内服及ヒ其溶液ヲ以テ洗フヲ稱

譽骨屈私骨布蘭度同尋振涅戾同ハ大量ノ的列並油

ヲ内服及ヒ灌腸ニ用フ○神經性腐敗性ノ羅斯ハ神經熱

腐敗熱ノ治ニ準ス外用藥ハ最謹慎ヲ加フベシ木綿弗刺

涅爾子布香竇藥末ヲ以テ患部ヲ被包シ以テ乾温法トス

ルハ最適當タリ刺必私印歇爾那栗斯ノ散末及ヒ濃厚溶

液ノ外用ハ皆之ヲ外用スレハ焮衝速ニ減シニ三日ヲ出テ危險ナリトス

此他諸種ノ外敷藥皆同一般ニシテ頓ニ羅斯發見ノ機ヲ

抑壓スルカ故ニ其害淺少ナラス輒近此症ニ格兒實捏稱用ス余意フニ本文ノ

論之數 ○第七百九方私昆列卑

精製消石 蘆根煎六ヲ溶化加後藥

蘆根煎六ヲ溶化加後藥

蘆根煎六ヲ溶化加後藥

延西方膏
卷七
羅斯
二五
廣
肚
堂

屋施茂爾

右調和每半時服一食匙

主治羅斯等二宜シ

○第七百十方〔謨私篤〕

芒硝一 旃那瀉下飲〔附〕

接骨木花水各三勺溶化加

後味

滿那舍利別子

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

主治焮衝性羅斯二宜シ一症二從一テ先琪鍼或ハ刺絡ヲ

施シ而ノ後腸胃汚物アル者ハ吐藥ヲ與フヘシ○或ハ

此種ノ羅斯二寒一罨法ヲ稱用スル者アリ之ニ由テ能ク
一時ノ快ヲ得ルト雖尋テ危險症ヲ發スルカ故ニ此法
廢シテ用フヘカラズ

○第七百十一方〔弗陽微弗栗都〕

吐酒石三 瀉利鹽一至三 加密列水三勺溶化加失

格列乙舍利別三錢

右調勻頓服

主治羅斯ノ初起先之ヲ與ヘテ同時ニ吐下セシムルニ

宜シ但瀉血ヲ要スル症ハ先瀉血スベシ○盖此方ハ獨

強實ノ人及ヒ熱勢熾盛ノ者ニ適當ス

遠西方彙 卷七 羅斯 廣 肚 堂

○第七百十二方 〔秘〕

荅麻林度二 常水十二三煮濾取八三溶化後藥

精製芒硝半 上好滿那一

右再濾過每半時或四分時服半小盞

○第七百十三方 〔同上〕

純精酒石一 苗香末二 荅麻林度二 覆盆子舍利

別宜

右為煉膏每二時服二食匙臨服宜攪和

主治右二方七百十三方ハ羅斯ノ輕症ニ用ヒテ膽液ヲ

復良シ且之ヲ排除スルニ宜シ之ヲ緩性ノ發表劑及ヒ

清涼ノ食養ト兼用スル片ハ之ニ由テ治ヲ得ル者往々

少カラス

○第七百十四方 〔弗陽〕

瀉利鹽三 接骨木花水三溶化加後藥

安質母尼酒一 民垵列里精一過爾托舍利別各半

右調和每一時服一食匙

主治熱性疹殊ニ羅斯及ヒ猩紅熱ニ治ヲ下スノ始腸胃

汚物アル者ハ先之ヲ用フ

○第七百十五方 〔秘〕

民垵列里精半 黑接骨木花浸四 過爾托舍利別

遠西方彙

卷七

七

廣 肚 堂

羅斯
廣
半

○右調和每半時服一食匙
〔主治〕聖京偃性羅斯熱微ニシテ腸胃汚物アラザル者之

○第七百十六方
〔主治〕

○第七百十七方
〔主治〕

○第七百十八方
〔主治〕

○第七百十九方
〔主治〕

○第七百二十方
〔主治〕

○第七百二十一方
〔主治〕

○第七百二十二方
〔主治〕

○第七百二十三方
〔主治〕

○第七百二十四方
〔主治〕

○第七百二十五方
〔主治〕

○第七百二十六方
〔主治〕

○第七百二十七方
〔主治〕

○實^ナ芟^キ谷^タ利^リ斯^ス葉^エ末^マ

十五人至

甘^カ汞^コ

四人至

白^シ糖^ト

五

右調和為散等分十裹每半時服一裹

〔主治〕羅斯ニ宜シ殊ニ此症猩紅疹ト同時ニ流行シ且頭

腦血鬱甚シキ者ニ宜シ後ハ唯實芟谷利斯ノミヲ用フ

ベシ

○第七百二十一方〔弗陽〕

精製消石^{一錢}

龍腦

加亞利昆亞護護漿適宜研和者六人

接骨木花

水^六

右調和每二時乃至二時服一食匙

〔主治〕羅斯神經性ニ傾久者之ニ宜シ

○第七百二十二方〔護秘篤〕

龍腦

甘^カ汞^コ

各四人

金^キ硫^リ黃^{ワウ}

精製阿芙蓉^{一人}

甘^カ草^{ソウ}

膏^四

右調和為散等分四裹每服一裹日三次乃至四次

〔主治〕羅斯神經性ヲ帶フル者ニ宜シ然レモ此ノ如キノ

症ハ治ヲ怠リ或ハ誤治ニ由テ偶之アリ或ハ惡性神經

症流行ノ時稀ニアル所ナリ但上方ニ兼テ纈草浸亞爾

尼^ニ加^カ花^カ浸^カ等^トヲ與^ルフ^{ベシ}真^{マコト}ノ腐敗熱ハ幾那及ヒ鑛酸ヲ

用フベシ○外用ハ解毒藥ニ龍腦ヲ加フ

○第七百二十三方〔別路突篤〕

○ 癒瘡木脂半 精製硫黃 大黃末 茴香油糖各二錢
 右調勻為散每服一茶匙日二次乃至三次

〔主治〕常習ノ羅斯他ノ原由ナキ者之ヲ用ヒテ偉効ヲ奏スルヲ多シ常習羅斯ハ痔血若クハ月經ノ不調ニ係リ或ハ依俛篤毒及ヒ其他ノ惡液病ニ因スル者多シトス此病根ヲ能ク排除スルノ後ハ冷水洗浴法ヲ施シテ皮膚ヲ強壯ニシ且諸排泄ヲ適宜ニ促スヲ最要トス○ 穢歇蘭度氏ハ苦水ヲ稱用シテ四週毎ニ二三日之ヲ服セシメ又ハ週毎ニ吸角ヲ施シ此他發疱膏ヲ持重シ。瑞香皮ヲ貼シ。打膿スルヲ稱賛セリ

○第七百二十四方

接骨木花 加密列 豆粉各一匁至二匁 龍腦一匁至半錢

右搗碎粗末供藥枕子

〔主治〕水泡羅斯虛性焮衝眼等ニ宜シ○輕症ノ羅斯ニ施ス片ハ龍腦ヲ去ル但鉛製劑外用ハ最危險ナリトス

○第七百二十五方

罌粟子油 或亞麻子油 石灰水各一匁

右調和作軟膏供外用

〔主治〕水泡羅斯ノ焮痛ヲ治ス輕症ハ酥ヲ外敷ノ足レリ

帶狀羅斯ソナデルソステル

此症羅斯ト頑癬ノ中間ニ位ス治法急性ノ症ニ在テハ尋常ノ羅斯ト一般ナリ腸胃汚物ヲ排除シ安質沒尼劑。汞劑七百七方木類煎七百七方等ヲ與フベシ

○第七百二十六方譚私篤

里歇利飲加醋三 接骨木花水四 吐酒石一

右調和每半時取一食匙接骨木花泡劑和服

〔主治〕頑癬及ヒ帶狀羅斯ノ初起熱アル者ニ宜シ後吐藥ヲ與ハ尋テ碯砂溶液ニ吐酒石ヲ加用スベシ外用ハ油藥ニ過爾托煎ヲ加フ

○第七百二十七方泊魯陳傑兒

越質屋布斯密涅刺列 金硫黃各二 瘡瘡木脂 勿

搦祭亞石鹼各二 苦味越幾斯附適

右二氏為一九衣桂末晨夕服十粒

○第七百二十八方帶布

越質屋布斯密涅刺列三 金硫黃一 瘡瘡木脂

勿搦祭亞石鹼各一 蜀羊泉越幾斯二

右調和為百五十九衣菖蒲根末早午晚服八粒

〔主治〕右二方ハ緩慢傷麻質斯性及ヒ依倔篤性ノ疾患或ハ經久ノ頑癬等ニ宜シ○外用ハ外汞水頑固ノ症ハ碯酸銀稀溶液ヲ良トス

西大齋
卷七
帶狀羅斯
三十一
廣
月

○第七百二十九方〔布弗蘭屈〕

瘡瘡木 越質屋布斯安質沒尼錢各一 蜀羊泉莖越幾

斯錢

右調和加舍利別每丸二瓜衣杜松子末朝夕服八九

主治慢性帶狀羅斯頑癬其他經久ノ皮膚病及ヒ慢性依

屈篤等ニ宜シ

○第七百三十方〔春姪隣〕

越質屋布斯安質沒尼四瓜 曹達乾者十 薩沙弗羅

私皮末 白糖各一

右調和為散等分六裏每服一裏日二次

主治帶狀羅斯頑癬及ヒ其他慢性皮膚病ニ宜シ

○第七百三十一方〔別至〕

醋酸莫爾比捏四 薔薇軟膏附一

右調勻供塗擦

主治帶狀羅斯ノ焮痛ヲ減スルニ宜シ

粟疹ミリアリアスラフル

熱性粟疹或ハ本症ト為テ發シ或ハ傍症ト為テ生ス多ク

ハ是他ノ熱性病ニ在テ温覆度ニ過レハ此症繼發スルナ

リ予ハ專其本症ト為テ發スル所ノ者ヲ以テ此ニ述フ或

ハ之ヲ非スル者アリト雖亦是一種固有ノ証候ヲ具ル別

遠西方彙 卷七 三十一 廣 月

症ニシテ各病ノ列ヲ擯斥スルノ理ナケレバナリ即發疹
 前或ハ發疹ノ始ニ方テ名狀スベカラザル苦悶ヲ發シ酸
 汗太過四肢攣痛シテ倭麻質斯痛ニ近似シ指頭ニ刺衝ヲ
 覺ユル等ノ証是ナリ○治法先其熱性ヲ視テ後疹性ニ注
 意スベシ間熱性燄衝ニ傾ク者アリ其症ハ精製消石精製
 礪砂其他清涼劑ヲ要トス但小量ニ與ヘテ佳ナリ或ハ小
 量刺絡ヲ行フベキ者亦之アリト雖多クハ蟻鍼ヲ好トス
 然レモ通例其熱腸胃性ニシテ神經性ヲ夾ム者アリ宜ク
 吐劑六十二方至 荅麻林度製ノ酸性瀉藥十六方七百四十方
 酒石孕鹼酒石五十方至五十三方七百十六方 酒酸加里曹達七百十八方七百三十二方

五十四方孕礪酒石七十三方等ヲ與フベシ或ハ里歇利飲方一
 五十五方
 ヲ用フベシ患者能ク之ヲ服ス爾後其症ニ隨フテ緩性衝
 動藥ヲ投スベシ但適宜ニ鑛酸ヲ加ヘテ佳ナリ之ヲ以テ
 此症ノ諸液溶渙ニ傾キ易キヲ防クベシ私昆列印名倭麻
 質斯性粟珍見點ノ時之ヲ治スル一方ヲ發明セリ此方今
 ニ至テ卓越ノ奇方トス即微温ノ刺必斯カハス高私蟄屈斯水ヲ
 以テ洗フナリ其法刺必斯高私蟄屈斯一錢乃至一錢半ヲ
 以テ水一坵ニ溶化シ漸々増加ノ半ヲ至ル先汗ヲ拭ヒ
 乾シテ后此溶液ヲ以テ全身ヲ灌洗スルヲ始一時毎ニシ
 後一時半乃至二時毎ニス之ヲ施シテ后輕易ノ倭麻質斯

性神經性心臟疾患心悸動ヲ發スル者甚多シヲ生スル者間之アリ此
 症老利兒水皮膚刺戟法等ヲ施シテ防止スベシ或ハ胃痛
 嘔氣等ヲ發スル者アリ挖歇兒散ニ吐酒石軟膏ヲ兼用シ
 テ良効アリ○慢性無熱ノ症ハ多ク其起因タル病毒ニ注
 意スルヲ專務トス若其因依屈篤毒ニアレハ全身浴ヲ行
 ヒ數次角法ヲ施シ木類煎七百三十八方硫黃劑安質沒尼劑ヲ與
 ヘ且瀉劑ヲ兼用スルヲ殊ニ稱贊ス又越粟幾失爾蔑印失
 屈篤良効ヲ奏スル者往々之アリ

○第七百三十二方

孕鹼酒石二錢至半錢 井水四弓溶化加後味

蘆根流動越幾斯三錢

右調勻每一時服一食匙

主治解凝兼瀉下劑トシテ粟疹腸胃証ヲ帶フル者ニ用

○第七百三十三方

孕礬酒石半錢 常水四弓溶化加後味

荅麻林度一錢

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治同上

○第七百三十四方

纈草錢三

熱湯適宜浸漬濾取四勺加後藥

收斂亞的兒カ一

櫻實舍利別錢六

右調和每一時服一食匙

主治緩性衝動劑トシテ之ヲ用フ此ヲ以テ溶崩症殊ニ

發汗過多ヲ防止スルニ宜シ

○第七百二十五方

甘消石精錢半

收斂亞的兒カ一

覆盆子水錢五

覆盆子

舍利別錢一

右調勻每一時服一食匙

主治同上

○第七百三十六方

收斂亞的兒カ一

櫻實水錢五

覆盆子舍利別錢二

右調勻每一時服一食匙

主治清涼ニシテ且苦悶ヲ鎮靖シ汗ヲ止ムルノ劑トシ

テ栗疹熱ニ用フ

○第七百三十七方

重升承錢半

精製礞砂錢二

蒸餾水六勺溶化

右調勻塗擦胸上

主治栗疹内陷ニ宜シ

○第七百三十八方

五方
卷七
毒麻羅斯
三
廣
別

○薩沙弗刺私屑 山牛房根 濱瞿麥根 蘆根 蜀羊

主泉莖各一 甘草半 茴香二

右細劉取二食匙水二匕煮日服

主治慢性粟疹二且シ

○第七百三十九方

炭酸剥篤亞斯二錢至三錢 井水十

右溶和供洗浴且苦悶ハ驗ホシ行ク五ニハハ

主治同上一執一食

毒麻羅斯子テルルカリア 此症大抵吐下劑ヲ用ヒテ治ス七百四十方至七百五十三方然レ其變

症ニ至テハ則潜伏スル所ノ病因ヲ探索シテ之ヲ除去ス
ベシ即門脈系ノ閉塞。瘰癧毒。依僂篤毒等是ナリ。鑛酸ヲ用
ヒテ良効ヲ得ル者モ亦間之アリ。又皮膚ノ感覺過敏ヲ制
シ遲鈍ナラシムルヲ要トス。毎日外氣ニ觸レ。屢視衣ヲ換
ヘ。日々冷水ノ用ヒテ遍身ヲ灌洗シ但其水漸次冷或ハ脚
ヲ浴スル等皆鴻益アリ

○第七百四十方 暴劉私名 旃那煉膏 一名 瀉利煉膏

旃那末一 純精酒石半 李肉半 砂糖舍利別

右調勻準症每半時服一茶匙乃至二茶匙以至得瀉

○第七百四十一方

遠
五
方
卷
七
毒
麻
羅
斯
三
廣
別

五方集 卷七 蘇麻羅斯 三十一 廣 脾 堂

○精製芒硝乾者半斤 旃那煉膏第七百四十一方 覆盆子舍利別

○第七百四十二方 右作煉膏每一時服二茶匙以至得瀉臨服宜攪流

精製芒硝乾者半斤 荅麻林度一斤 枸櫞汁舍利別宜適

右作煉膏每半時服二茶匙以至得瀉

○第七百四十三方係過栗屈的爾 考曾家投スルハ李肉ヲ以テ荅麻林度ニ代フ

純精酒石 旃那末各二錢 茴香末四錢 李肉一斤 砂糖

舍利別宜適

右作煉膏每半時服二茶匙臨服宜攪流每日服盡

附考貧家應用ノ瀉利煉膏トス

○第七百四十四方駭情 酒石酸二斤 白糖一斤 橙花水二斤 溶化加後味

過設印亞的兒半斤 旃那煉膏七百四十五方六錢至十錢

右調勻茶匙抄服臨用宜振盪

主治緩下劑トシテ感觸過敏ノ人殊ニ婦人ニ用フ

○第七百四十五方 燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

右調和先取半劑頓服後每半時服一食匙以至取全功

燐酸曹達一斤 櫻實水四斤 溶化加櫻實舍利別一斤

主治佳味之瀉劑也。不貴婦之用。二供不致及至。又全。○第七百四十六方抄書私 四日谷外。咳。醫。寶。合。除。服。一。日。○旃那細到 瀉利鹽錢六 右加熱湯二小盞浸出四分時每半時服半小盞以至得瀉

○第七百四十七方抄書私 旃那錢一 和胸劑料錢一 右細剉熟湯少許浸漬一日服盡

○第七百四十八方抄書私 旃那錢三 橙皮黃錢一 薄荷錢二 睡菜半 右細剉調勻取一食匙強水三小盞浸出每日服盡

○第七百四十九方抄書私 旃那錢三 加熱湯二錢 更煮沸濾加後藥

○第七百五十方抄書私 旃那錢二 加熱湯六錢 飽熟半時濾加後藥

○第七百五十一方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 右分三四服暫時盡之臨服宜振盪

○第七百五十二方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十三方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十四方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十五方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十六方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十七方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十八方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百五十九方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

○第七百六十方抄書私 旃那錢二 阿沒勒錢六 滿那舍利別錢一 腎暴劉私複方旃那浸

遠西本草 卷七 蘇麻羅斯 廣脚堂

○蘇旃那錢三熱湯二斗浸漬四分時濾過溶後藥

○酒酸加里曹達錢三滿那錢三拘櫟油糖半

右調勻頻服一二時間盡之 蘇雅舍味

○第七百五十二方 警拍暴劉私瀉下浸

○十旃那錢二加熱湯四斗飽熟八分時濾過溶後味

○精製表述硝各半右再濾過服法同上

○第七百五十三方 警母暴劉私瀉方旃那浸

○旃那錢二熱湯四斗浸漬四八時濾過溶化精製表述硝六

○錢再加後味

砂糖舍利別半

右調和頓服或分再服

主治此方七百四十三方至慢性蘇麻羅斯其他無熱ノ發疹

病ニ瀉藥トシ用フベシ又諸病ニ應用少カラス

○第七百五十四方 謨私篤

甘草半 金硫黃 精製阿芙蓉各四分 東方產大黃六

白糖一

右調和為散分十二服朝夕一服

主治經久ノ蘇麻羅斯ニ宜シ○搔痒甚シキ者ハ謨私篤

氏間菲阿斯油ヲ皮膚ニ塗リ或ハ罌粟殼及ヒ菲阿斯葉

通中本草 卷七 渴設刺 水疱疹 三十九 廣 脾 堂

ヲ乳汁ヲ以テ煮微温蒸湯法トシテ之ヲ施セリ

渴設刺エセラ 羅ホル セレイ ンギ

此症亦急慢ノ二種ニ分ツ治法全ク尋麻羅斯ニ同シ無熱

症ハ唯微瀉スルヲ以テ通例治スルニ足レリ慢性症ニ至

テハ更ニ峻効ノ方法ヲ要ス殊ニ其原因ニ從フテ適當ノ

方ヲ處スベシ

水疱疹ヘルペス スラ フラ 蘭

此症或ハ熱アリ或ハ熱ナキ者アリ其無熱ノ症ハ經過緩

慢ナリ其熱熾衝狀ヲ見ハス者モ亦間之アリト雖大抵聖

京キョウ 倨コ 性コ 若クハ腸胃性ノ者多シトス神經性腐敗性ノ者モ

亦稀ニ之アリ其熱ハ各症ノ定則ニ從フテ療シ其他腸中。

皮表及ヒ腎ノ分泌ヲ催促スヘシ殊ニ里歇利飲一方七百

及ヒ荅麻五方 林度三十 乳清十ヲ稱用ス水疱ヲ摩擦シ或ハ抑

壓スルヲ防クベシ但皮膚熾衝甚シキ月ハ細鍼ヲ以テ小

心シテ之ヲ破潰シ酷厲液ヲ洩スベシ○慢性水疱疹ハ痔

疾依倨篤腎石膀胱石ノ如キ深ク腹裏ニ根蒂スル所ノ病

ニ因テ起ルヲ常トス通例之ヲ療スルヲ大ニ難シトス之

ヲ根治スルニ至テハ醫術ノ効アルヲ甚罕ナリ刺絡吸角。

汞劑安質沒尼劑七百五十八方至 硫黃七百五十六方 硫黃製劑七百五十八方 杜松子七百五十八方 金花

爾加里石鹼烏白烏爾識實荅荅七百五十八方 杜松子金花

遠西方藥 卷七 水疱疹 廣脚

草。木類煎等ヲ稱用ス外用ハ微温浴。硫黄浴人造。天然俱ニ用フ六百四十

方七ヲ最妙トス ○第七百五十五方〔謨秘篤〕

里歇利飲二 接骨木花水 杜松子水各三 精製礞

砂 精製甘草膏各一 吐酒石一 滿那舍利別一

右調和每一時服一食匙

〔主治〕急性水疱疹其見點スル毎ニ更ニ熱ヲ帶フル者之

ニ宜シ

○第七百五十六方〔同上〕

純精酒石一 蜚蛄石半 實キ荛荅リ利ス斯半至 歇爾

蘭獨留謨子六

右調勻為散分十裏每服一裏日二次乃至三次

〔主治〕頑固水疱疹ニ宜シ之ニ兼テ礞砂揮發加的列並油

膏ヲ以テ腎部ニ擦スベシ

○第七百五十七方〔阿別爾拿弗〕

木酸錢二 薄荷水五 砂糖舍利別半

右調和每一時服一食匙

〔主治〕水疱疹ニ宜シ殊テ諸液溶渙ノ証徴見ハル、者ニ

用フ

○第七百五十八方〔邊傑栗屈的兒〕

遠西方廣 卷七 水疱疹 四十一 廣脚堂

實菱荅利斯越幾斯 至六人 甘草 一人 精製阿芙蓉 半人 白糖 十五人

右調勻為散分十二裏每服一裏日三次

主治慢性水疱疹ニ宜シ栗屈的兒名此人此症ニ之ヲ用ヒテ

即効ヲ得タリ此方ヲ用ヒテ吐涎スル片ハ姑ク後服ヲ

停ノ兼テ杜松子浸ヲ飲マシムベシ

○第七百五十九方

甘草 金硫黃 各一人 蜀羊泉莖末 白糖 各十人

右調和為散分十二服朝夕一服

○第七百六十方 過。係。栗。屈。的。兒。

硫黃安質沒尼 蜀羊泉莖末 各一人 睡菜越幾斯 二人

右合勻二人為一九夜石松粉每服十九日三次

主治右二方 七百五十九方 慢性水疱疹ニ宜シ

○第七百六十一方 萊爾鳩私

越質阿布斯密涅刺列 麻僂涅失亞 各五人 白糖 半人

右調勻為散分十裏每服一裏日二次乃至三次

主治慢性水疱疹ニ宜シ萊爾鳩私氏此症ニ越質阿布斯

密涅刺列ヲ試驗シ諸藥中ニ就テ最効アリト云ス

○第七百六十二方

槓楂核汁 一人 薔薇水 七人

遠西方集 卷七 水疱疹 四十一 廣 野 堂

右調和供外用

○主治 水疱疹疼痛灼クガ如キ者洗藥トシテ之ヲ用フ鉛

製劑及ヒ其他總テ疹ヲ内陷セシムル者ハ皆忌ムベシ

水疱寒壞疽ニ變スル片ハ幾那煎ヲ用スベシ

○第七百六十三方 衛過栗屈的兒 一六八五三六

苦扁桃 去皮 加蒸餾水八寸搗爛 白藥 半

右作乳劑供洗藥

○主治 頑固ノ水疱疹ニ在テ遍身ノ搔痒緩慢日ヲ延ク者

ニ宜シ又陰囊搔痒ヲ治ス

我鳥口瘡 一蘭 羅 蘇 藥 水 一 瓶 藥 水 一 瓶 藥 水 一 瓶

此症本病トシテ發スル者ハ獨嬰兒ニアルノミ 搦養ヲ節

シ數次浴湯ヲ施シ口中ヲ洗淨シ哺乳毎ニ乳頭ヲ洗ヒ又

室中ヲ清潔ニスレバ大抵之ヲ未發ニ防グヲ得ベシ其

既ニ發スル者モ醫藥ヲ要スルヨリ專其搦生ヲ節スルキ

ハ速治スルヲ得ベシ 緩下劑 七百八十一方ヲ與ヘ並ニ

制酸劑ヲ用ヒテ胃中ニ鬱滯セル酸敗液ヲ制シ及ヒ細筆

ヲ以テ數次緩和液 七百八十四方ヲ塗ラシムヘシ 硼砂ハ

内外俱ニ用ヒテ此症ノ一奇藥ト稱ス 七百八十五方至七百八十八

方 ○然レハ我鳥口瘡モ亦每症必シモ順良ナラス殊ニ盲人

産婦等ヲ養フ館内ニ在テハ惡性ノ症聞之アリ其惡性症

ハ幾那煎ニ研砂ヲ配スル者。及ヒ石灰水七百六十九方稀鹽酸七百七十一方等ヲ加ヘテ外用スベシ。○此症大人ニ在テハ通例他病ノ傍証ニシテ惡性神經熱腐敗熱等ニ發シ又羸瘦病及ヒ其他慢性病ノ末期ニ生スル者多シトス

○第七百六十四方 〔蘇歇爾度〕

研砂錢一 桑椹舍利別錢二

右調和每一時服一茶匙

○第七百六十五方 〔福德篤〕

研砂錢二 撒爾非亞水六 玫瑰蜜一

右調勻供含漱藥

主治大人鴛口瘡ニ宜シ

○第七百六十六方 〔朴訖私〕

研砂錢末二 白糖末半 達刺侃篤末半 趨謨漿適

右為三十錠曬乾衣乳糖末取一箇入口中旋轉日四次乃至六次

主治右二方七百六十五方ハ大人鴛口瘡ニ宜シ

○第七百六十七方 〔遠突土〕

主研砂錢二 撒爾非亞水二 溶化加後藥

主沒藥丁幾錢一 蜜去泡沫

右調和供塗藥

主治肺勞等三傍發スル虚性我口瘡ニ宜シ

○第七百六十八方同上

主石灰水砂糖舍利別各一六八入我口瘡ニ宜シ

右調和供塗藥

○第七百六十九方別建社遠突土質人口中乾熱日四火

石灰水一至三至五至七至九至十一至十三至十五至十七至十九至二十一至二十三至二十五至二十七至二十九至三十一至三十三至三十五至三十七至三十九至四十一至四十三至四十五至四十七至四十九至五十一至五十三至五十五至五十七至五十九至六十一至六十三至六十五至六十七至六十九至七十一至七十三至七十五至七十七至七十九至八十一至八十三至八十五至八十七至八十九至九十一至九十三至九十五至九十七至九十九至一百

○舍利別半

右調和供塗藥

○第七百七十方福徳篤

○稀鹽酸一錢至

錢至

玫瑰蜜一

右調勻塗口中良衣用マシ

○第七百七十一方大入我口瘡ニ宜シ

格魯林水二錢至過爾托舍利別一

右調勻供塗藥

○主治右數方七百六十八方至大人ノ我口瘡腐敗ニ傾

手惡色ナル者ニ宜シ但方中ノ藥量適宜ニ消息スル片

ハ小兒モ亦用フベシ即知熱湯ニ宜シ式中ノ藥量

○第七百七十二方別建社熱湯適宜浸濾取六加後藥

撒爾非垂葉半熱湯適宜浸濾取六加後藥

廣
勝
堂

格魯林水半 玫瑰蜜宜

○右調勻硝子搗收貯以黑紙纏之供含漱及射注藥

○主治大人虛性鷺口瘡及ヒ咽喉焮衝ニ宜シ方中ノ藥量

適宜消息スル宜小兒モ亦用之宜

○第七百七十三方過傑栗屈的兒大人ノ鷺口瘡賣煩ニ

皓礬三 蒸餾水一弓溶化

右塗鷺口瘡

○主治鷺口瘡膿潰スル者ニ宜シ大人ノ用ニ供ス之ヲ消

息スル宜小兒モ亦用フベシ

○第七百七十四方別連社

皓礬半 薔薇水 桑椹舍利別各一

右調齊供塗藥

○主治大人惡性鷺口瘡ニ宜シ皓礬ノ量ヲ減シ二瓜乃至

三瓜ヲ以テ製スル片ハ小兒モ亦用フベシ

○第七百七十五方蓮珍

寒製幾那越幾斯一錢 紺百設木越幾斯一錢 礪砂半錢

沙列布薄煎四

○右調和每半時若一時服一二茶匙

○第七百七十六方二茶匙

寒製幾那越幾斯一錢 亞刺昆亞越護一 蒸餾水三

廣
勝
堂

卷
七

四
六

廣
勝
堂

甘海鹽精錢半

橙皮舍利別錢一

右調勻每一時服二茶匙

○第七百七十七方遠突土

寒製幾那越幾斯錢二

芸香水錢二

甘海鹽精錢二

玫瑰

蜜錢一

右調和供塗藥

○第七百七十八方過條栗屈的兒

幾那錢一

井水十二勺煮耗至六勺加後藥錢一

稀硫酸錢二

玫瑰蜜

沒藥油各一

右調和供含漱

○主治第七百七十五方ヨリ七百七十八方至皆鴛口瘡寒

壞疽ニ傾ク者ニ宜シ蓋吾見ヲ以テスルニ蓮珍氏製ス

ル所ノ第七百七十五方ハ小兒ニ供用スベク但嬰兒ニ

用フルヲ勿レ其他ハ皆大人ノ用ニ供スベシ

○第七百七十九方別連杜

赤幾那半 井水十勺煮濾取六勺加後藥

龍腦

加亞刺昆亞蘆謨
研和者十二勺

地榆丁幾 單方幾那丁幾

各半

玫瑰蜜半

右調和為含漱水

○主治大人惡性鴛口瘡及ヒ寒壞疽狀焮衝ニ宜シ

○第七百八十方 同上

硼砂一刃或半錢 乃至二刃

苗香水二

過爾托舍利別半

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒酸敗液及ヒ驚口瘡ニ宜シ

○第七百八十一方 同上

水製大黃丁幾半 蝻蛄石末二

雜腹蘭東方產者四人

苗

用香水一 大黃舍利別七錢半

右調勻每四分時與一茶匙以至小兒得安靜

主治同上

○第七百八十二方 同上

鱗酸曹達一錢

玫瑰蜜二

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒驚口瘡ニ宜シ

○第七百八十三方 同上

撒爾非亞葉浸二錢 以葉製者

砂糖舍利別一

右調和供塗藥

主治驚口瘡ニ宜シ又之ヲ綿布ニ攤ヘ乳頭ノ潰瘍ニ貼

又

○第七百八十四方

胡蘿蔔汁一

右供塗藥

○第七百八十五方 別連社

○ 硃砂錢一 胡蘿蔔汁子一

右調勻供塗藥

○第七百八十六方 祇歌齋度

○ 硃砂刀一 玫瑰蜜子半 桑椹舍利別子一

右調和塗數次

○第七百八十七方 福儼篤

○ 硃砂錢一 玫瑰蜜子一

右調勻供含漱

主治 右數方七百八十四方至七百八十七方 至 八小兒鴛口瘡宜シ 大人

モ亦用フヘシ

○第七百八十八方 孤劉傑

○ 硃砂錢一 白糖子半

右調和為散取一刀尖 塗擦小兒舌上日十次

主治 嬰兒ノ鴛口瘡宜シ 或ハ哺乳前此散少許ヲ取り

テ乳頭ニ撒布シ或ハ乳汁二三滴ヲ加ヘテ泥ト為シ乳

頭ニ塗ルモ亦妙

遠西方彙卷之七

遠西方彙

卷七

四七

廣濟堂

遠西方彙卷之八

○第一編

○第二編

○慢性病

○第一類

慢性病係血脈系症

○第一類

○第二類

○第三類

遠西方彙卷之八

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第二編

慢性病

第一類

慢性病係血脈系症

第一 心臟慢性病モルビ。コルガス。コロニキ。羅スレ。ハルト。蘭
 慢性心臟病治法消焮誘退及ヒ鎮靜法等漸次ニ之ヲ施ス
 へシ變機法對當ノ症ハ最罕ナリトス「焮衝性心臟病ハ放
 血ヲ以テ根治法トスルカ故ニ數次刺絡シテ多量ノ血ヲ
 瀉スレハ慢性症ニ至リテハ放血ハ唯姑息ノ効ヲ奏スル
 ノミ故ニ獨己ムト得ザルノ症殊ニ窒息ノ懼アル者ノ
 ミ之ヲ施シテ可ナリ」之ニ反シテ少壯ノ人心臟ノ器敗症
 ニ罹ル者ハ少量ノ放血數次ニ宜シ放血ハ此症ノ危險ヲ
 防止シ或ハ其増進ヲ制スル的當ノ一法ナリ○誘退法ノ
 中ニ就テ心臟器敗病ニ最偉効アル者ハ心部ノ打膿及ヒ

串線法トス但之ヲ施スモ其病ヲ根治スルニ難シト雖其
 増進ヲ防キ且心臟病固有ノ發作ヲ鎮定スルヲ得ベシ
 ○實^キ麥^タ答^リ利斯^スハ鎮靜藥トシテ心臟器敗症ニ奇藥ノ稱ア
 リ實^キ麥^タ答^リ利斯^スノ心臟及ヒ血脈系ニ奇効ヲ奏スルヤ通例
 之ヲ用ヒテ心臟縮張ノ數ト脈動ノ減スルトヲ以テ徵ス
 べシ蓋感觸過敏ノ人ニ在テハ之ヲ用ヒテ脈至先進ミ後
 ニ至リテ減少スルヲ常トス「過^ク屈^ク答^タ刺^ラ設^セ謨^モ沙^サ根^{ケン}」附及ヒ格
 爾^ニ失^シ屈^ク謨^ムモ亦實^キ麥^タ答^リ利斯^スト同効アルベシト雖未其試驗
 ヲ究メス「病發作ノ時心臟感觸亢進シ神經証ヲ見ハス者
 ハ萬^ク首^ク越^ク幾^ク斯^ス老^リ利^リ兒^ニ水^ス青^ク酸^ク等ヲ用フベシ阿^メ蓉^{ロウ}ハ心臟

遠山方算 卷八 心臟慢性病 廣野

器敗症ニ適當ナラズトス○法魯撒爾聒氏ノ斷食法ハ生
カ沈衰未甚シカラズシテ其症既ニ希望スル所ナキ者ニ
試ムベキニ此他心臟病人ハ醫士善ク意ヲ加ヘテ其身心
ヲ安靜ナラシムルヲ要トス

心臟器敗其由多端ニシテ之ヲ區別スル丁甚難シ設令之
ヲ辨別スルモ醫治ニ益ナシ故ニ今具論セサルナリ唯心
臟慢性病二症ヲ掲ケテ治例ヲ示ス此二症ハ多ク醫治ノ
關係スル所ナリ

心悸動 ハルトコロッピング ハルビタナヲコルジス 羅

此症多クハ他病ノ傍証ニシテ特發スル者罕ナリ蓋依朴

昆埴兒歇私的利風氣鬱積下腹畜血痔脈畜血及ヒ心臟ノ
器敗ニ併發スルガ故ニ專其本症ヲ攻ムル片ハ心跳モ亦
隨テ治ス若其レ本症タル者ハ實芟答利斯ヲ以テ經驗ノ
奇藥トス

○第七百八十九方 穢歇蘭度

實芟答利斯 越幾斯 菲阿斯 越幾斯 實芟答利斯葉

末各半錢

右調和一氏為一九夜石松粉早晚服一粒頑固症日服三
九乃至四九

主治心悸動並ニ諸般ノ心臟無形病ニ宜シ之ニ兼テ冷

廣野 三 廣野

水ヲ外用スベシ

○第七百九十方 〔西過爾〕

實芟答利斯葉末

葛私篤樓護各一

白糖半

右調勻為散分八晝每服一晝日二三

主治 神經性心悸動ニ宜シ

○第七百九十一方 〔匹篤失葛弗士〕

白地榆丁幾半

苦扁桃水錢二

右調勻每一時服二十滴乃至三十滴

主治 心悸動並ニ血脈ノ感觸過敏ノ症痔血ノ素因アリ

テ來ル者之ニ宜シ

○第七百九十二方

薩乙歇爾土人丸

健質安那越幾斯半

牛膽錢三

蘓甘沒扭錢二

右調和為百六十二丸每服四粒乃至八粒早且空心服

主治 腎弗蘭屈名此丸藥ヲ用ヒテ心悸動難治ノ症下腹

閉塞ニ起因セル者ヲ治セリ

胸内逼迫

ボルンギトナベクトリス羅

此症多クハ心臟或ハ大血管ノ器敗ニ因リ而シテ大抵依

倔篤ヲ合併スル者ナリ治法小量ノ放血數次及ヒ蟻鍼心

部ノ灌水誘退法殊ニ打膿ヲ施シ食餌ハ清涼ノ植物ヲ撰

ムベシ其主藥ハ消石實芟答利斯七百九十四方至七百九十七方老利兒

水。萬苜越幾斯。七百九十八方其他清涼鎮靜ノ劑ヲ最要ト

ス。輓近ニ至テ最結晶硝酸銀ヲ稱用セリ。八百二方其發

作ヲ鎮靖スルハ手脚ヲ温水ニ浸シ。胸止及ヒ腓腸ニ蒸餅

母ヲ貼シ。胸上乾角法。足蹠温蒸藥或ハ胸部灌氷水等効アリ

又發作ノ終末ニ及テ薄荷水一食匙強過泥子油一二滴ヲ

和用スルニ宜シ之ニ由テ能ク嘔氣ヲ發シテ頓ニ其發動

ヲ鎮定スルナリ。魯母別爾各人ハ硫酸ヲ氣管ニ吸引セ

メテ速効ヲ得タリト云。發作中適宜ニ放血スルハ每症

大抵即効ヲ得ザルナシ又多血ノ人ニ在テハ大概放血ヲ

急ルハカラズト雖多クハ是一時ノ快ヲ得ルノミニシテ

次後ノ發作更ニ急速且劇甚ニ至ルナリ二三入ル燻亦ス

○第七百九十三方弗陽 結爾蔑斯密涅刺列各五 精製阿芙蓉各五 麝香各一 鹿角

鹽各半 阿魏各一 癩瘡木脂各一 纈草越幾斯各一 小瓶器

右調和二氏為一九衣石松粉每一時服三九乃至四九

主治 瘧瘧喘依倔篤毒ニ因ル者並ニ胸内逼迫ニ宜シ

○第七百九十四方

實菱答利斯末六瓜至 白糖錢二

右調勻為散等分十二裹每服一裹日四次

○第七百九十五方

遠西本草 卷八 五

透... 胸内逼迫... 廣... 肝... 堂

○實芟答利斯葉半錢至二錢熱湯適宜浸漬八分時濾取四

右調和每服一食匙日四次白糖

○第七百九十六方

實芟答利斯丁幾半

右每服十滴乃至二十滴日三次

主治右數方七百九十四方至七百九十六方胸内逼迫及他ノ心臟器

敗症宜シ○實芟答利斯内服ニ堪ヘザル片ハ之ヲ丁

幾劑ニ作リテ塗擦シ或ハ心部ニ芫菁膏ヲ貼シテ表皮

ヲ剥去リ實芟答利斯末一匁若クハ二三匁ヲ撒布ス

ル下日ニ一次賢聖法

○第七百九十七方

實芟答利斯浸六匁以實芟答利斯葉半錢製者老利兒水錢櫻實

右調和每一時服一食匙

○第七百九十八方私屈列神傑爾

實芟答利斯末半白糖半

右調勻為散分八裹每一時服一裹

○第七百九十九方

萬首越幾斯十六老利兒水半ヲ溶化

廣半堂

透四方藥

胸内逼迫

廣

右調勻每一時服十五滴

○主治第七百九十七方ヨリ七百九十九方至皆胸内逼迫

瘵癆喘等ニ宜シ

○第八百方

阿芙蓉丁幾 老利兒水

右調勻每一時服十滴乃至十五滴

○主治胸内逼迫ニ宜シ此方ニ兼テ每晚或ハ隔晚水製蘆

薈越幾斯二氏ヲ用フベシ

○第八百一方

阿芙蓉丁幾 安質沒尼酒

右調勻每晚臨卧服十滴乃至二十滴

○主治胸内逼迫ニ宜シ其症間歇ノ間モ亦用フベシ

○第八百二方

結晶硝酸銀 蒸餾水二三滴溶化加後味

漿粉 甘草 亞刺昆亞護護漿

右作三十六丸衣過爾托末早午晚服二丸

○主治胸内逼迫胃神經病等ニ宜シ○硝酸銀ノ量漸徐ニ

増加シテ一日半ハニ至ル但一劑ヲ盡スキハ姑後服ヲ

停ムベシ便秘スル者ハ苦味水ヲ用フルヲ好トス

○第八百三方

透四方藥

卷八

中

廣

半

登

遠西方藥

卷八

多血畜積病

七

廣

堂

結晶硝酸銀半

蒸餾水適宜溶化加後味

阿芙蓉末六

癒瘡木脂三

右調勻二人為一九夜過爾托末玻璃壘收貯朝夕服三九

主治同上

第二 多血畜積病

羅コブルングスチオ子ス甘シンゲイニス

實症ハ放血或ハ蟻鍼内服消石或ハ之ニ純精酒石ヲ伍ス

ル者カ方至十二方十四方結晶水沸騰散二方三方中和

鹽製清涼下劑十方八百十八方五十四方至六方答麻林度十六

十三方九十六方五百七方複方旃那昆設兒弗八方七百七十

方植酸八百九方至等二宜シ又多ク冷水ヲ飲マシムベシ

且誘退法トシテ足心ヲ蒸湯シ若クハ温水ニ灰鹽或ハ石

鹼ヲ和シテ脚ヲ浸シ又蒸餾母荒菁膏等ヲ貼スベシ○實

性ニシテ感觸銳敏ノ症ハ適宜ニ上ノ方法ヲ施用スルノ

外鑛酸八百廿一方ハヲ以テ鎮靜藥血脈系ノ感觸ニ配伍セ

ル者小量阿芙蓉實艾答利斯等最宜トス○虛症モ亦鑛酸

類殊テ冷水外用血頭上ニ逼迫スル者ハ宿繆結爾氏ノ寒

ヲ最的當トス○其他此症ヲ繼發スルノ懼レアル者

並ニ血ノ畜積スル器ニ隨ヒ各症醫意ヲ加ヘテ治法ヲ下

スベシ ○第四百八方 菜兒鳩松

精製消石 白糖各半

右調勻為散分八服每一時乃至一時半一服

○第八百五方 同上

精製消石 純精酒石 白糖各一

右調勻為散分八服每一時乃至一時半取一裹冷水送下

主治右二方 八百四方 實性多血畜積症 宜之

○第八百六方 同上

清涼散 拘櫟酸加里 孕礬酒石 消石 人造銀朱

右調和為散等分八裹每一時乃至一時半服一裹

主治實性多血畜積 宜之 並 蒸氣閉塞 後未確著

ノ見症アラザル者ニ用フベシ○當今一般ニ此ニ銀朱

ヲ伍スル者ハ怪シムベシト雖先輩既ニ銀朱ヲ大ニ吸

收管ノ運機ヲ振起シ且神經系ノ覺機過敏ヲ鎮靖スル

ノ効ヲ稱ヒリ輓近ニ至テ匹篤失葛弗上ノモ亦世醫之

○第八百七方 同上

純精酒石 白糖

右調和為散分八裹每一時乃至一時半取一裹冷水送下

○第八百八方 同上

沸騰散

酒石酸 麻痺涅失 白糖

右調勻為散分八裹每一時乃至六時半取一裹投冷水乘沸騰服之

○第八百九方 令里沒拏姪散 至一兩半取一裹分水送下

酒石酸 錢三 枸櫞油糖 錢三

右調勻為散取一二茶匙和冷水作佳味酸液服

○第八百十方 非越松 常水適宜煮為錠稠加後藥

白糖 錢四 枸櫞皮油 錢二

右作錠三十二個入松葛肘刺與之取半錠乃至二錠令

含口善消渴清熱

○第八百十一方 同上

酒石酸 錢二 白糖 錢四

右作錠八十個衣乳糖松葛肘刺收貯時服一二錠善

消行旅煩渴又精熱

○第八百十二方 柔爾鴉秘

酒石酸 錢半 白糖 錢一

右調和為散分八裹每一時乃至一時半取一裹冷水送下

○第八百十三方 福仙膏

純精酒石 錢各 枸櫞油糖 錢一 白糖 錢五

○第八百十四方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

○第八百十五方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

○第八百十六方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

○第八百十七方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

○第八百十八方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

○第八百十九方 孕鑿酒石

純精酒石 錢半 孕鑿酒石 錢半 白糖 錢一

右調勻為散入私葛肘刺器與之每服取一茶匙強抵兒都

爾水一盞和用

○第八百十四方所兒 胸部及七頭生多血畜積六宜

○酒石酸錢一 蒸餾水一弓融化加麗春花舍利別三弓

右加冷水合勻作佳味酸液服之昔文一宜

○第八百十五方秘傳福保兒

酒石酸錢一 覆盆子水五弓溶解加覆盆子舍利別三弓

右調和每時服一食匙

○星治右二方八百十四方 清凉劑トシテ多血畜積症ニ用

フ

○第八百十六方栗屈的兒

枸櫞汁新絞 覆盆子舍利別二 井水北四

右調和為飲料

○第八百十七方

醋一 井水北二 白糖適宜味佳為度

右調和為飲料

主治右二方八百十六方 渴ヲ消シ血液ノ逼迫ヲ鎮メ又

發汗利尿ノ効アリ

○第八百十八方栗屈的兒

孕礪酒石_三

吐酒石_一

蒸餾水_四

右調和每一時服一食匙

○第八百十九方 別連杜

精製芒硝_半

白糖_三

常水十六_三溶解加枸櫞汁

新絞濾
去渣半_三

右調勻為飲料名瀉下里沒拏姪

主治 右二方_{八百十八方} 血脈系ノ運機ヲ變更シ且瀉下

ノ効アリ胸部及ヒ頭上多血畜積症殊ニ之ニ宜シ

○第八百二十方

硫酸密幾私丟爾

代用收斂重
的兒半錢

覆盆子舍利別_二

右冷水和勻為佳味酸液

○第八百二十一方

稀硫酸_{半錢}

常水_{一北}

白糖

適宜味
佳為度

右調勻為飲料

主治 右二方_{八百二十方} 實性及ヒ神經性多血畜積症ニ

宜シ

第三 失血病_{モルラギア} 羅_ブ

實性ノ失血ハ純一ノ消燉療法ヲ要ト以放血 螞蟻消石_{百八}

方_{廿二} 清涼中和鹽_{八百廿三方} 實_キ 荛答利_{リス} 引赤劑 衝動脚浴等ニ

宜シ ○實性失血神經力過敏ニ因ル者ハ每症必消燉劑ヲ

要セズ若之ヲ用フル片ハ總テ謹慎ヲ加フヘシ内服ハ鑛
 酸八百廿四方ヲ以テ阿芙蓉八百廿四方非阿斯實八百廿四方答利斯八百廿四方少量吐根
 ノ如キ鎮痙藥ニ配スルヲ佳トス誘退法モ亦施スベシ○
 虛性失血症血脈系ノ衰弱若クハ將ニ麻痺セントスルニ
 因テ來ル者ハ收瀉劑ヲ用ヒテ速ニ遏止スルヲ要トス若
 其前兆ヲ見ハス片ハ隨テ即之ヲ用フベシ鑛酸モ亦此ニ
 宜シ其他明礬八百廿四方刺達尼亞八百廿四方紺八百廿四方百設
 木八百廿四方吉納護謨八百廿四方阿仙藥八百廿四方拳參八百廿四方篤爾八百廿四方面窒兒刺
 五八百廿四方結列阿速篤等是ナリ外用寒罨法ニ宜シ○其他失
 血スル所ノ器ニ從フテ施治スベシ肺血ハ實答利斯ニ

宜シ。虛性子宮血ハ桂皮効アリ○畜血症條ニ載ル所ノ方

法亦中等ノ實性失血ニ通用シテ可ナリ

○第八百二十二方福俣列爾

吐根末三 酒石酸半 消石或 孕礬酒石錢 乳糖六

○右調勻為散每服一刀尖或一哥喜匙每日二三次

○主治諸失血殊ニ痔血或ハ經血過多ノ症ニ宜シ

○第八百二十三方西篤失葛弗士

芒硝四 精製阿芙蓉二

○右調勻為散等分四裹每服一裹日二三次

○主治失血症先瀉血シテ多血ヲ防クノ后之ヲ處スルニ

宜シ

○第八百二十四方 〔秘制律秘〕

稀硫酸 錢一

黑櫻實水 錢四

覆盆子舍利別 錢一

右調勻每半時或一時服一食匙

〔主治〕失血實症虛症並二皆之ニ宜シ

○第八百二十五方 〔遠突土〕

稀磷酸 錢二

沙列布薄煎 錢六

覆盆子舍利別 半錢至

右調勻每時服一食匙強

〔主治〕實性失血虛症ニ傾ク者之ニ宜シ又吐涎及ヒ微毒

性腐骨疽ニ効アリ

○第八百二十六方 〔秘結魯〕

勿搦祭亞的列並底那 錢一

醇硫酸 錢二

以上二呆調勻

內玻璃器漸徐加後味

再餽燒酒 錢一

右調和每半時取十五滴乃至三十滴粘滑藥汁和服

〔主治〕虛性失血ニ宜シ

○第八百二十七方 明礬乳清

牛乳 北二

入壺煮沸加明礬末二錢攪和再煮至酪質全

分離濾過加雞子白二箇清淨之

右服半小盞若一小盞日二三次

主治咯血。嘔血。虛性子宮出血。心臟及ヒ大動脈ノ廣張勞
瘵脫汗。溶崩下利。及ヒ尿管等皆之ニ宜シ。○明礬乳清之
ヲ生明礬ニ較レハ効力更ニ緩ナリ

○第八百二十八方〔布弗爾屈〕

生明礬錢一 亞刺昆錢一 亞護謨錢半

右調勻為散等分四服每一時半服一畏

○第八百二十九方〔列加爾爾〕

明礬錢六 阿芙蓉越幾斯錢一 阿仙藥錢七

右調和為六丸衣石松粉分服數次十二時間盡之

○第八百三十方〔春姪隣〕

刺達尼亞根錢一 井水十六弓煮耗至八弓加後藥

收斂亞的兒錢一 桂舍利別錢半

右調和從症每半時服一食匙

○第八百三十一方〔福倭篤〕

刺達尼亞越幾斯錢一 阿仙藥錢半 精製明礬錢四 甘草

末半

右調勻為散分十五裹每服一裹日三四次

○第八百三十二方

刺達尼亞越幾斯錢二 明礬錢半 菖蒲根錢末一

右二瓜為一九衣桂末每一時半服五粒乃至十粒

主治八百二十八方ヨリ八百三十二方至虚性失血症ニ
宜シ

○第八百三十三方〔衾拂〕

紺百設木越幾斯錢二 葛私加栗刺越幾斯錢一 幾那越

幾斯錢三 甘草膏錢二 榭楂核汁宜適

右為煉膏每服一茶匙日三次臨用宜攪和

○主治虚性粘液過泄及ヒ失血ニ宜シ

○第八百三十四方〔布闥僂列〕

紺百設木越幾斯錢三 桂加酒水半一 井水七 阿仙

藥丁幾錢二

右調和每二時服一二食匙

○第八百三十五方

篤爾爾面室兒刺越幾斯錢二 薄荷水六 越栗失爾必篤

薄荷舍利別半

右調勻每一時服一食匙

○第八百三十六方〔春姪隣〕

吉納半 阿芙蓉二 桂油糖一

右調和為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

○主治八百三十四方ヨリ八百三十六方至虚性失血症ニ

宜シ

衄血 エビスダキス 羅子

此症ハ強テ抑壓スベキ者甚罕ナリ少壯ノ人ニ在テハ殊

ニ然リトス故ニ畜血症條ニ列載セル方法及ヒ精製消石

方九方至十二方 清涼下劑十五方至十六方 酸性

飲十四方 方九方 與ヘ脚湯ヲ施シ失血ノ甚シキ者ハ足ノ絡ヲ

刺シテ適宜ニ放血スベシ痔血或ハ經血閉止セル者ハ肛

門若クハ陰部ニ蟻鍼二三頭ヲ施スベシ○此ニ及シテ衄

血虚候ヲ呈シ生力虚脱ノ懼レアリ顔面口唇灰白色ニ變

シ脈細結代眩暈等衰弱ノ諸証見ハル者ハ止血ノ法ヲ

處スルヲ切要トス即冷水ニ醋ヲ加ヘテ鼻中ニ吸引セシ

メ氷或ハ雪ヲ以テ前額ヲ按シ項窩陰部ニ寒罨法ヲ施シ

兩手ヲ微温湯ニ浸シ明礬或ハ皓礬ノ收斂溶液ヲ鼻中ニ

射注シ已ム 方一 得サレハ耽朴ヲ造リ明礬蛋白ノ合劑ニ

醃シテ之ヲ挿入スベシ流墨紙 洋紙一片 ヲ咀嚼セシノ即

効ヲ得ルヲ屢之アリ俗間項上ニ冷鍵或ハ葱ヲ置クノ法

アリ亦稱用スベシ涅 惺惺利兒名 衄血劇症ヲ治スル法其鼻

孔ヲ視テ衄血アル一方 膈ヲ直立セシム以テ適當法ト

シテ稱贊スル所ナリ○實性ノ衄血ハ内服ニ小量吐根ハ

六廿二方 實麥答廿七方 刺斯九十四方 等効アリ虚

症ハ 麥奴八百七方 鑛酸八百五十五方 及ヒ其他ノ收瀉藥

ニ宜シ○衄血老人ニ在テ屢發スル者ハ打膿法ヲ持重ス
ルヲ稱譽セリ患者虚憊シ又血溶渙ニ傾ク者ハ幾那及ヒ
鑽酸ヲ用ヒテ効アリ

○第八百三十七方 賜帖帖尼

麥奴末 一 白糖半

右調和為散等分八裹每一時半服一裹

主治 子宮失血 衄血 效血 血尿ニ宜シ

○第八百三十八方 同上

麥奴末 一 白糖半

右調和為散分六服每一時一服

主治 小兒衄血過多ノ症ニ宜シ蓋五六歳兒ノ用ニ供ス

ベシ

○第八百三十九方 刺影終

篤爾面窰兒刺 根末

右供外用

主治 衄血過多ノ症ニ宜シ此散末ニ醋適宜ヲ加ヘ捏和

泥ヲ作り前額ヲ按スベシ

○第八百四十方 蕭列剉

赤石脂末

刺達尼亞末各

加玫瑰醋適宜捏和為外

敷藥

右按前額

主治同上

○第八百四十一方〔假栗匪篤〕

血石錢二

明礬

赤石脂

錢各一

血竭

半錢

右研末合和供鼻散

主治虛性衄血過多ノ症ニ宜シ

○第八百四十二方〔春姪隣〕

刺達尼 equal

井水十二弓煮耗至六弓加醋二弓

右調和供射注藥

主治衄血子宮出血尿道出血過多ノ者ニ宜シ

○第八百四十三方〔別連杜〕

撒兒赫爾扶斯

半錢至錢半

撒爾非亞

水四弓溶化加亞刺

昆亞護護水半弓

右調和供射注藥

主治虛性衄血並子宮出血等ニ宜シ

咯血ハシモフチイシス

咯血嘔血欬血等ノ名義諸書説ク所一定ナラス貞ガ學

固陋何レカ其據ルベキ者ヲ知ラス書中譯メ咯血トナ

ス者ハ專血肺竅ヨリ出ヅルヲ謂ヒ嘔血ハ胃中ヨリス

ル者ヲ謂ヒ欬血ハ欬ト共ニ出血スルヲ謂フ名稱其意

遠西丸集 卷八 咯血 其 廣 册

ヲ盡スヘカラズト雖唯辨別ヲ旨トスルヲミ書中悉之
ニ倣フ看者文字ヲ以テ之ヲ論テ勿レ

實症ハ放血芥子脚湯湯膝上並ニ兩膊中温湯湯浸シ胸

上脊椎及ヒ眉部ニ乾角法ヲ施シ四肢ニ蒸餅母ヲ貼シ灌

腸ヲ行ヒ粘滑飲米汁。裸麥汁。沙列布。煎。燕麥汁。雞子白。酸性飲屋施蔑爾或ハ

水ニ和ヲ飲料トス内服ハ消石九方至十二方。十四方。八百

方。八百四。礪砂百方。百一方。八油性乳劑ニ菲阿斯越幾斯ヲ

加フル者三百八十五方等撰用スヘシ○實性若クハ痙攣性

ノ者ハ實芟答利斯ヲ以テ首藥トス七百九十四方。七百九

至八百之二次テ吐根ヲ宜トス八百廿二方。八百廿一方。八百廿

八百三十八方。並ニ鉛糖八百七十一方至モ亦稱用セリ實

性ノ咯血虚症ニ傾ク者ハ殊テ之ニ宜シ然レモ余ハ鉛糖

内服最危險ニ屬ストス他人諸症ニ至テモ亦然リ○虚性

咯血ハ鑛酸八百廿四方。八百廿五方。八百廿六方。八百明礬八百廿七方

方食鹽八百四十九方至結列阿速篤八百七緋百設木八百

外用ハ殊ニ胸上或ハ陰部寒罨法ヲ施スヘシ蓋之ヲ胸上

症危險ナリトス唯其症已ニ希望スル

○第八百四十四方過傑栗屈的兒

過兒托膏三熱湯六弓溶化加後藥

精製消石 錢至六

○右調勻每半時服一食匙

主治 嗽衝性咯血ニ宜シ

○第八百四十五方 [穢歇蘭度]

精製消石 錢三 純精酒石 錢二 井水六勺溶化加後藥

實芟答利斯越幾斯 二八至 過兒抱舍利別 一勺

右調勻初每四分時後每半時乃至一時服二匙

主治 咯血嗽衝ヲ兼ヌル者ニ宜シ之ヲ與フルノ前放血

及七脚踏浴ヲ兼施スベシ

○第八百四十六方 [藥贈件別爾德]

精製礪砂 甘草 末各一刃 至半錢

右調勻為散分十二服每一時一服

主治 實性咯血危重ノ者ニ宜シ 鑛酸効アラザル者モ亦

之ヲ用ヒテ能ク歛血ヲ止ムルアリ

○第八百四十七方 [魯葛孤刺律秘]

精製食鹽 適宜

右每八分時服一茶匙

主治 咯血ニ宜シ

○第八百四十八方 [兒越彭斯]

精製食鹽 一 井水十勺溶化

右一二劑暫時服盡

○主治 欬血ニ宜シ 殊ニ放血ヲ要スル症多ク之ヲ用フ之

ニ兼テ二三日間稀淡ノ枸櫞製里謨拏姪ニ些ノ食鹽ヲ

和服セシム

○第八百四十九方 〔秘密篤滿〕

精製食鹽一刃至半錢 亞刺昆亞護謨末 甘草末各半刃 實子

芟答利斯葉末

右調勻為散分八服每一時一服

○主治 咯血ニ宜シ

○第八百五十方 〔秘傳〕

過硫酸加里半 覆盆子水四 覆盆子舍利別一

右調和每四分時或半時服一食匙

○主治 諸般ノ失血殊ニ肺及ヒ子宮出血症便秘スル者之

ニ宜シ

○第八百五十一方 〔護秘篤〕

純精酒石錢二 覆盆子水八

右調和每四分時取一食匙 燕麥粘汁和服

○主治 實性咯血ニ宜シ

○第八百五十二方 〔秘傳〕

酒石酸一

菲阿斯越幾斯八 井水四弓溶化加過爾

遠西方藥

卷八

咯血

二十一

廣胖堂

右一二劑暫時服盡

○主治 欬血ニ宜シ 殊ニ放血ヲ要スル症多ク之ヲ用フ之

ニ兼テ二三日間稀淡ノ枸櫞製里謨拏姪ニ些ノ食鹽ヲ

和服セシム

○第八百四十九方 〔秘密篤滿〕

精製食鹽一刃至半錢 亞刺昆亞護謨末 甘草末各半刃 實子

芟答利斯葉末

右調勻為散分八服每一時一服

○主治 咯血ニ宜シ

○第八百五十方 〔秘傳〕

過硫酸加里半 覆盆子水四 覆盆子舍利別一

右調和每四分時或半時服一食匙

○主治 諸般ノ失血殊ニ肺及ヒ子宮出血症便秘スル者之

ニ宜シ

○第八百五十一方 〔護秘篤〕

純精酒石錢二 覆盆子水八

右調和每四分時取一食匙 燕麥粘汁和服

○主治 實性咯血ニ宜シ

○第八百五十二方 〔秘傳〕

酒石酸一

菲阿斯越幾斯八 井水四弓溶化加過爾

抱舍利別一子半幾共水四子各外吐廣脾堂

右調勻每四分時服一食匙

主治咯血瘰癧ヲ帶グル者ニ宜シ

○第八百五十三方額爾列斯無麥肆七味耶

菲阿斯油半 甘扁桃油半

右調勻每服一茶匙日三次乃至四次

○第八百五十四方過傑栗屈的兒

菲阿斯油半 亞刺昆亞護護錢徐々搗和加後藥

過兒托舍利別一子幾黑櫻實水六

右調勻每一時服一食匙子水四 費金子舍利一

主治瘰癧性欬血ニ宜シ○蓋菲阿斯油ニ代ヘテ甘扁桃

油ヲ用ヒ且菲阿斯越幾斯二八ヲ加フルヲ更ニ適當十

リトス

○第八百五十五方戒歌蘭度

甘扁桃油一 亞刺昆亞護護半 加井水十六子搗

和如法作乳劑加扁桃乳舍利別一子幾味一子幾

右調勻每半時服半小盞

主治咯血症瘰癧及ヒ胸痛ヲ兼ヌル者ニ宜シ之ニ兼テ

胸上ニ鎮瘰癧法兩膊ニ芥子泥ヲ貼スヘシ

○第八百五十六方遠突土

遠突土一 芥子泥一 水一 共一 搗一 和一 貼一 胸一 上一 鎮一 瘰一 癧一 法一 兩一 膊一 二一 芥一 子一 泥一 ヲ 貼一 スヘシ

透 西方藥 卷八 咯血 廣 肝 堂

鳳仙花油三

右每半時服二茶匙

主治瘰癧性咯血二宜シ蘇ク集ル昔ニ宜シ之レ藥ヲ

○第八百五十七方ハ

實菱答利斯葉五熱湯適宜浸漬濾取十錢加後藥

亞刺毘亞護謨二白糖半舍電阿芙蓉液六

右調勻為紙劑每二時半服一茶匙

主治實性咯血肺勞等二宜シ

○第八百五十八方ハ戒蘭度

實菱答利斯葉半井水適宜煮濾取液七錢加後藥

格魯林水錢老利兒水錢

右每一時服一食匙

主治瘰癧性咯血多血畜積ヲ兼ヌル者ニ宜シ先適宜ニ

放血シテ後消石ニ菲ヒ阿斯ヲ加ヘ用フ此ニ於テ粘滑汁

ニ收斂ニ的兒ヲ配スル者或ハ上ノ方ヲ兼用スベシ

○第八百五十九方ハ

阿芙蓉丁幾一實菱答利斯丁幾二

右調勻早晚服十滴乃至十五滴

○第八百六十方ハ護私篤

葛私篤儂謨二實菱答利斯一孕鹼酒石六亞刺

遠西方藥
昆亞護謨末
白糖各半
咯血
廣脾堂

○右調和為散分六裹每服一裹日三次

○第八百六十一方〔穢歌蘭度〕正齋

吐根一錢 白糖二錢

○右調勻為散等分八裹每八分時服一裹

○主治第八百五十九方ヨリ八百六十一方至瘧癩性ノ咯

血ニ宜シ

○第八百六十二方〔穢刺律〕

實チキ荛答利リス葉半錢 加熱湯適宜飽熟八分時濾取六弓

溶化刺達ニ厄ニ越ニ幾斯半錢乃至一錢

右調勻每一時半服一食匙

○主治實性ノ咯血虛症ニ傾ク者ニ宜シ

○第八百六十三方〔哥寧偈私別爾偈〕地〔穢羅〕屑

歇爾蘭獨留謨子三錢 熱湯適宜浸漬濾過取六弓

○右每一時服一食匙

○主治血脈興奮機亢進セル症咯血及ヒ肺勞ニ宜シ

○第八百六十四方〔穢屈私〕

麥奴一錢 實チキ荛答利リス十五錢 熱湯適宜浸漬濾取五弓

溶化消石一弓半後加鑛舍利別〔未詳〕半弓

○右調勻每半時服一食匙

透斑方藥

咯血

三五

廣脾

堂

主治勞瘵肺ノ失血ニ宜シ

○第八百六十五方篤姪

稀硫酸錢二

覆盆子舍利別錢十四

令紙而緩徐嚥下次後與燕麥粘

右調和每服取一茶匙

汁

○第八百六十六方

稀硫酸錢二

阿芙蓉丁幾三十滴至

董菜舍利別錢二

右調和每半時服一茶匙

○第八百六十七方秘歇蘭度

收歛垂的兒六十二滴

舍電阿芙蓉液二十滴

井水四

麗

春花舍利別錢二

右調和每四分時服二食匙

○主治右三方八百六十五方至八百六十七方

瘰癧性咯血虛症ニ傾ク者

ニ宜シ

○第八百六十八方同上

精製磷酸錢一

蒸餾水半

櫻實舍利別錢二

右調勻每八分時服十滴乃至二十滴

主治虛性咯血ニ宜シ○又結毒夜間骨痛等ニ稱用ス

○第八百六十九方過傑栗屈的兒

紺百設木越幾斯錢三

酒石酸錢一

黑櫻實水六

遠西藥房
廣野堂
咯血
三六

覆盆子舍利別錢六

○右調和每半時服一食匙五兩

主治 虛性咯血ニ宜シ ○又肺癆交間骨蒸等ニ服ス

○第八百七十一方 結麗阿速篤六 白糖半 過兒抱一 末各 錢四

右調勻為散等分三晝每服一晝日二三次

○第八百七十二方 過儂栗屈的鬼半 封各血五 煎五 香

主治 虛性欬血肺勞ニ宜シ

○第八百七十一方 過儂栗屈的鬼半 封各血五 煎五 香

右調和為六十九衣石松粉每二時服三九

○第八百七十二方 過儂栗屈的鬼半 封各血五 煎五 香

○第八百七十二方 過儂栗屈的鬼半 封各血五 煎五 香
主治 咯血肺ノ虚弱ニ因リ感觸過敏証ヲ兼ヌル者之ヲ
用ヒテ再發ヲ防グニ宜シ

○第八百七十三方 機利蔑爾
鉛糖六 過兒抱六 末各 遠志越幾斯各一 錢

右調和為六十九衣石松粉每服二粒乃至五粒日四次

主治 咯血虚性子宮出血肺勞ニ宜シ ○其症ニ從ヒ或ハ

之ニ阿芙蓉二八ヲ伍スルモ可ナリ此ニ由テ亦能ク鉛

糖毒ヲ制ス

○第八百七十三方 機利蔑爾

阿芙蓉四分 精製鉛糖二 醋酸曹達乾者 乳糖五

遠西藥房
廣野堂
精製鉛糖二 醋酸曹達乾者 乳糖五

遠西方藥 卷八 嘔血 二十七 廣脾堂

右調和為散分八囊每一時取一囊封糊被之送下

〔主治〕失血危重ノ症ニ宜シ○蓋此散藥ハ唯病狀危篤ノ

際連服スベシ久シキモ二日ニ過クベカラズ

○第八百七十四方〔秘制律秘〕

鹿角菜錢半 井水適宜煮濾取液六寸加後藥

燐酸曹達錢半 阿芙蓉舍利別錢至

右調勻每一時服一食匙

○主治效血ニ宜シ但效ノ間隙ヲ候ヒ用フ

嘔血ハ一マテメシス 蘭エハ一マテメシス

此症炊衝狀ヲ見ハス者ハ足ノ絡ヲ刺テ放血シ痔血閉若

クハ經閉ニ因ル者ハ肛門或ハ陰部ニ放蟻ハ其他脚浴腓

腸蕪餅母胃部醋罨法ヲ施シ粘滑ノ飲液冷水ニ亞刺毘亞

護謨漿ヲ加フル者涼潤ノ舍利別酪餘等ヲ與フルニ宜シ

但之ヲ與フル皆小量ニ宜シク總テ硬固ノ食物ヲ忌ム多

般ノ醫藥ヲ要セズ唯里歌利飲方方一或ハ其症ニ準シテ之ニ

阿芙蓉液二三滴ヲ加フル者沸騰散方二等ヲ用ヒ後

答麻林度煎ニ孕驗酒石或ハ孕礪酒石方八等ヲ用ヒ後

スル者答麻林度乳清方百七十五及ヒ酒酸加里曹達方百七十五

那ヲ加ヘ方百七十五○瘧瘵性嘔血ハ至テ小量ノ吐

根方百六十一菲阿斯越幾斯方百八十五老利兒水方百八十五

遠西方藥 卷八 嘔血 二十七 廣脾堂

百八十 癰痛甚シキ者ハ阿芙蓉及ヒ麝香ニ宜シ○收斂藥
 六方 ヲ用ヒテ驟ニ嘔血ヲ遏止スルハ極メテ危シ唯虛性ノ症
 ニ在テハ細心ニ收斂劑ヲ用ヒ以テ之ヲ止ムベシ明礬乳
 清八百七方 ヲ最稱譽セリ之ヲ用ヒテ後鑛酸八百八十七方
 ヲ與ヘテ佳ナリ又鉛糖八百七十一方 至 結麗阿速篤八百
 方的列並油八百八十九方 麥奴八百七方 刺達尼至八百世方
 方ニ等皆其症ニ從テ撰用スベシ○其他冰冷水ヲ囊ニ盛リ
 或ハ疊布ヲ醃シテ胃部ヲ按シ又氷ヲ細碎シテ急ニ嚥下
 セシムルヲ佳トス凡此症小腹ノ閉塞ニ起因セルヲ以テ
 後治法ニ多ク解釋劑ヲ用フルヲ好トス即蒲公英蘆根珊

篤里白屈菜等ノ越幾斯ニ緩性中和鹽ヲ伍スル者八百九
 醋酸加里液酒酸加里曹達孕礬酒石等是ナリ末期ニ至テ
 幾那ヲ用フト雖最緩方八百九十二方ニ宜シ此症胃弱ヲ
 遺ス者多シ若之カ為ニ欺カレテ衝動健胃藥ヲ用フル片
 ハ其害極メテ甚シ

○第八百七十五方

答麻林度弓ニ 常水十二弓煮濾取八弓溶化後藥

○孕礬酒石弓一

右調勻為散每一時服一食匙

○第八百七十六方

孕礪酒石_半 常水六_勺 溶化加答麻林度一_勺 半
右調勻每一時服一食匙

○第八百七十七方〔煎〕

答麻林度_三 答麻林度乳清_六

右調勻每一時服半小盞

〔主治〕第八百七十五方ヨリ八百七十七方至嘔血ノ初起

一二日之ヲ用ヒテ以テ腸ノ下部ニ漏出セル〔參〕參爾様ノ

血ヲ排泄スルニ宜シ又肝臟慢性症ニ用フベシ〔參〕第百三

ヲ參照スベシ

○第八百七十八方〔煎〕

旃那_{一錢} 純精酒石_{半一錢} 滿那 答麻林度_{各一}

砂糖舍利別〔適〕宜味佳為度

右調勻作煉膏每服一〔哥〕壽匙每日二次乃至三次

〔主治〕嘔血及ヒ痔血ニ宜シ又痔脈ノ血鬱ヲ除カント欲

スル片ハ之ニ精製硫黃二錢ヲ加フベシ

○第八百七十九方〔煎〕

酒酸加里曹達_半 上好滿那_一 常水九_勺 溶化

右濾過每一時服一食匙

〔主治〕嘔血症之ヲ用ヒテ瀉ヲ促シ腸中漏出セル血ヲ排

除スルニ宜シ

遠西方藥 卷八 嘔血 三十一 廣

○第八百八十方

菲阿斯越幾斯四 白糖四

右調勻為散等分八裹每一時服一裹

○第八百八十一方

老利兒水錢一

右每服十滴乃至十二滴日四次

○第八百八十二方謝慈倫

老利兒水錢二 覆盆子舍利別一

右調勻每服一茶匙強日四次

○第八百八十三方

老利兒水錢二

亞刺毘亞護護漿

過爾把舍利別各一

右調勻每服一小哥喜匙每日四次

○第八百八十四方

老利兒水錢三

蒸餾水半一

櫻實舍利別一

右調和每服一茶匙日四次

主治第八百八十一方ヨリ八百八十四方至皆瘧癩性嘔

血ニ宜シ○蓋初學ノ徒ハ老利兒水單味ヲ用フルヨリ

第八百八十二方乃至第八百八十四方ヲ撰用スベシ

○第八百八十五方

菲阿斯越幾斯一 老利兒水半ヲ溶化

遠西方藥

卷八

三十一

廣

右調和每服七滴乃至十四滴日四次

主治瘧疾性嘔血ニ宜シ

○第八百八十六方〔護秘〕

血老利兒水半 桂丁幾一

右調勻每服五十滴乃至六十滴日四次

主治嘔血症下血遷延持久シ且麻痺証ヲ帶ブル者之ニ

宜シ

○第八百八十七方

玫瑰葉加 硫酸丁幾附三 覆盆子水四 櫻實舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治輕ク下血ヲ止ムルニ宜シ

○第八百八十八方

硫酸密幾私去爾 半錢至一錢 沙列布煎六 以沙

製 覆盆子舍利別一

右調勻每一時服一食匙

主治同上此方收斂ノ効前方ニ優レリ

○第八百八十九方〔略爾密葛兒〕

的列並油一 雞子黃一 攪和徐々加後味

甘扁桃乳四 橙皮舍利別二 精製曹達三 桂丁幾

滴四

右調和每一時乃至一時半服一食匙

考略爾密葛兒名此方ヲ以テ的列並油劑中最適宜ノ

方トス

○第八百九十方蕭羅擲

的列並油二十滴 桂水一 橙皮舍利別一

右調和頰服

主治英國ノ腎ハ總テ麻痺性ノ失血症ニ的列並油ヲ稱

譽シ就中腸胃ノ出血及ヒ血斑症ニ之ヲ稱用セリ骨布

蘭度名ノ說ニ據レハ四分時毎ニ的列並油二十滴乃至

三十滴ヲ與ハ又之ヲ灌腸塗擦罈法ト區噎魯利阿篤損

名ハ一時半乃至二時毎ニ二十滴乃至二十五滴ヲ與ハ

若之カ為ニ惡心ヲ發スル片ハ青酸ヲ配用セリ然レハ

的列並油ヲ用フルハ每症最謹慎ヲ加フベシ獨粘液質

ノ人ニ於ケル鈍性衰弱症ノ如キハ能ク之ニ堪フルナ

○第八百九十一方秘傳福傑兒

孕齡酒石三錢 接骨木花水六ヲ溶解加後藥

蒲公英流動越幾斯 蘆根流動越幾斯各半 屋施茂

爾一

西藥 卷八 三三 廣半堂

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕小腹ノ閉塞症通例嘔血ノ因タリ本復ノ期ニ及ビ之ヲ用ヒテ功ヲ收ムベシ

○第八百九十二方〔春經隣〕

答麻林度ニ 寒製幾那越幾斯ニ 枸椽油糖六 過

施應亞的兒一

右調和作煉膏入器固封與之每一時服一茶匙臨服宜攪

和

○第八百九十三方同上

上好亞刺毘亞護謨三 煎餹水三 橙花水二 溶解

加後藥

過施應亞的兒半 寒製赭色幾那越幾斯三 橙皮舍

利別三

右調和每一時服一食匙

〔主治〕右二方八百九十二方 病後身弱ノ者之ヲ用ヒテ補

益スベシ方中過施應亞的兒ヲ去ルキハ應當ノ症更ニ

多カルベシ

黒病メライナノモルピスニゲルヒボ

此症治法畧嘔血ニ同シ但放血スルヲ罕ナリ誘退法トシ

テ煎餅母ヲ貼シ手足ヲ刺戟藥湯ニ浸シ或ハ兩脚煎湯法

遠西藥房

藥

黒病

三十四

廣

胖

堂

緩和灌腸等之ニ宜シ穢歇蘭度ハ胃部ニ香竄麻酔ノ微

温罨法ヲ殊ニ稱用セリ濠ニ其失血ヲ抑遏スルヲ勿レ即

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

之ヲ防クニ先答麻林度乳清百三十五方。八酒石酸四百八十

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

腸ヲ行フベシ内服ハ消化シ易キ越幾斯劑及ヒ緩方幾那

右調勻為散分八服朝暮一服

○主治 黑病ニ用ヒテ腸ノ觸動機ヲ鎮靖スルニ宜シ

○第八百九十六方

赭色幾那

二錢至三錢

熱湯四匁浸一二時濾取液加橙皮

舍利別半匁

右調勻每一時服一食匙

○第八百九十七方

草赭色幾那

半匁

井水八匁煮耗至四匁絞濾放冷加橙皮

舍利別三錢

右調勻每一時服一食匙

主治

右二方八百九十六方

患者本復ノ期ニ方テ生カヲ

○振起スルニ宜シ○第八百九十二方及ヒ八百九十三方

モ亦用フベシ

○第八百九十八方

依蘭苔

三錢至半匁

格綸僕

錢一

常水八匁煮濾取六匁放

○冷加桂舍利別半匁

右調和每一時服一食匙

主治 病后衰弱ヲ補益スルニ宜シ○或ハ單純ノ滋養方

六百六十二方至三百六十八方 適當スル者多シ

○第八百九十九方

遠西方彙
卷之八
黑病
三十六
廣
肚
堂

○ 著草越幾斯半錢 默栗薩水四

右調和每半時服一食匙

〔主治〕黑病本復ノ期ニ方テ極メテ再發ヲ防グベシ此方

之ニ宜シ

○ 第九百方

著草 蒲公英 紫堇各新葉

○ 右入石臼搗爛漸徐加薄荷水一多半絞濾清定取上澄每

朝飲服

○ 第九百一方

著草葉 蒲公英葉各新絞汁本野

右精細濾過清定取上澄更加薄荷油糖半多溶解每朝飲
服臨服宜振盪

〔主治〕右二方九百方 患者本復ノ期ニ及ビテ小腹ノ閉

塞ヲ解散スルニ宜シ

遠西方彙卷之八

遠西方彙卷之八
 眼病
 三十七
 廣野堂

遠西方彙卷之九

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

痔ハロイモルロイシデス羅ハモ

痔ノ療法ニ般ニ分ツ曰ク根治法曰ク姑息法是ナリ其症

根治法ニ宜シキ者ハ之ヲ用フルヲ固ヨリ論ナシ然レモ

痔既ニ深ク宿根シテ其全治ヲ望ムベカラズ而メ諸見證

極メテ困難加之生命モ亦危キニ臨ムニ至テハ特ニ姑息法ヲ施スヨリ他ナシ

第一根治法ハ攝養ヲ節スルノ外專小腹ノ血行ヲ進メ且大便ヲ利シ總テ腹臟ノ鬱積ヲ除クノ藥ヲ用フルニアリ即此ニ屬スル者ハ蘆根。蒲公英。麻爾羅。歐。越。幾。斯。等ノ如キ緩性解釋藥ニ孕鹼酒石ヲ配スル者

九百二方至 九百五方至 九百八方至 九百九方至 九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

及ヒ解釋越幾斯劑ヲ配スル者 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

百十灌腸法 九百十九方至 九百二十方至 九百二十一方至 九百二十二方至 九百二十三方至 九百二十四方至 九百二十五方至 九百二十六方至 九百二十七方至 九百二十八方至 九百二十九方至 九百三十方至

泉ノ如キ是ナリ 輓近ニ至テ弗蘭白刺皮 九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

健身泉 是ナリ 輓近ニ至テ弗蘭白刺皮 九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

アリ **第二姑息法**ハ專痔血ヲ漏出セシメテ其困難危險ヲ

防グヲ要トス其之ヲ漏出セシムルハ温水ニ灰鹽若クハ石鹼ヲ加ヘテ之ヲ猛烈ナラシメ以テ脚ヲ浸シ蒸氣ヲ以テ肛門ヲ温メ緩性刺戟藥ヲ腸ニ灌キ四週毎ニ肛門ニ蟻鍼ヲ施シ又礪砂。蘆薈。沒藥。雜腹蘭。黑列僕里。鋏劑 九百九方至九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

方世 等ノ如キ所謂破血藥ヲ用フ○痔血多過ノ者ハ其症ニ準メ清涼劑 九百九方至九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

シ己ムヲ得ザレバ鑛酸明礬モ亦用フベシ○所謂盲痔モ亦緩下藥殊ニ孕鹼酒石ヲ與ヘ而メ諸種ノ軟膏 九百九方至九百十方至 九百十一方至 九百十二方至 九百十三方至 九百十四方至 九百十五方至 九百十六方至 九百十七方至 九百十八方至 九百十九方至 九百二十方至

方世 ハ痛所ニ貼スベシ冷水ヲ以テ肛門ニ灌キ或ハ寒罨法。或ハ冷水灌腸ヲ施スハ皆其症唯局處ノ衰弱ニ因ル者

二適當ナリ ○粘液痔ハ強壯藥九百四十方至ヲ處スルヲ
 常トス ○膀胱痔ノ治法大概直腸痔ニ同シ唯僅ニ斟酌ア
 ルノミ即解釋劑ヲ用ヒテ素因ヲ除クヲ務メ以テ根治
 ヲ圖ルヘシ然レモ根治ノ効ヲ收ムルヲ罕ナルガ故ニ其
 畜血ヲ直腸ニ導引スルヲ常トス四週毎ニ肛門ニ鎮鍼四
 條乃至六條ヲ施シ或ハ刺戟藥ヲ用ヒテ灌腸シ又管ヲ以
 テ緩和藥ノ蒸氣ヲ攝シ直腸ニ送入スレハ能ク其効ヲ達
 スルナリ此症ハ衝動藥ヲ坐藥ニ作リテ用フルモ亦適當
 ナルベシ又膀胱ノ部位及ヒ陰部ニ冷水ヲ灌クニ宜シ内
 服ハ荅麻林度五百七十五方至 孕礪酒石五百七十五方 酒酸加里曹達十五

痔
 廣
 肝
 堂

四百五十五方 孕礪酒石九百二方至 等ノ如キ緩性瀉藥ニ
 宜シ瘰癧証ハ油性乳劑ニ菲阿斯越幾斯ヲ伍スル者五百
五百十 老利兒結爾私水八百八十五方 至 小量吐根百廿五
三百十 老利兒結爾私水八百八十五方 至 小量吐根百廿五
六十七方 等佳ナリ此他尿道漏血太多カラサル者ハ慢
 ニ止血藥ヲ用フルヲ勿レ若其血過多ナルモハ停止セザ
 ルヲ得ヌ即粘汁ニ硫酸ヲ伍セル者一方 明礬八百廿 或ハ
 明礬乳清七百廿 桂下幾ヲ阿芙蓉丁幾葛私篤儂漢丁幾或
 ハ老利兒結爾私水ト配伍スル者此症の當ノ方トス蓋之
 中兼テ膀胱ノ部ニ寒罨法ヲ行フベシ ○膀胱粘液痔即所
 謂膀胱聖京偃症ノ治法ハ直腸粘液痔ト一般ナリ上ニ載

廣
 肝
 堂

スル所ノ強壯藥ノ外烏萃烏爾失ハ奇特ノ効アリ鑛泉ノ
 中ニ就テ志爾順傑兒泉ハ穢歌蘭度氏稱用セシヨリ膀胱
 ノ粘液痔ヲ嘉稱ヲ得ル他ハ膀胱粘液流出症條下ニ詳
 説スル所ノ方法ヲ參照ス

○第九百二方〔落優〕

孕驗酒石一 蒲公英越幾斯或濱瞿麥越幾斯或蘆根
 越幾斯半 默栗薩水六
 右和勻朝夕服二食匙

主治 諸種ノ痔ヲ宜シ

○第九百三方 穢歌蘭度

...

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯 孕驗酒石各半 蒸餾

○水 薄荷水各三

右調勻每服一食匙日四次

主治 痔脈閉塞症ニ用ヒテ微利ヲ持續セシムルニ宜シ

○第九百四方〔斯爾羅越幾斯〕

孕驗酒石 麻爾羅越幾斯各二 默栗薩水三 溶

解

右調勻朝夕服半劑

主治 上方ニ同シ

○第九百五方 穢歌蘭度

○純精酒石一 硫黃半

右和勻為散每服一茶匙日一二次

○第九百六方一

精製硫黃一錢至二錢 孕驗酒石六錢 茴香油一錢 白糖

○右調和為散每服一茶匙日三四次

主治右二方痔脈ノ閉塞ヲ通暢シ大便ヲ導泄スルニ宜

○第九百七方一 穢歌蘭度

硫黃乳 麻屈涅失垂 純精酒石 枸椽油糖各一

右調勻為散晡時冷水一小盞和服

主治神經質人ノ痔疾ニ宜シ大黃

○第九百八方一 過傑栗屈的兒

純精酒石 麻屈涅失垂 沈澱硫黃 茴香各二 龍

右調和為散等分十六包每一時半取一包著草浸劑和服

主治痔疾家甚虛弱ノ者之ニ宜シ

○第九百九方一

結列印依林昆姪兒散 大黃 茴香 加耶普的油

孕驗酒石 橙皮黃 大黃 茴香各二

右調勻為散早晚服一茶匙強

○第九百十方

設兒列名入疎釋散苗香油各一

○純精酒石錢三

麻屈涅失重加密列

硫黃華 大黃

右調勻為散每服一茶匙再二三次

主治右二方九百九方

門脉系閉塞。胃腸虛衰。風氣鬱蓄。大便不利。依朴昆姪兒等。三偉効。了。其。黃。苗。香。油。各。一。

○第九百十一方

室卒德

精製護謨安沒尼亞幾 白石鹼

大黃末各錢

右調勻為散每服一茶匙再二三次

乃至八九日三次

○第九百十二方

精製護謨安沒尼亞幾

白石鹼各一錢

蒲公英越幾斯

白屈菜越幾斯各一錢

右調勻二丸為一九衣石松粉每服五丸乃至八九日三次

主治右二方腹中閉塞殊。肝系門脈系ノ閉塞ニ宜シ。

或ハ水製蘆薈越幾斯半錢ヲ加フベシ

○第九百十三方

蒲公英越幾斯

睡菜越幾斯

纈草越幾斯各一錢

勿

搗祭亞石鹼半錢

大黃末一錢半

過爾托末適宜

遠西方彙 卷九 六 廣用堂

右二氏為一九衣伊里斯弗魯連底那根末每服十九日三次

主治諸般ノ腹臍閉塞。膽液分泌ノ障礙。粘液鬱滯等ノ症

宜シ

○第九百十四方 [傘拂]

蒲公英越幾斯 蒼草越幾斯 葛兒儒別越幾斯 亞

兒尼加越幾斯 各二 醋酸加里 精製礮砂 各半 大

黃 赤二 錢 右調和二氏為一九衣伊里斯弗魯連底那根末每服十五

丸乃至三十九日一二次

主治腹内諸器粘液鬱滯或ハ閉塞アル症及ヒ痔疾等ニ宜シ

○第九百十五方

蒼草穗 二

右細剉水煎供飲料

主治痔疾ニ宜シ早晚一小盞ヲ取り冷服セシム但シ累

月連進スベシ

○第九百十六方 [剉齒松]

蒼草葉 半 瀉利鹽 一 過泥子 一

右細剉水ニ此浸漬安熟所四分時玻璃壘收貯每服取半

小盞乃至半小盞餘濾過飲服日二三次

主治腹内諸分泌遲鈍ノ症粘液鬱積痔疾等ニ宜シ

○第九百十七方〔附爾姪蒲瀉度〕

精製瀉利鹽 水製大黃丁幾各一 默栗薩水二

右調勻朝夕服二食匙

主治痔疾殊ニ盲痔便秘ヲ兼ヌル者ニ宜シ

○第九百十八方〔附瀉爾偈名地白母布列屈篤〕

弗蘭白刺皮半弓或六錢或一弓

右常水適宜煮濾取液六弓每一時服一食匙以每日得粥

樣便三四行為度

〔主治〕〔白母布列屈篤氏之ヲ稱用セシノミナラズ密

優憫見名地噎魯蘭件同尉魯寺瀉爾偈等同ノ病院ノ碩學

及ヒ其他ノ醫家モ亦痔疾及ヒ他ノ少腹痛ニ此方ヲ好

トス蓋此煎劑數週連用スルニ宜シ〔白母布列屈篤氏病

者ニ命スル所ノ用法左ノ如シ弗蘭白刺皮一弓半水一

瓶半ヲ以テ煮テ一瓶ヲ取り午前午後一盞強ヲ服セシ

メ一食匙半ニ食匙以テ効ヲ得ルニ至ル○多血畜積症生

力充進セル者或ハ血脈系ノ感觸過敏ナル者ハ更ニ此

硝或ハ孕鹼酒石ヲ加フ○又屢胡蘿蔔ヲ兼用スルヲ大

ニ稱賛ス○白母布列屈篤氏或ハ胡蘿蔔ヲ插爛シテ米

飲若クハ肉羹汁ニ加ヘ。或ハ生根ヲ用ヒ。或ハ洋芥。些ノ
 酪。砂糖。及ヒ些ノ食鹽ヲ合メ搗爛シ。或ハ之ヲ冷浸シテ
 飲料トス。冷浸法生根ヲ搗爛シテ桶ニ入レ冷水ヲ注キ
 テ蓋覆シ冷所ニ安スルコト六時後絞リ濾シテ砂糖ヲ和
 ス。或ハ此液更ニ味佳ナルヲ要セハ洋芥根ヲ研爛シテ
 胡蘿蔔ト俱ニ浸出スルモ亦可ナリ。此液半瓶乃至一
 ヲ取テ一日ニ服盡セシム。風氣鬱閉ヲ兼ヌル者ハ過
 炭酸曹達一刃乃至半錢沙糖水甘味 適宜一麥酒蓋強ニ和シ
 之ヲ上ノ煎方ト兼用スルコト日ニ三四次シテ良効ヲ得
 タリト云フ。○此煎方ハ弗蘭白刺ノ幹皮乾枯セル者ヲ

用フベシ。嫩枝ノ皮ヲ用フルコト勿レ。生皮ヲ用フルハ嘔
 ヲ發ス。

○第九百十九方 別連世

○蒲公英葉根俱用三 麥糠一 井水十六弓 煮純至八弓 乘

沸如後藥

加密列 續草 各ニ 錢

右濾過二分灌腸

備考 此方ハ弁拂氏小腹閉塞ヲ治スル灌腸藥ノ變方ナ

リ。○弁拂氏ノ説ニ據レハ多般ノ小腹病殊ニ依朴昆姪
 兒。黑膽液病。及ヒ痔疾ハ唯夫ノ灌腸法ノミヲ以テ癒ル

ト云ヘリ此論偏固ニシテ形器説ニ原ツクト雖然氏當
 今之ヲ廢棄スルモ亦甚シトス高醫落優ハ人ハ弁拂氏名
 療法ニ拘泥セシ者ニアラスト雖亦夫ノ灌腸法ヲ以テ
 諸種頑固ノ小腹病肝臟虛衰メ膽液減耗シ之カ為ニ便
 秘常習トナレル症黃疸腸間膜腺ノ腫脹盲痔等ヲ全治
 セリト云フ

○第九百二十方 〔歐蘭度〕

蒲公英根 濱瞿麥根 歇爾拔斯屈謨花 加密列各

右割合供灌腸劑毎用取二茶匙強加小麥糠一握煎

主治所謂小腹閉塞及ヒ閉塞ニ係ル諸患ニ宜シ○蓋毎

次小量六ニ射注シテ務メテ藥汁ヲ内ニ留メシムルヲ

要トス之ヲ留ムルハ灌腸後四分時間患者ヲシテ右側

臥セシムヘシ頑固ノ閉塞或ハ粘膠液蓄積セル者ハ石

鹼石灰水ノ如キ峻烈ノ解釋劑及ヒ新鮮牛胆一食匙ヲ

加フ

○第九百二十一方

蒲公英根 濱瞿麥根 顯草 點失刺護各一

右割合合供灌腸

○第九百二十二方

○蒲公英根 濱瞿麥根 蒼草葉 葛爾儒別葉 加密

列各一

右細割合供灌腸

○主治右二方上ニ同シ○此方症ニ隨テ種々加減スサト珊篤

里葉麻兒羅歇等モ亦加ヘテ可ナリ

○第九百二十三方 祇ヤ種ノ名ハ奇効水リアクワノテ

麻偃涅失ニ三ニ井水ニ北ニ

右和勻徐々加稀硫酸九錢每服一麥酒盞強日三次

○主治痔疾ヲ根治スルニ宜シモ謨私篤ノ名ハ同友福傑兒氏

ト俱ニ此藥液ヲ歷驗シテ實ニ偉効ヲ得タリト云フ○

○方中ノ稀硫酸ハ醇硫酸一分水六分トス○蓋安頓ノ名ハ

未此水藥ヲ熱試セザルガ故ニ實ニ未其効ヲ知ラズト

雖痔疾ヲ根治スルハ攝養ヲ節シ解釋劑及ヒ硫黃ヲ用

ヒ小腹頑固ノ閉塞アル者ハ浴法葛爾泉浴ヲ施メ更

ニ偉効ヲ奏セリ

○第九百二十四方謨私德落兒

複方大黃越幾斯 水製蘆薈越幾斯各一 過ア泥子油

滴十六 開達格碌屈斯十二

○右調勻二匁為一丸衣石松粉每晚服一丸乃至三丸

○主治小服内閉塞症便秘ヲ兼ヌル者及ヒ上症ニ因テ發

スル所ノ諸症ニ俾効アリ

○第九百二十五方 〔秘歌〕 忽弗滿名 拔爾撒謨丸

沒藥 蘆薈 黑列僕里越幾斯錢各二 葛爾儒別越幾

斯 亞爾鮮越幾斯 紫堇越幾斯 珊篤里越幾斯

著草越幾斯各半 底列並的那 安息香 杜松子脂

常春藤脂各二 雜腹蘭東方產

右丁寧調和上沙火二匁為一九夜石松粉隨症每朝服二

九乃至六九

〔主治〕痔血ヲ促スニ宜シ

○第九百二十六方 設兒名 拔爾撒謨丸

雜腹蘭未半 阿芙蓉未五 精製碓砂 蘆薈透明

黑列僕里越幾斯各一

右加水製大黃丁幾適宜調和一匁為一九夜甘草末玻璃

器收貯每服八九乃至十二丸

〔主治〕痔血及ヒ經血ヲ促スニ宜シ○毛皮ヲ以テ肛門ヲ

摩シ痔血ヲ促スノ法ハ益アルヲ稀ナリ唯患者感觸遲

鈍多血肥胖ニシテ粘液質ノ者ニ適當ニ感觸鋭敏ノ者

ハ脚浴ヲ行ヒ肛門ニ蒸氣浴ヲ施シ肛内ニ衝動藥ヲ射

○第九百二十七方 橙蒲名丸

蘆薈透明者 鐵屑各一錢 拔爾撒

謨舍利別適宜

右三丸為一九衣石松粉早朝服一二丸晚間二丸乃至四丸

主治閉止セル痔血ヲ挑起スルニ福傑兒名大ニ此方ヲ稱賛セリ○又經閉症ニ弗陽名人之ヲ用フ

○第九百二十八方暹傑栗屈的兒

黑列僕里越幾斯 阿魏 透明蘆薈 撒兒未爾扶斯

雜腹蘭東方產 各一錢 越栗失爾布魯布利篤適宜

右二丸為一九衣桂木每晚服八九丸

○第九百二十九方同上

甲方

黑列僕里越幾斯刃 沒藥水製越幾斯 礪砂 桂油

糖各一 桂水三勺溶解加橙皮舍利別半勺

右調勻早午晚服一食匙

主治右二方九百廿九方痔血及ヒ經血ヲ挑起スルニ宜

シ○蓋此ノ如キ破血峻劑ヲ用フルハ最慎重スヘシ但

感覺遲鈍ノ者ニ適當タルハ固ヨリ論ナシ

○又有名ノ秘方二三ヲ掲ケテ左ニ示ス痔疾及ヒ依朴

昆堉兒有形ノ因ニ係ル者其他慢性諸病小腹閉塞ニ因

スル者ニ在テハ屢誤用シ易シト雖効ヲ奏スル症モ亦
往々之アリ即飽私ノ説ニ據ルニ所謂上帝丸ルスピ
ンル一名噎涅爾名清血丸ノ方左ノ如シ

乙方

格碌堇篤錢六 蘆薈錢六 蘇甘沒尼各半 益智錢一

右調勻取一爪半加甘求半爪作一九

○寄束弗名地越仙祭亞ハ密優憫見名地合藥家ノ一方タリ

其方悅乾名地合藥家噎蛭名地ノ説ニ據ルニ左ノ如シ

丙方

大黃錢六 健質亞那 雜腹蘭各三 山奈

落葉松耳 上好沒藥 勿搦祭亞的里亞各四 上

好蘆薈十六

右細剉加拂郎斯燒酒三十六匕飽熟

○越爾涅兒名地健身拔爾撒謨或ハ噎涅爾健身拔爾撒謨

ハ噎蛭名地言ニ據ルニ左方ヲ蒸餾シテ製スト云フ

丁方

穉爾撒謨字露黑色 同上白色者 蘇合香乾 同上

安息香三錢 桂皮 府利各六 護謨安沒尼

上好蘆薈各一 上好沒藥二錢 乳香半 酒石

鹽錢一 乙切草花一握 良姜 白芷 亞爾加那根各一

蓮 實久聰尼 鴉栗拔奴謨 白雜腹蘭 瘰癧瘡木

油 龍涎香 麝香 迷迭香 萊沃刺那 刺

賢堙兒花 各半

右細對調勻

○第九百三十方〔設兒列〕

酒石酸 一刃至 二刃 著草油糖 一

右調勻為散等分六晝每服一裏日三次乃至四次

主治痔血過多ノ症ニ宜シ六晝

○第九百三十一方〔落優〕

鹿琥精 錢二 葛私篤儂謨丁幾 錢一 阿芙蓉丁幾 錢半

右調和每四分時服十二滴

主治痔血過多ニシテ瘰癧性ヲ帶ル者之ニ宜シ

○第九百三十二方〔弗陽倣弗氏隣〕

著草越幾斯 鐵粉 錢二

右調勻加桂末三人為一九夜桂末每服三丸乃至五九日

三次

主治虛性ノ痔疾失血最甚シキ者之ニ宜シ

○第九百三十三方

里那利膏 附一

主治結核痔疼痛ヲ帶フル者之ヲ塗擦ス

○第九百三十四方 〔疥瘡〕

里那利膏 菲阿斯油 煮製者 各半 鉛糖 半錢

右調勻作軟膏塗擦盲痔

○第九百三十五方

雜腹蘭 末一錢 龍腦 二錢 菲阿斯油 煮製者 二錢 鉛糖膏 六錢

右丁寧調勻塗擦

○第九百三十六方 〔逆〕

菲阿斯油 煮製者 斯百兒末 攝多 各二錢 葛加阿酪 半錢

龍腦 二錢 雜腹蘭 一錢

右調勻作軟膏攤麻布貼每一時半更換

〔主治〕第九百三十三方ヨリ九百三十六方至結核痔疼痛

ヲ帶フル者ニ宜シ又單味ノ葛加阿酪雞卵油過兒托軟

膏及ヒ其他ノ緩和藥モ亦適當ナリ肝爾姪蒲蘭突土 人名

ハ果實ヲ油燻シテ之ヲ搗爛シ赤葡萄酒ヲ和シ尻間ニ

貼スルヲ稱譽ス接骨木汁ヲ麻布ニ塗リ結核上ニ貼ス

レバ破潰出血シテ能ク緩解ス若焮痛スル者ハ會陰ニ

放蟻シ又結核上ニ寒罨法ヲ施シテ効アリ

○第九百三十七方 〔瘰癧〕

明礬 末半錢 新鮮無鹽酪 半一

右調勻塗撒絲貼之日數次

主治痔疾痛ヲ帶ヒ稀液滲出スル者之ニ宜シ

○第九百三十八方律私篤

○明礬末二錢半阿芙蓉末半鉛糖軟膏半

右調和塗麻布貼之

主治痔核箱窄ヲ治スルニ宜シ

○第九百三十九方骨布

甘汞一至六分亞刺毘亞護護末半加纈草水一弓半

徐々搗和

右為灌腸劑

主治直腸内ノ痔疾瘰癧疼痛ヲ帶フル者及ヒ直腸ノ腫

起ニ宜シ蓋水節ニ之ヲ装スル前先重湯ヲ以テ暖ムベ

○第九百四十方

大黃末白糖各一錢四分

右調勻為散等分六裏早晚服一裏

主治粘液痔ニ宜シ○直腸ニ焮衝性血積ヲ兼ヌル者ハ

先清涼劑或琪鍼ヲ施シテ以テ之ヲ制スベシ然レ粘液

痔ハ多ク虚性ナルガ故ニ強壯ノ諸藥殊ニ蒼草九百十

百十連錢草洞庭藍睡菜括失亞依蘭苔幾那擦子製喜

刺達尼亞鐵劑鐵泉等ヲ用フルヲ要トス○又大黃ヲ用

遠西方彙

卷九

十一

廣生堂

フベシ腸衰弱弛緩シテ粘液ヲ漏スル過多ナル者最驗
アリ若此散藥ヲ飲クハ大黃小塊ヲ齧嚼スル一日ニ
一二次或ハ次方ヲ用フルモ亦可ナリ

○第九百四十一方

主大黃半錢 菖蒲根半錢 熱湯適宜浸漬濾取三勺 加橙

皮舍利別三錢乃至四錢

右調勻每服一食匙日四次

主治胃腸衰弱症。粘液痔等ニ宜シ

○第九百四十二方

格綸僕一錢 大黃一錢 常水六勺煮濾取四勺 後加橙

皮舍利別半勺

右調和每服一食匙日四次

主治胃腸衰弱。酸敗液。風氣鬱畜。慢性泄瀉。粘液痔等之ニ

宜シ

○第九百四十三方

別私那爾突人丸

撒兒萊爾秩斯 牛胆凝固 蒲公英越幾斯 蘆薈越

幾斯各半錢

右調勻二勺為一九衣桂末隨症朝暮服二九乃至六九

主治噶刺弗氏粘液痔ヲ治スルニ甚之ヲ稱賛セリ但小

腹内諸器感觸過敏ノ者ハ蘆薈越幾斯ニ代ヘテ水製大

黃越幾斯ヲ撰用セリ○落優名ハ水製蘆薈會越幾斯半ハ至ヲ用フル一日ニ三四次兼テ蒼草浸葛私加栗刺浸及ヒ大黃加桂皮浸或ハ未熟橙ノ浸劑ヲ服セシメ又沒藥的列並底那或ハ拔爾撒謨骨拜灌ヲ用ヒテ効ヲ得タリ
 感觸甚遲鈍ノ症ハ越栗失爾布魯布利篤ニ薩毘那了幾ヲ加ヘ或薩毘那末ニ鐵粉雜腹蘭大黃等ヲ伍用シテ良効ヲ得タリ蓋此ノ如キ症ハ兼テ胡椒五粒乃至八粒ヲ嚥下スル一日ニ二三次補益ノ食餌及ヒ葡萄酒或ハ健渭酒ヲ用フ飲酒常習ノ者ハ落優氏時々燒酒少許ヲ與ヘリ燒酒ハ珊篤里健質安那未熟橙薄荷等ニ優レリト

云フ弛緩甚シキ者ハ薦骨ノ部位ニ芫菁了幾ヲ塗擦シ或ハ芫菁硬膏ヲ貼シ脊椎ニ越列機的爾若クハ瀉水浴ヲ施シ内服ニ別私點變名ノ神經強壯了幾葛刺布呂篤名神經了幾ヲ用フベシシ

○第九百四十四方〔依過秘密土〕

土木香越幾斯錢三 幾那越幾斯錢六 阿魏錢一 鐵粉錢各一

右調勻二人為一九衣桂末每服五九日三次

主治粘液痔ニ用フ又萎黃病及ヒ白帶下ニ宜シ

○第九百四十五方

沒食子一 井水一 比半煮濾取一 比

右分為三劑供灌腸

○第九百四十六方

主沒食子煎六明礬半

右溶和供灌腸

〔主治〕右二方九百四十五方粘液痔及ヒ直腸脱ニ用フ○

○粘液ノ漏泄スル者病毒分利ノ為ニシテ久シク癒ザル

症ハ先全身ノ弛緩ヲ治シテ后灌腸ヲ行ヒ以テ直腸内

粘液膜ノ弛緩ヲ復治スルヲ佳トス何者粘液ヲ抑壓ス

ルヲ早キニ過グレバ喘息ノ如キ大害ヲ招クヲ往々之

アレバナリ且其灌腸モ亦始メ小量ニ施シ或ハ微力ハ

品ヲ撰用シ漸次ニ強藥ニ移ルベシ故ニ先冷水ヲ以テ

灌腸シ其後唐茶浸珊瑚里檳榔皮水楊皮或ハ幾那浸ヲ用

フベシ明礬鉛糖及ヒ其他ノ收瀉藥ヲ加フル者ハ罕ニ

弛緩甚シキ症ニ稱用スルノミ但含鐵泉ノ灌腸ハ偉効

アリ含鐵泉ニ浴スルモ亦佳トス匹爾爾闕爾篤爾泉爾蒲爾劉爾攝爾

那優同尤佳トス

○第九百四十七方春姪隣

烏華烏爾爾失失半半 蒼草總一 井水三斗煮耗至二斗

加甘草一弓濾過再加桂舍利別二弓

右調勻二日服盡

〔主治〕膀胱痔並ニ總テ虚性ノ出血及ヒ粘液流出症ニ宜

シ○孤刺劉私人ハ烏華烏爾失ヲ實阿私麻〔附〕ト配合シ

與ヘリ膀胱麻痺條ノ方ヲ見ルベシ

○第九百四十八方〔設〕倚迷謁爾

烏華烏爾失 連錢草葉各三錢 常水適宜煮八分時加

橙皮黃二錢蓋閉浸漬八分時濾取八弓再加後味

亞刺毘亞趨謨漿 過兒托舍利別各一

右調勻每服半小盞日四次

〔主治〕膀胱痔血或ハ粘液ヲ流出スル者ニ宜シ又白帶下

ニ用フベシ

○第九百四十九方〔鐘護私丁〕

烏華烏爾失一 苗香油糖五

右調勻為散等分十二裹每服一裹日三次乃至四次

○第九百五十方〔越過簡設〕

烏華烏爾失一 井水十二弓煮濾取八弓

右每一時服半小盞

○第九百五十一方〔速別倫歎愷〕

烏華烏爾失一 井水適宜煮濾取六弓溶化葛私加栗

刺越幾斯二錢再加後味

拔爾撒謨字露舍利別各一

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

○第九百五十二方〔秘屈私〕

石松粉刀二 雞子黃箇一 加烏華烏爾失煎煮三五 五子取液

搗爛加後藥

橙皮舍利別錢六

右調和每一時服一食匙

主治第九百四十九方ヨリ九百五十二方至腎及ヒ膀胱

ノ虛性粘液流出症ニ宜シ

○第九百五十三方〔福屈列爾〕

吐根末三 麻偏涅失亞錢一 白糖錢七 拘櫟油或ア 過泥牙

子油六滴至

右調勻為散玻璃壺貯每服一乃至若一茶匙強日三次乃

至四次

主治膀胱粘液痔小便難澀久麻白帶下ニ宜シ又吞酸及

○ヒ百日效ニ用フベシ

血尿ハチ ムチユリ ア〇 ミユ ヲク チユ スク リユ エ

此症原因多クハ痔ノ存スルニ係ル故ニ治法膀胱痔ト一

般ナリ煥衝性ノ者ハ放血シ且答麻林度製清涼瀉劑ヲ用

フベシ九十三方 五百七十五方五百七十五方 瘻變性ノ者ハ小量吐根五百世

油性乳劑ニ阿芙蓉液或ハ菲阿私越幾斯ヲ

卷九

卷九

三

廣

堂

加フ者五百八方。五老利兒結爾私水八百八十一方至等

宜ニ弛緩ニ因ル者ハ著草葉浸九百十方烏華烏爾失煎九百

方明礬乳清八百七方幾那八百九十六方刺達尼八百七方

等ヲ用フ此他甘扁桃油若クハ罌粟子油ヲ取り早晚一食

匙ヲ用ヒテ諸種ノ尿血症ニ甚偉効アリトス

○第九百五十四方〔春姪隣〕

主刺達尼越幾斯六錢好桂水五ヲ溶化加後藥又香類

至硫酸密幾私生爾附一錢半橙皮舍利別一錢半

右調勻每洋特服食匙一只米一茶一日三次

主治尿血太過ノ症ニ宜シ

○第九百五十五方〔蒲列刺〕

大馬子一井水適宜煮耗至一比加三色堇菜花不詳半

過兒托舍利別半

右調勻每服半小盞

主治經久尿血ニ宜シ

血斑病モルビユス。マキユロシユス。ウエルホヒ。〇ピユルピユ

フエルホ治法猛烈收斂ヲ要トス是故ニ鑛酸及ヒ幾那ヲ最トシ其

他明礬刺達尼ヲ用ヒ冷水及ヒ醋ヲ以テ全體ヲ洗ヒ又榭

西

藥

卷

三

廣

肝

血斑病 二二三 廣 肝 堂

皮煎 浴スベシ 失血症ノ條ニ載スル所 全錄ニ載ル又檢

○第九百五十六方 過兒抱煎 六分以過兒 覆盆子舍利別

鹽酸 一錢至 過兒抱煎 六分以過兒 覆盆子舍利別

右調勻每一時服一食匙

○第九百五十七方 幾那煎 覆盆子舍利別

稀硫酸 半錢至 幾那煎 覆盆子舍利別

右調勻每一時服一食匙

○第九百五十八方 刺書私 加 密列水 或 覆盆子水 覆盆

○第九百五十九方 加 密列水 或 覆盆子水 覆盆

○第九百六十方 加 密列水 或 覆盆子水 覆盆

子舍利別 或 黑櫻實舍利別 稀硫酸 半錢至一

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治 右三方血斑症ニ用ヒテ諸液ノ腐敗ヲ防止シ且生

カヲ挑起スルニ宜シ

子宮出血 ムトドル フラダア 羅バール

實性子宮出血症多血ノ婦人ニ在ル者之ヲ抑遏スルヲ早

キニ過レハ危險ヲ致スヲアリ宜ク自然ノ良能ニ從事ス

ベシ設令藥劑ヲ與フルモ緩方ノ消石飲。純精酒石等ノ如

キ清涼品ヲ處シ又清涼下藥ヲ用ヒテ毎日瀉ヲ促スニ宜

シ尺澤放血ヲ要スル症ハ甚罕ナリ出血癉瘰性ノ者ハ小

藥 西 藥 卷 九 二 廿 四 廣 肝 堂

量吐根八百六十一方殊ニ之ヲ阿芙蓉ニ配スル者九百五十一方實莖

荅利斯九百五十一方葛私篤幾トス等佳ナリ但血

脈系ノ興奮機盛ナル者ハ鑛酸九百六十一方妙トス外用其症

痙攣性ノ者ハ胸上乾角法ヲ行ヒ下肢蒸餅母ヲ貼スルヲ

稱譽セリ兼テ下肢ヲ温水ニ浸スベシ○弛緩ニ因ル症ハ

出血發作ノ時ニ當テ桂丁幾ヲ以テ醫藥ノ魁トス蓋之ヲ

鑛酸及ヒ阿芙蓉丁幾ニ配スルヲ最妙トス九百六十一方

方後麥奴九百六十五方紺百設木八百三十三方刺達

尼八百六十八方至八百七十一方篤爾九百六十七方面室兒刺八百七十一方

等ヲ用フベシ○弛緩甚シクシテ危篤ニ臨ム者ハ薩毘那

九百七十三方至九百七十五方明礬八百七十六方至八百七十九方及ヒ撒

兒末爾九百八十八方稱用ス○外用小腹ニ亞的兒ヲ塗擦

シ或ハ點滴シ諸種ノ軟膏硬膏及ヒ射注劑ヲ施シテ効ア

リ九百八十九方又冷水ヲ以テ直腸或陰門ニ射注シ或

ハ氷雪若クハ氷屑ヲ取テ子宮上ニ寒罨法ヲ行フベシ蓋

此等猛劇ノ法ハ出血過多ノ為ニ生命危險ニ臨ミ前ニ舉

ル所ノ方法功用ヲ逞シクセザルニ至テ方ニ之ヲ試用ス

ベキノミ何トナレバ慢ニ之ヲ用ヒテ時宜ヲ得ザレバ却

テ之カ為ニ子宮焮衝腹膜焮衝腸焮衝其他困難ノ諸症ヲ

發スレバナリ小腹及ヒ腰部ニ冷水ヲ灌クハ偉効ヲ得ル

者多シ形器法ノ此ヲ施スベキ者ハ手掌ヲ以テ小腹ヲ摩
擦シ。下肢ヲ纏絡スルノ卑キヨリ高キニ至ル及ヒ栓ヲ挿
ム等はナキ但其絡纏挿栓ニ法ハ子宮内ニ畜血ノ懼レ
ナキ者ニシテ之ヲ施スベキノミ

○第九百五十九方護私篤

甲方水質 煎膏點膏

上好葛私篤儂 吐根二 精製阿芙蓉一 桂油

糖水錢 煎膏點膏

與右調勻為散等分十二裏每八分時四分時若半時取一裏

冷水和服

主治子宮出血感覺過敏症脈縮小シテ不齊。面色慘澹。皮

膚冷エ且乾キ體質甚柔脆ナル者之ニ宜シ○此方ト更

換シテ左ノ散方モ亦用フヘシ

乙方 實芟荅利斯一 純精酒石 白糖各半

右調和為散分十二裏每服一裏日二次乃至三次冷水送

下下

○第九百六十方過傑栗屈的兒

主越栗失爾茂印失屈篤半 葛私篤儂一 丁幾錢 舍電

阿芙蓉液錢

藥 西 方 藥 卷 九 廣 胖 堂

右調勻每半時二十滴乃至三十滴冷水或粘汁和服

主治瘧瘵性子宮出血ニ宜シ

○第九百六十一方佛陽

桂丁幾錢三 收斂亞的兒錢一 阿芙蓉液錢一

右調勻每四分時取二十滴冷水或粘滑煎汁少許和服

○第九百六十二方傑過栗屈的兒

硫酸密幾私去爾 舍電阿芙蓉液錢一 桂丁幾錢二

右調勻每半時取二十滴甘味燕麥粘汁和服臨服宜振盪

○第九百六十三方護松篤

收斂亞的兒錢二 舍電阿芙蓉液錢半 桂丁幾錢一

右調勻每四分時取二十五滴三十滴乃至五十滴燕麥粘汁和服

○第九百六十四方秘瀉爾達那

精製磷酸錢一 桂丁幾錢二

右調勻每半時取三十滴沙糖水服

主治第九百六十一方ヨリ九百六十四方至虛性子宮出血ニ宜シ

○第九百六十五方祿溫顯爾毒土

麥奴六人至十人 白糖半

右調勻為散分六裏每十密扭篤服一裏

主治子宮出血ニ宜シ ○咩私濕兒名人ノ歴驗ニ據レハ麥

奴ハ孕胎ノ子宮ニ在ルニアラザレバ効アラヌ故ニ妊

娠中若クハ分娩ニ臨テ失血スル症ニアラザレバ全ク

功用ナシト云フ

○第九百六十六方布列私骨篤名地泥名煙名爾

麥奴錢一 井水適宜煮濾取四弓

右分三服每十二密扭篤一服

主治分娩後ノ子宮出血ニ宜シ

○第九百六十七方春名煙名隣

紺名百名設名木半 井水三北煮耗至二北加橙皮半弓濾過

加後藥

精製燐酸錢二 桂舍利別名 又名龍名血名煎名固名一名

右調勻每服一小錢日三四次臨服宜振盪

主治子宮出血弛緩ニ因ル症ニ宜シ

○第九百六十八方彫名和

刺達尼錢六 井水二十四弓煮濾取八弓加後藥

刺達尼越幾斯錢三至

右調和每一時服二食匙一服二食匙

主治虛性子宮出血白帶下ニ宜シ

○第九百六十九方設名椅名越名謁名爾 煎四分和蘇名爾名六名時名射名藥

○刺達尼搗碎常水適宜煮四分時濾取六分加後藥

桂丁幾錢二刺達尼丁幾錢一砂糖舍利別錢一

右調勻每一時乃至一時半服一二食匙強

主治 虛性子宮出血 宜シ

○第九百七十一方 春經隣 十四日煎取八分加後藥

刺達尼越幾斯錢六桂水五勺溶化加後藥

硫酸密幾斯錢一橙皮舍利別錢一

右調勻每半時服一食匙

主治 子宮出血過多ノ症 宜シ 又尿道出血頑固ノ症

妙トス

○第九百七十一方 別連杜

篤爾綿點刺 井水十勺煮濾取六勺加後藥

桂丁幾錢二橙皮舍利別錢一

右調和每一時服一食匙

主治 子宮出血弛緩ニ因ル者 宜シ

○第九百七十二方 弗除爾姪蒲蘭突土

赤石脂 大黃 麻偃涅失亞各一錢

右調和為散等分十二服日三服

主治 同上

○第九百七十三方 骨布

薩毘那葉 半錢 桂皮 二錢

右熱湯適宜浸漬濾取六勺每半時服一食匙

主治子宮出血及ヒ子宮脫ニ宜シ○咩私涅爾ハ薩毘

那ヲ用ヒテ出血増加スルヲ壓驗セルガ故ニ廢メ用ヒ

ズト云フ十二方

○第九百七十四方同上

薩毘那葉 赭色幾那 各三錢 熱湯適宜浸漬濾取六勺

冷定加後藥

桂舍利 六錢

○右調和每一時服一食匙

主治子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ症ニ應メ收歛亞的

兒半錢若夕ハ一錢ヲ加

○第九百七十五方

薩毘那葉 末三錢 薩毘那越幾斯 錢二 薩毘那油 一

右調和三人為一九衣石松粉每服四五丸乃至十九日三

○款

主治子宮出血定期アリテ太多ク而ノ平常モ亦稀淡ニ

行惡色惡臭ノ血ヲ漏下シ面色慘憺ノ者之ニ宜シ

○第九百七十六方

精製阿芙蓉 四錢 桂皮 一錢 生明礬 一錢

右調和為散等分四裹每半時服一裹

○主治子宮出血弛緩ニ因ル者ニ宜シ○明礬ハ其人筋織

維強實ニ多血ノ者ニハ適當セズ唯虛弱弛緩ノ症

ニ長ク口腹臍閉スル所アル者モ亦之ヲ禁スベシ

○第九百七十七方拂連幾

生明礬一錢桂丁幾地亞格實溫各一薄荷水三

右調和每半時或一時服一食匙乃至二食匙

○第九百七十八方阿西安姪爾

水楊皮越幾斯一錢明礬半錢至一錢桂水五覆盆子

舍利別一...

右調勻每四分時服二食匙

○第九百七十九方福爾

明礬末礪鐵華一芳香散一幾那越幾斯各半桂油

右調和二丸為一九衣桂末朝夕服五丸乃至十九

○主治第九百七十七方ヨリ九百七十九方至虛性子宮出

血ニ宜シ

○第九百八十方蘇歐蘭度

桂皮半撒兒末爾秩斯白糖一

右調和為散分四服每一時一服或隨症數服

遠西方藥 卷九

主治子宮出血危險ニ臨ム者之ヲ遏止スルニ宜シ○或ハ其症ノ要スル所ニ從ヒ撒兒末爾秩斯ノ量漸次ニ倍加シテ可ナリ

○第九百八十一方護秘篤

桂油半錢 亞的兒半錢 右調勻每八分時服二十五滴乃至三十滴

主治臨産ノ虚性子宮出血ニ宜シ之ニ兼テ小腹ニ龍腦

精礪砂揮發膏等ヲ塗擦スベシ

○第九百八十二方弗陽

薔草越幾斯一錢 桂水三勺 溶化加後藥

桂丁幾一錢

舍電阿芙蓉液一

橙皮舍利別三錢

右調和每一時服一食匙

主治虚性子宮出血小腹ニ經久ノ血積ヲ兼子又歇倚秘的利性ノ感覺過敏衰弱及ヒ痙攣証ヲ挾ム者之ニ宜シ

○第九百八十三方護秘篤

失鳩荅越幾斯 蜀羊泉越幾斯各一錢 老利兒結爾斯

水一 吐酒石二

右調勻每服二十滴乃至三十滴日三次末煎煎數分

主治子宮出血腹臑ノ胃寒ニ因ル者之ニ宜シ

○第九百八十四方刺曹秘

子宮出血

硫酸規尼捏十八至十五人 乾燐酸二刀 過兒托末或大黃

末四 珊篤里越幾斯二

右調和為六十九衣伊里斯弗魯連底那末玻璃壘收貯每服三四丸乃至六丸日二三

主治半產後ノ神經衰弱症出血セントスル者ニ宜シ

○第九百八十五方俄歇蘭度

王幾那末一 橙皮末二 井水十二ヲ煮耗至八ヲ濾

過如後藥 出血小瓶ニ盛テ、血餘ヲ棄テ又加劑味

收斂重の兒錢半 桂丁幾錢二 橙皮舍利別一

右調勻每一時半服二食匙

○第九百八十六方同上

收斂重の兒錢二 越乙土幾那丁幾一 橙皮丁幾一

右每服八十滴水一小蓋和服日三次

主治右二方月經過多症子宮ノ衰弱及ヒ弛緩ニ起因セ

ル者或ハ同因ノ子宮出血ヲ根治スルノ功用アリ

○第九百八十七方子宮出血對症藥

蒲刺實爾收斂皮一 井水適宜煮濾過取八

右每一時服一食匙

主治麻痺性子宮出血後ニ用ヒテ再發ヲ預防ス

遠西方藥 卷九

○第九百八十八方穢歌蘭度

幾那越幾斯刺達尼越幾斯 水揚皮越幾斯 阿仙

藥各三錢 撒兒末爾扶斯

右調和二火為一九夜桂末每服十九乃至十五九日三次

主治月經太過或ハ子宮出血後虛憊甚シキ者之ニ宜シ

○第九百八十九方骨布

幾那越幾斯錢二 阿芙蓉越幾斯十錢 薩毘那油半錢

菲阿斯軟膏一 小蓋時 羅日三 火

右丁寧調勻朝夕取二小哥哥匙塗擦小腹

主治子宮出血並ニ子宮ノ衰弱弛緩ニ宜シ

○第九百九十方同上

香竄硬膏一 薩毘那油一 薩毘那末二錢

右調和外敷

主治子宮弛緩及ヒ其レニ起因セル出血症ハ小腹ニ之

ヲ貼ス

○第九百九十一方

麥奴細劉一弓至一弓半 熱湯三北乃至四北浸少頃煮沸濾過

右冷定射注

主治子宮出血並ニ衄血過多ニ用フ

月經不調メンストリアチオ。アノマラ 羅オン 月ゲル 月デ 月スト 月ン 月マ 月フル 月ド 月蘭

此症四種ニ分ツ一ハ婦女已ニ嫁時ニ及テ月經不來二ハ月經痛三ハ月經方ニ來テ卒然閉止ス四ハ月經太過是ナリ

第一嫁時ニ及テ月經不來ノ症其原或ハ多血畜積ニ係リ或ハ痙攣ニ因リ或ハ弛緩ニ感動遲鈍ナルニ因リ或ハ陰門閉鎖等ニ在リ○其多血畜積ニ因ル者ハ足ノ絡ヲ刺テ放血シ陰部ニ放蟻シ内股ニ吸角法若クハ蒸餅母ヲ貼シ刺戟藥脚踏ヲ行ヒ沸騰散ニ方。三方。八百。八方。孕礪酒石七十八方。七百三十方。茜根九百九十三方。九百九十四方。等ヲ用フベシ○痙攣ニ因ル者ハ續草阿魏九百九十五方。葛私篤儂護吐根百五十五方。八百六十六方。礪砂九百九十七方。等ヲ用ヒ兼テ陰部ニ放蟻シ全身温浴脚湯及ヒ

其他ノ誘退法ヲ施スベシ○弛緩ニ因ル者ハ鐵劑九百九十八方。

至方麥奴千二方。礪砂九百九十七方。雜腹蘭九百九十六方。沒

藥千一方。十五方。尾爾拔奴千一方。歐羅巴千一方。產葡萄草附千一方。

九蘆薈九百九十七方。薩昆那千一方。等ニ宜シ蓋此諸藥ハ

其成方ニ就テ見ルベキガ如ク種々配合スベシ此他黃肝條下ニ載

參照スル所ノ方ヲ第二月經痛モ亦鎮痙劑九百九十六方。千油

性乳劑ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ五百四十方。或ハ菲阿私越幾斯ヲ

加ヘ五百四十方。陰部及ヒ子宮ノ部位ニ温暖ノ鎮痙法ヲ施

シ。微温半身浴等ヲ行スベシ第三經時ニ方テ經血遽ニ遏

止スル者ハ激衝証ヲ啓發スルニ往々之アリ此症其機變

從フテ適當ノ治法ヲ下スベシ設令嫩衝ヲ發セザルモ

亦足ノ絡ヲ刺テ放血シ或ハ陰部ニ放蟻ハ若クハ内股ニ

吸角法ヲ施シ以テ局處ヨリ放血スルヲ要ス又之ヲ兼テ

蒸餅母ヲ貼シ小腹及ヒ陰部ニ罨法ヲ施シ刺戟衝動ノ脚

浴等ヲ施スベシ内服ハ礪砂或ハ沸騰散ヲ與ヘ而シ唯感

觸甚遲鈍ノ症ノ上ニ列載セル破血藥ヲ與フベシ第四

月經太過症ハ子宮出血ヲ治ニ同シ

○第九百九十二方別連杜

加密列各一接骨木花各一

右浸出供坐浴

主治陰部及ヒ利尿諸器ノ痙攣痛並ニ痔血經血ノ閉止
ニ宜シ

○第九百九十三方

茜根細劉半ヲ至一ヲ

右井水二十六弓煮耗至八弓濾過每一時服ニ食匙

主治經閉及ヒ月經痛等ニ宜シ未熟ノ醫輩茜根ヲ以テ

古藥ト稱シ全ク功用ナシト云フ者多シト雖訶墨人敬

取同弗陽同福僱列爾同阿西安姪爾同遏傑栗屈的兒

同等ノ先哲經閉症ニ茜根ノ効アルヲ主張シ殊ニ其症

小腹ノ壅塞ニ因ル者ニ稱用セリ

○第九百九十四方〔福保列甫〕

孕礬酒石半錢 茜根末 白糖各二錢

右調和為散每服一〇分

〔主治〕經閉症熱ヲ帶フル者之ニ宜シ ○猘歌蘭度名ハ 茜

根末每服半錢日ニ三服セシムト云フ

○第九百九十五方

阿魏 纈草越幾斯 勿擗チ祭チ亞チ石鹼 凝固牛膽 大

黃末各一錢

右調勻二匁為一九衣石松粉朝夕服五丸

〔主治〕瘰癧性經閉症大便秘結スル者ニ宜シ

○第九百九十六方〔連別倫歌〕

雜腹蘭二錢 吐根五匁至十匁 井水適宜浸漬濾過取五匁

溶化孕礬酒石二錢更加後藥

加密列舍利別六錢

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

〔主治〕瘰癧性ノ經閉及ヒ月經痛ニ宜シ

○第九百九十七方〔依設私註爾〕

礬砂二錢 黃橙皮 茴香油糖各一錢半 白糖三錢

右調勻為散每服二食匙日三次

〔主治〕經閉ニ宜シ

○第九百九十八方

穢歌蘭度沸騰散

ルニス。マルチリス。ピユ

麻偃涅失亞

錢

純精酒石

半

鐵酒石

附

二

右調勻為散每服一茶匙棄沸騰飲服日二三次

主治感觸遲鈍ノ婦女經閉及ヒ虛弱ノ症ニ宜シ

○第九百九十九方

穢歌蘭度

附

二

亞兒尼加根

半

錢

井水五弓煮耗至三弓濾過加後藥

加密列越幾斯

半

芸香越幾斯

各

二

鐵酒石

附

半

薄荷水

一

橙皮舍利別

半

右調勻每服二食匙日三四次

主治少女虛弱ニノ皮膚慘憺且微冷シ脈遲ニノ弱ナル

者慾火亢盛ノ年期ニ及テ月經不來ノ症ニ宜シ

○第一千方

驚姪

硝鐵華

細末

二

桂皮

半

白糖

適

宜

煮

右作扁圓錠四十個每服二三個日二次

主治經閉弛緩ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千一方

弁拂

名

紅頰丸

撒兒末爾秩斯

一

沒藥越幾斯

末

瓦爾拔奴謨

各

三

橙皮舍利別

適

右為二百十九衣桂末玻璃壺收貯每一時半服六丸乃至

交日... 月經不調

六九餘

主治 少女皮膚灰白感覺遲鈍ノ者月經閉止セル症ニ宜

シ○又弗陽名ハ人此症ニ橙蒲名九七方ヲ與フ

○第一千二方弗肝爾姪蒲蘭突

麥奴 白糖錢各半

右調勻為散等分三服朝夕一服

主治 經閉症子宮ノ神経系感覺遲鈍ニ因テ來ル者之ニ

宜シ

○第一千三方同上

著草越幾斯錢一 硃砂刃一 加密列水六

右調勻每一時服二食匙臨服宜振盪

○第一千四方穢歌蘭度

硃砂錢半 雜腹蘭八 硫黃華 薄荷油糖各一

右調勻為散分三服早午晚一服

主治 右二方月經閉止ニ宜シ

○第一千五方過傑栗屈的兒

雜腹蘭末 沒藥 硫黃華各一 凝固牛膽適

右為百五十九衣雜腹蘭末玻璃壘收貯每服十二九日一

二次

主治 經閉及ヒ小腹内閉塞症ニ宜シ

藥師方... 卷九

○第一千六方 祇歌蘭度 沒藥 瓦爾拔奴謨 黑列僕里越幾斯 各一錢 蘆薈 半錢

葛私篤樓謨 一錢 右調勻二入為一九夜石松粉每服十九日二三

次 主治感覺遲鈍ノ婦女經閉ノ症ニ宜シ

○第一千七方 祇刺律私 利布西煙斯 名一人 病院常用通經丸

瓦爾拔奴謨 五錢 雜腹蘭越幾斯 一錢 沒藥越幾斯 三錢

黑列僕里越幾斯 四錢 右調勻二入為一九夜石松粉早晚服六丸

主治經閉及ヒ萎黃病ニ宜シ

○第一千八方 機利偃 葡萄酒 新絞者 燒酒 分 葡萄草丁幾

右飽熟二十四時濾過每六時取三十滴温麥酒和服

主治經閉ニ宜シ 經期前十四日ヨリ始メテ用フベシ

○第一千九方 同上 鹽酸鐵丁幾 一十八方

葡萄草丁幾 六錢 右調勻每服三十滴日二次

主治經閉症體質大ニ弛緩スル者ニ宜シ

○第一千十方 祇刺律私 水製蘆薈越幾斯 雜腹蘭越幾

水製沒藥越幾斯

水製蘆薈越幾斯

雜腹蘭越幾

水製沒藥越幾斯

雜腹蘭越幾

水製蘆薈越幾斯

雜腹蘭越幾

水製沒藥越幾斯

雜腹蘭越幾

水製蘆薈越幾斯

雜腹蘭越幾

水製沒藥越幾斯

雜腹蘭越幾

水製蘆薈越幾斯

雜腹蘭越幾

水製沒藥越幾斯

斯各一 碩鐵華二 瓦爾拔奴三 錢四 錢五 錢六 錢七 錢八 錢九 錢十 錢十一 錢十二 錢十三 錢十四 錢十五 錢十六 錢十七 錢十八 錢十九 錢二十 錢二十一 錢二十二 錢二十三 錢二十四 錢二十五 錢二十六 錢二十七 錢二十八 錢二十九 錢三十 錢三十一 錢三十二 錢三十三 錢三十四 錢三十五 錢三十六 錢三十七 錢三十八 錢三十九 錢四十 錢四十一 錢四十二 錢四十三 錢四十四 錢四十五 錢四十六 錢四十七 錢四十八 錢四十九 錢五十 錢五十一 錢五十二 錢五十三 錢五十四 錢五十五 錢五十六 錢五十七 錢五十八 錢五十九 錢六十 錢六十一 錢六十二 錢六十三 錢六十四 錢六十五 錢六十六 錢六十七 錢六十八 錢六十九 錢七十 錢七十一 錢七十二 錢七十三 錢七十四 錢七十五 錢七十六 錢七十七 錢七十八 錢七十九 錢八十 錢八十一 錢八十二 錢八十三 錢八十四 錢八十五 錢八十六 錢八十七 錢八十八 錢八十九 錢九十 錢九十一 錢九十二 錢九十三 錢九十四 錢九十五 錢九十六 錢九十七 錢九十八 錢九十九 錢一百

○右調和二入為一九衣桂末早晚服五丸

主治經閉ヲ治ス最妙トス然レモ此方慎重シテ用フル

右要ス但感觸遲鈍ノ者ニ適當ナリ

○第一千十一方〔附〕

○薩毘那葉半 熱湯適宜浸漬濾過取四ヲ溶化後藥丸

主礪砂二 白糖半 右調勻每服一食匙日三次

主治月經痛子宮ノ虛弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第一千十二方〔同上〕

○薩毘那葉半 纈草一 熱湯適宜浸漬濾過取八ヲ放

冷加桂丁幾三錢

右調和每半時服一食匙

主治經閉子宮ノ衰弱痙攣ニ因リ或ハ子宮ノ血絡弛緩

ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千十三方〔附〕

○加密列 默栗薩 薄荷各二 薩毘那葉一

右細判熱湯二小盞泡出分二服朝夕一服

○第一千十四方〔同上〕

○麻一 純精酒石十六 薩毘那葉末 白糖

○第一千十五方〔同上〕

○麻一 純精酒石十六 薩毘那葉末 白糖

○第一千十六方〔同上〕

○麻一 純精酒石十六 薩毘那葉末 白糖

○第一千十七方〔同上〕

○麻一 純精酒石十六 薩毘那葉末 白糖

○第一千十八方〔同上〕

各一錢 薩毘那葉 鐵粉 水製蘆薈越幾斯 達刺

○右調和為散分三服早午晚一服冷水半小盞送下

○第一千十五方 薩毘那越幾斯 鐵粉 水製蘆薈越幾斯 達刺

薩毘那葉 鐵粉 水製蘆薈越幾斯 達刺

○右加達刺侃篤越幾斯少許為六十九衣石松粉每服四五

九日二三次

○第一千十六方 鐵粉 水製蘆薈越幾斯 達刺

薩毘那葉 鐵粉 水製蘆薈越幾斯 達刺

侃篤越幾斯

右調和一人為一九衣桂末每服三四九日二三次

附考一九中薩毘那一尺鐵半尺蘆薈六分尺ノ一ヲ含畜

○第一千十七方

薩毘那葉 格碌屈斯末兒扶斯 薩毘那油

薩毘那越幾斯 甘草越幾斯

右調和為二百九玻璃壘收貯每日已牌申牌酉牌及臨卧

服用每服七丸

○第一千十八方

薩毘那油 再留的列並油

右調和塗擦內股

主治第一千十三方ヨリ一千十八方至經閉症弛緩ノ甚

シキニ因ル者ニ宜シ

○第一千十九方甲評兒地絳爾

纈草 默栗薩葉 綿苔幾里私布 加密列各一 甘

草半

右細剉每日取一食匙常水三小盞浸出服

○第一千十九方乙同上

甘永 葛私篤儂謨各半 葭苈葉 毘私繆篤各一

纈草三 加密列六 過泥子油糖半

右調勻為散分十二包每一時半服一包分入一合

主治右二方處女月經痛ニ宜シ二方皆經期前四日ヨリ

始メテ之ヲ用ヒ經血來レハ乃チ散方ヲ廢シ唯浸劑ヲ

連進メ月事ノ過ギ去ルニ至ルベシ

○第一千二十方散劑

甘永一 葛私篤儂謨三 雜腹蘭東方產 白糖一

右調和為散分三裹每夜臨卧取一裹加密列泡劑和服

主治月經痛ニ宜シ○之ニ兼テ每晚脚湯ヲ施シ又全體

殊ニ兩足ヲ温覆スルヲ切要トス

主治婦人經水不調或前或後或多或少或赤或白或崩或漏或帶下或胎前產後諸症

一、白帶

一、赤帶

一、崩漏

一、胎前產後

一、經水不調

一、赤白帶下

一、崩漏不止

一、胎前產後

一、經水不調

遠西方彙卷之九

