

遠西女彙

六

○卷之十六

第五 精神病

第三類

慢性病係補給器系症

第一 甲 粘液太過症

鼻孔及氣管粘液太過症

○聖京倔 ○欬嗽

肺臟粘液勞

胃腸粘液鬱積

膀胱聖京倔

✕

e 12

F 6
工-22



富士川文庫

3263



499.2
Em-2
No 1391
18 e/12



伊東瑤川院譯

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏

遠西方彙卷之十六

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑斐婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

精神病 モルビドシキシ 羅

醫者精神病ヲ診シテ其原由一箇有形病ニ係ルヲ會得ス
ル時ハ乃其本病ヲ治スルヲ第一簡要トシ蓋門脈系ニ壅
塞アリテ原因ヲナス者常ニ多シ是解釋微苦ノ越幾斯劑

二中和鹽類ヲ配スル者四十九方至五十三方九百二十九方
 九方千六緩下劑五十四方至七十一方七百植物絞汁九百
 百八十方緩下劑四十方至七百五十三方植物絞汁九百
 方一護謨安沒尼亞幾九百一十一方九百一十二方九百一十四
 老利兒結爾斯水八百八十五方至鑛泉等ヲ用ヒテ鴻益ア
 リ腹臟感觸甚遲鈍ノ症ハ上ノ諸劑ニ吐酒石ヲ加ヘテ連
 綿惡心ヲ起サシメ或ハ峻下劑ヲ與フルニ宜シ全身多血
 及ヒ貴要ノ部多血畜積スル者ハ刺絡及ヒ蟻鍼ヲ施シ總
 テ消燉法ヲ佳トス○若其起因ノ探索スベカラザル症ハ
 其腦中異常ノ運營ヲ他部ニ誘導シ或ハ其症狀ニ從フテ
 之ヲ鎮靜シ感觸敏症或ハ之ヲ挑起スベシ腦ノ運營衰弱者

其之ヲ誘導スルノ法或ハ吐下藥ヲ以テ腸ニ導キ千六百八
 至千六百或ハ全身浴打膿法串線法灸或ハ頭項胃部等ニ
 吐酒石軟膏六百三十五方ヲ塗擦シ若クハ吐酒石硬膏六百三
 貼メ皮表ニ引クニ宜シ甘黍モ亦瀉ヲ得ルニ至レハ誘導
 ノ効アリ殊ニ腦燉衝症ニ轉スルノ恐アル者ニ稱用ニ全
 身微温浴ハ每症須要トス頭ニ多血畜積セル者ハ微温湯
 中ニ浸坐セシメテ頭ニ灌水スルヲ好トス○腦ノ運機尤
 進セルヲ鎮靜スルニ麻酔藥ヲ以テ功ヲ収ムルノ字ナリ
 十雖然氏實芟荅利斯千六百八十八方曼陀羅華千六百九
 六百九菲阿斯老利兒結爾斯水青酸莨菪千六百九十三方

阿芙蓉等ヲ用フルヲ常トシ慾火旺盛セル者ハ殊ニ龍腦
千六百九十五方ヲ稱用ス○腦ヲ挑起スルニハ續草亞兒
 尼加麝香法尼利亞的兒類ノ衝動藥ヲ專用ス然レ亦効ナ
 キ者少シトセズ○此他能ク注意メ以テ飲食消化皮表蒸
 發大便通利ノ障碍無カラシムルヲ醫治ノ須要タリ蓋其
 方法極メテ簡易ナルヲ好トス○精神病ニ多量ノ服藥ヲ
 要スルノ論說ハ不可ナリ却テ之カ為ニ危險ニ陥ル者多
 シ○精神錯亂ヲ醫スルハ轉神治法心思ヲ轉移シ或ハ之ヲ慰愉スルノ法ヲ云フ
 最要トス但此篇枚舉ニ暇アラズ
 ○第一千六百七十九方密優篤設兒

孕驗酒石 蘆根越幾斯 白蜜各半 已上三味蒸餾

水三勺乃至四勺溶解

右每半時服一二食匙

主治神思鬱憂及ヒ精神錯亂症腹内壅塞ニ因ル者之ニ
 宜シ○此方ヲ以テ切ヲ収メント欲スレハ久服ヲ要ス

○第一千六百八十方泰姬隣

孕驗酒石半勺至一勺 蒲公英流動越幾斯一勺至二勺 綿苔

幾里私布水五勺溶解加後味

老利兒結爾斯水半錢 安質沒尼酒錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙臨用宜振盪

主治神思鬱憂症腹内壅塞ニ因ル者之ニ宜シ○或ハ瓦刺秩阿刺越幾斯一錢乃至三錢ヲ加フ然レハ輓近ニ至テ峻下藥ヲ廢シテ用ヒス亦宜ナラズ乎

○第一千六百八十一方 [蓮珍帶腸]

瓦刺秩阿刺越幾斯 二錢至三錢 櫻實水三勺融解加後藥

老利兒結爾斯水 二錢至三錢 精製蜜一

右調和每服一食匙日四次

主治精神病ニ宜シ

○第一千六百八十二方 [連別倫歇愷]

瓦刺秩阿刺越幾斯 一錢 格碌董篤丁幾 二錢 溶化加後

味

老利兒結爾斯水 三錢 安質没尼酒 二錢 橙花舍利別 半

右調勻每服二十滴三十滴乃至四十滴日三次臨服宜振

湯

主治神思鬱憂及ヒ精神錯乱症腹内壅塞或ハ粘液畜積

及ヒ膽液損敗ニ由テ来ル者之ニ宜シ之ニ兼テ格碌董

篤丁幾ヲ塗擦スベシ

○第一千六百八十三方

瓦刺秩阿刺越幾斯 瓦刺秩阿刺末 各一錢 達刺侃篤

蘊謨漿 適

右二氏為一九衣桂末每服四九乃至六九日二次

主治神思鬱憂症腹内壅塞ニ因ル者ニ宜シ

○第一千六百八十四方孤刺律私

瓦刺秩阿刺葉ハ薄荷油刃半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一包

主治精神病ニ宜シ○瓦刺秩阿刺漸夕加ヘテ半刃ニ至

ル

○第一千六百八十五方遠突土

白墨列僕里根ハ十五醇醋適煮八分時濾取五号加

白糖一号

右調和每一時半取一匙冷水半小盞和服飲過水四

○第一千六百八十六方虎兒

黑墨列僕里根錢二井水適宜煮濾過取八号溶化孕齏

酒石一号再加後味

清淨蜜二

右調勻每一時半服一食匙

主治右二方鬱憂症及ヒ精神錯乱等其症未發前腹内ニ

頑帶硬結腫アリテ起因ヲナス者ニ宜シ往昔黑白ノ墨

列僕里ヲ以テ精神病ヲ浴スルヤ其量患者之ヲ服シ連

綿不快ヲ覺エ或ハ吐下ヲ發スルヲ以テ度トセリ

遠西放毒 卷十六 精神病 廣胖堂
遠西方彙 卷十六 精神病 廣胖堂

○第一千六百八十七方 拔結耳名強壯丸名 廣胖堂

黑墨列僕里越幾斯 水製沒藥越幾斯各 葛爾儒各

別葉適宜

右一氏為一九衣石松粉每服三九四九乃至六九

主治精神錯乱水腫經閉二宜シ

○第一千六百八十八方

實芟荅利斯丁幾半

右每服二十滴乃至三十滴日四次

○第一千六百八十九方

實芟荅利斯葉一錢刀至至 熱湯適宜浸漬濾過取四加加

後藥

過爾托舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治右二方十六百八十八方精神病脈管運營尤進シ脈

動心跳疾數ノ症ニ宜シ服量漸ク加増ノ患者不快ヲ覺

工。溘瀉シ脈不整ヲ見ハスニ至ル

○第一千六百九十方 穢歌蘭度

實芟荅利斯葉半 注井水適宜飽熟八分時濾取六号

加後藥

老利兒結爾斯水二 精製曹達三 錢

右調勻每一時服二食匙

主治精神病脈管ノ運機元進セル症ニ宜シ之ニ兼テ小量吐酒石ヲ與ヘ且内外冷水ヲ併用セリ蓋外用ハ灌水法ニ宜シク内服ハ密幾斯失爾トシテ日服十六北ヨリ二十北ニ至ル

○第一千六百九十一方 過幾綸伍

曼陀羅華丁幾_{弓半}

右每服十滴漸加至二十滴若三十滴日二三

主治精神錯亂症脈管系ノ太過運管退クノ後之ヲ用ノ又感觸過敏ノ症ニ宜シ

○第一千六百九十二方 別連杜

曼陀羅華越幾斯_{刀半} 甘草膏_{錢二}

右調勻為六十九衣石松粉每服十九日二次

主治精神錯亂及ヒ癲癩ニ宜シ日三次

○第一千六百九十三方 濼格魯杜

菲阿私越幾斯_{刀一} 莨菪越幾斯_{刀半} 老利兒結爾斯水

一弓溶解

右調勻每一時服二十滴

主治精神病感觸過敏ヲ鎮靖ス_{刀一}ニ宜シ○菲阿斯ハ阿芙蓉ニ優レル症多シ病人全身多血及ヒ頭ニ多血畜積

シ若クハ便秘シ易キ者ノ如キハ阿芙蓉適當ナラズ然
氏甚過敏ノ症ハ僅ニ一二ルヲ用ヒテ姑息鎮降セシメ
睡眠ヲ促ノ鴻益アルヲ屢之アリ

○第一千六百九十四方（調戒歇蘭度）

莨菪越幾斯刀半 瓦利秩阿刺ラニ 老利兒結爾斯水ニ

ヲ溶解

右調勻每服三十滴乃至六十滴日三次

主治精神錯乱及ヒ鬱憂症ニ宜シ○（調戒歇蘭度ハ老利兒
結爾斯加莨菪水千四百八ノ殊効ヲ經驗セリ）

○第一千六百九十五方（遷設耳）

龍腦錢半 白糖錢 亞刺昆亞蘊錢 蘊錢

已上三味研和加後藥六

酢半 接骨木花水六 麗春花舍利別一

右調勻每一時服一食匙

○第一千六百九十六方

龍腦錢 亞刺昆亞蘊錢 白糖錢

已上三味入石臼徐々搗爛加後味

酢六

右溶解每服一二食匙日二次乃至四次

主治右二方精神病陰部ノ感觸敏捷ヲ兼又ル者殊ニ此

方宜之... 精神病

○第一千六百九十七方警魯歇屈篤

甘朮八二 薩昆那越幾斯四 罌粟舍利別宜通

右適宜分為塊每服一塊

主治精神錯乱症經閉ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千六百九十八方同上

格綸僕末錢一 大黃末刀二 加密列越幾斯錢二 葛縷子

油五滴 雜腹蘭舍利別宜適

右適宜作丸每服四九日二次

主治精神錯乱症經閉ヲ兼又ル者又歇倚私的利及ヒ依

朴昆垚兒ニ俱ニ供用スベシ

○第一千六百九十九方新滿

醋酸亞鉛錢一 蒸餾水六勺溶解

右每半時服一食匙

主治神經熱ノ譫語及ヒ顔面羅斯又精神錯乱ニ宜シ○

醋酸亞鉛五錢乃至六錢餘ヲ與ル者往々之アリ

第三類

慢性病係補給器系症

第一 係諸液分泌器症

甲粘液太過症

鼻孔及氣管粘液太過症 ブレノルロナトリウム。エト。クラ

○聖京偶 ○效嗽

單純聖京偶ハ醫藥ヲ須クズ大抵接骨木花或ハ菩提樹花
浸一二盞ヲ服ノ以テ其蒸發氣ノ閉塞ヲ復スレバ其症暫
時ニ一掃スルニ足レリ若其効力更ニ強キヲ要スレハ民
埜列利精千七百方若クハ鹿魂精千七百方ヲ用フベシ其症熱ヲ
帶フル者ハ聖京偶熱ノ治ニ從事スベシ四十方乃至四十
嗽ヲ治スルハ先皮表ノ變調ヲ整復スルヲ要シ後
和胸泡劑千七百五方至燕麥粘汁諸種ノ和胸舍利別等ヲ
用テ之ヲ寬解スベシ更ニ劇症ニ至テハ礪砂千七百九

方安質沒尼劑及ヒ硫黃劑ハ必要トシテ效嗽頻々ニ粘液

分泌夥多ナルモ痰質甚粘膠ニシテ之ヲ豁利スルニ勞苦

スル者ハ金硫黃千七百二十方至結兒茂斯密涅刺列千七百

三方至千七百少量吐酒石千七百及ヒ薤謨華兒斯殊ニ薤謨

安沒尼亞幾千三百五十三方千三百五十八方千三百六

百四十ヲ稱用シ其他慢性聖京偶ニ用フル所ノ藥劑ハ各

方下ニ主治ヲ詳ニス

○第一千七百方

○民埜列利精一 接骨木花浸四 接骨木子舍利別半

右調勻每一時服一食匙

廣 半 堂

西遊方書 卷之六 聖京偈 救嗽 廣 胖 堂

主治單純嗽及七聖京偈二宜之

○第一千七百一方 蘇骨木子舍膠膠半

鹿琥精錢 安質沒尼酒半

右調勻每一時二十滴接骨木花或八菩提樹花泡劑點服

主治聖京偈無熱症及七嗽二宜之

○第一千七百二方私四卷

革澄茄錢 拔爾撒謨篤露六 拔爾撒謨字露舍利別

甘草膏各一 亞刺昆亞籬謨宜適

右十氏為一球衣桂末每服一球日二三次

主治經久鼻孔ヨリ粘液流出スル症及七感冒二宜之

穢歇蘭度氏ノ噴嚏散モ亦用フベシ ○羅遠私的印名ハ

吐酒石四百五方一溶液ヲ鼻中ニ射注ノ良効ヲ得タリ

○第一千七百三方暹傑栗屈的兒

甘汞半 菲阿私越幾斯一 蘆謨散附 白糖各十

右調勻為散分四最每一時半服一最

主治聖京偈六初起之ヲ制伏スルニ宜シ ○栗屈的兒氏

分用和兼阿斯ノ量ヲ一倍シ用フ

○第一千七百四方同上

鹿琥精錢 阿芙蓉丁幾滴 阿芙蓉舍利別附

右調勻每一時服一茶匙

遠西... 聖... 廣... 堂

玉治同前

○第十七百五方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

和胸劑料 牙 麻爾羅歇葉 牙

右調和為和胸泡劑料 一劑 用 牙

○第十七百六方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

過泥子 錢 甘草 錢 一 過爾托 牙 三 費

右調和為和胸泡劑料 一劑 用 牙

○第十七百七方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

亞麻仁末 三 錢 至 甘草粗末 一 錢 至

右調和水二彬篤少項煮沸瀝過取液一日服盡

○第十七百八方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

點失刺蓮 半 一 弓 過爾托 牙 半 茴香 過泥子 錢 各 半

右調和為和胸泡劑料

主治 千七百五方ヨリ千七百八方至聖京屈症ニ宜シ

○第十七百九方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

礮砂 消石 各 半 錢 至 二 刀 沙糖 舍利 別 牙 半 櫻實水 牙 四

右調勻每一時服一食匙

○第十七百十方 藏歌蘭度 阿美... 味... 一

礮砂 錢 二 甘草膏 牙 半 茴香 井水 各 牙 四 過爾托 舍利

別 牙 安質沒尼酒 滴 牙 十

右調勻每半時服一食匙

主治右二方千七百九方急性及慢性ノ聖京倭ニ用

○第一千七百十一方刺胃私

點失刺蘆末 冰糖各半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治聖京倭胸内ニ係ル症粘液膜ノ感觸過敏ヲ兼子粘

痰豁利シ難キ者之ニ宜シ

○第一千七百十二方篤煙

甘扁桃油一 亞刺昆亞蘆謨末適 黑櫻實水半 橙

花舍利別一

右調勻為舐劑每二時服一茶匙

主治刺衝軟ニ用ヒテ咯痰易カラシム

○第一千七百十三方職歌蘭度

蘆根越幾斯半 麻爾羅歇越幾斯 酒石葉各二 安

質没尼酒 老利兒給爾斯水各一 苗香水各六

右調勻每一時半服一食匙

主治慢性乾嗽ニ宜シ

○第一千七百十四方 福倭列爾名和胸散

葛爾儒別葉半 半夏錢二 遏泥子 苗香各一 硫黃

華半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治胸内聖京僑ニ用ヒテ咯痰易カラシムルニ宜シ

○第一千七百十五方 賦歇蘭度聖京僑越栗失爾

葛爾儒別越幾斯錢一 蜀羊泉越幾斯刀一 茴香水子一

老利兒結爾斯水錢一

右調勻每服六十滴日四次

主治乾嗽ニ用ヒテ非凡ノ効アリ

○第一千七百十六方

金硫黃 菲阿私越幾斯各二錢 白糖錢一

右調勻為散分六晝每服一晝日四次

○第一千七百十七方

金硫黃 菲阿私越幾斯各四錢 亞刺毘亞護謨末錢二

甘草末錢三 白糖錢六

右調勻每服一茶匙和胸泡劑送下日四次

○第一千七百十八方

金硫黃 菲阿私越幾斯各三錢 亞刺毘亞護謨末錢三

過爾托舍利別各一 井水各一

右調勻每一時服一茶匙臨服宜振盪

○第一千七百十六方ヨリ十七百十八方至秋嗽ニ用ヒテ

祛痰ヲ促スニ宜シ○感觸遲鈍粘液質ノ人最能ク金硫

黄ヲ服スルニ堪フ

○第一千七百十九方

金硫黄原本分量 土木香 越幾斯宜適

右為三十九衣石松粉每服一二九日三次

主治胸内聖京屈ニ用ヒテ祛痰ヲ促スニ宜シ

○第一千七百二十方弗陽

精製消石刀半 金硫黄一 龍腦半 精製阿芙蓉四分之

右調勻為散分八畧每服一畧日三四次和胸飲送下

主治乾欬頑固ニノ患者大ニ苦悶シ胸中緊張収縮或ハ

壓迫ヲ覺ユル者ニ陽氏此ヲ稱用セリ

○第一千七百二十一方別連杜

金硫黄錢半 精製蘘護安沒尼亞幾一錢 遠志末二錢

海葱末十五 蒲公英流動越幾斯宜適

右為百五十九衣伊里斯弗碌連底那末玻璃壘収貯每服

五六粒日三次

主治經久胸内聖京屈ニ用ヒテ祛痰ノ効アリ

○第一千七百二十二方連別倫歇慳

金硫黄六 加達刺促篤蘘護適宜徐々研合加後味

苗香水五 菲阿私越幾斯六 精製甘草膏一錢 遠

志舍利別

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治慢性胸中聖京屈ニ用フ又氣管喉衝症ニ用ヒテ局
處ノ分利ヲ進ムルニ宜シ

○第一千七百二十三方

結爾茂私密涅刺列四二氏至

菲阿私越幾斯三氏至

白糖錢一

右調勻為散分六晝每服一晝日四次

主治肺臟聖京屈ニ用ヒテ痰ヲ利スルニ宜シ○結爾茂
私密涅刺列ハ金硫黃ト同効ニシテ彼ニ比スレハ強力ナ

○故ニ其服量ヲ減セザルベカラズ結爾茂私ハ消食機
ヲ衰弱セシメ或ハ吐瀉ヲ起シ易ク粘液質家ニ用ヒテ
最適當ス

○第一千七百二十四方弗山隣

結爾茂私密涅刺列一氏 甘草越幾斯三氏 白糖刀一

右調勻為散分六服早晚一服冷水送下

主治同上

○第一千七百二十五方紫涅室 祛痰麻兒茂刺姪

結爾茂私密涅刺列四氏 上好滿那錢六 甘扁桃油 海

葱舍利別 遠志舍利別各二錢

右調勻每一時服一茶匙

○第一千七百二十六方速別倫歇慳

結爾茂私密涅刺列蜀羊泉越幾斯宜適

右為四十九衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘以貯每半

時服一九

○第一千七百二十七方秘拔爾記

結爾茂私密涅刺列刺發私越幾斯宜適

右為四十九衣石松粉每半時服一九

主治已上二方慢性感胃二宜

○第一千七百二十八方颯結魯

吐酒石半 水適宜融解加後味

白蒸餅心 白糖各適宜

右為百三十九衣石松粉早晚服一九

主治慢性聖京屈二宜

○第一千七百二十九方職歇蘭度

蜀羊泉莖 井水十勺煮耗至七勺加後藥

孕鹼酒石錢 安質沒尼酒滴六十 甘草舍利列一

右調勻每服二食匙日四次

主治乾嗽經久ノ症此方之ヲ主トル兼テ弗刺涅兒ヲ以

テ胸上ヲ覆ヒ又上膊若クハ胸部ニ發疱膏ヲ貼シ二三

遠西方藥 卷六 聖京屈 嗽 廣 膠 室

週間之ヲ打膿セシムベシ

○第一千七百三十方同上

蜀羊泉越幾斯錢一 硫黃華錢半

右調勻一尺為一九衣石松粉每服四五丸乃至八九日四次

○第一千七百三十一方 戒歇蘭度發汗散

精製硫黃錢二 金硫黃 龍腦各八分 白糖錢二

右調勻為散每服一刀尖日二次乃至四次

主治聖京屈。儂麻質斯及ヒ依屈篤症ニ宜シ

○第一千七百三十二方 戒歇蘭度

硫黃華 純精酒石各半 甘草錢二 過泥子錢一 油糖錢一

梅那葉二 金硫黃六分

右調勻每服一茶匙日三次

主治慢性咳嗽ニ宜シ 兼テ燕麥粘汁。接骨木花泡劑。和胸

飲等ヲ多服セシムベシ

○第一千七百三十三方 骨布

精製硫黃錢五 甘草膏 乳糖 甘草各三錢 伊里

斯弗魯連底那錢一

右調勻為散每一時服一茶匙

主治頑滯聖京屈。喘息ニ宜シ 又救血痔疾ニ因スル者及

遠西方藥 卷其 聖京屈 救救 廣 肺 堂

七肺癆初起ニ用フベシ但煥衝性及ビ多血症ハ決メ硫黃劑ヲ投スルヲ勿レ

○第一千七百三十四方同上

精製硫黃^{三錢} 甘草膏^四 白糖^二

右調和分爲錠七十個每一時服二個乃至四個

主治同上

○第一千七百三十五方

越埵兒^{名人祛痰散} 安息香酸^一 甘草末 伊里斯弗魯底那^{各二錢} 精製硫黃^半 白糖^二 過泥子油 茴香油^{各十滴}

右調和爲散私葛點刺^{名器}収貯每服一茶匙日三次

○第一千七百三十六方設留室

硫黃華^{各一錢} 茴香^一 伊里斯弗魯底那 梅那葉^{各一}

半錢 甘草^三

右調勻爲散每一時半乃至二時服一刀尖

主治聖京屈ニ宜シ○或ハ病性ニ從テ尚他味ヲ任用ス

ヘシ例スルニ吐根末二三^分 菲阿私越幾斯六^分 精製阿

芙蓉二^分 或ハ結爾茂^私 密涅刺列四^分 或ハ精製礪砂半

錢乃至一錢或ハ精製消石一二錢ヲ配スルカ如キ是ナ

リ

○第一千七百三十七方 複方甘草散

甘草末 旃那葉末各二錢 茴香末 精製硫黃各一錢
 白糖六錢

右調勻為散朝夕服一茶匙

主治 聖京傷 宜止又之ヲ瀉藥トスベシ

○第一千七百三十八方

斯百兒麻攝篤錢三 白糖一錢

右調勻為散每服一茶匙日三次

○第一千七百三十九方戰歇辭度

斯百兒麻攝篤錢六 亞刺昆亞蘊護錢三 白糖一錢

已上三味徐徐研和加蒸餾水四勺

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

○第一千七百四十方

斯百麻攝篤錢二 消石一錢 伊里斯弗魯連底那根末

白糖各半

右調勻為散每服一茶匙日三四次

主治 右三方至一千七百四十八方 聖京傷症 咳嗽等宜止

○第一千七百四十一方刺曹私

土沐香錢二 井水八勺煮瀝過取六勺加後味

精製礪砂錢一 吐酒石一錢 阿芙蓉舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙

主治經久聖京偃歎及七肺管粘液蓄積セル者ニ宜シ

○第一千七百四十二方同上

瓦列阿布失穗點失刺種附 過兒托各一 甘草二錢

右細剉調和四分取其一水一北半煮一日服盡

主治慢性胸中聖京偃將ニ粘液勞ニ陥ラントスル者肺

臟結核ノ二三軟化ノ膿ヲ吐出スル者此方ニ宜シ

○第一千七百四十三方越層溼魯

瓦列阿布失葉一

右井水一北煮四分時瀝取液十二時間服盡

主治慢性肺管聖京偃ニ宜シ○世上通知スル所ノ栗栗幣

魯人名和胸劑一名佛蘭見歇人情名ノ泡劑ト稱スル方モ亦

瓦列阿布失葉ヲ以テ製スルナリ

○第一千七百四十四方蓮珍

蘘蘘謨安沒尼亞錢 鷄子黃適 肥束布水四 海

葱蜜一

右調和每一時服一食匙臨服宜振盪

主治肺臟粘液鬱積及ヒ麻痺ノ初起ニ宜シ

○第一千七百四十五方秘拔爾託

蘘蘘謨安沒尼亞錢 舍利別 過兒托各半 安質

沒尼酒四

右調勻每半時服一茶匙

主治慢性聖京屈ニ用ヒテ粘痰ノ膠着セルヲ治スルニ宜シ

○第一千七百四十六方福佃篤

護謨安沒尼亞幾錢一 加甘草舍利別一弓半捏和為泥

加後藥

角苗香末錢三 精製礪砂錢二

右調勻為舐劑每服一小茶匙日四次乃至六次

主治肺管ノ粘液膜弛緩及ヒ之ニ因テ發スル所ノ慢性粘液軟ニ宜シ

○第一千七百四十七方弗陽

苗香水錢二 越堙兒名和人 丁香錢二 鹿瑰精錢一 實亞

格地温錢二

右調勻每一時服一茶匙

主治聖京屈症肺臟ノ感觸過敏緊脹牽急或ハ頑固ノ乾軟ヲ兼ル者ニ宜シ

○第一千七百四十八方列布見

葛兒儒別越幾斯錢一 菲阿私越幾斯錢八 苗

香水 甘草舍利別各一 礪砂加過泥子精錢一 苗香水

右調勻每一時服一二食匙

遠西方藥 卷十六 聖京編 廣時堂

○第一千七百四十九方 別連杜

白麻爾羅歇越幾斯錢二 蜀羊泉越幾斯半錢 苗香水

五 礪砂加過泥子精錢二 過兒托舍利別半 曲

右調勻每一時服一食匙

主治右二方慢性胸中聖京屈二宜シ

○第一千七百五十方 弗栗結

礪鉄華四 菖蒲根末 白糖各六

右調勻為散分十二裹每服一裹日三四次

主治呼吸器及七腸管上部粘液膜ノ慢性疾患ニ宜シ

○第一千七百五十一方 穢歇齋度

依蘭苔 蜀羊泉各半 井水十四勺煮耗至八勺濾

過加後藥

礪砂加過泥子精六十 甘草舍利別一

右調勻每服二食匙日四次

主治頑固欬嗽ニ宜シ兼テ攝爾都兒水ヲ用ヒ及ヒ瑞香

皮ヲ以テ片膊ニ貼ス劇症ニ至テハ兩膊ニ貼スベシ

○第一千七百五十二方 歇兒仙

依蘭苔煎八 舍電阿芙蓉液十 屋施茂爾二

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十三方 同上

遠西方彙 卷六 聖京僞 款款 三三 廣 脾 堂

實芟荅利斯 一氏至 上好沒藥 過泥子油糖 各五

葛 私加栗刺皮 刃半

右調勻為散分八服每一時半一服

○第一千七百五十四方 同上

阿仙藥 半 常水 三四 阿芙蓉加安息香酸 丁幾 半一錢

屋施蔑爾 錢六

右調勻每一時服一食匙

○第一千七百五十五方 同上

格綸僕末 礪砂華 各十 實芟荅利斯 半一氏 乳糖 五

右調勻為散分六服每一時半一服十四日蒸結至八日

主治一千七百五十二方ヨリ一千七百五十五方至弛緩性聖

京僞咯痰甚過多ナル者ニ宜シ

○第一千七百五十六方 弗栗結

甘扁桃油 沒藥 丁幾 各半 遠志舍利別 橙花舍利

別 各一 雜腹蘭 丁幾 錢一

右調勻每半時服二茶匙

主治聖京僞咯痰十分ナラリル者ニ宜シ

○第一千七百五十七方 秘泥煙爾

撒爾非亞油 滴八 肥束布油 著草油 各四 亞兒魯末

白糖 錢各一

右調勻為散每一時服一茶匙

主治慢性粘液效二宜

○第一千七百五十八方 飛歌藥度

地榆丁幾

右每服二十滴乃至四十滴沙糖和服日三四次

主治所謂煩欬二奇効アリ

○第一千七百五十九方 刺野秘

白地榆根

京加後味

過兒托舍利別

井水適宜浸漬飽熟四分時濾過取四

右調勻每一時服半食匙

主治慢性嘶嘎及七肺管粘液分泌過多ノ症二宜

○第一千七百六十方 炭兒

白地榆丁幾

海葱蜜

過兒托舍利別

○第一千七百六十一方 福傑爾

安質沒尼酒

托舍利別

右調勻每三分一時服一茶匙

甘草膏丁幾 蘭苗香水

遠西藥房
粘液勞
廣
肺
堂

主治 幼兒聖京屈ニ宜

○第一千七百六十二方 骨布

精製硫黃八氏至十六氏 乳糖一 伊里斯弗魯連底那根末

○第一氏至三氏

右調勻為散分八畧每一時取一畧乳汁和服

主治 幼兒ノ胸病ニ宜シ ○或ハ吐根半氏乃至一氏半ヲ

伍シ瘵擊症ハ麝香一二氏ヲ加フ

粘液勞 ビブレノルロヒルモニムフロチシス。ピルモナリス。ピトイトサ羅スレイムフルド。デル。ロンゲシ。ロス。

慢性聖京屈ニ相當ノ藥劑大抵肺ノ粘液勞ニ用フヘシ此ニ

先揭示スベキ品ハ依蘭苔 三百六十九方至三百七十五方。

方。千七百七十一方幾那 六百七十一方。六百七十二方。 及ヒ沒藥 千

至千七百七十六方。千七百七十七方。千七百七十八方。是ナリ此保固強

壯藥ト相並テ肺臟弛緩ヲ防クノ効アル者ハ苛烈ノ植物

及ヒ安質沒尼劑夕リ即遠志 千七百六十六方。千七百六十七方。 過麻刺 千

百七十五方。千七百七十六方。海葱。蜀羊泉 千七百七十二方。千七百七十三方。

七十五方。吐酒石 千七百二十方。千七百二十一方。 結爾茂斯密涅刺列 千

百七十六方。至千七百七十七方。津唾甚粘稠ノ症ハ慢性聖京屈ヲ

療スルガ如ク護謨安沒尼亞幾 千三百五十三方。千三百五十四方。

阿魏。礪砂加過泥子精。鹿琬精 千

四百六十三方。千七百四十四方。阿魏。礪砂加過泥子精。鹿琬精 千

百四十七方至千亞的兒油類千七百五地榆方至千七百五十八
 七百四十九方
 方天造拔爾撒謨千七百六十九方等ヲ用フベシ歇爾蘭獨
 留謨菲阿斯及ヒ阿芙蓉等ノ鎮痙藥モ亦須要ノ症多シ肺
 中粘液充積ノ室息ノ恐アル者ハ吐根ノ吐方最即効アリ

○第一千七百六十三方〔讀私薦〕

礪砂 遠志 甘草各二錢 金硫黃半錢 茴香油糖半錢

右調勻為散每一時半一茶匙冷水送下

〔主治〕輕證粘液勞ニ宜シ

○第一千七百六十四方〔越魯濕屈〕

祿別利丁一錢 過爾托煎六錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

〔主治〕聖京偪後之ヲ用ヒテ痰ヲ豁利シ又肺ノ粘液流出

症ニ宜シ

○第一千七百六十五方〔那連地〕

過麻刺一葉及根 井水十四ヲ煮瀝過取八ヲ加後味

甘海鹽精一錢 過兒托舍利別一錢

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕肺臟弛緩及ヒ粘液溢流症ニ宜シ

○第一千七百六十六方〔我剌律秘〕

遠志一錢半 乃 井水十ヲ煮耗至六ヲ加亞兒尼加花

一錢蓋閉飽熟八分時濾過放冷再加後藥

鹿琥精錢 海葱蜜錢六

右調勻每一時服一食匙

主治老人聖京傷肺弛緩ヲ兼又ル症胸水初起及ヒ室

息症ニ宜シ○鹿琥精ニ代ヘテ礪砂加過泥子精ニ刀ヲ

用フルモ亦好

○第一千七百六十七方謨私篤

遠志 亞兒尼加錢各一 水道宜煮濾取四弓半加後藥

龍腦五以亞刺昆 安質沒尼酒錢半 遠志舍利別米出

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

○第一千七百六十八方同上

礪砂錢 龍腦六 亞兒尼加花錢半 金硫黃五 白糖

右調勻為散每服一茶匙日四次

主治右二方粘液勞肺ノ感觸遲鈍ノ症ニ宜シ

○第一千七百六十九方越耳録弗

拔爾撒謨字露鷄子黃 幾那水製越幾斯錢六 玫瑰

蜜三

右調勻為散劑每一時半服一茶匙

○第一千七百七十方弁拂

遠西方彙

卷之六
肺癆
廣
肺
堂

○拔爾撒謨骨并霍一刀至加沙糖適宜捏為泥加後味

新鮮驢馬乳半攝爾都兒水或法仲水北

右調勻日服

主治右二方千七百六十九方肺勞二宜

○第一千七百七十一方秘拔爾訛

麻爾羅歌越幾斯依蘭苔濃煎六予溶化加後藥

甘草膏可幾遠志舍利別錢六

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治肺臟粘液溢流弛緩二因八七ノ及七粘液勞二宜

○第一千七百七十二方過傑栗屈的兒

依蘭苔 過麻刺根各三 甘草六 蜀羊泉莖錢三

右細剉調和三分取其一水適宜煮每日飲服

○第一千七百七十三方福倭篤

依蘭苔半 幾那錢二 遠志 甘草各一 角茴香錢半

右細剉調勻分六包每日一包水一匙煮過服盡

主治右三方肺管粘液溢流症弛緩二因八者二宜○第

三百六十九方ヨリ三百七十五方至亦應用方トス

○第一千七百七十四方職歇蘭度

依蘭苔錢六 蜀羊泉莖錢三 井水十六予煮耗至八予瀝

過加後藥

遠西方藥 卷十一 粘液勞 廣脾堂

拔爾撒謨舍利別

右調勻每服二食匙日三次

主治聖京傷肺入衰弱二因儿症粘液溢流ヲ兼又儿者二

宜

○第一千七百七十五方

依蘭荅傑列乙 蜀羊泉越幾斯 甘草舍利

別 礪砂加過泥子精滴

右調勻頻々茶匙抄服一日服盡

○第一千七百七十六方

洞庭藍葉 依蘭荅 已上二味細剉常水適宜煮

八分時濾過取一此加後味

清淨蜜

右調勻每一時半服半小盞

主治右二方粘液勞二宜

○第一千七百七十七方

沒藥水製越幾斯 酒石葉液

右調勻每一時半服四十滴

主治同上

○第一千七百七十八方

阿魏 蜀羊泉莖末 甜百設木末 沒藥水製

越幾斯錢
 右調勻一匁為一九衣石松粉每服九丸日三次
 主治栗屈的兒名此丸ヲ用ヒテ粘液勞已ニ重證ニ至レ
 ル者ヲ治セリ半散四十散

○第一千七百七十九方 賦歌蘭度
 王幾那 刺達尼根各半 井水十二匁煮耗至八匁濾
 王過加後味
 明礬錢半 過兒托舍利別一匁
 右調勻每一時服二食匙

主治 粘液勞吐痰夥多人 症緩劑依蘭苔沒藥 効ヲ奏セサル者

之ニ宜シ但其症呼吸ニ妨碍アラサル者ニ用フベシ
 ○第一千七百八十方 思參傑滿
 肝色硫黃二匁 葛兒儒別越幾斯錢二 菩提樹炭末一錢半
 拔爾撒謨字露一匁
 右調勻為丸衣伊里斯弗魯連底那根末玻璃壘汊貯每服
 十九日三次

○第一千七百八十一方 栗屈的兒
 麻爾羅歇越幾斯 沒藥越幾斯 精製蘆謨安沒尼亞
 幾各二錢 金硫黃一錢 精製甘草膏三錢

遠西方藥 卷十六 粘液勞 廣利堂

右調勻二氏為一九衣伊里斯弗魯連底那末每服四九乃
至六九日三次

〔主治〕肺臟粘液溢出症弛緩ニ因ル者ニ宜シ

○第一千七百八十二方 蒲耳法歇名人拔爾撒謨九

斯百兒麻攝多 勿擲祭亞的列並底那各二錢

已上二味調和加後味

沒藥末 鵠栗拔奴謨末同適

右二氏為一九每一時半服一九

〔主治〕粘液勞ニ宜シ

○第一千七百八十三方 倭栗名人匪篤名人削瘦病察幾斯去爾

沒藥錢一 アレキンテリー 水七勺燒酒六錢溶解加後

味

亞爾鮮鹽錢半 撒爾末兒秩斯十二 過兒托舍利別一

右調勻每服大食匙日三次

〔主治〕輓近此察幾斯去爾ヲ廢ノ用ヒズト雖粘液勞刺衝
緊張ノ証徴無ク却テ衰弱弛緩ヲ見ハシ全ク熱性ヲ帶
ビズ設令熱アルモ甚微ニ病者夥ク膿様粘液ヲ咳出ス
レ氏血ヲ混セザル者此方殊効アリ

○第一千七百八十四方 類方

沒藥錢一 アレキンテリー 水七勺肉豆蔻水半勺溶解

遠西方藥 卷十六 粘液勞 三十二 廣 堂

加後藥

幾那丁幾錢 亞爾鮮鹽 刀二 撒爾末兒秩斯 刀十六 白

糖 弓半

右調勻每服二食匙日三次

○第一千七百八十五方 類方

沒藥錢 酒石鹽 刀二十 綿苔幾里私布水 弓八 撒兒末

爾秩斯 刀一 白糖 弓半

右調勻每服一二食匙日四次臨服宜振盪

○第一千七百八十六方 (三) ステル 此怒布瀉

安息香花 刀四 龍腦 刀二 白糖 刀一

右調勻為散分六服每一時一服

主治粘液勞衰弱弛緩甚シキニ係ル症痰粘着シ脈沈ナ

ル者之ニ宜シ兼テ胸上發疱膏ヲ貼スベシ

胃腸粘液鬱積 スブレノルロエア。左ントリキユリ。エト。インステ

マレイムオプホルピングイン

此症解釋劑ヲ用フベシ即礪砂 四方至二百五方。二百二十

百八十 孕驗酒石 五十五方至 孕礬酒石 至千七百八十八方瀉利

鹽吐酒石等之ニ屬ス並ニ峻烈ノ華爾私性植物。旃那。大黃。

千七百九 藥刺巴。蘆薈。千七百九十四方至 等ニ宜シ。但巴

上藥劑ノ用量ヲ斟酌シ為ニ虛憊セシメザラントヲ要ス

遠西方彙 卷十六 胃腸粘液蓄積 廣利堂

胃腸大ニ汚物蓄積スルニ後ニ時々吐下藥ヲ與フヘシ病後功ヲ収ムルハ苦味藥千七百九十六方ヲ用ヒテ以テ各部ノ衰弱ヲ復シ再粘液ノ聚積ヲ妨クベシ

○第一千七百八十七方

精製礪砂 精製甘草膏各一錢 吐酒石一錢

已上三味橙花水四勺融解

右調勻每一時服一食匙

主治胃腸粘液蓄積ニ宜シ

○第一千七百八十八方

精製孕礬酒石半勺 常水六勺溶解加後味

蒲公英流動越幾斯三錢

右調勻每一時服一食匙

主治同上○五十方ヨリ五十三方至及七五十六方ヨリ

六十一方至亦同効

○第一千七百八十九方 穢歇辭度

麻屈涅夫亞 孕礬酒石 大黃 薄荷油糖各二錢

右調和為散每服一茶匙

主治飽食セル者之二宜シ又胃腸汚物及ヒ粘液ノ蓄積

ニ用フ

○第一千七百九十方 柳冠秘

遠西方彙 卷十六 廣利堂

西... 卷... 胃腸粘液蓄積 廣... 堂

精製孕礬酒石錢二 大黃刀二 苗香油滴六 葛兒儒別越

幾斯宜適

右為六十九衣苗香末每服五丸乃至八九日四次

主治胃腸粘液蓄積二宜シ

○第一千七百九十一方同上

大黃 螭蛄石錢各一 薄荷油滴十 牛膽凝固者二錢

薯草葉末適

右為百二十九衣伊里斯弗魯連底那根末每服五丸乃至

八九日三次

主治同上粘液痔二稱譽セル方九百四十四方至七百亦此二

用フベシ

○第一千七百九十二方

蘆薈水製越幾斯錢一 複方大黃越幾斯附半

右調勻二瓜為一丸衣石松粉早晚服一二丸

○第一千七百九十三方歌愷

蘆薈水製越幾斯錢半 葯刺巴末

右調勻為二十九衣石松粉每晚服一丸乃至三丸

主治右二方胃腸粘液蓄積二宜シ

○第一千七百九十四方同上

蘆薈水製越幾斯錢半 葛私篤僕謨末 亞刺毘亞護謨

遠西方彙 卷十六 胃腸粘液鬱積 廣月堂

末各五

右調勻為二十九衣石松粉玻璃壘收貯早晚服一二九

主治依朴昆垚兒家胃腸粘液畜積二罹ル者之ニ宜シ

○第一千七百九十五方屋兒弗

芥子亞的兒油滴二 亞刺昆亞蘊謨宜適 キイスダム水

白糖二錢至四錢

右調勻為乳劑每一時服一食匙

主治胃中粘液畜積及ヒ之ニ因ル不食症ニ宜シ

○第一千七百九十六方穢歇辭度

忽布滿健胃丁幾附一 橙皮丁幾錢一 格綸僕越幾斯

刃一

右調勻千前千後服八十滴

○第一千七百九十七方同上

亞爾鮮丁幾 複方橙皮丁幾附各

右調勻用法同上

○第一千七百九十八方同上

忽布越幾斯原本秤量 薄荷水一 桂水半

右調勻每服六十滴日三次

○第一千七百九十九方摠心

整魯別利涅附精製 白糖六

遠西方彙 卷十六 胃腸粘液鬱積 廣脾堂

右調勻為散分十二包每一時半服一包

主治 滉弗涅兒名ハ消食器衰弱症ニ整魯別利涅ヲ用フ

托久名ハ衰弱症本復ノ期粘液熱下利格列刺等ニ之ヲ

試用セリ○整魯別利涅ハベルベリス植名物

及ヒ他種ノベルベリス上同根皮ヨリ採製シヌベルベリ

デシ上同ノ類属タル「マゴニウ」ヨリ得タル結芒質ニシ

テ窒素ヲ含畜ス臭氣無ク味甚苦ク黄色微細ノ芒針ニ

シテ光澤絹絲ノ如シ

○第一千八百方叔拔爾訛

括失亞半 橙皮二 上好列印酒半一北

右浸漬一日濾過每服一盞日三次

○第一千八百一方戒歌蘭度

括失亞 睡菜葉各六 山柰根 良姜各二

健智安那 橙皮各半 幾那二 鐵屑六

右上好列印酒或昏嚙爾酒ハ弓浸安暖所飽熟十二時每

服一利鳩爾盞日三次乃至四次

主治 千七百九十六方ヨリ千八百一方至粘液畜積症治

ノ後胃腸ヲ補益スルニ宜シ

膀胱聖京偪ブレノルコウトヘイト 或カタルリスヘシケルユリナ

膀胱聖京偪ハ痔脈壅塞ニ因テ来ル者屢之アリ其症ハ肛

遠西方彙 卷六 膀胱聖藥 廣胖堂

門周圍時々蟻蟻ヲ施之解凝劑及ヒ硫黃劑ヲ與へ又總テ膀胱粘液痔ニ處スル所ノ藥劑ヲ佳トス九百四十七方至九百五十三方

○且強壯劑衝動藥ヲ併用ヲ用フルヲ最要トス即著草連症多シ錢草洞庭藍組百設木幾那殊ニ烏白烏爾識九百四十七方至九百五十二方

撒謨骨百五方澤霍百三十一方是ナリ飲料ニ櫟實寄喜ヲ用拔爾阿仙藥八百三十一方華澄茄八百三十一方明礬七百七方至

篤爾綿黥刺九百七十一方等ハ効力更ニ猛烈ナリ用ニ臨テ尤慎重スヘシ若疼痛増進シ或ハ血脈系ノ觸動機尤盛

セル證狀ヲ見ハセハ速ニ廢メ用フベカラス石灰水百十八

方至千八百十二方ハ其藥力更ニ緩ナリ滲出液甚粘膠ナル者或ハ尿酸ヲ交フル症並ニ尿石若クハ膀胱内潰瘍ヲ發セル症尤之ヲ用フルニ宜シ○輓近多ク膀胱中ニ藥液ヲ注射スルノ法ヲ稱ス秩歇魯名其ノ法先乳汁扁桃乳亞麻仁煎過兒托煎等ノ緩和劑ヲ用ヒ後罌粟球阿芙蓉水製越幾斯菲阿斯越幾斯莨菪越幾斯等ノ麻醉藥一二以ヲ上ノ藥汁ニ和用ス其之ヲ施ス日ニ三次乃至五次トス而シテ每次藥液ヲ膀胱ニ停ムルヲ十密扭篤ヨリ二十密扭篤ニ至ル膀胱ノ感觸過敏ヲ鎮靜シ得テ后麻醉加拔爾撒謨劑ヲ注射ス其方莨菪越幾斯一二以水三四以ニ溶ス者及ヒ拔爾撒

遠西方彙 卷六 廣胖堂

遠西方藥 卷十六 膀胱聖藥 廣 胖 堂

護骨拜霍一二錢漸加ヘテニ至ル 鷄子白ヲ加ヘテ乳劑トナシ
用之而シ其之ヲ注射セルヲ毎日一次或ハ隔日ニシテ以
テ粘液ノ流出全ク止ムニ至レリ但焮衝証ヲ見ハス片ハ
速ニ之ヲ休止ス○又刺魯列滿度名刺抜突同 及ヒ秩歇魯
其同ハ腐蝕藥液ヲ注射シ微々焮衝ヲ挑起シ以テ粘液流
出ヲ制スト云フ○終ニ含鑛泉ヲ用ヒテ以テ切ヲ収ムベ
シ井ルジュンゲル水ヲ用フルヲ最佳トス

○第一千八百二方 溼篤溼患
精製礮砂 甘草各一
右調勻為散分ハ畏每一時半服一畏

主治 膀胱粘液流出症及ヒ慢性遺精ニ宜シ

○第一千八百三方 遠突土
烏白烏爾識葉半 茶葉一 常水六ヲ煮濾過加後味
過爾地舍利別錢六

右調勻每服一食匙日四次乃至六次

主治 膀胱聖藥 結石 等ニ宜シ

○第一千八百四方 速別倫歇愷

刺發斯越幾斯錢三 烏白烏爾識葉煎六者烏白烏爾識葉半ヲ取

主之 溶解加後藥

曹達錢一 杜松子傑列乙一

遠西方藥
卷之六
膀胱聖京低
三九
廣
胖
堂

右每一時服一食匙

主治腎膀胱粘液流出症水腫ヲ兼又ル者及ヒ結石ノ初起ニ宜シ

○第一千八百五方〔福徳篤〕

烏白烏爾識葉 撒爾非亞葉 松芽各二錢 玫瑰花一錢

洋芹子半錢

右細剉為私百尖斯分六撮取一撮注水一彬容量名供一

日飲料

主治利尿器ノ粘液流出症水腫及ヒ結石ニ宜シ○九百

四十七方ヨリ九百五十二方至亦膀胱聖京低ニ殊効アリ

○第一千八百六方

〔甲方〕弗那爾煙蒲藪突

阿訥尼私根一 井水適宜煮四分時瀝取一匕加後味

海葱蜜半

右調勻每半時服半小盞

主治膀胱聖京低腎臟結石ニ宜シ

〔乙方〕石松粉半 雞子黃二 著草葉浸五

右為乳劑每半時服一食匙

遠西... 卷十六... 廣... 堂

主治膀胱聖京傷二宜之
○較姪孺兒度名八此症ヲ治ス
ルニ石松粉ヲ廢ノ石松葉ヲ稱用ス

○第一千八百七方謨私寫

連錢草 洞庭藍各二錢 滾湯適宜浸漬濾過取四勺加

後味

著草越幾斯二錢 紺百設木越幾斯二刀 精製礪砂一錢

右調勻每一時服一食匙

主治膀胱聖京傷二宜之

○第一千八百八方刺鬱秘

華澄茄末半勺 清淨蜜適宜

右為煉膏每服一茶匙日三次乃至四次

主治膀胱及七尿道聖京傷並二總テ經久粘液流出症ニ

宜之

○第一千八百九方婚也

麻爾羅歇越幾斯 沒藥越幾斯 吉納蘊各二錢 撒

爾末兒秧斯錢

右調勻二以爲一丸衣伊里斯弗魯連底那每服八丸日三

次

主治膀胱及七直腸粘液流出二宜之又慢性肺臟聖京

傷弛緩二因ル者ニ用フ

卷之六
膀胱聖藥
...

○第一千八百十方

石灰水北 右每服半小盞

附考或八石灰水甘乳若久八酪等分混和之ヲ服之日

二一此半二至ルト云フ

○第一千八百十一方謨私篤

烏白烏爾識葉半 井水適宜煮濾取四勺加後味

石灰水一 扁桃乳舍利別半

右調和每一時乃至一時半服一食匙入樽煎出或

主治右二方膀胱聖藥之宜

○第一千八百十二方春煙隨

括失亞屑半 石灰水十八 入玻璃壘蓋閉浸漬二日

大濃過加後味

桂酒水二 右調勻入玻璃壘密閉貯每服半盞日三次

主治虛性粘液流出症殊不利尿管之粘液流出ニ宜之又

腸胃衰弱及ヒ依倔篤性全體衰弱ニ用フ白糖

○第一千八百十三方秋歇魯其

拔爾撒護骨海霍半 明礬 血竭 阿仙藥各一 麻

倔涅失亞適

右為百九日服十九至三十九

主治膀胱粘液流出ニ宜シ

○第一千八百十四方別連杜

芫菁乾者 甘扁桃去皮 石灰水十錢 白糖一

右為乳劑濾過但不用絞每一時乃至一時半服一食匙臨

服振盪八 服振盪八

主治利尿器ノ虚性粘液流出ニ宜シ○蓋之ヲ用フルハ

大ニ謹慎ヲ加フベシ

遠西方彙卷之十六

遠西方彙卷之十七

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑斐婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

痲 ブレノルロロ。ウレトレ。ヒリリス。オゴノルロ。ロ。メ

ボイストロド
ロイプル蘭

單純ノ痲ハ醫藥ヲ要セス體ヲ勞セス刺戟衝動ノ飲食ヲ
戒メ微温乳錦葵葉若クハ歌爾拔私屈謨煎ヲ以テ毎日數

田龜頭ヲ浴スレハ大低二三週ニノ平治シ後患ヲ遺ス
 ナシ燕麥粘汁。大麥水。米飲。或ハ後ニ列載スル所ノ煎液ハ
 八百二十方至千方等ノ如キ粘滑飲料ヲ最要トス尚且油質粘
 滑乳劑五百三方若クハ扁桃乳。罌粟乳。大麻子乳千八百十五方至千八百
十七方或ハ粘滑散劑千八百方ヲ用フベシ○焮衝麻ハ衆醫精
 製消石但多クハ適ヲ乳劑ニ和用シ千八百方或ハ甘汞千八百
 方ヲ佳トス焮衝劇度ニ進ミテ尿閉症ヲ發スル片ハ瀉血
 及ヒ温暖琶布ヲ施シ焮衝退ク片ハ阿芙蓉越幾斯ヲ乳劑
 ニ和シ與フ千八百方焮衝麻ハ大便秘スル者多シ清涼下劑
 ニ宜シ千八百三十一方○痙攣性ノ者ハ乳劑ニ老利兒結

爾斯水五百十 菲阿私越幾斯五百十三方 或ハ舍電阿芙
 蓉液五百十 和用ス他ノ同種藥例スルニ阿芙蓉小量吐
 根。及ヒ龍腦千八百三十三方 至モ亦敏性麻ノ痛苦ヲ緩和
 スルニ妙トス之ニ兼テ鎮痙射注法千八百四十三方ヲ施
 スベシ若其痛失血ヲ兼ヌル者ハ疊布コハナリス或ハ他ノ射注法千
五百四十ヲ施スベシ○末期ニ至レハ大抵弛緩症ニ轉移ス
 ルカ故ニ鹽酸重土ニ老利兒結爾斯水千八百九方ヲ和服シ或
 ハ拔爾撒謨骨滓藿每服十滴日ニ三服以テ粘液流出ヲ止
 ムヘシ但拔爾撒謨ノ服量漸ク加ヘテ二十五滴ヨリ三十
 滴ニ至ル射注法ハ往昔專行ハレ千八百四 輓近復之ヲ稱

用スト雖安頓ノ意ニ從ヘハ廢ノ用ヒサルヲ優レリトス
 ○麻毒ヲ滅スルニ往昔刺必私高私質屈斯ノ射注法千八百四十八方
 十ヲ用フ栗格爾突名ハ結晶硝酸銀ノ濃溶液千八百四十八方
 最妙ト稱ス吾輩未之ヲ親驗セズト雖身命ヲ委メ救治ヲ
 請フ所ノ病者ニ在テ此ノ如キ猛劑ヲ輕試スルハ敢セサ
 ル所ナリ

○第一千八百十五方 過傑。栗屈的。魁

甘扁桃皮去 白罌粟子各半 加蒸餾水或如密 一坵搗

爛作乳劑加後味

亞刺昆亞護謨錢一 過爾托舍利別錢六

○右調勻每一時服半小盞

○第一千八百十六方 同上

大麻子搗碎 甘扁桃去皮各半 加井水一坵徐々搗碎作

乳劑濾過加後味

過兒托膏附半

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百十七方 佛律屈涅魯

大麻子一 加常水十六多徐々搗碎作乳劑濾過溶後

味

亞刺昆亞護謨錢二 白糖錢六

右調勻每一時服半小盞臨服宜振盪

主治千八百十五方ヨリ千八百十七方至麻疾ニ宜シ

○第一千八百十八方

阿訥尼私根附一 井水九勺煮瀝取六勺加左味

白糖勺一

右調勻每一時服二食匙

○第一千八百十九方

蘆根一勺至二勺 井水一坵煮

右日服

○第一千八百二十方

蘆根 蒲公英根各半 井水半坵煮將熟加左味

甘草二錢

同上

○第一千八百廿一方

過兒托根勺四 甘草三錢 亞麻子三勺 大麻子三勺

右調勻供泡劑

○第一千八百廿二方

過兒托根 大麻子各二勺 茴香 甘草各半錢

右細剉調勻取二大食匙水四盞煮日服

○第一千八百二十三方

錦葵葉弓四

過兒托根弓一

大麻子弓三

右細劉調勻取二食匙水四盞乃至六盞煮日服

○第一千八百二十四方

過兒托根末弓半

甘草 亞刺昆亞護謨錢各二

白糖弓一

右調勻為散每服一茶匙亞麻子泡劑送下日四次

主治千八百十八方ヨリ千八百二十四方至諸麻應用方

トス

○第一千八百二十五方〔遠突抄〕

消石錢半

甘扁桃乳十弓溶解加後味

沙糖舍利別弓一

并水半...

右調勻每一時服半小盞

○第一千八百二十六方〔同上〕

大麻子搗碎

加常水一匕徐々搗爛為乳劑溶枸橼酸

加里二錢後加左味

過兒托舍利別弓一

右調勻每一時服半小盞

主治右二方炊衝麻ノ初期ニ宜シ○消石ハ通例利尿器

ノ疾患ヲ進ムルガ故ニ衆醫廢ノ用ヒス

○第一千八百二十七方〔同上〕

甘汞弓四

精製硫黃

蝟蛄方各二

上好砂糖弓四

右調勻為散分八晝早晚服一晝

〔主治〕麻疾焮衝劇度ノ期ニ宜シ○方中甘汞ハ微毒ヲ解スルニアラズ又焮衝ヲ制スルニアラズ大便通利ヲ調理スルガ為ナリ

○第一千八百二十八方〔同上〕

罌粟子半 甘扁桃去皮 加蒸餾水八勺搗爛作乳劑

後加左味

阿芙蓉越幾斯三 上好砂糖三

右調勻每半時服二食匙

〔主治〕麻後ノ尿閉ニ宜シ○先放血シ或ハ會陰ニ蟻鍼六

頭乃至八頭ヲ施シ而ノ後麥糠ニ乳汁ヲ和シ或ハ緩和

劑ハ毳布ヲ貼シ温水及ヒ乳汁ノ蒸氣ニ浴シ或ハ接骨

木花歇爾拔斯屈謨浸ノ蒸氣ニ浴シ粘滑藥ヲ以テ灌腸

シ微温湯半身浴等ヲ好ム此ニ由テ焮衝已ニ退クキ

ハ乃上ノ乳劑ヲ與ヘ又菲阿斯葉ノ毳布ヲ用フルニ宜

シ

○第一千八百二十九方〔同上〕

孕鹼酒石二 上好滿那一

右加沸騰大麥煎五勺溶解每半時服二食匙以至得効

○第一千八百三十方〔同上〕

○答麻林度半一 純精酒石半 覆盆子舍利別宜適

右為砥劑早晚服二大茶匙

○第一千八百三十一方私由尼阿魯

○酒石酸加里 乳糖各一

右調勻為散每一時乃至一時半取一茶匙冷水和服

主治一千八百二十九方非利 一千三百三十一方至焮衝麻大

便不利或八胃腸汚物ヲ挾ム症ニ宜シ

○第一千八百三十二方

白豐粟乳五 菲阿私越幾斯五 白糖半

右調勻每一時服一匙

主治靈敏性ノ麻ニ宜シ

○第一千八百三十三方遠突 八百三十三方至靈蟻掛

古精製阿芙蓉二 蝟蝟石 砂糖各一

右調勻為散分四晝每晚服一晝

○第一千八百三十四方婦兒

吐根末二 精製阿芙蓉末四 白糖二

右調勻為散分四晝每晚臨卧服一晝

○第一千八百三十五方遠突

龍腦四 龜謨散二

右調勻為散分四晝每晚服一晝

遠方集 卷十七 麻 廣勝堂

○第一千八百三十六方〔護私篤〕

杜松子各一 精製阿芙蓉各一 龍腦各一 白糖二

○右調勻為散分四服每晚一服

○第一千八百三十七方〔遠突土〕

龍腦八 亞刺昆亞蓮八 護漿八 巴上二 味搗和徐々加

○第一千八百三十四方〔遠突土〕

扁桃稀乳四 砂糖三

○右調勻每一時服一食匙

○第一千八百三十三方〔遠突土〕

入麻二 罹リ 夜間陰莖勃起疼痛スル者之ニ宜シ此症先

陰莖根ニ蟻鍼二三條ヲ施スベシ

○第一千八百三十八方〔遠突土〕

杜松子二 傑列二 大麥煎四

○右調勻每一時半服一食匙

主治 痲疾特ニ癩癰質ノ人痲ニ罹リ歛衝既ニ退テ後此

方ヲ用ヒテ久痲ヲ防クニ宜シ之ニ代ヘテ蜀羊泉煎ニ

杜松子舍利別ヲ加ヘ用フルモ亦可ナリ

○第一千八百三十九方〔歌權〕

鹽酸重土半 老利兒結爾斯水半ヲ溶解

○右調勻每半時服十五滴乃至二十五滴

遠方集 卷十七 廣勝堂

主治痲ニ用ヒテ粘液分泌ヲ減スルニ宜シ焮衝ノ時期
モ亦用フベシ○安頓ハ焮衝既ニ去テ后此方ヲ用ヒテ
屢佳効ヲ得タリ最初重土半ヲ老利兒結爾斯水半ヲ
溶シ漸ク重土ノ量ヲ加ヘテ半錢ニ至ル

○第一千八百四十一方 依過秘密
主治痲ニ用ヒテ粘液分泌ヲ減スルニ宜シ焮衝ノ時期
モ亦用フベシ○安頓ハ焮衝既ニ去テ后此方ヲ用ヒテ
屢佳効ヲ得タリ最初重土半ヲ老利兒結爾斯水半ヲ
溶シ漸ク重土ノ量ヲ加ヘテ半錢ニ至ル

○第一千八百四十二方 其魯單濕爾
主治痲毒ヲ感染シテ後第一日未焮衝ヲ發セサルノ前
減毒方トメ之ヲ用フ

○第一千八百四十一方 栗格爾突
結晶硝酸銀^{十五} 蒸餾水一弓溶解
右調勻隔日一回用玻璃水節射注尿道
主治痲毒ヲ感染シテ後第一日未焮衝ヲ發セサルノ前
減毒方トメ之ヲ用フ

○第一千八百四十二方 其魯單濕爾
蒸餾水四弓溶解加後藥

阿芙蓉越幾斯^八 蒸餾水四弓溶解加後藥

阿芙蓉越幾斯^八 蒸餾水四弓溶解加後藥

密陀醋八滴

亞刺昆亞蘆護漿半

右調勻射注日二次

〔主治〕焮衝既退キテ後尚尿道ヨリ毎朝粘膠液淋瀝シ其症彌久スルノ懼アル者之ニ宜シ○密陀醋ニ代ヘテ鉛糖醋三四匁ヲ用ヒテ更ニ妙トス是沉澱スルナケレバナリ○安頓ハ急性淋ニ決メ射注法ヲ要セス上方ノ如キハ特ニ久淋ニ適當トス

○第一千八百四十三方〔速突土〕

阿芙蓉越幾斯三 蒸餾水二匁 檳榔核汁一匁 溶解

右調勻微温射注日二三次

○第一千八百四十四方〔叔列傑兒〕

白罌粟子半 加常水六匁 搗爛作乳劑加左味

老利兒結爾斯水一錢

右調勻微温射注日三四次

〔主治〕右二方千八百四十三方 靈敏性ノ淋疾陰莖勃起疼

痛甚シキ者之ニ宜シ

○第一千八百四十五方〔速突土〕

生明礬一錢 遏兒把煎三匁 溶解

右調勻供射注劑

〔主治〕淋疾陰莖勃起ニヨリテ大ニ出血スル者之ヲ止ム

ルニ宜シ亞刺毘亞護謨溶液ヲ射注シ或ハ尿孔ノ周圍

ニ疊布ヲ施スモ効アラスノ其症危急ニ至ル者獨上方

ヲ施スベシ

久麻 ナゴノドロイプル蘭 セキニダリア

鈍性久麻ヲ治スルノ最峻藥ト稱スル者ハ拔爾撒謨骨痺

霍是ナリ 千八百四十六方至 華澄茄モ亦同効アリトスト

雖胃腸ノ拔爾撒謨ヲ服スルニ堪ヘザル者ノミ獨之ヲ用

フベシ 千八百六十二方至 又兩藥相合ノ用フルト屢之ア

リ 千八百五十六方至 其他の列並底那 千八百六十九方

二七方 拔爾撒謨字露沒藥 千八百七十九方 阿仙藥 千八百七十一方

番木鱉越幾斯 千八百三十七方 幾那 千八百七十五方 加里

丁幾 千八百七十一方 莞菁 千八百七十九方 等ヲ用フト雖簡易

ヲ好トスルノ醫ハ決メ之ヲ配用スルトナシ病初刺戟収

斂ノ劑ヲ施スト十分ナラザレハ其症鈍性久麻ニ變スル

ハ後亦刺戟収斂藥ヲ用フベシ而メ其類方蕃庶ナリトス

中ニ就テ最試驗ヲ經ルノ多キ者ヲ拮撫シテ此ニ列ス

百八十二方至千 〇久麻感觸過敏ニ原ツク者ハ決メ刺戟

衝動藥殊ニ拔爾撒謨劑ヲ用フルト勿レ内服ハ鑛酸類

百九十三方 千並ニ鉛糖加阿芙蓉等 千八百九十五方 嘉稱 アリ射

注方ハ罌粟乳加老利兒結爾斯水 千八百四十四方 阿芙蓉越幾斯

溶液ニ鉛醋少許ヲ加フル者千八百四十二方醋酸亜鉛溶液等ニ

宜シ千八百九十方○久麻尿道中ノ潰瘍ニ因ル者ハ華涅滿溶

汞散甘汞硝酸汞千八百九十七方ヲ内服スルノ最簡要タリ但外

用ハ外汞千八百九十六方或ハ刺必斯高私塾屈斯千八百九十九方溶液

ヲ射注シ又婆菱ヲ挿入スルニ宜シ○又婆菱ハ久麻尿道

ノ狭窄ニ因ル者ニ多ク歴驗ノ法タリ

○第一千八百四十六方

拔爾撒謨骨湃霍一

右每服十五滴乃至二十滴日三次

主治鈍性久麻ニ宜シ漸ク増シテ四十滴六十滴ニ至ル

私越秩鏡爾名人ハ拔爾撒謨骨湃霍ヲ服スル毎ニ後越栗

失爾蔑印失屈篤十五滴水少許ニ和服セシムルヲ妙ト

ス何トナレバ之ニ由テ胃能ク拔爾撒謨ニ堪フレバナ

リ○拔爾撒謨骨湃霍ヲ用ヒテ後尚粘液ノ流出止マザ

ル者ニ暴訥爾田名人幾那濃煎慢症ハ燒酒ヲ以テ尿道ニ

射注シ且冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗ハシム

○第一千八百四十七方婦兒屈

拔爾撒謨骨湃霍三錢 鷄子黃三箇 加井水五匁搗和加

後味

桂水一匁 桂舍利別半匁

右調勻每一時半服二食匙

○第一千八百四十八方〔録私恒土〕

拔爾撒謨骨湃霍錢二 亞刺昆亞薤謨末錢半 已上搗和

加後味

枸椽水錢二 枸椽汁舍利別錢六

右調勻每服一茶匙日四次

○第一千八百四十九方〔祕設兒〕

拔爾撒謨骨湃霍錢半 忽弗滿液錢二 桂舍利別錢一

右調勻每服一茶匙日四次臨服宜振盪

○第一千八百五十方〔埤魯筋屈〕

拔爾撒謨骨湃霍 枸椽汁舍利別 橙花水 綿苔錢一

古里私布水各半 稀硫酸錢半

右調勻每服一茶匙日四五次燕麥粘汁和服

備考若此方ヲ用ヒテ瀉スル片ハ每服阿芙蓉丁幾二三

滴ヲ加フヘシ

○第一千八百五十一方〔醫仙滿〕

拔爾撒謨骨湃霍錢一 薄荷油滴八 丁子油滴二 阿芙蓉

丁幾滴四

右調和每服三十滴砂糖點服日三次

○第一千八百五十二方〔醫私百兒〕

遠西方藥 卷十七 久麻 三 廣 堂

○甘扁桃六錢 丁寧搗爛加後味

○渴爾托根末錢一 阿仙藥末錢半 拔爾撒謨骨泔霍錢三

右調勻為煉膏每一時乃至一時半服一茶匙

備考此方善々拔爾撒謨骨泔霍ノ惡味ヲ掩フト雖口内

○粘着スル片ハ其味嫌フヘシ

○第一千八百五十三方遠突出

拔爾撒謨骨泔霍錢半 蜀羊泉莖越幾斯錢二 大黃末錢一

○亞刺昆亞護謨末適

右調和二公為一九衣桂末每服七丸乃至八九日四次

○第一千八百五十四方西栗布

○白蠟錢一 上微火熔解加後味

拔爾撒謨骨泔霍錢三 大黃末錢六

右調勻二公為一九衣桂末每一時服八九丸六朝服宜詳盡

○第一千八百五十五方嗜鬼

拔爾撒謨骨泔霍加麻俛涅失亞 少許者一弓

○大黃末錢二

右調勻四公為一九衣桂末每服六丸日三次

主治千八百四十七方ヨリ千八百五十五方至鈍性久瘰

ニ宜シ拔爾撒謨骨泔霍ハ此症ニ最効アリ○之ヲ用テ

ルハ後強哥喜少許ヲ服スハ速ニ拔爾撒謨ノ惡味ヲ

消スルニ妙ナリ上方更ニ多量ヲ服スレハ腹痛不利ヲ
發シ易シ大抵拔爾撒謨二三ヲ用ヒ盡セハ其症ヲ治
スルニ足ルト雖後尚量ヲ減メ連進スルト十四日三至
ルベシ兼テ又冷水ヲ以テ屢陰莖ヲ洗フベシ

○第一千八百五十六方〔福僞篤〕

拔爾撒謨骨泔霍四錢 加鷄子黃一箇攪和加後味

萼澄茄末四錢 玫瑰昆設兒弗半

右調勻作舐劑每服一茶匙日三次乃至四次臨服宜振盪

〔備考〕此方味甚不佳ナリ大黃末

○第一千八百五十七方〔秩設兒〕

拔爾撒謨骨泔霍 亞刺昆 亞蘧謨末各二錢 橙花水二

已上二味丁寧搗和加後味

萼澄茄末二錢

右調和為六塊衣桂末每服一塊日三次和後味

○第一千八百五十八方〔弗脫爾田蒲蘭突〕

拔爾撒謨骨泔霍 萼澄茄末各一錢 亞刺昆 亞蘧謨漿

〔適宜〕

右三瓜為一九衣石松粉每服五六丸乃至十九或十九餘

日三次

○第一千八百五十九方〔弗夥結〕

遠西方彙 卷十七 廣

白蠟錢二 上微火熔解加拔爾撒謨骨湃霍半弓捏和放冷些時再加後味

華澄茄末一 右調和二一為一丸衣桂末每服六丸乃至十九日四次

備考此方殊ニ嘉稱アリニ依不失門レ

○第一千八百六十方例不失門

白蠟錢二 上微火熔解放冷些時加後味攪和

拔爾撒謨骨湃霍錢二 右為八十九衣桂末每二時服八九漸加增

備考每粒拔爾撒謨一一半ヲ含ハ

○第一千八百六十一方同上

白蠟錢二 上微火熔解放冷些時加後味攪和

拔爾撒謨骨湃霍錢二 華澄茄末半 右為百二十九衣桂末服法同上

備考每丸拔爾撒謨一一華澄茄二一含ハ

○第一千八百六十二方

華澄茄 白糖各一

右調勻為散每服一茶匙日三次

主治久麻ニ宜シ○別魯列印地名ノ病院左法ニ依テ華澄

茄ヲ用ヒテ久麻ヲ治ス其法華澄茄砂糖各一弓調和

遠西方藥 卷十七 久麻 十一 廣

シ散ト為シ之ヲ二分シ每朝卯牌半時ニ方リテ其一分
 ヲ取り温乳四分名量ニ和シ彬篤容量ニ和シ頓服セシメ午牌至後
 服ヲ停メ午後時々一刀尖ヲ服用メ晚酉牌半時ニ至テ
 全ク一劑ヲ盡サシム後二日間服藥ヲ停メ唯稀淡ノ飲
 料ヲ多服セシメ第四日ニ至テ復華澄茄ヲ用フル初
 日ノ如シ又第五日第六日ハ總テ藥用ヲ停メ第七日ニ
 至リテ更ニ又華澄茄ヲ用フル初日ノ如シ假令麻ノ
 流出既ニ休止スル者モ亦之ヲ服セシム第八日ニ方リ
 テ甘汞蒟刺巴ノ瀉劑ヲ與フ○上法ノ如ク是ヲ療メ若
 其症治セザル者ハ復華澄茄ヲ用ヒズメ他藥ニ轉スル

○佳トス○華澄茄ハ胃腸宿患アル者ニ在テハ拔爾撒
 謨骨拜霍ニ優レリ或ハ之ヲ阿芙蓉ニ配スルヲ要ス何
 者華澄茄ヲ多量服スル片ハ患者不和ヲ覺エ或ハ吐瀉
 腹痛等ヲ發スル下ヤレバナリ若華澄茄ヲ用ヒテ便秘
 不此症片ハ之瀉利鹽ヲ配用ス勞瘵質或ハ卒中ノ素
 因アル者及ヒ痔疾家ハ華澄茄ヲ忌ム木乙失速非屈私
 人ハ諸症ニ害アリ下云フ
 ○第百八十六方誤和篤
 華澄茄半一 蜎姑石錢二 麻屈涅失亞錢一 乳糖半
 右調勻為散每一時乃至一時半服一茶匙

○第一千八百六十四方〔叔密士〕 華澄茄錢半 吐根三分 薄荷油滴

右調和為散分十二包蠟紙包裹每服一包日四次

○第一千八百六十五方〔私託爾屈〕 華澄茄錢半 砂華甘草各半

右調勻為散分六服每一時半一服

○第一千八百六十六方 華澄茄錢一 吉納六分 甘草一分

右調勻為散分八包每服半包或二包日四次乃至六次

○第一千八百六十七方〔獨蘇的〕 華澄茄錢一 吉納六分 甘草一分

右調勻為散分八包每服半包或二包日四次乃至六次

○第一千八百六十八方 華澄茄錢一 吉納六分 甘草一分

右調和為散劑每一時半服一茶匙

○第一千八百六十九方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百七十方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

主治千八百五十六方ヨリ千八百六十八方至久麻弛緩

ニ因ル者ニ宜シ○焮衝ノ時期華澄茄ヲ用フルハ甚危

○第一千八百七十一方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百七十二方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百七十三方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百七十四方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百七十五方〔好斯滿〕 華澄茄錢一 亞刺昆亞錢半 蒸餾水

右調勻為九十九衣石松粉每服十九日三次

○第一千八百六十九方 遠突也

的列並底那^半 上好沒藥^{錢一} 精製甘草膏^{宜適}

右三以為一九衣桂末每一時半服四九

○第一千八百七十方 同上

上好沒藥^{半錢} 撒爾末兒秩斯^{錢三} 篤爾綿黜刺根末

亞刺昆亞護謨漿^{宜適} 蒸餾水

○第一千八百七十一方 同上

阿仙藥^{錢三} 大黃末^{錢半} 勿搦祭亞的列並底那^{宜適}

右二以為一九衣桂末每服五九日四次

右二以為一九衣桂末每服五九日四次

○第一千八百七十二方 佛蘭葛爾度^{宜適}

的列並底那 健質亞那^{各三錢} 吉納 撒爾末兒秩斯

右調勻二以為一九衣桂末每服十九日四次

主治一千八百六十九方日一千八百七十二方至弛緩

久麻嘉稱以此劑必小量日始又漸加又亦大量

及フベシ^{宜適}

○第一千八百七十三方 秘託爾屈

番木鱉越幾斯^{宜的兒製} 沒藥末^{錢二} 拔爾撒謨骨拜

霍^{錢二}

右調勻二八為一九衣桂末每服六九日四次

主治久麻尿道粘液膜大衰弱七ルニ因ル者之宜

○第一千八百七十六方

○第一千八百七十四方 漢姪爾名治麻煉膏

入番木鱉越幾斯水製胡瓜煎汁六勺溶解加後味

主垂麻油鷄子黃研蜜半一十八百六十二方

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪日四次

主治時期ニ拘ラス麻ニ應用方トス最久麻ニ好シ

○第一千八百七十五方 遠突土

王幾那錢六熱湯適宜浸漬飽熟四分時慮過取九勺放

冷加後味

○阿芙蓉丁幾滴八拔爾撒謨亭露舍利別勺

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百七十六方 婦兒屈

幾那末錢六并水五勺浸漬飽熟六時屢攪動慮過加後

藥

桂水 橙皮舍利別各半

右調勻每一時半服一食匙乃至二食匙

○第一千八百七十七方 同上

幾那末 鐵粉各半 列印酒半小盞

右冷浸十二時屢攪和每一時半服半小盞

○主治千八百七十五方曰千八百七十七方至弛緩久痲

三宜之○幾那弛緩一部三止ラズメ全身ニ及ブ者ニ

殊稱ナリ

○第一千八百七十八方

加果丁幾附二老利兒結爾水半

○右調勻每一時半三十滴乃至四十滴燕麥粘汁和服

主治弛緩久痲ニ宜シ

○第一千八百七十九方婦兒屈

芫菁丁幾三錢

右每一時半五滴乃至二十滴粘滑藥煎汁和服

主治久痲感觸甚遲鈍ノ症ニ用フ○但芫菁ハ假令小量

ニ用ヒ或ハ遲鈍家ニ用フルモ亦痲ヲ治セズ直チニ

小便艱澁ヲ發スルガ故ニ婦兒屈名人モ亦甚其効ヲ疑ヘ

リ故ニ寧廢ノ用ヒサルヲ優レリトス○若小便艱澁ヲ

發スル者ハ乳劑ニ龍腦ヲ和用シテ即効アリ

○第一千八百八十方遠突

芫菁末二錢 龍腦六分 乳糖三錢

右調勻為散分十二畏早晚取一畏裸麥煎汁送下

○第一千八百八十一方

○藥 光普末三 亞刺昆亞蘆謨末二錢 白糖六錢 甘扁桃皮去

右搗爛加蒸餾水八勺作乳劑每一時服一食匙又者一

○主治 右二方八勺八百八十十方十 經久麻感覺甚遲鈍ノ症二

宜シハ六八八原二請二味二用二マ二明二咳二マ二

○第一千八百八十二方〔縮見屈〕

右石灰水四勺 榎植核粘汁半 蒸餾水四勺 溶解加後藥

右調勻供射注劑二用二ハ二マ二亦二麻二ノ二症二ハ二直二モ二

○第一千八百八十三方〔同上〕

刺必斯高私秩屈斯三 蒸餾水四勺 溶解加後藥

○第一千八百八十四方〔同上〕

阿芙蓉越幾斯一勺 榎植核粘汁半

右調勻同上

○第一千八百八十五方〔同上〕

皓礬半 蒸餾水四勺 溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨漿二 蒸餾水四勺 溶解加後味

右調勻同上

○第一千八百八十六方〔同上〕

榎植核粘汁半 蒸餾水四勺 溶解加後藥

右調勻同上

○第一千八百八十七方〔同上〕

皓礬半 蒸餾水四勺 溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨漿二 蒸餾水四勺 溶解加後味

右調勻同上

○第一千八百八十八方〔同上〕

榎植核粘汁半 蒸餾水四勺 溶解加後藥

右調勻同上

○第一千八百八十九方〔同上〕

皓礬半 蒸餾水四勺 溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨漿二 蒸餾水四勺 溶解加後味

遠西方膏

卷卅十

○第一千八百八十六方同上

升汞二 蒸餾水五勺溶解加後藥

阿芙蓉越幾斯水製 槓植核粘汁一

○右調勻同上八十五方

○第一千八百八十七方

硝酸銀結晶者一 蒸餾水四勺溶解

右供射注劑或加阿芙蓉丁幾半勺

○第一千八百八十八方館兒屈

明礬半錢至一錢 井水五勺槓植核粘汁半勺溶解

右供射注劑

○第一千八百八十九方別撰爾

上好幾那一 井水適宜煮四分時濾取液十勺放冷加

後味

赤葡萄酒二 明礬一錢

右調勻射注日三次

○第一千八百九十方葛拍爾

老利水揚彼附一 井水適宜煮四分時濾取液八勺溶

後味

明礬一錢

右射注日三次

遠西方書 卷十七 久麻 廣 月 堂

○第一千八百九十一方〔格爾照發〕

沒食子末平 井水適宜煮濾取八勺溶後味

明礬二錢 皓礬二錢

右調勻同上井水適宜煮四合煎取八勺

○第一千八百九十二方〔詰爾〕

阿仙藥五錢 沒藥各一錢

右石灰水四勺溶解用法同上

主治千八百八十二方ヨリ千八百九十二方至弛緩久麻

ニ宜シ○猛烈ノ収斂藥ヲ射注スレハ尿道狹窄シ易シ

○第一千八百九十三方〔遠突土〕

越栗失爾必篤利阿里

右每服三十滴乃至四十滴冷水點服日三四次

○第一千八百九十四方〔同上〕

硫酸密幾私去爾〔代用收斂並的爾半錢〕 沙列布淡煎 覆盆

子舍利別子

右調勻每一時服一食匙

○第一千八百九十五方〔同上〕

鉛糖 精製阿芙蓉各三

右調勻為散分十二畏每服一畏日四次

主治千八百九十三方ヨリ千八百九十五方至久麻感觸

過敏ニ因ル症ニ宜シ○一病者此方ヲ用フルニ三日ニ
又全治セリ

○第一千八百九十六方〔製法〕

醋酸亜鉛八 蒸餾水六

右微温射注日二三回

主治同上○或ハ叔列傑兒名人及ヒ其魯單涅爾名人ノ方十

百四十四方ヲ此症ニ用フベシ此候亦蒸餾水

○第一千八百九十七方〔遠突土〕

硝酸汞溶液附十四 蒸餾水六 蒸餾水六 蒸餾水六 蒸餾水六 蒸餾水六

右調和早晚服一食匙

主治 淋ニ因テ尿道潰瘍ヲ生スル者ニ宜シ○之ニ兼テ

華涅滿名人 水銀硬膏ノ婆菱ヲ用フベシ

○第一千八百九十八方〔門的其西〕

升汞一 蒸餾水四 溶解

右供射注劑

○第一千八百九十九方〔其魯單涅爾〕

刺必斯高名 秩屈斯半 蒸餾水六 溶解紙濾

右射注日三次

主治 右二方久淋尿道潰瘍或ハ狭窄ニ因ル者ニ好シ○

婆菱ハ此症ニ偉効アリ

包莖 龜頭瘻窄 ピモシス。エト。バラピモシス。羅フルナ一井

グ。ス。ハット。ル。デホーフト蘭

焮腫甚シキ症ハ包皮ニ蟻鍼三條乃至六條ヲ施シ次テ麥

糠及ヒ蘆烏刺兒度水ヲ以テ琶布ヲ作り微温シ施スヲ好

ト凶或ハ緩和劑ニ菲阿斯葉乳汁ヲ加ヘテ琶布ヲ作り温

暖シテ貼スルモ稱譽セリ但之ヲ施スハ慎重ヲ要ス何者

安頓緩和藥ノ温暖發法ヲ施シテ后其症寒壞疽ニ變シ尋

テ斃レ、者アリシヲ想ヘハナリ○上症ニ及ノ焮腫頗羅

斯性即水腫状ノ症ハ香竈藥ニ龍腦ヲ加ヘ千九百方至

蒸劑トスベシ○総テ包莖ハ微温乳汁或ハ遇爾托煎或ハ石灰

水。ア。加。フ。チ。九。百。三。方。ヲ射注ノ龜頭及ヒ包皮ノ内面ヲ清潔スベシ

或ハ患處感觸過敏ナラザル者ハ外汞射注法千九百方ヲ稱

用セリ寒壞疽ニ變セントスルノ恐アル者ハ藥那櫛皮ニ

止腐藥ヲ加ヘテ琶布或ハ蒸漏法トスヘシ千九百五方至

包莖ニ外術ヲ施スハ尤危険ノ法トス之ガ為ニ焮衝ヲ増

シ寒壞疽ニ變スル一愈速ナレバナリ○内服藥ハ効アル

一ナシ但シ真焮衝症ハ乳劑ニ消石ヲ和シ用ヒ十一或ハ

剥篤亞斯ニ枸椽汁ヲ和スル者方ヲ稱用ス羅斯性焮衝ハ

阿芙蓉加龍腦ニ宜シ包皮内ニ徽毒瘡アル者ハ水銀劑ヲ

用フルヲ要ス

○龜頭瘻症ハ之ヲ包莖ニ變セシムベシ蟻鍼及ヒ冷法
ヲ施セハ之ヲ變スルノ最易シ即チ龜頭ヲ冰冷水ニ浸シ
或ハ明礬溶水千九百方或ハ消石礬砂溶液千九百方ヲ以テ龜
頭ヲ掩フベシ上方効アラザルキハ毘私スリ利リヲ以テ包
皮ヲ截割スルノ外他術アルナシ其他一々包莖ノ治法
ニ同シ

○第一千九百方 薄荷葉 菲阿斯葉各半 加密列 接骨木花 豆粉

右為散作藥枕子温暖貼之

○第一千九百一方 薄荷葉 接骨木花各二 龍腦錢一

右為散用法同上

主治右二方羅斯性包莖頗神經性ヲ帶フル者ニ宜シ

○第一千九百二方 默栗薩葉 迷迭香葉 加密列 接骨木花各末

龍腦錢一

右調勻乾貼

主治水腫状包莖ニ宜シ

○第一千九百三方 層矣堊爾

石灰水一 過爾托煎三

右調勻射注包皮內

主治之ヲ射注ノ包皮内ニ鬱蓄セル汚物ヲ洗除スベシ

○第一千九百四方

升汞二 蒸餾水八一 阿芙蓉丁幾半錢溶化

右調和用法同上

主治包莖感觸靈敏ナラサル症ニ宜シ並ニ包皮内ニ發

セル疥瘡ニ好シ

○第一千九百五方(遠突土)

幾那末三 芸香葉 亞兒尼加花各末一

右調勻加温酒作毬布

○第一千九百六方(同上)

檫皮二 井水適宜煮四分時煮將熟投亞爾鮮葉蘇格

爾需謨葉各一一 浸漬八分時濾過取一坵冷定加後

味

龍腦精二

右調勻微温浴患處

主治右二方千九百五方 包莖症包皮惡色ヲ見ハシ茶褐

班ヲ生シテ寒壞疽ニ變スルノ恐アル者之ニ宜シ○此

方ヲ施スノ前焮衝極度ノ時期氷冷水ノ晝法ヲ行フベ

○第一千九百七方

木炭 藥那各六錢 水楊皮 菖蒲根各二錢

右調勻為散加赤葡萄酒作毬布微温貼患處

主治寒壞疽性包莖及龜頭箱窄ニ宜シ

○第一千九百八方私由尼阿魯

明礬 菲阿斯葉煎六弓溶解

右調和為冷罨法

主治龜頭箱窄ニ用ヒテ包皮ヲ縮収スルニ宜シ

○第一千九百九方

精製消石一錢 精製礪砂半錢 醋三錢 常水五錢

主治同上○此方病床ニ於テ調和シ鹽類溶化スルニ乘
メ用フベシ

畢九焮衝オルキチス。ゴノルロイカ羅オン
トステーキング。デルバルレン蘭

強實多血ノ人ニ在テハ放血スベシ會陰焮腫ノ部及ヒ腹

輪ニ蟻鍼八頭乃至十二頭ヲ施シ爾後裸燕麥麥糠ニ乳汁

ヲ加ヘ或ハ亞麻仁末ヲ緩和藥ニ加ヘテ毬布ヲ作り温暖

シテ之ヲ貼シ其后陰囊ヲ醋蒸氣ニ浴セシムベシ之ニ浴

スルハ洩器ヲ用フベシ最施シ易シトス兼テ瀉藥ヲ以テ

灌腸シ孕齡酒石溶液ニ滿那ヲ加フル者千八百廿九方 荅麻林度

千八百三十方 或ハ甘汞加葯刺巴千九百一十方ヲ用ヒテ瀉ヲ促

スニ宜シ千九百一十方焮衝勢退ク片ハ早晚内股ニ灰白水銀膏千九百一十方

半錢ヲ塗擦ス此ニ至レハ緩和千九百一十方釵法ヲ轉ノ解釋釵法ヲ施

スノ期トハ麥糠ヲ水ニテ煮鉛糖ヲ加ヘテ釵法トシ千九百一十方

方或ハ解凝藥末一匕中礪砂二三錢ヲ混和ノ釵法トス但

夜間ハ釵法ヲ施スニ便ナラザルガ故ニ解凝硬膏千九百一十方

ヲ貼スベシ千九百一十方○硬結腫ヲ遺ス者ハ軟膏ニ沃胃謨千九百一十方加里或ハ

沃胃謨千九百一十方ヲ和ノ千九百一十方之ヲ塗擦シ内服甘汞ニ失鳩

苔葉千九百一十方ヲ配用スベシ千九百一十方失鳩答葉釵法千九百一十方

セリ千九百一十方輓近壓定繃帶法千九百一十方ル千九百一十方トクフヲ施ノ大ニ驗アリ時々

吐劑ヲ用フルモ亦硬結腫ヲ消解スルノ効アリ

○第一千九百一十方遠突士

苔麻林度二 井水適宜煮四分時瀘過取十三ヲ溶和瀉

利鹽一三ヲ加後味

覆盆子舍利別一ヲ

右調勻每一時服半小盞以至得効

主治罽丸焮衝麻ト合併スル症ニ宜シ

○第一千九百一十方同上

甘汞一 葯刺巴 螭蛄石各一 白糖二

右調勻為散分十包每一時半服一包

主治同上

○第一千九百十二方〔同上〕

過爾托軟膏 灰白水銀膏各半

右調勻早晚取八分一塗擦外股

主治畢九燉衝麻下合併スル者燉衝証已ニ退テ后之ヲ

用

○第一千九百十三方〔其魯單溼爾〕

鉛糖錢三 醋三 蒸餾水比二 白蒸餅心適

右作琶布

主治麻後畢九燉衝ニ宜

○第一千九百十四方〔拂連屈〕

滿突刺蘘落根〔附〕 失鳩荅葉 菲阿斯葉各

右細剉調勻作琶布

○第一千九百十五方〔娵兒屈〕

菲阿斯硬膏 失鳩荅硬膏 水銀硬膏各半

右捏和

○第一千九百十六方〔弗娵兒的爾〕

沃胃謨加里 精製炭酸曹達各半 蕃薇軟膏半

右調和早晚取豆大塗擦

主治右諸方千九百十四方至千九百十六方 麻後ノ畢九硬結腫ニ宜

兼テ患處ニ細狹ノ膠着膏ヲ貼シ壓定繃帶ヲ施スベシ

○第一千九百十七方（暴訥爾也）

沃胃謨コクホク至十五 灰白水銀膏半

右調和早晚塗擦腫處

主治畢九硬結腫ニ宜シニ三日毎ニ塗擦ヲ休息スベシ

後皮膚剥爛羅斯狀ノ焮腫ヲ發スルニ由テナリ感觸靈

敏ノ人ニ在テハ殊ニ然リトス

○第一千九百十八方

甘汞ニ至十八 失鳩苔葉十六至二十四 麻僣涅失亞一

白糖錢

右調勻為散分八服早晚一服

主治畢九硬結腫ヲ解散スルニ宜シ

攝護腺焮衝グロスタチチス。コノルロイカ羅オントステ

刺絡ノ多量ノ血ヲ瀉シ屢會陰ニ放蟻シ内股ニ水銀膏ヲ

塗擦シ緩和藥ニ菲阿斯葉或ハ失鳩苔葉ヲ加ヘ緩和鎮瘻

琶布ヲ作リテ會陰ニ貼シ鎮瘻灌腸法ヲ行ヒ大量甘汞ヲ

内服セシム但瀉血後小便閉ヲ發シ或ハ瘻孿甚シキ症ハ

阿芙蓉ヲ加フベシ律私篤各八已上ノ方法ヲ用ヒテ毎ニ此

症ヲ解散セシメ化膿或ハ硬結腫トナルヲ預防セリ○若

上法効ナクメ焮腫化膿セントスル者ハ温暖琶布ヲ施シ

釀膿ヲ進ムベシ膿成レハ之ヲ尿道ヨリ漏シ或ハ會陰ヲ
 破テ排泄スヘシ其他ノ療法ハ外療書中ヲ檢スベシ○硬
 結腫ニ轉スル者ハ大量礮砂千九百二十方ヲ最良藥トス
 且沃胃謨加里軟膏千九百二十方ヲ塗擦スルニ宜シ○荅婪百兒
 名ハ會陰串線法ヲ殊稱シ内服ニ大黃消石ヲ用ヒ消石毎
晚三十
 五又八日毎ニ甘汞ハ以麻屈涅失亞半錢ニ和シ與フ○
 暴訥爾田名ハ鹽酸金鹽ヲ用フ千九百
廿二方或ハ瑞香皮及ビ烏
 白烏爾識葉煎ヲ稱用スル者アリ

○第一千九百十九方馮弗肝設爾

精製礮砂 精製甘草膏各一 蒲公英越幾斯適

右分作十二塊衣伊里私弗魯連底那末每一時服一箇
 主治麻後ノ攝護腺硬結腫ニ宜シ又膀胱粘液膜卵巢食
 道胃腸等ノ硬結腫ニ用フベシ

○第一千九百二十方麻健奎

骨霜附末 精製礮砂末一 失鳩荅越幾斯二 精製

甘草膏適

右為十二塊衣伊里私弗魯連底那末每服一箇日三次
 主治攝護腺ノ腫起及ヒ結節腫ダヌスルニ宜シ

○第一千九百二十一方颯爾滿

沃胃謨加里半 家猪脂一

遠西方膏 卷十七 攝護腺焮腫 三十三 廣月堂

右調勻作軟膏

主治攝護腺及ヒ子宮等ノ硬結腫ニ宜シ○且會陰ニ揮發膏。水銀膏ヲ塗擦シ或ハ先菁軟膏ヲ貼シ瓦爾法尼越列幾的爾海水浴等ヲ行フベシ○焮衝証ヲ兼ヌル者ハ放蟻スベシ○總テ刺衝藥ヲ塗擦ノ焮衝ヲ催起スルヲ戒慎スベシ之カ為ニ惡性膿潰ヲ為シ易スケレバナ

○第一千九百二十二方 攝錄都溼兒

鹽酸金鹽 三八至 四八 家猪脂 錢半

右丁寧調勻作軟膏

主治硬結腫。結節腫 ゲクヌイスト 骨瘤殊ニ其症徽毒ニ因セル者ニ宜シ故ニ此軟膏ヲ攝護腺硬結腫ニ亦用フベシ且此症鹽酸金鹽ヲ内服セシムベシ内用方ハ癩病水腫。徽毒。結節腫。癌腫ノ條下ニ見エタリ

徽毒焮衝眼 ビレバルオオプタルミアゴノルロイカ羅シ

痲内陷ニ因ル者ハ刺衝藥ヲ尿道ニ射注シ 千九百 廿三方 或ハ婆

艾ニ赤降汞ヲ塗リテ挿入シ陰部ニ温暖緩和罨法ヲ施シ

或ハ陰部ヲ浴スベシ少壯多血家ハ刺絡ニ宜シ輕症ハ顛

顛ニ蟻鍼八頭乃至十二頭ヲ施シ吸角法ヲ施スモ亦可ナ

ラシ乎峻誘導法トシテ項上吐酒石軟膏 六百ニ 十五方ヲ塗擦シ

屢耳後ニ芥子泥ヲ貼シ刺戟藥ヲ加ヘテ脚浴ヲ行フベシ
内服芒硝ニ精製消石及ヒ吐酒石ヲ加フル者十五方至五十
方九方至五十方瀉利鹽ニ吐酒石ヲ配スル者六方至十方等清涼瀉劑ニ宜シ或
ハ感觸銳敏ノ者ハ孕鹼酒石五方至十方酒石酸加里五方至十
方等ヲ好トス或醫甘汞ヲ稱賛ノ每服一二日ニ數服ノ
水瀉ヲ得ルヲ度トス外用ハ先眼水ニ舍電阿芙蓉液ヲ加
ヘ十九方或ハ罌粟殼煎ヲ冷用スベシ爾後升汞十九方及
ヒ皓礬溶液十九方或ハ等衝動眼水ニ宜シ○上法ニ兼テ水銀
軟膏ニ菲阿斯越幾斯ヲ加ヘテ十九方眉邊ニ塗擦スル
日數次病末ニ至リテ過多ノ粘液分泌ヲ制スルハ赤降汞

千九百三十一方或ハ白降汞千九百三十一方ヲ以テ眼軟膏ニ合和
スベシ

○第一千九百二十三方〔搦僂〕

吐酒石二方至四方 蒸餾水一弓溶化

右射注尿道

主治 德毒喉衝眼ニ施ノ尿道ヨリ流出セシ粘液ノ抑壓
ヲ喚起スルニ宜シ

○第一千九百二十四方

楨植核粘汁四錢至六 井水四 舍電阿芙蓉液十二滴至十六

右調勻洗眼日數次

主治微毒焮衝眼ノ第一期ニ用フ舍電阿芙蓉液

○第一千九百二十五方〔秘傳健別魯僞〕

外承ハ蓄薇水六錢溶化加後味

舍電阿芙蓉液錢半

右調勻為眼水

主治結膜焮衝ニ因ル者之ニ宜シ○私ハ傳健別魯僞名

先剪刀或ハミルテ名樹葉刀取テ角膜ニ屬スル所ノ

結膜ヲ截除シテ淚管ニ至リ出血止テ后又其部ヲ乱刺

ス其後毎半時上ノ眼水昆刺地名ノ方ヲ射注シ且蒸漏シ次ニ

チンストイフル貨弊名大ノ羌膏膏ヲ作りテ上視筋ノ部

ニ貼シ其發泡セル處ニ灰白水銀軟膏ヲ貼又繃帶ヲ施

ス已上ノ療法ニ由テ三日乃至四日ニメ危險ヲ防キ得

タリ

○第一千九百二十六方〔秘傳〕

皓礬一錢半 鉛醋錢半 蒸餾水十 龍腦精二錢

右調勻為眼水

主治麻毒結膜焮衝ニ宜シ○方中龍腦精ヲ去レハ之ヲ

昆刺地名ノ方十九百廿五方ニ代用メ可ナリ然レ其効力彼ニ

比シ難シ

○第一千九百二十七方 拂連幾蘆謨承半斤 牛乳一匕煮然其味以除之 右醮疊布貼眼

主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百二十八方 刺必私高斯秩屈斯以 蓂若越幾斯六

已上二味 薔薇水六弓溶解 右調勻洗眼日數次

主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ 焮衝ノ劇勢已ニ退ケハ 蓂若越幾斯ニ代ヘテ 阿芙蓉丁幾ヲ用フベシ

○第一千九百二十九方 華涅滿溶承散二 無鹽酪新鮮者 龍腦四

右調勻為眼軟膏 主治 徽毒焮衝眼瀉血後之ニ宜シ

○第一千九百三十方 菲阿私越幾斯四 灰白水銀膏半

右調勻塗擦眉邊日四次 主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百三十一方 赤降承一 無鹽酪新鮮者

右調勻塗擦眉邊日四次 主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百三十二方 赤降承一 無鹽酪新鮮者

右調勻塗擦眉邊日四次 主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ

○第一千九百三十三方 赤降承一 無鹽酪新鮮者

右調勻塗擦眉邊日四次 主治 徽毒焮衝眼ニ宜シ

右丁寧研和為軟膏早晚取豌豆大塗擦眼瞼

○第一千九百三十二方

赤降汞各三 亞鉛華各三 薔薇軟膏二

右丁寧調和為軟膏早晚塗擦瞼緣

○第一千九百三十三方

白降汞一八 至一 無鹽酪一

右丁寧調和為眼軟膏

主治石三方千九百三十三方至 徽毒炊衝眼ノ末期粘液ノ

流出過多ナル者ニ宜シ

龜頭麻ゴノルロエアゴラシジュリスロバ
ラニチス羅エイケルドロイブル蘭

患處唯微痛ヲ帶ブル症多シ此等ノ症ハ屢冷水ヲ以テ患

部ヲ洗滌スレバ暫時ニシテ治スルヲ常トス然レ若其症速

治セサルハ粘滑劑千九百三十三方 或ハ石灰水乳汁等分ノ各

劑或ハ鉛糖稀溶液千九百三十三方 既ニ患處剥爛メ底

面豕肉状ナル者ハ升汞稀溶液ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘ千九百三十三方

或ハ硝酸汞溶液ニ水多量ヲ加ヘテ稀釋シ千九百三十三方

用フベシ已上ノ諸藥ハ患處ニ點滴スルニ宜シ之ヲ綿撒

絲ニ醮シテ龜頭ト包皮ノ間ニ挿ムモ亦可ナリ然レ包皮

龜頭ヲ覆フテ之ヲ外翻シ能ハザル者ハ上ノ水劑ヲ以テ

龜頭ト包皮トノ間ニ射注スル毎日數次スベシ此症再

發ラ防クハ久ク硝酸汞溶液ヲ連用スルヲ要トス第一千九百三十八方ノ金屬溶液モ亦稱用スベシ大抵包皮ヲ外翻メ龜頭ヲ空氣ニ觸レシメ以テ此症再發ヲ禦クニ足ル

○内服藥ハ蛇足ニ屬ス唯患處ノ剥爛恐ルベキ景況アル

キハ慎重ノ汞劑ヲ用フベシ

○第一千九百三十四方

榎植核汁一錢至 井水六

右調勻供外用

○第一千九百三十五方

鉛糖四八至 蒸餾水六ヲ溶化

右調勻供外用

○第一千九百三十六方遠突土

升汞二 蒸餾水二ヲ溶解加後味

阿芙蓉丁幾

右調勻供外用

○第一千九百三十七方同上

硝酸汞溶液二 蒸餾水二

右調勻外用

主治一千九百三十四方ヨリ一千九百三十七方至龜頭

麻ニ宜シ

○第一千九百三十八方同上

生升承ハ鉛糖カ半 蒸餾水四可溶化加後味

白亞鉛華カ

右調外用日二三次臨用宜振盪

主治龜頭贅留焮衝及ハ粟粒疹ノ素因ヲ治スルニ宜シ

○此合劑分離術ノ則ニ違フト雖然ハ其効大ナリトス

白帶下グレノルロエアヲギナエ○レウコル○エ○フ

テ○井ツテフ
ル○ト蘭水○ニ○テ○テ○テ○

一ニ之ヲ婦人麻ト名ク此症他人ヨリ傳染シ獲ル者ト全

身或ハ局處ノ弛緩ニ由テ自ラ發スル者ト能ク區別スヘ

○大率傳染症ハ經過更ニ急ニノ其治男子ノ麻ト同シ

但稍斟酌アルノニ焮衝勢劇シキ者ハ罕ナルガ故ニ焮衝

ノ時期ニ方テ乳汁ニ石灰水ヲ加ヘ或ハ鉛糖稀溶液ノ射

注法ヲ施スベシ焮衝既ニ退クキハ速ニ収斂衝動ノ射注

法ヲ行フ一猶男子ノ麻ニ於ルガ如シ千ハ百八十二方至

九百五十四方至 内服拔爾撒謨骨汗霍 千八百四十六方至

葦澄茄千八百六十二方至 其他前ニ揭ル所ノ収斂密藥私

去爾千八百六十九方至 其與○佐治法トノ琥珀乳香鵝栗

拔奴謨其他拔爾撒謨劑ノ薰法ヲ施スベシ○火爾滿名布線

ヲ以テ耽朴ヲ作りテ腔中ニ充填シ分泌粘液ヲ吸收セシ

ノ或ハ之ニ明礬ヲ塗リテ挿入スト云フ○男子ノ麻ハ交
 感症ヲ發スルノ恐アルガ故ニ更ニ難症トス婦人ノ麻ハ
 通例患部弛緩シ慢性ヲ帶フルカ故ニ經過多クハ緩ナリ
 患處剥爛セントスルノ恐アラハ其第二病ヲ繼發スルノ
 危険ナルガ故ニ承劑ヲ須要トス○自發白帶下ハ先其病
 因ヲ治スルヲ要ス乃腹内閉塞。癭瘰質。依倔篤質。皮疹内陷。
 脚汗閉止等是ナリ爾後板爾撒謨骨。汗霍。華澄茄。的列並油。
 薩昆那。白續。断花。明礬。錢劑等ノ如キ症ノ特效藥ヲ用フ
 ベシ上ノ諸藥ニ兼テ射注法ヲ行ハベシ但先緩劑ヲ以テ
 シ漸ク劇劑ニ轉スルヲ良トス然レ過劇ノ品ハ害アリ之

ガ為ニ硬結腫及ヒ癭腫ノ基因ヲ萌生シ易ケレハナリ。ピ
 ロモンテル鑽泉名チリビュルゲル同及ヒス。パウリ同トル同偉
 効アリ河水浴及ヒ海水浴モ亦好トス

○第一千九百三十九方

蘧謨安沒尼垂幾 白石鹼 蒲公英越幾斯 牛胆

大黃末各二錢

右調勻二匹為一九夜石松粉早晚服五丸

○第一千九百四十方秘訣蘭度

大黃ハ 螻蛄石ハ

右調勻為散分八包早晚一服

主治右二方白帶下腹內壅塞ヲ兼ヲル者ニ宜シ

○第一千九百四十一方〔常布〕

百屈林子一乃至半錢 白續斷花一錢半

右細剉調勻分十四晷朝午晚取一晷熱湯一盞泡出飲服

主治白帶下ニ宜シ○此泡劑ハ殊効藥トス但久服ヲ要

ス

○第一千九百四十二方 喝兒祿爾名人 拔爾撒謨越栗失爾

拔爾撒謨骨泮霍再留的列並油 再留琥珀油各一錢

右調勻每服三十滴乃至六十滴沙糖和服日三次服後當

飲赤葡萄酒半盞

主治白帶下及その他ノ粘液流出症及ヒ遺精ニ良トス

○第一千九百四十三方〔茂魯列謨〕

蒲刺實爾收斂皮煎 附三 拔爾撒謨骨泮霍和雞子黃者

林檎酸鐵丁幾附各一錢 拔爾撒謨舍利別半 蒼草蘇

右調勻每一時服一食匙

主治久麻及ヒ白帶下ニ宜シ

○第一千九百四十四方〔的爾矣別魯士〕

勿擲祭亞的列並底那附二錢 白石鹼三錢 過兒把末適宜

右調和二ハ為一丸夜石松粉早晚服五丸乃至十丸

○第一千九百四十五方

甲方 千九百四十五方

○大黃末錢半 橙葉末 應的刺皮末各錢半 至麻僞涅失

右調勻為散朝午晚服一茶匙

○第一千九百四十五方

乙方 下

麻爾羅歇葉 烏白烏爾識葉 默栗薩葉 著草穗

橙皮各二錢 續斷花半 對爾嫩骨 雜靈

右細剉調勻每次取一食匙注滾湯三盞泡出

主治右二方白帶下 宜 甲方 服之 每後元方

○盞ヲ飲ムベシ

○第一千九百四十六方 拔爾的兒起

刺達尼丁幾錢一

右每服十滴日三次漸加增

主治白帶下 宜 兼テ刺達尼濃煎ヲ外用スベシ但先

單味之ヲ用ヒ後刺達尼越幾斯ヲ加ヌ

○第一千九百四十七方 秘的印別爾傑魯

健質亞那越幾斯 亞爾鮮越幾斯各一錢半 葛私加栗刺

皮末 亞爾鮮葉各適宜

右調勻二瓜為一丸 衣桂末每服五丸日三次

遠西方藥

卷九

白帶下

四三

廣

丹

主治 白帶下宜以爾後鐵下幾又用口三六

○第一千九百四十八方弗陽

沒藥 乳香 瘰瘡木脂 各一錢 蜀羊泉 越幾斯 各一錢

濱瞿麥 越幾斯 各一錢

右調勻二以為一丸 衣石粉粉每服八丸 日三次

主治 陽名之月經久白帶下三用七行屢効得夕日

○第一千九百四十九方穢歌蘭度

阿仙藥 明礬 幾那越幾斯 各三錢

右調勻二以為一丸 衣桂末每二時半服四丸

○第一千九百五十方忽倫

拳參 越幾斯 各半 沒藥末 撒兒末 爾秩斯 各半

右調勻二以為一丸 衣桂末每二時半服六丸

○第一千九百五十一方骨布蘭度

龍腦 撒爾末 兒秩斯 硫酸規尼 各一錢 加密列越

幾斯 拔爾撒謨 字露 各一錢

右調勻為三十九 衣桂末每服二三九 日二三次

○第一千九百五十二方春煙隣

格碌屈私末 兒秩斯 葛私加栗刺末 絀百設木越

幾斯 乾者各一錢半 健質亞那越幾斯 各一錢

右調勻二以為一丸 衣石粉粉每服五丸 乃至十九日 三次

遠西本草 卷十七 白帶下 廣勝堂

主治 千九百四十九方ヨリ千九百五十二方至白帶下ニ
宜シ

○第一千九百五十三方〔福爾嘴〕

明礬 礪鍊花 芳香散 幾那越幾斯寒製各半錢 桂油

十二滴

右調勻二匁為一九衣桂末玻璃壘收貯早晚服五九乃至十九

○主治 白帶下其人粘液質者之ニ宜シ

○第一千九百五十四方〔邊傑栗屈的鬼〕

阿芙蓉越幾斯水製一錢 薔薇水八匁溶化加後味

密陀醋一匁 榎楂核汁一匁

右調勻微温射注患處日二三次

○主治 白帶下腔中ノ感觸尤進セル者ニ用フ○薤謨漿及

ヒ鉛糖ヲ用フルヨリ榎楂核汁密陀醋ヲ更ニ良トス何

者沈澱スルヲナケレハナリ

○第一千九百五十五方〔骨布〕

薩毘那葉一匁半 井水適宜煮濾過取十二匁二匁日

右供射注劑

○主治 白帶下子宮ノ弛緩ニ因ル者是ニ宜シ

○第一千九百五十六方

膽礬五六八至

井水一坵溶化

右供射注劑

主治白帶下嫩衝既ニ退キテ后患者ノ體質ニ由テ緩慢

症ニ變スルノ恐アル者ニ用フ○千八百八十二方ヨリ

○千八百九十二方至亦同上ノ症ニ施スベシ

○第一千九百五十七方骨布

刺達尼根錢十 井水三坵煮耗至一坵濾過放冷加後味

刺達尼越幾斯錢半 阿仙藥丁幾 吉納丁幾錢各半

右調勻供外用

主治白帶下ニ宜シ每晚臨卧尿利ノ后海綿ヲ取テ上ノ

煎液ニ醱シ腔中ニ挿入ス○脫腔ニモ亦能ク適當ス

遠西方彙

卷十七

白帶下

五

廣月堂

遠西方彙卷之十八
 一、白帶下
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、
 十一、
 十二、
 十三、
 十四、
 十五、
 十六、
 十七、
 十八、
 十九、
 二十、
 二十一、
 二十二、
 二十三、
 二十四、
 二十五、
 二十六、
 二十七、
 二十八、
 二十九、
 三十、

遠西方彙卷之十八

獨乙 加幾安頓白 著

和蘭 傑婆婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯

南洋伊東 健夫 參校

乙排泄失常症

慢性嘔吐

嘔吐ノ治法其因ニ從テ諸種ノ別ヲ以テ胃腸汚物ノ吐下

劑ニ宜シク慢性燃衝ニ因ル者ハ蟻鉞ニ宜シク樓麻質斯

遠西方彙

慢性嘔吐

廣月堂

或ハ依倨篤ニ原ツク者ハ芥子泥羌膏若クハ吐酒石軟膏ニ宜シク胃ハ神經敏捷ニ因ル者ハ鎮痙藥及ヒ沸騰散ニ宜シク千九百五十八方至千九百六十三方器敗ヨリ發スル者ハ其症ニ應メ的當ノ術ヲ行フヘシ○總テ慢性嘔吐ハ其因器敗ニアル者モ亦一時毎ニ乳汁一小盞ヲ飲服セシムルヲ主藥トス以テ其元氣ヲ保テ治ヲ試ムヘキナリ乳汁灌腸モ亦併用スヘシ

○第一千九百五十八方

過炭酸曹達四

酒石酸一錢

枸橼油糖一

白糖十六

右調勻每半時取一茶匙乘沸騰飲服

○第一千九百五十九方

過炭酸曹達八

酒石酸五

白糖半

右調勻為散分六裹每半時取一裹乘沸騰飲服

○第一千九百六十方

甲方

過炭酸曹達半

右分六服白紙包裹與之

乙方

酒石酸半

右分六服青紙包裹與之

○每半時取甲方一裹沙糖水半小盞溶化投乙方一裹乘沸騰飲服

○第一千九百六十一方

甲方

炭酸剝篤亞斯

半刀

枸橼油糖

五八

右調勻為散分七服白紙包裹與之

乙方

酒石酸

各八

白糖

各八

右調勻為散分八服青紙包裹與之

○用法同前

○第一千九百六十二方

麻瘋涅失亞

茴香油糖

各二錢

右調勻為散

私葛點刺

玻璃器名

收貯每服取一茶匙以冷水少許及枸橼汁加沙糖者一食匙頓服

○第一千九百六十三方

麻瘋涅失亞

半錢

純精酒石

枸橼油糖

各二錢

右調和為散玻璃壘收貯每半時取一茶匙冷水少許送下

主治千九百五十八方より千九百六十三方至嘔吐胃ノ

感觸過敏ニ因ル者ニ宜シ先胃部ニ芥子硬膏ヲ貼メ后

沸騰散ヲ與フハニ標悍ノ品モ亦許シ與フハ痔症ハ商

湯酒 蓋沸騰ニ乗シ飲服セシメテ甚効アリ或ハ胃ノ
 感覺走進ノ服藥ニ堪ヌサル者往ニ之テ亦宜ク以氷塊
 或ハ冷水一匙ヲ與フヘシ總テ大量ニ藥ヲ與ルテ胃ヲ
 飽滿セシメテ亦勿レ○此他第一方三方及ハ百方
 ヲ參照スベシ

○第一千九百六十四方 賦歌蘭慶

持酒石鹽錢ニ 新絞枸橛汁適宜飽和為度 默栗薩水三 菲阿

右每半時服ニ食匙

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ○此方効ヲ得サルキハ阿芙蓉

丁幾八滴ヲ加フ

○第一千九百六十五方 同上

複方乳香精附六 忽弗滿振爾撒謨非答 阿芙蓉

丁幾錢二

右調勻塗擦胃部或為罨法

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ且綿苔幾里私布ヲ酒煮シ布囊
 ニ盛リテ藥枕子ヲ作り胃部ニ襯シ或ハ芥子泥ヲ貼シ
 殊ニ乾角法ヲ施スヘシ此ニ由テ劇吐止ム一屢之アリ

○第一千九百六十六方 朴滌秘

過炭酸刺馬亞斯 枸橛油糖各一 蒸餾水ニ可溶化

右時之服一食匙

主治嘔吐ニ宜シ○此方服スルニ臨ミテ先枸櫞汁三四茶匙ニ沙糖水少許ヲ和シ服スベシ

第一千九百六十七方 福倔列爾名入鎮嘔散

吐根末三 純精酒石二 白糖六

右調勻為散每服半食匙乃至一食匙

主治嘔吐ヲ鎮靖スルニ宜シ

第一千九百六十八方 骨布

吐根末六 叔格刺度適

右為百二十錠每二時服一錠

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ殊ニ妊婦ノ嘔吐ニ好トス

第一千九百六十九方 福傑兒

精製阿芙蓉二 綿苔幾里私布油糖一

右調勻為散分六裹每服一裹日三次

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ○一病者二年來飲食スル毎ニ

後必嘔吐ス福傑兒氏此ヲ用ヒテ治セリト云フ

第一千九百七十方 栗屈的爾

過設印亞的兒 續草亞的兒丁幾 阿芙蓉液各一

右調勻每一時十滴乃至三十滴沙糖和服

主治痙攣性嘔吐ニ宜シ○此人如キ有力ノ鎮痙藥ハ服

透五方彙 卷五 慢性嘔吐 五 廣 膠 堂

スルニ堪ヘサル者屢之アリ故ハ每常更ニ緩テ藥劑ヲ撰ミテ先少量ヨリ進ムベシ即過設印亞的兒三四滴白蒸餅小塊ヲ酒ニ醮ス者薄荷錠ハ一二個等ニ宜シ

○第一千九百七十一方 戒歇蘭度

橙皮丁幾 葛私薦樓謨丁幾 蘆薈丁幾 各一錢

右調勻每服十五滴日三次

主治歇倚私的利家ノ嘔吐頭痛ニセハラヨホ屢發作スル者其發作ノ間隙ニ方テ之ヲ用ヒテ偉効アリ○戒歇蘭

度著書載スル所ノ用量每服六十滴日ニ二次トク愚按

スルニ過多ナリ

○第一千九百七十二方 同上

瓦爾拔奴謨硬膏 龍腦 揮發鹿角鹽 阿芙蓉

錢各半 加耶普的油 薄荷油 各廿滴

右捏和取一握攤革貼胃部

主治船注ニ宜シ

○第一千九百七十三方 蔡垣隣

瓦爾拔奴謨硬膏 龍腦 揮發鹿角鹽 加耶普的油 各半

普的油 四十滴

右調和作硬膏攤革貼胃部

主治痙攣性嘔吐。船注等三宜シ。○輓近船注ニ結列阿速
多ヲ稱用ス

○第一千九百七十四方同上

麻屈涅失亞 孕礬酒石 大黃 芳香散各二錢

右調勻為散每服一小食匙日三四次

主治早旦嘔吐及ヒ過酒家ノ嘔吐ニ宜シ

○第一千九百七十五方

失鳩峇越幾斯半錢 老利兒結爾斯水半ヲ溶化

右調勻早晚服三十滴

主治同上

○第一千九百七十六方

枸橼酸安沒尼亞精半錢 菩提樹花水四錢

右調勻每一時服一食匙

主治 枸橼酸安沒尼亞精確砂華一分冷水五分一溶化シ

和セハ早且嘔吐ノ殊藥タリ按スルニ是民埜列里精ト

同効ナリ英吉利及ヒ拂郎斯ニ於テハ之ヲ發汗劑トシ

熱病ニ用フ

○第一千九百七十七方懸格魯杜

麻屈涅失亞二錢 酒石酸半錢 枸橼油糖一錢

右調勻為散私葛點刺名器取貯每服取一茶匙加冷水乘沸

滾服

主治 妊婦ノ嘔吐ニ宜シ ○嘔吐病人口ヲ戒スルヲ嚴ニ過クル勿シ難化ノ食餌却テ消化易キ者ニ勝リテ能ク胃ニ堪フルヲ問之アリ ○倚拂朗屈各人ノ經驗ニ從フニ大抵妊婦ハ油煤肉硬固蒸餅葡萄酒及冷水一盞ヲ最良ノ飲食トスト云フ ○謁弗西暴爾土人ハ默栗薩水桂水等分ヲ稱用ス或ハ諸藥寸驗ナク妊娠五六個月ヲ過テ嘔吐自ラ止ム者屢之アリ

○第一千九百七十八方（妊婦） 越栗失爾茂印失屈篤 龍涎香丁幾各半

右調勻每服四十滴日三次

主治 妊婦ノ嘔吐ニ宜シ兼テ胸上ニ芳香硬膏一千九百七

ヲ貼ス ○屋爾噶私地ノ歇魯列爾各人此方ノ殊効ヲ確

徴セリ ○鴿屑各人ノ經驗ニ據ルニ桂酒水ニ龍涎香丁幾

ヲ加エテ香竄藥ノ泡劑ニ和服シ屢良効アリト云フ只

胃ニ循ル血絡ノ盈張嘔吐ノ原因ナラバ此症妊婦甚多此方

害アリ而ノ刺絡最良効アリ

○第一千九百七十九方（癩駝蘭度）

収斂亞的兒錢一 龍涎香丁幾錢二

右調勻每服三十滴日三次冷水一小盞點服

主治同上

○第一千九百八十方〔瀝格魯杜〕

麻屈涅失半錢 大黃丁幾水製六錢 橙皮舍利別二錢

右調勻每一時乃至二時半服一茶匙

主治小兒嘔吐胃中酸敗液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千九百八十一方 碱歇蘭度名小兒應用鎮痙散

檯寄生 蜎蛄石 鹿角屑 纈草各一錢

右細末為散每服一小刀尖日三四次

主治幼兒酸敗液泄瀉嘔吐生齒刺衝其他神經性諸証ニ

宜シ

泄瀉ジロアロヘア羅ド

泄瀉ハ他病ノ見証トノ發スル者常ニ多シ故ニ其原因ヲ制スルヲ醫治ノ專務トス是故ニ先其功ヲ収メテ而後泄瀉ヲ止ムルモ病者ニ害アラサルニ至リ方ニ之ヲ治スル

ノ方法ヲ議スベキナリ最初粘滑藥油質藥粘滑乳劑五百方至五百卅三方千九百八十四方千九百八十五方沙列布煎舍雷發白煎三百八或ハ漿粉灌腸百九十八方二千十八方等ヲ施メ排泄物ノ酷厲

ヲ制シ以テ腸ノ感觸ヲ緩和スルヲ要ス次ニ腸管ノ感覺ヲ減殺スヘシ是阿芙蓉及ヒ吐根千九百八十三方ノ主トル所ナリ之ニ由テ功ヲ収ムルヲ常ニ多シ若効アラザ

ル片ハ收斂保固劑ヲ用ヒテ腸ノ粘液膜ノ分泌機ヲ制ス
 ヘシ然レ此劑不相當ノ症ニ在テハ害ヲ招ク下屢之アリ
 收斂保固劑ニ屬スル品ハ即大黃千九百八十七方至 依蘭
 苔格綸僕千九百九十八方 葛私加栗刺皮二千二方至 亞兒尼加
 根二千三方至 刺達尼西根六千二方 西瑪劉拔皮七千二方 紺百設木
 九方阿仙藥十方 赤石脂一方 等是ナリ○輓近泄瀉ヲ治
 スル一種ノ藥アリ即硝酸銀九百九十二方 鉛糖三百九十方
 木鼈千九百九十七方ノ如キ佳稱アリ○肚腹ニ香竈溫暖
 罨法ヲ施スハ泄瀉並ニ胃腸ノ膨脹及ヒ痙攣症ニ殊効アリ
 裸麥製蒸餅細末ハ食匙乃至十食匙 丁子搗末一茶匙乃

遠西本草 卷之九 泄瀉 九

至二茶匙。肉豆蔻研末或ハ格墨因一茶匙ヲ取テ調和シ赤
 葡萄酒若クハ燒酒三四食匙ヲ加ヘテ泥上ナシ適宜ノ稠
 ラ得セシメ二重麻布間ニ塗ル其厚ヤ手指横經可リ此ノ
 如ク琶布ヲ作り竈上ニ煖メ以テ全腹ヲ掩フ此琶布ヲ貼
 シ四時五時乃至六時ヲ經テ之ヲ去リ次日又赤葡萄酒或
 ハ燒酒少許ヲ加ヘ煖メテ以テ再貼スベシ○此他諸種ノ
 藥局製胃硬膏及ヒ肚腹香竈塗擦方皆佳効アリ○小兒泄
 瀉ヲ治スルノ應用方其最良ノ者ヲ撰テ二千十九方ヨリ
 二千十八方至ニ列載セリ

○第一千九百八十二方

遠西本草 卷之九 泄瀉 九

○精製阿芙蓉末各一錢吐根末各一錢白糖二錢

右調勻為散分四服早晚一服

主治單純泄瀉宜或八其症準之天日四服セシ

○第一千九百八十三方

吐根十五錢至六錢滾湯適宜浸瀝過取四勺加後味

亞刺昆亞護謨漿半勺阿芙蓉液六滴至十滴

右調勻每一時服一食匙

主治泄瀉腸人感觸充進スルニ因ル者之ニ宜

○第一千九百八十四方

甘扁桃油二錢亞刺昆亞護謨漿六錢加黑櫻實水四

勺混和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾八滴遇見托舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙

○第一千九百八十五方

甘扁桃油二錢亞刺昆亞護謨漿半勺雞子黃一箇加

井水四勺搗和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾八滴扁桃乳舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙

主治右二方十九百八十四方尋常夏月泄瀉ニ宜

○第一千九百八十五方

甘扁桃油二錢亞刺昆亞護謨漿半勺雞子黃一箇加

井水四勺搗和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾八滴扁桃乳舍利別半勺

右調勻每一時服一食匙

主治右二方十九百八十四方尋常夏月泄瀉ニ宜

其症ニ準シ千九百八十二方ヲ與フベシ

○第一千九百八十六方 穢歌蘭度

甘扁桃油一 精製礞砂二 亞刺昆亞護護漿半 井

水六 菲阿斯越幾斯六 扁桃舍利別一

右調勻作乳劑每一時服ニ食匙

主治水瀉症腸痛劇甚舌上苔ヲ帶フル者ニ宜シ○方中

ノ礞砂總テ二錢ニ足レリ又按スルニ此方全量過多

ナリ殊ニ夏月炎熱ノ候此乳劑宿用スベカラザルカ故

ニ半劑ヲ處スルヲ好トス

○第一千九百八十七方 仰設松訖爾屈

此方全量過多

沙列布半 井水ハ乃煮瀘過加後味

礞砂一 大黃丁幾一 舍電阿芙蓉液一 實亞格

地温一

右調勻每半時或一時服ニ食匙

主治腹痛泄瀉ニ宜シ此方亦半劑ヲ處スルヲ更ニ好ト

ス

○第一千九百八十八方

大黃丁幾水製

右每服一茶匙日四次

主治七八月ノ際屢發スル所ノ尋常泄瀉ニ宜シ但大黃

ヲ散トシ用フレ、更ニ効アリ、尋常散ニ宜シ、且、四、大、黃

○第一千九百八十九方〔穢歇蘭度〕

大黃丁幾水製 薄荷水ヲ 蒸餾水ヲ 精製硃砂錢一

○過兒托舍利別ヲ

右調勻每一時半服五食匙

主治尋常夏月泄瀉ニ宜シ、亦、半、價、ヲ、更、ニ、散、ト、シ、

○第一千九百九十方

大黃末錢半 白糖刀四

右調勻為散分八服每一時半乃至二時一服

主治夏月泄瀉ニ用心テ屢効アリ、但諸果實、菜蔬、萵苣、酸

性物、麥酒等ヲ戒メ、只粘滑ノ飲食ヲ與フヘシ

○第一千九百九十一方〔穢歇蘭度〕

大黃末刀六 吐根末刀二 牡蠣末刀四

右調勻為散分八服每四分時一服

主治水瀉ニ宜シ

○第一千九百九十二方〔同上〕

大黃末刀二 蜥蜴石 薤謨散各一 舍電阿芙蓉液滴二

肉豆蔻末刀三

右調勻為散分六服日二服乃至三服

○第一千九百九十三方〔邊、佛、栗、屈、的、兒〕

遠西方藥 卷八 泄瀉 三 廣 堂

大黃丁幾 水製 結列印健胃丁幾 桂水各一 阿笑

蓉丁幾 四十滴

右調勻每服一食匙日三四次

主治泄瀉症腸弛緩ニ由ル者ニ宜シ

○第一千九百九十四方 抄瀝私

鹽酸 格綸僕越幾斯 格綸僕末 各一錢 沙列布末 適宜

右為八十九衣桂末玻璃壘收貯每服十九日四次

主治膽液性泄瀉ニ宜シ

○第一千九百九十五方 骨布

結晶硝酸銀 三 蒸餾水適宜溶化加後味

甘草末 適宜

右調勻不加他味為三十六丸衣銀箔每一時服一九日服

主治骨布 名 此方ヲ胃瘧吃逆慢性嘔吐乾嘔疝神經症ニ

稱用セリ ○肝爾私 名 泄瀉虛嫩衝ニ由リテ而メ將ニ腸

ノ潰爛症ニ移ラケトスル者ニ此方偉効アリトス

○第一千九百九十六方 飛歇蘭度

番木鱉越幾斯 三 肉豆蔻 四 刺蝟石 半

右調勻為散分六服日三服乃至四服

主治慢性泄瀉ニ用ヒテ間偉効アリ

○第一千九百九十七方 利歇林兒地涅爾欣

番木鱉越幾斯西兒箇 大黃末 水銀九料各八 格

碌屈私末爾秩斯糖十六 阿芙蓉二 甘草膏適

右為十六丸衣石松粉每服一九日三次

主治弛緩性泄瀉尋常ノ保固收瀉藥効ナキ者之ニ宜シ

通例之ヲ用フルト三日ニメ已ニ良効アリ連進十四日

ヨリ久シキヲ要スル症ハ罕ナリ涅爾欣名此効ヲ專番

木鱉ニ歸ス番木鱉ハ腸ニ循ル神經運管ヲ進メ以テ乳

糜脈ヲメ能ク養液ヲ吸收セシメ且大腸ニ屎ヲ貯留セ

シムルニ由ラナリ鐵ハ保固ノ効アリ方中ノ小量大黃

及ヒ水銀ハ瀉下ノ効ヲ奏セズノ分泌管ノ運機ヲ復ス

阿芙蓉ハ去ルヘキ症往々之アリ

○第一千九百九十八方私弗蘭屈

格綸僕末錢二 府利油糖錢一

右調勻為散分六服日四服

○第一千九百九十九方穢歇蘭度

格綸僕末半 井水十二勺煮耗至六勺濾過加後藥

橙皮舍利別一 舍電阿芙蓉液十滴

右調勻每一時服一食匙

○第二千方別連杜

格綸僕末半 水十勺煮耗至六勺投葛私加栗刺二錢

遠西於藥 卷十八 泄瀉 十一 廣 胆 堂

瀉過加後藥

橙皮丁幾錢二 桂舍利別一

右調勻每一時半服一食匙

主治千九百九十八方ヨリ二千方至皆泄瀉習僻ノ症殊

ニ其症弛緩ニ由ル者ニ宜シ

○第二千一方歌憶

阿芙蓉末 吐根末各五 葛私加栗刺越幾斯錢一 阿

仙藥末適宜

右為七十五丸衣桂末每服二丸日三次

主治弛緩泄瀉ニ宜シ

○第二千二方歌蘭度

葛私加栗刺越幾斯錢一 薄荷水 加密列水各二 亞

刺毘亞護謨漿半

右調勻每一時服一食匙

主治泄瀉ヲ止ムルニ宜シ藥害アルナシ

○第二千三方同上

亞兒尼加越幾斯 格綸僕越幾斯 著草越幾斯

硫黃華各二錢

右調勻二丸為一九衣石松粉每服十九日三次

○第二千四方別連杜

遠西坊齋 卷六 泄瀉 廣 堂

亞兒尼加根 格綸僕根各二錢 葛私加栗刺皮三錢

滾湯適宜浸漬瀝取七勺加後味

橙皮舍利別一

右調勻每一時半服一食匙

○第二千五方賊歇蘭度

亞兒尼加根三錢 葛私加栗刺二錢 井水十勺煮耗至

六勺瀝過加後味

阿仙藥丁幾一錢 舍電阿芙蓉液十二滴 過兒托舍利別一

右調勻每服二食匙日四次

主治 二千三方ヨリ二千五方至泄瀉習僻症或ハ慢性症

ニ宜シ

○第二千六方設倚迷謁爾

刺達尼根末二錢 精製阿芙蓉一 白糖四

右調勻為散分八服每一時半一服

主治 習僻泄瀉ニ宜シ

○第二千七方密都兒利弗

西瑪爾拔皮二錢至六錢附 常水適宜煮瀝取六勺加後藥

橙皮舍利別一

右調勻每一時服一食匙

主治慢性泄瀉ニ宜シ並ニ格列刺ノ末期熱及ヒ炊衝証退キテ后之ヲ用フ

○第二千八方 辨歌蘭度

府利下幾 弓半 舍電阿芙蓉液 錢半

右調勻每服三十滴日三四次

主治習僻及ヒ弛緩ニ由ル泄瀉他藥効ナキ者此方佳効ヲ得ルコト多シ

○第二千九方 同上

紺百設木末 弓一 橙皮 錢半 井水十二弓煮熟至八

弓濃過加後味

橙皮舍利別 弓一
右調勻每一時服ニ食匙
主治習僻泄瀉ニ宜シ但小量阿芙蓉液ヲ加フルノ症モ亦之アリ

○第二千十方 福傑兒

阿仙藥 錢半 精製阿芙蓉 錢六 丁子油糖 弓半

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半服一晝

○第二千十一方 辨歌蘭度

赤石脂 錢半 肉豆蔻 錢三

右調勻為散分六服每一時半一服

○第二千十二方列設爾

升鍊鹽錢二 蒸餾水三勺溶化

右調勻每服半食匙乃至一食匙日三四次

主治二千十方ヨリ二千十二方至泄瀉ニ用ヒテ腸ノ分

泌運營ヲ直ニ制止スルノ効アリ

○第二千十三方弗陽

生明礬 葛私加栗刺越幾斯錢各一 加密列水四 亞

刺毘亞護謨 橙皮舍利別各半

右調勻每一時服一食匙

主治泄瀉腸ノ衰弱弛緩ニ因ル者ニ宜シ但明礬ヲ用フ

ルハ最慎重スヘシ其最之ヲ禁戒スベキハ腸中瘀物及

ヒ腹内畜血アル者はナリ

○第二千十四方法列魯

蕁麻半 井水半綿首魯容量 浸漬飽熟八分時乃至

四分時

右每半時一小盞温服

主治格列刺狀泄瀉及ヒ格列刺ニ宜シ

○第二千十五方骨布

升汞六分 蒸餾水一 亞刺毘亞護謨漿

精製阿芙蓉末一

遊西方藥 卷廿六 泄瀉 藥 廣 胆 堂

右調勻二分每次取一盞温煖灌腸

主治慢性泄瀉及ヒ格列刺症阿芙蓉及ヒ他藥効ナキ者

之ニ宜シ

○第二千十六方

漿粉二錢 井水一北煮放冷加後味

雞子黃二個

右調勻灌腸

○主治漿粉灌腸ハ泄瀉ニ良効アリ但小量ニ灌キ且極

テ久シク腸中ニ保持スルヲ要ス○燕麥粘汁ニ新鮮雞

子黄ヲ和シ灌腸スル亦良驗アリ百九十八方 參照ス

○第二千十七方

漿粉一錢至二錢 加冷水少許捏為泥更加熱湯六勺乃

至ハ勺溶解放冷再加後藥

舍電阿芙蓉液一刃至半錢

右調勻灌腸

主治水瀉或ハ酷厲物ヲ瀉スル者之ニ宜シ

○第二千十八方福屈篤

漿粉一刃 阿芙蓉越幾斯水製一ハ半 熱湯四勺

右調勻四分取其一温煖灌腸日二次

主治瀉ヲ止ムルニ宜シ

○第二千十九方

亞刺昆亞蘆謨漿 菩提樹花水各一 過兒托舍利別

錢三

右調勻每半時服二茶匙

主治 小兒熱性泄瀉ニ宜シ

○第二千二十方 (刺胃私)

甘扁桃油半一錢 亞刺昆亞蘆謨錢半 加密列水半一

右為乳劑加沙糖二錢調勻每半時或一時服二茶匙

主治 幼兒泄瀉ニ宜シ 大兒ニ用フル片ハ阿芙蓉丁幾一

二滴ヲ加ヘテ可ナリ

○第二千二十一方 (過傑栗屈的兒)

甘扁桃油 亞刺昆亞蘆謨 扁桃舍利別各二錢 桂水

半 苗香水一 已上五味調勻每半時服一二茶匙

主治 幼兒泄瀉ニ宜シ 香竄胃硬膏及ヒ漿粉灌腸モ亦兼

施スベシ

○第二千二十二方 (帶栗結)

過兒托煎二 甘扁桃油 亞刺昆亞蘆謨末各二錢

磁砂加過泥子精廿五滴 冰糖二錢

右調勻每半時或一時服一茶匙

主治 初生後二三個月ヨリ二歳至ノ兒粘液膜諸病皮表

ノ運營妨碍ニ由テ發スル者即疝泄瀉等ニ宜シ

○第二千二十三方（速突也）

沙列布淡煎三 大黃丁二 桂水半 白糖二

右調勻每半時服ニ茶匙

○主治 嬰兒無熱泄瀉症舌上苔ヲ帶フル者之ニ宜シ

○第二千二十四方（穢歌蘭度）

蜷蛄石 苗香油糖 遏兒托末各二 舍電阿芙蓉液

滴一

右調勻為散分四服每二時一服

○備考 小兒ノ泄瀉ヲ遏止スルハ極メテ慎重スヘシ而メ

阿芙蓉ノ如キハ僅ニ其量ヲ過キ或ハ不適當ノ症ニ之

ヲ用フレバ速ニ卒中狀ノ症ヲ發メ斃ル世人之ヲ諳知

スルヲ久シ是故ニ上ノ散方ヲ處スル前更ニ緩藥ヲ

施スナリ即油質粘滑乳劑或ハ之ニ雞子黃ヲ加フル者

沙列布煎米飲雞卵水漿粉灌腸肚腹肉豆蔻拔爾撒謨（附）

冷擦自製蒸餅心胃硬膏香竄温煖赤葡萄酒等是ナリ已

上方法ヲ用ヒテ効ナク泄瀉頑然トノ止マズ將ニ知覺

過敏症ニ陥ントスル片ハ上ノ散藥一晷ヲ與フ之ニ由

テ泄瀉速ニ鎮定スヘシ但已ハヲ得ザルノ症ニアラザ

レハ二時一後一第二晷第三晷或ハ第四晷ヲ連用スル勿レ

多血肥滿或ハ頭上熱シ顔面赤色ノ兒ニハ決メ此散ヲ
處スベカラズ

○第二千二十五方〔常布〕

甘汞一 乳糖十八

右調勻為散分六晝早晚取一晝乳汁和服

〔主治〕小兒泄瀉ニ宜シ○他ノ醫モ亦至小量甘汞ヲ以テ
此症ノ殊藥トシ大便綠色ニメ腹痛甚シキ者ハ最好ト
ス其便透明白色ニメ雞卵ヲ破ルカ如キ者ハ効ナシ甘
汞ヲ用ヒテ泄瀉減スル者ハ骨布氏速ニ後服ヲ停ム○
上方服量ハ哺乳兒ニ充ツル所ナリニ歳乃至八歳兒ハ

甘汞一日ニ四分ハ月ニ一次乃至三次ニ分服セシハ此

方ヲ用フルモ尚泄瀉緩慢治セザルハ骨布氏礞鐵華
丁幾或ハ檳楂加鏡丁幾或ハ小量炭酸鈣ヲ用ス而シテ骨

布氏ハ此ノ如キ嬰兒ニ絶テ阿芙蓉ヲ與フルナシ

○第二千二十六方〔遠突土〕

菖蒲根 滾湯適宜浸濾取三勺加後味

亞刺昆亞蘆謹錢 白糖錢

右調勻每一時服一茶匙

〔主治〕小兒胃弱及ヒ虚性泄瀉ニ宜シ之ニ兼テ肚腹ニ香

竄藥登法ヲ施スベシ

○第二千二十七方同上

王幾那粗末半 滾湯適宜浸八分時濾取三 溶化

紺カ百設木越幾斯一錢加後味

桂水 橙花舍利別各半

右調勻每半時服一 琶布匙

○主治小兒頑固泄瀉宜

○第二千二十八方聯歌蘭慶

葛カ私カ加栗刺越幾斯 苗香水二 沙列布漿過見托舍

利別各半

右調勻每一時服一茶匙

○主治小兒慢性下利或八屢及復スル下利宜

○第二千二十九方護利私

格綸僕一錢 沙列布半 井水適宜煮八分時濾過取

三弓加後味

加密列舍利別半

右調勻每半時服一 兒匙

○第二千三十方

沙列布煎二 煮以 八 格綸僕末八 至 阿芙蓉液二

實亞格地温半

右調勻每半時乃至一時服一 琶布匙

主治右二方二十廿九方大兒慢性瀉二十卅方宜シ

○第二十三十一方遠突土

格綸僕越幾斯錢一 沙列布淡煎三 茴香油糖二

右調勻每半時服一二茶匙

主治小兒經久脫衰下利宜シ

○第二十三十二方過傑栗屈的兒

葛私加栗刺一錢至二錢 滾湯適宜浸濾取二乃乃至三

乃溶水製番木鱉越幾斯一乃至二乃再加後味

亞刺昆亞蘊謨漿 過兒托舍利別各一

右調勻每一時服一琶布匙臨用宜振盪

主治小兒泄瀉生力虛脫。胃化衰耗。腸ノ感覺亢進。裏急後重及ヒ脫肛スル者宜シ

○第二十三三方履結

精製礬土十二 黑櫻實水 亞刺昆亞蘊謨漿 過兒

托舍利別各半

右調勻每半時服一茶匙

主治乳兒ノ泄瀉宜シ

○第二十三四方

精製礬土一 礪砂加過泥子精二 過泥子水二 桂

舍利別半

右調勻每半時服一匙布匙

(第二千三十五方 附爾私)

結晶硝酸銀四分 蒸餾水ニ弓溶解加後味

亞刺昆亞蘆謨二分 白糖二分

右調勻內玻璃壺黑紙被覆貯每一時服一茶匙或一匙布匙

主治離乳泄瀉ジアロエリー。アブニ宜シ之ニ兼テ硝酸銀

四分ハ一粘汁半弓何芙蓉少許ヲ調和シ灌腸ス附爾私

氏ガ此ニ離乳泄瀉ト稱スル者ハ世醫或ハ胃腸軟化ス

トシロト云ヒ律私ハ嬰兒格列刺ト云ヒコレンライ

臃滿名ハ血質不良卒中ト云ヒアポプレキ阿爾連板篤

名ハ養管麻痺ハラリス。カナト云フ者同一症ナリ此

症誘因ハ生齒遠因ハ離乳トス生齒ト離乳ト一齊ニ来

ル者ハ殊ニ此症ヲ發スルナリ只病初泄瀉輕ク熱勢熾

ナル時ハ格魯林ヲ用フヘシ葛私加栗刺格綸僕安促私

點刺西瑪爾拔等保固藥ハ唯輕症ニ適當スルノニ明礬

及ヒ鐵劑殊ニ外 鐵鹽 撒兒末 爾ハ効力復ニ勝レリ他藥

ノカラ須タズノ効ヲ得ルヘリ鉛糖ハ稱譽スヘキニ

アラズト雖附爾私曾テ之ヲ二三兒ニ用ヒテ良効アル

ヲ見タリ已上諸藥ニ勝リテ結晶硝酸銀ヲ上法ノ如ク

用ヒテ卓越ノ効ヲ得タリ其大便減シテ稠厚トナリ既
ニ二三日ニメ全ク止ミル后灌腸法モ屏ケテ用ヒサル
ニ至レリ

○第二千三十六方 篤優爾黠亞兒

林檎酸銕丁幾 香竈丁幾 各半

右調勻每服十滴二十滴乃至三十滴日三次

主治 小兒腸ノ衰弱及ヒ粘液鬱滯症胃中酸敗液ヲ帶フ

ル者泄瀉蟲症及ヒ陰部ヨリ粘液流出スル症等皆此方

ニ宜シ

○第二千三十七方

肉豆蔻油 薔薇軟膏 各二錢 忽弗滿拔爾撒謨 非答

至一錢 阿芙蓉丁幾 一錢

右調勻為軟膏塗擦肚腹

主治 小兒慢性泄瀉胃腸衰弱及ヒ肚腹膨脹症ニ宜シ

○第二千三十八方 穢歇蘭度

遇兒托軟膏 肉豆蔻拔爾撒謨 附各半 綿答幾里私布

油 六滴 舍電阿芙蓉液 一錢

右調勻同上

主治 同前○大抵肉豆蔻拔爾撒謨單味ニメ足レリ

○第二千三十九方 叔渴耶杜葛列私

...

番水龍越幾斯水製一八 蒸餾水二錢溶解

右調勻乳兒每服二滴乃至三滴大兒六滴乃至十二滴臨服宜振盪

主治小兒泄瀉後屢患フル所ノ脫肛ノ奇方ナリ○頑固

症ハ刺達尼越幾斯ヲ加フ

完穀下利リインテリア 羅

此症世人ノ通知セルカ如ク食後少頃ニ不化ノ飲食肛

門ヨリ下ルヲ謂フナリ輓近謁名第二症ヲ記セリ

其症大抵軍中ノ歩卒ニ限リテ痢疾後ニ發シ之カ為ニ死

スル者他病ヨリ多シ其証黑色流動少シク惡臭ヲ帶ル

物絶エス肛門ヨリ流下ス其中著シク不化ノ食物ヲ交フ

病者死ニ臨ム至コト食欲ヲ失ハズト雖速ニ虚脱スルナリ○

第一症ハ阿芙蓉千九百八十二方 菲阿斯老利兒結爾斯

水八百八十一方 至八百八十二方 等麻酔藥ヲ用ヒテ腸ノ感觸過敏

ナル者ヲ遅鈍ナラシメ兼テ私昆列名ノ歴驗ニ據リ

テ皮表ノ誘導諸法殊ニ微温水ニ剥篤亞斯ヲ加ヘタル浴

法ヲ施シ其后苦味收斂ノ方法ニ移ル即依蘭苔格綸僕九

百九十八方 葛私加栗刺二千一方 阿仙藥二千一方 吉訥

至二千方 紬百設木二千九方 明礬二千十三方 鐵劑二千

方ノ如キ是ナリ但之ニ麻酔藥ヲ配用スベシ倚イ弗蘭屈名

ハ皓礬ヲ與ヘテ良驗ヲ得タリ每服皓礬一匁ヲ以テ健質
亞那越幾斯二匁ニ伍シ日ニ三服セシハ危篤ノ症ハ倚百
弗蘭屈名人及ヒ私昆列印名人等巴豆油及ヒ藤黃ノ如キ峻下
劑ヲ試用セント思欲セリ疇昔一症アリ頑固ノ完穀下利
ニシテ百方寸効ナシ一醫一方ヲ施メ治セリ倚百弗蘭屈名人
其方ヲ記ス即旧製玫瑰昆設爾弗三弓的里亞加三錢槓植
煉膏適宜已上三味合メ舐劑トシ病者他ノ飲食ヲ禁メ每
次一羅獨ヲ取り服スル一日ニ三次スト云ク私傑福傑兒
名人ハ安僣私黥刺煎汁ニ紺百設木越幾斯阿芙蓉及ヒ槓植
舍利別ヲ加フル者ヲ稱用セリ○第二症ハ嚙刺名人馱名人小腹

ノ左側ニ大發疱膏ヲ貼スルヲ以テ最良法トシテ之ヲ稱
用シ並ニ漿粉灌腸法或ハ之ニ阿芙蓉丁幾ヲ加フ百九
十十六方至内用ハ小量吐根ニ宜シ但丁幾二千四
二千十八方者最妙トス末期ニ至テハ紺百設木煎或ハ格綸僕煎ヲ好
トス

○第二千四十方秘列傑兒

甲方

括失シ亞ア屑ニ 冷水六弓浸屢振盪經十二時濾過加

後味

老利兒結爾斯水一錢至

右早午晚服一食匙

〔主治〕完穀下利ニ宜シ○之ニ兼テ漿粉溶液ニ老利兒結

爾斯水ヲ加工灌腸スルヲ要トス

〔乙方〕

漿粉一錢半

微温水一匕溶煮沸少頃濾過加後味

老利兒結爾斯水一錢半

右調勻二分供灌腸

○第二千四十一方〔溼優滿〕

阿仙藥 肉豆蔻末 炭酸曹達各六

酒石酸三

白糖半

糖半

右調勻為散今十二服每一時半一服

〔主治〕完穀下利ニ宜シ

○第二千四十二方〔蒲列刺〕

吉訥六

阿仙藥五

明礬半

玫瑰昆設兒弗適

右為八九衣桂末每服一九日三四次每服後宜飲玫瑰浸

液

〔主治〕粘液流出因弛緩症完穀下利泄瀉虛性咯血過多痔

血ニ宜シ

○第二千四十三方

紺百設木六錢

井水九勺乃至十二勺煮耗至六勺濾

過加後味

桂舍利別弓半

右調勻每一時服一食匙

主治完穀下利末期ニ宜シ

○第二千四十四方 明礬乳清

牛乳新鮮者 生明礬一錢

右和勻令凝結後漉過加白糖一弓每服三弓日三次

主治虛性咯血。子宮出血。慢性下利。完穀下利等ニ宜シ百八

二十七方ヲ
参照スヘシ

○第二千四十五方 二瓶

肉豆蔻油一錢

肉豆蔻拔爾撒謨附一

杜松子酒二

右調勻塗脊椎日數次

主治此方完穀下利ニ偉効アルベシ五六日三六

○第二千四十六方私傳。福傑兒

格綸僕越幾斯二錢

肉豆蔻拔爾撒謨半

舍電阿芙蓉

液廿滴至 龍腦半

右調勻塗麻布貼肚腹

主治泄瀉。完穀下利等ニ宜シ

○第二千四十七方謁嚙新歌

吐根丁幾一

右每一時半服二十滴乃至十五滴

主治痢後ノ完穀下利ニ宜シ此症ヲ治スルハ小腹左側

ニ大發疱膏ヲ貼スルヲ第一奇法トス次テ漿粉灌腸ニ

宜シ或ハ之ニ阿芙蓉丁幾ヲ加フ

○第二千四十八方羅似私的印

越質屋布私麻兒秩斯葛私加栗刺越幾斯各ニ桂

舍利別適

右二氏為一九衣銀箔每服三九乃至五九日三次

主治大兒泄瀉ノ末期ニ宜シ兼テ二千四十五方ヲ塗擦

スベシ

○第二千四十九方濠格魯杜

鐵粉 桂皮各十 白糖一

右調勻為散分十二服早晚一服

主治同上

乳糜利フリスキス。クローリアキ

此症ハ粘液下利及ヒ直腸粘液流出症ノ一種トス其治第

一病因ニ着眼メ之ヲ索ムベシ而後著草括失亞格綸僕九千

百九十八方 良姜二千五十一方至 紺百設木二千九方二 及

至二千方 鐵劑等ノ如キ苦味強壯方ヲ用フベシ醫或ハ灌腸法ヲ

稱贊ス葛爾科名地ノ獨戾失屈名ハ 鉛糖及ヒ阿芙蓉越幾斯

蒸餾水ニ 密シ 幾シ 私シ 去ル 爾ニ 胡蘿蔔 加用 シ 或ハ 虛症ヲ 治ス

スルニ 沒食子煎ニ 迷迭香油 忽弗滿液及ヒ 阿芙蓉丁幾ヲ 加フ 栗屈的 兒石 石灰水ニ 升ヲ 和用 セリ

○第二千五十方私傳 福傳 兒

硫黃華 上好沒藥 瘡瘡木脂 角苗香 白糖各ニ

右調勻為散分三十服 日三四服

主治乳糜利ノ痔疾ニ 因ル者ニ 宜シ ○時々肛圍ニ 蟻蟻 鉞鉞

ヲ施スハ 諸病 治ス 一法 也

○第二千五十一方獨戾失傳

良姜末錢ニ 熱湯六寸 浸漬蓋閉飽熟一時半濾過加

後味

越栗失 爾茂 印失 屈篤 錢ニ 葛私 加栗 刺越 幾斯 刀ニ 橙

皮舍利別方

右調勻每半時服一食匙

○第二千五十二方同上

沒食子 良姜各末 錢ニ 熱湯六寸 浸漬蓋閉飽熟一時

半濾過加後味

越栗失 爾茂 印失 屈篤 錢ニ 水楊皮越 幾斯 錢一 橙皮舍

利別方

右調勻每半時服一食匙

主治右二方敏性衰弱 乳糜利ニ宜シ之ニ兼テ腎上ニ
發泡膏ヲ貼スヘシ

○第二千五十三方 同上

沒食子 良姜 健質亞那各末 芎藭油二滴

右調勻為散分六服蠟紙包裏每一時取一裹冷水送下

○第二千五十四方

亞兒尼加花 芎藭根各一錢半 熱湯五弓浸漬蓋閉飽

熟一時濾過放冷加後味

硃砂加過泥子精一錢半 沙糖舍利別弓半

右調勻每半時服一食匙

○第二千五十五方 獨戾失儼

白芷 薄荷各一錢 熱湯四弓半浸漬濾過放冷加後

味

七葉樹皮越幾斯 良姜丁幾 忽弗滿液各一錢 沙糖

舍利別弓半

右調勻每半時服一食匙

主治二千五十三方ヨリ二千五十五方至鈍性衰弱ノ乳

糜利ニ宜シ

○第二千五十六方 襍過栗儼的兒

枸椽汁一弓 甘扁桃油一弓 渴爾托舍利別弓半

透西方書 卷之八 乳糜利 三十一

右調勻每一時半服一食匙

主治頑固慢性泄瀉及ヒ乳糜利等ニ宜シ○私的印歇情

名モ亦甚稱賛セリ

肝崩 フリュキヌスヘパチキス羅 一十五衣至檢封素節ノ

此症治法專原因ニ從フテ處スベシ多クハ腹臍ノ壅塞硬

結腫其他諸般ノ器敗病ニ因テ發スルカ故ニ通例緩解釋

劑ヲ用ヒテ効ヲ得ベシ勁性収瀋劑抑壓藥ハ罕ニ効ヲ奏

スルノミ是故ニ紺百設木 二十九方二 及ヒ明礬乳 八百廿

四千四十ノ如キ間良驗アリト雖却テ之レカ為ニ病惱ヲ倍

スル下屢之アリ衰耗羸瘦セル者ハ滋養劑 三百六十二方

方例スルニ幾那浸劑或ハ煎劑 百六十一方。百六十二方。二
ヲ用ヒテ之ヲ補益スベシ

○第二千五十七方

幾那 六錢 熱湯適宜浸安微温所飽熟四分時瀘過取

液五ヲ加後味

橙皮舍利別ヲ

右調勻每一時服一食匙

○第二千五十八方

幾那 半 井水十二ヲ煮耗至六ヲ瀘過

右每一時服一食匙

主治肝崩及他病ニ用ヒテ生カヲ補益スルニ宜シ

肝崩ハ肝ノ血ヲ失フニ由リ生ズル也其ノ症ハ血ノ枯リテ肝ノ體ヲ傷ルニ由リ生ズル也

○藥二十五種有也

肝古歸身散一劑服一會後

此症ハ血ノ枯リテ肝ノ體ヲ傷ルニ由リ生ズル也其ノ症ハ血ノ枯リテ肝ノ體ヲ傷ルニ由リ生ズル也

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

肝古歸身散一劑服一會後

