

文政甲申鑄行

新宮涼庭譯述

泰西疫論

神經
疫部

驅豎齋藏板

疫論

編後

腐敗疫部

坤

✂
e 7

413.848

Ek

2

18 e 7

No. 1379



富士川文庫

2902

疫論卷之下 後編

目次

腐敗疫部

第一章

補瀉交用

第二章

初起發汗利尿劑無功論

第三章

解熱皮主治防腐救脫論

第四章

龍麝効驗及精神錯亂治法

第五章

苦味劑効驗及解後治法

第六章

葡萄酒及葡萄酢効驗

腐敗疫部下目次

第七章

白芥糊主治昏睡治法

第八章

發泡有功論

第九章

胃咳胃痛失吐論

第十章

蛔蟲發嘔治法

第十一章

發斑發疹併症治法

第十二章

尿閉治法

第十三章

失血治法

第十四章

腐敗疫與神經疫異治例論

第十五章

神經疫併症及治法

第十六章

聖京健毒兼症及治法

第十七章

諸病有兼併論

第十八章

症候因氣運年年有異同論

第十九章

諸灰鹽無功論

第二十章

阿片爲害論

第二十一章

放血無功論

第二十二章

論血狀

第二十三章

論邪毒

第二十四章

除防法

第二十四章

第二十三章

第二十二章

第二十一章

第二十章

第十九章

第十八章

第十七章

疫論卷之下目次畢

疫論卷之下 後編

新宮碩涼庭 譯述

紀伊 有馬 崔 信齋

門人 加賀 加藤 恕 邦安 纂訂

甲斐 大窪 貞 章言

腐敗疫部

第一章 補瀉交用

吐下之劑。一掃邪毒穢物略除。收補厚以培植乃為

一定之法。如夫虛中有毒。補之不易。攻之亦難。強攻之。運化不勝。於攻擊。正撓邪壅。徒加斲削。於是不可不補。瀉並施也。有朝補而夕可瀉者。有一日補而一日可瀉者。一補一瀉。首尾相救。次序回環。變化無極。治療之權。於是輒爲得。

此症初メヨリ吐下交モ行フテ、分利日期ニ及ンテ、熱勢仍、退カズ、疲勞日ニ加フル者アリ、之ヲ攻レバ、疲困愈、加ハリ、補スレバ、宿燼再ビ燃ヘテ、攻補俱ニ易カラズ、此ノ如キハ平補ノ藥ヲ撰ミ用ヒ、機ヲ見

テ攻ベシ、下劑ナレハ先ツ深夜ニ一服ヲ與ヘテ、早朝一下ヲ取ルベキ者アリ、又吐方ナレバ朝用シテ、晝後ノ熱ヲ挫クベキ者アリ、或ハ一日ヲ隔テ、吐スベキ者アリ、二日ヲ間テ瀉スベキ者アリ、○碩ガ經驗ニ、重症ハ吐方十餘次ニモ及ビシコトアリ、普通ノ症ハ、初メニ吐スルヲ常例トス、分利日期ニ至テハ吐シ易カラズ、下劑ハ分利日期ニ及ンテモ用ユベキ症多シ、熱皮劑ニ酸精柑汁ヲ滴下シタル者ガ、太夕遏腐救脫ノ功アリ、○碩、十八歳ノ頃、窮理醫

學ヲ解セサリシ日、鄰村疫邪流行シテ、闔門傳染シ、
日期十餘日ヲ待テ、三承氣ヲ交用シ、日ニ快利三四
行ヲ取リテ、雪ニ沃キ落ヲ振フガ如クニ全功ヲ收
メ、自ラ以爲ラク、又可氏ノ論ヲ以テ如何ガノ重症
タルモ、疫ノ一病ニ於テ治シ難カラズト、近來京攝
ニ行ワル、疫ヲ見ルニ、吐劑ヲ用ユベキ症ハ見レ
凡、偏ニ下劑ヲ處スベキ症ハ太夕稀ナリ、蓋シ生計
風土ノ同シカラザルニ因ト見ヘタリ、

自驗補泄湯

立方取公私
步律偏之意

主治。虛中有毒。不可偏

吐偏下者。

熱皮一錢

大黃三分

甘艸二分

縮砂二分

大麥一錢

右五味。以水一合五勺。煮取一合。晝夜五六服。○

大黃分量。隨症增損。兼用麝香散。方出于第四章

凡病未可收補。又不可清解者。唯與平藥。以見運化

機轉之所發。其方

自驗清燥湯方立

主治。不可吐下。又不可收補。餘熱

尚存者。

柴胡 大麥 瓜萆根 各八分 黃芩 二分

知母 三分 蛇根 各一分 甘艸 各一分

右以水一合五勺。煮取一合。晝夜五六服。○小便不利者。加蒔蘿三分。

此八碩が、漢人ノ局方ヲ摘テ、加減シテ自驗ヲ取ノ方ナリ、攻補俱ニ難キ場所ニ用ヒテ、龍麝、泊夫藍、礬精ノ類ヲ兼用スルコトアリ、按スルニ、柴胡ハ、其質脂油アリテ、遏腐解熱、諸般ノ熱病ニ功アリ、自驗シテ疑ヒナシ、捨難キ者ナリ、蘭醫蒲跬篤福弗余ニ謂テ

曰、支那ノ國正帶ニ在テ、寒暖二帶ニ延衰シ、艸木多

品ヲ生ジテ、用ユベキノ藥品多ク、其性ヲ審カニスルニ於テハ、精煉ノ巧ヲ費サスト、然ルニ窮理醫學者流、謾リニ漢人ノ方ヲ排斥シテ、和蘭ノ藥劑ヲノ

ミ功アリト認ムルハ、其見識卑フシテ、且陋シト云フベシ、豈病ヲ治スルニ、藥品ヲ忌嫌スベキノ理アラシヤ、俗間ノ方ト雖モ、功アル者ハ、乃チ玉液金丹

ナリ、昌黎曰、牛溲馬勃、敗鼓之皮、收貯無遺者、醫師之良也、知言ト謂フベシ、

第二章 初起發汗利尿劑無功論

初起三日若七日。邪毒未熟。其根在胃。未必散蔓漲溢。當此時雖有汗。無利于病。雖尿多。其熱不解。何則病從汗尿解者。大率在乎十餘日之後也。醫家學術未熟。見識未達。徒計急治。謾進發汗利尿之劑。有害而無益。蓋病有日期之不可移者。不可不察也。

此疫モ亦神經疫ノ如クニ、日期ノ定レル者アリ、凡ソ初メ七日ハ、發生日期中、ゴロ七日ハ、釀熟日期終リ七日ハ、分利日期ト名ク、是ヲ以テ發生ノ日期ニ

於テハ、病毒未タ熟セザルヲ以テ、汗尿ニ分利スル

ヲ稀ナリ、徒ラニ用ユレバ、患者ヲ疲勞セシム、論出

私步律佩、又可氏ノ所謂ル、半表半裏、不可汗下ト、主

意同一ナリ、

第三章 解熱皮主治防腐救脫論

世醫或認解熱皮爲熱病之主藥。是誠不知熱皮者。也。熱皮苦收強固。主治間歇熱。往來熱。遏腐救脫。天下無若者。故名焉。如此邪。非揮發涌泄。則不可驅逐也。醫視邪毒而不視虛脫。其措劑亦要於驅邪而不

要於收補冀使邪毒不沈固滯。蓋其為症弱脈疲勞。血液融釋。虛候百態。殆有不可支持者。驅邪救脫之所岐。其間不容髮。與非有獨特不拔之見。誰亦無危疑於此際。熱皮固善救。亡脫防腐敗。無諸藥出其右者。雖然其虛屬枝症。熱不解者。不許用之。唯熱去而腐存者。用之有功。蓋功取於救腐。而不取於解熱。古人之論。審且盡矣。

熱皮擦劑 自驗方

主治。大熱略退。腐敗尚淡。唯內景

慣藥味。亡脫難支者。

熱皮煎汁 三翁私 葡萄酢 半翁私
右調勻。硝子瓶內收貯。洗擦手足面部。碩據公私步律。偏之說。立此方。

人皆其解熱皮ノ名ニ縛ラレテ、疫邪ト雖凡疲勞スル者ニハ喜テ此ヲ用ユ、是熱皮ヲ知ラザルノミナラス、亦疫邪ノ性ヲ知ラザル者ノミ、夫熱ニ有毒ノ者アリ、無毒ノ者アリ、疫ハ有毒ノ熱ユヘニ、分利泄出ニ非ザレハ治セザル者ナリ、是ヲ以テ患者ノ疲困衰弱ハ素ヨリ枝症ニ屬ス、邪熱除カサル間ハ發

洩ノ外、ニ治法ノ處スベキナシ、○碩按スルニ、譬
 ヘハ苗ヲ長スル者ノ如シ、蒿莠蔓リテ苗ノ長セザ
 ル者ハ、其蒿莠ヲ除カズシテ、如何様ニ培植スルト
 モ、苗ノ長ズルコトハアラジ、然ルニ世醫衰弱ヲ視
 テ邪ノ除カザルニ論ナク、熱皮ヲ用ユルコトヲ好
 ムハ、蒿莠ヲ除カズシテ、徒ラニ糞壤スルノ類ニア
 ラズヤ、是誠ニ蒿莠ヲ長スルノ道ナリ、苗腋削セザ
 ルコトヲ得ズ、古人之ヲ辨スルコト詳カナリ、然ル
 ニ未熟醫輩ハ置テ論セス、窮理學ニ從事スル者モ、

卓識ナキ者ハ、唯其疲勞ヲ怯レテ、兔角熱皮ヲ用ユ
 ルコトヲ急ニス、事ヲ悟ラズト謂フベシ、併シ謾リ
 ニ熱皮ヲ排斥スルニアラズ、熱皮ハ防腐ノ功ヲ兼
 タル收補ノ劑ナレバ、用ユベキ良藥ナリ、余屢世醫
 ノ誤治ヲ見聞スルガユヘニ、古人ノ説ヲ參驗シ、丁
 寧反覆學者ヲシテ、覆車ノ轍ヲ蹈シメント欲スル
 ノミ、

第四章 龍麝効驗及精神昏聩治法

麝香驅邪、龍腦防腐、俱有奇勳、亦非常藥之倫、吐下、

之可治者。不必恃龍麝。唯神經不堪感觸。搐搦痲。難於吐下者。用之。又疲困不支。循衣摸牀。精神昏昏。不省人事者。有奇功。其方。

麝香散 公私步律倨方 主治。吐下後。搐搦痲急。肌膚乾燥。

脈堅而數。精神昏聩。或循衣摸牀者。

麝香 末二朱吉兒布 白砂糖 末一翁私

右混和。分爲三十八。每一時二服。

龍麝丸 自驗方 主治。搐搦痲。循衣摸牀。噦逆昏聩。

自汗敗臭者。

麝香 上品一分五厘 龍腦 三分 洎夫藍 三分

右蜜煉。爲八十九丸。每服十粒。晝夜服盡。○又加砂

糖二錢。爲散亦佳。

公私步律倨曰。龍腦ハ脈不齊ニシテ。漏汗脈弱ナル

者ヲ主治ス。麝香ハ筋惕肉瞤。脈細堅ニシテ不齊肌

膚乾燥スル者ニ功アリ。龍腦ハ葡萄酒ニテ用ユル

ヲ良トス。○碩按スルニ。吐下スベキノ症。神經衰弱。

攻撃ニ勝ヘズシテ。痲攣昏聩ヲ致ス者ニハ。龍麝洎

夫藍等ヲ兼用スルニ非ザレバ。救フベカラズ。是余

か治驗スルコトモ亦多シ、

第五章 苦味劑効驗及解後治法

苦味強壯之藥。品類許多。不可枚舉。率有遏腐補收之功。然而其功不能無小異同。唯其尤者。熱皮。蛇根。比兒利沒藥。纈艸。昆答刺越爾發根。解毒根之類而已。邪勢挫折。氣力虛脫者。用之。其方。
苦味補收飲方自驗 主治。邪熱略退。氣力虛脫。飲食不進。手足微腫者。

- 解熱皮 一錢
- 蛇根 三分
- 木香 一分
- 柴胡 八分

昆答刺越爾發根 二分
甘艸 二分

右以水一合五勺。煮取一合。晝夜四五服。

苦味劑ハ、防腐健胃ノ功アリテ收補ニ屬ス、今茲ニ碩カ立方ヲ出ス者ハ、僻邑門生ノ爲ニ舉示ス、老婆心ナリ、

第六章 葡萄酒及葡萄酒酢効驗

葡萄酒効驗。前編論之盡矣。列印設葡萄酒。補益亾脫。鼓舞運化。雖吐下後亦可用。拂即察白葡萄酒亦太有。功。出_二于_一公私。蓋葡萄酒觸氣易敗。唯醇熟上品之者。

充用。

葡萄酢。性清涼疎通。有鎮火發汗利尿之功。故能救

腐敗。又能逐邪毒。其功不在於酸味菓實之下。

酸味漿。蒲趾篤福 弗傳方 主治身熱不解。渴欲飲水者。

葡萄酢。新鮮者、 冰糖十錢

右二味冷水二合攪勻。硝子器內密封貯。每一時

一盞以溫湯亦可。

西醫斯祿乙的兒ノ口授ニ、大麥煎汁ニ滴下シ用ヒ

テヨシト碩之ヲ驗スルニ、砂糖ヲ加ヘザレハ酸烈

ニシテ患者服スルコトヲ好マス、

第七章 白芥糊主治昏睡治法

白芥。性侵刺滲透。健神經。行陳滯。起焮腫。發水胞。○

主治精神昏沈。不省人事。或昏睡難醒。或精神錯亂

如狂者。貼項或足蹠。

白芥糊。方出于前編下卷

碩、長崎ニ在リシ日、一譯司腐敗疫ヲ病ンテ、昏睡人

事ヲ省ミス、加被丹渡富、其病体ヲ余ニ問フ、余具サ

ニ其狀ヲ告ケレバ、乃チ尹斯兒ノ書ヲ出シ來リ、白

芥糊ノ卒中昏睡ニ稱譽セルヲ余ニ示ス、余直チニ
 足蹠ニ糊劑ヲ貼シタレバ、二時許リヲ經テ、患者頻
 リニ痛ヲ覺ヘ、遂ニ活路ニ上ルコヲ得タリ、其ヨリ
 熱病ノ昏聩スル者ニ、屢試ミテ功ヲ取ルコト多シ、
 當時學術至ラズ、讀書博カラズ、西哲未發ノ術ナリ
 王ト思ヒシガ、治疫ノ諸書悉ク之ヲ稱譽シテ論セリ、
 因テ想フ西醫ノ學術ニ於ル、精微殆ント人工ヲ窮
 メタリ、吾儕ノ如キハ、餘涎ヲ嘗ルニ過キスト謂フ
 ベシ、

第八章 發胞有功論

癩腫併症、或其發一部者、乃貼發胞膏、太有功、又邪
 毒著腦膜、其人如狂、或精神昏昏難醒覺者、亦貼之。
 ○公私步履偏日、脈遲緩、肌膚乾燥、無分利之候者、
 用之則發運化攘除之機。

發胞膏 方出于前編下卷 主治、脈細弱結促不齊、眼精昏

暗、精神錯亂、病毒有著、神經之諸症者。 論出于瓜亞令

斯微甸ノ論ニ、血液苛烈、腐敗ノ散換シタル者ニハ、

芫青ヲ貼セス、又精神錯亂シタル者ニモ、用ヒスト

謂へり、碩之ヲ實事ニ驗ムルニ、芫青膏ヨリハ、白芥糊ヲ優レリトス。○瓜亞令日、發胞膏ハ、病毒ノ血中ニ在者ヨリハ、神經ニ著ク者ニヨシト、又之ヲ貼スルニハ、膏ヲ和ラカニシテ持重スルヨリハ、烈ニメ數、夏ユルニヨシト、○又日、芫青ヲ貼シテ、小使艱澀スル者ニハ、乳漿ヲ飲シムベシト、○西哲、芫青ヲ稱譽スル者アリ、又排斥スル者アリ、碩按スルニ、唯腐敗ノ甚シキ者ニハ宜シカラス、麻痺スル者ニ功アリ、畢竟邪毒ノ性ト、其人ノ性トニ由テ、利害損益一

定セザルベシ、瓜亞令ノ論ヲ卓見トス、○彼又腐敗疫ノ論ニ、彼國千七百五十八年ニ行ワル、疫ハ、發胞ヲ貼スレバ、膏痕盡ク脫疽ニ變スト謂へり、又氣運ニ由テ、小異同アルコトヲ論ス、碩以爲ラク、是等ハ丹毒併症ナラン、

第九章 胃咳胃痛失吐論

凡可吐之症、視咳認胸中有炊腫、誤其治者不少、其症自與炊腫不同也、夫胃咳胃痛、在胃口而不及胸肺、有呼吸安靜、惡心口苦、舌胎粘汚、脈不堅實之症、

也。得一吐其咳自止。又膈間有疼痛。脈實數者。是亦與炊腫易混。然而其病尚在胃口。而不在肺。醫不審則殺人。

邪毒尚胃口ニ粘著シテ、咳ヲ發スル者ハ、其苛毒胸膜ニ浸淫シテ、發スル者ナリ、醫、胸肺ノ病ト認ムルコト多シ、亦諳セズンバアラス、唯精密ニ察スル片ハ、症候ノ混シ難キ者アルベシ、

第十章 蛔蟲發嘔治法

邪火薰灼。或服吐下之劑。蛔不得盤居。因以升胃發

嘔者非吐症。乃用左方。

安蛔湯 瓜亞 瓜亞 瓜亞 瓜亞 主治嘔吐不止。其嘔因蛔蟲者。

瀕州 一錢代用、春 女即花根 熱皮末 二錢

右以水一合五勺。煮取一合。兩次服用。

碩按スルニ、蛔ハ大抵平素人ノ腸中ニ、五六條ハ素ヨリ在者ナリ、然ルニ吐下ノ劑、又ハ熱鬱ニ由テ、蛔

自ラ安キコトヲ得ズ、胃中ニ上リ來リ嘔ヲ發シ、諸藥ヲ受ザルコトアリ、是全ク枝症ニ屬ス、然レモ先

ツ必ス之ヲ穩カニセザレハ、藥餌下リ難キノ弊ア

リ乃チ右ノ劑ヲ用ユ

第十一章 發斑發疹併症治法

熱邪沸鬱。血液漸將敗壞。是以初起三四日。徃徃發赤斑如雲片。炮疹如粟粒者。其未發也。病苦更加邪熱亦熾。已發而稍得安者。誠為佳兆。但急症斑痕不斂。紫色隱隱在皮下而不起。且脫汗有屍臭者。死期在第六日。又發斑第四日。諸症自若。未見變症。至第七日見惡徵者。其死大率在乎第十一日。或第十三日。
出干蕪 篤兒屈 公私步律偈日。惡性者必變脫疽。

龍麝發疹散 自驗方

龍腦 三分 麝香 一分 冰糖 一錢

右調勻。分為六晝夜服盡。救腐湯劑。送下亦可。有熱者兼用礬精。

公私步律偈ニモ、斑疹併症ト名ケテ、吐下ノ劑ハ處レ難シト論セリ、○碩按スルニ、京師ニ於テ、文政五年ノ初夏、發斑ヲ發シ、五六日ノ間ニ、牀瘡ヲ發シ、其瘡脫疽ニ變シテ、死スル者多シ、想フニ、丹毒併症ト見ヘタリ、○上ニ出ス散劑、病症ニ隨テ湯液ニ兼用

スベシ、余ハ邪熱略折ケテ、清下シガタキ者ニハ右ノ發疹散ヲ兼用シテ、功ヲ取ルコト多シ、併シ熾熱熬ガ如ク、面目赤ク、腐敗ヨリ來ル者ハ、酸味下劑ニ右ノ散劑ヲ兼用ス、又大熱全ク除キテ、根脚起サル者ニハ、左ノ熱皮劑ニ此散ヲ兼用ス、

自驗發疹劑 方立 主治。發斑發疹。身無大熱。皮下隱

隱不起者。

連翹 各八分 鹿角末 各八分 柴胡 七分 熱皮 五分

瀕艸 各三分 獨活 各三分 升麻 各一分 甘艸 各一分

右以水一合五勺。煮取一合。晝夜五六服。

第十二章 尿閉治法

病經十餘日。釀熟分利之際。易致尿閉。時蘿露及油。有功。宜配用。主藥。又取揮發擦油。龍腦油。擦肚腹腰背。亦有功。 方出于前編下卷

十餘日ヲ經テ、病ノ釀熟分利ノ期ニ閉スル者多シ、濃涎ヨリ來ル者アリ、麻痺ヨリ來ル者アリ、麻痺ヨリ來ル者ハ凶兆ナリ、○余一男子、危症ノ疫ヲ療ジタルニ、尿閉涓滴ヲ通セザルコト十七時、揮發精氣

ノ擦油ヲ、腹肚腰背ニ擦シテ、導尿管ヲ用ユルコト
十餘日許リニシテ、灰地ヨリ救ヒ得タリ、

第十三章 失血治法

下血衄血。在初起者。爲吉。在分利日期者。爲凶。礬精。
礬石。爲止血之主藥。又撰取前編崩血所舉之方。亦
有功。

碩按スルニ、失血十四五日ヲ經ルノ後、腐敗ノ候ア
ル者ニ來ルハ、甚タ惡兆ナリ、熱勢烈シク七八日ヨ
リ、十日ノ間ニ發マル者ハ、多ク善兆ニ屬ス、併シ十

六日ヲ經テ、大ニ泄血シテ、活路ニ上ル者ヲモ經驗
セリ、想フニ脫疽ナラサル者ハ、必死トモ論ジ難シ、

第十四章 腐敗疫與神經疫異治例論

神經疫之治法。正邪分爭之際。佐生生運化之機。在
於使之攘除邪毒。故涌泄清解之劑。不主用。此疫則
不然。衝突一舉。決其盤窟。使邪毒不散蔓。不偏期元
運自然之機。唯顧邪勢挫折耳。

神經疫ノ治ト、腐敗疫ノ治トハ、其趣向ノ異ナルコ
ト多辯ヲ俟ズ、其難易モ亦論ジ難シ、蓋シ腐敗疫ハ、

他ニ拘ラス、邪毒ヲ攻伐スルニ在リ、之ヲ兵法ニ喩
 ヌレバ、唯敵ヲ擊テ主トシテ、已ヲ顧ミルコトヲ主ト
 ス、又神經疫ハ、之ト反シテ、已ヲ顧ミルコトヲ主ト
 ノ、敵ヲ擊テ第二事トス、故ニ神經熱ハ、藥量ノ權ヲ
 緊要トス、○碩、茲ニ二症ノ治例ヲ、譬喩シテ論スル
 ニ、兒曹ノ狗ヲ相鬪シムルガ如シ、神經疫熱ノ如キ
 ハ、吾狗ヲ強ク啖カケ、或ハ輕ク鞭ヲ加ヘ勵マシ、勢
 ヲツケテ、他ノ狗ヲ咬伏サスルナリ、吾狗ハ神經ニ
 シテ、他ノ狗ハ邪毒ナリ、啖カケ又ハ加鞭シ勵スハ、

香竄刺擊ノ劑ナリ、○又腐敗疫ノ治法ハ、直チニ他
 ノ狗ヲ痛ク擊撻シテ弱ラセ、吾狗ニ咬伏サスルナ
 リ、吾狗ハ元運自然ナリ、他ノ狗ハ邪毒ナリ、痛ク楚
 撻スルハ、漏泄發洩ノ劑ナリ、故ニ神經疫ハ、吾狗ヲ
 成艾ケ傷レ疲レヌ様ニ勢ヒヲツケ勝シメ、腐敗疫
 ハ、吾狗モ共ニ誤リ擊殺サヌ様ニ、他ノ狗ヲ目カケ
 擊撻キシテ咬伏サスルナリ、乃チ神經疫論ト照シ
 讀片ハ、明カナルコト火ヲ見ガ如シ、

第十五章

神經疫併症及治法

二疫併症。險惡驟至。比諸單症。不易救也。譬如常山之蛇。擊首則尾隨起。擣尾抗首。噴毒。故一名惡性熱。蓋因其形狀名焉。夫邪侵神經。則運化逼於邪勢。其機殆不支。必將廢絕。加之病毒峻刻。損血液。傷臟腑。速為屍臭。受害亦酷。苟緩其治。則瞬目之間。危禍並至。當此時。高手握權。取其重者。而捨輕者。雖有毒邪。不得不佐運化。主宰之機。何暇論驅除。涌泄。事理當然。不俟識者而知也。

麻痺與腐敗。慘刻並害。刺發香竄之劑。宜重量內外。

兼施不及必斃。又換用前編所舉之諸藥。其藥品如左。麝香。龍腦。揮發鹽。鹿角鹽。琥珀鹽之類。赤葡萄酒。朴斯朴律。私。硫黃。遏的兒。獨活根。蛇根。纈艸根。揮發油。其他芳香揮發之藥。

經驗揮發液。出于公私。步律。偏。主治。惡症不退。虛脫甚者。

麝香。十二傑。列應。朴斯朴律。私。二傑。列應。列印。油。一匕。混和者。

清水。二翁。私。

右調勻。每一時兩三次。服盡。隨症增損。

又方。同上。主治。併症虛極者。

瘦論

又式 朴ボ斯ス朴ボ律ム私ス

三傑 列應

硫黃ス退ル的テ兒レ

一達刺 脾麻

右混和調勻。每一時或一時半。取十滴。點白湯送

下ル。

強壯灌腸劑

同上

主治。下利泄血。腸襞萎蕪虛極者。

葡萄酢

適宜

清水

適宜

右調勻灌。肛內。又取熱皮煎汁冷者。處之有功。

揮發灌腸劑

自驗方

主治。併症虛極。有麻痺之候者。

麝香

三傑 列應

龍腦

五傑 列應

鹿角精

三滴 純粹者

蜂蜜

適宜以上 四味混和

纈艸煎

四翁私

右調勻灌。肛內。○碩テ隨テ公コ私シ步フ律ム偏ヒ狹ク歇ム即チ度フ之意。立此方。自驗亦多。故揭示。

用揮發香竄之藥。諸症漸退。虛脫存者。飲葡萄酒。良肉煮汁。徜徉緩步。以吸大氣。○碩按食雞粥。鼈肉。海參等。亦驗。

此症蓋シ神經麻痺。血液腐敗。並ヒ至テ速カニ斃ル。

其斃レザル者モ、其症險惡ニシテ治シ易カラズ、蓋

シ補瀉兼施スベキ。人病ナレモ、一身主宰ノ神器ヲ

補助セザレバ、危險忽チ來ルヲ以テ、止ムコトヲ得ズ

先ツ揮發香竄ノ劑ヲ處シテ、其急ヲ濟フコヲ宗ト
 ス、乃チ治法ハ、前編ノ方ヲ撰用シ、唯藥量ヲ重クシ、
 且麝香服量モ一時ニ八傑列應ヨリ、十六傑列應マ
 テモ増シ進ムベシト、唯神經疫ノ治法ト小異アル
 ハ、阿片ヲ用ヒズシテ、解熱皮ヲ用ユルノ一事ノミ、
 ○一賈豎十八歲、劇症ノ疫ヲ患ヘ、其症精神昏瞶、親
 疎ヲ辨セス、循衣摸牀、撮空撚指、或ハ時ニ尿閉遺尿
 シ、四支共ニ麻痺ノ候アリテ、脈數不齊、百三十餘度
 ニモ及ベリ、衆醫必死トシテ皆辭シ去レリ、余之ヲ

診スルトキハ、既二十日ヲ經タリ、目黃バミテ涙ヲ
 流シ、手足微冷シテ、腹熱熬カ如ク、麴胎アリテ、鼻孔
 唇齒、煤ヲ抹スルカ如ク、敗臭近ツキガタシ、便秘ス
 ルコト七日、乃チ兼症ト認メ、先ツ緩和泄方ニ劑ヲ
 與ヘテ、下ヲ取ルコト三次、下後脫汗流ル、如ク、氣息
 奄奄トシテ、將ニ絶セントスル者ノ如シ、乃チ龍麝
 散八分ヲ、晝夜六次ニ分テ、揮發飲ニ兼用シ、白芥糊
 ヲ蹠ニ貼シ、龍腦油ヲ周身ニ擦スルコト、晝夜十次
 許リ、二三日ニシテ初メテ白芥糊ニテ發胞シタル

痛ヲ覺へ、生路ニ上ルコトヲ得タリ、

第十六章

聖京偈毒兼症及治法

有聖京偈毒兼症。初起五六日。漸顯敗疫之候。蓋此症發。腫癰焮腫。其腫易變。脫疽。治法。宜施敗疫之方。有失血之候者。處吐方。救之。有腸胃內刺戟毒者。處下劑。導之。但不可輕忽。○遏腐之劑。善解聖京偈毒。乃葡萄酢。龍腦。獨活。消毒液之類也。其方。

第一消毒液

方出于公
私步律偈

礶砂酢

白葡萄

拂郎斯產
各四翁私

纈艸融液

半翁私

右調勻。每一時一食匕。

第二消毒液

同上

獨活融液

纈艸融液

龍腦酒精

鹿角精鹽

琥珀精鹽

各一達
刺屈麻

葡萄酒

六翁私

右調勻。每朝服一食匕。○以上二方。屬強心劑。

第十七章

諸病有兼併論

公私步律偈曰。有聖京偈併症。初起如聖京偈單症。

經日見敗疫之候。乃氣息敗臭。精神昏沈。下利臭糞。筋惕肉瞤。麩胎臭汗。斑疹瘡癰。其性易變。脫疽氣力。亟脫之類。乃其候也。唯有咳者。稍異其方。即可用之。藥如左。龍腦。舍涅瓦根。憲尼之類也。又發胞膏有奇功。

有痰熱兼症。其候瞭然。不俟辯。

有丹毒兼症。易變脫疽。治法隨症。

有猩猩熱兼症。易變寒脫疽。或咽喉生寒脫疽。潰癰。

有痘瘡兼症。暗赤平陷。痘或畜血。或變黑色。或發紫。

黑斑點。灌漿。其性苛烈。或發衄血。下血齒衄。又一身

有屍臭者。腐毒內攻。其外出倉卒。治法宜兼施。防腐

除毒。其變脫疽者。外貼脫疽之藥。碩曰。世醫所謂走馬牙疳。則變脫疽

也者

公私步律。個曰。神經疫。モ亦諸病ヲ兼併スル。此疫

ニ異ナルコトナシ、

第十八章

症候因氣運。年年有異。同論

無論神經疫。腐敗疫。其所行。年年有異。同。碩。以為。蓋

天地氣運之不均。寒暑往來之無順序。異邦姑不論。

京師所患。四時不同。況地方曠漠。山川遙隔。人物資稟異其氣者乎。凡物隨寒燠。而有厚薄。在方隅而有
 多寡。所謂如江北不育橘。廣南不產梅花。今閱諸書。有
 疾病之輕重。症候之差等。悉皆出于諸病兼併。多寡
 厚薄之年年不同。公私步履偏。穢歇即度。歇乙刺
 屈之論。明確亦無遺漏。謂之併症可也。又謂之兼症
 可也。學者參驗考證。則瞭然莫危疑之可論者。參考原書

近來京師ニ行ワル、疫ヲ見ルニ、神經疫ニシテ稍

腐敗疫ヲ兼タル者アリ、又腐敗疫ニシテ、神經疫ヲ
 兼タル者アリ、其行ワル、症候、年年同ジカラス、唯
 神經疫多クシテ、腐敗疫ヲ見ルコト少ナシ、蓋シ寒
 暑雨暘ノ往來、天地氣運ノ同ジカラザルヲ以テ、其
 病ノ異同アルコトハ、固ヨリ怪ムニ足ラズ、且、他邦
 ニハ腐敗疫溫疫ナル者多クシテ、正症ノ神經疫ハ
 殊ニ少ナシト謂ヘリ、蓋シ山川風土、寒暖飲食等ノ
 異ナルニ由テ、其行ワル、所ノ疫モ、寒熱虛實ノ相
 違無コト能ハズ、然ルニ曠漠萬里ヲ隔テタル、西哲

ノ醫籍ヲ見ルニ、獨リ其病ニ於テ、吾皇國ノ病所口ト、毫髮ノ差ヒナキ者ハ何ゾヤ、蓋シ天地人ヲ生ズル、其性情氣質ニ至ルマテ、賦與スル所口、普ク一般ニシテ、所謂ル一氣ノ煦育、毫髮モ公然私無キ者ト見ヘタリ、

第十九章 諸灰鹽無功論

往古已來、或稱諸鹽皆有救腐之能、是皆據醃肉保久之驗而立之說、近世或擯其說、紛紜未知孰非孰是、步林傑兒、歇乙刺屈輩、並起論之、盡矣、其說曰、鹽

誠善保肉、遏腐、雖不使之朽爛也、物或爲功於死物、與活物、利害得失、一一不同也、況邪毒各有性、人亦各有稟賦、一藥不同功、固無論、灰鹽於此疫、既無遏腐之能、多損少益、往古之說不可從、唯其可用者、酒石鹽、精硝石、多功鹽耳、二哲之論、確實不可撼也、

于歇乙刺屈、碩所持論、

往古實驗未タ盡サ、バリシ日、鹽ヨク肉ヲ保藏シテ、腐敗セシメザルヨリ、遏腐ノ論紛紜タリ、步林傑兒、歇乙刺屈續キ起テ、此疫熱ニ於テ其理ヲ窮メ盡シ、

其實ヲ驗試シテ、往古ノ謬誤ヲ看破シタルハ、實ニ
深切ナリト謂フベシ、

第二十章 阿片爲害論

初起毒邪在胃、無益於發汗、蓋阿片發汗安神、使人
醉且眠、以奏一時之快、其力固不能驅邪、凡可疎滌
之症、服之則使大便祕澀、使邪毒浸淫、雖有痙攣不
寐之症、一切禁之。

病理藥性ヲ解シタル醫輩ハ、禁ゼズシテ素ヨリ其
害アルコトヲ知ル、唯學バザル醫輩ハ、一時ノ快ヲ

喜ヒ、妄意ニ之ヲ用ユル者アレハ、是西哲諄諄乎ト
シテ教ヲ世ニ垂ル、者ナリ、

第二十一章 放血無功論

脈浮而堅實、有焮腫兼併之候、尚且不許多量放血、
況無合併者乎、假令認得實徵、放之不容易、蓋其血
融釋不凝、敗壞易耗、豈可不深慎哉、
論出于公私步
律、偈、歇、刺、屈

此症血液融釋スル者ナレバ、焮腫併症ト雖、凡多量
ヲ放ツコトヲ許サズ、頭痛甚シキ者ニハ、顛顛ニ水
蛭ヲ著テ吸シムルニ過ス、又一部ニ焮腫ヲ挾ム者

ニハ發胞膏ヲ以テスベシト論セリ脈ノ堅實ヲ目的トシテ正症焮腫ト治例ヲ同フセズ○碩此疫ノ下血衄血ニ由テ平路ニ赴クラ經驗シタレバ唯察病ヲ明カニシテ人事ヲ盡スニ在ノミ膠柱シテ治療ヲ論スルコト勿レ

第二十二章 論血狀

血之行脈内綿綿不絶如綫順環如水之流無潰溢滯息之機造化妙合自有定理而賦焉也氣駕此以行焉神依之以爲用焉血苟虧薄則氣精不育血苟

充稠則停塞不行停塞與不育俱皆使精神疲困夫氣之所依憑者血也氣則神之所舍二者相須而存於血血之係於生機蓋亦大矣固知醫匠之所賴輒亦在於審血如此疫率皆溶釋而無活色或帶綠色而不凝結病重其釋愈甚故雖發熱熾盛弱脈不實足以取證參考諸說碩所論說

此疫ハ血ヲシテ黑色融釋ナラシムルコト乃チ前ニ陳ルガ如シ蓋シ血ハ生活ノ實質ヲ資ノ本源ノミナラス大氣モ亦精神ノ舍スル所ナレバ血ノ變

化ニ由テ、不測ノ危損ヲ致スコト怪ムニ足ラス、劇
症ニ於テハ、一、二日ニシテ斃ル、蓋シ血ノ状態ハ、醫
ノ審カニスヘキ要物タリ、

第二十三章 論邪毒

邪之爲物、有爲而無方、其形雖隱而不可視哉、痕迹
毒於人、而後顯、乃亦有可知而言者、其聚也、如火之
發於鑽燧、在胃則上涌發嘔、蒸熱掀颺、則爲汗發洩
於毛孔、或下流於直腸膀胱、最卑之腑、則滲出於二
便、又能氣化、以行大虛、故能從口鼻腠理傳于人、如

夫伏滅無迹、猶聲之在鐘中、火之在石中、均是浮遊
之一氣、無聲無臭、唯可知而不可見、可言而不可形、
故西哲博悟衆理、洽格萬物、纖悉不遺、以窮邪之本
質、預設除防之法、以惠天下後世、其所注意遠固非
偶然也。碩所持論

公私步履、偏ニ載ス、此症ヲ病テ、灰シタルノ屍ヲ實
驗シテ、内臓多クハ腐壞シ、不敗色ノ血融渙シテ、渚
溜シ、又臟腑寒脫疽狀ニ變ジ、灰色斑ヲ視ルト、又灰
後三四時ハ、ソノ屍溫暖ニシテ、又強韌ナラズ、冷レ

ハ乃チ腐敗スト○碩按スルニ、疫邪ノ生質ハ、極メ
 テ精微揮發ノ風化スベキ氣ナリ、其故ハ此邪身體
 ニ觸スシテ、口鼻腠理ヨリ襲ヒ入者ナレバナリ、是
 ラ以テ猖獗怖ルベキノ毒ナレドモ、其質風化スベ
 キ者ナレバ、日期僅カニ二十餘日ニシテ、身體ヲ謝
 シ去リ、他病ノ如クニ、治後其害ヲ殘サズ、癘毒ノ如
 キ、固結沈著ノ者トハ、其質自ラ異ナリ、故ニ邪毒人
 身ニ得ルニ至テハ、油ノ火ヲ得テ燃ルガ如ク、實ニ
 有爲無形ノ毒氣ト謂フベシ、併シ其實ハ形チナキ

ニ非ス、人眼ニ視ルベカラザルノミ、○此論ハ西哲
 ノ意ヲ總括シテ、已レノ有トナシ、形容シテ述ル者
 ナリ、

第二十四章 除防法

- 一 減損飲食。日飲赤葡萄酒四五盞。優遊終日。
- 一 徜徉水邊。或乘馬蹴鞠。運動身體。
- 一 病室燒雄黃硫黃。看護者日飲醇醪。服熱皮。
- 一 禁臍肉。防寒冷。避敗氣。
- 一 食生葱根一莖。歇し爾爾結傳

一禁。溫室羣集。吸大氣。使表氣疎通。

右修六條。庶可免感染。

碩屢看護ノ者傳染シテ病ムヲ觀ルニ、太夕輕カラズシテ、自發ノ者ニ比スルニ劇症多シ、怖ルベキコトナリ、除防ノ法感載スルニ餘リアリ、

受業 伊勢 横井綱俊介校并書

疫論卷之下大尾

