

醫學管錄內集

二

i 18-1

490.9  
Tg-3  
3

No. 2037  
18-1



富士川文庫

1249

醫學子管錐卷二目錄

九折堂山田

氏圖書之記

膨脹

彭彭

嚮嚮

響響

防響

房嚮

食亦

食休

彭亨

嚮

食晦

淋露

古觀雷路

四能雷路

淋瀝

決瀆

寃悅惋輓通用

今月令

吉日良兆

肯馮心肯盈

飲食起居之要及玩味多字大字

醫者音也非篤論

古之瘞厥即今之脚氣

舟船

恍惚恍然

暎暎

附後用豚方法

壞證勞復等用鱉甲

頭痛用承氣湯

一和一

治自鼻痔方

自鼻病用瓜蒂細辛二味方

桃人承氣湯治中焦及上部

壯原湯原治鼓脹

傷寒論可與某湯之與猶用



膨脹 彭彭

腹大滿膨脹而喘欬。素問至真要大論。  
是動則病肺脹滿膨脹而喘欬。靈樞經脉篇。

馬蒔曰：膨脹俗云膨脹。

厥而腹膨脹多寒氣。甲乙經卷七陰衰發寒厥陽衰發寒厥第三按靈樞作腹脹。

嚮然文載後。

腹滿膨脹。千金卷二十大黃瀉熱湯主治。

腹滿彭彭。外臺卷六引刑繁。与前千全文同。而膨作

腹脹彭彭氣急。同上卷十六刑繁厚朴湯主治。

腹脹滿彭彭。同卷七深師厚朴湯主治。

嚮嚮

嚮嚮

厥而腹嚮嚮然多寒氣。靈樞雜病篇。

腹滿食不化。腹嚮嚮然不能大便。同上。

關上脉牢。脾胃氣塞。盛熱即腹滿嚮嚮。千金卷二十

法第六。

商丘主腹中滿嚮嚮然不便。同上。三十心腹第二張。

喘息不安。腹中嚮嚮脹滿。同上深師大溫脾湯主治。

千金翼卷十九水腫第三、澤漆根湯主治。千金作

嚮嚮言文載下。

食輒嚮嚮不消。外臺卷十六引千金翼瀉脾丸。

穀不消。嚮嚮脹滿。同上深師大溫脾湯主治。

關脈牢。脾胃氣塞。盛熱即腹滿嚮嚮。脈經卷二平治宜第三。

病源候論卷十六腹脹候云。關脈實即腹滿嚮。又云。脈來外溢者為奔腹脹滿也。  
按嚮嚮下。疑脫嚮。訛字。奔腹當本嚮。

明核嚮

又云。

明核嚮

證治要訣。蟲々々々。同以言其急心實如蟲非蟲毒之蟲也。俗謂之膨脹。又謂之蜘蛛病。卷三十七。

心下堅聚。彭亨滿。不得食。前附子卷十六。嘔吐歲逆門。小腹急脹。下彭亨。同卷十九一方主治補腎門。大建中。

食訖覺腹中彭亨短氣。同卷廿六食治序論

詩大雅蕩篇。女包休于中國。毛傳。包休猶彭亨也。

陽大有卦。九四。非其彭。无咎。陸德明釋文。干云。彭

亨。驕滿貌。

王篇肉部。膨蒲行切。膨脹脹兒。脅許庚切。膨脹。

韓文城南聯句。溢旋皮卷癭。苦開腹膨脹。注。膨脹。腹張兒。帶句

又石島龍頭縮菌春蠶。腹漲彭亨。注。彭亨。大腹也。

通俗編。詩大雅。女包休于中國。毛傳云。包休猶彭亨也。彌明石鼎聯句。豕腹脹彭亨。孟郊城南聯句。苦開腹彭亨。廣韻作膨脹。傳燈錄。有肚裏飽膨脹語。按集韻彭音旁。今俗言彭彭亨亨。其亨字讀虛郎切。卷三十四。

責響 賁嚮

衛之生病也。氣痛時來時去。怫愴責響。風寒客于腸胃之間。靈樞壽夭剛柔篇。

責響。腹脹。是為脾厥。同經脉篇。

留而不去。傳舍於腸胃。在腸胃之時。責嚮腹脹。病始。

彷彿責嚮 五十二 難

楊上善曰、責嚮、腹脹兒也、大鱗刺卷廿二 脾健穀

又曰、責嚮、虛起兒、同卷廿七 耶傳注

馬時曰、有責響之聲、張介賓曰、責響、腹鳴如奔也、  
並壽夭剛徐大椿曰、責嚮、責動有聲也、難注

廣按諸家皆就響嚮字為解、非唯楊上善可從、上文所載、嚮嚮響者、並與彭彭彭耳同、知責嚮亦彭亨之義、史記樂書、奮末廣責、正義云、責氣充也、

○脾胃論、言善食而瘦者、因伏火邪於氣分則能食、脾虛則肌肉削、卽食亦也、叔和云多食亦肌虛此之謂也、卷上脾胃勝衰論

食亦 食休 食晦 食掛

素問氣厥論、大腸移熱於胃、喜食而瘦入、謂之食亦、胃移熱於膽、亦曰食亦、

王冰注、食亦者、謂食入移易而過、不生肌膚也、亦易也、

甲乙經、腹中氣脹、引脊痛、飲食而身羸瘦、名曰食休、

先取脾俞、後取季肋、卷九、脾胃大腸受病發腹脹滿

腸中鳴短氣第七

十全作食晦文見後

○寇宗奭本草衍義云、有小兒病虛滑、食略化、大便

日十餘次、四肢柴瘦、腹大、食訖又餓、此疾正是大腸移熱於胃、善食而瘦、又謂之食休者、時五六月間、脉洪大、按之則絕、今六脉既單洪、則夏之氣獨

然按之絕則無胃氣也。經曰：夏脉洪，洪多胃氣少。曰病但洪無胃氣曰死。夏以胃氣為本，治療失於過時後不逾旬果卒。卷三

又小兒食晦頭痛，諺諧主之。同卷十二第十一小兒雜病

千金方：腹中氣脹，引脊痛，飲食多，身羸瘦，名曰食晦。

先取脾輸，後取季肋。卷十六 脹滿灸法

又脾輸、大腸輸，主腹中氣脹，引脊痛，飲食多而身羸瘦，名曰食晦。先取脾輸，後取季肋。卷三十九孔穴主對法 脹滿病

又諺諧主小兒食晦頭痛。同上 小兒病第九

蘭軒先生曰：食晦者，蓋食自消盡而不生肌肉也。釋名：晦，月盡之名也。晦，灰也。火死為灰。月光盡似

似之也。又文選江淹雜體王徵君詩：寂歷百草晦。  
注：凡草木華實榮茂謂之明，枝葉彫傷謂之晦。

### 附食掛

續醫說：朱思古眉州人，年三十歲時，得疾不能食，聞董腥即嘔，惟用大鑷旋煮湯沃淡飯，數數食之，醫莫能治。史載之曰：俗輩不讀醫經，而妄欲療人之疾，可歎可駭。君之疾，正在素問經中，名曰食掛。凡人之肺六葉，舒張而蓋下覆於脾。子母氣和則進食，一或有戾，則肺不能舒，脾之為敝，故不嗜食。遂授之方，以清肺潤肺為治，服之三日，病者鼻聞肉味覺香，取啖之甚美。此事宋人載于傳記，余考之岐黃書，皆無食

掛之說、或記者假托耳、或史公妄言、以欺世惑人歟、  
二者皆未可知也、卷三

淋露

露又作路

羸露

罷露

主淋露

本草白字木香條

證類上

卷六草

女子血閉淋露下血

同黑字黃芩條

同上

卷八草

風邪淋露

同黑字狗脊條

同上

傷中淋露

同黑字白薇條

同上

婦人月經不調

腹中結塊崩中淋露

同黑字延胡索

洩痢淋露

同黑字厚朴條

證中品

木

四肢酸疼

多汗淋露

同黑字白膠條

證上

獸

傷中淋露

同黑字生大豆條

證中品

味

寒熱淋露

靈樞九宮八篇

兩實一虛病則為淋露寒熱

同九宮八風篇

療飲中蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病  
變無常方附後方卷七外臺卷廿八引古

有傳戶勞者云云大既寒熱淋露沈沈默默不的知  
其所苦而無處不惡積月累年漸就委頓醫說卷四

按原見附後卷一巢源卷三尸注候淋露作  
作淋瀝今依醫說所引

瘕之聚令人苦四肢寒熱身重淋露不欲食巢源卷三十八

八瘕候

苦淋路痞瘦百節酸疼醫心方卷十四增深方西

傷中淋潞同卷三十大豆條引本草按證類潞作

羸露不能飲食千金卷五下真朱九主治外臺卷三十五引千金露下有瘦字

左氏昭元年傳勿使有壅閉湫底以露其體杜預

注露羸也壹之則血氣集滯而體羸露孔穎達正  
義云四時之事若其壹之則血氣集滯使不得宣  
散氣不散則骨羸露也肥則膚肉厚骨不見瘦則  
肌膚薄故體羸露羸露是露骨之名其義與倮相  
近倮露形也羸露骨也瘦必羸亦瘦之別名  
列子湯問篇來丹氣甚猛形甚露計粒而食張湛  
注有膽氣而體羸虛

管子五輔篇匡貧窶賑罷露注疾憊裸露者有以  
賑救之

韓非子亡徵篇罷露百姓煎靡貨財者可亡也  
秦策一兵終身暴露於外士民潞病於內高誘注

路羸於內三ノ八十

秦策三諸侯見齊之罷露、君臣之不親。五ノ七才

呂氏春秋不屈篇士民罷路、高誘注路、羸也。畢元校注、路與露同。○按罷与疲同、詳見孟子公孫丑上篇今日病矣正義解千百廿二

小便淋瀝、小腹甚硬、傷寒論辨不可下篇

淋瀝

桃子多食令人熱、仍不得入水浴、令人病淋瀝寒熱。

全匱要略果實菜穀禁忌并治第廿五

尸注鬼注病者云云大便略使人寒熱淋瀝、悒悒默默不的知其所苦、而無處不惡、累月積月漸就頓滯以至死。附後方卷一十一

別說自說列雜家方

淋瀝作淋露

尸注候文小

腎虛則小便數、膀胱熱則水下瀝、數而且瀝、則淋瀝不宣故謂之為淋。巢源卷十四諸淋候

小便淋瀝難者、病在下焦也。巢源卷

百合侯

傷寒卷

八瘕候

同卷三十八

時崩時止、淋瀝不斷、名曰崩中漏下。同上、崩中

漏下候、中

或胃中冷逆脣中、嘔不止、及泄痢淋瀝。金防卷四

淋瀝

月水不通、或一月再來、或隔月不至、或多或少、或淋

瀝不斷、同上、文畧同、故不載橫歸圓主治四ノハク又白至圓主治四ノウ

產後餘血不消作堅、使胞門不閉、淋瀝去血、同上、論曰條四ノ共

產後及隋身月水不調、或淋瀝不斷、斷後復來、狀如

鶴水

同上桃人湯主治四ノセイ

若淋瀝瘦瘠、百節酸疼、服一丸

同卷十二仙人王壺丸方後十五ノセウ

小小久痢、淋瀝水穀不調

同卷十五下枳實散主治十五ノセウ

小便淋瀝、病變無常處

同卷廿四治臺廿八引中蠱毒方外

金同附後卷七

小便淋瀝、作淋露骨立

小兒淋瀝寒熱、臚脹大腹、不欲食

外臺卷四古今錄驗大黃丸方後五

假如男子、因虛損得之名曰勞極、吳楚云淋瀝、巴蜀云極勞、同卷十三傳屍方引蘇遊論十三ノ十九才

治黃疸後小便淋瀝方

同卷廿一

療小便難淋瀝湯方

同卷廿七引集驗廿三ノセウ

療產後淋瀝葵根湯方

同卷廿四引千金方按千金卷三

療婦人崩中泄血不斷、淋瀝連年不絕、同上引刪繁廿四ノ五

大小便塞不通、或淋瀝尿血、陰中疼痛、同三十八廿七ノ

滯下淋瀝、長去赤白雜汁、醫心方卷六小品方腰痛用法三ノオ

治小便難淋瀝方

同卷十二引錄驗方廿ノオ

治小小淋瀝形羸不堪大湯藥者、同卷廿五引小品方廿五ノ九

治黃疸後小便淋瀝方同卷廿一

決瀆

三焦者，決瀆之官。水道出焉。素問靈蘭秘典論

說文水部：決，行流也。从水夬聲。十一上

爾雅曰：溝注澗曰瀆。注水流不絕曰瀆。太平御覽卷七十五

引

漢書溝洫志：治水有決河深川。顏師古注：決分泄也。

韓非子五蠹篇：中古之世，天下大水，而鯀禹決瀆。

卷十九  
又有決瀆於殷周之世者，必為湯武笑矣。同上

淮南子原道訓：禹之決瀆也，因水以為師。高誘注：因以水性自下，決使東流，以為後世師法也。卷一

按決瀆者分決行流之義與說文瀆溝也楊倞荀子脩身篇注瀆水竇也之義不同說者或執說文等解之恐非是

熱

○窩當作窓俗煩窩

煩惋

煩惱

心

素問病名曰疝瘕少腹窩熱而痛面白王機真藏論

煩窩

素問汗不出而熱齒乾以煩窩腹滿死論

陰陽應象大

按太素

經窩作惋

又陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩窩手足熱而欲嘔

瘡論 千全卷十 窩作窓 惡俗字

又肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩窩示從容論

又欬嗽煩窩者是腎氣之逆也 同上

煩惋

素問血并於上氣並於下心煩惋善怒

調經論

太素

經校作

窩煩窩

悅

惱亂 煩惱 悅 驚 兔

靈樞意傷則惱亂四肢不舉四本神篇

按脉經甲乙經

又舌縱涎下煩惱取足太陰寒熱病篇

經作門下經

又舌縱涎下煩惱取足太陰寒熱病篇

經作門下經

又腹脹煩惱取手太陰同上

經作門下經

心高則滿于肺中惱而善忘本藏篇

甲乙經

又肝高則上支賁切脇惱爲息責同上

經作門下經

說文免部冤屈也从「免」免在「下」不得走益屈

折也段玉裁注古亦假宛爲冤卷十上

楚辭塞蹇蹇之煩冤王逸注冤屈也

又離世哀枯楊之冤雛注冤煩冤也

經作門下經

莊子大宗師篇惱乎忘其言也釋文惱亡本反或

作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也

韓非子忠孝篇古者黔首惱密惱患注惱忘情貌

呂氏春秋審分覽夫說以智通而實以過惱畢元

校注惱音瞞又音滿王篇惑也莊子大宗師釋文

廢忘也

莊子大宗師篇惱乎忘其言也釋文惱亡本反或  
作免李云無匹貌王云廢忘也崔云婉順也  
韓非子忠孝篇古者黔首惱密惱患注惱忘情貌  
呂氏春秋審分覽夫說以智通而實以過惱畢元  
校注惱音瞞又音滿王篇惑也莊子大宗師釋文  
廢忘也

又重已篇味衆珍則胃充胃充則中大艱高誘注  
艱讀曰憊不勝食氣爲憊病也

按說文憊煩也悶滿也段玉裁曰滿古是煩悶  
字當作憊悶作本義其作冤惱惱艱者皆假借轉  
用也

用也

又塗歌為四肢束

今月令

素問新校正云詳芍藥榮牡丹華今月令無氣調神四  
大論

禮記月令鴻鴈來今月令鄭玄注鴻皆爲候正義云今月令鴻皆爲候者但月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是也

不人數言者安知視口力者知其景也

令醫者事則著曰日令出首士效以當其者古

賢言日令新朝又讀之舊說皆以是爲是今月

天正素問新林五云精於藥學并日華令日合並

素問新林五云精於藥學并日華令日合並

令日令

山條八刑志日良兆

素問靈蘭秘典論黃帝乃擇吉日良兆而藏靈蘭之

室以傳保焉

楚辭九歌吉日兮辰良王逸注日謂甲乙辰謂寅  
卯

呂氏春秋孟春紀是月也天子乃以元日祈穀于  
上帝乃擇元辰天子親載耒耜措之參于保介之  
御間高誘注日從甲至癸也元善也辰十二辰從  
子至亥也

不人數言者安矣。觀呂后大哭也。  
令歸督事。則其日令出。亦有以故人盡歸。故  
歸。言民之新朝。來禮。上云。歸。督事。則其日令  
天子。素語。序。林玉。詩。楚興。秦。丹華。令。目。合。無。詩。周。故。公。合。  
令。日。令。

吉日良兆

素問靈蘭秘典論。黃帝乃擇吉日良兆。而藏靈蘭之  
室。以傳保焉。

楚辭九歌。吉日兮辰良。王逸注。日謂甲乙。辰謂寅  
卯。

呂氏春秋孟春紀。是月也。天子乃以元日。祈穀于  
上帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。措之參于保介之  
御間。高誘注。日。從甲至癸也。元。善也。辰。十二辰。從  
子至亥也。

王室之文

商問高義家日癸甲至癸巳云過也更十二氣始  
土帝次軒元卯天子縣舞象耳醫之參于翰公也  
召內春妙卷序吳月也天子於又云日林燁千

吸

欽端大經吉日之元更王命

甲子風晴寅

宜以轉采萬

素問靈樞經脉與篇黃帝之醫吉日庚未日歲

吉日庚申

舍 肺 憑 肺 盈

素問五常政大論其病喘喝曾憑仰息

脉經肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝曾憑仰息

肺手太陰經病證第七

卷十七肺藏脈論第

甲乙經肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝曾憑

注盈作仰息卷一精神五藏論第一

靈樞本神篇肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝曾  
盈仰息按脈經甲乙曾盈作曾憑文見上

說文十上馬部馮馬行疾也从馬入聲皮冰切

廣雅釋詁一馮滿也

楚辭離騷唱憑心而歷茲王逸注憑一作憑一作

馮五臣云、馮滿也、洪興祖補注、方言云、馮怒也、楚  
曰、馮、注云、恚盛貌、引楚詞康回憑怒、皮氷切、列子  
曰、帝馮怒、莊子曰、僕弱於馮氣、說文云、馮、薄也、按  
說文  
无改並音憤、喟馮心而歷茲者、歎逢時之不幸也、  
歷猶逢也、

段玉裁曰、按馬行疾馮馮然、此馮之本義也、展轉  
他用、而馮之本義廢矣、馮者、馬蹏箸地堅實之兒、  
因之引伸其義、為盛也、大也、滿也、淺也、如左傳之  
馮怒、離騷之馮心、以及天問之馮翼、惟象淮南之  
馮馮翼翼、地理志之左馮翊、皆謂充盛、皆畱字之  
合音假借、畱者、滿也、或段為凭字、凡經傳云馮依、

其字皆當作凭、或段為淜字、如易詩論語之馮河、  
皆當作淜也、俗作馮、非是、說文注

王念孫曰、馮者、方言、馮怒也、楚曰、馮、郭璞注云、馮、  
恚盛貌、昭五年左傳、今君奮焉震電馮怒、杜預注  
云、馮盛也、楚辭離騷、馮不厭乎求索、王逸注云、馮  
滿也、楚人名滿曰馮、馮與馮同、戴先生毛鄭詩考  
正曰、卷阿五章、有馮有翼、傳云、道可馮依以為輔  
翼、寔又云、馮馮几也、翼、助也、震案馮滿也、謂忠誠滿  
於內、翼、盛也、謂威儀盛於外、馮翼二字、古人多連  
舉、楚辭天問云、馮翼、惟象、淮南天文訓云、馮馮翼、  
翼、皆指氣化充滿盛作、然後有形與物、謹案翼通

作翊。韓詩外傳云。關雎之事大矣哉。馮馮翊翊。自東。自西。自南。自北。無思不服。漢書禮樂志。安世房中歌云。馮翼翼。翼承天之則。皆言德之盛滿也。廣

疏證 經解本六百六十七ノノ十二ウ

飲食之要。爰玩味多字大字。  
素問五藏篇成篇。多食鹹。則脉凝泣而變色。多食苦。則皮槁而毛拔。多食辛。則筋急而爪枯。多食酸。則肉胝脢而脣揭。多食甘。則骨痛而髮落。此五味之所傷也。

又宣明五氣篇。五味所禁。辛走氣。氣病無多食。辛。鹹走血。血病無多食。鹹苦走骨。骨病無多食。苦甘走肉。肉病無多食。甘酸走筋。筋病無多食。酸是謂五禁。無令多食。

靈樞五味論。黃帝問于少俞曰。五味入于口也。各有所走。各有所病。酸走筋。多食之。令人癃。鹹走血。多食飲食之要。爰玩味多字大字。

之令人渴。辛走氣。多食之令人洞心。苦走骨。多食之令人變嘔。甘走肉。多食之令人悅心。下文論所以然之義今蓋不備

載

又九鍼論。五裁。病在筋無食酸。病在氣無食辛。病在骨無食鹹。病在血無食苦。病在肉無食甘。口嗜而欲食之不可多矣。必自裁也。命曰五裁。

金匱要略。梅多食壞人齒。李不可多食。令人臚脹。林檎不可多食。令人百脉弱。橘柚多食。令人口爽不知五味。梨不可多食。令人寒中全瘡。產婦亦不宜食櫻桃。杏多食傷筋骨。安石榴不可多食。損人肺。胡桃不可多食。令人動痰飲。生棗多食。令人熱渴氣脹。寒熱可多食。令人動痰飲。生棗多食。令人熱渴氣脹。寒熱

羸瘦者。猶不可食。傷人。

果實菜穀禁忌第三十五

素問生氣通天論。大怒則形氣絕。而血菀於上矣。

呂氏春秋盡數篇。畢數之務。在乎去害。何謂去害。  
大甘大酸大苦大辛大鹹。五者充形則生害矣。大喜大怒大憂大恐大哀。五者接神則生害矣。太寒大熱大燥大溼大風大霖大霧。七者動精則生害矣。高誘注諸言大者。皆過制也。

論語鄉黨篇。不撤薑食。不多食。集解孔安國曰。不過飽也。

**醫者意也非篤論**

後漢書郭玉傳醫之為言意也。神存於心手之際可得解而不可得言也。列傳七十二

全蜀王函經醫者意也。聖道非不妙愚醫不能尋聖意之要妙。怨嗟藥石不治者此為謬也。非聖人之過也。卷一證治總例

陶弘景本草經序例醫者意也。古之所謂良醫者。蓋善以意量得其節也。

唐書方技傳辨亂或觀其著書貽後世者答曰醫特意耳。思慮精則得之。脉之候幽而難明吾意所解口不能宣也。古之上醫要在視脉病乃可識病與藥值。

唯用一物攻之氣純而愈速今之人不善爲脉以情度病多其物以幸有功譬猶獵不知免廣絡原野冀一人獲之術亦疏矣一藥偶得它味相制弗能專力此難愈之驗也脉之妙處不可傳虛著方劑終無益於此吾所以不著書也

列傳一百二十九

方有執曰天下有不歸一於三陽三陰之病乎嗚呼仲景殆六經熄病論不爲意也事物皆歸一於意矣尚何道可言哉傷寒論條辨圖說

子華子北宮意問篇醫者理也理者意也意其所未然意其所將然而謹訓于理夫是以謂醫張介賓曰昔人云醫者意也意思精詳則得之余曰醫者理也理透心明斯至矣夫扁鵲之目洞垣者亦窺敷于理耳故欲希扁鵲之神必須明理欲明於理必須求經經理明而後博採名家廣資意見其不通

神入聖者未之有也

類經附翼序

按醫者意也語以郭玉為始蓋非廢書亦蓋精慮熟思之謂非廢書而私意自用之義自許胤宗之言出而淺人或執以為著書無益於治病甚謬矣宋李庚序幼幼新書曰或乃謂醫特意耳不庸著書唐史臣以此剗口稱道於許嗣宗殊不知張仲景孫思邈輩率千百年而得一人使其方劑之書不傳則醫之道或幾於熄矣是或一偏之論也李氏此言先得吾所嗜因載於斯

古之痿厥即今之脚氣

素問四氣調神大論冬三月此謂閉藏水冰地坼無擾乎陽早起晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春為痿厥奉生者少又生氣通天論秋傷於濕上逆而欬發為痿厥王冰注陰陽應象大論曰地之濕氣感則害皮肉筋脉故濕氣之資發為痿厥厥謂逆氣也

又陰陽別論三陽為病發寒熱下為癰腫及為痿厥脇痛王冰注謂痿疼也痿無力也厥足冷即氣逆也又異法方宜論中央者其地平以濕天地所以生萬

物也衆其民食雜而不勞故其病多痿厥寒熱王冰注濕氣在下故多病痿弱氣逆及寒熱也

又通評虛實論凡治消瘅仆擊偏枯痿厥氣滿發逆

肥貴人則高梁之疾也王冰注厥謂氣逆靈樞本輸篇轉筋者立而取之可令遂已痿厥者張而刺之可令快立快也

又邪氣藏府病形篇脾脉急甚為瘓癰微急為膈中飲入而還出後沃沫緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心急然若無病

又本神篇恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下

又經脈篇口乾舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛又雜病篇痿厥為四末東、悅乃疾解之日二不仁者十日而知無休病已止

又口問篇下氣不足則乃為痿厥心悅補足外踝下留之又痿厥心悅刺足大指間上二寸留之一日足外踝下留之

按醫書中所云厥當作痺說文痺、竚氣也厥發石也義自別素問所稱厥王冰並以逆氣釋之此即痺字之本義而仲景以厥為手足逆冷者引伸言

雜錄卷四 腳氣  
道引法論曰 夫中央者其地平以濕法土德之用而生物也衆故中國之人食雜而不勞是以多痿厥

之也。如素靈稱痿厥者皆當作廢足後世所謂脚氣是也。王冰注厥論曰 厥謂氣逆上也。世謬傳為脚氣廣篤方論焉。後人皆主王說。但林億千金方凡例云 古以廢足為脚氣。今攷素問五藏生成篇血凝於足者為厥。及痿厥之厥皆廢字之義竟與厥論所說之厥不同。說文 廢，僵也。呂氏春秋盡數篇處足則為廢。為廢本生篇招廢足之機重已篇多陰則廢。多陽則廢。此後世所稱脚氣而高誘注以逆寒疾釋之。是以癥解廢。謬也。孫真人云 古人少有脚氣恐亦非通論。要之厥癥廢三字或當假借通用而其本義各異。扁鵲傳尸廢足亦當作廢為正。

孟子公孫丑上篇 今夫蹶者趨者是氣也而反動其心

呂氏春秋不廣篇 北方有獸名曰蹶。說苑復恩篇郭璞注引呂氏春秋亦作廢。鼠前而免後趨則跕走則顛常為蛩蛩距虛取甘草以與之蹶有患害也。蛩蛩距虛必負而走。

焦循曰 淮南子精神訓云 形勞而不休則蹶。高誘注云 蹶，顛也。荀子富國篇注云 蹶，顛倒也。國語越語云 蹶而趨之。注云 蹶，走也。呂氏春秋慎小篇云 人之行不廢足於山則蹶由於行。孟子正義

舟船

本草經雲母主治中風寒熱如在車船上

畢沅曰古伍字作五

舟人怒而以楫撻其頭顧

## 舟船

素問方盛衰論醫氣虛則使人夢見舟船溺人

說文八篇下舟部舟船也船舟也段玉裁曰坤風  
方之舟之傳曰舟船也古人言舟漢人言船毛以  
今語釋古故云舟卽今之船也又曰二篆為轉注  
古言舟今言船如古言屨今言鞋舟之言周旋也  
船之言泝治也按孔穎達毛詩谷風正義云舟者  
古名也今名船段說本於斯

業廣按韓非子功名篇若水之流若船之浮又千  
鈞得船則浮鎋銖失船則沈呂氏春秋蕩兵篇有  
以乘舟死者欲禁天下之船悖又必己篇孟賁過  
於河先其五

人不爲又船父蘇至仲尼問子桑父曰吾子之學

道者莫过乎溫故知新溫故能知新知新故能進

不疑外更知多寡故能進不疑外更知多寡故能

進

不知其孟賁也。中河孟賁瞋目而視舟人。髮植目

裂髮賓指舟中之人盡揚播入於河。使船人知其孟

賁。弗敢直視。涉無先者。又況於辱之乎。由是觀之

漢已前已用船字。段氏謂漢人言船者恐謬。

又知度篇絕然者託  
於船致遠者託於江  
雷朝王者託於賢伊尹  
呂尚管夷吾百里奚  
此雷朝王者之船驥也

有兩蛟夾繞其舟

次非謂舟人曰子嘗

見元兩蛟繞舟能兩

活者子舟人曰未之

見也又殺之而復

活

莊子山木篇方舟

而濟於河有虛舟

來觸舟雖有偏心

之人不怒又漁父篇

至於澤畔方將杖藜而引其船又乃刺船而去延緣葦間

恍惚 惺然 眇眇

素問靈蘭祕典論恍惚之數生於毫釐

王冰注恍惚者謂似有似無也忽亦數也

老子第十四章是謂無狀之狀無物之象是為忽  
恍河上公注勿忽恍惚者若存若亡不可見之也  
又孔德之容唯道是從道之為物唯恍唯忽勿兮  
恍兮其中有像恍兮忽兮其中有物窈兮冥兮某  
中有精釋文恍况往反又呼廣反

韓非子忠孝篇為恬淡之學而理恍惚之言

恍然

靈樞小針解篇寫則恍然若有失也

說文悅、狂之兒心況

省聲廣雅釋詁悅

狂也史叔本於斯

何晏論語子罕篇曉

之在前忽焉在後集

解云言忽悅不可為形

像也陸德明釋文作

惚悅云今作恍惚

按恍惚見禮記樂義

畢沅老子疏異云河上

公作忽忧王弼作惚

忼河上忼是足弼忼是

其忼忼則並非也

史崧釋音悅吁往切狂兒。

按玄應衆經音義云悅古文兌悅二形同

睭睭

素問藏氣法時論虛則目睭睭無所見

又刺腰痛篇解脉令人腰痛痛引肩目睭睭然時遺

溺

又目睭睭然

又目睭睭欲僵仆

又脉解篇起則目睭睭無所見者

王篇睭呼尤切目不明

熊氏藏氣法時論釋音王篇文同唯睭作睭

按忼或作忼或作忼睭睭亦忼忼之義玄應一切

經音義三引漢書音義云忼忽眼亂也知睭乃忼  
之从目者或作睭明本醫籍多作眇眇者俗又廣  
雅釋詁忼忼忘也王念孫疏證云忼者說文忼忘  
也墨子脩身篇云忘名忼忼者王篇忼忼忼忼也  
忼與忼同合言之則曰忼忼淮南子人間訓使忼  
忼而後能得之高誘注云忼忼善忘之人忼亦與  
忼同忼忘聲相近忼忼猶忼忘耳忼之言荒

肘後方用豚方法

附載醫心方

救卒死、扁鵲法、又云、斷犧尾、取血飲之、并縛犧以枕之死人、須臾活。卷二十一

治交接勞復陰卵腫、或縮入腹、腹中絞痛、或便絕方、取犧子一枚、撞之三十六、放於戶中、逐使喘極、乃刺脇下、取血一升、酒一升合和、飲之、若卒無者、但服血勿便冷、應用犧子。卷二十一

按醫心方引刪繁方云、治轉筋陰囊外縮入腹、腹中絞痛、從交接極損所為方、取犧子一頭、杖撞卅六下、放於戶中、逐之使喘極、刺脇下、取血一升、以酒一升、共和飲之、若無酒、單血亦好、勿令冷凝也。

又方取狂狶脰及血、和酒飲之、差。同上

治卒厥逆上氣、又兩心脇下痛滿淹淹欲絕、方溫湯令灼灼爾、以漬兩足及兩手、數易之也、此謂奔豚病從卒驚怖憂遂得之、氣上縱縱衝心胸、脣間築築發動、有時不治煞人、諸方用藥皆多、又必須熬豚、桂枝唯有一湯、但可辨耳、甘草二兩、人參一兩、桂心二兩、茱萸一升、生薑一斤、半夏一升、以水一斗、煮取三升、分三服、此藥宜預蓄、得病便急合之。卷三廿八

外臺引肘後文畧同、而無諸方用藥云云十九字、  
卷十一豈王氏所見本、與今本不同耶、抑宋臣所刪去耶、

據所載醫心方小品集驗等文、用豚者、蓋古義也、葛氏療白朮方、殺猪即取肚破去屎及熱以反搘頭上、須臾蟲出著肚、若不盡更作取、令無蟲卽休。卷五廿九

附

醫心方引小品方云、師曰、病有奔狶、有吐膿、有驚怖、有大灸耶、此四部病、皆從驚怖得之、所言如奔狶之狀者、是病人氣如犯奔走、氣息喘迫上逆之狀也、湯方用贍猪者、謂雄狶、狗斗子是先逐之使奔之、然後飲取血及藏合藥也、卷九廿三

外臺卷十二、引小品、无湯方用贍猪云、文、十四

又葛根奔犯湯方、葛根八兩、干者生李根一升、去皮人參三兩、术二兩、半夏一升洗炙、夕藥三兩當歸二兩桂五兩、生薑一斤、甘草二兩、凡十物以犯汁二斗、煮得五升溫服八合、日三同上

外臺卷十二引貴德湯無煮犯

十三

又牡蠣奔犯湯方、牡蠣三兩、桂肉八兩、李根一斤、甘草三兩、凡四物煮、犯令熟、取汁一斗七升、煮大李根得

七升汁內藥取三升、分服五合、日三夜再同上

集驗方、貴德痰伏苓湯治虛氣五藏不足寒氣厥逆腹滿氣貴衝冒鬲發作氣欲絕不識人氣力羸劣小腹起騰踊如犯子走下方、生葛八兩、甘李根白皮切一升、生薑五兩、伏苓四兩、半夏一升洗人參三兩、甘草

三兩當歸二兩、芎藭二兩、肥犯一頭、世斤者逐走令口中沫出、刺取血治犯如食法、以水足淹犯、熟取出之、澄取清汁、吹去上肥、得一斗二升、酒二升、并血合煮諸藥取五升、服八合、日三同上

外臺卷十二引集驗文有小異同而无肥犯一頭

云文方後煮法大異

十一

幼：新書、賈女孺治少小心驚、防病牛黃湯方後云、右前件藥細切、取豚五歲及外、以水一斗、煮藏外得三升、去滓澄清、內諸藥、煮取一升三合、去滓下芒硝洋盡、一服二合、日三夜一、卷十一

又賈女孺治少小驚癇、制手縮不止、十二味牛黃豚

血湯方、豚血五合、炙云云、同卷十二

又嬰孺治少小驚癇、壯熱中風、四肢掣手癓、吐舌  
出沫、當歸湯方、當歸二分、豚卵一隻切細、云云、同  
上  
又嬰孺治少小驚癇、掣手癓、一日一夜百餘發。  
葛散子方云、若不可服用、當歸半兩、小豚卵  
一具、同上

壞證勞復等用鼈甲

附後方、若病失治、及治不差、十日已上、皆名壞病、唯  
應服大小鼈甲湯、此方藥分兩乃少、而種數多、非備  
急家所辨、故不載、卷二

又治篤病新起、早勞及食飲多、致欲死方、千金外臺  
證類本草

致下有  
復字

燒鼈甲、服方寸七、同上

千金卷十、外臺卷四、引千金、並鼈甲下、有末  
字、壽域神方、衛生易簡方同、類聚六十三同

外臺、張文仲療傷寒八九日不差、名為敗傷寒、諸藥  
不能消者方、鼈甲炙蜀升麻、前胡、烏梅、枳實炙、犀角  
屑、黃芩各二兩、甘草一兩炙、生地黃八合、右九味切、

以水七升、煮取二升半、分五服、日三服、夜二服、出支

太醫方、卷一

傷寒

活人書卷十七、名鼈甲散、敗作壞、總病論卷五、名

鼈甲犀角湯、无枳實、前胡作柴胡、

又必效、療天行病、經七日以上、熱勢彌固、大便澁秘、心腹痞滿、食飲不下、精神昏亂、恍惚、狂言浪語、脈沈細、衆狀之中、一無可救、宜決計服此、鼈甲湯方、鼈甲一兩炙、細辛二兩、桂心二兩、白朮二兩、生薑四兩、吳茱萸一兩、白鮮皮二兩、附子二兩半炮、枳實二兩炙、茵陳二兩、大黃三兩切、右十一味切、以水八升、煮取二升六合、去滓、分三服、服別相去、如人行五里進一服。

卷三

傷寒總病論卷五、名附子鼈甲湯、

聖惠方、治壞傷寒、經數日未解、潮熱時作、煩躁面赤、宜服升麻散、方川升麻三分、鼈甲三分、前胡半兩、烏梅肉半兩、枳殼參分、犀角屑參分、黃芩參分、甘草半兩、葛根三分、右件藥擣篩為散、每服五錢、以水一大盞、煎至五分、去滓入生地黃汁一合、更煎一兩沸、不計時候、分為二服。

又治壞傷寒、經十日已來、未解、熱在胃膈、煩悶不止、宜服鼈甲散、方、鼈甲一兩、柴胡兩、川升麻一兩、烏梅肉一兩、枳實一兩、犀角屑一兩、黃芩一兩、甘草半

諸方各味下、必載修治、今省不載、宜攷本書下皆倣之、

兩右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入生地黃汁半合更煎一兩沸不計時候分

溫二服

類聚四十九引五十一

又治傷寒後夾勞骨節煩疼時有寒熱欬嗽頭目疼痛宜服柴胡散方柴胡壹兩貝母一兩知母一兩人參一兩赤芍藥一兩石膏一兩黃芩參分杏仁一兩白朮半兩梔子人半兩鼈甲壹兩右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

類聚四十九引五十一

又治傷寒後夾勞四肢煩熱骨節疼痛不思飲食時欬嗽心胷痰壅宜服鼈甲散方鼈甲一兩半柴胡

一兩半秦艽半兩紫苑半兩桔梗參分麻黃參分桃人壹兩半夏半兩知母參分桂心半兩陳橘皮半兩黃耆參分右件藥擣篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

類聚四十九引五十一

治傷寒後夾勞體瘦少力四肢疼痛心膈痰壅時有欬嗽不思飲食宜服柴胡散方柴胡一兩鼈甲一兩白朮三分人參三分天門冬一兩桑根白皮半兩枳殼半兩桂心半兩當歸半兩百合三分紫苑三分桔梗半兩欬冬花半兩麥門冬半兩陳橘皮半兩黃芩半兩梔杷葉三分甘草半兩右件藥擣篩為散每服

五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計

時候溫服

類聚四十九引

又治傷寒後夾勞煩熱四肢疼痛不欲飲食宜服犀角散方犀角屑三分赤茯苓三分枳殼三分柴胡一兩半白朮三兩鱉甲一兩半知母半兩赤芍藥三分甘草半兩右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

又治傷寒後夾勞黃瘦體熱四肢煩疼不欲飲食宜

服秦艽散方秦艽一兩人參三分鱉甲一兩白朮一兩半夏五分五味子半兩甘草半兩柴胡一兩黃芩半兩桔梗半兩麥門冬半兩黃耆一兩右件藥搗篩

為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

類聚四十九引

又治傷寒後夾勞四肢無力脾胃氣弱飲食無味肩背疼痛宜服木香丸方木香半兩鱉甲一兩白朮三分少柴胡一兩半夏半兩桔梗三分枳殼三分陳橘皮三分五味子半兩黃耆半兩桃仁一兩白芍藥一兩右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十九

類聚四十九  
ノ六十二

又治傷寒後虛羸盜汗不止四肢無力向晚增寒宜服鳖甲散方鳖甲三分蒼朮一兩附子三分甘草三分人參三分黃耆三分肉蓯蓉三分桃仁三分熟乾

地黃三分、牛膝三分、柴胡三分、五味子三分、牡蠣一  
兩、枳殼三分、杜仲三分、右件藥搗篩為散、每服五錢、  
以水一大盞、入生薑半分、茱萸三枚、煎至五分、去滓、不  
計時候溫服。

類聚四十九ノ六十四才

又治時氣新差、起早勞復及食飲過多、復發欲死方  
右以鼈甲三兩、醋涂炙令黃熑、去裙襠、擣羅為散、每  
服二錢、以粥飲調下、不計時候服。

類聚五十一ノ四才

又治熱病後、體氣尚虛、用力太早、遂生寒熱、四肢乏  
力、宜服鼈甲飲子方、鼈甲半兩、柴胡一兩、人參一兩、  
甘草半兩、白朮一分、雄鼠糞七枚、右件藥細剉拌令  
勻、分為二服、每服以水二大盞、入生薑一分、葱白三

莖煎至一盞、去滓、入研了鼠糞、攪勻、不計時候、分溫  
二服。

類聚五十二才

又治熱病後、體虛成勞、氣力羸弱、或寒或熱、狀如瘧、  
四肢煩悶、宜服黃耆散方、黃耆三分、知母半兩、桑根  
白皮半兩、鼈甲一兩、甘草一分、陳橘皮三分、白朮三  
分、或一合、右件藥搗篩為散、每服五錢、以水一大盞、  
入葱白三莖、生薑半分、煎至五分、去滓、不計時候溫  
服。

同上十五ノ二

又治熱病後、虛勞煩熱、四肢疼痛、小便赤黃、不欲飲  
食、宜服柴胡散方、柴胡一兩、生乾地黃一兩、黃連  
地骨皮一兩、枳殼一分、赤茯苓、甘草半兩、鼈

甲三分、知母半兩、右件藥擣篩為散、每服五錢、以水一大盞、煎至五分、去滓、不計時候溫服。

同上

又治熱病後、虛勞盜汗、口苦不得睡卧、四肢煩躁、舌乾卷滯、宜服人參散方、人參一兩、麥門冬一兩半、赤芍藥一兩、柴胡一兩、白茯苓一兩、黃耆一兩、牡蠣一

兩、甘草半兩、鼈甲一兩、右件藥擣羅為散、每服四錢、以水一中盞、煎至六分、去滓、不計時候溫服。

同上

又治熱病後、虛勞、四肢無力、亥時寒熱盜汗、心中虛悸、不能飲食、日漸瘦羸、宜服黃耆丸方、黃耆一兩、參一兩、知母三分、白芍藥三分、茯神三分、牡蠣一兩、鬼箭羽半兩、木香三分、白朮一兩、陳橘皮三分、五味

子三分、地骨皮三分、麥門冬一兩半、沈香一兩、甘草半兩、牛黃半兩、麝香半分、鼈甲半兩、右件藥擣羅為末、入牛黃麝香研令勻、鍊蜜和擣三百杵、丸如梧桐子大、每服食前以溫酒下三十丸、如不飲酒用粥飲下亦得。

同上

神巧萬全方、治壞傷寒、經數日未解、潮熱、時煩躁、面赤、升麻散方、川升麻三分、鼈甲三分、前胡半兩、烏梅肉半兩、枳殼三分、犀角屑三分、茜草三分、甘草半兩、葛根三分、右件為末、每服五錢水一大盞、煎至五分、去滓、入生地黃汁一合、更煎一兩沸、不計時候、少為二服。

同上

聖濟總錄治傷寒過經半月不解。鼈甲湯方。鼈甲、

茈胡、升麻各一兩。烏梅半兩。枳實、犀角屑、黃芩各

一兩。甘草半兩。右八味麌擣篩每五錢七水壹盞半煎至七分去滓下地黃汁二合攪勻食後分溫

二服。

類聚五十八卷

聖濟總錄治傷寒過經潮熱不解。亥時作寒如瘡狀。此胡鼈甲湯方。此胡鼈甲、赤茯苓各一兩。黃芩知母、桑根白皮各三分。甘草半兩。右七味麌擣篩每服五錢七水一盞半生薑半分拍碎煎至七分去滓溫服不拘時。

類聚五十八卷

又治傷寒後潮熱不退。發歇無時。秦艽湯方。秦艽、當

甲各一兩。甘草半兩。右三味麌擣篩每服五錢七水一盞半。生薑半分拍碎敲一百粒。葱白五寸煎至七分去滓溫服。

同上卷九

治傷寒餘毒。潮熱不解。秦艽、茈胡湯方。秦艽、茈胡、知母、青蒿各一兩。大黃、鼈甲、鬼臼、常山各半兩。右八味麌擣篩每服三錢七水壹盞煎至半盞去滓溫服不拘時。

同上卷九

又治傷寒潮熱不退。常山湯方。常山參分。烏梅肉、鼈甲、黃耆各一兩。大黃、甘草各半兩。茈胡二兩。右七味麌擣篩每服三錢七水一盞半入小麥一匙。生薑三片煎至七分去滓熱服不拘時。日三。

同上卷九

溫疫論。凡疫邪交卸，近在一十，遠在二七，甚至三七。過此不愈者，因非其治，不為壞證，即為痼疾也。夫痼疾者，所謂客邪膠固於血脉，主客交渾，最難得解。且愈久益固，治法當乘其大肉未消，真元未敗，急用三甲散，多有得生者。更附加減法，隨其平素而調之。三甲散，鼈甲、龜甲各一錢，川山甲末五分，蟬退五分，姜蠶五分，牡蠣五分，麤虫三個，白芍藥七分，當歸五分，甘草三分，水二鍾，煎八分，濾清溫服。卷下

頭痛用承氣湯

當与卷十對看

附子條相對看

頭篇用

傷寒論。傷寒不大便六七日，頭痛有熱者，與承氣湯。其小便清者，知不在裏，仍在表也。當須發汗。若頭痛者必衄。宜桂枝湯。太陽中篇

活人書。陽明論。頭疼不惡寒，反惡熱，曾實故也。陽明氣實，故攻頭也。調胃承氣湯主之。仲景去傷寒，不大便六七日云云。卷九問頭疼，亦少。

本草衍義。有人苦風痰頭痛，顫掉吐逆，飲食減，醫以為傷冷物，遂以藥溫之，不愈。又以丸藥下之，遂厥復與金液丹，後譖語吐逆，顫掉不省人，狂○元極若作事鬼，循衣摸床，手足冷脈伏。此胃中有結熱，故昏瞀不

省人以陽氣不能布於外、陰氣不持於內、卽顫掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈。方見仲景後服金鎗

丸見刑繁

卷三十三  
文畧同冠

雞峯方卷四十五  
亦載此證

世頗同

告田以冠氏為本

為本

十形三療。一婦人年四十餘病額角上耳上痛鳴呼為偏頭痛。如此五七年。每痛大便燥結如彈丸。兩目赤色。眩運昏澁。不能遠視。世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸。芎犀丸之類。連進數服。其痛雖稍愈。則大便稍松。兩目轉昏澁。其頭上鍼灸數千百矣。連年著灸。其兩目且將失明。由病而無子。一日問戴人。戴人診其兩手脉。急數而有力。風熱之甚也。余諳此四五年矣。遍察病目者。不問男子婦人。患偏正頭痛。必

大便澀滯結硬。此無他頭痛或額角是三焦相火之經。及陽明燥金勝也。燥金勝乘肝。則肝氣鬱。肝氣鬱則氣血雍。氣血雍則上下不通。故燥結於裏。尋至失明。治以大承氣湯。令河水煎三兩。加芒消一兩。煎成。

○原作殘  
從類聚改

今頓令溫。合作三五服。連服盡。蕩滌腸中

垢帶結燥積熱。下池。

○王機微  
義作泄  
如湯二十餘行。次服

七宣丸。神功丸以潤之。波菱葵菜猪羊血為羹。以滑之後。五七日十月。但遇天道晴明。用大承氣湯。夜盡一劑。是痛隨利減也。三劑之外。目豁首輕。燥澤結釋。得三子而終。傳門事親卷七十三

續醫說。一婦人偏頭痛久不愈。醫用大承氣湯即瘳。

何也。蓋陽明燥金勝乘肝氣鬱鬱則血壅。血壅則上下不通。故燥結以承氣湯疏通之。則氣血流行而肝氣通矣。傷寒治例云。少陽偏頭痛多便閉。宜下之。此為新病者設。若久病元氣不足者。更作處治。卷六  
頭痛篇

治驗

吳又可曰。時疫初起邪氣蟠踞於中表裏阻隔裏氣滯而為悶。表氣滯為頭疼身痛。因見頭疼身痛往往誤認為傷寒表證。因用麻黃桂枝杏蘇葛根敗毒九味羌活之類。此皆發散之劑。強求其汗。妄耗津液。經氣先傷。邪氣不損。依然發熱也。更有邪氣傳裏。表氣不能通於內。必壅於外。每至午後潮

熱。熱甚則頭脹痛。熱退則已。此言表實者耶。以上似表誤為表證。妄投升散之劑。原邪愈實。火氣上升。頭疼轉甚。須下之。裏氣一通。經氣降而頭疼立止。若果感冒頭疼。無時不痛。為可辨也。且有別證相參。不可一途而取。溫疫論卷下。似表非表。似裏非裏。

螺青本草攷ルアシ疑バ青螺ナラン大青月トスルハ恐バ是ニアラズ  
薩摩山曰青螺ハヤクガヒ薩州  
夜久島ノ産ニ故ニ名ク誤テ夜光少形紅螺ニ似テ原子ク大ラミ微扁シ  
外色灰白、内ハ銀色ニシテ珠色如シ外皮ヲ去リ去キハ深緑色ナリト云々本草啓蒙四十二ノ十九ウ

○本事續集ノ文  
コノ处へレル

### 治鼻痔

治鼻痔方 附鼻卷五重出 卷七又參

經驗良方治鼻痔即瘻肉 醫方類聚卷七十九引辨

甜瓜蒂又名苦丁香 甘遂各四兩 白礬即大

草烏尖各半錢

右為末清油搜令硬得些子旋丸如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日

壹次用

得効方消鼻痔方 同上卷七十九引辨

狐帶甘遂一錢 白礬枯螺青 草烏尖絡半  
右為末麻油搜令硬不可燭旋圓如鼻孔大用藥

入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日  
一次甚妙

有持氏曰、蠟殼、タニシ  
ノカニフ、レ

瓜礬散門瓜礬散去鼻痔之疾 卷六十五

瓜蒂鉗 甘遂錢 白礬桔 螺殼煅

草烏尖名五

甘遂錢

白樺

螺殻

為末用真麻油調令軟硬得所，旋丸如鼻孔大，每日一次以藥入鼻肉令達痔肉上，其痔化為水肉，皆爛下即愈。

按有持桂里曰。鼻痒輕者瓜蒂或甘遂只一味可得治。重者非此散難收功。見方藥輓卷十五。

本事方續集消鼻痔方 卷五

**瓜蒂** 炒四錢

甘遂同

白礮枯羊錢

**螺青** 半錢  
**炒**

右為末用真麻油搜令硬得些子不可爛旋圓如  
鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉  
皆爛下每日一次用妙不可言

右為末用真  
銀屑子  
鼻孔大用藥  
皆爛下每日

麻油搜全  
入鼻內，  
一次用半

令破得此  
令達痔肉

鼻病用瓜蒂細辛二味方 鼻病用瓜蒂細辛等  
載此二味方餘不具載 卷七至卷九

肘後方療鼻中塞肉不通利方 外臺卷廿二十九

細辛 瓜蒂各等分末以吹鼻中須臾滌出頻吹  
之即差 注千金方以絮裹如棗大塞鼻中須臾通  
張文仲亦治鼻塞不聞香臭方 卷五

樣要方療鼈鼻不聞香臭方 醫心方卷五

細辛 瓜蒂

分等為末以吹鼻中須臾大涕出恒能久自通

宋經心方 瓜蒂二分細辛一分  
作散絮裹如豆塞鼻須臾通

千金方治鼈鼻有息肉不聞香臭方 卷六上十六

瓜子 細辛

右二味各等分末之以綿裹如豆大許塞鼻中湏  
臾即通

醫方類聚校訂

千金方治齧鼻有息肉不聞香臭方

聖惠方、鼻齧氣息不通方

神巧萬全方同朱氏

集驗方名細辛散

瓜丁

聖惠方、萬全方半兩

細辛

聖惠方、萬全方一分

右二味各等分為末以絲裏如豆大許塞鼻中

驗方直指須臾即通千金翼方同施圓端效方為細辛散半錢一字鼻內備預百要方為末綿裹塞鼻

是齊醫方治齧鼻有息肉不聞香臭

方出千金得效方、名言田次律曾患此息肉已垂出  
鼻外用此藥傳之即化為黃水點滴至盡不三四

日遂愈後不復作瓜丁即瓜帶也、王氏集驗方又名苦丁香、細辛、右二味等分末之以綿裹如豆許塞鼻中須臾即通經驗良方同、自鼻中息肉俗謂之鼻痔千金治此疾方極多當時適以此取效耳、類聚卷七十八九叶

桃人淨氣湯有治中焦及治上部之功

古今錄驗療往來寒熱、曾有逆滿、桃人淨氣湯方、大黃四兩、瀆別下、甘草炙、去消湯成下、桂心各二兩、桃人五十枚、去皮尖碎、右五味以水七升煮、取二升半、去滓內、去消更煎一兩、沸溫分三服、外臺卷一九、拔粹方、桃仁淨氣湯、治血結、曾中心、心下手不可近、為中部畜血、無寒熱、曾滿、嗽水不欲嚥、喜忘、昏迷、其人如狂、桃仁半兩、大黃一兩、甘草二錢半、桂參錢、去參錢、右咬咀、每兩一兩水二盞、生薑七片、煎至一半、去滓入硝化開食後服、若牙齒等蝕數年不愈、當作陽明蓄血治之、此湯細末、煉蜜丸、桐子大服之、好飲

過者、多有此疾、屢服有效。

類聚六十引九

玉機微義文与拔粹方同

類聚八十五引三十一

觀聚方四引、本書未校下同

識病捷法、桃仁承氣湯、噎癌有積血者、為丸酒送下五十九、隔一日服一次、十次為止、其藥韭汁糊丸。

傷寒醫義二引  
本書未校

證治大還、吐血勢不可遏、胸中氣塞、上吐紫黑血、此瘀血內熱盛也、桃仁承氣湯加減下之、打撲內損、有瘀血者必用。

張氏醫通、齒數年不愈、當作陽明畜血治、桃核承氣為細末、煉蜜丸如桐子大、服之、好飲者多此、屢服有效。

醫酉學正傳、一男子年三十五、胃脘作痛久矣、人形黃瘦。

後

食少而胷中常若食飽來求治、與加味枳木丸、脹不効、而日漸大痛、叫號聲聞四隣、別父母妻子、屬什後事、欲自殺、予與桃仁承氣湯作大劑與之、連二服、大下瘀血四五碗許、困倦不能言語者三日、教以稀粥少食、漸漸、將理病全安、復壯如舊。卷四十二

又引丹溪曰、治平日喜好熱物、致死血流於胃口而作痛者、以桃仁承氣湯下之安。同上六

又腹痛瘀血作痛者、小柴胡合四物湯加桃仁紅花、或乳香沒藥煎服、痛甚而元氣壯實者、桃仁承氣湯下之而愈。同上四十二

又桃仁承氣湯、治男子婦人、血結胷、手不可近、及中

焦畜血妄言見鬼昏迷如狂及久病胃脘疼痛畜血  
等證卷五

又跌撲損傷腹痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加  
蘇木紅花下之卷六

萬病回春吐血卽見胷中氣塞吐紫血桃仁承氣  
湯下之卷四失血

壯原湯原治敷脹之方

孫一奎赤水玄珠卷六脹滿門壯原湯去治下焦虛  
寒中滿腫脹○有持指里由按中滿腫脹四字乃眼目說見下小水不利上氣  
喘急陰囊兩腿皆腫或面有浮氣人參白朮各二錢  
茯苓破故紙各一錢桂心大附子乾薑砂仁各五分  
陳皮七分水煎食遠服有痰加半夏一錢喉中痰聲  
加桑白皮一錢咳嗽亦加脚趺面腫加薏苡仁二錢  
中氣不轉運不知餓加厚朴木香氣鬱不舒加沈香  
烏藥臨服磨入氣虛甚者人參加作五錢大附子加  
作一錢半汗多者再加桂枝五分白芍藥酒炒過八  
分若夏月喘乏無力或汗多者加麥門冬一錢五味

子十一粒。夜夢不安者、加遠志一錢。兩脇氣硬、加白芥子八分。若面浮脹下氣硬、加白芥子紫蘇子五分。若身重不能轉動、加蒼朮一錢。澤鴻七分。濕盛加桑白皮赤小豆。

甲賀通元刪補古今方彙有持桂里方輿輓收此方于鼓脹門今運用水腫屬虛者而有殊驗世或有慣所聞而忽所見者往往不知此原治鼓脹之方皆不檢本書之誤也今揭本書全文及方後加案減法以警言淺人苟且之弊云爾

有持桂里曰中滿脢脹小便清白大便不實口中和脉遲緩此為壯原湯之正脉證業廣按此方帶

附子理中四君子等意且有中滿文則雖曰下焦虛寒其實溫中下二焦之方也

可與猶可用

傷寒論可與某湯、不可與某湯。

韓非子卷三十過篇、君遂不用濕明、而與堅刀。  
呂氏春秋卷二十三貴直篇、王胡不能與野士乎。  
高誘注、與猶用也。

高慈老與

呂方君知遇二十餘年而以疾相見其

轉非半參三十點萬數不厭其微此

高慈老與



