

醫學管錐內集

三

X  
i 18-1

胎教

490.9  
Ig-3  
4

No. 2038  
12-1 18-1



富士川文庫

1250

醫學子管錐卷三目錄

九折堂山田氏圖書之記

人子不可不知醫

生栗安脚氣

水病針出水法

禁水病針出水

肝藏在右

五香湯

五香連翹湯方

漏蘆湯

漏蘆湯治諸瘍腫

瓜蒂下水

紫蘇用莖葉

大黃別瀉先水瀉

小兒用新汲水

小兒初生服葱白方

一指按三關

小兒搐搦不可捉持手足

小兒禁溫飽

古名呷嗽者疑後世之頓嗽

生薑用一二片之弊習。甘草空腹用。



淺田栗園所說

王勃難經序云勃養於慈母之手每承過庭之訓曰人子不知醫古人以為不孝

王仲宣甲乙經序云若不精通於醫道雖有忠孝之心仁慈之性君父危困亦子墮地無以濟之焦氏筆乘云許道幼以母疾曉醫方遂號名醫而諸子曰為人子者嘗膳侍藥名醫傳略引隋書云許智藏曰為人子者嘗膳視書不知方術豈謂孝乎焦氏筆乘云許道幼以母疾曉醫方遂號名醫而諸子曰為人子者嘗膳侍藥不知方術可謂孝乎

周嘉胄紫濱志云為人子者不可不知醫焦氏筆乘云司馬公曰父母有疾專當以迎醫驗方合藥為務矣事親者亦不可以不知焉

按小學載伊川先生曰病卧於床委之於庸醫以之不慈不孝事親者亦不可不知醫也此語亦見孫思邈千金要方序而王勃先已言過庭則此言蓋

生薑用一二片之弊習 甘草宜重用

出文中子而伊川亦誦之也

宋人稱姜者於原此  
抽姜以片言者其尾大如錢故局方謂之姜錢舊多村榜窓先生曰崔玄亮海上集驗方療腰脚冷氣方中生姜兩片如錢亮唐太和中人所謂錢即開元錢亦足以知一片概畧焉其久吾奇效醫述四時感寒方云生姜三片為引約重

二錢負原寫大和本草云生姜一片宜用五分為定不知二氏說孰是

問

顧體廣類集云如藥引中生姜幾片燈心寫幾根謂此二者須寫分兩為量蓋

片有厚薄根有長短過與不及均難取效彙講顧兩田說蓋本於此

生姜一二片辨

人子不可不知醫

孫思邈千金要方序君親有疾不能療之者非忠孝也

唐書王勃傳嘗謂君親有疾不能療之者非忠

唐書王勃傳嘗謂人子不可不知醫唐書二百一列傳一百二十六

朱子小學外篇伊川先生曰病臥於牀委之庸醫比之不慈不孝事親者亦不可不知醫○岡本况齋先生曰此語原見程子外書

栗反脚氣

千金方。凡脚氣。病極須慎房室。羊肉。牛肉。魚蒜。戴菜菘。菜蔓。苦瓠子。酒麴。酥油。乳麋。猪雞。鵝鴨。有方用。鯉魚頭。此等並切禁。不得犯之。并忌大怒。惟得食梗梁栗。

未醬。豉葱。韭薤。椒薑。橘皮。又不得食諸生果子。酸酢之食。犯者皆不可差。又反生牛乳。生栗子矣。卷七

壽親養老書。治老人脚氣。腎虛氣損。脚膝無力。因乏生栗方。生栗一斤。以蒸熟透風處。懸令乾。右以每日空心常食十顆。極治脚氣不測。有功。醫方類聚。九十八引。百十二

衛生易簡方。治脚弱無力。用生栗為末。餽或風乾食

之。同上引。百十二

李素

徒水先取環谷下三寸以鉗針針之已刺而針之筒而內之入而復之以盡且水必堅束之緩則煩惱束急則安靜間日一刺之水盡乃止飲用藥方利之時徒飲之方飲無食方食無飲無食他食百卅五日各下三十

楊上善曰環谷當是齊中也齊下三寸開元之穴也鉗開元內筒引水水去入虛當堅束自令寒復飲補藥飲之與食相去而進間日刺之不可煩矣水盡乃止禁如藥法一百卅五日乃得愈徒空也空飲無食也則煩惱來急則安靜一日

一刺之痕盡乃止。

肘後方若止皮膚水腹內未有者服諸發汗藥得汗便差然慎風寒為急若唯腹大下之不去便針臍下二寸入數分令水出孔合須腹減乃止卷四

張介賓曰按鍼要曰凡水氣惟得鍼水溝若鍼餘處水盡即死是又不可不知也靈樞四時氣篇注

水病針出水法

靈樞四時氣篇徒瘀先取環谷下三寸張介賓曰環谷義无所谓之環跳穴以鍼針針之已刺而留之而內之入而復之以盡其瘀必堅來緩則煩悅來急則安靜間日一刺之瘀盡乃止

肘後方若止皮膚水腹內未有者服諸發汗藥得汗便差然慎風寒為急若唯腹大下之不去便針脅下二寸入數分令水出孔合須腹減乃止卷四 三十六

張介賓曰按鍼要曰凡水氣惟得鍼水溝若鍼餘處水盡即死是又不可不知也靈樞四時氣篇注

太素

徒水先取環谷下三寸以鉢針針之已刺而針之筒而內之入而復之以盡其水必堅束之緩則煩密束急則安靜間日一刺之水盡乃止飲閉藥方刺之時

徒飲之方飲無食方食無飲無食他食百卅五日

楊上善曰環谷當是齊中也齊下三寸開元之穴也鉢開元內筒引水水夫人虛當堅束身令寒復飲補藥飲之与食相去而進間日刺之不可煩夫水盡乃止禁如藥法一百卅音乃得愈徒空也空飲無食也

玄道抄

水病不可誤又不下水疾方靈樞卷十一禁水  
聚令實曰鍼灸要曰鍼水病謂醫難水再苦鍼灸  
二十七人遭水令水出针灸取之山卷四  
動水者不可針水出者可針水不之不去動全體  
拔水者可針水出者可針水不之不去動全體  
一候之水集於土  
或一處生其水又久來受相敵射來自外而自  
來自內心經以知全體之行陳而蓄之而內之外而  
蓄之四知其蓄於水水則難尋谷水之源  
水無從出水去

禁水病針出水外集卷十一當參看

千金方凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之

卷十一水腫

世傳神効方治水腫不利小便非其法也大忌脚膝  
上針刺出水取一時之効後必死矣

二醫說病水入水在膜外切不可鍼鍼透膜初時稍愈  
再來即不可治卷四水喘條引醫餘

張介賓曰按鍼要曰凡水氣惟得鍼水溝若鍼餘處  
水盡即死是又不可不知也靈樞四時氣篇注

一聖濟總錄愚醫多以鍼灸出水為功云云大抵此病  
尤忌鍼灸華佗云患水病未遇良醫第一不得鍼灸

言氣在膜外已化為水、水出即引出腹中氣、水盡則死。扁鵲云：水病在膜外，常鍼不可及，常藥不可療。惟神鍼良藥可也。卷八十引徒都子サハウ

皇朝古子和中星陵某著水腫刺鍼法二卷。說刺水腫有五利六害，然不詳載其治法，故不贅。

王子桂著水腫刺鍼法二卷。說刺水腫不除小動非其志也。大忌標榜。

李全之著水腫刺鍼法二卷。說刺水腫不除小動非其志也。大忌標榜。

禁水詩推水經卷十一管參音

王子桂著水腫刺鍼法二卷。說刺水腫不除小動非其志也。大忌標榜。

### 肝藏在右

滑壽曰：肝之為藏，左三葉、右四葉。凡七葉。其治在左。其藏在右。脇右腎之前。並胃著脊之第九椎。十四經發揮足

厥陰肝經

李梃曰：肝之系者，自膈下着右脇肋上，貫膈入肺中，與膈膜相連也。醫學子入門卷一臟腑條分肝藏注十七

四氣調神大論、逆春氣

則少陽不生、肝氣內變。王注謂動出也。

云位置、肺藏於右亦然。馬玄臺注刺禁論曰：後世安疏肝瀉肝，可以見也。馬玄臺注刺禁論曰：後世

以為其藏在右、其脉在左者非。此說却非是。自朝三谷様解體發蒙家云、宋王遠、元滑壽輩、雖知肝在右、尚云其用在左、可謂牽強。此說亦不驗諸實際之謬也。

宋王遠象海集云、人身之肝位在於右、而脉胗却見左手、脾位在於左、而脉胗却見右手、此亦陰陽互藏其宅之義也。人身類十二之卦。

其效卦古稱古醫之精、近世普醫之驗、大卦十四

祖範卦

### 五香湯

癰疽方、治惡瘡丁腫、五香湯方、普婆方同之。醫心方  
卷十六

青木香 薰陸香 沈香 丁子香 蕁藿香各一兩  
水三升、煮取一升半、分三服、得麝香二分、去藿香  
錄驗方、治惡核腫毒入腹、五香湯方。同上  
十六

薰陸香 射香 沈香 鷄舌香 青木香各二兩

凡五物、以水六升、煮取二升半、適寒溫、分作三服、  
不差復作、云令劑可盡、五香各一兩、水四升、煮取  
三升、亦為二服、又痒薄腫上、神良。

古今錄驗五香湯、療諸惡氣喉腫結核方、外醫卷廿

經心方治毒腫、五  
香湯方、同上  
沈杏 青木香  
陸香 丁香各一  
鹿射香 二兩  
五味以水五升煮取  
一升半分三服

沈香

二兩

薰陸香

一兩

麝香

湯硝

青木香

二兩

雞舌香

二兩

右五味以水五升煮取一升半去滓分三服  
崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脉寒熱如  
瘰疬痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急速  
與湯并以淳傅腫脈上方同上火

青木香

雞舌香

沈香

升麻

各五分

霍香

犀角屑

吳茱萸

桂心

麻黃

甘草

炙各三分

薰陸香

細辛各二分

右十二味㕮咀以水七升煮取二升分三服不差  
復合若晬惡寒加附子中形者一枚炮令坼八

破用

又五香湯療毒腫瘰疬方

同上

世三才

湯療毒腫方全同

崔氏五香

麝香

研

青木香

雞舌香

霍香

薰陸香

當歸

黃芩

升麻

芒消

各三大黃

五分

右十味㕮咀以水六升煮取二升去滓內消分二  
服相去如人行七八里再服諸卒尸注惡氣亦療  
千金方五香湯主熱毒氣卒腫痛結作核或似癰癧  
而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人方

卷四十一

青木香

霍香

沈香

丁香

薰陸香

各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分三服不差更

服之、并以滓薄腫上。注、千金翼以麝香代麝香末用。

千金翼五香湯、主惡氣毒腫方、卷廿三十八才

沈杏 丁香

麝麝香

薰陸香

青木香 酥壹

兩

右伍味切、以水伍升、煮取貳升、分三服、不差更合  
服、以湯滓薄腫上。按外臺卷廿四引習異方、分量  
煎法小異、六後云、集驗方用

雞舌香一兩、不用丁香。

廿四引

和劑局方、五香散、治咽喉腫痛、諸惡氣結塞不通、急  
宜服之、卷七續添諸局經驗秘方十三

鷄舌杏 木香 沈杏

薰陸香 酥壹

麝麝香

別研參分

○聖濟總錄治癰疽內攻五臟、煩悶不安、排毒托裏散方、卷百三十諸癰疽  
沈杏 雜乳香 研丁香 木香 薑藿香 各壹兩調下二錢七日三夜二不可犯鐵器。

右五味以四味擣羅為細散、入乳香和勻、先以清酒五升、黃耆五兩十錢、銛內封閉、  
浸二宿、旋取一錢、微溫調下一錢七日三夜二不可犯鐵器。

右搗羅為末、入麝麝香研令勻、每服貳錢、水壹中盞、  
煎至六分、溫服、不拘時候。

外科精義

五香湯

出總治諸瘡毒氣入腹、托裏、卷下

丁香 木香 沈杏 乳香

各一兩

麝麝香

參錢溫者去  
麝麝香加

藿藿香

渴加

人參

各一兩

右為細末、每服三錢、水一盞、煎至六分、去粗空心  
稍熱服、總錄聖惠千金外臺、治諸瘡腫方中、皆載  
此方、大同小異、大抵專治毒氣入腹、煩悶、氣不通  
者、其餘熱渴、昏昧口燥、咽乾、大便硬、小便澀者、未  
可與服。

福田方、五香散、近世醫人多為小兒總涼和劑方

云、升降諸氣宣利三焦疏導雍滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核或似癰癧而非使人頭痛惡心寒熱氣急方沈香丁香木香乳香藿香各等分右納生絹袋煎或綿裹良又或除藿香用麝香尤妙觀聚方卷七引。本書未檢按此列丸劑方今本局方無收疑有隣以意所增。

甲賀通元曰齊德之外科精義引總錄云云其說精審可為準則此方本邦為小兒初生必用之藥愚夫愚婦亦稱之未知明據謂完輩宣無故而妄為常用之方乎且使兒多服常用者亦未見生害蓋小兒一二歲多生胎毒瘡是所不免也其意原於治諸瘡毒氣之說而遂至使兒預服者欤或取諸香避穢氣之義欤明者幸云焉原醫方

外集  
五香連翹湯附錄卷二當參攷

肘後方五香連翹湯療惡肉惡脈惡核瘰疬風結腫氣痛卷五十九

木香沈香雞舌香各二兩麝香半兩薰陸一兩夜干紫葛升麻獨活寄生甘草炙連翹各二兩大黃三兩淡竹瀝三升十三物以水九升煮減半內竹瀝取三升分三服大良

小品方五香連翹湯治惡脉及惡核瘰疬風結諸核腫氣痛方醫心方卷十六杜

青木香二兩 麝香半兩 沈水香二兩  
薰陸香一兩 雞舌香一兩 連翹子二兩

夜干二兩

升麻二兩

獨活二兩

寄生二兩

大黃三兩

甘草二兩

淡竹瀝二升

凡十三物㕮咀以水九升煮藥計水減半許可內  
竹瀝汁又尅取三升分三服

文仲五香連翹湯療惡肉惡脈惡核瘰疬風結腫氣  
痛方外臺卷廿三

青木香

沈香

雞舌香各二

麝香半兩

薰陸香一兩

射干

紫葛

升麻

桑寄生

獨活

通草

連翹各二

大黃三兩

淡竹瀝二升

右十四味切以水九升煮取減半內竹瀝更煮取

三升分三服古今錄驗同注千金方無紫葛雞舌  
香有丁香  
崔氏五香連翹湯療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹兼  
取利以洩毒氣方同卷廿四

連翹三兩

蜀升麻二兩

薰陸香二兩

淡竹瀝一升

大黃四兩水一升別煮

朴消二兩熬乾別內

麝香一分研

青木香二兩

丁香一兩

獨活二兩

寄生三兩

射干二兩

甘草二兩

沈香二兩

右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後  
內大黃朴消竹瀝竹瀝更煮一兩沸去滓內麝香  
分溫三服服別相去如人行十里久以得利二三行

為度

千金方五香連翹湯、凡一切惡核、瘰癧、癰疽、惡腫患、  
皆主之方、卷廿二十一

青木香 沉香 薰陸香 丁香

麝香

射干

升麻

獨活

寄生

連翹

通草

大黃

右十二味㕮咀、以水九升、煮取四升、內竹瀝二升、  
更煮取三升、分三服、取快利。注、附後方有紫葛甘草無通草治惡肉惡脈、惡核、風結腫氣痛要籍喻義有黃耆甘草甘草消各六分、千金翼云未差中間常服佳、與小兒篇相重、小有異處。

千金翼連翹五香湯、卷廿二十一

外臺廿二引連翹五香  
湯主一切惡核、瘡腫、  
方四十四

方

連翹

青木香

薰陸香

麝香

沈香

射干

獨活

通草

升麻各二兩

丁香

壹兩

大黃

參兩別浸

右壹拾壹味㕮咀、以水九升、煮取減半、內竹瀝貳升、煮取參升、分參服、未差中間常服佳。

千金方、五香連翹湯、治小兒風熱毒腫、腫色白、或有惡核瘰癧、附骨癰疽、節解不舉、白丹走竄身中、白軫瘡不已方、卷五下

青木香

薰陸香

雞舌香

沈香

麻黃

黃芩各六兩

大黃

兩

升麻

連翹

海藻

射干

升麻

外臺引分量異

外臺卷廿六引全竟作遍

○處前ノ印入ル

枳實 各半 竹瀝 半

右十四味㕮咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合至百日暮歲一服五合一方不用麻黃

傷寒總病論治毒瘡毒氣不出煩悶熱毒氣攻腰或腹脇痛不可忍大便不通五香湯主之

卷四

麝香 半

木香

丁香

沈香

乳香 半

芍藥

枳實

射干

連翹

黃芩

麻黃

甘草 半

大黃 一兩

四錢水一盞竹瀝半盞煎八分去滓下

宣明論五香丸治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡腫沉香木香雞舌草各一兩薰陸香鹿角各三錢連翹二兩末右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時

卷十五

朴硝一錢七和服以利為度

本事方續集治一切惡核瘰癧癰疽等病及惡腫

卷六

青木香

沈香

乳香

麝香

升麻

獨活

連翹

桑寄生

木通

夜干

一兩

大黃

右㕮咀

乃如麻豆大也剉散也剉

每服四錢水二盞煎至一

盞已上去滓取八分清汁空心熱服半日已上未利再服以快為度或下惡物未生肉已前時服不妨以析毒熱之氣或有人使竹瀝汎消恐用藥之人不能斟量是故不載知者當自相度用之

丁香各七錢、沈香、青木香各二錢半、生甘草、乳香麝香各一錢半、每四錢水煎熱服以利惡毒為度。一方有竹瀝、芒硝隨熱輕重加減治一切積熱結核癰瘡。

癰瘡瘍瘍

卷七 百八ウ

後

婦人良方、連翹湯療產婦乳并癰、連翹子、升麻、芒硝各十分、玄參、芍藥、白欵、防己、射干各八分、大黃十二分、甘草六分、杏仁八十枚去皮尖右以水九升煎取三升、大黃次下硝三分、三服

卷廿三

五香連翹湯治諸瘡癰

附後方、小品、癰結腫堅如石或如大核色不變或作石癰不消、鹿角八兩燒作灰、白欵二兩、麝理黃色磨石一斤燒令赤、三物搗作末、以苦酒和泥厚塗癰上燥更塗取消止、內服連翹湯下之

卷五 四ウ

惡脈病身中忽有赤絡脈起如蚓狀此由春冬惡風入絡脈之中其血瘀所作宜服之五香連翹、鐵去血傳丹參膏、積日乃差、余度山嶺即患常服五香湯傳

小豆得消以下並姚方

同上 五ウ

惡核病者肉中忽有核如梅李小者如豆粒皮中慘痛左右走身中壯熱瘰疬是也此病卒然如起有

毒入腹殺人。南方多有此患。宜服五香連翹湯。以小豆傳之。立消。若餘核亦得傳丹參膏。同上五ノ十方。

氣痛之病。身中忽有一處如打撲之狀。不可堪耐。而左右走身中。發作有時。痛靜時。便覺其處冷如霜雪。所加。此皆由冬溫至春暴寒。傷之。宜先服五香連翹數劑。又以白酒煮楊柳皮。暖熨之。有赤點點處。宜錢去血也。同上五ノ十方。

小品方云。有惡核病者。宗中忽有核累。如梅李核狀。小者如豆粒。皮肉中癥痛。左右走人身中。壯熱。瘡痍畏寒。是也。与諸瘡痕瘰疬。筋結相似。其瘡痕瘰疬。要曰瘡而生。是緩疾无毒。其惡核病者。卒然而起。有

毒不治。入腹煩悶。則致人。南方多有此疾。皆是冬月受溫氣。至春夏有暴寒。冷相搏。氣結成此毒也。宜服五香連翹湯。以小豆薄塗之。得消也。尔煮五香湯去滓。時時洗瀆之。消化之後。以丹參膏傳。餘核令消盡。不消盡者。還傳小豆薄也。醫心方卷十六引十六。

小品方。治惡脉病方。宜服五香連翹湯及竹瀝湯。錢去惡血。傳丹參膏。積日則差。亦以白雄鷄屎塗之。注集驗方同之 同上

千金方。凡腫根廣一寸已下名癰。一寸已上名小癰。如豆粒大者名炮子。皆始作急服五香連翹湯下之。數劑取差乃止。卷廿二八ウ

千金翼卷廿三作諸  
癰狀多種不同無問久  
近皆五香連翹湯主  
之四十

醫心方引小品方入翼  
見于後  
雞峯方參丹參膏  
主治大小異廿九才

凡諸暴腫一一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺  
去血小豆末傳之其間數數以針刺去血若失療已  
潰爛猶服伍香湯及漏蘆下之隨熱多少依方用之  
外以升麻湯搗洗熨之毒篇丹摩升麻膏毒篇方在丹若

毒篇同上九才

生息肉者以白蘭茹散傳之云云  
或身中忽有痛處如似打撲之狀名曰氣瘤。痛不可  
忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由  
冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣  
瘤宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煎楊柳  
皮及煖熨之有赤氣點點者即刺出血也其五香連  
翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑未差便住以

謂無效即褐至矣中間將白薇散佳又有氣腫痛其  
狀如癰腫無頭虛腫色不變但皮急痛不得手近亦  
須服此五香湯次白針寫之次與蒺藜散傳之十四上  
論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有  
單服鍾乳而發者又有生平不服而自發背者此是  
上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟末  
大或痛或癢仍作赤色人皆初不以為事日漸長大  
不過十日遂至於死其臨困之時以閼三寸高一寸  
瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所  
以養生者小覺背上癢痛有異即大急取淨土水和  
為泥捻作餅子厚二分濶一寸半以麌艾火作炷灸

泥上帖著瘡上灸之一炷、一易餅子。若粟末大時可  
灸七餅子即差。如榆莢大灸七七餅炷即差。如錢大  
可日夜灸之不限炷數。仍服五香連翹湯及鐵漿諸  
藥攻之乃愈。同上廿六才

又有赤脉病。身上忽有赤脉絡起。隴聳如死蚯蚓之  
狀。看之如有水在脈中。長短皆逐脈所處。此由春冬  
受惡風入絡脈中。其血肉瘀所作也。宜五香連翹湯  
及竹瀝等治之。刺去其血。仍傳丹參膏。亦用白雞屎  
塗之良。同上廿七才

惡核病者。肉中忽有核。累累如梅李核。小者如豆粒。  
皮肉癰瘤。壯熱癱索惡寒是也。與諸瘡根瘰疬結筋。

相似。其瘡根瘰疬因瘡而生。是緩無毒。惡核病卒然  
而起有毒。若不治入腹煩悶殺人。皆由冬月受溫風。  
至春夏有暴寒相搏。氣結成此毒也。但服五香湯主  
之。又以小豆末傳之。亦煮湯潰時。洗之消後以丹  
參膏傅之。令餘核搃消盡云云。同上廿八才

惡核癰病癰疽等。多起嶺表中土。渺有南方人所食。  
雜類繁多。感病亦復不一。仕人徃彼深須預防之。防  
之無法。必遭其毒。惟須五香湯小豆散吳茱萸。皆是  
其要藥。同上廿八才

凡初得附骨疽。即須急服漏蘆湯下之。傳小豆散得  
可。服五香連翹湯方在癰疽條中。同上廿八才

以下三條前ノ小品方ノ  
類ニ入ルヘ

丸項邊腋下先作癰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麴及諸熱食凡漏有似石癰累累然作瀝子有核在兩頸及腋下不痛不熱治者皆練石散傳其外內服五香連翹湯下之已潰者治如癰法同卷廿三〔ウ〕

小品方附骨急疽者其疽處壯熱體中乍寒乍熱疼；惡寒不用熱小便或赤大便或難無汗也即得治下去熱便得消也縱不消盡亦得浮淺近外易得壞潰其不復附骨也賊風之證但痛應骨不可按抑痛處不壯熱體不仁乍寒乍熱但覺體瘻以冷砍得熱；熨痛處即小寬時有汗也即得針灸熨服治風溫

藥便効也初得附骨疽即服漏蘆湯下之傳小豆薄得消也下利已虛而腫處未消者可除大黃用生地黃及干地黃也熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黃也餘熱未消可傳升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如治癰法也醫心方卷十五

小品方云有氣腫病其狀如癰無頭虛腫色不變皮上急痛手裁著便覺痛此由體熱當風復被暴冷涼折之結成氣腫也宜服五香連翹湯白針氣寫之傳疾梨薄亦用小豆薄並得消也同卷十六十四

小品方云有氣痛病身中忽有一處痛如打棵之狀不可堪耐亦左右走身中發作有時痛發時則小熱

痛靜時便覺其處如冷水霜雪所加此皆由冬時受溫風至春復暴寒冷來折之不成溫病乃變作氣痛也宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯摩丹參膏又以白酒煮楊柳皮暖熨之有赤氣點見處宜錢去血也其間將白芨散同上十五才

婦人良方癸亥年僕處五羊趙經略廳判門摸脚疑  
聞字訛夫人年七十一歲隔二年左乳房上有一塊如鵝卵大今忽然作楚召余議藥僕云楊亦訛  
此字孫真人云婦人年五十歲已上乳房不安見癰見則不可療矣幸而未破恐是氣瘤謾以五香連翹湯去大黃煎服服後稍減則已過六七年後每遇再有腫脹

時再合服必消減矣五香連翹湯方見二十卷第二論卷二十三

漏蘆湯方

肘後方、漏蘆湯、療癰疽、丹癰、毒腫、惡肉、漏蘆、白欒、黃芩、白薇、枳實炙、升麻、甘草炙、芍藥、麻黃去節、各二兩、大黃三十物、以水一斗、煮取三升、若無藥、用大黃下之佳、其丹毒須針鑊去血。卷五十九

小品方、漏蘆湯方、醫心方卷十七引三

漏蘆二兩 白簽シカニ二兩 黃芩イエキ二兩

白芨ハナクモ二兩

枳實ジツセキ二兩

升麻ショウマ二兩

大黃オウバ二兩

甘草カンゾウ二兩

麻黃マオウ二兩

凡十物㕮咀、以水一斗、煮取三升、分三服、若是窮

外臺卷三、經心錄漏  
蘆湯方云、漏蘆無  
用施子傷寒總病  
論卷四漏蘆湯  
方云漏蘆葉無以  
山楂子代之

地無藥之處、依說增損易服之及用後單行方也  
能以鋒針鎌去血、然後傳藥大良、增損方法、无漏  
蘆、用支子十枚、无白簽亦可略耳、无黃芩亦用  
支子、漏蘆黃芩並无者、但以支子一物亦足已之  
無升麻用犀角、無犀角用蛇銜、无大黃用芷消、无  
麻黃用葛根、无葛根用石膏、无白芍用知母、无知  
母用委蕤、无委蕤用枳實、夕藥甘草亦可略耳、都  
无藥、但得大黃單服之亦大善。

經心錄、漏蘆湯方、外臺卷三十列

漏蘆、白歛、黃芩、麻黃  
白薇、枳實炙、升麻、犀角、芍藥

甘草炙各二兩、大黃三兩、無  
右十味切、以水一斗、煮取三升、分三服、若無藥處  
單服大黃一兩、取利注、千金云、療一切癰、小品亦治丹毒  
千金方、漏蘆湯方、卷廿二十四

外臺卷廿、引千金瘡  
疽漏蘆湯方、無白及、  
有白歛、廿二

漏蘆、白及、黃芩、麻黃、白薇  
枳實、升麻、芍藥、甘草各二兩、大黃二

右十味㕮咀、以水一斗、煮取三升、分三服、快下之、  
無藥處、單用大黃下之良。注、附後云、治癰疽丹輪  
毒腫、肉、千金翼、无白  
微、劉涓子无芍藥、有連翹、治時行熱毒、變作赤色、  
癰疽、丹輪毒腫、及眼赤痛生瘡、督筋熱盛者、可加  
芒消、二兩、此方与小兒篇方相重、分兩服法異、  
又漏蘆湯、治小兒熱毒癰疽、赤白諸丹毒瘡瘍方、卷同

外臺引作漏蘆用葉

五下九ウ

漏蘆

連翹

肘後用

白斂

芒消

肘後用

甘草

銖各六

大黃

一兩

升麻

枳實

麻黃

黃芩

銖各九

右十味㕮咀以水一升半煎取五合兒生一日至  
七日取一合分三服八日至十五日取一合半分  
三服十六日至二十日取二合分三服二十日至  
三十日取三合分三服三十日至四十日取五合  
分三服

注肘後治大人

各用二兩

大黃參兩

以水

一斗煮取三升

分參服其

丹毒須針錢去

血經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

千金翼漏蘆湯方卷廿三十四ウ

漏蘆

白斂

黃芩

枳實

炙

芍藥

升麻

麻黃

甘草

銖各二兩

大黃

三兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分參服無藥處  
單服大黃下之一方白薇貳兩

傷寒總病論小兒時行瘡痘恐相傳染先服漏蘆湯  
下之本治熱毒癰疽赤白諸丹熱毒瘡癧卷四

漏蘆葉

無以山梔子代之

連翹

白斂

甘草

苡消絡

升麻

枳實

麻黃

黃芩

銖各一

大黃

四分

㕮咀水二升煮一升半下大黃煮一升去渣下苡  
硝分減服以利為度大人服倍作大黃水浸少

本事方續集治癰疽發背丹癰赤腫惡肉時行熱毒  
變作赤雜及眼赤痛生障翳病方 卷六三ウ

黃芩

白芨

麻黃

漏蘆

白薇

枳殼

去麌升麻

白芍藥

川當歸

川牛膝

甘草

附二

右為麻末每服四錢水一盞半煎至七分空心熱服或利一二行如未利再服可加芒硝三錢未成者散去已成者立潰。方後全文癰瘍藥中無如此三方妙絕余每用濟人不少凡有患癰瘍發背等疾服此二三藥獲安之後宜常服四物湯交和建中湯空心煎服御未來恐疾再作傳其難又兼

費財不秘者

○三方及二三藥者謂內托散五香連翹湯漏蘆湯也方並見本書無方

名罕矣

醫方考漏蘆湯

卷一

漏蘆

升麻

大黃

藍葉

黃芩

玄參等分

消甚者加至二錢

疫癟積熱時生疙瘩結毒俗稱流注面腫咽塞者此方主之經曰管氣不從逆於肉理乃生毒癟又曰熱勝則腫故疫癟之餘熱解之未盡逆留於分肉之間則作上件諸證藥之為性辛能解散苦能勝熱漏蘆升麻藍葉辛而且苦故足以解散熱醜能軟堅苦能瀉實大味苦止消味鹹故足以軟堅

而鴻實、玄參苦而潤、黃芩苦而枯、潤者去血中之熱、而枯者去氣中之熱爾。况與漏蘆升麻走散之藥同用之、則又無所不至矣。

萬病回春、千金漏蘆湯治一切惡瘡腫丹瘤癰癧疔腫魚睛、五發癰疽、初覺一二日便如傷寒、頭痛煩渴拘急、惡寒肢體疼、四肢沈重、恍惚悶亂、坐臥不寧、皮膚壯熱、大便閉結、小便赤黃、並治姪婦勿服。卷八

漏蘆

白欵

黃芩

麻黃

枳實

升麻

芍藥

甘草

炙大黃

茲消

連翹

右剉作劑水煎服

肘後方惡肉病者、身中忽有肉、如赤小豆粒、突出便長、如牛馬乳、亦如雞冠狀、亦宜服漏蘆湯、外可以燒鍼烙之、外可以燒鍼烙之

三烙令稍焦以升

麻膏傳、卷五

漏蘆湯治諸瘍腫

小品方初得附骨疽、即服漏蘆湯下之。傳小豆薄得消也、下利；已虛而腫處未消者、可除大黃、用生地黃及干地黃也。熱漸退、餘風未歇者、可服五香連翹湯除大黃也。醫心方卷十五引此 全文見五香連

翹湯治法中

小品方云、有惡肉病、身中忽有肉、如赤豆粒、突出便長、推出不息、如牛馬乳、亦如鷄冠狀也、不治、其為自脈中變成此疾也。治之宜服漏蘆湯、外燒鐵燉之日、稍燒令焦盡也。燉竟以升麻膏傳之、積日乃差耳。

小品方治癰病方宜服漏蘆湯自下外以鎗針數錢去血氣針寫其結核處傳小豆薄則消皆可依治丹法消之。六用治癰三物甘焦薄也及至潰成膿大針傳膏散亦如治癰法之。千金方同云 同上卷十  
小品方云丹毒者方說一名天火也肉中忽有赤如丹塗赤色也大者如手掌大其劇者竟身體亦有痛痒微腫者方用赤小豆二升春下筛以鷄子白和如泥塗之小乾復塗之逐手消也竟身者倍合之盡復作內瓦服漏蘆湯今案千金方无鷄子但用水和之

同上卷十七引三十

千金方代指者先腫瘀熱痛色不黯緣爪甲邊結膿

刺者爪皆脫落此謂之代指病也但得一物冷藥汁搘漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搘漬之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗膏也。卷廿二卅六

又復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛癢此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾治之宜服漏蘆湯外燒鐵烙之日日為之令焦盡即以升麻膏傳之積日乃差。同上卅七

又凡癰病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於脚喜從腨起至踝亦如編繩故云癰病也發於腎喜著腋下皆由久勞熱氣盛為濕涼所折氣結

筋中成此病也。若不即治，其久潰脹亦令人筋攣縮也。若不消潰，其熱氣不散，多作躡病。漏蘆湯主之。瀉後鋒針數針，去惡血氣針瀉其根核。上傳小豆末，取消為度。又用治丹法治之，亦用治癰三味甘草湯傳之。若潰傳膏散如癰法。同上 セセハ

又凡初得附骨疽，即須急服漏蘆湯下之。傳小豆散得消可服五香連翹湯。同上 セハウ 又有洪燭瘡，身上忽生癰漿，如沸湯灑劇者，徧頭面亦有胷脅腰腹腫緩，通體如火湯灼癰起者是也。治之法急服漏蘆湯下之外，以升麻膏傳之。其間傳升麻膏，若無效，一依傳丹方。同上 セナガ

傷寒總病論。龐曰：凡覺冬溫至春夏必發斑豆。小兒輩，湏服漏蘆湯下之，得下後逐日空心飲甘牛汁。三歲以上一盞，兒小減之，直候腹疼乃止。未疼可飲至十日，則永不發。或下後飲羊血一盞，則不發。卷四

又龐曰：初得病便驚狂不眠，渾身熱然汗出，問之身不增寒亦不惡風，其脉如數，以漏蘆湯下之，不甚數者，以大承氣湯下之，非但瘡豆傷寒亦然。同上

千金翼論曰：諸癰狀多種不同，無問久近，皆五香連翹湯主之。先刺去熱，小豆薄之，其間數數鍼去血，若已失瘡者，潰爛者，猶常服五香漏蘆等湯下之。卷四

瓜蒂下水 附錄才三卷可攻

必效療諸黃眼已黃亦差瓜蒂散方

外臺卷四付

丁香一赤小豆一分瓜蒂一分加秫米一

右三味擣末溫水食前領服使盡則當利并吐黃

水不差更服

廣濟療急黃身如金色瓜蒂散方

同上付

赤小豆一枚

二十七

丁香一枚

二十七

黍米粒

二十七

瓜蒂一枚

二十七

麝香

薰陸香等分

別青布研入

燒為灰

右七味擣篩為散飲服一錢七則下黃水其黃則

定

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤

瓜蒂下水

少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散主之方千金翼卷十八黃疸第三

苦參

黃連

黃芩

黃芩

大黃

瓜丁

葛莖

熬各  
壹兩

右柒味擣篩為散飲服方寸七當大吐吐者日再亦得下服藥五日知可消息不知可更服之

紫蘇用莖葉

拙著修治古義當攷又

紫蘇莖葉

千金卷七犀角旋復花湯 大犀角湯

卷十引肘後一方

外臺卷十救急一方

卒短氣一方

同崔氏療上氣暴欬方

古今錄驗煮散方

同卷十九蘇恭防己湯方

紫蘇苗外臺卷十七延年酸棗飲方

紫蘇莖外臺卷十八崔氏側子酒方 又崔氏旋復

花湯方 又旋復飲子方

**大黃先水漬** 修治古義互參看

五卷重出

本草序例。凡湯酒中用大黃。不須細剉。作湯者。先以水浸令淹浹。密覆一宿。明日煮湯。臨熟乃內湯中。又煮兩三沸便絞出。則勢力猛。易得快利。

大黃一兩切。浸湯成下。金匱要略 雜療方 治馬疋及一切筋骨損方

若服已盡。而癥不斷者。可更加大黃釣藤各一錢。以水漬藥半日。然後煮之。千金方卷五上白鮮羊湯方

其大黃別浸。壹宿下。同卷五下五味子湯方後

別漬大黃一宿。同卷十三 大黃泄熱湯方後

**大黃**三兩細切。水一升半。別漬一宿。同卷十五上大黃瀉熱湯方後

大黃先水漬  
水一升密器中漬一宿

大黃別浸 同卷十六 前胡湯

大黃切一升水密器中宿漬 同卷十九 鴻臚湯

大黃切別漬水一升

同三黃湯

蜀大黃切以水一升浸 同卷廿大黃瀉熱湯

別浸 千金翼卷廿二 麻黃湯

又治女子先因月經  
不調云 方 又漏蓄溫湯

漬別下外臺卷一古今錄驗桃人承氣湯

別漬 同卷三廣濟柴胡湯

卷十三小品五產湯 卷廿四崔氏五香連翹  
湯 卷廿四救急療婦月病不調云 方 卷廿

七卷廿八卷中別漬文數見茲不具錄

別漬後下 同卷五救急蜀漆湯

以水一斗五升別漬 同卷六刪繁大黃瀉熱云湯

麩切別浸湯欲熟內之

同卷七崔氏桃人大黃湯

大黃別漬湯欲成下 同卷十三備急療疾癬鬼氣云  
別漬大黃一宿 同上大黃泄熱湯方後

一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明日絞取汁  
一服五合許微利即止 同上崔氏療五蒸四日肉蒸  
云 方

以水九升先取一升水別漬大黃一宿以餘八升煮  
諸藥取二升五合去滓下大黃更煮兩沸去大黃滓  
下此消分為三服 同卷十六刪繁大黃泄熱湯方後

別浸 同卷廿六古今錄驗療月內發丹方

卷廿八 中別浸文數見茲不具錄

先煮諸藥至一升半乃下大黃大黃先以水漬和水  
下之則折熱易利 傷寒總病論卷三大黃施子湯方  
後

大黃水浸少時和水下 同卷四漏蘆湯方後

或用大黃者、虛人入大黃、同煎之、如難得通利人、每服四錢水一盞半、煎至一盞、別入大黃半錢、同煎至七分、又難得利者、以湯浸濃大黃汁三二分、同煎之、以取利為度、同六卷末門人布衣魏炳所說

兒出訖

小兒用新汲水

千金方、兒出訖、一切人及母、皆忌問是男是女、兒始落地、與新汲水五咽、忌與暖湯物勿令母看視穢汚、  
胎落地即急取口中外臺卷三十四引千金作兒  
發湯物也勿令母看視穢汚耳

又兒有熱、不欲哺乳、臥不安、又數驚、此癇之初也、服紫丸便愈、不愈復與之、兒眠時、小驚者、壹月輒壹以治之、慎勿妄灸、不欲吐下、但以除熱湯浴之、除熱散粉之、除熱赤膏摩之、又以膏塗臍中、令兒在涼處勿

禁水漿常以新水飲之

卷五上 驚瘡第三對 卷十一 養小兒第一○子全類

同上

天保中平野某著坐婆秘研云產婦喫新汲水一盃其法出千金今檢千金无其文恐誤讀令小兒又飲新汲水文之謬也千金產難條中有凡產婦慎食熱藥熟麪食常識此飲食當如人肌溫溫也文則其誤不待辨

名士集卷五上 驚瘡第三對 卷十一 養小兒第一○子全類

小兒初生用葱白方

劉氏療小兒初生不喫妳方以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫乳立效以蛤蠣灌之外卷卅五注引幼：新書卷五引外臺文同

又小兒初生不小便方人乳四合葱白一寸右二味相和煎分為四服即小便利神效同上

集驗方小兒初生不飲乳及不小便妳汁二合葱白一寸分四破右以銀石器煎取一合注子灌立愈醫

卷十引

或白頭女童百問小兒金鏡等書名葱白散者

即此文

全幼心鑑。小兒不尿。乃胎熱也。用大葱白切四片。用乳汁半盞。同煎片時分作四服。即通。不飲乳者。服之即飲乳。若臍四旁有青黑色及口撮者。不可救也。本草

續目卷廿六葱附方引

醉翁指父老，西鄙見小吏。問之誰氏子，亦云是其子也。因呼酒與之飲，醉翁笑曰：「汝不以我為老矣。」又呼其子與之飲，醉翁曰：「汝不以我為愚也。」又呼其子與之飲，醉翁曰：「汝不以我為鄙也。」

幼新書、小兒三歲已後、或五百七十六日外、皆可診兩手脉、一指定三關、卷二引保生論

又二指三關定其息同上

幼幼新書走馬閣

卷三

本事方候小兒脉當以大指按三部卷十  
脉語三歲以下看虎口三關三歲以上乃以一指取  
寸關尺之處卷上

卷

醫學正傳按古法曰、凡小兒證候、難以手太陰尺寸  
脉診、如一歲至六歲曰嬰孩、惟以男左女右、手次指  
三關、寸脉以為驗病輕重生死之訣、第一節名風關、  
無脉則無病、有脉則病輕、第二節名氣關、脉見則

病重尚可以藥治而已、第三節名命關脈見則病劇、乃九死一生之候也、多不可治、七歲凡歲曰齡、九歲十歲曰髫、始可以一指探掌後尺寸三部之脉、而以一息七八至為無病之常脉、十一歲至十四歲曰童、而以一息五六至為常脉也、卷八脈法總論

**小兒搐搦不可捉持手足**

病源候論、凡諸癇正發手足掣縮慎不可捉持之捉  
之則令曲突不隨也。卷四十五、小兒驚癇候○醫心  
方卷廿五、引曲突作曲戾

濟生續方、正發搐掣之時、勿捉持之、捉之則曲疾不隨也。卷一論 小兒癇病

活幼心法當其癓癒大作時但可扶持不可把捉恐  
風痰流入經絡或至手足拘攣也卷下急驚風論

曰、心火勝也、勿持捉其手、當從搖擗、

傷寒  
卷六十七  
事親

間者患曰、允小兒急驚方擗、不用驚擾、此不足畏、慢驚雖靜、乃危病也、急驚方擗、但扶持不可擒捉、蓋風氣方盛、恐流入筋脉、或致手足拘攣、

附方  
小兒直訣

### 小兒禁溫飽

病源候論、小兒始生、肌膚未成、不可暖衣、暖衣則令筋骨緩弱、安時見風日、若都不見風日、則令肌膚脆軟、便易傷損、皆當以故絮著衣、莫用新綿也、天和暖無風之時、令母將飴、日中嬉戲數見風日、則血凝氣剛、肌肉硬密、堪耐風寒、不致疾病、若常藏在帷帳之内、重衣溫暖、譬如陰地之草木、不見風日、軟脆不任風寒、又當薄衣、薄衣之法、當從秋習之、不可以春夏卒減其衣、則令中風寒、從秋習之、以漸稍寒、如此則必耐寒、冬月但當著兩薄襦、一複裳耳、令不忍見其寒、適當佳耳、反而晒之、適所以害也、又當消息无令

汗出、汗出則致虛損、便受風寒、晝夜寤寐皆當慎之、其飲乳食哺不能無痰癖、常當節適乳哺、若微不進、仍當將護之、凡不能進乳哺、則宜下之、如此則終不致寒熱也。卷四十五 養小兒候○醫心方卷廿五引  
係節畧十九

產經云、凡作兒衣、勿以新綿縉之、損兒氣、故宜用故布帛有人氣者著益也、兒衣不欲原多綿之、恒如不忍見其寒、乃為佳耳。醫心方卷廿五引六

禮記云、童子不衣裘裳。裘大溫、消陰氣、使不堪苦、不衣尚衣以便宜也。  
同上引六

養生要集云、嬰兒之生、衣之新纏、則骨柔焉、食之魚肉、則虫生焉、串之逸樂、則易傷陽焉。同上引六

產經云、凡養小兒法、隨大人身之寒溫而養之、隨天

時寒溫減增之、能察其微之、又不用新綿帛、新者過即有患兒也。同上引六

崔氏兒初生法、宜用父故衣裹之、若生女、宜以母故衣、勿用新帛、切須依之、令兒長壽。外臺卷三十五小兒初生將護法引

又一卒之內、兒衣皆須用故綿帛為之善、兒衣綿帛特忌厚熱、慎之慎之。同上

千金方、生兒宜用其父故衣裹之、生女宜以其母故衣、皆勿用新帛為善、不可令衣過厚、令兒傷皮膚、害血脉、發雜瘡而黃、兒衣綿帛、特忌厚熱、慎之慎之、凡小兒始生、肌膚未成、不可暖衣、暖衣則令筋骨緩弱、宜時見風日、若都不見風、則令肌膚脆軟、便易中傷。

婦人良方卷十四引產乳  
集解詳論大意與巢淵全所論頗同因不贅

皆當以故絮衣之勿用新綿也凡天和暖無風之時令母游兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在帷帳之中重衣溫暖猶譬猶陰地之草木不見風日輒脆不堪風寒也

卷五上初生出腹第二十五○翼方卷十一文頤同外臺卷三十五並文醫各同

又仲長統曰王侯之宮美女兼千卿士之家侍妾數百書則以醇酒淋其骨髓夜則房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色醺內不出遊外不返王公得之於上豪傑馳之於下及至生產不昧夜育太早或童孺而擅氣或疾病而構精精氣薄惡血脉不充既出胞藏養護無法又蒸之以綿纊燉之以五味胎傷孩病而

印新書目卷四引張渙論及萬全方論卷十六骨熱第二引聖惠論聖惠本書可攷

脆未及堅剛復縱情欲重重相生病病相孕國無良醫醫無審術姦佐其間過謬常有會有一疾莫能自免當今少百歲之人者豈非所習不純正也

同卷二十七養性序

禮記曲禮上童子不衣裘裳鄭注裘大溫消陰氣使不堪苦正義云童子體熱不宜著裘大溫傷陰氣也

內則十年出就外傳居宿於外學書計衣不帛襦袴鄭注不用帛為襦袴為大溫傷陰氣也又七十而冠始學禮可以衣裘自

呂氏春秋重已篇先王不處大室不為高臺味不聚珍衣不禪熱則理室金理寒則氣不達味衆珍則胃充胃不適中大觀中大觀而氣不適以此長生可得乎

王藻童子未裘不帛鄭注裘帛溫傷壯氣也

王荀曰、歷觀前政、貴人之用心也、與嬰兒子何其異哉、嬰兒有常病、貴臣有常禍、父母有常失、人君有常過、嬰兒常病、傷於飽也、貴臣常禍、傷於寵也、哺乳多則生瘤病、富貴盛而致驕疾、愛子而賊之、驕臣而滅之者、非一也、潛夫論 貴忠篇

王朗上疏曰、少小常苦被禡泰溫、泰溫則不能便柔膚弱體、是以難可防護、而易用感慨、若常令少小之緼袍、不至於甚厚、則必咸保金石之性、而比壽於南山矣、魏志 王朗傳

按儒門事親卷一、過愛小兒反害小兒說、有確論、文長不具錄、

川顯道塵塚談曰、狗之家の床下ふなを生む、生子床下ふなを生む日と屋根とんにえ、足腰弱く、生音よ達たつのい、床下ふなをじきか、天の風氣を暫まことにと、  
ひく不不して空うつのひ、たごひ健けんふ生な物ものそ、しそホの理りを考かて、覺おぼを換育かんいくし、世人せじん、  
四月の光羅こうら夙ゆゑるのの人ひとえと、生なふ外ほかかいぞ、口くち毒どくと思おもふう、為なはなれ  
入い余よ候まつ、夙ゆゑる、夙ゆゑる、  
通つう不辭ふさる、

醫說、小兒未會行能坐、不可常抱、抱在手中、可以入坐車、能獨坐、春夏坐於地上、寒則以薦簾襯、之人得地氣方能行、惜之過當、常抱持之、所以當行而不能行也、萬物非土不生、故小兒亦要得地氣也、卷十

列醫錄

格致餘論、人生十六歲以前、血氣俱盛、如日方升、如月將圓、惟陰長不足、腸胃尚脆、而空養之道、不可不謹、童子不衣裘帛、前哲格言、真在人耳、裳下體之服、帛溫軟、甚於布也、蓋下體主陰、得寒涼則陰易長、得溫煖則陰暗消、是以下體不與帛絹夾厚溫煖之服、恐妨陰氣、實為確論、慈幼論

宣明論雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟腑迺得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故空壅滯內有積熱生於心心受邪熱乃發為噫氣不止返為潮搐則為病也大槩小兒病者純陽熱多冷少卷十四

萬病回春小兒初生宜用七八十歲老人舊裙舊襪改作小兒衣衫真氣相滋令兒有壽富貴之家切不可新製衣紵絲綾羅氈絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福卷八

### 古名呷嗽者疑後世之頓嗽

病源候論呷嗽候呷嗽者猶是咳嗽也其曾高痰飲多者嗽則氣動於痰上搏於喉咽之間痰氣相擊隨嗽動息呼呷有聲謂之呷嗽其与咳嗽大脉雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此為異耳四卷十

千金方沙牛喉嚨主小兒呷五卅六食治門鳥獸第  
時所引改

說文呷吸呷也从口甲聲

明吳志中兒科方要白附飲主治云頓嗽者小兒欬嗽嗰頓連聲不已嗽則臉紅吐即嗽止嗽久不已眼腫而目中白珠起有紅絲者即不可用涼藥

清蔣示吉醫意商碧玉丹主治云治頓嗽無時連聲不已與食吐出而止業廣按所謂頓嗽此間俗稱百日咳者古無頓嗽疑呷嗽即是診其病咳嗽際往往呴少而吸多巢氏所謂隨嗽動息呴呷有聲者是也

保赤全書咳甚氣喘連聲不住名為頓嗽甚至飲食湯水俱嗆出或出血此熱毒乘肺而然也卷

醫學子真傳咳嗽俗名曰嗆連咳不已謂之頓嗆頓嗆者一氣連嗆三三十聲少則十數聲

### 胎教

病源候論妊娠候妊娠三月始胎當此之時血不流形像始化未有定儀見物而變欲令見貴盛公王好人端正莊嚴不欲令見區儻侏儒醜惡形人及猿猴之類無食薑兔無懷刀繩欲得男者操弓矢射雄雞乘肥馬於田野觀虎豹及走犬其欲得女者則著簪珥環珮弄珠璣欲令子美好端正者數視白璧美玉看孔雀食鯉魚欲令兒多智有力則噉牛心食大麥欲令子賢良益德則端正坐清虛和一坐無邪席立無僞倚行無邪徑目無邪視耳無邪聽口無邪言心無邪念無妄喜怒無得思慮食無到亦肉無邪卧胎教

無橫足。思欲果瓜。噉味酸薺。好芬芳。惡見穢臭。是謂外象而變者也。卷四十一

又任娠禁忌。懷任娠男女未分之時。未有定儀。見物而化。故須端正莊嚴。清淨和一。無傾視。無邪聽。兒在胎。日月未滿。陰陽未備。腑臟骨節。皆未成足。故自初訖于將產。飲食居處。皆有禁忌。同上 千金卷二載 兒在胎以下文更有一禁忌法。十餘條。茲不具錄。

千金方論曰。舊說凡受胎三月。逐物變化。稟質未定。故妊娠三月。欲得觀犀象猛獸珠玉寶物。欲得見賢人君子。盛德大師。觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設。焚燒名香。口誦詩書古今箴誠。居處簡靜。割不正不食。席

聖惠方卷七十六 胎教論  
幼：新書卷四引小兒胎教第一引聖濟經聖惠方

不正不坐。彈琴瑟。調心神。和情性。節嗜欲。庶事清淨。生子皆良長壽。忠孝仁義聰惠無疾。斯蓋文王胎教者也。卷二養胎第三

格致餘論古之胎教。具在方冊。愚不必贅。論幼

賈誼新書周妃后妊成王於身。立而不跛。坐而不差。笑而不謳。獨處不倨。雖怒不罵。胎教之謂也。卷十  
胎教 大戴禮卷三保傳文畧同

列女傳太任者。文王之母。執季任氏中女也。王季娶為妃。太任生三性。端一誠莊。惟德之行。及其有娠。目不視惡色。耳不聽淫声。口不出敖言。能以胎教。洩於豕牢。而生文王。文王明而聖。太任教之以一

而識百君乎。謂太任爲能胎教。古者婦人姪子寢不側坐。不邊立。不蹕。不食邪味。割不正。不食席不正。不坐。目不視于邪色。耳不聽于淫聲。夜則令瞽誦詩道。正事如此。則生子形容端正。才德必過人矣。故姪子之時。必慎所感。ミ於善則善。感於惡則惡。人生而肖万物者。皆其母感於物。故形音肖之。文王母可謂知肖化矣。卷一周室三母。

和田東郭曰。生姜女ハ、藥一服ニ五分ハテウトヨシ。生姜泻心ノ如キ方ハ、生姜ヲ本トスル故セホト入ル。ハヨキシ。昔ヨリ。生姜女ハ一分ナメアレ。ソレミテハ余リ少シ。百疾

卷下

### 生薑一二片之弊習

顧雨田曰。藥引中。生薑常寫幾片。燈心常寫幾根。竹葉橘葉常寫幾瓣。葱管荷梗常寫幾寸。余謂片有厚薄。根有短長。瓣有大小。寸有麤細。諸如此類。皆須以分兩爲準。吳醫彙講卷一。

按傷寒仲景用生薑者。自一兩至六兩。或用半斤一斤。詳見拙著傷寒金匱類纂。廿六卷中錄兩類。宜參看。頃日治小兒馬脾風。用導痰湯。屢有奇效。因檢濟生方。生薑十片。集方書者。往往以生薑水煎。文概之。用者亦仍之。竟不談。當日編書者精意之所存。苟且鹵莽。莫甚焉。可歎甚矣。

活人書局卷之四載生姜鴻心湯方之後用生姜七片

藏書由日暮仁喜到清同治年間少數同人共藏十  
卷之二

和田東郭曰、我邦ノ醫人、藥ヲ剤スルニ必甘草ヲ減少ス、甚シキニ至テハ、餘藥ノ十分ノヲモ用ヒズ、總メ我邦ノ人耆ハ甘味ニ空シカラズ、甘キハ人ラメ中滿セレムナド云テ人寢具ニ甘草ハニジナカ  
同然ニ心得オル

ノ醫人、藥ヲ剤スルニ必甘草ヲ減少ス甚シキニ至テハ、餘藥ノ  
總ノ我邦ノ人有ハ、甘味ニ安シカラズ、甘キハ人ヲメ中滿セレバナド云テ  
**甘草宜重用** 外集卷十 大棗甘草宜重用條  
當歸參耆酒  
汪認庵曰、益氣補中、鴻火解毒諸劑、皆倚甘草為君、  
必須重用、方能建效、此古法也、奈何時師每用甘草、  
不過二三分而止、不知始自何人、相習成風、牢不可  
破、殊屬可笑、本草備要卷一甘草條

按仲景用甘草自半兩至五兩其多寡各有精義  
即此分量也甘草二錢半芍藥肉桂各三錢半是桂枝湯桂枝三兩芍藥肉桂湏門之一針矣傷寒金匱類纂十六卷中詳載古

方鑄兩互參看

宋以下之友亦

备至錢半是桂枝湯  
ノ椎底三兩甘草三兩  
ノ分量ノ本ツクト見  
ヘタリ必シモ舊深ニ  
倣テ甘草ヲ減ズヘ

月背山

カラズ然レ天性甘  
味ヲ思ム人ニト斟酌

アルベキフ蕉窓方

下ノ心氣

意解卷

尤甚卷矣

甘草半夏大棗桂枝湯  
燒牛乳藥同前  
喉邊有聲者甘草  
本草之序方也  
用甘草者甘草  
甘草半夏大棗桂枝湯  
燒牛乳藥同前  
古之傳之以爲  
同我之傳之  
宜復之甘草  
十全大補丸  
麻田東菴月余升  
味ヲ思ム人ニト斟酌  
アルベキフ蕉窓方  
下ノ心氣  
意解卷



