

醫學管錐
內集

四

✂
i 18-1

490.9
Ig-3
5

No. 2039
12 i 18-1



富士川文庫

1251

醫學管錐卷四目錄

脚氣漬脚

脚氣不宜淋洗 附針刺出水說

灸脚氣洩毒氣

膏盲即今之膈噎

五膈丸類 五噎丸附

噎用羚羊角治噎

弄髮蒜髮宣髮

理中丸散酒服

醫心方不引素靈傷寒金匱文

服蜜一味通大便難 褚氏遺書多確言

凡字 反診

兩股熱如湯沃 氣衝熱

孫真人養子教子法

甄權之言宜佩服

大汗之禁

木分蒼君白

乳汁屬濁血

乳汁出自穀氣

不時之物傷人

阿膠者其湯不炙

素靈中尺字有不可為尺膚者

金匱金勝金櫛 玉版金府附

治瘡方用酒

瘡疾用附子

截瘡之禁

治瘡期限 服藥時刻

治瘡灸法

治瘡藥橫刀其上法

瘡痢同因



脚氣漬脚

金匱要略治脚氣冲心礬石二兩右一味以漿水一斗五升煎三五沸漬脚良

肘後方若腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方

小豆一斛煮令極爛得四五斗汁温以漬脚已下日

二為之數日消盡 卷三

又方削楮或桐木煮取汁以漬之并飲少許加小豆

妙同上

必效療脚氣方外臺卷十八引杜

蒼耳子 五升 赤小豆 二升 鹽 一斤

右三味以水一石五斗緩火煎取五六斗去滓別

脚氣漬脚

九折堂山田氏圖書之記

貯取受斗半錙於前泥四面開一畔入火處錙內
著所煎汁用浸脚終令沒踝錙下微著炭火當令
溫溫如汁漸盡不沒踝續續添使沒浸時仍於密
房中牀前遮閉為垂脚恐風不能久坐之仰卧亦
得連夜浸之彌佳浸經三日外其欲食飲常苦飢
便食任食服一劑藥汁盡必差不過用半汁即可
覺漸可一日兩日食一頓生猪肉鱠大精此方甚
効

廣濟療脚氣衝心悶洗脚漬湯方 同上廿九

糜穰 石內 釜中

右一味多煮取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘

沸漬脚三兩度如冷溫漬洗差止無所忌

近効療脚氣擡肩喘并脚氣衝心方 同卷廿九

烏豆 二大斗

右一味以水五大斗煮斟酌有一斗半即休分向
兩故瓷瓮中以兩脚各於一瓮中浸遣人從膝向
兩故瓷瓮中以兩脚各於一瓮中浸遣人從膝向
下持之持百遍以來必差如無瓷瓮取故瓦瓮不
滲者亦得極重不過更浸一度必差

文仲持脚方 同卷十九

擣烏麻碎水煮漬持大驗

又方同上

水煮杉木浸持脚去腫滿大驗備急同

近効療脚氣兩脚腫滿暴破衝心衆醫不差方同上

小便三大升 黍穰三大升

右二味相和煮三五沸將浸脚日三四度極神効
其藥於水盆中盛下著火煖之如池瓮法周迴泥
塞然後浸脚持使汗出立効

本草行義杉作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處々有

五

遼齋閑覽曾有士人得脚弱病方書羅列積藥如山
而疾益甚余令屏去但用杉木為桶濯足及令排樟
腦於兩股間以脚襯擊手定月餘而安健如故南方多

此疾不可不知醫說卷八引於

蘇曰不得露脚當風
入水以冷水洗脚脚脛尤
不宜冷雖夏月常須著
綿袴至冬寒倍令兩脛
溫暖微有汗是最佳外臺聖
許仁則曰亦有腎氣
先虛夏者月序熱以
冷水洗脚濕氣不散
亦成脚氣外臺聖卷十

脚氣不宜淋洗

附針刺出水說

附錄卷水

肘後方若腫從脚起稍上進者入腹則斂人治之方
小豆一斛煮令極爛得四五斗汁温以漬膝已下日
二為之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食
之卷三

治人書脚氣鍼灸為佳服補藥與用湯淋洗者皆醫
之大禁也卷七 婦人良方卷四同

世傳神效方治水腫不利小便非其法也故內經云
濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之吐瀉後長
服益元散加海金沙煎以長流水服之則愈矣大忌
脚膝上針刺出水取一時之效後必死矣儒門事親
卷十五
脚氣不宜淋洗

不愈矣。卷三十 雜病第七

千金方凡例古之經方言多雅奧以膈氣為膏肓

五引 醫說卷八引雜峯方同

森立夫曰案膏肓古之俗言而謂膈中也膏肓七月之急
字為聶聶即膏肓之與肓非有二義猶旁尤
謂之膈膈謂之頭之例也左傳膏肓之上肓之下亦
謂一聶膜之上與下也說文肓心上聶下也言上為心
下為聶也即心下之聶膜包絡是也此地即胃之上口
而為水飲留滯結聚之處故傷寒之結胸心下痞等
少陽厥陰諸證皆根于此瘡邪沈固亦挾飲在此地所
以為寒熱休作證也

又曰說文懷一曰懷隔也
諱若荒公月懷荒
三字同音 又曰外志卷八五膈方中引備急有五膈要丸方是亦謂膈為膏肓之徵也
又曰史記扁鵲傳採荒藥即育膜之古字謂膈膜也而索隱曰荒膏肓也所謂膏肓即
指育一物也

五膈丸類 五噎丸附

肘後方膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所

以作丸含之令氣勢得相燻染有五膈丸方卷四十三

麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子炮乾

薑人參桂細辛各六分搗篩以上好蜜丸如彈丸

以一丸含稍稍嚥其汁日三丸服之主短氣心胸

滿心下堅冷氣也此疾有十許方率皆相類此丸

最勝用藥雖多不合五膈之名謂憂膈氣膈寒膈

寒膈○據東源刑繁等脫熱膈二字其病各有診別在大方中

千金五膈丸治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病同藥

服以憂意思慮食飲得之若冷食及生菜便發其病

五膈丸類

苦心滿不得氣息引背痛如刺之狀食即心下堅大如粉絮大痛欲吐吐即差飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘息短氣方卷十七注

麥門冬 兩各五 甘草 兩各五 蜀椒 遠志

桂心 兩各三 附子 兩各一

人參 兩各四 乾薑 兩各二

右九味末之蜜和丸微使淖先食如彈丸一枚細

細咽之喉中肯中當熱藥力稍盡復含二九日三

夜二服藥七日愈注延年方云若不能含者可分

酒服之經心冬甘燂吳人參胡洽云亦可服如梧子五

物吐之不出咽之不入食飲少者

備急膈中之患名曰膏盲湯丸徑過針灸不及所以

作丸含之令氣勢得相熏深有五膈要丸方外臺卷

麥門冬 十枚 椒 六分 遠志 附子 炮

乾薑 人參 桂心 細辛 各六分 甘草 十分

右九味搗篩以蜜和丸如彈子以一枚著牙齒間

含稍稍嚥汁日三主短氣曾滿心下堅冷氣此病

皆有十許方率皆相類此丸最効五膈者謂憂膈氣

膈患膈熱膈寒膈也千金肘後文仲同

張文仲五膈丸方同上

吳茱萸 麴 杏仁 去尖 乾薑

蜀椒 汗出閉口 好豉 煮冷

右六味等分搗篩蜜和丸如梧子飲服七九日三
此方出隱居効驗備急肘後同

延年秘錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常
以憂愁思慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病
苦心滿不得氣息引脊痛如刺之狀食則心下堅大
如粉絮大痛欲吐吐則差飲食不得下甚者乃手足
冷上氣欬逆喘息氣短療之九物五膈丸方同上

麥門冬法

蜀椒汗各

遠志三

甘草五兩

附子炮一兩

乾薑三兩

人參四兩

桂心三兩

細辛三兩

程敬通曰此即前五膈要丸一味不

右藥搗篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如

彈子丸一丸置喉中稍嚥之喉中曾中當熱藥力

稍盡復含一丸日三四夜一二服服藥七日愈二

十日平復若不能含者可分一大丸作二小丸盡

服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不

異神良椒當以銅器熬於火上使極熱下置地內

椒器中熟攪之須更汗出便搗合曰起椒力有熱

亦去其毒非令有熱也忌海藻菘菜猪肉冷水生

葱生菜千金集驗同不能具於此方錄用之耳

古今錄驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處歲有

處冷氣迫咽喉曾滿氣逆脊有邪氣食已氣滿羸瘦

著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨

肉銷盡服之令人能食長肌肉強筋骨利五藏好顏色補不足益氣力方同上廿九

細辛 桂心 黃芩 吳茱萸

厚朴各三 杏仁三十枚去皮並兩人蒸 乾薑

椒汗 遠志各三 小草 芍藥

附子炮 當歸各二 黃連各二

右十四味搗篩蜜和服如梧子二丸日三不知加之以知為度

又五膈丸瘵憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方同上

人參 附子炮 遠志去心 桂心

細辛各四 乾薑 蜀椒各五

右七味搗篩以蜜和服如彈丸著牙下吹咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒風注氣腹中百病皆應當得真新好藥即可中病耳神秘妙方不傳

程敬通曰此方比前五膈丸全但少麥冬甘草二味

又療邪氣嘔逆吸氣五膈為病五藏俱虛則受風冷五藏皆有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂語言無常俠舌左右狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣衰微藏凝冷氣成之服此丸安穀通氣溫藏五膈丸出僧深方同上

蜀椒一斤 乾薑二斤 桂心二斤 芍藥一斤

半夏洗 細辛 茯苓略一 前胡一兩

右八物搗篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再

又療胃痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之方同上詳

半夏一分煎 甘草炙 遠志去心各 乾薑

桂心 細辛 椒去目 附子炮各

右八味搗篩以蜜和為丸先飯酒若糲米飲服如梧子五九日三服增至十九

經心錄五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽之不入食飲少方同上詳

乾薑三兩 麥門冬二兩 附子炮一兩 細辛二兩

蜀椒汗一兩 遠志去心一兩 甘草炙一兩 人參二兩

食茱萸二兩 桂心三兩

右十味蜜和為丸如梧子服五合千金同 程敬通曰此方

古今錄驗五噎丸療胃中久寒嘔逆逆氣隔飲食不

下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸

上下不通噫噦不徹胃脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆

心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣隔脅下支滿胃中

填塞冷手足逆冷不能自溫食噎者食無多少唯胃

中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視眩

眩此皆真寒嘔怒寒氣上逆胃脅所致療之方同註
○千金卷十六五噎丸注引同

乾薑

蜀椒汗

食茱萸

人參

桂心各五

細辛

白朮

茯苓

附子各四

橘皮六分

右十味搗篩以蜜和為丸如彈子酒服三丸日再
不知漸增

經心錄五噎丸主五種之氣皆令人噎方同上四十九

人參

半夏

桂心

防葵一方用防風

附子炮

細辛

甘草炙各二兩

食茱萸五合

紫苑

乾薑

芍藥

枳實炙

烏頭各六炮

右十三味搗篩以蜜和為丸如梧子大服五丸日
三不知加至十五丸

雞峯方夾門冬五膈下氣元療肺勞熱肺損生虫形
如蚕在肺為病令人咳逆氣喘或為夏膈氣膈患膈
寒膈熱膈皆此勞氣所生名曰膏肓鍼灸不着卷十

麥門冬

遠志

附子

細辛

甘草各拾

人參

乾薑

黃耆

百部

白朮

桂各伍

川椒肆

杏仁肆拾

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元含化

○崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸削唯飲水亦同此方
 製半夏六兩人參三兩
 生薑二兩橘皮三兩春
 杵頭糠一升綿裹牛
 涎一升厚朴二兩炙於
 羊角三兩煎右八味以水
 八升煮取三升分溫三服
 相去十里久欲煩服者
 可至三劑氣噎病者
 胃閉不受食唯飲水
 水入吐出積年不差乃
 至於死人間多有此病
 此方救療有效外臺卷八

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

噎用羚羊角治噎噎方醫心方卷三十八

者波方治人風噎方醫心方卷三十八

零羊角五兩炙 通草二兩半 防風二兩

升麻二兩 甘草四兩炙

五味搗菹為散以白飲服一方寸匕日二

深師通氣噎方外臺卷八

半夏三兩 桂心兩 生薑八兩 羚羊角三兩醫心方

引無鈴

古右四味切以水八升煮取三升分服半升日再服

救急療喉中氣噎方同上

半夏洗 柴胡 生薑各三兩 羚羊角三兩

噎用羚羊角

犀角屑 桔梗 昆布 通草 甘草各二兩

右九味切以水八升煮取三升分三服

古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方同上

金卷十六羚羊角湯全同廿六

羚羊角屑二 厚朴炙 吳茱萸 乾薑各三

通草 橘皮各二 烏頭十五枚炮

右七味切以水九升煮取三升分三服日三

深師療噎方同上 四十五

羚羊角屑 前胡 甘草各一 人參二兩

橘皮各二

右五味切以水六升煮取二升分四服

又方同上

羚羊角

右一物多少自裁末之飲服亦可以角摩噎上良

○按醫心方卷廿九引葛氏方治食卒噎方以零

羊角摩手噎上廿九

筭髮 蒜髮 宣髮附

少而筭髮千金翼卷五瓜子散主治廿四寸

少而生蒜髮外臺卷卅二引千金翼瓜子散卅七寸

壓油塗頭能變蒜髮證類本草卷廿七菜部上品蕪菁條引孟詵

北齊書卷二十慕容紹宗傳紹宗頻有凶夢意每

惡之乃私謂左右曰吾自年二十已還恒有蒜髮

昨來蒜髮忽然自盡以理推之蒜者算也吾算將

盡乎

雲谷雜記令人言壯而髮白者目之曰蒜髮猶言

宣髮也

宣髮

筭髮 蒜髮 宣髮

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

易說卦釋文黑白雜為宣髮宣髮注

周禮考工記下車人之事半矩謂之宣鄭玄注頭

髮皓落曰宣又易巽為宣髮正義云今易文不作

宣作寡四十二二十三

雲谷雜記文見上

易說卦釋文

北齊書卷二十

少而宣髮

少而宣髮

宣髮

宣髮

理中丸散酒服

錄驗方治霍亂虛冷吐逆下利理中丸方後云凡四

物搗下蜜丸如彈丸取一九內煖酒中服之日三醫

方卷十一引四

効驗方治霍亂吐下理中散方後云凡四物治篩酒

服方寸匕日三同引五方

千金方治中湯方後云遠行防霍亂依前作丸如梧

子服三十九如作散服方寸匕酒服亦得卷二十六

易說卦者文曰白龍...
 周禮考...
 醫心方...
 千金方...
 仲景...
 諸師秘...
 醫心方...

醫心方不引素靈傷寒金匱文

醫心方張仲景青龍湯方用麻黃細辛干薑半夏四物卷十卅七葉

又桑根白皮湯用桑根白皮桂生薑人參四物同上

又張仲景方治消核腫黃耆帖方用黃耆當歸大黃

芍藥白朮黃芩防風芍藥雞子黃連十物卷十六靴

按醫心方無引素靈及傷寒論金匱要畧者而載

素靈文者皆引太素經引醫門方者往與傷寒

金匱合其他載仲景方者引小品千金等而不稱

仲景豈素靈未船載傷寒金匱亦當時猶有江南

諸師秘之習是以丹波君未及觀之耶書以質識

醫心方不引素靈傷寒金匱文

者、相、味、之、香、是、以、丹、丸、既、未、及、醫、之、唯、書、以、實、錄、
 中、見、豈、素、靈、未、明、遺、對、美、全、圖、亦、當、和、蘇、百、二、南、
 全、圖、合、其、出、薄、中、景、大、香、代、小、品、十、全、等、而、不、林、
 素、靈、文、香、皆、以、大、素、靈、代、醫、門、大、香、對、之、與、對、寒、
 外、醫、心、大、無、復、素、靈、及、對、寒、論、全、圖、要、思、其、而、尊、
 其、類、白、大、香、之、也、用、女、藥、雜、半、黃、動、十、部、卷、十、六、婦、
 又、承、中、景、大、香、對、對、香、皆、以、大、用、黃、香、當、醫、大、黃、
 又、夫、財、白、文、影、用、來、對、白、文、封、主、香、入、卷、四、婦、
 卷、十、七、婦、
 醫、心、大、承、中、景、香、諸、為、大、用、麻、黃、麻、辛、干、薑、生、薑、及、四、
 醫、心、大、下、臣、素、靈、對、寒、全、圖、云、

服蜜一味治大便難 附錄卷六參看

千金方治大便難方常服蜜煎五合 卷十五上秘澀第六十九外臺

廿七引千金同然

業廣屢觀大便秘結不互消黃者用蜜一味快利因載于斯

萬病回春一方治大便小便不通用蜜一鍾入皮硝三錢滾白湯一鍾空心調下卷四

服蜜一味治大便難

褚氏遺書多確言

羸女宜及時而嫁，弱男宜待壯而婚。

血雖陰類，運之者其和陽乎。

養耳力者常飽，養目力者常瞑，養臂指者常屈伸，養股趾者常步履。

夏臟宜涼，冬臟宜溫。

背陰肢末，雖夏宜溫，胸包心火，雖冬難熱。

陽精陰血，皆飲食五味之實秀也。

女人天癸既至，踰十年無男子合，則不調；未踰十年，思男子合亦不調，不調則舊血不出，新血誤行，或漬而入骨，或變而之腫，或雖合而無子，合男子多則瀝。

褚氏遺書多確言

枯、虛人產乳衆則血枯殺人、而無下合、更于多、
雌鳥牝獸無天癸而成胎者何也、鳥獸精血往來尾
間也、
制劑、獨味為上、二味次之、多品為下、酸通骨、甘解毒
苦去熱、鹹導下、辛發滯、
當驗之藥未驗、切戒、
藥、
修而肥者、飲劑豐、羸而弱者、受藥減、
善用兵者、徒有車之功、善用藥者、薑有桂之效、
病有微而殺人、勢有重而易治、
未笄之女、天癸始至、已近男色、陰氣早洩、未完而傷

未實而動、是以交而不孕、孕而不育、育而子脆不

壽、

老陽遇少陰、老陰遇少陽、亦有子之道也、

醫學源流論
 方論卷上
 六十一
 夫書而遺是必交之而不平空而不可直謂于銀不...

料方

醫學源流論方論卷上六十一

說文三下卜部卜以問疑也从口卜讀與稽同
 段玉裁注左傳曰卜以決疑不疑何卜問疑故從
 口俗作乚說文注三下四十一

字典乙部乚集韻正韻並堅奚切音雞說文卜以
 問疑也通典西國用羊卜卜師謂之廝乚通雅乚
 當與叶同

又卜部叶唐韻古奚切集韻韻會堅奚切正韻堅
 溪切並音雞說文卜以問疑从口卜廣韻問卜也
 集韻說文引書叶疑一曰考也又或作乚通作稽

乚字

〇コノ処ハ下文ノ段玉裁
 ノ注ヲ入レル

韻會今文尚書作稽疑又集韻遣禮切音啓卜問也

又占視兆問也从卜口段玉裁注按上文叶字疑

占之變體後人所竄入同上

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

反診

素問至真要大論北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反其診則見矣

王冰曰不應皆為脉沈脉沈下者仰手而沈覆其手則沈為浮細為大也前文注

脉經寸口脉沈著骨反仰其手乃得之此腎脉也卷十
○按反仰蓋王冰所謂覆其手也

殺車槌法尤當問病人若平素原無正取脉須用覆手取之脉必見也此屬反關脉診法與正取法同若反診

平素正取有脉後因病診之無脉者亦當覆手取之
六書卷三

又取之而脉出者陰陽錯亂也宜和合陰陽如覆取
正取俱無脉者必死矣此為良法同上

王叔和曰又取者覆手取也其法如覆取其法
天假三日不取者不取也又其法覆取也
小宜曰天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也
天假三日不取者不取也又其法覆取也

兩股熱如湯沃 氣衝熱當與附錄卷三氣衝
急痛相參看

靈樞百病始生篇岐伯曰其著孫絡之脉而成積者
其積往來上下云云其著於伏衝之脉者揣之應手
而動發手則熱氣下於兩股如湯沃之狀

太素經胞痺者少腸膀胱按之兩髀若沃以湯原
作陽

改今濟於小便上為清涕卷三○按素問痺論少腸
作少腹兩髀作內痛新校

正云按全元起本
內痛二字作兩髀

脉經眩冒狀如厥氣衝髀裏熱卷九平鬱對冒

又婦人病苦氣上衝背眩冒吐涎沫髀裏氣衝熱
同上

兩股熱如湯沃

又謂人許世居上爵... 兩頰頰吹息太... 廣齋錄... 卷十一

孫真人養子教子法

千金翼小兒雜治門論曰文王父母有胎教之法此
聖人之道未及中庸是以中庸養子十歲以下依禮
小學而不得苦精功程必令失心驚懼及不得苦行
杖罰亦令兒得癩癩此事大可傷但不得大散大
漫令其志蕩亦不得稱讚聰明尤不得誹毀小兒十
一以上得漸加嚴教此養子之大經也不依此法令
兒損傷父母之殺兒也不得怨天尤人 卷十一

孫真人養子教子法

良可對父母之終家世不野也天大人卷十一
一以上骨痛或氣短地養子之大醫也不知地起金
要合其志也亦不野也醫能知亦不野也醫小兒十
林四時亦合字野離離地事大野也野不野大婚大
小學子而不野也野如野也令夫以野也野不野也
聖人之道未及中野是也中野是也十歲以不野也
千金要小兒雜志門第曰文王父母皆野也之志也
野真入養子也野也

甄權之言互佩服

唐甄權曰人有七尺之軀藏腑包其內皮膚絡其外
非有聖智孰能辨之者乎吾十有八而志學於醫今
年過百歲研綜經方推究孔穴所疑更多矣千金翼卷十六
取孔穴法第一

業廣嘗每讀過百歲研綜經方語未嘗不嘆老而
猶不怠余年六十五得知六十四年之非天若假
數年之壽亦必得昨非矣孔聖有言學而不已闔
棺則學者其可不勉乎時明治壬申七月廿六日
也八年己亥余年六十八修拙著之日再識

甄權之言互佩服

史記倉公傳齊王太后病得之流汗出

許慎說文書言不誤也

熾華之書亦必對相非矣

辭不意余年六十

業當守其

取此

非有聖賢博通

重理辭曰八百

重理辭曰八百

重理辭曰八百

大汗之禁

史記倉公傳齊王太后病得之流汗出

又濟北王病得之汗出伏地

又齊北王女子豎病得之流汗

又齊丞相舍人奴之病得之流汗數出

出見大風也

傷寒論溫覆令一時許遍身熱

不可令如水流離病必不除

凡服湯發汗中病即止不必盡劑也

肘後方凡傷寒發汗皆不可使流離過多

汗汗絮便止未止粉之勿當風

出汗之禁

千金方凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛羸卷一論服餌第八

本事方仲景用桂枝以發其邪芍藥以和其血蓋中風則病在脉之外其病稍輕雖同日發汗特解肌之藥耳故仲景於桂枝證云令遍身熱水微似有汗者佳不可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反動榮血邪氣乘虛而襲之故病不除也卷八又昔有鄉人丘生者病傷寒予為診視發熱頭疼煩渴脉雖浮數而無力尺以下遲而弱予曰雖麻黃證而尺遲弱仲景云尺中遲者榮氣不足血氣微少未

行

可發汗予於建中湯加當歸黃耆令飲翌日脉尚爾其家煎迫日夜督發汗藥言幾不遜矣予忍之但只用建中調榮而已至五日尺部方應遂投麻黃湯啜第二服發狂須臾稍定略睡已得汗矣信知此事是難是難仲景雖云不避晨夜即宜便治醫者亦須顧其表裏虛實待其時日若不循次第暫時得安虧損五臟以促壽限何足責也南史記范雲初為梁武帝屬官武帝將有九錫之命在旦夕矣雲忽感傷寒之疾恐不得預慶事召徐文伯診視以實懇之曰可便得愈乎文伯曰便差甚易政恐二年後不復起耳雲曰朝聞道夕死猶可况二年乎文伯以火燒地布桃

葉設席置雲於上頃刻汗解撲以溫粉翌日果愈雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒夫取汗先期尚促命期况不顧表裏不待時日便欲速効乎每見病家不耐病未三四日晝夜促汗醫者隨情順意鮮不敗事故予書此為醫者之戒同上九ノナ

案劉君蒞庭藥治通義卷四發汗不可太過條十ノナ虛家不可大汗條九ノナ載宋元以下諸說互攷

木分蒼白

林億曰如白木一物古書惟只言木近代醫家咸以木為蒼木今則加以白字庶乎臨用無惑矣凡陰方

寇宗奭曰蒼木其長如大小指肥實皮色褐氣味辛

烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白木麤促

色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言木

未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言木有兩種自

此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將

蒼木置而不用如古方平胃散之類蒼木為最要藥

功尤速殊不詳本草元無白木之名近世多用亦互

兩審本草衍義卷七木分蒼白

施政卿曰夫去濕以木為主古方及本經止言木未嘗有蒼白之分自陶隱居言木有兩種後人以白者難得故貴而用之殊不知白木肉厚而味甘甘入脾能緩而養氣凡養氣調中則相宜耳蒼木肉薄而味辛烈辛烈走氣而發外凡於治風去濕則相反耳以此觀之則白木治濕不如蒼木明矣續易簡方論卷二方有執曰木上不當有白字說在本草鈔木條下是書編始於叔和叔和有脉經脉經木上皆無白字足可徵也然則白為後人所加明甚傷寒論條辨五苓散注汪琥曰或問五苓散中用木昔賢如朱奉議孫真人許學士等皆用白木近醫方中行喻嘉言改作蒼木

何也余答云改用蒼木雖未合義然使其人裏實熱結小便不利雖用蒼木不為害也若其人發汗過多亡津液胃虛燥渴欲飲水而小便不利者則蒼木過於燥烈斷不可用不若白木之甘平滋膩能補津液而潤燥為可用也方喻二氏所可怪者凡仲景用木之方皆云此是蒼木倘後學起而宗之不論其人虛實燥溼之證凡方中類用蒼木不其大害邪縱使仲景時無白木於今業已有之在醫人亦可權宜取用如死執古方以療今病斷不可行也傷寒辨注汪認庵曰古方本草不分蒼白陶隱居言有兩種始各施用本草備要

劉君廉夫曰木少赤白始出于本草經集注金匱
麻黃加木湯方內白字後人所加互刑金匱
輯義
劉君紹翁曰陶弘景本草經注稱木有兩種曰白
木曰赤木以根色分之也至日華子改赤木名蒼
木然蒼字說文曰草色也與赤自異不知何故詩
北風曰莫赤匪狐而南史沈慶之傳曰慶之患頭
風好著狐皮帽羣蠻惡之號云蒼頭公是狐皮亦
稱蒼則蒼恐黃赭色若蒼鷹史鄧蒼鴛志禽之類
想當爾耳南史張彪傳曰大名黃蒼梅堯臣詩云
只畏落日聞蒼狐蘓舜欽詩曰齒搖髮亦蒼此皆
黃褐之謂也蒼木之蒼亦是赭黃之褐之謂而已

柳泮文藁下 迂巢雜存

劉君直庭曰仲景之時木無蒼白之分未知其所
用為何然在今世則二木隨互為妙如白木附子
湯及甘草附子湯並用蒼木正見其效傷寒木
義
李時珍曰昔人用木不少赤白自宋以來始言蒼木
苦辛氣烈白木苦甘氣和各自施用亦頗有理本
草

乳汁屬血

病源候論產後乳無汁候婦人手太陽少陰之脉下
為月水上為乳汁任娠之人月水不通初以養胎既
產則水血俱下津液暴竭經血不足故無乳汁也卷

十四

又產後乳汁溢候婦人手太陽少陰之脉上為乳汁
其產雖血水俱下其經血盛者則津液有餘故乳汁
多而溢出也同上

崔氏乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉血氣所

生外臺卷三十五揀乳母法引婦人千金

本事方方未受孕則下行以為月水既妊娠則中蓄

乳汁屬血

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, mostly illegible.]

之以養胎及已產則上雍之以為乳皆血也卷

婦人良方衝任之脈皆起於胞內為經絡之海手太陽小

腸之經手少陰心之經也此二經為表裏主上為乳汁

下為月水然則月水是經絡之餘卷一 卷二十二 文

其意難論水與下其盛血盛者傾車來下論法

又其意難論水與下其盛血盛者傾車來下論法

十四

重限水血動下動氣暴暴盛血不足始無餘於也如

無日水土為厚六封致之入月水不亂以養諸理

諸氣到命盡對於時下封致入主大腸少動之氣下

陰十七 氣血

乳汁出自穀氣

近効祠部李郎中消渴論由如乳母穀氣上洩皆為

乳汁外臺卷十一 引廿九

西京三原三折產育全書卷末拾遺有乳汁論

互參攷

婦人良方雖有乳又却不甚多者須服通經之齊以

動之仍美臃引之蓋婦人之乳資於衝脈與胃經

通故也卷二十三

乳汁出自穀氣

之以養胎及已產則上養之以下養之
婦人食之氣血虧損
賜之經年以陰心之經也此三經為
面婦也春之動月水是經絡之餘
禮之心蓋謂人之血氣其動而
動人身之氣血不味不盡多者
曰參芪

西京三原三林室音全書卷末合對音

原十樹臺卷十一後

出校師暗李中微思論由收此其陳原土

原十出自彙原

和果不時之物傷人

詩小雅魚麗物其有矣維其時矣

論語鄉黨篇不時不食朱熹注不時五穀不成果實

未熟之類此數者皆足以傷人故不食按古注與朱注不同今用

朱注說

禮記玉制五穀不時果實未熟不粥於市鄭玄注物

未成不利人謂粥因不

家語刑政篇菓實不時不粥於市卷七十一

淮南子說林訓華不時者不可食也高誘注華實若

今八九月食晚瓜令人病瘡此之類故不可食卷七十五

漢書循吏傳昭信臣傳大官園種冬生葱韭菜茹覆以屋

不時之物傷人

庶師古曰庶周室也晝夜難蘊火待溫氣乃生師古曰難古然字蘊火蓄

火也蘊音於云反信臣以為此皆不時之物有傷於人不宜

以奉供養及之非法食物悉奏罷省費歲數千萬

卷五十九姓

後漢書鄧皇后紀因下詔曰凡供薦新味多非其節

或鬱養強孰或穿掘萌芽味無所至而夭折生長豈

所以順時育物乎傳曰非其時不食自今當奉祠陵

廟及給御者皆須時乃上凡所省二十三種卷七上

醫說食物可生噉者唯有果核時新初市無貴先

嘗貴在實成氣足以走趨市利之物多未成熟故也

時果鮮味易於可口無喜其甘酸至於意足而後已卷七

阿膠煮湯不炙

玉函經方藥炮製膠乃成下去滓乃納之飴亦然凡

圓藥膠炙之乃可搗用膠炙令盡沸卷

陶氏本草序例凡丸散用阿膠皆先炙使通體沸起

燥乃可搗有不沸處更炙之千金更炙之下有斷下

是

千金方合和第七斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用

阿膠皆絞湯畢內汁中更上火兩三沸令烊卷一十

字接前陶氏文

薛生白曰長沙夫子用阿膠何曾云炒後人畫蛇添

足耳阿膠之用專為濟水伏流也炒之濟水何在哉

阿膠煮湯不炙

按古人用膠、丸、散、則灸之、煮湯則否、然千金翼外
臺者、煮湯中間有灸者、是恐非古義、其煮湯中灸
者、載于拙著修治古義中、互攷、三無令秋、

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

素靈中尺字有不可為尺膚者

素問陰陽應象大論按尺寸觀浮沈滑澹而知病所
生以治

又平人氣象論尺脈緩澹謂之解休

又奇病論帝曰人有尺脈數甚筋急而見此為何
病

又至真要大論帝曰尺候何如岐伯曰北政之歲三

陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之政三

陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應

靈樞終始篇少氣者脈口人迎俱少而不稱尺寸也

按素靈中尺字間有不可為尺膚者說者必改易

素靈中尺字有不可為尺膚者

字句以為尺膚之義然素問固非一人之作則焉
知其中無為尺寸之尺者夫寸關尺出越人之創
意亦焉知必不本古人乎王冰以下注家或為尺
膚或為尺寸之尺望文生義似模糊無定見而其
實不可全廢若夫至真要大論係六朝之人所作
則全與難經同也

又齊書論帝曰入骨又視其其病急而見此為可
又平八屏象論又視其其病急而見此為可
至心欲

素問全圖卷之大論其又古醫家所著而味其
素靈中只字百下不為入靈者

金匱金匱金匱 玉版金匱附

素問病能論金匱者決死生也又續素問大論其
又氣穴論藏之金匱不敢復出

賈誼新書 書之玉版藏之金匱卷

史記太史公自序遷為太史公細史記石室金匱
之書徐廣注細音抽索隱如淳云細徹舊書故事
而次述之小顏曰細謂綴集之也宋石室金匱皆

國家藏書之處卷百三十五美氏系中外景金匱

又秦撥去古文焚滅詩書故明堂石室金匱玉版

圖籍散亂同上

漢書高帝紀又與功臣剖符作誓丹書鐵契金匱

金匱金匱金匱

石室藏之宗廟如淳曰金匱猶金縢也師古曰以金為匱以石為室重緘封之保慎之義卷一下

又晁錯傳刻於玉版藏於金匱三石室金匱

賈公彥周禮天官冢宰下正義引張仲景金匱云

神農能嘗百藥卷五

尚書金縢武王有疾周公作金縢孔傳為請命之

書藏之於匱緘之以金不欲人開之正義經云金

縢之匱則金縢是匱之名也詩述韞弓之事云竹

又閉緘縢毛傳云緘繩縢約也此傳言緘之以金則

訓縢為緘王鄭皆云縢束也又鄭喪大記注云齊

人謂棺束為緘家語稱周廟之內有金人三緘其

其口則縢是束縛之義藏之於匱緘之以金若今

釘鑠之不欲人開也鄭云凡藏秘書藏之於匱必

以金緘其表是秘密之書皆藏於匱非周公始造

此匱獨藏此書也卷十三

使求得之金縢

魚目語下使求得之金縢韋昭注縢匱也金以金帶

其外也卷五

韓非子喻老篇周有玉版

詩含神霧詩者天地之心刻之玉板藏之金府太平

御覽引

亦可煮同上 勞發又照二合

老瘡久不斷者常山三兩鼈甲二兩炙升麻一兩
附子一兩烏賊骨一兩以酒六升漬之小令近火

一宿成服一合比發可數作同上

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有酒氣

不即斷更作不過三服而止同上

又方末龍骨方寸匕先發一時以酒一升半煮三

沸及熱盡服溫覆取汗便即效同上 卷十四引葛氏方

全無問年月可治三十年者常山黃連各三兩酒一

斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服八合比發時

令得三服熱當吐冷當利服之無不差者半料合

服得同上

發日五更酒三三十九同上 治一切瘡烏梅丸方

千金方

治瘡或間日發者或夜發者又方先作羊肉臠麩

餅飽食之并進少酒隨所能其令欣欣有酒氣入

密室裏燃炭火厚覆取大汗即差卷十溫瘡第五

驗瘡從四肢始又方同外臺卷五集

又方燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸七日同上

臺卷五引備急瘡間日瘡方畧同

治老瘡久不斷者方後云有五味吹咀絹袋盛

○此發可數服或
吐下
才後發

以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合

同上○外臺卷五引作山瘡瘡酒方

治瘡無問新久者又方馬鞭草汁五合酒三合分

三服同上

又方常以七月上寅日採麻花酒服末方寸匕

同上

治瘡方後云右五味吹咀以酒二升半漬之露

一宿明日塗五心手足過發時瘡斷若不斷可飲

一合許差

鯪鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘡方後云右

五味吹咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜之同上

勿絕也兼以塗
身斷食過時乃
食飲之

金翼同

治肝邪熱為瘡云云烏梅丸方後云酒服十九日

再飲服亦得同上

恒山丸方後云未發前酒服十九同上○外臺

千金翼

卯時發者鞭死鬼所為治之用五白衣燒作灰三

指撮著酒中無酒清水服卷十八痲瘡第二

外臺秘要

肘後療諸瘡又方方後云酒服方寸匕卷五

又方後云以酒三升漬一宿同上四

以深師常山烏梅湯方後云以酒三升水四升合

臨發時一服正發
時一服

煮取二升同上

深師療臍湯方後云以酒二升漬一宿同上

必効常山酒方後云病未發前一日以酒浸藥於

碗內以白紙一張覆之同上

古今錄驗烏梅丸方後云以酒飲任下三十九同上

千金烏梅丸方後云酒服十九日再同上

廣濟療溫瘧常山丸方後云空肚以溫酒下二十

九至三十九同上

小品療山瘴瘧陵鯉甲湯方後云以酒三升漬之

同上

同上

備急瘵瘴瘧服藥後灸法云灸鼈甲末一方寸七

煖酒和服同上

備急麻黃散方後云平旦空腹溫酒三合服方寸

七同上

救急蜀漆湯方後云以水一斗漬之并春酒二升

合煮取三升去滓分三服同上

常山散方後云發日平旦酒服一方寸七臨發又

一七發後又一七二日不得洗手面七日忌食雜

物唯藥用酒得餘皆斷或吐或不吐皆差同上

古今錄驗常山酒方後云以酒小一升半漬一宿

同上

發見 勿在 一人 靜 身 藥 置 兒 漢 以 手 計 出

○寒頓服相次
更服三錢更
飲三兩至盡
意醉却睡過
方得食

近効常山丸方後云候欲發前一食時酒下四十丸同上

木香犀角丸方後云酒飲服三十九丸同上三十九丸

小品常山湯方後云以酒漬藥刀置上覆頭安露地同上明旦以水七升煮取三升分三服比未發前令盡同上

集驗黃連散方後云以濃酒一盞調三盞酒任意

醉却睡候過時方得食同上廿六丸

深師常山湯方後云以酒一斗宿漬之向晚以瓦

釜煮取六升一服八合比發時令得三服同上廿九丸

崔氏常山散方後云先發熱飲和服若先寒清酒

和服之同上

備急烏梅丸方後云未發時酒服二十九丸同上廿九丸

近効常山酒方後云以酒三升漬經再宿空腹早

朝溫服一合同上廿九丸

肘後蠶甲酒方後云以酒三斗漬一宿平旦服

一合稍稍加至二合日三四服同上廿九丸

古今錄驗朱砂丸方後云用清酒下行五十餘步

隨意坐臥無酒湯下亦得同上廿九丸

近効加減桃人常山丸方後云右三味各別搗五

六百杵又和更搗六七百杵然點好酒如黑泥自

成丸不飲酒事須酒下三十九丸如梧子未發前服

同上卅四丸

○臨發更服三十九

許仁則當歸等六味散方後云平旦空肚以酒飲下同上卅九ウ

醫心方

葛氏方治瘡病又方灸鼈甲搗末酒服方寸七卷四後又引葛氏方老瘡不斷者方畧同

本草疑云治瘡燒猫屎為末酒服方寸七同上

范汪方治鬼瘡方當發及旦從旦至發時温酒服方寸七同上

寸七三服同上

通玄鬼瘡方恒山三兩豉一升秫米一百粒蒜七

片研清酒二升漬之一宿早旦服之同上

僧深方治勞瘡桃葉湯方後云桃葉十四枚恒山

十四枚恒山四兩凡二物酒二升漬一宿同上

錄驗方治瘡及瘴氣方恒山二兩甘草二切以白

酒大一升浸一宿去滓分二服同上

小品方斷瘡恒山酒鼈甲一兩淡竹葉切三升恒

山三兩甘草三兩久酒三升凡五物以酒漬藥云

云同上卅五〇外臺卷五引作小品恒山湯

效驗方恒山散牛膝草一把好酒三升凡二物牛

膝內酒中漬一宿云同上

錄驗恒山湯恒山二兩甘草一兩大黃二分桂心

六銖凡四物切以恒山酒漬一夜云同上

效驗方恒山五分干漆四分牡蛎二分杏仁二分

恒山散

凡四物下篩酒服方寸匕同上

不粒正四物以對山而貴一或云云

山二兩甘草一兩大黃二分

味積散三十分

山二兩甘草一兩大黃二分

味積散三十分

山二兩甘草一兩大黃二分

味積散三十分

山二兩甘草一兩大黃二分

味積散三十分

山二兩甘草一兩大黃二分

瘡疾用附子

肘後方治瘡病又方臨發時搗大附子下篩以苦酒

和之塗背上卷三治寒熱諸瘡方

又方巴豆一枚去心皮射菌如巴豆去心皮射菌如

中豆大棗一枚去皮合搗成丸先發各服一九如梧

子大也同上

又老瘡久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻一兩

附子一兩烏賊骨一兩以酒六升漬之小令近火一

宿成服一合比發可數作同上

作寒作熱作有作無

又治瘡瘡常山黃連鼓熬各三兩附子二兩炮搗篩

瘡疾用附子

鱈魚甲云處二字
サゲル

蜜丸空腹服四九欲發三九飲下之服藥後至過發

時勿喫食同上三九外臺卷五備急療瘡瘻

千金方治瘡方鱈甲枋烏賊骨二方附子甘草各一

恒山二兩右五味咬咀以酒二升半漬之露一宿明日

塗五心手足過發時瘡斷若不斷可飲一合許差卷十溫瘡第六

又鱈魚湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘡瘡方同上

○千金翼卷十八作瘡疾江南瘡瘡

鱈魚甲十四枚鱈甲又烏賊骨略一

恒山三兩附子一枚

右五味咬咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜之勿

絕吐也兼以塗身斷食過時乃食飲之○翼方鱈魚甲鱈甲

下有炙字附子下有炮去皮字外臺作陸鯉甲
十片炙烏賊魚骨去甲鱈甲炙附子炮方後文小異

古今錄驗療瘡豉心丸方外臺卷五九方

香豉五合常山三兩大黃三分附子二分

右四味搗篩蜜和丸服如大豆十丸當勿食比至

發來令服三十九瘡不止亦可至四十九瘡必止

若膈上有停痰欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨

常有驗

深師療久瘡難斷香豉丸方同上廿九方

香豉一斗常山七兩蜀漆針附子一斗大黃二分

右五味搗下篩蜜和發日早服五丸如梧子須臾

又服五丸發晚者至發可三四服令其得吐為佳
欲不即斷畏吐者但則長將久服無不差也
又備急龍骨丸療久瘡不斷者方同上

龍骨一兩常山三兩大黃二兩附子二錢

右四味搗末以雞子黃丸如梧子大先發臨發各
飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年

瘡

肘後療勞瘡鼈甲酒方同上

鼈甲二兩常山三兩蜀漆二兩烏賊魚骨一兩

附子一兩知母二兩椒一兩

右七味切以酒三斗漬一宿平旦服一合稍稍加

古今錄驗朱砂丸方後一服三丸用清酒下之無酒

至二合日三四服且後之人至創耳

僧深方治一切諸瘡無不斷恒山丸方增心方卷

大黃一兩二兩附子一兩二兩恒山三兩龍骨一兩

凡四物治合下篩蜜和平日服梧子七丸未發中

間復服七丸臨發服七丸若不斷至後日復發更

服如此法甚神良○按此方與前備

僧深方治卅年瘡龍骨丸神方同上

龍骨四兩恒山三兩附子三兩大黃三兩

右四物治從雞子和發前服七丸如大豆臨發服

七丸

續醫說嶺南一大商病瘡胸中痞悶煩燥昏不知人

願得涼藥清利上膈其證上熱下寒脉沈而微以生薑附子作湯浸冷俾服踰時甦醒自言胸膈踈爽然不知實用附子也若庸工見其胸中痞悶投以涼藥下之十無一生然此法惟山嵐瘴氣所致下體虛冷之人宜施若暑瘧痰瘧則別處治可也卷六附子愈瘧條

醫方考七棗湯

卷ニサウ

附子

一枚鹽水煮去皮

大棗七枚

通王對日對

瘧發時獨寒無熱脉遲者名曰牝瘧當責之寒宜此方主之牝陰也王冰曰益火之原以消陰翳故獨寒無熱之瘧用附子之辛以主之佐以大棗七枚取其能和附熱且引之入至陰耳

截瘧之禁

明醫雜著瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發
有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有
有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者
治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須
分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發者可散可截虛
瘧及久者宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延
綿不愈矣
續醫說瘧之為疾寒熱並作謂之瘧二日一發謂之
疟經年累月謂之瘵內經問答詳盡今人未嘗深究
但持無痰不成瘧之說傳習砒黃豆粉為丸衣以朱

砂謂之瘡丹或以常山一味為君名為瘡藥不問虛實緊行施治或偶與痰瘡相投暫得取效若脾虛氣弱之人瘡不因痰而或七情所致者投之大作嘔吐精源髓海倒流逆動病勢轉增為禍不淺婦人所畏者吐耳尤難遽投當詳其病源有暑風濕痰食老瘡之不同若貧賤之人其身雖苦其志則安雖用砒石硃砂有毒之藥以熱攻熱亦能取效至於富貴之人徃徃役心大甚加之奉養過厚內火與外火俱動以熱攻熱變為吐血瀉心瘡瘍嘔吐之證豈可以一槩而治之哉

卷六瘡禁劫藥條

一日一發有二日一發

案瘡之為病雖有日發間日之別寒熱多少之異

其實不過外來之邪故治法亦與傷寒無大異同特疫能傳裏瘡但在表耳是以治得其互則無死證病者能得俟輕者十餘發重者二十餘發必愈此不止瘡之得愈徃徃因是愈積年之宿疾者有焉然病家督促醫者循其情三四發後直用截瘡法輕者乃差重者或再發寒熱或延綿引日或更生他患苟欲明病之大體者可不三思於斯乎

此書之旨，在於辨別病之虛實，以定其治法。凡病之初起，必先察其脈象，以知其病之所在。若脈象浮而有力，則為表證，宜用汗法。若脈象沉而有力，則為裏證，宜用下法。若脈象浮而無力，則為虛證，宜用補法。若脈象沉而無力，則為虛證，宜用補法。此書之旨，在於辨別病之虛實，以定其治法。凡病之初起，必先察其脈象，以知其病之所在。若脈象浮而有力，則為表證，宜用汗法。若脈象沉而有力，則為裏證，宜用下法。若脈象浮而無力，則為虛證，宜用補法。若脈象沉而無力，則為虛證，宜用補法。

相論治瘡期限

服藥時刻

當與前治瘡方用酒條相參看

素問瘡論至病之發也如火之熱如風雨不可當也故經言曰方其盛時必毀○太素作勿敢必毀因其衰也事必大昌此之謂也夫瘡之未發也陰未并陽陽未并陰因而調之真氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發為其氣逆也

又刺瘡篇凡治瘡先發時如食頃乃可以治過之則失時也王冰注先其時真邪異居波隴不起故不可治過時則真邪相合攻之則反傷真氣故曰失時

仁齋直指方附遺大抵瘡之初得三數日間如火燎原不可向過波濤洶湧未易回瀾當俟其稍定而圖

治瘡期限 服藥時刻

本草備要露能解暑故白露降則處暑矣瘡必由于暑故治瘡藥露一宿服露水條

之經所謂其盛者可待衰而已瘡方來與正發及將

解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩時之

先或遇發日凌晨空心與之卷十二

醫方考三四發後寸口脉來弦滑浮大者此方吐之

三四發後可截之時也卷二截瘡七寶飲

肘後

金匱要略服法

大鼈甲煎丸方後如梧子大空心服七丸日三服

姑蜀漆散方後未發前以漿水服半錢温瘡加蜀漆

素半分臨發時服一錢七火之熱

肘後方服法

治瘡病方未發時服二丸欲發時服一丸卷三

又方未發前服一丸同上後同者不具載

又先發服三丸中服三丸臨臥服三丸無不斷者

同上

常山甘草方先發時一服比發令三服盡同上

空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時

勿喫食同上

烏梅丸方後發日五更酒下三十九平旦四十九

欲發四十九不發日空腹四十九晚三十九同上

乞鬼瘡發日平旦冷水服二丸同上

千金方服法

麻黃湯方後未發前食頃一服臨發一服服後皆

厚覆復取汗卷十

牡蠣湯方後飲一升即吐出復飲之卷十

治瘡云云方後銅器中漬藥露置星月下高淨處

橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器緩火煎

取三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發

發一服三服訖靜室中臥莫共人語當一日勿洗

手面及嗽口勿進食取過日不發乃澡洗進食并

用藥汁塗五心曾前頭面藥滓置頭邊曾用神驗

同上

又方圓方後未食服五丸日二不知漸增同上

以竹葉飲服三丸

又方欲吐但吐至發令得三服時早可斷食時晚

不可斷食同上

梔子湯方後未發一服發時一服發後一服以吐

利四五行為瘥不止冷飯止之同上外書至卷

治老瘡方後比發可數服或吐下同上

治瘡云云方後每發日平旦時服自至發勿食

同上

又方後未發前服盡同上

又方并花水服之同上

又方水服方寸匕同上

治瘡方後露一宿明日塗五心手足過發時瘡斷

桃花末

若不断可飲一合許差同上
治勞瘡云云方第一服取未發前食頃第二服取
臨發時同上○外臺卷五引

鯪魚湯方後發前稍啜之勿絕吐也兼以塗身
斷食過時乃食飲之同上

恒山湯方後分三服至發時令三服盡同上

藜蘆丸方後蜜丸如小豆大旦服一九正發時

一九一日勿飽食同上

外臺秘要服法

備急服瘴藥皆在發前必須平旦空腹服服藥之
後勿洗手面漱口勿通外人勿喫食勿勞力既過

發時久小進糜粥如此將瘴無不即斷又當發熱
之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更
是難療得瘴之後復成癥癖亦有即發氣者死不
救若熱渴者豉汁煖服取足得吐彌善水煮豉研
犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪
如兩棗許大水和飲之云云卷五十八

又療瘴瘧常山丸方後發前空腹服四丸欲發更
服三丸飲下之自旦至暮乃食三日勿雜食豬肥

臠肉魚及生冷生葱生菜同上十九方

又大黃湯方後分三服發前盡服別取吐利同上

救急朱砂丸方後候瘴發日平明服七丸飲下欲

覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差同上
深師香豉丸方後發日早服五丸如梧子須臾又
服五丸發晚者至發可三四服令其得吐為佳欲
不即斷畏吐者但則長將久服無不差也同上
備急龍骨丸方後先發臨發各飲服五丸無不斷
長將服之同上

又常山散方後以竹葉煮飲取六七合飲及熱用
調常山散三方寸匕未發前一服若差停不差臨
欲發又進二寸匕老小以意量之同上
集驗阿魏散及丸方後以煖水服半錢如不能散
服蜜丸就水下三十九須臾吐忌冷水如吐不止

啖蒜薑鱠仍以聃子盛散一錢男左女右繫臂

上立差同上

救急常山湯方後分温三服清旦一服欲發一服
正發時一服三服訖靜室中臥莫共人語過時後
洗手面與食七日禁勞生葱生菜酒及熱麪毒魚

同上

古今錄驗朱砂丸方後病人氣力強仍不廢行動
者則須於當發日服之如似日西發者臨發之日
勿食平旦服三丸已時服三丸午後更服三丸則
差若不差必定輕微更服則差餘時發者準此日
一時任意消息其病人氣力微弱者不得臨發日

服應預前一日服之如似明日發者今日平旦空
腹服三丸至齋時食一碗粥至日西更服三丸至
日暮復食一碗淡粥_三不得飽食至一更盡更服
三丸至平明食粥一碗至齋前更進三丸不得食
至午時更進三丸必差差後三日以來唯得食甜
粥飲漿忌生冷酢滑膩麪及飽食七日以來特忌
生血物生葱生菜云云

五勞傷一服三服
珠珀散
生血物生葱生菜云云
同生
三丸
至齋前更進三丸
不得食
至午時更進三丸
必差
差後三日
以來
唯得食甜
粥飲漿
忌生冷
酢滑膩
麪及飽
食七日
以來
特忌
生血物
生葱
生菜云云

肘後方

治瘡灸法

金匱要略弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之瘡
脈證并治

病源候論脈數而緊者可發其汗宜針灸之脈浮大
者不可針灸之卷十一瘡病候

療瘡病又方大開口度上下唇以繩度心頭灸此度
下頭百壯又灸脊中央五十壯過發時灸二十壯卷
治寒熱諸瘡第十六

集驗瘡瘻又方桃葉二十七枚安心上灸菜上十四
壯僧深方同之醫心方卷十四廿七
千金方治瘡又方未發前預灸項大椎犬頭漸灸過

治瘡灸法

時止同上○外臺卷五引備急云療瘡服藥後灸法灸大椎三四十壯無不斷云云十八壯

葛氏方治瘡病又方灸鼈甲搗末酒服方寸七至發

時令三服兼用火灸無不斷同上○外臺卷五引肘後同

千金方凡灸瘡者必先問其病之所先發者先灸之

從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止

從腰脊發者灸腎輪百壯外臺注穴在第十四從

手臂發者灸三間卷十指節根下一寸在虎

又瘡灸上星及大椎外臺注大椎穴在背從至發

時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大

炷也同上

又覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈

者不過三灸同上

又以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸

線頭三七壯炷如小豆同上

又灸風池二穴三壯同上

又一切瘡無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從

乳向下灸度頭隨年壯男左女右同上

又五歲一切諸瘡灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈

是也同上

又瘡瘡上星主之穴在鼻中央直髮際下陷容豆是

也灸七壯先取譙譙後取天牖風池同上

又瘡日西而發者臨泣主之穴在目眇上入髮際五

分陷者灸七壯同上

又瘡實則腰背痛虛則輒斂飛揚主之穴在外踝上七

寸灸七壯同上

又瘡多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之

穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯同上

千金翼瘡醫並不能救者友以繩量病人脚圍繞足

跟及五指一匝訖截斷繩取所量得繩置項上著反

向背上當繩頭處中脊上灸三十壯即定候看復惡

寒急灸三十壯即定比至過發一炊久候之雖飢勿

與食盡日此法神驗男左女右

卷十八外
臺卷五引同

治瘡藥橫刀其上法

千金方治瘡或間日發者或夜發者方後以水八升
銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀其上明日取
藥於病人房門以銅器緩火煎取三升分三服卷十
廿五ノウ

○外臺卷五引崔氏療瘡會稽
賴公常山湯方後文与千金醫同六ウ

必效療瘡常山酒方後病未發前一日以酒浸藥於
碗內以白紙一張覆之碗上橫一刀欲發時三分飲
一分港外臺卷五ノ

小品常山湯療瘡瘡云云方後以酒漬藥刀置上覆
頭安露地明旦以水七升煮取三升分五服同上六

應安靈水... 小品常山... 一分... 藥... 千金... 志...

瘧痢同因

醫說昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得泄痢連月
 夢觀音壁間有韻語一紙讀之數過其詞曰暑毒在
 脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧卷三觀音治痢條
原作夢得神方

大今從潘王府本
作觀音治痢

張介賓曰凡患瘧者必因於盛暑之時貪涼取快不
 避風寒或浴以凉水或澡於河流或過食生冷壯者
 邪不能居未必致病怯者畜於營衛則所不免但外
 感於寒者多為瘧內傷於寒者多為痢使能慎此二
 者則瘧痢何由來也素問瘧論注

又曰瘧痢發于夏秋本因溽暑豈非濕熱但炎蒸之
 瘧痢同因

令出於天苟能順天之氣安能有病惟因熱求涼過
于縱恣則病由於人矣故凡風寒感於外者其邪在
經病多為瘧生冷傷于內者其邪在臟病多為痢痢
之來也暑濕鬱久則為濕熱然有瓜果生冷涼風冰
水未必鬱積加以飲食相犯觸而成痢則痢未有不
本于寒濕生災者豈必專以濕熱為患哉質疑錄
尤怡曰痢之為病氣閉于下而火復迫之是以腹痛
裡急糟粕不出而便腸垢也其源皆由于暑濕與瘧
病俱發于夏秋益傷于經絡則成瘧而入于腸臟則
為痢也經絡之邪可散而愈故治宜辛苦溫之藥腸
臟之熱非清不愈故治宜辛苦寒之藥亦發表不遠

熱攻裡不遠寒之意 醫學讀書記卷下

今出於天而能變天之氣安能有病惟因熱求涼
 而致之則病由於人矣故凡風寒感於外者其和在
 經病多為虛生於內者其亦在臟病多為實刺
 之文古者濕地野久則為濕熱然有瓜果生冷涼風水
 水天必寒時加以飲食相犯而成痢則寒者有不
 水于寒濕生穴者宜又專以濕熱為忌
 尤怕曰利之為病氣閉于下而火復自之是以腹脹
 而泄澀澀不出而便膿也其源皆由於暑濕與瘴
 毒俱發于夏秋之氣易于經絡則成瘧而入于腸胃則
 為痢也經絡之不可散而愈故若宜辛甘溫之藥腸
 積如野不盡寒之意



Kitasato Memorial Medical Library