

醫學管錐 內集 九十

✕
i 18-1

F
4-11

490.9
Iq-3

藥水甄會赤小豆

升用之品

羅背羅明

夏良不可食水

藥如酸心

三百家賦原以真法易

藥忌慈藥及益障藥毒小甲海去

藥學楚關為護志之因藥

黃芩湯治血毒

醫藥學管雜卷八目錄

內國書之信
大正七年



○卷八用黃芩一味條
互併攷

音不黃芩湯治血證附錄卷五黃連解毒湯四物藥

傷寒補亡論仲景曰陽明病口燥但欲漱水不欲飲

者此必血常氏云可黃芩芍藥地黃湯注當作黃芩芍藥甘草湯

不寒身必血血土首為血黃芩湯注當作黃芩芍藥甘草湯

又仲景曰脉浮發熱心乾鼻燥能食者則血常氏云

可黃芩湯同上九才

又仲景曰下利脈數而渴者令自愈設不差必圍膿

血以有熱故也常氏云可黃芩湯同卷七十八曰黃

又曰傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日

小便利色白者此熱除也欲得食其病可愈若厥而

嘔胸脇煩滿者其後必便血常氏云便血者可黃芩

黃芩湯治血證

湯雍曰熱已除者畏黃芩卷計五三更血者何黃芩
又曰陽明病口鼻燥但欲嗽水不欲嘔者此必衄常
氏云宜黃芩芍藥湯同上更熱下谷食飲難下
又曰脈浮發熱口乾鼻燥能食者則衄常氏曰可黃
芩湯同上下血衄而欲飲者自食難下蓋又圍氣
醫學入門經熱則口燥煩而欲水漱裏寒則水入而
不敢嘔陽明症漱水不嘔身熱或微惡寒熱在經而
不在裏必逼血上行為衄血黃芩湯於血症漱水不
嘔外無寒熱喜忘如狂犀角地黄湯卷三如
又如無表證衄血成流及因汗而得衄或下又見血
者不治自愈不止者犀角地黄湯陶氏生地芩連湯



又論文
卷八田黃苓

黃芩湯茅花湯外用冷水浸紙貼太陽穴紙熱又換
或用百草霜胎髮燒灰吹入鼻中九竅出血亦效凡
衄不宜即止恐餘血入胃着於上焦為血結胸疝同上

三枚十

又直中少陰症熱行於裏先熱後厥無汗亦陰證似
陽也醫者不能識強發其汗必動其經外則筋惕肉瞤
內則伏熱逼血從耳目而出或從口鼻而出名曰陰
血是為下厥上竭不治但厥為下厥血出於上為上
竭輕者黃芩湯加生地之類或當歸四逆湯黑錫丹
救之動經與鼻衄微有不同如此同上
又衄血熱溢肺與胃涼血行血古入方初宜黃芩湯

加鬱金或茅花冬青子止之久宜清肺生脉飲茜梅
丸古天地膠云云同卷四

血是病五臟之病皆由血出而後言難四
外因於熱血出於耳目而出於鼻而出於口
又血中之氣動則血行而氣亦動血行而
血不直在血脈之中而入胃養於五臟
夫血之氣動則血行而氣亦動血行而
血不直在血脈之中而入胃養於五臟
夫血之氣動則血行而氣亦動血行而

癱勞鼓膈為難治之因辨

侶山堂類辨夫飲入于胃猶海之行雲氣于天下穀
入于胃由脾土之轉輸于四旁是以水穀之津液各
走其道五藏六府皆以受氣皮肉筋骨咸以資生故
曰清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢濁陰歸六
府是止濁中之濁者歸于大腸重腸膀胱而為糞為
溺也夫勞怯膈脹之證或久嗽而傷脾或鬱怒以傷
肝或不得志意而心脾之氣不舒或過于勞傷而腎
藏之精漸絕入胃之藥食不能輸布于五經惟走腸
胃而為穢濁故雖久服而毫無效驗也即悞服其藥
餌亦不覺其有損用參苓之神品亦不能受其精華

此皆鬱逆之為故耳，以致精神日減，肌肉日消，而漸無生氣矣。脹滿之病，在於腸胃之外，郭郭之中，如脾不運行，則藥食更不能及。知陰陽升降之理，五行運化之道者，先當理其脾胃焉。土氣化而灌溉四旁，坤德厚而資生萬物，津液生而陰火伏，地天泰而否隔消，脾氣運行則脹滿自減，筋骨濡潤則癱瘓可強。此端本澄源之大道也。若不知治本，惟以涼潤之藥，欲其降火生津，潤下飲食，夫脾喜燥而肺惡寒，脾土濕則不能輸運，肺氣寒則不能通調，以致津液不生，痰涎及其甚，陰火炎而欬嗽頻，上下否而膈脹愈劇矣。陰火不可撲滅，遇水愈熾，得所生之真精，而后能制之。

卷上卅五

醫學源流論，膈同為極大之病，然膈可治，而膈不可治。

卷上膈論

成劑 卷十小兒瀉痢

續醫說，仲景治痢法，可下者十法，可溫者五法，謂之下者，率用厚氣湯，加減謂之溫者，率用姜附湯，何嘗以巴豆粟殼之劑乎？俗醫見自利而渴，煩躁不眠，手足微冷者，皆用苦劑攻之，殊不知陰盛發燥，欲坐井中，故前哲用吳茱萸湯，甚者用四逆湯，經曰陽虛陰乘之謂也。丹溪用吳茱萸湯，治霍亂吐瀉轉筋者，亦此意也。近時醫人不審痢之赤白，病之新久，驟用芩朮，栗殼石榴皮之類，以為秘方，其功但施於久痢，而

其說在子湯之外如脾
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四
胃之氣化而產四

痢忌熱藥及瀉劑

醫說瀉者不可急以熱藥止之若以熱藥止之便變
成痢 卷十小兒瀉痢

續醫說仲景治痢法可下者十法可溫者五法謂之
下者率用厚氣湯加減謂之溫者率用姜附湯何嘗
以巴豆栗殼之劑乎俗醫見自利而渴煩躁不眠手
足微冷者皆用苦劑攻之殊不知陰盛發燥欲坐井
中故前哲用吳茱萸湯甚者用四逆湯經曰陽虛陰
乘之謂也丹溪用吳茱萸湯治霍亂吐瀉轉筋者亦
此意也近時醫人不審痢之赤白病之新久驟用麩
栗殼石榴皮之類以為秘方其功但施於久痢洞泄

痢已執藥及瀉劑

者則反若初起者用之閉塞積滯變生別證以致經
年累月謂之休息痢者是也世俗但知泄劑之能塞
不知通劑之能塞也後之學者貴在變通不可執一
而治卷六泄劑禁用
其治今者皆用苦降之劑不味創盜發熱治坐共
以巴豆栗殼之障牛公醫見自味而飲更疑不辨生
下者率用中厚然味熱諸之品皆率用姜附其同嘗
蘇習習中厚或麻去下下者十去下品皆五去體之
太麻 卷十小兒疳積
醫治無不河急以熱藥止之可以熱藥止之更變
麻忌熱藥及虛

藥磨爪甲試法真武湯

本草黑字代赭赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝
者良為王者皆自玄武湯而變化之也
圖經牛黃此物多偽今人試之皆指摩手甲上以透
甲黃者為真證類本草卷十六且用理中湯飲用其
本事方乳香掛窻孔中風乾研或用人指甲研或以
乳鉢坐水盆中研卷十治藥制度
本草綱目雌黃試法但于甲上磨之上色者好卷九引丹
房鑑源

李時珍曰騏驎竭今人試之以透指甲者為真卷十甲
同上卷三十四

藥磨爪甲試法

者同五苓三去甲之閉塞積滯變生別證以致經
本和參白期細思冷大痛以爲微許用者真對
不寒濕熱之能寒也後之學者貴在變通不可執一
本草附錄 鍾黃海慈回于甲土藥之士色香秋
片桂坐水盆中形第十卷藥師更
本草之序香樹參以中風痺痺夜用入許甲形夜以
甲黃香亦真 藥師本草卷十六
圖對半黃出味多爲今入端之皆許藥也甲土以
昔身

藥類考甲法

三白湯類原於真武湯

李梈曰三白湯人參三白湯辛黃三白湯凡方中以

三白為主者皆自玄武湯而變化之也醫學入門卷三總方陰症

溫補玄武湯下三五百

證治要訣陰證雖合用四逆湯且用理中湯欲用真

武湯且用三白湯庶不失古人重敵之意若證候已
危不可失機勿拘此說卷二

諸藥本草卷五

李時珍曰宋徽宗食冰太過病腫疾困醫不效召楊

介診之介用大理中丸上田服之屢矣介曰疾因食

水因因水飲此藥是治受病之原也服之果愈若

三白湯原於真武湯

或不下夫對少辨此信

流暴且用三白湯煎下夫古入重嫡之意哉

論要知劉醫經合用四逆湯且用野中湯

監斬玄在湯下

三白為主皆自玄在湯而變少少

李時珍曰三白湯入參三白湯辛黃三白湯

三白湯酸氣飲真在湯

煎夏月不可食冰

陳藏器曰夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱

石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非冥食

或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用水

正可隱映飲食令氣冷不可打破食之雖復當時暫

快久皆成疾今冰井西陸朝觀出之頒賜官宰應悉

此淮南子亦有作法又以凝水石為之皆非正冰也

證類本草卷五

李時珍曰宋徽宗食冰太過病脾胃疾國醫不效召楊

介診之介用大理中丸上曰服之屢矣介曰疾因食

冰臣因以冰煎此藥是治受病之源也服之果愈若

夏月不可食冰

此可謂活機之士矣。本草綱目卷五夏冰發明愈苦
 醫說泗州楊吉老名醫也。徽廟常苦脾疾。國醫進藥
 俱不效。遂召吉老診視。訖進藥。徽廟問何藥。吉老對
 以大理中丸。上云朕服之屢矣。不驗。吉老曰。臣所進
 湯使不同。陛下之疾。以食冰太過得之。今臣以冰煎
 此藥。欲已受病之源。果一二服而愈。卷五引贊
 王徃年加州侯。每盛夏獻冰於幕府。世徃徃珍而食
 之。余時以為夏月外陽而內陰。况冰凝則是死物。
 既失水之性。必不互脾胃。頃年洋風盛行。東京每
 東街。鬻蝦夷所製造之冰者。不可勝計。深畏暗害內
 藏。因揭陳箴器說。以乞識者之是。正。明治九年七

月椿庭老人

黃耆桂

李杲曰黃耆既補三焦實衛氣與桂同功。特此桂甘
 平不辛熱為異耳。但桂則通血脈能破血而實衛氣
 耆則益氣也。綱目卷十二上引

人參甘草

弘景曰人參為藥切要與甘草同功。同上

五參

弘景曰沙參與人參玄參丹參苦參是為五參。其形
 不盡相類而生療頗同。故有參名。同上

人參沙參

此可謂活機之士矣。本草綱目卷五夏月發明
醫說泗州楊吉老名醫也。徽廟嘗苦脾疾。因醫進藥
俱不效。遂召吉老診視。訖進藥。徽廟問何藥。吉老對
以大理中丸。上云。朕服之屢矣。不驗。吉老曰。臣所進
湯。使不同。陛下之疾。以食水太過得之。臣以冰煎
此藥。欲已受病之源。果一二服而愈。經年打鐵
不往。不加州候。每值夏。徽廟欲食。吉老診而食
之余時。以為夏月外陽而內陰。死水凝滯。是死物
既失水之性。必不互。脾胃頃年。海風盛行。東京海
街。醫蝦夷所製造之冰。考不可。厥說深畏。暗害內
服。蘇氏入。器說以乞識者之。是正。明治九年七

藥功類似 鈔本草綱目此篇未暇檢本

黃耆桂

李杲曰黃耆既補三焦實衛氣與桂同功特比桂甘
平不辛熱為異耳但桂則通血脉能破血而實衛氣
耆則益氣也 綱目卷十二土

人參甘草

弘景曰人參為藥切要與甘草同功 同上

五參

弘景曰沙參與人參玄參丹參苦參是為五參其形
不盡相類而生療頗同故有參名 同上

人參沙參

藥功類似

元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之同上

黃精萎蕤

時珍曰黃精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同名一名地節與萎蕤同名則二物雖通用亦可同上

知母黃蘗

時珍曰知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相

依附同上按此說又出三十五卷上黃蘗發明文稍有異同

白木蒼木 白木黃耆

時珍曰昔人用木不分赤白自宋以來始言蒼木苦

辛氣烈白木苦甘氣和各自施用亦頗有理同上

好古曰本草無蒼木之名近世多用白木治皮間

風出汗消痰補胃和中利腰臍間血通水道上而皮

毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血無汗則

發有汗則止與黃耆同功同上故有羌活胡王使者

拔契草解狗脊下卷十八草解拔契木蒼木之義

時珍曰拔契草解狗脊三者形狀雖殊而功用亦不

甚遠同卷十二下

玄參地黃同卷四

時珍曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法

宜壯水以制火故玄參與地黃同功卷十二
一味丹參與四物湯同

時珍曰一味丹參主治與四物湯相同蓋丹參能破
宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脈其
功大類當歸地黃芎藭芍藥故也同上

發柴胡連翹黃耆同

李杲曰十二經瘡疽中須用柴胡以散諸經血結氣
聚功與連翹同也同卷十三按卷十六引王好古

日連翹與柴胡同功但分氣血之

弘景曰前胡根似柴胡而柔軟為療殆欲同之同上

時珍曰前胡其功長于下氣故能治痰喘熱嗽痞膈
嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新
之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治
證雖同而所入所主則異同上

又獨活羌活同

時珍曰獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者
諸名乃一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮之義
入用微有不同後人以為二物者非矣同上

蘇頌曰大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西
者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方
既用獨活而又用羌活茲為謬矣同上

機曰本經獨活一名羌活本非二物後人見其形色
氣味不同故為異論然物多不齊二種之中自有不
同云云古方但用獨活無羌活今方俱用不知病宜
兩用耶抑未之考耶同上二此實非笑謂經脈其
時珍曰獨活羌活乃一類二種以中國者為獨活西
羌者為羌活蘇頌所說頗明類始有羌活王好古
又曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關節但氣有剛
劣不同尔同上王好古曰羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分
二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽
風濕相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃

却亂反心之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩
足濕痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證

同上
又落新婦升麻

陳藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同於升

麻亦大小有殊也同上

半夏貝母

同上

機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺
經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥何可以代
若虛勞欬嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰疽及
諸鬱之證半夏乃禁忌皆貝母為向導猶可代也至

於脾胃濕熱涎化為痰久則生大痰火上攻昏憤僵
仆寒澹諸證生死旦夕亦豈貝母可代乎同卷

龍膽石行

元素曰龍膽石行之功與防已同同上

杜衡細辛 鬼督郵及已徐長卿

時珍曰杜衡功雖不及細辛而亦能散風寒下氣消

痰行水破血也同上

又曰鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不同也

徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜衡之亂

細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也不可不

審同徐長卿集解

破故紙胡桃

時珍曰白飛霞海外奇方云破故紙屬火收斂神明

能使心包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓

充實漚以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥

故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破

故紙無胡桃猶水母之無鰓也卷十四

蘇頌曰鬱金姜黃迷藥

蘇頌曰鬱金姜黃迷藥三物相近蘇恭不能分別乃

為一物陳藏器以色味分別三物又言姜黃是三年

老姜所生近年汴都多種姜往往有姜黃生賣乃是

老姜市人買噉云治氣為最同上

又美姜黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相近但鬱金
入心治血而姜黃兼入脾兼治氣迷藥則入肝兼治
氣中之血為不同尔同上限三寸又言姜黃長三寸
三稜香附姜黃迷藥三物皆下指心限尺
時珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功可近於
香附而力峻故難久服同上西寒十散風寒下氣消
結蘭草蕙草如附木火味主之妙姑結二類
時珍曰蘭草蕙草乃一類二種耳同上血氣鬱結
蘭草澤蘭與合命門之火則氣逆而鬱
時珍曰蘭草澤蘭一類二種也同上高火水檢肝脾
又曰雷斅炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即

澤蘭也同上

又曰諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之
分故無定指同上草蒿香附各草者高與也味以厥

又曰數日凡使須別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃
能生血調氣与榮合小澤蘭迥別葉上斑根頭大能
破血通久積同上治人則肥血心姑結血與鬱蘭同
又曰蘭草澤蘭氣香而温味辛而散陰中之陽足太
陽陰厥陰經藥也脾喜芳香肝喜辛散脾氣舒則三
焦通利而心氣和肝鬱散則營衛流行而病邪解蘭
草走氣道故能利水道除痰癖殺蟲辟惡而為消渴
良藥澤蘭走血分故能治水腫塗癰毒破瘀血消癥

瘕而為婦人聖藥雖是一類而功用稍殊心如赤白
茯苓芍藥補瀉不同也雷斅言雌者調氣生血雄者
破血通積心合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑
據血生於氣故曰調氣生血也玉璣經原譜三
又馬蘭澤蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同
功同止馬原榮合小對蘭血原葉上斑狀大指
又青箱青蒿決明子莫實蘭葉皆圓射青
時珍曰青箱一名草蒿青蒿亦名草蒿其功相似而
名亦相同何哉其子明目與決明子同功故有草決
明之名卷十五論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即

又曰青箱子治眼與決明子莫實同功同上

大薊小薊

蘇恭曰大小薊葉雖相似功力有殊大薊生山谷根
療癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血同上

又曰大小薊皆能破血但大薊兼療癰腫而小薊專
主血不能消腫也同上

大明曰小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣
也同上

漏蘆飛廉

時珍曰按沈存中筆談云今方家所用漏蘆乃飛廉
也飛廉一名漏蘆苗似苦艾根如牛蒡綿頭者是也

采時用根今閩中所謂漏蘆蓋如油麻高六尺秋
深枯黑如漆采時用苗乃真漏蘆也餘見飛廉下

同上

又曰龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熟用
漏蘆葉云無則以山庖子代之亦取其寒能解熱

同上

又曰飛廉亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆
是飛廉沈存中筆談亦言飛廉根如牛蒡而綿頭古
方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛廉
無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈
或一類有數種而古今名稱各處不同乎 同上

二蘇頌云... 蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘇頌曰郭璞注尔雅... 蘇頌曰郭璞注尔雅...

蘭山曰時珍說不可
ニ秋ト兼トノ注相反
スレバナリ 又曰蘆葦
共ニ名多ク夕粉ハニ故
ニ初長成ノミヲニ配メ
クツベシ葭ハ初生ナリ
蘆ハ長ナリ葦ハ已
成ナリ而メ蘆ハ其
總名ナリ 葦ハ初
亂ハ長ナリ葦成ナ
リ而メ秋ハ其總名
ナリ 葦ハヒメヨシ蘆
ニ種形小ナルモノナリ

時珍曰蘆有數種其長丈許中空皮薄色白者葭也
蘆也葦也短少於葦而中空皮厚色青蒼者葦也亂
也秋也葦也其最短短而中實者蘆也蘆也皆以初
生已成得名其身皆如竹其葉皆長若若葉其根入
藥性味皆同其未解葉者古謂之紫葦葦同上
木賊麻黃 蘆葦 蘆葦 蘆葦 蘆葦 蘆葦 蘆葦 蘆葦
時珍曰木賊氣溫味微甘苦中空而輕陽中之陰升
也浮也與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火
鬱風鬱治眼目諸血疾也 同上
白菀女菀紫菀 蘇秦曰白菀即女菀也療體與紫菀相同無紫菀時

亦用之卷十六
黃葵子久葵子
時珍曰黃葵子古方少用今為催生及利小便要藥
或用或入湯散皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也
花子與稂性功相同可以互用無花用子無子用根
同上
草決明石決明馬蹄決明
時珍曰決明此馬蹄決明也以明目之功而名又有
草決明石決明皆同功者草決明即青箱子調桂辛
甜葶葶蘆薈新賞子 卷廿七 薺薺新賞當攷

時珍曰或云甜葶蘆薈是薺薺子攷其功用亦似不然

甜苦葶藶

宗奭曰葶藶有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也同上仲景瀉肺湯用苦餘方好古曰苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有用甜者或有不言甜苦者大抵苦則下泄甜則少緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而甜苦之味安得不異同上時珍曰甘苦二種正如牽牛黑白二色急緩不同又如葫蘆甘苦二味良毒亦異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者下泄之性急既泄肺而易傷

胃故以太棗輔之同上

車前子茯苓

好古曰車前子能利小便而不走氣與茯苓同功同上

諸藍

時珍曰諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱

惟木藍葉力似少劣同上

穀精菊花

時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中

諸病加而用之甚良明目退翳之功似在菊花之上

也同上

商陸大戟甘遂

此三藥性同而功同也同上

時珍曰商陸苦寒沈也降也陰也其性下行專於行
水與大戟甘遂葶異性而同功卷十七

狼毒防葵

時珍曰狼毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方
治蛇痕蠱瘕大方中多用防葵皆是狼毒也同上

漆頭蘭茹草蘭茹

蘇頌曰漆頭蘭茹草蘭茹古方兩用之指頭毒劍煎

澤漆大戟

時珍曰澤漆利水功類大戟同上澤漆甘遂
續隨大戟澤漆甘遂

時珍曰續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相

似其功皆長于利水惟在用之得法亦皆要藥也同上

蓖麻仁巴豆

時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣味頗近巴豆亦能利
人故下水氣同上

天南星半夏

好苦曰天南星補肝風虛治痰功同半夏同卷下

堯花桃花芫花

時珍曰芫花益亦芫花之類氣味主治大畧相近同上

覆盆蓬蘽桑椹

時珍曰覆盆蓬蘽桑椹功用大抵相近雖是二物其實一

類而二種也一早熟一晚熟兼用無妨其補益與桑
椹同功同卷十八桑椹性而功卷十七

又百部天門冬卷十八桑椹性而功卷十七

時珍曰百部亦天門冬之類故皆治肺病殺虫但百
部氣溫而不寒寒嗽宜之天門冬性寒而不熱熱嗽

宜之此為異耳同卷十八桑椹性而功卷十七

草薺拔藜土茯苓

時珍曰草薺拔藜土茯苓三物形雖不同而主治之

功不相遠豈亦一類數種乎卷十八桑椹性而功卷十七

又曰土茯苓昔人不知用此近時弘治正德間因楊

梅蒼盛行率用輕粉藥取効毒留筋骨潰爛終身至

人用此遂為要藥諸醫無從考證往往指為草薺及

拔藜然其根苗迥然不同宜參考之但其功用亦頗

相近蓋亦草薺拔藜之類也同上

漢防己木防己

葢器曰如陶所說漢木二防己即是根苗為名同上

又曰治風用木防己治水用漢防己同上

通草茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子木通

李杲曰通草凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草猪苓

琥珀瞿麥車前子之類皆可以參濕利小便泄其滯

氣也同上

又曰木通下行泄小腸火利小便與琥珀同功無他

藥可比同上許世小紙天除藥與藥與同

通脫木通燈草

李杲曰通脫木與木通同功同功

又曰與燈草同功同上

昆布海中諸菜海藻許世小紙天除藥與藥與同

時珍曰昆布生登萊者搓如繩索之狀出閩浙者大

葉似菜蓋海中諸菜性味相近至療一致雖稍有不

同亦無大異也卷十九

李杲曰鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除與海藻

同功同上

骨碎補蓋蘭

時珍曰骨碎補一名石菴蘭菴蘭主折傷破血此物

功同故有菴蘭之名卷二十

井中苔垣衣昔邪屋遊瓦苔澤葵石髮陟釐鳧

葵曰水

蘇頌曰苔之類有井中苔垣衣昔邪屋遊大抵主療

畧同陸龜蒙苔賦云高有瓦苔里有澤葵散巖空實

者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟

釐是矣澤葵鳧葵也雖異類而皆感瓦石之氣而生

故推類而云耳卷二十一

酒附子真草

好古曰酒能引諸經不止與附子同卷廿五

新實草莖薺 前十六卷可參看

時珍曰新實草莖薺皆是薺類 卷二十七

蘇恭曰尔雅云新實大薺也注云似薺俗呼為老薺

然其味甘而不辛也 同上

藏器曰本經新實一名大薺蘇氏引尔雅為注案大

薺即葶藶非新實也新實大而扁葶藶細而圓二物

殊別也 同上

蘇頌曰尔雅葶藶謂之葶音典子葉皆似薺一名狗

薺新實即大薺大抵二物皆薺類故人多不能細分

乃尔致疑也 同上

時珍曰薺與新實一物也但分大小二種耳小者為

薺大者為新實新實有毛故其子功用相同而陳士

良之本草亦謂薺實一名新實也葶藶與新實同類

但新實味甘花白葶藶味苦花黃為異耳或言新實

即甜葶藶亦通 同上

時珍曰葶藶實與青箱子同類異種故其治目之功亦

彷彿也 卷二十七

甘諸薯蕷類 卷二十七

時珍曰甘諸薯蕷補虛之益氣力健脾胃強腎陰功同薯

蕷同上

薯蕷同上

筍竹瀝 卷二十七

汪穎曰筍與竹瀝功近有人素患痰病食筍而愈也

詩同上

瓠懸瓠匏壺蒲蘆屬也其類甚多其色迥異於古以今

時珍曰瓠懸瓠匏壺蒲蘆各分名色迥異於古以今

參詳其形狀雖各不同而苗葉皮子性味則一也

瓠冬瓜實與青瓠同味異而苦其皮白之也
弘景曰瓠與冬瓜氣類同輩同上

長瓠懸瓠壺匏瓜蒲蘆子葉皆似薺一名狗

時珍曰長瓠懸瓠壺匏瓜蒲蘆名狀不一其實一

類各色也亦謂薺實一名蘇實也薺與蘇實同類

檳榔檳子椹棹木瓜子如菓子也用時同而刺去

時珍曰檳榔檳子椹棹三物與木瓜皆是一類各種

故其形狀功用不甚相遠但木瓜得木之正氣為可

貴耳卷三十

羊杔子山檀相生之

時珍曰羊杔子乃山檀同類醫家不用而有此效則

其功應相同矣同上

橘柑柚功同菓子同上

時珍曰橘皮性溫柑柚性冷不可不知今天下多以

廣中來者為勝江西者次之然亦多以柑皮雜之柑

皮猶可用柚皮則懸絕矣同上
又曰柑樹無異於橘但刺少耳柑皮比橘色黃而稍

厚理稍粗而味不苦橘可久留柑易腐敗柑樹畏冰
雪橘樹畧可此柑橘之異也柑橘皮今人多混用不
可不辨同上
又曰橘皮苦辛温柑皮辛寒甘外形雖似而氣味不
同同上

陳皮青皮 枳殼枳實

王好古曰陳皮治高青皮治低與枳殼治胸膈枳實

治心下同意同上

時珍曰陳皮浮而升入脾肺氣分青皮沈而降入肝
膽氣分一體二用物理自然也小兒消積多用青皮

相同上

破胡紙胡桃

韓愈曰破胡紙屬火能使心包與命門之火相通胡

桃屬水主潤血養血血屬陰惡燥故油以潤之佐

破胡紙有木火相生之妙故古有云黃蘗無知母破

胡紙無胡桃猶水母之無鰓也卷三十

時珍曰梅實仁功同椽子

時珍曰梅實仁功同椽子

椽實被子

時珍曰椽實被子治療相同當為一物無疑但本經

被子有毒似有不同亦因其能殺虫蠱尔汪頴以粗

椽為被子終是一類不甚相遠也同上

檳榔大腹檳榔蘇頌曰劉恂嶺表錄云直檳榔來自船上今交廣生者皆大腹子也彼中悉呼為檳榔或云檳榔難得真者今賈人所貨者皆是大腹檳榔也與栴榔相似但葉莖幹小異爾連皮收之卷三十一
時珍曰大腹子即檳榔中一種腹大形扁而味澀者不似檳榔尖長味良耳所謂豬檳榔者是矣蓋亦土產之異今人不甚分別陶氏分陰陽之說亦是臆見按劉恂嶺表錄云交廣生者云云見上文則大腹子與檳榔皆可通用但力比檳榔稍劣耳同上
又曰大腹子與檳榔同功同上

枳椇實蜂蜜

截器曰枳椇實止渴除煩去膈上熱潤五藏利大小便功用同蜂蜜枝葉煎膏亦同同上

吳茱萸食茱萸檳子

時珍曰吳茱萸食茱萸乃一類二種茱萸取吳地者入藥故名矣茱萸檳子則形狀似茱萸惟可食用故名食茱萸也卷三十二

蘇恭曰食茱萸功同吳茱萸力少劣尔同上

石蜜糖霜冰糖紫沙糖

時珍曰石蜜即白沙糖也凝結作餅塊如石者為石蜜輕白如霜者為糖霜堅白如冰者為冰糖皆一物

有精粗之異也卷三十蓮花白味甘香為水蘇留一
又曰石蜜糖霜冰館比之紫沙糖性稍平功用相同
入藥勝之然不冷利若久食則助熱損齒生虫之害
同也同上

藕蓮 藕密藕 蓮鬚蓮子 蓮房荷葉

紅白蓮花

時珍曰藕所主者皆心脾血分之疾與蓮之功稍不
同云同上

又曰藕莖功與藕同同上

又曰蓮鬚本草不收而三因諸方固真丸巨勝子丸
各補益方中往往用之其功太抵與蓮子同也同上

又曰蓮房入厥陰血分消瘀散血與荷葉同功亦急
則治標之意也同上

又曰紅白蓮花不知即蓮花否而功與蓮同同上

慈姑澤瀉

蘇恭曰慈姑生水中葉似鐔箭之族澤瀉之類也同上

茵桂牡桂桂心

葳器曰茵桂牡桂桂心三色同是一物卷卅四

時珍曰茵桂主治與桂心牡桂迥然不同昔人所服
食者此類耳同上

天竺桂桂心

均曰天竺桂功與桂心同方家少用同上

沈香青雞雞骨馬蹄煎香蜜香青桂棧香黃熟
香蘇恭曰沈香青雞雞骨馬蹄煎香同是一樹出天竺
諸國同上蘇恭曰沈香青雞雞骨馬蹄煎香同是一樹出天竺
藏器曰枝節不朽沈水者為沈香其肌理有黑脉浮
者為煎香雞骨馬蹄皆是煎香並無別功止可熏衣
去臭同上蘇頌曰沈懷遠南越志云交趾蜜香樹彼人取之先
蘇頌曰沈懷遠南越志云交趾蜜香樹彼人取之先
斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛木心與枝
節不壞堅黑沈水者即沈香也半浮半沈與水面平
者為雞骨香細枝緊實未爛者為青桂香其幹為棧

香其根為黃熟香其根節輕而大者為馬蹄香此六
物同出一樹有精粗之異尔時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿
時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿
楓香松脂乳香時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿
時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿
亦彷彿不遠時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿
亦彷彿不遠時珍曰蜜香亦沈香之類故形狀功用兩相彷彿

薰陸乳香

別錄薰陸乳香同功同上別錄薰陸乳香同功同上

乳香沒藥騏驎竭

時珍曰乳香活血沒藥散血皆能止痛消腫生肌故
二藥每相兼而用時珍曰乳香活血沒藥散血皆能止痛消腫生肌故

又曰乳香沒藥雖主血病而兼入氣分騏驎湯則專於血分者也同上

樟腦焰硝同 煆藥燻血皆謂之藥能觀主眼姑

時珍曰樟腦純陽與焰硝同性同上

椿樗栲

時珍曰椿樗栲乃一木三種也卷三十五上可重衣

又曰椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利入益

椿皮入血分而性瀉樗皮入氣分而性利不可不辨

其主治之功雖同而瀉利之效則異心如茯苓芍藥

赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受

病有鬱者宜用樗皮此心得之微也同上

槐實桃仁

王好古曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與桃仁同

同上

又曰乳香及藥雖主血病而兼入氣分其賦則專於血分者也 同上

檀腦脂硝

時珍曰檀腦純陽與脂硝同性 同上

椿檉栲

時珍曰椿檉栲乃一木三種也 卷三十五上

又曰椿皮色赤而香檉皮色白而臭多服微利人益椿皮入血分而性溫檉皮入氣分而性利不可不辨

其匪却之功雖同而審利之效則異心知茯苓芍藥
至性古曰野實與檉皮此心得之微也 同上

天雄如無以大附子代之 證治要訣類方卷三八生散

以苦胡黃芩檉栲末如無用山藥中威靈草下治渴死友

代用品

無猪膽以羊膽代之 傷寒論霍亂篇通條四逆

生薑八兩無者乾姜三兩 附後方卷二

卒無牛乳羊乳亦得 同卷三右風毒

無小豆大豆亦可用 同上腫從脚起稍上進者

若無朴消者芒消代之亦可用 同上卷四治食食

無人參肉桂各一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶

及心虛敬心懷安定精神 同上卷三淡竹茹湯

無當歸用芍藥 同上卷四治食食

圓方後

無澤瀉以白朮代之 同上甘草圓方後

天雄如無以大附子代之證治要訣類方卷三八生散

以苦胡蘆蘆穰作末如無用瓜蒂中藏經卷下治溺死方

代用之品

無猪膽以羊膽代之傷寒論霍亂篇通脈四逆

生姜八兩無者乾姜三兩肘後方卷二

卒無牛乳羊乳亦得同卷三治風毒

無小豆大豆亦可用同卷三治風毒

若無朴消者芒消代之亦可用同卷四治食魚

無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶

及心虛驚悸安定精神千金方卷三淡竹茹湯

無當歸用芍藥同上遠志湯方後

圓方後

無澤瀉以白朮代之同上甘草圓方後

代用之品

若無生薑用六兩方則以乾薑三兩代之同上內補當

後

無續斷大薊根代卷四白芷圓方後

不能飲酒人以水代之同上茱萸蟲蟲湯方後

無寒水石朴消代之同卷五上治少小中風

如無木香可用麝香一分同卷九萎蕤湯方後

無犀角以升麻代同卷十木香湯方後

血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代

黃之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

蜀榛無以恒山代之同上牡蠣湯方後

不耐木香者以犀角一兩代之同卷十三温中

天鈔收無以大代

秦皮如無用榭皮代之同卷十五下治下赤

今世之生金但用成器金亦善同卷十五上生金

無生薑酒漬干薑三兩一宿用之同卷十九建

無羊乳牛乳人乳亦得同卷十一治嶺南

若無鯉魚鮓魚亦可用同上澤漆湯方後

無黍米粟米粳米亦得同卷廿三治乳癰方後

古方紫丸治小兒用代赭云無真者以左顧牡蠣代

使乃知真者難得證類本草卷五引圖經

葛根生者四兩乾者二兩代傷寒總病論卷二

無堯花以桃花一鴨子大不炒代之同小青龍

湯方後

小麥奴乃小麥未熟時叢中黑麥捻之成黑勃者是也無即以同麥小麥炒黑焦地上出火毒用之亦得奴丸

方後

漏蘆葉無以山梔子代之同卷四小兒時行同卷六

樗雞十五枚無以羌青五枚代同卷五辟温

空青一兩無以石綠代同上

麋茸無即以鹿茸代本事方卷二麋茸圓

如年高者以川芎代黃芩活人書卷十七獨

蒿本直者無則以芎代之同調中湯方

生地黃壹兩半如無只用生乾地半兩同卷二十五物入參湯方

白菊花如無則甘菊花代之然不及白菊同卷二十通聖散

活人書八本事方
前八入

治疹痘瘡入眼及生翳

龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏蘆

葉云無則以山梔子代之亦取其寒能解熱蓋不知

其能入陽明之故也本草綱目卷十五時珍時珍說

或言無羌花以桃花代之取其利耳同卷十

丁皮心腹冷氣諸病方家用代丁香同卷卅四

隆香唐宋本草失收唐慎微始增入之而不著其功

用今拆傷金瘡家多用其節云可代沒藥血竭同

如無茅根以藕搗汁亦可傷寒六書卷三生

如無真阿膠以龜板膠代之柯琴炙甘草湯方論

往年欲集代用品以備他日試驗獵涉之次僅

得數十條，但東奔西走，不暇筆研。安政初，喜多村翁編越俎藥誌一卷，其書完備，因閣筆不復添續。今展閱舊稿，不忍棄去，漫載于茲云尔。

大凡代藥，值一時其品缺乏，或下俚之藥，之地，權

互用之，出於不得已之策耳。非取之以為定準也。且

某病互代用某藥而可耳，非他病執之以為定準

也。觀甘草無用芒消代，人參無內茯苓，並千金倉卒

其求人參不得，只白湯亦佳。聖類可以見今時淺人

或以干薑代生薑，以升麻代犀角者，甚謬矣。

白濁丸...

幼新書卷六龜背第廿八引聖惠張渙吉氏家傳。又龜背第十九引聖惠錢乙張
渙吉氏家傳。

黃三龜背龜背大黃圓百合丹龜背散龜背丸

小兒直訣肺熱脹滿攻於背，即成龜背。又乳母多

食五辛亦成。卷上

又兒生下，客風入脊，逐於骨髓，即成龜背。治之以龜

尿點節骨取尿之法，當蓮葉安龜在上，後用鏡照之，

自尿出，以物盛之，同上。

聖惠方：夫小兒龜背者，由坐而稍早，為客風吹著脊

骨，風氣達於髓，使背高如龜之狀也。卷八十九

又治小兒龜背，互服麻黃圓方，麻黃三分，去根節，桂

心，独活，防風，去芦頭，赤芍藥，川大黃，剉微炒，枳殼，麩

炒微黃，去瓤，松花，已上各半兩，右件藥，搗羅為末，鍊

必...
必...
必...

蜜和圓如菉豆大每服以粥飲下五圓日三服量兒
大小以意加減同上
又方栝榔半兩川大黃半兩剉微炒桂心前胡去芦
頭防風去芦頭赤芍藥獨活訶梨勒皮枳殼麩炒微
黃去瓢麻黃去根節已上各一分右件藥搗羅為末
鍊蜜和圓如麻子大每服以粥飲下五圓日三服量
兒大小以意加減同上
又小兒龜背者緣肺熱脹滿致使背高如龜又云多
食熱物亦能致此也同上
又治小兒龜背肺熱壅滯心膈滿悶大黃圓方川大
黃三分剉微炒天門冬去心焙百合杏仁湯浸去皮

夫双人麩炒微黃木通剉桑根白皮剉甜葶藶隔紙
炒令紫色川朴消已上各半兩右件藥搗羅為末鍊
蜜和圓如菉豆大不計時候以溫水研破五圓服量
兒大小加減服之同上
又方甜葶藶隔紙炒紫色杏仁湯浸去皮夫双人麩
炒微黃麻黃去根節川大黃剉微炒已上各半兩桂
心一分右件藥搗羅為末鍊蜜和圓如菉豆大不計
時候以溫水研下五圓量兒大小臨時加減同上
又治小兒龜背方右取龜尿隨多少摩手背骨上即差
得效方百合丹胸高脹滿其狀如龜此肺經受熱所
同同上

致也。乳母酒麪無度，或夏月熱煩，熱乳與兒得之，或乳多食五辛，而亦成此疾。川大黃三分，焙。天門冬去心，○原缺心字，今據諸書補之。焙。杏仁去皮炒。百合、木通、桑白皮炒。甜葶藶紙上炒。爛石膏各半兩，右為末。煉蜜圓葉豆大，每服五圓，食後臨卧，熱水化下。卷十二

又松葉丹，治嬰兒生下不能護背，客風吹脊，入於骨髓，致之。或坐大早，亦致偃僂背高如龜，多成痼疾。松花、枳殼、防風、獨活各一兩，麻黃、川大黃、前胡、桂心各半兩，右為末。蜜圓黍米大，每服十粒，粥飲下，量兒加減。同上

又灸法：肺腧穴、第三椎骨下兩傍各一寸半，膈腧穴

得效方前出
スヘシ

第七椎骨下兩傍各一寸半，以小兒手中指中節為一寸。艾炷如小麥大，但三五壯而止。同上

仁齋直指小兒附遺方論：曾高脹滿，其狀如龜，此肺經受熱所致也。乳母酒麪無度，或夏月熱煩，熱乳與兒得之，或乳母多食五辛，亦成此候。川大黃、參分、焙。天門冬去心、焙。杏仁去皮微炒。百合、木通、桑白皮炒。甘草、麻紙上炒。爛石膏各半兩，右末。煉蜜圓綠豆大，每伍圓，食後臨卧，熱水化下。附遺卷四

又嬰兒生下不能護背，客風吹脊，入於骨髓，致之。或小兒坐早，亦致偃僂背高如龜背矣。然此多成痼疾，間有灼艾收功。肺腧穴、第三椎骨下兩傍各壹寸半。

膈俞穴第三椎骨下兩傍各壹寸半，以小兒中指中節為壹寸，艾柱如小麥大，但參伍壯而止。同上

保童秘要：夫小兒龜背者，為生時被客風吹拍著背，風達於骨髓，使兒背高如龜伏，宜服此方。麻黃去節，枳殼炙，芍藥各一分，桂心獨活，防風，大黃各二分，右為末，蜜和為丸，如梧子大，每服十丸，米飲下。醫方類聚二百

四十三引 本書未校

又龜背方：葶藶熬，大黃各二分，桂心壹分，麻黃二分，去節，右為末，一如前治。同上

永類鈔方：兒生不能護背，客風入脊，或早坐，偻背高，放龜於荷葉上，候龜頭四顧，急以鏡照之，其尿自

出，以此調紅脊，消點其背上骨節，積久自安。有灸肺俞穴，第三椎骨下兩傍各乙寸半，膈俞穴，第二椎骨下兩傍各乙寸半，以小兒中指中節為乙寸，艾炷小麥大，三五壯止。類聚卷二百四十三引 本書未校

又龜背乃肺受熱，氣脹滿而成，或乳母食五辛飲熱，傷肺而成。同上

又龜背散：大黃三分炒，天門冬去心焙，百合，杏仁去皮尖炒，木通，桑白皮，蜜炙，甜葶藶，隔紙炒，朴消，制枳殼等分，右為末，蜜元食後溫湯化下。同上

醫學入門：龜胸肺熱，百合丹，妊孕及乳子時多食五辛炙烤淹截，生下嬰孩，或胸前高起，形如龜狀，此肺

經受熱也。行動喘急。但遇風寒。或多食則痰嗽氣急。喘滿肢體瘦悴。久而不治。將成疝勞之疾。百合丹主之。大黃三分。天門冬。杏仁。百合。木通。桑白皮。甜葶藶。石羔各五錢。為末。煉蜜丸。如菘豆大。每服一十五丸。食後臨卧。熟水化下。卷五。又龜背客風。松葉驗。嬰兒生下。不能護背。客風吹脊。入於骨髓所致。或小兒坐早。偃僕背高。如龜多成疝。疾間有灸肺俞。膈俞。炷粟米。大艾三五壯。收功。內服松葉丹。松花。枳殼。防風。獨活。各一兩。麻黃。前胡。大黃。桂心。各五錢。為末。煉蜜丸。如黍米大。每服十九丸。或二十九丸。粥飲下。量兒大小。加減用之。或外以烏龜尿點。

脊骨縫中效。同上。二。醫。或。背。客。風。或。疝。勞。或。單。

回春八八八前

萬病回春龜背者。肺熱脹滿也。龜背丸。治小兒龜背。高如覆堂。川大黃煨六分。天門冬。去心。百合。杏仁。去皮。麩炒。木通。去節。枳殼。麩炒。桑白皮。蜜炙。甜葶藶。隔紙炒。軟石膏。各一錢。右為細末。煉蜜為丸。如菘豆大。每服五丸。溫水化下。食後臨卧服。仍宜灸兩乳前。各一寸半。兩行三骨間六處。各灸三壯。春夏從下灸。起。秋冬從上灸。起。依法灸之。卷五。又龜背者。風邪入脊也。龜背丸。治小兒龜背。枳殼。麩炒。防風。去蘆。獨活。大黃煨。前胡。去蘆。當歸。麻黃。去節。各三錢。右為細末。麩糊丸。黍米大。每服十五六丸。看。

兒大小以米飲下食後服仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸艾炷以小麥大但灸三壯而已同上每服一十五丸業廣按觀諸家所說率龜背用松蓋丹龜背用百合丹以分其所因愚謂此有脊背前後之異耳並係肺經火熱之所致分其所因者恐鑿李氏鈐方以百合丹名龜背散者可以徵一方治二證矣近世醫人或有為胎毒以用紫圓滾痰丸類者或有為先天腎氣不足以用地黃丸類者然其所處皆出臆測縱令雖有一二得効者未可執以為定準

愚今以百合丹為此二證主方或有增損方中石膏大黃用之或有用小陷胷湯麥門冬湯加百合丹中二三味要在臨時審其虛實以權宜消息若夫龜尿灸法未試他日當試驗
頃日讀和田東郭百疾一貫亦論龜背龜胸一然治法與余所觀稍不同當參看

此之病十餘一生急救之同上
此治大便水瀉方草薤一升云云勿食鹽常食小豆

兒太小以米飲下食後腹仍脹與肺俞穴在背下兩傍
 各一寸半心俞穴在背椎下各一寸半膈俞穴在背
 椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為度
 又注以小麥大但灸三壯而已同上

然試者... 夫龜氣灸去未... 丹中二三和要... 膏大費用... 愚令以百合...

水腫食赤小豆 治腫 肘後方脛已滿捏之沒指者酒若水煮大豆飲其汁

又食小豆亦佳 卷三治風毒脚弱 又治卒腫滿身面皆洪大方大豆一斗熟煮瀝飲汁

及食豆不過數度必愈小豆尤佳 同上治卒 又腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方小豆一

斛煮令極爛得四五斗汁温以積膝已下日二為之 數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫雜

喫飯及魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如 此之病十死一生急救之同上水三升煮取薄湯

又治大腹水病方葶藶一升云云勿食鹽常食小豆 水腫食赤小豆

飲飲小豆汁同卷四藝一代云云必身常食小豆
又方白茅根一大把小豆三升水三升煮取乾去茅
根食豆同上又專煨小豆十粒無小豆大豆亦可用吹
千金方治脚腫向上至腹者即殺人治之方赤小豆
一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一
度差止若已入腹不須浸但者豆食之忌鹽菜米麪
等湯飲汁差乃止腫後方方文畧同
又按千金瘡瘍用赤小豆者許多或傳或服是雖不
又關脚氣水腫而利濕熱之理則一今舉其一二如
相癰疽門排膿內塞散頭雀散內消散治諸腫紫葛
帖方麻子小豆湯發背門內補散丹毒門治小兒

丹毒方治小兒天火丹方治小兒朱田火丹病方
治小兒天竈火丹病方治小兒茱萸丹病方等是
也其他諸病亦多用之者不復具載

黑豆湯類方
湯類
道子未各半湯非陶節卷所創
竹茹溫膽湯非龍共雲林所創
雷石區半百及湯千金半夏今里流水湯
心湯半夏補心湯補心湯類

飲飲小豆汁... 又方白茅根一大把小豆三升水三升煮取乾... 根食豆... 千金方治脚腫向上至腹者即殺人治之方赤小豆... 斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日... 度差止若已入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米... 按千金方... 聖惠方... 丹毒... 丹毒... 丹毒...

段酉學管錐卷十目錄

傷寒為外感之總名

千金方中最當熟讀之門目

黑豆湯類方附桑白歸脾湯

增損理中丸原出肘後方附聖惠人參丸

聖惠方茵陳散拔粹方段酉學綱目犀角

湯類

道守赤各半湯非陶節庵所創

竹茹溫膽湯非龍共雲林所創

靈樞半夏湯千金半夏千里流水湯

竹葉湯心湯半夏補心湯類

竹葉湯解五蒸湯類 導赤散類

續命湯類用酒 香薷飲類方

大豆紫湯類諸方 風引湯類諸方

古方不可思議非謂諸方藥不可各藥論其功

傷寒論辨平二脉法諸可不可諸篇辨

平脉辨證 脈平 頌一字醫家當服膺

病證字面 原出用處 凡

黑豆湯 凡

十八金中 凡

傷寒論 凡

傷寒論卷十目錄

傷寒為外感之總名

成聊攝曰凡中風與傷寒為病自古通謂之傷寒

論傷寒例凡傷寒之病
從風寒得之注

徐靈胎曰按王叔和編次仲景傷寒論略例云中而

即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至春變

為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也又第

四篇先序痊濕暘三證痊則傷寒之變證暘則熱病

濕即此篇所謂濕溫也又傷寒論太陽上篇亦首舉

中風傷寒溫病證脈各異之法素熱病論云今夫熱

病者皆傷寒之類也又云凡病傷寒而成溫者生復

至日為病溫後夏至日為病暑則此五者之病古人

傷寒為外感之總名

皆謂之傷寒，與難經淵源一轍。後世俗學不明其故，遂至聚訟紛紜，終無一是。是可概也。其詳須細讀，病論及傷寒論自知之。難經經釋註十八云：今夫寒又曰：按傷寒為外感之總名，傳變出入千頭萬緒，仲景傷寒論一字不可遺漏。今止舉六經本病及六經主方數首，以存大畧，不可以此而廢全書也。能將傷寒全書熟讀而精通之，則凡為外感之病，遊又有餘矣。故此集外感之方，選錄甚少，意有在也。蘭臺取劉君傷寒論輯義綜彙，詳辨傷寒為外感之總稱，引證較著，無復餘蘊。但遺徐氏說，因揭于斯，以為狗續。吳為代恩心醫名

卷第十 全方中最當熟讀之門目

卷第十 全二書，蓋孫氏纂集隋唐以前書，以為一部者，

卷第十 論未必皆出親驗，故全書中或有玉石混殺，蕭

卷第十 艾並收者，殊不知微言大義，往往存於其中。世或

卷第十 謂真人素屬於道家者流，故其言雜糅難施于今

卷第十 此所謂知其一而不知其二者之所說，通觀全書

卷第十 以玩味精義之所存，則王氏外臺輩矣。所企及况

卷第十 聖惠聖濟等乎。夫全部數千首方法，豈謂一親

卷第十 驗而後載之，是固不俟辯。特在用者取捨奈何耳。

卷第十 愚今擇各門中最當熟讀者，揭其目於茲。學者當

卷第十 體認玩索，而始知其妙處焉而已矣。

非專意於醫事者

非虛音也

卷第一大醫習業及諸篇
 卷第二婦人門中疑當補藥者其目疑疑當
 卷第三同上疑疑不難辨其目疑疑當
 卷第四同上疑疑全補疑疑其目疑疑當
 卷第五上少小嬰孺疑疑其目疑疑當
 卷第五下同上疑疑不疑其目疑疑當
 卷第七風毒脚氣疑疑其目疑疑當
 卷第八諸風疑疑其目疑疑當
 卷第十五上脾藏疑疑其目疑疑當
 卷第十五下同上疑疑其目疑疑當
 卷第二霍亂第六疑疑之門目

卷第二十一水腫第四

卷第二十二瘰疽第六

卷第二十六食治序論第三

卷第二十七養性序第一 道林養性第二

去酒二合內藥中隨多少服之或不刺服
 刺多減服之
 文齊通身腫小便澀者用麻豆方主之療脚腫氣烏
 豆一斗水四斗煮取一斗半去豆桑根白皮切五升
 大麻子二升研碎右三味以豆汁內藥煎取升
 一服一分日三服三日令盡

卷第一 大醫習業及諸篇

卷第二 婦人

卷第三 同上

卷第四 同上

卷第五 上少小嬰孺

卷第六 同上

卷第七 風毒脚氣

卷第八 二十 養神氣第一 養神氣第二 養神氣第三 養神氣第四 養神氣第五 養神氣第六 養神氣第七 養神氣第八 養神氣第九 養神氣第十 養神氣第十一 養神氣第十二 養神氣第十三 養神氣第十四 養神氣第十五 養神氣第十六 養神氣第十七 養神氣第十八 養神氣第十九 養神氣第二十

卷第九 二十 養神氣第一 養神氣第二 養神氣第三 養神氣第四 養神氣第五 養神氣第六 養神氣第七 養神氣第八 養神氣第九 養神氣第十 養神氣第十一 養神氣第十二 養神氣第十三 養神氣第十四 養神氣第十五 養神氣第十六 養神氣第十七 養神氣第十八 養神氣第十九 養神氣第二十

卷第十 二十 養神氣第一 養神氣第二 養神氣第三 養神氣第四 養神氣第五 養神氣第六 養神氣第七 養神氣第八 養神氣第九 養神氣第十 養神氣第十一 養神氣第十二 養神氣第十三 養神氣第十四 養神氣第十五 養神氣第十六 養神氣第十七 養神氣第十八 養神氣第十九 養神氣第二十

卷第十一 二十 養神氣第一 養神氣第二 養神氣第三 養神氣第四 養神氣第五 養神氣第六 養神氣第七 養神氣第八 養神氣第九 養神氣第十 養神氣第十一 養神氣第十二 養神氣第十三 養神氣第十四 養神氣第十五 養神氣第十六 養神氣第十七 養神氣第十八 養神氣第十九 養神氣第二十

及再黑豆湯類方 原無方名今據和用東郭所名

崔氏療脚氣遍身腫方 大豆三大升以水一斗煮取

五升去豆桑根白皮一握切檳榔二七枚碎茯苓三

兩切右四味將三物以前豆汁浸經宿者取二升絞

去滓添酒二合內藥中隨多少服之或不利即刺服

利多減量服之 外臺卷十九方○原无方名

文療遍身腫小便澀者用麻豆方主之療脚腫氣烏

豆一斗水四斗煮取一斗半去豆桑根白皮切五升

大麻子二升熬研碎右三味以豆汁內藥煎取六升

一服二升日二服三日合盡 調時切十好四為末大

黑豆湯類方 附桑白皮湯

文仲療脚氣滿小便少者方檳榔四十枚切為末大豆三升桑根白皮切一升右三味以水二斗煮取六升分六服間粥亦得若冷脹加吳茱萸二升生薑一兩用亦良同上野靈昔用麻豆大至之藥脚動麻息
 又脚氣滿方大豆一升以水四升煮之令熟去滓取桑根白皮切一大升和豆汁重煎之厚薄如酪布絞去滓空腹自再同上野靈昔用麻豆大至之藥脚動麻息
 蘇恭腫滿小便少者湯方檳榔三十枚合子碎大豆三升桑根白皮二升生薑一斤合皮切右四味切以水二斗煮取五升半去滓分為六七服各相去十里久再服小便當利腫即消瘦弱不能忍者時復以少

粥止之同上少

樣要方療脚氣遍身腫方大豆三大升以水二斗煮取五升汁去滓桑根白皮一握切檳榔三七顆擘伏苓二兩右以前豆汁浸經一宿煮取二升去滓添酒二合內藥中隨多少服之利多量減服醫心方卷八

附桑白皮湯方原無方名和田東郭名桑白皮湯

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絕方桑根白皮切三升生薑切半升吳茱萸半升右三味切以酒五升煮三沸去滓盡令服之入則口愈千金秘方外臺卷十卒上氣方

二十九

傷脾... 傷脾... 傷脾...

文仲藥御氣滿便少者方檳榔四十枚切為末大
 豆研碎去根白皮切一升右三味以水二斗煮取六
 斗去其渣盡令服入腹只愈千金味甘平山補
 長生薑四分半長吳茱萸半升古三和以酢五升煮
 醋意實為藥辛土庫歇息更治強大藥味甘白文仲
 藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥
 二合在藥中配多少服之休多量減服謂以少
 各二兩古以兩豆者長藥一兩煮取二升去其氣
 藥三升去其氣藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥
 藥要之藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥
 服五升同七升利腫即消瘦弱不能忍著時復以少

而宜歸脾湯用藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥味甘白文仲藥

嚴氏濟生方歸脾湯治思慮過制勞傷心脾健忘怔
 忡白朮茯神去木黃芪去芦龍眼肉酸棗仁炒去殼
 各一兩人參木香不見火甘草炙二錢半右咬咀每
 服四錢水一盞半生薑五片棗子一枚煎至七分去
 滓溫服不拘時候卷三〇按此書健忘門唯收此一
 方知嚴氏為健忘一證設本方也
後人數演其意以薛氏內科摘要歸脾湯治思慮傷脾不能攝血致血
運用之諸病也妄行或健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜臥少食
 大便不調或肢體重痛月經不調赤白帶下或思慮
 傷脾而患瘡痢人參白朮白茯苓黃芪龍眼肉酸棗

歸脾湯

仁各二錢遠志一錢木香甘草炙各五錢當歸一錢
右薑棗水煎服卷上賦曰寐不寧赤白帶下恐思慮
嚴用和曰論曰夫健忘者常常喜忘是也蓋脾主意
與思心亦主思思慮過度意舍不清神宮不職使心
健忘治之之法當理心脾使神意寧靜思則得之矣
辛齋雜方卷三賦曰寐不寧赤白帶下恐思慮
汗認庵曰心藏神而生血心傷則不能生血而血少
故怔忡健忘驚悸盜汗汗者心之液也脾主思而藏
血脾傷則血不歸脾故不眠脾主肌肉故肌熱脾氣
四肢故體倦脾不健運故食少脾不能統血則妄行
而有吐衄腸風崩漏等症醫方集解卷中歸脾湯注

又曰治實火之血順氣為先氣行則血自歸經治虛
火之血養正為先氣壯則自能攝血醫賈曰心主血
脾統血肝藏血凡治血症須按三經用藥遠志棗仁
補肝以生心火茯神補心以生脾土參耆甘草補脾
以固肺氣木香香先入脾總欲使血歸脾耳同上
徐靈胎曰補脾有二法一補心以生脾血一補腎以
壯脾氣此方乃心脾同治之法補後天以生血即所
以調經蘭臺軌範卷一

金匱要略問曰上工治未病何也師曰夫治未病
者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受
邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾

惟治肝也。夫肝之病，補用酸，助用焦苦，益用甘味之藥，調之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能傷腎，腎氣微弱，則水不行，水不行，則心火氣盛，心火氣盛，則傷肺，肺被傷，則金氣不行，金氣不行，則肝氣盛，故實脾則肝自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法，實則不在用之。藏府經絡先後篇

千金方論曰：心勞病者，補脾氣以益之。脾王則感於心矣。卷十三 心勞第三

按心肝之病屬虛者，補脾而有效者，比比有之。古人歸脾湯訣不一而足，茲不具錄，唯舉一二以示之，更觀金匱千金所說，則其義自明矣。

增損理中丸原出肘後。附聖惠方人參丸。

肘後方治胃脇痞滿，心寒氣急，喘急方人參、木各一兩，枳實二兩，乾薑一兩，搗蜜和丸，一服一枚。若嗽加括蕒二兩，吐加牡蠣二兩，日夜服五六丸，不愈更服。

卷二 治傷寒時氣溫病 始

崔氏其年時行四五月，大下後或不下，皆患心中結。

滿兩脇痞塞，胃中氣急，厥逆欲絕，心起高，胃手不得。

近不過二三日，輒便死死，諸醫用瀉心湯，余用大小。

陷胃湯，並不得療，重思此或是下後虛逆，而氣已不。

理，而毒復上攻，毒氣相搏，結於胃中，縱不下者，毒已。

入胃，胃中不通，毒還衝上，復搏於氣，氣毒相激，故致。

增損理中丸原出肘後方。

此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸
方人參二兩白朮二兩甘草二兩炙乾薑六分炮加
枳椇根二兩枳實四兩茯苓二兩牡蠣二兩熬右八
味末之以蜜和為丸服如彈子一枚熟水下不歇復
服余時用此効的神速下喉即折續復與之不過服
五六丸胃中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當
加枳椇不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以
告領軍韓康伯右衛毛仲祖光祿王道豫靈臺郎顧
苗著作即商仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時
枳實乃為之貴難者白傷寒熱病中溫藥今不解
之以冷而救之以溫其可論乎余應之曰夫今診時

行始於項彊勅色次於失眠發熱中於煩躁思水終
於生瘡下痢大齊於此耳外臺卷三九

附聖惠人參圓方

聖惠方治傷寒結育心膈躁悶宜服人參圓方人參
一兩去芦頭白朮一兩甘草一兩炙微赤剉犀角屑
半兩菰藪根一兩赤茯苓一兩牡蠣一兩燒為粉右
件藥搗羅為末鍊蜜和圓如梧桐子大不計時候以
粥飲下三十圓卷十三

此病廢之皆見先理其氣次下諸疾思與增損理中丸
 方八參二兩白朮二兩甘草二兩炙乾薑六分炮加
 枳椇根二兩枳實四兩茯苓二兩牡蠣二兩煅石八
 陳渣三三末置為丸每服一錢熱水下不飲便
 料藥對無效者於麥味圓餅餅為大不持神效
 半兩為護神言兩赤芍藥二兩球藥一兩熱為餅
 一兩赤芍藥白朮一兩甘草二兩炙乾薑六分
 聖惠方治傷寒後餘熱在心恍惚多驚不得眠睡宜
 前聖聖惠方入參圓朮二兩炙乾薑六分
 後聖聖惠方入參圓朮二兩炙乾薑六分
 前聖聖惠方入參圓朮二兩炙乾薑六分
 後聖聖惠方入參圓朮二兩炙乾薑六分

聖濟總錄可及

聖惠方治傷寒後餘熱在心恍惚多驚不得眠睡宜

服茵陳散方茵陳三分犀角屑半兩麥門冬一兩去
 心桅子入三分茯神一兩赤芍藥三分生乾地黃三
 分甘草一分炙微赤剉右件藥搗篩為散每服四錢
 以水一中盞入生薑半分青竹葉二七片煎至六分
 去滓不計時候溫服卷十二 治傷寒餘熱不
 退諸方 聖惠方
 又治傷寒後伏熱在心中恍惚多驚不得眠睡宜服
 茵陳散方茵陳半兩犀角屑半兩柴胡一兩去苗茯
 苓一兩赤芍藥半兩麥門冬半兩去心黃芩半兩桅
 子入半兩甘草半兩炙微赤剉右件藥搗篩為散每
 茵陳散犀角湯類

茵陳湯 茵陳半兩 犀角屑一分 茯神半兩 枳實半兩 黃芩一分 黃連一分 黃白中 薑入生薑半斤 竹葉二七片 生地黃二分 煎至六分 去滓 不計時候 溫服 卷十二 治傷寒後 伏熱在 心 煩躁 恍惚 或多驚恐 及不得眠 臥宜服 茵陳散方 茵陳半兩 犀角屑一分 茯神半兩 枳實半兩 赤芍藥半兩 麥門冬半兩 去心 黃芩半兩 生乾地黃一兩 右件藥 搗 麤羅 為散 每服五錢 以水一大盞 入生薑半分 煎至五分 去滓 不計時候 溫服 醫方類聚 卷四十七 引 按今本 隱 一兩 去 拔粹方 犀角湯 治傷寒後 伏熱在 心 怔忡 驚悸 不得眠 犀角屑半兩 茵陳蒿七錢半 茯苓二兩 芍藥 麥

門冬 去心 各一兩半 山梔子 仁半兩 生乾地黃 焙二兩 右為麤末 每服五錢 水壹盞半 生薑二片 竹葉三七片 同煎 食後服 醫方類聚 卷六十 引 五十一 醫學綱目 犀角湯 治傷寒後 伏熱在 心 怔忡 驚悸 不得眠 犀角屑半兩 茵陳蒿七錢半 茯苓二兩 芍藥 生地 焙二兩 麥門冬 去心 兩半 山梔子 半兩 右 咀 每服五錢 水一盞半 薑二片 竹葉三七片 同煎 食後服

卷三十二 十一

服四錢以水一中盞入生薑半斤竹葉二十七片也
黃一分煎至六分去滓不計時候溫服服時不可食
諸方○煎藥卷四十八
又和湯十之九飲熱在心煩驚恍惚或多夢驚恐及不得
眠至夜半一盞半薑二升甘草三升同煎食後服
坐此藥二兩來門冬赤芝二兩半山慈半兩杏仁四錢
鮮卑補腦骨節生兩箇東高士發半升各等兩半
通靈藥目擊可為奇效其藥於燒亦以耳公醫藥
才取同藥會效極本書未收
兩存心醫藥不無邪正藥水意如半生薑三升竹葉三
門冬三升山慈半兩半兩生薑三升此藥

如問導赤各半湯非陶節庵有所本 附加生地黃方
至機微義此事難知曰傷寒傳至五六日間漸變神
昏不語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水
稀粥與之則嘔終日不與則不思六脉細數而不洪
大心下不痞腹中不滿大小便如常或傳至十日已
來形貌如醉人虛見神昏不已多用承氣湯下之則
誤矣蓋不知此熱傳手少陰心經也然而又未知自
何經而來答曰本太陽經傷風風為陽邪陽邪傷衛
陰血自燥熱畜膀胱至病逆傳於丙丙可兄妹由是
傳心心火自上迫而熏肺所以神昏也謂肺為清虛
之臟內有大邪致令神昏宜施子黃芩黃連湯若脉
道手赤各半湯非陶節庵所創

○引此事難知

在丙者導赤散脉在丁者瀉心湯若誤用涼膈散乃氣中之血藥也如左手寸脉沈滑有力者則可用之或用犀角地黄湯近於是也本方所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此解陽明經血中熱藥若脉浮沈俱有力者是丙丁中俱有熱也可以導赤瀉心各半服之則宜矣○按以上又見按粹方文畧此證同見醫方類聚卷六十一膀胱傳丙足傳手經也下傳止也丙傳丁也表傳裏也全傳丁者良傳離也越經傳也又謂腑傳臟也治人云傷寒只傳足經不傳手經此言不盡意也有從足經而傳手經者何以知之經云傷寒或止傳二經或間傳一二經不可一途而取之但馮其脉與外證

治之此活法也與食則噦者邪不在胃也不與則不思者以其神昏故執邪既不在胃誤與承氣湯下之其死也必矣卷十四方○按心脉本此

按陶節庵傷寒瑣言亦引玉機微義云可導赤

赤瀉心各半服之矣

附加生地黃

吉壽世保元瀉心導赤飲方後云臨服入生地黃汁二匙卷二萬病回春瀉心導赤散方後同

茹、桔梗、枳實、麩炒各一錢、黃連、錢半、人參、五分、陳皮、
半夏、茯苓各一錢、香附、八分、甘草、三分、右剉一劑、生
薑三片、棗一枚、水煎服。卷二 十三

壽世保元卷二、有麥門冬五分、餘寺回春同。

附一、九半、八參、柴胡、麥門冬、蘇野各六兩、參、桂、芍、
珠、十、兩、三、錢、白、芍、苓、各、六、兩、三、錢、甘、草、四、兩、一、錢、香、
以、通、飲、悶、坐、相、不、安、思、實、半、夏、什、散、各、八、兩、四、錢、蘇、
主、能、營、衣、臥、床、針、之、疔、野、自、天、四、姐、毛、甄、熅、會、無、和、
新、異、與、有、意、者、廷、以、營、甄、蘇、野、桂、主、其、其、與、野、蘇、
時、多、或、以、和、品、甄、野、各、以、甄、甄、去、論、其、息、端、其、寐、不、
什、後、甄、甄、其、非、實、雲、林、竹、陰、

靈樞半夏湯千金半夏千里流水湯

靈樞厥氣客於五藏六府則衛氣獨衛其外行於陽
不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹇陷不
得入於陰陰虛故目不瞑補其不足寫其有餘調其
虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已
通其臥立至其湯方以流水千里以外者八升揚之
萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升
治半夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小
杯日三稍益以知為度故其病新發者覆杯則臥汗
出則已矣久者三飲而已也。節畧邪客篇文
千金方治膽腑實熱精神不守瀉熱半夏千里流水
湯

湯方半夏宿薑各三兩生地黄五兩酸棗人五合黃
芩二兩遠志茯苓各二兩秫米一升右八味以咀以
長流水五斗煮秫米令蟹目沸揚之三千徧澄清取
九升煮藥取三升半分三服卷十二膽實熱六一小
黃白頭其青三十其之六以當補秫米一升
其其至其湯方以流半千里以代昔八代湯之
靈實八直其直而去其邪道以半夏湯一濟金剛曰
野人其金靈道始目不興其下只寫其首繪隨其
不野人其金靈道始目不興其下只寫其首繪隨其
靈靈通屏容公王薈六在阻留屏醫其衣其其
靈靈通屏容公王薈六在阻留屏醫其衣其其
靈靈通屏容公王薈六在阻留屏醫其衣其其

茯苓補心湯半夏補心湯補心湯類

千金方治心氣不足善悲愁患怒衄血面黃煩悶五
心熱或獨語不覺喉咽痛舌本強冷涎出善忘恐走
不定婦人崩中面色赤茯苓補心湯方茯苓四兩桂
心二兩大棗二十枚紫石英一兩甘草二兩人參一
兩赤小豆一十四枚麥門冬三兩右八味以咀以水
七升煮取二升半分三服卷十三心虛實第二
又治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤半夏補
心湯方半夏六兩宿薑五兩茯苓桂心枳實橘皮各
三兩白朮四兩防風遠志各二兩右九味以咀以水
五斗煮取三升分三服補心湯類
按此方與前後
伏苓補心湯半夏補心湯補心湯類
類不向書存備改

又補心湯主心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶
短氣喜怒悲真又悉不自知常苦咽喉痛口唇黑嘔吐
血舌本強不通水漿方紫石英茯苓人參遠志當歸
茯神深師作桂甘草紫苑各二兩麥門冬一升赤小豆三
合大棗三十枚右十二味以水一斗二升煮取
三升分三服補心湯去桂心加茯苓神遠志此方茯苓
者兩大棗二十枚紫石英一兩甘草二兩人參一
補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺
咽喉痛時吐血舌本強水漿不通方紫石英研茯苓
人參桂心各二兩麥門冬三兩紫苑甘草各一兩赤
小豆二十四枚大棗七枚右九味以水八升煮

取二升半分三服春夏服之佳同上按此方扶

深師補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶

善惡獨苦多夢不自覺者咽喉痛時時吐血舌本強

水漿不通手掌熱心驚悸吐下血方麥門冬三兩去

心紫石五分紫苑二兩桂心一尺一方二兩茯苓四

兩一方一兩小豆二十四枚一方六合人參半兩大

棗二十五枚辟子甘草五寸炙一方一兩右九味切以

水八升煮取二升四合羸人分作三服強人再服心

王之時有血證可服耳外臺卷十五按此

三按千金更有補心定心鎮心等數方然方意不同

故不附載

又附三因方茯苓補心湯方

三因方茯苓補心湯治心虛寒病苦悸恐不樂心腹
痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五
心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走
及治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食
白茯苓八分參前胡半夏湯洗七次去滑川芎各三分
橘皮枳殼麩炒去穢紫蘇桔梗甘草炙乾薑各半兩
○易簡方用當歸一兩三分白芍藥二兩熟地黃一
乾葛似是用當歸一兩三分白芍藥二兩熟地黃一
兩半右剉散每服四大錢水盪半薑薑五片東朮一枚煎
七分去滓食前服卷八其藥苦黃下出心風散問
易簡方參蘇飲方後一方用此藥三兩加局方四物

湯一兩半用熟地黃當歸白芍藥川芎各等分合和名茯苓補心湯大

治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并治吐血衄血
便血并婦人下血過多致虛熱並得其宜

服甲賀通元曰先輩以此方為出於陳氏補遺血枯失

方然良方原書未見此方能宗良方補遺血枯失

類血門載此方龍雲雲林書方下主治乃能氏補遺治

症也醫方紀原卷中

右十四味以竹筒飲一斗五升煮取五升分五服

若非天行而虛羸久病胃上痰熱亦可服之加黃耆

二兩除黃芩減知母一兩除桔槎用之大効

深師竹葉湯天行後虛熱羸勞不復知補遺血枯

又附三因方茯苓補心湯方

三因方茯苓補心湯治心虛寒病苦悸恐不樂心腹
痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五
心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走
及治婦人懷妊惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食
白茯苓八分前胡半夏湯洗七次去滑川芎各三分
橘皮枳殼麩炒去穢紫蘇桔梗甘草炙乾薑各半兩
乾薑簡方用當歸一兩三分白芍藥二兩熟地黄一
兩半右剉散每服四大錢水盪半薑五片棗一枚煎
七分去滓食前服卷八其藥苦齋下出心風散問
易簡方參蘇飲方後一方用此藥三兩加局方四物

湯一兩半用熟地黄當歸白合和名茯苓補心湯大

治男子婦人虛勞發熱或五心煩熱并治吐血衄血

回春茯苓補心湯治心汗者心孔有汗別處無也因

憂思鬱結茯苓人參白朮當歸生芩酸棗芍藥麥

冬陳皮黃連各等分辰砂研末臨服調入麥甘州

二分右棗二枚烏梅一箇浮麥一撮水煎服補心治

症也醫方紀原卷中

若非天行而虛羸久病胃上痰熱亦可服之加黃耆

二兩除黃芩減知母一二兩除桔槲用之大効

深師竹葉湯天行後虛熱漸勞不復

深師竹葉湯天行後虛熱漸勞不復

回春茯苓補心湯治心汗者心孔有汗別處無也因
憂思鬱結茯苓人參白朮當歸生苧酸棗芍藥麥
冬陳皮黃連各等分辰砂研末臨服調入麥甘艸
二分右棗二枚烏梅一箇浮麥一撮水煎服

附三因方茯苓補心湯方

三因方茯苓補心湯。治心虛寒病。苦悸恐不樂。心腹
痛。難以言。心寒恍惚。喜悲愁。志怒。血面黃。煩悶。五
心熱。渴。獨語。不覺咽喉痛。古本強。冷汗出。善忘。恐走
及或吐。續。心。痛。或。吐。或。眩。暈。四肢怠惰。全不納食。
白血。閃。瘧。此。方。補。心。益。氣。補。血。補。精。補。神。補。志。補。意。補。魂。補。魄。
補。心。補。腎。補。脾。補。肺。補。肝。補。胆。補。胃。補。大。腸。補。小。腸。補。三。焦。
補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。
補。心。補。腎。補。脾。補。肺。補。肝。補。胆。補。胃。補。大。腸。補。小。腸。補。三。焦。
補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。
補。心。補。腎。補。脾。補。肺。補。肝。補。胆。補。胃。補。大。腸。補。小。腸。補。三。焦。
補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。補。百。病。補。百。損。補。百。傷。

藥竹葉湯解五蒸湯類

崔氏療煩躁而渴不止。惡寒但熱盛者。竹葉湯常用
亦佳。不徒療天行。凡虛羸久病。及瘡後。曾上淡熱者。
服之皆妙。方。甘草二兩。炙。棗十五枚。擘。半夏一兩。洗。
芍藥三兩。前胡一兩。黃芩一兩。小麥五合。人參二兩。
粳米一升。知母二兩。麥門冬四合。去心。桔樓一兩。生
薑四兩。竹葉一把。須以竹篠飲代水。煮湯。不用其葉。
右十四味。切。以竹篠飲一斗五升。煮取五升。分五服。
若非天行。而虛羸久病。曾上痰熱。亦可服之。加黃耆
二兩。除黃芩。減知母。一兩。除桔樓。用之。大效。外臺卷三
深師竹葉湯。療天行後。虛熱牽勞不復。程本四枝
竹葉湯解五蒸湯類

沈重或一臥一起氣力吸吸羸弱方竹葉一把小麥
一升甘草一兩炙石膏二兩碎茯苓二兩半夏一升
洗去滑前胡二兩知母二兩黃芩二兩人參二兩生
薑四兩大棗三十枚擘右十二味切以水一斗二升
煮竹葉小麥減四升去渣內藥煮取三升分三服上同
殊古今錄驗解五蒸湯甘草一兩炙茯苓三兩人參
二兩竹葉一把葛根乾地黄各三兩知母黃芩各二
兩石膏五兩碎粳米一合右十味切以水九升煮取
二升半分為三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮
藥同卷十三抄

崔氏療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴竹葉飲方竹
葉一握麥門冬一升去心大棗二十顆擘甘草三兩
炙半夏一升湯洗令滑盡粳米五合生薑三兩右七
味切以水五升煮取二升半分溫三服同上
古今錄驗療虛勞客熱百病之後虛勞煩擾不得眠
臥骨間勞熱面目青黃口乾煩躁偃懂燥切不自
安短氣少食不得味縱食不生肌膚胃中淡熱煩
滿憤悶大竹葉湯方甘草二兩炙小麥五合完用黃
耆二兩人參二兩知母二兩大棗二十枚擘半夏三
兩洗栝樓根一兩粳米一升黃芩一兩當歸二兩生
薑四兩前胡二兩芍藥二兩麥門冬六合去心龍骨

三兩桂心三兩竹葉切一升右十八味切用東流水
二升者煮取五升去滓分服一升日三夜二不過兩劑
如湯沃雪效同卷十七如外
千金方竹葉湯主五心熱手足煩疼口乾唇燥骨中
熱方竹葉小麥各一升知母石膏各三兩黃芩麥門
冬各二兩人參一兩半生薑五兩甘草枯樓根半夏
各一兩茯苓二兩右十二味咀咀以水一斗二升煮
竹葉小麥取八升去滓內藥者取三升分三服老小
五服卷十六如外
葉一升卷十六如外
葉一升卷十六如外

道導赤散類 附大府丹

小兒直訣目內證赤者道導赤散卷上

又肝有熱目直視不搖得心熱則搖治肝瀉青圓治

心導赤散主之同上

又凡病或新或久皆引肝風風動而止於頭目目屬

肝風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能任

故目連劄也若熱入於目牽其筋脉兩皆俱緊不能

轉視故目直也若得心熱則搖以其子母俱有實熱

風火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之同上

又因潮熱已午未時發搖心神驚悸自上視白睛赤

色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治

道導赤散類

心導赤散涼驚圓補肝地黃圓主之同上又因潮熱神聖子丑時不甚搐而喘目微斜視身熱似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之同上又因潮熱亥子丑時不甚搐而臥不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液當補脾治心補脾益黃散治心導赤散涼驚圓主之同上夜間發搐十才同上又皇都徐氏子三歲病潮熱每日西則發搐身微熱而目微邪與斜同反露睛四肢冷而喘大便微黃錢

與李醫同治錢問李曰病何搐也李曰有風何身熱微溫曰四肢所作何目斜露睛曰搐則目斜何肢冷曰冷厥必內熱曰何喘曰搐之甚也曰何以治之曰嚏驚馬圓鼻中灌之必搐止錢又問曰既謂風病溫壯搐引目斜露睛內熱肢冷及搐甚而喘併以何藥治之李曰皆此藥也錢曰不然搐者肝實也故令搐日西身微熱者肺潮用事肺主身溫且熱者為肺虛所以目微斜露睛者肝肺相勝也肢冷者脾虛也肺若虛甚用益黃散何膠散得脾虛證退後以瀉青圓導赤散涼驚馬圓治之後九日平愈同卷中又導赤散治小兒心熱視其睡口中氣溫或合面睡

幼新書卷八分錢
乙治散熱去竄咬
牙道赤散方生乾
地黃焙口木通甘
草炙各等分右同
為末每服三錢水
一盞入竹葉同煎
至五分食後溫服
注一本不用甘草用
黃芩

雞安方道赤散通心氣生乾地黃木通甘草右等分為末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五分食後溫服一方不用甘草用黃芩卷五

及上竄咬牙皆心熱也心氣熱則心肯亦熱欲言不能而有就冷之意故合面睡生地黃甘草生木通各等分右同為末每服參錢水壹盞入竹葉同煎至五分食後溫服一本不用甘草用黃芩卷五

新添方

又導赤圓治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相

搏淋瀝不宣或服補藥過多水道寒澀出少起數臍腹急痛攻症陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發背血脈瘀閉服此排膿內消腫毒疎導心經邪熱應內蘊風熱五般淋疾並皆治之山梔子炒壹拾貳兩赤芍藥滑石茯苓去皮各肆兩生乾地黃焙木通去節各半斤大黃炒拾五兩右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服貳拾圓至參拾圓食後用溫熟吞下卷六續添諸局經驗秘方

濟生方導赤散治心藏實熱口乾煩渴或口舌生瘡驚怖不安黃連去鬚炙冬門冬去心半夏湯泡柒次地骨皮去木茯神去木赤芍藥木通去節生地黃洗黃

木香圓散
前大赤丸
少壯丸
未煎丸
水入丸
為末丸
甘草丸
小兒丸
黃連丸
赤芍丸

仁齋直指小兒附
遺方論導赤散治
小兒血淋生乾地黃
木通各三錢黃芩
甘草生各壹錢右
為末每服壹錢井
水入燈心煎服仍以
米飲調油髮灰生
少許煎湯灌下或
煎大流氣煎飲研青
木香圓灌下卷四

芩已上各一兩甘草炙半兩右以咀每服四肆錢水
一盞半姜五片煎至捌分去滓溫服不拘時候卷七
賜虛實四ノウ

仁齋直指附遺方論增味道導赤散血淋尿血通用生
乾地黃洗晒木通黃芩生甘草車前子不炒山桅仁
川芎赤芍藥已上等分右件為末每服三錢入竹葉
十葉薑薑三片煎服卷十六
明治九年丙子五月一女子年九歲口眼喎斜言
語蹇澁右半身不遂脈甚緩醫皆為不治或以中
風治之或以肝病治之無寸效余亦以肝治之先
與抑肝散加羚羊角一日嘔吐藥食俱不納與半

滿數厚甚

復瀉心湯小劑日一服四五日而吐止余以為是
或脾虛發風之證與真武湯資壽解語湯等類十
數日一日嘔吐再發如前舌上黃胎舌拳縮不舒
黃胎滿數厚甚聲音不發與半夏瀉心湯小半夏
加茯苓湯等十餘日嘔吐漸差稍欲飲食其際羸
瘦骨立似無生路余退思脈緩古人為熱又舌者
心之苗其聲音不發不能言語者疑心經實熱之
所致於是與嚴氏濟生方導赤散大有佳候一月
許而飲食如常又一月許而言語手足復故自夏
閱冬而後漸愈余始悟心肝之證固有區別吾人
往不能辨之終致使病人不起深可慚愧因輯

導赤散類更備他日資攷凡此集輯諸方類皆係
或所親驗或為他日試用之地者並非漫然錄之
讀者宜審焉又凡言而論者只宜自夏
先厚田祐庵嘗謂余曰中風不語用陶氏導赤各
半湯往往有奇効余以為祐庵雖頗巧治療而其
學淺狹恐所說亦無根柢且以傷寒法治中風實
屬燕書野說是以當時漫然不之省頃日集導赤
散類之次想往年所說深感其言有味因附載于
茲

本事方治心經熱小便澁及治五淋火府丹生乾地
黃二兩木通削去鹿皮黃芩去皮各一兩右為細末煉蜜

杵圓梧子大每服三十粒木通煎湯下此藥治淋澁

臍下滿痛卷二 婦人良方卷八火府丹文同

又壬戌年一卒病渴日飲斛水不食者三月心中煩

悶時已十月予謂必心經有伏熱與此丹數服每服

五十粒溫水下越二日不覺來謝云當日三服渴止

又次日三服飲食如故此本治淋用以治渴信知用

藥要在變通也同上

證治要訣治淋之法云蓋小便者血之餘也血苟

充滿則滋腹下潤自然流通如火府丹自却為的當

其中有地黃輩然此非特言血淋氣淋一應淋皆可

用獨不可用之虛冷耳卷四

又火府丹本小便血同類方卷四

又小便澀痛常急欲溺及去點滴莖中痛不可忍者

此五淋病生料五苓散加阿膠七分云云或五苓散

並可吞火府丹佐以導赤散卷八

又若淋瀝有血者宜加五苓散或生料五苓飲和五

淋飲或道赤散仍研地錦草水煎服同上

五苓散

門

又

林

林

續命湯類用酒煮方

千金方大八風湯當歸升麻五味子烏頭黃芩芍藥

遠志獨活防風芎藭麻黃秦朮石斛人參茯苓石膏

黃耆紫苑杏仁甘草桂心乾薑大豆右二十三味

咀以水一斗三升酒二升合煮取四升彊人分四服

羸人分六服卷八抄當飲本書下皆倣此

又羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後

中風方羌活桂心芍藥葛根麻黃乾地黄甘草生薑

右八味咀咀以清酒三升水五升煮取三升温服五

合日三服同卷八抄

又治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後中柔風及

續命湯類用酒煮方

氣滿葛根湯方同上 藥味方後文與前方全同

又白斂薏苡湯治風拘攣不可屈伸方白斂薏苡人芍藥桂心牛膝酸棗人乾薑甘草附子右九味以淳酒二斗漬一宿微火煎三沸服一升日三扶杖起行不耐酒服五合同上 藥味方後文與前方全同

漬一復時

又石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行要脊僵直五緩六急手足拘攣隱胗搔之作瘡風尸身瘡卒風面目腫起手不出頭口噤不能言方石南乾薑黃芩細辛人參桂心麻黃當歸芍藥乾地黃甘草

食茱萸右十二味以水六升酒三升煮取三升分三服大汗勿怪同上

又倉公當歸湯主賊風口噤角弓反張瘕者方當歸防風獨活麻黃附子細辛右六味以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口內湯一服當

蘇二服小汗三服大汗同上 藥味方後文與前方全同

分四服外臺卷十四引千金无方名

深師療賊風入腹五藏四肢心胃急痛背反寒咽乾口噤戴眼方藥味与次大續命湯全同右九味

以咀以水酒各五升合煮取四升分爲四服外臺卷十四

注云此故是大續命湯藥分兩不用

又大續命湯療毒風賊風身體不能自收不知痛處
咽中卒不得語若拘急腰痛引頸目眩不得見風坐
欲却倒覺卽反張脊不著席脈動不安恍惚恐懼欲
啼上氣嘔逆面腫方杏仁芎藭石膏甘草桂心當歸
麻黃乾薑黃芩芍藥九味切以水六升酒三升合煮取
三升分為四服取微汗汗出粉之勿見風同上桂
又防風湯療中風兩目不開不能言短氣欲死方防
風甘草黃芩茯苓當歸杏仁秦艽生薑乾棗麻黃右
十味以咀以清酒水共四升煮取三升分為三服發汗
同上枳
古今錄驗八風九州湯療男子婦人寒冷不自愛護

當風解衣汗出臥冷濕地半身不隨手足苦冷或不
隨或俛仰屈伸難周身淫淫痺四肢不收狀如風狂
飲食損少方麻黃甘草乾薑附子防風獨活石膏茯
苓白朮芎藭柴胡當歸人參杏仁細辛右十五味切
以水一斗清酒五升漬三夜煮取四升分為三服一
日令盡若病人羸瘦者用水煎服藥訖厚覆當汗出
微微去上衣汗解以粉粉之同上枳

諸續命湯類間有用水酒者者今世絕不試用茲
鈔千金外臺方後所載以備參攷如其九散酒服
諸酒劑類省不載又二三十味以上方亦率不收
錄

十兩右四味切以水一斗煮取三升分三服得吐利
止每服皆須溫同未效復用此方主頭眩吐酸水瀉
刪繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯方厚
朴四兩炙乾扁豆葉二兩茯苓三兩白朮五兩人參
三兩右五味切以水七升煮取二升分三服同上
和劑局方香薷圓治大人小兒傷暑伏熱燥渴昏悶
頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦
不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之乾木瓜紫
蘇去蘆梗香薷去土各壹兩白茯苓神去木藿香葉檀
香劉甘草劉炙丁香各半兩右為細末煉蜜和勻圓
每壹兩作參拾圓每服壹圓至貳圓細嚼溫湯下或

婦人良方卷六文頌
同方後云蘇沈良方
中名香薷散百問同
有黃連無扁豆

新汲水化下亦得小兒服半圓不拘時候卷二
又香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生
冷過度或起居不節或露臥濕地或當風取涼而風
冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水
穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之
間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者
有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼
而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘
急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脈欲絕或
煩悶昏塞而欲死者悉能主之香薷去土壹斤白扁
豆微炒厚朴去蘆皮薑汁塗炙令黃各半斤右為麩

育黃連散...
中...
同...
...

末每服參錢水壹觔入酒壹分同煎至柒分去滓水
中沈冷連喫貳服立有神效隨病不拘時候
活人書香薷散治陰陽不順清濁相干氣射中焦名
為霍亂此皆由飽食腥膾復啖乳酪海陸百品無所
不餐多飲寒漿眠臥冷席風冷之氣傷於脾胃諸食
結而不消陰陽二氣雍而不反陽氣欲降陰氣欲升
陰陽交錯變成吐利不已百脉昏亂榮衛俱虛令搏
於筋令轉筋宜服此方厚朴去皮貳兩香薷穗壹兩
半黃連貳兩二味入生姜四兩同杵炒令紫色用一
方有白扁豆尤良右搗為粗末每服三錢水一盞酒
半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷

盧祖常續易簡方論後集卷四云香薷飲局有見賣不錄其煎者必用酒與水以分冷熱
須水浸令十分冷服
亦不外新汲水之意
專治夏月心飲水
雪瓜菓膾膾變
為霍亂至要之劑
孫與王謂不宜冷
服緣其後與子監
此以為於武之按孫
王蓋謂孫志寧王
碩其義我見易簡
方增損縮脾飲方
後施氏續易簡方
卷二增損縮脾飲
條又按盧氏所
說殿圖方類聚廿
六引王氏易簡方
致今本易簡無效

頓服之藥冷則効速也仍煎服時不得犯鐵器慢火
煎之兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢
逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沈
令極冷頓服之乃有神效
萬病回春中暑者熱中心脾二經也其症煩渴自汗
面垢眵虛或腹痛吐瀉或嘔噦燥悶重則熱極而昏
不知人事俱用香薷飲加減元氣虛脫者用生血散
加減
又香薷飲治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並治若
卒中昏冒倒仆角弓反張不省人事手足或發搐搦
此為暑風不可作風治之當以本方加羌活治之香

古今本草綱目卷之六
六代王內長簡
又新蓋內竹
卷二醫家雜考
大醫前解題
其書目
非其其對
其書目
亦不
亦不
亦不

千金方治妊娠腰痛方大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒腰痛卷二

薰厚朴薑汁炒白扁豆炒加黃連薑汁炒尤妙右割
劑水煎熟以涼水沈冷服如有搖擗加羌活瀉利加
白木茯苓鹹虛弱加人參五味子麥門冬虛汗不止
加黃芪白木心煩加梔子黃連薑汁炒調辰砂末服
胸脹加枳殼桔梗夾痰加南星半夏虛加人參黃芪
小便不利加赤茯苓滑石嘔吐加藿香陳皮薑汁少
許湯加葛根天花粉同上

婦人良方夏月中暑霍亂大煩渴四肢逆冷冷汗出
脚轉筋者香薷散濃煎沈冷服即效卷六

大豆大紫湯類諸方

大豆大紫湯類諸方
肘後方若口噤不開者取大豆五升熬令黃黑以酒
五升漬取汁以物強發口而灌之畢取汗卷三治中風諸急方
小品方治高墮若為重物所鎮在得瘀血方作大豆
紫湯如產婦法服之醫心方卷十八
千金方治產後百病及中風痲痺或背強口噤或但
煩熱苦湯或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆
因虛風冷濕及勞傷所為大豆紫湯方大豆五升清
酒一斗右三味以鐵鑊猛火熬豆令極熱焦烟出以
酒沃之去滓服一升日夜數過服之盡更合小汗則

千金方凡產後角弓反
張及諸風病不得用毒
藥惟宜單行二兩味亦
不得大發汗特忌轉
瀉吐利必死無疑大豆
紫湯產後大善卷三

大豆紫湯類諸方

雞峯方卷十六後
有方用獨活酒一
斗三升先漬獨活兩
宿依前熬大豆以獨
活酒沃之服如前世
字、婦人良方卷廿列
千金文小異方後云亦
有加羌活者亦佳。

愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中
三日服此酒即差卷三抄入
又治產後百日中風痙口噤不開并治血氣痛勞傷
補腎獨活紫湯方獨活一升大豆五升酒一斗三升
右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減
三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去
豆服一升日三夜二同上抄難立腎衰血之於大豆
又大豆湯主產後卒中風發病倒悶不知人及妊娠
挾風兼治在蓐諸疾方大豆五升炒令微焦葛根獨
活各八兩防己六兩右四味以酒一斗二升煮
豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服日四夜

大豆湯主產後卒中風發病倒悶不知人及妊娠
挾風兼治在蓐諸疾方大豆五升炒令微焦葛根獨
活各八兩防己六兩右四味以酒一斗二升煮
豆取八升去滓內藥煮取四升去滓分六服日四夜

二同上十一又治產後中風頭面手臂通滿方大豆參升以水陸
升者取壹升半去豆渣清更煎取壹升內白木捌兩
附子參兩獨活參兩生薑捌兩添水壹斗煎取伍升
內好酒伍升去滓分伍服日參夜貳間粥頻服參劑
又治五色帶下方服大豆紫湯日三服注方見前三
卷風篇中
又治卒中風口喎方炒大豆三升令焦以酒三升淋
取汁頓服之注肘後以治口噤不開
外臺卷十四引千金同卷八
又治四肢骨碎筋傷蹉跌方大豆五升水五升煮取

起然煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視

又方若口噤不開大豆五升熬令黃黑以五升酒漬

開口灌之取汗肘後同並出第二卷中同上

小品大豆紫湯主婦人產後中風困篤或背強口噤

或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視

此皆因風冷濕所為方大豆三升炒令炮斷預取器

盛清酒五升次熱豆中訖漉去豆得餘汁盡服之温

覆取微汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結

云周德成妻妊胎觸墮因傷折胎死在腹中三日困

篤服此酒即差後療無不佳注千金用大豆五升酒

所以然爾者產後多虛著風以獨活消風去血故也

重者十劑崔氏云如中風口噤加雞屎白二升和豆

煎更佳同卷卅四○醫心方卷廿三引小品方文小異產寶卷中引小品亦文小異

本草衍義生大豆又治產後百病血熱并中風疾癰

止痛背強口噤但煩熱瘕瘕若渴身背腫劇嘔逆大

豆五升急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微煙出傾入

酒瓶中沃之經一日已上服酒一升取差為度如素

不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微推

破同沃仍增酒至一斗二升卷二十破同沃仍增酒至一斗二升

本草綱目豆淋酒破血去風治男子中風口噤陰毒

腹痛及小便尿血婦人產後一切中風諸病用黑豆

炒焦以酒淋之温飲卷廿五附諸酒方雞峯方豆淋酒治產後諸風一名紫湯羌活壹兩黑

豆半升炒熟，右以酒一升，先煮羌活五六沸，去羌活，乘熱沃在所炒豆上，煎三五沸，傾入磁器中，以紙蓋，却去豆，溫飲半盞，風勢大者，隨證下諸風藥尤佳。如口噤，驛曳，服何膠元些，小風則服龍砂丹。卷十又大豆煎，男女新久腫及惡暴風入腹，婦人新產上，溷清風入臍腹中，如馬鞭者，噓吸短氣咳嗽，大豆壹升，揀令淨，右以水五斗，煮之，得壹斗三升，澄清，去下濁者，內釜中，以一斗半美酒內汁中，煎取九升，宿勿食，旦服三升，溫覆取汗兩食頃，再下去風氣腫，減真冷，十日平復如故。同上 卷十九 大豆煎 同文 小異

又治中風口噤，身軀強直，羌活紫神湯，羌活壹兩，去

蘆薈，右以酒三升，浸一宿，取黑豆一升，淘淨，炒出煙，乘熱就鍋內，以浸藥酒沃之，放溫去滓，每服半盞，日二三服，不以時候。卷三十

婦人良方，紫酒治妊娠腰痛如折，大黑豆二合，炒令

香熟，以酒一大瓊，煮取七分，去豆，空心頓服。

卷十

此方原出

又白木酒治妊娠中風口噤，語言不得，白木一兩半，

獨活，黑豆一合，炒，右細剉，以酒三升，煎取一升半，去

滓，溫分四服，口噤者，拗口灌之，得汗即愈。

同卷十四

又新產後云云，如未出月，間欲酒喫，或服藥者，可用

淨黑豆一升，炒令烟出，以無灰酒五升澆淋之，仍入

好羌活一兩，洗淨拍破，同浸尤妙，當用此酒下藥，或

時時飲少許可以辟風邪養氣血下惡露行乳脉也

卷十八

又曰胞衣不出若腹脹則殺人黑豆一合炒令熟右

入醋一盞煎三五沸去豆分為三服酒煮亦可同上

又大豆紫湯治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後

百病或中風癱瘓背強口噤直視煩熱脉緊大者不

治小品方主產後中風因篤背強口噤或但煩躁或

頭身皆重或身重痺劇嘔吐直視者指迷方名獨活

湯用獨活兩半大豆半升酒三升右先以酒浸獨活

煎一二沸別炒大豆極焦烟出急投酒中密封候冷

去豆每服一二合許得少汗則愈日十服此藥能去

外集卷十

風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得差凡產後

口噤腰背強直角弓反張皆名曰瘓又名曰瘓古人

察有汗無汗以夕剛柔陰陽而治今產寶諸書有中

風口噤一門又有角弓反張一門其實一也如增寒

發熱有類傷寒皆不論及豈可只以一二藥治之愚

今取百門中方論已詳備前篇見三卷庶幾覽者如

指諸掌卷十九

又治產後中風口噤四肢頑痺不仁身體如角弓反

張羌活酒羌活防風各三兩黑豆一升炒令烟出右

細剉以好酒一斗於瓶中攪動密封經半日許又於

產寶卷中文小異此當引產室

異地當用及重定
至寶卷中文字

飲之日可三四服度之當汗出即差 同上類一
產寶療產後中風口噤拘急困篤腰背強直時及
折大豆貳升炒令聲絕右清酒陸升投之煮三四沸去
滓飲之令微醉如汗出差切勿觸風如已成風者加雞
糞白和豆炒同喫兼飲竹瀝佳 卷中
又千金療產後風冷所致腰脊強痛中風煩熱苦渴
頭身皆重此因風冷所致及傷寒大豆酒大豆伍升
酒壹升右以鐵鎔炒豆令熟以酒投之密蓋令温去
豆服壹升日夜數服卧取微汗避風 卷下按今有中
本千金无攷
可禁藥皆欲首備之及乘習各日慈又各日或古今
風能血餘或致致并壽胡夜朝中邪此野美或致致

外集卷十當參看

風引湯類諸方。千金卷七有風引獨活湯風
續命湯類與茲所載方意自不同因不錄
病源候論若病人脉得浮大及緩宜服續命湯兩劑
若風盛宜作越婢湯加木四兩若脉轉駛而緊宜服
竹瀝湯脉微而弱宜服風引湯二三劑此皆多是因
虛而得若大虛乏氣短可其間作補湯隨病軀之冷
熱而用 卷十三脚氣緩弱候
千金方紫石者散治大人風引小兒驚癇瘕瘕日數
十發醫所不藥者方紫石英滑石白石脂凝水石石
膏赤石脂各六兩大黃龍骨乾薑各四兩甘草桂心
風引湯類諸方

牡蠣各三兩右十二味治下篩為麤散盛以韋囊懸於高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服以意消息之注深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味卷十四風癩第五註或根之合

又治百二十種風癩癩驚狂及發即吐沫不識人者四月五月宜服者散方紫石英芍藥龍骨一本用黃芩麻黃青石脂當歸甘草桂心人參枯樓根白鮮皮各二兩牡蠣三兩大黃五兩右十三味治下篩為麤散分作七裹每以大棗十枚水三升煮取二升半下一裹大棗汁中煎取一升去滓頓服相去七日一服

服訖即差同上

廣濟療風癩卒倒嘔沫無省覺方麻黃去節大黃牡蠣熬黃芩各四兩寒水石白石脂石膏研赤石脂紫石英滑石研各八兩人參桂心各二兩蛇蛻皮一兩炙龍齒六兩研甘草三兩炙右十五味搗篩為散八兩一薄以絹袋盛散藥用水一升五合煮取一薄取七合絞去滓頓服之日一服一方水二升煮散方寸匕取一升去滓服之少小百日服一合熱多者日二服三五日一服亦得本方無麻黃龍齒蛇蛻皮外臺卷十

五風癩及敬馬癩方廿四

深師療大人風及少小敬馬癩癩瘰日數十發醫所不

療除熱方。龍骨、大黃、乾薑各四兩，牡蠣三兩，熬滑石、赤石脂、白石脂、桂心、甘草炙各三兩，右九味搗下篩。章囊盛，大人三指撮，以井華水二升，煮三沸，藥成適寒溫，大人服一升，未滿百日服一合，未能飲者，綿裹筋頭內湯中，著小兒口中，以當乳汁，熱多者日四服，無毒，以意消息之。同上廿五

崔氏療大人風引，少小驚癇，癩疥，日數十發，醫所不能療，除熱鎮心，紫石湯方。紫石英、滑石、白石脂、石膏、寒水石、赤石脂各八兩，大黃、龍骨、乾薑各四兩，甘草炙、桂心、牡蠣熬各三兩，右十二味搗篩，盛以章囊置於高涼處，大人欲服，乃取水二升，先煮一沸，便內藥

方寸匕，又者取一升二合，漚去滓，頓服之。少小未滿百日，服一合，熱多者日二三服，每以意消息之。此紫石湯一本無紫石英，紫石英貴者，可除之。永嘉二年，大人小兒頻行風癇之病，得發例不能言，或發熱，半身掣縮，或五六日，或七八日死。張思惟合此散，所療皆愈。錄驗范汪同，並出第六卷中。
注：此本仲景傷寒論方，同上。

又論曰、甘草解百藥毒、此實如湯沃雪、有同神妙、有人中烏頭、巴豆毒、甘草入腹即定、中藜蘆毒、湯下咽便愈、中野葛毒、土漿飲訖即止、如此之事、其驗如反掌、要使人皆知之、然人皆不肯學、誠可歎息、方稱夫豆汁解百藥毒、余每試之、大懸絕、不及甘草、又能加之、為甘豆湯、其驗尤奇、有人服玉壺丸、治嘔不能已、百藥與之不止、藍汁入口即定、如此之事、皆須知之、此則成規、更不須試練也、同卷廿四
又論曰、凡蠹蝮蟲、尿人影著處、便令人病瘡、其狀身中忽有處疼痛如芒刺、亦如刺蟲所螫、後起細瘡、癩作聚如茱萸子狀也、四邊赤、中央有白膿、如黍粟亦

令人皮肉急、舉身惡寒、壯熱、劇者連起、竟腰脇骨也、治之法、初得之、摩犀角塗之、止其毒、治如火丹法、余以武德中六月、得此疾、經五六日、覺心悶不佳、以他法治不愈、又有人教畫地作蠹蝮形、以刀子細細畫取蠹蝮腹中土、就中以唾和成泥塗之、再塗即愈、將知天下萬物相感、莫曉其由矣、同卷廿五
余嘗謂當歸四逆湯、麻黃升麻湯等、以其與仲景諸方簡潔者不相類、注家往往疑為後人所攙入、然其說固臆揣、實屬夏蟲之見、蓋古聖所建之方、不可以後人之淺見擬議也、明矣、夫聖人猶有蓋關之書、後人暗中摸索、欲絕斷古人之疑案、祇見

正本草也。本草之書，不可以極仲景氏之蘊也。無已，則通考全論，以窺其端倪乎。是余之所以不釋方意也。傷寒集成業廣案不釋方意者，自公案有大家之識，謂不取本草者，概論也。業廣嘗觀好言藥性者，往往去加古方而用之，是比之不識本草者，不同日而論。唯恐不免，所以惡智者為其鑿金之譏。甚者至有真武湯去附子，五苓散加半夏者。夫然後古方之精義消亡盡矣。夫方有寒溫，藥有冷熱，方之寒溫，乃其大體，而藥之冷熱，乃其細目也。凡方之為用，數味合和，然後始可定寒劑熱劑。但溫劑中有冷藥，寒劑中有溫藥。此古聖能明陰陽升降之理者之所創立，而非叔世

凡庸之徒，所可能窺者。今乃論一味藥性，漫然去加之，是好小察而不通乎大體之弊也。世又有墨守成法，不知變者，乃所謂守株刻舟，均不為得。然不失大體，則猶勝於臆斷鹵莽，斷首截尾，令成方无完膚者萬矣。又注家論仲景方各味，辨其功用，如懸鏡照妍媸，蓋各味有各功，則固勿論已。若配合以為一隊，則不宜各論其功。假令麻黃湯，則發汗之重劑，試取麻黃一味用之，汗不必出。凡藥率如此，故取各味以論其功，為彼上上而不治下，此治表而不治裏，必戾立方之意。要之當平素識得各藥性味，而詳審之，至解成方，須混和說之。

耳此讀方書之要亦臨證處方際最當審之
又嘗論能知藥性者乃能忘其藥性者也
好論藥性者未必得其藥性得兔而忘蹄
得魚而忘筌是非筆舌之所盡
王弼解易曰義苟在健何必馬乎
類苟在順何必牛乎又苟合順何必坤
乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或
者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽
說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變
變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚
縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也
忘象以求其意義斯見矣王氏此言可擴以
為用方者之鑑

傷寒論辨平二脈法諸可不可諸篇辨

辨平二脈法蓋古之遺法恐非仲景筆然謂之叔和所撰亦臆說耳方有執等何以言之二脈法徃徃與本經相矛盾知非一人筆脈經卷五引平脈文題以仲景論脈是非叔和自著也明矣傷寒例則叔和自撰故曰採輯仲景舊論至辨諸可不可諸篇則非非叔和所撰王函經辨可不可十七篇与脈經同而傷寒論則缺可温以下諸篇脈經十七篇外更有重貫重虛等六篇而卷末乃云治傷寒形證所宜進退晉王叔和集仲景評脈要論由是觀之諸可不可篇原叔和所集而六朝際取以附之傷寒論末以足十

卷之數耶、謂之叔和所攙則誣矣、要之六經篇、奔存仲景真面目、其他則謂之採輯本亦可也、然謂全非仲景面目、亦屬妄斷、

王安道曰、叔和之增入者、辨脈平脈、與可汗可下

非等諸篇而已、其六經病篇、必非叔和所能贊辭也、

自但厥陰經中、下利嘔噦諸條、却是叔和因其有厥

逆而附、遂併無厥逆而同類、亦附之耳、海澱集張仲景傷寒

與亦立法考、非仲景所撰、蓋叔和所撰、

仲景亦撰、叔和所撰、

仲景亦撰、叔和所撰、

仲景亦撰、叔和所撰、

仲景亦撰、叔和所撰、

平脈辨證 附辨脈平脈說

傷寒論序、平脈辨證、或疑是書名、按前既歷舉書目、

而至平脈辨證、特言并以改其端、則明非書名、蓋平

辨二字、互文言之、不必差別、首卷辨平二脈法、說稍

有異、同而无甚分別、則知二脈法、亦古之遺經、而作

者、或非一人、故異篇目、其實辨平二字、義則同矣、脈

經所載篇目、與金匱篇目畧同、而必冠以平字、外臺

瘡門、引張仲景傷寒論、曰辨瘡病、曰辨瘡脈、曰辨瘡

亦必冠以辨字、是與脈經平字義同、茲知平脈辨證

者、辨論脈證之義、而互文言之耳、書堯典、平章百姓

漢以後、或作便章、或作辨章、古便平辨辨四字相通

平脈辨證 附辨脈平脈說

平脈辨證 附辨脈平脈說

曰氏春秋曰已篇世之人主貴人無賢不其莫
不欲長生久視而日逆其生欲之何益凡生之長也
順之也使生不順者欲也

其不然因適于其

其不然因適于其
其不然因適于其
其不然因適于其

其不然因適于其
其不然因適于其
其不然因適于其

其不然因適于其



