

欽定四庫全書
古今圖書集成

卷二



492

Ih
3

富士川文庫

2655

2286

12 / 126



醫方彙編卷二

慈谿銘之劉廷楨筆述
英國醫士梅藤更口譯

天台陳子耕 受業銘三劉廷銓 同校
銘新劉廷璋

耳症

Ear, Diseases of

分爲三部。
 一外耳。二中耳。三內耳。三者之中。外耳病輕。中耳內耳病重。

一外耳自耳以下均是最多患者。一水皰癩 Eczema。病狀與別部同。治法。以鉛醋水一錢。佛士林一兩外搽。并以二三滴鉛醋水滴入內耳。以防發炎疼痛○如舊症宜加卡而白兌對兒琴水。如炎累內耳。宜滴杏仁油。并以棉花捲淨耳內。
 二小紅癰瘍。Haematoma。宜割之。用汞綠水洗。
 三小骨瘤。Bony Growth 多在耳門。治宜割去。亦有因瘤塞耳門失聰者。
 四炎症。Inflammation

tion of the External Meatus.

大約爲別病_{如疔}所致。極痛不舒者。

宜蜞吮或放

血。或以哥根四釐化熱杏仁油百滴。滴入耳中。亦有以力坐新五釐哥根二分半水一兩相合。滴入耳中。_{滴後或用棉花捲之}能止痛消腫。最有效驗。或謂此

症爲該處血中有蟲之故。

Parasite.

是以用汞雙綠二釐火酒六錢。汽水

三兩。每日滴入耳中。_{或浸棉花塞入耳中}極效。

五 粉蟲

Fungi (*Aspergillus flav. and nig.*) 由植

物之蟲染及所致。結成蟲窠之形。宜汞雙綠火酒洗滴可也。

六 耳蠟與

外入之物。 Wax and Foreign Bodies. _{如豆蟲} 治宜溫水射洗。或揩出之。_{射洗耳部宜用象皮水節}

先以鑷水每一釐半化水一錢。滴入耳中。畧化。再射洗之。或滴入巴卑

水善化耳蠟。

二 中耳。_{自耳鼓至三小骨爲中耳} 最多之症。

一 炎症

_{毒無} Acute and Chronic Catarrh.

分新舊兩

種。新症治宜蜞吮。後用熱壓劑。壓在蜞吮處以放血。疼痛難當而腫者。

以小刀

_{兩面有鋒} 刺割放血。

_{耳鼓至} 或以象皮水節。

(Politzer's Bag.)

射洗。_{射時當飲水一口} 使氣

入耳。或以專器 Eustachian Catheter 射氣入耳。或悶閉喉鼻。逼氣入耳。或

以硼酸或鑷炭養。每百釐化水十兩漱喉。或以硼酸粉吹入鼻孔。均有

止痛之功。新炎已退者。最宜專器通耳。或以鋸礮養一釐水一兩。由鼻

通入。射洗耳管。○舊症亦宜專器通氣入耳。或以輕淡綠氣通入耳管。

或以鋸礮養一釐化水一兩。射入。或以硼酸鑷炭養水漱喉。

二 腫炎

_{有毒}

症。 Purulent Catarrh (Acute and Chronic) 大約中耳之病。多由喉症來。不由

外耳而入。此症亦然。治宜射洗。但此症有毒與否。辨之甚難。故初起治

法。與無毒炎症相同。又此症須防耳膜破裂。

_{難收口}

見症宜刺放之。

_{易收口}

愈早愈妙。刺後與未放以前。宜硼酸水 _{一分化} 或鋸礮養。

_{三釐化水一兩}

每日數次

射洗。或以專器通氣。如耳後外部腫者。須開刀。喉部可以加波匿酸。

_{八十一化}

鋸綠 _{四十化} 或炭匿酸甘油 _{三十化} 漱喉。或以甘油加波匿酸。

_{一化}

鐵酒合甘油 _{二化} 銀淡養水 _{二十化} 刷喉。此新症也。○舊症卽耳膜穿破。難於收口之故。宜內

外交治。外用加波匿酸水_{一化百二十}洗。硼酸粉洒之。或火酒合硼酸_{一花二十}或巴卑水_{五釐化水百滴}滴入十五滴。過一點鐘再以硼酸水洗之。或以專器通氣。_三發炎成瘡。Mastoiditis。宜在外蜞吮或開刀_{連骨割之}或將骨用圓鋸鋸去。使膿外流爲要。往往有膿毒攻腦而死。_四耳癥 Polyp. 概由膿炎時發出。治宜割之。或揩去。

_三內耳即三小骨處之病。治之不易。一有因花柳之毒。Syphilis. 以致耳聾者。宜耳後搽汞油。內服銻碘。_二耳鳴 Tinnitus Aurium. 宜服瀉溴_{一二三分}。或滴哥根水。或耳後引炎。其餘諸法。均無效驗。_{如電震等法} _三耳鳴。發暈。Meniere's Diseases. 或兩耳或一耳未定。治宜雞那霜。每服半至一分。或銻溴每服半錢。或沙利沙精。每服半錢。或毛地黃酒。每服一分。或以指揩耳部。

癩瘡 Ecthyma.

乃皮膚發小粒疹子。有膿。畧如天泡瘡。惟此不若天泡瘡之大。且脫痂

後有疤痕。大約爲身弱污穢。兼有疥瘡者多有之。_{因抓摩所致} 盡多者用麥皮壓劑。○一方。鍾養油一兩。鉛醋水半錢。相合調勻。搽之可也。起居飲食。均宜精細合宜。并服補劑。鐵魚油等品。

水蠍癩 Eczema.

此症最難治。法不一。或爲虛弱之故。或謂別病遺體之故。其實二者兼有之也。一內治之法。其飲食須要精細易化。如初起新症。可飲牛乳與肉食。至舊症則糖茄菲茶鹽肉豬肉魚水果辛辣之味。蛤蜊之類。以及糕餅等類。均須忌之。○此症凡不宜之食物。食後當覺患處發癢。故何物可食。病者自知。切宜小心忌之。_{不得已飲酒者。宜忽司克爲妥。}又起居運行。均須合乎養身之理。○內服之藥。大約有此症者必兼胃症。故內服之藥。以清利胃經爲要。如鹽類瀉劑。或鹽類瀉泉。或鎂礦養等爲佳。○一方。鎂礦養二兩。哥枝禁葡萄酒二錢。鎂炭養三錢。薄荷水到十二兩。每早空肚服三兩瀉

之。○又方。鎂礦養二兩半。鐵礦養半錢。淡礦酸二錢半。汽水到十六兩。每服二三兩。化水服之。隔兩日一服。如服後三點鐘不瀉者再服之

惟新症則不用

○有時先服汞藍丸。後服

鹽類瀉劑。如舌苔皮乾、胃閉、渴赤者。宜果子沸鹽。或○一方。鉢炭養一兩。鉢醋一錢。化水十兩。每服一兩。合半兩檸檬鮮汁相合。沸時服之。

○如兼血薄者。宜鐵丸。○如心經有病。以致脚腫者。宜鐵與毛地黃。○如

瘡癩不睡者。忌用咖啡鴉片綠養冰等品。宜服撒弗那兒二分。或鑄溴

半錢。極效。或謂小兒患此不睡者。則用綠養冰多效。又其拉撒米姆酒。

內服亦能止癩。若合蘋茄鬧羊花。則能止痛寧睡。又安的拜林。亦有寧

睡止痛之功。或鉢錫葡每服十六分釐之一。亦佳。又鉛石水。乃此症最

可靠者。凡舊症均不可少。惟新症則不用

惟新症則不用

但宜大服。初服一二滴。半月後宜每服

十餘滴。有時合鐵同服亦佳。如皮膚乾燥者。宜比魯介賓引汗。亦有用

電氣震之者。外治之法甚多。但不能拘擬一藥。能治之愈。大約宜久

用一藥。不可輒換爲要。○新症概宜滋潤之劑。如初起可用油類。

微標油猪油佛士林

等。或甘油等搽之。不第能潤。又能不遇天氣。更覺舒暢。如有靨癬。宜洗

去。或熱劑燻之。大抵只用一次足矣。不可頻洗。舊症或多洗

其簡便之法。卽以

橄欖油浸棉花。揩抹。善能去癥。○如必不得已。須用肥皂者。宜用油皂。

至於一切提神皮膚之事。如揩擦。出汗。忽冷忽熱。行走。抓爬。均宜小心

忌之。用粉酒油搽卽所以保護皮膚不使提神之意也

○如用藥水或油藥者。勿包油紙。務使該處通氣乾

燥爲佳。

發小疹。包油紙每

一方。安息香鋸養油二兩。爐甘石二錢調勻搽之。

二方。滋肌香蜜膏二兩。鋸養粉二錢。爐甘石一錢。調勻。

三方。鋸養粉一錢。鉢炭養四錢。甘油三錢。加波匿酸四分。白佛士林一

兩半。調勻。

四方。藕粉一錢。鉢養或鉢炭養一錢。滋肌香蜜膏一兩。調勻。

其餘各藥。筆難盡述。而其效驗之靈。功用之妙。以上四方。可以該之。○用法。將油用指抹在癩處。後以絨布貼上。或以絨布卷紮之。勿用粗糙者○亦有用灰水。橄欖油對半。或杏仁油。油蘇油均可。用棉花揩抹。以去其痂。○已用上文四藥之後。數日。仍流水液者。宜用鉛醋水一錢。合銻養油一兩。以飲之。或合少許鴉片酒大約一兩。合半錢。更佳。或以鉛醋水外擦亦可。○流水極多者。概用藥粉洒之。如藕粉漿粉。鉛炭養銻炭養鎂炭養鋐炭養米粉。法國石粉。銻養滑石粉。富羅石散等。但必須合鉛炭養或鉛油粉爲要。如癬癢者。宜合樟腦同酒。每一分。○近來有用各種稠膏者。如來撒兒氏膏。Lassar's Paste。其方用佛士林二兩。漿粉一兩。銻養一兩。沙利沙酸四分。調勻。猶納氏膏方用來撒兒氏方少加偈克坐兒。Ichthyol。搽之亦效。

大約新症。忌用甘油。功大。提神。猶納氏甘油凍方。雖新症亦可用之。惟斃熱奇癢者。用此最效。用時宜浸熱水化之。以筆刷搽可也。○舊症用滋潤之

品無益。須用提神之劑。如柏油。汞油。鉛雖是古法極效。等品。頗效。大約宜用油藥。或藥水亦可。如流水極多者。不宜油藥。宜用飲性藥水搽之。○如赤熱而癢乾燥無水者。柏油極效。如流水者。誤用柏油。則病增劇。醫宜慎之。大約舊症流水者。宜先以鉛劑歛之。至水已乾。方可再用柏油。○一方。淡鉛醋水。四十至一。合鴉片酒。或樟汁少許。或卡而白兌對兒琴水少許。八十一至一。搽之極效。○舊病乾燥無水可常用者。其方以卡而白兌對兒琴水。可以Oil of Cade: Oil of white Birch。幾阿蘇。加波匿酸。比打納弗石。納弗石林等代之。而最好用柏油油藥。或合銻養油合用。甚效。惟有毛髮處。不可用之。柏油之功用。善治水蠣癩舊症。一切舊症。用此無有不奏效者。或謂舊症只賴柏油鉛。劑輕淡綠無不可愈。又用稠油藥以治舊症者。必合鉛柏油等爲妙。○畢氏用膏藥。以治舊症流

水者。如沙利沙酸五釐。合肥皂膏藥百釐。貼之。約四五日一換。頗效。至水已乾。以洋菜三十分化水百分。火酒燈燭至重七十五分。加甘油二十五分。汞雙綠半分。化時去膏藥後搽之可也。

汞劑善治半新半舊之水蠶癩。但病症漫延極大者忌。恐毒傳入如欲去其痂靨。可用汞雙綠一釐。化水二兩洗搽。後以輕淡汞綠二三分調豬油一兩搽之。或以加路迷調油搽之。至二三分或以黃汞養調油八至一兩搽之。或以諸藥合柏油與鉛鋸搽之。均可。○一方。安息香鋸養油。鉛醋油。黃汞養油。各一分調勻搽之。○如流水極多者。宜以銀淡養三分。化水一兩搽之。繆絲久病皮厚者。宜鍼輕養水或巴卑粉。極硬者亦能化或蟹螯水搽之。○拉氏治下陰等處之水蠶癩。用哥根油粉二分。闡納林四十分。橄欖油十分。相合搽之。數日後。洒上文各種藥粉。○又礦粉可治極舊之症。每用一錢。調油一兩。或貝路加力。半錢化油一兩又哭來撒弗內克酸。分半化一兩或綠養冰。或

甘油。沒石子酸。硼酸。沙利沙酸。郁加利達油。石莫耳等。均以分半化油一兩搽之。或硼酸甘油。或白礬力坐新等各一錢。化油一兩搽之。或埃阿達方一分調油一兩搽之。亦有以巴卑粉甜肉汁。或哥老典恩。用治極舊之病者。猶納氏常用力坐新一劑。○一方。力坐新十分。甘油十分。酒醇百八十分。相合溶化之。再以此水一分化水四分。以棉花浸壓包裹。善能化之。其義與雞眼用沙利沙同意也。○希氏所擬之法。以哥哥油甘油合成之皂。以代佛士林猪油之用。 Glycerinum Saponatum (Cocoa Nut Oil Acid Soap) 如脚腿患此浮腫者。宜象皮布卷紮之。○大約鉛粉柏油汞劑。鋸養四藥。用治水磁癩。無有不愈者。惟用之得法與否。視病症之輕重有異。神而明之。在乎其人也。

大沙蹄即大腳風 初起名流火 Elephantiasis.

此症因頻發而成。發時身熱火也。治宜金雞那霜。安的拜林。并鮮檸檬果。

煮熟食之以及一切表劑。均不可少。惟當時無外搽之藥。○平時不發。宜外搽紅汞碘。并以象皮布卷包裹之。又宜改換水土。能使少發。○亦有用電震。或緊壓血管。或搽蜜蠟水。使之發炎者。均無實濟。○如極大重百餘斤者。多生於腎囊惟有割之一法耳。

氣珠變大 即喘咳 又名痰哮 Emphysema of the Lungs.

治宜審其病由。或因氣管舊炎。或因暴咳氣逆。以致咳嗽哮喘。治宜一止咳。二引痰。因痰不出。咳不平。厥疾難療也。如爲事業所致。如石匠春米等業。每有灰塵隨氣吸入肺體者。治照氣管舊炎症。○如氣管無病。平常不發之時。宜補益身體。通利二便。改換水土。吸新天氣。并內服鉢石。須經年常服之魚油。碘。碘劑善能化痰止咳。改病之要藥也又輕燎各劑。亦不能少。○如氣逆者。宜養氣。或得力平。呴嘔略、葡萄酒、松節油、郁加利達油。噴吸其氣。亦有用專器製成淨養氣。使病者吸之。喘可略平。所以使肺經炭氣呼出。加多患此症者。其心經每多無力

鬆大。故毛地黃。使得羅返得斯。茄菲精。馬前冰等劑。均宜服之。又宜住在山上。不宜在過高之山上吸淨天氣。

氣臌 Emphysema (General).

大抵由肺部破裂。氣入連網。迫入該處之故。病症甚輕。可用象皮布卷包之。自能消退。或以針刺放。或以小刀割之。橫按此症概不多見。中土所稱氣臌。想指病由言之。因氣而患臌。非真氣脹也。今所謂氣脹。不過氣由肺經迫襲頸部。或別部。第在一處脹凸。故以布卷包紮。自能消散。非若中土。每以水脹作爲氣臌也。治有天淵之別。閱者審之。

肺胞積膿 Emphysema.

治法知有膿宜放之。先用皮膚針抽試之愈早愈妙。須在腋下直線。在五六或七八條肋骨中刺之。如另有一處脹凸者。則在脹凸處刺放。或用抽氣瓶。或長套針。須連長條皮管一端浸在藥水大抵放至咳嗽氣逆頭暈之時。須將放管暫閉。使病者畧

安。再放。惟所用諸器。均宜先浸藥水。以防傳毒。且用套針。更爲穩妥。不致刺傷體肺。放畢。貼加波匿酸藥布。再以象皮膏封口。或用畧大套針。至放畢。不必將套管取出。即接以象皮管。一端浸入藥水。聽其漸自流出可也。如小兒。大約放一次足矣。如成人可放二三次。再不愈者。宜用刀在腋下直線。五六七條肋骨中。或背後肩胛骨下角直線。九十、十一條肋骨之中割之。須聞哥羅方。略使側睡。向無病一邊先割小孔。可容通瀉軟管插入。內實無孔探明肺體虛空之處。然後依內部之情形如何。須在膿積極低之處。沿骨之上廉割之。約長寸餘。如肋骨併合極近者。可將肋骨割出寸半。須留骨衣或先將骨衣剔開。用鉗翦去寸餘亦可。使內積成塊之膿。易於流出。且割後忌用包紮之法。肺難以呼氣運動管亦可宜以象皮管接引下流爲妙。所用挿入之管。宜以玻璃或焦木爲之。極好象皮如流出膿水變臭者。可用鍬鑿養。加波匿酸、硼酸、汞綠、碘、綠氣水、鷄那霜等。化冰射洗。○如久用上法。膿仍不止食宜精細養身之物。起居動定。咸當合宜。

心房發炎 Endocarditis.

此症概爲風濕發熱之病所累。或有風濕之病。治不合法之故。以致心房內圍心門各處發炎也。治法。有風熱者。宜靜養。切忌風寒運行。務須治之絕根。勿使少留餘波爲要。治不斷根久成此症○凡風濕心不痛者。身不熱者。沙利沙宜忌服。須服鋸炭養二分。合鴉片酒半分同服。○如心無力者。宜忽斯克。輕淡。毛地黃。或單服。或合服。均可。大約用地黃密合提神之劑爲要亦有用草烏豆者。大約在脈洪大時用之。如脈沈細。則忌用之。○外治。可用甘油。蘋茄膏。搽敷心部。或哥羅方合蘋茄搽藥。或貼蘋茄膏藥。或搽蟹螯水。○如防心房發炎處。有血團凝結者。每有氣逆。全身甚不舒暢等狀。宜輕淡水。

或聞之。或皮膚針射入。或內服。○如無危險之狀。宜輕淡炭養二錢。輕淡醋水六兩。相合。每六點鐘服一大匙。○如舊症無危險病狀者。宜數月內服鋸碘。○如心門房潰爛者。宜服加波匿鑄磺一藥。Sulphocarbolate of Sodium. 每服三分。日三次。或鷄那霜。汞雙綠。亦可服之。○如當時不服此藥。以致久潰。使心門牽制粘連者。則此生無可治之日矣。

子宮內炎 Endometritis.

此症處女不患。概因產後有血塊。或小塊胎盤內積。日久不出。以致發炎身熱。肚痛。治法。一。宜靜養。二。宜射洗子宮。可以加波匿酸水。或淡汞綠水射洗之。并以熱劑外壓。或以蘋茄膏合甘油外擦。或先射洗肛門。惟初起忌服瀉劑。痛者宜以嚙啡尖丸。納入肛門。或兼內服叱哩略雜散二釐。合半釐雞那霜。或在小肚肛門四圍。如病勢已減。可坐熱水盆。射洗子宮。宜以百零二度熱水漸加至百零八度。每射一次可用

十斤。內合半至一
兩加波匿酸

最妙以自下水射之。待內積之物已盡。後服鹽類瀉劑。兼

流血者。則以了葛精用針射入。○如舊症。則難治。宜補養全體。大約忌臥。須要運行爲妙。惟行經時
則宜靜臥其餘如飲食起居。大便胃口等。均與病症相關。

宜預治之。如有花柳瘰癧等體者。宜照法治。或常服鋸碘鉛石鐵酒等劑。○疼痛者。宜射入溫水。百零五度或坐熱水盆。或服溴雞那霜與輕衰酸。惟鴉片嚙啡綠養冰等品。則宜忌之。如隔時初發疼痛者。第服安的拜林大服能止。餘如印度蘇。哥地那。蘋茄。鬧羊花。謙落等。每有人服成癮者。宜慎之。大約蘋茄膏三分釐之一。印度蘇膏三分釐之一。哥地那精三分釐之二。成丸內服。或納入陰道。亦有用蠻螯水引炎。或草烏豆蘋茄樟腦等。合成搽藥。或鴉片膏藥均可。○至於子宮本部。一子宮倒曲者。宜用專器套入。使之挺直。如子宮口炎者。先洗淨。後將宮口割大張開。并以濃加波匿酸。或以一兩碘化在四兩加波匿酸。Iodized Phenol. 搽之。

或汞雙淡養水濃鐵酒銀淡養水淡酸等。均可搽之。○如子宮口有肉砂。兼發炎者。宜以棉花成團浸甘油塞入。每日一次效。如子宮用通管易入。并覺子宮內面高凸不平者。多在小產後數月有之。宜將子宮扣定刮淨。後以加波匿酸棉花揩淨。此法須在經行後九日刮之。每月宜刮二次。○亦有以小條鋸綠直挿子宮外。以棉花墊滿陰道。約七日後。將棉花取出。腐質亦下而取愈者。七日以後。常以水洗之。○亦有以埃及阿達方同法爲之者。有用淡酸等品同法爲之者。每致腹統膜炎而死。如用諸藥作痛者。宜在肛門納入嚙咷尖丸。并靜臥爲要。餘詳經痛。

睫毛倒刺 Entropion.

此乃睫毛倒刺。有向外者。有向內者。向外刺者爲舊炎。內皮脹凸之故。輕者搽銀淡養水。重者將內皮割之。且常使眼睫閉合。至愈爲度。否則雖割。仍向外刺。或因外皮縮緊。以致向外刺者。宜割開或另以好皮補。將外層與內皮縫合。自然向外翻矣。

癲症 俗名羊癲羊弔 Epilepsy.

治法分爲三候。一發病時。二將發時。三不發時。

一發病時。見症當使平臥。鬆其衣襟。如口噤咬舌者。宜張開其口。如係鐵牙宜取出之。勿縛緊強制全身。如四肢抽搐極重者。宜慎之。不使或傷。亦有病發當時壓住頸項脈管。宜慎可使不發。亦有以淡養氣滴巾聞之者。

二將發時。病人預覺四肢或木或癢。須當時刺錯該處。或將該肢紮緊。不使腦部留意該處之意。或將頸脈壓住。或覺一肌弔縮者。宜伸直之。反其所發之功力。往往有因此不發者。○或將發之時。聞哥羅方淡養氣輕淡鼻煙等品。

或踊躍行走。或大聲疾呼。均有使病不發之功。

三 不發之時。溴之鹽劑推爲妙品。惟須經年累月。常久服之。切勿間斷。大約至六月不發者。不至再發。○服鋸溴宜飯後每服二三分。如服後頭痛胃閉無力者。藥性使然。宜停服數日。至再服時。宜先服別種溴劑。或合輕溴酸同服。或輕淡溴。或鋸溴或鋸溴。調換服之。○如發病每在半夜者。宜臨睡時服半錢鋸溴。○白氏之方。鋸碘二錢。鋸溴一兩。輕淡溴三錢。鋸雙炭養一錢。高林布酒一兩。汽水至六兩。每飯前服一小匙。又臨睡時服三小匙。至飯後則服鉛石燐酸。呻嘶頓等。一切補劑。○如輕症。Petit-mal。宜輕淡溴或多。鋸溴減少。○重症止者。宜鋸溴或多。輕淡溴減少。大約溴劑依各人體質或多或少男女老幼服無定數。惟服藥須有一定之時。○間有久服溴劑。面發疣瘡者。須合鉛石水同服。亦有服溴劑毫無功效者。須服蘋茄膏。服之每四分釐之一。漸加至釐半。或服蘋茄酒分半。或服了刀邊水三四滴。或蘋茄火酒流膏六分釐之一。服此仍不效者。宜銅銀鋸金鉛石燐鋸。鋸矽鋸之鹽類等類。如輕淡磺銅 Ammonio Sulphate of Copper。每四分釐之一。成丸服。少兒或銀淡養四分釐之一。或銀養一釐。每日三次成丸服。或溴鋸 Bromide of Zinc。每服半分。合水或甘油服。每日四次。或服鋸養一分。或鋸磺養六釐。或鋸醋四釐。或甘松鋸珠每服四釐。或鋸燐養每服二十五分釐之一。或金綠金鈎養。或鉛石水。或燐魚肝油。或錯草酸。每服三釐。或鋸合溴或鋸合溴或硼砂。每服二分。或鋸綠每服一二錢。或鋸淡養 Nitrite of Sodium。每服一釐。日四次。有花柳體者。宜汞碘劑。或綠養冰。或安的拜林。或撥拉兒海達。或樟腦。淡巴菰。阿魏。毛地黃。松節油。印度麻。了葛。哥根。荳菲精。哥地那精等品。均可試用。亦有電震之。或迷蒙之 Hypnotism。或壓住項脈管。或項後弔炎。或肌肉穿線。每日拉之。以引炎。或背部揩冰塊。或搽巴豆油。至其飲食。最宜謹慎。大約宜蔬

食爲妥。至數月不發者。惟蛋魚可食。肉食仍宜忌也。

淚管閉 Epiphora.

此因淚管閉塞。以致流淚不已。治宜刺通淚管。并以歛藥外洗。如通後再閉者。宜割之。至總管爲度。自能流通。

鼻衄 卽鼻血 Epistaxis.

如血旺肥胖頭痛者。能鼻血則佳。所謂以病治病也。至平常鼻血有能止者。有難止者。治宜仰臥。頭宜兩手高提。以指揩定鼻翼。或以冰塊壓在太陽。西俗輒以鐵匙納諸脣後謂能止之

或引血下行。

如熱水瓶熱水盆芥辣膏等

重者以白礬水。

足炭

匿酸。

松節油

酒濃鐵水。哥老典恩等品浸棉花塞在鼻孔。○偉氏法。先將鼻孔揩淨。

用拍夫罷兒。Puff-Ball (Lycoperdon Giganteum.) 成粉洒入。立能止之。過三

四日。藥與血塊。自能脫下。亦有用止鼻血象皮袋。塞入鼻孔。抽氣放大能止之。或以止血各藥浸棉花。縛以線。自喉向鼻孔拉出。或以歛劑藥

水洗之。洗時自左孔灌入。灌入時頭宜畧低。口宜張大。則藥水自右孔流出。不至溢入喉內。或以檸檬鮮汁射洗。或以熱水射洗均可。或噴射收歛藥粉。惟了葛一藥。或服或射。於此症均無功用。

流火 又名癰疽又名血蛇 Erysipelas.

一、內治。二、外治。古法以吮血放血泄瀉治之者。甚不合宜。近來治法務須飲食精細易化。極重者另服忽斯克酒。或與飲食合服。不必服病輕者初起發病宜輕利大便之劑。如汞丸或鎂礦養可也。并內服鐵綠酒。每服半至一錢。日三四次。如身熱者。兼服雞那霜。先高拿定酒。可服四五釐。每四五點鐘服一次。如心經無力者。宜輕淡香酒一錢。合白蘭地半兩。每二三點鐘服一次。亦有專用草烏豆者。須慎用之。大約熱重皮乾舌有苔脉洪大。體本健壯者。可服。每二點鐘服一次。每次一二滴。連服二三日爲妙。亦有投以鈍錫葡萄加波匿鑄。或鑄安息。或硼酸。或蘋茄。或毛地

黃輕淡等劑。以補其心。或用比魯介賓射入五分釐之一。○外治之法。宜搽滋潤之藥。不使遇著天氣爲要。可以麥粉漿粉合硼酸或鉛粉。鉛粉油。均可用之。或敷象皮水加波匿酸一至八。或蘋茄合甘油。而最妙用偈克坐兒闌納林各一分。調勻搽之。後以沙利沙棉花包之。○一方。鐵礦養一錢。豬油二兩。調勻搽之。或以石炭養一分。豬油一分。每百分再加大分加波匿酸。搽之均可。欲使病不漫延。可以銀淡養一化水二十分。或乾塊。或鍉搽藥。搽敷一條。或緊貼膏藥一條。或包以象皮布卷。或搽哥老典恩。不使血中之蟲漫行。則赤熱不至逾越搽藥之處。亦有射入加波匿酸。沙利沙酸水。及礦加波匿鉛。力坐新等品者。但多危險。概不用之。○柯氏方。克羅林一錢。埃阿達方四錢。闌納林十錢。調勻搽之後。以油紙包裹之。又幾阿蘇、鐵酒、礦養酸、鉢油粉。加波匿酒、松節油、碘酒、汞綠、銀淡養、毛地黃、銻錳養等。均有用之者。大約此症。均宜外用之。并以汞綠水洗之。

紅斑

卽風斑之類又名赤遊風Erythema.

此症概爲胃病所致。如胃病去斑亦退矣。大約爲食豬肉蛤蜊。蝦蟹之類與鹽肉之故。病者宜忌之。或服松節油、銻碘、哥拜巴、畢澄茄等劑。亦能致之。其有自發者。宜鑄雙炭養或銻雙炭養半錢。鉢炭養一分。奇拉大湯半兩。作一次服。○又方。鎂炭養水十兩。大黃酒兩半。甘油半兩相合。每服一錢。日三四次。飯後兩點鐘服之爲妙。亦有另加銻錠葡萄二釐。以治舊症者。如服後不瀉。再服鎂礦養二至四錢。化在鑄銻之荷蘭水服之。如五臟有病。均照病治。如極癢者。宜以蛤蜊或鉛醋水洗之。○一方。鑄或

銕炭養半斤。化二十斤水沐浴可也。亦有以熱水沐浴後反重者。可以六十兩。酒十兩或加火搽之。再不效者。宜以硼砂一兩。化水六十兩。或輕衰酸一錢。合水十五兩。搽之。再以油紙包之。○一方。挨地壳倫香水二兩。鍾養半錢。卡而白兌對兒琴水半兩。汽水十七兩。相合用海棉花搽抹各處。○此症治法不一名目亦異。有稱爲輕流火者。有稱爲紅片者。亦有形如小疹極痛。兼有全身之病者。宜以鉛醋嚙啡。或哥老典恩搽之。或將患處高擋。或包布卷。大約忌用壓藥。不得已宜用芝蔴粉○亦有一種因肥胖腕節等處赤腫者。須抹乾勿使揩擦。另以鍾養粉富羅石散等洒之能愈。如小兒臍腿臀部。因濕紅熱者。宜鍾養油一二兩。爐甘石一二錢。漿粉四錢。相合搽之。

胎成膀胱漏 Epispadias.

此由胎成。在小肚前穿孔。通至膀胱。治宜割之。將邊肉補滿。此孔可也。

口中生瘤 又作齦瘤 Epulis.

凡口中牙肉所生之瘤。均以此名。治宜割之。

骨瘤 Exostosis.

此瘤由骨而生。治宜鑿去或鋸割之。大抵不必治。亦有將瘤四圍之肉括去。搽以礦酸。日久骨死割之。此症無毒不能驟大。雖終身經來行房謂之犯經。有此毫無緊要故不必割之。

子核受胎 Extra-uterine Foetation.

子宮本受孕之具。而今反成孕於子核卵管者。西名法 Fallopian tubes. 其殆羅兵其殆由子宮舒縮太過。抑犯經謂之犯經之過歟。是未可知也。醫者審明此症。宜令靜臥。不使驚霍。其或痛如分娩者。宜用嚙啡。間有胎兒長大。以致子核一時破裂者。不治。故宜及早割之。割法與割子核之法同。審明部位。割入。將子核捐出。夾於割口縫住。再將胎兒割出。惟胎盤當時不必取

出。通以皮管。每日洗之可也。割後困倦者。宜射呻呻。亦有不將胎盤取出。第洗之極淨縫合之。謂自能化散者。亦有不將胎兒割出。第放胎水。或電針刺。或射入咖啡半釐。或服汞劑至流口水爲度。或大服馬前冰。與了葛。或大瀉之品。均能使胎兒變死。或謂孕婦染種花柳。使胎兒死。亦可說不可行之法也。西律所禁。醫宜知之。

燕窠瘡 黃禿瘡 又名雞屎堆 Favus.

此症由鼠染之於貓。由貓再染之於人也。治法首宜補其全身。凡起居飲食均須合宜。此症有蟲。Achorion Schönleinii。故當先去膿瘍。大概壓劑無效。不如以煤油或酒之搽藥。搽之爲佳。或治金錢癬諸藥。均可用之。或以硫養酸搽之。或噴氣射之後。用汞綠水一至二百五十內
有火酒甘油各半洗之。或幾阿蘇力坐新加波匿酸。沙利沙酸。薄荷油。均可化酒。并合以哥羅方水少許洗之。○如用油藥。最宜碘磺二分。調油一兩。或汞油粉調油五至百分搽之。

亦可。

輕熱症 Febricola.

此非傷寒瘧疾等熱症也。不過輕熱。約四十八點鐘自退。但亦有不治之而變重者。宜鎂磺養瀉之。衣服輕鬆。飲食宜流質易化之物。如皮膚乾燥者宜表之。或利小便。○一方。草烏豆酒一分二。樟腦水六兩。每一點鐘服一小匙。○又方。輕淡醋水二兩。甜消呻呻二錢。鋸檳鹽五錢。樟腦水到八兩。每一點鐘服半兩。或以檳榔鮮汁合清水。或麥汁隨飲可也。或以檳榔糖合鋸水隨飲亦可。至於安的拜林。金雞那霜。甯不用爲佳。

熱症 Fever.

此係總名。輕者已詳前篇。重者觀後傷寒。小腸壞。風痛。癩瘡。玫瑰紅等症。

作氣又名腸風 Flatulence (See under Dysp^psia.)

詳見卷一胃滯篇。

骨折 Fractures.

治法。宜將斷處或錯處合齊。一如未斷完骨之式。當審明斷處之時。不可過於用力。務使肌肉放鬆。并使斷骨兩面。畧離少許。合齊爲要。後以板皮或鐵皮等。包紮之。切勿有過緊過鬆之弊。如欲常見斷處情形者。須在斷處留空少許。以便隨時觀看。不必將包布盡解去也。後宜平臥板牀。不可頻動。至斷處生合爲止。○大約幼年骨斷。一月可以生合。壯年約六禮拜可以生合。衰弱者約八禮拜方能生合。大約過三禮拜。可以解去包布。推拿該處。片刻後再包之。或另換石膏布。牛膠布。卷等可也。○如傷處破損。或有碎骨。宜留孔處。或將瘀血與碎骨割出爲妙。

雀斑 Freckles (See Chloasma.)

已詳卷一雀斑篇。

血瘀不行 與凍傷同 Frost-bite.

此乃血脉凝滯不行。如死肉症初起是也。或一處統病。或第在皮膚。大約木不知痛。冷而變瘀。當時或以手擦之。或以雪揩之。使血速行爲要。後宜衣服煖熱。最妙以皮次法闌絨。次棉花。包裹之。其病重者。卽死肉症。宜以戒毒藥水洗之。加病處與好肉分明判然者割之。

疔瘡 Furunculus (See Boils.)

見卷一疔瘡篇。

胆淋 Gall stone

治法。一。淋過胆管疼痛之時。最宜嚙啡三或四分釐之一。射入皮膚。或服鴉片二釐。綠養冰二分。或蘋茄膏三分釐之二。安的拜林二分。呻吟三分。松節油二分。或熱水百零四至八度沐浴。或久浸水中。至覺倦乏爲止。內飲

熱水。或合鑄炭養同服。或用鋸礮養半錢。或鍊錫葡萄一釐。或吃暉略二分。阿伯嚙啡十分釐之一。或芥辣一二錢。合溫水十餘兩。等品吐之。如以上諸法無效。宜聞哥羅方。或呻吟可也。○一方。薄荷油二錢。哥羅方酒六錢。礮強呻吟酒四錢。嚙啡水四錢。印度麻酒二錢。輕淡香酒到三兩。相合。每服小匙。合大匙忽斯克酒與水。每半點鐘一服。痛止爲度。痛已止。每四點鐘再服。此方頗效。○如淋過胆管。嘔吐極重者。宜以檸檬汁合蛤蜊沸鹽服之。或吞冰塊。或服鉢淡養。輕衰酸等。胃部宜貼芥辣膏。或服嚙啡丸。十六分釐之一。○病後宜多運行。凡居家事業。亟宜改之。須常運行。通風爲要。飲食宜節。不可過飽。凡漿粉類。豬肉油類。均宜切忌。○亦有在肝部之上。手搘之極緊。後忽離去。使肋骨一時高鬆。或謂此法。能使胆淋易過。^二化胆淋法。或謂松節油有化淋石之功。每服一分。日三四次。宜久服之。又當多飲蛤蜊泉水。能使不發。或服鍊雙炭養半錢。鑄炭養半錢。鑄燐養半錢。硬皂分半。鑄沙利沙二分等品。均可服之。亦有投以生胆汁之藥。謂胆汁多。不致成淋。或服瀉肝之品。如輕綠淡酸半錢。洋合莞一釐。加路迷一釐。綠汞碘八分釐之一。布道非連八分釐之一。均可服之。亦有每服橄欖油二十至四十兩。或每二點鐘服五六兩。恐此法亦無實效耳。○偉倫氏常投以加路迷半。兼服草蘇油一兩。能將胆淋瀉出者。○亦有用電震之者。○倘胆淋頗大。胆管閉塞腫脹。或因而潰爛者。當卽開刀。宜在右肋腹右直肌之外旁。離第十條肋韌骨約二寸處。與第十條肋骨平約割二寸長。將指探入。摸明胆囊。後以放針刺放胆汁。再將膽囊扯出。伸長。割開。以胆之割口。與肚之割口縫合。如內有淋石。可以鉗拔去。或以匙括去。後納入皮管。漸使收合。

筋小瘤 Quesiton

此瘤多在手腕環筋有之。其中係流質黃水。治法。將手伸縮極緊。使瘤

處扯直刺之。或擊之使破。破後漸能消散。或以小刀割之。如治後重發者。外貼蠚蝥膏。或搽碘。或藥。或以絨布包紮極緊。或其中有小核如黃瓜子者。宜割盡。用藥水射洗。

死肉症

傷寒之後患者
名曰脫脚傷寒

Gangrene.

此乃一指或一肢忽變死肉之症。治法。患處不大者。不必用刀。聽其自脫。或以熱劑外壓。如麥皮炭粉等類。如爛處與好肉分離者。宜當時割之。如因跌打或用刀後有死肉症者。即醫局死肉症聽之不可卽行割去。宜先顧其精力爲要。如年老死肉症。必待死肉與好肉分離。方可割之。凡見醫局之死肉症。宜另住通風之室。并服提補之藥。大服鐵雞那霜可也。其已死之肉。宜以濃解毒水洗之。或濃加波匿酸淡酸等爛之。大約每日須洗換數次。愈潔愈妙。

胃腦筋痛

亦有誤作心痛者
或稱謂肝胃氣痛

Gastralgia.

一發病時治法。宜服鴉片。或印度麻酒。或射入咖啡水。又綠養冰一分。安的拜林一分。哥羅方或呻呻五滴。淡甘油淡酸一二滴。鈎雙炭養半錢。薄荷油五滴。加絕布的油四滴。幾阿蘇二滴。蘋茄酒二分。輕衰酸四滴。等品均可用之。而偉倫氏。每以鑄炭養四分。合咖啡八分釐之一。作一次服。極有功效。外部宜貼蠚蝥芥辣膏。或電震。或飲溫開水。加重者或胃部用針刺。或擦草烏豆蘋茄樟腦搽藥。○二未病時治法。宜審其病由。是否胃炎。胃爛。或胃癰等症所致。均宜照法治之。如無病據可得。惟投以治胃腦筋之劑。每日服雞那霜二至五釐。日三次。或鉛石水每服二滴。飯後服之。或白礬每服分半。宜飯前飯後適中之時服之。或謂鉢炭養每日三四次。每次半錢。極效。或謂炭粉亦效。亦有用銀淡養半釐。銀養一釐。或鋸養。或甘松鋸珠每半分。或了葛精或鉢碘三釐。或沙利沙精三至四分半。或沙利沙酸二分。或力坐新半分。或士的年。馬前巴。

卑粉、卑百新、甜肉汁等。均有用之者。

胃爛 Gastric Ulcer.

此由胃經久病而成。治法最宜安胃。不使運動消化。是非一靜臥。二禁食。食物由直腸射入不可。又須內服嚙啡。鴉片。哥地那等品。安其胃經爲要。如肛門射入食物。大約至多五兩。中數三兩半。其可用之物。如牛汁。牛乳。雞蛋。漿粉。藕粉等。并合小匙貝氏甜肉流質。Benger's Liquor Pancreaticus。并鴉片酒少許。如病勢不重。無嘔吐疼痛等情者。可以少坐。略進柔弱精細易化之食物。如牛乳等切勿過多。并以蛤蜊水合牛乳同飲可也。病若漸愈。漸進食物。惟牛汁。絕力凍。牛乳等。可常用之。凡堅硬不化油煎燒烤之物。以及酒糖切宜忌之。○如一時吐血者。宜以了葛射入肛門。或射入皮膚。或服松節油。海士林。每服一錢鐵綠酒。檳榔雜粉。或有時服鎂礦養。與菓子鹽以瀉之。餘詳流血症○如吐者。宜鉢淡養。冰塊。輕衰酸。幾阿蘇。嚙啡等劑。○疼痛者。宜外部引炎。或服或射嚙啡。亦有用嚙啡無效。服了刀邊水半滴而得愈者。○一方。鉢炭養二錢。淡輕衰酸一錢。嚙啡水一錢。樹膠水六錢。哥羅方水到二兩。相合。每服一小匙。每三點鐘一服。有時每次服鉢石一滴。善能止痛止吐。又炭粉。幾阿蘇。印度蔴膏。每四分之一蛤蜊泉水。硼砂。小服卑百新等品。凡吐而痛者。亦可用之。○又方。鉢炭養二分。鉢炭養一分。蘋茄酒一分。合作一次服。每日三四次亦效。○如胃內發炎者。○一方。鉢雙炭養二錢。鉢碘三分六。淡輕衰酸三分六。龍胆草湯至六兩。每日三四次。每服大匙。○如胃內爛者。宜外部引炎。搽蠻蠶水。或服銀淡養。每二釐成丸服之。或銀養。每三四釐成丸服。或汞雙綠。五十份釐之一。或鉢雙鎰養。每五十分釐之一。或電震。或藥水射洗胃腕。宜用哥羅方或幾阿蘇水。四分化四十兩硼酸水。二錢化水四十兩鹽水。硼砂水。二錢化四十兩或鉢錳養水洗之可也。○如胃經潰爛穿孔者。不必治。亦有使之靜臥勿動。由胃外部

割入。洗淨破處而取愈者。但極少耳。

胃炎 Gastritis.

此症分爲新舊兩種。新炎嘔吐作痛不食者。治與胃爛相同。并去其病原。如酒與服毒等外用蜞吮蠚螯弔炎。或以冰塊或熱劑外壓。最妙以鴉片射入肛門。或以嚙啡內服。或射入皮膚。或服加路迷一釐。善能止炎。不使病發。又鉢炭養輕袁酸亦可服之。○舊症概爲飲食不節。或飲酒之故。治法詳胃滯篇。或謂服鉢炭合鉢炭養。極效無比。

軟脚 或跛足 爲膝節筋網 無力之故 Genu Valgum (Knock-knee.)

此症爲腳骨無力支撑。因而彎凸或向裏偏。則兩膝相碰。或向外偏。則兩膝相離。概爲飲食不敷。以致補身之料不足。或因骨少土質之故。或土質足而身弱遺體之故。初起覺察。即宜靜臥。不得行走肩挑。其飲食最宜精細。并推拿膝節肌肉。或善法包裹。使之伸直。或用專器輔紮爲要。如腳已彎形。無法使直者。宜將大腿骨內輪內面割一V字形。使直。如彎外者。則在外輪割之。

馬落鼻 Glanders.

此乃毒症由馬染之於人。或由傷處傳染。或由呼吸傳染。治宜提神。飲食宜佳。牛乳牛汁宜多飲之。如有瘡瘍者。毒即由此傳入。當搽銀淡養水。或及早開刀。或射入解毒之藥。其內服惟有鉢加波匿磺。每日三次。每服二分。或雞那霜。每服五釐。憊乏者。宜大服輕淡。亦有投以馬前冰。鐵、加波匿酸、碘、砷石等劑。或搽以汞油。或以松節油。加波匿酸。噴食其氣。其餘痛。吐。發熱。瀉汗者。均照法治。

綠水眼 又名青冒 其實大房 變大也 Glaucoma.

治法甚難。惟伊斯林。卽加拉巴豆精。一釐化水二百五十滴。滴之爲最可靠。其功能縮眼球。或射入嚙啡。或蜞吮。或壓熱劑。或服鹽類瀉劑。養佳 鑄磺

均可用之。惟蘋茄、了刀邊。切切忌用。亦有預早做假瞳神。須割去眼簾五分之一。割口宜大。且極近白衣邊割之。雖血多無碍。亦有用尖刀在白衣近眼簾後刺入。以放後房之水。或刺放前房之水。成割去白衣一小圓塊。均可試治。

淋濁 Gleet.

新者謂濁。舊者謂淋。糾纏不愈。故稱淋濁。均由白濁而起。治法。病根已深。凡治濁之藥。均不必用。惟顧其大便胃口。并審其溺中有否草酸之質。凡茶酒辛辣油煎厚味房事。均宜切忌。不可久臥不動。不得過於行走。常以冷水沐浴。吸新天氣。內服鐵綠酒分半。雞那霜三釐。同服。或服呻嘶頓補藥。亦有服蠻蠻酒者。但不甚妥。不如服硼酸。每服一分臨睡時服。松節油爲妙。○外治之法。最要者以通管通之。先搽甘油硼砂。每七日兩次。可免溺管生窄之弊。用通管時。亦有以海士林油。用埃阿達方半錢合海士林猪油一兩。或加波匿酸。力坐新銀淡養。

養。

牛調油一兩各半分至分

或哥拜巴檀香油。或碘磺油各半分調油一兩。調油擦在通管。兼治其病者。

亦有以諸藥製成通管通入。使其自化者。

製法如尖丸用黃蠟哥哥白塔甘油凍所成

或以諸藥化水射洗溺管者。如銀淡養水。

二分化水一兩

連射二十日。射後宜睡臥片時。痛者先射哥根水以止之。或以鏗礦養。

三釐化水一兩

銀淡養。

一釐化水一兩

碘酒。

五滴化水一兩

汞雙綠。

一釐化水

化水

沙林礦 Sulphate of Thallin. 五釐化水一兩

炭匿酸。

五釐化水一兩

埃阿達方。

二分化油一兩

克羅林。

五分化水百分

鉢半錢化樹膠水一兩。鉛醋。

一分化水一兩

銅礦養。

三釐化水一兩

射油三十分。鋸加波匿礦。

Sulpho carbolite of Zinc. 二釐化水一兩

銚鑿養。

一釐化水一兩

射洗也可也。又在會陰宜引炎。使積熱散。則淋濁自止矣。

舌炎 Glossitis.

爲服汞劑碘劑過多。或爲口瘡花柳所致。重者腫大。壅塞喉管氣逆者極險。宜在舌之上面直割兩條。或能將舌扯出放血。或蜞吮。或以加波匿酸。一錢化水十二兩 銀綠。三錢化水二十兩 硼砂。或硼酸。四錢化水二十兩 白礬。二錢化水二十兩 等洗口。或外壓劑。或

噴射藥汽。或大瀉之巴豆效。如有膿者。宜刺割。後以鍊錠養水洗漱。○如因花柳所致者。宜服汞與鍊碘。或以汞雙綠水。水四兩 膏一錢含一刻後吐出。切勿咽下。餘同口瘡篇。

頸癰 Goitre.

治法。首宜改換水土。因病原多因所飲之水欠潔所致。內服最可靠者。卽碘。鍊碘。與淡輕弗酸。半釐化水一百滴每服十滴。或外搽碘與蟹螯。或碘酒一分。

碘搽藥一分。相合搽之。或搽碘油。或以紅汞碘油。三錢調油一斤搽擦一刻之久。

後向日曬之。至覺熾熱。再搽少許。能退亦有以線穿過該處。時時拉勤

之。亦有射入碘酒。

碘片二十五滴酒

每七日兩次。射入時須留心血管喉管。簡法

可以細帶扣緊癰之下廉。然後射入。且每射一次。不可依照原處射入。

○亦有刺以電針者。○如治之無效。漸大以致氣逆閉塞者。惟有割之一法。但必須至無可如何。不得已之時割之可也。○另有一種癰中有

袋瘤水汁者。Cystic Goitre. 宜用套針刺放其水。放畢。射入鐵綠水。

二分半化百份

約一二錢。後將套管之口閉塞。過七十二點鐘後。放出。如無膿水一同

流出者。再射一次。使內皮發炎變膿。後壓熱劑。并以藥水射洗。至淨爲

度。如袋瘤不消水出稀薄者。宜以鋸綠水洗之。又有以貓腸線浸碘酒

塞入其中者。亦有將袋瘤對半割開。與外皮縫合。再塞以碘酒棉花者。

大約袋瘤不能盡行割出

○更有一種病在眼根者。名曰眼癰。Exophthalmic Goitre. 其病狀

眼凸。如大房變大外凸之形。此症不治。概服碘鐵雞那霜。宜久服不斷。

其餘如蘋茄砷石銀綠了葛毛地黃甘松等品。但不甚效。亦有以使得

羅返得斯酒二至五滴。合司把丁。Sparteine. 四分釐之一。每日服三四

次。能漸退。因此症之脉多速。此藥善能平心緩脈。故能治之。或以電震。

并飲食起居合宜爲要。

白濁 Gonorrhœa.

此症必由秦樓楚館得之。染毒而成。毒至溺管。因而發炎。使津液變如膿汁。色白而黃。重者有血。滴瀝不止。故稱白濁。大約分爲新舊兩種。均有一定之治法。大抵得病之後。未發之前。宜用熱鍊錳養水。一盞化水五兩射洗溺管。其性潤善能解毒。用後不使病發。如病已發。此藥可加倍用之。切忌哥拜巴。華澄茄。銀淡養。銅礦養等斂劑爲要。又忌行走。飲食宜清淡。凡魚肉牛乳茶煙酒。切宜禁忌。并服鹽類瀉劑。熱水沐浴。渴者宜蛤蜊水。或檳榔水。○病重腫脹。澁痛。全身不舒者。宜○一方。錫葡萄散釐半。輕淡醋水二兩。草烏豆酒一分。樟腦水至六兩。每兩點鐘服一大匙。另以熱水頻洗陽莖。有時可用冷水洗之。如初起陽物強舉不倒者。可以熱水射洗肛門。後以○一方。蘋茄膏四釐。嚙啡三釐。樟腦四分。哥哥油七分。相合分爲八丸。納入肛門。○又有內服鴉片。樟腦。或嚙啡。樟腦。或鍊澳洲。每服二分。樟腦五釐。綠養冰一分。相合服之。又如印度蘇。閻羊花。樟溴。了刀邊。草烏豆。了葛等劑。均無實效。○如疼痛者。可以哥根水射入。○至病勢已退。疼痛漸去。小便無阻者。已是舊症。此時第一要藥。卽哥拜巴是也。宜久服三禮拜二惟此藥氣重難服。且服後胃多不安。宜成蠟丸服之。或○一方。華澄茄粉二兩。鍊淡養粉二錢。吃哩咯雜散半錢。哥拜巴漿足用。調成稠膏。每飯後兩點鐘服一粒。如黃豆大。○又方。哥拜巴漿六錢。鍊水三錢。樹膠水一兩。甜消呻呻三錢。桂皮水五兩半。調合。每飯後服半兩。或服檀香油。功用與哥拜巴同。大約每服二分。亦有服蜜螯酒。但易累內腎膀胱之病。宜慎用之。其餘如白哥。安息酸。沙林。沙羅。松節油。海士林。印度蘇。亞拉白丁。等品。Arbutus均可取用。但無大效。○至病情盡退。哥拜巴止服。宜服鐵劑。如忽然病發再炎者。哥拜巴宜停。仍如新炎之法治之。凡射入之藥。均宜溫熱。切勿冷用。大抵先以溫水射洗。後射入藥水。擠住馬口。不使射入之藥流出。片刻之後。將藥放出。再射。每

一射約三四次可也。○亦有以汞雙綠_{半釐化水 十六兩}每兩點鐘射洗一次。至三四日後可加濃一倍。再不愈再濃一倍。此法取效甚速而妥。○亦有以銻礦養。

{一釐至五釐 化水一兩}銻礦養。同法射洗。○亦有以銻醋{二三釐化水一兩}銻綠_{半至一釐 化水一兩}銻加波匿礦。

{二釐化水一兩}加波匿酸{六釐化水一兩}綠養冰_{二釐化水一兩}硼酸_{一分化水一兩}銀淡養_{四分釐之一 化水一兩}鉛醋_{三釐化水一兩}

炭匿酸_{半分化水一兩}白礬_{三釐化水一兩}克羅林_{六百分化水一百份化水一兩}埃阿達方_{一分化油一兩}鐵綠水_{一滴化水一兩}檸檬

酸二釐或沙利沙酸八分釐之一。化水一兩。或偈克坐兒_{一分化一百份化}均可射洗溺管。其中以銻劑爲最佳。銀淡養用後極痛。故鄙之_{一釐化水六兩 用之不大痛}○亦有以諸藥製成通管。通入溺管。待其自化者。○如婦女患之。治法同。_{志按中醫在陰道子宮謂白帶病在溺管卽白濁也}常以熱水頻洗。至愈時。宜以硼砂一分合白礬一分。取其一匙。化水六十兩。洗射陰道與溺管。○如因此累及膀胱發炎者。詳觀首卷膀胱發炎篇。

酒風或骨節脹大膝 患此曰鵝膝風

Gout.

治法分三候。一初起。二發時。三舊症。

一新病初發。During Acute Attacks. 一內治。飲食最宜湯類。切忌肉食。至

發病次日。凡滋潤牛乳牛湯藕粉等。少可食之。_{指虛弱者而言}或謂初起專飲湯

水爲宜。或謂初起專食乾糧爲宜。二說均有偏見。大低年壯者患之。飲

食宜清淨乾物。_{如慢頭與茶而已}不可肉食。如虛弱者_{病已久發}患之。飲食畧宜加厚。_{如牛乳牛汁等}

惟酒與此病極爲不宜。切切忌之。萬一有難戒者。則宜忽斯克。_{無忽斯克則用白蘭地}

合飲食同服。如新病已退。飲食可以如常。惟菜與蛤蜊爲尤宜。至其

吐瀉_{多則}初次可服哥支噤。葡萄酒四十滴。後每四點鐘服十五滴。足矣。或恐嘔

噤。可再略減。或獨服。或合鋸炭養。與檳榔鮮汁沸時服之。○一方。哥支

噤。葡萄酒四錢。鎂礦養一兩。鎂炭養二錢。薄荷水到十二兩。相合。每四點鐘服一兩。○如病者極形憊倦。或嘔瀉者。哥支噤宜停服。另服大黃丸

與哥羅新丸瀉之。或服布道非連四分釐之一可也。○疼痛者。宜鴉片。綠養冰。咖啡等品。或以咖啡射入。極有效驗。○如溺赤短促。皮膚乾燥者。忌服哥支噤。宜以鋰檸鹽。Citrate of Lithia. 三釐合五兩鍊之荷蘭水。或加少許檸檬汁同服。每四點鐘一服。○不睡者。宜臨睡時服二分撒弗那兒。或大服鍊溴。○近來以鎗沙利沙。代哥支噤者。其功能解血中之溺酸。與熱。初起每服三分。後服分半。其功亦效。^二外治之法。疼痛不甚者。以棉花油紙包裹。或以軟墊墊之。切勿用亞力加與放血蜞。吮冷熱壓劑等法。可以菊花或瞿粟花蒂泡水壓之。或浸熱水。或蘋茄合烏豆搽藥。又如哥羅方、蘋茄、薄荷油、菸葉、哥根、綠養冰、鍊碘、碘搽藥、沙利沙、加絕布的油、埃阿達方、咖啡、了刀邊水。^{一或二錢化水一錢}或火酒所成搽藥。或呻吟等。均可試用。

二 發時或作不發之時。Between the attacks. 起居。飲食。風寒。均須慎而又

慎。如有酒風遺體者。其飲食更宜謹慎。平時飲食寧主清淡爲要。^{第求補身足用而已}凡使身體肥胖之物。切宜避忌。^{肉可食宜瘦不宜肥須飲其汁不食其肉}卽漿粉糖類蕃茹水果糕餅等類。亦不可食。惟魚與雞乳白塔乳油菜等類。與病無碍。可常食之。又

宜多飲清水。沖淡津液與血。此外又須每日在空曠之地。量力行走。^{汗爲至有}

度馳馬乘輿
概不合宜

又宜早睡早起。勞其形骸。切勿偷安。常睡。一切氣惱忿鬱。均宜

避忌。○如骨節腫大者。勿多行走。宜推拿法。或以熱水被單引汗。或遷

至高燥相近蛤蜊泉水處居住。以便不時沐浴。并飲其泉水。^{如不能至藥泉處可}

以購飲佛絕水各藥泉內服之藥。宜蛤蜊劑。能使血中酸質改變。由便溺而出。其中以鍊炭

養。每服二分。日三四次爲佳。^{服後變血中之猶勝克酸爲猶勝克鍊}

或佛絕水。鋰炭養。或佛絕水。鋰炭養。或

鎂水灰水。并鎗沙利沙。或沙利沙酸。均可服之。^{或謂服此能使血不發酸質}

又安息酸。安息鎗。安息鋰。輕淡燐。^{每服一}或鎗燐養。或輕淡綠。均能制病不發。

三 舊症。 During the chronic stage.

凡輕淡鎗。鎗燐養。輕淡綠。與鍊碘。均可

服之。○一方。銥碘二錢。銥炭養六錢。哥支禁。葡萄酒二錢。樟腦水到十二兩。每服半兩。合二兩水。每日三次。飯後服之。又圭阿襟。每服半分日三次。兼骨節痛者極效。○又方。圭阿襟。松香粉一兩。淨礦粉二兩。大黃粉半兩。芥辣粉二兩。銥淡養四錢。白蜜足用。調成如膏。每服一錢。早晚一服。○總之。此症綜治。無論內外藥法。果能使血中已有溺酸。易於遺出。并不使再發溺酸。則病無不速痊。再無復發之患也。然而難矣。

嘔血 Hæmatemesis.

嘔血胃血也。概爲胃經癰瘍之故。已詳治宜勿動。吞食冰塊。飲食宜由肛門射入。極重者。宜外壓冷水。或芥辣膏。或火酒烙之。或脚浸熱水。另以鴉片嚙啡納入肛門。或以皮膚針射入嚙啡。○止血之品。最宜以了葛精。用皮膚針射入。每四點鐘射一次。或內服每一分。不效者可服炭匿酸一分。化冰水服。每兩點鐘一服。或鐵淡水。鐵綠水。鐵礦養。均可。其中以鐵綠每服三十滴爲最佳。或鉛醋每二三點鐘服一次。每次服五釐。隨做隨服○一方。鉛醋一錢。淡醋酸一錢半。醋強嚙啡水二錢半。汽水到八兩。相合。每二點鐘服半兩。或白礬每服一分。每半點鐘服一次。過多則吐或沒石子酸。每服半至一分。日數次。惜取功太緩。宜合礦酸同服。則佳。亦有以加美拉、檳榔、紅蘇木。或銀淡養一釐成丸服。或吃嚙啡。或酒一二滴。或幾阿蘇成空丸服。○亦有吐血不由胃爛。因肝大脾大。胃經積血。脹瘀而吐者。宜鎂礦養或加路迷瀉之。或利其小便。或外壓冰塊。脚浸熱水。或服海士林。最妙以海士林合輕淡同服。或合以上各藥同服。則效。○如爲血液之病而吐血者。宜服松節油冰塊鐵酒等品。如皮膚有血癥者。內部屢多流血。

汗血 Hæmidrosis (Bloody-sweating.)

此症極少。概不多見。可以自愈。婦女倒經者亦有患此。治法無別。症者不必治。兼別病者宜瀉之。使血下行。

溺如血色 Haematinuria or Hæmoglobinuria.

此症因血輪中鐵質紅色。濾至溺中之故。^一因別病累及。以致小便常如血色。而溺中毫無血輪者。概爲銳綠、貝路加力、加波匿酸、輕綠酸、磺酸之毒。與玫瑰紅各種熱症之時有之。^二有一時小便如血色者。當時可愈。不必治。或服鐵、鐵碘、磺酸炭、匿酸、白礬、銳碘、輕淡綠、汞劑等品。餘詳後溺血篇。

血瘤 在腎囊者曰血瘤。在別部者即血溢。也由小血管斷裂血溢之故。治法同。 Hæmatocèle.

此乃瘀血內積之故。治宜靜臥勿動。將腎囊包裹。或以冰塊壓之。輕淡與醋亦可用并宜瀉之。如經日不退。宜刺放之。如壓冰後該處結塊者。宜割之。將凝塊取出。大者宜通。聚皮管此症病在腎丸之包衣。由臍腋以下至囊均可患之。治法不外一冷治。二不動。三刺放。四剖割。五射洗。如碘酒等○如婦女患之者。名曰盆血瘤。Pelvic-Hæmatocèle。病發甚速而險。概多不治。見症宜使靜臥。暈厥者宜服輕淡呻呻或白蘭地。此外最可靠者。即鴉片酒。宜每服一錢。或射入嚙咙。每用半釐。宜久用之或以冰塊外壓內塞。厥已醒。飲食宜牛乳牛汁等。○外治之法。最宜冰塊。或壓或塞入陰道。如病症甚重。不能用冰者。宜貼芥辣膏。此症如病人不動。并大服鴉片至醉爲度。兼射入了葛精。或可治之。否則極難。或謂剖割該處。至肚腹骨盆內將血管縛紮之。此法斷不可行。○大約所溢之血。或自然吸去。或變膿自破。^一入膀胱。^二入腸廻。^三入陰道。^四入子宮。^五入皮膚。均屬危險。是以早能探明膿已脹足。宜以刺針。由陰道刺放。大抵難治。

血瘤 Hæmatoma.

此亦微絲血管血溢之故。致在皮膚或肌肉或韌骨之下。隱約可見。猶如血痕瘀塊。大小多少不一。或謂心經腦筋同病也。治法。初宜冰塊壓之。後宜散之。或壓熱劑。或刺放。或刀割。不使變膿割後。宜藥水洗大者變膿。照膿瘡治。如

消散極緩者。可以火酒外擦。再以布卷包之極緊易退。如在耳部患此。大抵不治而愈。

溺血 又名血淋 *Hæmaturia*

此症須先審明血由何來。可將小便逐日試覈。或以電器探視膀胱。并詳查病案。自知其血或自膀胱。或自溺管。或自內腎來也。○如血由溺管而來者。宜常插以探管。包緊能止。如血由膀胱來者。或因石淋。或因癰瘡之故。宜平臥。并外壓冰塊。婦女宜塞入陰道 或以冰水四十兩。白礬二分半至四分化之。溺後射洗膀胱。或以銀淡養一分化水二十兩。或海士林一化水二。或鐵綠或鐵淡養一錢化水二十兩。或草麻油二至五兩等。射洗亦可。有時膀胱蒂核流血。宜通入通管。一手在小腹。一手在會陰揩之。○如血由內腎來者。爲服松節油燐等劑之故。宜忌之。又宜平臥。并在腰部引炎。或服汞丸瀉之。或熱水引汗。內服鵝片酒。或嚙啡。最有效驗。惟腎舊炎蛋白症者。此二劑宜忌。另服了葛可也。孕婦宜忌 或服白礬炭。匱酸。沒石子酸。兒茶。或鉛醋三釐。鵝片半釐。成丸服之。或松節油五滴。幾阿蘇二滴。或毛地黃印度麻。均可用之。亦有專服海士林者。頗有效驗。大抵血自內腎而來。其最可靠者用查潘闡達酒三分至四分半。汗之。所以止其血也。

易衄症 或作流血性質 *Hæmorrhage*

此係遺傳之症。雖有微傷。卽流血不止。譬如針刺或拔去一牙。以至血流不止。不治而死者是也。治法。如父母曾犯此症者。其子女之起居飲食。凡有關乎養身之理者。均宜謹慎。勿使此身少有破傷爲要。○至流血時。宜平臥。內大服鐵、鉛、松節油。毛地黃。了葛、白礬、炭匱酸。沒石子酸。幾阿蘇。而其中以鐵綠酒二分。鉛綠半分。合甘油與水同服。每日三四次。爲最佳。亦有用火刀割之者。亦有拔牙之後。或種痘。或生瘡。或針刺。

切忌開刀刺放等法。流血不止者，可以棉花浸鐵淡養水，塞塗該處，咬緊，并以布卷包住牙牀骨爲要。○如鼻衄不止者，照常法治之。○如失血極多者，宜借血法。○西國有此症者，概不婚嫁，所以永其天年也。

咳血 Hæmoptysis.

咳血者肺血也。概爲肺壞或嚙毗咖咧，以致該處潰爛，或血管斷裂。乃咳血所由來也。如斷裂之血管愈大，則病愈險。其因嚙毗咖咧所致者難治。○咳血時，病人宜睡，切勿用力言語，有礙心肺。其飲食宜冷牛乳、牛汁等。凡酒類提神之品，勿用爲宜。惟咳血過多倦脫者，可少投白蘭地、或輕淡香酒。此外有飲以冰水，或吞食冰塊者，功用頗佳。一能滋潤口乾。^二止咳。^三止血。○如痰中帶血不多者，可以芥辣膏貼胸膛。○如狂血不止者，宜以冰塊壓胸膛，^{和鹽少許}○如壓冰塊後其血已止者，不可再壓。亟宜撤去，至其居室，宜常通風。房中常用松節油噴氣壺，使病者吸食藥氣。^{止血能解毒}或以窗簾浸松節油，或地板滴洒松節油，亦可。○內服之藥，如病人無痰，咳血不多，人無倦怠者，宜鴉片或咖啡，或內服，或射入。如痰多血多極形憊倦者，則忌用鴉片咖啡。^{不用同意}須用了葛精，或服或射，或白礬每一刻服一分至分半，合水與淡礦酸二分同服。^{凡咳血症所服之藥不可隔時}過多宜每一刻或上文鉛醋合咖啡方，或沒石子酸，或松節油，先服二分，後每半點鐘服半分。又毛地黃一藥，如一時咳血極多者，宜忌。如痰中帶血散吐者，服此極效。又如身熱咳血者，則宜草烏豆、銻錦葡萄，或聞淡養氣。肺血減少之意也。或服銀綠，功同毛地黃。或服鱗綠。^{即食鹽}二匙化水一杯，每一鎰時服一大匙。或以輕淡綠照此法服之，亦可。或謂芥辣粉，Cayenne Pepper。每服半至一分，其功與了葛同。^{恐無實據}或服海士林，每服半至一錢，有功效者有不效者。或鐵酒鐵丸，鐵醋蘋茄了刀邊，或貝路加力，每射入四分釐之一，或服安的拜林銀養。^{一鎰每兩點鐘一服}或服銻礦養，^{四分鎰之一每一點鐘一服或服半分至吐爲度}或銻溴，銻淡。

養。鍊綠麥的哥 Matico。拉兒去 Larch。白賴那 Bryonia。哥拜把。印度麻等均可試用。○又法。凡有咳血症。可大瀉之。或放要者。誌按西人體質強壯。血液極旺。或可試治。所以導血下行也。至於華人。醫者須細酌病人之體質。慎而用之爲要。

流血 Hæmorrhage.

此指外傷流血也。治同外科。立將傷處血管縛紮。間有一時流血過多暈厥者。宜提補之。輕者。勿用之。亦有因流血過多而自止者。或因暈厥而自止者。宜聽之不可妄投各藥。宜令病人平臥。頭宜更低。又使天氣常吹病人頭面。并聞以輕淡。或冷水拖擊胸膛。或將下肢高擡。或將腹總脈管掐住。或以象皮帶縛緊兩腿。當慎用之。宜暫不。宜久須防死肉症。使血歸入臟腑。如傷處深凹。不可卽投白闌地等品。至驗明血管縛紮後方可投服。如傷處宜剖割者。須將迴管脉管兩端均宜縛紮。如小血管斷則不必縛。可以鉗扭轉。再以藥棉墊之。能止。○迴血管斷者。治法相同。輕者祇以布卷包紮自止。○大抵外科止血。以縫紮居功爲多。故止血之藥。概不用之。不得已而用者。以柏夫罷兒爲最。次之如鐵綠。鐵礦。鐵淡。冰炭。匝酸。餘詳上文。等品。或用火刀熱水百二十至百二十五度。冰水亦可。○如流血過多。愈後宜服補血之品。

腸迴出血 Hæmorrhage from the Bowels.

見後 Melena.

產後血崩 Hæmorrhage, Post-partum.

治分二候。一預治之法。二病時治法。

一胎兒生下後。宜在小腹外面。不時摭擠子宮。并服了葛酒。約一錢。或了葛精。每服一分。可免此患。又胎兒既下。其臍帶切勿牽強拉下。須候半點鐘後。漸自脫下爲妥。不下必須入手至子宮取出者。要過一點鐘後可用此法。如脈數。每秒一百至者。宜防此患。當時仍宜摭擠子宮。至縮如常度。約二三點鐘之後子宮雖舒縮不至過大。再使小兒吮啜乳頭。

亦有止血之功。所以使子宮。腿筋功用轉移至乳頭也。

亦能止之。

二、一時血崩者。卽以手指在腹外擠定子宮。如胎盤未下者。當卽用手取出。如胎盤既下。血仍不止者。宜以右手握拳。探入子宮之內。左手在腹外擠壓。或能止之。或謂以海絨浸以淡醋酸。充塞子宮。外則包裹肚腹。亦能止者。或以冰塊冷水或熱水。百二十五至百二十一度。充滿子宮之內。亦可。餘如白礬。炭疽酸。酒醇。鉛醋。海士林。碘酒等。均宜於未用以上各法之前。服之。如已用上文諸法未效者。不必服。○極重無法可止者。宜以鐵綠酒一分。化水十分。射入。或浸棉花充塞子宮。○如子宮舒而不縮者。鐵酒一分。化水十分。射入。或以柏夫罷兒。或以埃阿達方紗布。翦成小塊。一層一層。塞入子宮內面。其功用一能收縮子宮。二能止閉宮內血管。較用鐵綠皮膚針射入腹部。每用一至一分半。每一刻一射。外仍擦又雞那霜。亦不能少。每服分半至二分。或在腹部擠定總脈管。或在小腹壓以圓塊。再以布卷環紮。暈厥者宜提神之品。詳量失血過多者。宜鉢綠一錢。汽水二十兩。化後射入迴血管。或以皮膚針射入。詳觀血薄症。

痔瘡 Hæmorrhoids.

痔症不一。有內外。有血無血。之不同。

治法。一宜預防。二治其標。三治其本。○大抵預防之法。病者須常運動。不可久坐久立。衣服宜法蘭絨。兩脚不可過受熱與濕。大便常宜通利。勿使閉結。鴻臚不宣便後常有脫肛者。每次宜洗淨之。然後納入。若不當即納入是使肛閉痔瘡易於腫脹潮大酒色切忌飲食有節。不可過多。求其易化。勿使便閉爲妙。大約大便宜每日一次。故每日宜服橄欖油。或煮熟果子。洋棗橘醬等可也。○如兼有別病。或肺病致患痔症者。先治其病。○或每日射入冷水五至十兩。其功能收縮痔瘡血管。二補內皮。三利大便。四止血止癢與裏急後重。此法

可常用之。○凡歛劑均忌。可服者如硫磺醬。哥拜把。辛拿醬。草麻油。柏油。松節油。甘油。海士林。了葛。甘草粉。畢澄茄等品。但無一定之功效。○如痔炎而痛者不必施刀。宜平腦筋。可以蜞吮血。或貼蠻螯膏。或納入冰塊冷水。或麥皮芝麻粉合蘋茄與鴉片膏之壓劑。見症施治另以溫水合草麻油射洗肛門。又須平臥。不得行走。其止痛之藥。如哥根。嚙啡。鴉片。哥羅方。蘋茄綠養冰草烏豆。海士林。鬧羊花。幾阿蘇。埃阿達方等。此時用之無效。惟冷壓或熱壓之法。乃能止之。○如脹痛已退。則宜謙落合偉倫氏所擬艾青流膏方。見卷一 肛裂○如舊症。則惟鴉片。沒石子酸。油。合少許蘋茄膏。或哥根。爲最效。或謙落油藥十兩。合鐵礦養一二分。成油搽之極效。○凡痔瘡腫炎之時。不宜用刀。或火刀割之。○如痔爛者。宜謙落合熱壓劑。爛愈痔亦去矣。○如久痔頻發。時時有血與膠滲者。宜以炭日射入冷水。十五至二兩或搽謙落鐵礦養油藥極效。如病更重不愈者。宜以炭匿酸二分。化水三兩。或鐵礦養一分。化水三兩。或鐵酒一錢。化水三兩。或海士林四錢。化水三兩。或白礬四分。化水三兩。或純用海士林半兩等劑。射入肛門。或以諸藥製成尖丸。納入肛門。亦可。或以鐵雙礦養半錢。猪油一兩。或淡汞淡養油。或鉛醋油。均可用之。惟此三者用之多痛。○亦有以淡酸或汞淡水。用肛門返光擦擦痔瘡之面。勿染及四面好肉後以石炭養酒之。或以橄欖油甘油等搽之。靜臥三四點鐘。頗有消痔之功。○亦有專用火刀割之者。或以濃加波匿酸一錢。甘油十錢化合。每以二至五滴。用皮膚針射至痔瘡。有用此發炎潰爛者醫宜慎用○猶納氏方。哥核粉精八分。埃阿達方三分。蘋茄膏六分。佛士林百五十分。調成尖丸。納入肛門。約三四日能愈。○又柯氏方。哥核精一釐。埃阿達方四分釐之一。蘋茄膏八分釐之一。哥哥白塔半錢。甘油足用。調勻成油。搽入肛內。約二三日可退。○痔症割法。或用翦翦去。或以刀割去。或火刀煨之。或以線縛之。或以痔

鉗 *Hæmorrhoids Clamp.* 指定割之。或以火刀割之。○痔症止痛之藥。如哥根水。加波匿酸水。二十或搽或射。或以呻呻與遏尼司帶兒。Anesthetic. 噴射之。○翦外痔時。外皮不可翦去過多。以防肛門變窄。○治內痔簡便之法。線縛爲妥。○割痔前夕。宜先服草麻油通利大便。臨割時。再以溫水射洗直腸。或聞哥羅方亦可。或不聞。使病人將痔努出。側臥棹上。兩腳高擋。將痔鉗指定。或割之。或以線縛之。縛者宜先將內皮翦裂然後縛之。縛後仍須納入肛內。聽其自下。如痔根極大者。須將線穿過痔根。分十字形縛之。縛畢納入謙落或嚙啡尖丸。或壓熱水冷水。又宜靜臥十餘日。不可大便。至五六日痔脫後。或十天小不定 可服利便劑。或外導法。以瀉之。○如肛門有膿臭者。宜藥水洗之。流血者。宜鐵綠酒或滴或搽。或火刀煨之。○大抵用痔鉗割者。最妥。先將痔瘡指出。用痔鉗指定。用刃割之。割後。再以火刀煨之。鐵亦可 或以線縫合。○忽氏於一千八百八十二年專用線縛之法。以治痔症。計千人中。無一不愈。毫無他患。可知此法之妥且效耳。

血入胸膛 *Hæmorrhax.*

概爲血病。或外傷或膿與嚙毗咖咧等症所致。有血與水。積在肺胞之內。○治法。與肺胞積膿積水相同。如積在一邊者。宜煙熱劑或冰水。并在病之一邊睡臥。飲食宜節。切忌茶水。內服鴉片。并以皮膚針射入了葛以止血。或以鎂礦養瀉之。或在手部放血。如積水過多。使肺體上壅者。則氣逆不舒。宜刺放之。肺水法 如刺放。或放後插入皮管。引血外出。大約此症甚重難治。

兔唇 缺唇又名崩口 *Hare-lip.*

此症均由胎成。治宜審明何時可割。如因此不能吮吸者。則生後一禮拜即宜割之。如仍可吮吸者。至三月後割之。如脣骨牙牀骨均崩者。宜在八月割之。割法須將小兒之手。用長巾包紮。不使動搖。聞以哥羅方。

先將缺脣與牙牀骨粘連之處剖離。再將缺脣兩廉。每邊割去皮肉一片。割時務使兩邊割口相合彌縫。自然而無高低之患。後以長針與線刺縫相合。須離所割之邊約三四處刺入。後將線在針之兩端繞住。須自上縫下而再以馬櫻縫合外皮。切勿使縫合後少有凹形爲要。縫後另以象皮膏。自右耳貼至左耳。不使頰頰因啼哭開動。二日後將針取出。六日後縫線亦宜取出。大約四五日內最宜小心。勿使啼哭張裂。偶有所傷。其飲食則喂以牛乳可也。○如雙缺或中處牙牀骨外凸者。先將凸骨揩入向內或先將骨根割斷然後揩入餘同上法。

蒿熱 又名蒿喘 Hay Fever.

此乃時行之症。猶惡傷風之類也。英國夏秋患此者多。想中國四時均可患之。概因刈割禾稻黍麥之時。稻草因。或汚氣。或野草花氣襲人所致。一時病發。鼻涕。聲熱。氣逆。或發後即愈者。或頻發不已者。○治法。或治其鼻部。或平其腦筋。治鼻之法。宜哥根分半。化水百分。搽之後。以火刀煨之。平腦筋法。未病之時。宜服鉛石。馬所致。百松。鐵。溴。鋸礮。養。雞。那霜。輕淡溴。鈦碘。海水沐浴。或改換水土。凡刈割禾草之處。不可經行其間。吸染其氣爲要。或鼻揩藥罩。滴藥聞之。有時服安的拜林分半。能斷之者。○一方加波匿酸甘油二兩。輕綠雞那霜二錢。汞。雙綠一釐。相合。以筆點敷鼻孔。或以汞碘一釐。化水一千。噴射亦可。大抵哥根無大用處。間以四分釐之一。成片納入鼻內。新症用之。或有效驗。或以安的拜林分半。化水一兩。射洗。或以哥根一釐。了刀邊百二十分釐之一。合哥哥白塔少許。搽入鼻內。或薄荷冰一二分。化油百分。或銀淡養半至分半。化水一兩。或得力平。幾阿蘇。溴。碘。樟腦。加波匿酸。薄荷油。郁加利達油等。化入開水。聞吸其氣。或以醋酸。輕淡水。碘。搽藥。聞吸其氣。又輕淡綠煙。或鍊淡養紙。亦可試用。然不若以汞綠一釐。化水五兩。硼砂甘油

二分化水一兩。雞那霜一釐。化水一兩。鍼碘四釐。化水一兩。碘片半釐。化水五兩。草烏豆酒五滴。化水一兩。海士林一錢。化水二兩。硫養三酸二錢。化水五兩。加波匿酸一錢。化水十兩。炭匿酸三釐。化水一兩等品。射洗鼻部爲尤效耳。亦有以藥粉抽搐鼻內者。不第無益。反有碍處。甯勿用之。

頭痛 Headache.

凡腦胞炎。傷寒。經閉。溺毒入血。內腎發炎等症。均有頭痛。治見各症。○大約平常頭痛。最多者爲血行腦部有毒。或血液改變。故所致。治宜將血中不宜之質化去。或瀉之。或汗之。或利小便。其病自愈。○亦有爲居住之房屋。閉不通風。養氣過少。炭氣過多之故。治宜在空曠處行走。○如熱症頭痛者。治之頗緩。因其血中毒。或汙多。雖服藥以去之。但每日所增。較所去加倍。故治之亦緩。如是者可在頸部貼蠻蠻膏以引其炎。○如爲腦中積血者。宜大瀉之。使血下行。腳部煨以熱磚。或腿後貼蠻蠻膏。或太陽穴。或頭上壓冰塊。所致○如血薄頭痛者。照以上之法反治之。并內服鐵錐那霜。飲食須宜精細。或服甘油淡酸。或聞淡養氣。均可。○有爲眼症。或所帶眼鏡不合。或胡衣凹凸不勻。致有頭痛者。宜先治眼症爲要。○有爲胃病。以致頭痛者。治宜吐之。立愈。或瀉之亦可。其飲食宜清淡易化。并宜金類酸或蛤蜊類。或馬前酒。或郁加利達油。每眼五滴極有效驗。○經來并子核病。以致頭痛者。宜治子宮之病。○酒風。以致頭痛者。宜鉛沙利沙。并鎂礦養以瀉之。○腦筋病。以致偏頭痛者。詳後腦筋症。Megrim. ○腦內有瘤頭痛者。宜鍼碘。○傷風頭痛者。宜解毒水洗鼻。後搽哥根水一釐。化二十滴。後再搐入藥粉。卽嚙啡六釐。了刀邊一釐。鉢炭養二錢半。樹膠粉錢半。研勻。抽搐可也。以上各種頭痛。用藥仍不效者。宜安的拜林。安的非白林。克撒而仍。求

拉那。Guarana. 均有止痛之功。或以電箱震之。

頭部受傷 Head Injuries.

大約傷後外似無病。而內實重傷者。醫者須細審之。○如腦部受震發顫頭搖者。治法與暈厥同。再以熱水抹身。以熱牛乳射入肛門。脚腿煨以熱磚。或引血。大抵忌服白蘭地。忽斯克等提神之品。當時勿施手法。爲要。每有施用手法而死者。如不醒者。腦必有傷。切勿投以提神之品。○如已醒者。勿與言語。服以半分加路迷。或巴豆油半滴。瀉之不下者。宜射洗直腸。并住黑房。頭壓冰塊。或以冷水澆頭。或將全髮剃去。不使頭部少熱爲要。○如肥體血旺譖語者。宜放血。惟酒鴉片肉食切宜忌之。可食者。惟牛乳米湯麥汁薄粥藕粉等。牛汁亦忌○大約十至二十日能漸愈。後宜疏食。不可肉食。○如腦部因擊搘。或內極危險。有當時死者。有漸醒者。有因而變成膿瘍者。或血溢者。宜以圓鋸鋸之。或刺放之。其宜鋸刺之時。卽見半面或半身發跳。或麻木者。卽碎骨壓著腦體之證據。見症當卽鋸之可也。

所致

心房變大 Heart, Dilatation of.

此症多因用力過度。或虛弱所致。非心經之肌肉變次。專指心房變大也。其心房雖大。而心房諸門。尙能啓閉如常。治宜補心。并審明別經臟腑之病而治之。○如因用力過常所致者。或爲忿怒過度所致者。均宜慎忌勿犯。不使腦筋心經過於提神之意最要者大便宜常通利。如第事補益不宣通之。病反增劇。醫者宜知。

心經累病 即如心跳 Heart, Functional affections of.

此症心經各處毫無疾病。間有一時病作。片刻便愈者。如飲食過飽。以致胃病。忽而累及心跳。或不準。或作痛。或氣逆者。宜吐之。或婦女腦筋病驚懼。以致一時心跳不安者。宜輕淡香酒。白蘭地。阿魏甘松。撒姆末。

拔麝香等品。或有時以冰塊外壓心部。心跳不準者忌之或聞呻吟。淡養氣。或聞濃輕淡水濃醋。并以鼻煙取嚏。立見病去。當時毛地黃則不必服。有時可服銳溴。借功力太緩或最妙服綠養冰。有心病者忌之宜合忽斯克酒同服。又薑酒加輕淡。或呻吟少許。服之頗效。○一方。輕淡香酒一兩。礦強呻吟一錢。淡薑酒三錢。薄荷汁三錢。樟腦汁三錢。豆蔻酒到二兩。每刻服小匙。加水少許。此藥百服百效。謬按此症與中土痧症甚合此方治痧亦甚效驗○至於無病時。飲食起居。宜有定時。煙茶酒均宜忌之。須常吸淨天氣。并忌勞心。勞力。忿怒。○如血薄者宜補血。肥胖者宜果子鹽。不睡者宜撒弗那兒。○又平時宜常服毛地黃。有時銳溴。蘋茄。馬前冰。安的拜林。服之可使不發。或久服呻嘶頓補藥。亦可不使病發。惟服呻嘶頓一月之後。每服一次。宜加二滴斯得羅返得司酒爲妙。○一方。淡輕溴酸六錢。蘋茄酒。或丙馬前酒一錢。甘油兩半。雞那霜酒到六兩。每服二錢。加水一兩。飯前服之。○如心極痛者。可服銀綠。每八點鐘服八分釐之一。切勿過多。

心變脂膏 Heart. Fatty degeneration of. 所致如

此症在肥胖者多患之。亦有時與大熱症相連者。如傷寒長熱。燐毒等症之後。能使心經暫變脂膏。大約熱退治之即愈○如熱退仍不痊者。須宜安靜。飲食精細。并服鐵劑。○亦有因心門之病。累及此症者。詳心門各病。○其自然變爲脂膏者。概爲心經肌肉補料不足之故。治宜飲食精細。切忌酒色與煙。凡起居身容。均宜按時合度。濃牛肉汁可作茶飲。每上下午一次。○間有暈厥者。少進白蘭地酒。○又宜早睡早起。房屋通風。或常在空曠處吸淨天氣。不可行走并忌登山登梯。勞心費神。凡使心經用力之事。均宜忌之。雖不能斷絕病根。却有帶病延年之功。○此症有一時顛仆厥死者。故病者宜常備輕淡。白蘭地。淡養氣等品。以便厥時取用。○一方。呻吟酒一兩。蘋茄酒二錢。輕淡香酒一兩。薑酒六錢。相合。每服一錢。合

水服之。厥時氣逆甚危險者。用此頗效。如服此無效者。病必危險。可以了刀邊水二滴。射入皮膚或內服。○如心門無病。心房不大。第變脂膏者。則斯得羅返得司。毛地黃。與使把兒丁。或康弗拉兒。Sparteine and Convallaria。切不可服。○或謂燐與鉛石。常服能致此症者。但既有此症。服此二劑。反能化其脂膏。或服了葛精。亦能治之。而最妙莫如鋸碘。鐵。與馬前冰。或佛羅斯貢邦。呻嘶噴。麥液醬。魚肝油等品。統能治之。○亦有在心經外面。多生脂膏。包住心體。或心房內肉絲多。生脂塊者。Fatty growth on the Heart, or fatty infiltration. 不過指一處而言。非心經本體統病。治法相同。病症各別。醫宜知之。

心體變大 Heart. Hypertrophy of.

此症甚難。先治其標。如因心房心門之病。或丙腎舊症等病所累者。照症治之。

心門之病 Heart-valvular. Lesions of.

心門之病。多因風濕發炎不退。變爲舊病所致。如當風濕發熱之時。照風濕治之。如身熱已退。宜服鋸碘。并驗其心跳之聲。如何。如聲音不準者。宜令病者出門遊行。二月之後。再驗其心跳之聲。如何。仍不準者。宜補養身體。漸加運動。切忌酒色濃茶。并須不時預防心跳。心痛。氣逆。血薄。腳腫。或變藍色。或肝胃腸內腎積血。溺涵蛋白等症。如已發諸病之一端。可知心肌極鬆。無力關閉。血行倒迴所致。治法。首重食補。多食涵淡氣炭輕油糖之質。○大約此症最先有者。如胃不開。是胃積血也。宜以飲食射入肛門。以鮮牛內兩半。合甜肉半兩。搗爛。加溫水少許。取其液射入肛門亦可。或以麥糊煮熱。至二百十二度。合牛乳。每五兩中加甜肉汁一小匙。約四分合滷炭養五釐。射入亦可。亦有以熱牛乳五兩。合魚油一兩。射入。或以食物成尖丸納入肛門均可。○華氏以爲此症。蓋由

心體內絲放鬆無力。并血汁中水液過多之故。如能減去血中之水。病自可愈。其法一節食。二登山。曾治一人。在四點鐘內。使之登高至百丈。畧能有力也。○華氏常配病人之飲食。以四十兩爲率。不能過多。四十兩內須有蛋白質五兩半。油一兩。炭輕質三兩。水三十五兩。或逐日早餐。茄菲四兩。二錢。牛乳一兩。白糖七分七釐。饅頭兩二錢。午餐。湯三兩。肉七八兩。鮮菜一兩。饅頭一兩。水果三至六兩。不食者可以極淡酒六兩代之魚少許。傍晚。茄菲三兩半。牛乳一兩。糖七分七釐。水二兩。饅頭一兩。晚餐。極淡酒七兩。水二兩。雞子一枚。烘肉五兩。鮮菜一兩。○華氏此法。本治身體肥胖。或血薄或血濃心變脂膏之症。所以減其脂油之法。謂用以治此症。亦有效驗耳。○偉倫氏云。此症能少運動頗佳。故登山之法。此症似宜。或謂用此法。氣更逆。小便短促者。不合。不可妄試。或謂登山之法欠妥。可以別種引汗之法代之。或射入比魯介賓。或禁飲水。或利小便。亦效。○或謂病人能在平地少用身力。或推拿全身。亦效。○至於內服之藥。如心門無力而鬆者。宜補心之品。如一時心跳聲吹。爲一時悲哀心本變大之故。心痛頻跳者。忌補心之品。宜鍛溴等平心之劑。○一方草烏豆酒二分。鍛溴二錢。甜消呻呻。利五錢。樟腦水到三兩。每二點鐘服一小匙。可也。○如心跳暴痛氣逆。肺積血。腳腫。脈管無力者。毛地黃最效。功能提補心體內絲使跳動遲緩合宜并無跳使下房之血易於逼出又使左右竅閉有當也。服後能使微絲血管舒縮有力。故用處最效而廣。兼有利便之功。大約初服至多五滴。後則每次一分。日三四次。照此可以經年常服。切勿一時驟加爲力之故。最宜慎之。大抵服毛地黃之後。最宜平臥。不可一時起坐爲要。○亦有以鐵合毛地黃同服者。○一方。毛地黃酒二錢。二分。鐵綠酒三錢。哥羅方酒三錢。甘油一兩。汽水到四兩。凡血薄有心症者。宜之。每日

因毛地黃質易沉
血中遺去極難

四次。每食後服一錢。化水一二兩同服。○如心房。左竅。即上房至下房之間Mitral regurgitation。有病不能合齊。血倒迴者。服毛地黃極爲靈驗。○如心房。左竅。卒制血出時。有吹聲者。 Mitral stenosis。與血倒迴相連則毛地黃之功少遙。二症最宜審明。○如三扇門。即總脈門由左下房開脉枝有病。或牽制或粘連因而血行聲吹。并倒迴者。 Aortic obstruction。因此時左下房變大。如心經本體有力者。毛地黃不宜服。如心經本體無力者。如心跳痛無力浮腫等形宜之。至病已退。如浮腫等狀已退之後宜止。切勿久服。○如三扇門。血倒迴而無別症者。 Aortic regurgitation。毛地黃不宜服。如三扇門久病。以致左右竅門均病。右竅不齊此時宜服毛地黃。○如三扇門血倒迴尚未累及左右竅。而第有脈速不準無力者。為左下房內絲無力之故或繼有氣逆浮腫。臟脹者。此時服毛地黃最宜。至病狀退宜止。○此外如使得羅返得斯。茄菲精。克斯克 Casca. 康佛拉兒或佛兒納斯 Adonis Vernalis. 海葱。使把丁。銀綠。辛衣格。以及鉛石。馬前冰等。均有補心之功。醫者選用。必須先服毛地黃。不效者。宜使得羅返得斯。之功用無利潤再不效者。宜茄菲精。再不效者。宜使把丁。依次取服可也。○如取治第欲補心者。服使得羅返得斯爲妙。如欲利溺兼補心者。宜服毛地黃爲妙。且服使得羅返得斯之後。藥質不至沉在血中。易於遺去。故較毛地黃爲尤妥。惜無利小便之功耳。○茄菲精。或謂能補心。或謂止能利溺。並無補心之功。大約浮腫與內臟積血者。每日服三次。每次半分。頗效。其利便之功。較毛地黃爲尤佳。○使把丁。功同毛地黃。最能補心。惟利溺之功少遙耳。○銀綠。有用之者。有不用者。功與毛地黃畧同。能平脈并提補血路。善能止心痛。大約以一釐化水百滴。每服此水一錢。○馬前冰。如一時心無力者。宜以一釐化汽水二錢。用四滴射入皮膚。○如因心病以致臟脹。或病勢極重。服毛地黃不及者。治法詳觀內腎新炎症。宜服加路迷五釐。功能瀉之。兼利小便。如內腎病者。切忌服此。或鋸碘合別劑同服。○一方。鋸碘一錢半。輕

淡香酒四錢。金雀花鮮汁一兩半。毛地黃酒二錢。辛衣格泡水到六兩。每六點鐘服一大匙。或顧氏白氏丸。Guy's Pills or Baly's Pills.

黃各一釐或合

汞藍丸同服。凡臟脹不重者宜之。○淡甘油淡酸。每服六分滴之一。每刻一服。至四或六點鐘後止服。

所以提神腎丸至四或六點鐘後始有通利之功故此時停服

○諸藥不效者。須大瀉

之。宜服鎂礦養。鋸葡萄酸散。簽笠雜散等品。或以刺針放水。凡治內腎之症。如引汗比魯介賓等法。均宜切忌。不可妄試。○心病以致臟脹新症者。宜服近來新出一藥名Diuretin。代有拉丁。每兩點鐘服半分。其功善

能利小便。或服一藥名 Lactose.

拉克多司。功效亦靈。每以三兩化水

八十兩。代茶隨飲可也。○如全身浮脹者。治法相同。惟內腎與胸膛之外。兼用火烙引炎之法。

部積血以散內

○如一時氣逆者。因肺部積血。并心右房

變大血難逼出心房之故。脣瘡目瞪。病狀危險。宜在手部放血。約十兩。兼服輕淡與呻呵等劑。○如肺積血兼氣管炎氣逆者。宜在外引炎。并

吐之。或吸以養氣。善能止喘。○如心病不睡者。宜鴉片。不宜綠養冰。或射入六分鐘之一。嚙啡能止喘。竇睡極效。或撒弗那兒。潑拉兒海

冰。或射入六分鐘之一。嚙啡能止喘。竇睡極效。或撒弗那兒。潑拉兒海

甯睡劑中
最爲穩妥

冰。或射入六分鐘之一。嚙啡能止喘。竇睡極效。或撒弗那兒。潑拉兒海

虛熱 Hectic Fever.

如勞傷、腐骨、嘟吡咖咧、五臟生毒、潰爛等纏絲之症。寒熱交作者。卽虛熱也。○治法。潰爛者宜洗之極淨。或將腐骨取出。如內傷。則飲食精細合宜。或少飲清酒。居處高燥。其不睡、胃閉、憂慮、不安者。均照法治之。○其寒顫之時。宜辛熱之劑。○其熱後發汗者。宜冷水合醋。浸海棉揩抹之。○其寒後未熱之時。可服一分安的拜林。能斷其熱。則減不○熱極重者。可服安的拜林三分。服後一點鐘不退者。再服分半。再不退者。再服分半。後勿再服。照此服之。雖熱至百五度者。能退至九十七度。且兩日內、不至再熱。或謂此法過猛。不如作寒後。服分半爲妥。然惟心經有力無病者。可以服之。○雞那霜亦可取服。每服半分。日數次。如有益於病體者。可常服之。餘詳肺勞。

半身不遂 或半邊風或邊癱 Hemiplegia.

此症每由中風之後發患。已詳風濕中風篇。治宜顧養全體。至於已癱之半身。從無妙法可治。惟有使腦部或髓部病處所溢之血散去爲要。此則宜服銻碘銻溴。馬前水等無效後服燐劑。又凡飲食中提神之品如酒肉等宜忌之。務求清淡與牛乳等物爲妙。更忌勞心勞力。忿怒憂慮。最要者病起一月之內。不可用提神之品。或電震。至一二月後。腦部溢血已可散去。如溢血未去方可取用電震提神之品。且首次電震愈輕愈妙。至後漸漸加重。切勿一時重電震之。

疝氣 俗稱小腸氣 Hernia.

疝氣不一。男女均患。大抵初次發者。當卽納入。繫以疝帶。不至脫下。或兩脚當時合齊。平臥。自能納入。然亦有納入極難者。○所用疝帶。或日夜用之。或臨睡解去。或繫或解必須平臥爲之如小兒臍疝。能經年常繫。一日無閒。必能自愈。不至再發。小腸擗出之孔須平臥爲之○疝之形狀不一。故疝帶亦無一定。大約病者須購備兩條。以防斷折。且每禮拜易而繫之。以免剛柔之別。每繫帶時。

先將石粉或鋸養粉洒在墊處爲妙。間有定製瘡帶。必如瘡之形狀而爲之者。○如小腸擗出之口收緊。以致小腸瘀爛者。極危險。有用刀割之者。或以手指送入者。小腸已爛者不可納入。醫者最宜細審。可否施刀。宜否送入爲要。以免臨事多敗。○送入之法。宜平臥。頭畧高。腳宜縮。膝向內側。使瘡處肌肉放鬆。先以右手大食兩指捉定收緊口處之腸畧。畧扯出少許。

再以左手將其餘墮落腸迴。畧使伸直。後使右手在收緊處。將腸緩緩送入。所以隨其自然之勢也。○知瘡之腸迴發炎。或瘀者。不可送入。○萬一不能送入者。宜平臥。將冰塊壓在該處。約三四點鐘。兼服嚙啡。或射入皮膚。或熱水沐浴。○亦有以刺針將瘡之腸內積氣。或水汁放出。然後送入更易者。○手送不入。惟有割法。令病人平臥板牀。聞哥羅方。如不能聞哥羅方者宜射哥哥根。兼服嚙啡。或依腋筋臍筋之路割之。如在腎囊者。宜依腸之出路直割。割時最宜小心。緩緩割入。一見

水 肩畧高。脚宜縮。在收緊處以刀直割。或橫割。如小瘡。或依腋筋臍筋之路割之。如在腎囊者。宜依腸之出路直割。割時最宜小心。緩緩割入。一見

血管。當卽繫縛。割至收緊處。另用瘡刀依循坑針。將臍筋即腸出之口。割大。然後送入原位。○如腸已變瘀變臭。或潰爛者。不治。不得已惟有將爛處。或變瘀處割出。縫合送入。惟所用手法刀器。須用藥水洗之極淨爲要。○如瘡氣頻發。因繫瘡帶或用手法不準。以致腸發炎者。宜令平臥。外壓冰塊。或澆冷水。并內服鴉片可也。○亦有頻發以致愈久愈大者。亦可照上法割之。將出口之筋網。用銀線縫窄。以免再發。

大水蠶癩患在胸腰者俗名纏腰龍 Herpes

此症患在面部與下陰者。輕而不重。其在頭面者宜用油藥。○一方。爐甘石粉一錢。濃鉛醋水半錢。鋸養油一兩半。調勻搽之。○患在胸膛。病症多重。有極痛者。宜以前方油藥攤在絨布包之。或合哥根少許。以止其痛。或以咖啡哥根等。合哥老典恩搽在水泡之上。極效。或最妙以漿粉、鋸養粉、爐甘石、鉢炭養、加路迷、富羅石散、滑石粉、來柯波達 Lycopo-

等酒之。○極痛者爲腦筋病。可服嚙啡。或射入皮膚。或鉛醋合嚙
啡搽之。或最效者服鋸燐養。每十分釐之一。善能止痛。○猶納氏方。以
偈克坐而化水搽之。或絕力凍合力坐新鋸養等搽之。或電震之。謂能
不使漫延。○亦有以酒醇九十分。水十分。浸絨布貼之外。包油紙者。或
酒醇百滴。內合二釐力坐新。或薄荷冰炭匿酸。石莫耳等。浸絨布貼之
者。亦效。○腦筋痛者。宜服雞那霜。鏗沙利沙。安的拜林。鉢石等品。而偉
倫氏云。服哥支疊甚效。○如頭顱第五對腦筋患此極痛者。宜服嚙啡。
安的拜林。眼中滴哥根水。并以加路迷分半。佛士林一兩。調勻攤布。包
於眼胞外。所以不使明衣白衣等發炎。以防蟹珠目盲等害。

呃逆 俗名打呃 Hiccough.

治法審其病由。概因胃病或積食或不化。故病重者可吐之。服芥辣小
匙。合熱水同服爲妙。間有以嚙啡哥根等止之者。或聞以哥羅方。或印
度藤。鴉片。鬧羊花精。樟腦。鎂炭。養麝香。醋。銦溴。鉢炭。養安的拜林。蘋茄。
咿咗。淡甘油。淡酸。熱白蘭地酒。淡養氣。埃阿達方。幾阿蘇。松節油。輕炭
淡酸。馬前冰。甘松鋸珠。比魯介賓。以及冰塊等。均可取用。亦有以鎂礦
養瀉之而愈者。○如小兒患此。畧使受驚。呃可立止。或用力長吸。將氣
閉住。或將兩手高提。或胃外部引炎。或嚏之。或飲冷水。或耳部煨以冰
塊。或以冷水噴射面部。或以電震。均可止之。○如傷寒與一切熱症瀕
死時。屢有呃逆者。是敗象也。

髀臼節病 又名環跳穴腐骨疽 Hip joint disease.

此症小兒多患初起。往往不介於意。或父母未之覺察。以致病漸加重
而不治者。十居其八。大抵初起最多者。先覺膝節疼痛。此時當使平臥
板牀。將有病一脚扯直。不使忤臼互相摩擦。綰以鐵片。初起可綰二至六磅。四一磅合中秤十二兩綰
之已久。如節處未見腫脹。按之不疼痛者。可去所綰之鐵。又當常吸清

氣飲食精細。起居合宜。亦有以長板包紮全腿。此法更不能動一如包紮大腿骨斷傷之法。或以多馬氏所製專器紮之。用此器妙在仍可運動。吸新天氣不必終日臥諸牀第。此器宜久久用之雖一二年亦不可去○間有病重成毒者。卽俗稱腐骨疽。醫者一見發炎。當卽用刀切勿聽其自裂。割後見有腐骨或腐韌骨。均宜取出。後以埃阿達方合絨布充塞爲要。一經開刀之後。又當常在空曠之處。吸新天氣。或運動身體。但勿碍於病處爲要切勿靜臥一室。有碍血分。大約所有腐骨。醫者探明。當卽割出。切勿姑存。以貽後患。○如因嘟吡咖咧體質所致者。詳後嚙篇宜將大腿骨杵頭鑽碎取出。後以加波匿酸水洗之。○如病極重。髀白亦病者。惟有鋸絕腿脚。并將髀骨病處。悉行刮淨爲要。○內服之藥。不外補益之品。凡魚油、鐵、鐵碘、雞那霜等品。均不可少。

喉啞重而久者曰失音。輕而暫者曰喉啞 Hoarseness.

此症不一。概因言語過重所致。宜審其病由。病者自忌爲要。○一方。炭

匿酸一錢。甘油硼砂二錢。辣椒酒半錢。玫瑰酸湯十兩。漱喉極效。○如聲管發炎者。亦可致此。詳後聲管炎症。○如聲管生小瘤。或聲管筋帶變厚者。宜割薄之。○如花柳病者。宜汞碘之劑。○如腦筋病者。或瘻照病原治之。○亦有因嘟吡咖咧所致者。均詳後喉症篇。

肝生水泡蟲 Hydatids.

此症多因水泡蟲子。 *Toenia echinococcus*.

由患帶蟲之狗傳之於人。

概由狗所飲之水有

蟲子遺落傳之於人致有此症。故平時人人所飲之水。最宜小心。務取清淨爲要。○治法。服藥概無實效。且無殺蟲之劑。因初起病兆難辨。故治之亦難。大約水泡已大。方能辨明此症。當時可以電針刺之。或以套針放之。使泡水外流。泡衣或能縮合。○亦有泡大下垂至右腹者。宜以補崩口之長針。連水泡與腹肌刺通。不使水泡移動。過一日拔出。然後用套針刺放。再以藥水頻洗。或將下垂之泡與割口縫合。每日用藥水洗之而得愈者。

○水泡蟲在肺胞、腦部、各臟腑均可患之。惟肝爲至多耳。○有時泡大，在肋骨間外凸者。宜將肋骨截去一二寸。如肺胞積膿法然後割之。將泡與割口縫合。

水瘤 Hydrocele.

此瘤之水。不在腎囊。而在卵子衣之內也。醫宜辨之。○治法。水少病久者。不必刺放。敷藥或可散之。如脹大行走不便者。宜刺放之。如欲辨明此症。可使病人在夜間。對燈立定。醫者在背後見之。澄清透光者。卽水瘤。否則卵子病也。○刺法。最要者。切勿刺及卵子。醫者先以左手握住水瘤。使水逼緊。然後以右手將刺針刺入。約進腎囊半寸足矣。過進恐碍卵子。發炎以致大約放之極乾。勿可少留餘水。一次可以退淨。其或未痊者再放。後以碘酒射入少許。將腎囊頻頻搖動。使卵子衣發炎。往往炎退。病亦去矣。○一方。鉢碘八釐。碘片一分。汽水四錢。作一次射入。或以鐵碘、葡萄酒、鋰綠、汞綠或紅汞養。埃阿達方各數釐等。均可射用。射後發炎。病者宜睡臥數日。炎退病自愈矣。○近來有以加波匿酸半至一分。射入。可不炎而愈。或先射入哥根水似較上法爲妥。○仍不愈者。須將卵子衣割破。或割去少許。割口須大二寸。子割出切勿將卵每日用藥水射洗至愈。○如小兒患者。先以長針刺入腎囊。并在水瘤左右前後上下刺之。每刺不可取出皮膚之外且勿及卵子使水由連網攝去。後再用冷水外壓爲妙。

腦胞積水

症分新舊兩種。新者俗名驚風。舊者形狀頭大腦脹。小兒患者最多。

Hydrocephalus chronic.

分爲新舊兩種。○新症卽腦胞炎症。詳後腦部。○舊症。治之最難。首宜補養身體。如因弱體瘰癧體所致者。均照症治。如因新症變舊者。宜在頭部引炎。蟹螯等妙。如嬰孩患此。宜搽汞油。并內服鉢碘鉢溴。或胸腔頭部。搽敷魚油。亦有以膏藥或象皮膏布卷。包裹全頭。不使水洩脹大。有效驗者。有不效者。惟瀉劑與利小便劑。均無用處。不如在頭部骨縫。

或臥門。先放其水。再以魚油搽頭。并用象皮布卷包裹。內服鍊碘鐵礦汞綠之劑。間有取效者。

內腎積溺 Hydronephrosis.

此症因腎溺管有石淋阻塞。不能下洩之故。○治法。用推拿法。或能使淋石落至膀胱。或上至腎盆者。或以熱劑外壓。或在背後末條肋骨。與胯骨上廉相隔之適中處。用針刺放。所用之針。宜細而長。或有在該處開刀。做假溺管者。○如內腎壞者。宜割出之。割時切勿累及統膜。并使天氣洩入腹中爲要。因內腎不在統膜之內。而在統膜之外也。

瘋狗咬 Hydrophobia.

大抵咬後一二月病發。治之極難。故咬後當在傷處以上。用帶繫緊。不使血行。以免瘋毒散佈全身。另以解毒之藥點敷患處。亦有當時吮啜傷處。將毒吮出者。此法極妙
亦極險也或以銀淡養濃加波匿酸。搽在傷處。用加波匿酸止
痛功用頗佳大

約用此法施治。百人中可救九十五人。但仍須兼用巴氏 Pasteur's 施

種獵犬之法爲要。拉甫氏云。凡瘋狗咬者。用搽敷之藥後。再種巴氏之法。二百人中。死者不過一人。曾在西歷一千八百八十八年。依此施種。在一千六百二十六人中。死者不過十六人。又在西歷一千八百八十六年至一千八百九十二年。依此施種。在九千四百六十五人中。死者不過九十人。可知此法之足恃耳。想中華城鄉各處。瘋狗之患。在在皆有。當道諸君。果能體恤民瘼。或收養獵犬。不使波害。或設局施醫。專療此毒。亦賢有司分中事也。○取漿法。先取瘋狗之口津。極射入兔之後。腦。發病後。取此兔脊髓所變水液。再種他兔。依此連種八十隻兔。後用種後六日發病之兔。取其髓液。可以佈種於人。以此漿再種別兔過
六日發病十日則死但先取此法所種兔之脊髓數條。藏掛真空瓶內。之極淨
先將瓶洗過三四五六七八九十一十二十三十四等日後。方可取用。○種法。須每日用皮膚針射入一二

次。每次約重七釐半。用極淨牛乳化之。惟每日每次所射。取用該免脊髓經藏眞空瓶中久暫之日期不一。列表於下。

一如傷在肚腹下肢者。亦在肚腹下肢射入。須連射十五日。

每日或二次或一次

射藥期數	射藥期數	射藥期數	射藥期數	射藥期數														
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九
日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
收藏日期	收藏日期	收藏日期	收藏日期	收藏日期														
二十七日	二十八日	二十九日	三十日	一月一日	一月二日	一月三日	一月四日	一月五日	一月六日	一月七日	一月八日	一月九日	一月十日	一月十一日	一月十二日	一月十三日	一月十四日	一月十五日

一如傷在頭面上肢者亦在頭面上肢射入。須連射二十日。

射藥日期	射藥日期	射藥日期	射藥日期	射藥日期														
第十一	第十二	第十三	第十四	第十五	第十六	第十七	第十八	第十九	第二十	第二十一	第二十二	第二十三	第二十四	第二十五	第二十六	第二十七	第二十八	第二十九
日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日
收藏日期	收藏日期	收藏日期	收藏日期	收藏日期														
二十七日	二十八日	二十九日	三十日	一月一日	一月二日	一月三日	一月四日	一月五日	一月六日	一月七日	一月八日	一月九日	一月十日	一月十一日	一月十二日	一月十三日	一月十四日	一月十五日

如不及種而病已發者。宜將病人四諸黑房。不與親人相見。宜以嚙咙。

射入。以免抽搐。或聞以哥羅方。惟當時見水極怕。故用之多不便或以綠養冰等審睡之劑。射入肛門。或淡養氣、淡甘油淡酸、巴拉豆草烏豆、蘋茄養金花、印度麻、水塊、樟溴、砷石溴安的拜林、蠻螯等劑。均可試用。概無實效。其中惟扣拉兒。Curare. *治抽筋用每四鎰射入十二至四分釐之一。至肌肉無力抽動爲度。或專以放血之法而取效者。惟慎用之爲要。

肺胞積水 Hydrothorax.

治法。詳後肺胞發炎篇。

汗多 Hyperidrosis (see Perspiration, Excessive.)

見後汗症。

遠視 卽老花眼 Hypermetropia.

因眼球前後過短。以致光點映射眼根。腦筋太過之故。○治法宜佩帶合宜之花眼。鏡凸以收縮光點可也。

疑心病 有稱爲肝胃腦筋不安者。有稱爲鴨症者。 Hypochondriasis

此症乃腦與腦筋之病。治之不易。因病者自疑病症沉重。必有性命之憂。狐疑不釋。病漸加重去此別無病症耳。○治法。惟有善爲勸導。去其疑竇。病可不治而愈。○閒有腦筋有病。血薄。胃閉。便結。酒風者。均照法治之。此外常令病者。在空曠處行走。或出門遊玩。改換水土。或因事業所累者。須改作別事。并忌煙酒。故治此症之法。必先去其病由。釋其疑懷。務使病人自信。並非重病。服藥其次焉者也。○一方。鉛石水四分。鐵綠酒二錢。撒姆末。拔酒二錢。樟腦水到四兩。每日二次。每次一錢。合水二兩同服。有時安的拜林、甘松、阿魏。服丸均可取服。或電震之。

膀胱底漏 或作胎成海底漏 Hypospadias.

此胎成膀胱蒂處變漏也。與上文膀胱漏 Epispadias. 相同。不過一在會陰處。一在上面交骨處。治宜割補。用伯氏割法。Plastic Operation. 以好肉

彌補之。

百合症 Hysteria.

此七情六慾之病。實腦筋所致也。病者忽而喜笑。忽而哀哭。或頓疑疼痛不安。或一時癲癇抽動。以及假睡假顫。獨自病輕。見人病重。種種奇奇怪怪病情。不可勝舉。醫者辨其真偽。審其病由。神而明之。在乎其人也。○治法。宜補養全身。飲食精細。宜有定時常須運行。夙興夜寐。均有定時。每日宜有一定之事。不使病者腦部紊亂爲要。凡驚懼之事。新說奇聞。不可與知。每日宜冷水沐浴。如胃閉便結血薄等症。均照法治之。○此症與上文疑心病同。服藥在後。所要者。使病人自覺無病。切忌重言怒罵。激其心志。彼西國曾有此症。已臥牀數載。病者自言自語。自覺病症極重。幾乎命在旦夕者。或忽而抽搐。忽而暈厥。忽而喜笑。忽而憂哭。歷經醫治。未見少痊。繼有名醫診視之。亟以草燒於牀下。該病人疾趨以遁。

可見此症之僞託也明矣。或問其何以僞託。則曰。腦筋病也。故宜服藥。如甘松。甘松鋸。甘松鐵。○一方。甘松鋸。甘松雞那霜。甘松鐵。各一釐。亞羅膏半釐。相合成一丸服。每日三次。飯後服之。或以阿魏每早晚服半分。成丸服亦效。至於麝香鈆溴。平常之症。無用。或謂馬前精。每服三十至十分釐之一。亦效。餘如山米斯。鉛石。樟腦。樟溴。葱頭。哥根。安的拜林。伯里多來。Pellitory. 琥珀油。Oil of Amber. 伊格內駭。Ignatia 等。均有用之者。但無實效。至於酒煙哥根等能成癮之品。宜慎用之。Weir Mitchell 魏氏治此症之法。一將病人另居靜室。常以一人服侍之。除醫士外。不與別人相見。林上遺之使病人平臥牀上。禁其轉側起坐。至一月後。凡家中各事。不可與聞。至一月半後。方可少坐。其飲食。初起十日。惟飲牛乳。後漸加以牛汁。雞湯。茄菲。饅頭。蛋。菜等。均須漸漸加上。○至於全身。在臥牀四日以後。專用推拿法。Massage 每日約一刻。漸至一點鐘之久。

或電震之。有經用數月之久者。以免肌肉痙攣也。○其僞病加重。或有抽搐者。宜令平臥。至抽搐畢。用冷水潑之。能醒。或以濃輕淡聞之。或電震之。或吐之。所以使病人聞此生畏也○再不效者。囑服侍人。以火烙阿魏酒松節油。○一方。阿魏酒一兩。輕淡阿魏酒二兩。松節油二錢。相合。每兩點鐘服一次。每次小匙。○亦有肌肉痙攣者。宜推拿法。或電震之。如一肢拘攣者。宜蜜蠟膏。如喉啞者。宜電針震之。○如不睡者。亦宜電震。○如皮膚疼痛忌按者。亦宜電震。誌按此症卽金鑑所稱百合狐惑之症。種種奇怪情形。病家醫家。每委之於鬼祟。不知其根實由七情六慾。發而爲病。初起病多僞託。忽喜忽憂。驚悸。忿怒哭笑。嗔罵。相雜有之。或忽而自言自語。面赤面白。或專乎自慮。病重無法可治。如處女患者。卽稱想思病也。大抵初發僞病輕者。亟宜設法。解其心懷。不藥可愈。如僞病漸重。釀成真病。大有性命之憂。醫者不可不知。

百合癲癇 *Hystero-epilepsy*

治法與上文百合症同。最宜者當時聞淡養氣。或以比魯介賓射入皮膚其不發時。常服鍊溴。鈍石。飲食清淡。酒肉宜忌。餘同百合症。

魚鱗癬 重者曰牛皮癬 Ichthyosis.

治法。內服宜魚油鉢石。別藥無效。○至要者外搽之藥。因此症由於患處之假皮變厚而硬。膚珠外疊之故。宜先以鋤輕養水搽洗該處。後以爛皂與刷刷之。使鱗痂脫盡。然後搽以滋潤之劑。如猪油、橄欖油、甘油、佛士林等均可。○如患在手面者。宜搽闡納林爲妙。○此外。又宜蒸汽沐浴引汗。每日一次。每汗後搽藥兩次。浴亦可亦有以魚油搽敷該處者。如患處極厚。敷藥不消。宜以剝剝之。或以鎰養酸沙利沙等品點敷而去之。或以鋸碘一分。闡納林一兩。調勻搽之。○其病久堅硬者。宜搽偈

克坐兒。

一分調
油百分

納弗石。

半分調
油半分

力坐新。

一分調
油百分

等品。○有時與水蠍癩相併連

者。宜先治水蠍癩。

黃疸 Icterus.

見後黃疸篇。Jaundice.

天泡瘡 Impetigo.

此乃皮膚新炎。發生膿泡之症。大約虛弱者多患之。○治法。宜去其病由飲食清淡。忌提神之物吸淨天氣。常須運行。血薄、胃閉、便結等症。均照法治。并服魚肝油、麥液漿等補劑。○外治之法。與有膿之水蠍癩同。先去膿瘍。後以鋸養油擦之。○一方石灰水一分。橄欖油一分。鋸養油一分。調勻擦之亦可。○如病在頭面。宜薙去頭髮。後以輕淡汞綠油一分。鋸養油三分。相合擦之效。

陽痿 不舉 Impotence.

概爲年輕斲喪之故。○治法。先宜脩心。勞其身體。切忌煙酒。每日以冷水頻洗陽莖。內服呻嘶頓補藥。或以電震之一納背後脊髓。一納前陰各處。每震約一刻餘。日震一次。或推拿法亦可。或在下部佩帶此症專製電氣之帶。Pulvermacher Chain Battery. 或謂蟹螯酒與燐。於此症極有效驗。但久服恐有碍於他臟也。宜慎。惟代蜜耐。Damiana. 一藥。極稱穩妥。○一方。代蜜耐流膏一二兩半。馬前酒六錢。甘油到四兩。每飯後服一錢。清水送服。最效。其餘如了葛、松節油、畢澄茄等劑。斷不可服。不第無益。反有害也。如因重病以後。致陽痿者。或腰腦筋病。致此者。如痛宜服汞雙綠四十分釐之一。或鏽綠金綠二十四分釐之一。或銛碘每服半分。惟燐宜慎用之。且數月後。方可電震。此時又宜出門遊行。改換水土爲要。

此症不一。有爲膀胱石淋所致者。治宜割出。有爲膀胱癰。膀胱蒂核脹大變窄者。宜照法治。并通管通之。如小兒遺溺。男多女少每因直腸髮蟲所致。宜以溫水。或以鑄綠水。射洗肛門。有因包皮過長所致者。宜割之。有爲溺過酸所致者。提神膀胱縮合宜服蛤蜊劑。或因食物所致者。宜節飲食。晚餐更宜小心。并忌茶湯。又宜早睡。臨睡時宜小便一次。後過三四點鐘叫醒。再使小便。其衣被宜輕鬆。牀鋪宜平硬。又宜側睡。不可仰臥。亦犯此 小兒患此。有經年累月穢臭不堪。因而面黃肌瘦。爲父母者不必加以斥責。恐因此病反加重焉。○或謂在腰背引炎。或謂以蟹螯水搽項頸。有時可愈。○內服最妙者蘋茄。或了刀邊。亦有服此毫無效驗者。無他。服之過少。不合法也。大抵蘋茄治此症。與其小服。不如大服。無有不奏效者。宜每下午服蘋茄酒半分。至晚再服半分。約服二三禮拜。漸加至每服分半。以至喉覺乾燥。瞳人放大爲度。不可再加。如服此二三禮拜後。仍

不愈者不治。○亦有用了刀邊水射入皮膚者。如四歲小兒。可射一滴。十歲之兒可射二滴。十五歲可射三滴。在未睡早三四點鐘射之。至臨睡時。瞳人尙未散大者。再射入一半可也。○有時鍊溴頗效。須合蘋茄同服。其功更偉。○一方。鍊溴五錢。蘋茄酒四錢。糖露一兩。橘花水到四兩。每睡時一點鐘服一錢。頗效。○綠養冰。印度麻。鴉片。哥地納。未見穩妥。不用爲妙。○惟而魯司流膏。Rhus Aromatic Ext. fluid. 猶納氏常用之。凡二歲之兒。服二釐半。八歲之兒。服一分。均合水同服。頗效。每有謂安的拜林。布古。蟹螯。了葛。松節油。幾阿蘇。拉拍林。Lupulin. 鍊淡養。馬前冰等。均無實效。不如電震爲妙。○已用上法無效者。宜以實通管通之。每日一次。連通七日。或亦可愈。否則以銀粉一分。化汽水一兩。射入溺管。至蒂核爲止。不使射入膀胱。如小女患此。可以銀淡養三釐。化水一錢。溺後射入。亦有常以溫水射洗膀胱者。惟此症治之極緩。不能速痊。○

如病已愈。宜服鐵、魚油、馬前冰等。補益之品。

時行傷風 或作惡傷風 或作春瘟症 Influenza.

此能傳染之熱症。有一時一鄉一邑均患之者。大抵初起。卽形寒風。但亦有並無傷風之形狀。不過甚覺倦乏。骨節疼痛發熱而已。病原蓋由病毒之蟲。Microbe. 染至血分。累及全體。腦筋與肌肉爲尤多。故腦筋肌肉之病亦愈多。如頭痛腰痛脚痛是也。○治法。宜解其血中病毒。顧其元神爲要。飲食宜補。并易化之物。牛乳牛汁等佳。初起頭痛腰痛者。宜安的拜林。每服分半。功能止痛引汗。服後兼飲熱湯。以助藥力。○亦有與肺炎氣管炎症相連者。醫者亟宜引炎提神。倘或因循坐誤病極危險者。宜服雞那霜一二分。合輕淡香酒。或忽司克同服。并錦葡萄海蔥等品以表之。○一方輕淡炭養四錢。金雞那酒兩半。輕淡香酒四錢。金雞那泡水到十二兩。每服一兩。合半兩檳榔汁同服。每四點鐘一服。○如嘔吐者。宜胃部貼芥辣膏。或吞冰塊。惟忌服輕衰酸。恐有害於心經也。○兼有風濕骨痛者。宜鎗沙利沙酸。每服二分。每四點鐘一服。○如泄瀉輕者不必治。重者宜淡礦酸三分。鴉片酒一分。相合。每瀉一次。服藥一次。或以蘇木膏一分。合鴉片膏一釐同服。亦有服鉛醋或炭匿酸而效者。或服鉛醋鴉片丸。餘同泄瀉。詳前卷。○此症已退。又當靜養。不可出行過早。往往初愈虛弱無力之時外行。以致肺炎而傷者甚多。切宜慎之。至其病時。平日飲食最宜小心爲要。○此症並不由人傳人。蓋由天氣傳染。或一鄉一邑一時俱發者也。

趾甲內陷 重者潰爛曰甲疽輕者趾甲暗陷內肉也 Ingrown Toe-nail.

此症大趾居多。概因鞋子過緊之故。○治法。輕者將趾甲翦短。刮薄。不使再陷。鞋子宜寬而闊。切忌尖緊。如症重潰爛者。以小塊絨布。墊在潰處。另以膏藥粘連所刺肌肉。使與趾甲相離。不至刺錯。二三日後。將墊

入絨布取出。再以埃阿達方白礬硼酸鉛粉鋸養粉等洒入。或一方。
埃阿達方四錢。爐甘石二錢。相合。洒之亦可。○如爛處變成肉砂高堆
者。宜以銀淡養。銅礦養。鋸綠。加波匿酸。汞淡酸。鐵綠水等。蝕之。或先搽
哥根水。或射呻呻。後割平之。或以薄塊銀片。或鉛片。或錫箔墊入陷處。
較用絨布收功更速。而藥粉仍宜洒之。如仍不愈。以致趾甲動搖潰爛
將脫者。惟有拔去趾甲。但拔時極痛。故須聞以哥羅方。或全行拔去。或
翦去一半。視症之輕重。不能一定。○又法。以鍊輕養四分。水六分。敷滴
甲上。至變軟時。以刀割之。刮之。至薄始可翦去。

癲狂 Insanity.

此症不一。有憂思疑惑者。有怒罵兇橫者。有呆坐默思者。有癡心妄相
者。有見事而狂者。有逢人而癲者。名目不一。動靜各殊。○治法。宜使病
人離親去家。另住別墅。務使病人暢心悅目。快其胸懷爲要。切勿囚禁
縛繫。大抵不必服藥。久久可以自愈。其仍有不愈者。宜顧其脾胃。使消
化有力。又宜內服甯睡之劑。如無心病者。綠養冰爲最妥。有心病者切忌 鍊溴。撒
弗那兒。潑拉兒海達。藥力過緩。莫若以開羊花精。用皮膚針射入百二
十分釐之一爲妙。而鴉片咖啡等品。則慎用之。

不睡 Insomnia.

此亦病狀。非病症也。其故不一。概因別病所致。均宜照症施治。○治法。
最宜審其病由。如多飲濃茶。飲食無時。用力過度。寫作傷腦。以及憂樂
勞心。胃不化。肝積血。心房病。瘟熱症。飲酒。腦瘤。脚冷。漁米睡也 疼痛等。均可
致之。醫者見症。切勿亟投甯睡之劑。須先查悉病由。先使飲食小心。運
動身體。改換天氣。或將睡時先令行走遠路。或以熱水冷水。只能于心 淋浴
洗腳。或煨以熱水瓶。或高枕睡之。或臨睡少飲溫水。或冷水。或凝神默
算。或推拿全身。或熱水引汗。或以電震。諸法均有甯睡安寐之功。如用

之不效。後當服藥。惟能成癮之品。均宜慎用。最妥之法。可以忽司克二兩半。燙熱。睡時一口飲盡。即睡。恐上癮者可以白木等苦劑合服○此外如鴉片。兼疼痛者宜之。如勞腦過度。以及瘋癲。宜忌勿服。恐成癮也。大約每服膏一釐半至二釐。或嚙啡水三十滴。服後四五點鐘不睡者。再服。○重者可用皮膚針射入嚙啡。但未射之先。宜服忽司克酒。并合了刀邊水同射爲要。○如有久嗽肺勞。腦積血瞳人收小。以及小兒體質柔嫩。則鴉片。嚙啡切不可用。○如因心痛不睡者。可以嚙啡四分釐之一。用皮膚針射入。○印度蘇有時頗效。惟性烈用之宜慎。服鴉片。嚙啡後。每有胃吐頭痛。服印度蘇則無此弊。○最要者用鬧羊花精。 *Hyoscine Hydrobromatis*。 每射百二十至百五十分釐之一。極效而妥。可以常射。漸多至八十分釐之一。
心門有病者忌用○或用以內服亦可。○一方。鬧羊花輕溴精半釐。橘皮酒一兩。汽水三兩。相合。每服一錢。○此外鋸溴。鋸溴。每服三四分。用治平常之症。

頗有效驗。

有服鋸溴一二不效者不可多服。恐胃不安反不能睡。

大抵勞腦不安心思過度者。鋸溴最靈。初服

宜三分。過一點鐘不睡者。再服三分。再不睡者。兼飲忽司克酒二兩半。熱飲。以助之。且鋸溴可以經年常服。毫無碍處。○綠養冰最易成癮。又

碍心經。故宜慎用。

綠養冰能安睡而不能止痛。又服此後可以逕至心經肌肉使之放鬆無力。

凡有心病氣管發炎。氣珠變大。傷寒等症。切切忌用。萬一用之初服宜二分。或合鋸溴忽司克。嚙啡等

同服可也。○一方。綠養冰三分。鋸溴三分半。嚙啡水平錢。橘皮糖露汽

水到三兩。先服一兩半。不睡者。再服其餘。并飲忽司克酒以佐之。

白塔綠養冰。與綠養冰功用相同。惟頭顱第五對腦筋痛。服此善能止之。兼能甯睡。其餘如壳羅兒。猶拉層。 *Chloralurethane* or *Ural*。撒末納兒。

^{Somnal} 壳羅兒。曼達。 *Chloralamide*。均可服之。或服撒弗那兒。每服一分至

分半。其功只能甯睡。不能止痛。較綠養冰更覺穩妥。約二三四點鐘後。藥力漸顯。並不碍於心經。宜每晚臨睡早一點鐘。約服半錢。合溫水或

忽司克酒同服。功效更速。此藥色白無味。無氣易服。婦嬰宜之。如癲瘋等症。服此太緩。不如服潑拉兒海達爲靈。如小兒不睡者。服此爲妥耳。○潑拉兒海達。功用極佳而妥。惟氣味過烈。故多鄙之。此藥可以久服。雖心經有病者亦可服之。稍能補心。故肺體炎症。服此最宜。既能審睡。又能補心。極稱靈驗。卽癲狂症亦宜服此。服後功效頗速。能睡六點鐘之久。大約每服三四五六錢。雖服後口有藥氣者無妨。每服宜合膠水或忽司克酒同服。○一方潑拉兒海達一錢。樹膠二錢。白糖露二錢。桂皮水九錢。相合作一次服。或以潑拉兒海達成空丸服之可也。

以上諸藥。服無不效。如不效者。概屬難治。雖有取服海百內。Hypnone

每服四滴 成空丸服 阿碎得兒。Acetal 每服二錢 麥石拉兒。Mythylal 每服三錢 愛麥倫海達雷得。

Amylene Hydrate. 每服一錢 合酒同服 或安的拜林。哥羅方。咿呵。撒姆末。拔麝香。樟腦。

蒲陀克羅辛。Boldoglucline. 拉百林。Lupulin. 拉得西。Lettuce 毛地黃等品者。概無實效。

往來瘧熱 Intermittent Fever.

治法。最可靠者。惟雞那霜。當初發寒顫之時。有用法截止者。有聽其發之者。或謂當時截止反有後患。○發寒之時。宜煨熱水瓶。飲熱湯。或射入比魯介賓。或了刀邊。謂能止之。或服哥羅方。至四分。或大服鴉片酒。或飲熱茶與酒。然後奔走。亦能止之。或用瀉汗引炎等法。以止之者。○寒冷已退。身大熱者。宜將衣被揭去。以溫水或冷水洗揩身體。或以冷水壓在頭部。○熱極則汗。此時宜以手巾浸熱水。擠乾。揩抹全身。○內服之藥。雞那霜當出汗時。宜服一分。成丸服。後每四點鐘服半分。初發寒冷。或轉熱時。切勿服之。必至汗後不發。兩日內至少可服二分。惡瘧汗後可服三分。後每四點鐘服一分。如病後不再發者。宜常服此藥。以免重發。○亦有服雞那霜不效。而常發者。宜服鉛石水。

每日三次。每次四滴。或以鮮檸檬作茶飲。亦能治之。或以沙利沙精。倍白林礦養。Beberine Sulphate 亞比阿兒。每服二分 Apio 納兒靠丁。每服一錢 Narcotine 樟腦。辣椒。克林達利亞。Grindelia 郁加利達。魯西亞藍。Prussian Blue 每服一兩。鎘淡養。每服半錢 輕淡綠。每服二錢 了葛。鍶碘。鍶溴。淡酸。碘劑。燐劑。馬前冰。苦白木。以及力坐新等品。合鍮石水同服而取愈者。其實功在鍮石耳。○此外華而白酒。Tinct Warburg's 治此亦效。善能解霉毒。表汗。取功頗效。但不若雞那霜之靈驗。如西人來華。居住卑濕霉毒之地。能每日服雞那霜半分至八釐。可免此患。○瘡後餘波。卽脾經變大也。如能常服鐵、雞那霜、鍮石。并外用紅汞碘搽藥。與鍶碘肥皂搽藥。易散可愈。

濕爛或在脣腋或在頸項 Intertrigo.

此本水蠍癩之症。○治法已詳前水蠍癩篇。簡法。在患處宜挾棉花與藥粉。富羅石散。鍶炭養。鋸粉。樟腦石炭養粉等。或油類。或一方。鋸油二兩。鍶炭養二錢。爐甘石二錢。樟腦汁一錢。相合調勻。成油搽之。極效。

腸廻閉窄 Intestinal obstruction.

此症最險。如腸廻褶交結。腸癰。或炎後收窄不通等症是也。前多不治。近十餘年來。有在腹部割治。以慶生者。實繁有徒。但必先審明病由。施用藥法無效。不得已然後割之可也。醫者必先探悉病處。是否宿垢。或爲腸褪。或一處收緊。或因瘤癰之故。○初治。宜平臥。兩腳縮。肚腹鬆。不使腸廻用力爲要。如初起嘔吐者。宜食牛乳所成之冰。并牛汁等。痛者。宜鴉片。每用酒四十五滴。納入肛門。或射入咖啡亦可。或以咖啡水半錢。合了刀邊水一滴。作一次服。過兩點鐘不效。再服半劑。○肚外用冷劑。或熱劑壓之。或搽蘋茄搽藥。或以蘋茄成尖丸。納入肛門。大約初起忌服瀉藥。須用水射外導。射時病人宜左睡。頭宜低。臀宜高。腰間墊

以枕使水易通至患處。

宜用自流水

只須將淨溫水漸漸射入。不必用油皂等射入後再

令仰睡使水流通故射入之水愈多愈妙要之此症一不食二不動三

鴉片。

內四外壓

五

射水如五法不效惟有剖割或聞以哥羅方用兩手

推拿腹部使病處移動或使病人倒懸或將兩膝粘在胸膛轉動肚腹

以及別種運行肚腹之法務求病處腸迴通達爲要亦有在肛門吸入

天氣。

有用純輕氣或氣或輕礦氣者

或以汞質倒灌肛內謂能打通窄處者此法極險或以電

震之。

○諸法仍屬不效并吐宿糞者非割不可須在臍與交骨兩間適

中處直割約容一手可入。

約三寸四寸

小兒約兩指可入但先割少許至見腸迴

無病可以設法者再割大之且此症聞哥羅方不可過多約五分時足矣。

每有聞之致死而致者

故割者手法宜熟鍊刀器宜極淨如割時腸溢出者當以藥

布浸解毒熱水壓之後以手指探明病處情形如何或褪入或交結須

漸漸扯直照病治之如不能探明病情者惟有將割處之腸開假肛門

眼簾發炎 Eye

治法。宜瀉之眼中滴以了刀邊水極痛者滴哥根水或以皮膚針射入嚙咷如血多瘀積者宜蜞吮之如滴了刀邊水瞳人放大者易治不放者積血或牽制之故宜以汞雙綠水洗之○此症曾患花柳症者多患之故汞劑宜常用○當發炎時須防瞳人扳住如是者前房之水過多宜刺放之○有風濕者宜鉛沙利沙○或謂松節油每服一分能使眼簾之積血消退此症宗治之法一宜不動靜養二用了刀邊三用汞雙綠無有不愈者○如症重恐瞳人牽扯者宜搽汞油藥或加路米三分釐之一合甘油些微滴入眼中頗效○已用諸藥瞳人仍有牽制不圓者宜以小針刺直或做假瞳人。

黃胆 Jaundice

此乃病狀也如胆淋等症有之醫宜審其病故是否胃先發炎然後累

及四合迴管所致。○治法宜通利大便飲食滋潤并服嚙啡水鉢炭養蛤蜊類外宜引炎法。○亦有自然發患並無別病所致宜治其標宜服拉軋會達流膏 *Liq. ext. of Ragweed. (Senecio Jacobaea)* 每服一錢或藥泉水布道非連洋合莞蛤蜊鑄鍊鹽類以及輕淡鹽類等。○一方鑄雙炭養一兩半大黃粉一錢薑粉四錢高林布粉六錢吃暉疇雜紛一錢相合每用一小匙合半杯鍊之荷蘭水同服每四或六點鐘一服。○又方蒲公英鮮汁二兩鑄雙炭養六錢大黃酒一兩半龍胆草湯加至十二兩每日三次每次一匙此二方可以間而服之或服淡輕綠淡酸每次服二分合植物苦劑同服宜飯前服之或輕淡綠每夜睡時服二分半。○此症所服汞劑不取其瀉取其利肝也既服汞劑又宜佐以瀉劑如先日服汞者次早宜服鍊磺養鎂磺養鑄磺養鑄燒養等下之。○亦有因霉毒發此病者宜雞那霜并宜飲食清淡只宜已去油之淡牛乳凡糖藥爲最效。

油白塔酒等切忌之米食亦宜少進。○如爲胆淋所致者已詳胆淋篇。○如病根已去或胆淋已過第欲去其黃色者當時不宜服利肝劑宜服瀉肝劑如鎂磺養亞羅等合利胆汁藥同服可也。○胆汁在腸所以助消化并不使腸胃之積糞臭壞故有此症者宜服弗兒鮑文 *Fel Bordinum Purificatum* 每服一分成丸服日三四次如胆汁不至腸亦可使糞臭壞而瀉或因而腸炎如是者最宜松節油每食前服之或服幾阿蘇硼酸亦可。○此外又宜服利小便劑使胆汁由溺而出。○又宜熱水沐浴或引汗法使由皮膚而出或常以鍊炭養化水抹身或以比魯介賓四分釐之一射入皮膚功效最靈凡胆淋阻塞者宜之各種黃胆惟此藥爲最效。

骨節病症 Joint disease.

大腿節病已詳上文發炎者詳後骨節新炎篇其有舊炎不愈者宜飲

食精細。并服補藥。如有別病者。照法治之。并顧其全體爲要。此外又宜靜養勿動。可用夾板。或石膏布卷縛定。必至熱、紅、痛三者俱退。方可少加運動。○如疼痛者。宜熱劑或冷水壓之。或以醋酸水抹之。或以火酒一分水二分相合。浸布貼之。新症舊症
此方均宜如在四肢。宜扯直之。以免攣縮。○如新炎已退。宜推拿法。使病處少動。否則恐成廢體。○如骨節腫脹變大者。可以象皮卷包紮。如有膿者。宜及早刺放。勿待自破。○如骨體病者。或割或刮。後搽鋸綠水。○如骨節壞者。宜割通。日以藥水洗之。或將病處全行刮淨。大腿骨此法
不能用之有漸漸收口得愈者。

肉龜 或名螃蟹瘡 Keloid.

此係瘡後結爲堅硬光亮之塊。割之病反加重。每有因針灸後而起者。○治法。宜搽汞油。或貼汞膏藥。外以布卷包紮。或以電震。或服汞綠鋸碘。大抵難治。無碍者聽之。○有時疼痛者。宜鴉片嚙啡安的拜林哥根克撒而仍鍍溴等品。

膝節病 Knee-joint disease.

此即骨節發炎變舊之症。概爲虛弱之故。飲食衣服均宜精細。住處高燥。內服補劑。魚油、鐵、碘、麥液、醬、燐、鉛石、汞綠、石綠等。又宜將患處挺直勿動。或用夾板。或綰以鐵片。痛者宜引炎。或熱劑冷劑。或弔膏。或止痛搽藥。○如能出門吸換天氣則更好。不可久住臥房中。故用石膏布卷。或多馬氏鐵板爲妥。病處不包
仍可洗數如有膿者。宜開刀。諸法仍不愈者。一宜開刀洗之極淨。二開刀後以布浸磺酸一分水一分。浸濕塗塞之。三在骨節兩旁開大。以鐵匙刮淨。四二三之法合而用之。五在膝蓋前下廉割一環。將膝蓋揭起翻上。凡有病處盡行刮淨。或割去已壞之軟骨。後以鋸綠水。或加波匿酸水。熱洗之後。插皮管。通行膿水。使毒易出。不可少積。爲要。或在臘部內邊再穿一孔。以瀉膿毒。割後伸直時。切勿使皮管在

節中夾住。^六將全節割去。^七連大腿下截一同割去。大約骨病或壞爲日已久。年已老邁者。不得已惟有將腳鋸絕。

醫方彙編卷一終

