

醫
方
彙
編

卷四

I-126

F
イ-114

492 Jh-5

No. 2288

12 126



富士川文庫

2655

卷四

醫士

英國醫士梅滕更口譯
慈谿銘之劉廷楨筆述

天台陳子耕 受業銘三劉廷銓
銘新劉廷璋 同校

胎盤先出 或胎盤不正

Placenta Praeia.

治法。凡在孕後七月內。一時流血者。必是胎盤與子宮相離之故。治同小產。宜平臥勿動。餘詳小產篇。○如血崩者。宜將胎兒與胎盤。當時取下。不可少延。活七月內之胎兒難以養。活七月後者間有可養。取法。先將子宮之口放大。使胎兒倒下。或將胎兒之腳拉下。西國有名醫擬治此症簡法。一一經辨明此症。當卽設法醫治。既經施行手法。務至取下。不可延時。至次日。三子宮口已開。胎盤不正在旁邊。宜破其胞水。破後少待片刻。四片刻後。胎兒頭欲下。

不能阻止者。宜用鉗拈下。或倒身下之。^五子宮口小。或胎盤阻於宮口
或偏者。宜用手指引路張大之。或用象皮管逼氣張大之。然後將胎兒拈
下。或倒身下之。^六子宮窄一時無醫器可以張大。宜用手倒下之。^七施
行以上各法之時血崩者。速將胎兒取下。或倒身拉下。其血自止。^八七
月前之兒。宜倒向下之。不必用拈。[○]餘觀正產小產篇。

肺胞發炎 Pleuritis, Acute.

此係肺經胞膜發炎之症。取治之理。與別種炎症相同。而取治之法各
別。[○]大約此症因呼吸扯動胞膜。是以甚痛。鴉片嚙啡則不可少。兼有
氣喘咳嗽者。宜以嚙啡在痛處用皮膚針射入。或以表劑合止痛劑同
服亦可。[○]一方。嚙啡水八分。藜蘆酒一分。輕淡醋水二兩半。錦葡酒二
錢半。樟腦水到八兩相合。每日服三次。每次一大匙。[○]亦有用放血之
法。^{二兩者有故血十}或蜞吮。或火酒烙。[○]或外用芝麻芥辣壓劑。壓在痛處。痛止不

必再用。後以熱水絨布壓之。

詳見膜炎篇

或在炎處外面。搽蟹螯水。或以鉛膏
藥斜條貼粘肺部外面。不使肺動。并有止痛之功。或用哥根半釐。射入
以止其痛。各種止痛搽藥概無大效故不用之

至毒炎

宜乾食

○病人宜靜臥勿動。飲食小心。初起宜流水之物。

如牛乳等佳。

此症初起宜瀉劑通其大便。病久則不可瀉。○又此
症炎後多有積水者。如水少心無累病。或貼大張蠻蠻膏於外部引炎。
使水外洩。或搽碘搽藥。或碘酒一分。合甘油一分。搽之。或搽汞油六分至
未流口水爲度。或鍼碘肥皂搽藥。浸布貼之均效。[○]內服之劑。如鍼碘、
茄菲精。毛地黃沸鹽、鎂礦養。比魯介賓等品。利其小便。或表或瀉。均所
以去其積水也。[○]一方。毛地黃酒四錢。海蔥酒三錢。鍼碘二錢。金雀花泡
水到十兩。相合。每日服四次。每次服半兩。化水一兩同服。如用比魯介
賓。功能大汗。大約用皮膚針射入四分之一效。[○]肺積水者。飲食宜乾
切忌茶湯流汁。但亦有專飲牛乳。每日八九十兩。而無別碍者。[○]以上

諸法有用之得愈有不愈者。不一而定。故諸法外一宜瀉之。每早空肚用鎂礦養一兩化水少許下之。亦有母服二兩者或服鏑沙利沙三分或沙羅兒三分或安的拜林一分亦有效驗。○如肺部積水過多。宜早放之。每有水脹以致肺縮後。雖用法使水消去。而肺經已變實。不能再鬆。故醫者辨明積水已多。服藥不及。宜刺放愈早愈妙。刺法先以皮膚針試放一次。然後用套針由第六條肋骨上廉刺入。餘同二卷肺胞積膿篇。放時又宜使水緩緩洩出。不可一時放盡。每有刺放過多過速。以致咳嗽厥逆者。最宜慎之。放畢。另用藥布包裹。病輕者刺放一次可愈。病重者宜放二三次。亦有內毒不盡。或變爲膿因而傷生者。亦屬不少。○放後飲食宜補。又宜內服補藥。鐵金雞那魚油等品必不可少。或出門遊行。改換天氣。或肺部尙有餘水者。宜引炎法以散之。

肺胞腦筋痛或作肋縫風痛 Pleurodynia.

此係兩脅一時暴痛。呼吸艱難。治法與瘋痛同。宜先熱水沐浴。後服鏑沙利沙三分。後每六至八點鐘服。安的拜林八釐至一分。或沙羅兒每服分半至二分亦可。○新症之後。宜服○一方。鏑碘一錢。鍊雙炭養一兩。山米斯酒六錢。樟腦雜水 *Mistura Camphoræ* 到十二兩相合。每飯後服半兩。頗效。或兼服雞那霜亦可。○血薄者。宜服鉛石鐵酒。○外治之法。可用咖啡三分釐之一。射入痛處。後用鉛膏藥斜條貼在胸肋。不使肺動。或貼鴉片蘋茄膏藥亦可。或以絨布浸止痛之藥。如蘋茄草烏頭哥羅方等品。壓在痛處。再以布卷油紙包裹。或以薄荷冰樟腦綠養冰。搽抹痛處。或以碘芥辣巴豆等引炎。或以針刺痛處。放血。引炎。後以呻呻噴射。頗效。

鉛毒 Plumbism.

此症概由鉛製杯壺之毒。故西人不用錫壺由飲食涵入血分。以及鉛匠多患之。見

症。凡鉛製各器。不可再用。○病狀。肚痛者宜瀉。鎂磺養佳。又以咖啡射入。以止其痛。或以草麻油二兩。巴豆油半滴瀉之亦可。亦有服鉛碘。能使血中鉛毒化爲無毒鉛之鹽類。由小便遺出。簡法。每飯前服鎂磺養一錢。飯後服鉛碘五釐。甚有效驗。○又白礬_鵝^功與鴉片。亦可服之。或以硫磺泉水沐浴。或內服硫磺。○間有肌肉痙攣者。宜電震或推拿法。_{餘見}
鉛毒乾吐痛又

本卷癰瘍篇

肺本體發炎

中土每以此症誤作火蒸傷寒 Pneumonia.

此係肺部一處統炎也。大小不一。或一葉或半葉。則不一定。病狀。常熱不退。俗稱火蒸傷寒是也。○初起宜平臥。衣服輕薄。臥房通風。切忌閉窗天氣熱須六十度。飲食宜牛乳。晚服加路迷三釐。早服鎂磺養以瀉之後。宜發表。○一方。咖啡水一錢。輕淡醋水二兩。錦葡萄酒五分半。樟腦水到八兩。相合。每服一大匙。每一刻服一次。○外部以芝麻粉壓之。或照腹

統膜炎篇。以芥辣粉壓劑壓之。痛不止者。宜皮膚針射入咖啡。或熱水紗布_{合鴉片}外壓。或引炎法。或壓冰袋。均可試用。○亦有以雞那霜三分。合加路迷一分。相合作一次服。并浸入冷水。謂可以減其熱度。恐此法華人有不敢用之者。妥法。每四六點鐘服安的拜林一分。頗有功效。或安的非白林沙羅兒克撒兒琴亦效。○亦有大服雞那霜者。_{約三}^分但服此多有痰滯頭暈之害。不如服滷沙利沙安的拜林爲妙。○德法兩國醫士。每用冷水退熱。如熱一百有五度。用六十度冷水。浸一刻之久。再加冰使冷至四十度。如熱一百二三度者。宜用冷水揩抹身體。善能退熱。惟此前先服白蘭地。至水浸時再服少許。提神爲要。○此症最要者。顧其心力。是以忽斯克白蘭地等。必不可少。如脈細數無力而沉者。更宜服之。莫妙以忽斯克合牛乳同服爲妙。○病人飲食宜補而易化之物。不外牛乳牛汁等類。○一方。輕淡香酒一兩半。甜消呻呻一兩。毛地黃

酒二錢半。吃嘩咯葡萄酒六錢。麝香一錢。辛高那酒到六兩。相合。每一刻

用半兩。化水二兩同服。善能提神。虛弱者宜之。○此外茄菲精。鏽沙利沙。亦可用之。○心無力者。宜馬前冰。用皮膚針射入。不睡者。宜潑拉兒海達。如安睡心無病若易治。忌用綠養冰鴉片嚙啡。惟潑拉兒海達大或撒弗那兒。每

服三分。最有效驗。○亦有用哥羅方合酒醇。浸棉花近鼻嗅之。功能甯睡。○或每服輕二養Peroxide of Hydrogen.二分。或每飯前服鍊碘分半均效。○如熱已退。仍宜顧其心力。飲食小心。內服補劑。呻嘶頓佛羅斯等均可。○一方。馬前冰水錢半。淡輕綠淡酸五錢。雞那霜三分。高林布湯到八兩。相合。每服一大匙。化水飯前服之。功主補益。久服甚效。

肺胞積氣 或作胸氣脹 Pneumothorax.

此症多因肺胞積膿。或肺體破爛穿孔所致。有時疼痛不堪。宜聞哥羅方。或外皮引炎。或射入嚙啡。○如積氣甚多。肋縫脹凸者。宜用刺針或套針放之。或插入皮管均可。

救各種服毒 Poisoning.

夫救服毒首要之法。宜使所服之毒速吐盡。或用皮膚射藥。或以雞毛拭喉。或服藥。或用洗胃皮條攝出。見症施用可也。○惟服各種強水。以致內皮潰爛者。宜吐之。切勿用胃水篩抽洗。○通皮條洗胃法。先以一指壓定舌根。右手將皮條速速通入。難入另以玻璃漏斗。與皮條相接。灌水入胃。將皮條下垂。胃水自能流出。○取吐之藥。如阿伯嚙啡。十分釐之水少許或吃嘩咯與錫。均可服之。○至於吐出之水。須量其多少。細覈其質。可驗所服之毒。究係何物耶。○一方。砲鎂養。Calcined Magnesia. 木炭粉。Powder Wood Charcoal. 與鐵雙養Hydrous Peroxide of Iron. 各半兩。相合。加水少許。每半點鐘一服。連服三次。不拘所服何毒。已吐之後。均可以此內服。善能解毒。

救金類酸毒。○忌用胃水節宜服蛤蜊、石灰、肥皂、鉛炭養、鎗炭養等。化水服之。或服杏仁油、橄欖油潤之。疼痛者射入嚙啡。飲食宜由肛門射入。毒甚胃爛。有穿孔通至肚腹者。宜飲食滋潤。藕粉、芝麻泡茶、鷄蛋清、大麥水等品。大抵此毒救治甚難。

救輕衰酸類之毒。○宜吐之。或用胃水節內服銼礦養半錢。或射入了刀邊六十分釐之一。或以輕淡忽斯克提神。或聞吸養氣與輕淡綠藥煙。先宜鐵養後服鈦炭養。有化學之變法。解其藥力。惟透呼吸法。必不可少。

救草烏豆毒。○先吐。後宜提神之品。忽斯克或輕淡劑。用皮膚針射入。或以毛地黃酒二三分合了刀邊水二滴同服。或馬前冰每服三十分釐之一亦可。胸膛宜貼蜜蠟膏。并用手挫擦全身。或謂聞吸阿沒來淡養氣亦妙。

救酒毒。○先吐。吐盡宜服濃荳菲茶。腳部宜貼芥辣或煨熱水瓶。再聞阿沒來淡養氣。或以馬前冰射入五十分釐之一。

救輕淡毒。○忌用胃水節。宜服淡醋酸。用多水橄欖油、杏仁油以潤之間。有聲管腫脹氣逆閉塞迫不及待者。宜開刀。

救錫毒。○服後自吐。不必另服吐劑。宜多飲溫水以助暢吐。後服濃茶。炭匿酸。或以酒精合馬前冰少許。或毛地黃少許。用皮膚針射入。或納入肛門。

救砒毒。○先吐。雖服毒後多自吐者。能再吐之愈淨愈妙。後服鐵養。或以炭養代之或鎂炭養。或骨炭橄欖油石灰水與滋潤之物。或大服荳麻油。以瀉餘毒。

救蘋茄子刀邊毒。○宜先吐。後服炭匿酸或炭粉。或飲濃茶。或射入嚙啡。或比魯介賓三分釐之一。然後服瀉劑。并以通管放溺。因毒由腎濾出油在溺中故宜放出

又宜提神引炎。透其肺氣。

救印度麻毒○宜先吐。後服提神與瀉劑。

救樟腦毒○先吐。後服多水。或瀉之。或以芥辣引炎。或用冷水熱水。拖擊全身。

救蠻蟹毒○先吐。後服滋潤之物。油類或石炭養。或服鴉片少許。或以咖啡尖丸納入肛門。

救加波匿酸毒○宜吐用胃水節。以甘油代水。或鎂礦養化水射入。後食油類蛋清等滋潤之物。後用礦養各劑。合熱膠水同服。再以了刀邊六十分釐之一。射入皮膚。功能提神。

救綠養冰毒○先射啞。或用胃水節吐之。後宜提神。用馬前冰二十分釐之一。或了刀邊二十五分釐之一。或茄菲精五釐。外聞輕淡。內服忽斯克酒與輕淡。全體宜熱。勿使少冷。另以電震。并透

呼吸法。不可常睡。內服茄菲茶。或用茄菲茶二十兩。射入肛門。

救綠氣毒○如聞吸之毒。宜聞輕淡氣或輕礦。 Sulphuretted Hydrogen.

如內服之毒。宜滋潤之品。蛋清與膠水佳。

救哥羅方毒○此毒多由外科聞吸過度所致。如舌縮者當卽拊定拉出。并通風。拖擊全體。透呼吸法。又宜左臥。另用輕淡忽斯克馬前水與毛地黃射入。後聞阿沒來淡養氣○如內服之毒。宜服阿伯咖啡五滴。吐之。或以胃水節射洗。餘同上。

附錄數年前泰西御醫驗定聞哥羅方之法。一宜仰天平臥。呼吸路切勿少有阻碍。如領帶之類二如外科不能仰臥者。聞藥頗難。須格外謹慎。見有危狀。當卽平臥。三寬鬆衣帶胸腹。切勿重壓。如猛力抽動者。聽之。不可用力阻止。四宜用布罩或玻瓶聞藥之專器。五初次聞藥不可逼近口鼻。須與天氣同入爲要。六如小兒哭後聞藥者。當短呼長

吸之時。切勿聞藥過多。^七聞藥片時。用手指揩眸子。不知不動者。聞藥已足。方可施刀。此後仍宜少少聞吸。切勿驟多驟少。^八如手指揩眸子能動者。聞藥不足。切勿施刀。每有急於用刀。因而厥死者甚多。

^九司蒙藥之人。宜專司其事。常審其人呼吸氣色。如一時呼吸面色異常者。當卽停止。^十聞藥時。宜露病人胸膛以辨呼吸。^{十一}呼吸忽閉者。宜將下牙床骨向前拉出。以通肺氣。^{十二}一時氣閉呼吸不通者。宜將頭放低。將舌拉出。并依好氏救溺法通其呼吸。^{十三}未聞藥前。最妙射咖啡少許。以防嘔吐。且聞藥時久無碍。^{十四}臨割時。可以酒醇或白蘭地內服少許。或射入肛門。或射入皮膚。

救哥枝禁毒。○宜胃水節射洗。服膠水蛋清。或濃茶炭匿酸等品。後服鎂礦養瀉之。再服提神之品。

救謙落毒。○先吐。或胃水節。後服炭匿酸與草麻油。提神用輕淡。或射及鴉片。善能止痛退炎。

救汞綠毒。○與汞同。

入馬前冰了刀邊。并透呼吸法。

救銅類毒。○先吐。或胃水節。後服鍤錦養蛋清牛乳麪粉蛋黃膠水。以及鴉片。善能止痛退炎。

救幾阿蘇毒。○與加波匿酸同。

救巴豆油毒。○先吐。或用胃水節。內服滋潤藥。或以鴉片合藥射入肛門。安其腸胃。或服提神退炎等劑。

救鋸衰毒。○與輕衰酸同。宜服鋸礦養水。或以冷水拖擊全體。或以刀邊射入皮膚。

救毛地黃毒。○宜鋸礦養半錢。或啊啞咖啡吐之後。服炭匿酸骨炭。并

提神之品。或射入草烏豆精一百二十分釐之一。或鴉片末斯克林

三分量 Muscarin. 酒精均可。

救喉哩爹毒。○先吐後服滋潤之品。并服鴉片。依養生路炎各法治之。
救加拉巴豆精毒。○先吐後服炭匿酸。并以了刀邊三十分釐之一射
入皮膚。至瞳神變大。或馬前冰與綠養冰均可服之。又宜身體常熱
爲要。

救咿吶毒。○多因聞吸之毒。治法與哥羅方同。

救野茵毒。○先吐後射了刀邊六十分釐之一。或服嚙啡與毛地黃。後
宜提神或用芥辣粉擦身。

救其拉撒米姆毒。○先吐後服鋸雙炭養炭匿酸。宜熱性提神之品酒
醇等類。或以輕淡。或了刀邊。或毛地黃。射入皮膚。

救輕衰酸毒。○與強水毒鋸衰毒同。

救闊羊花毒。○與了刀邊毒同。

救碘毒。○先吐後象皮管射洗。後服漿粉類與灰水。以及麥粉藕粉滋

潤各物。

救鉛類毒。○先吐宜鋸礦養。此藥不能吐。又能解去鉛質。後服蛋清。
淡礦酸。鎂礦養。鋸礦養。輕礦。後服種片止痛。餘詳鉛

救石灰毒。○宜服荷蘭水淡醋。

救淡巴菰毒。附草烟毒。○先吐。後服炭匿酸。或提神法。用芥辣擦身。或射入酒

醇輕淡咿吶士的年。三十釐之一。并鴉片小服。人宜平臥。不可行走。

救汞毒。○宜吐并服麵粉。麵粉化水取飲其汁。牛乳油類。以及嚙啡酒醇等品。

救馬前毒。○與馬前冰同。

救鴉片或嚙啡毒。○先吐或胃水節射洗。後飲茄菲茶。宜濃而熱。又炭
匿酸。并以馬前冰或了刀邊。用皮膚針射入。重者可射入七十五分釐之一每二三點鐘。或以冷水

拖擊。或以芥辣膏貼在心窩與腳。毒重者。宜在腳掌煨之使醒。既醒
不得再睡。常使行走。

救惡西酸毒。○宜吐或胃水節射洗。內服灰水草麻油。并退炎提神之品。與胃炎症同。

救比魯介賓毒。○宜吐或胃水節射洗。內服炭匿酸。并射入了刀邊。或內服了刀邊四十分至二十分釐之一。

救燐毒。○宜吐。每分半時服銅礦養五釐。并服松節油與鎂礦養蛋清油類等品。

救鉢藥丹毒。○宜吐忌用胃水節。內服醋酸油類麥液水芝蔴茶等潤之。

救鉢綠毒。○宜吐後服滋潤利便之品。餘同內腎新炎症。

救銀淡養毒。○大服鉢綠。或吐之。或速用胃水節射洗。後服蛋清麵粉汁牛乳等潤品。

救養金花毒。○吐後服炭匿酸與堤神之品。或射入咖啡。餘與了刀邊蘋茄毒同。

救馬前冰毒。○宜吐或胃水節射洗。後服炭粉炭匿酸。或以煙泡水射入肛門。或大服鉢溴二錢至與綠養冰哥羅方。加拉巴豆謙落。咖啡。呻吟等。或以酒醇或內服。或射入肛門。并透其呼吸。或常聞哥羅方。

救鋸錫葡萄毒。○與錫毒同。

救煙毒。○吐後服炭匿酸提神之品。并射入馬前冰二十分釐之一。餘同淡巴菰。

救藜蘆毒。○速吐後服酒醇鴉片。餘同草烏豆。

救錕毒。○吐或水節射洗。內服蛋白、茶炭匿酸、牛乳、蛤蜊水。并以鴉片合滋潤藥。射入肛門。

癰肉在鼻孔曰鼻瘡 在陰道曰陰瘡 Polyp.

癰本軟肉之瘤。概患於內皮。治宜割揩。如癰長有根者。或以線縛刀割

剪斷。或火刀電刀。均可施用。○此症在鼻最多。名曰鼻癰。宜以鉗拔取爲妥。亦有性硬而堅者。須用火刀鋼絲拉取。亦有將鼻開大。然後抜取者。○如癰肉極軟。如膠涎者。可以炭匿酸粉沙利沙酸、鋸礮養、白礬、濃酒醇、加波匿酸甘油、鐵雙綠水、鎔養酸等。搐入或射洗。如拔取後。尚有餘根。用諸藥外治。頗有功效。○又哥根。凡外用手法時。必不可少。○如子宮患癰肉者。治法相同。如癰肉大。易於流血者。宜火刀割之。割後用解毒藥水頻洗。其陰道用碘酒合甘油。半浸棉花揩抹。後以硼水射洗。以解其毒。

溺數 Polyuria or Diabetes Insipidus.

見卷一淡水消與甜水消症。

背脊骨爛 Pott's Curvature.

見卷一背脊骨爛篇 See Caries of Spine.

孕婦累病 又名胎氣 Pregnancy, Disorders of

孕婦最多嘔吐。清晨尤甚。大抵皆然。不足爲慮。治宜通利大便。服加斯加拉片。與草麻油。或溫水射洗肛門。飲食宜易化之物。且宜按時。不可過多。安法。宜每早在牀早膳。後兩點鐘方可起床行動。○一方。輕綠酸四錢。龍胆草雜水七兩半。相合。每服一匙。日三次。化水少許同服。或以高林布代龍胆草亦可。或合馬前酒。至十滴 每服五金雞那霜。淡輕衰酸。二滴 同服亦可。又鉢淡養。鉢炭養。卑百新。或應姆魯文。Ingluvin。每服一分。日服三次。亦效。○一方。淡輕衰酸一錢。嚙咙水二錢半。鉢淡養水 Liq. Bismuthi (Schacht.) 一兩半。卑百新。葡萄酒到四兩。相合。每服一錢。日三四次。食後化水同服。或第服嚙咙細丸十六分釐之一。亦效。○又錯養草酸 Oxalate of Cerium。每服三四至七八釐。或服加波匿酸而最妙。服幾阿蘇。成空丸服或沙羅兒。每服二厘或化水服之或哥根。每四分厘之或安的拜林。或潑拉兒海達。每一點鐘用三五滴化糖露服或鍊溴。

綠養冰。均可用之。惟綠養冰。宜由肛門射入。○一方。鉢溴半錢。綠養冰半錢。牛乳水九兩。相合。射入肛門。○一方。哥根六釐安的拜林錢半。鉢溴五錢。龍胆草湯到八兩。相合。每日三次。每次服半兩。飯前服效。○此外如草烏豆、銛水。每服十至十五滴或獨服或含嚥啡水同服。迦路迷。或碘酒合鉗石水。與吃哩略葡萄酒。各一滴化水服。炭匿酸三厘等劑。均可取服。○如用以上之法不效。或口渴無力。舌赤皮膚乾熱者。病症多重。宜將飲食射入肛門。另以呻吟噴射胃腕外部。或貼芥辣膏。且孕婦必須平臥勿動爲要。○萬一病重有性命之憂者。惟有下胎以救母。亦不得已之法耳。間有子宮口或陰道潰爛有病者須先治之。○此外孕婦可患之症。如小產。或溺涵蛋白。見腎舊炎症。已詳卷一。間有抽搐癲癇者。見後產後癰癧篇。

遠視眼 或花眼 Presbyopia.

此症爲前房過淺所致。無治法。惟有佩帶花鏡。所帶眼鏡以離目九至

十二寸所看字劃清楚。方爲合宜。

肛門發炎 Proctitis.

治法。先去病由。如痔瘡肛裂成管潰爛。虫癩所致者。宜先治各症。如相近生毒流通累及肛門所致者。宜以熱水外溼。或熱水沐浴。或熱水射洗肛門。或以解毒水。硼酸水或收斂之品。均可射洗。後搽謙落油藥。或艾青膏。見卷一肛裂篇。安其筋。最有效。○如疼痛或裡急後重者。○一方。鉢炭養六錢。蛋清一枚。橄欖油二兩半。加波匿酸半錢。玫瑰水到八兩。相合。每用半兩。射入肛門。頗效。

脫肛 Prolapsus Ani et Recti.

治法。當將肛門納入。或病人自納。或醫者以五指撮合。漸漸送入。如小兒患此。每多啼哭。以致肛門腫脹。最難納入。宜將小兒倒臥。頭低臀高。以食指插入肛內納入。隨用絨布外揩肛門。再以膏藥橫貼坐臀。或以

布卷包紮。不使再脫。切忌行動。○亦有用克氏法。Cripps。將絨布裹紮食指。塞入所脫腸內。漸漸送入。既已送入原位。將絨布抵住肛內食指即可輕輕拔出。○亦有用溫水八兩於大便後。射入肛內。側臥片刻。待再便後。另以冷水射入。亦效。○內治首宜審其病由。大抵成人患此。多因痔瘡所致者。先治痔症。或以冷水射洗肛門。○如因蛔蟲所致者。宜以烟葉一錢。沖水一小杯。射入肛門。頗效。○如溺管變窄。外腎變大。膀胱石淋。肛門癰肉所致者。均照症治。○小兒患此。多因虛弱之故。飲食最宜小心。內服魚肝油潤其大便。且大便宜有一定之時。并服硫磺粉或硫磺片。均有效驗。○如小兒肛脫變爲營症。不能上升者。惟有在肛門四圍。割去薄肉一圈。後再縫合。自能縮入。或以炭匿酸水。礬水。鐵水。銀淡養水等飲之。或納入冰塊。亦能上升。此外有用了葛精二三釐。射入所脫之腸。立有效驗。如久病脫肛者。宜射入甘油二錢。或用洋布氣袋外壓包裹。自能縮入。○間有用淡酸外搽者。宜慎用之或火刀割治者。或割去小塊。或割去大塊。待割口收合。自能縮入而無再脫之患矣。

子宮脫俗名陰脫或陰墜 Prolapsus Uteri.

此症治法與脫肛同。宜脫後當即納入原位。其人側臥。兩脚縮短。用手法漸漸送入後。又宜靜臥兩三日。并用冷礬水頻洗可愈。○此症多因子宮積血而重。以致下墜。故宜通利二便。或以棉花浸硼砂甘油。塞入陰中。至子宮口。納二日取出。并射洗之。又宜靜養。飲食小心。或服鐵劑。海水沐浴。牀鋪平硬。不可行走。○如膀胱前面同墜者。宜以冷水洗之。每八點鐘一次。又遺溺時宜俯伏。首膝着地。不使膀胱用力爲要。此外或電震腰腹。衣帶均宜放鬆。○以上諸法不效者。宜用子宮擰。以阻下墜。擰之形狀不一。見症而用可也。間有不便用擰。惟有將絨布浸甘油塞之。如能用則用擰更好。如象皮圈擰。Indian Rubber Rings。或霍氏如

意擰。Hodge。使子宮擰於擰上。不使脫下爲度。○以上諸法仍不愈者。或電震或推拿。或用刀法。將子宮頸與相近陰道後面縫合。或將子宮割去。或在小肚開刀。將子宮頂與肚腹縫合。或將子核割出。子核根與割口縫合。均不使子宮下墜。但此症不割並無性命之憂。故割之一法。審備之不用爲妥。

膀胱蒂核炎 *Prostate, Inflammation of.*

治法。宜止痛滋潤。又宜審其病由。如因膀胱炎石淋白濁等症所致者。均照症治之。症人最宜靜臥。或坐熱水盆。或以熱水射洗肛門。後以熱水或冷水射入。以去其炎。或外壓熱水冷水。漱塊琪吮。頗有散炎之功。○如濁管炎白濁者。宜熱水射洗以潤之。忌用斂藥。或另服鎂礦養瀉之。○一方。嚙啡水三錢。鍊醋四錢。鬧羊花酒四錢。錦葡萄酒一兩。輕淡醋水到四兩。相合。每服一錢。每日服四次。食後服之。○或以嚙啡尖丸納大。均效。

入肛門。善能止痛。○如炎重成毒者。宜及早刺放。或由肛門用套針刺放。或以割石淋用通濁坑管通入割之。割後又宜洗之極淨。○生膿後又宜細探內部有否石淋。如有當時取出爲要。○如膿多者宜挿入皮管。流通膿毒。○如變爲舊炎。宜以冷水射肛門。或外搽蜜蠟水引炎。或以軟通管放其小便。通時宜採
諭落油或以鍊輕養水_花五六滴射入濁管。或內服硼酸。或硼酸合鬧羊花了葛酒_大服均效。

膀胱蒂核變大 *Prostate, Hypertrophy or Enlargement of.*

治法。極大者不治。輕者易治。大抵此症必與膀胱炎癃閉相連。因核大則溺閉。溺閉則膀胱炎。亦有積溺過久變臭者。○大抵此症自五十七至六十歲多患之。醫者欲辨此症。可以手指探入肛門。試摸是否蒂核變大。如已變大。宜在溺後。另用通管。放其未盡內積之溺。倘每次溺後膀胱尚積餘溺三四兩未出者。病者須不時自放。以防膀胱發炎之症。

并內服硼酸。每服一分至分半。日三四次。不使溺壞變臭。○如蒂核變大過甚。積溺漸多者。宜不時用通管。由細而粗。使窄口漸大爲要。先砂甘油潤
急用加波匿酸甘油
因通管易於變壞也○大便須每日通利。如閉積者。宜加斯加拉膏。每早晚服一分。○一方。馬前酒四錢。硼酸二錢。蘋茄酒二錢。開羊花酒一錢。白哥湯到十兩。相合。每日服三次。每次一大匙。合蛤蜊水作沸時服之。○如服硼酸合度。雖外不用通管射洗。其溺亦不變臭。○亦有用象皮通管。朝夕通入。不取去者亦效。○已用以上諸法不效者。宜剖割。或自腹割至膀胱。再以鐵匙插入膀胱。刮去變大之核。至盡爲度。或照割石淋法。自會陰居中直割。割石淋宜偏
左或偏右割將核割開。以散其炎。均效。

癢癬 *Purigo.*

此症皮膚作癢。間有細小疹點。治法。宜久服魚油、鉛石、金雞那、鐵燐等補劑。又宜飲食精細。或另服汞雙綠六十四分釐之一。日三次。至半月盡脫爲度。後再以動物脂油擦之。魚油爲最佳數日可愈。○一方。杏仁油九分。扣達油 *Oil of Cade.* 一分。相合。搽抹亦效。○此症切忌抓擦。小兒患此者。宜用手套以免抓爬。致傷皮膚爲要。

癢 附陰癢 *Puritus.*

此症與癢癬異。癢癬有疹子。此則無疹。不過痒癢不堪。病故。或酒風。溺涵糖與蛋白。黃胆。胃滯。虱瘡。金錢癬。或衣服粗澁等故所致者。均照症施治。○因腦筋病所致者。宜平腦之品。如銳溴。鱗溴。印度蘇。其拉撒米姆比魯。介賓。蘢茄精。了葛等劑。均可取用。○因血薄所致者。宜以皮膚針射入魚肝油。每日二錢或以蛤蜊水。每桶水合銀炭
養八至十兩熱水。臨睡時沐浴。或以鋸礪

養漿粉等。化水沐浴。或以沙利沙酸合漿粉。十五至二洒撒患處。○或以薄荷冰外擦。或以薄荷冰半錢。合火酒一兩半。外擦。或以薄荷油外擦。或以薄荷冰二錢。橄欖油半兩。哥羅方一錢。蘭納林二兩半。相合。外擦頗效。或以哥根合白塔五十至一外擦亦可。○一方。哥根四釐。汞輕淡綠分半。鋸養粉一錢。白佛矢林十錢。相合。外擦亦效。○或以加波匿酸水八至一或化油。二十至一沐浴後擦之效。○或以幾阿蘇一錢。蘭納林二兩。調勻。擦之亦效。

○如婦女前陰癰瘍不堪者。宜用加波匿鑄二十五分。埃及地壳倫香水七十五分。甘油一百分。汽水三百分。相合。洗抹後擦以上之水亦效。○又方。加五分酒醇百分。汽水三百分。相合。洗抹後擦以上之水亦效。○又方。加波匿酸二滴。醋強嚙啡釐半。淡輕哀酸十二滴。甘油一錢。汽水一兩。相合。浸棉花塞入陰中。或以絨布浸貼癰處其效。或謂加波匿酸與輕衰酸加重更效又方。沙利沙酸一錢。鋸養粉三兩。甘油三兩。相合外擦。○此外如柏油。卡兒白兌對兒琴水。綠養冰。樟腦。哥根。更用合用加路迷。汞輕淡綠。安息香酒。硼砂。汞雙綠。埃阿達方。納弗石林。銀淡養。硫磺。沙利沙。白礬。鋸炭。養炭。匿酸。鉛霜。醋酸等。均可用之。卽謙落油亦甚效驗。○一方。幾阿蘇半錢。哥根分半。謙落油一兩。相合。調勻。擦之。未用此藥之前。先宜小便。便後射洗陰道。然後擦之可也。○肛門作癢。見卷一肛門癢篇。

膠肌生膿瘡附肚角腸癰○脊漏 Dorsal Abscess

此係膀內膠肌先炎後變爲毒。初起甚難分辨。概因身體虛弱所致。醫者知係此症。宜小心解毒之法。噴射藥氣必不可少。又宜及早開刀。抽氣放膿間有破於內部。或膀胱者。甚屬危險。亦有破於脊腰。俗名肚角或破於肚角者。俗名肚角腸癰於開刀後。宜插皮管流通膿毒。所用各件。最宜潔淨爲要。此症最耗精力。飲食宜精。并吸清氣海風。內服魚油。鐵鍊碘等品。且此症於開刀後。宜不時起床行立。使膿毒流通外達爲要。餘見卷一膿瘡

篇。

牛皮癬 *Psoriasis.*

患此症者。人多強壯。是以外治之法爲重。亦有血澀者甚少。有時內服鉛石、燐、鐵礦、哥核精、松節油、哥拜巴、柏油、加波匿酸等品。其中以鉛石爲最效。初起每服二滴。後漸加至十滴。或大服至日赤頭痛爲度。或服鐵鉛養十五分。鉛鍾養十分鑿之至半鑿。或燐丸三十二分鑿之一。或鋅礦有初服四分半漸加至四錢一日者。○一方。鋅礦二兩。鉛石水四錢。甘油兩半。樟腦水至八兩。相合。每日服三次。每次服一錢。飯後服之。○又哥核精丸每丸八分鑿之一。但服後往往有肚痛泄瀉嘔惡者。如小兒服魚油則更效。

外治之法。或以熱水沐浴。使靨癩變軟易脫。或以哥核精調油外搽。化熱一錢。但此藥染在無病處。每易發炎。故不得搽抹過多。如偶染目中必致目炎腫痛。○若頭部之病。宜以哥核精分半。化油一兩搽之。切勿過濃。而最妥之法。依卷

二水蠍癩篇。用甘油肥皂凍調搽。

甘油八十分肥皂二十分

二分。調勻搽之。或用柏油。或卡兒白兒對兒琴水。或柏油油藥二錢。合蘭納林六錢搽之。或以柏油水一分。火酒外洗藥十分。外貼。再以油紙包裹亦可。或以側柏柏油 Juniper Tar。或扣達 Cade 合鯨腦白蠟油 Ung: Cetacei.

牛各半相合外搽。均效。○大約用柏油多與輕淡汞連。○一方。汞輕

淡綠一分。哥核精一分。卡兒白兒對兒琴水。幾阿蘇各一分。安息香豬油一兩。調勻搽之。神效無比。○或以熱水沐浴。約半至一點鐘。或用絨布揩抹病處。或浴水中加入銻炭養鉛炭養更效。○沐浴後宜以絨毬揩抹全體。或包裹全體。使皮膚乾燥。後搽以上各藥。○如不能沐浴去其靨癩者。可以輕淡炭養十分。蘭納林二十五分。滋肌香蜜膏五十分。調勻搽之。善能去癥。或以克羅林五分。佛矢林百分。或石莫兒一分。豬油二十分。或納弗石林一分。豬油八分。或貝路加力酸五分或十分。豬油百分。或

幾阿蘇一分。猪油八分。或偈克坐兒五十分。佛矢林百分。調勻。均可外搽。如患處廣大。宜以貝路加力酸沙利沙酸各九分。用濃呻吩咐化足。再加哥老地恩二兩半。搽抹患處極效。惟藥性猛烈。須慎用之。○又方。礦粉半兩。克達 *Huile de Cade* 半兩。綠皂一兩。猪油一兩。鉛炭養二錢半。相合。外搽。○如病處漫延甚大者。○一方。柏油水濃火酒綠皂各一兩。相合搽之。或汞雙綠油藥五十化或碘油藥至一百化五十○一方。加路迷半錢。碘片一分一釐。猪油十四錢。相合搽之。均效。○或以柏油油藥二兩。合汞淡養油藥二兩。調勻外搽。均可。更有每日電震而得愈者。

流口水 又名多涎 *Ptyalism*.

此乃病狀。如口齒咽喉等病。或花柳毒。均可致之。宜照症治。○因服汞劑過多所致者。宜停服。另以鍊綠水四十至一百化不時漱口。或先用鍊錘養水漱後。再以鍊綠水漱口可也。○因口瘡所致者。宜以礬水四十化鍊綠水二兩化水一兩。漱口。○如口氣臭惡牙齦潰爛者。宜以鉛綠或鍍綠化水。或加波匿酸水。八十化碘酒水。四十化硼砂甘油。不時搽抹。或內服鍊綠。或合輕綠酸鐵酒同服更效。○因腦筋累病。以致口水者。宜服了刀邊蘋茄鬧。羊花鴉片等品。至口乾爲度。○如孕婦子宮之腦筋。累及津核。流口水者。治法相同。或另服鍊溴頗效。

產後癲癇 *Puerperal Convulsions.*

病症與平常抽搐相同。此爲子宮腦筋累及。并血液改變之故。治法。宜預防之。不使症發。通利二便。飲食清淡。宜淡牛乳佳。○溺涵蛋白者。宜服綠養冰。○亦有病重頻發不止。因此小產者。但可未病時服藥以下之。如不免小產者宜服藥助之
或措取之且胎盤宜早取下○或謂放血之法。能治此症者。或謂聞吸哥羅方。并服綠養冰二分。鍊溴四分。善能治之。或謂先聞哥羅方。後以綠養冰鍊溴納入肛門均效。不效宜在手腕迴血管
放血十五至二十兩○或將項頸左右大血管揩定。不使跳

動亦效。○又宜常利二便。成服鎂礦養。兼射比魯介賓汗之。用絨包浸熱水
引汗法爲要或聞阿未來淡養氣。或甘油淡酸。或內服茄菲精。均有效驗。○如正產或小產後發病者。宜以芥辣粉合熱水。用絨毯包裹全身汗之。與內腎舊炎漏毒
入血症治法相同

產後熱症 俗名產後驚瘋 Puerperal Fever.

此症本可預防。一經產後。產路均宜清潔。常以藥水射洗。不使病發。所用之水。如加波匿酸水。五十至一或銳鑑養水。四十化均屬可靠。惟醫器與醫士之手。宜以汞雙綠水。一千至一洗之。○凡產後半月。每日射洗二次。此後每日一次。中土產後最忌用水射洗。以致惡露吸入血分。一時寒競抽搐者。狀病見症當卽用加波匿酸水。五十至一射洗子宮內皮。須醫士爲之以後每八點鐘一次。又宜不時射洗陰道。○發熱者。服金雞那霜一分。每三點鐘一服。或一次大服半錢亦可。或另服安的非白林均效。○身熱極重者。服金雞那無濟。熱輕者金雞那霜切不可少。○身熱不退。服藥無濟。

病狀危險者。宜以六十度冷水澆身。或服忽斯克酒。以補心力。或服忽斯克酒與安的拜林。每二點鐘一服。隔時服之。或忽斯克合牛乳同服亦可。○如腹統膜炎者。先服五釐迦路迷。後服鈸礦養四或六錢。○如熱不退者。別藥無濟。宜服華而白酒。或松節油沙利沙酸鈸沙利沙毛地黃草烏豆郁加利達酒等品。間有效驗。○或以松節油合熱水聞吸其氣。○統膜發炎疼痛者。宜外壓熱劑。或射入咖啡。○嘔吐者。宜吞冰塊。或將食物由肛門射入。

產後瘋癲 Puerperal Mania.

治法。產婦既病不能哺乳。須另僱乳媼。母子不可同住相見爲要。病人住處。宜靜而黑。飲食最宜清淡滋潤。又當按時不食者宜射入肛門起居合度。忌服綠養冰咖啡。惟每晚服撒弗那兒二分。不睡者至次早再服。頭上另壓冷水。頸後貼芥辣膏。○凡酒類提神之品。切不可服。○病久者宜服銳溴。

善能安腦。○凡哺乳過久身弱者亦可患此。治法宜補身並服酒類。提神又宜細察子宮往往有子宮尙未收縮如常以致發病者宜服雞那霜了葛鐵酒。○一方了葛精一釐鐵養三釐馬前膏八分釐之一金雞那霜二釐成丸每日三次頗效。

產後腹統膜炎 Puerperal Peritonitis.

見前產後熱症

血疔成瘻 Purpura.

此是皮膚疔血成瘻甚癢治法飲食最宜清補。○一方鉛石水半錢。或用錢絲

鐵酒四錢甘油一兩樟腦水至八兩相合每服一匙日三次食後合水同服佳病輕者可以行走病重者必須安臥又宜大服鐵酒兼患牙血者病多危險必須靜養并用皮膚針射入一二釐了葛精房中衣被宜遍洒松節油或用松節油噴氣。○一方松節油二錢草麻油二錢膠水三錢檸檬糖露半錢薄荷水至一兩相合每晨服之服後仍流血者宜○一方鉛石水三四滴鐵酒分半合服每日三次頗效。如了葛不效者宜服鉛醋鴉片白礬炭匱酸高雷克酸磺酸海士林冰塊或銀淡養之五分釐等品病漸愈宜服咿嘶噴糖露。○此症不分爲輕症。 Purpura Simplex 重疔 Purpura Haemorrhagica 風濕之疔 Purpura Rheumatica 風圍疔 Purpura Urticans 等症因風濕者宜服鍶碘。

膿毒入血又名破傷風 Pyæmia.

此因外科纏綿不愈以至身弱膿毒入血所致病狀發熱全身不舒中土名曰破傷風。○治法凡開刀受傷處均宜洗淨使膿易於外洩又須房屋通風床帳衣被須浸滴加波匿酸或幾阿蘇郁加利達松節油等藥以解其毒內服表劑通利二便亦有膿毒未破患此者速宜放出并大服鐵劑。○此症極耗精神每一點鐘宜用半兩忽斯克酒合牛乳同

服效。又金雞那鐵酒必不可少。○一方。金雞那錢半。鐵綠酒半兩。鋸綠二錢。甘油一兩。哥羅方水到十六兩。相合用。此二大匙合水二杯。每四點鐘一服。○外如鏽沙利沙。沙利沙精。立坐新埃阿達方。茄波匿礦。鋸錳養。幾阿蘇。松節油。碘沙羅等品。均可取用。

腎穴漏管發炎 又名腎漏發炎 Pyelitis.

治法。須審其病故。因沙淋所致者。先治砂淋。因蒂核變大或發炎膀胱石淋膀胱發炎或瘤白濁所致者。均照症施治。亦有因傷寒。嘔吐。咖啡。爛喉痧。水消症。玫瑰紅。漏涵蛋白與糖。內腎舊炎等症者。先治各症自愈。如因內服蜜蠻。松節油。哥拜把等品過多所致者。宜停勿服。○病變重者。宜安臥勿動。疼痛者。宜壓熱劑。或熱水芝蔴。麥皮等品。或蜞吮放血等法。惟飲食宜滋潤之物。牛乳。藕粉。六角粉佳。○最要之法。宜通利小便。極效宜鋸檣鹽。或以鋸炭養合檣。檬毛地黃。金雀花同服效。○漏味蛤蜊者。宜服硼酸。○疼痛者。宜鬧羊花。忌用咖啡。○舊症宜補養全體。內服魚油。吸淨天氣。又宜內服。硼酸。每服分半日三次。甚效。○一方。硼酸一分。哥地那精三分釐之一。鏽沙利沙一分。相合作一服。合鋸荷蘭水同服。每日三次。善能止痛。○外如幾阿蘇。每服一滴。金雞那每服半分。或合鰐綠
酸同服 石礦養。均可取用。○如服硼酸不效者。須服鐵酒。服鐵酒仍不效者。惟有在背後開刀。開法見卷二內腎積漏篇。

內腎本體發炎 Pyelonephritis.

病故治法與上文腎穴漏管炎。又名腎漏發炎相同。

腎漏管炎生毒 又名內腎生膿瘡 Pyonephrosis.

此症不可妄施刀法。因有毒入內腎。反使內腎本體變爲粉質。漸自收縮而得愈者。○間有膿毒擗破腹內。累及統膜發炎者。宜及早開刀。割法宜在立脊直肌邊。在季肋與胯上廉適中處割入。割至病處。將膿放

出。挿入皮管流通膿水。如膿多難愈者。宜將內腎割出。

內腎積氣 Pyopneumothorax.

此症宜刺放。治法與肺胞積膿相同。見卷二肺胞積膿篇。

卵管積膿 Hyo-salpinx.

此症先炎後漸積膿。間有膿毒流入子宮而出者。如病重宜射止痛藥。或以溫水射洗子宮。因子宮舊炎以至卵管口閉塞。膿在卵管積膿者。須將宮口張大刮淨內皮。使卵管口通達。以便膿毒流出。後以埃阿達方蘇布充塞子宮。○亦有用電震之一在子宮內皮。一在外皮。謂可以化散內毒。○經久不效者。須將子宮割出。或由肚腹割出。或由陰道割出。或由陰道放膿。或由陰道開刀。均可施治。

舌底核軟瘤 又名重舌 Ranula.

此乃舌下之核變爲軟瘤。如豆腐質。治法不能割盡。不如剪去軟瘤少許。擠出內質。再以棉花浸碘甘油。^{二十至三十}或鐵水鋰綠水等品塞入。使炎炎退漸能收縮如常。瘤小初起。可以剪去。或以絲線縛脫。

賴狃氏症 又名輕死肉症 Raynaud's Disease.

此症由名醫賴狃氏查出。故名。本與死肉症相同。但此變症後。仍可復原不脫。本係心經血管之症。血管抽搐之意如水消醉酒。腦胞發炎。瘋癲憂鬱。受寒麻瘋。內腎舊炎。肚腹外傷等症。均可致此。○病狀與死肉症相同。但此症已變疔黑之後。每有血脉流通如常而得愈者。○治法與死肉症同。或先服安的拜林。每日三次。每次一分。連服二三日後。再服馬前冰鉢石等品可也。

荒熱症 Relapsing or Famine Fever.

此症多在飢荒兵事之後患之。病症與寒傷同。治法亦同。飲食最宜易化流質。或提神之品。如脈細數倦乏者。宜忽斯克酒。○熱重者。宜雞那

霜。○此症頻發不止。愈後再發。纏綿不休。兼有頭腰疼痛。宜服安的拜林效。

長熱 Remittent Fever.

治法與瘧疾同。見卷二 雞那霜必不可少。或內服。或射入肛門。大約初起宜服微表之品。如萬應退熱藥。另加草烏豆酒少許。或先服加路迷半分瀉之。均效。○至病勢判然。知係長熱。宜服雞那霜。且熱度低時。於一點鐘內可服半錢。如吐者可用四分射入肛門 頗能退熱。○亦有在熱度低時。大服雞那霜。熱高時服鈸砂利沙。或安的拜林。亦效。○亦有在熱畧退後。常服鷄那霜者。○如熱高至百五六度。服藥無濟。宜以冷水沐浴。或服華而白酒。○嘔吐頭痛。與別種病狀。與小腸壞傷寒同。大抵有吐瀉者。病多危殆。○熱已退盡。宜服鉢石等品補之。

溺閉或癃症 Retention of Urine.

治法。首宜坐熱水盆。後以通管放之。○年老者多因蒂核變大之故。宜照症治。以軟通管通之。如軟管難通者。以銀管通之。○用通管法。先用大號。由大而細。切勿先用細管爲要。且所用之管。內外均宜藥水洗抹。并擦甘油硼酸。既已通入。可待一二日後取出。萬一不能用通管。惟有在小腹刺放。放畢再用通管通之。於通入刺後易 以免溺管變窄之患。○如舊症白濁後。溺管已窄。不通者。首坐熱水盆。次服鴉片。自能通利。否則平臥。用〇號或半號通管通之。難者再通一號銀管。或連用略大之管道。至窄處變大爲度。○如有石淋。阻于溺管者。宜割取排出。○如因白濁溺閉者。宜坐熱水盆。或以熱汽水射入膀胱。或鎂礦養瀉之。或以鴉片酒半錢。或嚙啡尖丸。納入肛門。或以通管道之。○如百合症。或熱症癆癰。與服鴉片毒後。每有癃閉者。宜通管通之。

眼腦衣發炎 Retinitis.

治法。切忌見光運行。額部與太陽背脊等處引炎。○如內腎舊炎或花柳毒所致者。均照症法。

眼腦衣分離 Retinal Detachment.

此因腦衣一處脫離之故。治宜靜臥。勿見陽光。兼用藥布包紮眼球。內服之藥。宜用鹽類通利一便。或比魯介賓引汗。

風濕新症 Rheumatism, Acute.

風濕一症。患者最多。初起身熱骨節紅疼微汗者。速宜安臥靜養。房中天氣最宜溫和。終日熱度不可改變切忌風寒。又宜板床不使頻動。衣被宜法蘭絨佳。初起飲食專用牛乳。藕粉。牛肉汁。雞湯。宜清而淡。○口渴者宜冰塊合牛乳。或蛤蜊水。或飲檸檬汁。切忌飲酒。○如心經無力。或起別病者。酒可稍飲。○內服之藥。首推鎗沙利沙。或先服草烏豆酒。初起一滴。後每半點鐘服半滴。功能微表止痛。再服鎗沙利沙。○又沙利沙酸精。沙羅。

冬青油 Winter green Oil. 等。均可取用。但不若鎗沙利沙功用之效。

○鎗沙利沙。初次宜服半錢。或每四點鐘服二分。○或謂鎗沙利沙。每點鐘服分半。服五次後。每三點鐘服分半。最妙合蛤蜊荷蘭水同服。○如服後耳鳴者暫停。○鋤炭養每三點鐘服半錢。善解血中之酸。如服後小便變爲蛤蜊者。宜每四點鐘服分半。或合少許檸檬酸汁更效。○一方。鎗沙利沙四錢。鋤雙炭養六錢。咖啡水錢半。樟腦水至十六兩。相合。每服一兩。日服四次。頗效。○又方。鋤炭養六錢。汽水十二兩。另以鎗沙利沙二分。合此水二匙。再加檸檬汁二匙。相合。沸時服之。○亦有大服鐵綠酒。或安的拜林。或安的非白林。或汾納斯丁。或鋤碘。每服半至分半。或圭阿禁。三呻呻阿美尼。 Trimethylamine. 或布路以拉阿美尼。 Propylamine. 或鋰之鹽類。溴。哥咬礦。鋤淡養等品。均可取服。○或服鴉片膏。每四或六點鐘服一釐。甚有效驗。○外治。引炎宜用蠶蠣膏。但不

可貼在炎痛處。宜貼在心經外面。○亦有用冷水熱水沐浴。或蒸汽引汗。○疼痛忌用引炎各法。可用鎗炭養水洗抹。或鴉片酒、哥羅方、蘋茄、碘、冬青油、沙利沙水等劑外擦。後以棉花包裹病處。油紙不可包善能止痛消腫。重者宜用夾板包紮。不使頻動。

風濕舊症 或久遠風濕 Rheumatism chronic.

此症多由新病纏綿不愈。變爲舊症。治法。因新症變舊。有全身兼症者。宜鎗沙利沙。○骨節疼痛者。宜止痛之品。切忌風寒潮濕。起居飲食。最宜小心。○間有胃病者。先治胃。食物宜油類居多。并飲金類泉水。以及鎗沙利沙。鎗雙炭養。鋸與鋰之鹽類。均宜常服。或以鎗碘合鋸炭養同服更效。○一方。鎗碘二錢。鎗雙炭養四錢。鋸炭養一兩。鉢石水錢半。土茯苓水至二十兩相合。每服一中匙。合鋸之荷蘭水同服。日三次。食後宜之。常服頗效。○亦有服此一月之後。改服魚油鐵雞那霜。一月後再服此更有效驗。○硫磺一藥。此症最宜。無論內外均可取用。○偈克坐兒。每服半至一分亦效。或常食葱頭亦可。○或服圭阿禁硫磺膏。用圭阿禁松香一兩。硫磺粉二兩。大黃粉半兩。芥辣粉二兩。鋸淡養半兩。蜜或糖露足用。調成膏。每服一錢。○或以噶吱噤沙羅兒、燐蛤蜊類。亦可取用。○外治之法。首宜止痛。用蘋茄等品外擦。或推拿法。或以蛤蜊水硫磺水沐浴。或蒸汽引汗。或以熱布包紮病處。或以電震。震時用熱鹽水擦抹病處。○外擦之藥不一。最效者以鋸碘肥皂擦藥。日擦兩次。擦後兼施推拿法。并用法蘭絨包紮。寒皮外包次之以硫磺粉乾擦痛處。另以棉花布卷包裹。○亦有用哥羅方、蘋茄、荳蔻、烏豆、藜蘆、薄荷冰等品外擦者。惟用藥均宜重擦。方能見效。○又蟹螯樟腦松節油碘酒疼痛不能推拿者擦此頗效。

冬青油薄荷油大楓子油丁香油等品。亦可試用。或以針刺火烙亦可。○病人衣服。宜法蘭絨。不宜過少過多。過多屢易受寒。以致病發。○骨

節腫大疼痛者。宜以絨線包裹。使血脉流通。

骨節風濕 Rheumatic Arthritis (chronic).

此症每因天氣有改變。凡溫和之地。如亞非利加北以大利國等處。與病體最宜。是以此症住處宜高燥通風。衣服宜清潔和暖。法蘭絨在骨節腫痛處。另貼麂皮一層。且衣服不可過重。鞋底宜軟木爲之。以免汗濕。

鮮菜 最妙芹菜葱頭 鮮肉魚油麥液漿。可以常服。惟酒切忌。於病體甚不相宜。

○如病人體弱者。宜補。切勿憂鬱忿怒。如乳婦患此不宜哺乳。以防傳染。

○內服之藥。沙利沙甚無功效。不如服蛤蜊類。或大服鍊碘。安的拜林。雞那霜。有時宜服鴉片。亦有服鉢石水碘硫磺圭阿禁山米斯鐵等品者。或以藥水沐浴。電震推拿法。均可試用。○一方。久服頗效。用鉢石水二錢半。鍊碘五錢半。土茯苓流膏至八兩。相合。每服一錢。日三次。飯後合水半兩同服可也。○又鐵碘糖露碘酒。或與上文圭阿禁硫磺膏。山米斯。眼大均可取服。○或至硫磺藥水泉沐浴。甚有效驗。○或以熱硫磺水熱鹽。包裹腫痛處亦效。○外搽之藥不一。難以枚舉。惟草烏豆蘋茄、樟腦雜搽藥等。用絨布浸濕貼上。外以油紙布卷紮。或以硫磺粉棉花包裹亦可。○如久病不愈者。宜鴉片咖啡安的拜林安的非白林噶吱噤鑄沙利沙金雞那沙利沙酸鋰或鍊溴。大服甚有功效。餘見風濕舊症篇。

風濕白濁

先有白濁 後發風濕

Rheumatism gonorrhœal.

治法。先治白濁。用鍊錘養水每一點鐘射洗一次。○如病重身熱。照風濕新症治之。先服鑄沙利沙。後服雞那霜。○一方。金雞那霜一錢。淡輕溴酸四錢。山米斯酒六錢。橘皮酒四錢。汽水至六兩。相合。每日四次。每次四錢。合水食後服之。甚有效驗。○舊症宜蛤蜊類與鍊碘。或雞那霜合大服鐵酒亦效。或先服加路迷。日服鎂磺養。善能退熱止痛。○外治

之法。骨節腫痛者。宜引炎法。或熱壓劑。或以甘油合蘋茄膏外搽。或以草烏豆、哥羅方、蘋茄搽藥外搽。或貼小塊蜜蠟膏。或電震或推拿或熱水沐浴。均有效驗。

肌肉風濕 Rheumatism, muscular.

此症發病專在肌肉。故名。初起服鏞沙利沙。或熱水一百零六度沐浴。或以熱布揩擦。或煨熱水瓶。均效。○痛者宜咖啡三分釐之一射入。或草烏豆、哥羅方、蘋茄搽藥。或浸絨布外貼包裹。或用熱壓劑。或火湯引炎。或鎂礦養與蛤蜊水瀉之。或以新風濕症治法治之。或電震或針灸。變爲舊症者。照舊風濕治。○內服鈦碘。每晚服鏞沙利沙。并以棉花包裹痛處。

軟骨症 又名骨軟變彎 Rickets.

此症多因小兒住處食物不合之故。或婦女孕時與哺乳時。起居飲食不_{食合宜將來小兒可免此患}致。治法。嬰兒之飲食。宜易化。與油類之物。如白

塔乳油、蛋黃鮮牛肉湯、羊內湯等類。漿粉之物。不可多食。又當常在空曠處行走。吸淨天氣。切忌寒濕與未熟水果菜類。或可食之。衣服宜法蘭絨。常用熱水或海水沐浴。每晚睡時衣被寒熱。尤宜謹慎。○內服之藥。首推魚油或服與麥液漿。以及鐵碘糖露、燐鉻養、鐵燐養等品。均可取用。○一方。燐一釐。酒醇六錢。甘油二兩。薄荷汁一分。相合。凡三歲小兒。每服五滴。甚效。○又方。燐四分釐之一。炭雙礦養 Carbon Bisulphid。六錢。汽水四兩。相合。每服半錢。合魚油同服亦效。○又方。燐一釐半。哥羅方二錢半。酒醇一兩四錢半。相合。每三歲小兒服一滴。亦效。○又方。燐油四分。魚油六兩。相合。每一歲小兒服一錢。每飯後合乳油同服更效。○纏綿舊症。宜推拿法。或外科法開刀。或攀空懸掛。使軟骨變直。爲要。

即脊骨患此

發寒 或寒戰 Rigor.

此係病狀非病本也。重者寒戰不已。宜烤火或蓋熱絨毯。并熱水瓶煨之。當時用忽斯克酒一兩。合熱水與糖少許同服可也。○間有聞吸阿沒來淡養氣。與哥羅方。或內服。功能立止寒戰。○此時鷄納霜無效。不必服。○古時取吐以治寒戰。亦有愈者。○如婦女寒戰時驚慌不安者。宜射入嚙啡。惟內腎病者
宜忌勿射

金錢癬 Ringworm.

見後遊風篇。 See Finea.

惡瘡又頑瘡又噬瘡 Rodent Ulcer.

本與爛瘡相同。但此兼有嘟吡咖咧故也。治法與癰相同。宜割出。或搽丹藥。或二者兼用。割法須將爛處割盡。切勿稍留餘根。丹劑如鋸輕養淡酸鉛石汞淡酸。或文那丹膏倫敦丹膏均見菌毒篇
丹藥類等品。其中又推錠綠爲第一。或化水用。或錠綠一分。麥粉三分。相合成膏外搽亦可。如病在眼

鼻者。宜用火刀割治。

紅赤風斑 Roseola.

治法與紅斑見卷二同。內服鎂礦養。并萬應退熱藥。或以熱水沐浴。合蛤蜊水或外搽油類。餘見卷二紅斑篇。

德國瘡 Rötheln.

此症德國最多。故名。其實瘡之最輕者。治法與癩瘡相同。見卷二癩瘡篇。

銅鼓疔 Rupia.

概因花柳之毒所致。治宜內服汞碘或鉛汞碘水。○間有靨癬脫後潰爛者。宜酒埃阿達方粉。或埃阿達方油亦可。此症靨癬宜聽其自下。不可勉強剔去。

疥瘡 Scabies.

此症最多。無非衣服污穢傳染所致。治宜外搽硫磺水。用硫磺二兩石灰一兩水百六十兩煮後外搽或硫磺油。但未用藥先宜熱水沐浴。然後敷藥。始有效驗。○亦有用硫磺粉重擦患處而得愈者。惟功效稍緩耳。○如用硫磺油藥。先宜熱水并以軟刷刷擦患處。然後搽藥。所有衣服宜以藥氣烘熏。殺其蟲子爲要。○亦有疥瘡愈後兼患水皰癩者。照法治之。或以佛矢林橄欖油搽之亦可。

玫瑰紅熱症 *Roseatum.*

此係發熱之症。皮膚變紅如玫瑰。○治法。起居飲食與瘡子同。但此症最易傳染。是以進出門戶。宜掛藥水絨簾。將絨布浸在解毒藥水初起發紅痘時。忌用

熱水沐浴。

祇可用熱水海絨搽抹紅處

大抵此症難治。醫者臨症惟有一顧病人本原。二設法不使病毒傳染爲要。○此症於熱度最高皮膚發紅之時。最易傳染。

○解毒之法。宜以加波匿酸水一至五十。搽抹病人身體。至痂脫後。再以一至二十五加波匿酸水搽之。可免傳染之患。○如熱減喉部之病亦退者。宜熱水沐浴。使痂易脫。再以汞綠水一至四十郁加利達水加波匿酸水等洗之。或以郁加利達油二兩。杏仁油十八兩。肉桂油一錢。相合外搽。○此症初起最宜表散。○一方。甜消呻呻二錢。輕淡醋水一兩半。鋸櫛鹽一錢。糖露一兩。樟腦水至四兩。相合。凡小兒每三點鐘服一錢。成人加倍。○最熱之時。宜安的拜林、金雞那、鏽沙利沙等品。亦有專服汞碘者。○一方。汞雙綠水三十滴。合清水一匙。加鋸碘二釐。每二點鐘一服。功能解熱并去靨瘡。○亦有專服汞雙綠水。或銀灰散者。卽輕綠酸、磺酸淡酸等品。亦有退熱之功。均可取用。又郁加利達油、鋸綠、鏽加波匿碘。四歲之小兒每三點鐘可服二三釐喉爛者宜之。○鷄那霜合鐵酒或毛地黃同服。功用亦佳。

此症喉病甚多。○一方。甘油硼砂四錢。甘油加波匿酸三錢。玫瑰水到

十兩相合噴射喉部。或照方減淡一半漱喉亦可。○或以加波匿酸、甘油刷擦喉部。或以碘溴綠、汞綠、礦養酸、鍶錳養、鍶綠、硫磺、碘酒等品洗漱均可。○或以冰塊熱壓劑冷水熱水外包喉部亦可。○如熱鬱紅癰不能外達者。宜以熱水加芥辣粉少許外壓。或熱絨包包裹全身以引之。○大約此症過一月半後方可出門。而無傳染之患。

臀大腦筋痛 又名尻大腦筋痛 Sciatica.

此乃尻部以下大腦筋作痛。見卷三腦筋痛篇 治法與腦筋痛相同。疼痛難堪者。用嚙啡射入。見腦筋痛篇 嚙啡宜淡。射入次數宜多。宜深 切忌行走運動。或引炎法。

或火炙。或服沙利沙酸。或鎗沙利沙、沙羅、雞那霜、鍶錫、輕淡綠、汾納斯丁、安的拜林、印度蔴、了刀邊、鉢石、鐵、燐、魚油、鋸燐養、山米斯、了葛、銀淡養、養金花、松節油、安息鑪等品。均可取服。○外搽草烏豆、蘋茄、哥羅方、搽藥、薄荷冰、謙落、火酒外搽藥。或射入哥根呻呻等品。或電震或推拿法。或熱水沐浴。或以硫磺棉花包裹痛處。○經久不效者。宜將痛處剖開。提舉該腦筋甚效。

皮膚變厚 又名硬皮 Scleroderma.

此係皮膚一處變厚高凸。而無發炎之患。治法。外搽之藥無效。內服鉀石、燐、金綠、銀淡養、銀養、魚油、鐵等品補之。衣服宜法蘭絨。○亦有用電震或推拿法。或熱水沐浴。外搽動物之油。猪油、魚肝油、蘭納林等以潤之。

腦與腦脊根變厚 Sclerosis, Disseminated.

此因腦部或腦脊根變硬。點點變硬，散而不聚 之故。病狀。頭暈行走無力。病處以下。即形癱瘓。○大抵不治。痛者宜止痛之藥。見症施治。○間有取服鍶碘或鍶碘。可以減輕病勢。不使加重。亦有服金綠丸。十二分之一 銀淡養丸。或汞雙綠丸合鍶碘同服。或服鉀石、燐、銀、魚油等品。或推拿法。或硫磺水沐浴。

或電震。問有不宜者○此症常因癰瘍致成。一臥瘡。二膀胱癰積溺。三不睡者。均照症治。

眼白衣炎 Scleritis.

此症多由眼簾與黑衣發炎。或外物累及所致。治法。切宜忌光。服瀉鹽與鈎沙利沙。外以蘋茄合甘油擦之。或蘋茄精油以止其痛。

瘰癧或作瘰癧體 Scrofula.

治法。凡起居飲食。與肺勞見前肺勞篇骨爛骨節病目疾菌毒等症相同。○如新起發炎之核。治法已詳吸核發炎篇。○已成毒者。亟宜開刀。刀口愈大愈妙。未成毒者忌刀○內服之藥。宜魚油、燐鉢石、鐵碘、圭阿柯兒、Guaiacol 等品。

○一方。圭阿柯兒一錢。橘皮酒二兩。甘油二兩。水到十兩。相合。每服二三錢。善解嚙吡咖咧質。凡肺勞兼瘰癧者。宜之外擦宜碘。與碘酒各半或鉛碘油藥。用力擦擦。或用銻碘肥皂擦藥均效。○開刀後欲其速愈者。

宜以碘酒或加波匿酸濃水射洗之。或將已爛之核刮淨。或割出爲妙。餘詳吸核發炎篇。按此症多由嚙吡咖咧漫延之故。是以內外取治。均以解嚙吡咖咧毒爲要。且此症初起之時。祇一二吸核發炎腫大者。審當時割出。絕其根株。不使嚙吡咖咧擴散相近各處。以致纏綿難愈也。

青蓮病或青蓮齦浮病又血枯變壞 Scurvy.

此症概因行船迷途絕糧飲食不足。血液變壞之故。病狀牙肉浮腫。出血。如血薄症。治法。宜食鮮菜芨茹之類。或飲檸檬汁。或檸檬酸○牙肉浮腫流血者。食物宜半生牛內。或肉湯肉汁。并飲藥漱口。○一方。加美辣酒一兩。兒茶酒半兩。橡樹皮湯至二十兩。相合。漱口頗效。○口氣宜檸檬汁。或鍊綠。或鍊錳養水。或碘水。或白礬一分。檸檬汁四十分。相合。漱口均效。○流血多者。宜射入了葛精。或內服。○口水多者。宜了刀邊。○病症

已退漸愈時。宜補劑。或推拿法。

暉船 Sea-sickness.

此症多因登舟時過饑過飽。胃經不安所累。故行船前三點鐘時。宜飲食。切勿飽肚登舟。○預防之法。宜數日前先服輕淡溴。每服二分。日服三次。至登舟時。當卽閉眼平臥。無枕胸胃外部。再以絨布包裹。或夜服綠養冰二分。可免嘔吐之患。○亦有服嚙啡、鴉片、印度麻、哥根、哥羅方、茄菲精、了刀邊、酒精等品者。如服甘油淡酸。與阿沒來淡養氣。間有效驗。但多危險。亦有服安的拜林一釐。合哥根八分釐之一。亦效。○已暉船嘔吐者。最妙吞服冰塊。或以冰合香餅酒。或蛤蜊沸水同服。甚能安胃。或貼芥辣膏。或胃部搽止痛之藥。後服輕衰酸。鉢淡養。幾阿蘇。與郁加利達糖片。Lozenges of Eucalyptus Rostrata. 均有效驗。○如吐後困倦者。宜少進飲食爲妙。或漸愈胃閉者。宜黃連合輕綠酸等品可也。

粉瘤 Sebaceous Cysts.

此症多在毛髮之間。大小不一。治法小者宜薙去毛髮。以汞綠解毒水洗淨。開刀。并將瘤壳刮盡。然後縫合。照常法治之。

毒入血分 Septicæmia.

此症多由傷處風毒入血所致。如因鋸腳所致者。宜細審割處。有瘀血者。宜洗淨。如因外傷所致。亦宜洗淨。後以丹藥解毒。○全身治法。與膿毒入血。產後驚風相同。皆以去其血分之毒爲要。

遺洩 Spermatorrhœa.

夢而遺者曰遺精。不夢而洩曰精滑。或由色欲過度。或由身虛體弱。亦有因包皮過長或變窄。或肛門裂或痔症所致者。均照症治。○亦有用銀淡養三分化水一兩。射入至膀胱蒂核而得愈者。又服燐劑或電震。或推拿法。均可試用。餘詳卷二疑心病與腸痙篇。

髓凸變瘤。又名崩脊骨 Spina Bifida.

此症小兒居多。因腦脊髓自脊骨間外凸成瘤。治法先宜補養身體。外以棉花或象皮布卷包裹。令病人安睡。後以套針刺放瘤內之水一半。或三分之一。後再以碘一分。銻碘三分。甘油一兩。相合用此一錢射入瘤中。射入後病人宜覆臥。○間有用絲線縛之。或割去者均屬危險。

脊曲 向左右彎者曰脊曲 向前後彎者曰龜背 Spinal Curvature.

此症因脊骨變彎或潰爛。

見卷一 Caries-Pott's disease. 骨病篇

或向前後彎。或向左右彎。大抵起初宜速治之。如已成彎形者不治。○初起飲食起居均須合宜。或用力運行身體。如鞦韆拋球之類但宜合度。不可過勞身體。亦有對鏡運動身體。使病人自知何處變彎。何處宜用力使直。如法爲之。有得愈者。○如立脊直肌已痠癱者。宜自腋至胯用架架定。或以石膏布卷包紮。或腋下輔杖行走。不使脊柱用力。以致形彎變凸。○電震推拿之法。亦

有效驗。而補養身體尤不可少。餘詳軟骨症與骨爛篇。

骨筋扭傷 Sprains.

此症多由跌打損傷所致。於未腫之前。宜以象皮布卷。輕輕包紮傷處。再以冷水外澆。以止其炎。○如傷處漸漸變腫不退者。宜將布卷釋去。另貼冷水布。或壓冰袋。或以輕淡綠水。鉛醋水。火酒外搽藥等洗搽包裹。○大抵已腫者。冷治無效。宜用熱壓劑。或浸熱水中。頗效。○通行治法。用鉛醋水一兩。鴉片酒二兩。淡醋酸二兩。水到二十兩。相合浸絨布貼在傷處。或以火酒外洗藥。包貼甚效。○至新症已退。變爲舊症。方可少動。新炎時甯用夾板包定。勿動但用之切勿過多爲要。至新炎已退。宜推拿或電震。亦勿過早過多。須見症酌用爲妥。

斜白眼 或鬪雞眼 Squinting.

此症多因眼珠直肌短縮之故。如上直肌短者多向上斜。外直肌短者

多向外斜。或病一目。或病兩目。或兼患近視遠視者。不一而定。治法。用了刀邊滴入。使肌肉放鬆得愈者。惜暫而不久。○如小兒患此。須在八歲時割治。割法將眼胞撐大。用鉗。鉗定罩睛皮與眼白衣。剪去皮少許。再用小鈎刺入。將縮短肌肉向近白衣處剪斷。自愈。○如斜向內眴者。多因近視遠視之故。先宜佩帶合宜眼鏡。不愈者割之。○亦有因花柳毒所致者。宜照花柳毒治。

舌結 又曰吃俗名吊嘴 Stammering.

此症多由小兒學成。想由腦部與腦筋症累及之故。治法。宜審其口舌喉管氣管。有否疾病。如無病者。治之甚難。惟在病人耐心自改。不可強于言語爲要。簡法令病人響亮朗讀。每日一二點鐘。醫者側聽。如有入聲難讀之句。不能出口者。須用法改正。而病者自當耐心緩讀。日久自能改正。凡氣惱忿怒喜樂之時。切勿言語。言之病多加重。○間有用迷

蒙之法。或服鍼溴等平腦之劑者。但無實效。

饑餓失食 飲食不足 Starvation.

此因絕糧失食。或遇刀兵凶荒。或行船遇險。每多有之。治法。凡飢餓已久之人。不可一時多食。須投以易化滋潤之物。每次食物宜少。每日次數宜多。最宜者如乳湯之類。一二日後。可以漸漸加增。稍進飲食魚肉。○如小兒宜飲牛乳。專飲牛乳多死 合卑伯短同食爲要。○失食之人。本熱每多不及。是以衣服宜絨。煨熱水瓶。并服提神之品。○瘋癲故意不食者。須將食物灌下。或由肛門射入。

乏嗣 又作不孕 Sterility.

男女均患。男子多因包皮過長。過窄。陽瘻不舉。或一舉便洩。或久患遺精所致。均照症治。如因腦筋病所致者。治法與陽瘻同。內服鱗馬前冰補之。或電震。或在陽莖頭搽蠻蠶水引炎。○婦女概因別病累及。如子

宮倒垂、白帶、月經之病所致者。均照症治。

蜂咬 Stings.

治法最妙。搽輕淡水。或輕淡香酒。○留刺者宜拔去。○亦有用濃蛤蜊炭養水。薄荷油加波匿酸。哥羅方與加波匿酸甘油_{八化}等。外搽甚效。○如咬後時久腫痛。搽輕淡已不及者。可用石灰水外壓。○蚊子咬者。最效用薄荷油。Peppermint and Pennyroyal Oil, Hedeoma Pulegioides. 樟腦、丁香油、肉桂油、迷迭香、郁加利達。或以吃暉略合薄荷葉外壓均效。○虫豸咬者。宜搽輕淡哥羅方加波匿酸或白礬水。○如咬後疼痛暈厥者。宜服輕淡或忽斯克等提神之品。

口炎 Stomatitis.

此症已詳卷一小兒口瘡。與走馬牙瘡篇。兼有口中起泡發炎潰爛者。飲流汁。吸淨天氣。起居飲食。最宜小心。外搽之藥。甘油硼沙。最有效驗。或鋸綠糖片。或鋸綠水_{半兩化水}。或硼酸水_{三分分}。或石灰水。或淡汞綠水_{一釐化水}。或琥珀酸水_{三分分}。或礬沙利沙水_{水六兩}等品漱口。宜忌亦甚效驗。○如口內潰爛者。宜銀淡養水或銅礦養白礬水。淡綠酸水洗搽。○口臭者。宜鋸錘養水洗漱。○流血者。宜歛劑。橡樹泡水沒藥等品甚妙。痛者宜用哥根。○內服宜鋸綠半兩。鐵綠酒四錢。甘油一兩。汽水到十二兩。相合。每服一匙。日四次。小兒減半。頗效。再服魚肝油。先高拿酒。功效更速。○因服汞劑過多所致者。宜以鋸綠水_{水三十}。或鋸錘養水洗漱。○如牙齦浮腫流血者。先宜平胃。洗擦牙齒。後服鋸綠糖片。○一方。沒藥酒。加美拉酒。先高拿酒。兒茶酒各半兩。阿地壳倫香水一兩。相合。每用一錢。合水一酒杯。或洗漱。或擦牙。甚效。

腎淋 又作內腎石淋 Stone in the Kidney.

此症多因血熱溺涵酸質。先變粉淋。積於腎漏。漸成堅石所致。如淋大不移至腎。溺管者。疼痛不堪。此時宜熱水沐浴。先百度熱。後加至百零六度。使溺管放鬆。易於下移至膀胱中。或服鴉片酒。每三四點鐘服分半。或以嚙啡射入。每用三分量之一至半釐大抵用嚙啡宜大服。或先服忽斯克一二兩。後服嚙啡半釐。再射入了刀邊水二滴。善能止痛。○亦有用熱絨布包裹痛處。或蒸氣引汗。或推拿痛處。均能使淋下移。○此症外搽止痛之藥無效。○痛去不發之時。宜服藥使淋化散。如淋係酸質。宜服蛤蜊之類化之。如淋係草酸類。化之甚難。大約用鉢醋與鉢檳鹽。各四分至六分。化水三兩作一次服。善能化淋。○如溺血者。照溺血篇治。○如病重危險者。宜在背後立脊直肌之邊。在季肋與膀上廉適中處割入。見淋在何處。亟宜割出。如內腎已壞者。一同割出可也。

膀胱石淋 Stone in the Bladder.

此症淋石或由內腎移下。或由膀胱之溺變壞先成粉淋後漸堅硬。如婦女患此。易於拊取。或夾碎攝出。男子患此。治之頗難。治法。一服藥化之。如溺蛤蜊者。淋石多係草酸質。藥不能化。如淋石係猶屢酸質。宜服蛤蜊劑可以化之。大抵淋石小者易化。大者難化。用探管能探明淋石者已大難化間有燒質石淋。可用淡淡酸水。一至十五射洗膀胱能化。或猶屢克質石淋。可用蛤蜊水射洗膀胱。亦能化之。二夾碎。如淋石微細者。可用鉗夾碎。另以象皮水管攝出。○夾石淋法。先用通管通之。由細而粗。至十六號。後以哥羅方。并用哥根水一至二十二錢。射入膀胱。病人宜平臥棹上。臀部略高。另以溫熱硼酸水四五兩。射入膀胱。然後用夾鉗通入。漸漸夾緊淋石。連夾五六次。至淋石粉膚。再以硼酸水射洗膀胱。至淨為度。○洗淨後。以嚙啡尖丸。納入肛門。飲食滋潤。又宜靜臥。并熱水沐浴。或以硼酸外洗。或內服均可。○夾後最多膀胱發炎之患。宜照症治之。三割法。或由會陰。或

由肚腹割取。由會陰割取者。先將肛門洗淨。通利大便。病人仰臥棹上。將手握脚縛定。用硼酸水射入膀胱足。通入亢通管。至遇石淋。另以一人扶定通管。須畧偏少許。然後用刀依亢割至膀胱。割口約長三寸。內窄外寬。如V字形。其刀須離肛門上寸半割入。後宜偏左向外下割至離肛門邊一寸四分寸之一處。即尻肛之間斜斜割入。大約先割皮膚。後漸割至膀胱。如淋大者割口宜大卽將食指探入。摸定石淋。當時將亢通管取出。另以石淋鉗。循指探入。拊定石淋。漸漸取出。再以藥水洗淨割口。人宜平臥。兩膝宜高擋。飲食宜小心。○由肚腹割法。如淋石大不能由會陰割出者。須自肚腹割之。割法先以硼酸水射入膀胱至足。將小便縛紮。再以象皮袋塞入肛門。射水十五兩。依腹直肌割入。約三寸長。先割皮膚。後用手指漸漸剔開。一見膀胱。用鉗拊定割開。當卽摸明石淋何在。用鉗拊出。或縫合。或不縫插以玻管。或第縫膀胱不縫肚皮。或以通管通入小便。均可試用。此症凡醫器手法。與藥水。均宜清潔。以防毒入血分。

溺管淋石 或溺管淋阻 Stone in the Urethra.

石淋既至溺管。速宜取出。或割出。忌用通管。簡法可用鉗拊定石淋。漸推拿溺管。取出。難者割之。

淋瀝刺痛 又名溺溼 又名痛溺 又名淋阻刺痛 Strangury.

此症多因石淋在膀胱或溺管或膀胱發炎所致。或因服蠻蠶哥拜巴等劑所致。如膀胱炎所致者。照炎症治。宜射入熱水。飲食滋潤。肛門納入尖丸。會陰壓熱劑。或射入嚙啡止痛。諸法無效。宜割取之。

溺管變窄 Stricture of the Urethra.

此症或一處變窄。或全管變窄。不一而定。治法。一處變窄者。惟有先用軟實通管通之。由細而粗。每三日通一次。宜緩處通之冷則肌閉難以通入通至五號。可用銀管或鉛管。初起用銀管易誤宜慎○此外大便宜常通利。或熱水沐浴。後臨睡時用通

管。須採甘油大約初次三日一通。後宜六七日一通。漸通至十五號通管爲度。每一月一通。或三四月。或半年。或一年一通。○如溺管數處變窄。或全管變窄者。宜服硼酸。每飯後服一分熱水沐浴。如服硼酸後吐者。宜服幾阿蘇。并通入軟通管。過一二日取出。再換畧大之通管。過一二日再換更大。換至第七號通管爲度。溺管已通。照上法宜不時用大通管通之。○亦有用攝鉗。一時將窄處撐大。再用通管通之。此法割後有愈變爲窄者。甯忌用之。○亦有用專治溺管變窄之刀。Urethrotomy。割治者。割後宜用十四號實通管通之。通時如中止不能通至膀胱者。須再割。至能通入膀胱爲度。然後射洗膀胱。放去積溺。并肛門納入尖丸。飲食宜流質。過六八至十點鐘後。用熱水沐浴。或在熱水中遺溺。如割後一時寒戰者。宜服雞那霜六釐。吃哩咯雜散一分二。硼酸半分。相合作一次服。割後先服一次。合忽斯克同服。以後每三點鐘一服。○如雞那霜不便服者。在割後六七日。用熱水沐浴。并通第十二號通管。或每三日每七日。并在兩點鐘服一中匙。合水同服。○間有割後七日內流血者。甚難止之。可用冰壓。或握住溺管。或通入大號通管。縛定能止。○亦有由割處溺毒入血。或膀胱炎。或溺管統炎。或卵子發炎者。均照症治。如無變症。宜在割後六七日。用熱水沐浴。并通第十二號通管。或每三日每七日。每一月或半年。常用通管通之可也。○亦有由外割入者。先用粗細第二號亢通管。上半粗第十二號
下半細第二號通至窄處。依亢割之。割時人宜仰臥。依割石淋法。并聞哥羅方。至窄處割通。即將上半粗管通過。割畢。另以粗通管通入。縛定。過一二日取出。再換畧大通管。并使外面割口。如法收口爲要。○亦有不知窄在何處者。宜用通管至不能通入。用刀自蒂核向外割至通管所阻之處。切勿由外向內割之。妥法。先將醫者左指探入肛門。至蒂核。後右手執刀。自離肛門上半寸處。一直割入。務使刀尖適在蒂核。

前面之邊割起。或用亢針探入窄處向外割出。或探入通管漸向外割至見通管爲度。餘照前治。

小兒汗斑 *Strophulus*

此症小兒多患之。形如汗斑而紅。治法宜用錠養粉外撲。內服蛤蜊與瀉劑。餘見卷三汗癬篇。

眼胞小瘡 久發不愈 日瞓眼沿 俗名偷針 眼胞 土疳

此係眼邊睫毛常起小瘡。有膿。有屢發不已者。初起將睫毛拔去一二。并以針滴搽加波匿酸自愈。○外用壓劑多不見效。反使小瘡加多。如不得已用者。宜熱水棉花包之可也。○有膿者先搽哥根。後擠出。并外搽黃汞養油。六釐化
油一兩 ○又方。哥根五釐。紅汞養三釐。佛矢林六錢。調勻。搽抹眼邊。日三四次。可使不發。

失氣又名捫死 附縊死 *Suffocation*

此症多因氣管阻塞。或小兒衣被捫閉。或食物不慎。誤入氣管所致。見症速宜取出。如縊死或溺死。心尚跳動者。可救。心脉已停者。不救。詳見卷一溺死篇。

傷暑 即中暑 *Sunstroke*

此因腦部日暴受熱之故。病狀或一時跌仆。或漸漸困倦暈厥。見症當卽臥在陰處。解鬆衣襟。并以冷水澆頭。腳煨熱水。使腦部之熱下行散退爲要。如心經無力者。宜服提神之品。宜熱
用之 病人平臥勿動。最宜靜養。切勿叫喚病人。或聞取嚏各藥。○如病重不能當時見效者。宜常壓冷水。○抵擋者。宜聞哥羅方。或淡養氣。或透其呼吸。或以冰水射洗肛門。善能退熱。本熱須常試之 ○如熱已退。餘病均照法治。頭痛者宜冰袋壓頭。并枕後貼蟹螯膏。便閉者宜服鎂礦養畧。熱者宜服安的拜林毛地黃雞那霜等品。飲食最宜清淡。切忌魚肉油膩。○如腦胞發炎者。見卷三腦筋發

炎篇。內服鍼溴。改換水土。切忌酒色用心勞腦等事。

溺閉即小便不通 Suppression of Urine.

此症如因內腎發炎所致者見卷一內腎炎篇。因石淋阻於腎溺管者見前腎淋篇。因服蟬螯鍼綠等劑或因腎淋內阻或內腎積血或熱症當風等所致者宜用熱水沐浴發表。腎部外壓熱劑或火酒烙之。○如病重無效者每致溺毒入血。Uraemia。照卷一內腎新炎篇治之。內服鎂磺養蒸滌引汗熱水沐浴并服比魯介賓惟利小便劑切不可服。○如內腎積血肺體發炎所致者宜在手腕迴血管放血。

羊鬚鬚 *Sycosis.*

此症有虫。西醫又名鬚髮圈癬專患鬚髮之間。治法先宜洗淨後將鬚髮剃去或拔去。另以漿粉壓劑漿粉十分 硫酸一分去其壓痂後搽油潤之再壓熱劑洗淨有小膿包者刺破放出用加波匿酸橄欖油五六分外搽內服鉛磺養每十分釐之一。

或外搽拉氏藥膏 Lassar's Paste 合沙利沙酸最效。○猶納氏每以加波匿汞 Carbolic-Mercurial 外搽或貼本製之力坐新膏藥後有膿處以力坐新半分化酒百分或以汞雙綠水加波匿酸水洗之。○一方炭匿酸錢半乳磺 Sulphur Lactatis 二錢錠養粉四錢半漿粉四錢半佛矢林一兩半相合調油外搽甚有效驗。○又以汞雙綠一釐調闌納林一兩搽之亦效。卽雞阿蘇郁加利達油硼酸沙利沙酸加波匿酸哥核精碘磺柏油硫磺汞輕淡汞加路迷汞淡養汞養偈克坐兒一分調油百分汞油粉、○亦有用藥過膿而烈反致病重者宜用錠養油或石灰搽藥并內服魚油鐵那霜等品補之。

眼胞粘眼球症 *Symblepharon.*

如病輕粘連少者宜剪斷。如病重粘連半球或全眼者宜剪去粘連之

皮。另剪口中內皮小塊。補貼縫合。否則剪後。不免再粘生合。

暈倒 Syncope.

此係病狀非病症也。發病卽宜平臥。頭較身畧低。解鬆衣襟。勿碍呼吸。須在通風之處。吸冷天氣。或用冷水拖擊面部。凡用冷水拖擊頭面胸膛者。所以提激皮膚筋達之于腦。由腦達之于心。使心經跳動有力。聞吸輕淡水。或服輕淡香酒。或以輕淡香酒一分化水五分。射入皮膚。或以白蘭地忽斯克酒射入肛門。見症施用可也。○如病極重不醒者。宜以輕淡水。或呻吟。或忽斯克。用皮膚針射入。或電震心部。或聞吸淡養氣。○如流血過多暈倒者。宜用象皮布卷包紮兩脚。使上身之血。多爲要。或透呼吸法。或摩擦皮膚。或以芥辣粉擦抹全身。均效。餘見卷一暈厥篇。

骨節發炎 Synovitis.

此症發炎。專在骨節。分爲新舊兩種。新炎忌動。宜用夾板包紮。惟骨節

炎處。不可蓋護。以便敷藥。大抵初起發炎。最宜冷水外壓。或蜞吮。或鎂礦養瀉之。瀉後宜表。服錦葡萄酸十六分釐之一。○一方。鎂礦養二兩。錦葡萄酸二釐。草烏豆酒十滴。橘皮糖露一兩。薄荷水到十六兩。相合。每二點鐘服二大匙。如因風濕遺體。宜服鏗沙利沙。并用棉花包裹痛處。如因酒風所致者。宜服哥枝禁。如疼痛者。宜服鴉片。或服叱哩略雜散分半。合絕迷氏粉 James' Powder. 用鎂養二兩。錦葡萄酸二兩。相合而研成。二釐同服。○因花柳體者。宜服汞丸。或先服鎂礦養瀉之後。服鍊碘。○骨節有膿者。先宜刺放。忌動。并以冷水包壓。○如新炎已退。經久者。宜稍動。或推拿患處。如節內積水者。宜搽蟹螯水。或鐵烙。或碘搽藥散之。如積水不消者。宜刺放。并以象皮布卷包裹。或用鉛膏剪成小條。用汞雜油 Scott's Oint. 搽膏藥上貼之。畧施摩撫。并內服鍊碘可也。○如內積之水變爲膿者。宜開刀。務使膿毒易于外洩。再以解毒藥水射洗。○此症刀後每有拘攣之患。醫者

宜預防之。如久病不愈者。惟有將已壞之骨節鋸絕耳。

花柳毒 俗名楊梅瘡 *Syphilis*

此症概分三候。治法。第一候。卽得病之時。宜將患處疔毒。搽汞淡酸水。或淡酸等品蝕之。丹藥愈早愈能使病不發 或以火刀割之。另用黑水。即加路米半錢合灰水十兩所成

浸絨布外貼。如爛處浸淫而濕者。宜洒加路迷粉。如疔毒在陽物中幹者。宜用汞膏藥貼之。○如婦女患此者。治法同。最宜洗淨。卽飲食起居。亦須精細清潔。合宜爲要。○內服之藥。汞爲最要。大抵見症施方。不一而定。或謂第一候服汞劑合法。能阻第二候之病。或每早晚服加路迷雜丸。Plummer's Pills. 或銀灰散。每日三次。每次一釐。或汞藍丸。或汞

雙綠。每服十二分釐之一。日服二次。○一方。銀灰散一釐。雞那散釐半。鴉片粉六分釐之一。苦白木膏足用。相合分作三十六丸。每日服三次。每飯後服一丸。甚效。但宜常服。九月後已。如服後多口水。或牙齦現藍

色或易齶者。宜暫停勿服。此法甚屬可靠。堪稱花柳第一妙藥。萬一不效者。必取服不足之故。○外搽之藥。或汞油。或以汞雙綠八釐化水一兩。取用二十滴。射入患處。每禮拜一次。○一方。汞雙綠三分二釐。淨輕淡綠一分六釐。滌水到二兩。每用十滴。內有汞雙綠三分釐之一 射入患處。每禮拜一次。均效。○如皮膚發癰瘍者。宜以汞油藥。或加路迷二分。闡納林一兩。調勻搽之。○如內皮患粉蕊或潰爛者。宜搽汞淡水。或洒埃阿達粉。如患在陰處。宜洒錚養粉。合埃阿達方。○此症最忌肚瀉。見症須服吃哩喀雜散。合汞劑同服可也。○第二候。卽五六月以後。仍宜服銀灰散。每日約一釐。照上文丸藥方減用。又宜常秤病人輕重。漸減輕者。宜暫停汞劑。另服魚油。○一方。布道非連酒半兩。鷄那霜酒二兩半。奇拉大酒一兩半。相合。每日三次。每飯前服一錢。合舍利酒同服效。如牙血或口水多者。宜以鍊綠水四十至 洗漱。○一方。鍊綠半兩。甘油砌砂一兩。玫瑰

水十五兩。相合漱喉。或每飯後服一匙。日服三次。甚有效驗。○患此症者。須俟兩年後。方可嫁娶。否則所生子女。必有花柳遺症。○第三候治法。必不可少者。宜汞與鍊碘。合服。善能改血毒。并化花柳變硬各質。餘法同上。至於鍊碘服法。宜少服。每次五釐。後漸加多。至每服二三分。○外治之法。潰爛處。宜搽汞淡酸水。埃阿達方。加路迷等品。亦有服汞碘。Biniodide of Mercury. 成丸服。每三十二至十六分釐之一。以代汞與鍊碘者。或陀氏水亦效。○一方。汞雙綠釐半。鍊碘三錢。瀝水十二兩。相合。每日三次。每飯後服一匙。服一月後。減去汞綠。一月後。仍服汞合鍊碘。甚有功效。○亦有服埃阿陀耳。或以汞膏藥。用鉛膏藥三十分加路迷粉十分草麻油三分合成膏藥貼諸脾部外。改其血毒者。○凡鍊碘大服。必須減去汞劑。爲妙。○一方。鍊碘四錢。鍊碘錢半。輕淡^硫錢半。鉀石水二錢。橘皮酒二兩。甘油一兩。高林布湯至二十兩。相合。以一大匙合水。每飽肚服之。頗效。○病在第三候者。最

宜改換水土居住海邊。吸淨天氣。飲食精細爲要。○如嬰兒胎傳之症。亦宜服銀灰散。與嬰兒最宜六月之兒。可服一釐。并外用汞油。或合魚油搽在肚腹。外包油紙。或服鐵碘糖露。合銀灰散。亦甚效驗。須經年常服其生母亦宜服藥。切勿顧用乳娘。以防傳染。萬一無乳。宜牛乳代之。且有此病之嬰兒。于六至九月內。最易出病。須當慎養。或食以驢乳。甚合病體。

扁帶虫 Tape-worm.

此虫形扁如帶。甚長。病者吐瀉。漸瘦。取治甚難。內服之藥不一。最效者卽櫟根又名鳳尾草流膏。每服一錢。服後多有惡心之患但未服此藥前晚。宜先服鎂礦養四至六錢瀉之。次早空肚取服此膏一錢可也。○如虫已下。宜審明是否頭尾均下。如頭未下盡者。宜再服松節油與草麻油。能使虫頭盡下。○如櫟根流膏。嫌其味劣。難以適口者。宜用蛋清一枚。櫟根膏一錢。哥羅方水與糖露加至二兩。相合調勻。作一次服佳。○亦有用松節油。或合

加路迷同服者。善殺此虫。或以櫟根膏合咿咗與哥羅方同服者。亦效。○一方。櫟根膏一錢。加路迷六釐。白糖二錢。絕拉丁足用。化合成凍服之。每六七歲小兒。可服半劑。頗佳。○亦有用綠養冰一分八釐。合櫟根膏半錢。巴豆油一二滴。合服。善下此虫。○大抵櫟根流膏。不可常服。最多服二次。每八點鐘一次足矣。多服恐傷腸胃。○櫟根膏外。松節油亦甚可靠。但宜合草麻油。每早飯前服之。○亦有用哥蘇 Kousso Infusion。四錢。泡水飲。或用哥蘇精 Kousin。每服四分成丸服。○或用加美拉二錢。合糖露同服。或加美拉酒 Anderson's Tincture。每服一錢亦效。○或榴樹根皮泡水。Pomegranate Infusion。每飯前服五兩。連服三次亦效。近來有用榴樹根精 Pelletierine。成人每服二釐。小兒每服一釐。或先服炭匿酸一分。後服此精。功力更偉。○亦有用番瓜子。Yellow Pumpkin Seeds。搗鮮汁一錢。合糖露同服亦效。成人可服二兩○亦有用檳榔。咿咗。哥羅方。

綠養冰石模兒。二錢合微欖油五錢薄荷冰。納弗石林。半分哥拜巴。每服四錢沙利沙酸。每服四分半等。內服者。或以苦白木泡水射洗直腸亦效。

裡急後重 Tenesmus.

大抵瀉痢之症多有之。治法。有瀉痢者。先照症治。後用嚙啡尖丸。納入肛門。或以鴉片酒四十滴。合漿粉水一二兩。或冰水或熱水。宜多射入肛門。或以謙落油納入肛門。均效。餘詳痔瘡肛門成管各篇。

痙攣又鎖喉風 Tetanus.

此症身體寒熱。手足搐搦。口噤頭搖。重者角弓反張。有自起者。Idiopathic Tetanus. 有產後患此者。Puerperal Tetanus. 有因破傷患此者。Traumatic Tetanus. 有患於嬰兒者。Infantum Tetanus. 有患於內部者。Centric Tetanus. 有患於外部者。Eccentric Tetanus. 痘症不一。○治法。宜靜臥黑房。耳孔宜塞棉花。勿使聽聞勞腦。飲食宜流質清淡。并提神之品。不能食者宜射入肛門如有

外傷宜洗淨照外科法治。頭部背脊宜壓冰袋。大抵不治。諸藥無效。○間有服鋸溴綠養冰^{宜大服}者。○一方。綠養冰二錢。鋸溴一兩。鴉片酒半兩。哥羅方酒半兩。樟腦水到八兩。相合。每一點鐘服二大匙。與一兩白蘭地同服可也。亦有用皮膚針射入嚙咗。或內服印度蔴。加拉巴豆。或加拉巴豆膏。每服一釐。每半點鐘一次。八服後宜止勿服。亦有用比魯介賓四分釐之一。或內服。或射入皮膚。或以扣累拉^{Curare}。四分釐之一。化水十滴。射入皮膚。或服安的拜林。安的非白林。了刀邊。蘋茄。鬧羊花。其拉撒米姆。謙落。阿沒來。淡養氣。淡酸甘油。或大服金雞那霜^{每服一錢}。與士的年等品。間有效者。有不效者。○如抽搐極重者。宜聞哥羅方。或服綠養冰鋸溴。以安其腦。

線虫又髮虫 Thread-worm.

此虫甚細而短。概因多食未熟水菜。或所飲之水內有虫子。傳染而成。其虫多在直腸肛門。有時極癢。如用力重擠肛門。自出。治法。用鹽一匙。化水一杯。射入。或以灰水苦白木水。白礬水。亞羅水。呼吸水。或郁加利達松節油。鐵酒。加波匿酸醋酸橄欖油。輕淡綠等化水。均可射入腸內。又肛門宜搽汞油。不使線虫攏散。○內服之藥。宜亞羅阿魏。并鎂礦養。或大服苦白木水。與龍胆草湯。或服山道年。或常以鹽水射入肛門。并內服鐵鉛石。或加路迷等瀉之。○又納弗石林。甚效。每二歲之兒服三釐。十歲之兒服五六釐。每日二三次。飯前服之。善殺此虫。

喉痛 Throat, Sore.

此症最宜者。服安的拜林。次之服鋸沙利沙與沙羅兒。或每半點鐘服草烏豆酒。或藜蘆酒一滴。^{連服}或合甜消呻呻同服。或大服雞那霜。或服吃哩咯。^{至吐}山米斯。圭阿禁。或服鎂礦養瀉之。至病勢漸退。○飲食宜牛乳。或湯或酒。又宜通風。吸淨天氣。大抵此症最易傳染。故醫者又

宜常以藥水漱喉。○一方。哥根八釐甘油四錢。加波匿酸一錢。玫瑰水到十二兩。相合漱喉最效。

如小兒宜用此
水噴射喉部

○亦有外用冷壓劑。或熱壓劑。或

用圭阿柯兒。或銀淡養水^{十一至}。搽喉。均有效驗。○病重似近爛喉痧者。○一方。酒精六十四分。到魯三十六分。鐵綠水四分。相合。再加十分薄荷冰相合。搽之頗效。○呼吸艱難者。宜吸蒸氣潤之。漸愈者。宜用歛劑。如鋸綠^{四十化}。或甘油硼砂四錢。硼酸一錢。玫瑰水九兩半。相合。漱喉。或內服

加波匿酸鋸綠哥根硼沙兒茶等糖片均效。○如新症已退者。○一方。鐵綠酒二錢。白礬甘油半兩。氯水十兩。相合。漱喉甚效。○如喉痛甚重者。宜服鐵酒。每服一錢合忽斯克酒同服。○又方。白礬甘油一兩。玫瑰水九兩。相合。或炭匿酸一錢。玫瑰水十兩。相合。洗漱。○如喉爛而臭者。宜淡綠氯水。鋸錳養、克羅林、碘水、礦養酸水、鋸綠水、汞雙綠水等品洗之。○病已愈。宜服補品。如輕綠酸、淡酸、鐵、鷄那霜。以及植物苦劑等。頗

效。

此症往往與杏仁核炎相連。治法。初起宜服安的拜林。外用熱壓劑。內用冷水洗漱。餘同上。

如杏仁核炎變毒者。宜刺放。

輕者刺深二分
重者刺深半寸

刺後宜搽哥根水。○試果否成

膿之法。宜先在喉部搽哥根水。後以手指一在內杏仁核處。一在外頰車處揩之。自易辨別。

杏仁核因此變大者。宜補益之品。服鐵魚油燐。改換水土。餘照瘰癧法治之。或以甘油炭匿酸碘酒鐵酒等品搽喉。○一方。碘酒三錢。白礬甘油一兩。相合。搽之。如碘酒嫌其過濃。宜以甘油加波匿酸四錢代之。或用白礬粉抽出喉部。如二三月不愈者。宜射入加波匿酸。或電震。或以割杏仁核刀割之。如刀後流血多者。宜火刀。或搽鐵酒。如喉生毒瘤致喉痛者。宜用丹藥。或以杏仁核刀或火刀割之。或以癰

內鉗拔出。或自外部割盡。

面腦筋暴痛 Tic-Douloureux.

此乃第七對面腦筋。一時暴痛。本與腦筋痛相同。此係痛之最甚者。治法宜射入嚙啡。或服白塔綠養冰其拉撒米姆輕淡綠鷄那霜印度麻安的拜林。或引炎電震。均可試用。餘與腦筋痛同。

油風 又風癬

與金錢
癬連

此症本卽金錢癬 Ringworm. 之類。如病在鬚間者曰羊鬚鬚。Sycosis. 在全身者曰遊風。Tinea Circinata. 在頭上者曰頭上金錢癬。Tinea Tonsurans.

不過因部位改變病狀耳。此症有虫。Trichophyton Tonsurans. 治法不一。

○一在全身者。最效用碘磺半錢合豬油一兩調勻搽之。頭部用此亦效但宜慎用。每有皮膚嫩薄。搽此發炎致患水蛭癩者。又如碘搽藥。或哥核酸。Chryophanic Acid. 玺油粉。輕淡玺油。加波匿酸。碘油。醋酸。幾阿蘇。綠養冰。

石模兒。汞雙綠。礦養酸等。調油外搽。均可。或以鐵酒合沒石子酸。或用西國墨水代

搽之亦可。○二病在頭部者。將髮剃去後搽碘磺油。或先將髮根拔出。然後搽藥。須連敷十日。切勿間斷。務使該處幾乎發炎爲度。○亦有用蟹螯水。或醋酸外搽。使炎。炎後有齧瘡。宜用壓劑。後再敷碘磺油藥。頗效。○此症治之甚難。務宜舊髮脫盡。或拔新髮已出。然後能愈。否則甚難告痊。有用碘磺油半月不效。另易玺油粉調油外搽。或以甘油加波匿酸外搽。亦有常用敷髮香油。郁加利達油藥硼酸油各二兩
哥哥油二兩丁香油半錢調勻功用不使病發。○如病已發者。○一方。鋏輕養九釐。加波匿酸二分四。闡納林與哥哥油各半兩。丁香油數滴。相合。搽之頗效。○郝氏謂頭部患此症者。先宜洗淨。或用卡而白兌對兒琴水一錢。化水二十兩洗之後。用○一方。哥核酸一錢。汞輕淡綠二分。闡納林一錢。安息香油六錢。卡而白兌對兒琴水一分。相合。搽之。久用必愈。須久○或謂此症必須用哥核精酸。如猶納氏方。

用哥核精粉五分。偈克坐兒五分。沙利沙酸二分。猪油百分。調勻外搽。
○亦有不用油藥而用藥水者。○一方汞碘 Hydrarg. Biniodidi. 一二釐。汞綠
分半。火酒十錢。滌水八兩。相合。先將頭髮洗淨。然後搽此藥水。每日二
次。頗效。又方。硼酸一錢。礦強呻呻一兩。火酒五兩。相合。同法外搽。亦效。
又碘搽藥亦有用之者。○病甚重者。可用碘片一兩。合加波匿酸四兩。
蘇一兩或合幾阿 外搽亦效。○又方。沙利沙酸二分。化哥羅方一兩。外搽。更有用礦
養酸外搽者。不見甚效。○此症每日洗髮之水。最宜硼砂。忌用肥皂。○
亦有不將病處之髮拔出。先以石模耳淡火酒納弗石兒汞綠等品化
水洗髮。洗後以咱囉甘油 Boroglycerine. 一半。合水一半。搽在病處。不效
者另以紫銅油粉 Oleate of Copper. 調闡納林搽之。仍不效者。用汞油粉
調油。小兒用五分。調油百分。人用二三分。調油百分。外搽。○內服魚油雞那霜鐵砷石等品補之。并吸淨
天氣。海水沐浴。飲食精細。餘與水蠶癩金錢癩同。

耳鳴 Tinnitus.

如因外物入耳。或耳蟬過多所致者。宜取出。間有因此發炎者。照卷二
耳症篇治之。○因胃肝腎病。或牙痛累及者。或腦筋病痛所致者。○一
方。馬前冰水三錢。淡輕溴酸兩半。鉛石水二錢。樟腦水至六兩。相合。每
服一錢。合水。飯後宜之。○又方。輕淡綠每服分半。或合輕淡溴分半。同
服亦佳。○耳後宜貼蠚螯膏。或內服鑄沙利沙。或雞那霜。或射入比魯
介賓八分釐之一。均可試用。

舌病 Tongue, Diseases of.

舌病不一。有生癰者。見舌下軟瘡篇 治宜割去。用鐵圈 Ecraseur. 如法掛出。或火
刀割之。大抵割時最易流血甚險。故宜慎用各法。割後以埃阿達方硼
酸粉洒滿。再貼紗布。飲食須由肛門射入。或用皮管通入。如流血者。宜
冰塊壓之。或用柏夫罷兒與止血各藥貼上壓緊。可以止之。○有舌炎

者。見卷二舌炎篇。○有舌爛者。見口瘡篇。○有舌患花柳毒者。見花柳篇。○有舌變大者。Hyper trophy of Tongue. 治法。宜收縮之。或以布浸斂藥貼上。外面再貼膏藥。但諸法概無實濟。欲斷其根必須剪去。或以火刀割之。割法在舌中間直割一條。或割深如V字形之槽。然後縫合。此症嬰兒胎成者多。須在四月後割之。○有舌腦筋痛者。此症甚少。治照腦筋痛篇。內服雞那霜與輕淡綠。外以哥根一分二釐化甘油一兩。搽之。○一方。哥根二分。甘油硼砂一兩。相合。每一點鐘外搽一次。甚效。痛甚者宜用嚙啡射藥。或用薄荷冰外搽。○有舌患牛皮癬 Psoriasis. 魚鱗癬者 Ichthyosis, Fylosis, Keratosis and Leucoplakia, etc. 名目不一。其實因有提神之故。如已蛀牙蜂刺傷舌部。以致皮破。漸漸變厚所致。見症宜將蛀牙拔去。并忌辛辣提神食物。另以汞綠水、乳酸水、鎰養酸水、銣碘水、水二百份化洗搽。○一方。得力礦養 Terra Silica. 二分二釐半。力坐新四

分半。猪油一兩。調勻搽之。而最妥之法。宜以火刀割去。○有舌筋短縮者。Tongue-tie. 因舌底筋短縮之故。治宜剪斷。

牙齒痛 Toothache.

概因虫蛀。牙根發炎。或牙齦發炎。或齒骨皆炎。或生瘤。或盡根牙。因牙肉外蔽。不得速萌。均可致痛。治法。宜審明病由。如牙蛀腦筋痛者。先宜洗淨已蛀之孔。抹乾。用幾阿蘇。或加波匿酸。哥羅方。丁香油。加絕布的油。薄荷油。或獨用。或合用。塞入蛀孔。或以棉花合哥根。綠養冰樟腦。薄荷冰。嚙啡。鴉片。安的拜林。克撒而琴等乾粉。塞入痛處。均有效驗。其中首要者。如幾阿蘇。樟腦。哥羅方。塞入痛處。更為效驗。○如疼痛不止者。因牙根發炎之故。宜將已用之藥洗去。另以鉛石粉。撥入痛處。外塞棉花立效。卽錠綠淡酸銀淡養等。同法用之。亦能引炎。使腦筋變木。其痛自止。○通行之方。用哥老典恩三錢。加波匿酸冰三錢。哥根一分。相合。

浸入棉花。塞在痛處。善能止痛。又能不使痛處受濕。并有腐質蓋上。再不效者。惟有用鉗拔去。

纏頭頸 卽歪頭 *Torticollis*.

此症因頸部肌肉短縮之故。有胎成者。宜以橄欖油或鍼碘肥皂搽藥。搽之後推拿頸部。再繫硬領。使頸項挺直。日久自愈。○有霍然起病。*Spasmodic*。屢發不止者。宜將頸兩段腦筋 *Spinal-Accessory Nerve*。割斷。或剪去半寸。不使腦筋再病。或肌肉縮短耳。○亦有用電震。或大服鉛石。鍼溴。外射其拉撒米姆。謙落。印度麻。藜蘆。或另服闊羊花精。阿魏。咖啡等品。均甚效驗。○間有頸骨病後頸項畧有短縮者。是因骨病非肌肉。腦筋之病。醫者辨明。須將肌肉肌筋割斷。至直爲度。

迷魂 俗名着魔鬼壓 其實何鬼之有 *Trance*.

此症與卷二百合病相連。治法亦同。電震必不可少。或以最濃鼻烟輕

淡水阿沒來淡養氣聞之。此症本腦部之病。有重發不愈者。治之甚難。不飲食者。宜用皮管通入。顧其元氣。並服鍼溴阿魏。麝香。茄菲濃茶等品。平其腦筋。或射入馬前冰亦可。

倒毛 又名倒睫 *Trichiasis*. (See Entropion.)

已詳卷二睫毛倒刺篇。而此症不過眼毛倒刺。所謂睫毛倒刺者。乃睫韌骨與眼毛同倒也。治法。將已倒之毛拔去。并將外皮割去少許。由睫邊倒刺之處。用利刀割通。分爲兩層。直至割去胞皮之處。使外皮畧上。內皮畧下。然後縫合。自然向外。而無再倒之患矣。

肉虫症 *Trichinosis*.

此因所食猪肉有病生虫。此虫熱至百六十度方死 食後傳染于人。攏入腸迴。即形身熱。嘔吐。頭暈。泄瀉等狀。治法。宜吐之瀉之。服加路迷。或草麻油。或肛門用水射洗。身熱者。宜服安的拜林。病人宜靜養安臥。或服提神之品。不能

食者。宜由肛門射入。大抵此虫無藥可殺。下之甚難。其子有時可以映視。故症多不治。

嘟吡咖咧 *Tuberculosis.*

此症因嘟吡咖咧質染患各部。詳見肺勢篇 痘症不一。數年前有柯氏。Koch. 製佈種之漿。惜用之無效。故其法不行。如膿瘡與吸核。或小兒體質虛弱。以及瘰癧之體。詳觀各篇。近來又以山羊血狗漿射入。以治此症者。亦難見效耳。

瘤 *Tumours.*

瘤固不一。各部之名目不同。詳觀子宮吸核癰瘤各篇。

內皮變厚 *Tylosis.*

此乃內皮之珠變厚之故。與舌部之魚鱗癬。以及外皮之雞眼相同。治法亦同。

肚腹氣脹 *Tympanites.*

治法。宜審其病由。因胃弱不化。腸癰閉塞不通者。宜在癰之上迴腹直肌處。割入放氣。另以松節油幾阿蘇阿魏等。射入肛門。或內服阿魏松節油。輕淡酒精炭粉。生薑薄荷。辣椒等品。均有效驗。○此症輕者。卽腸風。Flatulence. 重者概因腸癰閉塞不通之故。

小腸壞俗名漏底傷寒 *Typhoid Fever.*

此症甚屬危險。大抵華人患此。病勢畧輕。西人患此。病勢愈重耳。治法。凡服侍之法。與病人起居飲食較服藥爲尤要。自起病後。速宜小心醫治。不可遲延。病人之住處。尤宜幽靜通風。明亮清淨。床舖宜在房屋居中。忌用帳幃。以便通風。房中用物。不可陳設過多。衣被最宜輕鬆。朝夕均須有人服侍。至於病人之飲食藥物大小。便睡眠與否。以及各種病狀。均宜逐日按時記錄。以便查驗。平時病人。又宜靜臥。兩便須在床上。

遺之。切勿起坐。既便之後。當卽納入鉢綠。或銕錳養水。以解其毒。而免傳染。○病人飲食更宜留心。不可少誤。凡難化之食物。切宜忌之。最妄者。宜牛乳。成人每週日可飲六十至八十兩。又宜次數多。每一點鐘飲一小杯。約三兩或冷飲。或合鑄炭養或蛤蜊荷蘭水少許同飲亦可。如口渴者。冰水冷水可飲少許。但勿過多。○喉乾口渴者。○一方。甘油一兩。檳榔酸半錢。水二十兩相合。隨飲可也。○亦有將卑伯新合牛乳同飲者。依胃之消化與否。酌用之。更有以灰水或蛤蜊水少許。合牛乳同服者。能解大便不正之色。亦有以牛肉汁雞湯少許同飲者。或以藕粉合牛乳或合魚肚膠。Ising-glass。與極拉丁同食者。均可取用。○如身弱無力者。先以卑伯短粉合牛乳同服。或以甜肉汁與牛乳同服。Benger's Liquor, Pancreaticus or Fairchild's Powder. 後服提神之品。忽斯克酒
合乳同服○如不能食牛乳者。或不能飲至六十八十兩者。可以牛汁代之。惟已有泄瀉者。

因腸核發
炎之故

牛汁切忌勿服爲妥。

恐提神陽核
使病加劇

大約每日夜用一斤牛肉所製之湯足矣。亦有先飲牛乳。至大便閉結不通之時。再飲牛汁。能使大便通利。

卽羊肉湯。濾淨去油或生牛汁麥液湯。小牛骨節凍。以及藕粉。均可食之。雞蛋

早不可食。至漸愈時。方可食之。○自熱退後十至十二日。方可更換別

種食物。如饅頭肉茄菲茶乳餅等。○此症內服之藥。或謂初起服加路迷一分。能使熱退。所以解腸中之毒亦有每日服一二釐者。亦有服硼酸者。服後多有嘔惡亦

有以輕綠酸十五至二十滴。化水一兩同服者。能退熱止渴。亦有以鋸綠分半納入十二兩瓶中。加六十滴濃輕綠酸。至有黃烟。漸加清水。加水時搖之另加二十四至三十六釐雞那霜。以及一兩橘皮糖露。加水至十二

兩足。每服一兩。日服四五次。甚效。亦有服礦養酸。每三四點
罐服一分或納弗石林。沙

羅兒。桂阿柯兒炭養 Carbonate of Guaiacol. 等品。○退熱之法。一用藥如雞那霜。安的拜林。安的非白林。沙利沙。汾納斯丁。圭阿柯兒。郁加利達。

幾阿蘇沙羅兒等。均可取用。或謂此症之熱難退。不如聽之。如強用退熱之藥。反延時日者。而安法審服藥退之爲妙。因成人或有不效。小兒每有服藥而退者。如成人熱百有五度服藥無效小兒服藥能退三四度

大抵服雞那霜至少服半錢。每六點鐘服一次。又宜與冷水外壓法相輔行之。方有功效。如熱不甚高。雞那

霜不必大服。每服五釐。常服爲妥。○服雞那霜後。多有耳鳴嘔吐之患。服毛地黃後。亦有兼症。惟二者合服方妥無碍。

每服以雞那霜一分合毛地黃酒半錢

○安的拜林

服之合度。退熱甚效。初次服半錢。後每一點鐘服分半。大有退熱之功。惜依此服後。多有暈厥之患。不如每服半或一分。每一點鐘服一次。連服五六次。更效而妥。○安的非白林。每一點鐘服三四釐。連服五六次。亦效。

汾納斯丁。鏑沙利沙等。均可試服。但不若安的拜林之佳。○此症用冷水退熱之法。宜在極熱之時服藥無效者。以冷水洗抹。或全身浸入六

十八度冷水之中。約一刻之久。未浸之前。宜服白蘭地少許。至熱退一二度。或病人覺寒冷。不可再浸。抹乾安臥。大約每日可浸七八次。甚有效驗。中華之人。每疑此法。究非王道不合于身。而西醫歷驗此法。甚合病體。賴此慶生者。十居七八。惟冷水之度數。依身熱有比例。不可拘定。有初浸時冷九十度。後漸加至六十八度。使病人不知不覺。漸漸而冷。如猛熱非常。可以一時浸入六十八度冷水之中。如病人體弱不便舉動。浸入水中者。可用海棉花滲以冷水。揩抹全身。或以絨氈浸濕包裹全體。○如瀉血或氣脹或腹統膜炎或心經有病者。冷治之法。宜忌勿用。○酒類提神之品。初起勿用爲要。如七日內。見有疲乏者。本是死症。用與不用皆可。大抵七日之後。見症施用。不一而定。○如久熱疲乏者。酒與牛乳合服後。須細審病情。如服後舌乾變潤。脈細變大。脈速變遲。氣喘漸平。皮膚滋潤。譫語漸減者。均是吉兆。反此甚危。故服酒後一刻。

之內。醫者須細審病情爲要。○所用之酒。宜忽司克酒。因白蘭地。每有假牌不宜服之。恐有損而無益。大約每日夜極少服五兩。如病重者。再當加倍。如服後病勢不減。宜漸漸減少。或口噴酒氣者。知已服太過矣。○有時嘔吐。忌用忽司克酒。宜服香冰酒爲妥。如肚瀉者。宜服葡萄酒。○大約服法。宜合乳同服。如不能合乳同服者。宜加多水冲淡。○或謂白蘭地之於熱症。一不服爲妙。二可服與否。猶豫不敢投者不可服。三病重兼生平有酒癖者不可不服。四有時用酒有起死回生之功。五取服酒類。每日夜宜服五兩。

此症兼症不一。一不睡。二頭痛。三譖語。四肚瀉。五便閉。六腸窄潰爛。七腹統膜炎。八久臥成瘡。九溺閉。列論如左。

不睡。○已詳不睡篇。○一方。輕綠咖啡水一錢。鱗溴四分半。橘皮糖露三錢。哥羅方水至二十四兩。相合。臨臥時服一半。如過三點鐘仍不睡處。亦有退熱寧睡之功。

者。再服其餘甚效。萬一不效。宜服撒弗那兒。用開水化合忽司克酒同服。逞熱服之。如肚瀉者。兼服鴉片酒。亦有用冷水澆頭。或揩抹手足各處。亦有退熱寧睡之功。

頭痛。○間有極重者。治法。宜在頸後貼芥辣膏。或先服安的拜林分半。過一二點鐘不止者。再服分半。甚效。或以冰塊或以冷水銅管包壓亦可。

譖語。○宜使病人息力靜臥。切忌嘈囉。醫者又當細審病原。是否腦胞炎。或肺炎。或腎症。或膀胱積瀉之故。治法與頭痛同。如變成暈厥極形疲乏沉睡者。宜服忽司克酒。服二點鐘或服麝香。每服三釐或射入呻吟酒精。肚瀉。○日下四五次者。不必治。頻下不止者。須驗其大便。是否食物之故。因食物所致者。如宜忌之。另以卑伯新合乳與忽司克酒同服。切忌漿粉牛汁之類。如漿粉類不能少。宜藕粉合牛乳同服。并內服鴉片。能

安腸迴。亦有用鴉片酒三分。合漿水二三兩。射入肛門。甚有效驗。卽別種熱症泄瀉者。亦可用之。兼嘔吐者。宜服嚙啡十六分之一細丸。○一方。香礦酸三錢。鴉片酒二錢半。兒茶酒四錢。哥羅方水至十兩相合。每服一兩。日服三次。善能止瀉。泄瀉極重者。宜服鉛醋二三釐。合鴉片酒一分同服。或炭匿酸洋蘇木。*Log wood.* 石炭養合劑。Chalk Mixture and Rhatany。等品。詳見卷一泄瀉篇。○亦有用熱水八度半一百零二十兩。射洗肛門。或用冷水射洗肛門。均效。

便閉。○間有極重者。治法宜以甘油尖丸納入肛門。或以熱水射洗。內服草麻油二錢。如六七日不下者。宜以橄欖油熱水射入肛門。再服草麻油二錢。頗效。瀉血。○最效鴉片酒。每服四分。如嘔吐者。宜射入嚙啡水。病人宜靜臥不動。并以冷水包裹肚腹。或大服白礬鉛醋。了葛炭。匿酸鐵雙綠蘇木礦酸松節油。餘同卷三咳血與流血篇。

腸爛變窄。○治法。宜大服鴉片。外壓冷水。飲食宜由肛門射入。口中常含冰塊。不時用之病人切勿行動。鴉片必不可少。

腹統膜炎。○切忌運動。大服鴉片。忌用冷水。宜以熱水外壓。久臥成瘡。○已詳卷一久臥成瘡篇。治法最宜潔淨。已爛者照爛瘡法治之。

溺閉。○宜用象皮通管通之。如溺有輕淡氣者。宜用硼酸二分。合乳同服可也。

此外在婦女有小產。或肺炎。或腎炎。或溺涵蛋白等症者。均照症治。至病漸愈。飲食起居更當小心。每食後仍宜試其本熱。如因食物不合。熱加重者。當卽忌口。飲牛乳爲妥。○此症熱退十二日後。方可起床畧坐。

有名醫云。如予患此症。宜置予於通風清潔之房內。衣被輕鬆。服侍之

人須有極大之本領。內服冷牛乳肚瀉者宜服鴉片。或射入肚門。便閉者。宜熱水射洗。瀉血者。宜吞冰塊。外壓冷水。或射入肛門。并內服鉛劑。腸爛變窄者。宜大服鴉片。又初時忌用忽司克酒。病久至病退時。可以少服。冷水沐浴。由便不必拘泥云。

瘟熱傷寒 *Typhus Fever.*

治法概與小腸壞同。依各種病狀。不一而定。○此症最易傳染。是以解毒之法。最宜小心。且其毒每自下升上。如病人臥在樓下。凡樓上之人。必易傳染。故病人宜臥在樓上爲妙。三千立方尺天氣其臥房大小可容如書館店舗羣聚之處。

一染此症。即宜停歇。以免遍傳。○此症飲食與小腸壞同。但此症小腸並無損壞。故飲食不必如小腸壞症過於嚴忌。凡牛汁鷄湯。均可食之。卽提神酒類。亦可取用。宜及早飲之。○此症至十四日。必能退熱。雖用藥亦不能早退。故醫者不以退熱爲要。宜以補心。使病人有力支延至十四日爲要。補心之藥。或用酒。酒不足者。或土的年。頗效。毛地黃此症無效○退熱之品。如安的拜林。冷水沐浴。均不甚效。不若小腸壞之易見藥力。不如以淡綠酸。合水代茶飲之。善能止渴。○譖語頭痛不睡者。忌用鴉片。宜吞冰塊。并頸後引炎。○或以麝香一分。合加絕布的油五滴。極形疲乏時服有效。○不睡者。初起可服綠養冰。日久心經無力者忌之。或以冷水洗沐手足。亦有審睡之功。○一時暈厥者。宜以冷水澆面。或洗其四肢。或飲熱茄菲茶。肛門或射入或頭部引炎。或以熱絨氈包裹全身。或腳部引炎。○膀胱有積溺者。宜刺放。兼患肺體炎者。宜提神之品。○如熱退酒類宜減。至三四日。斷淨勿服。至七日後可服藕粉魚鷄湯等類。又宜內服補劑。○一方。鷄那霜半錢。淡綠酸四錢。高林布酒苦白木酒各一兩。橘皮飲至八兩。相合。每飯前服一大匙。日三次。大抵此症熱退之後。便可速愈復元如常。

爛瘡 Ulcer.

此症不一。已詳卷一肛裂。卷二胃爛。以及頑瘡口瘡花柳各篇。統治之法。必使爛處變熱。易於收口爲要。病人必須靜養不動。常以滋潤濕藥包裹患處。如病人有事必須行動者。宜用象皮條包紮。包後每有兼患水滲者或用絨布二層。大小如爛處。另以油紙略大於布。浸加波匿酸水。四十貼上相近爛處佛士林者可茶用寬緊帶。終日包裹。如不用加波匿酸水。卽汽水。或硼酸水。化火酒水。一化鋸綠水。四化鋸綠水。水一兩鉛醋水。十五滴化黑水黃水汞綠水。水一兩丹礬水。一釐化水四兩綠養冰水。五釐化水一兩淡淡酸。水一兩安息香雜酒。海士林碘水。一釐化水十兩丹礬水。一釐化水銀淡養水。三釐化水一兩鋸礦養水。水一兩等。均可取用。如所用各水。過於提神者。另用滋潤油類之品。最妙加波匿酸油。一化油五滴化大約每日早晚換兩次。亦有以鉛片或鉑片如爛處大。或蓋在絨布外。或貼在爛處。久用亦效。○病久成爲弱瘡。Weak Ulcers. 因內刺不生。或生而無力。內涵水泡之形。

宜服鐵魚油。飲食宜佳。吸淨天氣爲要。外搽銀淡養水。再貼乾絨布。以象皮卷包裹。數日後已生肉刺者。宜用銅礦養水。亦有用淡淡酸水。鋸綠水。浸絨布外貼。較加波匿酸水更效。○或用安息香雜酒。浸絨布如爛處大貼之外。加鉑片一層。亦效。或用松香油藥。Ung. Resinæ. 頗有效驗。

日久頑瘡不愈 Indolent Ulcers. 又作千日瘡 或名陰瘡 腐質。亦有色 緣者 宜用丹藥提神內刺。先將患處病人宜靜養數日。至已生肉刺。方可行走。此症潰爛之邊略高。形如韌骨。每有因此不能收口。以至纏綿難愈。宜將瘡邊高處。用力壓平。病人每在未起床時。宜用象皮卷包裹患處。然後行走。每夜臨睡。用硼酸水洗。并貼加波匿酸水絨布。○亦有用象皮卷不便者。可以鉛片外貼瘡面。鉛片須較爛處畧大。先浸汞綠水。然後貼上。外以棉花或絨布寬緊

帶紮緊。○亦有將患處洗淨貼綠油紙一層。先浸汞綠水一化水四千外蓋洋鐵一層。再以汞綠紗布布卷包紮。○亦有以蟹螯水外搽使炎者。有用後疼痛不堪或變死肉者故不多用○亦有在爛邊高凸如韌骨之處。每離半寸割之。約一寸長雖流血甚多。於病甚宜而效。或先在爛處中間直割一條。再橫割。每離一寸一割。依爛處大小不定。當時流血甚多後以藥布與埃阿達方包紮。不必每日洗換。過一二禮拜後自愈。○亦有將高凸之邊括平。或種皮。大約宜在瘡邊種之。且所種之皮愈小愈妙。○猶納氏法。先以皂水洗淨患處。後以極拉丁一分鍔養一分甘油四分水四分相合。搽在不爛之處。其已爛處洒埃阿達方粉。後貼藥紗布一塊。加棉花用長方布四角包裹。每三四日一換。頗效。○亦有用電震或推拿法。或不治者惟有鋸絕。○內服宜補劑。吸淨天氣。改換水土。

熱痛爛瘍。Irritable and Inflamed Ulcer. 宜靜臥勿動。內服瀉劑。巴豆甚效。

每服半滴。或加路迷雜丸亦效。○一方。加路迷釐半。錫礦養二釐。圭阿禁松香 Guaiaci Resinæ. 二釐。巴豆油三分之一滴。相合。成丸作一次服。每晚服一粒甚效。○如爛處紅熱疼痛者。宜服鎂礦養瀉之。○如疼痛難當者。宜鈳溴三分。合安的拜林半至一分。相合作一次服。○外治之法。以加波匿酸水_{三十化}浸絨布用油紙包紮。不效者。宜用加波匿酸哥根水。每百滴加哥根二釐或加綠養冰_{加一分}或鉛醋鴉片水。均可試用。但此症往往用止痛之藥。痛反加劇者。可以哥根水_{八釐化水一百}外搽。一刻之後。再以銀淡養水。或乾塊搽之。餘法同上。○發炎爛瘍。最妙用冷水包裹。或冷水加火酒。或輕淡水少許。包裹後。服鎂礦養瀉之。或刺爛處放血。○大抵外包之藥無效。

爛瘍變死肉。Sloughing Ulcers. 凡花柳飲酒吸煙水消等症。兼可患之。最宜提神爛處。內服補劑。如死肉甚大。將脫者。宜搽淡酸。如死肉不大。

未脫者。宜以淡汞綠水_{五十}或鍊鑿養水_{一化}淡酸水_{三十}加波匿酸水_{六十}洗之。至死肉已脫。治法與平常爛瘡同。

迴脈脹大變爲爛瘡。Varicose Ulcers. 宜靜臥勿走。用象皮卷包裹。每晚用海士林四兩。火酒二兩。玫瑰水二兩。相合浸絨布_{或海士林一分水一分相合}貼在爛處。用油紙包裹。頗效。

水滋癩爛瘡 Eczematous Ulcers. 與迴脈脹大爛瘡相同相連。治法宜以象皮卷包裹。使迴血管縮小爲要。但往往用象皮卷多有濕熱。使水滋癩變重者。醫者宜設法預防。最要之法。病人宜靜臥勿走。或搽硼酸油藥。用有孔象皮卷包之。凡外用流汁濕藥。甚爲不宜。不如用粉藥或柏油各劑爲妙。

通瀉管後發熱症 Urethral Fever.

此症概因用通管後。發寒作熱。故名。病發當使病人安臥。煨以熱水。內

服忽司克酒等熱劑。○如瀉不閉或內腎不病者。第服忽司克能愈。_{有內腎病}

司克酒
忌用

或另服雞那霜與鴉片酒二三分亦效。○如瀉閉者。宜熱水絨氈包裹全身。或熱水沐浴。腰部壓熱劑。或火酒烙之。或以熱水射洗肛門。餘與內腎炎症同。○加瀉變蛤蜊者。宜服幾阿蘇沙羅硼酸等品。或以熱硼酸水射洗膀胱。○預防此症之法。凡用通管之後。最宜靜臥。又宜在床上通之。不可感冒風寒。_{切勿在棹上或有風處通之}或未通之前。既通之後。宜用熱水沐浴。如醫者預知必發病者。宜未通之前二點鐘服鴉片。未通先半刻射入哥根水。又宜用軟通管。<sub>尤當洗之極淨
外搽硼砂甘油</sub>忌用銀管爲要。

瀉管破傷 Urethral Rupture.

此因外傷之故。宜當時速治通入軟通管。_{以便}如不能通入者。再以坑通管_{割石}通入膀胱。如不能通入者。宜割之。至通入爲度。再換入軟通管。不可取出。接以象皮管。使小便流出。後將傷處并割口縫合。○亦有傷後

溺管斷裂不見者。惟有自小肚割至膀胱。用通管自內通出。將溺管與傷口縫接。以便將來便溺無阻爲要。○此症每因小便流佈傷處。變爲死肉。或溺毒入血者。最宜小心預防。

小便成管 或 潴管變漏 Urinary Fistula.

此症不一。或一管數管。亦有因傷後溺管斷裂不接。由傷處生合成管爲假溺道者。不必治。○如溺道不斷。有管道至外者。先用通管通入。後將成管處割通。直至溺管縫合。○亦有每次小便之時。病人自用通管。不使小便由所成之管漏出。久用自愈。或內服硼酸。頗有效驗。○至於割法。詳見溺管變窄篇。

子宮病症 Uterus, Diseases of.

子宮之病不一。已詳子宮內炎外炎生瘤流血崩等篇。此外如子宮口潰爛者。Ulceration of the Cervix. 已詳白帶篇。治法與白帶同。如不效

者。宜以碘加波匿搽抹爛處。或以銀淡養加波匿酸鋸綠鐵酒汞淡酸水搽抹亦可。或棉花浸甘油硼砂。納入宮口。或甘油吳匿酸
甘油白礬亦可身弱者宜服補劑。

子宮不正 Uterine Displacements.

子宮不正。如下垂已詳下垂篇或倒前或倒後等症是也。

子宮一半倒後症。Retroflexion. 患者最多。患此多難受孕間有患此而無病狀可驗者。醫者須細審病人。曾否子宮變大。或舊炎。或產後子宮收縮不整。或天癸妄行。亦因收縮不整之故或子宮前面生瘤等症。如病人覺痛而熱者。治照子宮內炎篇。最宜靜臥。外壓熱劑。以甘油硼砂浸棉花。納入倒處。切勿妄試手法。務先止痛退炎爲要。○如熱已退。宜將子宮納整。用食指插入陰道中。指插入肛門。最易摸明倒處撥正。或以子宮探管。Sound. 探入倒處。扶正。或以棉花浸甘油硼酸塞入倒後擱起。每三四日一換。後以好氏子宮擰。又名 Hodge Pessary. 納入倒處。圓端宜在倒處方端宜在宮口扶正。不使再倒。待三至六月

後取出。不倒者不必用。仍倒者再用之爲妥。

二 子宮向後全倒。Retroversion. 與半倒相連。治法相同。宜用好氏子宮

撐。撑之或用探管亦可。孕婦用

三 子宮向前半倒。Anteflexion. 大概治法與上同。如發炎流血變大。或收縮不整者。均照法治。惟子宮撐概無用處。

四 子宮向前全倒。Anteversion. 多因子宮本體發炎。或內炎外炎之後患之。先宜止痛止炎。後照上法治之。

五 子宮下褪。Inversion. 多因產後子宮口無力所致。見症當卽一手將褪下之子宮納入。一手在腹外助之。○如平時不在產後患之者。取治甚難。宜先聞哥羅方。然後用手納正。如不能上升者。用白氏專器White's Reducing Appliance 檻舉使之套入原位。後以一指探入肛門。一指探入溺管。握住子宮之口。不使再褪。○亦有久病難愈。將宮口剪去少許。縫合。決不再褪。惟此後不能正產孕後一二月下之爲安亦有用象皮袋納入子宮。後射入水至滿。使褪處上升。久用亦效。

子宮軟瘤 Uterine Fibroids.

此症與癟肉相同。間有患者並無病狀可驗。往往爲治別病始知患此。○如疼痛或流血者。宜用了葛精。或射入或內服。○一方用了葛精一釐。馬前膏三分釐之一。雞納霜三釐。相合。成丸。每日服二丸。不效者。宜電震。用法與月經妄行同善能去痛止血。○亦有放大子宮之口。將瘤指出。如瘤之根蒂細小者。可以用鉗掛定割之。

陰道抽閉 又名陰痛 Vaginismus.

此因陰道肌肉抽搐疼痛。與腦筋病相連。治法宜平腦筋。用哥根三分。嚙啡分半。謙落油一兩。調勻。搽入陰道。或以哥根一釐。埃阿達方一分。顛茄膏釐半。哥哥白塔油足用。調成尖丸。納入陰中。頗效。如日久不效。

者。宜審明陰中有否破裂潰爛。如有照法治之自愈。○亦有將痛處或破傷處剪去少許。或將陰道割大。可免再發之患。

水痘 *Varicella or Chicken-pox.*
此症極輕。亦有水痘之微生物故能傳染不治自愈。或內服萬應退熱藥。或外用蛤蜊水洗沐皮膚。

卵迴管變大 *Varicocele.*

此症因卵之迴管變大。與腳部之迴管大相同概因病人久立之故。治法常宜行走。或冷水洗之。或布卷包緊。或推拿法。大抵外擦之藥無效。○一方。海士林三兩。火酒二兩半。汽水四兩半。相合洗之。○此症最宜通利大便。或謂舉陽不洩與此症有或電震。或服海士林與補劑。○日久不效者。惟有割治。將患處血管割斷縛住。或割去或以帮針一枚。將迴管兩端縛住。後將二針之間血管割斷。

迴血管脹大 脚腿最多 *Varicose Veins.*

此症在脚腿最多。概因過於行走舉重。以致迴管無力所致。治法宜用象皮卷紮緊。臨睡解去。起床節宜紮緊。亦有衣以象皮襪者。病人不宜久立。腳部不可用帶縛紮。大便常宜通利。血薄血旺。均宜調治。久不愈者。惟有照卵迴管脹大法割之。大抵病輕者不必治。病重者一時破裂。易於流血。故宜早治。

天花 或 天痘 *Variola.*

本毒症也。最易傳染。天行尤烈。佈種次之。治法與麻瘡傷寒玫瑰紅相同。病人之起居飲食。最宜小心。通風清潔爲要。○病重者。多有腰痛背痛。宜服安的拜林。或火酒烙之。甚有效驗。○內服之藥。概無實效。惟雞那霜五釐。合鐵酒二三分。常服。能解血中之毒。頗有效驗。○洗沐身體。最妙用郁加利達油。○淡輕綠酸。謂能止渴退熱。宜之。至於酒類。宜用

與否。與小腸壞傷寒同。○天花流血。乃症之最重者。宜大服雞那霜與鐵酒。○又方。可以合服。了葛流膏三錢。松節油三錢。甜消呻呻二錢。火酒一兩。蛋清一枚。薄荷水到八兩。相合。每三四或六點鐘服一兩。頗效。○頭痛癲癇泄瀉不睡者。與傷寒治法同。○外治之法。最要用汞綠水。硼酸水加波匿酸水。八十或油。八至搽抹患處。或謂用油藥較水藥更妙。偉倫氏方。石灰橄欖油七錢半。郁加利達油四錢。爐甘石粉一錢。相合。用鷄毛每一二點鐘拭一次。甚效。○亦有以碘酒外搽。至起黃漿爲度。亦有以汞油藥一分。加猪油五或十五分。調勻搽之。性或過烈或先搽橄欖油。後以鉢淡養鉛炭養粉各半相合洒之。或以沙利沙酸一錢。漿粉十錢。甘油四兩相合調勻。攤絨布黏上。亦效。○病人臥房。不可過亮。宜用帳幃阻光。亦有以絨布浸冰水八兩。合甘油一兩。貼于痘上。外以油紙包裹。或以汞綠水。每盆納汞雙綠二錢半沐浴。不可過多每日兩次。或以加波匿酸水噴射。或加

波匿酸水合哥根噴射喉部。或以甘油硼砂化水噴射喉部。均可取用。

嘔吐 Vomiting.

此非病症。實病狀耳。詳見胃瀰胃癰、胃痛、腦或腦胞炎、內腎病、暈船、泄瀉各篇。

老鼠奶 或飯澁 Warts or Verruca.

治法。用濃毒醋滴。搽自脫。極厚者宜先刮薄。或以鷄眼藥水。見鷄眼篇或鉀石水。鉀石粉。鍊輕養銀淡養鎔養酸。水五汞淡養汞綠水。百五十分等品搽抹。每

日一二二次。數日便脫。餘與鷄眼同。

甲疽 俗名蛇頭 Whitlow or Paronychia.

治法本與膿瘡相同。務使散膿退炎爲要。或先以冰水壓之。不效者用熱壓劑。須合解毒藥內已成毒者。宜早開刀。且割口愈深愈妙。止痛之法先以呻呻噴射患處。或浸冰水合加波匿酸水中。然後割之後。照爛瘡治法。

外傷 Wounds.

傷科不一。或割傷 Incised wound. 疗傷 Contused wound. 扯傷 Lacerated wound. 刺傷 Punctured wound. 槍炮傷 Gunshot wound. 醫者須審病施治。大抵刀傷首要之法。解毒爲最。傷處與皮膚宜洗之極淨。并用刀薙刮皮膚。再以汞綠水一釐化二兩洗之。卽醫士之手與刀器亦宜洗淨。又傷處忌用海棉。不如用棉花爲安。浸熱水或硼酸水汞綠水洗之。○流血者宜紮縛血管。或常以流水滴洗。○破傷之處不可頻動。當宜縫合。後洒硼酸粉與埃阿達方。用絨布藥棉花布卷等包裹。務使傷處清潔。不使天氣吸入傷處爲要用之得法。可逾七日。不換自愈。如一時痛脹身熱者。內必有毒。須當洗換。○扯傷。治法相同。最宜潔淨。傷輕者洗淨後用哥老典恩。或安息香雜酒包貼能愈。○毒傷蛇狗之類已詳血毒篇。○刺傷者。宜以水節射洗傷處。挿入皮管。使毒外洩爲要。○槍炮傷。內有彈丸者。宜細探取出。將傷口開大。以便掛取。不能掛取者。宜暫停不取。但求無害病人而已。惟傷處大者。宜在傷處之下。另開小孔。以便流通膿毒。解毒之法。與平常同。

黃熱時症 Yellow Fever.

此症皮色變黃。猶如黃疸。炎熱各國有霉毒之處。多患之。概與天花溫熱等症相同。易於傳染。病人住處最宜清潔通風。凡服侍之人。最宜穩安。病人飲食更當小心。內服利小便發表瀉劑。○一方。鎰雙炭養七釐。汞綠 Hydarg Bichloridi. 七十分釐之一。汽水二兩。相合作一次服。每一點鐘服一次。功能使小便變酸者。反變爲蛤蜊。○又方相同。鎰雙炭養一分二釐半。汞綠四十分釐之一。汽水二兩。服法同上。功用亦效。大抵此法不宜久用。二三日後。宜停勿服。○退熱與平常熱症同。或以溫水沐浴。或以冷水洗沐四肢。雞那霜初起服之。或有功用。久後無效。○

此症最多嘔吐。所吐盡是黃水。汁胆治宜外搽蠻蠶水芥辣膏。內飲冰水冰塊。又服鉢淡養輕衰酸 Prussic Acid. 或牛乳合灰水。○又忽斯克酒必不可少。須由肛門射入。○亦有初起瀉表。并利小便。後用皮膚針射入雞那霜大服。後用輕瀉劑。○吐黃水時。宜大服吃哩略。又用皮膚針射入咖啡。後宜補心。○溺閉者宜腰部引炎。或芥辣膏或火酒烙之。○飲食宜餽蛤蜊水。不能食者。用鑄炭養一茶匙。化水射入肛門。均甚效驗。

以上自 I¹ 至 Y 爲四卷

醫方彙編卷四終

廣學會書目書價附均以洋銀計

萬國公報 每月一本

一角五分

每年十二本

一圓五角

中西教會報 每月一本

一角

每年十二本

一圓

花之安著

自西徂東 八角

性海淵源 二角

經學不厭精 八角

聖蹟五彩圖 救主 約瑟 摩西 大衛王 所羅門王 以斯帖 但以理 路德氏 各一角五分

韋廉臣著

格物探源 壹圓

基督寶錄 壹圓

治國要務 二角五分 共九篇備例於後零售亦可

治國要務總論 國之三寶 致治之本 煤炭礦利 林木之益 修路之益 機器之益 人非教不成 非忠恕不可

各四分

二約釋義叢書 六角

女兒經 三分

耶穌紀要 一角五分

慕維廉著

廣學會書目

附

一角

格致新機

一角

人心交與上帝 二分 破船救人記 二分

林樂知著

自歷明證

六角五分現有十一種備列於後零售亦可

卷一印度教柏得門奇信道 一角半

卷二羅馬教奧古斯丁信道 一角

卷三回教依美德定信道 三分

卷四猶太教洛士伐里信道 三分

卷五婆羅門教瑟的那但信道 二分

卷六日本教新島約瑟信道 一角

卷七印度教但以利信道 六分

卷八歐洲古時人信道 八分

卷九印度女氏信道 三分

卷十巴西等人信道 三分

卷十一英國得基督教緣始 一角二分

卷十二基掃斯登 二分

麻笛論道探源 八分

卷十三中西互論 一分

聖人說 五分

家用禱告文 六分

印度隸英十二益說 二分

中東戰紀本末初編 一圓五角

文學興國策 二角

戰紀初續編文策全函 二圓

中國度支考 一角五分

英興記 三角五分

泰西新史攬要

貳圓

時事新論圖說

陸舟

教士列傳

救世教益

三十一國志要

五彩天樂圖

列國變通興盛記

喻道要旨篇

五洲各國統屬圖

生利分利之別

八大帝王傳

傳教定例

五洲教務問答

百年一覺

花圖篇一百張

中西四大政

大國次第記

七國新學備要

新政策

養民有法篇

名人雜著

八角

幼學操身

一角五分

正道啓蒙

一角五分

新學彙編

五釐

論機器之益

勉善會摘要

六分

華英譯案定章考

五分

農學新法

三分

修水口以利通商議

五分

名公三序

三分

修命說

二分

山東貧窶考

二分

稅歛要例

二分

傳教諭旨

五分

中國變新策

二分

電學總覽

八分

廣學會書目

附

聖經釋義

五分

爲道受難記

三分

太平洋島受道記

三分

富翟氏著

一角五分

李提摩太著

一分五釐

辨忠篇

一角二分

安仁車

一角二分

麻笛論道探源

八分

中西互論

四分

聖人說

五分

家用禱告文

六分

興華新義書

三分

印度隸英十二益說

二分

中東戰紀本末初編

一圓五角

中東戰紀本末續編

三分

文學興國策

二角

戰紀初續編文策全函

二圓

李中堂歷聘歐美記

三分

中國度支考

一角五分

英興記

三角五分

中東戰紀本末三編

三分

廣學會新出各書

格致舉隅	一角二分	聖經要道	三角
福民圖	二分	救星圖	二角五分
聖經國人書	二角五分	聖經譬喻圖	二角五分
字母國人書	二角五分	字母聖經故跡	一角五分
泰西聖跡圖單張	一角二分	歷代地球圖樣四條	二角五分
猶太地圖	二圓	一圓七角五分	一圓七角五分
泰西畫譜	二圓	大教統屬圖	一角
醒華博議	二角	永息教案策	四分
石印泰西新史攬要	八角	救華卮言	一角二分
紅十字圖	一角	石印時事新論圖說	二角六分
天道興國淺說	一角	性學舉隅	七角
古史探原	二角	天倫詩	一角五分
彌賽亞	三分五釐	富國真經	三角
		小孩新報	五分
		蒙學淺說	一角
		便帶地球	一角
		聖教功效	六元五角
		使徒紀略	二角五分
		雪教說	一角

