

✂
1-127

F1
イ
117

富士川文庫

明治六年新刷



醫西方啓蒙

醫卜堂聚珍版

富士川文庫
1300

Kitasato Memorial Medical Library

2冊
1-2

490.9

Ih-5

1

No. 2289

1H 1 127

醫方啓蒙序
大矣哉皇國之取於人以為善也
建洋蠻延洋師文武諸省之法莫
不一亦參諸西教而如我方技因
得以沐其餘澤纏綿郭索之文日
新窮理之術戶譯家誦渙然永釋
四布於海內可謂斯民之洪福矣
夫醫之為道專就人身以窮理順



理以施治至公無我應變無窮無
歉於己而有濟於人故謂之仁術
然則何擇華夷辨古今喋々乎爭
門戶之爲也香城喜多村先生學
博行脩無穿鑿拘泥之弊脫黨同
伐異之習著書等身闡聖言之微
發至理之蘊扶世翼教者有年於
茲今又爲童蒙著書若干卷名曰

醫方啓蒙徵序於余余受而讀之
其所論皆足以通華夷之旨折今
古之衷而其要以濟世利民爲歸
庶幾不悖于國家制令之意焉讀
者勿以弁髦視之可也是爲序
明治六年一月栗園淺田惟常拜
撰於東京半門勿誤藥室



醫方啓蒙 卷一
方。而世醫言漢者。詆洋爲荒唐。不經。言洋者。譏漢爲迂濶。不適用。所謂楚則失齊。亦未爲得也。嗚呼。醫者。衛生之任。一撮之石。半匕之草。既有裨於生命。固不擇內外。況漢洋乎。香城喜多村先生。我曹之老國手也。嘗於醫經。經方有所撰著。而頃又著一書。命曰醫方啓蒙。乃

取古書之所未備。與己之新得者。各摘其要。而折之於中。以授子弟。輩不敢偏於漢。亦不敢黨於洋。其意謂尺有所短。寸有所長。苟裨益於我道。奚分彼此。是與世之言醫者異矣。先生學術精良。世所共知。而胸有成竹。目無全牛。予與先生相知久矣。迨是書竣。功聚珍刷印。

使予題其首。予謂是書布於世。則
在民之受賜。盖有不可量者焉。不
得不拋擲百事而應其請。弗敢以
不文辭也。長興母之言
紀號二千五百三十三年。第五月
識於日本橋南邁種德舍。其
谷辭甚。要而述之。今村亮高
與古書之。河未。典。文。海。發。奇。

醫方啓蒙序
喜多邱栲翁一日携書一編來。余曰是我近日所草聊爲
黃小計耳。非敢示大方也。然相知之久。請予爲子序之。余受
而繙之。其病論治方。粲然臚列。而綴以國字。令人易讀。洵爲
刀圭家之祕笈也。當今醫家。漢洋互競。言漢者曰洋家。支離
狡獪。其言雖巧。而無裨於治術。談洋者曰漢醫。陳腐之論。徒
爲芻狗。執拗不已。何以活人。余平心夷攷之。如中風一證。漢
以爲虛邪賊風所致。洋則謂腦靈性之病。瘧疾爲夏傷暑所
得。洋則謂腐草敗禾之氣。觸人爲孽。婦人帶下。則爲子宮敗
濁。小兒變蒸。則爲生牙之候。凡此等類。漢人所未嘗言。而明
核精微。徵之今日。確有應驗。然而如傷寒時疾。脚氣治法。漢

醫方啓蒙序

已巳冬月予僑居下毛鹿鳴堂中主人温厚長者延予教督
孫兒雖刀圭不暇饗待甚厚家又富典籍予課業之餘閑居
無營因抽繹架藏之醫書兼纓述平素之所得國字綴文聊
備診候處療之用題曰醫方啓蒙鳴喙疾疢洪繁不可端倪
醫方千卷未盡其理此瑣々册子何足以示人雖然童蒙
學醫或省疾問病而時寓目此編庶幾可以知其證候方治
之端緒也初學輩此爲階爲梯而更升堂入室則圓機之
妙自存乎其人焉若夫大方君子何取于此矣鹿鳴堂在
都賀郡關根井村主人姓手塚氏名玄僊累世醫師今年越
古稀而勉勵不怠精志診處起死肉骨豈啻千百近里蒙其

醫方啓蒙序

醫方啓蒙序

已巳冬月予僑居下毛鹿鳴堂中主人温厚長者延予教督
孫兒雖刀圭不暇饗待甚厚家又富典籍予課業之餘閑居
無營因抽繹架藏之醫書兼纓述平素之所得國字綴文聊
備診候處療之用題曰醫方啓蒙鳴喙疾疢洪繁不可端倪
醫方千卷未盡其理此瑣々册子何足以示人雖然童蒙
學醫或省疾問病而時寓目此編庶幾可以知其證候方治
之端緒也初學輩此爲階爲梯而更升堂入室則圓機之
妙自存乎其人焉若夫大方君子何取于此矣鹿鳴堂在
都賀郡關根井村主人姓手塚氏名玄僊累世醫師今年越
古稀而勉勵不怠精志診處起死肉骨豈啻千百近里蒙其

侍醫叙法眼教諭如故事務倥傯猶能講究不倦以繼開自
任曰醫與儒其道相通醫之於素難猶儒之有六經也醫之
於仲景則儒之有四子也六經不明訓詁無由得其解四子
不究義理則不能求其旨然義理之與訓詁各有所主非分
鑿異途也故先生於素靈難經端治訓詁而注仲景書特主
義理上自素難下至仲景及晉唐之書抽繹諸家一掃鞶鞶
融會參酌歸之於至當約不失於疎詳不流於繁其經整頓
者凡三十餘部就中素門講義傷寒金匱疏義爲世寶重焉
又思世沐國家之渥恩身受特達之知無涓埃以報之因倣
武英殿聚珍版式活字刷印醫方類聚二百六十六卷及太
平御覽千卷獻納之於官且置諸學庠以廣其傳蓋類聚者

醫家叢書之冠取宋元亡逸之書若干博通之資無以尙焉
者而御覽則考據之淵藪在醫家亦不可缺之典也先生爲
人寬宏樂易待人以恕而偏々自立期爲有用之學有與同
僚議不協遂退職老于城西大塚莊此時藏庭學古二先生
逝旣久矣先生獨康健西遊于京洛東登筑波恆與俳士歌
人娛玩風月與桑門繙流談論心性怡然自樂蓋先生之崇
德鉅望中道而隱逸不能展其所抱負洵爲天下惜之也厥
後數年明治丙子秋朝廷以先生所刊醫方類聚贈之於朝
鮮蓋彼土亡佚失其傳今得再覩可謂惠及異邦矣醫官洪
顯章等大喜以爲國寶朝廷爲賜金若干云先生以甲戌
十二月罹風疾右身枯矣猶能以左手作書賦文詩然時々

疾發神昏不語數日丙子十一月九日遂不起卒於家享年七十三遺命葬於今戶稱福寺先生配和田氏生直敬先卒養湯川某子直正嗣家而和田氏沒側室女芳野未字在家先是數月寄書於常曰枯木無再榮死灰不復燃余將不遠歸泉下乃有東游學士倘相訪紅杏花深一片碑句實爲纖哀哉惟常爲諸生初來江都人無知者惟先生一見以斯道相許屢交三十餘年以先生蔭列侍醫之後知先生尤深况有臨沒之囑豈可以不文而辭乎乃銘曰惟學與術繼聖開賢於時不遇於古獨全彼競々者咸屬忽焉先生述作海外永傳墨水之佳鬱々新阡墓木惟何冬青萬年

明治十年丁丑春

靜岡

淺田惟常謹撰

凡例

- 一 此書ハ予カ少壯ノ時ヨリ年來經驗シタル治療ノ方法論說ヲ錄シ子弟輩ニ示スモノナリ故ニ病論症候
- 一 モ簡約ナルヲノミテ舉テ今日ニ的切ナラサルハ皆省テ記セス其治方モ亦然リト爲ス觀者幸ニ疎漏ヲ
- 一 嘗ルコ勿レ
- 一 古來方書ノ病門自ラ一定ノ次序アルニ似タリ今ハ
- 一 惟其病ノ世ニ替テ有テ證候多端ナルモノヲ首ニ載
- 一 テ編下爲ス必古人ノ成例ニ拘ラサルナリ
- 一 近日西洋ノ醫方盛ニ世ニ行ル予ハ横行ノ文字ヲ讀
- 一 ン能サレハ洋人漢文翻譯ノ書ニ就テ其論說ノ卓絶

ナルヲ舉ク邦人譯述ノ如キハ概之ヲ省ス宜其書ニ
 一就テ看ヘシ
 一湯羹煎劑ハ亞細亞州中ノ治法ニシテ邦人古ヨリ用ヒ
 來ル所ナレハ布帛菽粟ト同ク一日モ廢スヘカラサ
 ルナリ然レモ西洋製鍊ノ藥モ奇驗アル方ハ必錄出
 シ用ニ備フ總テ短テ捨テ長テ取テ要ト爲ス彼是齟
 齟スルヲ欲セス
 一此書ニ載スル所ハ其大概ヲ示シ子弟輩ノ醫ヲ學フ
 指南ト爲ノミ畢竟臨症處治ノ妙義ニ至テハ言語文
 字ノ盡スヘキニ非レハナリ
 一傷寒論金匱要畧中ノ方劑ハ茲編ニ載セス又方中ノ

分量ハ原方ニ因テ調藥ノ用ニ充ツ華佗傳ニ心識分
 銖不假稱量ト云フ其多少斟酌ハ自ラ醫人ノ心得ニ
 アルナリ羹服ノ法ハ每方後ニ薑棗煎服又薑水煎服
 ト記ス若方中姜棗無レハ單ニ水煎服之書ス而其
 煎煮ノ法尋常ニ異ナリ更ニ方後ニ詳ニス假令ヘ
 ハ升陽散火湯ノ金首飾丸ノ煎シ導水茯苓湯ニ如
 熬阿刺吉酒ト云類ナリ銀ニ煎ニ煎金銀煎ニ
 一古來ノ醫書汗牛充棟ニシテ粹ニ讀ムカラス其方法モ
 一浩繁ニシテ容易ニ究難ニト爲ス今古方ヲ就テ當世ニ
 確驗アルモノヲ主ト爲シ後世ノ方本邦試驗ノ方其
 他西洋ノ方ニテモ今日ノ治術ニ觀切ナキモノヲ擧

錄ス其迂遠ナルハ省テ記セス古人モ醫方千卷猶未
 盡其理ト云テ此編著ノ悉備フヘキニ非レハナリ其
 一此編己巳冬月子鹿鳴堂中ニ在テ草ヲ起ス僅ニ一
 一ヲ成セリ庚午ノ四月再ヒ此ニ來テ業ヲ卒又計ヒニ
 前後三旬ヲラス以稿ヲ脱セリ故ニ癰疽金創痘疹ノ
 如キハ未タ記載ニ及ス其他尙詳考ニ違フヲ遺漏
 モ亦多シト爲ス後ヲ再訂ヲ俟ツト云籍ニニ對合ヘ
 庚午四月中ニ終ニ成ルニ至リ香城老人識之而其
 一ニテハ其編之起ルニ由リ其書之成ルニ由リ又其
 一ニテハ其編之起ルニ由リ其書之成ルニ由リ又其

卷一 目次

中風 脚氣
 痰飲 水氣
 虛勞 瘡

醫方各書 卷一 目次

醫方啓蒙卷一

中風ノ証ハ素問ニ風論アリ金匱ニ中風ノ篇目ヲ載テ
其來ルコト久シ其所因ハ飲啖不節嗜慾過度ヨリシ氣血
衰壞シタルニ偶賊風邪氣ニ遇テ病ヲ發スルナリ然レ
ハ風字ハ其病發ニ就テノ名ナラン西洋ニテハ是ヲ腦
ノ病ニ屬シ其說ニ云此症ノ病源實ハ腦ニ由ル風ト關
ルコトナシ若肢體癱瘓スル者是腦氣筋動作ノ功用ヲ失
スルナリ痛癢冷熱ヲ知ラサルモノハ是腦氣筋知覺ノ
功用ヲ失スルナリ又云此症發スル前ニ病媒ノ徵スヘ

醫方啓蒙卷一

東京本壽堂隱醫香城老人編述

中風

中風ノ証ハ素問ニ風論アリ金匱ニ中風ノ篇目ヲ載テ
其來ルコト久シ其所因ハ飲啖不節嗜慾過度ヨリシ氣血
衰壞シタルニ偶賊風邪氣ニ遇テ病ヲ發スルナリ然レ
ハ風字ハ其病發ニ就テノ名ナラン西洋ニテハ是ヲ腦
ノ病ニ屬シ其說ニ云此症ノ病源實ハ腦ニ由ル風ト關
ルコトナシ若肢體癱瘓スル者是腦氣筋動作ノ功用ヲ失
スルナリ痛癢冷熱ヲ知ラサルモノハ是腦氣筋知覺ノ
功用ヲ失スルナリ又云此症發スル前ニ病媒ノ徵スヘ

醫方啓蒙卷一 中風

醫方考卷一

キアリ病媒トハ病先兆ニテ頭目其說甚精確ニシテ
或ハ然ラン乎詳見西醫畧論中風ノ證ハ卒然トシテ暈倒
シ昏冒ノ人事ヲ知ラス或痰涎壅盛ノ咽喉作聲或口眼
喎斜手足癱瘓或半身不遂或舌強不語等ノ候アリ其脈
ハ緩大或洪滑ナルヲ風ノ常ト爲ス微瀦細數或濶大虛
軟無力ハ難治トス此病卒然トシテ發シ速ニ斃ル者アリ
荏苒トシテ不治不死モノアリ旬日ニシテ癒ルアリ又類中
風ト云テ古人ハ真中風ニ對シテ因氣因火因濕モノトス
レト原ト卒中風ニ別ツノ名ナレハ延日不治ノ証ヲ類
中風ト云テ可ナラン又本事方ニ氣中ノ名アリシヨリ
中風中氣ノ別アレト中風ハ外熱ノアル証中氣ハ外熱

ノ無キ証トシ宜シ凡中風癱瘓不遂ノ証ニ輕重急慢ノ
別アリ此ヲ枯樹ニ譬フ枝葉繁茂スト雖ト根幹乍枯テ
暴折スルアリ半身枯テ存スルアリ一枝枯テ活スルア
リ然レト寒烟再燃ヘ枯木再榮ノ理ナキヲ以其枯所ア
ルモノハ狂風猛雨ニ倒レ易シト知ヘキナリ
治療ノ法ハ外熱アリテ發表スヘキニ表ノ實スルハ大
續命湯虛スルハ小續命湯桂枝加附子湯ノ屬痰涎盛ナ
ルハ三生飲沈香半夏湯更ニ養正丹黑錫丹ノ類ヲ兼用
スヘシ又獨參湯加竹瀝姜汁可服之或加附子若大便閉
ルモノハ三黃湯或加辰砂或加牛黃可ナリ卒倒昏冒ノ
トキハ蘇合圓ヨシ痰涎上潮ノ牙關不開ニハ稀涎散又

醫方考卷一

嗜鼻ノ方アリ或白肉ヲ牙齒ニ措スレハ口開ク因テ
 灌藥ノ法モアリ其緩證ニハ烏藥順氣散十味剉散ノ類
 選用スヘシ言語蹇澁ニハ資壽解語湯兼テ清心散ヲ擦
 ヲ効アリ
 中風ニ閉脫ノ二證アリ 古人ノ口眼開闔ヲ察メ以テ輕
 重ヲ別テ痰涎ノ有無ニ因テ証
 治ヲ明ニスト 云ハ確言ナリ 卒然トシ口禁シ目張り兩手握固シ痰壅
 氣閉此閉證ナリ目合シ口開キ汗出如珠昏臥遺溺手ヲ
 撒ケ足ヲ擲テ聲如鼾睡ハ是脫症ナリ閉證尙可治脫證
 尤難治トス
 三生飲 卒中昏不知人口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰
 氣上壅或脉沈伏或浮盛兼痰厥飲厥及氣虛眩暈

南星 一兩
 川烏
 附子 各半
 木香 一分

右姜水煎服

沈香半夏湯 主氣祛痰

附子 各一
 沈香 各一
 人參 半兩
 半夏 二錢

南星 一錢

右姜水煎服

三黃湯

即本方或加辰砂或加牛黃

烏藥順氣散 風氣不順手脚偏枯流注經絡并濕毒進襲

腿膝攣痺筋骨疼痛

烏藥
 麻黃
 橘皮 各二
 甘草

川芎 枳殼 桔梗 白芷

白殭蠶 乾姜

右薑棗水煎

十味剉散 臂痛連筋及骨舉動艱難

附子 桂枝 白朮 茯苓

黃芪 地黃 川芎 當歸

芍藥 防風

右姜棗水煎

資壽解語湯 風入心脾言語蹇澁舌強不轉

附子 防風 天麻 酸棗人

羚羊角 桂枝 甘草 羌活

右姜水煎服

稀涎散 風涎潮於上膈痺氣不通

猪牙皂莢 礬石

右為末溫水調灌下 一方研白礬為末生姜煎湯灌服

清心散 中風舌強不能言語

青黛 薄荷 硼砂 牛黃

龍腦

右為末生姜自然汁ヲ以テ舌上ヲ洗淨シ白蜜ヲ塗リ

此藥ヲ擦ス

嗜鼻方 口禁不省人事者

用細辛皂角各少許或只用半夏為末以蘆管吹入鼻

蘇合香丸 風痰相搏神暴絕

蘇合香油 白朮 辰砂 沈香

訶子 丁香 木香 香附子

白檀 犀角 乳香 草撥

安息香 麝香 龍腦

右為末煉蜜丸温酒嚼下人參湯亦得 一方有牛黃

養正丹 中風涎潮不省人事

硫黃 水銀 黑錫 辰砂

右黑蓋ヲ用テ火上ニ黑錫ヲ鎔シ汁ト成シ次ニ水銀

ヲ下シ柳杖子ヲ以攪テ汁ト成シ和シ勻ヘ如シ炤

アレハ醋ヲ以テ之ニ洒キ冷テ候テ取出シ研シ粉ノ
如ク極テ細ニ糯米粉ヲ以テ糊ニ煮テ丸ト為シ鹽
湯ニ下ス

黑錫丹 卒暴中風痰潮上膈言語艱澁咽喉中痰饜

苦棟子 胡蘆巴 木香 附子

肉豆蔻 破故紙 沈香 茴香

陽起石 肉桂 黑錫 硫黃

中右黑蓋或新鐵鍋ヲ用テ常法ノ如ク黑錫硫黃ト砂子

ヲ結シ冷テ候テ研細ニシ餘ノ藥末ト和シ勻ヘ酒糊

ニ丸ト為シ姜鹽湯ニ下ス

洋方ノ治療ハ都テ腦中ニ膿血水脹アリト認シユエ棋

吮鈞膿ノ法ヲ用ヒ或革麻油巴豆油大黃元明粉等ノ瀉劑ヲ與ルナリ其大便ヲ瀉スルヲハ宜シケレモ他ハ用

ルニ中ヲスルニハ宜シケレモ他ハ用中風七處灸時ニ隨テ用ヘシ

- 一百會穴
- 二耳前髮際
- 三肩井穴
- 四風市穴
- 五三里穴
- 六絕骨穴
- 七曲池穴

此外聽會頰車天樞氣海肩髃温溜曲池合谷環跳三里

絶骨等ニ灸メ往々効アリ古人說ニ若灸スレハ必舊

メハ左ニ灸スルノ論ニ拘ラス但痲疹ノ處ヲ按ノ之ヲ灸スト此說佳ナリ

兩脚坐脚氣瘰癧ノ候ハ

古來脚氣ノ名ナシ晋唐以降始テ此症アリ其濕蒸ノ氣

脚ニ着テ發スルニ因テ脚氣ト名ク其病春末夏初ニ多

ク有リ秋冬ハ少シ証候ハ兩脚酸麻脛腿頑痺或ハ屈弱

無力或轉筋或微腫行步艱澁等ノ候アリ腫氣アルヲ濕

脚氣ト云腫氣ナキヲ乾脚氣ト稱ス若舌上胎ヲ生シ少

腹麻痺不仁心下動悸呼吸短促小便不利嘔吐ノ脉數急

ナルハ脚氣衝心ノ候ナリ大ニ畏怖ニ速ニ治療ヲ爲ヘ

シ若胸脇逆滿上氣肩息嘔吐不止者ハ死不旋踵此証ノ

初或寒熱アルヲ以テ脚氣類傷寒ノ語アリ若疑似ノ候

アレハ早ク其兩脚ノ麻痺アルヤ否等ニ心ヲ用テ診察

スヘシ往々醫治ヲ誤ルコトアリ此病酒色縱恣華靡奉養
ノ人患易シ故ニ王公貴人多ク此証ヲ病ナリ又世俗婦
人ニ脚氣ナシト云ハ誤ナリ外臺ニモ脚氣之爲病無間
男女ト云ヒ聖惠ニモ婦人中ニ脚氣門アリ濟生方ニモ
婦人ノ脚氣ヲ病ト云ヘリ又婦人産後ニ脚氣ヲ患ル
トマ、有リ凡テ脚氣ノ脉ハ遲緩微遲ニ宜シ洪大滑數
ハ共ニ吉兆ニアラス古人モ浮大緊駛ナルハ最惡脉也
ト云ヘリ又西洋ニハ絶テ此症アルコトナシト云故ニ洋
方ニハ治法ナキナリ大凡脚氣ノ證ハ兩脚少ク平日ニ
異ナルコトアレハ速ニ灸スルヲ良トス又脚氣外發トテ
兩脛生瘡臙瘡ノ如キモノアリ發毒ノ藥ヲ用ヘシ收斂

ノ品ニ宜シカラス然レモ如此證ハ衝心ノ患ナシト知
ヘシ

治法輕證ハ栝蘇散木瓜散疼強キハ神効栝蘇散若表候
アレハ越婢湯或加栝榔木瓜若惡心ノ藥ヲ納レサレハ
犀角旋覆花湯若小便不利表候ナキハ六物附子湯若衝
心ノ候アルハ木茱湯唐侍中方廣濟一方等酌用スヘシ
兼テ養正丹黑錫丹或紫雪ヲ用ヘシ更ニ童子小便ヲ取
テ生姜汁ヲ加ヘ服ス尤妙ナリ或犀角屑栝榔末沈香末
皆佳ナリ又緩證ニ腫氣アルハ黑豆飲唐風引湯ニ宜
シ大勢去テ後三和散腎氣丸證ニ隨テ選用スヘシ愈後
調攝ヲ善スヘシ尤房室ヲ慎ニ宜シ一切酒麪粘膩酸醎

膏梁ノ味ヲ忌ム然ラサレハ日後再發ス

板蘇散 風濕脚痛踈通氣道

香附子 紫蘇 陳皮 各三兩 甘草 一兩

板榔 二兩 木瓜 一兩

右姜水煎服○大便秘滯或加大黃

木瓜散 脚氣衝心胸膈痞滯煩悶

大腹 紫蘇 木瓜 甘草 各等

木香 羌活 茯苓 陳皮 各等

右水煎服

神效板蘇散 治脚氣如神

板榔 三錢 紫蘇 防風 活羌

當歸 木瓜 各二錢 乳香 沒藥 各二錢半

右姜水煎服

越婢湯 風痺脚弱

麻黃 六兩 石膏 半斤 白朮 四兩 附子 一枚

甘草 二兩 大棗 十五枚

右姜水煎服○或加茯苓或加板榔木瓜或加犀角

犀角旋覆花湯 脚氣腫滿或行起澁弱小便秘澁喘息氣

衝喉食嘔不下

犀角 旋覆花 各二兩 橘皮 茯苓

生姜 各三兩 紫蘇 一握 大棗 十二枚

六治水煎○或加桑白皮

六物附子湯 骨節煩疼四肢拘急小便不利手足時時浮

腫

附子

防己 四兩

桂枝 各四兩

白朮 三兩

茯苓 三兩

甘草

單右姜水煎服

木茱湯 脚氣入腹困悶欲死腹脹

吳茱萸 六升

木瓜 兩顆

右水煎○或加犀角

唐侍中方 專主脚氣衝心

枳榔

木瓜 各一兩

生姜 各二兩

橘皮

吳茱萸

右水煎服○或加桑白皮

黑豆飲 脚氣遍身腫

大豆 三升

桑白皮 一握

枳榔 二七枚

茯苓 二兩

右以水一斗煮大豆取五升去豆以三物浸豆汁煮服

唐風引湯 痺滿上氣遍身脹膝疼并去風濕痛

紫雲大豆 三升

附子 三兩

枳實

澤瀉

黃五橘皮 各四兩

甘草

茯苓

防風 各二兩

右取大豆煮汁內藥煮服

三種散 三焦不和脚氣土攻漆漏瘡眼本管

大腹皮

紫蘇

獨活

沈香

氣木瓜

川芎

白朮

木香

甘草

板榔 各三分

陳皮 二分

右水煎

腎氣丸料三脚氣少腹不仁上氣喘急即本方加沈香

右水煎服

養正丹 黑錫丹

并見中風

紫雪 脚氣衝心煩躁者最良

惠風黃金

十兩

寒水石 石膏 共去周磁石

水滑石

各四兩

玄參

一兩

羚羊角

二錢

升麻

一兩

沈香

一兩

丁香

四分

木香

二錢

犀角

各二錢

黑豆甘草

三錢

右水煎斗以テ先五種ノ金石藥ヲ煮テ四升ヲ得テ

滓ヲ去リ後ニ八物ヲ内テ煮テ一升五合ヲ取り滓ヲ

去リ芒消一斤ヲ取テ汁中ニ投シ微火ニ煎シ柳木篋

ニテ攪シ水盆中ニ投シテ凝ント欲スルトキニ辰砂

一錢 麝香

五分

ヲ内テ攪キ調ヘ之ヲ寒スルヲ二日ニシ

霜雪ノ如ク紫色ト成ル取テ之ヲ服ス

今世量ニ依テ本方十分ノ一

ヲ裁ス

脚氣八處灸穴

風市

伏兔

犢鼻

膝眼

三里

上廉

下廉

絕骨

此外ニ三陰交承山ニ灸スルモ良シ○按蘇恭云若脚氣盛發時自腰以上并不得鍼灸

痰ノ病ニシテ一類ノ病ニシテ少異ナリ稀ヲ飲ト爲シ稠ヲ
痰ト爲ト云テ稀トハ清稀トテスミテウスキナリ稠ト
ハ稠濁トテコクニコリタルナリ古ハ痰ノ下ヲ濁唾涎
沫ト稱ス其痰ト云ハ淡字ト通シ淡飲トハ今ノ留飲ナ
リ痰飲ハ本人身中ノ津液ニシテ常ニ滋養ヲ爲スモノナ
レモ若壅滯凝閉スルキハ病ヲ爲ナリ証候ハ金匱ニ委
シ其大畧ヲ言ヘハ心下痞滿倚息短氣頭目眩暈嘔吐吞
酸或黃苦水ヲ吐シ胸痛或背如手掌大冷ルモアリ又
僻飲トテ脇下ニ牽テ痛ムモアリ又僻囊ト云ハ脇下ニ
水飲ノ窠白ヲ爲ナリ痰ノ病ハ眩暈嘈雜忪悸嘔逆咳喘

痰飲

痰ト飲トハ一類ノ病ニシテ少異ナリ稀ヲ飲ト爲シ稠ヲ
痰ト爲ト云テ稀トハ清稀トテスミテウスキナリ稠ト
ハ稠濁トテコクニコリタルナリ古ハ痰ノ下ヲ濁唾涎
沫ト稱ス其痰ト云ハ淡字ト通シ淡飲トハ今ノ留飲ナ
リ痰飲ハ本人身中ノ津液ニシテ常ニ滋養ヲ爲スモノナ
レモ若壅滯凝閉スルキハ病ヲ爲ナリ証候ハ金匱ニ委
シ其大畧ヲ言ヘハ心下痞滿倚息短氣頭目眩暈嘔吐吞
酸或黃苦水ヲ吐シ胸痛或背如手掌大冷ルモアリ又
僻飲トテ脇下ニ牽テ痛ムモアリ又僻囊ト云ハ脇下ニ
水飲ノ窠白ヲ爲ナリ痰ノ病ハ眩暈嘈雜忪悸嘔逆咳喘

痞隔噫氣吞酸心下痛痞或ハ濕痰流注トテ四支胸背ニ
引テ痛モアリ脊上一條如線ノ寒アルモノアリ肩稜耳
角痛ヲ爲アリ風痰迷心トテ驚狂ヲ發シ又恠奇ノ狀ヲ
見スモアリ痰爲百病ト云テ種々ノ狀ヲ爲スモノナレ
ハ一概ニ盡シカタシ然レモ其方劑ハ痰モ流飲モ互ニ
用テ爲ヘシ西洋ニハ痰ハ是氣管ノ内ニ生スル所ノ津
液ニシテ平人ハ多カラス少カラス濃カラス薄カラス畧
蛋青ノ如シ若中ニ風氣アレハ滿溢ノ出ツ亦蛋青ノ如
シ之ヲ攪キ之ヲ撓セハ則泡沫ヲ生ル又凡肺病必痰ア
リ大小腸ニ必膠血アルト理ヲ同スト云ヘリ痰飲ノ脉
ハ沈微弦緊ヲ常候ト爲ス或時ニ伏絶不勻ノ狀ヲ見ス

コアリ其治ハ淡飲ハ温藥ヲ以和之ト云テ常套トセリ
治法胸滿目眩アルハ桂苓朮甘湯宿水ヲ吐スルハ茯苓
飲冷痰ニハ大半夏湯姜附湯二生湯半夏湯尋常ノ證ハ
二陳湯導痰湯加味導痰湯ノ類ヲ選用スヘシ胸膈作痛
ハ瓜蒌枳實湯枳縮二陳湯小陷胸湯濕痰流注ニハ清濕
化痰湯肩稜骨痛ハ水玉湯驅痰ノ劑ハ十棗湯甘遂半夏
湯又控涎丹滾痰丸ヲ兼用スヘシ温藥ニテ痰ヲ下スハ
半硫丸ニ宜シ

茯苓飲心胸中有停痰宿水白吐出水後心胸間虛氣滿
不能食消痰氣令能食

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

三兩

生薑

四兩

枳實 二兩
橘皮 一兩

右水煎服 痰冷癖飲胸膈中不理

大半夏湯 痰冷癖飲胸膈中不理

白朮 三兩
生薑 八兩
茯苓 各二兩

天參 長夏 桂心 甘草 附子 各二兩

右水煎服 痰冷癖飲胸膈中不理

薑附湯 痰冷癖氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化亦主

卒中風 痰冷癖氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化亦主

生薑 八兩
大半附子 四兩

右水煎服 痰冷癖氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化亦主

二生湯 專治痰冷癖氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化亦主

附子 半夏 等分

右姜水煎服

半夏湯 痰飲癖氣吞酸

半夏 六兩
吳茱萸 各三兩
生薑 六兩
附子 一枚

右水煎服

二陳湯 痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快

或發為寒熱或食生冷脾胃不和

半夏 六兩
橘皮 各五兩
茯苓 三兩
甘草 一兩

右姜棗煎服 或加枳實縮砂

導痰湯 一切痰厥頭目旋運胸膈痞塞頭痛吐逆喘急痰嗽

半夏 四兩
天南星 橘皮 枳實

茯苓

各一兩

甘草

半兩

右姜水煎服

加味導痰湯

於本方加木香沈香

瓜蒌枳實湯

竅不能言語

瓜蒌

貝母

當歸 六分

右姜水煎服

枳縮二陳湯

涎在心膈上攻走腰背嘔噦大痛

蘇合

枳實

痰結咯吐不出胸膈作痛寒熱氣急痰迷心

枳實

枳實

陳皮

黃芩

木香 各五分

山梔 各一兩

枳實

膏肓縮砂

四半夏

陳皮

香附

各一分

木香 蘇合 大草豆蔻

乾薑

各五分

厚朴

茴香

延胡索

各八分

甘草

三分

半右姜水煎服

清濕化痰湯 遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背或四肢

麻痺不仁或背心一點如水冷是濕痰流注經絡故也

蒼朮 南星 半夏 陳皮 茯苓

白芥子 各等分 大甘草 減半 白芷

右姜水煎服

水玉湯

眉稜骨痛不可忍者此痰厥也即小半夏湯

控涎丹 凡人忽患胸背手脚頸項腰膝牽引鈞痛此乃痰涎在心膈變爲此疾

甘遂 各等分 大戟 各等分 白芥子 各等分

右爲末糊丸如梧子大薑湯或熟水下

滾痰丸 通治痰爲百病

大黃 各八兩 黃芩 各八兩 礞石 硝石一兩 沉香 五錢

右爲末水丸梧子大白湯食後空心服 半硫丸 水 下痰

半夏 三兩 硫黃 二兩

右爲末生薑麩糊丸梧子大白飲下

灸法 膏肓 期門 四花 脊際

水氣

水氣ノ證脾腎二藏ヨリ發スルヲハ古來ヨリ論ノ種々ノ名目ヲ立テ區別ヲ爲セヒ治術ノ急務アラヌ素問ニ諸有水氣者微腫先見於目下也又靈樞ニモ水始起也目窠上微腫如新臥起之狀トアリテ是ヲ水氣ノ初兆ト爲メ手足頭面浮腫シ或先腰肋微腫ノ漸々身體洪腫シ小便不利大便燥結スル是其常證ナリ甚キニ至テハ欬嗽喘急短氣促迫腹脹煩滿外腎或腫肌肉崩潰足脛流水ハ多ク救サルナリ又腫氣ノ腹ニ起テ四支ニ散スルハ治シ易ク四支ニ起テ腹ニ歸スルハ治シ難シト云ヘリ又陽水陰水トテ手ヲ以テ腫上ヲ按スニ凹ノ起ラサル

チ陰ト爲シ直ニ起ルチ陽ト爲ス陽水ハ實ニ屬シ熱ニ
屬ス故ニ脈沈數ニシテ色多黄赤或煩或渴小便赤澁大便
多閉是ナリ陰水ハ虛ニ屬シ寒ニ屬ス故ニ脈沈遲ニシ
色多青黄不煩不渴小便澁少ニシテ清大腑多洩是ナリ猶
其他ノ証ヲ參照シ治療ノ方ヲ設ルナリ水病ノ脈ハ沈
遲チ常トナシテ或ハ洪大ナルモアリ若シ微細小ナル
ハ危シ又瘡疥變ノ腫滿トナルアリ是亦一證ナリ西洋
ノ說ニハ人身ハ水ト血ノ融シ兩チカラ相離レス離レ
ハ則病ム又水ノ汗孔ニ外泄スルヲ得レハ勢必吸
管ヨリ内ニ泄ル大小腸ニ泄レハ瀉シ皮膜ニ泄レハ
腫チ爲ス其理一ナリト云ヘリ水病ノ五傷トテ唇黒ク

缺盆平ニ臍出テ足下平滿シ背平ナル是五不治ノ證ナ
リ
水病ノ治法ハ經文ニ腰以上腫ハ宜ク發汗スヘシ腰以
下腫ハ宜小便チ利スヘシトアリテ發汗利水滲泄ノ三
法ニ分ツヘシ唯利水ニ温利ト峻利トアリ今左ニ列ス
然レモ是其大端ナリ宜ク症ニ隨テ參酌スヘシ又此證
禁忌ヲ嚴戒スヘシ尤擻醬鹹味チ忌ム然ラサレハ治セ
ス
發汗ハ越婢湯或加茯苓或加朮附麻黃散麻黃湯温利ハ
實脾散壯原湯沈附湯五苓散加沈香附子三聖丸峻利ハ
牽牛五靈散棗湯塌氣散溶川丸三花神祐丸滲泄ハ

牡礪澤瀉散導茯苓湯木香分氣湯無礙丸大橘皮湯或
 消水膏亦効アリ若瘡疥ノ腫滿ニ變スルハ麻黃連翹赤
 小豆湯或加犀角又赤小豆湯兼用聯步丸効アリ
 臍下水分ノ穴ヲ刺シ水ヲ取ルコトアリ古人ハ多ク禁ス
 ルコトナレドモ壯實ノ病人ハ往往効アリ尤虛腫ニハ決メ
 施スヘカラス
 麻黃散 風水徧身腫滿骨節痠疼惡風脚弱皮膚不利
 麻黃 一兩 石膏 三兩 白朮 二兩 附子 一兩
 防己 二兩 桑白皮 二兩
 右薑棗煎服
 麻黃湯 風水身體面目盡腫
 麻黃 五兩 桂枝 四兩 甘草 二兩 附子 二枚

右薑水煎服
 實脾散 陰水先實脾上積除濕散積疎土導心氣不
 厚朴 白朮 木瓜 木香
 草葉 藜蘆 香太腹皮 附子 茯苓
 正苓乾姜 各一兩 甘草 半兩
 右姜棗煎服
 壯原湯 香下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣喘息陰囊兩
 丸腿皆腫 難寐 齒齩 不食 不尿 藥餌 愈不 效
 大人參 白朮 各二兩 茯苓
 桂枝 附子 乾薑
 砂仁 各五分

右燈草水煎煎此藥時要如熬阿刺吉酒相似約水一斗
止取藥一盞服直至小便變清白色爲愈此藥濃煎スル
ヲ要トス然ラ

サレハ効ナシ阿刺
吉酒ハ燒酎ナリ

木香分氣湯氣滯腫滿虛氣上衝神志不爽

木香木香 木茯苓各一 澤瀉各一 半夏各一

枳殼煎服 紫蘇子各三 檳榔各三 猪苓三分

右燈心煎服

無礙丸料 四肢浮腫心腹脹滿喘不能臥

大腹皮煎服 莖菥朮煎服 三稜煎服 木香煎服

檳榔各一分

右薑水煎服○或加郁李人

大橘皮湯 濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄

橘皮一兩 木香一兩 滑石六兩 檳榔三錢

茯苓一兩 猪苓一兩 澤瀉一兩 白朮一兩

桂枝各等 甘草二錢

右姜水煎服

赤小豆湯 有患生瘡用乾瘡藥太早致遍身腫

赤小豆一匁 商陸一匁 連翹 反鼻

桂枝各五分 大黃一匁

右水煎○或加大黃

消水膏

田螺味 大蒜 車前子

右三味和シ研メ膏ト作シ大餅ト作テ臍上ヲ覆フ水
新小便ヨリメ出ル也

聯步丸 煎陽水腫脹

續隨子 炒去油 大黃 一兩 爲末

右爲丸白湯下

三聖丸 十種水氣凡脚膝腫上氣喘滿小便不利

蛇含石 燒通赤入醋中 候冷研細三兩 禹餘糧 二兩

鹹砂 五兩入禹餘糧一處用米醋就銚內煮 醋乾爲度卽用銚并藥通赤候冷研

右蒸餅丸白湯下切須忌鹽

三花神祐丸 一切水濕腫滿濕熱腸垢沈積變生疾病

大戟 芫花 各半 牽牛 二兩

大黃 一兩 輕粉 一錢

右爲末滴水爲丸服

溶川丸 一名平水丸 水腫利小便酒客虛熱腹腫陰脹滿

商陸 四兩 甘遂 一兩 芫花

吳茱萸 大黃 各二兩

右研末蜜丸服

刺水分法

臍下二寸ニ針メ入ルヲ數分水ヲメ針孔ヨリ出シ

今西洋筒管針ヲ用テ必宜トス

右五味... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

此藥... 補腎... 補心... 補脾... 補肺... 補肝... 補膽... 補胃... 補大腸... 補小腸... 補膀胱... 補三焦...

虛勞名証ハ古今良治法ナシ而肺痿骨蒸乾血勞等皆虛

勞中ノ一証ナリ分テ言ヘハ虚勞ハ陰陽氣血ノ不足ス

ルニ相生スル病ニ總名ナリ肺痿ハ俗云勞咳ナリ骨蒸

ハ後世勞瘵ト稱ノ字面ノ通り熱ノ勝タル證候ナリ乾

血勞ハ瘀血ヨリ發スル證ナリ此外婦人産後ノ毒勞ア

リ小兒ノ疳勞アリ蛇蟲勞アリ癩毒勞アリ疥癬勞アリ

又馬刀夾纓トテ頸下ニ瘰核アルモノ能勞ヲ發スルナ

リ桃花蛙トテ面色如故肌體自充如無病人ニノ勞ヲ爲

スモノアリ總テ難治ノ証ナレモ古人ノ成法アレハ其

證ニ隨テ藥治ヲ施スヘシ一概ニ抹殺スヘカラス諺云

傷寒勿治始勞証勿治終トテ洵ニ醫者ノ手ヲ下シ難キ
病ナリ其證寒熱日久頭旋頭暈効嗽不已吐血吐痰紅線
白沫身疼ニ脚弱ク心怯氣短自汗盜汗或五心煩熱シ或
午後潮熱シ或骨蒸熱ヲ作シ夜惡夢多ク晝精神少ク耳
内蟬鳴咽痛聲啞飲食無味婦人ハ必經閉不來此皆勞傷
ノ證ナリ西洋ニテハ勞証ハ肺體ニ堅粒ヲ生スルヲ如
沙チルニ因テ此ヲ番名ニ都吡迦叻ト云或左肺ニアリ
或右肺ニアリ或左右俱ニ有リ右ノ多キヲ左ニ過ク上
入多キヲ下ニ過ク先多小粒ヲ生シ肺經本體ノ内ニア
ズ漸合シ一大粒ヲ爲シ久メ潰爛シテ穴ヲ成ス穴ニ大
アリ小アリ肺體全壞スルモノアリ病源或父母ノ延累

ニ因テ性質此證ヲ患易キモノアリ云云男女此証ヲ患
ルモノ毎ニ十五歳以上三十歳以下ニ至ル病狀先乾欬
シ有血滄出シ漸氣短促ニ至リ行動呼吸更ニ促ク困倦
シテ精神無メ手足疲軟ニ羸瘦シ頸ハ細長ニ變シ胸膈
ハ窄ニ變シ操作辛苦スレハ則汗出瀉泄シ食物消化セ
ズ夜臥不安脈微細ニシ數心跳シ痰多ク或欬血シ胸膈
時痛聲音不清久ケレハ則啞ス夜晚顴色鮮紅早起多冷
汗舌苔先白後紅數年ニシ死シ或半年一年ニシ死ス間
三四年ニ死スル者有リ將死時瀉多ク汗多ク更ニ羸瘦
メ髮脫跣腫牙肉爛テ白泡ヲ生シ發熱シ痰更ニ膿ト相
雜ル手足熱シ脈更ニ細數是ヲ死徵ト爲ト云ヘリ凡虛

勞ノ脈ハ洪大無根或細數少力但脈細數ナラサレハ賴
 ム所アレハ細數ノ極ニ至テハ必不治ト知ヘシ張景岳
証ニ弁爪ノ法ヲ載テ指爪ニ枯槁ノ色アルハ虛損ノ甚トス是又診法ノ一端ナリ 虛勞寒熱腹痛
 スルハ小建中湯汗出ハ黃芪建中湯大建中湯肺痿唾沫
 吐紅ニハ炙甘草湯或加蛤蚧炙劫勞散蛤蚧散或兼用密
 酪煎寒熱劇キハ小柴胡湯加胡黃連芩甲柴胡鱉甲湯或
 淨府湯又補中益氣湯柴胡散骨蒸熱勝ニハ竹葉飲解五
 蒸湯乾血勞ハ麥煎散小柴胡加地黃湯或大黃廬蟲丸ヲ
 兼用ス此他方法多シ証ニ隨テ選用スヘシ蓋虛勞ノ治
 法甚難シトス用藥温燥ニ過レハ其熱ヲ助ク清涼ニ過
 レハ其寒ヲ益ス補養潤滋ノ劑ニ宜シ是其病ノ治シ難

キ所以ナリ且其類多 西洋法ニハ用ユキ方ナシ其說ニ穀肉ヲ以テ補養ト

爲トキハ牛乳牛酪牛肉雞鴨臙汁半熟ノ雞蛋等ヲ用ル
 ナルハ又レールマラン或効アリ
 虛勞將攝ノ法ハ諸書ニ載セテ皆人ノ知ルコトナレモ西
 洋ノ書藥宜ク散步間適シ遊玩シ情ヲ怡シ他處ニ遷徙
 或水土ヲ變易スヘシ所居ノ室戶牖ヲ開テ風氣ヲ通ス
 ヘシト言ヘルハ大ニ佳ナル說ナリ

大建中湯 虛勞裏急四支不和身體疼痛不欲喫食

- 黃芪 四兩
- 人參 二兩
- 大棗 廿枚
- 當歸 一兩
- 桂心 六兩
- 半夏 一升
- 附子 一兩
- 芍藥 四兩

甘草 二兩 右姜水煎服

炙甘草湯 即本方加蛤蚧 勞嗽寒熱盜汗唾中有紅線名曰肺痿

切勞散 勞嗽寒熱盜汗唾中有紅線名曰肺痿

芍藥 六兩 黃芪 三兩 甘草 二兩 人參 二兩

茯苓 三兩 當歸 三兩 五味子 三兩 地黃 三兩

半夏 一升 阿膠 各二兩

右姜棗煎服 中肉緩緩服之

蛤蚧散 積勞久效失音

半兩蛤蚧 一對去口 阿膠 是

足用醋炙

小柴地黃 各半 麥門冬 各半 細辛 各半 甘草 各半

右水煎服

蛤蚧散 虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧 一對 人參 三兩 百部 三兩 紫菀 三兩

貝母 各五錢 款冬花 三錢 阿膠 五錢 鱉甲 五錢

柴胡 各五錢 甘草 一錢 杏仁 三錢 四黃耆 五錢

右水煎服

竹葉飲 米骨蒸唇乾口燥欲得水止渴

竹葉 一握 麥門冬 一升 黃大棗 二十顆 甘草 二兩

半夏 一升 粳米 五合 人參 二兩

右姜水煎服

解五蒸湯煎服

甘草 一兩

茯苓 三兩

人參 二兩

葛根

地黃 各三兩

知母 各一兩

黃芩 各二兩

石膏 五兩

粳米 一斗

口燥唇干 木土

右水煎服

麥煎散 少男室女骨蒸婦人血風攻疰四肢心胸煩壅

鼈甲 各三兩

大黃 三兩

常山 正

柴胡

茯苓 一兩

當歸 一兩

乾漆 一兩

白朮

石膏 各一兩

地黃 各一兩

甘草 半兩

右小麥水煎

小柴胡加地黃湯 骨蒸勞熱 辛 甘草 兩

即本方加鮮芩

柴胡鼈甲湯 虛勞寒熱

柴胡 一兩

鼈甲 一兩

茯苓 各一兩

黃芩

知母 一兩

桑白皮 各三兩

甘草 半兩

右姜水煎服 〇今加胡黃連有效

淨府湯 虛勞骨蒸

柴胡 一兩

茯苓 一兩

澤瀉 一兩

三稜 一兩

白朮 一兩

山查 各一兩

黃芩 一兩

半夏 各八分

白朮 一兩

猪苓 各七分

人參 一兩

胡黃連 一兩

甘草 各三分

甘草 各三分

人參 一兩

右薑棗水煎 〇或加鼈甲 煎服

補中益氣湯煎飢飽勞役身熱頭痛

黃耆 甘草各五分 人參 升麻

柴胡 橘皮 當歸 白朮各五分

右水煎服 山查 黃芩 半夏 枳實

柴胡散 虛勞 茯苓 桔梗 麥門冬各二分

柴胡 三錢 人參 茯苓 各一

白芍藥 當歸 黃芩 青皮 麥門冬各二分

甘草 一分 桑白皮 黃芩 青皮 麥門冬各二分

右水煎服 桑白皮 黃芩 青皮 麥門冬各二分

蜜酪煎 肺痿欬嗽 桑白皮 黃芩 青皮 麥門冬各二分

小柴酪 二合 白蜜 二合 生地黄汁 三升

生姜汁 一合 生麥門冬汁 三升

右合煮如稀餲內貝母末紫菀末攪服

新定大黃應蟲丸

乾漆炒一兩 應蟲十箇 大黃一兩

右酒煮搗膏爲丸白湯送下

灸法 四花 患門 脊際七椎ヨリ十三四椎ニ至ル

遲ハ重トス此其大略ナリ瘧証洋說太簡ニシテ適切ナリ
曰瘧証ノ狀惡寒發熱汗出即愈ユ或日ニ一發或一日ヲ
間テ一發或二三日ヲ間テ一發ス更ニ初起日ニ一發漸
變ノ間日發ト爲ルアリ或日ニ發スル二次ナルモノア
リ其發作歷時久暫定ラス大約發寒一時發熱一時出汗
一時共ニ三時ヲ歷テ而病退テ平人ノ如シ此其常ナリ
又曰瘧症ノ狀初起惡寒困倦精神ナク懶惰ノ喜テ欠伸
シ胃中空虛ニシテ安カラス周身ノ皮皺冷ニシテ寒戰牙噤
頭痛腰痛唇青身青指甲青溺少便秘脉細數ニシテ不定呼
吸不利覆蓋ノ衣被多ト雖モ寒減セス半時或一時後漸
熱ノ覆蓋ヲ欲セス忽ニシテ大熱面紅眼紅徧身紅熱シ猶

暑寒ス少頃ニシテ寒退テ全ク熱シ脉數口渴溺少ニシテ紅
一二時ノ後頭面頸先汗アリ漸々全身大汗熱退脉靜呼
吸如常溺漸多シ頗快適ヲ覺ヘ平日ニ異ナルヲナシ又
云此症四時俱有日ニ一發者春尤多其發作毎ニ晝時ニ
在テ準トスル者自發至退六時ニ過ス輕キハ或三四時
間日發作スル者春秋俱ニ有其發作毎ニ午時ニ在テ準
トスル者自發至退四時ニ過ス二三日ヲ間テ一作スル
者毎ニ未申ノ間ニアリ或夜晚更ニ多シ自發至退三時
ニ過ス凡日ニ一發作スル者惡寒時久間日作ルモノ熱
時久也大概肝脾ヲ累スルモノ尤多シ脾尤多ク肝ニ過
ク肝脾生大ナルトキハ則膨脹ノ原ト爲ス凡瘧證ノ原

腐草敗禾ノ毒氣風吹テ人ニ傳染ス秋收ノ期此證最多
キ所以大ニ案此論尤精詳ト爲ス猶本書ヲ參看スヘ
シ證ス凡日ニ一發トスル者惡寒人聞日計トシテ
瘧ハ少陽部位以病ナレハ治法小柴胡湯ヲ以テ套劑ト
ナシテ出入加減ト用ヘシ大抵ハ柴平湯九味清脾湯ノ
類ニ宜シ熱多ハ柴胡去半夏加栝樓湯白虎加桂枝湯寒
多ハ柴胡姜桂湯疫瘧ニハ柴苓湯達原飲勞瘧ニハ小柴
胡加鼈甲湯若餘証アルトキハ斟酌加減ト治スヘシ又
截瘧ノ方多シ輕キハ小柴胡湯柴陳湯ヲ露宿ト用ヘシ
重キハ常山湯虛人ハ獨參湯ニ宜シ又灸法モ効アリ大
抵四五發ヲ待テ截スヘシ一二發ト間病勢熾盛ナル時

遠ニ截藥ヲ與ルハ宜シカラヌ又截藥ヲ服スルハ發日
二時前ニ服スヘシ或早晨ニ服スルヲ宜トス
洋法ハ噉喇五六釐ヲ服シ二時ヲ過テ後更ニ二三釐ヲ
服ス日ニ二三或金噉喇末每服一二錢每次汗退後服
之反復ヲ免ヘシ今柴胡劑ヲ主用ノ兼テ此外信石酒ノ
方アリ未試故ニ錄セス噉喇ヲ服ス特ニ効アリ
又云若服藥不應宜ク他處ニ遷徙ノ水土ヲ改變スヘシ
如貧人ハ遠遊ノ資ナシ亦宜別屋ニ移住スルヲ妙ト爲
ヘシ此說特ニ瘧証ノミナラス甚佳ナリトス素問ニ移
精變氣ノ論アリ孟子ニ居移性養易氣ノ類此亦治術ノ
一端ナリ○此症病後ノ調攝ヲ善シ房勞食餌ノ禁戒ヲ

嚴ニスヘシ然ラサレハ再發シ或ハ他病ニ變シ易シ
 小柴胡湯 即本方○若截藥ト爲ストキハ生薑ヲ倍シ煎シ滓
 去リ益ニ入レ前夜星月ノ下ニ露ソ發日ニ用ユ
 柴平湯 瘧發時一身盡痛手足沈重寒多熱少脈濡者名
 曰濕瘧 即小柴胡湯合平胃散
 九味清脾湯 瘧瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦
 舌乾心煩渴水小便黃赤大腑不利
 厚朴 白朮 草菓

柴胡 茯苓 半夏 黃芩
 甘草 各等分
 右姜水煎服○或加檳榔
 柴苓湯 傷風傷暑瘧大効ニ
 右即小柴胡湯合五苓散
 蓬原飲 疫瘧壯熱多汗而渴
 黃芩 一錢 甘草 一錢 芍藥 一錢 知母 二錢
 厚朴 一錢 枳榔 二錢 草菓 一錢
 右薑棗水煎發前熱服
 柴陳湯 截瘧妙方
 柴胡 五錢 陳皮 二錢 甘草 三分

右水二碗煎一碗臨發日五更空心温服已發時不可服

常山湯 常山 木常山 木煎 草菓 知母 檳榔 各等

右水煎露宿ノ服ス發前二時ニ臨テ用ヘシ 星月下ニ露ス器上ニ

置ナ法ト為ス甘草一匙 水煎一匙 眠廿二匙

常山湯 截瘧 常山 木煎 草菓 知母 檳榔 各等

常山 常山 木煎 草菓 知母 檳榔 各等

右一味水煎露宿ノ發前ニ服ス○常山和名コクサキ

云モ良ナリ藥舖ノ品ハ土常山ニテ効ナシ

獨參湯 虛人截瘧

洋參 即稱廣東人參者

右一味水煎曇子ニ入レ口ヲ固ク封ノ一夜井底ニ沈
メ冷メ發前ニ服ス奇驗

阿魏丸 病瘧半年不愈者用此最効

阿魏 丹砂

右研末米糊爲丸空心人參湯化服

灸刺法 大椎 膏肓 四花

刺手足十指間出血妙

大小動血

無病

如通利血

衝流

無不

頭流

國裏の流

流流

夜夜

卷二目次

醫方啓蒙卷二

東京 隱醫香城老人編述

疝氣 疝字說文ニ腹痛也トアリ劉熙釋名ニモ疝訛也訛々然

痛也顔師古急就章ニモ腹中氣疾上下引也ト云金匱ニ

寒疝腹痛ト稱シ王水素問ニ寒氣結聚之所爲也ト注ス

ルキハ疝ハ寒ニ屬シテ腹中ノ痛ヲ爲ハ其正證ナルコ

瞭然ト以明ナリ然レモ病ノ變化ニ至テハ濕ニ因ルア

リ熱ニ因ルアリ是又其權証ニ從テ治療ヲ爲サスンハ

アル可ラス其腎ニ屬シ肝ニ屬シ及七疝ノ名ノ如キハ

治術ノ急務ニ非レハ姑置テ論セス其證候ハ少腹痛ヲ

作シ或腰脇ニ攻刺シ或腎脊ニ遊走シ或冷氣心ニ槍テ
 心下痛滿或手足厥冷臍ヲ繞テ痛ミ或脇ノ左右盃ノ如
 ク或臍ノ上下臂ノ如ク或腹中累々トシ桃李ノ如ク或
 胃脘ノ間覆大盤ノ如ク壯熱惡寒スルアリ酒漸寒熱ス
 ルアリ大小便ヲ得サルアリ裏急ソ下利スルアリ自汗
 出ルアリ食ヲ欲セサルアリ其陰間ニ於テハ卵ニ大小
 アリ伸縮ソ上下常ナラス囊ニ腫脹アリ急痛ソ發歇定
 ラス種々ノ證候一ナラス是其大畧ナリ婦人ニ疝ナシ
 ト云ハ誤ニテ疝證アルトハ諸書ニ詳ナリ其脉ハ細小
 緊急ヲ常トシ其變態ハ一概ニ定カタシ西洋ノ書ニ小
 腸病腹痛ト云モノ疝ニ近シ其說ニ曰小腸病腹痛二種

ニ分別ス輕キモノハ腹暴ニ痛テ炎ナシ紅腫熱痛其痛
 如絞忽作忽止時有テ痛劇ク時アリテ稍安シ全腹皆痛
 ヲモノアリ腹痛一處ニ偏ナルモノアリ或左或右或左右
 移動ト按トテ喜ム脉常人如ク身無熱大便必秘ス腹内
 ニ風氣アリテ或欲嘔或吐出ス此證不拘男女四時皆有
 又初起輕漸重ニ變スル者アリ云々此是變成炎証危險
 難治ト云ヘリ又致病ノ原數端アリ或因天時暴冷或感
 受雨濕汗管驟ニ閉或因食酸果生瓜之類肚腹寒冷或因
 膽汁生多味辣惱觸小腸或因大便久秘令小腸不安皆能
 致此ナリ其小腸痛ト云腎囊水疝ト云ハ陰疝又癩疝ト
 ナリ其証候治法彼書ニ委シ茲ニ贅セズ

治法ハ尋常ハ輕證烏苓通氣湯五苓散加茴香苦楝子又
 柴胡桂枝湯ノ類ニ宜シ温散ヲ要スルモノハ當歸建中
 湯當歸四逆湯及加吳茱萸生姜湯ノ類又一方當歸四逆
 湯吳茱萸加附子湯選用スヘシ腹痛ノ劇キハ大黃附子
 湯烏頭桂枝湯附子粳米湯蜜附子湯衝疝トテ心下へ搶
 逆スル證ハ大建中湯解急蜀椒湯若下ヲ取ラシテ欲セ
 ハ八味疝氣劑借性丸ニ宜シ和血ノ劑ハ桃人當歸湯洋
 家ニ云フ小腸炎ノ証ハ大黃牡丹湯復元通氣散ヲ佳ト
 ス洋方ノ外治法ハ證ニ因テ採用ス可ナリ其味更ニ水
 烏苓通氣湯ト切疝氣无問遠近寒熱風濕寒濕熱濕
 烏苓藥去之當歸藥去之芍藥藥去之山查子藥去之其濕

醫方啓蒙 卷二

香附 陳皮 各一
 茯苓 白朮
 枳榔 玄胡索 澤瀉 木香 各一
 甘草 各三

右姜水煎服○或加吳茱萸

當歸四逆湯 臍腹疼痛相引腰股而痛

當歸 七分 附子 桂枝 茴香
 柴胡 各五 芍藥 四分 茯苓 玄胡索
 川棟子 各三 澤瀉 二分

右水煎服

吳茱萸加附子湯 寒疝腰痛牽引睪丸屈而不伸脉沈遲

即吳茱萸湯本方加附子二錢

醫方啓蒙 卷二

三

蜜附子湯 疝氣發作

於附子建中湯煎時加蜜一筋頭許

解急蜀椒湯 寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出欲

絕

蜀椒 二百枚

附子 一枚

粳米

乾姜 半兩

半夏 十二枚

大棗 廿枚

甘草 一兩

右水煎服

八味疝氣劑

桂枝

桃人

延胡

木通

大黃

烏藥

丹皮

牽牛子

右水煎臨用點牽牛子末

別末各 八分

桃仁當歸湯 疝因瘀血作痛

桃仁 二錢

當歸

玄胡索 各一

各半

川芎

地黃

芍藥

吳茱萸

青皮

牡丹皮 八分

右薑水煎服

復元通氣散 小腸氣腎癱便毒腰疼氣刺腿膝生瘡

合延胡索

陳皮

白牽牛 炒取

甘草 各一

木香 一兩

茴香

穿山甲 炒各

二兩

西若水煎服

借性丸 小腸氣下元閉塞不通

木川棟子 一兩

破為四片

巴豆 一兩

並殼 各一

豆 各一

蘇子 各一

醫方啓蒙 卷二

右同和勻入銚內炒令紫色取出去巴豆只取川棟子淨
 昔刷研末爲丸每服十九服以得利下不妨

西洋外治法

罌粟殼ヲ用テ沸湯ニ沖シ布巾ニ浸シ絞テ肚腹處ヲ

合按スルト一二刻或數刻ニシテ能痛ヲ止ム若痛未止

野ニ酸醋ヲ用テ芥末ニ和シ略滾水ヲ加テ熬シ

濃シ厚紙或布ニ攤シ塊上ニ貽住スルト一二刻ナル

八ヘシ長丈 八尺

黃 吳茱萸 寄艾

林 當歸 立降

附子 當歸 蘇合

奔豚

難經ニ腎ノ積ヲ奔豚ト曰トアレモ此奔豚氣トハ自異

ナリ此證ハ臍下ノ水飲ヲ激動シ心下へ衝逆スルナリ

其証候ハ如豚奔走之狀ト云語ニテ形容ヲ盡シタリ前

人ノ論說モ別ニ發明ナシ後世奔豚疝氣ト稱シ衝疝ナ

ソノトスルハ誤ナリ桂枝加桂湯桂苓甘棗湯奔豚湯

皆用テ効アリ又枳榔末ヲ與ルハ脚氣衝心ノ方ヲ活用

シタルナリ今前哲試驗ノ方一二ヲ左ニ錄ス

奔氣湯 卒厥逆上氣氣支兩脇心下痛滿淹淹欲絕此謂

奔豚病氣從下上上衝心胸臍間築々發動有時

甘草 二兩 人參 二兩 吳茱萸 一升 生姜 一斤

醫方啓蒙 卷二 奔豚 五

半夏 一升 桂枝 三兩

右水煎服

定悸飲 奔豚

李根皮 一錢 二分

茯苓

桂枝

白朮 各一

甘草 少許

牡蠣 一錢

甘草 少許

右水薑煎服

壓氣散 奔豚氣上下衝走悶亂面青

其藥 檳榔 三枚 搗

羅為末

生姜汁 半合

右件藥以童子小便一大盞入煎藥攪令勻服

腹痛

腹痛ノ所因一ナラス冷痛アリ熱痛アリ積痛アリ蟲痛

アリ氣痛アリ血痛アリ感寒停食亦能腹痛ヲ為ス奇効

後停滯即日用常餐亦停滯此言是也其原由同シカラス

宜其証候ニ就テ方ヲ處スヘシ古人ノ說ニ痛通也宜通

而塞則為痛ト此說理アリト為ス虛實ヲ辨スルノ法ハ

手ヲ以テ重按ノ不痛却テ按フヲ好者ハ氣痛ニシテ虛ニ

屬ス是ヲ温ルニ宜シ按ノ痛ミ手ヲ近ルヲ好マサルモ

ハ有積テ實ニ屬ス是ヲ攻ルニ宜シ又形有テ痛常處

アルハ血分ニアリ無形ノ痛ニ定處ナキハ氣分ニアリ

又痛テ増減ナキハ寒ナリ時痛時止ハ熱ナリ其脉ハ弦

緊ナ常候トシ滑實有力ハ實邪ナリ虛弱無力ハ虛邪ナ
 リ其病ノ證候新久ニ因テ脈狀モ一樣ナラスト知ヘシ
 又當臍痛モノハ燥屎アリトス小腹痛モノハ二便不通
 ノ證ナリ西洋ニ小腸炎ト云ハ尤危險ノ證ナリ其書ニ
 就テ考ヘシ
 治法ハ小建中湯芍藥甘草湯邪氣アレハ小柴胡湯四逆
 散ニ宜シ温中ニハ安中散蟠葱散附子建中湯温下ニハ
 温脾湯當歸大黃湯桂枝加大黃湯攻下ニハ大柴胡湯承
 氣湯麻人丸ノ類選用スヘシ中ニ結實アリテ峻下スヘ
 キニハ備急丸走馬湯ナリ總テ痛甚キハ沈麩丸又乳蠟
 散ヲ兼用シ効アリ灸法熨法并良ナリ

小建中湯 腹中切痛 臣類皆無不顯內藏

即本方〇加附子各附子建中湯

芍藥甘草湯 四時腹痛 三 大黃 正同

即本方加姜煎干 人參 苦節 各二

四逆散 熱鬱腹痛 臣類皆無不顯

即本方白一草水煎

安中散 遠年日近脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留滯於

內停積不消脹滿攻刺腹脇及婦人血氣刺痛

甘草 十兩 炒 延胡索 良薑 炒 茴香 炒

肉桂 各五兩 牡蠣 四兩 乾薑 炮五兩

右水煎服〇又爲散熱酒或鹽湯下 補藥 潤燥 開胃 煎

蟠葱散 脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛胸膈痞悶背膈

拘急不思飲食

蒼朮 十兩 甘草 半斤

肉桂 二兩 肉桂 二兩 茯苓 各二兩 三稜 各二兩 青皮 各二兩 檳榔 各四兩

中莪朮 各六兩 縮砂 各二兩 丁香 各二兩 木香 各二兩 檳榔 各四兩

右連根葱白一莖水煎服

溫脾湯 腹痛臍下絞結繞臍不止

甘草 六兩 附子 二兩 人參 二兩 芒硝 各二兩

當歸 三兩 乾姜 各三兩 大黃 五兩

右水煎服

當歸大黃湯 冷氣牽引腰背肋下腹內痛

當歸 三兩 芍藥 八分 桂枝 三分 乾姜 六分

吳茱萸 五分 人參 一分 大黃 各一兩 甘草 二兩

右水煎服

沈疇丸 一切氣痛不可忍

沒藥 一錢 辰砂 一兩 血竭 各一兩 木香 半兩

麝香 一錢 沈香 一兩

右熬甘草膏為丸姜鹽湯送下血氣醋湯嚼下

乳蠟散 心脾疼不可忍

牡蠣 一兩 煨研 乳香 半兩 研細

右和勻沸湯調下

灸法 神關 丹田 氣海

熨法 腹痛不止冷汗自出手足厥冷

熟艾半斤白紙一枚ヲ以テ臍上ニ鋪キ紙上ニ艾ヲ

攤ケ勻ヘ又葱白數枚ヲ取テ豎ニ割リ艾上ニ排シ

臍際再白紙一枚ヲ以テ之ヲ覆ヒ慢火熨斗ニテ熨之冷

去レハ易之腹中熱ヲ覺テ綿帶ヲ以テ繫之冷時ヲ待

右方ニ解ス

木香 四 木香 一

大黃 一 大黃 一

人參 一 人參 一

甘草 二 甘草 二

黃連 一 黃連 一

黃連 胸痺心痛

胸痺心痛 一類二種ニ分ツナリ痺閉也ト訓メシヒレ

ルヲ非ス胸中痺閉窒塞ト胸背相徹疼痛ナリ其甚

詳シハ真心痛ニテ朝發夕死夕發朝死ス西洋ノ説ニ

心暴痛如刺頃刻而死醫書其故ヲ詳ニ述ス夫抵心力亂

用シ或心房内ノ血暴ニ盡ルカ或心脉管病ヲ或心房

閉戸病ヲ或心體本管病有テ血ヲ養護ニ供テ不足

ヲ今未定ヘカ此證治法甚難ト云モ是ヲ其

脉候凡痛ヲ甚キハ必沈伏ス此等痛緩ナリ細キハ

浮數沈遲一ナラズ又胃脘痛ハ心下ニアリ心痛ト同シ

カヲス辨別ス不シ又西洋ノ書ニ凡心痛證應安養身體

不可登山登樓不可遠行辛勞不可思慮煩怒尤宜戒口戒酒色并云ハ實ニ確言子謂識ハ以不ニ其ハ以識ナ同治法ハ栝樓薤白半夏湯效アリ但白酒合無シ醱醋ヲ代用シ奇驗アリ小陷胸湯加半夏亦良ナリ赤石脂禹餘糧丸証ニ因テ兼用スヘシ其短氣ス其速ニ茯苓杏仁甘草湯甚効アリ橘枳薑湯合ス其速亦佳ナリ今前哲又諸方此証除應効アリ其速ナリ撫テ左ニ列テハ代屬栝樓湯ハ胸痺短氣マ肺經又其ハ經肺經ス西華ノ類ニハ蘇蘇一枚橘皮一兩枳實二兩其甚一兩若入生薑薤白水煎服ハ其速ナリ與閑也ハ肺ノハ其速ナリ黃連湯苦寒辛通

黃連 土瓜萋 白芥子 茯苓

半夏 橘皮 竹筴各等分

右姜汁水煎

通氣湯 胸滿短氣噎塞

半夏八兩 陳皮三兩 吳茱萸四十枚

右水姜煎服

麝香散 胸痺

麝香一兩 牛黃半兩 犀角一兩

右搗研爲散温酒調下

白礬散 急心痛

白礬一錢

〔降氣〕

沈香降氣湯 陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞心腹脹滿又
 脚氣上衝心膈堅滿肢體浮腫
 香附子 二十斤 沈香 一斤二兩半 縮砂仁 三斤 甘草 七斤半
 右水煎服 宜牛乳
 沈香四磨湯 冷氣攻衝心腹疔痛脾胃素弱食飲易傷嘔
 逆冷痰精神不清
 沈香 一兩 木香 一兩 檳榔 六分 烏藥 六分
 右濃磨水煎服 ○加枳殼大黃加六磨湯
 五香散 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯諸熱蘊毒腫痛結
 核或似癰癧

木香

丁香

沈香

乳香

加味藿香 各等分

柴右水煎服

抑氣散 氣道壅滯不得升降脈盛氣粗或胸膈痰飲窒碍

或胸肋肝氣逆滯凡氣貫諸痛用此抑之

烏藥 二兩

紫蘇

橘皮

檳榔

枳殼

縮砂

沈香

香附

右水煎服

白氣散 氣滯不勻胸膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿

噎塞止嘔吐惡心

白豆蔻 七丁香

檀香

木香

各十兩

〔疎氣〕 右水煎服 甘草 各五斤 縮砂仁 二斤 木香 二兩

理氣平肝散 七情所傷發瘧 香附 各一錢半 清波 正錢 枳殼 各一錢

右水煎服 柴胡 五分 青黛 五分 香附子 一錢 川芎 一錢

柴胡青黛湯 怒氣傷肝瀉肝火 加大湯 枳殼 各一錢

青皮 八分 黃連 八分 甘草 八分 梔子 八分

甘草 五分 柴胡 五分 香附子 一錢 川芎 一錢

右水煎服

加味逍遙散 一切鬱證似虛者但其人口苦嘔吐青水或

苦水面青脇痛耳鳴脉濡 柴胡 五分 芍藥 三錢 丹皮 三錢 陳皮 三錢

茯苓 三錢 當歸 三錢 白朮 三錢 貝母 各一錢

薄荷 七分 右水煎服 〇或加吳茱萸

〔利氣〕 四七湯 喜怒不節憂思兼并多生悲恐或時振驚致藏氣

不平增寒發熱心腹脹滿傍衝兩脇上塞咽喉有如炙鬱

吐嚥不下皆七氣所生

吐嚥不下皆七氣所生

吐嚥不下皆七氣所生

吐嚥不下皆七氣所生

即半夏厚朴湯

右姜棗水煎 婦人一切諸氣作痛或上澱心胸或攻築脇

助眩暈嘔吐

烏藥 二兩 香附 八兩 附皮 紫蘇

乾姜 各一兩

右水煎服

三和散 五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋脹風氣壅

滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澁大便秘難

大腹皮 一兩 紫蘇 一兩 白朮 三分 獨活 一兩

沈香 一兩 木香 三分 甘草 三分 木瓜 一兩

橘皮 二分 檳榔 三分 川芎 一兩

右水煎服

〔溫散〕

七氣湯 虛冷上氣勞氣等

半夏 一升 人參 桂枝 甘草 各一兩

右薑水煎服

半夏散 藏腑虛冷心胸氣上勞乏不能飲食

半夏 人參 白朮 桂枝 各一兩

厚朴 二兩 橘皮 三分 附子 沈香 各一兩

右薑水煎服

沈附湯 升降諸氣暖則宣流

沈香 一兩

右薑水煎服

沈附湯 升降諸氣暖則宣流

附子 一錢 附子 一錢 附子 一錢

右水煎磨沈香入藥服

指迷七氣湯 七情相于陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

半夏 青皮

陳皮

桔梗

菘朮

桂枝

藿香

益智 各一兩

香附 一兩

甘草 三兩

半夏 三分

右姜棗水煎

（此方）... 水煎... 功效... 諸症... 宜服...

滯下 今人痢疾ナリ内經ニ之ヲ腸澼ト名ク仲景ハ惟

下利ト稱ス泄瀉ト相似テ同シナラズ泄瀉ハ裏急後重

ナリ又寒熱舌胎モ痢ノ如クナラズ是ヲ以別ト爲ス其

源因中ハ飲食停積外ハ邪氣中傷相合メ病ヲ發ス故ニ

夏秋ノ交此病多シ古人云無積不成痢ト正ニ此義ナリ

初泄瀉ヨリ變スルアリ直ニ痢ト成ルアリ其證心腹絞
痛忍ヘカラス或痛マサルモアリ下迫窘急裏急後重登
團頻數二三十度ヨリ百餘度ニ至ルモノアリ所下或赤
或白或赤白相雜ル魚腸ノ如ク純肝ノ如ク或膿或血或
膿血相混淆スル是ヲ腸垢ト云古人赤ヲ熱ト爲シ白ヲ

滯下

十五

寒ト爲セヒ必拘ル可ラズ正ニ他症ニ斷メ決スヘシ又
 裏急ト後重ト同シカラズ裏急トハ腹裏拘急ト云テ腹
 裏ノヒキハルヲナリ後重トハ後肛重墜ト云テイキミ
 ノタツトナリ是ヲ以テ二證ノ別ト爲ヘシ古諺ニ飽死
 ノ痢病無シト云テ能食スルモノハ輕ク食スル能サル
 ハ重シ其脈ハ大小遲數ヲ論セス總テ安静ナルハ吉躁
 動ノ象アルハ凶ト知ヘシ凡此病數種アリ疫痢トテ疫
 熱ヲ兼タルアリ瘧痢トテ虐ノ痢ヲ兼タルアリ血痢ト
 テ純血ヲ下スアリ噤口痢トテ飲食ヲ絶スルアリ休息
 痢トテ年月ヲ隔テ屢發スルアリ凡此等皆其証候ヲ詳
 ニシテ治セサレハ性命ヲ誤ルコト多シ爲醫者細心究心セ

スンハアル可カラズ西洋ノ説ニ痢証ハ大腸ノ内ニ炎
 紅腫熱痛ヲ炎トテ生スルニ因ル或一處或二三處アリ
 云前ニ見タリ小腸ニモ偶有レヒ但甚少耳ト云ヘリ又云病直腸ニ在
 レハ裏急シ時ニ努掙ノ出ルヲ得ス愈肛門ニ近ケレ
 ハ裏愈急ナリ更ニ手ヲ以テ腹ヲ隔テ摸試スルニ大腸
 ハ右肋骨ヨリ倒上ノ上中下三廻ニ分ツ上廻ハ小腸ニ
 横接シ中廻ハ肝下ニ在リ横ニ胃底ニ過ク下廻ハ脾下
 ニ至リ左軟脇ヨリ斜ニ落テ肛門ニ至ル是ヲ直腸ト爲
 ス小腸ハ腹ノ中ニ居ル何レノ處ヲ按メ更ニ痛メハ即
 病ノ何レノ處ニ在ルヲ知ト云ヘリ此説理アリト云ヘ
 シ

痢ノ治法初起ハ表熱アレハ葛根湯又葛根芩連湯ニ宜
 シ輕キハ逆挽湯升陽除濕防風湯宜シ稍表ヲ過ルモノ
 ハ黃芩湯黃芩加半夏生薑湯夫ヨリ裏ニ入レハ下劑ニ
 宜シ大柴胡湯三承氣湯桃核承氣湯選用スヘシ尋常ノ
 證ハ芍藥湯檳芍順氣湯効アリ血痢ニハ黃連阿膠湯白
 頭翁加甘草阿膠湯犀角散止澁スルハ斷痢湯霞片香連
 丸噤口痢ハ參連湯連理湯又金龍湯ハ奇方ナリ休息痢
 ハ温脾湯効アリ泄瀉ニ痢後ノ調停ハ六君子湯香參散
 枳實理中湯生姜瀉心湯ノ類ニ宜シ西洋ノ方ハ用難シ
 但雞牛羊肉湯粥飯鮮魚俱可食鹽魚火腿一切生乳尤佳
 能收斂止瀉ト云ハ本草ニ鯽魚作膾主久赤白痢ト云ノ意ニ

合ス必可ナラン又洋說ニ最他處ニ居テ遷シ水土ヲ改
 變スルヲ妙トスト云是痢疾ノミナラス

逆挽湯 一二日微熱泄瀉數十行而後帶血裏急後重

- 蒼朮 一匁
- 肉桂 一匁
- 茯苓 八分
- 乾姜 八分
- 枳殼 五分
- 甘草 一匁
- 人參 六分

右姜水煎服○腹痛加木香檳榔

升陽除濕防風湯 大便閉塞或裏急後重數至闔而不能
 便或少有白膿或少有血慎勿刺之舉其陽則陰氣自降
 矣

- 蒼朮 四兩
- 防風 二匁
- 白朮
- 茯苓
- 芍藥 已上各一匁
- 葛根 一匁
- 甘草 五匁

右水前服

芍藥湯 下痢膿血裏急後重腹痛作渴日夜無度

芍藥 一兩 當歸 二兩 黃連 各半 枳實 二兩

木香 二錢 甘草 二錢 大黃 三錢 黃芩 半兩

肉桂 半錢

右水煎服

檳榔順氣湯 下痢頻數裡急後重兼舌胎黃得瘟疫之裡

症者

檳榔 一兩 芍藥 一兩 枳實 八分 厚朴 八分

大黃 一兩

右姜水煎服

溫脾湯 下久赤白連年不止及霍亂冷實不消

大黃 四兩 人參 一兩 甘草 各一 乾姜 各一

參 附子 一枚 不眠熱白不食

右水煎 ○或加桂枝

犀角散 熱毒痢痢血

犀角 末五兩 阿膠 四兩 黃蘗 四兩 艾葉 二兩

乾藍 各四兩

右水煎服 ○或以乾姜代乾藍

斷痢湯 胸心下茯苓

半夏 一升 茯苓 四兩 甘草 八分 龍骨 各二兩

附子 一兩 人參 一兩 黃連 各三 大棗 十二枚

右水煎服

霞片香連丸

久痢諸藥不効

黃蘗 兩

甘草 兩

大棗 十枚

二

酒洗黃連

同妙去茶葉不用

木香 八分

霞片

即阿芙蓉二分

右為味水丸

白湯下

姜汁

黃蘗

黃芩

枳實理中湯

右理中湯

本方加枳實更加縮砂

陳皮

木香

豆蔻之類

連理湯

即理中湯

加黃連茯苓

枳實

豆蔻

參連湯

一下痢噤口不食者

枳實

豆蔻

人參 五錢

黃連 一兩

甘草

神姜

各一

右水煎

不八

表白

蝦蟇

不吐

又雷

崩命實不節

香參散 痢久積穢已盡腹中不痛或微痛不後重但滑溜不止

人參

白朮

茯苓

芍藥

白扁豆

陳皮

肉菓

烏梅

木香

甘草

陳米

烏梅

右水煎服滑溜加粟殼為末砂糖湯下

金龍湯 痢疾噤口病勢欲死者

金絲鯉魚

一尾重一二斤ナルモノ如常治淨シ

鹽醬葱ヲ用テ必胡椒末三四錢ヲ入レ煮熟シ病人

ノ前ニ置テ之ヲ嗅シム吃セント欲スレハ意ニ隨

テ湯ヲ連テ食シム一飽ノ病即根ヲ除ク屢治ノ効

初治洞瀉ス飲食轉節口味ヲ頓ハ但日間上半夜ノ
 無事ヲ得ル時ハ五更ニ近ク必瀉ス此症老人ハ多ク難
 治其候泄瀉ノ脉状食浮沈遲數ヲ論セ有方者胃氣強
 無力者胃氣弱也提テ以虛實ノ一端ヲ知ルヘシ西洋
 醫說肝生膽汁太多能令大小腸不安而瀉暑月最多又
 所瀉之味或黄或白或綠甚臭澀澀汁太少則白太多則黄
 甚小兒則綠俱失其正此論漢人未タ信ハサル所ナリ
 治法理中湯五苓散理苓湯胃苓湯健理湯以上並豆蔻木
 香縮砂シ類ヲ加ヘ煖劑子ヲ加命又柴苓湯加味五苓散
 錢氏白朮散參苓白朮散ノ類總治也又腸胃濕毒ニ因ル
 ハ胃風湯良シ熱瀉ニハ連理湯四苓散加黄連ニ宜シ五

更瀉ハ七成湯腎氣丸料加五味子効アリ酒瀉ハ生薑瀉
 心湯葛根芍連湯ヲ用ヘシ中ニ積滯アルハ温脾湯或乾
 姜圓ヲ兼用ス
 理苓湯瀉泄瀉
 即理中湯合五苓散

胃苓湯夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

五苓散合平胃散
 建理湯泄瀉腹痛

小建中湯合理中湯
 錢氏白朮散吐瀉發熱咽乾口渴

人參 白朮 茯苓 葛根
各五分

藿香

木香

甘草

各五分

右水煎

參苓白朮散 脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心

參 氣喘嘔吐泄瀉

白扁豆

茯苓

白朮

甘草

蓮子肉

薏苡仁

各一斤

右水煎

柴苓湯 泄瀉發熱口渴裏虛之證

小柴胡湯合五苓散

更右姜棗煎服

加味五苓散

伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或煩或渴或

小便不利

茯苓

宜大 澤瀉

豬苓

白朮

桂枝

芍藥

甘草

各一斤

右水煎服

右姜水煎服

胃風湯

風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛

滿腸鳴疔痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

芍藥 肉桂 人參

當歸

茯苓

白朮

右粟米水煎服

連理湯

暑瀉內傷生冷

張理中湯加黃連茯苓

右水煎服煎服

七成湯病愈後脈遲細而弱黎明或夜半便作泄瀉者此

命門真陽不足

肉桂

人參

破故紙三附子一五味子八茯苓一

胃風人參一甘草七

右水煎服

溫脾湯治冷在腸胃間連年腹痛泄瀉休作無時服諸熱

藥不效宜先取去然後調治易差不可畏虛以養病也

小厚朴

乾薑

甘草

桂心

賦附子各半大黃四

乾姜圓

右水煎服更以乾姜圓佐之

乾薑

巴豆

去心炒黃

大黃

人參

各一

右蜜丸以前湯下



吐衄欬唾血... 諸藥... 大黃... 不可... 人... 也... 此本... 更... 以... 調... 治... 之...

吐衄欬唾血

吐衄欬血唾血ノ證名目繁多論說紛紜ナリト雖大抵體虛勞損酒食過度愁憂思慮患怒氣逆ヨリ發スト云ニ過ス其下行スルハ順ニシテ治シ易ク上行スルハ逆ニシテ治シ難ト爲ス褚氏醫書ニ云フ所簡易的切ニシテ盡セリト謂ヘシ其說ニ曰内熱スルハ則上ハ喉ヲ蒸シ下ハ大腸ヲ蒸シ小竅ヲ爲ス喉ニ竅アレハ欬血殺人腸ニ竅アレハ便血殺人便血ハ猶止ムヘク欬血ハ醫シ易カラズ又云喉ハ物ヲ停メス毫髮モ必咳シ血喉ニ滲入ス愈滲シ愈咳ス愈咳シ愈滲ス此說暗ニ西漢溲溺ヲ飲メハ百ニ一死セス寒涼ヲ服スレハ百ニ一生セス此言誠ニ服

膈スハシ凡血証熱アルハ治シ難ク熱ナキハ治シ易ト
ス又吐血ト唾血トハ一類ニシテ皆血ノ上湧シ常道ヲ失
スルナリ多クハ吐血シ少クハ唾血ス又衄血モ血
溢ノ理ハ同シナリ只其竅ヲ異ニスルツミナリ其脉
ハ沈細ニ宜ク浮數ヲ喜ス凡テ微弱平緩ハ治シ易ク弦
緊急實ハ治シ難トス西洋ノ説ニ欬血ノ一證人毎ニ其
死ヲ慮ル其實ハ欬血是死證ナラス欬血ニ因テ肺壞レ
ハ則死ヲ致スノ耳時ニ牙肉ノ出血或喉嚨ノ出血アリ
誤認テ欬血ト爲ヘカラス凡血ヲ欬セシト發スル先胸
膈安カラス物アツテ傾壓スルカ如ク呼吸易カラス欬
出ノ後痰中ニ混雜スルハ此血肺經ヨリ來ルヲ知ル蓋

胃血ハ吐出シ大小腸血ハ瀉出シ肺血ハ欬出ス其理一
也又云凡血泄レテ氣管中ニハテ氣管ヲ塞住スレハ呼
吸難艱ニシテ大方ヲ用テ欬出セサルヲ得ス此欬血ノ
由テ來ル所ナリ又云天熱過度勉力操作シ持重シ或言
語太多ク或大聲呼叫シ或跌倒外傷ニ因ル西國人壯健
ナル者多シ欬血多クハ血ノ停滯ニ因ル虛ノ泄出スル
モノ較少シ故ニ治宜ク放血スヘシ中土ハ則虛ノ而泄
出ノ證多ト爲ス治法高枕安臥寡言ニシテ叫呼ヲ禁シ辛
勞ヲ節スヘシ又云胃血ト肺血ト別アリ肺血ハ欬出シ
胃血ハ吐出ス肺血色紅胃血色黑シ肺血痰アリ胃血ハ
則或食フ所ノ飯物ト齊ク出ツ且肺血少胃血多
肺血偶多者ア

鮮紅ナリ俱ニ辨シ易キ也ト其言皆是ナリ今治方ヲ別
テ四款ト爲メ左ニ列ス曰瀉下曰止遏曰清涼曰温住

〔瀉下〕

桃核承氣湯 吐血覺胸中氣塞上吐紫血又積鬱火甚迫
血上行爲衄數升餘
即本方
三黃瀉心湯 吐血衄血
即本方
犀角地黄湯 大熱甚血積胸中
前方更加犀角生地黃
茜根散 吐血心躁煩悶

茜根 半兩

犀角

升麻

大黃

黃芩

甘草

各一分

右水煎服

〔止遏〕

花藥石散 五藏崩損湧噴血出成升斗用此止之

花藥石

火煨存性
研爲粉

右用童便調末服

黑散了 諸竅出血

蓮蓬

棕櫚

亂髮

並燒存
性等分

右爲末米飲調下

麝香散 鼻衄不止

白礬 枯過 龍骨 各半 麝香 半字

右三味杵和勻先以冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙

阿膠散 肺破嗽血唾血

人參 茯苓 生芩 天門冬

五味子 阿膠 白芨 各等分

右芩姜棗水煎臨熟入白芨末服

西洋方 止血最妙

鉛散三五釐鴉片一二釐日服二三次如無鉛散用白礬五七釐鴉片三四釐溫水和服

〔清涼〕

小柴胡湯 男女諸熱出血血熱蘊隆

甘 即本方○或加生地黃

犀角地黃湯 內瘀蓄血鼻衄吐血

芍藥 三分 地黃 半斤 牡丹皮 一兩 犀角屑 一兩

右水煎服○或加黃芩大黃

涼血地黃湯 血熱上行或吐血或衄血或下血一切失血

犀角 二錢 生地黃 二錢五分 芍藥 一錢五分 牡丹皮 二錢

黃連 黃芩 各一錢 玄參 一錢

右水煎服○或加大黃桃人

涼榮湯 吐衄諸血

生地黃 當歸 栝葉 蒲黃

芍藥

甘草

麥門冬

知母

蘇葉黃蘗各等分

右水煎服

輪迴酒一名還元酒

消痰血止吐衄諸血

童子小便

取十二歲以下無病者二錢

正使

桂枝

二錢

右入生薑自然汁攪服

治鼻衄出血不止方

新汲水淋頭頂上并沒脚立效

〔温住〕

甘草乾薑湯

男子婦人吐紅之疾絕妙

小柴胡湯即本方

理中湯 傷胃吐血

即本方

人參湯 吐血咯血

人參 二兩

右水煎服

堅中湯 虛勞內傷嘔逆吐血

小建中湯加半夏

參附湯 嘔血吐血或血崩脫血盈盆盈桶面色青慘六脉

欲脫四肢厥冷或自汗出危極者

附子 五錢

人參 一兩

姜灰 八錢

右水煎服

附子理中湯 因冷飲中寒雜食生冷血爲寒凝而下必腹

痛色晦淡

本方倍炮薑加酒黃連

斷紅飲 吐下血

當歸 八分

川芎 五分

蒲黃 一匁

阿膠 八分

聖中柏葉 一匁

炒姜灰 七分

右水煎百草霜末點服

大小便血

大小便血其病因吐衄ト異ナラス惟血ノ下竅ニ失スル耳然レ血ハ水ノ類ナリ故ニ下ルヲ順ト爲シ上ルヲ逆ト爲ス其治方モ彼是互ニ通用スヘシ但小便血ニ血淋アリ大便血ニ痔血アリ混看スヘカラス血淋ハ痛アリ尿血ハ痛ス又大便血ハ腸胃ヨリ下ルナリ痔血ハ肛門邊傍ニ一小竅アリテ出ルナリ是其別ト爲スヘシ又大便血ニ腸風臟毒ノ二証アリ腸風ノ血ハ滑ニ色鮮ナリ臟毒ノ血ハ濁テ色黯ナリ又糞前ヲ近血ト名ケ糞後ヲ遠血ト名ク然レ藥ハ互ニ用ユヘシ今方治ノ大略ヲ掲ク尋常ノ證ハ加減四物湯解毒四物湯ニ宜シ下

血久不愈ニハ平胃散効アリ柏葉湯理物湯モ亦用ユハ
シ尿血ハ猪苓湯加車前子鹿茸散良ノ尙欬血門ノ方ヲ
參用ノ可ナリ

加減四物湯 腸風臟毒下血不止

生地黃 當歸 川芎 甘草

槐花 柏葉 荆芥 枳殼 各等分

右生姜烏梅水煎

解毒四物湯 大便下血不問糞前糞後

四物湯合黃連解毒湯更加地榆槐花阿膠側柏葉

人參平胃散 大便下血百藥無効者

本方加人參

右水煎服

理物湯

即理中湯四物湯併用

鹿茸散 小便尿血日夜不止

鹿茸 酒洗 生芩 當歸 各二兩 蒲黃 一合

冬葵子 炒四兩半

右細末温酒調服

本除末盡...
 參麥干...
 小...
 中...
 古木...

