

醫
方

8

1-127

F²
イ-117

卷五目次

疳	初生	小兒門	產後	產前	婦人門
	癩	小兒諸証	婦人衆疾	產育	

富士川氏藏



富士川文庫

1304

490.9
Ih-5
2

No. 2290
18 7 129

婦人門
孫思邈曰婦人ノ別ニ方アルモノハ其胎妊生産崩
立傷ノ異ナルヲ以ノ故ナリ是ヲ以テ婦人ノ病之ヲ
于立男子ニ比スレハ十倍療シ難シト此言誠ニ是ナリ
醫然レモ婦人傷寒雜病ノ治療ハ別ニ男子ト異ナル
人ヲナシ但其經候生産血分ニ關ル丈夫ノ病ト別
レハ茲ニ心ヲ用テ治療ヲ施サスンハアルヘカラ
ス此孫子ノ十倍療シ難シト云テ丁寧告誡スル所
以ナリ今尋常應用ノ方法ヲ採擇シ童蒙ノ指南ト

醫方啓蒙卷五

東京 隱醫香城老人編述

婦人門

孫思邈曰婦人ノ別ニ方アルモノハ其胎妊生産崩
立傷ノ異ナルヲ以ノ故ナリ是ヲ以テ婦人ノ病之ヲ
于立男子ニ比スレハ十倍療シ難シト此言誠ニ是ナリ
醫然レモ婦人傷寒雜病ノ治療ハ別ニ男子ト異ナル
人ヲナシ但其經候生産血分ニ關ル丈夫ノ病ト別
レハ茲ニ心ヲ用テ治療ヲ施サスンハアルヘカラ
ス此孫子ノ十倍療シ難シト云テ丁寧告誡スル所
以ナリ今尋常應用ノ方法ヲ採擇シ童蒙ノ指南ト

爲ス其臨症施理ノ妙域ニ至テハ此編ノ盡スヘキ
ニ非ス自ラ醫工ノ心悟ニアルナリ

産前

婦人妊娠ノトハ古來ノ醫書ニ諄々然トシテ詳説アレモ
皆懸象虛揣ニシテ些モ實際ニ益ナシ曩者我邦賀川玄悦
子玄アリテ産論ヲ著シ千古未發ノ見ヲ闡明セリ其嗣
玄迪子啓産論異ヲ撰シテ克ク其箕業ヲ紹述ス懷孕達
生ノ義ニ於テ詳悉精確餘蘊アルコトナシ爾後諸家撰著
アレトモ要スルニ此範圍ヲ出ルコト能ス近日英國醫士
合信婦嬰新説ヲ作テ其理ヲ究格シタリ此又事實上ニ
於テ甚タ觀着ナリトス然レハ學醫ノ士宜ク二家ノ書

ヲ讀ミ二家ノ門ニ就テ其方論治術ヲ精研シ彼是斟酌
ノ其長ヲ取ルヲ良トスサレハ妊孕ノ一事ハ従前ノ醫
書一二ノ探ルヘキチキニ非レモ概實際ニ切近ナラサ
レハ今其論説ハ茲ニ贅セス惟今日ニ採用スヘキ方劑
ヲ錄スル已ナリ
予玄ノ説ニ婦人受孕ハ經畢テ後十日ノ間爲其候矣ト
云古人モ男女受胎ハ婦人經絶ノ後一日ヨリ六日ニ至
ルヲ期ト爲ス六日ヲ過テハ胎ヲ成サスト云ヘリ然ル
ニ洋説ニハ受胎或在經前或在經後ト云ハ疑ヘシ
妊女疑似ト云テ其然否ヲ決シカタキノ證古法ハ診脉
ヲ以テ斷スルコトアリ服藥ヲ以テ試ルコトアリ然レモ二

家ノ説ノ的據アルニ如ス宜ク其人ニ就テ學フヲ要ト
ス
子玄ハ分娩ノ期初孕ノ者ハ三百日ニ滿テ免ス經産ノ
モフハ二百七十五日ヲ期ト爲スト云洋説ニハ計算ノ
二百八十日ヲ準ト爲ス毎ニ第十次ノ經期ト暗ニ合ス
ル也ト云二家ノ言大約相符セリト云ヘシ
婦人ノ懷身スルハ造化自然生々之具ニ固ヨリ疾病
ニ非レハ藥ヲ用ルノ理ナシ然レモ其邪氣ヲ挾ムカ或
ハ素稟宿疾アルカ又ハ氣血不調等ニシテ其孽害アルハ
邪ヲ祛リ正ヲ資ルノ術ナカルヘカラス此ニ其方法ヲ
設ル所以ナリ

受胎ノコトハ褚氏遺書ニ詳論アリ爾後咎殷産寶時賢産
經王嶽産書其他産育保慶集胤産全書廣嗣全書達生編
等アリテ妊孕ノ説多ケレモ大抵空理ニ涉リテ事實ニ
益ナシ故ニ此篇記セス
妊娠惡阻ハ惡字去聲ヲト讀ヘシ又擇食又惡食ト云古
人モ經血既閉水漬於藏藏氣不得宣通故四支沈重頭目
眩暈心煩憤悶氣逆而嘔好噉酸鹹菓實ト云是ナリ千金
半夏茯苓湯ハ惡阻ノ套劑ナレモ今用ヒカタシ
妊孕中ニ子癩子淋子煩子懸等ノ證アリ此子字ハ懷子
中ノ証ト云義ニテ妊婦ニ關ルコトナラス然ルニ子癩ハ
母癩ト云ヘシトノ説ハ古人ノ造語ニ達セサルナリ

子立ノ手術ハ踐履實行ニ出ルモノナレハ皆今日ニ施
用スヘシ洋説ハ精密ナレモ手術ニ至テハ我邦ニ及ハ
サルヲ遠シ且其方藥モ亦用カタシ但受胎後房事ヲ禁
スヘシト云ハ彼是一轍ナリ

治法金匱ノ桂枝茯苓丸芎歸膠艾湯當歸芍藥散當歸散
等皆用ヘシ今古人ノ方其用ニ充ヘキヲ摭テ此ニ列ス
膠艾湯 妊娠二三月至八九箇月胎動不安腹痛
即本方

竹茹湯 妊娠惡阻嘔吐不下食
竹茹 各十 橘皮 各十 茯苓 一兩 半夏 三十
右薑水煎服

竹瀝湯 妊婦恆苦煩滿此名子煩

茯苓 三兩 竹瀝 一升

右水煎 小半夏加茯苓湯 妊娠阻病嘔吐不止

即本方

右以伏龍肝浸水澄清取其汁煎藥服

加味二陳湯 妊娠惡阻
陳皮 各一 茯苓 各一 半夏 一兩 白朮 七錢
甘草 三錢

右姜烏梅水煎 六君子湯加旋覆花煎調赤石脂末服妊娠病膈飲粒全不

婦人妊娠惡阻

入口痰沫上湧
四七湯 婦人妊娠惡阻

即半夏厚朴湯

冬葵子湯 妊娠大小便不通

冬葵子 二匁 微炒
大黃 一匁 炒

右水煎

紫蘇和氣飲 妊娠胎氣不和

大腹皮 人參 川芎

芍藥 各半 兩

紫蘇 一兩

當歸 三分

橘皮 一分
甘草 一分

右姜水煎服

芩連四物湯 子痛陰虛火亢

四物湯加黃芩黃連半夏 各等分

右姜水煎服 婦人小產下血不止

奪命圓 婦人小產下血不止

即桂枝茯苓丸

右水煎服

佛手散 妊娠至五六月因事築碇或子死腹中去血過多

運悶不省或疼痛不已口噤欲絕此藥催生神妙

寒 當歸 六兩

水川芎 四兩

右酒水煎服

妊娠惡阻吐逆スルハ嘔吐門ヲ按シ藥ヲ用ヘシ子癩ノ

証ハ癩証門ニ考ヘシ胎水トテ四肢浮腫スルハ水腫門

ニ參シ宜シ又産前後ニ脚氣ヲ患ルコトアリ心ヲ用テ診
スヘシ治法ハ脚氣門ヲ考テヨシ古人モ有故無損ト云
テ其證アレハ其藥ヲ用ユ必拘忌スルコトニ非ス妊娠傷
寒ニ伏龍肝ヲ水ニ調シ臍下ニ擦スレハ墮胎セサルコ
妙ナリト云未試
子立妊婦束帶并ニ産椅ノ害ヲ論ス産椅ハ太タ宜シカ
ラス鎮帶ハ稍緩ニシテ緊束セサレハ甚害ナキニ似タリ
姑俗習ニ隨フモ亦可ナリ

産育
婦人達生ノコトハ天地間自然ノ理ニシテ固ヨリ人力ヲ假
ルモノナラス古人モ是ヲ菓中ノ栗子ニ譬フ其自熟ヲ

待テハ殻自開而栗自墮生産之理何ソ此ニ異ナランヤ
唯其變動ニ至テハ倒横逆生證狀一ナラス此時ニ當テ
ハ前ニ論スル手術ヲ用サルコトヲ得ス草根木皮ノ能維
持スヘキニ非ス然ト雖モ氣血ヲ循環シ陽神ヲ鼓舞シ
其功效ヲ遂シムルハ湯煮煎劑モ亦無績ト云ヘカラス
茲ニ其治術ノ補翼ト爲ヘキ方法ヲ揭示ス尙産前後ノ
諸方ヲ通用スヘシ而古人ノ空理ニ涉ル論說治療ニ益
ナシ今皆採ラサルナリ
妊婦未タ満月ナラスコト生スルモノ之ヲ半産ト云又小
産ト云氣血虛衰ノ滋養ヲ失シ或癩撲閃墜或傷寒温疫
ノ類皆半産ヲ爲ヘシ宜ク此篇并ニ前後門ノ證治ニ照

ノ施理ノ可ナリ
 前人ノ説ニ臨産ノ時ニ傍人喧擾シ大小惶忙スレハ産婦ヲ驚動スルヲ慮ルヘシ宜ク熟事ノ産婆謹慎老成ノ親屬一兩人ヲシテ看侍セシムヘシ陳痛甚タ兒ノ産門ニ逼ルヲ待テ蓐ニ坐セシム慎テ早クスルヲ勿ルヘシ分娩了テ速ニ童子小便一盞ヲ與フヘシ是甚タ良法ナリ但反支日遊借地ノ類ニ至テハ迂闊ニ用ニ適セス又臨蓐ノ時ニ冷水ヲ用テ熱蜜ヲ調シ意ニ隨テ之ヲ叩ス血暈ヲ免ル且胎氣ヲ滑ニス
前條童便或用ヒ難キ時ハ此法ニ代ルモ亦可ナリ
 加味芎歸湯 催生及産後最爲穩當功亦鉅大

當歸 一兩
 川芎 五匁
 肉桂 二匁

右酒水煎服○預防血暈加酒炒荆芥有効

脫花煎 臨産將産并難産經日或死胎不下俱妙

當歸 一兩
 肉桂 三匁
 川芎 各二匁
 牛膝 各二匁

水車前 各半

右水煎或服後飲酒數杯亦妙○若胎死不下及胞衣不

來再加芩消氣虛困劇加人參更加附子

折衝飲 催生并産後諸疾

牛膝 一兩
 桂枝 各一匁
 芍藥 各一匁
 桃人 各一匁

延胡 各二匁
 當歸 各一匁
 川芎 各一匁
 紅花 各一匁

牡丹 各三分
 甘草 一分

右水煎服○或加大黃

催生丹 產難及橫生

腦月兔腦 一箇取髓去
皮膜研如泥

麝香 二分

乳香 末二

丁香 末二

右拌勻和丸雞頭實大 雞頭實ハ芡實ナ
和名チニハス 陰乾油紙裏每

時取一丸温水磨化服即產

獨得散 胞衣不下并惡心冲心

五靈脂 四錢

右研末温酒調下

洋法ニ胎盤出テ後仍大手巾ヲ用テ肚腹ヲ緊束ス一ハ
肚腹ヲ輔助シ意ニ適セシム一ハ子宮ヲ壓シ鬆展セシ
メス更安臥兩三時起立セス室内過寒過暖セス言語セ

ス多人擾亂スルヲ忌ム困倦スレハ少ク茶ヲ飲ミ精神
無レハ稍酒ヲ飲ヘシ醫者産婦ノ安身無事ヲ探知テ歸
去ヘシト洵ニ確言ナリ

婦人産後精神慧了四體安和別ニ證候ナシ其調養ニ任
スヘシ若病アレハ證ニ隨テ治法ヲ設ケサルヲ得ス孫
真人モ産後ノ病餘病ヨリ治シ難シト云ヘリ仲景ノ法
ヲ考ルニ桂枝湯小柴胡湯ハ葢草薺傷風ノ類ナリ大承
氣湯ハ津燥裏實ノ治ナリ當歸生薑湯當歸建中湯ハ温
養ノ法ナリ枳實芍藥散ハ疎通ノ品ナリ下瘀血湯ハ攻
瘀ノ劑ナリ竹皮大丸ハ清中ノ藥ナリ竹葉湯産後中風

ナ治シ白頭翁加甘草阿膠湯產後下利ヲ治スルノ類是
 又權變方ヲ處スルナリ凡產後ノ諸症ヲ治スル此意ヲ
 擴充ノ可ナリ又產後血暈ノ証ニ虛實兩端アリ其去血
 過多ニシ暈スルモノ氣脫ニ屬ス其證眼閉口開手撒シ
 四支冷六脉微細或浮是ナリ宜温補スヘシ下血極少而
 暈スルモノ血逆ニ屬ス其証胸腹脹痛氣粗兩手握拳シ
 牙關緊急スル是ナリ宜攻下スヘシ今前人ノ方法ヲ揭
 テ後ニ掇ス若其手術ニ至テハ子玄及子啓ノ書在ルア
 リ平素熟究スルヲ宜トス
 生化湯 此方去舊生新凡產後無論有病無病能服數劑
 使惡露盡去新血速生誠產後之要藥也

黑歸當歸 五匁 蘇川芎 一匁 大桃仁 二十粒 黑炮姜 一匁 血積膏

甘草 二匁 柴胡 去水 參朮 各半 枳實 半 芩連 各半 五靈脂

柴胡水煎服 產時血既大下則血去氣亦去故昏暈不

救氣脫昏暈方 產時血既大下則血去氣亦去故昏暈不

省省 參 五七匁至 三二匁

右入炒米煨姜大棗煎服若少遲則無及矣亦血暈不省

六味回陽飲 凡真元既敗氣血既亡陰陽將脫索

人參 一二兩 附子 二三兩 甘草 三匁 炮姜 二三匁

當歸 五匁 地黃 三匁

若水煎或加鹿茸効更捷

醫方啓蒙 卷五

蓬莪朮散 產後腹臍疼痛心胸注悶每遇經脉行或多或

少及有塊積 黃芩 桃人 大黃 當歸

桂心 川芎 木香 延胡索

芍藥 牡丹皮 各半

右水煎服 產後血暈悶絕狼狽

牡丹散 產後血暈悶絕狼狽

即天黃牡丹湯 血暈大不醒 血去漆衣去垢 昏不

柴胡破癥湯 產後傷寒熱入血室或惡露不下

即小柴胡湯 去人參加芍藥當歸生地桃人五靈脂

黑神散 產後惡露不盡胞衣不下血暈神昏及瘀血諸疾

黑豆 炒半升 地黃 當歸 肉桂 蒲黃 各四兩

炮姜 甘草 芍藥

右為細末酒水童便同煎服

參蘇飲 產後敗血上攻面目紫黑

蘇木 蘇人參 蘇木 二兩

三右水煎服 愈風散 產後中風口噤牙關緊急手足痲痺亦血暈不省

人事 荊芥 輕炒過

右為末每服三錢溫酒調下

產後虛勞心熱煩悶不識人方

產後虛勞心熱煩悶不識人方

醫方啓蒙 卷五 十一

童便一小 生薑一合 生芩汁二合

右相和煎一沸頻服之不

一奇散 產後頭痛

人即芎歸湯加荆芥

愈右水煎服時中風口動平關深急手足與寒亦血暈不省

三黃瀉心湯加辰砂 產後敗血迷心顛狂錯亂

沒藥散 產後百疾

各等分如無以紫礦代之○紫礦ハ
花モツヤクト稱スルモノナリ

右細末童便酒煎沸調下

紅藍花酒 產後血暈昏迷氣絕

紅藍花一兩○今用番紅花殊妙

右沸湯擺用 原方用酒
今代湯

失笑散 產後心腹痛欲死百藥不効

蒲黃炒香 五靈脂等分
無末

右醋水煎服

大調經散 產後惡露不消敗濁凝滯為腫滿

大豆一兩炒 茯苓一兩 琥珀一兩

右為細末濃煎黑豆紫蘇湯調下

產後血暈方

石子十餘顆ヲ燒通赤ニシ輪次ニ醋ニ淬シ產婦ノ

前ニ置テ鼻ヲノ猛烈ノ酷氣ヲ聞シム

回乳四物湯 產後無兒吮乳致乳汁腫脹堅硬疼痛難忍

四物湯 各二
友

麥芽 二友炒
為鹿末

右水煎服

湧泉散 乳無汁亦乳結癰腫

穿山甲 一兩
炒

右為細末酒調服

洋法ニ治血崩用氷塊陰道ニ入ル氷無レハ水節ヲ用テ
凍水ヲ射入ス仍止サルハ布ヲ用テ凍水ヲ浸シ陰道ニ
捲塞ス必凍水ヲ用ルモノハ蓋臟腑ノ性冷レハ則歛縮
ス子宮モ亦然リ故血崩ヲ治スルハ務テ寒冷ヲ以テ主
ト為ス又云凍水能血ヲ止メ暖水能血ヲ行ス此漢人ノ
未タ言サル所ナリ

又治產後血崩証者務テ產婦ヲ清涼ナラシメ

開通シ衣被ヲ減薄シ多人ヲ屏去スルヲ宜トス昏迷ス

元モハ美酒ヲ飲シメテ以之ヲ麩ス是極テ良法ナリ

又產後所食粥飯魚蛋牛乳藕粉蓮子及ヒ一切潤物ニ宜

トシ每ニ粵人ヲ見ルニ產後例生薑酸醋龍眼ヲ食ヒ并ニ

喜ヲ火ニ近ク皆宜ニアラスト云ヘリ

又產後身安ク病無ク乳有レハ七日ノ後常ニ照ソ肉ヲ

食ヘシ大概產後ノ病証多ク七日以前ニアリ此ヲ過レ

ハ即關係ヲ失フ此皆佳說ナリ

婦人衆疾曰氣弱帶下曰氣血閉曰氣血不調曰氣弱

婦人ノ病男子ト同キ大宜ク本門ニ照ソ方法ヲ處

スヘシ今經血崩傷ノ丈夫ト異ナル證ヲ記シ四款
 最ト爲ス曰崩漏帶下曰瘀血血閉曰氣血不調曰雜證
 諸方若夫七癥八瘕九痛十二帶下三十六疾ノ類ニ
 食ヘ至テハ徒ニ名目ヲ繁ニスルノ言ニメ實際ニ益ナ
 又此編取ラザル所ナリハ十日ノ發常ニ照ル肉モ
 〔崩漏帶下〕云々言宜ニ此等ノ病ニテハ崩漏ノ
 下部ノ出血ノ止サル之ヲ崩漏ト云穢液ノ常ニ流ル之
 ヲ帶下ト云崩漏ノ一證細ニ分テ云ヘハ輕キヲ漏下ト
 云淋瀝不絶ナリ重キヲ崩中ト云忽然暴下スルナリ又
 帶下ニ赤白ノ二証アリ然レモ治方ハ大抵通用スヘシ
 此症前人ハ概衝任二經ニ屬ス西洋ノ說ハ乃子宮ノ病

ト爲ス此ヲ仲景ノ律ニ考ルニ温經膠艾正ニ其治ナリ
 今姑ク其病因ヲ論セス長沙ノ意ニ就テ方法ヲ列スル
 下左ノ如シ 婦人經水不調或前或後或多或少或崩漏
 四物湯 調益榮衛滋養氣血衝任虛損月水不調崩中漏
 下諸症 當歸 川芎 芍藥 熟地 各等分
 右水煎服 ○此方前人加減甚多今摭其一二以附于此
 加減法 孕婦下血腹痛加艾葉阿膠 ○腹痛惡露不下
 加沒藥 ○大便秘澁加大黃桃人 ○泄利加桂附子 ○虛
 煩加竹葉人參 ○渴加知母石膏 ○心膈迷悶刺痛加橘
 皮香附子玄胡索 ○經血凝滯腹內作疼加莪朮肉桂 ○

十三

產後敗血胸膈疼痛加延胡沒藥○血風兩脇築疼加大
 黃蘗撥乳香○腹痛加黃芩黃連○產後惡露腹痛不止
 加桃人蘇木牛膝○經病疼痛加吳茱萸
 加減四物湯 婦人氣血不足四肢惰怠乏力少氣
 本方去地黃加乾姜人參甘草
 涼膈散合四物湯 婦人年老血崩不止
 丁香膠艾湯 崩漏不止臍下如水白帶之物多
 即芎歸膠艾湯加丁香去甘草
 小温經湯 婦人經道不通繞臍寒疝痛徹
 當歸 川芎 芍藥 桂枝 炙甘草
 牡丹 莪朮 人參 甘草

牛膝 各一兩

右水煎

正經湯 崩中下血服之即斷或月經來過多及過期不來

即本方去芎藭甘草加地黃

黃連解毒湯 婦人五十以上經脉暴行不可以病治之如

下峻藥即死

本方加棕灰蓮殼灰後用四物湯和血或加艾葉

婦人赤白帶下不問遠年日近皆治方

龍骨 半兩 舶上硫黃 二匁

右爲末酒調下

伏龍肝湯 崩中去赤白或加豆汁

伏龍肝 如彈丸七枚 地黄 五兩 甘草

桂心 各二兩

右姜水煎服

雙和湯 婦人血勞經病勞損等證

芍藥 七兩 黃芪 當歸 地黃 艾葉

川芎 各三兩 甘草 肉桂 各二兩

右姜棗水煎

洋法治白帶方

鐵鏞 五分 沒藥 三分 大黃 三分

右蜜攪和為丸十八粒日服二三粒

又兒茶白礬石榴皮沒石子等水貯水節內自陰道射入並

須冷用若無水節可用藥水外洗潑入陰道或擦尾骶骨

亦妙 此礬石丸方意近之

又云大抵子宮ノ病ハ則白帶ヲ流ス肺ノ腸風ハ涕ヲ流

シ大腸ノ病ハ白痢ヲ流スト其理相同シ若子宮潰爛

ハ或ハ乳癰肉瘤洩生ハ白帶ヲ流スハ則危險ニシ

治シ難キナリ事不測ハ腹堅痛不得近

〔瘀血血閉〕

此證ハ經文大黃甘遂湯抵當湯丸ノ主治スル所ナリ今

逐血破瘀ノ劑ヲ撰以此ヲ隸ス

桂枝桃仁湯煎經道不通繞臍寒疝痛徹

桂枝 芍藥 生地黃 各二兩 桃人 五十箇

醫方考卷五

甘草 一兩

芍藥 黃

生薑 黃

桃人 五

卦若姜瓊水煎服直不面蘇觀家欲欲論

逐痰飲血水壅遏遍身洪腫

冬葵子 一匁

紅花 八分

滑石 八分

桃人 五

牡丹皮 各四

延胡索

牛膝 各六

木香

牡丹皮 各四

右水煎服

牛膝散 月水不利臍腹疔痛帶下崩漏

牛膝

桂心

芍藥

桃人 五

當歸 五

川芎 三

白帶 木香

延胡索 七

牡丹皮 各三

分

右水煎服 藥水清 藥水候 藥水候

琥珀散 婦人血氣攻心腹煩躁悶亂疼痛不止

琥珀

沒藥

當歸

芍藥

丹皮

胡索

蒲黃

莪朮

桂枝 一兩

林

當歸

莪朮

右水煎服 藥水清 藥水候

乾漆湯 婦人月事不通小腹堅痛不得近

大黃 三兩

桃人 一升

芒消

土瓜根

乾漆

當歸

芍藥

丹砂 研各

右水煎服 藥水清 藥水候

代抵當湯 行瘀血

生地黄

當歸

穿山甲

降香

醫方考卷五

十六

醫方考蒙 卷五

肉桂 一錢
桃人 炒二錢
大黃 三錢
芒消 八分

升右水煎服

桃人散 月經來繞臍痛上衝心胃往來寒熱如瘧

桃人 五十枚
麤蟲 二十枚
桂心 五分
茯苓 一兩

薏苡 入
牛膝 一兩
代赭 各一兩
大黃 八兩

右水煎服 人且事不遂小頭望滿不辨

川大黃散 婦人久赤白帶下胞中有積滯

大黃 一兩
朴消 一兩
當歸 一兩
蜚蟲 二分炒去翅足

桂心 半兩
桃人 一兩

右水煎服

〔血氣不調〕

此張子小柴胡湯ヲ用テ熱入血室ヲ治スルノ意ニ原テ前人ノ諸方ヲ茲ニ揭示ス

逍遙散 血虛勞倦五心煩熱頭目昏重及血熱相搏月水

不調

甘草 半兩
當歸
茯苓
芍藥

白朮 各一兩

右姜薄荷水煎○或加丹皮梔子

加味逍遙散 氣血不調及一切鬱証

柴胡
芍藥
丹皮
陳皮

茯苓
當歸
白朮
貝母 各一兩

薄荷 七分
黃連 五分

醫方考蒙 卷五

十七

右水煎服

柴胡散 婦人雜病寒熱往來

柴胡 三錢 地骨皮 一錢 黃芩 三錢 桂 二錢

甘草 三錢 荆芥 二錢

右水煎服

芎藭湯 婦人血風攻注身體疼痛頭目昏眩口苦舌乾多

困少力時發寒熱

芎藭 芍藥 牡丹皮 各一兩半 羌活

甘草 防風 甘菊花 各二兩 柴胡

前入半夏 各一兩

右薑薄荷水煎

小柴胡加地黃湯 熱入血室及血熱諸症

即本方加地黃○又本方加檳榔紅花五靈脂治瘀血

疼痛効

柴物湯 婦人血氣諸疾

即小柴胡湯合四物湯

如聖散 婦人血氣不足月水不調五心煩熱飲食無味胃

膈不利

柴胡 茯苓 甘草 地黃

人參 當歸 各一兩 鼈甲 胡黃連

沈香 知母 各半 葛根 桑寄生 各五分

右水煎服

婦人血脈若血崩者服之住血隔者服之通方

地黄 生熟

甘草

柴胡

芍藥

當歸

地骨皮

牡丹皮

玄胡索

川芎 各二兩

右同古老錢一兩文煎至熟入麻油一兩點煎服

雜病諸方

仲景甘麥大棗湯ヲ用テ藏燥ヲ治シ腎氣丸ヲ用テ轉胞

ヲ治シ半夏原朴湯ヲ用テ咽中炙鬱ヲ治ス皆權治ニ出

テ其類一ナラス今此ニ雜出シテ以テ臨處ノ用ニ備フ

ト云

四七湯 婦人女子小便不順甚者陰戶疼痛

五於於半夏厚朴湯加香附子甘草煎成加琥珀末調服

桂枝四七湯 風冷寒邪搏心腹作痛

即前方合桂枝湯加枳殼人參

抑氣散 婦人宜血盛氣衰此乃主氣盛於血所以無子頭

暈膈滿體痛怔忡皆可服

赤芍 香附子 四兩

茯苓 一兩

橘皮 二兩

甘草 一兩

右水煎服

桂枝紅花湯 婦人傷寒發熱惡寒經脈凝滯

於桂枝湯加紅花

通神湯 婦人大便不通熱而實者

大黃

芒消

檳榔

桃花

郁李人 各一兩
木香 半兩

右水煎服 婦人大便不通心腹虛脹

牽牛子散 婦人 四角
生用 青橘皮 二兩
木香 一兩

右為末蜜丸溫水下

赤茯苓散 婦人血分腹脇鼓脹四支浮腫肩背壅悶

茯苓 各三
芍藥 各三
大黃 二兩
鼈甲

枳殼 各半
桂心 各半
枳殼 各半

郁李 一兩
半 牽牛 三兩
微炒

右姜水煎服

正氣天香湯 婦人一切氣脇肋刺痛月水不調

烏藥 二錢
香附子 八錢
陳皮
紫蘇 各一

乾姜 半錢

右水煎服

釣藤散 肝厥頭暈清頭目

釣藤 陳皮 半夏 麥門冬 炙甘草

茯苓 人參 防風 甘菊花 各半

甘草 一分 石膏 一兩

右姜水煎服

寧志膏 婦人因出血多心神不安不得睡語言失常

琥珀 各一
酸棗人 人參 茯苓

琥珀 各一
乳香 一錢

右細末濃煎燈心棗湯調下○或蜜丸薄荷湯下

連翹湯 妬乳乳癰

升麻 杏仁 射干 大黃

防己 黃芩 柴胡 各三兩

甘草 各四兩

右水煎服

蛇床子湯洗方 婦人舉體痒如蟲行皮膚上搔之皮起欲

成瘡

蛇床子 三合 蒺藜子 三合 防風 三兩 大黃 一兩

大戟 三兩 菴蔚子 三合 白礬 三兩

右水煎入酒更煎洗之

鷹取白朝散

信長公侍士鷹取新五左衛門家方 婦人血暈破傷諸血病

當歸 四錢 芍藥 地黃 四錢 川芎

茯苓 四錢 人參 紫檀 陳皮

大黃 四錢 縮砂 沈香 白芷 四錢

甘草 三分 木香 藿香 四分

右沸湯擺用

味勝湯藥用
 六寶丹
 萬應膏
 寶鏡
 鳳凰血藥
 白芷
 刺刺
 川芎

小兒門

小兒ノ醫療最難ト稱ス何トナレハ體氣未充語言
 未發四診全ク備ルヲ得ズ蓋面ヲ察シ聲音ヲ考
 外證ニ因テ内証ヲ認ム此其難シトス所以
 是ヲ以テ古來啞科ノ一門ヲ立テ專ラ顛顛ノ疾
 痲ヲ療セシム然レモ倉卒病發スルニ臨テ醫タル
 豈手ヲ束テ坐視スルヲ得ンヤ仍テ今證治
 概略ヲ舉テ子弟輩保赤ニ用ニ備フ其詳義非至
 此編ノ悉ス所ト非ルヲ觀觀點云云文マ
 初生
 其淵
 初生ノ病ニ臍風撮口ノ證アリ聚口撮面計テ哭聲不出

乳哺スルヲ能サレナリ此熱毒腸胃鬱結閉テ通ス
ルヲ得サルナリ其臍風ト云ハ斷臍ノ後保護ヲ慎ス水
濕臍ヲ傷テ發ス故ニ古人モ臍突臍腫臍濕ト云文アリ
此其因少別ナリ又古法小兒初生ニ甘草ヲ與ヘ朱蜜
ヲ與ヘ牛黃ヲ與ル法アリモ繁雜ニ今施シカク因
テ甘連湯ヲ以テ初生ノ套劑ト爲セリ又爲口舌腫等ノ
證アリ左ニ錄ス古來秘傳ノ一門モ立テ專ニ臍腫ノ疾
甘連湯小兒初生必有惡汁留於胸次若不消去即胸膈
壅塞易生蘊熱驚癇瘡癩皆由此也
甘草一分 黃連一分
右水煎以綿裹如乳頭沾藥與兒吮之○或加大黃紅花或

更加鷓鴣菜効

百壽散 除熱定精神

黃連

辰砂

右水煎拭口涎淨灌下○或加牛黃入蜜煎服

龍膽湯 小兒初出面目悉黃而啼閉目聚口撮面口中乾

燥四支不能伸縮

龍膽

釣藤

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草

各六銖

右水煎服

平和飲子 小兒初生日及百啐與之

醫方考卷五

平味甘參 小兒茯苓 日炙甘草 升麻 各一

右水煎與之○或加白朮或加芒消

五香散 小兒總治諸熱蘊毒諸痛結核

沈香 丁香 木香 乳香

藿香 等分

右水煎服

紅花散 小兒一切胎毒 惡黃而翳閉目渠口瘡面口中瘡

紅花散 小兒一切胎毒 惡黃而翳閉目渠口瘡面口中瘡

丁香 連錢草 桔梗 檳榔

百藥香 各一分半 甘草 少許

右水草煎服

柴胡散 煎變蒸經時不止挾熱心煩啼叫

柴胡 甘草 人參 玄參 各一

小兒龍膽 半兩 麥門冬 兩半

右水煎服

黑散 小兒變蒸挾時行溫病

麻黃 二兩 大黃 一兩 杏仁 二分熬 研如脂

右水煎服 原方同搗用或三味並 炒黑研細用溫水下

古法紫丸方 即宋以後 稱紫圓者

赤石脂 三兩 代赭 各一兩 古方一兩 當今三分四厘八毫

巴豆 三十枚去 皮心熬 杏仁 五十枚去 尖皮熬

右四味搗代赭等二味為末巴豆杏仁別搗如膏又內二

醫方考卷五

二十四

醫方類聚卷之五

味合擣三千杵自相和若硬入少蜜此二硬キハ少蜜

方ハ巴豆杏仁ノ油ニテ藥ヲ和スルト見ユ更擣蜜器

若和セサルトキハ蜜ヲ少シ加ヘシトナリ中盛封之三十日兒服如麻子一九百日兒服如小豆一

古丸以此準量増減也後世ハ巴豆用厚紙槌去油ト云フ又爲末爛飯杵丸小豆大ト云ハ

永類鈴方ニ見ヘタリ柴圓ハ小兒ノ一大要藥ニシテ小兒變蒸發熱不解並ニ傷

寒温壯痰癖驚積食癩酌商量ノ用ルトキハ小兒百疾ニ

効アラスト云フナシ

小兒口瘡不得吮乳方

大青 黃連 各二兩

藥右水煎服

青金散 小兒白口瘡

青黛 四錢

右細末調掃口瘡○或用乾胭脂枯礬

鷲口瘡ハ紗帛ヲ以テ指ヲ纏ヒ水ニ浸シ舌上ヲ拭ヒ白

垢ヲ去テ前藥ヲ傳ク良ナリ清心散モ亦効アリ清心散見中風

斷臍ノ後ハ臍上ニ當テ大艾炷三十餘壯ヲ灸スヘシ古

人モ令兒強壯ト云ヘリ又治臍濕方枯礬一龍骨一分末

シ麝少許ヲ入レ臍ヲ拭乾シ之ヲ傳ヘシ

洋法小兒宜ク通風ノ室ニ居ヘシ常ニ日光ヲ射入セシ

ム晦暗ニ宜シカラス身須ク温暖スヘシ濕地ニ居ラシ

ムルヲ勿レ足ハ寒露スルヲ勿レ宜ク勤テ身體ヲ洗滌

シ衣被ヲ脱換スヘシ毎ニ見ル小兒ノ皮病疥癬ノ類多クハ汗孔汚塞ノ致ス所ニ因レリ又云小兒六七月ヨリ一年餘ニ至テ多哭ノ夜臥不能ス或腹痛瀉泄シ或抽搐驚癇ヲ爲ス皆生牙ノ病ヲ致スニ因ル口熱牙肉痛口水多キモノ母ノ指ヲ兒口ニ入レテ牙面ヲ擦スレハ兒最快適ナリ或甘草一條ヲ用テ蜜ヲ醃シ兒ヲノ咀咬セシムルモ亦佳ナリ時有テ牙肉紅腫シ人ヲノ擦セシメス發熱面紅ニ口渴シ驚駭シ夜臥大ニ安カラサルハ牙肉緊ニ出シト欲シ出サルニ因ル法牙刀ヲ用テ或圓口或三角口ニ牙肉ヲ將テ割開シ小牙割クト一直口大牙ハ縱横ニ割テ十字形ヲ成シ均

ク割テ牙面ニ至レハ即時ニ快適ニシテ所患ノ病症愈ト云ヘリ此說漢人未言サル所ナリ

癇

醫書ニ變蒸ト云モノ或此症ニ近シト爲ス

小兒ノ癇ハ聖惠方以後驚風ト稱ス急驚風慢驚風ノ二証アリ急驚ハ陽ニ屬シ實ニ屬ス其候遍身壯熱氣麁涎潮四肢拘急筋脉抽掣項背強直上竄直視牙關緊急大小便黃赤其脉浮數洪緊治法宜ク涼瀉スヘシ慢驚ハ陰ニ屬シ虛ニ屬ス其候或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩頭目搖動驚跳搐搦乍發乍靜在苒經日其脉沈遲緩散或急驚ニ寒涼ノ藥ヲ過用シヨリ慢驚ニ變スルアリ治法並宜ク温補スヘシ又慢脾風大抵慢驚ノ後吐瀉脾ヲ損シテ

醫方啓蒙 卷五

リ傳變ス噤口咬牙手足微搐ノ收ラス或手足冷ヘ其脉沈微是極テ治シ難シトス今其方法ヲ撰ノ左ニ撮ス

〔急驚風〕 嬰兒血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣及變蒸不解

龍膽湯 嬰兒血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣及變蒸不解

諸驚癇 方見初生

柴胡加大黃湯 急驚風最利痰熱

小柴胡湯本方加大黃

柴胡加龍骨牡蠣湯 驚癇

即本方

風引湯 少小驚癇瘳癢日數十發除熱

即本方

釣藤散 小兒驚癇仰目嚼舌精昏悶

釣藤 半兩 龍齒 一兩 石膏 三分 梔子人 一分

黃芩 半兩 大黃 半兩 麥門冬 三分

右水煎服

竹瀝摩犀角飲子 小兒心熱驚悸

竹瀝 二合 犀角

右將犀角於竹瀝內磨令濃服之

牛黃丸 小兒大便不通心中煩熱

牛黃 一分 大黃 三分

右煉蜜丸粥飲下

無價散 風熱喘促悶亂不安俗謂之馬脾風

醫方啓蒙 卷五

二十七

雜藥辰砂二分 輕粉五分 甘遂一分

右細末每服一字用溫漿水少許入滴油一點挑藥在上

沈下去却以漿水灌之立効

天竹黃丸 小兒胎風搐搦壯熱多驚

天竹黃半兩 天南星半兩 鉛霜一分

胡黃連半兩

牛黃一分

右為末棗肉和丸服之必獲効

〔慢驚風〕

烏蝎四君子湯 慢驚風

四君子湯加川烏全蝎

右姜棗煎服

烏沈湯 慢驚驅風助胃

天麻二分 人參五分 川烏

南星 木香 沉香各二分 甘草半分

右姜水煎服

沉香天麻湯 驚癇發搐痰涎壅塞目多白睛項背強急醒

主後復發數十日不差神思如癡脉沉弦而急多服鎮墜寒

涼之劑復損其氣

中沈香 木香 益智 川烏各二分 天麻

防風 藜蘆 半夏二分 附子各三分 羌活五分

甘草 姜蠶 當歸各一分

右姜水煎服

人參牛黃散 小兒驚熱

人參 牛黃 等分

右為末以薄荷水調之

理中湯加木香 慢驚風

即本方加木香或更加附子

生氣散 諸風疎利後以此調氣

丁香 三字 白朮 青皮 甘草 各二

木香 人參 各一

右水煎服 甘草 半

異功散 温中正氣吐瀉不食

人參 茯苓 白朮 甘草

橘紅 木香 各等分

右薑棗水煎

定命散 慢驚吐瀉困重欲傳慢脾

半夏 茯苓 木香 老姜 各一

白朮 甘草 各半

右姜棗水煎

沉香散 生胃氣止吐瀉

茯苓 沉香 丁香 木香

藿香 厚朴 二錢 甘草 一錢

右水煎服

醒脾散 慢驚吐瀉不止 附子 四錢 茯苓 二錢

肉豆蔻 檳榔 胡椒 茯苓

木香 藿香

右水煎服

參附湯 元氣虛脫將成慢驚

附子 人參 丁香

右姜水煎服

加味回陽飯 慢驚面青四肢逆冷泄瀉不止

人參 白朮 山藥 茯苓

甘草 附子 全蝎 赤石脂

右水姜煎服

〔慢脾風〕

黑附湯 慢脾風盛四肢厥冷

附子 炮二 木香 白附子 甘草

右姜水煎服○或加人參

沉附湯 慢脾風厥冷吐瀉

沉香 丁香 木香 黑附

白附 全蝎 藿香 天麻

右水煎服一兩

生附四君子湯 慢驚風搖頭斜視昏困喜睡額上汗多身

赤粘汗其聲沉小而焦

即本方加生附

〔急慢通治〕

釣藤湯 卒得痢

釣藤 甘草 等分

右水煎服

小兒驚癇癡掣方

右取熊膽一兩豆大和乳汁及竹瀝服汁並良得去心中

涎至良

抑肝散 虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸或嘔吐痰涎腹脹

少食睡臥不安

柴胡 甘草 川芎 各五分

白朮 茯苓 釣藤 各一分

右水煎服

羚羊角散 小兒驚風及五癇癩癧

羚羊角 半夏 當歸 各五分

天麻 茯苓 人參 各三分

白朮 釣藤 各三分

右水煎和角汁服

釣藤飲 小兒驚熱眠睡不穩

釣藤 蚱蟬 犀角 各三分

升麻 石膏 柴胡 甘草 各半

右水煎入竹瀝服

胡黃連丸 小兒驚癇退上焦熱

胡黃連 天竹黃 膚會 熊膽 各一分

醫方考卷五

膩粉各半 麝香 牛黃 雄黃

龍腦各一

右細研軟飯丸粥飲下

疳

疳ハ古人乳哺不節肥甘過度所致ト爲ス其証頭皮光急
毛髮焦稀顛縮鼻乾口臭唇白兩眼昏澁揉鼻擗眉脊聳體
黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白瀉泔肚脹腸鳴癖結潮熱酷ニ
瓜菓鹹酸炭末泥土ヲ嗜テ吞水欲飲モノ皆疳ノ候ナリ
凡疳在內ハ目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱是ナリ
疳在外ハ鼻下赤爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生瘡
是ナリ又五疳トテ五藏ノ疳アリ蛔疳アリ疳利アリ疳

眼アリ疳癆アリ走馬疳アリ丁奚哺露ト云アリ疳蠹疳
癖ト稱スルアリ其他名目甚多シ此篇ノ盡スヘキニア
ラス今尋常應用ノ方法一二ヲ採摭シ左方ニ掲ク學者
尚諸醫書所載ヲ攷テ臨處ノ用ト爲ス可ナリ
柴胡飲 骨蒸疳氣五心煩熱日哺轉盛口乾無味渴多身
瘦胸滿痰緊小便黃

柴胡 人參 當歸 黃芩
芍藥 甘草各一 大黃 桔梗
五味 半夏各半

右烏梅生姜水煎○或加鱉甲胡黃連
小兒食疳諸積腹大肢瘦方

醫方考卷五

醫方考卷五

青橘皮 白朮 山檀肉 麥芽

穀芽 兩各一 半夏 升麻 各八

右水煎服

黃芪湯 疳勞

黃芪 當歸 川芎 芍藥

地黃 蝦蟆 鱉甲 人參

茯苓 橘皮 半夏 柴胡

甘草 史君子 各一

右姜棗水煎

淨府湯 小兒腹中癍塊發熱口乾小便赤

柴胡 茯苓 澤瀉 三稜

豬鬃 山查 黃芩 半夏

白朮 猪苓 人參 甘草

胡黃連 各三

右姜棗水煎

抑肝扶脾散 補元氣健脾胃退熱消癍

黃連 白朮 茯苓 龍膽

桑寄生 山查 陳皮 青皮

神麵 胡連 柴胡 甘草

右姜棗水煎

消痞飲 小兒疳疾身熱面黃肚大青筋瘦弱

醫方考卷五 三十三

諸疾人參 白朮 白朮 白朮 黃荻 荻 荻 荻 黃連

神麴 砂仁 甘草 胡黃連

青皮

右水煎服傷食加山查有蟲加使君子

甘草

集聖丸 冷熱新久一切疳証

黃連

蘆薈

五靈脂

夜明砂

陳波

青皮

蘇莪

使君子

木香

當歸

川芎

人參

黃連

蟾蜍

各三

砂仁

二

右末猪膽一枚取汁將前末和勻米糊丸服草

龍膽湯 疝病

龍膽 小兒 釣藤

柴胡

桔梗

芍藥

川芎

茯苓

甘草

人參

一

大黃

二

右水煎服

大黃煎丸 無辜閃癖或頭乾癩癩頭髮黃聾或乍痢乍差

諸狀既多不可備說

大黃

九兩錦文新實者若微朽即不堪用削蒼皮乃秤

右搗篩為散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鑪中

浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木篋攪藥候堪丸乃

停於小蓋器中密貯服以下青赤膿為度此藥唯下膿及

宿結不令兒痢

麝香熊膽丸良小兒無辜疳面黃髮直時發肚熱飲食不成

肌肉... 麝香 半兩 熊膽 二錢 蘆薈 三分 胡黃連 大者一枚去足并腸胃燒灰研

黃連 各一兩 使君子 十枚 乾蟾 大者一枚去足并腸胃燒灰研 蘆薈 三分 胡黃連 大者一枚去足并腸胃燒灰研

右末以白麪稀糊和丸米飲下

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

大蘆薈丸 治疳殺蟲和胃止瀉

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

蘆薈丸 小兒疳疾

少可壯、有及所、非、因、今世間通治、方法一、二、ヲ
據、此篇、三舉示、ス、異、十、八、宜、本門、一、照、レ、藥、ヲ

釣藤散、小兒驚啼、壯熱心煩、不得穩睡

本釣藤、龍膽、犀角、屑、茯苓、米、煨、下

黃芩、甘草、各等分

右水煎服

四物解肌湯、痘疹與傷寒疑似之間、可先與之

正百芍藥、黃芩、升麻、葛根、各半兩

右水煎服

升麻葛根湯、傷寒温疫、風熱瘡疹已發未發

即四物解肌湯去黃芩加甘草

惺惺散、傷寒時氣、風熱痰壅、欬及氣不和

桔梗、細辛、人參、甘草

茯苓、白朮、括蘂根、薄荷、各一兩、三片

天右姜水煎服、調不、合、鼻、塞、不、通

人參、犀角散、疳勞、夜汗、頰赤、多嗽、不止

六刺人參、白朮、犀角、各半兩

柴胡、鼈甲、甘草、半夏、各一分

右姜棗水煎

五苓散、加車前子、薏苡、陰囊赤腫、脹痛

紫圓、小兒乳哺不節、化爲痰癖、痰滿則搖、日久爲癩、此藥

水以消乳食、使痰氣隨下、其證自然磨退、良妙、此藥固是

醫方考卷五

小兒之妙藥也 方見初生

黃耆丸 小兒羸瘦體熱面色萎黃不欲乳食

黃連 胡黃連 柴胡 三分

麥門 各一兩 鼈甲 各一兩

右水煎服 甘草 各一兩

六味地黄丸加紫河車 解顛白散

此方為丸服自合○今以天靈蓋代紫河車亦効

天南星散煎顛開不合鼻塞不通

天南星 大者微炮去皮

右為細末淡醋調塗緋帛上貼顛上火炙手頻熨之立効

半夏熨 小兒腦長解顛不合羸瘦色黃至四五歲不能行

半夏 生姜 芎藭 各一兩 細辛 三兩

桂心 一尺 烏頭 十枚

右以醇苦酒五升漬之醉時煮三沸去滓以綿浸藥中適

寒温以熨顛上

白朮散 小兒嘔吐脉遲細有寒

肉豆白朮 人參 各二兩 半夏 半兩 茯苓

炮姜 甘草 各一兩

右姜棗水煎

大黃散 小兒疹氣發即緊痛不欲食

大黃 半兩 鼈甲 一兩 木香 一分 三稜 半兩

檳榔 半兩 麝香 一分 甘草 半兩

右爲散以粥飲調下

小兒心腹痞滿瘦黃瘦瘠四肢痿痺繚戾方

大黃芍藥小兒宜黃耆 阿膠一分 沙糖半兩 甘草一分 肉豆蔻等分

柴胡八分 茯苓六分 甘草 乾薑各二分 人參各四分

右水煎服○或加枳實大黃

肉豆蔻圓 小兒夾驚傷寒大便瀉青腹疼

白朮二錢 肉豆蔻半錢 人參一錢 白朮二錢 藿香半錢

丁香 木香 甘草各一錢

右水煎服 異功散

胃氣不和臍府泄瀉不思乳食或哕乳吐逆

藿香 白朮 人參 茯苓

陳皮 木香 甘草 肉豆蔻等分

右紫蘇水煎

傷冷氣涎喘多方

菰蘆大者一箇開蓋 阿膠一分 沙糖半兩

二味入菰蘆內蓋着白紙封飯甑蒸兩遍傾出冷服

半夏丸 痰鳴涎響欬嗽喘逆

大蘿蔔一個小竅ヲ開テ罐ト成シ半夏半兩好醋ニ煮

テ赤シ研ノ泥ノ如ニシ朱砂雄黃各一錢ヲ入レ菉豆

大ニ丸シ姜湯ニ下ス

治爛胎方 小兒驚風 面赤身熱 實不除 胎動不安

天竺黃 蚌粉等分

右蜜調塗爛頭喫

升麻飲子 小兒藏府積熱面赤煩渴痰實不利腸胃燥澁

一切風壅

山梔子

防風

甘草

黃芩

大黃

菜豆

大連翹

升麻

等分

半右水煎服如大便不通加芒消

藍葉散 小兒月內發一切丹

藍葉

一兩

黃芩

一分

犀角

半兩

大黃

柴胡

大梔子

各一分

升麻

石膏

各一分

石膏

分半

甘草

半分

右水煎下竹瀝服

防風升麻湯 總治十種丹毒

防風

升麻

梔子

麥門

荆芥

木通

乾葛

薄荷

玄參

牛蒡

各一分

甘草

減半

燈心

十莖

右水煎服便閉加大黃

五香連翹湯 小兒風熱青腫或惡核瘰癧附骨癰疽白丹

白瘰

木香

薰陸

沈香

丁香

黃芩

連翹

海藻

射干

升麻

枳實

各一分

麝香

半分

大黃

八分

右水煎入竹瀝服

醫方啓蒙附錄
四診要訣

醫方啓蒙附錄
四診要訣

醫方啓蒙附錄
四診要訣

醫方啓蒙附錄
四診要訣

醫方啓蒙附錄

四診要訣
內經云診法常以平且陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻乃可診有過之脈是診病之定期ナリ然レ

凡病之倉卒ニ發スルカ或遠方請來ノ病人ハ此例ニ拘ルコトヲ得ス宜ク其時ニ臨テ診察スヘシ

病ヲ候フニ四診ヲ以テ四診トハ何ソ望聞問切是ナリ

望トハ何ソ色ヲ望ムナリ問トハ何ソ証ヲ問ナリ聞トハ何ソ聲ヲ聞ナリ切トハ何ソ脈ヲ切スルナリ

凡望法ハ病人ニ對シ先眼中ヲ見ルヘシ是目ハ五藏六

醫方啓蒙附錄 四診要訣

腑ノ精華聚ル所ナレハナリ次ニ明堂關庭ヲ察スヘシ
 是五色ノ現ル所ナレハナリ夫ヨリ舌上ヲ視テ舌胎ノ
 有無厚薄乾燥滋潤黃黑芒刺等ヲ詳ニスヘシ是又望色
 以一端ナリ舌上ハ診脈畢テ後見ル
 次ニ病人ノ様子ヲ問ヘシ寒熱ノ有無汗ノ出不出飲食
 二便身體ノ痛痺心腹ノ悶疼病發ノ時日等婦人ナレハ
 胎産ノ口經候ノ調否等子細ニ尋ヌヘシ是問法ナリ
 次ニ病人ノ言語音聲咳喘呻吟呼吸等ヲ聞ヘシ聞トハ
 聲來テ耳ニ入ルノ義ニシヨリ尋求ルニアラス是即
 聞法ナリ
 以上ノ診畢テ寸口ノ脈ヲ候ヒ足ノ趺陽太谿ヲ診スヘ

シ夫ヨリ臆中虛里ノ動ヲ診シ腹上ヲ按メ胸脇ノ痞鞭
 スルヤ否心腹ノ滿痛スルヤ否小腹ノ拘急不仁スルヤ
 或有力ヤ無力ヤ等ヲ候ヘシ是切診ノ法ナリ切トハ身
 ニ切近シテ候フヲ云

以上ノ診法必茲ニ云フ次序ニ拘ルヘカラス病者ノ
 證候疾病ノ模様ニ依テ其時宜ニ從ヒ子細ニ診察ス
 ルヲ宜ト爲ナリ



明堂關庭

醫方啓蒙 附錄

規矩太極圖

寸口圖



明堂闕庭圖



靈樞五色篇云明堂ハ鼻ナリ闕ハ眉間ナリ庭ハ顔ナリ
 顔ハヒタイノフナリ


醫方啓蒙
附錄

跌陽太谿圖



平曰同也... 脈之... 跌陽... 太谿...

虛里臆中圖



因之... 虛里... 臆中... 脈之... 虛里... 臆中...

醫方啓蒙
附錄

診脈ノ部位ハ手ノ三部足ノ跌陽太谿ナリ三部ヲ總テ
寸口ト云又氣口ト云三部ハ寸關尺ナリ又寸口關上尺
中ト稱ス寸口ヲ候フノ法ハ醫者ノ指ヲ以テ病人ノ手
腕高骨ノ所ヲ推シ下ル寸ハ自然ト中指ノ落付ク所ア
リ是ヲ關部ト定テ前指ノ下ヲ寸部ト爲シ後指ノ下ヲ
尺部ト爲スナリ人臂ノ長短ニ依テ指ヲ疎密ニ排スル
ノ說アレヒ大抵三指齊ク下ストキハ自ラ其位置ノ定
ルモノナリ三部ニ指ヲ齊クシテ是ヲ推シ或浮へ或沈
テ進退消息ノ病ヲ候フナリ古來ハ三部ニ左右藏府配
位ノ說アレヒ皆無稽ニ屬スレハ今取ラス唯十八難ニ
因テ寸ハ胸以上咽喉頭目ノ病アルヲ候ヒ關部ハ胸隔

ヨリ小腹ニ至ルノ病ヲ候ヒ尺部ハ小腹以下腰膝脰足
ノ疾ヲ候フト云ハ其理無キニハ非レヒ是又必拘ルコ
ニアラサルナリ
跌陽ハ足面繫鞋ノ所ニ在リト云テ足趺ニ在ル脈ナリ
是レ胃氣ヲ候フ脈ナリ太谿ハ内踝ノ後跟骨ノ上陷者
中也ト云テ内踝ノ下ニアリ是レ腎氣ヲ候フノ脈トス
此二脈ハ死生ヲ決スルノ要ナリ必診セスンハアルヘ
カラス
虛里ノ動ハ男女ヲ論セス左ノ乳下ニアリ洋說ニ心藏
ノ尖尾略向左ト云テ是心藏ヨリ周身ノ血脉ヲ運行ス
ル端原ナレハナリ

醫方略纂
附錄
附錄

寸口ノ脈ニ反關ト云フアリテ手腕ノ表ニ脈ノ搏ツナ
リ是ハ打撲損傷アル人力或ハ平素ノ稟質ニ因テ脈道
阻碍スル所アリテ常道ヲ失スルナリ一手反關ノモノ
アリ兩手反關ノモノアリ心得テ診メ良シ若寸口ニ全
ク應セサルハ尺澤ニテ候ヘシ又沉脈ノ極手背ニテ候
ヘキフアリ
脈名多シ古説ハ七表八裏九道ト云テ二十四脈ニ分テ
其外ニ怪脈等アリ細ニ分テカタシ初學ノ人ハ浮沉遲
數大小滑瀦ノ八脈ヲ識ヘシ仲景ノ書ニモ脈數急ト云
又靜ト云テ是皆脈狀ニシテ脈名ニ非レハ深ク拘ルヘキ
ニアラス凡テ病證ニ因テ脈ヲ診メ虛實死生ヲ決スル

フニシテ脈ニ因テ病ヲ定ムルフハ無ト知ヘシ又脈ニ有
力無力有神無神ト云フアリ神トハ脈狀中ニ欣然トシ
トコトナク神彩ノアルナリ是ヲ胃氣アルノ候ト爲ス
依稀飄渺トシテ神氣ノナキハ胃氣敗スルノ候ナリ
右ノ四診全ク備テ病証ヲ決シ方法ヲ處スヘシ四診備
ラズノ病ヲ知ルト絶テナキフナリ假令ヘ有リト雖モ
醫ノ法ニテアラスト知ヘシ
二 浮 按メ足ラズ舉テ餘リアリト云テ表ニ力ノアル
脈ナリ
三 沉 舉テ足ラス沉テ餘アリト云テ筋骨ニ着テアリ
浮脈ノ反ナリ

醫方略纂

附錄

醫方啓蒙
附錄
附錄

遲呼吸ニ三四至ノ脈ナリ
數呼吸ニ六七至ノ脈ナリ
大洪大ノ脈ニ小ノ反ナリ
小微細ノ脈ニ大ノ反ナリ
滑往來流利ノ如盤走珠ト云テスラトスヘ
瀦往來不利メ如刀刮竹ト云テサヲサヲトシフ
此八脈ニ能熟スル寸ハ其他ハ自ラ得ヘシ又怪脈ニ
至テハ平常ニ變リタル脈ナレハ心ヲ用ルトキハ更
ニ診シ易シト知ルヘキナリ

灸穴要法

針灸經穴ノ一ハ世ニ専門アリテ初學ノ粹ニ其義ヲ領
スヘキニ非ス且近來ハ洋書出テ知覺運動共ニ腦氣筋
ノ爲ス所ト云テ定論トスレハ從來ノ十二經十五絡皆
廢スヘキニ似タリ然レモ針灸ノ法ハ黃岐以來諄々ト
說來テ今ニ其効功ノ顯著ナル一ハ世人ノ知ル所ナリ
今針刺ノ經穴姑ク置テ論セス日用ニ切近ナル灸穴一
ニテ擧テ童蒙ニ便ス其詳義ノ如キハ專門ニ就テ學フ
ヲ要ト爲ス
同身寸ト云ハ病人ノ男ハ左女ハ右ノ大指ト中指ト相
屈ノ環ノ如ク中指中節ノ橫紋上下相去長短ヲ取テ一

醫方啓蒙
附錄
灸穴要法

寸ト爲シ是ヲ同身寸ト云圖アリ左方ニ附ス
 同身寸圖
 二寸五分
 一寸五分
 一寸二分
 一寸一分
 一寸一分



同身寸法
 一寸五分
 一寸二分
 一寸一分
 一寸一分

頭項部

百會 一名巔上項中央旋毛中陷可容指直雨耳尖

風府一穴 項後入髮際一寸大筋內宛宛中疾言其肉立

起言休其肉立下
 上ウナ寸ノノ大ナル筋ノ内ニ宛々トク
 ヲキ所アリ早クモ此穴ハ灸ヲ禁スト云リ

風池二穴 風府兩傍顛顛一腦空後髮際陷中按之引耳

ノ兩旁之ヲハハキノ内ニホカナル所
 ニアリ之ヲハハキノ内ニホカナル所



肩背部

肩井 肩上陷者中缺盆上大骨前直乳中兩近クノ四ナシ前
所乳ノマウヘ
通リナリ

肩肭 肩外頭近後有解宛々中ヘガヨリノタル所ニノウシ

ミアッ
アル
ルナリ
ホ

大椎 肩ト平カニン動カサル骨ヲ大椎ト爲ヘシ

凡脊椎ヲ取ル法ハ先大椎ヲ定メ臍ノウラカ俗ニヘシト

云テ十四椎ト爲シ是テ半截ノ七椎ツ、ト定メ又十

四椎ヨリ尾骶マテテ七椎トン都合二十一椎ニナル

今此法ヲ以テ經穴ヲ挨スヘシ○脊椎七八椎以下ハ

人ノ肥瘦ヲ論セス大抵辨シカタシ故ニ今此法ヲ定

ルナリ

陶道 大椎節下ト傷寒論ニ大椎第一間

身椎 第三椎下和俗ニナリケト

胸腹部

鳩尾 臆前 敝骨下其骨垂下如鳩尾心下所ナリ

上腕 鳩尾下二寸

中腕 鳩尾下三寸

水分 臍上一寸

神關 臍中也

氣會 臍下一寸五分

關元 臍下三寸

天樞 臍兩傍各二寸

期門 第二肋端上直兩乳舉臂取之乳ノ上下二肋ノマツ

リスクナリ通



章門 直臍季脇端側臥屈上足伸下足舉臂取之一肋骨ノ

末ノ穴所

京門 監骨腰中季肋本夾脊章門ノ後ニアリ監骨ト云



手臂部

少商 大指内側去端如韭葉手ノ大指ノ爪ノキリハ

勞宮 掌中中指本節内間手ノ中指ノマ

合谷 大指虎口兩骨間陷者中手ノ大指ノ次指ノ

温溜 腕後六寸一名蛇頭手ノ如キ肉ノヲ腕後ノ所ナリ蛇

下廉 去上廉一寸

上廉 三里下一寸

三里 曲池下一寸

曲池 肘外輔骨陷者中屈臂而得之ヒキチノ止リナリ

下廉ニシカウテ上ルナリ



醫方啓蒙
附錄

足脛部

三陰交 内踝上三寸骨下陷者中ノウチ三寸ヲホシ
 懸鍾 外踝上三寸ニツトクホシノウチ三寸ヲホシ
 承山 一名魚腹兌腸下分肉陷中分肉頭ニフクアリ俗ニキノ
 湧泉 足心也屈足捲指宛々中マアノウチニウアラリ
 内庭 次指外側也俗ニカラカ
 三里 膝下三寸胫骨外ニ脚氣ハス處
 委中 膕中央約紋中動脈ガアシノ中ナリカ
コカキ三
ト云




醫方啓蒙
附錄

奇穴部

風市 兩髀外可平倚垂手直掩臂上當中指大筋上捻之
自覺好

病人正ク立テ手ヲ下ケテ外臂ニ當テ中指ノサキニ
アタル所ナリ



腰眼 令病人平眼以筆於兩腰宛々中各點二穴灸七壯

病人ヲウツムケニ臥セシムルトキハ腰ノ兩傍ニ凹

ナル所アリテ眼ノ如シ左右共ニアリ此穴ナリ

痞根 專治痞塊十三椎下各開三寸半以指揣摸自有動

處即點穴灸之大約與臍平多灸左邊如左右俱有左右

俱灸

十三椎ノ兩傍各開クフ三寸半指ヲ以テサクリミレ

ハ自ラ動ク處アリ即此穴ナリ大抵ハ臍ノ通りナリ

臍四邊穴 臍ノ上下左右去臍半寸治小兒暴痢及腹中

雷鳴下利

膝眼四穴 膝頭骨下兩傍陷中宛々中是

醫方彙編 附錄

膝ヲ立レハ犢鼻ノ兩傍ニ凹處有テ眼ノ如シ是ナリ
脚氣八處灸穴

風市 伏兔 犢鼻 膝眼 三里 上廉 下廉 絕骨

第一風市穴 病人ヲツ起テ正身平立シ兩手ヲ垂テ直ニ下ノ十指ヲ舒テ掩テ兩脾ニ著テ中央ニ當ル指頭即手

第二伏兔穴 病人ヲメ夫ヲ足指累テ端坐セシメ病人ノ手夫ヲ以テ横ニ膝上ヲ掩ヒ夫ノ下傍ト曲膝頭ト

齊クシ上傍ヲ夫際ニ側メ中央ニ當ル是ナリ茲ニ夫手ノ四指ヲ横ト併テ排スルコトハ少シ然レト伏兔ト

第三犢鼻穴 膝頭蓋骨ノ上際外骨邊ノ平處ニアリ手ヲ以テ之ヲ按セハ節解ヲ得ル則是ナリ犢鼻ハ小牛ノ鼻ノ如シ故ニ名ト云テ膝蓋ニ牛鼻狀ノ骨アルナリ

第四膝眼穴 膝頭骨下ノ兩傍陷ナル者宛々タル中ニ在リ犢鼻穴ノ兩傍ニ眼ノ如キ凹處アリ

第五三里穴 膝頭骨節ノ下一夫ニアリ脛骨ノ外ニ附ク是ナリ三里ハ膝頭下

第六上廉穴 三里ノ下一夫ニアリ亦脛骨ノ外ニ附ク

第七下廉穴 上廉ノ下一夫ニアリ亦脛骨ノ外ニ附ク

第八絕骨穴 脚外踝上一夫ニアリ一云四寸

脊際穴 大椎ヨリ十七椎ニ至テ脊ヲ挾テ左右各半寸

醫方彙編

附錄

四花患門穴法 喉外臺ニ崔氏ノ説ヲ載テ後人は是ヲ
 用ルニ頗効功アリ其文モ甚明暢ナレモ圖ヲ以テ示
 スノ捷經ナルニ若ス今因テ其圖説ヲ左ニ掲録ス
 先定穴患人ヲ平立シテ正シカラシメ一繩子ヲ取テ
 男ハ左女ハ右其繩ノ前頭大指ノ端ト齊クシ後頭ハ
 脚跟中心ニ當テ後ニ向テ繩ヲ引キ肉ニ貼シ直ニ上テ
 曲睭ノ大横紋ニ至テ截斷ス




又患人ヲノ髮ヲ
 解キ向ニ截ル所
 ノ繩ノ一頭ヲ鼻
 端ニ齊メ繩ヲ引
 テ上ニ向フ骨ヲ



醫方啓蒙
附錄
附錄

鼻端ニ齊スル繩子ヲ以テ量テ上ニ向ヒ頭縫ヲ循テ腦
後ニ至リ脊骨ヲ循テ繩頭ヲ引テ下ニ向ヒ繩ノ盡ル所
ニ至リ脊骨ニ當テ墨ヲ以テ記ス此假點ナリ



又一繩子ヲ以テ口上ニ按シ兩頭口吻ニ至リ繩子中心
ヲ鉤起メ鼻柱下ニ至リヘノ如クナラシメ口吻ニ齊メ
截斷ス



醫方啓蒙
附錄

口吻ヲ量ル繩子ヲ展ヘ直シ前來假點ノ處ニ於テ横ニ
量テ兩頭ニ黑點ヲ以記ス是患門ナリ

患門二穴



白圈是灸點ナラス
黑點即灸穴ナリ

又患人ヲ平身正坐セシメ一繩ヲ取テ項ヲ遶ラシ前
ニ向テ雙垂シテ鳩尾ト齊メ其繩ヲ截斷ス



却テ前ノ繩頭ヲ翻メ項後ニ向ヒ前ハ喉嚨結骨上ニ當
テ兩頭ハ項ヲ夾テ雙垂シ脊骨ニ循テ下ニ向テ兩繩頭
ノ盡ル所ニ白圈ヲ以記ス



ニ向テ雙垂シ又結骨ノ脊ノ其間ヲ對過ス
又患人ニ向テ其項ヲ夾テ一繩ヲ束テ其ノ盡ル所ニ前


又一繩子ヲ以テ人ヲメロヲ合セシメ横ニ量リ兩吻ニ
齊メ截斷ス
口吻ヲ量ル繩子ヲ用テ
脊骨白圈上ニ於横ニ量
リ墨
ヲ以
テ點
定ス



白圈是假點
黑點是灸穴

是第一次點穴

患門四花總圖



黑野是灸穴白圈是灸穴ナラス

四花四穴



第二次口吻ヲ量ル繩子ヲ以テ第一次雙繩頭盡ル處ノ
白圈ニ於テ直上下直繩頭ノ盡ル所ニ墨ヲ用テ點ス前
ニ合メ四穴是四花ナリ

醫方類聚
附錄

醫方類聚
附錄

愚問四辨



黑髮身灸穴白國蚤灸穴ナク

啓蒙餘語 此編ハ啓蒙ノ彙成ル後診脉灸穴藥品ノコナト記

ト一ノ小冊子ト作サント思シニ又考レハ此等ハ皆

前人ノ成書アリテ捷經ト爲ヘキモノ多シ因テ其

事ヲ止リニ鹿鳴主人ノ子ニ囑シテセメテ傷寒

六經ノ大略ヲモ書綴リテヨトアルニ辭スルヲ得

ス六經ノ私説并ニ偶思ヒ出セルコ四五條ヲ錄シ

且邦人撰著ノ書裨益ニナル人キモソ一二ヲ舉ク

漢人ノ書ハ醫經經方自ラ業ヲ積テ讀ヘキナレハ

茲ニ載テス畢竟童蒙ノ早ク晤ラシクヲ欲スルナ

...

...

...

醫方啓蒙 附錄 啓蒙餘語 二十一

傷寒六經ノ目ハ古來紛紜トシ統歸ナシ三陽ノ證ハ稍
 確説ニ建三陰ノ証ニ至テハ各家ノ私見ヲ以テ斷シ
 タレ歟人定ノ説アルコトナシ今竊ニ經文ヲ考ヘ諸家ヲ
 折衷以テ人定規ヲ爲ス是又私見ヲ免レヌト雖トモ
 今日ノ寒熱上ニ於テ尤觀者スルニ似タリ其詳義ニ至
 テハ拙著ニ寒論疏義并ニ析義ニ辨シタリ今其概畧ヲ
 茲ニ掲ク太陽病ハ表裏熱實ノ證ナリ古人ハ裏ト胃ト
 造ハ陽明ヲ指セヒ裏ト胃トハ其部位ハ頭項腰脊下焦ナ
 リ下焦ハ腸胃外少陽病ハ半表半裏熱實ノ證ニシ其部
 位ハ胸脇ヲ指シ云ナリ陽明病ハ胃中熱實ノ證ナリ其
 部位ハ中焦ニテ即胃中ノ病ナリサテ少陰病ハ太陽ト
 部位ハ中焦ニテ即胃中ノ病ナリサテ少陰病ハ太陽ト

表裏ヲ爲モシニ表裏虛寒ノ證ナリ厥陰病ハ少陽ト
 表裏ヲ爲シ半表半裏虛寒ノ證ナリ太陰病ハ陽明ト表
 裏ヲ爲シ胃中虛寒ノ證ナリ凡テ太陽ト少陰ト對待ス
 少陽ト厥陰ト對待ス陽明ト太陰ト對待ス太陽虛スル
 トキハ少陰ニ變シ少陰實スルトキハ太陽ニ變ス少陽
 ト厥陰陽明ト太陰モ此理ニ同シ其變化ニ至テハ陰陽
 互ニ轉スヘシ此三陰三陽ノ大略ナリ如是看做ストキ
 ハ今日ノ病上ニ摸捉スル所アリテ判然トシ明了ナル
 コトヲ覺フ猶拙著ヲ熟觀スルコトヲ要ス
 厥陰病ハ從來稀有ノ證ニシ陰極テ陽ニ變スルト爲ト
 雖モ予カ説ハ大ニ異ナリトス厥陰ハ少陽ト表裏ヲ爲

少半表半裏寒証ナレハ其實スルトキハ必少陽ニ變ス
故ニ寒トナリ又熱トナル証トハ經文ニモ少陽ニ小柴
胡ヲ主トシ芍薬連ヲ苦寒ト人參ノ甘温ト配合シタリ厥
陰ニ烏梅丸乾薑芍薬連人參湯ヲ主トシ寒温錯雜ノ方ヲ
處シタリ此其證ノ相對シ互ニ相變スルノ一據ナリ後
世ニ既濟湯復元湯ハ厥陰部位ノ藥ナリ因テ今一方ヲ
製ス其原方ハ顧憲章カ傷寒溯源ト云書ニ見ヘテ小柴
胡湯ニ半夏ヲ去テ竹葉麥門附子ヲ加ヘテ此ヲ既濟湯
ト名ク今此方ニ就テ小柴胡湯本方ニ半夏去竹葉黃連
附子ヲ加ヘテ柴胡附子湯ト名テ少陽ノ厥陰ニ變シ厥
陰ノ少陽ニ轉セントスル証ニ用テ効アリ今世ハ厥陰

ノ証ニ用テ効アリ今世ハ厥陰ノ証太タ多ケレト能其
証ヲ認得ル醫尠シト爲ス
柴胡附子湯ハ原南陽カ柴胡四逆湯ヲ製シタル同位ノ
証ニ用ル方ナリ但附子ノ銖量多寡ニ至テハ則増損斟
酌甚難シ過レハ則熱ヲ増シ及ハサレハ則効ナシ苟モ
其機ヲ詳ニシ而是ヲ審諦セサレハ用ヒ易カラス今其
證ノ大略ヲ擧ルニ傷寒過經煩熱引日不解脈洪數ト雖
モ必根柢ナシ表翕熱スト雖モ手ヲ燎カ如ナラス舌苔
黄燥ト雖モ必少潤アリ精神昏スト雖モ必夢語喃々々
ラス四支熱スト雖モ或微冷アリ大便燥ト雖モ時乃微
利ス口中渴スト雖モ大引飲セス好冷好熱證々對勘ス

レハ乃是厥陰寒熱錯雜ノ證タルヲ瞭然トシ明ナリ宜
ク此方ヲ處スヘシ但此湯用後舌苔少退キ饘粥微ニ進
ミ精神稍了了トシ脈ニ根柢アリ共ニ是佳兆ナリ若此
一候アレハ此方ヲ持重スルヲ長トス或附子ノ剛燥恐
テ勿勿方ヲ易レハ遂ニ効ナシト知ヘシ
大柴胡湯ハ本方ニ大黃ヲ脱シタルナリ既ニ經文ニ下之
則愈ト云太陽下之解ト云可下當下之ト云腹滿方後ニ
モ若不加大黃恐不爲大柴胡湯ト云寸ハ方中ニ大黃ノ
脱落シタルヲ疑ナシ然ルニ當今ノ醫ハ宋板大柴胡湯
トテ大黃ナキ方ヲ指メ云ハ差ヘリ若大黃ヲ用サルト
キハ大柴胡去大黃ト云テ宜キナリ

小柴胡湯及半夏甘草生姜三瀉心湯ハ再煎メ用ル藥ナ
リ小柴胡ハ方後ニ以水一斗二升煮取六升去滓再煎取
三升トアリ漢ノ一升ハ今ノ一合餘ニ當ルナリ瀉心ハ方後ニ以水一斗
煮取六升去滓再煎取三升トアリ煮トハ物ヲ入レテ煮ルトハ物ヲクテ煮
カライリニ此ハ皆少陽部位ノ藥ニシテ芩連ノ寒藥ト參
姜等ノ熱藥トヲ配合メ用ユルナレハ此ヲ再煎スルト
キハ寒熱混淆メ偏寒偏熱ノ碍ナク少陽半表裏ノ証ヲ
和解スト云ニ相當スル藥ナリ然ルニ今世ハ醫モ俗モ
其煩ヲ厭テ再煎メ用ルモノナシ故ニ其効必尠シト知
ヘシ
仲景ノ人參ヲ用ル其証三アリ曰小柴胡湯甘草半夏生

醫方啓蒙 附錄
姜三瀉心湯曰白虎加人參湯竹葉石膏湯曰四逆加人參湯茯苓四逆湯附子湯凡藥ハ其配合ニ因テ功ヲ異ニスルモノニシテ柴胡瀉心ハ少陽部位ノ藥ナレハ胃ニ陽氣ノハリヲ附テ邪ヲ中焦ニ入レマシキ爲ナリサレモ邪熱ニ得ルコトモアレハ芩連ノ寒涼ト配シ且再煎シテ混和スル寸ハ些モ邪熱ニ礙スルコトナクシテ効ヲ奏スヘシ今日ニ用テ如法再煎スル寸ハ又白虎加人參竹葉石膏決シテ人參ノ熱ヲ助ルノ患ナシ又白虎加人參竹葉石膏ノ人參ハ胃中ノ津液ヲ生シ煩熱ヲ清スルナリ四逆加人參茯苓四逆附子ノ三方ニ用ル人參ハ元氣ヲ鼓舞シ回陽ノ資ト爲スナリ如此人參ノ功ハ三様ト爲シ見ヘシ然ルニ東洞家ハ人參ヲ一概ニ心下痞鞭ヲ治スルモ

ノト爲シ白虎四逆ノ類モ痞鞭ノ証ヲ脱スルト云ハ大ナル謬ナリ和ノ直根人參竹節人參ハ漢土ノ書ニ見ヘス一種此邦ノ參類ニシテ味苦寒其性芩連ニ近シ全ク陽津ヲ助ルノ効ナシサレハ心下ノ痞鞭ハ芩連ニテ足レリ且經文ニ人參ト芩連ト配シタル方ハ再煎スレモ芩連ノミノ方ニ再煎シタルナシ是ヲ以テ張子ノ用ル人參ト異ナルヲ知ヘシ古昔ハ和ニ人參ナシ今ノ種參ハ享保中ニ朝鮮ヨリ齋來シタル品ヲ培養シ作りタルモノニテ漢土用ル所モ此種ナルヘケレハ方中ニ用テ必効アリ然レモ柴胡瀉心ニ至テハ如方再煎セサレハ害アリト知ヘシ畢竟元祿寶曆ノ比マテハ人參拂底ナレ

ハ直根竹節ヲ用ルノ議論モ生シタルナリ然シ此二品
モ苓連ノ場合ニ用タランハ必効ヲ奏スヘキナレモ遂
ニ仲景用ユル所ノ參ニハ非ルナリ
生姜生地黃ノ生ハナマト訓メ生根ヲサレハ効ナシ
藥舖ニ生姜ト稱スルモノハ乾姜ナリ其乾姜ト稱スル
モノハ熟姜ナリ混用スヘカラス
升陽散火湯ノ方後ニ入金首飾煎トアリ金首飾ト云モ
ノハ未タ何品ナルコト知ラサレモ何レニモ純金ノ器
ナルヘシ今ハ純金ノ器物ハ稀ナレハ金箔十四五枚ヲ
絹ニ包テ入レ煎スヘシ箔ハ純金ナレハ必宜トス若金
ヲ入レサレハ必効少シト知ヘシ

太陽證ニ桂枝湯麻黃湯ト相對ノ用ルコトハ古來ノ定論
ナレモ今世ハ麻黃湯ノ純症ハ稀ナリ大抵ハ桂枝湯桂
枝加葛根湯或柴桂湯ナトニテ外邪ハ解スルナリ又感
冒ト云ハ太陽証ノ輕キモノナリ若劇クナレハ傷寒ト
異ナルコトナシトス桂枝湯ハ以水七升煮取三升トアリ
桂枝人參新加湯ハ以水一斗二升煮取三升トアリ同體
ノ藥ナレモ煎煮ニ差別アリ總テ補陽ノ藥ハ濃煎スル
コトナリ炙甘草湯以清酒七升ハ古方ハ煎煮ニ因
テ藥効モ異ナルコトナレハ方後ノ文モ熟讀ノ今日ノ用
ト爲ヘシ
桂枝湯方後禁忌ノ文ハ後人ノ攙入ト云説アレモ病人

ニ諭ス禁戒ニハ太々宜トス此法ヲ守テ可ナリ
 川芎ハ本名芎藭ナリ川州ノ芎藭良ナルユヘ畧ノ川芎
 ト稱セリ辰砂ハ本名朱砂ナリ又丹砂ト稱ス銀朱ト同
 ノ辰州ノ品良ナルユヘ畧ノ辰砂ト稱セリ阿膠モ牛皮
 膠ナルヲ阿井縣ノ水ニ製シタルカ良ナルユヘ阿膠ト
 云ナリ他ノ膠ハ只皮膠ト云テ宜キナリ陳皮青皮ハ陳
 橘皮青橘皮ノ畧ナリ如此類ノ畧稱ヲ本名ト覺タルハ
 誤ナリ
 竹茹竹葉葦莖商陸側柏葉ノ類ハ新キ品ヲ採用スルヲ
 良トス陳久ノモノハ効ナシ醫家庭園中ニ植置テ宜キ
 品ナリ又竹茹竹葉竹瀝ニ用ル竹ハ淡竹ハナヲ用ヘシ

若無キトキハ蒼竹ケマヲ代用スルナリ
 大黃ハ剉テ酒ニ拌セ乾メ使フ効アリ甘草ハ皮ヲ去リ
 切テ炒用ルヲ良トス桃人杏人ハ熱湯ニ浸シ皮ヲ去テ
 用ヘシ藥製ハ宋ノ局方以來殊ノ外ニ精クナレ聖惠方ニ
 始マレ此ハ後世ノコナレハ今ハ用ナシ古方ノ製モ悉ク
 守リ難シ然レモ鹿略ニシハ効薄シ故ニ其大概ヲ取ル
 ヲ佳トスヘシ
 烏頭ノ製ハ草烏頭ヲ水ニ浸マ一晝夜ニシ半分ニ割
 リ炮烙ニ灰ヲ布キ其上ニ排ヘ火ニテ煨スヘシ暫時ニ
 又反メ煨スルナリソレヲ皮膚ヲ去リ剉テ用ユヘシ桂
 芍知母湯大防風湯ノ附子ハ此烏頭ヲ代用スヘシ鳥頭大

ナルモ用ニ長ナリ小唐山ノ大瓠ハ形大ナレハ核ヲ去テ
用ユヘシ取ハ肉モ邦産ハ形太大小ナリ故ニ核ヲ去ル
能ス因テ核トモ打碎テ割ミ用ユ此ハ畧製ナリ
蘇子牛蒡子ノ類ハ麤末ニシテ用ヒサレハ効ナシ麻人ノ
去皮ハ湯上ニ炊甑ニテ蒸シ熱ニ乗シテ布袋ニ入レ井
中ノ水際ニ掛テ置キ冷テ待テ手ニテ擦スレハ皮ヲ去
ルヘキナリ牽牛子ハ頭末トテ一番粉効アリ
本草ノ學ハ醫家知ラスンハ有ヘカラス然レモ物類洪
繁ニシ一朝一夕ノ能究ムヘキニアラスサレハ日用藥
品ノ大略ヲ覺テ可ナリ貝原氏ノ太和本草尤親切ニシ
宜シ藥品ヲ辨別スルハ俗書ナレモ藥舖ノ手板發蒙甚

便ナリ

防風ハ筆防風ト稱スルモノ長シ濱防風ハ珊瑚菜ナリ
防風ニアラス和ノ杜仲ハ衛矛マユナリ杜仲ニアラス
桑寄生ハ桑ノヤトリキナリ藥舖ノ品ハ桑黃サカケノコ
ナリ用ヘカラス桑白皮ハ皮ノ附キタル長シ皮ナキハ
楮白皮ナリ牡蠣ハ生ナルヲ燒テ使フヘシ吉益牡蠣ハ
蛤粉ヲ雜テアリ辰砂ハ丹砂ヲ水飛メ用ルヲ長トス色
ノ好キハ往々銀朱ヲ雜ルアリ鱉甲ハ醋ニ浸メ炙ルヘ
シ鱉甲ハ藥舖ニ土鱉甲ト稱スルナリ毒瑁ヲ用ルハ誤
ナリ反鼻ハ酒ニ浸シ炙リ使フヲ長トス
穀肉菓菜爲養ト云フハ素問ノ運氣篇ニ出ル語ニシテ張

子和儒門事親ニモ云ヘリ東洞モ頻ニ此言ヲ唱ヘタリ
キ是ハ洵ニ適切ノ言ニシテ藥ハ固ヨリ邪ヲ祛ルヘク補
養スヘキモノニハ非ス今ハ西洋モ同說ナリ言ノ理ニ
中ルハ今古萬國同情ト見ヘタリ東洞翁ハ仲景復古ノ
學ヲ唱テ世醫ノ治療ヲ一變シタル英邁雄偉ノ人ナリ
然レモ其實ハ張戴人ニ根抵スルヲ多シ翁ノ時世ハ事
親ノ書モ稀ナルヘシ翁ハ偶見ラレテ識見ノ暗ニ合メ
其言ヲ採ラレシナラン然レモ一言ノ事親ニ及ハサル
ハ遺憾ナシト云ヘカラス
按摩素問ニ按蹻ト名ツク孟子ニ爲長者折枝趙岐注ニ
折枝按摩ナリト云ヘリ其他莊子ノ熊經鳥伸扁鵲傳ノ

攙針橋引按抗毒熨華佗傳ノ五禽之戲皆按摩導引ノ法
ナリ延喜式ニ按摩博士按摩師按摩生ノ目アリ古ハ其
術モ傳レナレモ今ハ亡テ存セス然レモ病源候論ニ每
條導引法ヲ載セ外臺秘要ニ天竺道人按摩法アリ臞仙
活人心蓮生八牋ニ八段錦坐功等ノ法アリ能古ヲ考ヘ
今ニ參メ考究シタラシニハ或古術モ復スヘキヲアラ
ン乎按摩ハ人ニ揉セラルナリ導引ハ獨ニテ按摩スルナリ
多紀蒞庭カ時還讀我書ニ升陽散火湯導赤各半湯ヲ用
ル辨アリ甚タ丁寧ニ說示セタ今其書ヲ借失ス故記セ
ス
診脈ノ丁劉桂山ノ脈學輯要ヲ精トス南陽醫事小言ニ

