

醫學管錐外集

十一

18-2

490.9
Ig-4
11

No. 2056
12; 18-2



富士川文庫

1268

醫學管錐外集卷十一目錄

九折堂山田
氏圖書之記

齒痛用承氣湯類

參芩白朮散當用散藥

阿刺吉酒

糞門產兒

菴羅果

調中湯

陰吹

小兒便青有二證

蒼木治雀目

二博

集驗一方又名柴胡

甲湯 治癰癧方

舌疽

舌疳

繅絲湯治消渴

黃芩湯治肺癰

衄血治熨頂上法

水病忌針出水

昏睡用酸棗仁湯 頸肩用吳茱萸湯

反胃嘔噎有屬熱者

黃芩白芍桂枝湯

淋病有屬熱者 小兒久病後成疳

卒霍亂說

散魚頭治脫肛

戴元禮證治要訣

劉大

小兒更羸音二三

華佗

歸中風

何焯告酒

養中風

參苓白朮散告酒

養中風

齒痛用承氣湯

養中風

通醫學子言華佗集卷十一

卷之十一



齒痛用承氣湯類

加藤謙齋曰、歷年齒痛黑々爛々、脫落々、冷水ヲ啜
バ、痛シバテク止者ハ、膏粱濕熱ノ火ナリ。此湯ニ
加黄連用べし。又牙齒實熱ニテ腫痛者、加黃連去
芝消。醫案手列草上篇調胃承氣湯方後。

福島慎獨軒曰、齒痛難堪者、宜桃核承氣湯。醫案先哲

醫案卷下

淺田栗園曰、齦齒斷痕、牙疳、骨槽諸齒痛難堪者、
余用之屢效。蓋屬血氣衝逆者多故也。同注
醫案學正傳引丹溪曰、牙疼或出血屬熱。田目中有
熱、有風寒、有虫、有濕熱、實熱腫痛調胃承氣加

黃連又用升麻白朮防風荆芥薄荷甘草桔梗之類

卷五

萬病回春王侍御齒搖齦露喜冷飲食此胃經濕先用承氣湯以退火又用清胃散以調理而齒固継用六味丸以補腎水而痊

卷五

又一男子晡熱內熱牙痛齦潰常取小蟲此足三陰虛火足陽明經濕熱先用桃仁承氣湯二劑又

用六味丸而愈

同上

八益散
藤謙齋曰久瀉アツテ不止モノ參芩白朮散ヲ散藥トシテ棗桑ノ煎湯ニテ用テ效アリ參芩白朮散ハ散藥ノ功格別煎湯ヨリ勝レリ或ハ久瀉ニ肉豆蔻诃子ヲ加ルコトモアリ古方家ニハ桂枝入參湯或ハ真武湯ヲ用ルナリ

醫西療手引草上編

齒齦用散

參芩白朮散當用散藥

藤謙齋曰久瀉アツテ不止モノ參芩白朮散ヲ散藥トシテ棗桑ノ煎湯ニテ用テ效アリ參芩白朮散ハ散藥ノ功格別煎湯ヨリ勝レリ或ハ久瀉ニ肉豆蔻诃子ヲ加ルコトモアリ古方家ニハ桂枝入參湯或ハ真武湯ヲ用ルナリ

醫西療手引草上編

香川啓益曰泄瀉ノ忘服華數貼ヲ用テ其忘大半愈テ未全快者ハ湯藥ヲ止メシムヘシ參芩白朮散異功散ニ白扁豆山藥砂仁等ヲ加テ極細末メ未飲湯ニテ用ベシ久ク湯藥ヲ服スレハ脾胃ニ濕テ畜テ泄泻止ムナシ粉藥ヲ用ルノ犬祕密

ノコシ食糲生トテ、粥バカリ食セシムレバ、是モ
亦脾胃ニ濕ヲ畜テ、泄鴻ヤム「ナシニ」度飯ヲ用
ル」、大祕密ノコシ、牛山活套卷上

又曰、參苓白朮散ハ、脾胃虛ノ泄鴻シ、或ハ自利シ、
或ハ大病ノ後、脾胃虛スル者ヲ、調理スル妙劑也、
啓益常ニ脾胃虛メ泄鴻スルヲ治スルニ、此方ヲ
用ルニ、煎湯トナシテ用テ効ナキ多シ、散ニメ
用ユレハ、脾胃濕ニ乾スノ義アル故ニ、其効如神、可
秘、牛山方考卷下

醫學子正傳、脾胃不和泄鴻者諸藥、多作丸子効。泄鴻者、卷二

阿刺吉酒

曾士考曰、燒酒中山土名泡盛、又云燒酎、今俗所謂
河云與燒酎者此謂其製更殊也廣東新語云、按燒酒之法自元始有、謂之燒酒者有暹羅人以燒酒復燒入異香至三二人飲數醕即醉、謂之阿刺吉、蓋得法於番人云、我藩附庸中山所醕成者尤清烈、歲貢、藩府本草綱目纂疏卷六

清川吉人曰、奇効良方、直水茯苓湯ノ下ニ、如熬阿刺吉酒相似、約水一斗、止取藥一盞ノ語アリ、按通雅云、阿刺吉燒酒也、燒酒ハ今燒酎ナリ、水火鼎ニテ取リタル酒ノ精粹ナルモノ也、氣味ハ厚久色ハ清白ノモノ也、此藥濃煎大氣味厚辛故ガクハ

言フカ、但西洋舶載ノ酒ニ番言ニテ何ト呼物ニ
ヤ、斯邦ニテ、金阿刺吉、銀阿刺吉ト呼モノ、金銀八
酒中ニ金銀屑片ノ如キモノアル故也、酒ノ氣味
ハ至厚久、色ハ濁ルモノニ非ス、述齋林公曾云、本
邦アラキ酒ト呼者、色ハ濃煎藥汁ノ如久氣味モ
至テ厚シ、此方後ニ云フ、阿刺吉酒ハ、二種ノ酒ニ
テ、今本邦ニ云アラキ酒ナルヤ、未見アタラス、
記メ改テ俟フ、培陰銷間雜記卷下

冀門產兒

戶田道玄曰、關尹子曰、陰陽雖妙、不能卵無雄之雌、
然我隣家一男子、後穴產一子、長三寸餘、有此理耶、
曰、陽兼陰、陰不能兼陽、古有淫夫化女、則駁雜之所
化、不可測也、無雄之雌、雖產卵、無成雛、則以非陰
陽之正也、丹水子 訓林列水子 按小川櫻齋換杏新

桂山先生曰、大隅國肝屬郡垂水鄉中俣村、有一婦
廿七歲、經水始通、而有孕、三月其胎墮墮、次年復孕、
方六月、登攀嶮崎、歸家之後、腹痛下血、至明年、經行
遂閉、而時、腹痛者、凡廿四年、氣血虛憊、殆至危篤、
請醫、有村紹甫、診療紹甫音、是胎猶在胞中為患、

投以利藥、反小便不利、或時急痛、再診其脉、弱而無力、因與補劑累日、大便下一塊兒、形畧各備、質如軟骨、仍知攀嶮之時、臍帶繚斷、元元之氣、無以潤養使然、乃記其事、併其胎以傳于家、時延寶六年秋九月也、此古今醫書所未載、頃從薩老公借觀、其色黃白如蠟、重十四錢八分、長三寸三分、而頭居半、其圍五寸、亦異事也、櫟陰遺說卷下

業廣慶應三年正月、福山侯ノ招キニ應シ、備後福山ニ到リシ時、侍醫鼓泰安詰ス、備後國福山領沼隈郡下山南村黒迫ノ百姓虎吉妻、年廿四歳、慶應三年丁卯二月中旬、肛門ヨリ一男子ヲ産

ス、形甚小ナリ、其後母子俱ニ壯健ナリ、同村四ツ判長谷川隆三ト云者、コレヲ療治セリト云ス、四ツ判トハ、備後畠表ヲ公儀ヘ獻スルニ、極上品ノモノ、長谷川家ニテ、四ツ判ヲ押スナリ、古クヨリ家柄ニテ、右ノ判ナケレハ、獻上ニナラズト云ヘ、此隆三殿業業ヲ兼テナセリ、故ニ此婦ヲ療セリ、右泰安詰スルトコロナレ凡、泰安門人某產婦ト同村ナレバ、余ガ為ニワザくソノ村ニ往テ、詳ニ探索シテ、更ニ余ヲ詰スル所ノ實見說ナリ、

菴羅果

原南陽曰、膈噎菴羅果一味煎服スルモノシ、醫書諱

卷四上

有持桂里曰、菴羅樹能治噎、又療哮嗽ト云、余未試
方輿觀卷十

小野蘭山曰、菴羅果和產詳ナラズ、世ニ安蘭樹ヲ
以コレニ充ルハ穢ナラズ、安蘭樹ハ、和州多武峯
大職冠ノ御廟ノ旁ニ一株アリ、コレハ、鎌足公ノ
御定定慧和尚、如唐ノトキ、鎌足公ノ薨去ヲキ、
タニヒ、五臺山ニ登リ、コノ種ヲ採、十三重ノ塔ニ
用ル材木ドヲ推カテ歸朝アリテ栽ラレシトナリ、

寶曆癸酉ノ年ニ至マテ、千八十年ナリ、原木ハ山
谷中ニアリ、今廟旁ノ者ハ、楓櫟ニ接タルナリト
云、形狀楓櫟ト同シ、葉ノ形モ異ナラス、三月ノ末、
淡紅花ヲヒラク又、楓櫟ト同シ、實ハ楓櫟ヨリ小
ニシテ、香味微ク異ナリ、内ニ黒核アリ、地ニ下シ
テ生シヤスシ、亦枝ヲ壓スルモ可ナリ、故ニ花家
ニタシ、俗ニ實ヲ用テ、疾及膈症ト、藥トス、漢名詳
ナテス、世ニ安蘭ノ昔菴羅ニキカキ故ニ、誤リ混
ズルナリ、本草啓蒙卷二十六

曾士考曰、菴羅果、和漢通稱大和多武峯、原有此樹、
今處ニ養此種、按釋光謙草堂雜錄、載菴羅似桃而

非桃似柰、非柰、正合翻譯集所言、相傳此樹唯本山
定慧和尚入唐所將來、然旭師則云、此方所無、意者
彼土亦不多有、今山僧言、聞山定慧在代州厭門縣、五臺山推到
白雉四年小山吉士長丹、丁乙吉士、聘于唐室、
原御田為送使、學子士巨勢、藥水老人及學僧道嚴定
慧安達觀等十餘人從之、定慧齋其種貯者、
蓋即此時也、本草綱目算疏卷八

本草綱目、菴羅果、釋名菴摩羅加果、出佛書、李時
珍曰、菴羅梵音二合者也、菴摩羅梵音三合者也、
華言清淨者也、本綱卷三十

調中湯

原南陽曰、調中湯、頓醫抄ニ、產後一切ノ痢病ヲ治
トアルヲ、寒症腹痛ニ用ユヘシ、其方高良姜、當歸
桂枝、芍藥、附子、川芎各一兩、甘草半兩、右剉合、每服
三錢、水三盞入、一盞ニ煎シ、滓ヲコシ、アツフテ服
セヨ、此藥ホトコスコトニ、效アラスト云々ナシ

歎四事小言卷三

有持桂里曰、產後ノ久下利、間アルモノナリ、產後
ナリトテ、別ニ方ヲ立テ、此レヲ分ツニ及ハズ、
其脈症ニ隨テ處治シテ可ナリ、然ルニ、調中湯ハ、
コトサラニ、此症ノ為ニ設ケ、且ツ產後下利ノ情

引局方載于後

因不錄

本書未校

狀ヲ詳明ニシタリ、因テ錄シテ備用焉。方輿卷八
產育寶慶爻集調中湯治產後怯腹痛作陣或如
錐刀所刺洞瀉腸鳴

和劑局方、調中湯、治產後腸胃虛性、寒邪所侵及
未滿月飲冷當風、乘虛龍襲留於肓膜、散於腹脇、腹
痛作陣、或如錐刀所刺、流入大腸、水穀不化、洞瀉
腸鳴、或下赤白、胠脇脹脹、或走痛不定、急宜服之。
甘草炙半兩 當歸去蘆根一錢 肉桂去皮一錢 芍藥白者一錢
附子炮良薑川芎各壹錢

右為剉散、每服參錢七水參錢煎至五錢、去滓熱服。

卷九續添諸局經驗秘方

三因方同

三因方、產後腹痛、又瀉痢者、何、答曰、產後腸胃虛
怯、寒邪易侵、若未滿月飲冷當風、乘虛龍襲留於肓
膜、散於腹脇、故腹痛作陣、或如錐刀所刺、流入大
腸、水穀不化、洞泄腸鳴、或下赤白、胠脇脹脹、或走
痛不定、急服調中湯立愈、若醫者以為積滯取之、
則禍不旋踵、謹之謹之、卷十七

又評曰、產後下痢、非止一證、當隨所因而調之、既
云飲冷當風、何所不至、寒熱風濕本屬外因、喜怒
憂思、還從自性、况勞逸飢飽、皆能致病、若其洞泄、
可服調中、赤白帶下、非此能愈、各隨門類別有心

方令錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門選
用之同上

陰吹

杏月啓益曰一婦人年二十餘容貌有色而伉儷不和去夏產一子產後發熱惡寒不止兩月百方不應爾後不藥而自然止飲食無味心忡煩滿時發寒熱羸瘦漸加髮無潤澤梳之則落毛如葉且有白帶下平日陰戶有聲而如轉失氣身體動搖則愈甚慮有其事常不近人席不得止著坐次則甚為赧愧宜哉如是者連綿而相苦十閱月衆工術窮自覺為廢人召予求治診其脉微細而濡予曰此不遂其病之病也婦人性執頑見鄙識尤力女不和則憂愁勞之火無日而不起矣經云憂愁則傷心又云思則

陰吹

傷脾益心脾之二臟受病、則口無味、心煩之証併發。
其髮無潤澤者、不能上升津液之故也。陰門有聲如
轉失氣者、昔人名曰陰吹。出醫學細目心業曠按陰
氏引仲景則當列金匱要略而引樓氏者疑凡物之
香月氏時金匱未盛行于世豈未寓目歟
為聲耳、皆中空虛聲猶樂器然也。陰戶亦中空、今婦人
久患帶下、下部之氣虛陷、不能收斂、其氣自脫漏故
有此患、治當上升心脾之氣、且佐以補血之劑、則病
自安。因與一方、四君子湯合升麻葛根湯以為君、黃
芪當歸川芎遠志酸棗仁為臣、防風柴胡山梔子為
佐使、服五十餘貼、而前證減十之七八矣。予告之以
開導誘掖之言、樹欲穩為風所動、心欲靜為物所亂、

如今也省妄想、消真火鬱、則無藥而自安。婦有三從之
道、不可不慎。男女不和者、皆係姪情之私、豈有善婦
道者乎。婦信予之言、攝養如法、服藥四箇月、得為善
人矣。游豐司命錄

又曰、婦人陰門時、有聲、轉失氣ノ如クナルゝ陰
吹ト名ク、此忘ハ、久ク帶下ヲ患ヒ、或ハ產後血脫
ノ後ニ必多キ忘也、加味歸脾湯ヲ用ベシ、有神效、
啓益常ニ此忘ヲ治スルニ、升麻葛根湯ニ、四君子
湯ヲ合シ、當歸川芎遠志防風、黃芪ヲ加ヘテ用、奇
效アリ、大祕良也、医按委ク游豐司命錄ニ載ス、可
参考、牛山活套卷下

劉君廉夫曰陰吹非罕見之病、簡前年療一諸侯夫人患此證、尋為療藥罔效而沒、金匱要略輯義

卷五

要略

義

全匱要略、冒氣下泄、陰吹而正喧、此穀氣之實也、

膏髮煎、導之。

婦人良方、膏髮煎、治婦人穀氣實、冒氣下泄、陰吹而正喧、墮中出血、頭髮灰、猪脂、右調停、綿裹如棗核大納陰中、卷廿四

清蕭壩女科經綸、按婦人陰吹證、仲景以為穀氣實、冒氣下泄所致、此之病機有不可解、雲來注云、胃實腸虛氣走胞門、亦是隨仲景之文而詮之也、夫人穀氣胃中何嘗一日不實、而見陰吹之證者

本書未校

未之嘗聞、千百年之書、其闕疑可也、予甲寅歲游峽右、有友吳禹仲來詢云、此鎮有一富室女、陰戶中時簌々有聲、如後陰之轉失氣狀、遍訪醫者不曉、此何病也、予曰、陰吹證也、仲景之書有之、禹仲因嘆予之讀書之博。

小兒青便有二證

播磨隨筆三ノ九ウ參看

原南陽曰、小兒口鼻之氣冷ルヤト、掌ヲアテ、候
フヘシ、若冷ルハ冷ナリ、弄玉加附子ノ主タルヘ
シ、此候法ハ大人ニモ心得有ヘキナリサテ後世
ニテ益苗散ヲ用ル所ナリ、屎ノ青ハ青菜ヲ絞リ
タルカ如キモノヲ下スノ、初生ニカキラス冷也、
簡易方ナトニ、驚風ヲ催ストスレ凡天樞ニ灸ス
レハ神驗アリ、醫事小言卷五

巢源小兒冷利候、小兒腸胃虛、或解脫遇冷、或飲
食傷冷、冷氣入於腸胃而具其色白、是為冷利
也、冷甚則利青也、卷四十七

千全方、若兒糞青者冷也、与臍中水同、卷五上腹初生

ニ

醫說小兒糞青此脾虛生風之證也、脾屬土、其色黃、糞黃則是脾家正色、今乃青、肝木克脾也、肝屬木、其色青、肝盛脾虛、受肝之克、故糞青也、當用益脾去風藥、如半硫丸加白附子、蝎稍可以治之、雖然小兒青糞、拋下便青者、是風冷也、良久然後青者、非病也、小兒糞自然如此、卷十

按ルニ、小兒青便長ク下レハ、徃々慢驚ヲ發スルハ、屢々目覩スルトコロナリ、畏ルヘシ、古人皆冷ニ屬ス、聖惠方幼ニ新書等攷ヘシ、サレド、格

別容體ノ出ザル内ナレハ、抑肝散抑青丸ナドニテ、多ク止ルアリ、肝木克脾土ノ理誣ベカラズ、先年嘔科、錢氏ノ鴻青丸ヲ用テ治シタルヲ見タリ、コレハ鴻青ノ名ニヨリリテ用タルモノ欽、鴻青トハ、鴻肝ノコニテ、青便ノコニハテラザレ凡キニ其児實ニ屬シタルユヘ治シタルモノナラン、所謂口玉書、脚注、仲景ノ自利清水色純青ニ大承氣湯ヲ用ヒタルヲ證トスレハ、申訣ハタツベキナリ、畢竟古ヨリ多ク冷ニ屬ス、益黃散ナド效アル所以ナリ、幼ニ新書卷三十、吉氏家傳ヲ引テ、朱砂輕粉ヲ用テ、青便

ヲ治スル方アリ、此外定テ寒涼ヲ用タルヲアラ
ニ、予淺文ニテ未見當ラズ、猶高明ノ士ノ教示ヲ
仰クノミ、

原病式青者肝木之色也、由火甚制金、不能平木、則
木肝自甚、故色青也、或言利色青為寒者、誤也、仲景
法曰、少陰病下利清水、色純青者、熱在裏也、大承
氣湯下之、及夫小兒熱甚急散馬利色多青為熱
明矣、ナウ

蒼木治雀目

本集卷十七水漬肝為目盲

參看

香川太冲曰、四苓散加華蒼木治雀目至妙、醫事說卷下
津田玄仙曰、雀目四苓散ニ唐蒼木ヲ加是香川氏
ノ醫事說約ニ出タル方十リ其効甚速十リ、療治茶談

卷

一聖惠方治小兒雀目右用蒼木一兩去皮剉微炒
擣細羅為散每服一錢用羊子肝一具以米泔煮
熟分半具細切拌藥與兒食之至晚再服五歲以
上即頓服未喫食兒不可與服、幼子新書卷三十三引

本事方飲漬其肝目亦多昏眩其後燈下能書
細字皆蒼木之力也、本集卷十七因新書載本

集驗一方 鎌田碩庵名柴胡鼈甲湯

淺田栗園曰、此方ハ集驗一方トアリテ、方名ナレ。洛醫鎌田碩庵柴胡鼈甲湯ノ名ヲ冒メ、喘息ノ癆
癆ヨリ來ル者ニ屢效ヲ得タリ、其方ハ四逆散ニ
鼈甲檳榔ホヲ加ル者ニメ、痃癖心腹痛ヲ治スル
カ主ナリ、楊氏ノ解勞散ハ、此方ノノ一等輕キ者ナ
リ、ニ方共勞立ノ胸腸ニカヽリ、寒熱往來メ咳嗽
アル者ニ用テ、大小柴胡ヨリハ反テ效アリ。勿誤
集驗一方又名柴胡鼈甲湯

方函口訣 卷三

外臺集驗療痰癖心腹痛兼冷方、鼈甲炙此柴胡赤芍藥各八分甘草炙枳實炙生薑白朮各六分檳

榔七箇末、湯成後下。右八味切以水六升煮、大七味
取二升半去滓、內榔榔末分服八合。當利。卷八



鯛魚治諸瘡

本集オハ巻當參攷

有持桂里曰、或曰、鯛魚能ク癩癧ヲ治スト、近ゴロ
先醒齋筆記ヲ閱ルニ、方アリ。治癩癧方、取過冬、
青即荔波鴨、正名天明精、五六枚、同鯛魚入鍋、煮熟、去鴨及魚
食汁數次即愈。又方、華岡家傳之夏枯鴨煎、夏枯
鴨百二十枚右盛臺裏、清酒二升、春秋二夜、冬二日、一沸煎
而去渣、以鯛魚重八十錢者去腸、魚小則用二頭內貝母八
錢、以糸縫括以夏枯鴨煎汁、煮半日許、後去貝母空
心食魚與汁、二三日食完、服後如吐血、止後服後服
可與柴胡桂姜湯。方輿輓卷十四

余ガ外甥富士左衛門、千住在西荒井村ニ住ス、
鯛魚治諸瘡

其近邊ノ老嫗、背ニ大癰ヲ生ス、農家ノ貧人ユ
ヘ、醫ヲ乞ト、能ハズ、富士左衛門憐ミテ、嵩之ノ
教ヘ、且ツ鮒ノ生ナルモノヲ研、ハナリ膏トセ
ゼ、日々貼シタレバ、大ニ膿ヲ出シテ愈タリ。始
終藥ヲ服セズト云ヘリ、鯉魚ノ諸瘡ニヨキト
ハ、管錐本集ニ載セ置タレハ、茲ニ贅セズ。其中
洪氏集驗方背疽ヲ治スル方、暗合ナリ。

醫學正傳治勞瘵方

太宰德夫曰、岡崎士人河野通親者好醫友有二男
一女、其長子病勞瘵而死、次子又疾、醫治不效、冉々
羸憊、河野謂醫東城子曰、吾兒疾篤、萬無生理、惟方
書有取痨蟲方、而今人莫取用之、予今欲為吾兒行
之、死者命也、予徒盡術而已、東城子曰、可也、河野乃
用虞天民醫學正傳所載神授丸、与服二日、下蟲形
如穀蟲、人或以爲不死、然羸憊之甚、元氣不支、遂死。
蓋晚也、無何、少女又疾、時年十四、咳嗽累月不已、勞
證粗具、河野試与神授丸二日、下蟲、時冬寒、且調補
以保元氣、明年二月、又用前方、取蟲如法、數日下蟲

五六合及小石如喬麥大者十六枚、鐵椎擊之而不碎、蓋蟲所齧骨節也、後用補脾之劑而愈、惜也、向使

二子者早服此方、則不死矣、東城子者、岡崎侯侍醫其子伯通記其事、以告人云、紫芝園漫筆卷八

無名氏日記云、醫學正傳ノ神授湯、ヨク傳屍病ヲ

治ス。○浦江定所翁曰、此人安永寛政間ノ

人十人中山玄寧トイヒシト

原真珠丸ニ

本書ニ據テ改

原南陽曰、太宰春臺ノ神授丸、今本書ニ據テ改效アルヲ、說ハ似タルモノヲ治シタルナルベシ、今之ヲ用ユルニ、下利下重スルヲ甚シ久大ニ用ヒ惡シ、醫事小言卷四

醫學正傳、神授散、此方得之於河南郡王府濟世

既久功不可述也、川椒二斤、擇去閉口者與梗、略炒出汗、右一味爲細末、每服二錢、空心未湯送下、或用酒糊米糊爲丸、如梧桐子大、每服二三十九、漸加至八十九丸、空心酒下、或未湯下、凡人得傳尸勞病、氣血未甚虛損、元氣未盡脫絕者、不湧多方服食、但能早用此藥、無有不愈者、真濟世之寶也、

卷三

又愚嘗治一婦人、用花椒二分、苦練根一分、丸服、屁虫盡從大便泄出、同上

舌疽

舌疳

補集卷十七口舌病用溫

附山活套卷

香月牛山曰、舌疽ト云病アリテ、舌腐爛シ、舌根又ハ舌上巖穴ノ如ニ大膿ヲ出ス者ハ、不可救、多ハ吐血メ死スル也、此疣ハ必固ク辞メ治スベカラス、百ニ一生ミナキト知ルベシ、
牛山活套卷

原南陽曰、口中第一ノ大病ト云ハ、舌病ナリ、世舌疽ト呼モノ、醫書ニナキ名目ナリ、然ニ今ハ海内ニ通用ス、若出所アルヤ、此病ハ死生ヲ以テ論ス、輕キノニ非ス、舌疽ハ舌ノ縁通リヘ、瘡ヲ生シ、肉陥没シテ、爪ニテ挑取形ナリ、段々ニ廣クナリ、岩ノ缺タル如ニ陥スルモアリ、其陥所アカクナリ

テ四邊紫赤ヲ帶タルハ、何處テモ潰ユヘキ兆
ナリ、又其缺タル所ヨリ、赤肉瘻肉ノ如ニ、幾ツモ出
ルヲ蓮花舌ト云、難治ナリ、又一所堅ク坐トリテ、
夫ヨリ潰ヘ初マルモアリ、甚シキハ血流レ出ルモ
アリ、如此ハ、ミナ食事ノシミテ痛ムヲナシ、凡大小
ノ瘻ニ不拘、塩味噌ナトノシミサルハ大ニ可畏催
ナリ、病ノ深キハ、頬下ノ絡中ニ、グリクト核ヲ結
フフ、大ク累ミトシテ幾ツモアリ、何ノ絡ト定ハ
ナシ、是ヘ灸ヲ三五壯スレハ、其所移テ又上下左右
ノ間ニ結ス、又灸シテ數日ヲ經テ解散スレハ、本
病治スルヲアリ、是ヲ名灸ト云、業トスルモノ

モソアリ、醫事小言卷四下

又曰、舌ノ中面ニ發シテ崩レタモアレ、凡先ハ舌根
ヨリ發スルモ多シ、下疳瘻ノ陰頭ヨリ腐脱スル
ト同形ナリ、崑崙散可也、尚足飲、或ハ四物加升麻
玄參石膏ナト見合ニ用ユヘシ、舌端ニ發瘻シテ、
白ク坐トリテ、灸痕ノ形ニナリテ、夫ヨリ疽ニナ
ルモアリ、先ハ塩氣ト熱湯ナトノ染ルハ、輕證十
リ、同上

本間和卿曰、舌疽ノ名ハ、古書ニ考ル處ナシ、本邦
ニテ唱ヘ始タルヲト見ユ、隨分多キ病ナレ、凡其
證候ヲ詳ニ云フモノハ、未だ見アタラズ、證治要

訣ニ曾有舌上病瘡久蝕成穴ト云ヒ、醫宗金鑑ニ、
舌疳ト云フモノヲ載テ百無一生、斷リタルハ思
フニ舌疽ノコトナリ、其病失榮乳岩ト同因ニテ、
翻花スル氣味アリ、至極大病ニテ、三十人ノモノ
ナレバ、二十九人ニテデハ死ヲ免レズ、又黴毒ノ舌
ニ發スルモノ、固結脂蝕シテ、其形狀舌疽ニヨク
似タレニ治シ難シトセズ、香川太仲行餘醫言ニ、
真舌疽ヲ黴毒ト心得タルハ、誤リナリ、舌疽ノ初
メ多クハ舌尖、或ハ右偏、或ハ左偏ニ發ス、或ハ舌
下、或ハ舌心ニ發スルモアリ、固結スルハ、豆ノ如
ク、粟子ノ如ク、久キヲ經レハ、瘡頭自ラ腐蝕シテ

行餘醫言刊行シ
タルトヨミハナシ定
テ鈔本ノ部ナラニ
余未タ見ズ、

凹ニナレニ、鹽醋辛辣及ヒ熱飲モ、一切潔ルヲナ
シ、潔ミザルハ、至テ毒ノ深キ故ナリ、凡ノロ舌何
程腐爛シテモ、飲食ノ潔ル證ハ、治シ易シトス、腐
蝕日ニ深久、固結月ニ蔓舌ヲ轉動シ難ク、言語蹇
渇シ一年或ハ二年ニ至テ、遂ニ舌缺ケ盡テ死ス
ル十リ、始メハ痛ミモ十ヶレニ、腐蝕スルニ從ヒ
痛ミミアリ、寒熱ヲモ發ス、ゴノ病少壯ノ人ニ少
ク、多クハ五六十年頃ニ及テ、患ルモノナリ、舌疽ヲ
患フルモノハ、頤下及頸ニ核ヲ結ヒ、疽ノ大ニナ
ルニ從テ、核モ大ニナリ、或ハ潰ルヲアリ、潰ル寸
ハ、其腐蝕シタル形狀舌疽ニ同シ、同毒ナレバナ

リ。○治法、痛ミ強キモノハ、尚足飲涼膈散加石膏。
痛ナクシテ虛候アルモノハ、甘露飲附子理中湯
ニ宜シ。外用ハ、五寶丹、冰硼散、崑崙散ノ類ニ宜シ。
先年、崎_ガ港ニ遊學セシ頃、和蘭醫シイボル止ナル
モノ、舌疽ヲ斷截シ、微ハ金創ノ治法ヲ用テ治シ
タリト。吉雄幸載ノ説語ヲキケリ。最初ナラバ治
ス可キ。理ナレモ、手ヲクレニ成タルハ、中々術ヲ
施シ難カル可レ、奇方多クアレモ、驗ミルニ效ヲ
奏スルモノ少シ、獨リ青洲老翁ノ金粉散神驗ア
リ。予其門ニ留學セレ頃、治セシモノニ人ニテ見
請タリ、歸省ノ後、舌疽ヲ療治セシ一、己ニ二十二

三人ニ及ヘモ、皆效ナクシテ死ス、獨リ安食村平
吉ト云モノ、舌ニ固結スルヲ、大サ小栗子ノ如久
蝕スルヲ深サ豆ヲ容ル、ニ至ル、諸家皆難治ト
ス、因テ予ガ門ニ治ヲ請フ、予診シテ、徽瘡ヲ患フ
ルヲアリヤト詰ルニ、絶テ患ルヲナシ、試ニ猛烈
水ヲ瘡中ニ點ズルニ、少シモ痛ミヲ知テズ、是ハ
真ノ舌疽ナリ、先猛烈水ヲ點スルヲ日ニ二次點
トレテ赤肌ニナルモノハ、腐肉、金粉散ヲ噴シメ、尚足飲ヲ
與フルヲ三十餘日ニシテ全愈セリ、舌疽ノ愈シ
フハ、至テ珍シキヲ故、其始末ヲ詳ニスルヲ如此。

證治要訣、曾有舌上病瘡、久蝕成穴、累服涼劑不效、後來有教服黑錫丹、遂得漸愈、此亦下虛故上盛也。卷十

醫宗金鑑、舌疳初起、宜服導赤散加黃連、虛者服歸脾湯、孰甚者、服清涼甘露飲、合歸脾湯、便溏者、服歸芍異功湯、云云、自古治法雖多、然此證百無一生、縱施藥餌、不過苟延歲月而已。卷六十

本間和卿續瘍科秘錄卷三、舌疳治驗數則ヲ載ス、文長メ茲ニ備錄セズ、爰シク本書ニ就テ攷ベシ。

有持桂里曰、城南散、コレ治舌疳ノ方ナリ、蓋シ舌疳ト云フ、何レノ代、誰人ノ言ヒ始メシノナルヤ、漢人ノ書ニハ、其名見ヘズ、金鑑、清溪祕傳比庭丹方下ニ、舌疳ノ字アリ、回春、黃白散方下ニ、口中疳瘡ノ目アリ、此ニツノモノ、舌疳ニ近似スレドモ、是的覈ニモアラザルベシ、今克ク此病ヲ視ルニ、初腫ヲ作ミ、漸ク疳蝕シ、終ニハ巖屈ノ如クニ成ル、其劇甚ナルハ、血大ニ流レ出ルモアリ、信ニロ患中ノ最大險惡ノ症ナリ、治方、涼膈三黃升麻煎、犀角地黃、當歸、飲等及ヒ、熏洗擦擦ノ諸藥アリトイヘドモ、此散尤モ絶妙トス、若遺毒結毒ノ所為

ナレバ、玉屑丸五寶散土茯苓劑等ヲ與ヘ外此散
ヲ傳クベシ。此餘牙齒咽喉口中一切諸疾用ヒテ
效アルハナシ。真ニ濟世ノ神方也。方輿觀

卷十三

又城南散治口瘡、梅肉、昆布、各二錢、巴豆一錢、礬石
二分、右前三味俱燒黑後一味用枯礬調和搽之穢
汁出而愈。此方治舌疽ノ藥トテ、城州鳥羽樞藥
ト云テ、極祕方也。惠美三白、コノ方ノ難得コト
アリ。其家方函ニ言ヘリ。山肠法眼此傳ヲ獲、其門人
佐井圭齋故アリテ之レヲ田中適所翁ニ傳ヘタ
リ。翁ニタ予ニ授與セラル。口中ノ諸患ニハ實ニ
無雙ノ仙藥ナリ。牙齒痛ニモ奇效アル所以ナリ。

同上卷十五

續

四錢

醫事小主、
宣、
止齶齒痛、昆布未經製造者佳燒存性、二錢、鹽梅
連核燒存性、二錢、巴豆燒存性、二錢、枯礬二分、右
四味研末傳瘡處甚良。齶齒痛、麻油少許盛小陶
器、安火上令沸、取藥末一撮、容於油中、牙掃尖挾
綿、將絹包之絲以紮之、熱油上藥末浮在者乘熱
藥而慘痛者毒淺、不知慘痛者毒深、又其腐潰既
去、生新肉者無痛、其度在省法內服尚足飲。凡口
內咽喉、齒牙諸痛必結核領下大抵纓筋前後絡

脈凝結劇者每絡累々按之痛隱々然而引患所
是絡脉怒脹作核也即灸其核上五六壯至十數
壯累々者每核皆灸大驗若不愈者連日上火唯
其灸時俯仰則其絡內移宜正取之又有今日灸
之明日其核消散結於他絡者須摸索之而灸其
處口問篇云齒鵝刺手陽明不已刺其脉入齒中
者立已乃此意也又喉痺纏喉風鋒鍼刺少商出
血又刺尺中及十指端此法亦可施一切口病毒
深者主之卷七

片倉鶴陵曰金粉散治舌疳如神硼砂柒分白檀伍
分丹砂乙泉烏梅伍分麝金柒分金粉乙泉右為細

末分作紙撚六條先入麻油於盞中將一條浸之點
大如尋常燈火法另取黑豆三合以水三升煮取二
升候冷定含口中然後嗅煙若豆汁得溫則換之日
用二條此方岡本朴仙秘方而上總州圓城良庵所
屢經驗予得此方甚艱今不吝祕公之下○
醫學秘
錄卷一春林ノ方トアリテ金屑三分ニ作ル方後
云久右細末ト為シセツニクナ、艾葉ニ和シ
紙二包ミ二十許ノ條トナシ
一日二一條宛喫クナリ

山田緯亨曰治舌疽神方水苦棗生昆布各各為霜
等分黃連少為末右三味塗瘡上日三夜二方家

野薔薇根治口瘡

本集卷十七當參看

蘭山

薔薇ハ藥ニイレバ、藥用ナリ、故ニ本經逢原ニ薔薇ノハ野生白花者トイフ。

片倉鶴陵曰、薔薇遺糧湯治結毒咽喉破燬全者、土茯苓七錢、薔薇根五錢、桔梗二錢、五加皮一錢、右以水六合、煮取三合、溫服、不拘時候。

徽癩新書上

有持桂里曰、千金升麻煎ノ薔薇ハ、野薔薇ナリ。野生スル白花ノモナク佳トス、根葉莖皆可用。和名イバヌ、大青ハ藍葉ナリ。醫學正傳ニ、藍葉乃大青葉ト云ヘリ。若シ藍葉ナクバ、青缸花ニ代フルモ可ナリ。青缸花ハ、藍甕ノ上沫ヲ取テ乾カシタル。

モノナリ、此方、口瘡、咽腫、牙齒ノ病ニ皆效アリ。

按孫真人治口瘡多用薑薇根方興觀卷十二

繅絲湯治消渴

有持桂里曰、回春繅絲湯ハ、蚕ノ繭ヲ煮タル湯ナリ、是ニユノ成リ出ザルサキニ、繭ヲ煮テ、其内ニ在ル蛹ヲ煮殺シテシニフベシ、此蛹ノ時、ソノマニ置ケバ、蛾ト為テ、ユヲクヒヤブリ出ルナリ、サテ其ニユヲ煮テ、ヨキ加減ヲ見合セムクノ葉ニテ、鍋ノ内ヲカキニハセバ、ユノ糸口ムクノ葉ノイラクトスル處ニツイテ出ルモノナリ、其レヲ繩リ取ルトナリ、茲ニ原^ト蠶^{トアレドモ、通}例ノ蚕殼ニテヨシ、本綱繭ノ附方ニ用出了蚕蛾繭トアリ、此即蚕殼ナリ、凡テ藥用ニスルマエハ、繭絲湯治消渴

蛾ノ出去リシモノヲ用フト見ヘテ、蘭ノ名目、本
ノ下ニ、蚕繭已出蛾者トアリ。爾レバ、蛹ノテダ一
ユノ内ニ在ルハ、不堪用ト見ニ。今用此藥ニ、不拘
多少、水煎シ置キ。湯茶ノ代リニ多ク服スベシ。無
時飲之ト云ハ、即是十人此方陰忘陽忘ヲ不論。泛
ク用ヒテ總テ效アリ。唯所謂中消渴ノ忘ニハ不
用之。方集輓卷八

醫學正傳、經驗原蠶蠶蠶湯治腎消白濁及上中二
消飢渴不生肌肉、其效如神。蓋此物屬火有陰之
用、大能鴻膀胱中相火引陰水上潮于口而不渴
也。原蠶蠶湯却再養晚蚕也。其繅絲湯極效如無繅絲
湯以爾殼絲綿煎湯皆可代之。卷五

萬病回春繅絲湯治三消渴如神、如無繅絲湯却
以原蠶繭殼絲煎湯皆可代之。無時飲之大效。蓋
此物屬火有陰之用、大能鴻膀胱中伏火引陰水
上潮於口而不渴也。卷五

本草綱目、蠶繭已出蛾者氣味甘溫無毒卷三十九
又時珍曰、蠶繭方書多用而諸家本草並不言及。
誠缺文也。云云。煮湯治消渴古方甚稱之。丹溪朱
氏言此物屬火有陰之用能鴻膀胱中相火引清
氣上朝於口故能止渴也。繅絲湯及絲綿煮汁功
並同。同上

又時珍曰繅絲湯主治止消渴大驗

同上

又引斗門方云、消渴飲水、晚齋沙培乾為末、每用
冷水下二錢、不過數服同上

萬病回春、丹溪曰、三消者、多屬血虛、不生津液、
俱宜四物湯為主治、上消者、加入參五味麥門冬、
天花粉煎熟入生耦汁、生地黃汁、人乳、飲酒、加生
葛根汁、中消者、加知母石膏、滑石、寒水石、以降胃火、
下消者、加黃柏、知母、熟地黃、五味子、以滋潤水、又
當間飲繅絲湯為上策。卷五

黃昏湯治肺癰

有持桂里曰、外臺ニ古今錄驗ヲ引テ、黃昏湯ヲ載
セ、其方下ニ療肺癰ト云ヘリ。○外臺ニ千金ヲ引
ナリ、文下詳ナリ、黃昏ハ蛤蠣木十枚、皮ヲ用フベシ。柴野
栗山先生、壯年ニ肺癰ヲ病ム、諸藥不應、黃昏湯ヲ
服シテ愈エト云ス。方輿輓卷六

千金方、治歎有微熱、煩滿、冒心、甲錯是為肺癰、黃
昏湯方、黃昏手掌大一片、是合昏皮也、咬咀以水
三升、煮取一升、分二服、卷十七。按外臺卷十引
千金方後云治法同

醫學正傳、要略、治肺癰、先以小青龍湯一貼、以解
表之風寒邪氣、然後以葛藤大棗瀉肺湯、桔梗湯、

葦葉湯隨證用之以取膿此治腫瘍之例也終以
宇宙獨行方名號以補裏之陰氣此治潰瘍之例
也、卷六

又引錄驗云黃昏湯治胷中甲錯隱痛知為肺癰
合歡木皮一掌手大右以水三盞煮取一盞半分二
服同上

黃昏湯古方

血瘀頭項上法

漫遊雜記一農夫侵暑耕卒然衄血一日夜昏眩不
能起家人急來請余余乃到診血益迸出冷汗如灌
虛里如奔馬脈如怒濤迺浸杉原紙三枚於冷水以
蓋其百會貯烈火於尉斗中自溼紙上熨之三五次
血止不出然暉眩發不能飲食於是作大黃連
瀉心湯日服三貼經七日兩脰大腫與瀉心湯自若
三十日而全愈

萬病回春治鼻衄一方用燒紙七層水濕於頭門
上以熨火斗熨之即止卷四失血

水病忌針出水本集卷三當參看

原南陽曰、腹以下大腫シ、股陰ナトヘ吹切、自然ニ
水漏テ、夫ミテ格別腫ハ減スレバ、元來不利ヨリ
發セシナレハ、又腫滿ス、偶ニハ多分ニ水モヒ全
愈シタルモ見タリ、又吸瓢ニテ吸セテ愈タルモ
見タリ、千金方ニ水病忌腹上出水、出水者一月死、
大忌之トアリ、予先キニ見タル、小腹陰股ニテ口
ヲ生タリキ、サテ療治ノ耻辱、天地ニ面ノムケヘ
キ無シ、命ノ盡ル故ニ、手段殘ル姿也、吹切所ヨリ
水泄レテ愈ホトナラハ、藥ノ驗ナキハ云ワケモ
ナキ次第也、醫事小言卷三

享和中星陵某ト云ヘル人水腫刺鍼法一卷ヲ
著シテ水腫ヲ刺スニ、五利六害アルヨラ云ヒ
タレ正治法針法ハ、秘シタルニヤ載セサレハ
茲ニ舉ケズ、

大忌者十人、火辛火中火見ヤド、小頭倒置ニテ口
腹タリ半全モニ水毒思観土出水出水音一月後
愈ニ及水毒思観火又如標ニ天灾オキ命ニカニ
發カシナ、以反觀病之多矣ニ水子メ全
水脈ニ矢ニ天禁限、翻然感火ノ刃來不休也
原南湖曰、觀以下大頭ノ逆氣、四十ヘ度ノ自燃ニ
水脉之陰出水本草集解三言參看

昏睡用酸棗仁湯

獨醉醫談、山脇東洋先生治河漏停滯而煩悶者、乃
復進河漏于口而令吐之吉益東洞先生有昏睡四
五日不寤者乞治即與酸棗仁湯令灌於口即寤皆
是活轉機用之人

泰定養生主論、酸棗仁湯治多睡及不睡、酸棗仁
湯治多睡多不睡、酸棗仁和皮微炙、人參去蘆、茯
苓去皮、各等分、右為末、每服一錢水一盞、煎七分
如不要睡卽熱服、如要睡卽冷服、卷十一

味不取酒。數服。或累日。令退費。十日。以之。

禁去。或半日。古者未有。母期一月。木。一盞。顏子父

馬。半日。退。木。謂。酒。麥。半。叶。又。退。入。參。去。靈。方。

泰。安。

夏。主。病。酒。麥。半。長。多。謂。木。不。謂。酒。麥。半。

吳。舌。難。數。用。人。

五月。不。舉。首。少。口。酒。來。少。無。令。飲。火。口。咽。藥。皆。

數。直。西。諸。干。口。而。令。土。少。吉。通。東。同。夫。主。育。魯。禪。四。

禮。在。越。山。謂。東。主。主。口。而。新。亨。革。而。更。門。春。八。

晉。楚。用。頌。麥。半。

吳茱萸湯治頭痛

椿庭隨筆卷二

廿九可參看

津田玄仙曰、一男子年四十餘、一日卒然トシテ、頭
百會ノ穴ヨリ起ツテ、頭上一面疼痛スル。烈衣ク
カ如ク、カナ植ニテウツカ如シ。熱スル。炎ノ如
シ、嘔逆シテ黃水ヲ吐シ。目アヘテ開クヲ得ス。
足臍厥冷スル。冰ノ如シ。甚タシキトキハ氣絶
シテ、シバテク人事ヲ知テズ。日ニ三四度モ發ス。
苦楚忍フヘカラズト云フ。是ヲ診スルニ、脉細數
ニシテ身熱ナク、舌ニ胎モヲヒス。夕、腹内脣中
ノ動氣衣ヲウツ、ニ便ツ子ノ如シ。乃傷寒ノ吳茱
萸湯ニ沈香五ヶヲ加テアドフ。二日ノ中、氣絶止ミ。

嘔逆吐水ニルマリ、足臍ノ厥スルモ少シ温ヒリ頭
上ノモユルヤウナモ、大半ゲンシ。然レニタ、臍
中ノ動氣サカシナリヨツテ桂枝加龍骨牡蛎湯
ヲ服サシム、十日ノ後、動氣ヤ、ヲサマリテ前症
コトクタ愈タリ。療治茶談卷九

至寶金匱水火「水火味之甚也」
水火味之甚也、黃水火味也、目也、人間也、是水火
火味也、水火味也、火味也、火味也、火味也、火味也
百會火水火味也、火味也、火味也、火味也、火味也、火味也
率田火水火味也、火味也、火味也、火味也、火味也、火味也

異葉蔓草根苦蘗散

反胃渴嘔有屬症者

大橋尚因曰、一婦人吐食、眾醫皆以為翻胃、身體羸
瘦、起居轉難、十有五年猶未治、諸醫俱束手、予診脈、
以為寒疝、根在臍腹、大如覆杯、此痛令人吐者也、是
衆醫所過也、與家製半夏湯五貼便止、而又下痢、
蓋寒邪逐水飲、上奔則吐也、下行則下利、今也實下
行矣、宜先治瀉、因與家製苓木羗附湯、瀉果止矣、而
後以古施附湯攻病源、不過五七劑而全愈、病婦曰、
百年之患、為君失矣、傍人又曰、起鏡之妙也。附錄
又曰、同袍牧子圭過予曰、吾母病心腹痞滿疼痛、不
飲食、日吐水數升、骨立倦怠也、他日醫為留飲治之、
反胃渴嘔有屬症者

無驗。其年七十餘、一以喜其壽、一以懼此病。吾子願治之。予徃診其脉、告曰、寒症也。病得之寒矣。病母日。君之言是也。吾一日嚴冬冒風、忽為惡寒、無幾此病發。予曰、一朝之邪、何至此乎。是元有症外感之邪相促以使然也。卽為之作茯苓湯飲之。藥入腹吐卽定。又與桂枝加附子湯、平其症而病方已。子圭又來曰。曩襄阿母疾病矣。藥治無驗焉。僕不勝其憂、足下為吾重心藥、以起其廢、深荷大德。何日忘之。同上

津田玄仙曰。當歸四逆湯。○方治 痘邪之嘔吐反胃。年久シク症氣ヲ持病ニモキタル人、脾胃ノ虛寒ヲカヌル寸ハ、多ハ翻胃膈噎等ノ廢證トナルモ。

ノナリ。症氣ノ反胃ト云フハ、醫書ニ方論ナシ。コノミワケハ、腹中雷鳴シテ、心下ヘサシコミ。其雷鳴が又小腹ヲ横スデカイニ下リ。腰ヘ落コンデ止ル。予が經驗ノ病人、皆カクノ如シ。此方ヲ用テ、大效ヲトリシコト多シ。療治茶談ニ編。

又曰。症氣經驗方彙ノ症氣門ニアル當歸四逆湯ニ、沈香呑茱萸烏藥ノ三味ヲ加ヘテ、加味四逆湯ト名ツケテ、或ル大醫家ノ極秘方タリ、ナルホド、之ヲ試ルニ、其效シ格別ナモノナリ。其主治ハ、寒症一切ノ症ヲ治ス。兎角症氣ノ年ヲヘタル症ハ、イヅレニモ見ヘテ見ワケガタキモノナリ。予一

病人ヲ治ス、トカク食ヲ喰へハ吐ス、又腹ガグワ
テく鳴リテ下ル、胸ニ荷繩ノ如キ物アリテ、ツカ
ヘル、又時ニヨリテハ、虫モ吐キ、腹モ痛ミ、ヤセコ
ケテ見ラレズ、如_レ此モノニ年ナリ、脉ハ微數ナリ、
イロくノ_レスレモ治セズ、予痴氣ト見タテ、此
加減ノ方ヲ用テ、藥服四五十バカリ飲テ、手モナ
ク治シタリ、又一人ハ胸ニ大キナモノガ下カラ
上ルト氣絶シ、マモナクホンキニナルト、汗ガ流
スホド出ル、トカクコノ發セ又時デモ、氣ガモウ
くトシテ、アケシキ日ナシト云フ、予ハ沈香天麻
湯ヲ用ヒタレモ、效ナシ、脉ハ沈微ナリ、如_レ此モノ

二月バカリ、遠山孝庵トイフ毎西者、予ニ教ヘテ當
歸四逆湯ヲモレトイフ、予モ痴氣ト見タテタル
主意ガ面白サニ、此加味ノ方ヲ与フ、相應シテ十
日バカリノ間ニ全快シケリ、コノニ人ハ、寒症ノ
見ヘガタキ忘ナリ、トカク如_レ此忘ハ、療治ノ仕覺
テナケレバ、見スカレヌモノナリ、同三編
又曰、予壯年ノ時、一婦人ヲ治セリ、其證アル時ハ
水ヲ吐テ、水逆ノ證ノ如ク、アル時ハ、食ヲ吐テ膈
噎反胃ノヤウニ、毎日食ト水トヲ吐ク、十九年
ナリ、種々治スレモ、效ナシ、治ヲ予ニ求メケル、予
蛔虫ノ吐ト見テ、烏梅丸ヲ用テ、穀食ヲ絶シムル

「七日が間、かくなノ如ク治ヲナス」、以上三十日
ハカリニメ、小效アレモ、全快ト云フニハ至テズ。
藥服ヲヤメテ、今年マデ四年ナレモ、サシク病
氣ガヨモリモセズ、ヤハリ昔シノ如ク、水食ヲ吐
テカワルトナシ、今ヲ以テ見ルニ、コノ婦ノ證、痴
氣ヨリ來ルトキガイナシ、因テ藥ヲス、メテ、又
服セシムルニ、痴氣ノ方ヲトヘケルニ、果メ病氣
四五十日ヲヘテメ全快シケル、方ハ治痴凡ト、桂
枝加附子湯ヲ用ヒタリ、コノ婦ヤミツイテヨリ
以來、三十年ニ及ブトイヘモ、一人痴氣ノ歎曰按ヲ
メグテスモノナク、月日ヲ病苦ニツイヤサスル

「ハ女ガ不幸カゾモイ、駭異ハミカ、是非モナキ
天命ナテズヤ、予ガ治ニヨリテ、久病一朝ニ全快
シタルモ、其病根ヲ見ツケヘキ時ニ見ツケズ、人
其期ヲスギ、幸ニカノ女ノ在命ニヨツテ治シタ
レバ、畢竟ノ處、テガラニハ非ズ、反テ耻ナリ、姑ク
コレヲ記ム、同志ノ將來ライマシム、又烏田村源
兵衛トイフモト、二病ヲ患フ、其證四年が間、毎日
食ヲ吐キ、且ツ泄瀉日ニニ三行ナリ、飲食ス、マ
ズヤセオトロヘタルト、枯木ニヌレガミヲハリ
タル如ク、脉ハ沈微ナリ、然レモ元氣ノハリヨク
メ、死病トモ見ヘズ、腹鳴甚シク、時ニ小腹錐ニテ

サスガ如クイタム。病證ノアテニシカクノ如シ。
是モ四年ガ間、一人疝氣ノ思ヒツキナクメ。醫者
手ヲコマスクニイタレリ。予寒疝ノ證トナシテ。
當帰四逆湯ヲ用ヒテ、四年ノ大病、十四五日ヲヘ
ズシテ、大半イヘ、已上日數三十日餘ヲヘテ、全ク
イユ。以上ノ醫案ニヨツテ、疝氣ニモ、嘔吐ノ證ア
ルヲ知ルベシ。同四編

又曰、一婦人ナンノ故トモ知テズ、飲食ヲ吐クフ。
アタカモ膈噎反胃ノ如シ。然レニ形体無事ニズ。
元氣スコシモオトロヘズ。九年ヲ經テ治セズ。其
間或蛔虫ヲ以治シ、膈噎反胃ヲ以テ治シ。其外

妙藥散葉名灸ナドノ類。手ヲツクセモヨクモナケ
レバ、惡クモナテズ。治ヲ先師ニ求ケル。先師腹ヲ
オスニ、臍ニアツテ餘ホド動氣アリ。モシヤ疝氣
ニヤアラント、ダシカニ見コミタフハナケレ。モ
諸治ノ效ナキミ、コモリハテ、ステモノニメ。疝氣
ノ療治ヲシケレバ、大半治シタルヲアリ。記ノ後
治ニソナヘヨトテ、先師ノ予ニ示サレケル。是疝
ニモ吐ノアル一ツノ證ナリ。又疝癥積聚編、医
案ニ、一婦人云々、又牧子圭云々。文上ニ載ス
故省ク

是年四月方開一人。京氣
雲未ニ日暮入矣。又殊不
當。故知其子ノ事也。大驚。尋
求之。大半日。未見其人。偶於太
半畠中。拾得一草。其根葉皆
斷。子大驚。以手觸之。乃知其
是。而子嘗以手觸之。故子見
之。子曰。此必是也。取以歸。
大半日。視之。乃知其子。未識。其子
元氣也。急予十枚。不次。未識。其子。未
數藥。其子。急予十枚。入藥。其子。未識。其子。未
數藥。其子。急予十枚。入藥。其子。未識。其子。未

淋病有屬症者

大橋尚因曰。松山生者。患淋疾十餘年焉。一日大發。莖中疼痛。小便膿血。小腹有塊。牽引脇下。予診之曰。盤腸氣也。便血雖似血淋。有塊痛者。難為血淋。亦當利腸氣。即作四味茴香散與之。卒痛止。血淋全愈。

積聚編

四味茴香散。治疝作淋。瀝。膏囊。肚抽。方用。大
烏藥。良薑。甘草皮。茴香等分。右為細末。溫酒調服。一
〇

按此方見本事方

無方名

津田玄仙曰。予一人ヲ治セリ。其證故ナフメ。タチ
マチ小便ヨリ血ヲ出ス。其妻驚テ。予ガ診ヲ請フ。
予傷寒論ノ猪苓湯ヲ与フ。妻又急ラツケテ曰久
二便トモニトデテ。通スルヲ得ズト。予諸診ヲ
淋病有屬症者

併セテ考ルニ、疝秘タルヲ疑ナシト、ヨツテ大黃附子細辛湯ヲ用テ、一服ニメ大便通ジ、二服ニメ小便モ亦通スルヲ得タリ、然レニ渴血ト、マラズ、小腹急痛ノクルシ、勿基シ、予ヲモヘテク、コノ病人モト疝積アリ、シカルニ、一朝房事ヲ犯メ、疝積ヲ動ズルガ故ニ、血出ルナラシト思ヒ、コレヲ問ヘハ、果メシカリ、即コノ四味茴香散ヲ用テ、治スルヲ得タリ、又木更津驛ノ横田屋吉次郎ト云フ富家、一病ヲ患ス、其證手足シビレテ、肌肉腫動スルヲ中風ノ如シ、種ニ藥效ナシ、治ヲ予ニ求ム、コノ證ハモハヤ、先医カ中風中氣順氣ノ藥

ヲ用タルヲ疑ナシト思ヒ、疝氣ノ有無ヲトヘ、疝氣ガアリトモキコヘズ、然レニ、病氣以來小便ガ淋病ニ似テ、淋病ニテモナク、小便ヲ通シコロヨロシカテズ、只一度ノ小便ニモ、人ノミヅウハイモカ、リテ、人ナミニ通スルヲ得、ソレニテモ、ダダアトニノコリタルヤウニテ、甚ダコトルト云フ、予乃餘瀝ハ、即疝邪ガ膀胱小腸ヲトヒアルヲサトリテ、其中風ノ如キ忘ラバズテテカマワズ、五積散ニ、大茴香附子呂茱萸川練子ヲ加ヘテ用ヒケレバ、ト便ノ通シコロヨク、中風ノヤウナル證モ、ゾロクトナラリ、全快ニヨ

ベリ、是小便餘瀝ハ、疝氣ニミアルヲヲ知ルベレ
思フニ中風ノ中風メヤウナル證ハ、是疝邪ノ經
絡ニ在テ、カヨイヲタル故ナリ、故ニ疝氣ノ
藥デトモニ治シタルノ理アキラカナリ、又練木
村ノ藤四郎ト云フ人ノ妹、一病ヲ得タリ、産後二
十餘日ヲ經テ、痔瘡甚シク、且大便カタキ「金」ノ
如クニメ、痛苦イフニタヘズ、血亦大便ニ交リ下ル
ナリ、然レバ元氣ニハ一向ニサワリナシ、一段_{産後}
トイフヲ以テ、補血潤劑用ヒズト云フトコロナシ、
效ナキノミナラズ、ソノ病勢反テツノレリ、予ニ求
ム、コレヲ見ルニ、疝氣ノ證トテハ少シモナケ

レド、已ニ補血潤劑硝黃ノ類、デモ、用テ效ナキ
ウヘハ、轉スルニ疝氣ノ治ヲスルヨリ外ナシト
思ヒ、内症散ニ、大黃一味ヲ加ヘ用タレハ、ナシノ
「モナク治シタリ、又一人常ニ痔ヲ持病ニモツ、
諸治療效ナシ、コレモ内症散ヲナガク用テ、イツヨ
クナルモナク治シタリ、右ノ醫按ヲ見テ、淋瀝痔
血ノ四病モ、疝氣ヨリ發ルモノアルヲ知ルベ
シ、療治茶談四編

明治十三年初復ノ頃、能執奉助矯男、名ヲ失年

廿四五、淋病ヲ患ル、一年餘、西洋家高名ノ人
ニ治ヲ託、水藥散藥等、種々手ヲ尽セば差

ズ余ニ治ヲ乞ス其證腰脚痛ミ腹中拘急甚シ放
ルニ淋ニハ相違ナケレ氏其因ハ疝ヨリ來レル
ナリ因テ仲景ノ當帰四逆加吳茱萸湯ヲラブ
凡ソ一月日餘ニハ大ニ效アリ凡ソ一月許ニメ
全ク愈ユ泰助來リ謝メ云病ノ愈タルハ實ニ
大效ナルトハ申述モコレナク侯共二年ノ間
高價ノ洋藥ヲ用タル、殘念至極ナリト語リ
テ笑ヒヌ

三十年已前百：鳩窓ノ門人豐田省吾トイヘ
ルモノ余ガ門ニ入ルアルトキ云入鳩窓ノ父
漢陰淋病ニ喜テ當帰四逆加吳茱萸生姜湯ヲ

用ユト咄セシニアリ當時漫然聞過セシグ今
茲コノ方ヲ用テ思出シ大ニ感服シタレハ此ニ
錄メ資攷ニ備ス

小兒久病生疳

香月牛山曰、小兒ノ疳疾ニ五種アリ。皮黃、肌瘦、髮直、屎白、肚大ニメ青筋アリ。好テ食ヲ欲シ、泥土炭茶生米ノ類ヲ好ミ食シ、或ハ吐シ、或ハ泄シ、或ハ大便堅硬祕塞シ、腹内ニ積塊アツテ、諸虫トナツテ、怪キ病ヲナス也。是皆乳母ノ攝取法ニソムキ。其熱乳ヲ飲シムレハ、疳虫ヲ生テ。怪キ病ヲナス也。又ハ久ク吐乳ヲナシ、久泻久痢ノ後、久瘧久咳下血久瘡ノ後、皆津液亡テ、濕熱ヲ生シ、其濕熱ニ依テ虫ヲ生メ、怪キ病トナルナリ。漸ク飲食ヲナス時ニ至リテ、酒肉油膩ノ物、生冷硬物、涼水西瓜。

甜瓜、紅柿、糯米、砂糖、饅頭ノ類ヲ過食シ、脾胃ニ積
テ久キ時ハ濕熱トナツテ、疳虫ヲ生スル十人、此

活套卷下

原南陽曰、萬病回春ニ、夫小兒疳病云々、又因久吐
之後、久瀉之後、久痢之後、以致久渴、久汗、久熱、久瘧
久嗽、久下血、久瘡之後、皆能亡失津液、並成疳病。此
久ノ字至テ味アリ、皆久病ノ後ニ發ス。醫事言卷

五

萬病回春、夫小兒疳病、由乳母寒熱失理、動止乖違、
飲食無節、甘肥過度、喜怒氣亂、醉飽傷勞、便乳兒
者、故成病。病又因久吐之後、久瀉之後、久痢之後、

以致久渴、久汗、久熱、久瘧、久嗽、久下血、久瘡之後、皆
能亡失津液、並成疳病。錢氏云、疳皆脾胃傷、亡津
液之所作也。卷七

卒霍亂說 溫知殿西談第九號

安政戊午以來、暴瀉病屢流行ス、西洋ニテハ虎烈
刺ト云、漢名詳ナラズ、是ニ於テ、或ハ蕃痧ヲ以テ
目シ、或ハ沙病、或ハ暴瀉等ノ名アリテ、一定セス。
余攷ルニゾレ一種ノ疫ナレモ、其目ハ霍亂ヲ以
テ定名トスヘビ、霍亂トハ、揮霍掠乱ノ義ニテ、固
ヨリ卒暴人^辛義猶卒中風ノ卒ノ如シ、徃年霍名ナ
レ凡、肘後方卒霍亂ノ字面ヲ以テ、的當トナス、ベ
シ卒トハ卒暴ノ卒、猶卒中風ノ卒ノ如シ、徃年霍
乱後痕ニ變シタルヲ兩三人見タルヲアリ、其頃
ハタゞ病ノ變化測ルベカラザルモノトノミ思

ヒシガ、傷寒論ニ、本是霍乱、今是傷寒トアルヲ視
ルニ、同因ナルヲ明ケシ、但疫ノ邪ハ先皮膚經絡
ヲ犯シテ後藏府中ニ入ル、霍亂ノ邪ハ皮膚經絡
ヲ經ズシテ直チニ腸胃ニ入ルナリ、或人曰、此病
霍亂ト大ニ異ナルヲアリ、霍亂ハ必腹痛スコノ
病ハ腹痛スルモノハ十中ノ一ナリ、余謂腹痛モ
霍亂ノ正證ニアラズ、故ニ上吐而下利、謂之霍亂
トアリ、六腹痛ノ文ナシ、醫家理中湯ヲ用ルニ、或
ハ腹痛ヲ目的トスルモノアレ、凡理中湯ニモ亦腹
痛ヲ言ス、若果ノ腹痛ヲ以テ正忘トナサハ、霍亂
篇中、一言腹痛ニ及ザレハ何ソヤ、巢源千金等ニ、

飲酒食肉、生冷過度ナドアリテ、舉世皆其說ヲ佳
トスレ、コレハ霍亂ニ食傷ヲ兼タルニテ、腹痛
ハアルヘキ苦ナリ、食傷ヲ兼ルハ尋常ノ霍亂ニ
テ、方今ノ卒霍亂ニアラズ、此病甚ケレハ、多ク轉
筋ス、轉筋ハ諸病ニアレ、霍亂ニ多メ、他病ニ稀
ナリ、是乃方今ノ暴瀉ハ、霍亂ノ真面目トナスヘ
キ一毫ナリ、或人又曰、コノ毫甚レキニ至テハ、米
泔水ノ如キモノヲ利ス、霍亂ニナキ毫ナリ、余謂
水精四布、五經並行ケハ無病ナリ、若暴注下迫ニ
因テ、水精四布スルヲ能ハス、粹ニ純粹ノ精液下
脱スコレハ此病ニ限ラズ、下利甚レケレハ、他

病ニモアルヘキ「」。辨脉法ニ聲咽塞寒厥相
追爲熱所擁、血凝血下、狀如豚肝、陰陽俱厥、脾氣孤
弱、五液注下、下焦不盡、清便下重トアリ。コレハ清
邪濁邪ヲ廣ク說キタル章ナレ。五藏ノ津液注
下スル「」ハ同義ナリ。或又曰、コノ症額上陷ル亦
霍乱ニナキ忘ナリ。余謂醫家不可發汗、汗出必額
上陷、脉急緊、直視不能胸、不得眠。コレモ醫家ニ限
リタル「」ニハアラズ、陰虛シ精脫スレハ、諸病ニ
アルヘキハ必然ノ理ナリ。大凡コノ症普通ノ霍
乱ト大同小異ナルニ。其小異ヲ執テ、大同ヲ取ザ
ルハ甚謬ナリ。又コノ病夏秋ニ多火春冬ニ稀ナ
リ。

ルモ霍乱ト同シキ「」ヲ證スルニ足ル。其死生反
掌ノ急ナルハ、一種ノ疫ニテ、食傷ヲ兼ズ、邪直チ
ニ腸胃ヲ犯スユヘ、精氣一時ニ脱スルナリ。若夫
番沙等ノ名ハ、所謂其說ヲ求テ得ズ、隨テコレガ
辭ヲ作ルノ濫名ナリ。

陳修園醫學實在易卷三霍亂續論中、大吐大瀉
ノ霍亂ヲ論ス、大ニ今ノ暴泻病ト相類ス、宜ク
參攷スベシ。

其言ノ所牽會
傳強ノ說ナク、明
人ノ著述ニハ大旨
用ノ書也ナリ。

戴元禮証治要訣

戴元禮ハ丹溪門人ノ由ナレ。其趣丹溪ト異ナルト徃ニアリ。續醫說卷三ニ、近世方書、惟戴元禮證治要訣議論切當、有益後學。トアレハ、明代ニテモ評判ヨロシキト見ユ。其書中ニ、脉ヲ言ヒタルトナシ、ナニカ見識アリタルト見ユ。コレハ桂イヘリ。段西籍考ニ見ニ。○卷八、五虛傷寒、金匱ノ方ヲ舉クルニ、皆局方活人書ヲ引テ、本書ヲ載タルコナシ。傷寒金匱ハ、顯晦一ナラザル書也。宣當時世ニ流傳セズ、目ヲ寓スレニ及ハサル矣。

又按ニゴノ書元禮述トアレ。恐ハ門人ノ錄セ

セシ所モアルヘキカ、何トナレハ、卷三陰癪氣當歸四通加吳茱生姜ノ條ニ載復菴曾用之効。又卷五載復菴云、腹内諸般冷痛、一箇枳實理中湯加減作無限用。ゴノ文自撰ノ口氣ニアラザルニ似タリ。又類方ニ增入ノ字面社ニアリ。並ニ門人等ノ補フトコロニ似タリ。

淺田栗園先哲醫話北山友松子ノ條ニ拙軒曰。有明一代醫書之多汗牛不啻所謂摸擬釘餌者居多。戴復菴吳有性陳實功之外僅ニ數家耳。

敏魚頭治脫肛本集卷十七當參攷

惠美寧固脫肛不愈者食敏魚頭愈。若愈後發咳嗽者遂成勞狀。先哲醫話卷下

有持桂里曰。千金治脫肛歷年不愈方。敏魚頭一枚燒令烟盡治作屑以傅肛門上。進以手按之。此物外貼ノ功カクノゴトシ。此ヲ內服シテ治脱肛亦頗效。方選輒卷十四

益潤口

卷之六
大通會食錄



