

醫學
管子
雜
外集
五

✕
i 18-2

490.9
I_g-4
55

No. 2050
12 18-2



富士川文庫

1262

醫學管錐附錄卷五目錄

不為良相則為良醫 青皮治乳核

石連甘草湯

史記司馬相如病消渴范睢置廁中說

宗祇論醫 消鼻痔方

椒葉治癰 附梓椒辨 兩臂脫肉

水腫不林醋 疥瘡浴湯

黃連解毒湯四物湯治崩漏 附溫經湯說

茯苓杏仁甘草湯治噎反胃 附先輩車 噎反

胃滯高裏有瘀血說

河豚治膈噎

石長生丹治膈

梓楸異同辨
梓葉治痔

九折三山田
氏圖書之記

反胃辟囊林示穀食水飲法

癩肝治勞

胃管癰無咳嗽說

膈病百日 附胃脫說

半夏厚朴湯治膈壅

水煎下

林葉

宗師

史

可

不為良相則為良醫

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

○范文正公ノ

不為良相則為良醫

當與本集第六卷醫卜宰相並稱條相參看

劉君涯庭曰不為良相則為良醫トイヘルハ人口

ニ膾炙スレテ其出典ヲ知ルモノ希ナリ此宋ノ

沈作喆少寓簡ト吳虎臣ノ能改齋漫錄ニ見タリ

又宋史崔與之ノ傳ニ父世明試有司連黜毎曰不

為宰相則為良醫遂究心岐黃之書公負者療之不受

直トアリ與之ハ紹熙四年ノ進士ナリ時還讀我書卷下

攷證

宋沈作喆寓簡云范文正公微時嘗慷慨語其友

曰吾讀書學道要為宰相得時行道可以治天下

之命不然時不我與則當讀黃帝書深究醫家奧

不為良相則為良醫

旨是亦可以活人也。公既仕進顯貴入為執政大臣出為大帥其謀經畫所活多矣於醫則固未暇也。君子之重人命其立志如此予觀東晉殷浩妙解脉法嘗有給使叩頭祈死詰問久之乃言小人自有母年垂百歲抱疾不除若蒙官一診視便有生理退就屠戮無恨浩為按脉處方一劑便愈於是悉禁經方嗚呼浩功名大繆幸有絕藝可以起死而深諱其事反以能活人為慚悔自范公視之浩可謂不仁者哉浩不善用其所能而強為其不能宜其敗也。卷五 知不足齋叢書本

宋吳虎臣能改齋漫錄云范文正公微時嘗詣靈

祠求禱曰他時得為良相乎不許復禱曰不然願為良醫亦不許既而歎曰夫不能利澤生民非大丈夫平生之志他日有人謂公曰大丈夫之志于相理則當然良醫之技君何願焉無乃失于卑耶公曰嗟乎豈易是哉古人有云常善救人故無棄人常善救物故無棄物且大丈夫之於學也固欲遇仁聖之君得行其道思天下匹夫匹婦有不被其澤者若已推而納之溝中能及小大生民者固惟相為然為相既不可得矣夫能行救人利物之心者莫如良醫果能為良醫也上以療君親之疾下以救貧民之厄中以保身長命在下而能及小

汪石山曰仕不至相則其澤之所及不如醫之博也余遺其出典

大生民者捨夫良醫則未之有也卷十三 五十九

宋史崔與之傳云崔與之字正子廣州人父世明

試有司連黜每曰不為宰相則為良醫遂究心岐

黃之書貧者療之不受直與之少卓犖有奇節不

遠數千里遊太學紹熙四年舉進士列傳一百六十五以上

三書借鈔况齋先生架藏本

此處為書影印，文字模糊，難以辨認。

此處為書影印，文字模糊，難以辨認。



合 青皮治乳核

時還讀我書、漢陰云、本綱附方ニ、乳核ヲ治スルニ、青皮末ヲ酒ニ服スル方アリ、乳巖ノ未潰モノマテモ、此ヲ用テ屢驗アリト、予因テ其言ニ從ヒ、日ニ一錢ヲ用ヒ試シニ、果メ效ヲ得タリ、神方トイフヘシ、此方ノ効アルニツケテ、本綱附方ヲ檢スルニ、丹溪ヲ引タリ、此ハ格致餘論乳硬論ヲ取タルニ、サレド、文大ニ異シ、餘論ニハ、本草單方青皮湯ト見タリ、因テ証類ヲ考ルニ、食醫心鏡ヲ引テ、治吹妳不痒不痛、腫硬如石トイフ方ナリ、李氏ハ、心鏡ト餘論トノ文ヲ湊合シ、心鏡ノ名ヲ没

青皮治乳核

シ丹溪方トノミ出セリ此イカナル伎倆ニヤ方
ノ出典ナトハ治術ノ關係スルヲナラ子ハイツ
レニモ用ヤスキヲ要トスヘシトオモヒ取リテ
斯クセシニヤ然漫ニ古人ヲ改シヨリハ詳ニ出
典ヲ舉タランコソ後人ヲ眩惑スルノ罪ナカラ
ム卷下

產育全書本綱附方青皮散治乳房結核疼痛及吹
乳妬乳青皮右一味細末酒調服服原作敷百百
漢陰云此方極効雖乳竒未潰爛者屢有神効卷
一試驗方

食醫心鏡治吹奶不痒不痛腫硬如石以青橘皮

二兩湯浸去穢焙為末非時温酒下神驗證類本草卷二

十三橘柚條

格致餘論若夫不得於夫不得於舅姑真及怒鬱悶
昕夕積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大其
子不痛不痒數十年後方為瘡陷名曰妳岩以其
瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣若於始生之際便
能消釋病根使心清神安然後施之以治法亦有
可安之理予族姪婦年十八時曾得此病察其形
脉稍實但性急躁伉儷自諧所難者後姑耳遂以
本草單方青皮湯間以加減四物湯行以經絡之
劑兩月而安乳硬論

本草綱目青橘皮附方引丹溪方婦人乳岩因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成癰名乳岩不可治也用青皮四錢水一盞半煎一盞徐徐服之日一服或用酒服卷三十
名醫類案一婦形脉稍實性躁難於後姑乳生隱核以本草單味青皮湯間以加減四物湯加行經絡之劑治兩月而安卷十

醫國子正傳單煮主目皮湯治婦人百不如意久積夏麥樹乳房內有核如鰲魚碁子每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已上二方間服至核消住藥卷六引丹溪

石連甘草湯

本事方治傷寒發狂或棄衣奔走踰墻上屋鵲石散黃連去鬚寒水石各等分右細末每服二錢濃煎甘草湯放冷調服卷九

吉益東洞好テ石黃連甘草湯ヲ用ニ疑クハ鵲石散即其方ノ原クトコロ欵石膏甘草二味ヲ用ユル方ハ錄驗方深師延年等ニ出ツ詳ニ弟一卷石膏單方條ニ載ス參看スヘシ

有持桂里曰本事方鵲石散云云此方本事方ニハ傷寒トアレハ一切狂癰ニ用テ可ナリ棄衣奔走踰墻上屋ト云ホドナル盛ナル症ニ殊ニ佳シ吾間ハ石連甘草湯

ヲ文字サケテ有持ノ説ヲ前へ出ス

方中ニ甘草ヲ加ヘ水煎シ用ユ其効ハ末ニ用ルヨリ
捷シ寒水石ハ石膏ノ釋名ナリ時珍曰其性大
甘寒如水故名寒水石トアリ凝水石ト同名異物
トナリ方輿輓卷五

和田東郭曰石膏黃連甘草湯ハ本事方ニ龍石散ト
云テアリ連膏ノニ味末トシ甘草煎汁ヲ用テ送下ス方アリ
東洞此方ノイキカタニテ右ノ方ヲ用シ本彼ニヨリテ用ト云
今ノ方家參連白虎ノユク處ノ敬馬癩ニ用ルニ此方ヲ用ユ
風引湯ノツヨキ處ヘユク也又骨人痛ニ用ユ又小兒二三歲
ニ至ル迄骨路不堅諸藥無効ニ石膏ト甘草トニテ治
タリ此皆二類ノ方ナリ百疾一貫

司馬相如

史記司馬相如病消渴范睢置廁中說

史記相如口吃而善著書常有消渴疾與卓氏婚饒
於財其進仕宦未嘗肯與公卿國家之事稱病間居
不慕官爵常從上至長楊獵是時天子方好自擊熊
羆馳逐野獸相如上疏諫之其辭曰云云 又相如
既病免家居茂陵天子曰司馬相如病甚可往從悉
取其書若不然後失之矣使所忠往而相如已歿家
無書列傳百十七卷百

或人余ニ謂テ曰司馬相如消渴ヲ患ル一固ヨ
リ論ナキナレ氏消渴ニテ死シタルナレハナ
シ余考ルニ消渴ハ緩慢ノ病ナレハ其死スル

司馬相如病消渴范睢置廁中說

消渴ナルヲ疑ナシ種々ノ賦ヲ作リタルモ多
ハ病中ノ作ナリ原書ヲ熟讀スレハ余言ノ誣
ザルヲ知ラン

又須賈為魏昭王使於齊范雎從留數月未得報齊
襄王聞雎辯口乃使人賜雎金十斤及牛酒雎辭謝
不敢受須賈知之大怒以為雎持魏國陰事告齊故
得此饋令雎受其牛酒還其金既歸心怒雎以告魏
相魏相魏之諸公子曰魏齊魏齊大怒使舍人笞擊
雎折脅摺齒雎佯死即卷以篋置廁中賓客飲者醉
更溺雎故僂辱以懲後令無妄言者雎從篋中謂守
者曰公能出我我必厚謝公守者乃請出弃篋中死

人魏齊醉曰可矣范雎得出魏後魏齊悔復召求之
魏人鄭安平聞之乃遂操范雎亡伏匿更名姓曰張
祿范雎列傳卷七

按范雎折脅摺齒廁中ニ置クテ蓋一日ニアラ
ズ必生スルノ理ナシ其幸ニメ生ヲ得ルモノ
ハ必尿ヲ飲シナラン千金方ニ云論曰凡被打
損血悶搶心氣絕不能言可壁開口尿中令下咽
即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人安
著以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小
便二升コレ更溺雎ト云モノ實ニ范雎ノ大幸
ナリ小便ノ杖瘡金瘡等ニ効アルヲ本集第七

卷ニ輯置ケリ、參看スヘシ

更ニ代々ト更ニ... 昔以テ... 又... 不... 行... 相... 蘇... 入...

下宗祇論醫

陶隱居本草序例祖訥云云 先輩此所ヲ講スル

ニ及ンテ、雜話アリシ、アル人、宗祇ノ許ヘ來テ申

ケルハ、我數年ニ及テ、連歌執心致シ候トイヘ、

終ニ事ユキ候ハ子ハ、醫術ヲ稽古致シ候ハ、

ト申ケレハ、宗祇ノ申サレケルハ、勿体ナク覺ヘ

候、今マテノ稽古モ徒ニヤナリニナンス、マゲテ

醫學ヲ一思食トマリ玉ヘト申サレケレハ、サテ

ハ、吾連歌ノ器量ヲヤ見ラレケント、獨咲メノ歸

リケル、跡ニ居殘リタル面、宗祇ヘ尋申ケルハ、

今ノ仁体ハ、我等カ耳ニサヘ、サノニ連歌ニ器量

元和中壽德庵法
眼玄由ノ撰スルコ
ロナリ

アリトモ聞へ候ハヌニ、何トテ只今ノヤウニハ、
仰ラレタルソト問ケレハ、宗祇申サレケルハ、連
歌ノ下手ハ、其身互キニ非ルル、醫師ハ惡クスレ
ハ、人ヲ殺スシ、アレホトニ連歌ガ下手ニテハ、醫
師モ一定下手ナルヘキ故ニト、前聖後聖其揆一
ナリ、本草序例抄此書岡君藏スルコト、書人ノ序例抄
陶隱居本草序例云、晉時有一才人、欲刊正周易
及諸藥方、先與祖訥共論、祖曰、辨釋經典、縱有異
同、不足以傷風教、至於湯藥、小小不達、便致壽夭
所由、則後人受弊不少、何可輕以裁斷、祖之此言、
可為仁識、足為龜鏡矣、

卷二治鼻痔方及卷七

消鼻痔方 本集卷七吹鼻中方當參攷

有持桂里曰、入門瓜礬散治鼻痔甚者、○有持氏

コロ、入門此方誤アリ、疑ハ有持氏意ヲ以テ改ル

ナラシ、且此方諸書ニ載ス、今本事方等ヲ出シ、入

後ニ出ス、鼻痔輕者ハ瓜蒂ニテモ、甘遂ニテモ、只

一味ニテ治ヲ得ヘシ、重者ニ至テハ、此散ニアラ

サレハ、收功ガタシ、螺殼ハ、夕ニシノカラシ、烏頭

ハ、根ノ先キ尖リテ、鳥ノ首ノ如キナリ、故ニ州鳥

尖トモ云ヘリ、方輿觀卷十五

原南陽曰、鼻中息肉ハ、何ニテモ輕キ藥ヲ點シテ、
流レ治ス、鉛丹ニテモ治スヘシ、瓜蒂ヲツケルモ

佳ナリ、醫事小言

本事方消鼻痔方瓜蒂四錢炒甘遂同白礬半錢

枯過螺青半錢炒○本草綱目卷四十六海藏集

ノ此螺青ノ一ナルハシ啓蒙四十二ニ青螺ハヤクガヒ薩州夜久島ノ産ナリ故ニ名ク誤テ夜光

ト云ハ形銀色ニ似テ厚ク大ニメ微扁シ外色灰

皮ヲ刮リ去ハ深綠色ナリ再磨トキハ珠色ヲ現スエ人針ニ切テ酒杯トス夜光ト云其層

ハ拳緊層ニ似テ大ナリ厚サ五六分潤サ草烏

二寸餘白色ニメ刺ナシ用テ鎮紙トナスハ

尖同炒右為末用真麻油搜令硬得些子不可爛

旋圓如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化

為水肉皆爛下每日一次用妙不可言卷五七ウ

經驗良方治鼻痔即瘰肉甜瓜蒂又名苦丁香甘

遂各四錢白礬螺青即大青○按螺青ヲ以テ大

青トナスモ人恐ハ

誤草烏尖各半錢右為末清油搜令硬得些子旋

丸如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為

水肉皆爛下每日壹次用新醫方類聚卷七

得効方消鼻痔方瓜蒂甘遂各二錢白礬枯螺青

草烏尖各二分半右為末麻油搜令硬不可爛旋

圓如鼻孔大用藥入鼻內令達痔肉上其痔化為

水肉皆爛下每日一次甚妙類聚七十九

醫學入門瓜礬去鼻痔之疾瓜礬散瓜蒂四錢甘

遂一錢白礬枯螺壳煨草烏尖各五分為末用真

麻油調令軟硬得所旋丸如鼻孔大每日一次以

藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下即

藥入鼻內令達痔肉上其痔化為水肉皆爛下即

愈卷六十五の螺螺卷螺ノ別ノ總名ナル有此用
螺殼ノ用ルモ螺青ノ斷ナリ假令本氏田

水肉香味苦平性寒性大功能入血肉令重骨肉土其毒消滅
 一葉同大冬二木用古未種由野合野不可食菜
 野合大能最有天氣性寒性平性寒性平性寒性平
 水肉香味苦平性寒性大功能入血肉令重骨肉土其毒消滅
 一葉同大冬二木用古未種由野合野不可食菜
 野合大能最有天氣性寒性平性寒性平性寒性平
 水肉香味苦平性寒性大功能入血肉令重骨肉土其毒消滅
 一葉同大冬二木用古未種由野合野不可食菜
 野合大能最有天氣性寒性平性寒性平性寒性平

梓楸異同辯

貝原益軒曰梓アツサ一名カハラヒサキ大和本
草卷十

又曰楸樹ヒサキト云又カシハトモ云其葉ハ桐
 葉ニ似又梓ニ似タリ苗及葉ノ莖葉ノ筋赤シ故
 ニ赤目柏ト云卷十二
ツモノオ

小野蘭山曰梓アツサアカメガシハアカ
 ガシハ本草啓蒙卷卅一セノオ

又楸ヒサギキサギ同上

又曰梓楸ノ名古ヨリ混淆ス時珍ノ説モ分明ナ
 ラズ秘傳花鏡ニ梓ノ形狀ヲ書スルモ楸ノコナ

梓楸異同辯

リ、故ニ大和本草ニモ、梓ヲキサ、ギトス、皆非ナリ、通志畧ニ、梓與楸自異、生子不生角ト云、是ナリ、梓ハ圓實ヲ生シ、長莢ヲ生セザルヲ云、コノ文甚明ナリ、空ク從ベシ、同上

田村藍水曰、梓、和、挨、紫、索、東都近道所在有之、俗名氣索、紫一名雷索、紫肥後州方言、氣福魚、鳥、楸、和名、肥索、氣、京師及東都俗言、挨、各迷、各矢、話、一名三股索、氣、一名雷電木、一名朱木、肥後方言、太郎莫骨、救荒本草刺楸、俗名針桐、是也、

田村西湖名善曰、梓、アツサ、キサ、ケ、楸、アカメ、カシワ、蘭山云、梓、和名阿各、免葛、識滑、昔人承綱目

之謬說、以吉索、傑充之、善之、按廖文英正字通云、梓、莢細長、冬後葉落、莢猶在樹總、然、文英之說、與綱目無異矣、又正字通楸注、引通志云、梓與楸自異、生子不生角、則生子不生角者、謂楸也、梓則生角、故王文煥詩經考、引尸子曰、梓、莢細如著、其長僅尺、今之氣索、紫與此形狀符合矣、蘭山之說、近于妄、大淵君棟軒名常範、通曰、蘭山ノ說、梓、楸相反スル、藍水西湖ニ先生說ク所ノ如シ、範案ニ、梓、大者、高、十數丈、經一圍ニ至ルモノ、往、有之、此、板トナシ、字ヲ刻スルニ堪タリ、楸ノ如キハ、高、十僅ニ丈許、枝幹屈曲、板トナスベキモノニ非ス、西湖翁

曾テコレヲ論ス、一證トナスヘシ、時珍說、楸梓互ニ誤ル、コレ蘭山說ノ因テヲコル所以ナリ、友人森立夫梓楸ノ辨アリ、拙著段補錄卷ニ載ス、當攷茲ニ具録セス、

楸南嶺曰梓和名アツツ書籍ノ彫ニ梓ニナリバム梓云又梓木ヲ以楸ニ作ル墓ニ植
下日本性昔多キモノト見ヘタリ然ニ今ハ真ノ梓木ト云モノ知人稀ナリ余
真ノ梓木ヲイハタ見ス俗ニキサケアカノカニハ梓云物モ本草物産家ニ
二真ノ梓ニ非スト云平松殿琴ノ裏板ニ美濃國梓山ノ梓ヲ用ユト其葉ノ形
如何ナリヤ余モ楸ハ見タレトモ葉ハ見ス後ニ五雜俎ヲ讀ニ梓也梓也積也豫章
也一木而數名者也云々唐土ニモ辨別ニ難キナリ同種物類ノ物ト思ハレタリ
北憲銀誅

五字國語考云梓與楸同類ニ然文英之遺興
六書通考云梓與楸同類ニ然文英之遺興

楸葉治癰 本集卷八當參看

有持桂里曰、梓葉散、療癰疽及一切腫毒方、梓葉、忍冬、各一錢、右二味、以水二合、煮取一合服、或加皂角五分、梓和名、アカメガシハ、又御祭葉、日本書紀トモ云、此方托裏消毒ノ効アリ、方輿輓卷十四按ニ、楸葉ハ楸葉ノ誤ナルヘシ、說前ニ見ユ。

蘭軒先生曰、楸葉ハ癰疽ノ奇藥ナリ、先年大和ヨリ、癰疽ノミヲ療スル人出テ、煎藥ノミ、膏藥ヲ用ヒスシテ、全功ヲ奏セリ、甚其方ヲ秘ス、後其人漂泊シテ、東都ニ至リ、大ニ債ヲ負ス、一藥舖購フニ二百金ヲ以シテ、遂ニ其方ヲ得タリ、即楸葉單煮、

楸葉治癰

山田富士左衛門嘗テ一
 農夫療癰ヲ患シ者
 ニ楸葉ヲ煎服セシメテ
 大功ヲ奏シタリ此夫梅
 毒アリテ咽痛下疳ヲ
 兼ヌ今楸葉ニテ本症
 愈ルニ隨ヒ兼症モ全
 ク愈ハタリト云フ明
 治四年七月十日同氏
 ノ話ス

ナリ、楸ハアカメカシハナリ、森立夫蘭
 軒醫談

清川吉人曰、癰癧濃汁出ルニ至レハ多クハ不治
 トス、此ニハ鯉魚ヲ焼キ、黒存性、白湯ニテ多服セ
 シム、漸シ濃汁減シ、核モ消散シ、愈ルヲ妙也、本州
 諸書未タ見アタラス、記メ後改ニ備ス、又法、昔年
 伯兄云、楸葉一味細末ニメ用ユ、多シ益妙也、トソ
 按本綱附方ニ、筐中方ヲ引テ、楸葉熬膏ヲ用ユ、曩
 時細末ヲ用テ効ヲ得シ、有キ、熬膏ハ未試、梧陰
 雜記下癰癧條

梓葉治痔

思コノ梓葉モ楸葉ノ繆稱ナラント
 思ヘル本書ニナニトモ言ハザレト
 ハ先其マ、ヲコ、ニ載ス

清川吉人曰、寛政中、京橋南涯ノ蒼麥店某母、療痔

神効ノ一術ヲ以頗聞エ、世呼テ痔婆ト為ス、丸岡

疾患痔痛積年、百治無効、因召テ治ス、久患頓愈、疾

其方ヲ奇トシ、以金若干購得シ、以テ諸國ニ傳ス、

先考疾ノ侍醫青木松秀ニ受ク、滿天膏、梓葉陰乾

細坐、水煎、先ツ患フ處ヲ洗、更ニ嫩葉ヲ細末シ、ハ

ルサンコハイヲ調シ、患處ニヌル、且洗且塗、差ヲ

度トス、患輕者、用後方亦佳ト云、辰砂一分、蒲黃一

分、龍腦一分、右研シ、白蜜ニ調シ、傳ク、梧陰
 雜記卷上

梓葉治痔

千金癰疽門搗腫方又方治癰腫痛煩問方聖惠方作淨諸癰潰後生肌藥貼方
椒葉十葉十重帖之以帛裹令緩急得所曰二聖惠方作三局止痛兼消腫蝕膿甚良
勝他物如冬月先收乾者臨用以鹽潤之亦可薄削椒皮用之
治瘡久不瘳之而復發骨節痛中出名為骨疽方
以豬膽聖濟總錄錄之半兩和椒葉能銷之墜于一兩搗封之聖惠方備預百藥方同

聖惠方諸瘡門治一切瘡腫不問硬軟方
右椒葉十葉覆於腫上即以舊帛裹之曰二三易當重之有毒氣為水在葉中如冬中取乾
煎以鹽水浸良久用之亦得不然取椒皮剉爛搗傅之甚良

聖濟總錄治癰疽金線膏方
椒葉五斤白皮馬齒見賦所去

右二味以水五升熬至壺升去滓入罐內以柳枝攪熬如錫盛在瓷器內先以荆芥湯洗瘡次用雞
翎掃藥於瘡上令勻以薄紙貼之更用酒調二錢匕服之

外科精義論炮製諸藥及單方之主療瘡腫法椒樹白皮軍用熬膏貼癰疽惡瘡疔
瘰癧瘰癧

運化玄樞立秋日太陽未升採椒葉熬為膏白瘡瘍立愈謂之椒葉膏
以上據醫方類聚所引抄出

名家方選療乳核初起方
梓葉黑霜一味為末白湯下
和田東郭三物梓葉湯
按梓恐椒誤辨見於前

北山友松子曰久病及大虛人尺肉脫者及指頭不能急屈者多不治

淺田東園先哲醫言
卷上東園曰片倉鶴
陵說蓋本於此

兩臂脫肉

片倉鶴陵曰凡病人肌肉柴瘠者手腕後肉脫而形
扁醫者握其中央時指頭將相合者不問何證為死候
也雖飲食如故此游魂之假息耳勞瘵之病累月後
必見此候唯傷寒痢疾脚氣後有此候者往往愈續
續探卷上病人死候

業廣壯年數診久病往往見其三部脈際臂肉脫
落扁而如削者必不治以為古人未言及後讀片
倉氏書其言與余說暗合頃日又得經傳既說破
者二條揭于斯以備參稽

靈樞五變篇云臂薄者其髓不滿故善病寒熱也

兩臂月脫肉

蘇遊傳屍論曰此病若脊脊肉消及兩臂飽肉消
盡曾前骨出入即難療也外臺卷十三

此病之由... 凡人... 飲食... 脾胃... 氣血... 筋骨... 肌肉... 消... 散... 水... 氣... 殺... 邪... 毒... 證... 類... 本草... 卷... 廿... 六...
水腫不禁醋

水腫不禁醋

有持桂里曰世醫水氣病醋ヲ禁スレハ害ナキ
モノナリ本草ニモ米醋散水氣下氣破結解諸毒
ト云又水病ヲ治スル禹餘糧丸ナド醋ヲ以テ製
スル品モアリ方輿輓卷九

業廣按ニ水腫醋ヲ禁スルハ常ナリ諸方書證
スヘシ然レ醋ヲ禁セサル說モアレハ下ニ一
ニ證ヲ舉テ參商ニ備フ但其證ヲ審ニセスレ
テ既ホ禁セスト云ハ恐クハ是ニアラス

本草黑字醋味酸温無毒主消癰腫散水氣殺邪
毒證類本草卷廿六

水腫不禁醋

又按靈樞五味論酸
走筋多食之令人癢
又酸入于胃其氣蒸以
收上之而焦弗能出入
也不出即留于胃中胃
中和温則下注膀胱
膀胱之胞薄以懦得
酸則縮絛約而不
通水道不行故癢
名證百類安本卷九
羅羅謙甫安本卷九

此經語ヲ載ス又
清本類案ノ注ニ凡治
小便不利不可用酸
トアルニ據レハ水氣ニ
酸ヲ禁セズト云ハ概
論ナルヲ知ルヘシ

素問至真要大論濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛
新校正云辛以苦燥之以淡泄之王冰曰濕氣所
疑當作淡淫皆為腫滿但除其濕腫滿自衰因濕生病不腫
不滿者亦爾治之濕氣在上以苦吐之濕氣在下
以苦泄之以淡滲之則皆燥也泄謂滲泄以利水
道下小便為法然酸雖熱亦用利小便去伏水也
治濕之病不下小便非其法也

崔氏療大腹水病方後云忌鹹粘脂膩及大冷熱
物等唯食稊粟米飯及淡醋外臺卷二十論諸毒

水甄不禁謂

疥瘡浴湯

崔憲雜話小瘡ハ初二先發表スヘシ荆防九文加

石ナドヲ用テヨシカセクチニ藥湯ニ入ヘシ小

山忠兵衛ノ藥湯ナト効アル方ナリ輕忘ハ只逐

ヒ散シタル切ニテ佳キモノナリ卷四七村

醫國子心悟治疥瘡浴湯及塗搽方黃柏當歸茯苓松

脂水飛以上細末各八錢松樹皮雄者佳燒存性二

十夕生羊蹄根研為泥右六味先研爛羊蹄根合細

末五味均調捏令可為團子狀更以温酒一合開化

稀稠得宜令可塗為度別以黃柏當歸茯苓三味投

浴桶中攪勻先令病者一浴了拭乾以右件藥塗遍

身每一度酒一合開化塗盡為度更乾了不得有少
潤寒用火亦不妨既乾了再以藥湯洗更浴湯中每
日一就度毒淺新者三五日深久者八九日疥瘡漸
差四肢屈曲處兩脇尺澤陰股膈中赤爛為效甚者
痒搔汁出仍依前法以瘡為度忌飲酒膏腴他无禁
忌

先友清川吉人通稱曰此方上州屋弥市右衛門

秘方即賣以為產往往有奇效無內攻之患非世

間所行玉水及小山藥湯之比佐藤一齋先生有

嘗得之自試屢驗因為予傳之予亦試效穴文

赤倉谷愚

明治年年初春清川
氏ノ格陰銷間雜記
ヲ得テ讀ミレニ治疥
瘡藥湯方條ニ一齋先生ノ傳ナリトテ此方ヲ載タレハ出典ハ覺見サルヤウニイヘリ余ハ清川氏ノ晩
年面晤セシトキニ醫國學心悟ノ方ナリトテ自筆ニテ傳ラレタリ蓋隨筆中ニハ偶書載セモノ歟

黃連解毒湯四物湯治崩漏附溫經湯說卷

看

有持桂里曰婦人七七ノ數外ニ及テ血下ル者ハ素

問ニ所謂血ハ載火而行ト云是ナリ○按ニ此語
素問中攷ル

シナ其暴下スルハ所謂火主暴速ノ所以ナリ子

和治之黃連解毒湯ヲ用テ一味ノ血藥ヲ雜ヘズ

其意火勢ヲ撲滅サハ血自止ムヘシトナリ子和

ノ醫世人或ハ之ヲ矜スレトモ為ス所皆確見ア

リ今人ノ脉證ヲ審ニセスシテ率意ニ芎歸膠艾

湯黃土湯柏葉湯ノ類ヲ用ル者ト日ヲ同シテ論

ズベカラザルナリ又暴喜暴怒憂結敬馬恐トハ即

黃連解毒湯四物湯治崩漏 附溫經湯說

是レ近世專ラ唱ル所ノ癩是レナリ、癩ハ即火症、
古人治癩求火ト云ヒシ語、何ノ書ニカ在リシ
ヲ記ス、是等ハ面白キ語氣ナリ、今婦人ノ癩家ヲ
視ルニ、經血亂ル、者、イカニモ多キモノナリ、小
橋屋清兵衛母堂、年六十二、踰ハ月經下テ不止、加
之時、下血ス、此人生平小事ニモ憂患シ、脉弦數
ナリ、因テ三黃瀉心湯ヲ投シ、其病大半愈シ、後黃
芩湯ヲ用ヒテ、調理スルヲ月餘、焔全ク消シテ
復故、黃芩湯ヲ血疝ニ用ルコトハ、吾黨所屢試ニレ
テ、其原李挺ノ工案ニ出ツ、方輿觀卷二十四ウ、本
集卷九黃芩湯治血證可改
又曰、龔廷賢曰、崩漏者、有新久虛實之不同也、初起

屬實熱者、宜解毒也、稍久屬虛熱者、宜養血而清火
也、宜溫清飲、此條前ニ所舉子和黃連解毒ノ論ト、
參觀スベシ、蓋シ子和ハ其病新ニシテ盛ナル者
ヲ論シ、廷賢ハ久シテ衰ル者ヲ說ク、各一說ナリ、

同上格ヲ

治病百法、夫婦人年及四十以上、或悲哀太甚、內
經曰、悲哀太甚、則心系急、心系急、則肺布葉舉、而
上焦不通、熱氣在中、故經血崩下、心系者、血山也、
如久不愈、則面黃肌瘦、慎不可與燥熱之藥治之、
豈不聞血得熱而流散、先以黃連解毒湯、次以涼
膈散四物湯等藥治之、而愈、四物者、是涼血也、乃

婦人之仙藥也。量虛實加減以意消息用之。儒門

卷五 五ノウ

又婦人年及五十以上，經血暴下者，婦人經血終于七七之數，數外暴下，內經曰火主暴速，亦因暴喜暴怒，喜憂結鬱，致然也。慎不可作冷病治之。如下峻熱之藥，則死。止可用黃連解毒湯以清於上，更用蓮殼灰椶毛以滲於下，然後用四物湯加玄胡散涼血和經之藥是也。同上 五ノウ

十形三療。孟官人母年五十餘歲，血崩一載，愈用澤蘭丸、黑神散、保安丸、白薇散補之，不效。戴人見之曰：天癸已盡，本不當下血。蓋血得熱而流散，非

寒也。夫女子血崩多因大悲哭，悲甚則肺葉布，心系為之恐，血不禁而下崩。內經曰：陰虛陽搏之為崩。陰脈不足，陽脈有餘，數則內崩，血乃下流。舉世以虛損治之，莫有知其非者。可服大劑，大劑者黃連解毒湯是也。次以揀香附子二兩炒，白芍二兩焙，當歸一兩焙，三味同為細末，水調下。又服檳榔丸，不拘日而安。同卷六 廿九ノ

古今醫鑑：一婦人血崩，年四十以上，悲哀太甚，則心悶急，肺葉舉焦，而上下不通，熱氣在中，故血走而崩。面黃肌瘦，慎不可服熱燥之藥。益血熱而流行，先以黃連解毒湯，後以涼膈散，合四物湯調治。

最效卷六十三才 回春卷六所載文小異

又西園公治一婦人年六十二歲患血崩不止以黃連解毒湯四帖後服涼膈散合四物湯六帖即愈姑記以廣其傳同上

壽世保元一治婦人五十以上經脈暴行內經曰火主速不可以冷病治之如下峻藥即死止可用黃連解毒湯以清其上加棕灰蓮殼灰以滲其下然後用四物湯涼血和經可也卷七姓

萬病回春崩漏者有新久虛實之不同也初起屬實熱者宜解毒也黃連黃芩黃柏生地黃蒲黃右劉水煎空心服稍久屬虛熱者宜養血而清火也

溫清飲治煩人經脈不住或如豆汁五色相雜面色痿黃腹刺痛寒熱往來崩漏不止當歸白芍熟地川芎黃連黃芩黃柏梔子右劉一劑水煎空心服日久屬虛寒者宜溫補也益母湯治煩人血崩當歸川芎白芍酒炒熟地黃姜汁炒條芩陳皮香附醋炒阿膠蛤粉炒各一錢益母草白朮去芦各一錢半玄參蒲黃炒各八分甘草四分右劉一劑水煎空心服卷六

按二黃連解毒合四物湯ヲ崩漏ニ用ルトハ甚妙ナレバ四十以上ノ説ニ拘ルハ非ナリ回春ノ三特ニ年齢ヲ言ハサルハ卓見ナリ明治七

年ノ冬、舊旗下小田切君ノ内室ヲ診ス、毎月月
經ゴトニ崩漏殆ト一年許多紀君ニ託ス、寸効
ナシ、方ハ數ニ轉シタル容子ナレ、余カ視シ頃
ハ、方ハ數ニ轉シタル容子ナレ、余カ視シ頃
地黃劑ヲ十日以前ヨリ、西洋家佐藤春海ニ託
ス、余謂ラク春海巧手トイヘ、コノ病ヲ十日
二十日ノ内ニハ、必治スルコトヲ得ザラシ、先彼
ニ託シ玉ヘト言テ歸リヌ、春海ニ託スルコト、凡
八九十日、阿片ノ類ヲ用ヒ、石灰汁ナドニテ陰
門ヲ洗フ、イツレモ收澀劑ノ容子シ、翌八年三
月、再々診ヲ乞フ、前證益劇シ、大出血ノトキハ、
卒倒人事ヲ省セザルコトモアリ、余藥ヲ與ルコト

一年餘、其人三十餘ナレ、レ、産シタルコトナク、右
臍旁小塊アリ、平素右ノ方腰痛アリ、肝氣甚強
シ、崩漏ノトキハ、頭痛劇シク、右ノ乳、右ノ腰、齊
シク痛ム、一甚シ、瘀血トナシ、桃仁承氣湯、桃人
當歸湯、温經湯、寸効ナシ、趣向湯、全大補歸脾
湯等ニ轉スレ、レ、亦効ナシ、凡出入三年餘、血
鮮血豆汁ノ如キモノヲ下ス、何石ト云數ヲ
シラス、九年三月ノ頃、血ノ際、小便閉ヲ患ス、
瘍科利尿管ヲ用ルコト數ニナリ、導氣除燥湯ヲ
用ヒ、琥珀油兼用シテ、小便ハ通シタリ、其際大
熱大渴、不食不眠ノ諸證蜂起ス、余不圖考タル

ニ、面色痿黃ハ、血虚ニ似タレ、凡、三年ノ凶血ニ、
大虚候ヲ現ハサザルハ、是全ク火ノ為ニ、血ノ
沸蕩スルナラント思ヒツキ、**黄連解毒合四物**
湯ヲ用ルニ、速効ハナケレ、凡、具合甚ク宜シ、漸ニ
頭乳腰ノ痛モ全ク去ル、四月ニ至リ、**月經三日**
ニメ止ミ、五月ニ至リ、**飲食起居常ニ復ス**、
當ニ止ミ、五月ニ至リ、飲食起居常ニ復ス、
凡、具合甚ク宜シ、漸ニ

附温經湯説 卷三 温經湯條可改

金匱温經湯ノ條ニ、**婦人年五十許、病下利數十**
日不止トアリ、五十所ト云ハ、下文曾經半產、瘀
血在少腹、不去ノ句ニ應シテ、驟結ノ血ニアラ
ザルヲ示スナリ、病下利ト云モ、數十日不止ト云、
腹中陽虚ノ候ヲ示シタルナリ、五十ト云ヒ、下
利ト云フ、並大法ヲ説キタルマテニテ、拘ル可
ラス、程林金鑑ナド、下利ヲ下血ノ譌トナスハ、
尤拘リタル説ナリ、此證手掌煩熱トアルトコ
ロ、眼目ナリ、脉經本事方等、並及スベシ、
卷三 温經湯ノ條ニ、載ス、
畢竟滋陰補陽ノ劑ナリ

茯苓杏仁甘草湯治噎反胃
 胃滯裏說
 卷二破
 棺湯治
 十一
 膈噎當參攷
 本集卷八
 茯苓杏仁甘草湯
 有持桂里曰破棺湯
 人傳二因之
 之噎證二試
 ムルニ時ニ奇效ヲ奏ス
 因テ思フ昔日適所翁余
 ニ語テ曰茯苓杏仁甘草湯能ク噎ヲ療スト
 方意稍相近シ
 方輿輓卷七
 細計
 業廣壯年ノ時本郷金助町ニ旗
 下牧野金助トイヘル
 累年痰飲ヲ患ヘ嘔吐數ニ
 百方効ナシ醫或ハ瀉心湯等ノ下劑ヲ投シ
 一時ノ快下ヲ取テ差ユ
 毎發如此一日卒ニ黑血升餘ヲ吐シ
 更ニ黑屎ヲ下メ死ス
 其頃反胃滯裏ノ類必痰
 茯苓杏仁甘草湯治噎反胃
 滯裏說

茯苓杏仁甘草湯治噎反胃
 滯裏說
 卷二破
 棺湯治
 十一
 膈噎當參攷
 本集卷八
 茯苓杏仁甘草湯
 有持桂里曰破棺湯
 人傳二因之
 之噎證二試
 ムルニ時ニ奇效ヲ奏ス
 因テ思フ昔日適所翁余
 ニ語テ曰茯苓杏仁甘草湯能ク噎ヲ療スト
 方意稍相近シ
 方輿輓卷七
 細計
 業廣壯年ノ時本郷金助町ニ旗
 下牧野金助トイヘル
 累年痰飲ヲ患ヘ嘔吐數ニ
 百方効ナシ醫或ハ瀉心湯等ノ下劑ヲ投シ
 一時ノ快下ヲ取テ差ユ
 毎發如此一日卒ニ黑血升餘ヲ吐シ
 更ニ黑屎ヲ下メ死ス
 其頃反胃滯裏ノ類必痰
 茯苓杏仁甘草湯治噎反胃
 滯裏說

血ニ属スルモノアラシク知リ、婦人嘔吐ノ
 症ニ活血破血ヲ用テ愈タルコトアリ、サレドモ、
 格別ノ奇効モ得ザレハ、半信半疑ニテ考モノナ
 サリシニ、今茲^{明治九年}下谷五間町市川某、反胃ヲ
 病シ、一醫人療治ヲ視タリ、増損理中湯、苓桂甘
 朮湯ナド用タリ、先ツソレ等ニテ互シカラシ
 ナド言テ歸レリ、十數日ノ後、不圖黒血ヲ瀉下
 スルコト夥シク、竟ニ斃ル、ニ至ル、先年ノ事ヲ
 思ヒ出シ、臍ヲ噬タリ、嚮ニ金匱集注ヲ編セシ
 トキ、茯苓杏仁甘草湯ハ、瘀血ノ證ニ効アラシ
 ク考置タルニ、有持氏ノ説ニ得テ、猶更嘔吐

○一種瘀血ニ属ス
 ノ證アルヲ審攻シ
 テ

諸證ニ、此方ヲ試タク覺タリ、犀角ヲ加ヘタラ
ハ、犀角ヲ加ヘタラハ、猶更面白カラ
シカト 古人用ルトコロ、メ方今人試用スルモ
 ノ、温胃補脾滌飲利氣ノ法ニ過キズ、偶五靈脂
 ヲ用タル方アルノミニテ、血ヲ捌ク方ハ絶テ
 見ズ、局ニ當ルモノハ迷フモノナレハ、他日此
 證ニ遇ハ、覆轍ノ過ナカラシク、戒慎ムヘ
 キトシ、

附先輩嘔膈反胃癖膏裏有瘀血説

原南陽曰、胃反癖膏裏其原ハ瘀血凝結シテ、形ヲ作
 タルナリ、^{醫事小言卷四十六} 全文載反胃癖膏裏
 又曰、疝ト積トヲ参考シテ、桂枝加附子烏頭湯ニ

香脂丸ヲ兼用スルモ、大小建中工録散モ用ユヘ
シ、香脂丸治血積結痛、何魏ニ莪、乳香、沒藥、丁香
各三錢、右四味為末、糊丸、每服一錢、日三、空心白湯
送下、同上、此丸ニ香脂丸山脇ノ家方ナリ
有持桂里曰、噎膈反胃、血ヲ夾ム者ニ、五靈脂大ニ
有效、余嘗テ此ヲ老醫ノ傳ニ得シガ、本細百病主
治ヲ觀ルニ、亦此說アリシ、方輿輒卷七四十九ウ
又曰、古ニ云、膈噎、神思間病、唯內觀養之ト、後藤良
山翁、年五十ヲ踰、斯病萌シケルガ、亟ニ百事ヲ抛
テ、四方ニ漫遊シテ、天壽ヲ終ヘタリト、其意古語
ニ本ヅク、卓識ト曰ベシ、雖然、今此症ヲ患ル者ヲ

無名氏日記ニ云、一男子四十餘歲、毎年二三度反胃を患ふる事あり、其父より傳
へたる病あり、桂枝茯苓丸を以て一七日して根治せり、此症定所、
此丸は、
此丸は、
此丸は、

視ルニ、間瘀血結毒ニ基ク者アリ、反胃癖毒表ナド
モ亦然リ、如此ノ類、其微萌ノ際ニ於テ、破血攻毒
ノ策ヲナストキハ、十ノ一二ヲ活セン、馮兆張曰
ヘルヲアリ、人皆知百病生於氣、而不知血為之胎
ト、知言ト云ベシ、同上
又治瘀血在胸、噎塞時時、大便黑澹方、桃仁、大黃、枳
實、甘草、右水煎服、噎ニ、大便黒ク澹スルハ、是瘀
血家ナリ、凶候ナレドモ、其人形氣未衰者ナラバ、
此方ヲ用ヒテ、挽救スベシ、此レ北尾春圃方、同
余往年、辻元崧庵翁ニ遇テ、膈噎ノ一ヲ問ヒシ
ニ、予七十餘ニ及ヘ、此効ヲ得シハ一人ナリ、其

醫國子正傳卷三痰
飲引丹溪曰自然成
積自積成痰痰挾
痰血遂成瘰癧此為瘰
為疔為疔疔膈翻
胃之次第也
又許學士用蒼朮治
痰挾痰血成瘰癧囊
行痰極功神本丸
世三六二〇按許氏不言
痰血疑唐六氏所添

方ハ桃人承氣湯ヲ用テ後調理ハ吳茱萸湯ニ
テ愈タリト語レリ今ヲ去ルコト三十餘年近日
痰血ニヨルモノアルコトヲ考シニツキ往年ノ
コトヲ思ヒ出シ識レオクモノナリ

徐靈胎曰若膈疔乃肝火犯胃本來侮土謂之
賊邪胃腕枯槁不復用事惟留一線細數又為
痰涎痰血閉塞飲食不能下達即勉強納食仍
復吐出醫國子源流論卷上膈膈論

醫國子通卷四膈膈門ニ汚血アルトイヘル論數
條アリ參看ス
先友清次吉人曰赫鱸ハ樗園杉本先生漫錄ニ

龍沙紀略ヲ引テ本邦ノサケニ充ツ大ニ妥當
ス俗ニ鮭或鰕字ヲ用俱ニ妥當ナラス此物破
瘵ノ功アリ俳歌師皇月患フ平素酒ヲ嗜ム病
中一日モ飲サレハ殊ニ苦悶朝食暮吐已二十
年ニ及氏日ニ一介ヲ飲サレハ心中憤悶ス針
灸湯丸百方効ナシ一醫飲食ノ禁忌ヲ嚴ニス
一月許頻ニ塩引サケヲ思氏家人許サス一日
獨守リシ故傍人妨モナク毎飲塩引ヲ燒テ喫
ス心中快ク其夜ハ吐セス因テ翼六月ヨリ每飯
喫ス家人モ其意ニ任ス已ニ卅日ニ及レニ乍
一日大便下血多十日ホト止サリシカ腹中快

正傳卷三丹溪
而東垣無及當
及本集卷一

久益ニ吐セス凡十八尾喫盡ス便血モ自カラ
止復サケヲ思ズ積年ノ宿患頓ニ愈其時先考
ノ命ヲ奉偶律佐ヲ訪ニ此話ニ及ヒ試ニ一診
ス脈弦數虚里ノ動衣上ニ動ス後廿日再診ニ
腹滿減シ動モ穩脈ハ猶弦ナリキ究竟玄留血ヨ
リ飲滯ナルヘシ赫鱸ノ逐瘀ノ力アルヲ思ヘ
シ格陰鎖間雜記上瘀血癖囊條

劉君直庭曰荻野台州ノ説ニ癖囊ハ正傳ニ痞為寒
裏者用紅花桃仁ト東垣ヲ引ケリ此ニ據ルハ癖囊ハ畜
血モヤルトニ温脾ニ血劑ヲ兼テ失笑散ノ類佳其所吐ノ物
時疫畜血ニ下ストコロノ物ト大抵同色ニテ赤豆ヲ搗キタカ

如キヲ吐下スルヲアリ此ニテモ其血ヲ兼ルコトヲ見ル也時疫續編
書續編

河豚治膈噎

原南陽曰烏神散治膈噎食不下河豚一尾去腸胃
以紅花填滿燒存性白湯送下天石為末湯ニテ用
ユル亦良醫事小言卷四柱ノ

有持桂里曰河豚ノ治噎症本草諸書ニ不載之昔
有一男子噎症ヲ病ム諸藥罔効日ヲ積三月ヲ累
子テ危篤ニ及ビシガ困苦ノ餘リ自促壽限ト欲
シ河豚ヲ煮テ食之咽ニ下ルコト四五變何ノ異ア
ルトナシ心ニ其足ラザルカト思ヒ翌日モ又翌
日モ猶續嘔噎セシニ愈啖愈快却テ全生保命ト
ヲ得タリ同時ニ同症ヲ患ル者ニ三人アリ教ヘ
河豚治膈噎

テ此物ヲ啖ハシメシガ、皆有起色、自此河豚治噎
ノ説、宇内ニ流傳スト云、今世ニ傳ル河豚黒散モ、
自此始ル乎、方輿輓卷七

往年膈噎反胃編ト云書ヲ讀ミシニ、河豚治膈
噎ノ咄シアリ、其書ヲ失ヒ、且心ニモトメザリ
言シガ、諸家イフトコロヲ視ルニ、定テ効アル
言モアラシカ、併シ劫劑ニ類シテ、醫家ノ喜テ用
ル所ニハアラザレド、記メ以テ參商ニ備ス、
和田東郭曰、堺ヨリ出ル膈ノ妙藥ハフグ也、百疢一
貫

石長生治膈

本草啓蒙ニ云、此草、元録中紅毛
人相州箱根ニ於テトリ得テ、産

前後ニ殊効アリト云ルニ因テ、ハコ子ク
サト名ク、然レモ、箱根ニ限ラズ、諸州山中
ニ多シ

有持桂里曰、治反胃方、石長生、右切、以水ニ合、煮取
一合温服、神驗、此養壽院方、方輿輓卷七、四十八ノ

劉君直庭曰、伊澤愴甫、○即蘭軒
先生ナリ嘗テ石長生ヲ用

テ、膈ヲ治シ愈タリシコトアリ、其藥一味水煎メ、多
服セシメシトシ、時還讀我書卷下

證類本草ヲ按ニ、本草經ニ、石長生、味鹹微寒、主
寒熱、惡瘡、大熱、辟鬼氣、不祥、一名丹草、陶云、苦有
毒、下三蟲、藥性論云、味酸、有小毒、治疥癬、逐諸風

石長生治膈

治百邪鬼魅陶又云俗中雖時有採者方藥亦不
 復用トアル故ニヤ本草衍義本草蒙筌本草備
 要本經逢原等並ニ收載セス李時珍綱目ニモ
 詳説ナシ肘后方卷一成帝所受淮南丸並療症
 易滅門女子小兒多注車注船心悶亂頭痛吐有
 此疹者互辟方ニウ千金方卷九殺鬼燒藥方
 第一又卷十二羌花散治一切風冷痰飲癥瘕痞瘡
 方醫所不治者皆治之十三方病九散第七又卷十四治五癩
 方十四方風癩第五又虎睛湯治狂邪發無常被髮大叫喚
 欲殺人避水火方同又卷十七金牙散治鬼症
 風邪鬼語尸症或在腰脊胸脇流無常處不喜見

人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者方飛

鬼症第八又卷十九填骨圓治五勞七傷補五臟除方

病方第八補腎又卷廿三九江散治白癩風及二百六

十種大風方疥癬等ノ方中ニ石長生アレ凡其

主療ノ的當ヲ得ズ因テ宇田川榛齋ノ説ヲ擧

テ參攷ニ備フ余洋書ヲ好ニスト雖聞見ヲ傳ムルカ為ニトニ散ス

和蘭藥鏡石長生ハコ子クサアヂアンテ

ウムペダテウム又カピルリヘ子リス羅

フロウウエンハトイル蘭試効葉ヲ藥用ト

ス和胸豁痰ノ一藥トス酷厲液ヲ緩和メ發

汗シ微脉管ヲ收瀼メ粘液ヲ分利シ痰ヲ疏豁

メ、略易カラシメ、冒寒欬嗽、喘滿、咽喉痛、傷冷毒
痛、胸痛ヲ緩解シ、或ハ胸膈ヲ排除スル等、胸肺
諸證ニ、良効ヲ称ス。或曰、此草汁ニ、石鹼質ア
ルヲ以テ、内蔵ニ凝聚セル膠粘液ヲ疏釋シ、酷
厲液ヲ淨刷メ、咯痰及小便ニ排泄シ、壅塞ヲ開
通ス、故ニ内蔵硬結、肝脾腸間膜ノ壅塞、脾病依
剩、昆垓兒神思鬱、眞寒病ヲ治ス。子宮衝逆、心動
悸、搐掣ニ、此藥ヲ細末トシ、稀麥酒ニテ送下シ、
効アリ。此藥泡劑トシ、沙糖少許加テ服シ、或
ハ對證ノ劑ニ加ヘ煎服シ、或ハ此葉一握ニ、水
四北加ヘ、徐ニ煮テ、終ニ甘草少許加ヘ、大ヲ

下シ、滓ヲ去リ、適宜ニ服用ス。舍利別トシ用
テ、殊ニ和胸ノ良驗アリ、製法、名ニ出ス、海州
骨碎補、鐵脚鳳尾ツバキ、ヌリバシ、キシノヲ、シ、カ
タシ、エ、オニシダ、サルノセウガ等、性効大抵石長
生ト同シ、藥鏡卷五

ルノ理也、火ヲ生ズルガユヘニ、其人火ニ渴スル
モノ也、渴メ多ク飲ニヨリ、畜聚シテ、ヤガテノ内
ニ吐水ス、吐水スレバ、復渴ヲ生シ、飲テハ復吐ス
ルユヘ、連綿トシテ止クナク、後ニハ食ヲモ吐
スル人アリ、是其疝ノ大畧也、其吐處ノ水モ、只一
通ノ水ハカリニテモナク、後ニハ色ニ穢濁ノ水
ヲ吐モノ也、若、烟煤ノ如キモノ、及、フノ、少クナキ
タルゴトキモ、大ク吐ハ、難治ノ疝也、又此疝ニ、腫
氣ノ添テモアリ、腹痛スルモアリ、又此疝、全体小
水ハ利スレバ、大便ハ多ハ秘結スルモノナリ、必
是ヲ世話ニスルコトニアラズ、其疝甚シキニ至レ

バ、日ニ肌肉モ消瘦メ、段ニ皮毛モカシケ、精神モ
ツカレテ、血色甚アレクナルモノ也、若此疝ニメ、
ベツタリト平臥シ、一向ニ牀ニ立コト能ザルヤ
ウニナリシモノハ、多ハ治方ナシ、愈ルコトヲ得ル
ハ、其ヨリ前ノ處也ト知ベシ、全体予ガ此疝ヲ治
スル處ノ手段ハ、本事方トハ少シ背馳セリ、又此
疝ノ腹候ハ、先活物ヲ嚢ニ入タル如ク、不時ニム
クミ、カシココ、ヘ高クナル也、是其飲ノタマ
ルニ隨テ、段ニト上ヨリモ見ユルヤウニ高クナ
ルニテ、實ニ鼠ナドヲ嚢ニ入タル如ク、頭足アル
モノ、ヤウニメ、コチヲヨリヲセハ、アチヲヘヒ

ヨツトヌケテ高クナリ、上ヨリオサハ、下ヘヌケ
ナドメ、定處ナキモノナレハ、先多クハ臍旁ヨリ
メ右ノ脇下ナドヘサシコムモノ也、故ニ良姜入
ノ藥ヲ用テ、効アルモノ多シ、脈モ先アマリ充リ
ハセヌモノ也、サレハ、是ハ人ニノモヤウニヨリ
テイロクアルベシ、小水ハ短少ナルモアリ、大便
ハ秘結スル方多キモノ也、此症全体ハ、脾胃ノ虚
損ヨリ出ルヲナルユヘ、食禁ヲ守ラシムルヲ、第
一ノ手段也、ダトヒイカナル奇方妙劑ヲ投メモ、
若食禁ノシヤウユルケレバ、治スルヲナキモノ
也、予往年此症ヲ療スルニ、諸攻撃ノ劑ヨリメ、種

種ノ奇藥ナドヲ用ヒ、百計スレハ、手ギハヨク治
スルヲ得ス、後ニハ滿腔子一箇モ手段ナキヤ
ウニナリ、凡此症ニ遇ス、幾ント匙柄ノ折ントス
ルモノ數年、然ハ猶晝夜ヲ舍ス、工夫ヲ用テ、ヤウ
ヤク近年ニ至リ、此症ヲ治スルハ、イヨク食禁
スリスルニアルヲ悟ル、コレヨリメ、多ク此症
ヲ療スルニ、悉ク手ニ應メ驗アリ、然亦極虚難治
ノ症ニ至テハ、其人イカホド食禁ヲ守ントメモ、
タユルヲ能ガルモノ也、カヤウナルニ、多皆死症
ト知ベシ、大抵食禁ニ堪ル内ナレバ、治セズト云
フナレ、サレハ、又人ノ我マ、ニテ、禁ヲヤブルモ

數ニアルモノナレバ、ヨクミ、氣ヲ付テ、禁ノヤ
フレガルヤウニ取アツカウベシ、一通ノ輕症ハ、
食禁ヲ丁寧ニスレバ、藥劑ナシニモ愈ルナリ、必
食禁示ヲユルカセニスベカラズ、先其食禁ノ法、一
晝夜ノ食料、精米一合ヲ以テ定トス、是ニテヨク
ヨク堪カヌルモノナラバ、其人其症ニヨリテ、少
ツ、ノ増ヲカスベシ、サレバ、先大抵ハ一合トカ
キルベシ、扱右一合ノ米ヲ隨分少ニカツタリ
トメ、至テヨク煮ヘタル粥ニタキ、六ニヲシワケ
テ、一晝夜ノ食トシ、一度、其一分ツ、ヲ食メ、断
メ味、噌醬油ノ汁、及魚鳥ノ肉ハ勿論、一切ヲ生シ

キモ人、硬キモノヲ禁シ、只菜ノモノニハ、カシテ
ニ、コヲリゴシニヤク、ナドノ煮火シメタルモノハ、
一寸四方モアルナレバ、一度ニニ切位、或味、噌ナ
レバ、棗一ツホトツ、用ユベシ、病人至テ慎ヨキ
人ニアラザレハ、多皆食ノ少キヲ患テ、平生トハ
格別、心イヤシクナリ、何ニテナリ、凡、腸胃ヲ充シ
メントメ、多ク菜ノモノヲ食ルモノ也、又介抱ノ
人、其外見、マイヲトヅル、人モ、餘リ食ノ少キ氣
ノ毒ニ思ヒ、色ミクヤミゴトヲ云フハ、病人ハ本
ヨリ我コノム處ナルユヘ、得テハ其拍子ニノリ、
禁ヲマブルモノ也、ヨクミ、氣ヲ付テ戒ムベシ、

初又右ノ食餌ヲシタルアトニテハ、只食ノ滓ノ
口中ニタマリタルヲウカイヌルツイテニ、僅ニ
一口許飲ヨリ外ハ、一切湯茶ヲ禁ズベシ、飲モノ
多メハイヨシニ腸胃メダラスメアシ、右ノ食
禁ハ先輕キモノハ半年、重キハ一年、或一年半モ
守ラズベシ、ハヤク止レハ、病復發スルモノナリ、
全体胃ノ氣手ウスクナリテ、鬱火ヲ畜ル症ニ
テ、飽マテ飲食ヲ食リテ止マナカリシ處へ、右体
ノ禁ヲサセルコトユヘ、初ニハ甚タヘカヌルモノ
也、サレモ初七日ホドヲタヘ得ル寸ハ、其アトハ
段ニタヘナレテ、サノミハ難義ガラヌモノ也、故

ニ初ニハ先試ニ七日コタヘテ見ルベシ、其内ニ
ハ、大抵具合ノヨキコトシル、ユヘ、得心スルモ
ノ也、又下地甚食湯メ多ク食リタル内ハ、至テ羸
瘦シテアリシモノモ、段ニ食禁メ、病少クユル
ナハ、右一合ノ粥ニテ、不思議ニ日ニ肌膚ニ光澤
ヲ生シ肥ルモノ也、又此症ヲ世醫多ハ及胃也ト
見誤ルモノ也、又久腹痛ナドヨリコレケテ、此症
ニモナルモノ也、藥劑モツ子ノ病ノゴトク、一度
ニ多用テハアシ、隨分小劑ニメ、一日ニ一貼ツ
、用ユベシ、主方ハ脉腹ニヨリテ、サマニ手段
モアルコトナレモ、先大抵ハ安中散ニテヨキモノ

○是ハ皮膚枯燥
ナドモツヨク腹痛
ノ強キ方ニ用ル
リ

也。忘ニヨリテハ香六加附子、或ハ附子粳米湯、
ドモ用ベシ。又甘草粉蜜湯ヲ用ル。忘モアリ。腹痛
ツヨクメコジケタルモノナドハ、甚治シカタキ
モアルモノ也。右安中散ハ、モト局方ニ出タリ。然
其書ニ於テハ、瀉裏ヲ治スル云ハズ。○業廣
按ニ局
方主治ニ、遠年日近、脾疼、翻胃、吐酸、水トアリ、
瀉裏ノ文ナレト雖、要スルニ瀉裏ノ忘ヲモ兼ズ、
カト云ベシ。予ガ此方ヲ瀉裏ニ用ル主意ハ、先良姜、乾
姜、桂ハ、同ク辛温ノモノ也。故ニコレヲ用テ、彼胃
中ニ畜ル處ノ水寒ヲ温メテ、動カシテダテルノ
意也。茴香ハ、香竄ノモノニテ、心胸ヨリメ、下ヘ氣
ヲオシヒラキ降シ、延胡索ハ、胸膈ノ氣ヲオシ下

○業廣按ニ本草黒字
ニモ味辛温無主母主
破血産後諸病トレハ、血ヲ利スルヲ言ガルハ、缺典トイフベシ。

シスカメ、且アタ、ムルモノ也。コ、ニ一ツ、肝心
ノモノハ、甘艸也。此甘味ヲ以テ、心下ヘ逆シタル
處ノ氣ヲ、ムツクリトユルメサケルヲ、大ニカア
リテ面白キヲ也。故ニ甘艸ヲハ、主藥トメ、大ニ用
ユベシ。右体ニ氣ヲユルメスカレ開テ、水飲ヲ動
カシオダテタル處ヲ、牡蛎ニテグツトオシ下ゲ
テ、久ミ畜タル處ノ水寒ヲメ、下水道ヘ達セシム
ルニ、初メテ胃中モメグルヲ得テ、吐水腹痛
等ノ忘ヲ免ルモノ也。若虚寒ノ候アラハ、附子
ヲ加ヘテ用ベシ。猶此忘モ、其人ニヨリテ、大同
小異アルヲナレバ、實地ニ就テ工夫ヲ用ヒ、ヨク

其機變ニ應メ活用スベシ、必シモ一定ノ法也ト
ノ拘泥スルナカレ、又右食禁ノ一ハ、癖囊一疔
ニ限ラズ、ズベテ中氣ノ虚損セルモノ、水腫久腹
痛久下利ノ如キモ、皆此法ヲ以テ擴メテ行ベキ
モノナリ、蕉窓雜話卷三 四十八ノナ
又曰、食禁ヲキヒレクサセテアルモノ、其少キニ
堪兼ルニハ、間ニニシルアメラ少ツ、故テ舐テスモ、
佳モノ也、同上
又曰、脚氣水腫癖囊久腹痛久下利ノ類ニ、尤食禁
ヲ嚴ニメ、隨分淡泊ナルモノヲ、甚ヒカメニ食セ
テ、脾胃ノ濕ヲヌクハ、彼隨分ヨクザシグリトシ

夕ツ石雜リノ砂ヲ少シツ、入テヲケハ、上ヨリ
入レル水ノスツストヨクヌケルト、同道理ナリ、
同上

又曰、癖囊ヲ疔疔患ル人多便秘スルヲアリ、此中
氣薄ク成ル故、肝火ノ亢ルカ為ストコロ也、下ス
ヘカテスガ、マワスヲイテ、本疔ヲ療スベシ、同上
癖囊ヲ患ル人ナド、ニワカニ渴ノ付ハ、吐水セシ
トスルノ兆也、内ニ水多タニル時ハ、渴付者ナリ、
同上

又曰、甘草粉蜜湯、予ハ蛇虫ノ疔ニハ用ヒス、癖囊
病ニ用ユ、癖囊ノ疔モ、一通リハ先安中散ニテヨ

津田玄仙曰、靈樞

原南陽曰、反胃又翻胃トモ云、同義也、金匱ニ胃反

上膈篇ニ蟲為下膈、下膈者食時乃出ト云ハ後世ニイフ反胃ニ蟲證ヲ兼タルモノ、梅花無毒、蠶、虫證ノ反胃、上膈ト云、噎ト膈トノニ證ナリ、后世ノ方書ニ反胃ノ證ヲ胃寒トナシテ、齋ヲ用、甚ニ至テハ桂附等ノ劑ヲ用クル方ハ多ケレ、此證ニ由アルハ論モ立タス、治方モナシ、予今日ヲ以テ見ルニ此篇ニイフテアル下

膈ノ證ヲ患ルモノハ六七ニシテ、后世ニイフ反胃ハ反テ少シモトヨリ胃中虚冷ナレハ、虫出、田中ニ安シキス、逆上ノ吐食ノ病、勢ヲ助クルノ理、了然タレハ、多クアルモ理リナリ、コレヲ后世ノ反胃ノ主方ヲ治シテ見ルニ、スキト大効ヲ得ズ、因テ諸書ヲ考ヘ合テ、ミルニ、傷寒論ノ厥陰篇ニ、吐厥ノ一條アリ、此吐厥ト云フモ、田中虚冷ノ、虫逆上スルノ証、只靈樞ノ下膈ニ、后世ノ反胃ト云ニ、比スレハ、下膈反胃ハ食ヲ吐出シ、ノ吐厥ハ虫ヲ吐ノ不同アルノミナリ、然レ其因ヲ求レハ、同一理ニ夫故ニ反胃モ其キニ云テハ、其腫血ヲ動シテ血ヲ吐キ、虫ヲ吐クアリ、吐厥モ時ニコレハ食モ吐スルナリ、此吐厥ノ主方ハ、理中湯ノ煎汁ヲ以テ、烏梅丸ヲ用ル、不易ノ治法ナリ、是、何ニテハ、ナク、附子乾姜ハ、人多ク桂枝ヲ以テ、胃中ノ虚冷ヲ温美、食シ、烏梅、苦連、細辛、蜀椒

ト出、猶轉胞胞轉、是ハ膈ト違テ、食ノ不下ニハ非、食物得ト胃中ニ納リテヨリ出、朝ニ食シテ暮ニ吐ス、晝晝ト云モノ、反胃ト同病ニテ、近頃此邊ノ醫多ク、辟瘴ト呼、何故ニカ、近來此病多シ、全ク胃ノ力乏、飲食不能消化、故ニ噯氣酸辛、鼻ヲ衝キ、嘈雜スル、頻ニテ、腹痛甚シク、吐セハ痛乍止、故ニ指ヲ以テ探吐ス、食物ヲ吐盡ノ後ニハ水ヲ吐ス、何水ノ出ルヤト思程多ク、其水モ吐盡セハ、煤色ノ物又海苔ハ如ク、吐下モ有、滑便ノ人モアレ、先秘閉ス、便ノ通スルハ痛薄シ、大槩朝飯前快ク、午食後ニ至テ腹痛、以上ノ語ル、忘ヲ作シ、晚間、

黃柏ノ苦辛酸寒ヲ
 以テ其逆上ノ蛇虫ヲ
 伏セシムル術ハ予ヲ
 理ヲラシテ下膈志
 ハ勿論ノ初スベテ吐食
 ノ證諸證モツレタモ
 共ニ下膈ノ證トナシテ
 法ノ如ク附子理中湯ニ
 蜀椒烏梅ヲ加ヘル
 煎汁ヲ以テ烏梅丸
 ヲ吞シメ七日カ間食
 ヲ絶シメテ治スルニ其効
 神ノ如ク七日カ間絶食
 カ定宗必讀 六七年以
 ニ見ヘタリ 外ヲ怪テスベテ廢人ト
 ナリタル北重ヲコト方法
 ニヨツテ二旬ノ間ニ全
 快ヲ得タルヲ余餘人
 ニ及ヘリ此治癰ノ法病
 因ヲ靈樞ニ求ムカク仲景ニ取リ則テ李仲梓ニ學ヒニ多クノ要ヲ撮シテ設タル治法ナリ此法只膈
 沁ノニ非ズスヘテ吐食ノ類用テ大利アリ療治茶談卷一

後ニ吐丁字湯曼倩湯主之其人飲食ノ味不變却
 テ貪食平日ニ異ナリ此病寒疝ニ屬ス臍傍ニ堅
 塊アリ是ヲ按セハ五體ニヒバキコタユ數十日
 ヲ經タルハ腹ノ津液ナク筋ハリテ常ニ鳴或足
 跗ニ微腫有又腹面ニ一物浮出テムツクリト頭
 足有カ如ク按セハ手コタヘ無クトト鳴テ没
 ス不鳴ニ無ナルモ有出沒無定所非塊非絡脉凝
 結此物ノ見ルハ大病ニテ一快ヲ得モ又再發
 ス其不審ニ思フ時ニ一狂人切腹スルヲ押留テ
 ケルニ臍傍三寸許切タリ是ヲ縫テ治タル後ニ
 胃反ヲ患彼腹面ニ件ノ物浮出テ如小鼠又蛇ナ

ントノ動ニ似タリ按スレハ夕ワイモ無没スル
 ニ其疵口ノ痕ノアタリニテ消ス仍テ思ニ是必
 大腸ノ脂膜ノ切テ腸ノホグレテ收ラサルナラ
 ント是ヨリ意ヲ用テ胃反ノ人ヲ見ルニ果シテ
 大腸ノ脂膜切ユルニ定位ニ不收也疝氣ニ疝腸
 氣ト云フ有萬病回春ニ盤腸氣ニ作是適當ノ文
 字ナレ氏杜撰ノ恐アリ金匱寒疝篇ノ大建中湯
 ニ有頭足上下スト見ユ即是ヲ云最建中湯主之
 所也此病ハ法則ヲ守レハ什ニ七八ハ治ス外臺
 ニ華佗ヲ引テ胃反ノ病ヒタル朝食夜吐心下堅
 如杯往來寒熱吐逆不下食此為寒癖所作トアリ

千金翼三癖ヲ癖ニ作治痰飲法曰諸結積留飲癖
囊胸滿飲食不消灸通谷五十壯ト見三寒疝トモ
寒癖トモ云ヘキ也其原ハ瘀血凝結シテ形ヲ作
タルナリ此病人何ニテモ見アタル物ヲ貪食シ
食スレハ必腹痛ス魚肉餅麵生冷菓實ノ類ヲ食
セハ別ニテ大痛シテ晚ニ至テ吐ス故ニ嚴禁ス
ヘレ仍日用ノ食物常法ヲ定ム一日ニ陳倉米一
合ヨリニ合半粥又ヤワラカノ湯取ノ飯是ヲ四
度ニ分テ食セシム飲物ノ多ヲ嫌カ故ニ藥モ一
貼ニ限り湯水モ一合ヲ一日ノ分量トス茶ハ別
テ惡シク燒塩ヒシホ梅干燒味噌位ノヲニテ食

セシム厚梁ノ物胃中ニ入レハ不能消化力故ニ
痛ムナレハ淡薄ニテ消化シ易ヲ食シメ自然ニ
胃ノ力復スレハ經日月而愈ニテ後モ禁食專一
也然トモ此食忌ノ一容易ノ教戒ニテハ守カヌ
ル腹痛モ吐モ合点ニテ貪食スルモノ也此法ヲ
守ル人ハ皆可治不能守人ハ辭テ不与藥病狀ハ
旋覆花代赭石湯附子粳米湯ニ似タレ氏曼倩丁
字背ニ徹痛セハ當歸湯吐甚ニハ安中散疝ト積
トヲ參考シテ桂枝加附子烏頭湯ニ香脂丸ヲ兼
用スルモ○香脂丸前茯苓杏人大小建中工豕散
モ用ユヘシ秘閑甚ニハ大黃甘草湯ニ加吳茱萸

牡蠣ヲ用ユ。ハ、^〇按ニ、コレハ時^〇如ク、^〇下劑ハ用ヒ、又
方曰積聚門ニ語ル赤丸モ生漆ヲ酒ニテ用ユル
モ此筋ニ工夫シテ用ユヘシ人ノ手ヲ束タルヲ
治ヘシ。醫事小言卷四上十四ノウ

有持桂里曰明李仲梓醫宗必讀云凡反胃證得藥
而愈者切不可便与粥飯惟以人參五錢陳皮二錢
老黃米一兩作湯細啜旬日之後方可食粥。倉廩未
固不宜便進米穀常致不救。反胃證囊ハ減食ガ
養生ノ第一義ナリ食多ケレバ藥ヲ服シテモ效
立タズサテ粥飯ヲ禁スルヲハ李氏精詣自得ノ
事ト見ユ他書ニテハ見アタラヌヲナリ吾邦醫

家ニ断飲ノ法ヲ行フ者アリ茶水湯藥一切飲ミ
モノヲ禁断シ藥ハ丸トシテ用ヒ食ハ唯飯團ヲ
ス、ム如此スルヲ四五日スレバ小便甚赤ク成
リテ淋瀝シ身熱口咽乾渴シテ病者困苦ニ堪ヘ
ズ唯湯飲治滴ニテモ口ニ入ルヲ得バ死ス
モ恨無シト謂フ醫者於此病者ヲ慰喻シテ猶忍
バシムルヲ一臘ニ及ブトキハ即愈ユト云是レ
異術ナリ記シテ以テ同志ニ告グ但余惟ヘテ久
飯團ハ消化シ易カラサルモノニテ病人ニハ忌
ム硬キ粥ヲ減少ニ與フルヲ佳ナリ。坊藥觀卷
劉君蒞庭曰許氏所患即支飲中一證其所辨說殊

為精核蓋如苓桂木甘湯澤瀉湯小半夏及加茯苓湯茯苓飲等證皆是支飲之自脾土失權而致者即所謂癰囊也癰囊之名今世多唱之者而少知其實為支飲者又莫識支飲之證得許氏之言而其理更明故愚今表而論之癰囊本作癰囊出千金痰飲中

金匱述義卷中痰飲篇餘述 十七分

經驗秘方反胃之疾因強以食或飲以羹湯是速其吐今得其說不強以食絕其羹湯飢則以飯炒香干啖一點湯水亦不與三日後竟不復吐飲食如初治方用甘蔗搗汁七升生薑搗汁一升和服得效方胃反惟食乾飯餅餌盡去羹飲水漿藥亦用

圓自不反動調理旬日奇效有人三世死於胃反至孫收効此方

證治準繩反胃證得藥而愈者切不可便與粥飯每日用人參五錢陳皮二錢作湯細啜以扶胃氣旬日半月方可小試陳倉米飯及糜粥倉廩未固不宜便進米穀常見食粥飯者遂致不救

張氏醫通反胃初愈切不可與粥飲每日與獨參湯少加炒陳米煎服旬日後方可小試稀糜

本書未校

以上依觀聚方所列

經驗方云有人三世死于反胃病至孫得一方用乾柿餅同乾飯日日食之絕不用水飲如法食之其病

遂愈。本草綱目卷三十枌發明

劉君直庭曰東坡集與孫運司書。脾能母養餘臟故養生家謂之黃婆。司馬子微著天隱子。獨教人存黃氣入泥丸。能致長生。太倉公言。安穀過期。不安穀不及期。以此知脾胃完固。百疾不生。近見江南老人年七十二。狀貌氣力如四五十人。問其所得。初無異術。但云平生習不飲湯水耳。常人日飲數升。吾日減一合。今但沾唇而已。脾胃惡濕。飲少胃強。氣盛液行。自然不濕。雖冒暑遠行。亦不念飲。此可謂至言。不敏。系。卜近時。荻野台州減飲論。トイフ文アリ。和田東郭。游臺表ヲ治スルニ極テ飲食ヲ節セシム。東坡ノ此說。蚤ク其意ヲ得シナリ。又古今錄驗。水痕病ヲ療スル。草麻ヲ用ル方ニ。下病之後。慎不可飲。當五日斷飲。止飲自糜トアリ。又元人ノ反胃ヲ治ルニ。斷飲セシメ。乾餅餌ヲ用ル。八余モ屢試テ效ヲ得タリキ。時還讀我書卷上ナク。

獺肝治勞 本集卷九當參看

香川太冲曰。獺肝。下蟲。療勞瘵。一本堂藥選卷中。

又曰。允獺肝。非自取者。不可信用。若得之急。以烈火炙乾。而後可以收貯。其取時。多在寒月。日暈難乾。故日乾。既不宜。况陰乾乎。必皆腐敗。不堪用。夏月。益甚。唯炙乾尤良。用時。直研末。一本堂藥選卷中。同上。

又曰。按李時珍本草綱目。引蘇頌曰。諸畜肝葉。皆有定數。惟獺肝。一月一葉。十二月十二葉。其間又有退葉。用之。須見形。乃可驗。不爾。多偽也。此妄言也。李舉載之。而曾不致辨。意因其不親驗。視而信之。不知其不然耶。予剖獺腹。親見之。凡三十頭。或冬。或春夏。有獺肝治勞。

雄有雌有老大幼少而其肝皆是七葉未嘗見有隨
月漸增多多少進退之異間有五葉大二葉小或四葉
大三葉小之不同而左右三四亦無定位由是觀之
徒讀古人之言實以為然不親驗察舉之藉口則必
為虛誕所誤不覺同坐空論之流而止也詩云無
信人之言人實廷女可畏也可慎也同上

原南陽曰癩肝冷勞ヲ治スト云フ金匱ニ肘後方

ヲ引タリ冷勞ト云モノハ其證候知ヘカラス直

解ナトニ先ツ冷ニ傷レテ後ニ勞ニナリタルナ

トノ注アレバ○按ニ沈明宗ノ注ニテハ勞無不

勝ルニ似タリ然レバ余ヲ以テ考ル今見ル所ハ

ニ熱アルモノモ重熱ニ屬スルナラフ

熱ニ屬シテ骨蒸スルモノナリ癩ノ勞ヲ治スル

コトハ水狗丸ヲ小兒ノ疳瘦潮熱ニ用テ辨フヘ

シ骨蒸ニ効アラニハ深思シテ知ヘシ醫事小

又水狗丸療勞瘵初發諸證未具者水狗去皮腸胃

燒存性右一味細末糊丸每服三分日二夜一葉心

黃耆湯送下同上

有持桂里曰世醫癩肝ヲ以テ傳屍ノ專藥トスレ

傳屍ハ血脈傳ヘ病ムノ疴ニシテ離經索居スト

モ不可逃ノ病ナリ一門相染ムノ中一人保生終

壽者偶ハ之レ有リ俗ニコレヲキマモリト稱呼

セリ此レハ是天ナリ人カノ為ス所ニ非ズ此丸

虚勞發熱、疳羸等ノ症ニ、早ク用レバ效アリ、小兒ノ疳勞ニモ、亦復効アリ、方輿輓卷六

又曰、高倉街越後屋七郎右衛門室女、嘗テ勞ヲ病ム、諸藥應セズ、余此丸ヲ與テ、抹治ヲ得タリ、七郎右衛門ハ、好事ノ人ナリ、後余ニ就テ此方ヲ求メ、脩合シテ人ニ施ス、病家報スルニ金銀ヲ以テスレドモ、一切受ケズ、只陰徳ヲ行フヲ以テ念日々、今ヤ七郎右衛門已ニ没シタレトモ、此家相繼テ、先人ノ志ヲ失スルコトナシ、又往年麻疹流行瘥後、勞ニ變セシ者不少、予コノ丸ヲ用テ治シタル者數十人、同上

又曰、懶丸、治勞瘵方、懶即水懶、燒存性、右一味為末、糊丸、每服三分、白湯送下、日二夜一、此レ金匱ノ

治傳尸懶肝散ニ本ヅキ來ル所、外臺勞病ノ部ニ、

懶肝ヲ用ヒタル方數首アリテ、又本邦ニ於テ

モ、懶肝丸トテ、數方ニ類同スル方アリ、然レドモ、

此方唯一物ヲ燒黑クシテ、丸ト為スヲ妙トス、此

丸、癆病ノ形氣未脱ニ乘ジテ、之レヲ用フルナハ、

効功アラザルコトナシ、小兒疳勞ニモ、亦甚良シ、

往年麻疹流行シ、餘毒變シテ癆ト為レル者ニ、予

此丸ヲ作與ヘテ、救療セシ者數十人アリ、以此觀

之、懶ニ解毒ノ功モ、誠有ル乎、金匱懶肝散方下ニ、

治冷勞ノ説アリ方是熱ナキ病ヲ言ヘル者采葢
后考、同卷十五

其言亦未詳也... 治冷勞ノ説アリ方是熱ナキ病ヲ言ヘル者采葢
后考、同卷十五

胃管癰無咳嗽説

原南陽曰胃管癰ト云モ素問ニ出レトモ膿ヲ吐

クハ不論靈樞ニ隱ニトメ痛ムモ人胃脘癰也ト

アリ入門瘡瘍全書等ニ唾膿血トヲ記スレハ同

シ物ト見ユレモ真中ニ非ルモ人胃管ト云カク

シ醫宗金鑑ニ無咳嗽トアリ是ハ怪キ説ナリ

小言卷四上〇按ニ靈樞ヲ引ケモ考ルナシ

張氏醫通仲景云嘔家有癰膿者不可治嘔膿盡

自愈此不言癰之所在而言嘔膿者以其但嘔而

不效知非肺癰而為胃脘癰明矣內經曰熱聚於

胃口而不行胃脘為癰胃脘屬陽明陽明氣逆故

〇按成無己注亦胃
管癰トナス

膿不自效出而從嘔出膿亦不似肺癰之如米粥者此出自胃脘從溼化而聚結成膿有結痰如硯肉也謂不可治嘔言不得用辛香溫胃止嘔之劑以膿之於濁熏蒸穀氣故嘔若膿出則嘔自愈夫癰之在胃脘之上者則然若過乎中在膈之下則膿從大便而出輕則金匱排膿湯重則大黃牡丹湯涼膈散選用若膿自上而吐輕則金匱排膿散重則射干湯或犀角地黃湯加忍冬連翹皆因勢利導之法也膿稀嘔止後用太乙膏作丸服虛人宜八珍加黃耆忍冬連翹之類調補之凡舌胎經久不退色黑垢膩口中作甜其氣穢濁即是胃脘

發癰之候明眼辨之毋俟癰成而致莫救也卷四

又石頑治談仲安體肥善飲初夏患壯熱嘔逆胸

膈左畔隱痛手不可拊便溺瀦數舌上胎滑食後

痛嘔稠痰漸見血水脈來瀦瀦不調與涼膈散加

石斛連翹下稠膩頗多先是瘍醫作肺癰治不效

予曰肺癰必效嗽吐腥穢痰此但嘔不嗽洵為胃

病無疑下後四五日復嘔如前再以小劑調之三

下而勢甫平後以保元苓橘平調二十日而痊先

時有李姓者患此專以清熱豁痰解毒為務直至

膈畔潰腐膿水淋漓纏綿匝月而斃良因見機不

早直至敗壞悔無及矣同上

按二胃脘癰ノ方
甚鮮、聖濟總錄
二五方ヲ載ス、聖濟方
百七十六、類聚
二載ス、傷寒醫方
全、二二モ、諸方ヲ載ス、
大抵聖濟ノ方ナ
リ、

醫宗金鑑外科心法要訣胃癰條云胃癰中脘穴
腫疼不效不嘔吐血膿飲食之毒七情火候治腸
癰大同注此證初起中脘穴必隱痛微腫寒熱
如瘡身皮甲錯並無咳嗽咯吐膿血由飲食之毒
七情之火熱聚胃口成癰血來沈數者初服清胃
射干湯下之射干一錢升麻一錢芒硝一錢各一錢
煎湯下之各一錢麻黃湯下之各一錢元參湯下之各一錢
煎若脈澹滯者瘀血也宜服丹皮湯下之丹皮一錢
煎若脈洪數者膿成也赤
豆薏苡仁湯排之赤小豆一錢薏苡仁一錢煎湯下之
氣喘作渴小水頻數者肺氣虛也補中益氣湯加
麥冬五味子補之其候證生死治法與大小腸癰

華岡青洲曰胃脘癰疑似肺癰而不止肺部痛亦連少腹吐膿血也治法互排膿
散桔梗白散先折醫言話卷上

同中脘穴又名胃募在臍上四寸卷六十七〇按
顧澄瘍醫大全
卷廿一載此文而引張仲景妄誕甚矣

按二素問病能論二熱聚於胃口而不行故胃脘
為癰也トアレハ胃脘中トモ云ヘキナレ凡腹
中論ニ俠胃脘内癰ノ文アレハ胃脘ノ外肺藏
ニ近キトコロヘ癰ヲ發スルナラニ歎ト思ハ
ル余カ親族有目孫三郎酒食ニ傷ラレ臭痰膿
ノ如キモノヲ吐スル一甚レ諸醫皆肺癰トナ
シテ治スレ凡効ナクメ死セリ其頃咳嗽甚鮮
ク曾痛モナキ一ヲ怪シク思ヒレニ後ニ考レ
ハ必定胃脘癰ナラント臍ヲ噬レナリ又先友

手塚良元一處女十八九歳ノ膿血臭痰ヲ吐ス
ルモノヲ診シテ種ニ肺癰ノ治ヲナセ凡効ナ
シ余モ一度診セリ咳嗽ハ甚少ク飲食起居モ
平素ト少ニハ替リタリト云位ナリ良元ノ門
人其人實證ナルヲ視テ桔梗白散ヲ投シテ全
快セリ因テ攷ルニ原氏胃管ト云カタシト云
ヒ咳嗽ナシヲ怪キ説ナリト云フモノ並ニ是
ニ非ザルニ似タリ凡方書ニ胃脘癰ヲ詳ニ説
ク一甚稀ナリイヅレ稀ナル病ト見エタリ

半夏厚朴湯治膈噎

北山友松子曰嘔吐噎食不下者半夏厚朴湯加海浮
石枯礬各效先哲醫話卷上

按時還讀我書卷上曰梅核氣ヲ治スルニ半夏
厚朴湯ニ浮石ヲ加用テ最奇效アリ先教諭ノ
經驗ナリ

按此說全ク醫
學源流論ニ本ク
兩書ヨリ參看スレ
ハ其義自見、

和田東野曰嘔噎ハ
凡七月斗ニノ死スルモ
ノ四五ヶ月メハ腹中
ノ鬼悉ク分明ニ別ル

子ニテ探リ見ル
派視スルカ知
百

膈病百日

附胃脘說
臣參看

前荻荅杏人甘草湯條

有持桂里曰人年老津液漸耗胃脘枯槁スルトキ

ハ唯一線ノ細竅ヲ存スルノミニテ不復管事然

レ凡脈モ病マスサセル苦患モナク斯テ積日累

月テ胃脘マス枯窄ク飲食オヒク廢絶シ大凡

七八月ニ至レバ胃氣之減シテ死スルナリ俗ニ

此レヲ七月病ト謂フ鄙諺ナガラ能ク當レリ此ハ

是真ノ噎ニテ必死不治ノ疴ナリ方輿輒卷七

業廣嘗テ院本戀女房染分手綱道成トイヘル

書ニハ歳トイヘルモノ、母嘔疴ヲ患ヒテ、ワ

シハ百日ト限リノアル命ナレハト云云又彦

膈病百日

Vertical columns of faint text on the right page, likely bleed-through or a separate column of text.

男業精證曰其區抑
肝散ヲ用テ治シタル
トアリ其說余カ著ス
井見集附録ニ載ス
據テ改ニ徐氏所謂肝
火犯胃ノ說洵ニ千古
ノ確言ト謂フベシ

其義自原

四月廿五日
大田東洋園

山權現誓仇討ニ京極内匠ノ願母嘔忘百日ト
アリサレ^世郡俚ノ俗書證トスルニハ足スガ
レモアルク膈病百日トイフ俗間ノ言ヒ習
ハシト見ヘリ大抵百日後マデハモツナリ隔
病百日ノ言誣ザルニ似タリ稍長キハ半年許
有持氏ノ所謂七月病ナリ幸ニ一年餘ニテ斃
ルモアリ

徐靈胎曰若膈忘乃肝木犯胃木來侮土謂之賊
邪胃脘枯槁不復用事惟留一線細竅又為痰涎
瘀血閉塞飲食不能下達即勉強納食仍復吐出
蓋人生全在飲食經云穀入於胃以傳於肺五藏

徐靈胎曰噎膈反
胃脈如常久則胃
絶而脈驟變又百無
生此又宜從忘不從
脈也^{醫學源流論}
論卷上忘脈輕重

六府皆以受氣今食不入則五藏六府皆竭矣所
以得此忘者能少納穀則不出一年而死全不納
穀則不出半年而死凡春得病者死於秋秋得病
者死于春蓋金木相尅之時也^{醫學源流論卷}
又按ニ膈噎ハ胃中ノ譯ニハナク胃脘ノイツトナ
クワルクナリ津液枯涸スルナリ其證ハ脈ニ異狀
ナク飲食ノ味モ常ニ異ナラズ外候ハナシモナク年
月ヲ經テ胃脘衰弱スル一朝夕ノ催シニハア
ラズ醫家徃ミ心下胃中ノ治ヲナレ又利氣ノ方
ヲ處スルハ方枘圓鑿ト云ベレ靈樞四時氣篇ニ
飲食不下膈塞不通邪在胃脘ト云モノ不易ノ

Kitasato Memorial Medical Library