

醫學管錐外集

八

X

118-2

F
1-12

490.9
Ig-4
8

No. 2053
12; 18-2



富士川文庫

1265

醫學子言 錄外集卷八目錄

食癥

消食籠

風字說

病當分風氣治之論

論吳又可

頸瘡治方

烏頭毒

附記附子生原

一本堂藥選確言有二

令痘兒終始不閉眼法

痘忌雞卵

漢種大黃

錫糖治骨鯁

癩病治方

米癥

亦名米瘕

苓桂朮甘湯治癥

交腸病

逆經

酒客吐塊

心漏

九折堂山田
氏圖書之記

數脈可畏

孕婦塗臍腹方

古施附湯

水腫忌用巴豆甘遂桃花牽牛等

水腫忌出血證

疫後精神如癡或如狂漏

脾湯案

令其身不得閉則去

一本堂本草卷之二

卷之二

藏當心處

風寒病

卷之三

風寒病

卷之四

風寒病



食癥

消食籠

卷一 蒜殺蟲條 本集卷十
諸蟲當參看

大塚印南曰、穀伯健啖、彼此所傳、魏崔駰一飯三升、聞之駭異、予所親睹、其人多雄壯、以腹為壑、不稱果然、一喫數筋、十人執飯匙、弗能給也、語云、惟酒無量、豈飯亦無量耶、又有短小羸瘠而食兼數人者、乃疾也、不問旨否、唯食是求、纔撤饌具畢、又聞厨內盤盂聲、輒動食指、或言必物在腹內、乃其所嗜焉、頃聞備之岡山景福禪寺、僧名推雲、健啖四五年、飲水計斛餘、竟發疾、而飲啖倍進、先死之六旬始減、日啜糜粥數孟而已、遂臨危篤、不復辨人、同侶見其病牀有物大如雞卵、以為遺矢也、將呼僮暨捨之、住持僧適訪

病怪其微蠕視之則一塊肉也色如敗紫眉目口鼻具備焉齒如銀鍼蓋病勢已盡乃所衝出焉同侶大驚投之溝渠時方初秋蘋藻覆渠物乃為所冒掛而弗沒猶在蘋上吸水俯而聽之歎々有聲明日僧遂死是與諾臯記所載與劉錄事食鱠事相類然則腸內有物之說亦恐不妄說姑錄本末以廣異聞是文化癸酉七月事越人關弓錄

劉君紹翁曰文化癸酉備前岡山府景福寺有僧堆雪者○他書皆作堆雪此誤年十九患渴疾至明年其證特劇一日同侶為之移床掃除有一物跔然落地其狀如雞蛋五竅畢具口中生齒渾然一小首也衆皆

驚異詢之堆雪曰其所吐者渠自此不復欲飲歷三日而死衆輒以水灌肉塊開脣吸之又置之于水甕中雲時飲了不遺涓滴又投于溪中則水為渦而入其口中云橫井玄琬永珍嘗詳說之柳游文藁卷下注叟新存

小川檉齋曰文化年間備前岡山ノ儒臣井上仲吉リ東都靈巖嶋ニ住セレ菅原文藏トイフ儒生ニ贈リシ書中ニ曰久敝邑岡山ニ京福寺ト云禪刹アリ其弟子ニ推云ト云僧四五年前ヨリ大食シ漸々甚シクナリ近來ハ一日ニ三四升ノ飯ヲ食フ又去秋ヨリ水ヲ夥シク飲ム一升ヨリニ三升ニ至ル然ルニ當春ヨリ發病伏枕ニ及ビタ

レニ、飲食ハ減セズ、五月末ヨリ、漸々其量モ減シ、六月中、病危篤ニ及ビ、言語不通、心氣モナキ容體ニテ、同月十六日、病床ニ鷄卵ノ如キ一物アリ、看病ノ者、糞翼ト思ヒ、取捨ントセレヌ、院主怪シミ掌上ニ取リ、熟視スルニ、柔肉ニテ、眉目口鼻恰モ人如ク、口中銀針ノ如キ歯アリテ、甚奇怪ナリ、傍入ニ命レテ、寺後ノ小流ニ投ゼレニ、萍上ニ留マツテ、夥シク流水ヲ吸ヒレトナリ、年來此物、腹中ニ在テ、病末ニ及ビ、口ヨリ出レント察セラレタリ、其僧ハ翌日十七日ニ死セリ、醫籍ニハ、如此類モ記レタレバ、實ニ目撃チセシハ一奇ナリト云々、予

ハ文政四年辛巳ノ十月、管原氏ヨリ其書翰ヲ借
テ視タリ、換答新詰吐異虫條

病源候論食癥候。有人卒大能食。乖其常分。因飢
值生葱。便大食之。乃生外臺卷十二引病源生作吐。一肉塊繞
畔有口。其病則難愈。故謂食癥。特由不幸致此妖。
異成癥。非飲食生冷過度之病也。

廣濟療食癥病食葱差方有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過飢急食生葱須臾吐出一空簿而圓繞畔有口無數即以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食

名段首類案五載齊
諧記文而引東坡物
類相感志五四九

醫說齊諧記云、江夏郡安陸縣隆安中有人姓郭
名坦、兄弟三人、大兒得天行病、後遂大能食、一日
食斛米、其家給可五年、負聲、後乞至一家門前、已
得飯、又復乞於其後門、此家語之、汝已就前門食
了、那得復從後門來、其人答曰、實不知君家有兩
門、腹大饑不可忍、後門有三畦薤、而一畦大蒜、因
啗之兩畦、便大悶極卧地、須臾大吐、吐一物似籠、
因出地漸々小、主人持飯出不復食、遂撮飯著所
吐物上、即消成水、此病尋差。卷七 消食籠

五雜組、有因疾而善啖者、余里中有人啖豚、嘗至
半體、鄉里社日時為所剽、一日衆共執之、縛庭柱

上不得食、久之覺喉中有物、一蝦蟆躍出、衆擊殺
之、自此不復能食矣、此與唐佐史食鱠至數十斤
者相類、近聞太原有嗜酒者亦然、乃知嗜好之偏
而酷者、皆疾也。

夢溪筆談

卷七

老婦啖物不知飽、餘德占過逆旅、老
婦懇以飢、其子耻之、對德占以蒸餅啖之、盡一竹
簍約百餅、猶稱飢不已、日食飯一石米、隨卽痢之、
飢復如故、京兆醴泉主簿蔡繩、予友人也、亦得飢
疾、每飢立須啖物、稍遲則頓仆悶絕、懷中常置餅
餌、雖對貴官、遇飢亦便齕啖、繩有美行、博學有文
為時聞人、終以此不幸、無人識其疾、每為之哀傷。

卷二十一

風字說

伊藤東涯曰、中風ト云ソノ名義ヲ詳ニセス、風ニ
中ルト云ヘハ寒疾ノナリ、中風ノ症寒疾トモ
イヒカタシ、近代ノ醫書ニモ少ニソノ說アレバ、
醫家ノ說ヲ聞クニ、タシカナラサルヤウニ覺え、
予思フニ風ト云字ヲ、風雨ノ風トハカリ意得ル
ニ因テ解レカタシ、風ト云ハ、タヽ氣ト云フニテ
ヨレ、或ハ心氣ノ疾、或ハ氣血ノ疾、一身ニ充滿レ
テ、運動流行スルモノ、皆風ト云、大塊ノ噫氣、其名
曰風ト、風モ天地ノ氣ナリ、故ニ氣ノ字ニ易テ風
ト云、癘瘡ヲ大風ト云、腸風胃風ト云疾アリ、白癰

風紫癜風ハ、白ナニヅ黒ナニヅノコナリ、此等ノ
風ハ、氣血ノ錯亂ナリ、小兒ノ慢驚風急驚風、夕
乱心ヲ心風ト云、風疾ト云、唐書ニ、風疾使酒、不
入仕ト、亂心醉狂スル人ハ、官ニ任セズトナリ、亂
心ノ人ヲ、禪書ニ、風顛漢ト云、又風子ト云ヒ、熟シ
タル上ハ、只風トハカリ云テ、心疾ノノミナルナ
リ、此ハイツレモ、心氣ノ錯亂ナリ、中風ノ疾タル、
一身ノ氣血偏枯軟瘻シテ、サヘノ忘ラナスニ
ヨリテ、中風ト名ツクルナルヘレ、中國ニハ、墓地
ノ吉凶ヲウラナフ法アリ、コレヲ風水ト云、又地
理ト云、風水ト云ハ、宋儒之言也、有水以界之無風

以散之ト、省身集要ニ出、地中ニ風ノアルヘキヤ
ウナシ、ニ天地中ノ氣ヲ言ノミ、佛書ニ、地水火風
ヲ四大ト云、ゴノ四大假合シテ幻體ヲナス、四大
各ノノ源ニ歸スル寸ハ云々、煖氣歸火、動轉歸風
ト云々、詳ニ圓覺經ニアラハル、世間ノ風、一身ニ
アリテハ、動轉スルトコロナリ、此亦氣ノハタラ
キナリ、又犬ノ狂タルヲ風狗ト云、鄉談正音ニ、無
神狗官ニハ、風狗顛狗ト云ト、醫書ニ云、風犬咬傷
ト是ナリ、シカレハ、風ト云字ハ、タ、氣ト意得テ
ヨレ、醫書ニテハ、心氣氣血ノ變、皆中ト云ナルヘ
シ、佛典ハ梵言ナレ凡、翻譯ハ、ミナ華人當時ノ語

ヨ以テウツシタルモノナレハ、證據ニトリテモ、
ヨロシカルヘレ、庚燭譚ニ中風ノノ

和田東郭曰、鶴膝風ト云モ、古人命名ノ義ヲ、後世
ニハ取違テ居ルナリ、外邪風濕ノコヨリ來ルト
心得ルハ誤ナリ、總メ風字ヲ用ルノ病外邪ヲ指
ノ外、ニ様アリ、傳變至速ナル處ノ病ヲ名ツケテ、
風ト云モノ、一フナリ、又肝經ヨリ事ヲ發スル者
ヲ名ツケテ風ト云ト、ニツナリ、是即厥陰風木ノ
義ニ取タル者ナリ、鶴膝ハ形ヲ以テ名ツケ、風ハ
風木ニヨリテ名ツケシモノト知ヘシ。雀窓雜誌卷一

原南陽曰、東涯先生曰、云々。文見前因不錄

余按醫籍以風

名病者甚多、然其實不過三義也、而名中風者有二
忘、傷寒論曰、中風是言傷寒輕忘、即風寒之風、於字
義為至當、中為去聲、即傷風也、頭風破傷風、風溼等、
皆風寒之風、屬外因、是為一義、世之所謂中風者、其
證半身不遂、口眼歪斜、東涯以氣字為解者也、莊子
曰、民溼寢則腰疾偏死、荀子曰、禹跳湯偏、尹子曰、禹
之勞、十年不窺其家、手不生爪、脰不生毛、偏枯之病、
步不相過、人曰禹步、鄭注尚書大傳曰、湯半身體
枯、淮南子曰、偏枯之藥、是即世之所謂中風、而古典
不言中風、夫中風者傷風之名、而係外襲風邪、而偏
枯者、原有癥痼、瘡血塊瘀毒、而思慮過度、或酒色

昏荒之人、因寒暑飢飽、內勢激發也、至其輕重緩急、順逆虛實、其候多端也、素靈無中風之目、風論有中

字都謂

中而說風之證者、往々有之、金匱要略說中風者、

有與傷寒論不吻合者、金匱是蠹餘殘簡、後人所輯錄、不足為徵焉、然後漢既以偏枯為中風、或單稱風

疾、表忠傳曰、風疾瘡不能言、又三國志注、曹瞞傳曰、

太祖少好飛雁鳥走狗、游蕩湯無度、其叔父數言之于嵩、太祖患之、後逢叔父于路、乃陽敗面喝口、叔父問其故、太祖曰、卒中惡風、叔父以告嵩、嵩敬焉愕呼太祖、太祖口貌如故、嵩問曰、叔父言汝中風、已差乎、太祖曰、初不中風、但失愛於叔父、故見罔耳、嵩乃疑焉、自後

叔父所告、嵩終不復信、太祖於是益得肆意、此稱中風者、父母病之、其子多病之、屬內因、所謂大麻風、癲風、大風等諸名、皆為一義也、至如風狂、風癲、風狗風癮、則又別為一義、通鑑曰、國子祭酒祝欽明、自請作八風搖頭轉目、備諸醜態、上笑胡三省曰、所謂八風舞、非春秋魯大夫衆仲所謂舞者、所以節八音行八風者也、借八風之名、而備諸淫醜之態耳、今人謂淫放不返為風、此則欽明所謂八風也、是與風狂風癲之風同義也、業取桂偶記卷一 風

劉君廉夫曰、傷寒論、中風乃是傷寒中之一證、宋以後呼為傷風者是也、而金匱中風乃靈素所謂偏枯、

後世中風之稱昉于此。夫傷寒論金匱元是一書而同成仲景之手。理宜無以一中風之名互稱兩種之疾。然魏志注引曹瞞傳云。魏太祖陽敗面喎口。叔父怪而問其故。太祖曰。卒中惡風。叔父以告嵩。嵩愕呼太祖。太祖口貌如故。嵩問曰。叔父言汝中風已。差乎。太祖曰。初不中風。魏武與仲景氏同。漢末人知當時有此語。又按後漢朱浮與彭寵書。俗通獨中風狂走。此以狂為中風。後世狂風、風狂、心風等之稱。蓋有所由。均之東漢語所指。遯殊不可不知也。若夫後世紫白癲風、落架風、食迷風之類。風字竟不可窮詰焉。蓋風善行而數變。凡病變動移易不定者。以風呴之。

耶錄以後識者。醫臘卷上 中風

儒門事親。夫風之為狀。善行而數變。內經曰。諸風掉眩。皆屬肝木。掉搖眩運。非風木之象乎。紓曲勁直。非風木之象乎。手足掣吳本作掣。顫。斜目。喝口。筋急攣。搐。瘻癰。驚癇。發作無時。角弓反張。甚則吐沫。亥泣或歌。喜怒失常。頓僵暴仆。昏不知人。茲又非風木之象乎。故善行而數變者。皆是厥陰肝木之用也。夫肝木所以自甚而至此者。非獨風為然。蓋肺金為心火所制。不能勝木故也。厥近世差互說

李時珍曰。古人論病。多主風寒。用藥皆是桂附。故不知梨有治風熱潤肺涼心消痰降火解毒之功。

也、今人琰病火病、十居六七、梨之有益、蓋不為少。

本草綱目卷廿九 梨發明

火生風

說見本集卷十
三茲不具載

靈樞刺節真邪篇、正氣者、正風也、邪氣者、邪風之賊傷人也。

莊子齊物論、大塊噫氣、其名為風。

廣雅釋言、風氣也、

淮南子汜論訓風
先賦馬注同

釋名釋天、風放也、氣放散也、

又風氾也、其氣博氾而動物也、

呂覽審時篇、如此者不風、

說高誘注

風落也、

說文、風動蟲生、故蟲八日而化、从虫凡聲、

大戴禮易本命、風主蟲、
書費誓、馬牛其風、鄭注、風走逸、
按ニ風寒ノ風ハ固ヨリ勿論、風ハ木氣ナリト
諸書ニアレハ、肝木生風ト云モ、左モアルヘキ
フナリ、東涯ノ說ノ如ク、ズヘテ風ヲ氣トハカ
リ釋スルモ、概論ナリ、凡風トイヘル病名ニハ、
氣トナスヘキモノアリ、蟲トナスヘキモノノア
リ、肌肉剥落トナスヘキモノアリ、走注トナス
ヘキモノアリ、狂疾トナスヘキモノアリ、急疾
トナスヘキモノアリ、此數義ヲ以テ解スレハ、
解スヘカラザルモノナレ、ニ義三義ニ出テズ

ト云ハ、無理ニオシツケタル說ナリ、畢竟ハ風
ニ風善行而數變々ノ聖詰ニテ總轄スヘレ

病當分風氣治之論

風為百病之長、素靈數言之、巢元方撰病源、皆概之于風、後世稱氣者、棄而不論、風病之因、掃地而盡、竟至桂麻難用於雜病、疏氣香竄之品、奉為拱璧、是古今治病之一大變、尤當看眼之甚者矣、而龍耳聾之徒、雷同於吠虛、動陷於巢窟、無啓憤憤者、仲景薯蕷圓主治、有風氣百疾文、張文仲有風狀百廿四、氣狀八十語、蓋風與氣一類二種、析言則風氣不同、渾言則風氣可通用、夫風氣本天地間之氣、散則風聚則氣、人身之感邪也、風盛則氣壅、故能散其風則氣自通、是知疎風即所以利氣也、後世方書既多利氣之法、病當分風氣治之論

而少疎風之治、今人亦不詳其理、徒知利氣、而不知疎風、豈非一大憾事、試以脚氣一病言之、其證有安麻黃石膏者、有安枳榔木茱萸者、若不分風氣二證、將何以處之乎、若能會此理、則聖經賢傳、皆迎刃而解矣、業廣私說

史倉公傳云、陽虛侯相趙章病、脈來滑、是內風氣也。

金匱要略首篇云、夫人稟五常、因風氣而生長風、氣雖能生萬物、亦能害萬物。

又云、客氣邪風中人多死、集玉文、新編、卷之二、

又水氣篇云、脉浮而洪、浮則為風、洪則為氣、風氣

相搏、風強則為隱疹、身體為痒、為泄風久為癥癩、氣強則為水、難以免仰、風氣相擊、身體洪腫、

王函經證、抱例、經云、地水火風、合和成人、風氣不調、全身強直、諸毛孔閉塞、風止則氣絕、

按人身中固有風、故有肝木生風、食某物動風等文、此可以證地水火風合和成人說也、

· 十全方、病有四種、一冷痺、二氣疾、三邪風、四熱毒、卷廿七調氣法

王機微義引發明云、經曰、陽之氣以天地之疾風名之、此中風者、非外來風邪、乃本氣自病也、云云、按此云本氣自病、乃與劉河間論內熱所生相合、但

彼云熱而此云虛之與熱並行而不相悖也。卷一

吳又可論

和田東郭曰時疫ハ歲ニ因テ癘氣ノ達ヒ病ム所ノ忘モ同レカラス、瘟疫論ニ說トコロノ戰汗ヲ得テ解スルト云忘モ、何時ニテモ、此通り病ムニ極リタルニアラス、此忘モ先年流行セリ、近年ハ見ヘス、唯傷寒論ハ万代不易ノ法書ニテ、ダトヒ病ムトコロノ忘カハリテモ、其變ニ應レテ用ヒテル、ナリ、若シ吳氏ノ云ル通り初メヨリ邪氣半表半裏ニヤリテ、發汗桂麻ノ類用ヒカタシトセハ、柴胡劑ヨリシテ入ルヘキナリ、達原飲ハガ味清脾飲ノ變方ナリ、又吳氏ハ承氣湯ヲ用ユル論口又可

ニ長セリト云、ナルホト、承氣ハ逐邪ノ為ニ設ケ、
結糞ニ拘ラスト云ヘルアタリハ、承氣ノ意ヲ得
ラレタリ、然トモ、柴胡劑ヲ用ユルニハ短ナリ、如
何トナレハ、大柴胡又ハ柴胡加芒消ノ行處ヘ聚
シテ、承氣ヲ用ヒ、下メ後ニ始メテ柴胡清燥及ヒ
養榮ノ類ヲ以テ調理ノ方トセリ、是裏ヲ先ニシ
テ、表ヲ後ニスルノ說ニ偏固セリ、傷寒論ノ陽明
篇ニ、熱邪ノ胃府ニ陷入スル間ヲ待ツケ、小柴胡
ヲ用ユル手段ハ、治療ノ細密ノ場ニテ、仲景氏ノ
教ハ格別ナリ、蕉窓雜話卷一、
原南陽曰、其說古方者、明呉又可、最有所見、然其著

溫疫論開卷說邪在募原、達原飲主之者、是徒欲建
奇懾於千古者、而不足怪、其僻建言家之常態也、至
如言白虎達表氣之劑逐邪不可拘結糞、及其他所
言、踏實地溯源流、實識古方者也、若言溫疫與傷寒
不同、則亦是素難家之醫而已、舊習既為性、不足深
責也、叢桂偶記卷一

劉君達庭曰、吳有性著溫疫論、主疫邪自口鼻入之
說、蓋膜原實少陽之部、而達原飲三消飲有地方之
宜、或驗于今者、然審其主證、猶不能出大小柴胡之
例、竊想當吳氏之時、邪勢暴厲、遽犯半表裏故遂立
其說乎、董氏西塘感忘引傷寒心法、稱見今世甚少

太陽症其書適與吳氏時世相近可以證矣世偶有
墨守吳氏之法忌用桂麻視柴胡為餘熱之治者故
附識于此傷寒述義卷二

又曰吳又可曰三淨氣功用彷彿又曰功效俱在大
黃餘皆治標之品也並欠辨晰同上

責士

傷寒總病論卷五 小兒傷寒欬嗽、鼻塞癰瘍、喉中呀呷聲、射干湯、射干、麻黃、紫菀、甘草、生薑各一兩、半夏伍枚、桂心五寸、麻黃、紫菀、甘草、生薑各一兩、大棗二十枚、右捌味㕮咀、以水柒升、煮取壹升、伍合去滓、內蜜伍合、煎壹沸分溫服、貳合、日參、卷五

千金方射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方、射干一兩、半夏伍枚、桂心五寸、麻黃、紫菀、甘草、生薑各一兩、大棗二十枚、右捌味㕮咀、以水柒升、煮取壹升、伍合去滓、內蜜伍合、煎壹沸分溫服、貳合、日參、卷五

少加減之、同上

兒科方要白附飲、頓嗽者、小兒欬即喰頓、連聲不已、

須當治方

嗽則臉紅吐即嗽止嗽久不已眼腫而目中白珠起
有紅絲者即不可用涼藥白附子枳實防風全蠟膽
星天麻半夏各一錢姜黃官桂丁香木香以上三味
若痰中有血當去之甘草各四分右薑水煎

和田東郭八味降氣湯治小兒百日咳半夏茯苓陳
皮甘草桑白皮木通香附子蘇子右八味加竹茹杏
仁或人傳

津田玄仙寧肺消中飲子枳殼紫蘇莖葛根陳皮甘
草紫蘇子新蘿蔔子枳橘厚朴旋復花各等分右十
味療治茶談後編

原南陽皮弁散治小兒欬嗽方所謂百燈籠草秋初
日熟者燈籠草

採苗葉實相連燒存性紅熟者不佳右一味散服又
治大人痰咳吐白沫者用勞嗽似有驗者醫事小言
部

按ニ邦俗百日咳ト稱スルモノ巢源四十八嗽
候ニ百日內嗽古名トスルハ是ニアルヲ百日明人頤嗽ト名
ク古呻嗽ト云ヘルモ人礙證ナケレモ確證ナ
難レサレド其說ハ本集第三卷中ニ載置タレハ參看スヘ
凡全効ヲ得ルモノ少シ蛇虫ナリナド云フモ
ノモアレ凡的當トモナシ難レ其病流行スル
時ハ閩鄉ノ児過半病ムラミレハ外來ノ邪ニ
相違ナキトハ論スルニ及ハズ肺部一經ヘ外

來ノ濕邪ヲ感レタルニテ、歲中ニハ少シモ及
サヅルト見ヘタリ。疳ヲ兼、蛇ヲ兼ルハ、小兒ノ
諸病ニハ普通ノノニテ、コレヲ孰テ病原トハ
ナレ難レ、千多方射干湯ヲ、小兒欬嗽ニ用タル
ニ據テ、弘化丁未春末夏初、頓嗽行ハル、トキ
ニ、金匱ノ射干麻黃湯ヲ用タルニ、イツレモ半
月位ニテ愈タリ。治疳ノ丸藥ヲ兼用レタルノ
モアリ。燈籠草ノ黒燒元ヲ少ミツ、兼用レテ、時
時效ヲ得タルノモアリ。本草ニ此草、苦寒、濕熱
ヲ除キ、咳嗽ヲ治ストアレハ、效アルハ必定ナ
レド、有毒ノ品ニテ、劫割ニ属スヘキナレハ、長

服スルハ如何アラシト思ハル、先友池田天谿
瑞長通稱白附飲ヲ用テ、大効ヲ奏レタルヲ見タリ、
コレハ久嗽ノ上ノノノナリキ、恐クハ初起ニハ
足レカルニジ、鷓胡菜紫蘇子ナド組タル方ヲ
啞科ノ用タルヲ數見タリ、和田津田ニ子ノ方
ヲモ試タレモ、全効ヲ得シノナシ、況ヤ小青龍
麻杏甘石ナド、タ、立派ナ處方ト云マデニテ、
一人モ効ヲ奏レタルヲ見ズ、畢竟前ニ云通り、
吐血ナドスルニ至レモ、歲ニ子細ナキユヘ、何
ノ藥ガキ、シヤ、自然久シキヲ経レハ、愈ルモ
ノ太半ナリ。

惠美空寧固曰、嬰兒領嗽與左金丸愈、蝙蝠霜亦效。

先醫醫話

淺田栗園曰、蝙蝠霜

亦效云、名獨聖

散片倉鶴

皮用雞霜

一入元氣天奏力變參天氣栗園神靈也
和否甘苦尤可察者在於大處也
如其病文身全形及脉之數十日者
更辨以用急之民運氣也此味由藥田元氣之也
空了也、無之無之無之無之無之無之無之無之
時次々次々次々次々次々次々次々次々次々次々
體白潤滑又風氣大極天奏之矣、此水火之根也
通天氣、盛女陰、水火相合、此水火之根也、水火並田天樂

鳥頭毒 附附子主毒

舊同僚本木元意、神田小柳町ニ住ス、嘗テ余ニ語
テ曰久近傍ニ家ヲ建築スルモノアリ、大工四五
人聚タルニ、午飯後、皆一時ニ卒倒人事ヲ省セス、
招キニ應シ、イソキ往キタルニ、四五人トモ、目六
カリキヨロイシテ、言語スルト能ハズ、診シタレ
モ、何ノ故ナル、トヨ知ラズ、午飯ニ、何ヲ喫シタル
ヤ、尋サレハ、豆腐ノ羹矣ヲ喫シタルノミシト答ス因
テ其残リノ鍋ヲ檢スルニ、輪切ニナリタル箇數片
ヲ出ス、杓子ニテ搗ケミルニ、全ク鳥頭ナリ、詰問
スルニ、其家ノ娘、頭ニ蟲ノ生セシユヘ、其母鳥頭

ヲ切り鉢ニ入レ、水ニ漬シオキシテ、家婢漫ニ椎
茸ノダシナラント思ヒ誤リ、豆腐ノ内へ入レシ
ナリ、コレニテ病因ノ知レタレハ、黒豆甘草湯ヲ
煎レ多服セレム、數刻ニ故ニ復ス、鳥頭ノ毒ノ畏
ルヘキハ、誰モ知リタルフナレモ、加様ナル疑似
ノ際ニハ尤丁寧反復審ニスヘキナリト語レ
リ。

舊同藩若林某ノ親戚ノ一男子、持病ニ痴アリテ、
時ミ橙ノ末ヲ酒ニテ服ス、アルトキ、童子ニ命シ
テ、橙ノ末ヲ買レムゾノ童子塗中ニテ、橙ヲ忘レ、
藥肆ニ至リテ、^前柚ノ末ヲクレヨト云フ、藥肆ニテ、

柚ニハアル、ジ、鳥頭ナルベレトテ、鳥頭ノ末ヲ
与フ、コレヲ酒ニテ服レタルニ、瞑眩甚シク、卒ニ
斃ル、何故ナルフ、知ラズ、死後サヘ、^前穿鑿レタ
ルニ、鳥頭ノ末ナルフ相違ナレト。

右ニ條、四十年。^前親ク聞クトコロナリ、拙著ヲ編
スルノ次、思出セレド、ヲ記ス、頃日先友清川
吉人ノ梧陰銷間雜記ヲ讀ムニ、暗合ノ談アレ
ハ、後ニ掲テ他日ノ戒トナス。

梧陰銷間雜記ニ云、文政壬午ノ春、都下大大ノ後、
尾張町平松屋へ出入スル匠人、急病トテ、平松屋
ヨリ案内ノ銀坐町へ赴キ診ス、先望ニ肥黒壯獐

人ナリ、其状卒ニ頭痛煩躁言語錯亂騒擾如狂、先
ツ脈ヲ診セントセシニ、忽起立、又乍顛仆、少時モ
寧ヲ得ズ、其所由ヲ問ニ、其妻答云、前夜大酒、今曉
ニテ爛醉メ、用ニ立カタキニヨリ、言訣ナカラ、店
平松屋
ラサスヘ行シニ、店アラハ、沙糖ヲ與ル程ニ、クツ
ニカキマセ多飲ベレトテ、糖沙ラ與ヘラレシニ
ヨリ、近隣ノ藥肆ニテ、グツヲ買、沙糖ト湯ニカキ
ニセ飲タリ、其餘瀝ヲ妾モ飲レニ、辛キヤフニ覺
ヘ、口中ニシミシ故水ニ嗽シト云、余云、其クヅコ
ソ怪レ速ニ藥肆ニ尋ヨト云、人ヲ馳テ問フニ、
ヅトウヅトノ聞誤ニテ、烏頭ヲウリレト云スサ

テコソトテ急ニ黒豆甘草湯ヲ煎服エヨト指圖
シテカラ、懷ニアル白礬ヲ冷水ミテ四冬ホト灌
キ、快ク受レ、頻ニ灌下レ、少時稍穩、床ニ臥ス、脈ヲ
診スルニ、沈伏不應、氣急息急モ急迫ナリキ、其ウチ煎
湯成リシ故頻ニ與フベレトテ、次早診セレテ、稍
稍脈モ應シ、精神モ定リ、十餘日服藥全愈タリ、白
礬諸毒ヲ解フベニ、知ナレバ、烏頭毒ニハ始テ
試タリ、白礬解諸毒ハ、諸ノ醫典ニ多ク覩フ也、西
溪聚語云、李晦文云、凡中毐、白礬芽茶搗末、冷水飲
之即愈トアリ、

舊同藩ニバ木条平トイヘル六十餘ノ老人アリ、大病ヲ患ヒバ味丸ニテ愈タリ、其人疵モアリ、病後身體衰タルユヘ、右ノ藥ヲ煉藥トナシ常
用セリ、茶臼モ所藏ニアレハ、手製ニシテ用タ
シトイフ故、分兩ヲ詳ニ示レテオキヌ、アルト
キ急病ナリトテ招久診ルニ脉モ絶シ、目ヲ閉
シ、手足厥冷ス、其由ヲ審問スルニ、其頃附子ノ
價甚賈ケレハ、白川附子ニ代テ制衣シ用ユ、昨日
蜜ヲ入ルヘキ、蜜モキレ、袋ニ少々末ノ殘リタ
ルヲ、白湯ニテ用ユト云フ、イソギ黒豆甘草湯
ヲ煎ジ用シム、翌日診スルニ自若ナリ、藥毒解

スレハゾノ内ニハ醒ムベレナド云テ帰リヌ、
五六日、日診スルニ、前ノ如ヒ、老人也、イニ、且衰
弱ノ上ナレハ、犬ニ心配シ、他醫ヲモ乞ヒ、犀角
ナド用ユレキ、脉モ出ズ、厥冷モ同ノフ、因テ
治ヲ断リタレトモ、親族ノモル集リテ、自作ソ
禡ナレハ、怨ムルヲナシトテ、懇請スルユヘ、已
ム「ヲ得ズ、黃連解毒湯ヲ冷服セシム、十餘日
ノ後、不圖目ヲ開キ、微ク言語スルヲ得、粥飲
ヲ少シツ、嘔ス、三十餘日ニメ故ニ復ス、余附
子ノ瞑眩ヲ度、見タレキ、此ノ如ク長キモ人
五十年間前後初テ見タリ、畏ルヘキノ甚シキ

トナリ

前年與名水男小文字中人見之者

改水東山又之東與之英人見其水

日數不圖自是開手發之言善矣但已失所

之平故謂之黃車論毒物來谷罪事年亦十金日

既知之恐少半所方於此良藥當請不以無念

宗長酒以多女重而殊蒸氣更甚集千元自於父

無事隨身之天福則古又惡食同食而因元

服久失大以成著之心酒多則善天主守口風雨

五六日日復又可云病或不勞人者更甚

夫水人內三益弱水尤有君云天是也

卷

一本堂藥選確言有二

予嘗有言人漫善治頓虛而不能治漸虛此二言足以蔽盡人謬矣卷上

予嘗曰新汲井水即可謂天然白虎湯矣卷下

平曾曰 情及井水頭口 雷天怒白氣暴矣卷下
火燒盡入夢矣天卷上
平曾言入夢善惡貪重而不諳亦神靈也三言
一本堂藥經卷下

令痘兒終始不閉眼法

清川吉人曰 痘兒灌漿ノ期ニ至レモ、眼ヲ閉サラ
シムル法ハ、發熱ヨリ結痂ニ至ニテ、痘兒ノ卧内
枕上ニ、茶碗ニ水ヲ盛リ、動ケモ溢レスヨウニハ
少目ホト入ヒ、紙ニテ益ヒ、元結ノ類細キ紙條ニ
テ、茶碗ノ底ヨリ十文字ニカケ、碗ノ上ニテ結屋
ノウラ、又ハ天井ニツリ置切ニ觸動スルヲ禁ス。
地震等ニテ搖クハ妨トセス、如此スレハ、灌水灌
將水ノ期ニ肉脹甚シ凡、全ク閉塞メ物ヲ視サルニ
至ラス妙也トム。昔年伯兄ヘ或人ノ傳ヘキ、何ノ
謂ナルヤ、祝モ彼邦古ハ咒由トテ有來タル

故其理ナシトモ断スヘカラス、小兒ノ痘危嶮ナ
リシカ、家婆此事ヲ傳聞メ、此法ヲ用シカ、始終目
ヲ細ク明キ、物ノ見ヘヌヤウニハ無リ。一、格陰銷
卷上

業廣兄弟十人アリ、十餘歳ノ頃ヨリ追ニ出痘
シタルトキ、俗人大傳ニテ、先考コノ法ヲ用テ
レタリ、池田家ニテハ、眼鼻トモニ封スルヲ佳
トスレモ、一モ誤タルトナケレハ、必害アリト
モ云難シ、清川氏ノ說クトコロト暗合シタレ
ハ茲ニ載テ試驗ニ備フ、但俗ニ樹根子ニテ鼻
ノ塞ガルヲ開クハ、イカ、アラン。

痘忌雞卵

清川吉人曰、痘瘡ニ雞蛋ヲ忌ム一ハ、先師蘭軒先
生ノ教示也、今世啞科徃々忌ザルヲ見ル、雞卵ノ
痘兒ノ目ヲ損スル一ハ、屢目擊セシケナリ、余見
當リシヲ左ニ記ス、皆兒科必讀ノ書ナリ、啞醫
忌サルコソ怪シケレ、蘇沈良方ニ、痘瘡不可食雞
鴨卵、即時盲瞳子如卵色、其應如神、コレハ醫說ニ
モ列リ、幼ニ新書、瘡疹愛護面目部ニ熟鷄鴨等卵
未有不損目者、雖瘡愈、宜數月不食、又醫方類聚ニ
備豫百要方ヲ引テ、小兒豌豆瘡ニ、鷄鴨卵ヲ忌ム
一則、良方謂トコロノ如、是齊醫方ニモ、目疾ヲ

治スル退醫散ノ下云、孫盈仲云、凡患痘疹不可食
鷄鴨子必生醫膜トアリ、傳心錄ニモ、諸卵目ヲ害
トアリ、又種痘新書ニ、鷄蛋滯氣不宣用トアリ、何
レニモ痘ニハ忌ヘキトナリ。格陰銷間雜記卷下

池田錦橋翁曰、雞卵ハ毒ナシ、心氣ヲシヅメ、五歲
ヲ安クス、邪熱ヲサルトイヘキ、若痘後炒米干菓
子ノ類ト共ニ食スレハ、後必眼疾ヲ發スト云說
アリ、故ニ痘中痘後妄ニ与フヘカラズ。痘疹草
天保庚子ノ春、舊同藩齊藤壯三郎ノ女ノ痘ヲ
療セシトキ、齊藤ノイヘルニハ、雞卵ハ痘後眼
疾ニ障ルト、古書ニアレハ、用ユヘカラズト、伊

澤蘭軒ノ話ナリト、余謂フ池田家ニテ禁シタ
ル說ヲ聞カズト答ス、其頃蘭軒京水ノニ先生
モ歿後ユヘ質問スルモナカリレガ、後聞入
氏ノ八十一論ヲ讀ミシニ、雞鵝鴨卵ヲ食ヘハ、
目害ヲナストヨイヒ、蘇沈良方卷十二モ云タ
ルトアレハ、識者ノ言、倉卒ニ聽過スヘカラザ
ルト悟リス、因テ隨筆中ニ記シオキタレド、
今茲清川氏ノ銷間雜記ヲ得テ讀ムニ、詳ニ其
事ヲ載セタレバ、速ニ鈔錄シテ攷ニ備ス。

漢種大黃

小野蘭山曰、今漢種ヲ傳テ、城州長池、和州ニ多ク
栽、藥肆ニコレヲ真ノ大黃トヨブ、切口ニ紫ノ筋
アリ、即錦紋大黃ナリ、形色ハ舶來ニ異ナラザレ
ル、本邦ノ土地ニ應ゼサル故カ、舶來ノ者ニ及ハ
ズ、一說ニ年ヲ經レバ、唐ニ同シト云、本草啓蒙
卷十三

劉君藍庭曰、蘭山先生ノ言ニ、漢種ノ大黃ハ效ナ
シ、生用スルユヘ、性カノ鬱シタルトミヘテ、其皮黒褐
ナリ、舶來ノ者ハ炙焦シタルトミヘテ、其皮黒褐
ナリ、嘗テ木ヲサシテ焼タルヲ見タルヲアリ、此
方ニ種ル物モ、カク脩製セハ可ナランカ、又桂枝

モ漢種小滋味アリテ辛香ナラス、此モ舶來ノ櫃ヨリ擇シニ、滋味ナルモノアリシユエ、湯ニ淘過メ辛香ニナリヌト。時還讀我書卷上

ミ坐用又リニシテ對也人體三ニテ變べル「モテ又

墮母齒真日蘭山米主八吉ニ裏轉人大黃ハ效大

下一部ニ羊矢盛ノハ吉ニ同也本節數學

日本研人土杜ニ敷すサマ茹大師來人昔ニ又六

マ火車鞋大黃ナリ、研色ハ師來ニ異ナセノ

殊藥真ニテ大黃大黃十日又四口ニ紫人頭

小理蘭山日吟薰軒天朝云其代是去味伏安多也

薰軒大黃

肝後方、魚骨鯫在喉中、衆法不能去者方、取飴糖丸如雞子黃大呑之、不去又呑。

以漸大作丸用得効、卷六

鴟糖治骨鯫

附瀉水醋法

卷三竹筒治諸哽法

友人伊澤春安

櫻軒

ノ曰、骨鯫ニ鴟糖一塊ヲ呑下

セハ立トコロニ下ル、膠飴ニテハ効ナレ、

續醫說、富家子弟被雞骨鯫所苦、百方不能治、家人驚惶、忽有一叟至、自云、我有巧術、但行手法取之、不勞藥餌也、富翁許厚謝、遂出千緝雙謂之曰、速取新綿白糖二物、將綿裹糖如梅大、令其子啖下入喉間、留綿一半于外、時時以手牽掣、俾喉中作痒、忽然痰涎壅出、其骨粘於綿上矣、富翁大喜、如約酌之而去、卷九巧術治鯫功

又近有稚子、戲以線錘置口中、誤呑之、有胡僧啖

以錫糖半斤、飴於穀道中、隨穢而下。僧云：凡誤吞

五金者皆可啖也。

同上誤吞線鍊引近
卷年間用各十ノウ

景岳全書：凡諸骨鰓或以錫糖一大塊滿口、吞而

嚥之。或用韭菜者、畧熟勿切、吞下一束、即裹而下。

亦妙。

卷二十八十六ノオ

名醫類案：禮部王貞外言：昔金陵有一士子為魚骨梗骨所苦、不能飲食。忽見賣白錫糖者、因買食之、頓覺無恙。後見孫真人已有此方。見說畧。

卷七

灌米醋法
太宰德夫曰：京師市中、有不兒四五歲、因咬核犯塞咽喉、其家走敦殿醫士。醫以白湯調麥芽末與服、未效。湏臾反目欲絕、偶有鬻綿布者過其家問而知之。我能救云急取米醋煮令熱灌半鐘於鼻口、兒便大吐出核犯而安。其家大喜、為沽酒重謝。曾人醫軒而去。其設局者純所謂也。

癩病治方

三宅道甫曰：予游歷中北筑ノ龜井道載氏ノ門生ニ治方ヲ授リケル十リ。嘗テ道載子曰：癩病ヲ療治シテ平愈スルモノ、十人ノ内八人ハイユルナリ、愈サルモノ、十人ニ一人、手足脇削スルモノ、黒色白色染タルヤウナモノ、口眼喰鉗スルモノ、是ハ愈サル又鬚眉墮落スルモノ、面身隱起スルモノ、腫脹スルモノ、紅醉ノヤウナモノ、班点アルモノ、肌膚破傷スルモノ、麻木不仁スルモノ、骨節拘攣スルモノ、皆治ス。余カ家曰天神祕丸ノ方アリテ、廢人ヲ起者幾千人ト云。ト知テス。寶三回。

天ノ術ニレテ、奇々妙々トイヘリ、ニコトナル武
名方タルヲ、愚心モ十餘人ヲ治驗シタリ、亦金聲散
玉振丸ノ兼用服方、甚口傳タルトモ、方後ニシル
シテ、世トトモニスルモノ、濟民ノ術ナリ。

景圓天神秘丸

今增大楓子皮黒燒五錢、

大楓子

去皮、五

大黃

黃柏

櫻皮黒燒

大黃

黃柏

金聲散

大黃八分、
燭甘石各三、
服部、
黑燒五分

大黃八分、
荳蔻粉五分、
右二味為末、酒服、

玉振丸

巴豆

牽牛子

大黃

各二

荳蔻粉一分

右四味糊丸白湯ニテ送下、

右神秘丸金聲散玉振丸ノ服法ノ秘傳ハ、一

ニ神祕丸三粒ツ、打碎キ、白湯ニテ早朝ニ服

ス、右十日用テ、其夜金聲散一錢三分ヲ、酒ニテ

服ス、翌日十一日ノ早朝、玉振丸五分ヲ白湯ニ

テマル呑ニス、但玉振丸ヲ用ル日ハ、神祕丸ヲ

用ヒス、十二日目ヨリ、又前ノ如ク神祕丸ヲ用

ヒ、又前ノ如ク、其夜散藥ヲ用ヒ、翌日玉振丸ヲ

用ヒ、以上三十三日ヲ一劑ノ日數トス、五辛酒

肉麩類房事堅ク禁ス

又癩病奇方 右ハ大和ノ比丘尼、此方ヲ用テ
癩ヲ治スルヲ妙ヲ得タリ。アル一男子、其方ヲ
知テシト欲スレモ、嘗テ授ケザルヲ聞キ、詐チ
馬鹿トナリテ奉公スルヲ三年終ニ。此方ヲ竊
ミ得タリトカヤ、愚按ニ藥品ノ奇物定メテ功
アラシ予神祕丸ヲ得タル故、イニタ怪験セズ、
願クハ同志ノ人試之。

大楓子目

鹿頭黒燒

龍腦

五枚

右糊九七日ニ用、但一日ニ三度白湯ニテ送下

王後方下藥

代赭石 當帰 茄藥 毛活絡一 輕粉
巴豆各五人參 大黃各五
杏八味糊丸服、虛人ニハ別ニ人參白朮茯苓甘
草擇出多分ニ用ユト云、以上療治茶談續編
和田東郭曰、癩疾ノ陽証ノ者、先浮萍湯ニ浴セレ
ムルヲ三日ノ發汗メ大ニ有効、ソレヨリ再造ニ
加天石散ヲ用レハ、功大ニ速、尤初發ノハ、癩
瘡膿潰スル如キニ至テハ、功アルニシ、先太陽病
ト云处ニ浮萍湯ニ浴スル片ハ、百日ニテ治スヘキ
者モ、五十日或三十日ニテ治スルナリ、先生又云、
今按ニ再造散、此處ニ用ニハ、反鼻ヨリ烏蛇ヨレ、

癩疾肉食ヲ忌ト雖、最第^一禁ハ房事也。房事ヲス
ルキハ、藥モ功大キシ。浮萍湯、或浮萍ニテ浴ス。表證元
泪當ハ、顏色等ノ紫黑色赤ニスキ、或ムテアクトメ
アル者、或ニリトトコロクシ。腫氣メアルモノハ、
發汗スル也。前ニ云レ浴後ノ再造加天石ヲ用ル
处ニテ、重キ者神秘丸ヲ用モノ、輕者ハ再造加天
石ニテ功アルモノ也。癩疾ニハ、服藥中ハ酒肉房
事ヲ忌シ。百疾一貫。

又曰、癩疾陽忘ハ治スルシ。陰忘ニ至テハ治方ナ
シ。大黃三錢、黃芩一錢、黃連一錢、川芎一錢、地黃一錢、白芷一錢、辰砂阿
仙藥各一錢、人參六分、木香一分、大楓子十五右丸ト

シ。金箔ヲ衣トス是半劑也。此方ヲ用ルニ、眉毛脫
落中ニ用ユレハ有効。既眉毛脱落シテハ無効ト
云。先生云。此方有効ト言テ、或人傳ヘタリ。先生又
云。此方癩疾ノ陰疾タチノモノニ用テ見タキ者
也。先生云。神秘丸ヲ用テオルウチ、惡寒發熱出
ル事アリ。前ノ丸散ヲ止テ、加味逍遙散ヲ用。惡寒
發熱治メ後、又神秘丸ヲ用ルシ。是龜井ノシオホ
エベトシ。又龜井家ニテハ、神秘ヲ用テ居ル内、变
アリテモ、アハテスレテ、加味道逍遙散ニ川芎ヲ加
テ良トシ。癩疾ニテモアルヘケレバ、常ノ人ニ
テ手、或足ノ内ナトクサリタルニ。神秘丸ヲ長服

メ有効レトアル也。癩疾陰陽ノ別ハ、陰ハヤセ
テ枯燥シ、或ハ外へ發メ、毛髮脱シ、或白癩等是也。
陽證ハ肥或腫起シ、或紫黑色、或斑ノ美紫黑色、或
赤斑ノ類、或麻痺ニ然レ、氏麻痺ハ陰症ニモアレ
氏、陽症ノ如ニハアラス、陽症ニテモ、合谷ノ脫症
ハ難治ナリ。癩ヲ浮萍湯ニ浴サスル者ハ、田中
ナド能セラレタリ。本草ニアリ、神秘丸靈方也ト、
以上並ニ百疾一無異。

未癪亦名米痕

田村君楓軒通稱元長余ニ語テ曰、一婦人姪娠中喜テ
白米ヲ喫ス、始婦ハ箇様ノ珍シカラザル故、別
ニ治ヲ加ヘズ、其儘打棄置タリシニ、產後ニ至リ
テモ猶止ニズ、後ニハ舅姑ノ目ヲ忍テ喫ス、強テ
忍ヘハ、口酸水ヲ吐シ、苦悶歎堪ヘカタシ、諸治効
ナシ、何次考ヘアリヤ、業廣答テ云フ、婦人米ヲ喫
スルモノ、間見聞レタレ凡、甚レカラザルユヘニ、
ヤ別ニ治ヲナシタルフナレ、米癪ノ名ハ、フルク
病源ニ出ツ、全クコノ沁ナリ、其人壯实ナラハ、漫
ニ試ミタキ方アリ、田村君曰、壯实ニテ他澄ナレ
未癪

ト云フ、並美廣云フ、千金外臺所載ノ雞屎白米等分、炒末、一日ニ一夕ミ服セレメ、本方ハ九味ノ清脾湯ナドハイカ、ト答フ、後二月餘、田村君喜テ來語テ云、嘆米ノ病人、足下ノ考ノ方ヲ與ル、六十年ハカリニメ、年餘ノ病全ク愈ニ、古人ノ妙感スルニ餘リアリ、サレド癥ヲ吐出スルノ說ハイカガアラン坎、再三試サレハ確徵ヲ得カタシコノ病人、平日胷持ノアシキ性ナレド、雞屎ナド一向ニサワラズシテ愈タリト、コレハ天保庚子五月ノ事也、今諸書載タルトコロヲ文ナテ、資貞改ニ備ス、病源候論米癥候人有好啞米、轉久弥嗜啞之、若

不得米、則胷中清水出、得米水便止、米不消化、遂生癥結、其人常思米、不能飲食、久則斃人。卷十九
廣濟療米癥、其疾常欲食米、若不得米、則胷中清水出方、雞屎一升、白米五合、右二味合炒、取米焦、薺篩為散、用水一升、頤服取盡、少時即吐、吐出癥如研米汁碎、若無癥、卽吐白沫淡水、乃憎米、不復食之、無所忌禁、千金同、外臺卷十二サミウ
又療米癥、久不療、羸瘦以至死方、葱白兩虎口切、烏梅三十枚碎、右二味、以水三升、宿漬烏梅、使得極濃、清晨取葱白、隨飲烏梅汁令盡、頃之心腹煩欲吐、卽令吐之、三晨療之、當吐去米癥差、無所忌。

千金方治米癥、卷十一
中方、占、黃齊醫、即雞屎白米二
食米闊之則口中清水出、情似憂思、食米頓便如
常、衆醫不辯、後遇蜀僧道廣、處方以雞屎及白米
各半合、共炒為末、以水一中盞調頓服、良久病者
吐出如米形、遂差、病源謂米瘕是也、卷五
名爲米癥、類案

卷五同

苓桂求甘湯治痿

和田東郭曰、苓桂木甘湯、痿痺ノ類、足フルヒ足ヨ
ハク、甚キニ至テハ、腰ヌケントスル者ニ用ニ、真
武モ是ヘユクフアリ、苓桂木甘ハ、真武ノ輕キ处
ヘヤルナリ、水飲ノ候アルモノ也、水飲ナキモノ
ハ、此症腹ヒツツイテ、動氣上ニツキ上ルモノ也、
此处ニ効アル也、劇キモノハ、卧ノアルト、脊骨ノ
辺ニヒククトウコキ、或一身中脉ノ处ヒククト
メ、自身ニモ氣味ワルカルモノ也、其忘耳ナト鳴
テ、逆上ノ候アルモノ也、今云瘤ニ類スルモノ也、
此等ヘ多ク効アリ、右ノ記ニメ、下利アルモノナラ
苓桂木甘湯治痿

八、真武湯也。傷寒論下篇久而成痿ノ條ノ證。何病ニナリ。凡アラハ、苓桂朮甘湯百發百中也。其剝シキモノハ、真武湯也。右ノ條ノ證中、初發或痼或產後ニ多アルモノ也。其它ニハ間ニアルモノ也。類一貫卷下

又曰。苓桂朮甘ハ、下部ノヒヘハオモニ腰ニカ、ルナリ。芍藥甘草附子湯ハ、脚ニカ、ルナリ。同上傷寒論太陽下篇。傷寒吐下後發汗、虛煩、脉甚微。八九日、心下痞鞕、脇下痛、氣上衝咽喉、眩冒、經脈動惕者、久而成痿。太陽下篇

喻氏尚論篇以此條接苓桂朮甘湯後云、即上

條之證、而明其增重者必致廢也。

傷寒補証論常氏云可茯苓甘草白朮生姜湯成痿者振痿湯雍曰當作茯苓桂枝白朮甘草湯。卷

有持桂里曰、醫門子綱目云、婦人小便中出大便名交腸。ノ忘余嘗テ二兩人見タリシガ、
後ハ皆勞狀トナリ。藥方効シテ死ニキ、方興、輓卷八。

交腸病

和田東郭曰、前陰ヨリ大便出ルアリ、是ヲ交腸ト
云、是ハ黃連解毒ノ類、總テ下ス藥ヨレ、然レ凡多
死ス、先生二三人見タリ、是后ニハ勞病ノ如クナ
リテ皆死セリ、暴漏ノ脫忘ト相^似モノ也。百灰一
實卷下
劉君薩庭曰、交腸病ハ罕見ノ證ナリ、仙臺ノ原玄
杏嘗^テ其證ニアヒ、五苓散ヲ用テ效ヲ奏セリト、
其子玄了、予ニ語レリ、危氏ノ言誣サルヲ覺ニ、
時還讀我書卷下。

醫說、一日有靈壁縣富家婦有疾、遣人邀李生以
往、李子初視脉云、腸胃間有所苦邪、婦曰、腸中痛不

⁰⁰名醫類案卷六
此文注、魏之珠方曰、按
交腸志亦如此、

可忍而大便從小便中出醫者皆以謂無此證不可治故欲屈子李曰試為籌之若姑服我之藥三日當有瘳不然非某所知也下小丸子數十粒前黃芪湯下之富家依其言下膿血數升而愈富家大喜贈錢五十萬置酒而問之曰始切脉時覺芤脈現於腸部王叔和脉訣云寸芤積血在胸中關內逢芤腸裏癰此癰生腸內所以致然所服者乃雲母膏為丸爾切脉至此可以言醫矣卷六

醫學綱目、婦人小便中出大糞名交腸服五苓散
效如未盡愈可用舊懷頭燒灰酒服之。卷二十一
五六五夕

醫學入門冊去交腸

不醉忽糟粕出前竅尿湧出後竅脉沈濇與四物
湯加海金沙砂木香換榔木通桃仁八貼安卷十
又一婦患此破漆紗帽燒灰末飲下愈同上
又一人患前症用舊幞頭燒灰酒調下五分愈同上
萬病回春一婦人病愈後小便出屎此陰陽失於
傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用
補中益氣湯而安卷六

世醫得效方、婦人小便中出大糞、名交腸、服五苓散效、如未盡愈、可用舊幞頭燒灰酒服之。卷十。
證治要訣、交腸之病、大小便易位而出、蓋因氣不循故也、清濁混淆、宜五苓散調氣散。氣散方用白歸脾

豆止卷丁香檀香木香各一錢。加阿膠末半錢。湯調
蜜酒杏葉甘草砂仁

服或研黃連阿膠丸為末。加木香末少許。再以前湯

送下。卷八

證治要訣類方。理物湯。交腸即理中湯。四物湯併用。卷一

又和劑。黃連阿膠丸。交腸阿膠炒一兩。黃連三兩。茯苓二兩。右為末。水煮阿膠膏。搜和丸如梧桐子。每服三十丸。空心酒未飲任下。卷四

逆經

有持桂里曰。經血錯テ口鼻ニ出ル。又逆經ト稱。又錯經ト謂。先哲ノ說ニ。此火載血上ル也ト云。トカニモ然ルベレ。龍龕雲林四物湯ニ生地黃ヲ用ヒ。大黃童便ヲ加ヘタル治驗。萬病回春ニ載ス。甚理アリ。徃年新街酒家茨木屋某下婢。此疾ヲ患ス。初ハ吐衄シ。後眼耳十指頭皆出血。形體麻木。手足強直スルニ至ル。余瀉心湯ヲ投ス。十日ヲ出デズシテ血止ム。後回生湯〇コレハ本_{龍王湯ノ類方ナ書卷一ノ十六ニ}出タヲ與ヘ。調理レテ故ニ復ス。此婢ナドハ錯經中ノ最劇證也。卷二

和田東郭曰、婦人逆經之病、古ヨリ名アリテ、其候
法ナシ、經水不利ナレハ、吐血スルトキハ、逆經ト
ミミルヘキナレ、經水サノミ不利ト云ホトニ
ナクノ、逆經ナルモノアリテ、吐血ト甚混シ易キ
也、其別ツ子ノ吐血ナレハ、心脇下グサクサスル
モノ也、不爾ハ、心脇下痞硬カ、イツレ心下ニ係ル
モノ也、又心脇下ニ動氣或ハ心下ニ云分ナ久脇
下ニ塊アリテ、其吐血前后堅ク突起シ、動氣上ニ
衝ノ勢アルモノナリ、一婦逆經ス、后ニ齒莖ヤ十
指頭ヨリ血ヲ出ス、回生湯ニテ差ヘタリ。○段方興
輓載スルトコロト
大ニ同シ、疑ベシ。ト先生云、今按ニ此證刺絡桃核

洋氣湯ヲニテ愈ヘレ、右ニ云フ處、逆經ノ塊ハ、小
便閉ノ塊ヨリハ、堅ク活動アリ、ト世逆經ヲ制ス
ルニ、四物加大黃ヲ用ヒテアリ、先生此處ヘハ、大
抵回生湯ヲ用ル也、但逆上シテ血量ノ氣ノアル
處ヘ用テ可也、逆經ハ必スカタマリタルヲ吐ス
ルモノ也、瘀血故ト見ニ、大概急ナルモノハ、回生
湯ヨリ三黃湯ヲ用テヨレ、后ニハ黃芩湯ヲ用ユ
ル様ニナルモノ也、偶ハ勞ノ狀ヲ見シテ來ルモ
矣也、此時ハヤハリ黃芩湯ナリ、勞ノ狀ヲ見サ
ル前ニ、早ク太黃劑ヲ用テ可也、黃芩ヲハ、血證ニテ
其證往來寒熱カ、效腹中拘急ナトアリテ、勞狀ノ

如クナルモノニ用レハ、血證モ治マリ、他ノ證モ
愈ル也。此症小柴胡小建中ノ間ノ處ナリ、凡テ諸
失血后ニ此症多クアルモノ也。凡テ此方宜ヒ逆
經ノ吐血ハ平生ノ吐血ナトヨリハ、治方モシ易
キモノ也。最初ニバヤク治スレハ誤ルトナキモ
ノ也。它ノ失血后勞狀ヲ見シタルハ、大抵治スレ
ハ崩漏後ノ勞ハ治シ難キモノ也。其内隨分モツ
レヌサキニ、早ク治スレハ、効ヲ得ルアリ。治方
ハ苗谷湯道達散當歸散ノ類ニテアレロウテ置
テ可也。百疾一賀卷上

又曰、逆經ノフ、法苑珠林ニ出タリ、此證アルモノ

之、同卷下

萬病回春錯經妄行於口鼻者、是火載血上氣之
亂也。治當滋陰降火順氣調經、經自准也。脉必芤
濇久而不治、乃成虛怯。當歸川芎白芍、生地黃、黃
芩、山梔牡丹皮、屋角阿膠炒白芍、芩去皮、麥門冬
去心、陳皮、右剉齊水煎溫服。卷六

又魏憲副寵夫人患逆經吐血不止、予胗六脉微
及濇有力、此血虛火盛也。以四物去熟地黃、用生地
黃、共一兩、加酒蒸大黃同煎、入童便服之、服後血
止經通矣。同上

本草綱目當歸附方引簡便方云、月經逆行、從口

鼻出先以京墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各

三錢水一錘半煎八分溫服其節通

卷十四當歸附方

又韭主治引朱震亨云主吐血唾血衄血尿血婦

人經脉逆行打撲傷損

卷廿六

及門越後鈴木順亭曰越後蒲原郡高木村ノ農夫ニ大酒ノモノアリ其人フト酒ニ傷テ長廿三寸許ノ筒子ノ如キモノヲ吐スソノ後ハ點滴モ飲ムト能ハズト

劉君道庭曰一酒客アリ胃脘痛ヲ患ヘ一日塊物一枚ヲ吐ス大サ枳殼ノ如久堅キト石ノ如シコレヨリメ酒ヲ飲トアタハス痛モ愈タリシカ反テ無聊ニ才モヒ右ノ塊ヲ貯置シテ取出メ頓ニ呑下セシカハ飲量前ニ異ナラス奇トイフヘレ時還讀我書卷上

酒客吐塊本集卷十三酒癥當攷

大善
二大善
又門媛安樂本草
高木林
御景
御景
卷十
ニ無
ノモ
一株
隆吉
酒客
本草
十三
當文

卷十
ニ無
ノモ
一株
隆吉
酒客
本草
十三
當文

心漏

清川吉人曰、曾テ方書中檢閱ノ次、心漏ノ治方ヲ得テ抄出シ置キシカ、イニ夕試サリシニ、近來品川驛ノ典舗丸屋九兵衛ノ手代松次郎、此證ヲ患テ久ニ不差、乃予ニハカル、診スルニ虛候アリ、ユヘ即試ニ此方ヲ與ヘシニ、半月許ニメ全愈ス、此後徃々奇効ア臻シキ。其後寸補醫按ヲ讀シニ、麻城令宋公ヲ治セシ條ニ論アリ、詳ニ其方意ヲ説ケリ、醫タル者、讀書セサルヘカラス、曩年松平兵庫頭殿是忘ニテ終ニ不起シ、此方ヲ用サルコソ遺憾ナレ、然ニ日是公ハ多慾督虛ノ上、大ニ心慮。

ヲ勞セシ人ナリ、是方ヲ用ヒシ凡如何アランヤ、

方ハ別ニ錄ス、梧陰銷間雜記卷三

治驗品川驛御林街典舡丸屋九兵衛手代松次郎、
心漏ヲ患フ、積年不差、漸羸弱、治ヲ余ニ謀ル、診之、
脉浮數ナレバ、甚キ虛候ナシ、但行歩コトニ短氣
ス、因テ万病回春追風通氣湯ヲ與テ、良朋彙集、
補醫案等ニ載スル、治心漏一方ヲ酒ニテ送下ス、
二旬ニメ効ヲ奏シタリキ、庚戌ノ秋ノ事ナリキ、

右治驗一則 清川 贈ル

明江瓘名鑒西類案、時康祖大夫患心漏二十年、當
胸數敷、血流長流、皆莫能治、或云、敷多則愈損、

閉則慮穴他岐當存其一二、猶為上策、坐此形神
困瘁、又積善腰痛、行則僵僂、不飲酒、雖雞魚蟹蛤
之屬、皆不入口、淳熙間、通判溫州、郡守韓子溫見
而憐之、為檢聖惠方、載腰痛一門、冷熱二忘、
使自擇、康祖曰、某年老久羸、安敢以為熱、始作寒
忘治療、取一方用鹿茸者服之、逾旬、痛減、更覺氣
宇和暢、遂一意專服、悉屏他藥、治月餘、腰屈復伸、
無復呼痛、心漏亦愈、以告醫者、皆莫能測其所以
然、後九年、康祖自鎮江通判滿秩造朝、訪子溫則
精力倍昔、飲啖無所忌、云漏愈之後日、勝一日、子
溫書吏吳弼亦苦是疾、照方服之、浹旬而愈、其方、

本治腰痛用鹿茸去毛、酥炙微黃、附子炮去皮脂
皆二兩、鹽花三分為末、棗肉丸三十丸酒下、引已

志名醫類案卷十列己志文妙譜

按聖惠方治五種腰痛輕身利脚膝方鹿茸二
兩去毛塗酥炙微黃附子二兩炮裂去皮臍鹽
花三分右件藥擣羅為末煮棗肉和圓如梧桐
子大每日空心以溫酒下三十圓晚食前再服

卷四十四

明程益十補醫按麻城令宋公諱一麟 南樂人乙卯上計
京師途遇不可意事憂愁成疾嘗留堅硬久之心
前途穿一孔日少出膿血體為之瘦醫不知何證

惟教貼膏藥兼服調養藥而已已未秋告病歸臨
行南樂魏相國命延予視診脉氣血俱虛教以附
子用大附子一箇炮去皮臍鹿茸一對酥炙青鹽
一兩共研末為丸茶豆大每日大半餓時滾水送
下二三十九公問何證何方予曰此名心漏證方
則前代名公所立也又問用此三味藥之理予曰
當心非可久出膿血之地故用附子鹿茸驟補反
助心邪惟性鹹之藥能軟堅而補腎故加青鹽軟
其堅以補其腎使腎水充盛心火不致獨熾夫人
有一病古人必有一病之方迺知少所見多所怪
不虛也卷五

排膿以長其肌
錢仲陽忌有鴻
而無補恐附耳
驟補

清孫偉良明彙集治心漏方、胸前有水孔常出血
水謂之心漏、又治腰痺、鹿茸去毛、酥炙欲黃色、附
子童便泡去皮食鹽炒、右三味各等分、為末、棗肉
為丸、每服豆大、每服三十九、空心黃酒送下。卷五

萬病同春、胷前有孔、常出血水者、謂心漏也。卷五

又鹿子丸、治胷前有孔、兼治腰痺、嫩鹿茸去毛、酥
炙微黃、大附子炮去皮臍、鹽花各等分、右為末、棗
肉為丸、每服三十九、空心好酒送下。同上

數脈可畏

原南陽曰、脈ノ虛脫シテ取ニク、様子モヲトロ
ヘ何カラ見テモ、大病ト知レテアル病人ハ、一向
ノ少指テエ夫モ入ラス、只可恐モノハ數脈ナリ、
急卒ノ病ニ至テ數ナラハ、油断ハナラス、小兒ハ
勿論ナリ、驚證ナトニナル、數脈ヨリ變ス、大人
トテモ、數ノ甚シキハ、急變ヲ生スルアリ、得ト
胃氣ヲ候ヒ、外候ヘモ參伍スベシ、新病舊病ノ差
別ナシ、去ナカラ、熱アレハ、イツニテモ數脈ハア
ラワスモノナレハ、ヨク精神ヲ用テ取り得ヘ
シ、サマテモナキ熱ヲ臆シテ、治レソコ子又心得

スベレ、又平日無病ノ人ニテ數脈ナルハ、勞瘵ノ
催ナルモノ多シ、醫事小言 卷一

保名醫類案、大凡病見數脈、多難治療、病久脉數尤
非所宜、卷三引汪石山案

因非所宜、卷三引汪石山案

東南學派人通解卷三引東中醫子モチモトロ
標榜古方

孕婦塗臍腹方

蘭軒先生曰、麻疹流行ノ時、姪婦多ク墮胎ス、一老
醫云ク、舊キ鉤ヲ布ニツ、ミ、臍下ニアツベレト、
因テ試ルニ、頗ル効アリ、蓋久シク土氣ヲ受タル
故カ、千金方卷ニ、竈中黃^土塗ル方アリ、參攷ス
ベレ、

千金方治姪娠遭時疫、令子不落方、取竈中黃土、
水和塗臍、乾復塗之、一方、酒和塗方五寸、又泔清
和塗之、並佳、卷二 活人書 卷十九塗臍法同
又治姪娠熱病方、井底泥泥心下三寸、立愈、
魏之琇曰、按孕婦熱病胎墮多死、宜先取井底泥

塗腹上、護住其胎、燥卽易之、再以藥治症、多獲兩全、名醫類案卷十一注

陳修園曰、婦人有胎、恐服藥有碍、灶中黃土研末、以水和、金於心下及臍下、乾則易之。時方妙用卷四

古今考略卷之三十一不老丹元本草中黃土

文平金大春ニシテ醫中黃土金粉太白火參散
因え清氣ノ威也、陰火也、益火也、土運火受也
通鑑卷之六百四十一
蘭草散主田禾寒疾、亦人相者數多也、蘭草散
卒驗茶飴頭也

古梔附湯

大橋尚因疝癥積聚編、古梔附湯、治寒疝入心腹卒痛、及小腸膀胱氣疔刺、脾腎氣攻、癰急極痛難忍、腹中冷重如石、自汗不止等方。梔子、附子等分、右水一盞、酒半盞、鹽二撮入煎服、節方也。

津田玄仙曰、コノ方ハ疝痛常ニカワリテ、苦痛ツヨク、イカヤウニモセンカタナキ時ニ用ヘ即効ナル方ナリ、方後ニ、即方也トアルハ、急痛ニ用テ、即効ナル方ナリト云フヲナリ、煎法、酒ト鹽トヲ入レザレハ、即効ナシ、療治茶談五篇

蘇沈良方、治小腸氣、倉卒散方、山梔子四十九枚、

切痛、梔子二兩、附子。

古梔附湯

一炮二兩、每服三錢、水
一大盞、薤白三十粒、同
煎至五分、溫服、酒
州有人病歲餘百日不
愈、卷三

燒半過、附子一枚炮、右每服二錢、酒一小盞、煎至十
分入鹽一捻、溫服、脾腎氣滯急極痛不可屈伸、腹
中冷重如石、痛不可忍、白汗如瀉、手足冰冷久不
差、臥欲死者、服此藥一劑、忽如失去、甚者兩服差、
予自得效亦屢以治人、皆驗、卷八

雞峯方、梔子湯、治肩痺切痛、梔子、附子、各壹兩、右
剉、每服三錢水一大盞、薤白三十粒、同煎至五分去
滓、溫服、不以時、卷十一

蘇沈良方卷三文畧同
異然无大異同因研不贅

又倉卒散治小腸氣

卷廿一 与蘇沈良方文小
異然无大異同因研不贅

水腫忌用巴豆甘遂桃花牽牛等

和田東郭曰、凡水腫ノ虛實ハ、他病ト異ニシテ、實
腫トイヘモ、脾胃ノ虛ヨリシテ、發スル者ナレハ
攻利ノ劇劑ヲ用テ、ナヨク脾胃ヲ損スルヲ勿レ、
唯病ニ於テ益無キノミニ非ス、人ヲ損ルヲ甚多
シ、深ク是ヲ慎ヘシ、是水腫ヲ療スルノ一大戒也
余聲ニ吠ヘ耳ニ食シテ、此說ヲ立ルニ非ス、往年
此病因ヲ深ク考ヘス、滿腫ノ症ニ遇ヘハ、必巴豆
甘遂桃花牽牛ノ類ヲ以テ瀉下ヲ逞ス、唯病者ヲ
苦惱セシムルノミニテ、効ヲ全スルヲ甚希シ、避
近ニ効ヲ得ルヲアリトイヘバ、多ハ遠カラサル
水腫忌用巴豆甘遂桃花牽牛等

内ニ再ヒ満腫ス、此時ニ至テ、再ヒ鴻下ノ劑ヲ投スレハ、其効始ノ如クナラス、漸ニニ異忘蜂起シテ、終ニ救ヘカラサルニ至ルモノアリ、導水

又曰、總シテ水腫ハ、小水ヨリ利セスレテ、大便ヨリ鴻下ヲ取ルハ、益ナキモノト知ヘバ、勉テ方忘ヲ能對配シ、小水ヨリ通シ去ルヘシ、然レハ實腫勢其盛ニシテ、ニ便閉塞シ、利水之劑ヲ投スレハ、消滴モ利セス、腹脹鼓ノ如久呼吸逼シ、苦悶シテ死セントスルモノニハ、甘遂末野薑薇實桃花ノ類ヲ投シテ、下ヲ取ヘシ、然レハシハクスヘカラス、快下利シテ病勢ユルマハ能ミ診候シテ、其

方忘ヲ對シ、平和ナル行氣利水ノ劑ニ轉スヘシ、是實ニ已コト得サルノ奇策ニシテ、常法ニ非ス、

同上

千金方、古方有十水丸、歷驗多利大便、而不利小便、所以不能述錄也、卷廿一

雞峯方、辨水證云々、此病不亞動大腸峻瀉醫者多用芫花大戟甘遂甘草澤瀉之類、故消取雖易、補閉即難、徃々致水復來而无以治之也、卷廿

水腫忌出血證

和田東郭曰、凡水腫吐血痰血下血アル者多ハ不治ノ症ト成リ易シ、然レバ十中一二救ヘキ者アリ、能ニ診候ヲ審ニスヘシ、コレ血痣ノ後ニ腫ヲ發スル者ヲ云ニ非ス、水腫中血痣ヲ兼レヲ云。

遵水瑣言

雞峯方、如牙縫内有血、雖水出亦死。

卷十九 地黃
十九ノ廿五十九

疫後精神如癡或如狂 附歸脾湯案

原南陽曰、桃仁承氣抵當湯、并丸、瘀血ヲ主トルノ正面トスレ凡、柴胡加大黃ニテ治スルノ多认畜血ノ證ハ、初ハ知レカ子ル、下血魚腸ノ如ク澤山下スノ有リ、胃氣ノ脉ト、腹候ニテ、吉兆ヲサトリム必死トスルトニ非ス、必ス補藥ニ泥ムヘカラス、其下盡ルト少ミツ、食モナル、脉ハ浮大洪數ナルモノ多シ、只心神如狂、或健忘ノ如シ、熟解レ、數日ヲ經テ、起色アレ凡、如癡ナルノ有火不苦、必慮ルニ不及、其ノ肥立ノ姿ニテ、安心シテ俟ツヘシ本復スルナリ、醫事小言卷ニ

又曰、一醫ノ外孫疫也、葛根湯ヲ與フ、數日ニテ譯語潮熱其忘具ル、故ニ大承氣ヲ投シ、熱退テ食モ相應ニナルニ、精神癡ノ如久、又狂ノ如久、狐ツキノ如レ、其醫ハ吉益流ニテ、三黃湯、黃連解毒ノ劑ヲ用ユルニ、晝夜不寐ニテ煩躁ス、予ニ乞フ、歸脾湯ヲニ貼投スルニ、其醫ノ顏色不服、仍テ譯無ク用ユベシト論シテ、翌日診スルニ、狂躁止テ本心也、醫曰歸脾湯如斯速ニ驗アルモノトハ夢ニモ知ラズト、又一門生疫ヲ治シテ、大抵ハ邪盡タレ、其人ウトクトシテ忘レタル様也、傷寒論ノ不了者、得屎而解スト云ヲ以テ承氣ヲ輕ク用ヒ、

大便ヲ利スルニ依然タリ、予ヲ延テ問フ、脉腹皆佳ニテ、肥立ハカリ也、是ニハ用ユル藥有リ、考ヒラレヨト云捨テ不構、又色ニスレ凡驗ナケレハ、更ニ教ヲ乞ス、予カ曰、歸脾湯也、是モ餘リ不面白ト云、顏色ニテ退キタレバ、畢竟手段ニ因ニル跡故ニ、其日歸脾湯ニスルトニ貼未盡、ソロく精神ハツキリトナリタルトテ、次日來テ其妙ヲ謝ス、同上

傷寒總病論、傷寒差後、有不了ミ證者、謂至十日或半月二十日、終不惺、常昏沈以失精神、言語差謬、或無寒熱、有似鬼祟、或朝夕潮熱、頰赤、或有

寒熱如瘡狀此乃發汗不盡餘毒氣在心包絡間所致也宜知母麻黃湯知母一兩半麻黃一兩芍藥黃芩甘草桂枝各半兩㕮咀水二升半煮麻黃數沸去上沫內諸藥取一升三合去滓每溫飲一大盞半日可相次三服溫覆令微汗若心煩欲水當稍與之令胃中和則愈未汗盡劑卷二

證治要訣有陽證下後熱退脉平而神思恍惚昏不知痛痒處不省人事如癥如瘡不可謂其為虛妄投補劑只一味參湯或不藥自愈卷二

溫疫論應下稽遲血竭氣耗內熱煩渴譫語諸下大證具而數下之湯熱並減下證悉去五六日後譫

語不止者不可以為實此邪氣去元神未復宜清燥養榮湯加辰砂一錢卷上

又清燥養榮湯知母天花粉當歸身白芍地黃汁陳皮甘草加燈心煎服表有餘熱宜柴胡養榮湯

其同上


又時疫下後氣血俱虛神思不清常向裏床睡似寐非寐似寤非寤呼之不應此正氣奪與其服藥不當莫如靜守虛回而神思自清語言漸朗若攻之脉必反數四肢漸厥此虛之禍危在旦夕凡見此證表裏無大熱者宜人參養榮湯補之能食者自然虛回而前證自除設不食者正氣愈奪虛

證轉加法當峻補同上

又疫邪已退、脉證俱平、但元氣未復、或因梳洗沐浴、或因多言妄動、遂至發熱、前證復起、惟脉不沈實為辨、此名勞復、益氣為火之舟楫、今則真氣方長、勞而復折、真氣既虧、火亦不前、如人欲濟舟楫已壞、其可渡乎、是火也、某經氣陷、則火墮陷於某經、陷於經絡、則為表熱、陷於臟腑、則為裏熱、虛甚熱甚、虛微熱微、治法輕則靜養可復、重則大補氣血、候真氣一回、血脉融和、表裏通暢、所陷之火、隨氣輸泄、自然熱退、而前證自除矣、若誤用承氣及寒涼剝削之劑、變證蜂起、卒至殞命、宜服安神

養血湯同卷下

又安神養血湯、茯神、東仁、當歸、遠志、桔梗、芍藥、地黃、陳皮、甘草、加圓眼肉、水煎服同補遺



Kitasato Memorial Medical Library