

X

i 41-1

F  
1-122

490.9

Ih-11

No. 2115

1R 141-1



1317

後學草全重校

延臺時醫院東井先

寬永戊辰孟春吉日

生類編醫方明鑑

命粹一字無訛

醫曹沫明鑑卷第一目錄

中風一附痛痺瘓瘻

傷寒二附中寒傷風癰瘻大頭病

中暑三

附蠅蟲瘻癰目

中濕四

瘧疾五

霍亂六

內傷七

泄瀉八

痢病九

氣十

痰飲十一

咳嗽十二附肺痿

附脚癱

喘急十三

醫門活明鑑卷之一

○中風 一附 痛痺 瘰癧

一、三賢風因

○傳河間曰：將息失宜，心火暴甚，腎水虛衰，不能制之，則陰虛陽實，熱氣怫鬱，心神皆冒，筋骨不用而卒倒，無所知也。夫五志過極，皆爲熱甚，俗云風者，言寒而忘其本也。

○東垣曰：中風者非外來風邪，乃本氣自病也。凡人年踰四旬，氣衰之際或因憂思忿怒，傷其氣者多有此証，壯歲之時無有也。若肥盛者，間而在之，亦是形盛氣衰故如此耳。

○丹溪曰：有氣虛有血虛，有痰盛西北二方，真爲風所中者，在之東南之人，皆是湿土生痰，生痰生風也。

一真風類風之辨

○惠有真中風邪者有類于中風者不可輕

治

○傳因風者真中風也從昔人而治之因少  
因氣因溫者類中風而非中風從三賢  
而治之

一真風經臟腑之辨

○禁面加五色有表證脈浮惡風寒拘急不  
仁中腑也加減小續命發表調以通聖  
卒涼之劑

○唇緩失音鼻塞眼翳耳聾便秘中臟也  
難治三化湯通其滯調以十全四物之

劑

○外無六經之見証內無便溺之阻隔肢  
不能舉口不能言中經也當從中治之  
大秦艽湯補血以養筋

一真風類風不可爲二途

○傳中風蓋因先傷內而後感於外之候也  
但有標本輕重之不同耳

○古人論中風者言其証三賢論中風者  
言其因真中風邪者未必不由氣輸虛

弱然後感於外邪經曰邪之所湊其氣  
必虛是也因火因氣因溫者亦未必絕  
無外邪侵侮而作也若無外邪侵侮則  
因火因氣因溫各自爲他証豈有喘僻  
癱瘓暴仆暴瘡之候乎豈可以一中風  
之證爲二途哉治法外感重先補外邪  
而後補中氣內傷重先補中氣而後補  
外邪或以散風藥爲君以補損藥爲臣  
使或以滋補劑爲君以散邪藥爲佐使  
一似中風之數証

○惠傷熱証卒暴僵仆者類中風

氣激痰碍心竅類中風宜吐後調理  
痰証諸癥諸癥皆類中風

尸厥瘡厥氣厥血厥酒厥各似中風  
者氣中者暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不已  
氣多厥逆便涎潮昏塞牙關緊急似中  
風灌蘿合香丸醒後隨寒熱虛實而  
調之中風脉浮身溫多痰氣中者脉沉  
身冷無汗

○酒濕之病作痺証口眼喰斜半身不遂  
舌強不正似中風當泻濕毒

○口眼喰斜半身不遂之病豈止風之一  
端而已况六氣皆能中人有縱急搐搦  
不知人等証不可不以脉証分別也

○口噤筋急或由風熱甚勝湿或因津液  
滯胸爲痰則筋大燥或筋反緩者乃燥  
之甚血液衰少也故經曰諸筋挛易愈

燥証微也筋痿難復燥証甚也

○林風病外感善行數變其病多變發表行  
滯痿証內傷起肺熱四肢不舉舌本強  
足痿不收痰涎有聲皆是虛証無寒可  
散無實可泻

○後世編集以外中風邪立名而與內傷  
痿証衆同出治此千古之弊也

○心理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此亡  
情也宜烏藥順氣八味順氣之類  
理血者無表裏之急証唯血弱舉發不  
時者用大秦艽羌活愈風之類

已上皆不可用風藥者也  
一緩急之治法

○丹溪曰大率主血虛有痰或挟火與湿  
治法以痰爲先補養次之  
傳初得之即當頑氣及日久則當活血

纂

○丹溪曰大率主血虛有痰或挟火與湿

治法以痰爲先補養次之

傳初得之即當頑氣及日久則當活血

初病暴仆昏悶，不省人事，或疾癇壅盛，人迎脉緊盛，或六脉俱浮大而實，急用吐法。舌強不語，兩寸脉浮大而實，急用吐法。續命表之看取，挾見証與時令寒溫，加減，施治病勢稍退，精神猶復，當改用補氣補血清痰之劑，調養其本氣而安此急則治其標，標而本之之治也。

凡人或手足漸覺不遂，或臂膊及髀股指節麻木不仁，或口眼喰斜，言語蹇澁，或胸膈迷悶，吐痰相續，或六脉弦滑，而虛軟無力，雖未致倒仆，爲中風量厥之候，早當從丹溪之法而調治。

左脉不足及左半身不遂，以四物補血之劑爲主治。右脉不足及右半身不遂，以四君補氣之劑爲主治。

瘧盛者，二丁陳導瘧等湯兼用。氣血兩虛，而挾瘧，八物加半星寶竹瀝姜汁之類。

若真元漸復，瘧飲漸消，或覺風邪未退者，仍以羌活愈風防風通聖之類，出入加減，調治而安，此緩則治其本，而標之之治也。

### 一卒風治法

○急中卒風氣絕，不語，至寶丹主之，連

進生姜汁。

### 二法治之

○瘧瘈盛者，口眼喰斜者，不能言者皆用。

吐法，瓜蒂散，稀涎散，口噤者灌入鼻內，虛甚者不可吐。

○王年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可吐一肥瘦之辨

○肥人中風口喰肢麻不分左右皆屬痰

用具姜守星陳木連

百芩云羌荊威薄桂

芎天花粉因痰者加附子竹瀝

姜汁入酒一匙行經降火

又曰肥自人多濕烏便煮浸入鑑下行尤捷

瘦人中風屬陰虛火熱四物加膝

芩柏有痰加治痰藥

○惠肥人中風者以其氣盛於外而歎于內也肺爲氣出入之道肥者氣必急痰涎壅盛取以急之必先理氣

一半身不遂左右之辨

○傳半身不遂大率多痰

在左屬死血少血宜四物桃仁紅花竹瀝姜汁

在右屬痰與氣虛宜二陳四君竹瀝姜汁

一辨治

○惠醒後小便少不可利之汗液外亡榮衛枯竭無以制火熱退汗止小便自行

○中風遺尿氣虛參芪補之

○飲食坐卧如常但失音小續命去附加菖

○中風証内外邪已盡當服愈風湯以導

諸經久服太風悉去縱有微邪加減用之然治病之法不可失其通塞或一氣

之微汗一旬之通利如此爲常治之法

一脉辨

○傳大法中風脈浮遲者吉急疾者凶

○林寸口脉浮而緊緩而遲皆曰中風脈經

曰浮而大者風

○被風不仁瘡疪其脈虛者生堅急疾者死也

### 一不治之証

○口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲鼾肺絕也

○林髮直吐沫搖頭上竊直視口開手撒眼合遺尿不知入或面赤如粧或頭面青黑汗繼如珠聲如鼾睡皆不可治

### 一灸治

○林風中益肺口眼喎斜聽會頰車地倉左

喎灸右右喎灸左

○風中解手足不遂百會肩顚曲池風市足三里絕骨四肢麻痛在左灸右在右

灸左

○風中臟性命危百會風池大椎肩井間使曲池足三里中臟氣塞逆上不語心

憒肢麻灸之各至半壯

○亢中風治法莫如發表攻裏調氣養血治痰若要取全功宜艾灸

○林允五藏中風各灸其本藏之俞百壯皆服續命湯救之治風之法大段宜灸九心中憒亂神思不怡或手足麻痺此將中臟之候不問風與氣可速灸

○中風眼戴不能上視者灸三推第五推上各五壯或七壯齊下火立愈

○失音不言灸天窓

○目劄口噤腹痛灸囊下第一橫爻十四

壯

○中風口噤灸承漿巨闕

一通關竅之劑

林擒鼻法

治卒中風不省人事牙關緊急藥不下咽者細洗去

去子各右爲細末以紙搘酒入鼻或等分用竹管轉吹入得嚏後進藥

用竹管轉吹入得嚏後進藥

通頂散

治中風中氣昏不知入急用

吹入鼻藜蘆甘生芎細參各末膏五右爲末吹入鼻中一字就

提頭頂髮立甦有嚏者可治

治大人小兒禁口風

皂角皮子蘿蔔如無用子研末用蘿蔔或

子同米醋研雞翎拂藥塗牙齦即更

皂角散蘿蔔子猪牙皂角各等

右爲細末每服二三錢水煎熱服半盞

即吐

鹿鳴香散

治卒中風瘡倒地癱瘓口

噙諸藥未服者服之

真鹿鳴香

稀涎散

治風涎不下喉中作聲如牽

鋸半夏大者十個生豬牙皂角一箇

右水煎入姜汁少許服不能嚥者徐徐灌之

獨聖散

治中風痰盛及諸癪痰飲壅

膈塞不通明礬一兩半生豬牙皂角

四夷去皮右爲末每服一二錢量人虛實

用之以酸辣汁調下以吐爲度凡行吐

法宜於天氣清朗之日行之晦日難得

症病暴急者不拘先令病者瀉宿不食  
如服藥不吐再用熱鹽水投之如吐風  
癇者加全蝎半分微炒如有虫者加猪油五  
七點雄黃末半分甚者加芫花末半錢立  
吐其虫

一導痰之劑

○三生飲 治卒中不知人口眼喎斜半  
身不遂瘓壅喉鳴及氣厥痰厥眩晕  
南木香一分 南星六分 川烏附子各  
各三 右煎服

○省風湯 治中風痰涎壅塞口眼喎斜  
半身不遂不知人半風甘各

白附 川烏生木 星生各 蝎箇一

右加姜

○貝母瓜蒌湯 治肥人中風口喎麻木  
左右俱作當 治 川烏泡 星泡

○荆風丸 柏芩 連术 陳去白  
半 薄桂 甘灸 磬 天花粉  
各等 右加姜煎至夜服

○秘方白丸子 治卒風半身不遂口眼  
喎斜痰壅盛端急咳嗽胸膈滿悶及  
小兒驚風婦人血風

○大半夏湯泡 七次 白附泡 星泡 川烏  
皮去 天蝎炮去 木 枳炒各

右爲細末姜汁糊丸如梧桐子大每服  
二三十丸臨卧茶清下熟水亦可小兒  
驚風生姜薄荷湯下

○全解毒雄黃丸 治中風牙關緊閉開口  
涎咽喉腫閉如牙關緊閉開口齒下七

齧 雄飛各二 巴去皮油  
右爲末醋者麯糊丸大每服七丸  
熟茶清下出頑涎立甦

一去風解表之劑

○小續命湯 治暴中風，不省人事，漸覺半身不遂，口眼喎斜，語言蹇澁，肢體麻

痺，神情昏亂，頭目眩暉，痰涎多。傳東垣上日，中風自汗者，不可重發其汗，故此藥亦不可輕用。

五仲景謂汗出則止，藥

已桂芩杏白芍甘芍

麻節參各一分 風二附炮七

右分三貼，每服水一盞，姜片一枚，枝去核，

煎分服。精神恍惚加茯神遠志，骨節煩疼有熱者，去附倍芍。

心煩多驚，加犀角。骨節疼痛倍加桂附。

加桂附，嘔逆腹脹，加半倍參。

○藏寒下利，去己，芩倍，附加木

○自汗，去麻杏加木，腳膝弱加膝

斛，身疼加丸，腰痛加桃仁，失音

無汗身涼倍附加姜，有汗無熱倍桂

附甘，肢節掣痛不仁加羌活。

○消風散 治諸風上攻，頭目昏眩，項背拘急，鼻塞聲重，耳鳴，皮膚癱瘓，婦人血風頭皮腫，荆穗，甘炒

羌，蟬蛻去砂霍，芩，風，荳炒

苓，參各二錢，陳皮，朴，姜制各半兩，右爲細

末，每服二錢，感風頭疼，鼻涕，用荆芥

湯茶清調下。遍身癰癧，溫酒下。

○八風散 治風氣上攻，頭目昏眩，肢體

拘急，瘙癮，瘻瘍，鼻塞，聲重，霍

芷，前各一錢，甘，參各二錢，風

各三，右爲末，每服二錢，薄可湯調下。

食後服音。大清亦可。

○羌活散 治風氣不調，頭目昏眩，痰涎。

壅滯遍身拘急，及風邪塞壅，頭痛項強。

鼻塞聲重，肢節煩疼，天陰風雨頑聾，不

安。音 前卷 麻白苓 芎 甘

炙芩 蔓枳 細風 膏研菊

去梗蕎，各一兩。右㕮咀，每服一兩，姜四片薄

苛三葉水二盞，煎至一盞，去滓溫服。

○清氣宣風散 治上焦風熱，膈痰目赤，

耳鳴。音 莢 卷 半生地 蚕炒

八仙 木白芍各一風 甘菊

枳 陳荆 升連 桔炒各蟬退，

炒 荸各六 甘三分 右分一點水二

盞，姜三片，枣一枚，食遠溫服。

○烏藥順氣散 治風氣攻注四肢，骨節

疼痛，遍身頑麻，久卒中，手足癱瘓，言語

蹇涉者，先宜服此藥，以鍼氣道，然後隨

証投風藥。音 麻節 陳去烏各二

蚕炒 蒿芷 甘炙桔 枳麸炒各

姜兩 炮半

右爲末，每服三錢水一盞，姜

三片，枣一枚，煎七分溫服。憎寒壯熱，

頭痛倦怠，加葱白三寸，身熱不能屈伸，溫酒調服，瘡痒抓之成瘡，用薄苛煎，常服。

○入參順氣散 治感風頭疼，鼻塞聲重，

及一切中風，服此藥，疏通氣道，然後進

風藥。音 參 姜各一 莢 甘桔

朴术 陳去麻節 芮各四 葛半 三兩

右每服三錢，姜三片，枣一枚，薄苛五葉，煎七分溫服。

○八味順氣散 中風先宜服此次進治

風藥 术 白芍 青白芷 陳白

烏 参各二 茯苓一 右

順風勻氣散 中風中氣半身不遂口眼喝糾先宜服此風全無煩 术四

瓜子各半 烏用二分 大全右分三貼水二盞

姜三片煎八分食遠溫服或風濕腰腿

疼痛亦宜服之

○勻氣散勻門 治心脾疼

术 半 甘 荸子各二 沈 参 陳

青 台烏 芷各一 天 木 巍 蕃

爪絡 一 右入姜

○防風天麻散 治麻痺走注肢節疼痛

風 天 莪 茉 川烏 白附荆

吸 甘 蕃各半滑二 右爲末熱酒

○去風養血之劑

○大秦艽湯 中風外無六經之形証內化瘀調服覺力運行微麻為度或牽

無便溺之阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言宜養血而筋

自榮此方主之 茅 甘 莩 吸

白芍 膏 獨 白芩各一 蕃 風

芩 生地 熟地各五細二分

半 右作一服水煎如遇天陰加生

姜三片○心下痞滿如枳實一錢

○卷活愈風湯 治腎肝虛筋骨弱語言蹇澀精神昏憊安心養神調理陰陽使

無偏勝治中風內外無邪服此以行中

道 卷 茯苓 風 蔓 莩 細

枳 熟地 参 麻 茜 甘菊 吸

知 茜 地骨 梗子 獨 芝 仲

茺 柴 守 西 已 各 分 三 白苓 芩

芍 各 四 分 半 膏 蒼 生地 各 六 枝 一 分

天 隆 雨 加 姜 三 片 右 作 一 服 空 心 一 服

嚙 下 二 参 丹 臨 卧 一 服 噙 下 四 白丹

○ 望 春 大 寒 之 後 加 柴 半 參 分 三 迎 而  
棄 少 阳 之 氣 ○ 望 夏 之 月 加 膏 参 知 三  
分 迎 而 弃 阳 明 之 氣 ○ 望 夏 之 月 加 巳  
木 苓 各 三 分 三 勝 脾 土 之 湿 ○ 初 秋 大 暑 之  
後 加 补 霽 各 三 桂 半 分 迎 而 弃 太 阳 之  
氣 ○ 望 冬 之 月 加 附 桂 各 一 分 三 勝 少  
陰 之 氣

○ 大 防 風 汤 去 風 順 氣 活 血 壯 助 又 治  
痢 後 脚 弱 緛 痛 不 能 行 名 曰 痘 風 或 两  
脚 腫 痛 足 腫 枯 腊 名 曰 鶴 腫 風 一 切 麻  
痺 痿 軟 風 溫 捣 虛 之 痘 服 乏 如 神

風 熟 地 白 浸 茜 白 芍 仲 伸 (姜)  
絲 斷 各 木 半 束 参 膜 浸 芡 各  
半 杖 附 (炮) 各 七 右 作 一 服 水 二 盞

姜 五 片 束 一 枝 煎 至 一 盞 空 心 温 服

○ 天 麻 丸 治 風 因 热 而 生 执 勝 則 動 以  
靜 勝 其 燥 是 養 益 也 此 藥 行 荘 獨 壯 筋  
骨 生 地 一 斤 姜 各 四 枚 十 仲 (姜)  
天 膜 (酒) 浸 三 草 蔥 姜 参 各 六 附 一  
炮 一 方 有 獨 活 五 右 細 末 煉 痿 丸

○ 繕 命 煮 散 治 風 氣 留 滯 心 中 痹 憞 四  
肢 無 力 口 耳 痛 動 或 時 搖 握 及 產 後 中  
風 自 汗 宜 服 之 風 獨 改 參

細 葛 芍 杖 井 熟 地 遠

荆 半 各 五 桂 七 片 右 每 服 一 兩 生 姜  
片 汗 不 止 加 蚝 一 子

○ 全 八 寶 回 春 汤 治 諸 虛 不 足 風 瘦 脉 絡

拘急癱瘓壅盛飲食不進

白芍五兩

卷三 术二兩 半一兩 生地

熟地

芩 桂 烏 姜 附炮參 麻謁

芩 已 莎 杏 風 蒿 敏 神

陳各一兩 沈川烏牛炮各半 生地

熟地

一去風清熱之劑

防風通聖散 治諸風潮搐手足瘓癰

小兒急慢驚風大便結閉邪熱甚腸

胃脣齶汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸

肌肉蠕動多勞 風 蒿 敏 芍 大

芒 韶 苛 麻分半膏 滾 桔

芩 术 荆各半 芍 滑各一兩 加姜

上清散 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛

不可忽 芍 韶 苛 芒各半 右爲細末

沒各一兩 腸半 苛 芒各半 右爲細末

每用一至鼻內擦

獨活散 消風化痰治頭目眩暉

細 風 藁 旋 蔓 芍 獨各一兩

膏 芈各半 右爲末每服二錢姜三

片水一大盞煎七分食後熱服

一攻裏通滯之劑

三化湯 中風外有六經之形證先以

加減小續命治之若內有便濶之阻隔

以此湯導之

朴 大 實 韶 蕤

各三 右分二服每貼水二盞煎八分

不半 去粗食前溫服微利則已

製慧濟方 治中風六七日大便秘結

煩劇轉增 升 柴 芩 赤芍

枳 檉 大半 生桃去皮尖 芍 麻仁去殼

將桃仁以下三味并生大黃一半研細

貯碗右將升麻已下五味并大黃剉水

煎數沸攬勻用冰冷服入

一鎮神之劑

○二參丹 治健忘，養精神，定志，和血，

丹參 熟地 天門各一  
兩半人參 丹砂

遠菖各五 神灸耳 麥門各一  
兩

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，每服五十  
丸空心以愈風湯下。

○四白丹 清肺氣，養魄中風昏冒，氣不  
清利者宜服之。  
芷一 檀 崑 獨

藿各一 不半 白芩 术 縮 参 風 芡

莎芎各半 知細各二 耕竹葉二  
兩半 雜別研

芍半 杏仁各半 煉蜜丸每兩作十九，臨卧嚼

十九分五七次嚼以愈風湯送下。

○琳至寶丹 治辛中急風不語，中惡氣絕，  
及心肺積熱，小兒諸癇，急驚心熱並皆

治之。  
生烏犀屑碎砂飛 雄飛

玳屑 球消 魏各一 磬 腦各一 牛黃半

安息一兩半爲末，以無灰酒，攪，置瓶，過

金箔一兩半入藥。銀箔各五

金箔一兩半爲衣。右將玳瑁爲細末，研勻，安息香膏，重湯煮凝成

後，入諸藥，中和成劑。丸如梧子大，人參  
湯化下二丸。

○牛黃清心丸 治諸風癇，不隨語言，  
蹇蹶，痰涎壅盛，心怔健忘，或發癲狂，  
羚羊風，木白芍，柴桔，杏各一  
兩半

犀角兩半 麝一兩雄各一參，麝炒，蒲黃  
炒各二 白芍，芎，柴桔，杏各一  
兩半

牛黃一兩半，大棗去皮，金箔  
一百片，爲衣。右除東杏金箔一角，末

及牛鹿射腦雄四味，爲末，入餘藥，和勻，煉  
及牛鹿射腦雄四味，爲末，入餘藥，和勻，煉

蜜同棗肉膏爲丸每兩作十九以金箔爲衣每服一丸食後溫水化下

○珍珠丸 治肝虛爲風邪所干卧則魂散而不守狀如驚悸 珍珠母研

白芍熟地各一參 酸棗仁柏子各一

犀角神沉龍齒各半右爲末煉蜜丸如梧子大辰砂爲衣每服四五十丸金銀薄荷湯食後吞下

○大辰砂丸 清頭目化痰涎及感冒風寒頭目昏眩皆治之 天芎甘草

各一風二細芍各半辰一兩

右七味爲細末煉蜜丸如彈子大硃砂

爲衣每服一丸細嚼食後姜湯下茶清亦可

### 一雜方

○林貝母瓜萎湯 治肥人中風口喚麻木

左右俱作疾治 贝萎星梔荆風羌柏芩連陳白术

半薄桂芩各分 蕎天花粉各等

右每服七錢水二盞姜三片煎八分夜服入

○資壽解語湯 治中風心脾舌強不語半身不遂附炮風酸天各四

分羚桂各二分甘草各一分

右分二貼每貼水二盞煎八分去粗入竹瀝二匙再沸服

○稀荳丸 治偏風口喚時吐涎沫語言蹇澁筋脉拘掣緩弱久服耳目聰明鬚髮烏筋力壯健 稀荳一味五月五日

六月六日採洗去土摘取葉九蒸九曝每次蒸用少酒蜜水酒泛蒸一飯久曝

乾如此九次爲末煉蜜丸如桐子大每

服「百丸空心溫酒或米飲送下」

雍淵遍身拘急及風邪壅塞頭痛天陰  
先覺不妄ルラルヲ恙耳麻勞

風前膏拳其矣且細枳

白芍 蔓去皮各一兩 硫砂一兩坐  
烏衣 右

末水糊丸如桐子大每服四十九粒姜湯送下

易簡

林治中

○又巴豆七枚去皮爛研噙。左塗右手心。  
噙右塗左手心。仍以燙水一盞安向口  
心，須臾便正洗去藥并頻抽制手中指用。  
草麻子亦可。

敷丁

○又桂心酒煮取汁，故布蘸搗，病止。正即止，左噙搗，右噙搗，左常用大効。

治風壅痰涎多，咽

炒荊穗各一  
甘草半兩共爲末食後臨卧

一方五月五日午時取蒼耳葉曝乾。又  
天酉戌、庚辰火根方寸ノアリ。三根枝、文ト

朱洪門壯水膠布丁七日三服竹節

服若身射有風處皆依粟肌出或如麻豆此風毒出也以針刺瀉去之黃汁出

乃止。五月五日，多取陰乾着大瓮中，稍  
以水潤之，待風氣小和，舉家服之，無不

取用之若服氣不除服寒服之并禁二  
魚腸痔一周半服其佳七月七日九月

九日採用之

○夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方謂之白虎歷節風丹溪曰大率因血虛受熱又曰溫痰濁血流注爲病太法

用蒼星芎芷飯酒芩在

上加羌枝桔歲在下加膝已通柏因

蕤者二陳加酒洗芩蒼因湿者用

二木佐以竹瀝姜汁及行氣之藥

○加味四物湯治白虎歷節風

本方加桃膝陳芩甘芷膽在上者加

羌枝歲在下者加膝已通柏氣虛

加麥芽板有痰加星半生姜血虛

倍白芍佐以桃紅

○一方治上中下痛風

連炒蕎米泔浸星各二麵炒芎各一

桃芷己各五歲酒炒枝橫行羌各三

膳五分酒紅五分右爲細末神曲糊丸如

梧子大每服一百丸空心服

○大羌活湯治風濕相搏肢節疼痛

羌升各一獨七芩歲己术

飯苓沵各五右作一服水一盞

半煎至一盞去粗空腹溫服

○四妙散治走注疼痛

歲酒浸焙鶴羊角灰三蒼耳子一不白

芥子炒右爲末每服一錢匕姜湯下

調下

○一方治飲酒濕痰痛風柏酒歲酒各五蒼米泔浸卷芩炙各一陳白芍各一右爲末每服一錢匕姜湯下

○肢節腫痛濕熱流注於肢節之間固春名之

桔梗各半升各三

羌獨芷蒼歲實片芩浸酒

桔葛各半升各三

麻節赤芍各一風荆

吳仙除病飲也

下焦加酒柏。婦人加酒紅。腫多加  
柏腹次更加沒一錢定痛丸妙。脉微  
數有瘀血用桃紅芎藭大丸。

○二妙散 治脚膝湿热成痛

柏酒浸培蒼米泔浸春秋二十宿冬三十  
乾二兩宿夏八十宿四兩

右爲細末沸湯入姜汁調服或爲丸姜  
塩湯送下氣實者加少酒佐之

○潛行散 柏一味酒浸曝乾爲末每服  
方寸匕四物湯調下治血虛陰火痛風  
多服效

○手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作痛  
也 半酒芩术星莎各一

貴苓各五分蒼一升歲三分甘三分

右爲

一服生姜片五水二盞煎至一盞食後服

○加味二陳湯 治臂痛

本方加酒芩 廿歲入姜水煎食後

溫服

○一方 治痛風神効赤芍青歲木

鱉魚各半紫威芎 風分半 芡分五

右酒煎服

○治婦人胸背股走痛 赤芍莎

柏各一枝蒼各半歲拌濕炒 芡

五分右

○治走注疼痛 歲蒼枝散

桃去皮尖炒各一升生桃箇甘二升芎一升

右加生姜五片水煎入童便竹瀝各半

盞再煎熱服

○舒筋湯 治臂痛不能舉是氣血凝滯  
經絡不行所致一名五瓣湯効如神

片子姜黃二分甘草卷各半海桐皮去外  
皮外

飯赤芍木各一右作一服生姜三  
片水一盞半煎至一盞去粗沉香磨水

少計入內溫服

○加味二妙丸 治兩足濕痺疼痛或從

足跗熱起

蒼四

柏酒浸

膝

飯尾洗

革

己 极一兩

酥各一兩

右爲末

酒者麵糊丸如梧子大每服一百丸空心姜塩湯下

○羌活湯 治白虎歷節風毒注骨髓疼

發不定

羌二分附炮尤

桂木

芎飯膝酒

桃去皮尖炒

骨碎補

風各一丱

右分六

二貼姜片

○加減地仙丹 治風冷邪濕留滯下焦

足膝拘急腫痛

地龍土炒去

靈脂石去

烏藥白膠香研

椒紅汁去歲

火

小豆炒黑豆皮

天仙藤川烏皮

炒去殼油去

五加蒼

炒木別去殼油

各等分右爲末

酒糊丸空心鹽酒湯下

○仙酒方 治諸風疾手足拘掣身不

遂膝花桔風羌晚輩

沙洗淨炒

各二兩枸升蒼二升

蒸炒牛蒡根皮去

大麻子炒半

牛蒡子半

右爲末糯米

酒二斗磁器內浸藥封口

七日開封勿

令面近瓶內恐藥氣犯眼日進三服每

一盞

○秘傳藥酒方 治男婦風濕相搏腰膝

痛及風濕脚氣

芷桔半

己各一朴

布袋貯用無灰酒三斗

壘蒸封口煮一

時久過三日後取酒飲盡粗晒乾爲末

酒糊丸如梧子大七八十九酒下

赤苓湯治痛癥四肢浮腫

赤苓

鳥各二

蒼四兩米泔水

仲炒研末酒

右剉

時久過三日後取酒飲盡粗晒乾爲末

酒糊丸如梧子大七八十九酒下

赤苓湯治痛癥四肢浮腫

赤苓

桑各二 方 風 桂 莩 麻各一

右入姜枣水煎溫服以姜粥投之汗泄

爲度着婢留注加飯芎

○五 防風湯 治血癰皮膚不仁 風 獨

飯 兮 赤芍 右入姜

杏 芎 各半兩 右入姜

全芎附散 治下癰痛自腿臂發作不定者

小芎 附 茵 术 柴 風 熟地

飯 桂 芎 右等分入姜東

續筋圓 治風濕流注四肢浮腫肌肉

麻痺 飯妙續 薡 莩各七乳

風 附 没各半兩 天一 右爲末煉蜜

丸溫酒末飲住下

○生料五積散 治寒濕麻痺 方見傷

○蠲癥湯 治風濕相搏手足冷痺腰腿

沉重身躰煩疼 茵蜜 風各二

羌 赤芍 姜黃 飯酒浸各

二兩 芎各半兩

右加姜

○烏藥順氣散 治整節走注骨節疼痛

加瓜 没 蘿木 方見右

○附子八物湯 治整節身痛不可忍

附炮姜炮芍 参 芎各桂 参各三

术四 右 一方去桂用乾地二兩

○三痹湯 治男婦血氣凝滯手足拘挛

風痺氣痺等 繼仲 風 桂

細參 参 芎 飯酒浸芎各半兩 生  
地 莩 獨各一膝酒浸芎各二 右每服

七錢姜五片枣一枚水二盞煎至八分

溫服

○煮苡仁湯 治手足流注疼痛麻痺不

仁雞屈伸 蒼 茵 飯 芎 麻桂

芎 各一兩蒼四 右每七錢半生姜七斤

- 煎食前服。自汗。<sup>止</sup>咸麻。<sup>苦</sup>热。<sup>甘</sup>桂。<sup>辛</sup>
- 通氣防風湯。肩背痛不可回顧及腰似折項似挾此太陽經氣鬱不行也此
- 湯治之。<sup>此方見中濕門</sup>名卷治勝溫湯十  
風 芎<sup>各一</sup> 藜<sup>各一</sup> 苓<sup>五</sup> 蔓<sup>三</sup> 差 獨<sup>各二</sup>  
重腰沉<sup>久</sup>經中有寒湿更加酒洗漢防已半錢附<sup>少許</sup>
- 如意遍聖散 治風濕走注疼  
豐 丁皮 麻 風 蒿 叉 芎 各一  
右咬咀炒黃每服七錢水二盞煎八分去粗入乳沒各少許再煎熱服出汗
- 如神救苦散 治風濕痺痛走注癱瘓  
蠶<sup>去頭穰蜜</sup>陳<sup>去白</sup>虎脰骨<sup>灸</sup>乳沒  
苡<sup>各半</sup> 右爲末每服三錢煎連粗熱服
- 十味剉散 治中風血弱臂痛  
叉 茜<sup>各一</sup> 白芍<sup>各三</sup> 附子<sup>二</sup> 蒿<sup>各一</sup> 風  
術<sup>各半</sup> 桂<sup>一</sup> 半 杏<sup>各半</sup> 地<sup>酒洗焙各半</sup>
- 右分二貼姜八片棗二枚食後臨卧服  
活絡湯 治風濕臂痛諸藥不効者  
术 叉 茜 獨 芎<sup>各二</sup> 蒿<sup>各半</sup>  
右分二貼姜三片
- 烏沉木香四物湯 治溫滯脾經肩臂  
手足疼<sup>久</sup> 莪 烏 蒿 叉 茜 獨  
地 菓<sup>各二</sup> 芎<sup>各一</sup> 木<sup>各一</sup> 右
- 加味二陳湯 治臂痛  
李方 加翹 風 蒿 呕刺 酒芩 薑  
亨活湯 治水飲留滯背痛 蒿 獨  
半 参 陳 枳<sup>各二</sup> 术 芎<sup>各一</sup> 木  
右加姜
- 羚羊角散 治筋痙肢節轉痛 羚

薄桂 附 獨各一兩半白芍 風芎

各一兩 右加姜

○五加皮浸酒方 治風濕相搏，腰腿疼。

痛四肢，急皮膚癩痒，添精補髓。

五加 兩木一兩右 吻咀生絹袋盛以好酒

一壘將藥袋入酒中用竹葉密封壘口，入滾鍋內煮一時取出後浸二十七日

開壘空心臨卧飲一二盞多服效。

### 一痿証，并麻木

○傳丹溪曰：內經謂諸痿起於肺熱，又謂治痿獨取陽明之經，蓋嗜慾無節則水失所養，火寡干畏而侮所勝，脾得木邪而熱，木性剛急，肺受熱則金失所養，木寒千畏而侮所勝，脾得木邪而侮，木熱則不能管一身，脾傷則四肢不能為用，而諸痿作矣。浮南則肺金清，而東風乘通治諸痿，何其謬哉。

○東垣治痿無一定之方，黃柏爲君，菟絲子等補藥爲佐，視所挾之証制其方。

○溫熱用健步丸加柏苓蒼之類。

○溫瘧用陳加二术芩柏竹鹽姜汁之類。

○血虛用四物加蒼柏，下補陰丸方見虛皆可治痿。

○虎潛丸 補腎丸損門

○虎督丸 柏酒半斤鹽知酒熟地各三

○氣虛元四君加蒼芩柏丸，柏蒼治痿之

要藥也。

。加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不能舉動 飄身 柏子 蒼朮一熟地各半連各半知分膝軟者不用右煎服又酒糊丸服亦可

。健步丸 治膝中無力屈伸不便提脚沉重行步艱難 羌 柴 滑炒芽各三炮各半桂各五風 沉各三苦參浸川烏三分已酒洗一兩右爲末麪糊丸如梧子大每服七十丸愈風湯下云荆芥湯下按荆芥湯又號愈風湯也

。大防風湯 治兩足痿弱或麻痺或兩膝虛肿名曰鶴膝風方見右

。祖傳經驗 治兩足痿弱軟痛或如火焙茶米泔浸一宿柏酒浸日乾各二兩各二極虎脰骨各半右爲末麪糊丸如梧子大每服七十丸姜塗湯下一方加炮附五分

。鹿角膠丸 治血氣虛弱兩足痿軟不能行動 鹿角膠一兩鹿角霜 熟地各分少白芍 兔絲 參 术 仲各半

。兩般身四虎脰骨各一兩右爲末別將鹿角膠用無灰酒二盞烊化丸如梧子大每服一百丸空心姜塗湯下除風溫恙活湯 治諸痿溫氣勝風証不退肢體麻木不已 羌一兩 蒼朮各一升分甘草獨柴各五分 术 仲各半

。陳 菓各三錢 猪茯苓各二連分右清燥湯 治溫熱成痿腰以下痿軟不能行 茜根一升分甘草獨柴各五分 术 仲各半

。五味竹白芩 参 升各三分 門 飖身生地 麵 猪 酒柏各二分 柴 芡各半

連分各一右慧無連有奉

○加味四苓丸 治腎肝虛筋骨痿弱

蕤蓉酒浸膝酒天瓜鹿茸去毛熟地

兔酒浸

別研五味酒浸各

右爲末煉蜜丸如

梧子大每服五十丸食前米飲下

○傳丹溪曰十指麻木胃中有溫痰死血

二陳加二木桃紅少加附

○人參益氣湯 治兩手指麻木四肢困倦熱傷元氣也

芪二分炙甘升各半

五味粒三十柴分生甘 參各一分白芍

分

右

○導氣湯 治兩腿麻木沉重

芪二分青升柴白梢枳各半

陳半分紅少許五味粒三十右

節不痛

參各三參

連各四白分五芪

不

用

參各三參

連各四白分五芪

甘升葛柄 蓼分六沵分柴分九

或加猪分右

○神效黃芪湯 治麻木不仁或兩目羞明

荳花睛痛

蔓分陳半參分炙甘

白芍各一芪二

右水煎去粗滓朴熱

服之如麻木不仁雖有熱不加黃柏只

加黃芪一通三。如麻木甚亦加芍藥

一通三。如有大熱証加酒柏三分

○祖傳經驗三妙丸 治濕熱下流兩脚

麻木或如火烙

柏因兩切片炒蒼米津

浸一二宿膝兩

右爲末麵糊丸如梧

子大每服五七十丸空心姜鹽湯下忌

魚腥蕎麥熱麪煎炒等物

卷之二十一 二十四

子大奇病之十次望其善記

脉外寒熱大微

財醫經細小

財醫經細小

財醫經細小

白苔者一

少陽過而入於三陰之經者亦有初不  
曾入於陽經而直傷於三陰之經而即  
病者因其末曾發熱是以一切爲寒證  
故多自霜降後至春分前發者是也爲  
其無頭疼無大熱脈沉遲而微故古方  
又出中寒一條實此證也

### 一 傷寒傷風之異

○以日傳變與傷寒無異但寒泣血故無  
汗惡寒風散氣故有汗惡風爲不同

### 一 傷寒感冒之異

○傳傷寒溫病熱病之外有四時感冒新受  
風寒之輕証而見頭痛身痛惡寒發熱  
等証非傳變傳經重病乏比

### 一 宗經之脉証

○一二日太陽脉浮惡風寒頭項強痛腰

脊髓

三四日少陽脉弦細口苦脅下堅滿伴  
來寒熱耳聾

各半

四五日太陰脉沉細腹滿咽乾

各半

五六日少陰脉沉欲寐而渴

各半

六七日厥陰脉緩氣上衝胸飢不食入  
吐蛔煩滿囊縮

各半

### 一 兩感

王掌

三日少陽厥陰耳聾囊縮而厥

内外兩感

府藏俱病表裏不能一治故

難治脉從陽可治從陰難治

傳經曰兩感於寒者死是內外兩感藏府

俱病欲表之則有裏欲下之則有表之  
裏既不能一治故死然方票有虛實所  
感有淺深虛而感之深者必死實而感  
之淺者猶或可治治之而不愈者有矣  
未有不治而復生者予嘗用此間有生  
者十得二三故立此方名解利兩感神  
方大恙沽湯方有養

### 一表證

脉浮緊表實無汗麻黃湯

○脉浮緩表虛自汗桂枝湯

○脉浮緩反無汗脉浮緊反煩躁各半

湯麻黃桂枝

合爲一劑

### 一半表半裏

○翁々發熱邪在外若小便黃非在外  
掌

○蒸々發熱邪在內若小便清非在內

○汗出微惡寒手足冷是表証此在半表  
半裏小柴胡湯

○不大便頭痛有熱是裏証小便清不在  
裏此表裏俱見也桂枝湯

○裏証已急或脉浮或頭痛表証仍有者  
用大柴胡謂之雙解

### 一裏証

○裏証者內熱是也宜以上之

○不惡寒反惡熱腋下汗出咽乾糞結潮  
熱腹滿喘或譫妄脉沉滑是裏証也

○小便少手足心并腋下不滋潤者不可  
致

### 一表裏寒熱

○發熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓

○脉沉遲，手足或微厥，下利清穀，此陰証，發熱表未解，四逆湯或通脈四逆湯。活人曰：表熱裏寒，先與陰旦湯。

芍

甘

二兩

姜

炮

芩

各三

桂枝

四兩

棗

十五

右剉

煎

寒

已

次

小柴胡

加桂

桂枝

四兩

棗

十五

右剉

煎

寒

已

次

小柴胡

加桂

桂枝

四兩

棗

○身寒反不欲近衣，熱在骨髓，寒在肌表，先用白虎加人參湯，熱除次各半湯。脉滑而厥，口燥舌乾，惡寒而踴時大煩，不欲厚衣，大柴胡。

## 一陽毒

○初受病時，邪毒深重，當汗失汗，當下失下，或吐下後，邪熱乘虛而入，或誤服熱藥，變爲陽毒，必發狂，登高歌棄衣走身面，錦斑，鼻燥舌卷，焦黑，脉洪大，五日可治，六七日不可治。

○若熱甚，時昏，口噤咬牙，藥不可下者，用

水清法，候牙寬，狂定，用藥。

## 一陰毒

○初受病時，寒邪深重，致陰氣獨盛，或汗吐下之後，變成陰毒，唇青，面黑，厥冷，身疼如被杖，腸中絞痛，或自利，咽不利，虛汗，嘔吐，脉沉微，三日可治，五日不可治，或真武湯，或啜桂附，或

雄鷄椒水煎，溫服，蓋覆取汗，或用葱尉法，溫臍下，漸醒，肢溫有汗，即瘥。

續

用

四逆

湯

之類，如尉而肢不溫，不可

治。

入

林

葱

尉

法

治

中寒氣虛，氣息欲絕，及傷

寒

蔥

厥

葱

一握

以

糲

如餅

去根葉

惟

病

白長

二寸許

以火煅

令通熱

以熱處

著

臍

上下

慰

一餅

壞

即易

手足

溫

百汗

更服

姜湯

一盞

良

○又法葱一握取白三寸捻成饼先用鹿角  
喬半分填膝內上放葱餅以火熨之連  
換二三餅稍醒灌姜汁如不醒灸關元

氣海二三十壯手足溫即醒者生手足  
不溫汗不出不省人事者死

○手足厥冷腹中絰痛昏青氣冷急於丹  
田究灸之或三五十壯或百壯視輕重  
手足煖爲度

○陰毒傷寒四肢逆冷宜熨之以吳茱萸  
一升酒和勻溫絰袋二雙蒸令極熱熨  
兩脚心候氣通暢勻暖即停熨累用極  
驗

### 一陰證

○怯弱人感寒溫發熱不食數日後不省  
人事言語妄神思昏迷而青齒黑爲  
必死之証脉沉細先用小柴胡等不愈  
思即回然後可用別藥謂之陰証之傷  
寒

○下後三五日後妄言不休此神不守舍  
慎勿復下膝多沉細足冷氣促而青黑  
口乾補中益氣湯倍參加竹葉

### 一陰證似陽之證似陰

○煩躁面赤微熱脉沉微此則陰證似陽  
以脉爲據不必守症

氣

○溫家之五証春月傷寒

名溫病十

○溫病冬傷於寒春必病溫脉浮數發熱  
頭痛亦惡寒輕於冬夏外麻湯解肌湯

。溫氣來行，變成溫疫，作天行，少長皆同。  
陽脈濡弱，陰脉弦緊者，熱溫寒清，煩時，  
宜以平爲期。

。溫毒、陽脉洪數，陰脉實大，更遇溫熱變  
爲溫毒，發班，生疹，咳嗽，心下痞悶。

### 玄參升麻湯

。風溫頭痛，身熱自汗，四肢不收，多眠，嘔  
息，陽脉浮滑，陰脉濡弱，黃茂防已湯  
切忌汗，方見中銀門。

。溫瘡，脉陰陽俱盛，重感寒者，變成溫瘡，  
小柴白虎之類。

### 一溫家之三證

。溫溫暑濕相搏成溫，溫胸間，多汗，頭如  
劈，脰冷，妄言，陽脉濡而弱，陰脉小而急，  
茯苓白朮湯，苓朮姜草枝。

。中溫，一身盡痛，發渴，太便快，尿涉，脉沉，  
則風濕俱去也。

### 一癥證 掌林

而緩 五苓散

。風濕肢躰痛重，難轉側，額上汗出，不欲  
去被，身腫，日晡劇甚，其脉浮，發汗微，不出，  
則風濕俱去也。

### 一癥 寶林

有汗不惡寒，柔痓，桂枝加葛根湯

無汗惡寒，剛痓，葛根湯

大陽發熱，無汗惡風，桂枝湯

陽明雖有下証，但惡寒表未解也。

### 麻黃湯

大陽發熱，有汗惡風，桂枝湯

陽明脉遲，汗多，微惡寒，表未解也。

桂枝湯

少陽頭痛發汗，惡寒，小柴胡

少陽發熱，微惡寒，柴胡桂枝湯

少陰惡寒，脉沉細，四逆，理中湯

汗後惡寒虛也，芍藥甘草附子湯

芍，甘各三附一枚右

小建中湯

吐下後不解，熱渴時々惡寒表裏俱熱

白虎湯

一潮熱林

少陽王於寅卯，大陽王於巳午於此時，  
發熱邪未入胃，非潮熱應於未申發者，  
謂之潮熱邪在胃。

惡寒，潮熱或溏，咳逆，小柴胡

脉浮，潮熱兼寒，小柴胡加桂

小柴胡加茯苓

汗後不惡寒，腹滿，喘，潮熱，大小承氣

脉實，潮熱，大承氣

下，後潮熱，大便復硬，大柴胡

汗下，後不解，日晡，潮熱，循衣擣床，喘急

直視，承氣湯，脉弦生瀉死

日晡，潮熱，脉虛，微汗，桂枝湯

汗後，煩熱而渴，夜砂五苓散

心煩，喜嘔，小柴胡

煩爲內不安，躁爲外不安，邪氣在裏者，得卧，施子豆豉湯

一煩躁林

在裏者因火故者陽虛者陰盛者煩躁者證之常也非逆也

結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不得卧者吐利煩躁四逆者自利煩躁不得卧者皆死

惡寒而踴時自煩欲去衣大柴胡煩躁消渴辰砂五苓散汗後煩躁不得眠欲飲水少與之此有燥屎小承氣

自汗心煩小便多芍藥甘草湯二味五六日不大便繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎小承氣

吐利厥冷煩躁欲死吳茱萸湯朱生姜各一參三分東箇右

薑盛而煩躁名陰躁四逆湯下利咳嘔煩躁不得卧猪苓湯

傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁久厥陰厥陰俞但是厥陰經穴故

自汗盜汗肢汗頭汗林發熱惡風自汗太陽中風桂枝湯自汗小便數芍藥甘草湯

自汗身熱不渴柴胡加桂多發汗久漏不止名漏風亡陽桂枝附子湯

陰証四肢厥冷自汗四肢逆湯陽明証汗多渴不太便調胃承氣

汗多不止术藁芩芷各一米粉半兩爲細末周身撲之見自汗門汗多亡陽煩躁惡風不得卧先與防風白术牡蛎湯三味等分爲末米飲調當特酒調極佳汗止後用小建中湯

肢汗太便難譖語四肢汗出熱聚於胃也可下

不食小便澀四肢汗出中寒也可溫不可下。

盜汗、瞞而汗出覺則方止非如雜病之虛邪在半表半裏也。

汗出而微惡寒共 小柴胡加桂，桂枝湯。

脉浮沉或盜汗共 黃芩湯 李子。

耳分等 東。

頭汗汗下後胸腹滿結小便不利得來寒熱心煩而頭汗出共 柴胡桂姜湯。

頭汗出惡寒共 小柴胡加桂。

汗不止者難治喘亦然心下滿頭汗出水結胸 小半夏茯苓湯。

一無汗林

脉浮而遲不能寐汗身必痒 桂麻各半湯。

陽明主有汗今反無汗身痒皮中又虛故也。

木附湯 黃芪建中湯桂枝湯加芪

一頭痛太陽証多頭項痛屬厥張頭角痛屬少陽額痛及鼻陽明。

無汗發熱惡寒頭痛共 痘黃湯。

六七日不大便頭痛有熱屎清不在裏仍在裏須汗痛甚者必衄共 葛根荳白湯，荆防散 川芎石膏湯方見頭痛

汗出發熱惡風頭痛共 桂枝湯。

輕者 柴胡桂枝湯。

半表半裏往來寒熱頭痛脉弦細各半湯。

發熱頭痛似癮爲欲愈共 各半湯。

厥陰少陽頭痛嘔吐共 避沫共 吳茱萸湯

方見前。

夏月頭痛身冷自汗中暑者溫也木附湯

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓散  
自汗頭痛風暑及雜病俱宜白虎或少  
加蔓荆芍藥或竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脉沉滑而長頭痛  
可下

熱不惡寒或不太便小便赤者胃实也  
調胃承氣湯

汗後不解頭痛不止 芍 茵 卒 烏

擗膏貼額上或用不卧散吹入鼻內

### 一胸腹滿

胸滿多帶表証腹滿多使半表半裏

半表半裏腹下痞鞕冲和湯去棗

加芍藥小柴胡湯

別名也

汗下後胸腹滿微結小便不利渴而不  
嘔但頭汗出或往來寒熱紫胡姜桂湯

下利身熱腹痛大柴胡

### 理中湯 枳 陳葷

心下滿而不痛 半夏泻心湯

嘔滿而發熱者 小柴胡

飲水多心下滿脹 牡蛎澤泻湯

### 一結胸

結胸有下之早而成者脉浮緊心下硬  
痛未可下之按之則痛爲小結胸不按

而痛爲大結胸

結胸証悉具而加之煩躁者不治

結胸有熱或煩渴先沖和枳實次下

本藥

飲水不散而結 小半夏茯苓湯或小  
柴去東加芩芍或五苓合枳木湯 枳

木湯 實半 木二 右

結胸喘促狂亂大躁用地龍水一服除

效。每服自然汗出愈。

邪熱在上，胸膈痞結，未辨虛實，先與理中，加枳實丸，或桔梗枳殼湯等分。

結胸手不可近，用陷胸藥不効。枳實理中丸。參、木、姜、炮甘各二兩。

實十六。右煉蜜丸溫酒或白湯下。渴者加搗姜。

汗後未全解，誤下之爲小結胸，煩渴，脉實宜。三黃湯心湯。大芩連各等分。表未全解，亦不可用。

熱實脈沉緊，心下痛，大陷胸湯。

寒實脈浮滑，心下按之痛無熱証。三物小陷胸湯。白散亦可。

項強如瘻，或從心下至臍上，手不可近。

大陷胸湯。

黃連二寸，赤芍末，巴豆七粒去殼研細，入黃連末，捻作餅子，挾臍中，以艾炷如指頭大灸之，輕者一炷，重者不過二三壯。熱氣入腹，依聲取下，惡物而愈。

慧心下飽悶，未經下者，非結胸，乃表邪傳至胸中，未灸處，小柴加枳殼，橘皮，杏仁，大黃各一錢，小陷胸方全，小陷胸加枳桔，即愈。

### 一 痘

痞心下滿而不硬，按之不痛，日落硬，水停，濡氣聚不滿不硬，但妨悶者，非痞，謂乏支飲。小柴胡加桂，胸滿而濡者。

半夏泻心湯。旋覆代赭湯。旋 芡

各一參六兩，一錢，生姜一兩半八兩，半兩，大黃十二枚，右，輕者，桔梗枳實湯。桔

半兩，各一實半兩，陳朴右或加芩草，又用茯苓白朮，并生姜湯。

胸滿硬，按之不痛，關脉沉緊，大柴胡痛，小便不利。五苓散。

一 腹脹滿

腹中滿痛 小柴胡 去芩 大柴胡

六七日不大便 腹滿痛急下之 小柴氣

大實痛者 桂枝大黃湯

譴妄脉沉數煩渴不拘 日數調胃承氣

太陽病反下之因而腹滿時痛 桂枝

考藥湯

小腹滿硬 小便自利 如狂者 血証也 小腹急結者 桃仁承氣

小腹硬尿不利 無血嘗利之

### 一 腹痛

按之不痛爲虛尺脉弦腸鳴泄利 小建中湯

桂枝加大黃湯

少陰腹痛或泄利 通脈四逆加芍藥湯

陽脉濇陰脉弦泄利 桂枝芍藥湯

厥脈証小腹痛 當取四逆湯 酒浸

桂枝 芍藥各三 甘草通草各二 蓉

子干姜湯

少陰腹痛而噦冷脉微不惡寒而亦

裏寒外熱 通脈四逆湯 加芍藥

關脉實便祕腹滿繞臍痛煩躁發作有時燥屎 大承氣

腹滿時痛 桂枝加大黃湯

在表之邪不於肺氣則咳嗽當發散而

愈

太陽發熱而咳 小青龍

表未解心下有水乾嘔發熱而咳 小

青龍

發熱嘔噦而咳六 小柴胡

少陽寒熱往來而咳 胸腹滿或泄利六

小柴二 去參 藿フ 加五味 姜フ  
少陰四肢厥逆腹痛或泄而咳六 四逆散二 加五味 姜フ

有寒而咳六 大半夏湯

春冬傷寒六 秋夏傷寒六 温之咳嗽喉嚨上氣六

橘皮湯方見咳門

少陰或咳或悸小便不利六 四逆散

少陰腹痛尿不利四肢重疼自利而咳六

真武二 加五味 細辛 干姜フ 正和

一喘急

邪氣外盛六 而喘雖汗喘不已雖經汗下亦可發之

麻黃杏子石膏湯 麻

二 杏五十膏二兩 苟六右

肺盛自汗喘六 大柴胡

太陽下之微喘者表未解也 桂枝加厚朴杏子湯

水停心下小便不利腹滿而喘六 小青

龍二 去麻フ 加苓フ

汗後飲水多咳嗽六 小青龍去麻加杏

陳毒喘促或陰証脉伏喘促理中四逆

腹滿而喘潮熱者外欲解六 大柴胡

汗後潮熱不惡寒腹滿大便實喘六

小承氣

桂枝証反下之利不止脉促喘汗出

葛根黃連黃芩湯 葛芩大茅根二

連三 右

直視譙語端滿者死汗出髮潤喘不休  
肺絕身汗如油喘不休命絕六

一嘔吐

嘔吐先嘔後渴爲欲解先渴後嘔水

停心下 赤茯苓湯

嘔發熱柴胡証具心下急鬱微煩

大柴胡 曾服滿更朝熱小柴胡加芒

吐逆二便不通厥逆無脉 大承氣

半表半裏証多嘔 小柴胡

胸熱腹痛嘔吐 黃連湯 連 苓

姜 枝各二參 半各一 藥一 筒 右

嘔吐手足冷 小橘皮湯 大柴胡

寒多而嘔 理中湯 不飲水而吐 苓

理中去木 加生姜

經汗下 閨脉逕胃虛冷而吐 苓 干姜黃

芩黃連人參湯 分

發汗後水藥不下及諸嘔吐 殀不下

小半夏湯

煩渴欲飲水水入即吐 苓 五參散

嘔而思水者急與 猪苓湯

治熱嘔不可無烏梅

一渴邪傳裏熱氣薰蒸焦膈

有虛熱少氣逆欲吐 竹葉石膏湯

瘥後餘熱在胃而嘔者 竹葉加生姜

汁湯 加桔

消渴氣上衝心中疼熱 桂苓白朮

甘草湯 桂三苓四术二草二右

汗下後胸腹滿微結尿淡渴不嘔頭汗

出往來寒熱心煩 柴胡桂枝干姜湯

汗多而渴 小柴去半夏加參 桔

脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯

利咳嘔煩渴不眠 猪苓湯 汗多者不用

汗後脉洪大而渴，陽明脉長有汗發熱而渴並。白虎湯

吐汗下後七八日不解，表裏俱熱惡風，大渴舌乾欲飲水，太陽服桂枝，大汗出，煩渴中暘四肢冷，汗出煩渴並。白虎加人參湯

○夏至前後煩渴發熱不惡寒，竹葉石膏湯

自利而渴，尿白下焦虛寒，甘草干姜湯

芋四兩 姜炮一兩 右 心煩欲眠，自利而渴，理中湯

汗後脉浮煩渴并 五苓散

小便不利而渴必發黃，茵陳五苓散

茵一兩 五苓半兩 右未米飲下

陽明脈長而实有汗而渴，調胃承氣

脉沉滑熱實煩躁而渴，大陷胸湯

陽毒發狂煩躁而大渴，潮熱咽痛

黑奴丸

○傳汗下之後煩渴飲水，涼膈散及咸桂，五苓，井露，益元，選而用之。

見荊門又名六十一散

一衄血

○傳傷寒衄久不止，施予黑爲末吹入鼻中，

脉浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者，是欲衄也

○發煩目眴劇者，必衄，乃解。

大陽脉浮緊發熱無汗衄者愈。

脉浮緊不發汗，因致衄者，麻黃湯

脉浮自汗而衄，桂枝湯

或涼膈散加生地，

六七日不大便頭痛熱衄，小承氣

衄而渴心煩飲水入即吐先五苓散

次 竹葉湯

當汗而失之熱，溫爲衄及吐血。星角

地黃湯

黃芩芍藥湯

黃芩

芍

芎 各半

少陰病，但厥而無汗，強發之必動血，或從口鼻出血，或從目中出，名曰厥上竭，難治。

姜附湯治本。

衄者，頭汗出身無汗，不出不至足者死。汗後熱退，衄不止，新水溫紙貼於鼻上，及頂項數易之。

傷寒七八日不解，角胸上至頭面，色黑，紫壅腫，寸脉浮大而數，是欲衄而不能，出刺鼻中，出血數外而安，或兩尺次穴，出血如射，即安。

### 一譴語

譴語身微熱，脈浮大者生，逆冷，脉沉細者死。

直視譴語，喘滿者死，下利者死，謂正氣脫絕也。

汗多亡陽，反身知譴語，此津液不知也，不可下，柴胡桂枝湯。

傷寒發熱，經水適來，晝明了暮，譴言熱入血室。 小柴胡

發熱四五日，大便祕，小便赤，譴言熱厥急用。 大柴胡

陽虛陰盛而譴言，脉沉細弱者，當溫經助陽。

譴言不惡寒，反惡熱。 白虎

煩，不眠，譴言。 白虎加梔子

腹滿，重面垢，譴言，遺尿，脉滑实，不可下。 白虎湯

喘滿，口乾咽爛，或不大便，久則譴語，是

被火劫所致

白虎湯

下之緩熱病久神不清狂言脈虛而長微弦滑大承氣柴胡飲

汗出譫言爲風下之下利譫言有燥屎

小承氣

潮熱反不食有燥屎太熱入胃水竭煩躁必譫言又身熱汗出大便硬譫言冒實並調胃承氣

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫言身重柴胡加龍骨牡蠣湯飲鎮

神氣

一發狂

發狂邪熱至極也新汲水濕布搭於肩

上頻易之

熱病六七日未得汗脉洪數面赤目脹

煩躁狂走大渴大柴胡

已承氣湯

血上逆則喜忘下畜則內爭其人如狂

犀角地黃湯重抵當湯

喜忘如狂身黃大便黑血証也抵當湯

膏滿唇瘻舌青口燥漱水不欲嚥無然

有瘀血必發狂下血犀角地黃湯加

傳汗吐下後熱甚脉洪數喘急身黃無走

三黃石膏湯速進三四服而愈

畜血者如狂熱在下焦小腹硬小便自

利抵當湯下血脉弦而長調胃承氣沉

實有表証大紫胡小腹急結桃仁承氣

陽臺狂躁發斑桔梗大黃湯桔

施參柴各一大半芩一本右

升麻梔子湯升一兩柴三兩梔子半生地汁半右

吐下後及虛人未解發狂人參白虎散  
砂之類清浮火或寒水石黃連末水謂  
下又龍膽草一物湯治陽狂

太劫者周身用火迫知出汗其人亡陽  
煩躁驚狂桂枝甘草龍骨牡蠣湯  
狂言直視爲腎絕汗出後熱狂言不食  
爲失志皆死

一發黃

發黃寸口近掌無脈氣冷不治取繁  
黃如烟薰直視搖頭心絕環口齧黑

研發黃脾絕

發熱身痛身自俱黃太陽中濕腐黃

連翹赤豆湯

麻根甘草各一  
小豆半升杏仁十二枚

生姜一

兩生梓白皮

半右

發黃脉浮緊不可下各半湯

往來寒熱身痛發黃小柴胡加旋子湯  
脉浮弦咳嗽短氣腹滿心脹痛氣既無  
汗身目黃小便難潮熱少陽中風也小

柴胡

身黃茵陳湯

身黃脉沉結小腹硬尿利狂畜血在

焦桃仁承氣

發熱頭汗渴飲水小便利大便快五苓  
加茵陳

小便不利四肢沉重似瘧不欲飲茵陳  
五苓得湯小便利如良藥汎則黃從小  
便出也

食後發黃用枳术內消也

林掌一癥赤斑五死一生黑斑十死一生  
有下泛太早熱氣來虛入曾故發斑有

下之太運熱留於胃中亦發斑有陽証  
熱藥多用胃熱焦爛發癉陽毒發斑紫  
黑熱毒陷於內也不治

陽毒已深舌卷焦黑鼻燥狂言面赤斑  
如錦陽毒升麻湯五服可治六七日不

可治

陽毒生斑涼膈散加葛根

赤斑熱証具咽痛玄參升麻湯

溫毒嘔者葛根橘皮湯葛橘

杏仁麻苡各一右

吐水眼赤口瘡下部生瘡喉而下利

黃連橘皮湯連陳杏實麻

葛根半朴苡各一右

冬溫受不正之氣至春發斑爛瘍疹謂

之溫毒化毒丹

溫毒身無大熱煩渴太便實或腹滿痛

見用參生地各五炮附子大黃各一右

自利至甚厥不止者死

下利日十餘行脉反實者死

直視譖言下利者死

下利手足厥冷無脉者灸之不溫脉不  
還者死

下利身熱股滿乾嘔寒熱往來脉長

大承氣

發熱後重泄色黃赤此爲有熱脉遲而  
滑內實數而滑宿食小承氣

自利清水，心下痛口燥，宜下

自利而渴，白虎湯或黃連阿膠散

自利不渴，理中丸

咳而嘔渴，下利心煩，不眠，猪苓湯

腸垢熱也，協熱而利，必膾下熱黃芩湯

李芍 芡各等

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

枳

仁丸

枳實丸

半兩

大柴胡

厚朴湯

木五

陳

芍三

傷寒七八日身黃、尿不利腹滿、茵陳湯

頭汗出、屎不利渴、飲水發黃、茵陳湯

傷寒八九日下乏、脅滿煩驚、小便不利。

譖言身重不轉側、柴胡龍骨牡蠣湯

柴二升 生姜 鈆丹 参 枝苓  
各三 大木棗半合 龍骨 蜈蚣各二右

一 四逆

附掌百

諸四逆不可下

吐利煩躁、四逆者死、吳茱萸湯主之方覽

發熱七八日身冷名藏厥難治、惡寒踴

卧厥逆、陰氣極不治

得病後四肢逆冷、脈沉細足寧、卧惡寒、不欲水下利清穀、陰厥也

四逆湯

手足指頭微冷 理中湯

無熱証而厥當加四逆加吳茱萸生姜湯

湯虛者宜附子湯

陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆、脉微欲絕、身反不惡寒面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止、脉不出者此陰盛於

內不相通也與通脈因逆湯

寒熱而厥面色丕沵冒昧兩手忽無脉

或一手無脉必是右正汗也與各半湯

厥而心下悸先治其水、茯苓甘草湯

苓枝各二半 芎各一生姜半右

初身熱頭痛已後大便祕小便赤或畏

熱或飲水煩躁不眠譖昏而厥陽厥也

大柴胡 歸而渴白虎

脉沉滑頭面有汗爪溫二便秘赤四肢

逆冷熱深也 柴氣湯

傳裡熱內盛陽厥極深皆因失下以致身冷脉微昏將死切不得以寒藥下之誤下即死又爲陰厥與溫藥必死但進涼

臍解毒，養陰退陽，如未愈解毒合承氣，少下少之次解毒涼膈天水合而爲。

二用之

舌胎

舌胎傷寒三四日後舌上有膜白滑如脂甚者或淡或黃或黑皆熱氣之淺深也表邪無舌胎邪氣傳裏津液結搏則舌胎仲景曰舌上白胎不可攻與小柴胡，

胡，

服下鞭蒲不大便而嘔舌胎小柴胡熱聚於胃則舌黃熱深也未下者下之，

黑滑亦下之經日熱病口乾舌黑者死

一咳逆林掌

冒有寒又飲水而咳嗽先與理中湯次

用旋覆代赭湯，

旋

其

各一

參

半

硝

半

生

姜

半

右

各一木一千生姜右

脉浮洪或有熱而咳嗽者火熱齊急上行肺不得納故也

甘草泻心湯

甘草

右

少陰因失下所致大便硬大承氣大便軟浮心胸散者死

桑白皮疏黃乳香等分末酒煎急令飲

五，

灸期門婦人屬乳頭向下盡處背間丈夫及乳小者以一指爲率

頭汗譯語腹滿微喘而見咳嗽此危証

一悸動

悸動有氣虛有停水有汗多榮虛神弱

汗後臍下悸，欲爲奔豚。茯苓桂耳大

棗湯 茯苓一枝一兩 一不半兩 茯苓半兩裏放 右

發汗過多，心下悸，欲按。<sup>桂枝加桂耳大</sup> 桂枝芍藥湯

桂枝二不 茵草一右

發少陽汗，則譖語而動悸。小柴胡

飲水多，歟而心悸。雖有他邪先治水，茯

苓茵草湯 茯苓枝各二不 茵草一生姜三

往來多，心悸，尿澁，煩嘔。<sup>小柴胡</sup>

脉代結，心悸。<sup>多</sup> 茵草湯 四逆散加桂，

### 一戰標

戰慄并振証戰外標標，心戰爲病，欲解。

也正與邪爭，則爲皺標，而戰振，但虛而不至，爭故止，聳動而振也。與桂苓白木

甘草湯，溫經。<sup>或</sup> 桂三苓四 茯苓木甘各二右

汗下後戰與，救逆湯，

發汗後不解，仍發熱，悸，肢瞶，振真武湯 吐下後裏虛，氣上逆，陽不足，起則肢瞶，

沉緊，發汗則動經，振搖桂苓木甘草湯或小建中湯

卒口噤，背及張，頭，痙病也。風主動，故也。形狀如烟，直視，搖頭，心絕。

### 一身痛

太陽無汗，脈浮，身痛拘急。<sup>或</sup> 麻黃湯

中溫身痛，難轉側，尿不利。五苓散尿利者，术附湯

陰毒，躬勢沉篤，身痛如被杖，嘔利，唇青，面黑，陰毒。<sup>或</sup> 茵草四逆湯 真武湯

汗後脉沉，身痛，血不足。<sup>或</sup> 桂枝加芍藥半夏生姜湯傳。桂枝加參，治汗後身痛。

脉沉者，<sup>或</sup> 茵草，<sup>或</sup> 茵草四逆湯，治汗後身痛。

一咽痛，不可汗，不可下。

廿二

四十一

少陰腹痛猶有熱ニテ咽痛黃連龍骨湯

連兩夾  
芍分一  
龍兩半  
右

**勝氣主無汗及有汗而六陽當咽痛**

陽虛脾浮數而大嘔膿血，烏扇膏

咽痛下利四肢冷無熱証理中湯加甘草

非時，暴寒伏於少陰之經，脉微弱而咽

痛次必下利，腎傷寒也。先半夏桂甘湯

蛔厥

烟歛元有蛇爲藏寒蛇上入脯時煩得  
食而區日土尤或用發汗之藥合文三

而呻自呴或因汗留中冷故是

聞食氣而上以理中丸烏梅丸方見溫

胃消渴吐蛔理中加大黄入蜜以利之

四兩  
熟地黃一錢  
桑葉一錢  
當歸一錢  
白芍一錢  
甘草一錢  
加干姜炒烏梅二錢  
服定後

以小柴胡退熱

汗後不解

子湯

汗後仍發熱心下慄動振々 真武湯  
汗後身痛脉沉桂枝加芍藥入參翁

加湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利惡

寒  
四逆湯

桂枝去芍藥  
姜棗煎服

汗後腹脹滿 厚朴生姜人參湯

## 柴胡湯

服桂枝後煩渴不解脉洪大白虎加人參湯

汗後不惡寒但惡熱及蒸蒸發熱者調胃氣

傳發汗之後熱不解脉倘浮者白虎加葛一下後不解林

大下後身熱不去心中結痛而煩施子豉湯

下後腹滿卧起不安施子厚桂湯有燥屎者大承氣湯

下後脉促膚滿桂枝去芍藥湯桂枝証誤下之利不止脉促者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯

過經十餘日二三下之煩不止心煩

大柴胡湯

傳汗下後熱未能除用施子豆鼓湯或東垣加減涼膈散

一勞復林

病後忌酒肉菓難消之物又勿過飽更結熱難救謂之食復

瘥後未滿百日氣力未平復而犯房室者死謂之女勞復

勞復生熱脈浮以汗解之枳殼施子湯瘥後渴竹葉石膏湯

勞復發熱欲絕麥門冬湯門冬等分  
梗葉竹葉

食復脉沉實腹滿譴語枳實大黃湯

大柴胡湯

一陰陽易林掌

男病新瘥婦與之交日陽易婦病新瘥

男與女交，日陰易婦，則裏急腰脇連腹痛。男則陰腫小腹絞痛。

男女俱或熱上衝，頭重不舉眼生花，離經脈見者死。一呼一至，損脉離經，一呼三至，至脉離經二脉易病，有之用燒褪散竹皮湯，小便不利五苓散。

### 一狐惑之証

齒燥惡飲食，面目赤，舌白，舌上白苔黑，有瘡四肢重，喜眠，虫食喉，爲惑食下部，聲啞爲狐，甚者食藏而死。上唇瘡重食其藏，下唇瘡重食其肝，以雄黃銑散膏，納穀道中。

唇瘡聲啞，桃仁湯或黃連犀角湯

連犀半兩烏梅七枚水十分右掌

一藏結其狀如結胸，飲食如故，時乍下利，舌上白胎，臍痛引陰筋不寒熱。一云寒

### 一不治脉証

林

陽病見陰脉者死。代脉者死。讐言身熱，脉洪大，身冷，脉沉細死。發斑陰脉死。

傳咳逆上氣，脉散耳聾，脉浮濶難瘥。

下利脉反實逆

吐衄血脈浮大，凸下不至，陽氣絕，上

不至，關陰氣絕。

少陰厥逆，無脉服藥通脉，脉漸續，生脉暴出死。

脉不治

脉陰陽俱虛，熱不止，脉乍疎乍數，百死。伏脉必是有正汗脈，麻黃甘草附子湯，多衣無汗者，脉不至者死。

循衣摸床，然內結脉弦者，生瀉者死。

赤斑出，五死一。生黑斑出，十死一生。

發動氣汗者死。

陳毒陽毒過六七日，兩感傷寒者死。

者不治。

大發溫家汗，則爲痓熱而痓者死。

結腎証見煩躁者死。

發少陰汗，則動血九竅出血者死。謂之

下厥上竭。

發少陽汗，則譴言汗只在頭面，不至遍身，衄血逆。

發濕溫汗，身青面變，耳聾，不語，不治。發風溫汗者死。亦主譴言咳逆不止者死。

藏結者死。發厥至七八日，膚冷而躁無時轉安者，名藏厥死。

厥張舌卷囊縮者死。少陰吐利煩躁，四逆者死。

爪甲青陽衰敗也。

口乾舌黑，不治。汗出如貫珠，絕汗也。喘不休，衛氣敗也。發賈變黑，不治。

發汗不至足者死。

汗後嘔吐，水滯不入逆。

腹大滿，下泄不治。

目張，呂陷，不治。舌本爛，熱不止逆。

發斑自利，不治。陰陽易病，頭重，眼花，四肢拘急，小腹絞，

痛手足癱者死。

厥而下利，當不能食，又能食者不治。諸逆發汗，劇者言亂，目眩，不治。

張口出氣，乾嘔，唇瘡，熱痛逆。譴言直視或喘滿，或下利並不治。

下利，發熱，或汗不止，或厥不正，並不治。汗後不爲汗裏發汗，而不得汗，發熱，脉

躁疾狂言不能食者謂之三死

搖頭直視如煙薰心絕

唇吻及青四肢多汗肝絕

爻目直視狂言遺尿腎絕

環口齶黑尿汗發黃脾絕

水漿不入形神不仁命門絕

絕及三因藏則死

### 一禁戒掌林

服藥中病即停後服

瘥後百日犯房者死

瘥後少食糜粥常令稍飢勿飽

若食諸肉肥血油膩等物必大渴難治

又莫勞神不可多言不可使意皆勞復

取汗祖脉微弱遲抽動氣瘡淋亡血虛

煩必不薦用之夏時用桂麻宜北京則

其性熱故有癥瘕之患也

食燒肉消渴

食魚鯉發黃

食濕麪潮熱

食黃芩必無病

食茄子成瘡

食生菜顏色不復

食葵菜失明

飲酒太早狂闌飲白酒浮腫

汗後飲冷水損心包

早澀頭潮熱

早澀定必癆

早洗浴熱閼

躁怒成瘡

思慮重則氣消

遠行脚風

### 一發表解肌之劑

鳴

麻黃湯 治太陽脉浮頭身痛惡寒發

熱無汗而喘 麻去根節枝一升芽六分

本二十筒 右先煎麻黃二沸掠去上沫下

餘藥煎去粗溫服覆取汗冬及春初宜

角蓋性熱夏至後服發斑黃狂悶

○桂枝湯 治太陽中風發熱自汗鼻鳴

乾呕

枝半 芎一 杏半 芍一 杏半 右加生

姜三

附大棗二枚煎冬及春初宜用夏至前加杏一錢夏至後加知半膏一

○葛根湯 治太陽陽明合病無汗惡風

身熱痛

葛半 麻半 杏半 右加生

芍各半

右加姜棗

○小青龍湯 治表未解心下有水氣嘔

咳發熱

麻 苓 半味 半各二細

姜 苓

枝半右渴去半加桔梗一

汗後飲水多

咳喘去麻加杏口一枚咳嗽心

下有水氣而小便不利去麻加苓一錢

大青龍湯 治傷寒見風或傷風見寒

脉弱汗出勿服

麻五 枝 苓一 杏各

半杏七

膏半 右加姜棗

○如聖飲 治剛柔一症搖頭口噤身反

張搐搦面赤項強

羌 風 芍 正

柴 苓 苓

白 烏 半 苓右加

姜前八竹瀝

姜汁口噤咬牙太便實者

加大黃

無汗剛症加麻葛。有汗栗

瘡加枝木

○六神通解散 治發熱頭痛發渴身疼

脉洪無汗

麻二 苓三 薰 清

參各四

芩八右入姜葱，

一和解之劑

○小柴胡湯 治傷寒四五日往來寒熱

膏滿腸痛心煩喜嘔風濕身熱邪在少

陽經 柴二 杏 苓 參各一 苓半

半分

右加姜棗

○大柴胡湯 治傷寒內實大便難不惠

寒及惡熱者

柴四 参 芎各二半

半分

右加姜棗

大各二 實一 杏右加姜蜜以利爲度

柴胡姜桂湯 柴兩枝 茴各三 拙兩

姜炮芍 蚝半兩 右

。半夏淳心湯 半一兩 杏 參 茴各

姜炮各連兩 右加姜蜜

。小半夏茯苓湯 半五兩 白參三右煎

去滓入生姜自然汁熱服

。小陷胸湯 治下之太早更爲結胸

中作漏滿

連二分半六分姜連半右以水二盞

先蒸去姜去粗納諸藥再熬

。黃連湯 治傷寒胃中有熱胃中有熱

氣腹痛欲嘔吐者

連 芍多姜

枝各一參 半各一大棗二枚 右

全柴胡飲子 治內實便難不惡寒及惡

熱 柴參 杏甘 大吸 半

右等分加姜

。防風當歸飲子 治身熱便祕不惡寒

而煩渴

細各三知 莖生地各一右

惠冲和靈寶飲 治兩感頭疼惡寒發熱

口瘶舌乾 風卷芩 茵細

生地 莖 柴 葛芷 膏陶加黑豆一撮

脉弦數 小柴胡加芍陳入姜蜜煎入

右入姜蜜取微汗爲度如未愈視表裏

証多少用汗下

。柴胡雙解飲 治寒熱嘔而口苦耳聾

生艾汁溫服。嘔者入姜汁竹茹。脣

痛加青皮。尿不利加芩。癥多加萎

卷之二

日月一

五十四

○桂枝麻黃各半湯 桂五芍一 芒一 麻

去根節

各三冬杏二十十四箇

去皮尖炒生姜太棗

○柴胡桂枝湯 柴三冬枝

芩一兩

參

芍各半半四冬芩三

姜棗

### 一攻裏之劑

○得小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿

悶汗後不惡寒潮熱狂言而喘者

大不朴 實各三半右煎服以利爲度

○大承氣湯 治胃實譖語五六日不

大便腹滿煩渴舌乾口燥日晡發熱脉沉

實者 大七冬朴 實各一芒半

內合

右先煎枳朴去粗內大黃再煎去粗納

芒硝更煎十二沸服以利爲度

○調胃承氣湯 治大使秘結譖語而嘔

日晡潮熱者 大六冬芩三芒一

度

右前法同前

○大陷胸湯 治太結胸高起手不可捫

大紅芒二冬芩遜一分二厘

右先煮大黃去粗納

芒硝一上沸納遂未服以利爲

度

○袖涼脯散 治表未解半入裏下証未全

懊憆不眠煩渴口舌生瘡譖妄便溺閉

結發斑黑陷

翹一施大苦

芩各五芍半

朴硝二冬右

芩一兩

水調下

○桔梗大黃湯 大一兩柴芩施桔

芩各一

大三冬右爲細末煉蜜丸新汲

水調下

○桔梗大黃湯 大一兩柴芩施桔

芩各一兩

大三冬右爲細末煉蜜丸新汲

水調下

各二 芎二 右以遍浮爲度

兩 一清熱生津之劑

各二 芎二 右以遍浮爲度

傳白虎湯治陽明証汗後脉洪大而渴

及虛煩中暎等証 知六 芎二 膏一兩

粳五 右水煎持米熟去粗溫服。口

燥煩渴不止或發赤斑加參各名化斑

湯又名入參白虎湯。陽明下後大便不固熱不退者或溫溫便溏熱不退者

加蒼朮六

竹葉石膏湯去石膏名竹葉湯

膏二兩八門半兩參一兩 芎各三不四

半竹葉兩右每服五錢內粳米三十粒

煎服

傳三黃石膏湯治瘟疫發狂大便泄者

膏三芩連柏各一枝半葛半麻各一

施各二右

○黃連解毒湯治太熱不止乾嘔煩渴錯語呻吟不得安卧連一枚柏

施各二右

○茵陳湯茵半大三錢肥施三錢右先煎茵減水一半內一味煎服

傳施子芩豉湯治汙下後虛煩不眠心中懊憹或大下後熱不去心下結痛

肥施茵四香豉半右先煮施子水減半內豉同煮去粗溫服得吐止後服

○東垣加減涼膈散退六經熱及傷寒餘熱膏煩翹木施芍竹葉芩

桔梗各半芩生一半右

○芩露飲治汙下之後煩渴而欲飲水其膏寒苓沵各二枝

猪各半滑各半右爲末每服三錢白湯

下

施子烏梅湯 治傷寒後不得眠

梔子芩 桔梗各半 柴胡一兩 烏梅十四個

右加生姜竹葉豆豉

逍遙散 治病新瘥，患勞復或陰陽易

參知其連 茼蒿生地滑蘿蔴根

柴胡 犀角 竹青 伸筋腹痛倍加量

腦服入燒棍榦末半分調猪汗出爲効

升陽散火湯 治撮空尋衣摸床譖言

沉鬱如小便不利者不可治 參

柴芍 門芩木苡陳神

右加姜棗 大便燥結諸語發渴加太

黃○泄漏者加升木炒

導赤各半湯 治病後神昏不語目赤

唇焦舌乾運梔子芩滑苡

知母 神參門右加灯心姜棗

全酸棗湯 治吐下後心煩更氣不眠

酸升門升耳矣知兩苓芍姜各

桔梗 茶葉陳白芍白莎丹山

氣下痰木葛苓藿參木

各一陳二乾生姜一右

兩分三耳分右加姜棗竹茹

溫膽湯 治病後虛煩不眠心膽虛

怯一切病後用橘紅一兩實半各

兩分三耳分右加姜棗竹茹

益元湯 治身熱頭疼不煩面赤飲水

不得入口此元氣虛弱無根虛火沙口一  
并熱証不用涼劑熟附耳參

姜門連知五味葱艾

寰右

○當吸活血湯 治頭不疼不寒只身

熱渴小水利大便黑口無倫語此內傳心脾二經令昏迷沉重不可作熟証

欬赤芍 生地 芍 姜 參 柴

枳桃 鈺 三服後去姜桂桃紅加

芩术 右姜一片水煎入酒三匙調服

枳實施子湯 治大病後勞復者

實枝 施箇 十四 跛升 右

一涼血逐瘀之劑

○犀角地黃湯 治大使黑衄血肺微發狂發黃當汗不汗內有瘀血

芍 生地 牡 屏 如無以升麻代之各二分半 右

○生地芩連湯 治熱毒入深吐衄不止

生地 苓 連 施 桔 芍 柴

芎 芍 屏 如無以升麻代之各二分半 右 入棗二枚煎

臨服入茅根汁如無藕汁亦可

○桃仁承氣湯 外証已解小腹急大便

黑小便不利爲瘀血証此藥主之

○大芒桂各一芍一桃十箇去皮尖研右水

煎去粗納芒一二沸溫服血盡爲度

○抵當湯 治血結胸譫語因瘀血結於胸中狂言小腹亦滿漱水不欲嚥者

水蛭炒 蟎虫各十五枚去足炒熟 桃十箇去皮尖研

右煎服血下止後服

一治癰瘍之劑

○陽毒施子湯 治傷寒壯熱身痛發斑

爛升芩芳柴各一右

○陽毒施子湯 治傷寒壯熱身痛發斑

施升芩芳柴各一

膏二分知半  
○犀角消毒飲 治發斑瘡 犀牛四  
分

荆穗 風各二分  
○犀角消毒飲 治發斑瘡 犀牛四  
分

荆穗 風各二分  
○犀角消毒飲 治發斑瘡 犀牛四  
分

調犀末服

○抽施子仁湯 治發斑煩燥面赤咽痛潮  
熱

○施 赤芍 大青 知各一升  
分

芩 膏 杏去皮尖柴 各半兩  
分

姜豉

○傳玄參升麻湯 治發斑咽痛  
玄參 升麻 各等分

升麻 各等分

○傳大青四物湯 治癰瘍發斑  
大青

膠珠炒成其多各香豉合右

○解毒防風湯 治發斑及癰瘍疼痛

風 地骨 茯苓 荆芥 牛

炒各七分半 右

○加味羌活散 治感不正之氣發瘡疹  
羌 前各一参桔 芍梔 芍

天 杏各半蟬 奇各二分

右加姜

○祖傳經驗加味敗毒散 治癰瘍及癰  
瘍等証，敗毒加飯 芳 术 風

荆 蒿 生地各等分入姜棗此因虛而  
感風溫而發斑者佳

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼 半陳宿霍芍 煙 芍梔 桔

飯 豆各一分 做粒 鱉矣一雄四分  
分

右煎調雄末服

○一分利之劑

○五苓散 治傷寒中暎煩躁小便不利  
而渴或霍亂吐利 次半兩苓 术

猪各一桂半右烏細末每服三錢白湯或清米飲調下或細切加姜棗煎服甚去桂加芩

猪苓湯 猪苓 膜沵滑

右各等分水煎去滓下膠候消服

赤茯苓湯 赤苓 陳參各二术

芎半各一右

一導痰之劑

鳴加味導痰湯 治內傷七情致痰迷心竅神不寧舌苔如鬼祟憎寒壯熱頭痛上氣喘息口出涎沫爲傷寒治誤

苓半陳寶星芍木桔參萎芩連右剉姜棗水煎臨

眼入竹瀝姜汁

金大橘皮湯 治傷寒嘔噦胸滿虛煩不能

安陳參各一甘半右每服五錢

加生姜片

○小橘皮湯 治傷寒嘔噦手足逆冷

陳半生姜右

○大半夏湯 半白苓生姜各一

右加棗

一溫經溫中之劑

○四逆湯 治即病太陽自利不渴及厥証脉沉細而遲身痛附一枚去皮作

甘不姜右煎服取少汗而愈

琳通脉四逆湯 姜三兩甘二附大者一枚生傳無甘有參

○茯苓四逆湯 苓二參三枚附一枚生片甘六枚二姜半右

傳理中湯 治即病太陰自利不渴寒嘔腹痛鴨溏眩厥霍亂等証慧日吐蛔若

傳理中湯 治即病太陰自利不渴寒嘔腹痛鴨溏眩厥霍亂等証慧日吐蛔若

難有大熱忌涼藥蓋胃中寒。蛇上加姜炒烏梅箇煎服。蛔定後以小柴退熱參其姜术各二右。如腎氣動者去木加桂。吐多者去木加生姜。

腹滿下利。脉沉遲而微者加炮附。真武湯治即病陰証脉沉細身痛或發少陽汗筋陽肉瞤等証。苓芍生姜附炮去皮各三個木二右如唆者加發少陽汗筋陽肉瞤等証。苓芍生姜附炮去皮各三個木二右如唆者加五味姜紙各一。小便利者去苓。下利者去芍加姜行。嘔者去附倍生姜。姜附湯治下後復發汗不得眠無表証而脉微者。姜附一枚右如下利厥逆脉不至者加甘倍姜面赤者加葱九莖。嘔者加生姜。利止脉不出加參三錢名通脈四逆湯。咽痛加桔少陰証腹痛或泄利加炮附一錢半。

林附子散治陰証唇青面黑身痛四肢厥冷熟附桂附木各二姜炮半分右加姜棗。

全生料五積散治感寒頭身痛惡寒嘔吐或感寒濕腰脚酸疼芷芎芍桂芩白芍麻桂各六桔十二蒼二十右加姜葱川烏皮膚桔木附炮去細各一姜炮半右

○海藏肉桂散治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷服者不知入變而陰毒惡証桂木木朴炒良各三白芍陳前附炮參各一茶半右入裏。

○再造飲治無陽証頭疼發熱惡寒項

脊強無汗用表劑汗不出是陽虛不能  
作汗冬月用之夏加芩膏也 茜 参

枝 苟 熟附 細 卷 風 莖

生姜煨右剉棗二枚水煎熟加炒芍一  
撮再煎三沸溫服

○林

术附湯 治中寒中氣四肢厥冷牙關  
緊急瘧壅脉弱 术 七分附炮 三不廿三  
半灸右分一貼每貼姜十片煎化蘿合香  
丸 保進

○惠 謂榮養田昌湯

治勞力感寒証即補中益氣之穀一参 茜 白 柴 陳 苟 术

芎 生地 細 莖 風 右入姜棗

葱白

○全 人參養胃湯 治外感風寒內傷生冷

憎寒壯熱頭目昏疼口渴食停痰俱能  
治之 蒼炒半 朴各一橘紅七分藿

梅 寒多加附

○一 瘟疫

荅 令

參各半 苟

各半右 加生姜烏

房勞辛苦乏人安樂者味乏有也俗名  
瘟病醫書曰疫癟一皆觸冒四時不正  
之氣而爲病麗安常曰疫氣之發大則

流行天不次則一方次則一鄉次則偏  
虧一家悉由氣運鬱發所致也仲景無

作傷寒正治而大汗大下也但當從乎  
中治而用少陽陽明藥方中看陰陽脉

証二方加減和治之

丹溪曰衆人病丁般者此天行時疫也

治有三法宜補宜散宜降用太黃 李

連 參 桔 蒼 風 滑 莖 介

中黃神龜糊丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下痰多以二陳湯下

敗毒散治瘟疫四時通用差獨

前柴芎枳桔白芩參各分甘葛半石爲末每服三錢加姜三片煎

服或沸湯點服亦可此藥治傷寒瘟疫風濕風暖肢痛增寒壯熱項強睛疼或多風痰或處寒濕之地脚氣痠弱此藥不可試一方加薄荷少許

九味羌活湯治瘟疫初感一二日間眼之取汗而愈其効如神羌風

蒼朮半芎芷拳生地牛膝各二

細分右

大無神木散治四時瘟疫頭痛項強身痛增寒壯熱專主山嵐瘴氣之妙劑

也陳仁蒼朴各一斤藿菖各一

半右作二服加姜三片棗一枚煎服不方無首有香附一

十神湯治時令不正瘟疫妄行或四時感冒風熱頭疼身癟寒熱無汗陰陽兩感並宜服之麻芎甘蘿

葛升芷赤芍陳莎各等分右加姜葱如中滿氣實者加枳殼杏仁升白芍甘葛各十五克

全升麻葛根湯治瘟疫頭痛發熱升葛根湯治時行瘟疫壯熱惡風

頭痛鼻塞咽喉乾癢嗽涕嘴稠粘柴前赤芍膏葛各十克桑各大荆去梗十升兩兩半荆兩半升兩右入姜三片煎

十余粒

神木散治四時瘟疫頭痛發熱及傷

風鼻塞聲重蒼橐芷細

羌 芎 苟 各各一兩右加姜葱

林辟瘟病亦小豆新布囊盛之置井中三

日出舉家服男十九枚女二十九枚

○又法熬豉和百味浸酒常服之

○又法用狐狸鼻尖及糞燒之以薰除此

病狐糞櫬在竹木石間頭尖堅者是也

○又雄黃研早晨水塗入鼻孔中及臨卧

亦可金同床不傳染

○天行疫癘者東行桃枝剉煮湯全家潔

浴佳

○溫病勞役及食復燒入屎存性爲末酒

調方寸匕服

○天行瘟疫及小兒熱癆狂啼大人酒後

暴熱

用臘月八日雪磁器盛之遇此病服效

○屠蘇酒方 大椒 桔桂 風各

兩术 川烏 薏苡 各一兩八味剉以

絳囊貯之歲隙日懸掛井中令沉至泥

正旦出之將囊浸酒中略煎血東從小

至大飲之棄囊于井中

○東垣曰太頭病乃陽明邪熱太其資養

少陽相火而爲之也溫熱爲腫木盛爲

痛此邪見于頭多在兩耳前後

治法不宜兼速速則過其病上熱殊除

中寒復生當視其漸勢在何部隨經處

治陽明爲邪首大腫少陽爲邪出於手

前後

○丹溪曰溫熱在高頭之上用葛及酒炒

芩酒蒸大黃驥病加咸切不可用降氣

○二黃湯 治太頭天行疫病 芩酒

連上生芩各等分右水煎徐呷之如

未遂用鼠粘子多少水煎入芒硝等分

亦時少與母飲食在後。如未已，只服前藥，或大使邪氣已，則止。

亦時少與母飲食在後。如未已，只服前藥。太使邪氣已，則止。

翁方宜各少加引經藥。陽明渴加通脉。  
○少陽渴加猪。陽明行經升葛芍甘  
○太陽行經荆風芩並與上藥相合用

翁方宜各少加引經藥。陽明渴加通脉。  
○少陽渴加猪。陽明行經升葛芍甘  
○太陽行經荆風芩並與上藥相合用

足少陰頭疼酒舉口渴者身痛羌枝風  
芳俱宜加之

足少陰頭疼酒舉口渴者身痛羌枝風  
芳俱宜加之

一  
蝶  
毒  
溫

裁用之，或用小柴胡加風羌荊芍桔，煎服。外以側柏葉搗汁，調火燉，蚯蚓糞，付之。或用丁香尖附子尖南星，醋調付之。或五葉藤車前草皆可搗付之效。

膏菊

各一  
半麻  
白微  
羞

杏  
耳

青木香

亨各半右水煎

タク  
鳥

瘧。用酒芩酒大黃加減。十五六日  
服小柴胡湯不愈者。仍用陳蕪發散而  
愈。又法酒炒參連。爲君。名享爲佐。水  
煎細火呷之。無加鼠粘子酒蒸大黃煎。  
入芒硝亦頻與之。

○李桔湯 治冬溫咽喉腫痛  
各等

亨桔湯 治冬溫咽喉腫痛  
古水煎持大頭呷之

一  
分  
四  
德

卷之三

傳不換金正氣散治四時感冒傷寒癥  
疫寒熱霍亂吐泻及出遠方不伏冰土  
並皆治之朴姜陳未白薑半夏蒼芩茅米

不換金正氣散 治四時感冒傷寒  
疫寒熱霍亂吐泻及出遠方不伏水土  
並皆治之 朴姜陳去白藿半芩去心

漫谷其一

右加姜棗

壯執或  
丁

風濕霍亂吐泻 腹痛  
酒洗銀絲  
桑白皮豆蔻  
朴硝 姜

木 陳去白桔 半分 各四  
分 芎各二 右加姜

蜜

○消風百解散 治四時感冒頭疼發熱  
鼻塞，聲重，咳嗽喘急等証 蒼 麻去

荆穗 陳 正各一 芎半右加姜葱，咳

甚者加烏梅一箇

○八解散 治四時傷寒頭疼體熱惡風  
多汗恶心嘔逆，參 木 苓 芎

陳 守 蘿 朴各等 右加姜棗

○和解散 治四時傷寒頭痛煩燥自汗  
咳嗽吐利 蒼去皮藁 桔 芎各半

陳 朴各四兩 右加姜棗

○杏蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒  
莎 蘿各二兩 陳一斤半 芎半兩 右加姜葱，頭

疼加芎芷

○參蘿飲 治感冒頭痛發熱，咳嗽聲重，  
涕唾稠粘，大解肌熱，寬中，止脹或勞瘵，

潮熱待來並能治之，參 蘿，葛

木 半 前 苓各三枳 桔 芎各

陳去白各半兩 右加姜棗，氣盛者去木芩，

○十味芎蘿散 治四時傷寒發熱頭痛，  
芎七 蘿 葛各二兩 柴 苓各半桔二半

芎三 芎半 六枳三分 陳半 右加姜棗，生

○二芎一兩 一芍半 右煎服

粟不熟，利人頭痛

C 中暑門三

○中暑中熱之異

傳內經曰：難而得之為中暑，動而得之為

中熱

用篇一

六十六

卷之二

五

Kitasato Memorial Medical Library

○暑熱之時無病之人或避暑於深堂太  
處得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒  
身熱拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱  
無汗爲房室之陰寒所遏使周身之陽  
氣不得伸越 大順散 桂枝 姜等分等熱藥主  
之

○若行人或農夫於日中勞役得之名曰  
中熱其病必苦頭痛發躁熱搏之肌膚  
大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃  
爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎等涼劑主  
之

○愚按傷寒論中一證曰中暍即中暑也  
脉虛而微弱煩渴引飲脉熱自汗此蓋  
得勞役脉虛而暑邪干衛之候是宜東  
垣清暑益氣湯等補益之劑一證曰熱  
病即中熱也脉洪而緊鹽頭疼身熱口  
燥心煩此蓋得之於冬寒邪鬱積至  
夏而發乃挾暑而成太熱之候是宜黃  
連白虎解毒等清涼之劑

### 一方法

○五中暍而死切不用冷宜溫養以湯熱

中嚼生姜或大蒜送下不能嚼水研灌  
之或生乾姜末湯點下亦佳也

○傳清暑益氣湯

治感

長夏濕熱四肢困

倦精神短少 脅滿氣促身熱而煩小便  
黃而數大便溏而頻或渴或不渴自汗  
躬重脉洪緩

苔汗少蒼各一  
上半  
下參  
术陳 麵炒各五  
豆姜柏酒浸

飯青門葛各三  
五味九  
右

○白虎湯 治暑熱發湯 方見傷寒門

○五味加參

一名天木散  
一名六一散 治中暑煩渴小便

○益元散

桂全姜等分等熱藥主

不利方見瀉門

○杏而飲 治暑熱腹痛霍亂吐利煩心

○等証 常三 朴姜炒各一 製扁半 右水

煎蕙氣虛者不可過多

○黃連香薷散 治証同前。前方去去篇加連七分

○十味香薷飲全清暑氣和脾胃 常小

參 陳 术 卷 扁 茂 仁 朴

甘各半 右

○桂苓甘露飲玉治伏暑發渴脉虛

桂 參 茂 卷 术 甘 葛 沢

膏 寒水各二兩 滑木一兩 朴右爲末白湯

下玉無有薷

○生脉散 參 五味 門各等 右水

煎 夏月時代熟水飲之垣日加葛甘

令人氣力湧出

○香薷剉散 解暑毒上 蔡二兩

朴姜製 茂 陳 甘各半兩 良三 右入鹽

「搗水煎」

○縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐

浮霍亂 縮 果 烏梅肉 甘各四兩

扁炒葛 茂各二 右水煎

○五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂

吐浮尿赤少如心神恍惚加辰砂名辰

砂五苓散方見傷寒門

○枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲嘔

噦惡心頭目昏眩去白 枇 丁 陳培

朴半兩 蕤七分 苘 陳培 卷 甘各一

兩右入姜水煎煩躁冷水調下

○香朴散子 治伏熱吐浮霍亂煩渴

參 卷 甘各半 蘿 瓜 汝 常 半

扁炒陳 烏梅 朴各等 右入姜棗

半

○夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也 参 茂 審門白芍 陳 白芩各一連炒甘草五分

柏三分 术一分 知 蒜各七分 右加姜煎

○夏暑如在途中常服壯元氣驅暑免中暑霍亂泄痢等証 参二分門 白芍

炒白芩各一五味子碎粒术一分芋絲五分知炒陳 蒜各七分右加姜

○夏秋暑熱因過飲食冷物傷內又取涼風傷外以致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或嘔吐泄泻此內外俱傷寒冷也參 姜炒紫朴炒姜水陳卷 實白苓各一木半 芋絲各五分右入姜水煎

#### ○中濕門 四

○傳居異溫之地或衝你風熱或辛苦汗滯

○恣飲酒漿多食瓜菓之類皆內傷濕也

○外感多癰癰附腫疼內因多由満透臍溼痢

○脉沉而緩沉而細微皆中濕

○脉滑數尿赤澁引飲濕熱小便禹利太便浮身疼自汗溫寒

○下身盡腫痛或無汗是溫流閼難邪氣在表五苓加羌蒼微汗之

○自汗多者宜白朮甘草湯

○小便自利清白太便泄泻身痛自汗爲寒湿五苓散加生附蒼朮

○二陳湯加酒芩 龜蓍 過散風行濕最妙

○防己黃芪湯 治風濕脉浮身重汗出思風或周身疼痛 已三 芍一子

木名氏三右作十服加姜三片裹二枝

○加味五苓散 治濕勝身痛小便不利

熱重發渴者本方中加羌活一倍

除風濕羌活湯 治風濕相搏一身盡

痛 羌分七風 升柴各五 藿蒼

各一右

○羌活勝瀝湯 治肩背痛不可顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛頸強腰似折項似拔足太陽經不通行此藥主之 羌 獨活一毫 風 杖

參芩各五 蔓分 右如身重腰痛沉々然經中有寒溫加酒洗漢防已分輕者附子分重者川烏五分

○家傳白朮酒 治中溫身痛難轉側及皮肉痛難著席 木一細切酒一盞半

煎至一盞去粗服

○對金飲子 治脾胃受濕腹脹不食身重皮膚微浮肢節酸痛 平胃散一袋

白芍一右爲末入姜煎服

### ○瘧疾門 五

○傳經日夏傷於暑秋爲瘧瘧云瘧得於暑當以汗解或因取涼太過汗鬱成瘧其初感也弱者即病冒氣強者伏而未動至於再感復因內傷其病乃作宜其難瘥夫暑與風皆外邪也故非汗多不解今之達此疾者已經再三劫試冒氣重傷何由得愈欲治此証必先與參术等補劑爲君加柴葛等發散藥漸而收汗得汗而虛又行補養下脾屬張最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

○當以汗之難易較輕重

○大忌飽食遇發則食飽病愈重

○陰虛証後惡寒發熱至晚亦微汗而解

○解脉必虛濡而數且瘡脉弦而虛脉不

○大慾爲辨耳

○暑瘡宜人參白虎湯之類

○在瘰者二陳湯加常葉 柴 茄

○不能食者必於飲食上得之當從食治

○虛者必用參术一二貼托住其氣不使下陷後用他藥有汗要無汗正氣爲主

○帶散無汗要有汗散邪爲主帶補

○渴者生地 門 天花 膝 知

○炒柏 葛 莼生

○大渴大熱 小柴胡去半加知 門

連 柏 施 天花

○久瘡二陳加芎 蒼 柴 葛 木

○補一發藥也

○痰滯胸滿熱多寒少大使燥實

○太柴 胡利之

○久瘡不得汗以二陳湯倍加二术少加

○桂枝

○小兒瘡疾者有痞塊方生地各一陳

草 半 苓 多各 茄 分入生姜煎調醋

○隨証加咸屬允醋湯送下

○老瘡風暑入在陰分宜用血藥引出陽

分而散 川芎 捣菖 叉口 紅 蒼

○本芷 柏 茄 煎露丁宿服之

○日久虛瘡寒熱不多或無寒但微熱者邪氣既無之八物加柴芩良陳滋補氣

血

陽瘧多汗用參芩木飲之無汗柴木參葛發之

陰瘧多汗用酸芍地葛柏飲之無汗柴木參葛發之

○截瘧常山飲 常 莪 樊 知 芋  
烏梅 穿 (慢火) 肥右等分每服五錢水酒各半盞煎至八分露星月一宿清晨冷服欲吐則須之忌熱湯一日然常山性暴悍善逐疾飲大傷真氣虛弱者勿輕用

○截瘧七寶飲 常 卜 葵 桦 芋 多

朴 青 陳各半右作十服酒水各半盞寒多加酒熱多加水煎八分露星月十宿空心冷服忌熱茶湯一日到午食溫粥

○白虎加桂枝湯 治溫瘧 膏 (五知) 朴  
芋 一桂枝一兩分右

○祖傳截瘧神方 通 尤 常 穿 醋  
黃各辰半朱梅 (七) 大棗 (七) 右水煎先以一升另研梅箇大棗箇右水煎先以一升另研梅箇大棗箇右水煎先以

棗和辰砂末食後服

○一方 常 果 知 桂各一酒一盞浸一日臨發早服

○治久瘧不愈一服便止永不發其效如神常半升桂一丁香半烏梅箇右作一服用好酒一盞浸一宿臨發日清晨飲之

○桂枝羌活湯 治瘧暑以前發頭項痛脉浮惡風有汗 桂 巍 風 芋 各 分水煎迎發而服之如吐加半夏酒調下

○桂枝羌活湯 治瘧暑以前發頭項痛脉浮惡風有汗 桂 巍 風 芋 各 分水煎迎發而服之如吐加半夏

○麻黃、羌活湯 治証如前，惡風無汗

麻節 崑 風 芮各分右

○清脾湯 治脈弦數，熱多寒少，口苦，渴

乾大小便赤，青朴木菓

柴參半芩其等分右加姜

○鱉甲飲子 治瘧久不愈，腹中結塊，名

曰瘧母肝之積也

鱉

分右入姜七片，裏箇烏梅一箇

琳清脾湯 治脾瘧食瘧

朴青守

梅肉

良各二葉，甘桔五

右姜三片

棗一枚

○人參養胃湯 治外感風寒，內傷生冷

發爲瘧瘧

蒼朴制半制各參

苓 菓 霍各半橘紅三分甘桔一丁方

加桂右每服八錢，姜五片，烏梅半水煎

○治諸瘧辰魏等分爲末，糊丸如豆

皂子大，每服一丸，空心人參湯送下，以

諸藥不損脾胃，最爲穩當

○百草霜 黃丹等分爲末，每服二錢，發日

空心米飲調下，不過兩服，愈矣。時無服

○瘰瘍 小柴胡加葛

○小柴胡湯 方見傷寒門

補治熱多寒少，頭

痛，脅滿，咽乾，如渴甚，而嘔去，半加天花

膏下，病滿加葛

○瘰瘍發於子午卯酉日，寒熱嘔吐，舌乾

口燥，少陰經瘧也。二陳加葛，半柏連柴，

之類。發於辰戌丑未日，寒熱嘔吐不

食，或腹滿自利，太陽經瘧也。二陳加二

木柴芍之類。發於寅申巳亥日，寒多

熱少，或腹痛引張，如淋狀，厥陰經瘧也。

二陳加桂枝附姜之類。

老瘧飲 治久瘧成癆在育服諸藥不  
効者 蒼浸草 桔 青 陳 良各  
兩 杏 茉 茄炒半 芋桂 姜炮  
三蘿 莖 各二 右入鹽少許煎  
味一方 治瘧用雄黃 瓜蒂 赤小豆  
爲末每服半錢溫水調下以吐爲度  
一方 治勞瘧 敗風三兩酥蜜爲  
末臨發時溫酒調下三錢七

○霍亂門 六

傅陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下痢  
憎寒壯熱頭痛眩暉

○河間曰因渴而大飲飲而過量或因飢  
而始食食而過飽以致溫熱內甚故陰  
陽交錯而不和是爲吐瀉

○熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理中  
丸

○河間曰九覺此証急用五苓 益元

桂苓甘露乃吐海之聖藥也慎勿無  
栗梨粥湯吐泻止過半日飢甚方可與

稀粥少食以漸將息

○轉筋屬血熱 四物加酒芩紅蒼星男  
子以手挽其陽女子以手牽乳近兩邊

呻甚則轉筋入腹即死霍亂惡証無越於  
斯

○內經曰脈伏者霍亂脉訣云霍亂脉微  
細者生微遲氣少不言者死

傅脉大者生微弱漸者死脉結伏代皆  
不可救以死

斯

○丹溪曰：有宜吐者，雖自吐利還須以吐法，提其氣用。二陳湯探吐或鹽湯皆可。委中穴，或十指頭出，皆良法。

吐之

○半夏湯 治霍亂轉筋吐泻不止。

半 麵 参 术 木各五分 淡桂半 杏半  
右薑末每服二錢渴者涼水調下，不渴者溫水調下。

○理中丸 木參 姜 芍各等分 炙末  
煉蜜丸，涼水化下。

○六和湯 治霍亂吐泻不止 术 半  
縮 杏 参 芍各五分 赤芩 薑 扁

姜汁、炒瓜子各一瓣 朴（制炒各右加姜三分片棗一枚）

○漿水散 治暴泄如水周身汗出盡冷  
脉弱吐不止 半朴附 乾生姜 芍

○桂附湯 治食生冷成霍亂吐泻心  
腹滿閼上方見傷寒門 加陳皮青皮名治中  
多汗上方見傷寒門

○理中湯 治食生冷成霍亂吐泻心  
腹滿閼上方見傷寒門 加陳皮青皮名治中  
湯，更加丁香治中湯。

○丹溪曰：霍亂不渴用生姜理中湯。  
渴五苓散加五味，門滑又云冬用理中

湯，夏用黃連香薷湯。

○一方 治吐泻 蕃 薑 朴 陳  
縮 茄 半 参 麵炒各分

○通脈四逆湯 治霍亂多寒身冷，脉絕  
水煎遇寒加乾姜，寒甚加附。

茱炒兩附炮一桂

通草 細 白芍

○半兩各分右水酒各半加生姜，  
茯苓泥浮湯 治吐利後煩渴飲水。

○半兩各分右水酒各半加生姜，  
茯苓泥浮湯 治吐利後煩渴飲水。

五苓 去猪加耳

木瓜湯 治霍亂吐下舉躉轉筋入腹  
闊絕 木瓜一兩茱萸半兩茴朮各一  
右入生姜

姜蘿葉

訶子散 治心脾卷痛霍亂吐利如神  
訶 茱萸朴製姜果陳良參

麴炒各右入鹽些少煎

七氣湯 治七氣鬱結五藏之間陰陽  
不和霍亂吐利 半兩白芍芩各四

桂朴 製各兩蘿陳各二參一右加

姜棗

止渴湯 治霍亂煩渴

甘草參門苓桔搘葛澤分等右爲

末每服二錢蜜水調下

麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱不解多

渴小便不利 門陳去半白芩

八分服

不換金正氣散 治霍亂轉筋吐泻不

正方見傷寒門

藿香正氣散 治濕氣霍亂吐泻

同前

姜塩飲 治乾霍亂 塩一生姜半兩  
同炒令色變以水一小碗煎熟溫服甚者

加童便一盞

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠

參芽 紫竹葉各四兩門附炮半兩  
右入姜五片粳米百餘粒

琳吐藥汁無法可治用井泉水黑椀一百沸  
湯半椀相合服之妙

瀆法 治霍亂轉筋入腹鹽多用煎湯  
瀆之

○洗法 治霍亂轉筋用蓼一把去兩頭水煎薰洗

一方 用陳大蓼

灸法 治霍亂已死腹中尚有暖氣用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海二七壯又灸霍亂吐泻上管中管各二七壯傳灸天樞氣海

又水穀不分而泄泻灸水分七壯

又轉筋入腹欲死者使四人捉手足灸

臍左邊二十四壯

骨上六壯

不處金玉處者

灸之

○內傷門

一辨內傷外傷

○外傷風寒有餘之証發熱惡寒寒熱併作其熱發皮毛之上鼻氣塞不通心中煩悶不安一時一日增如愈甚

○內傷飲食勞役不足之証寒熱間作其熱蒸燥熱發肌肉之間口鼻中氣短不足以息腹中不和口不知味大小便或閉或溏或心下痞悶或胸中痛

○內証頭痛有時而作有時止

○外証頭痛常有之須傳裏方罷

一治法

○惡寒發熱頭目沉重之証世醫不察内外虛實便依傷寒用汗下之法故東垣先生著内外傷辨惑論脾胃論等皆以扶植胃氣爲本

○或內傷，挾痰與食清氣鬱于下，濁氣塞  
胃中之候，驟用補中益氣等藥，則氣滿  
死故。王安道著內傷不足，中有有餘  
病，塞遂謂補藥不宜此。証改用汗下而  
死。<sup>子</sup>故王安道著內傷不足，中有有餘  
勞倦傷，誠不足<sup>古</sup>飲食傷，當於不足中分  
有餘不足。

○酒者太熱，有毒氣味俱陽，乃無形之物，  
也若傷之，止當發散汗出，則愈。其次利  
小便二，者分消其濕。  
○惡傷食，必惡食氣，氣口脉緊盛，胸膈痞塞，  
亦有頭痛發熱者，但身不痛。二陳加赤  
芍，葛根如聞食氣，即嘔。二陳加縮青，  
傳有挾痰者，有挾外邪者，有熱鬱于內而  
發者，皆補元氣為生者所挾，而兼用藥，  
挾痰者，補中益氣加半夏，氣虛甚者，少  
加附子，以行參芪之氣。

○脉緩急，情嗜卧，四肢不取，或便溺從平  
胃散。

○脈弦氣弱，自汗，四肢發熱，或便溺，或皮  
毛枯槁，從黃芪建中。

○脈虛而血弱，從四物湯，而加減。

○真氣虛弱，及氣短，脉弱，從四君子湯。

○或渴，或小便閉澀，赤黃，從五苓散去桂，  
傳補中益氣湯。

○芪一

甘

分

參五

病甚

參一

木

升

柴分三

右

脾胃一虛，肺氣先絕，故用芪益皮毛，闔  
腠理，不令自汗。○上喘氣短，損其元氣，  
用參補之。心火乘脾，用炙甘，泻火熱。

補胃中元氣，若脾胃急痛，腹中急縮，昔  
宜多用之。此三味除濕熱，聖藥也。木除  
胃中熱，利腰膝間血，升柴升胃中之清  
氣，又引芪甘上升，能補衛氣之散，用

百散和血脉，橘紅理胸中之氣，又助陽氣上升，散滯氣。或少加柏，以救腎水浮華，中之伏火也。喪熱者，一二服，氣和微汗而愈。咽乾者，加葛。心刺痛，乃血澁不足，加百散。精神短少者，加參五味。頭痛加蔓荆子，甚痛加芎。頑痛攜痛加藁細。有痰加半生姜。咳嗽，夏加五味門，秋冬加連節麻。春加佛耳欵冬。久咳肺中伏火去參。食不下，乃胸中有寒或氣逆，帶加木陳青。寒月，更加益智草豆蔻。夏日，更加芩連。秋，更加枳縮。心下痞悶，加芍連。腹脹，加實木朴縮。天寒，加生姜桂。腹痛，加白芍甘。有寒加桂。夏加芩葛芍。冬加益智草，昆蟲半夏。股痛，或縮急，加紫甘。臍下痛，加熟地。不已是寒也，加桂。大便閉，殊加大棗。脚軟，支勞，或痛，加柏，不已更加己。氣逆，心亂，以碌砂安神丸鎮固之。

○碌砂安神丸 遵半  
碌朴酒生地  
酒釀身 甘（炙各五分）右爲末，湯浸蒸餅丸  
津唾吞下。食後服一方，無敵地用生柴，調中益氣湯。脉弦洪緩而沉，壯緩四肢倦急，煩心腹難舒伸。二便清利而散或大便澀，夏月飧滯完穀或便後見血，或白膿膏滿，噎癥，察此，棄主之。補中益氣湯去，加木一分或二分，如陰火蒸熱，加生地三分，太便虛坐，或了而不利，腹中逼迫，血虛，血凝，加分身分。身熱沉重，雖小便多亦加參二分，身分。身熱沉重，雖小便多亦加參三分，身分。有嗽，加生地分，以制半夏之生姜片。有嗽，加生地分，以制半夏之

。升陽補氣湯 治因飲食勞役，日氣不足，脾氣下陷，氣短無力，不能集熱，早飯後昏悶倦怠，五心煩熱。朴製三分升

羌獨白芍 風草各一錢，次分王紫

二分生地半兩，加姜棗。腹脹乃宜狹倍朴。腹似硬加縮分。

木香化滯湯 治憂食，溫麪結中，脘心

痞不食，或胃脹痛。半兩，生薑一錢，溫麪

碎甘草各七錢，木橘紅各四錢，各半分半。

實炒白芍三錢，紅分右加生姜。

○閉冬清肺飲 治脾胃虛弱，氣喘，精神

短少，或吐衄。大黃一錢，白芍

甘草各一分，參，附身各五錢，味桔右

○白术和胃丸 治久不食，太便或閉，或溏，此胃氣虛弱也。木一兩半，朴一兩半

兩陳皮，白參五錢，附子一錢，實，換各二錢。

木半錢，乾生姜半錢，末湯浸蒸餅，丸米

飲送下。

○枳术丸 治痞滿，消食，強胃。木二兩，枳炒一兩

實，炒右爲末，用沸湯泡，青荷葉，乾姜亦可，煩，去葉，用湯浸晚粳米，杵粉以

原湯煮糊丸，白湯送下，加橘紅一名，橘皮枳术丸治元氣虛弱，飲食不消，心下

痞，闊。橘紅一錢，炒藥麵一錢，名藥麵枳术丸，治飲食太過，心腹滿闊。橘紅一錢，木一錢

名木香枳术丸，破滯氣，消飲食。加半兩，名半夏枳术丸，治傷冷食。加酒炒

黃連酒煎，大黃炒神，麵橘紅各二錢，芩

四兩，名三黃枳术丸，治傷肉食，濕麪辛辣

味厚之物，填塞閼亂。

○備急大黃丸 治心腹卒痛。

大巴去皮膜及油 乾姜各等 右為末，煉蜜。

丸小豆大，每服二丸。

○丹溪保和丸 治宿食心腹飽閼，脾胃虛者勿服。

查王禹 炒半各三錢。

陳云白各一兩 蘿蔔子炒翹各一錢，芽炒一錢。

右爲末，別用生神麴五兩水入姜汁打糊，丸白湯米飲下。

有木二兩 脾胃虛因

君子湯送下。

○祖傳遜源散 丸傷食寒熱久不已，或傷寒後食復以原食之物燒存性一兩爲末，用生韭根葉杵汁調服過一二時，以東垣枳實導滯丸下之。

○枳實導滯丸 治傷溫熱之物，痞滿閼亂。

大一寶麸炒半兩 麵炒各一錢 茎

連 木各三兩 沢二 不右蒸餅丸以利爲度，加木換各二 名木香導滯丸。

○參苓白术散 治脾胃虛弱飲食不進，或嘔瀉大病後補助脾胃極妙。

參术苓山扁姜汁浸炒各一兩半兩 芎

桔 薏 蓼各一兩 右爲末，每服二錢，湯調下。一方有縮一兩 禁口，刺用粳米湯下。

○平胃散 治脾胃不和。蒼木朴姜

陳去白各半兩 茱二 右加姜棗。氣不舒

快中脘痞塞加莎縮。欲進食加曲芽吳茱洗蜀椒。

○益胃湯 治頭悶，動勞則微痛，不喜飲食，口不知味，躁熱氣短，腸鳴便溏，口乾不善食冷。

芩二兩 守分二芩升分各五

芩守分二芩升分各五

分 蒼半 右

林凝神散 取斂冒氣清涼肌表

參术 哮山各二錢 痰癥知

生地 芡各一錢 竹葉 地骨 門各一

右加姜棗茶

○感應丸 治傷冷物不能消化或浮臭  
如抱壞雞子百草霜鑄底者 杏四百  
粒去皮姜炮一巴 十十粒去皮  
皮尖姜兩 巴心油膜研 蔴菌煨  
木二兩丁一兩右姜蔻木丁四味爲末  
同餘三味用蠟六兩鎔化入好酒一升  
煮數沸候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤  
用春夏條合用清油一兩秋冬用一兩  
半煎熟下酒煮蠟四兩同化乘熱拌和  
薑末丸姜湯下

○全黑圓子 治宿食不消吞酸或腹痛飧  
泄如痢

烏梅肉

七

百草霜

二

杏十二

一箇去皮尖巴殼油半九枚縮二十一箇右爲

阿魏圓 治脾胃虛弱食因麪菜不消  
化

魏酒浸桂

莪芽炒麵炒

青蘿炒木 姜炮各百草霜三分巴

一箇去殼油右爲末糊丸姜湯下麴傷用

麴湯下生薑傷用麝香湯下

人遇勞倦辛苦用力過多服之免生肉  
傷發熱之病此方主於補氣 茴蜜後  
半參 門 陳 术各一 芡五味二

粒右入姜棗 力倦甚加熟附四五  
分半

全養胃湯 治脾虛胃寒嘔逆惡心腹脹  
痛腸鳴泄泻或有外感寒熱如瘧膏

節煩疼並皆治之 蘿朴半芩

各一 萊附 芡陳 參分各三术半  
兩

右姜片裹放烏梅半

○補血湯 遇勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸煩熱並治

○太抵浮利小便清白不淡爲寒赤淡爲熱

芎 生地 陳 楚 芡 分各五 参二分

味 蒜 五 右

○泄浮門 八

○傳原病式曰浮身寒冷青黃赤黑爲熱

○太抵浮利小便清白不淡爲寒赤淡爲熱

○又太便完穀不化色不要吐利不脾臟

○水液澄澈清冷尿清不澁身冷不渴脉

○遲細而微寒証也

○穀肉消化無間色及他証便斷爲熱

○穀不化亦有熱証尤火性急速傳化失

○常完穀不化而爲食泄者亦有之

○久泄穀道不合或脫肛此元氣下陷及

○大腸不行取令而然 术 苓 麴

陳 訶 蔴 五倍 烏梅爲丸四君子加升風煎湯送下

○泻水腹不痛溫 四苓散加蒼术倍白

○飲食入胃不住完穀不化氣劇 参

术 苓加蒼术柴風提之

○泻水腸鳴痛一陣泻一陣火四苓散加

○滑石通施伐火利尿

○或泻或不泻或多或少瘧 海石 薑

芩 麴爲丸

○腹痛甚而泻泻後痛減食積以大寒曲

消滌

○泻証須積滯已消後用断下藥便固止

○乏多成痢先理中焦次分利水穀治中

○利水穀治中

不効然後斬下

○泄本禹濕多因飲食不節治法消食燥  
濕利尿補脾亦有升提下陷之氣有用  
風藥勝溫亦有久泄腸胃虛滑不禁者

收止五

主方 术木苓 茯苓各一陳木芽五  
傷食泄黃或食積加連朴實○承赤散  
少加沉猪通施○口渴引飲加葛參門  
升麻○夏秋湿熱大行暴泄○加連蒼沵  
升通○續酒熱浮加連因麵葛○寒月  
冷泄加麵姜縮木益○久泄胃氣下陷  
眼利尿藥不効加參芪升柴○久滯中  
虛食少難化加耆參麵木姜○久泻腸  
胃虛滑不禁加訶蔻木姜脂

○傳止浮方

蔻木白滑春冬一兩二分半  
夏二分半秋二分半

右爲末姜汁調神麵作糊丸服

○茯苓湯 治傷苓飲泄注變作白痢或  
赤白相交腹痛食咸熱躁四肢沉困無  
力 方 茯苓生一錢桂枝 芍药各二  
分 猪苓各三錢五分芍药七分蒼朮 生芍  
升柴各一錢

○黃芪補胃湯 治大便一日二四次濁  
而不多腹鳴尿黃 茯紫柴升身

益 橘紅各一錢升草各半錢紅豆蔻半錢  
右

○治痛泄 术炒白芍炒各陳一兩風兩  
右水煎或丸服久瀉加升草

○白术散 治濕瀉及食積溫熱作瀉  
木香 茯各等水煎或禹米飲調

下

○神术散 治春傷於風夏必飧泄

蒼朮各一錢芩各六錢分 芍药三分

細分

右加姜

○胃風湯 治証如前及治風寒乘虛入腸胃泄瀉完穀及濕毒下如豆汁或下瘀血或如魚膾

桂木 白芍各等 右入粟米一小撮

水煎如腹痛加木香，

○生料五苓散 治泄注如水門

加蒼車倍木為末米湯調服○溫熱甚，下泄如熱湯者去桂加滑參施通之類。

○腹痛下泄清冷不渴寒泄也倍桂加

桂

○胃苓湯 治脾胃不和及夏秋之間脾胃傷冷水穀不分 平胃 五苓合和

姜棗煎服

○發水散 治暴渴身冷汗出脉微

方見霍亂門

○理中湯 治藏府停寒泄瀉不已

方見傷寒門

○升陽除濕防風湯 治大便閉塞或裏

急後重數至圊而不能便或有白膿或

血慎勿利之

蒼

四

風

木

白芍

各一

右

○林實腸散 治泄瀉不止 寵 訶

方見霍亂門

縮 陳 蒼 苓 朴 各二木 甘草

各一

右加姜棗

手足冷

加干姜

炮

各一

赤石脂散

治腸胃虛

泄注

完穀

腹鳴

○赤石脂散 治腸胃虛泄注完穀腹鳴

痛

脂

炮

甘

各一兩

縮

四

兩

右加姜棗

○六和湯 治暑月泄瀉此方見霍亂門

蒼

炒

麌

桔

各一兩

右加姜棗

各三

右加姜棗

○調中散 治腸虛泄瀉不止嘔吐不食

蒼

炒

麌

各一

右加姜棗

各三

右加姜棗

各三

右加姜棗

○參守 杏 縮各五右加姜棗

各一

右加姜棗

各三

右加姜棗

各三

右加姜棗

○調中散 治腸虛泄瀉不止嘔吐不食

蒼

炒

麌

各一

右加姜棗

各三

右加姜棗

各三

右加姜棗

○藿縮 药炮姜炮桂茴炮果各半

各半

右加姜棗

各半

右加姜棗

各半

右加姜棗

○芩參守 杏 縮各五右加姜棗

各一

右加姜棗

各三

右加姜棗

各三

右加姜棗

止瀉秘方 參术苓 甘姜炮

訶木 蔴蔻 麝香 分煎服

粟殼圓 治暴泄不止 穩谷去蒂蔻炮

右爲末醋糊丸米飲下

木香散 治脾胃俱虛瀉瀉 空心炮

砂炒木白芍各半木甘各

右加姜棗

二神丸 治脾胃虛寒瀉瀉不食

砂炒四蔻生二右爲末以蜜四十九箇

生姜四兩切同煮棗燉去姜研東肉爲

膏丸桐子大鹽湯下加木半茴兩名四

神丸治脾腎虛腸鳴瀉瀉腹脹虛脹胸

膈不快飲食不化

五味子散 治腎泄 味二茱萸兩細者

右二味炒杏爲末陳米飲下

灸法 治吐瀉不止灸天樞氣海立愈

同陷下則灸百會 脾俞 中脘

關元 腎俞 大腸俞 長強

○痢病門九

傳丹溪曰痢疾乃外感兼內傷之候也須

分表裏治之在表者惡寒發熱身首俱

痛小柴去參棗加蒼芩生芍陳微汗以

散之在裏者後重窘迫腹痛下積早宜

以大小承氣酒煎大黃湯之類下之餘

邪未盡更以為藥湯膏連丸之類穢積

已盡而更衣未息者此大腸不行取令

故也以固腸丸參香散之類止之

○腹痛 白芍甘草爲君白朮爲佐惡寒

加桂惡熱加柏

○腹痛因肺氣鬱在大腸之間以苦梗發之後用荆葉一云實則可下虛則以苦梗發之

○初下痢腹痛用溫藥姜桂之屬勿用參术縱氣虛胃虛不可用

○後重者積氣墜下故乘升兼消木香枳榔丸方見腹痛門保和丸之類方見內傷門

○發熱不止者屬陰虛用寒冷兼溫藥升棄

○孔痛因熱流於下木棋芩連加炒姜又云久病身冷自汗脉沉小而孔痛宜溫暴病身熱脈洪大宜清之

○下血者宜涼血活血酸芩桃之類風邪下陷升提之

○溫熱下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛後重桂苓甘露飲方見暑門送下保和丸

○濕多熱少食少腹痛後重夜多利下胃苓湯平胃五苓合爲一方送下保和丸

○氣虛面色痿黃或枯白色疲倦廁頻併痛後重不食脉細弱或微汗出黃芩建中湯下保和丸

○濕熱爲痢不渴者建中湯加蒼苓下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍桂葛木苓下保和丸

○血氣大虛腹滿頻併後重不食或產後得此証因君方見虛門加白朮陳皮下保和丸

○下痢白積者芍藥湯加木陳皮滑桃湯下保和丸

○下痢日久而不能起於床不食疲弱之甚者用參、芍、地榆、縮、沃各分木升白蔻各三分右煎服。

君治痢主方 芍各二連 木枳 槟各一芽少。初後重加滑再加枳枳生弓再加條芩。日久後重不去此太腸墜下也去枳枳用條芩加升麻提之。

○白痢加木升陳滑初欲下之加大黃紅痢加白芩初欲下之加大黃紅白相交加白芩以理血加滑陳木以理氣有食積加枳實。

○傳芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也 白芍仁飯尾連茶各一大分其 桀 木 桂 各五 初後重窘迫甚者倍大黃加芒硝宿

○黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血 連 各二右

○芍藥黃連湯治便後下血腹痛謂之熱久不愈脉洪數及腹血稠粘者，李子為各二芽右煎服腹痛加桂三分

○黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血 連 各二右

○芍藥黃連湯治便後下血腹痛謂之熱毒下血 芍 各 連 各一 大 分桂半 分 芍 分 右

○大黃湯治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脈沉實者或初腹痛甚者窘迫不安者 大黃一味好酒浸半日前去粗煩服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯微其邪此乃蕩滌邪熱之劑

○香連丸 治下痢腹血相交裏急後重

連二十兩用茱萸十九兩同連以酒拌濕同炒去茱萸木八兩右爲

末醋麪糊丸米飲下加石蓮子半治禁口

痢充佳

益元散

治痢之聖藥也

白滑木

其一右爲末白水調下

神効參耆散 治痢日久穢積已少腹

不痛或微痛不後重窘迫只滑泄不止乃收功之後藥也

陳一兩蔻  
斐果衣  
四分芩  
火  
四分扁  
妙各木  
四分參

各一右爲末每服一錢七清茶飲調下

食遠

○祖傳和中散 治痢疾不分赤白久近

服之但發熱禁口不可服

陳木

卷六 菓一葉七分甘三陳倉米二砂糖

三粟殼  
醋灸一  
不半烏梅一箇右作一服加姜

三片棗一枚水煎

○二防飲

治痢後感寒濕脚膝腫痛名

鶴膝風 參术芪葛芍熟

地芍仲  
姜汁  
半分芩  
各半  
附皮膚  
浸三日  
三分風

已羌  
各半  
附皮膚  
浸三日  
三分風

右作二服入姜三片棗一枚

○禁口痢冒口熱甚故也用連參煎湯終

日呻吟如吐則再強飲但得一呻一下咽

便好又用細螺搗盦腋中以引下其熱又禁口不食者參苓白术散方見內加菖蒲陳倉米飲下或參苓蓮入些少菖蒲爲末與之齋次一開自然思食蓮陳

丹溪主方 治熱痢血痢

四黃散

連參柏枝白芍酸甘清

甘 桃 木 分 各等爲茶，糲丸加大黃  
米飲下

○一方 治虛弱患痢 参三白苓二

木 茯苓各一 蒼朮麵分七升五分

右水煎。下重加風酒飯各一 樟分

連炒沃各六 甘草滑炒各三分

○治痢後脚細弱 蒼朮兩白苓 极各二  
柏子仁爲末，粥糊丸四物湯加陳甘煎

湯下

○林黑丸子 治宿食腹痛飧泄赤白痢 方見  
內傷門

○駐車丸 治冷熱不調，下痢赤白日夜無度腹痛甚 連兩膠 白酒半姜一

兩右爲末，醋糊丸米飲下

○自木聖散子 治瀉痢久不瘥，并婦人產後痢 敏蔻 縮 榴皮 詞

姜炮陳 木芋 茯苓分水煎入乳香，未空心服

○加減平胃散 久下痢則脾胃虛損，而血不流於四肢，却入胃中爲血痢，宜服此滋養脾胃 木 茯苓各三 术 朴

陳各一 甘草參 連 白苓 膠炮蔻

各五，右爲末，每服五錢，姜三片棗一枚水煎去粗服。血多加桃。氣不下後重加枳木。膿多加膠。濕多加宋。腹痛加桂芍甘。熱澀加連。脉洪大，加大黃。承溫加芩沃。

○加減木香煮散 治一切痢，神妙

木 茴 皀 蔴 參桂 茯苓 詞

烏梅核膠 蝙蝠白苓各二 聖蜜半

在每服四錢，姜三片棗一枚煎去粗服。加味四君子湯 服藥已多，痢不愈，益

攻擊藏府之寒熱覺難安宜用和氣之  
藥 参 术 白芍 芍药

鑿 蜜加各等分 每服三錢 姜三片 蔗二枚

○百中散 治一切痢一日去五六十行  
只一眼便除 鑿 蜜加色四兩 朴 製四兩 右爲

朱米湯調下忌生冷油膩魚鮮等

○獨神丸 治痢疾 鑿 蜜加醋炒爲末燥蜜  
丸如桐子大每服五十丸。赤痢甘草

湯下。白痢干姜湯下。

○倉廩湯 治瘧痢俱作寒熱腹痛煩渴  
及禁口者 柴 一兩前 卷 杏仁 獨枳桔  
桔 参 李 杏各半升不加苛不加

參 半升不加苛不加 右分二貼 姜五片棗一枚倉米  
粒水煎服之三五貼之後後重脇痛寒

熱煩渴脉沉實以大柴胡湯宜下之

○葛根湯 治酒痢 葛根 半升 参 半升

生地 杏 各二升 木 一升 草 半升 右分

二貼 黑豆百粒姜五片白梅一箇水煎

○全真人養藏湯 治下痢膿血腹痛及酒  
毒便血 鑿 蜜加各等分 参 术 焙各

桂 八兩 茵 皮一兩 木 一兩 蔴 四兩 蕃 半兩 白芍 一兩

六 萸一兩 八 升 右水煎藏寒者加附

○調和飲 治下痢稍久者 白芍 二升

芩 木 連根二升 桃核 一升 五  
右水煎

○氣門十

傳內經曰百病皆生於氣也若不善攝養  
者五志之火無時不起五味之偏無時

不傷是以釀成腸澼固積留滯於太府  
候府藏不能傳導是故外邪得以乘虛

鬱火邪氣充塞乎三焦使氣血失其常  
候府藏不能傳導是以乘虛

而湊襲

○脈經曰、脈滑者多血少氣濁者少血多氣大者血氣俱多、脈來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少、細而緩者血氣俱虛代者氣裏細者氣少。

○氣結則生痰、盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯半夏爲主官桂佐之調氣雖用豁痰亦不可無溫中之劑

○集二陳湯方見痰門氣結于胸膈之間而爲痞滿刺痛伏梁等証者加連實桔萎木七氣湯治五藏不調三焦不和心腹痞悶、脹脇脹、腹浮腫、大使祕難參桂半各二、芍各一右作一貼、八姜三片、惠半兩桂一參、芍各五

○四七湯 治証同前方見痰門

○三和散 治証同前又治背脣痛妨食及脚氣攻竅腹滿悶、大使不通  
羌 蘿 沉 瓜 腹各一、芍六分、芩  
灸陳 木 桔 木 分各九 一方加生姜  
縮 燈心各一右

○木香飲一名流氣飲子治氣壅脚浮腫無不効 蘿青飯酒浸芍烏  
苓桔半、芍各一、芪參實炒風  
枳炒腹子姜汁浸十宿、陳二分  
木四右分二貼、姜三片、蘿二枚水煎

不香流氣飲 治氣痞脢脹脹面目

四肢浮腫二便秘

半

朴

青

蘿

梗莎甘

各一分陳去白

桂

枝

根

各六

通節

云

丁皮火

腹

霍

木

果

各六

通節

云

八門

芷

木

赤苓

瓜

參

菖

各四右無服四錢姜三片棗一枚

方去藿菖加沉枳

大黃

兩

一

方

去藿菖加沉枳

大黃

兩

快氣湯 治氣積心腹脹滿脅塞吞酸

痰逆嘔吐宿酒

香附

炒一

縮

四

廿

右爲末

鹽湯點服或入姜煎

抑氣散 治七情所傷中脘不快氣不

升降服脹

莎

炒四

陳

兩

廿

廿

廿

右爲末每服二錢食遠白湯點服尤妙

女人尤宜能

分心氣飲 治因憂思氣留滯胸膈痞

闊嘔吐頭眩口苦乾食或漸羸瘦

丁皮 肉桂各右入姜東東火心十莖

錢姜片

棗

心

十莖

氣

急

枳

炒

炒

炒

炒

炒

炒

分心氣飲 治証同前

桔

炒

門

蘿 腹皮各一木

桑

多

腹子

朴

各一

丁皮 肉桂各右入姜東東火心十莖

蘿合香丸

專能順氣化痰并治傳屍

骨蒸卒心痛鬼魅亦白下利小兒驚癇

等証

沉 麝

研詞皮

丁 木

安酒

升熬膏

莎

炒

撥

木

蘿薰

別

研

用無灰

脂

腦

研

各

硃

飛

烏犀

各二

右爲末

和勻用安息膏

并煉蜜和膏丸如梧桐子大空心溫水

化下四丸酒服亦可

○紫沉通氣湯 治三焦氣滯不能宣通  
腹脹便秘 木香 沉木各一克 蘿卜炒陳白亦可

甘草 桔梗各一兩 沉木 門味桑

芍藥 茜草 荆實 桂枝炒各半兩 右

○木香 桔梗丸 跛三焦利育膈破瘀逐

瘀 煙連 枳殼各一兩 柃柏大各三兩炒

牽牛末各右爲末水丸如桐子大每服五

十九食後姜湯下

○傳正氣天香湯 治婦人氣痛或脅腹脹中結塊刺痛因之月水不調或眩暈寒熱及胎崩產後一切氣証 烏半

莎六陳 蘿 姜各六分半右水煎

○沉香降氣湯 治氣不升降育膈痞悶吞酸 沉柏縮五甘草一兩莎童便浸

兩右爲末每服二錢入鹽少許白湯調

○全和氣散 治脾胃不和中脘氣滯脹滿嘔吐 青茴炒蒼 芎各一兩 陳去

桂良莎桔各三右爲末鹽湯點服

○順氣木香散 治氣不升降育膈引痛及酒食過傷噫酸 木香炒各一兩

桂木各一右姜棗前服或入鹽少許沸湯點下亦可

○紫蘿子湯 治憂思過度心腹脹喘促煩悶腸鳴二便不利肺虛累而瀉

木香炒各半兩 沉木 桔梗各一兩

甘草 桔梗各一兩 沉木 門味桑

芍藥 茜草 荆實桂枝炒各半兩 右

蘆子一兩 腹 莪 半 朴 木 陳

通 术 實炒耳參各半 右加姜末

○鍼灸法

憂死肢冷心腹口鼻溫目神不轉口無  
延舌卽不縮鍼合谷三分徐入出針押

穴復活入

驚死心下溫刺兌膏用針口中溫入三  
分徐出押穴

悲哭欲死肢冷身口溫針入中三分灸

百會三壯各

又法 神道五推下針三至

奔豚氣捨心不得息灸中極五十壯

徐氏

○灸心氣法男左女右掌內五指與寸之  
寸之脾心二條結于正坐脾心分開

加頭上以指按定磊於天突骨上兩邊

沉木參半青桔各半陳一

白芩 菖多腹流蘿通各三 右姜末

○瘧飲門 十一

○傳丹溪曰有熱瘧有寒瘧有食瘧  
瘧有風瘧有寒瘧有老瘧

○瘧脉皆弦微沉滑雙弦者寒飲偏弦者  
飲也沉而弦懸飲內痛肺飲不弦但苦  
喘短氣四肢歷節走痛脉沉者有留飲  
百藥不効閉脉伏而大者疾眼胞及眼  
下如炭煙薰黑者亦瘧也

○熱瘧用葛連

○濕痰身多軟而重用一下木又曰用芩莎半貝

○酒痰用蓼黛蜜丸噙化

○食積痰用麴芽查或化痰丸消積藥攻之

○風痰用星白附

○寒痰用半夏

○老痰用海石莎蜜五倍一云五倍子佐他藥大治頑痰

○痰結棲在咽喉嗽而不能出化痰藥加鹹能軟堅之味萎杏海石桔

翹少佐以朴硝姜汁蜜丸噙化

○痰在腋下非白芥子不能達在四肢非

竹瀝不行在腸胃間可下而愈

○肺浮當吐痰在膈上必用吐膠固稠濁

必用吐痰在經絡中非吐不可心中就

行之又服瓜蒂蘆薈等藥不用探吐

自吐

○油炒半夏大治濕痰又治喘心痛熟丸

生姜湯下

○二陳湯治痰之要藥也

欲下行加柏通已之類欲上行加升柴風之類

又曰加升提之藥能使大便潤而小便長

陳去白半湯治七苓朴草右作一眼加姜三片

○風痰壅盛喘咳加風寒星枳壳之類者

白附 天麻 蠟

○熱癓腹脹喘滿加芩連施萎滑膏瀝之類

類

○濕痰身重倦急加二木星之類

○酒痰加葛根宿曲芽之類

○寒痰加姜附益草豆蔻之類

○氣痰加木桺宿枳烏莎之類

○燥痰加姜杏與味之類

○陰虛咯血痰嗽加二門知柏貝母欽火船之類

之類

○如痰在中焦作嘔氣吞酸胃脘當心而痛或嘔清水惡心等証多加二丁木曲芽

芎宿莖葛根次寶連朱梔木換之類作丸服之

○嗜氣虛有痰者加參术

脾虛者宜補中氣以運痰降下水

芍藥芽兼用升發提起

○血虛有痰者加天門冬夢莎瀝姜汁，帶血者桑白皮桑

○傳痰在脾胃痛或痞滿加木曲芽宿之類

○在股下痛或澀行自聲加紫青草禹之類

○在經絡中或胸背手足臂膊痛者在上加葛風藤在下加巴通膝冬月加烏附行經

○在腰股膝下臍痛加蒼朮通柏薢膝之類

○如偏頭痛在右加芩芷風荆奇升之類在左合四物湯又加風荆奇細蔓紫酒片芩之類

○項痛者加芎藴升紫蔓細茴等

○丹溪加味二陳湯 道痰補脾消食行

氣

橘紅

芩

連

各分莎半

各分

不亨

矣二亨

蒼

白朮

各分

各分查半

各分

縮

芽麪炒各分右

麴芽別研餘

細切加

姜棗水煎調曲芽末服

各分

導瘻湯

治風濕瘻等証

半朴

星

裂根

橘紅

枳

炒各分

芽矣半加味枝杏五

各分

千鎧湯

治風瘻壅盛

半箇皂子

去皮芽矣一右作一眼入姜三片

各分

利膈化痰丸

星裂根

蛤

半具

薑

莎童便

皂皮

杏去皮

黛各分

等

右以前六味研爲末以皂角杵碎煎濃

汁擣杏仁如泥再以姜汁和蒸餅左

豆大青薰爲衣每服五十丸姜湯送下

各分

等

各分

神木丸

治瘻飲

芩

湯浸入

生芝麻

蓋研細取數

太棗

肉研細

者

各分

右以蒼木焙乾爲末以芝

麻漿及裏肉

和勻丸

梧桐子大

每服五七十丸溫

各分

辰砂化疾丸

治風化痰安神定志止

嗽除煩

枯礬研辰

研各分

半

兩右爲末姜汁糊丸如菉豆大碌砂爲

衣每服三十丸食後姜湯下

各分

右以青皮同巴豆入漿水內浸

宿次日同炒青皮焦去豆爲末水淹烏

梅肉蒸研爲膏入藥末和丸如菉豆大

每服十丸至十五丸姜湯下婦人頭風

眼愈蓋頭風是瘻飲所致也

芩辛散

治熱瘻壅塞頭目不清語言

不出 ノルテ 茸 シモ 細風 スリ 桔正 カク 堯 ヨウ

甘二半柔妙 カニハラタマタマ 苛各一右入姜 カクダツイチハツイ

○五飲湯 ゴウイントウ 留飲下 リュウイクシヤ 麻飲下 マエイクシヤ 薏飲中 エイエイクシヂ 溢飲

○膈流飲 カクリュウイク 腸間此五飲酒後及傷寒飲冷過多故有此痰 カクランシテシゴンジン

术参朴半澤猪前桂芍 ソクサンボクハツザイヒツケイ 右入葛根縮 カクレンシク

○蘿子降氣湯 ロコトシヨウキトウ 治虛陽上攻上盛下虛痰涎壅 カクランシヨウ 飯甘前朴各二桂

陳三兩白各蘿子半兩各五右入姜東 カクランシドウ 朴兩桂兩

○四七湯 シブシツトウ 治氣鬱痰涎如破絮或如梅核在咽端滿 カクランシヤウタマツ 蘿子半兩朴兩苓

桔梗半兩加姜東 カクシキハツノハシナシドウ 附炮桂兩半兩加姜東 カクボウハツノハシナシドウ

○桔梗湯 カクシキトウ 治胸腹脹滿短氣痰逆

桔梗半兩陳去白各實麸妙右入姜 カクシキハツノホシタハツノミツカク 附炮桂兩半兩陳去白各實麸妙右入姜 カクボウカクシキハツノホシタハツノミツカク

○枳术湯 シカツトウ 治飲輝氣分心下堅水飲不下桔炒桂草矣枳各七附炮

細术各一實麸妙右入姜 カクシキハツノハツノミツカク 附炮桂兩半兩加姜東 カクボウハツノハシナシドウ

○枳參飲子 シカツサンイニシ 治痰飲蓄心胃怔忡 カクランシヨウ 枳各二半兩加姜東 カクボウハツノハシナシドウ

赤荳半神木陳去白各二門兩沉 カクシキハツノホシタハツノミツカク 附炮桂兩半兩加姜東 カクボウハツノハシナシドウ

○甘妙 カニハラタマ 檉各半右入姜 カクハツハツイチハツイ

○哎嗽門十二附肺瘡肺癰 カイソウモンジツツウホウショウ 附肺瘡肺癰 カクホウショウ

○風寒鬱熱干肺夜嗽者 カクランシヨウセキカンホウヤイソウザ 三拗湯加知 カニシテ 脈大而浮者有熱加芩生姜，

○寒嗽以生姜切薄焙乾爲末糯米糊丸如芥子大空心清米飲下三十丸火峻者有聲痰少而亦芩姜海蜜石黛桔莎半訶青蜜

丸 嘴化

目錄一

九十九

○勞咳者盜汗出，痰多寒熱。四物加竹瀝姜汁。

○陰虛火動而嗽。四物合二陳加炒柏知，

○陰虛，咳嗽或吐紅者。四物加知柏五味參門參地骨。

○好色之人元氣虛弱，咳嗽不愈。瓊玉膏。最捷。

○咳嗽聲嘶者，乃血虛受熱用黛蛤粉蜜，調服之。

○痰嗽半身，藥各五錢，桔梗各二錢，枳壳一兩，為末，姜汁糊丸服。

○痰嗽因酒傷肺，藥杏仁如泥，黃連爲末，以竹瀝蒸鰐，煎入韭汁，丸服又用咸棗蜜丸，嘴化。

○痰嗽氣急，蒼朮三兩，莎草一兩，蘿蔔蒸杏，薑半兩各一錢，苓根各五錢，芎藭三錢，右丸服。

○主方杏尖去皮，白芍根各一錢，紅花半桔梗各五分。

○春多上升之氣，宜潤肺，抑肝，加芎藭半各一錢，炒芩知母各五分。

○春若傷風，致咳，鼻流清涕，宜辛涼解散，加風苛蘿炒芩門各一錢。

○夏多火熱，炎上最重，宜清金降火，加桑枝炒芩知母各五分。

○冬多風寒，外感宜解表，行痰加麻桂半風生干姜各一錢，肺經素有熱者，再加酒炒芩知母各五分。若發熱頭痛，鼻塞聲重，再加藁本前柴各一錢。若有痰加半枳，

○加藁本前柴各一錢。若風寒外感，宜解表，行痰加麻桂半風生干姜各一錢，肺經素有熱者，再加酒炒芩知母各五分。若發熱頭痛，鼻塞聲重，再加藁本前柴各一錢。若有痰加半枳，

風痰，再加星（姜汁）<sup>步</sup>。濕痰脾困，少食加二术。有痰口燥，咽乾，勿用半星，宜加知母水，吳茱萸粉。

知母水，吳茱萸粉。

○若夏月熱痰或素熱，有痰加芩連知膏。上半日咳者，胃中有火，加貝膏，運五更，咳者全止。

○黃昏咳者，火浮於肺，不可正用寒涼藥，宜加五味五倍訶子皮，斂而降之。午後咳者，屬陰虛，即勞嗽也，宜補陰，降火。加亨飯，熟地，柏知瀝，姜汁，天門，吳茱萸，補陰血也。

○若咳嗽久，肺虛滋氣補血，加參芪膠，飲，天門馬鈞酒，生姜之類。

○肺熱，喘咳去參，用沙參，此兼補血氣也。

○若勞嗽，見血，加膠飯，芍天門，知貝桑，亦於前肺虛陰虛二條擇用。太底咳嗽見

○血多是肺受熱邪，氣得熱而變爲火，火盛而陰血不得安寧，從火上升，故治宜瀉火滋陰，忌用入參等辛溫補氣之藥，然亦有氣虛而咳嗽者，則宜用參芪飲等，藥但此等証，不多耳。

○火鬱，嗽謂瘧鬱，火邪在中，宜開鬱，消瘧，用調皮便香附，姜半海石，黛半，爲末，蜜丸，噙化。

○痰積食積，作咳嗽者，用莎薑，海石，貝，黛半，軟石膏，查實，姜炒，連，爲末，蜜丸，噙化。

○久嗽有積，痰留肺，如膠氣不升降，或痰

溫與酒而作用，茜根（童便）蜜炒，海粉。

杏，薑，蜜，蜂房，爲末，姜汁竹瀝，調噙化。嗽，而心煩不安。六十散。一名益元散，一名加減。

○ 痰嗽寒熱交作者 小柴加知一方加

白芍五味桑

○ 夏日嗽而發熱 小柴加知一方加冬月嗽而寒熱 小青龍加杏

○ 二陳湯 治咳去痰伐病根陰虛血虛火盛乾咳者勿用

○ 咳嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱自除 枳桔各一麻風甘陳蘿通參等分如嚴寒去參加杏半

○ 潤肺散 治嗽而失聲 計五倍五味參甘分蜜九噙化

○ 拏湯 治風寒咳嗽喘急 麻根

甘生 杏各一粒半右加姜棗半

○ 溫肺湯 治冬感寒而咳嗽吐痰久嗽禁熱者勿用 半陳白五味 姜桂

桂杏各五細膠 甘矣各二右入

姜棗 苷各一不入

○ 葛根散 治感寒而嗽胸滿聲重

○ 蘿子 陳 赤芍 桑 麻各一 苓半

右入姜

○ 咳金沸草散 治感寒鼻塞聲重咳嗽不

○ 皂角寒熱無汗 荆朴麻節 前各三 甘

矣赤芍 半各一 旋右加姜棗

○ 橘皮湯 治感寒咳嗽頭痛上氣不得

下

○ 陳 苑 麻各一 杏參

枝 苓各二 右

○ 杏蘿飲 治上氣喘嗽目黑膚

○ 蘿分杏 五味 腹 烏梅各五 陳白

桔 麻根桑蜜 膠各半 蔡亨三分

芩分 右入姜

○ 東垣加減三奇湯 治咳嗽上氣喘促

○ 脾膈不利 桔 陳 苓 青 參

○ 蘭 桑 各五半分 杏三味四 右入姜  
桔青參加木貝名橘蘆散下 治傷風

咳嗽惡風有汗脉浮下

○ 東垣加減鴉白散 治陰氣在下陽氣  
在上咳喘嘔吐上 桑一地骨七陳青  
味參各五白參右入粳米二十煎  
寶鑑加減鴉白散 治咳而口乾煩熱  
胸膈不利喘促下 桑一地骨知陳  
桔各五細青芩甘草各右  
大橘皮湯 治面腫上喘上 滑九芩下  
木 桔各半陳各右

○ 平氣散 治諸嗽井 吐痰惡風不食  
參术 亨 叟桂味 甘瓜  
蘆子 神杏炒烏藥芷各等  
右入姜

○ 金平肺湯 治肺氣上壅喘嗽上 寒熱

○ 往來咽乾口燥 陳酒桔炒半苛  
蘿 乌梅去苑 五味知桑蜜  
杏炒銀星蜜炒各半 芎炙半兩 右入姜下  
○ 大降氣湯 治上盛下虛痰實喘嗽咽  
乾下 蘿子炒亨細前白培  
朴 桔 半 白芩 陳白桂 甘草  
等分右加姜五斤蘿五葉下  
○ 半夏丸 治肺熱痰嗽膏膿塞滿上  
蔓去 半培各等分右爲末姜汁麪糊丸食  
後姜湯下

○ 五参术調中湯 鴉熱補氣止嗽定喘和  
中進食中 茯四分桑分各二青分水煎早飯後服  
各二青分水煎早飯後服

○ 五味子湯 治咳嗽不已皮膚乾燥嘴  
血膏膿痛味桔苑甘續各二

卷之三

百三

桑各半  
右

傳祖傳潤肺除嗽飲 治遠年咳嗽如神  
參杏生甘芍各三味九粒 欽

菟草陳去白麻桔膏半桑蜜枳烏梅鑿蜜各五分右加姜三

片細茶一撮

○九仙散 治一切咳嗽乃擊其惰歸

乏藥也 参欬桑桔葛膠味

各一烏梅箇貝半鑿蜜各右入姜

貝母湯 治久嗽貝姜汁浸味

芩姜陳各二桑炒半桂各一

柴木甘各杏炒十粒右入姜

神功散 治久嗽桂一兩雄龜

半桂一兩右爲末吸喉中

○人參散 治遠年嗽麻節杏炒各

甘各四陳味桑鑿製各門各

菟草陳去白芍各三甘一姜

○神効寧嗽散 治勞嗽諸嗽通用

味芩桑炒蘿蔔細陳去枳杏

炒膠甘各半蜜臘各半半紅芩三右入

姜棗烏梅

○人參芎附湯 治勞嗽寒熱略血

白芍各二參半陳赤芩

膠味細甘各一分右入姜棗

紫菟膏 治肺熱久嗽身如火將成肺

勞杞通欬菟杏炒桑各

卷之三

卷五

一  
雨 大補右歸丸 煉蜜丸 夜間噙化  
五  
紫苑散 治喉血肺癆 参苑知

貝桔甘味苓膠右

人參養肺湯

嫩者參甘 肺病方  
杏炒桔炒實炒各一桑二紫四加

卷之二

知母淡芩湯 治肺痿喘嗽不已寒熱

自汗 惊其一雨知 吻 先  
苛半柴术歎桔門

兩各半  
芎  
膠格三  
右入生姜煎食後通

口腹入

○保和湯 治勞嘔膈火成瘧者  
知貝 天門 麥門 欸

妙味格二甘菊苑百合桔

蘓  
奇  
各

姜。瘧盛。

加施大連

腹蘿子 蘿

卷之二

實或口中咳，胸中悶，トウ痛，脉滑數者爲肺癰。要略先以小青龍一貼，解表之風寒邪，然後以葶苈大棗瀉肺湯，桔梗湯，華葉湯隨証用之。此治腫瘍之例也。終以黃昏湯補裡之陰氣。此治潰瘍之例。

草薑大棗瀉肺湯 治肺癰肺脹喘促  
不得卧 荘 一丁酉 煉蜜丸 如 薑爲紳末 大棗枝  
右以水煎大棗至一盞空著入荑

一丸，每煎至一盞，攬匀，眼乏。

韋葉二  
蕙半  
桃苗五十  
瓜瓣半  
右以

水一斗煮韋葉至五升去粗入諸葉  
取一升服當吐痰如粥而愈

桔梗湯 治肺癰心嘔氣壅咳散肺血

心肺煩悶咽乾多渴或兩脚腫滿小便

赤黃大使多盜 桔貝各一錢

蕙各八枚炒已桑芪各五

杏皮百合各三右作一服加姜五片

太便秘加大黃小便澁加大通一方有

正草絡一右水煎食後服一方無異

芷有產一

又方治前証

桑白桔貝

黃昏湯 治胸中甲錯隱痛知爲肺癰

合歡皮一錢以水三盞煮取一盞半分

二服而愈方見中風門一

○瀉白散 治喘咳嗽胸痛胃滿氣促肺經

蘊熱等証桑白桔萎升半

杏皮骨格一錢分右入姜

升麻湯 治肺癰脅乳間痛吐膿血

腥臭升桔蕙地榆拳赤芍

牡生芍各三

○四頤湯 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶

咳嗽食

花去桔炒各一兩芍各半右

理肺膏 治肺癰咳嗽不利脅膈迫塞

阿桂去

百藥煎味微

條參去苦款葉

杏 知 貝 舐夢 菴 百合 苟 节

格 五 右爲末，白茅根三研取，自然汁。

砂器熬成膏，更入蜜二兩，每熬和前藥。

丸溫水下。

○治肺癰，薏米末，糯米飲調下，或入粥內。

煮喫亦可。一方水煎服，當下，膿血便愈。

○咳嗽，灸法。

○灸兩乳，下黑白際，各數十壯，即瘥。

○又以菖蒲，當乳頭周匝圍身，令前後正中，當脊骨灸十壯。

○又上氣咳，嗽短氣，氣滿食不下，灸肺募五十壯。

○上氣咳逆，短氣風，勞，灸肓一百壯。

○上氣咳逆，短氣胸滿，多唾，冷痰，灸肺俞五十壯。

○林從太推下第五節，下六節，一月而瘳。

年

壯

○喘急門 十二

傳：凡喘者，由痰火內鬱，風寒外束而致之。又有陰虛，發喘，氣從臍下起，直衝清道，而上，又有氣虛，發喘，短氣不能以接續。戴氏曰：凡喘，則有痰聲者，痰也。乍進乍退，得食則減，食已，則喘者，火炎也。

○九喘未發時，以扶正氣爲主。已發，以攻邪爲主。

○火急甚者，不可用苦寒藥，火盛故也。宜溫劫之。

○却藥用椒目，五七錢，研爲細末，生姜湯調服。喘止之後，因痰治痰，因火治火。

。 千緒湯 治痰喘，不得卧，入牀而坐數日，丁服而安。一方用導痰湯合，千緒

湯服。二方並見

。一方用蘿蔔子一兩，蒸熟，急用五木燒茶，研細，海粉各一星，甲子半錢，一冬半研細，兩右爲末，煉蜜丸，噙化。

。一方 治喘而嗽，用星萎半步沙，蘿蔔子，皂角，爲末，神曲丸，姜湯送下。一方有杏仁。

。氣實，因服更甚，過多而喘者，宜用三拗湯。方見

。三拗湯 治肺感風寒，喘急不已，咳嗽，葶苈大棗瀉肺湯 治肺壅，脹胸，肺滿，闊上氣喘急，身躬面目浮腫等証。方見

。濟生葶苈散 治過食煎燙或飲酒過度，致肺壅喘，不得卧及肺壅，口燥，不渴，効尤捷。

。祖傳秘方 治遠年喘急，升薑，桑蜜，葛分各八分，右依眼加生姜五斤。

。瀉肺內臺蟲糞一升，蘿蔔半升，杏半升，不

甘二兩，石烏，細末，湯浸蒸餅丸，如梧子，大，每服五七十丸，淡姜湯送下。

。又用猫兒頭骨燒灰，酒調一二三錢，一服便止。

。林氏液散 治久逆喘嗽，口乾渴。方見

貝妙知各四參二其不一右

○人參胡桃湯 治喘急不得卧

參一

半胡桃肉五十箇湯浸右作一貼加姜片三

胡桃皮取下

杏炒皮胡桃肉

仁煎

海蔴散

杏法皮

右研膏煉蜜丸如彈子大每服

分

丸細嚼臨卧姜湯下

又胡桃肉三箇

姜片臨卧嚼吃飲湯二兩

口每嚼再飲就卧

○人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲

胸膈緊滿

參麻節去

半

膠炒

甘草各一桑葉味各二分半

蜜炒

右

分二貼入姜三斤

安神散 治喘嗽

蜜蜜參

陳

白芍等分右爲末每服一二錢煎烏梅

湯調食後服

○人參散 治喘嗽

桔梗一升三參

調服亦可

○一方 古文錢七箇

白梅箇七

右水

浸二宿空心一呷良久得吐効

○杏仁飲 治身熱咳嗽喘急

柴前

枳 柑 蘿 陳去半

井炙芩參

杏各等右入姜

○清氣散 定喘止嗽

蜜味吳

棗 蘿 井 青 陳去枳

欵各等

慢火炒焦水煎加生姜半夏充妙

台山蜜陳去

星桂半桑炒姜參各等

桔 右入姜

○人參湯 治上氣喘急不得卧者

參分

神

治上氣喘急不得卧者

參分

參分

卷之三

分氣參之，則肺胃不和，氣逆喘促。

宋 桑 叶 莠 莠 腹 突

仁龍人紫即水王美塲小言一

味半參門杏橘白生姜各二錢，

右  
帝命三十七天災七

卷之三

卷之三

淨光寺

萬法時金華錄

卷之三

今古以來無第一絕唱也

卷之三

卷之三

...and the last time I saw him he was wearing a tattered shirt and a torn pair of shorts.

A large, dark, irregular shape, possibly a stain or a piece of debris, visible against a lighter background.

卷之三

the first time in the history of the world, the people of the United States have been compelled to go to war to defend their country.

卷之二



Kitasato Memorial Medical Library