

醫法明鑑

※  
i 39

F  
1-123

490.9  
TH-10  
3

No. 2103  
10 | 39



富士川文庫

1314



醫法明鑑卷之一

中風

一。附癆痺。瘡麻

一。三賢風因

○傳河間曰將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也夫五志過極皆爲熱甚俗云風者言未而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或因憂患思忿怒傷其氣者多有此証狀歲之時無有也若肥盛者間而在之亦是形盛氣衰故如此耳

丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛西北二方真為風所中者在之東南之人皆是濕土生痰痰生熱熱生風也

一 真風類風之辨

○惠有真中風邪者有類于中風者不可一槩治

○傳因風者真中風也從昔人而治之因火因氣因濕者

類中風而非中風從三賢而治之

一 真風經臟腑之辨

○惠面加五色有表證脉浮惡風寒拘急不仁中腑也

○加減小續命發表調以通聖辛涼之藥

○唇緩失音鼻塞眼翳耳聾便秘中臟也難治三化湯

○通其滯調以十全四物之劑

○外無六經之見證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言

○中經也當從中治太秦艽湯補血以養筋

一 真風類風不可為二途

○傳中風蓋因先傷內而後感於外之候也但有標本輕重之  
不同耳

古人論中風者言其証三賢論中風者言其因真中風邪者未  
必不由氣虛虛弱然後感於外邪經曰邪之所湊其氣必虛  
是也因火因氣因溫者亦未必絕無外邪侵侮而作也若無  
外邪侵侮則因火因氣因溫各自為他證豈有喘僻癱瘓暴  
仆暴瘻之候乎豈可以一中風之證為二途哉治法外感  
重先驅外邪而後補中氣內傷重先補中氣而後驅外邪  
或以散風藥為君以補損藥為臣使或以滋補劑為君  
以散邪藥為佐使

一 似中風之數證

○惠傷熱証卒暴僵仆者類中風氣激痰碍心竅類中

風宣吐後調理 痰証諸癥諸脾皆類中風 尸厥痰厥

氣厥血厥酒厥各口似中風

○林氣中者暴怒傷陰暴喜傷陽憂愁不正氣多厥逆便

涎潮昏塞牙關緊急似中風灌蘇合香丸醒後隨寒熱

虛實而調之中風脉浮身溫多痰氣中者脉沉身冷

無痰 酒溫之病作痺證口喚斜半身不遂舌強不正

似中風當瀉濕毒

○玉口眼喚斜半身不遂之病豈止風之一端而已况六氣皆能  
中入有縱急搐搦不知入等證不苟不以脈証分別也  
口噤筋急或由風熱甚勝溫或因津液滯胸為痰則筋大  
燥或筋反緩者乃燥之甚血液衰少也故經曰諸筋緘  
易愈燥證微也筋痿難復燥証甚也

○林風病外感善行數變其病多變故表行滯瘻証內  
傷起肺熱四肢不舉舌本強足痿不收痰涎有聲皆

是虛証無寒可散無實可瀉

○玉後世編集以外中風邪客而與內傷瘻証交同出治此  
千古之弊也

○心理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜鳥藥  
順氣八味順氣之類理血者無表裏之急証唯血弱舉  
發不時者用大秦艽羌活愈風之類已上皆不可用風藥

者也

### 一、緩急之治法

○纂丹溪曰大率主血虛有瘀或挾火與溫治法以瘀為先補養  
次之

語

○傳初得之即當順氣及日久則當活血  
省人事或痰涎壅盛舌強不語兩寸脉浮大而實急用吐  
法入迎脉緊盛或六脉俱浮強者急小續命表之看此  
挾見証與時令寒溫加減施治病勢稍退精神稍復當改  
用補氣補血清痰之劑調養其本氣而安此急則治其

凡久或手足漸覺不遂或辟股及髀指節麻木不仁或口眼喎斜言蹇或胸膈迷悶嘔痰相續或六脉弦滑而虛軟無力雖未致倒仆為中風暈厥之候早當從丹溪之法而調治左脉不足及左半身不遂以四物補血之劑為主治右脉不足及右半身不遂以四君補氣之劑為主治痰盛者二陳導痰等湯兼用氣血兩虛而挾痰八物加半星實瀝姜汁之類若真元漸復痰飲漸消或覺風邪未退者仍以養活愈風防風通聖之類出入加減調治而安此緩則治其本末而標之之治也

一卒風治法

五急中卒風氣絕不語至寶丹主之連進生姜汁  
○灌初中風卒倒牙關緊急不省人事蘇杏圓灌之俟其甦  
○便不用辛脉証從法而治之  
○惠瘀雍盛者口眼喎斜者不能言者皆用吐法瓜蒂散稀涎  
○散口噤者灌入鼻內虛甚者不可卽吐

○年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可吐  
○傳肥人中風口喎肢麻不分左右皆屬痰用貝葵守同  
陳木連百芩云羌荆葳薄桂行經降火

又白肥白人多溫烏附行經童便煮浸八鹽下行尤捷

瘦人中風屬陰虛火熱四物加藤芩百在痰加治瘀藥

○肥人中風者以其氣盛於外而歉於內也肺為氣出入之道肥者氣必急瘀從壅盛所以急之必先理氣

### 一 半身不遂左右之辨

○半身不遂大率多痰在左屬死血少血宜四物嬰紅瀝姜汁在右屬痰與氣虛宜陳四君瀝姜汁

### 一 辨治

○醒後小便少不可利之汗液外亡榮衛枯竭無以制火熱退汗止小便自行中風遺尿氣虛參芪補之飲食坐卧如常但失音小續命去附加葛根○中風証内外邪已盡當服愈風湯以道子諸經久服大風悉去縱有微邪加減用之然治病之法不可失其通塞或一氣之微汗一旬之通利如此為常治之法

### 一 脉辨

○太法中風脉浮遲者吉急疾者凶寸白脉浮而緊緩而遲皆曰中風脉經曰浮而大者風被風不仁痿蹙其脉虛者生緊急疾者死也

### 一 不治之證

○口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕喉聲鼻肺絕也林髮直吐沫搖頭上竄直視口開手撒眼合遺尿不知人或面赤如粧或頭面青黑汗綴如珠聲如鼾睡皆不可治

### 一 灸治

○風中血脉口眼喚斜聽會頰車地倉左喚灸右喚灸左

風中腑手足不遂 百會肩頸曲池風市足三里絕骨

四肢麻痛在左灸右在右灸左

風中臟性命危 百會風池太推肩井間使曲池足三里

中臟氣塞涎上不語

心憤肢麻灸之各至年壯

凡中風治法莫如發表攻裏調氣養益治癒若要取全功宜艾灸

○林凡五藏中風各灸其本藏之俞百壯皆服續命湯救之

治風之法太段宜灸

凡心中憤亂神思不怡或手足麻痺此將中風藏之候不問

風與氣可速灸

中風眼戴不能上視者灸三推第五推上五壯或七壯齊下

火立愈

○朱音不言灸天窓

目反口噤腹痛灸囊下第一橫穴十四壯

中風口噤灸承漿水巨闕

一通關竅之劑

○林摘鼻法

治卒中風不省人事牙關緊急藥不下咽者

細洗去

土葉猪牙皂角各等分

用竹管輕輕吹入得嚏後進藥

髮立甦有嘆者可治

治大人小兒禁中風

皂角炙去蘿蔔皮右以皂角研末

如無右以皂角研末

用蘿蔔子同米醋研雞翎拂藥塗鼻即甦

皂角散 蘿蔔子 猪牙皂角各等右為細末每服二三錢

水煎熱服半盞即吐

麝射香散

治卒中風瘡倒地癱瘓口嚼諸藥未服者服之

真鹿射香

二  
真香油

二  
右麝香研細入油攢勻開口灌之自

甦蓋

鹿射香通關節可以行至病所也

稀涎散

治風涎不下喉中作聲如鑿鋸

豬牙皂角

一寸右水煎入姜汁少許服不能嚥者徐徐灌之

○稀涎散

治中風痰涎壅盛口眼歪斜

明礬一兩半枯猪牙皂角四英去皮右為末每服一二錢溫水

調下以吐為度

獨聖散

治諸風痰盛及諸癰瘍飲壅溢等證

葫瓜蒂

一兩炒黃色

右為細末每服半錢或一錢量入虛

實用之以酸蘇韭汁

調下以吐為度凡行吐法宜於天氣清

朗之日行之晦日難得吐病暴急者不拘先愈病者隔宿不食如服藥不吐再用熟蘇韭水投之如吐風瘡者加全蝎

半水微炒如有虫者加猪油五七點雄黃末一丁甚者加芫花末

半錢立吐其虫

一。導痰之劑

○三生飲

治卒中不知人口眼喰斜半身不遂痰壅喉鳴及

氣厥瘀厥眼暉

南木香一升南星六升川烏附子各生各

右煎服

胥風湯

治中風痰涎壅塞口眼喰斜半身不遂不知人

半風甘炙白附

川烏生木

星生各

一升

蝎小加姜

貝母瓜萎湯

治肥人中風口喰麻木左右俱作痰治

貝萎星炮荆風羨

百芩連术

陳曉

白

- 半 薄桂 甘炙威 天花粉各等右加姜煎至夜服  
 祕方 白丸子 治卒風半身不遂 口眼喎斜痰涎壅盛喘  
 急咳嗽胸膈滿悶及小兒散馬風婦人血風大半夏湯泡  
 白附 泡星洗 川鳥炮去天 蝎毒去木 枳麸燬各右為細  
 末姜汁糊丸如梧桐子大每服二三十九臨卧茶清下熟  
 水亦可 小兒驚風生姜薄苛湯下  
 ○解毒雄黃丸 治中風牙關緊急及痰涎咽喉腫閉如  
 牙關緊閉開口灌下 醒雄飛各二巴十四分右為末  
 醋煮麥糊丸蒙古大每服七丸熱茶清下吐去皮油  
 東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用  
 仲景謂汗出則止藥 已 桂 苓 杏 白芍 甘炙  
 ○小續命湯 治暴中風不省人事漸覺半身不遂 口眼喎斜  
 盡姜五束丁枚前分服 精神恍惚加茯神遠志  
 語言蹇涉肢體麻痺神情昏亂頭目眩暉痰涎多  
 李子仁治寒症前分服  
 骨筋煩疼有熱者去附倍芎  
 骨筋疼痛倍加桂附  
 藏寒下利去巴苓倍附加朮  
 腿膝弱加膝斛一 身疼加羌活 呕逆腹脹加半倍參  
 朱音加杏無汗惡寒倍麻風杏 有汗惡風倍桂芍杏  
 身熱無汗不惡寒加知膏去附 身熱有汗惡風加葛桂芩  
 無汗身涼倍附加姜 有汗無熱倍桂附甘  
 肢節痙攣痛不仁加羌活

消風散

治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻喚聲重耳鳴皮膚癩痒癰疹婦人血風頭皮腫痒

荆穗甘草

鳴皮膚癩痒癰疹婦人血風頭皮腫痒

荆穗甘草

卷 蟬蛻去砂 蕁藿

芎 風 茎炒芩 參各二陳

去穰焙

朴 姜製各半兩

右為細末每服二錢

感風頭疼鼻涕用酒

茶湯茶清調下遍身瘡癬溫酒下

八風散

治風氣上攻頭目昏眩肢節拘急癰癧癰疹鼻塞

聲重

藿去土半竹

芷 前各一

芍 甘 參各二

卷 風

各三右為末每服二錢薄苛湯調下食後服茶清亦可

卷活散 治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪塞壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陽風雨預覺

不安

前 卷 麻

白芩 芎 甘炙芩 蔓枳

細

風 腦剔

菊去梗薄右必咀

每服一兩姜四片薄苛三葉水二盞煎至一盞去滓溫服

去麻細膏

菊加參天桔

清氣宣風散

治上焦風熱膈痰目赤耳鳴

芎 茄 半

生地

蚕桑各八分

白朮

白芍各一

風 甘菊 枳

荆

升連

梔子炒各五分

蟬退炒芩六分

甘三分

右分二貼水二盞

姜三片棗一枚食遠溫服

一去風順氣之劑

○林鳥藥順氣散

治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻凡

卒中手足癱瘓

言語蹇涉者先宜服此藥以疏氣道然

後隨証投風藥

麻節去根陳去烏各二蚕炒芎

半

桔 枝炒各一兩

姜炮半兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分溫服

憎寒壯熱頭痛倦怠加葱白三寸

身躰不能屈伸溫酒調服

癰瘻搘之成瘡用薄苛煎常服

人參煩氣散 治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風服此藥  
疏通氣道然後進風藥 參 姜各一芎 甘炙桔

朴 术 陳去麻各四葛半兩 葛三兩 右每服三錢姜三片

棗一枚薄荷五葉煎七分溫服

八味煩氣散 中風先宜服此次進治風藥 术 白芩

青去芷 陳去烏 參各二甘炙一右

煩風煩氣散 中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

术四天參各一沉芷 青 甘炙蘇 丹各半烏三

右分二服水一盞姜三片煎六分食遠溫服或風濕腰腿  
疼痛亦宜服之

勾氣散 方見心治心脾疼 术 半 甘 苓各三沉 參

陳青 台烏 芷各二天 木 茯 苏各一右八姜

○防風天麻散 治麻痺走注肢節疼痛 風 天 芗

芷 川鳥 白附 荆 白 甘 茯各半滑二右為末熱

酒化蜜調服覺藥力運行微麻為度或蜜丸熱酒化  
下白湯化下亦得

○傳大秦艽湯 中風外無六經之形證內無便濶之阻隔知血  
弱不能養筋筋故手足不能運動舌強不能言宜養血而  
筋自榮此方志之 芫 甘 萸 白芍 膏

浊 白芩各一芎 术 生地熟地各五

細半右作二服水煎如遇天陰加生姜三片

心下痞滿枳實一錢

羌活愈心風湯 治腎肝虛筋骨弱語言蹇澀精神昏

憤安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無邪服

此以行中道、卷甘風蔓芎細枳熟地

參麻苛菊飯知芍地骨拘子獨

芷仲芍紫守朴西巴各三白苓

芍各四膏蒼生地各六枝一分半

天陰雨加姜三分右作一服空心一服嚥下

望春太寒之後加柴半參各三迎而奪陽明之氣

望夏之月加膏芩知各三分迎而奪陽明之氣

季夏之月加巴木芩各三勝脾土之湿

初秋太暑之後加朴華佳各三分迎而奪太陰之氣

望冬之月加桂各一反三勝肝之氣

大防風湯去風順氣活血壯筋又治痢後脚弱緩痛不能

行名曰痢風或兩脚腫痛足腫枯腊名曰鶴腳風而麻痺

瘦軟風濕挾虛之候服之如神

風熟地白浸芍

自芍仲姜汁拌炒絲木一茶匙參

附炮各七右作一服水一盞姜五棗一枚煎至一盞空心溫服

○林天麻丸治風因熱而生熱勝則動以靜勝其躁是養益

也此藥行火榮衛壯筋骨生地一錢十四分十仲七

天膝酒浸三錢草薢玄參各六附炮一兩一方有獨活五

右細末煉蜜丸

續命散治風氣留滯心中昏憒四肢無力口眼瞇動或

時搐搦及產後中風自汗宜服之

風獨飯參

右每服工兩生姜三片汗不止加蠅頭一錢

○全八寶回春湯治諸虛不足風疾脉絡拘急痰涎壅

盛飲食不進 中風外有六經之形證先以加減小續命治之若內有便溺之阻滯以此湯導之 白芍五兩 茵三兩 木二兩 半一兩 生地半兩 熟地半兩 桂白 鳥神 姜陳各一兩 附炮參沉 麻節 茅巴 莎杏 風芎

板白 神陳各一兩 沉沉 小鳥炮各半兩 右加姜末束

一去風清熱之劑

○林防風通聖散 治諸風潮搐手足癱瘓小兒急慢驚風 大便結閉大熱暴甚 腸胃乾燥裏汗咬牙上竄睡語 筋轉散馬憐肉 蠕動風 芎芍 飴大 芒芒 鞘芍 麻分半七 膏膏 檀桔 李木 荆荆各半 甘甘

滑各半 右加姜束

止清散 治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍 芎芍 乳荆穗 没水 各一兩

用一字鼻內噙

右為末每服二錢 姜三片水一盃

獨活散 消風化痰治頭目眩暈 細風 藁藁 旋旋 蔓蔓 芎芍 独各一兩 膏甘 各半 右為末每服二錢 姜三片水一盃

盞煎七分後 热服

一攻裏通滯之劑

○休三化湯 中風外有六經之形證先以加減小續命治之若右分二服每貼水二盞煎八分去粗 食前溫服微利則已 惠製慧濟方 治中風六七日太便秘結煩劇轉增

升升 柴柴 茶赤芍 枳炒大 麝米生桃去皮 芒芒 麻仁殼 將桃仁以下三味并生大黃一半研細貯碗右將升麻以下五味并大黃剉水煎數沸攪勻用冰冷服

一鎮神之劑

○傳二參丹

治健忘養精神定志和盜

丹參 熟地

天門各一入參

丹砂 遠

菖各五神

炙甘 麥門各一

右為細末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心以愈風湯下

四白丹

清肺氣養魄中風昏冒氣不清利者宜服之

芷一

檀 巍 独

藿各一

白芩

木

縮

參 風

甘 蒜

芎各半知

細各二

甜竹葉二

苛三

鹿麝一字另研

牛黃

腦各半另研

右為細末煉蜜丸

每兩作十九臨卧噙

丸分五七次噙以愈風湯送下

○補至寶丹

治卒中急風不語中惡氣絕及心肺積熱小兒諸癇急驚心熱並皆治之

生烏犀屑硃砂飛雄飛玳屑

琥珀各一

鹿麝

腦各一半

牛黃

安息二

半為末以無灰燭酒

琥珀各二

慢火金箔

一丁米入藥銀箔各五

右將內同爲田朱研

息番膏重湯煮凝成後入諸藥中和剉丸如梧子大入參湯化下二十丸

湯化下二十丸

牛黃清心丸

治諸風緩縱不隨語言蹇澀痰涎壅盛心怔健忘或發癲狂

羚一

風

木

白芍

門

芩各一

犀

麝

腦各一

參

麴炒蒲黃炒各二

兩半

白芩

芎紫桔

杏

各一

西黃

二冬半另研

雄各二

另研

半酒

大豆黃卷

桂

膠各一

兩

大棗

一百個蒸熟去皮成膏

金箔

入餘藥和勻煉蜜同棗肉膏為丸每兩作十九以金箔為衣

每服一丸食後溫水化下

珍珠丸

治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守狀如驚悸

珍珠母

三分研

飯

熟地各一半

參酸棗

柏子各一

犀神

沈 龍齒各半 右為末，煉蜜丸如梧子大。辰砂為衣，每服四

五十九，金銀薄苛湯食後吞下。

大辰砂丸

清頭目化痰涎及感冒風寒，頭目昏眩皆治之。

天 茄

甘

炙芷各一兩

風二兩

細

苛各半兩

辰一兩右七味為

細末，煉蜜丸如彈子大。

辰砂為衣，每服一丸。

細嚼食後，姜湯

下茶清亦可。

### 一、雜方

林

○復母瓜萎湯 治肥人中風口喎，麻木左右俱作，痰治。

貝 菓

星炮荆 風 紫

百 茅 連

陳 白

术

半 薄桂 甘

炙藏 天花粉

各等分

右每服七錢水二盞，姜

三序煎八分至夜服。

資壽寧鮮語易

台中風口喎，舌強不語，半身不遂。

附炮

風 酸

天 各二兩

羚 桂

各二兩

甘

卷 各一兩

右分三貼，每貼水二盞煎八分去粗入竹瀝二匙，再沸服。

稀荳丸

治偏風口喎時吐涎沫，語言蹇澀，筋脈拘攣，緩弱。

久眼耳自聰明，此是烏筋力壯健。

五月五日六月六日採洗去土，摘取葉九，蒸九，曝每次蒸用酒蜜

水洒之，蒸飯久曝乾如此，九次為末，煉蜜丸如桐子大，每服一百丸，空心溫酒或米飲送下。

驗活丸 治風氣不調，頭目昏眩，痰涎壅滯，遍身拘急，及風邪壅塞，頭痛，天陰先覺不寢。

卷 甘菊 麻

芎 風 前 膏 茗

甘炙細

枳

白芩 蔓

去皮各一兩

硃砂

一兩半右為末，水糊丸如桐子大，每服四十丸，姜湯送下。

臨卧食後

一易簡

目錄一

○林治中風口眼喰斜 括樓絞取汁和大麥麴作餅灸令熱熨  
正便已勿令火過 正便已勿令火過

又 巴豆七枚去皮 爛研 嘴左塗右手心 嘴右塗左手心仍以  
燼水一盞安向手心須臾便正洗去藥并頻抽掣手中指用草  
麻子亦可

一方皂角二兩去皮弦子炒為末 醋調敷

又 桂心酒煮取汁故布蘸擗病止即止左嘴擗右右嘴  
擗左常用大効

治風壅痰涎多呴瞞不利

牛蒡子

微

荆穗各一

甘

炙半

共

甘

兩

共

為末食後臨卧湯點二十錢服

牛蒡子

微

荆穗各一

甘

炙半

共

甘

兩

共

一方五月初午時取蒼耳葉暴乾為末 酒或水服方寸  
匕日三服作散若叶近蜜九淮言一方也風輕易治者再服  
若身有風處皆作粟肌出或如麻豆此風毒出也以針刺  
瀉去之黃水出乃止 五月五日多取陳乾着大瓮中稍取用  
之若時氣不和舉家服之并殺三虫腸痔一周年服之佳  
七月七日九月九日採用之

一痛風并痺証

○夫古之所謂痛痺者即今之痛風也諸方又謂之白虎壓

節風丹溪曰大率因血虛受熱又曰濕痰濁血流注為病

大法用蒼星 芎 芍 白酒芩

在上加羌枝 桔 蔻 在下加膝 已 通柏

因瘓者 二陳加酒洗芩 蔻 因濕者用二木佐以

竹瀝姜汁及行氣之藥

加味四物湯 治白虎歷節風

本方加桃膝陳苓甘芷膽

在上者加羌枝歲

在下者加膝巴通柏

氣虛加參术板

有痰加星半生姜

血虛倍飯芎佐以桃紅

加星半生姜

一方 治上中下痛風

連酒

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各

兩桃芷已各五

歲酒

梗橫行各二宿

炒枝手臂卷各三

膽一木酒紅

五分

右為末神麌糊丸如梧子大每服

一百丸空心服

大恙活湯 治風濕相搏肢節疼痛

連酒

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

蒼歲已木板芩

連酒

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

煎至一盞去粗空腹溫服

四妙散 治走注疼痛

連酒

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

一方 治飲酒濕瘀痛風

連酒

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

白芥子炒右為末每服一錢匕姜湯下

柏酒炒歲

乾五木酒炒各一

姜湯調下

卷

甘炙名陳去芍各三右為末每服一錢匕姜湯下

柏酒炒歲

乾五木酒炒各一

姜湯調下

卷

荆羗獨芷蒼歲實片芩酒桔葛芎各

一

風

麻節去根赤芍各一

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

赤甘飯梢升各三

下焦

柏酒

婦人加酒紅

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

腫多加枳腹

升各三

下焦

柏酒

婦人加酒紅

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

瘀血用桃仁

升各三

下焦

柏酒

婦人加酒紅

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

二眇散 治脚膝溫熱成痛

柏酒

蒼米泔浸星各二

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

宿四右為細未沸湯入姜汁調服或為丸姜鹽湯送下

柏酒

蒼米泔浸星各二

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

氣竇者加少酒佐之

柏酒

蒼米泔浸星各二

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

暗行散 桔一味酒浸曝乾為末每服方寸匕四物湯調下

柏酒

蒼米泔浸星各二

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

蒼米泔浸星各二

麵炒芎各一

獨七分

手臂痛是上焦溫痰橫行經絡中作痛也

半酒芩木

星莎各一貴芩各五蒼一冬歲三甘分右為二服生姜

五斤水一盞煎至二盞食後服

加味二陳湯治臂痛

本方加酒芩

卷歲入蜜水

煎食後溫服

一方治偏風神効

赤芍青歲木散

各一紫歲芍

風各七分半甘五分右酒煎服

治婦人胸背腰走痛

赤芍莎柏各一枝

蒼木歲各半冬

治走注疼痛葛蒼枝板桃去皮尖炒生桃七甘二

芍一冬右加生姜五斤水煎入童便竹瀝各半盞再煎熟眼

舒筋湯治臂痛不能舉是氣血凝滯各不通行所致一名五

痺湯效如神片子姜黃二冬甘煑桂各半海桐皮去外

赤芍木各一右作一眼生姜三片水一盞半煎至二盞去

粗沉香麝水許入內溫服

加味二妙丸治兩足濕痺疼痛或從足跗

蒼木板

酒浸膝歸尾酒草已板

各一兩

右為末酒煮麩糊丸如

林梔活湯治白虎歷節風毒注骨髓疼發不定

卷四分

附炮芍桂木芍白膝酒洗桃尖炒骨碎補風各一

甘分右分二貼姜五片

加減地仙丹治風冷邪濕留滯下焦足膝拘急腫痛

地龍炒去

靈脂石鳥

白膠香研椒紅洋

歲爪小豆炒

黑豆皮炒去天仙藤川鳥皮炒去五加

蒼木別去蔻油

各等分

右為采酒糊丸空心鹽酒湯下

○惠仙酒方 治諸風疾手足拘攣半身不遂

膝 芫 桔

風 羌

晚蚕沙

洗淨炒各二兩 柏升蒼二升牛蒡根去粗皮大麻子

各一牛蒡子

右為末糯米酒二斗

石器內浸藥封口七日

秘傳藥酒方 治男婦風濕相搏腰膝痛及風濕脚氣

開封勿令面近瓶口恐藥氣犯眼日進三服每

一日盡

正 桔

半 巳

芎 苓

桂 芎 麻

甘 各一

朴

歸 凰

陳 枳

獨 楸

各一

膝

鳥

各二

蒼

四兩米泔浸一宿炒

仲 伸

右剉布袋貯用無灰酒三斗

蒸封口煮一時久

過三日後取酒飲盡粗晒乾為末酒糊丸如梧子大七八十

丸酒下

茯苓湯 治癰瘍四枝

治癰瘍四枝

赤苓

桑格二兩

肉桂

甘草一兩

芎 麻

各一半右入姜束束水煎溫服以姜粥投之酒池薦度

着

痺留注加歸甘

○平防風湯 治血癰皮膚不仁

風 独 附 芫 赤苓

赤芍

芩 各一桂 杏 甘

炙各半兩右入姜

○金芎附散 治癰痛自腿臂作不定者

小芎 附 茯 术

柴 風

熟地 附 桂 甘

右等分入姜束束

續斷圓

治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

白芍 繼續

附

沒各半

天一右為末煉蜜丸溫酒米

飲任下

生料五積散

治寒濕麻痺

方見傷寒門

蜀蠆湯

治風濕相搏手足冷痺腰腿沉重身體煩疼

芎 蜜

各二兩半羌

赤芍 姜黃

白芍酒浸各半

甘草二兩

右加姜

烏藥順氣散 治歷節走注骨節疼痛

加瓜 没蘇木

方見右

蘇木

附子八物湯 治歷節身痛不可忍

附炮姜炮芍 芍甘

桂 參各三兩 术四兩

一方去桂用乾地二兩

○三癰湯 治男婦血氣凝滯

手足拘攣風痺氣痺等

芎 繢仲 風桂 細參

芩芍 白芍酒浸甘

灸花生地

薑獨各一兩 腎酒浸茵各二兩

右每服七錢姜五片棗肉一枚水二盞煎至八分溫服

薏苡仁湯 治手足流注疼痛麻痺不仁難屈伸

薏苡仁桂桂

甘炙各一兩

蒼朮四兩

七片煎食前服

自汗減桂

熱減桂

通氣防風湯

肩背頭及腰以下皆冷此方見中濕門

氣鬱不行也此湯治之

名葛根湯

甘炙蓼各二兩

芍甘蔓各一兩

右如身重腰沉經中有寒濕更

加酒洗漢陶已半錢附

許

如意通聖散 治風濕走注病

丁皮麻風

芍

歸

甘炙各二兩

右咬咀炒黃每服七錢水二盞煎八分去粗入

乳沒各少許再煎熱服出汗

○

如意救苦散 治風濕痺痛走注癱瘓

丁皮麻風

芍

虎骨

炙乳沒甘炙各二兩

右為細末每服三錢煎連翫熱服

十味剉散 治中風血弱臂痛

白芍

白芍各三兩附炮姜

半芎

風术各一兩

熟地酒洗燒各半

八片棗二枚食後臨卧服

活絡湯 治風湿臂痛諸藥不効者

木白芍

桂獨

甘炙芎各二水半右分二貼姜三片

烏沉木香四物湯 治湿滯脾經肩臂手足疼 蒼鳥

芎各二芍各二熟地 菟各二甘炙木各一水右

加味二陳湯 治脾胃痛 本方加翹 風 芎 半刺酒芩 葴

芎活湯 治水飲留滯背痛 芎 独 半 荸 陳

枳各二木各二甘炙各右加姜

羚羊角散 治筋痺肢節束痛

羚 薄桂 附 独 各

芎各二白芎各二右加姜

五加皮浸酒方 治風濕相搏腰腿疼痛四肢癱急皮膚癩

痒添精神補髓 五加五木一右加咀生絹袋盛以好酒

下罐將藥袋入酒中用竹葉密封罐口入滾鑷內煮一時取出後

浸二十七日開罐空心服一劑多服

芎各二白芎各二右加姜

○傳丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂治痿獨取陽明一經蓋

嗜慾無節則水失所養火寡平畏而侮所勝肺得火邪而

熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡平畏而侮所勝

脾得木邪而傷矣肺熱則不能營一身脾傷則四肢不能為

用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之

能補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有又曰內經論

風論痿各有篇目治法迥異屬方以治風藥通治諸痿何

其謬哉

東垣治痿無一定之方黃柏為君黃芪等補藥為佐視

所挾之証制其方

濕熱用健步丸加柏芩蒼之類

濕痰六陳加二术芩柏竹瀝姜汁之類

血虛加葛根，下補陰丸，方見犀損門。

**虎潛丸** 補腎丸 方見虛損門 皆可治痿

**虎潛丸** 補腎丸 方見上皆可治癆  
**元替丸** 百半竹鹽酒熟地各三板酥灸白芍東  
換門

虎頭丸 杜酒炒  
矢炒熟共兩 杜四兩 白芍  
炒熟共兩 杜四兩 白芍  
右為末酒煮鷄半肉為丸 塩湯下

冬加乾姜半兩

氣虛四君加蒼芩相一凡柏蒼治瘧之要藥也

**加味四物湯** 治諸痿四肢軟弱不能舉動 白芍  
熟地三兩 归芍一錢 中各七分 明一五味九分 參連各半 知母三分 蒸水

熟地水白芍  
仲分半丹王巴枚參  
漆三分足不右煎服又酒糊丸服亦可

股軟者不用右前用又酒糲丸附方  
健步丸 治膝中無力屈伸不便腿脚沉重行步艱難

滑炒甘炙酒桂各五  
風 沢各三 已酒洗

三名不治。麥粉丸如米大。每服七十粒。日服三次。下風湯。

**大防風湯** 治兩足痿弱或麻痺或兩膝虛腫名曰鶴膝風

右方見

**祖傳經驗** 治兩足癱弱，軟痛，或如火焙。蒼米泔浸一下，柏浸酒。

日乾各柏 漂浸日乾膝  
四两 板 路四两 各一  
白尾 两 板 酥虎胫骨 酥  
炙 烧多  
已 两

右為朱麥糊丸如糲子大每服七十丸姜鹽湯下  
鹿角膠丸 合血氣虛陽兩足不寐吹不化手足動  
附五条

鹿角霜

卽身四虎脰骨  
燭板一兩  
右為末別將鹿角膠用無灰酒

二益，<sup>シ</sup> 煙化丸，如桔子大，每服一百丸，空心，姜鹽湯下。<sup>ニ</sup> <sub>ス</sub> 木

○除風濕羌活湯 治諸痿濕氣勝風証不退肢體麻不已

卷一 風

蒼 茵 各一升

甘 炙 独

柴 各五芎 百陳

蒼各三尺 分

猪苓 茵各二連 分

右

清燥湯

治濕熱成瘻腰以下痺軟不能行

茵半

蒼各半木 分

陳 沢各半五味九分

白芍 升各三分 門 反身

生地 麴 猪 酒柏 分

各二柴 甘炙連各一右

惠無連

加味四斤九

治腎肝虛筋骨痺弱

茵容 酒浸天瓜

鹿茸 去毛熟地 酸參 分

兔酒浸五味酒浸各一分

右為朱煉蜜丸如梧

子大每服五十丸食前米飲下

○丹溪曰十指麻木胃中有溫痰死血二陳加一木桃紅少加附

人參益氣湯 治兩手指麻木四肢困倦熱傷元氣也

茵各二分炙甘 分

升各半五味粒紫分生甘 參各一分半

白芍 沢各半陳紅 話五味三十右

道家氣湯 治兩腿麻木沉重茵紅甘半青竹升柴

天麻黃芩湯 治表有風証因醉飲其証復來右口角併眼牽

引側視及左手腿麻木疼痛天芍 麴炒卷如支節不

芩各三分參連各四分白芍五分

甘升葛柏 蒼各六分

沴分柴九分或加猪六分右

神効黃芩湯 治麻木不仁或兩目羞明昏花睛痛

蔓分陳半參分炙甘 白芍各一茵二右水煎去相臨臥熱服

如麻木不仁雖有熱不加黃柏只加黃芩一通三

如麻木甚者加芍藥一通二分如有大熱証加酒柏三分

祖傳經驗 三妙丸 治濕熱下流兩脚麻木或如火烙

柏四兩切片蒼六兩米泔浸一下膝三右為末麥糊丸如梧子

柏酒桂畧炒蒼六兩米泔浸一下宿細切焙

兩右為末麥糊丸如梧子

大每服五七十九空心姜鹽湯下忌魚腥、薑、麥、熟麩煎炒等物

## △傷寒門

一附中寒 傷風 瘧疫  
矢頭 蝦蟆溫 感冒

### 一傷寒、溫病熱病之異

○林中而即病名傷寒、寒毒藏肌膚至春變為溫病至夏

○變為熱病醫皆均謂之傷寒

### 一傷寒、中寒、之異

○寒邪傷腎急痛拘攣、戰掉強直、昏迷厥冷、口噤失音。此中寒也。無汗惡寒、頭痛面慘發熱拘急手足微寒此傷寒也。

○傳有至人傳云：傷寒大法有四曰傳經、專經、即病、欬病夫。即病者多為專經，欬病者多為傳經。云云或但中於太陽未及

○陽明散表邪而愈。或有從太陽未及鬱熱不從陽明少陽過而入於三陰之經者，亦有初不曾入於陽經而直傷於三陰之經，而即病者因其未曾鬱熱是以一切為寒証故多自霜降後至春分前發者是也。為其無頭疼無大熱脉沉遲而微，故古方又出中寒一條實此証也。

### 一傷寒、傷風之異

○林以日傳變與傷寒無異，但寒泣血故無汗惡寒、風散氣

故有汗惡風為不同

### 一傷寒感冒之異

○傳傷寒、溫病熱病之外，有四時感冒新受風寒之輕証而見頭痛、身痛、惡寒發熱等証。非鬱熱變傳經重病之比。

### 一六經之脉証

○一二日、太陽脉浮惡風寒、頭項強痛、腰脊強

三三日、陽明脉長不惡寒、反惡熱、目疼、鼻乾不得睡

三四日、少陽脉弦細口苦脇下堅滿往來寒熱耳聾耳

四五日、太陰脉沉細腹滿口乾

五六日、少陰脉沉欲寐而渴

六七日、厥陰脉緩氣上衝胸亂不食食吐蛔煩滿囊衣縮

一兩感

○五掌一日、太陽 少陰 頭痛口乾渴

二日、陽明 太陰 身熱譖言腹滿不食

三日、少陽 厥陰 耳聾耳囊縮而厥

內外兩感、府藏俱病表裏不能一治故難治、脈從陽可治

經曰兩感方寒者死是內外兩感、肺腎俱病欲表之則有裏欲下之則有表表裏既不能一治故死然所稟有虛實所

感有淺深虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治之而不愈者有矣未有不治而復生者平嘗用此間有生者十二得二三故立此方名解利兩感神方太羨瀉湯

一表證

○脉浮緊表實無汗麻黃湯 脉浮緩表虛自汗桂枝湯

脉浮緩反無汗脉浮緊反煩躁 备半湯

麻黃桂枝合劑

一半表半裏

○翁翁發熱邪在外若小便黃非在外

百蒸蒸發熱邪在內若小便清非在內

脉浮大是表証尿赤煩渴是裏証是表裏俱見也五苓散

心下滿ヒツク不食ヒツク大便堅ヒツク脉沉細是裏証頭汗出微寒手足冷是表証此在半表半裏小柴胡湯

不大使頭痛有熱是裏証小便清不在裏此表裏俱見

### 桂枝湯

裏証已急或脈浮或頭痛表証仍有者用大柴胡謂之雙解

### 一裏證

○掌裏証者內熱是也宜下之不惡寒反惡熱腋下汗出咽乾糞結潮熱脣滿喘或譖忘脉沉澀是裏証也小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻

### 一表裏寒熱

○林發熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓

○脉沉遲半足或散微下利清酸此症正發熱表寒兼四逆湯

○沛人曰表熱裏寒先與瀉日湯芍甘炙各二兩姜炮  
芩各三枝四束束十五右剉煎寒已次小柴胡加桂  
身寒反不欲近衣熱在骨髓寒在肌表先用白虎加參湯  
熱除次各半湯

○脉滑而厥口燥舌乾惡寒而踴時時煩不欲厚衣大柴胡

### 一陽毒

○掌初受病時邪毒深重當解失汗當下失下或吐後邪熱乘虛而入或誤服熱藥變為陽毒必發狂登高歌棄衣走身面錦瓊鼻煤舌卷焦黑脈洪大五日可治六七日不前治若熱甚時昏口噤咬牙藥不可下者用冰漬法候牙寬症定用藥

一、陰毒

○掌初受病時寒邪深重致陰氣獨盛或汗吐下之後變成陰毒。唇青面黑厥冷身疼如被杖脅中絞痛或自利咽不利虛汗嘔吐脉沉微三日可治五日不可治或真武湯或白桂附甘雄鯉魚椒水煎溫服蓋覆取汗或用葱煎法溫睛下漸醒肢溫有汗即瘥續用四逆湯之類如尉而肢不溫不可治。

○葱煎方 治中寒氣虛氣息欲絕及傷寒陰厥。  
葱一握以糸纏如餅去根葉惟存白長二寸許以火煅令通熱以熱處著脐上下熨一餅壞即易手足溫有汗更服姜湯一盞良。

○關元氣海三十九壯手足溫即醒者生寒不溫汗不出不省人事者死。手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷急於丹田穴灸之或三十五壯或百壯視輕重手足煖為度。

○陰毒傷寒四肢逆冷宜敷之以吳茱萸下升酒和勻溫縮袋二雙煎令極熱熨兩脚心候氣通暢勻暖即停熨累用極驗。

一、陰證

○怯弱人感寒濕發熱不食數日後不省人事言語亂忘神思昏迷面青齒黑為必死之證脉沉細先用小柴胡等不愈急用四君加附子數斤煎以碗盛放冰盆中少時寢其熱性稍溫服之脉轉神思即回然後用別藥謂之陰証之傷寒下後三五日後妄言不休此神不守以含慎勿復下脉多沉細足

冷氣促面青黑口乾補中益氣湯倍參加竹葉

一、陰證似陽 陽證似陰

○煩躁面赤微熱脉沉微此則陰証似陽以脈為據不必守症小便赤大便結脉沉滑四肢逆冷伏熱深也此則陽証似陰

輕者白虎 重者承氣

一、溫家之五證 春月傷寒名溫病

○百溫病冬傷於寒春必病溫脉浮數發熱頭痛亦惡寒

輕於冬夏 分麻湯 解肌湯

溫氣來行變成溫疫作天行少長皆同陽脉濡弱陰脉弦緊者熱溫寒清順時宜以平為期

溫毒陽脉洪數陰脉實大更遇溫熱變為溫毒發斑疹咳嗽

黃氏防呂湯 切忌汗 方見中濕門

溫瘡脉陰陽俱盛重感寒者變成溫瘡 小柴 白虎之類

一、濕家之三證

濕溫暑濕相搏成湿温胸間多汗頭如辟腫冷妄言陽脉濡而

弱陰脉小而急 袁苓白朮湯芩朴姜半枝

中濕丁身盡痛發黃大便快尿淡脉沉而緩 五苓散

風濕肢脉痛重難轉側額上汗出不欲去被身重日晡劇脉浮

發汗微微出則風濕俱去也

二、痙證

掌林

太陽經中風又感寒濕又大發溫家汗則成痙發熱惡寒似癢

寒反張口噤如癲

有汗不惡寒柔痙

桂枝加葛根湯

無汗惡寒、剛症

葛根湯

一、惡寒、林

太陽發熱無汗惡寒、麻黃湯

陽明雖有下証俱惡寒表未解也

麻黃湯

太陽發熱有汗惡風、桂枝湯

陽明脉遲汗多微惡寒表未解也

桂枝湯

少陽頭痛發汗惡寒、小柴胡

柴胡桂枝湯

少陽發熱微惡寒、柴胡桂枝湯

桂枝湯

少陰惡寒脉沉細、四逆理中湯

汗後惡寒虛也

芍藥甘草附子湯 芍、甘各三兩附一枚右

汗後惡寒而表已溫水散寒裏裏俱熱、白虎湯

一、潮熱、林

少陽王於寅卯太陽王於巳午於此時發熱邪未入胃非潮熱應於未申發者謂之潮熱邪在胃

惡寒、潮熱或溏欬迷

小柴胡

脉浮潮熱兼寒、小柴胡加桂

脉浮弦小便難、腹滿脹痛無汗嗜卧、小柴胡加芍苓

汗後不惡寒、腹滿喘潮熱、大承氣

小承氣

脉實潮熱、大承氣

下後潮熱大便復硬、大柴胡

汗下後不解日晡潮熱脩衣摸床喘急直視、承氣湯

脉弦生瀉死

目晡潮熱脉虛微汗之 桂枝湯

一煩熱 林

為煩而熱無時而渴者是也

心煩喜嘔

小柴胡

汗後煩熱而渴

辰砂五芩散

汗後胃乾煩不能飲

永少與之 傳心煩不得卧

梔子豆豉湯

一煩躁 林

煩為內不安躁為外不安邪氣在裏者在裏者因火劫者陽虛者陰盛者煩躁者證之常也非逆也

結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不得卧者吐利煩躁四逆者自利煩躁不得卧者皆死

惡寒而踰時自煩欲去衣

大柴胡

煩躁消渴

辰砂五芩散

五六日不太便繞脅痛煩躁發作有時此有燥屎小承氣

吐利厥冷煩躁欲死

吳茱萸湯

茱生姜

各一參三分

棗三個

陰盛而煩躁名陰躁

四逆湯

下利嘔嘔煩躁不得卧

猪苓湯

傷寒五六日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰

背第四推兩傍各一寸半名厥陰

一。自汗盜汗肢汗頭汗 林

發熱惡風自汗太陽中風

桂枝湯

自汗小便數 药藥甘草湯

自汗身熱不渴

柴胡湯加桂

多發汗汗漏不止名漏風亡陽

桂枝附子湯

陰証四肢厥冷自汗

四逆湯

陽明証汗多渴不太便

調胃承氣

汗多不止

术 藜 萸 苓

芷 各一兩 米粉半兩 為細末周身撲

乏 跛溫粉 見自汗門

汗多出陽煩躁惡風不得卧先與防風白朮牡蠣湯汗止後

用亦建中湯

肢汗太便難諳語四肢汗出中寒也可溫不可下

不食小便澀四肢汗出中寒也可溫不可下

盜汗睡而汗出覺則方止非如雜病之虛邪在半表半裏毛

汗出而微惡寒 小柴胡加桂

脉浮潮熱或盜汗

黃芩湯 芎 茯 甘 等分

末末

頭汗出惡寒 小柴加桂 汗不止者難治喘亦然

心下滿頭汗出水結胸 小半夏茯苓湯

一無汗 林

脉浮而遲不能作汗身必痒

桂麻各半湯

陽明主有汗今變無汗身痒皮中久虛故也

术附湯

黃芩建中湯 桂枝湯 加芍氏

一頭痛太陽証多頭項痛屬厥陰頭角痛屬少陽額

痛及鼻陽明

無汗發熱惡寒頭痛

麻黃湯

六七日不大便頭痛有熱尿清不在裏仍在表須汗痛

甚者必衄葛根葱白湯

荆防散

川芎石膏湯

頭痛

汗出發熱惡風頭痛 桂枝湯

輕者 紫胡桂枝湯

半表半裏往來寒熱頭痛脈弦細 小柴胡湯

發熱頭痛似瘧為欲愈 各半湯

厥陰少陰頭痛嘔吐涎沫

吳茱萸湯

方見前

夏月頭痛身冷自汗 中暑濕也

木附湯

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快 五苓散

自汗頭痛風暑及雜病俱宜白虎或少加葛荆尤妙或

竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脉沉滑而長頭痛可下

熱不惡寒或不大便小便赤者胃實也

調胃承氣湯

汗後不解頭痛不止 正辛鳥

搗膏貼額上或用

胸滿多帶表証胸滿多快半表半裏

半表半裏脇下痞鞭

冲和湯去棗加蠶

小柴胡湯  
別名也

汗下後胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出或往來

寒熱 柴胡姜桂湯

下利身熱脇痛 大柴胡

寒中誤下乏愈不快腹脹或吐或利

理中湯枳陳輩

心下滿而不痛 半夏瀉心湯

嘔滿而發熱者

小柴胡

飲水多心下滿脹 牡蠣澤瀉湯

一結胸

結胸有下之早而成者脉浮緊心硬痛未可下之

按之則痛，為小結胸。不按而痛，為大結胸。

結胸證悉具，而加之煩躁者，不治。

結胸有熱，或煩渴先沖和，加枳實，次下本藥。  
飲水不散而結。該矣 小半夏茯苓湯 或小柴胡東加芩蠟，或

五苓合枳木湯，枳木湯，實半木右

結胸喘促，狂亂，大躁，用地龍水一服未効，再服自然汗出愈。  
邪熱在上，胸膈痞結，未辨虛實，先與理中加枳實尤妙。或

桔梗枳殼湯二味等分

結胸手不可近，用龍胸藥不効。枳實理中丸，苓參木

姜炮甘，炙各半，實十六，右煉蜜丸，溫酒或白湯下。渴者加桔梗，二兩 個

汙後未全解，誤下之為小結胸，煩渴，脉實，宜三黃瀉心湯。

寒實脉浮，滑心下按之痛無熱証。三物小陷胸湯，最亦可

頂強如瘡，或從心下至膈上，手不可近。大陷胸湯

○灸黃連二寸許，為末。巴豆七粒去壳研細，入黃連末，捻作餅子。按，膏中以艾炷，如指頭大灸之，輕者一炷，重者不過二三

壯，熱氣入腹，作聲，取下惡物而愈。

慧心下飽悶，未下者非結胸，乃表邪傳至胸中，未入腹，小柴胡，如枳桔，速効。本方合小陷胸加枳桔，即愈。

### 一、痞

痞心下滿而不硬，按之不痛，曰痞。硬水停滯，氣聚不滿不硬，但

妨悶者非痞，謂之支飲。小柴胡加桂。

胸滿而濡者，半夏瀉心湯。旋覆代赭湯。旋甘各一

參六味

生姜六味

半八味 束束十二右

輕者

桔梗枳實湯 桔半各一實

半陳木右或加薑

兩或加薑

又用茯苓白朮甘草生姜湯

胸滿硬按之不痛關脉沉緊

大紫胡

痞滿小便不利

五苓散

一。腹脹滿

腹中滿痛

小紫胡

去芩

六七日不大便腹滿痛急下之

小承氣

太實痛者

桂枝大黃湯

譴妄脉沉數煩渴不拘日數

調胃承氣

太陽病反下之因而腹滿時痛

桂枝芍藥湯

小腹滿硬不痛則無血溢滿之

小腹急上當小腹急上當

按之不痛為虛 尺脉弦腸鳴泄利

小建中湯

按之痛者為實 關脉實滿而大便秘

桂枝加大黃湯

少陰腹痛或泄利

通脈四逆加芍藥湯

陽脉濶陰脉弦泄利 桂枝芍藥湯

厥陰証小腹痛

當歸四逆湯

白浸酒

桂枝

芍藥

細各三

甘灸

通草各一束

二十個

少陰病利而嗽厥逆腹痛

四逆五味子干姜湯

少陰腹痛泄而厥冷脉微不惡寒面赤裏寒外熱

通脈四逆湯加芍藥

關脉實便秘腹滿繞脅痛煩燥發作有時燥屎太承氣

太承氣

腹滿時痛六 桂枝加大黃湯

一咳嗽

掌林

在表之邪干於肺氣則咳嗽當發散而愈

太陽發熱而咳共

小青龍

表未解心下有水乾嘔發熱而咳共

小青龍

發熱嘔而咳共

小柴胡

少陽寒熱往來而咳胸膈滿或泄利

小柴胡參東加味姜

少陰四肢厥逆腹痛或泄而咳共

四逆散加五味姜

有痰而咳共

大半夏湯

春冬傷寒秋夏傷冷濕而咳嗽喉鳴上氣

橘皮湯

方見喉嚨門

少陰或咳或悸小便不利共

四逆散

邪氣外盛而喘雖汗喘不已雖經汗下亦可發之

麻黃杏子石膏湯

麻一兩杏五十膏一兩甘六右

脉盛自汗喘共

大柴胡

太陽下之微喘者表解也

桂枝加厚朴杏子湯

水停心下小便不利腹滿而喘共

小青龍去麻加苓

汗後飲水多咳喘共

小青龍去麻加杏

陰毒喘促或陰証脉伏喘促

理中四逆

腹滿而喘潮熱者外欲解共

大柴胡

汗後潮熱不惡寒腹滿大便實喘共

小承氣

桂枝證反下乏利不止脉促喘汗出共

葛根黃連黃芩湯

葛芩

各二

連共

右

直視譫語喘滿者死 汗出髮潤喘不休肺絕  
身汗如油喘不休命絕

一。嘔吐

林嘔吐先嘔後渴為欲解先渴後嘔為水停心下赤茯苓湯  
區發熱柴胡証異心下急鬱微煩大柴胡

胸脇滿嘔潮熱小柴胡加芒硝

吐逆二便不通厥逆無脉大承氣

半表半裏多嘔小柴胡

胸熱腹痛嘔吐黃連湯

連甘姜枝各二參

半各一 束二 右

嘔吐手足冷小橘皮湯

寒多而嘔理中湯

發汗後水藥不下及諸嘔吐穀不下

小半夏湯

煩渴欲飲水水入即吐

五芩散

嘔而思水者急與猪苓湯

竹葉石膏湯

有虛熱少氣氣逆欲吐

竹葉加生姜汁湯

瘡後餘熱在胃而嘔者治熱嘔不可無烏梅

一。渴

邪傳裏熱氣薰焦膈脉弦而嘔渴邪在半表半裏

小柴胡加桔梗

消渴氣上衝心中疼熱桂苓白朮甘草湯

汗下後胸脇滿微結尿澁渴不嘔頭汗出往來寒熱心煩

柴胡桂枝干姜湯

目金一

卷三

汗多而渴 小柴胡去半夏加參 拮

脉浮發熱渴欲飲水小便不利 猪苓湯

下利咳嘔煩渴不眠 猪苓湯 汗多者不用

汗後脉洪大而渴陽明脉長有汗發熱而渴並 白虎湯

吐汗下後七八日不解表裏俱熱惡風太渴舌乾欲飲蒙太

陽眼桂枝湯

太汗出煩渴中暎四肢冷汗出煩渴並白虎加入參湯

夏至前後煩渴發熱不惡寒 竹葉石膏湯

自利而渴尿白下焦虛寒 甘草干姜湯

心煩欲眠自利而渴 理中湯

小便不利而渴必發黃 茵陳五苓散

陽明脉長而實有汗而渴 調胃承氣

脉沉滑熱實煩躁而渴 太陷胸湯

陽毒發狂煩躁太渴潮熱咽痛 黑散

○汗下之後煩渴飲水涼膈散 及減桂五苓 甘露

益元 選而用之 又方六十一散

一血

慧傷寒血久不正

梔子

炒為末吹入鼻中

○脉浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者欲衄也

發癉目眞刺者必血衄乃解

太陽脉浮緊發熱無汗衄者愈

脉浮緊不發汗因致衄者 麻黃湯

脉浮自汗而衄共 桂枝湯

六七日不大使頭痛熱六 酸小承氣或涼膈散加生地  
而渴心煩飲水水入即吐六 五苓散次竹葉湯  
當汗而失之熱溫為血及吐血六 犀角地黃湯黃芩芍藥湯

黃芩分 芍 甘 各半

兩

少陰病但厥而無汗強發之必動血或從口鼻出血或從目中出下 厥上竭難治姜附湯治木

衄者頭汗出身無汗汗出不足者死

汗後熱退六 血不止薪水濕紙貼於鼻上及頂項數易之

傷寒七八日不解自胸上至頭面色黑紫壅腫寸脉浮大而數是欲衄而不能出刺鼻中出血數升而安或兩尺澤穴

逆冷脉沉細者日內死

直視譴語端滿者死六 下利者死謂正氣脫絕也

汗多亡陽反身和譴言此津液不和也不可下

柴胡桂枝湯

傷寒發熱經水適來六 曰明了暮譴言熱入血室也

小柴胡

發熱四五日太便秘小便赤譴言熱厥急用大柴胡

陽虛陰盛而譴言脉沉細弱者當溫經助陽

譴言不惡寒反惡熱白虎

煩不眠譴言合 白虎加梔子

腹滿身重面垢譴言遺尿脉滑實不可下

白虎湯

喘滿口乾咽爛或不大便久則譴語是被火劫所致

白虎湯

下之緩熱病久神不清狂言脉虛而長微弦滑太承氣

柴胡飲

汗出譫言為風下之下利譫言有燥屎 小承氣

潮熱反不食有燥屎太熱入胃水竭煩躁必譫言又身熱汗出

太便硬譫言胃實並調胃承氣

傷寒八九日下之胸滿煩散驚小便不利譫言身重

柴胡加

龍骨牡蛎湯 敗鎮神氣

一發狂

發發狂邪熱至極也新汲水濕布搭於胸上頰易之  
熱病六七日未得汗脈洪數面赤目脹煩躁狂走大渴太柴胡  
極熱脈大渴而發狂黃連解毒湯不已承氣湯

血上逆則喜忘下畜則內爭其人如狂

犀角地黃湯

重抵當湯

犀角地黃湯 加芍

○傳汗吐下後熱甚脈洪數喘刃身黃狂走 三黃石膏湯  
玄盃者如狂熱在下焦小腹硬少便自利 指當湯血下

連進三四服而愈

膝痛居癆舌青口燥渴大便黑血正也

此一皆因陽

脉弦而長 調胃承氣

沉實有表証

太柴胡

小腹急結 桃仁承氣

桔梗大黃湯 桔梔芩柴各一大半

兩半

一右

桔梗大黃湯 桔梔芩柴各一大半

兩半

一右

升麻梔子湯 升一兩柴二兩半梔十一膏二兩生地半

半生地半

一右

吐下後及虛人未解發狂 金參白虎

辰砂之類清浮火或

寒冰石 黃連末水調下 又龍膽草一物湯治陽狂

一右

火劫者周身用火迫劫出汗其人亡陽煩躁驚驚狂桂枝甘草

### 骨牡蠣湯

狂言直視為腎絕汗出後熱狂言不食為失忘冒死

### 一發黃

發黃寸口近掌無脉鼻氣冷不治形躰黃如烟薰直視搖頭心絕

環口秘黑黑承汗發黃脾絕

發熱身痛身目俱黃太陽中濕麻黃連翹亦小豆湯

麻甘翹各一小豆半杏仁東棗生姜生梓白皮右

發黃脈浮緊不可下各半湯

往來寒熱身痛發黃小柴胡加梔子湯

脉浮弦咳短氣腹滿心脇痛鼻乾無汗身目黃小便

身黃脉沉結小腹硬屎利狂畜盈在下焦桃仁承氣

發熱頭汗渴飲水小便利大便快

五苓加茵陳

小便不利四肢沉重似瘧不欲飲茵陳五苓得湯

小便利如皂莢汁則黃從小便出也

食後發黃用枳米內消也

### 一癥

○赤癥五死一生 黑癥十死一生

有下之太早執氣乘虛入胃故發癥有下之太遲執留於

胃中亦發癥有陽証熱藥多用胃熱焦爛發癥陽毒

發癥紫黑執毒陷於內也不治

陽毒已深舌卷焦黑鼻孔煤狂言面赤癥如錦陽毒斧麻湯

五日可治六七日不可治

○傳陽毒生癥涼膈散加葛

○赤癰熱証臭咽痛

玄參升麻湯

溫毒嘔者葛根橘皮湯

葛杏芩麻甘各一右

吐水眼赤口瘡下部生瘡咳而下利

黃連橘皮湯

連陳杏尖麻葛各一朴

甘各一右

冬溫受不正之氣至春發癰爛癰疹謂之溫毒

化毒丹

溫毒身無大熱煩渴太便實或腹滿痛生赤癰

調胃承氣

○傳發致面赤譖語脉大而無勞或絕而不覓用參半地各五

炮附一大黃二玄甘一右

一自利

下利至甚厥不止者死

下利日十餘行脉皮實者死

直視譖言下利者死

下利煩躁不得寐者死

下利手足厥冷無脈者死

下利之不溫脉不還者死

下利身熱脇滿乾嘔寒熱往來脉長

大承氣

發熱後草泄色黃赤此為有熱脉遲而滑而實數而滑宿

食小承氣

自利清水心下痛口燥宜下

自利而渴白虎湯或黃連阿膠散

自利不渴理中丸

咳而嘔渴下利心煩不眠

猪苓散

腸垢熱也協熱而利必膚下熱

黃芩湯

芩芍甘各等分

鴨溏寒也協寒而利必膚下寒

理中湯

自利十餘日不正手足微冷無熱証

理中湯

陽病自利便膿血者協熱也下後脉數不解自利不正必膿

自利不正必膿

熱而便膿血俱，犀角地黃湯

一大便不利

太便不利，脉數能食名陽結。調胃承氣，大柴胡  
脉遲不能食名陰結。

金液丹 硫一味 製製樣

厚朴湯

木五朴

陳

甘各三枳

半兩

右姜朮朮

太便不利，尿難有津液。

可作汗。

施子湯

不著席

太便堅小便數不可下。

趺陽脈浮濶。

麻仁丸

枳實丸

三下不通不可攻當吐提之。

一小便不利

小便不利，邪熱畜於內。

津液不下，行故不利。

桂枝干姜湯

小便不利，心煩。

桂枝干姜湯

小便不利，大使乍難乍易。

微熱，胃中有燥屎。

承氣湯

傷寒七八自身黃。

尿不利，腹滿。

茵陳湯

頭汗出，尿不利。

渴飲水發黃。

茵陳湯

傷寒七八自下之。

胸滿煩驚，小便不利。

言身面不轉側。

柴胡龍骨牡蛎湯

柴二芩 生姜 鉛丹 參枝

苓各三分

大半合 龍骨 各二分

右

林而一掌

四逆

諸四逆不可下。

吐利煩躁四逆者死。

吳茱萸湯主之。

方見前。

發熱七八自身冷，名藏厥，難治。

惡寒、踰卧厥逆，陰氣極不治。

得病後四肢逆冷，脈沉細，足繻，卧惡寒，不飲水，下利清穀。

陰厥也。

四逆湯

手足指頭微冷。

理中湯

無熱証而厥共當歸四逆加吳茱萸生姜湯一虛者宜附子湯  
陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕身反不  
惡寒面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者此  
陽盛於內不相通也與通脈四逆湯

寒熱而厥面色不澤冒昧兩手忽無脉或一手無脉必是有  
正汗也與各口半湯

厥而心下悸先治其水

茯苓甘草湯

荳

枝

各二  
末

半 甘各一生姜三右

初身熱頭痛已後大便秘小便赤或畏熱或飲水煩躁不  
眠言昏而厥陽厥也 大柴胡

厥而渴

白虎

脉沉滑頭面有汗爪溫二便秘赤四肢逆冷熱深也

承氣湯

進涼膈

解毒養陰退陽如愈

解毒合承氣少下

乏次解毒涼膈天水合而為一用之

一舌胎

林

舌胎傷寒三四日後舌上有膜白滑如胎甚者或纖或黃  
或黑皆熱氣之淺深也表邪無舌胎邪氣傳裏津液結  
擗則舌胎仲景曰舌上白胎不可攻與小柴胡

脣下硬滿不大便而嘔舌胎 小柴胡

熱聚於胃則舌黃熱深也未下者下之黑滑亦下之

經曰熱病口乾舌黑者死

一欬逆

林掌

胃有寒又飲水而欬逆先與理中湯次用旋覆代赭湯

旋覆代赭湯

旋

甘各一參六冬赭三半八生姜一兩

甘半

生姜六冬

棗十二枚

或小青龍去麻加附

脉微細

橘皮干姜半

夏生姜湯

羌活附子湯

羌

附子各一茴各一半木一千生姜若干

脉浮洪或有熱而咳逆者

火熱奔急上行肺不得納故也

甘草瀉心湯

甘二兩芩

姜各一連

參各半半一兩棗六右

少陰因失下所致大便硬

太承氣

大便軟

瀉心湯

脉散者死

藥不効

硫黃

乳香等分末酒煎急令服之

冬期門婦人屈乳頭向下盡處脣間丈及乳小者以二指為率

頭汗譫語腹滿微喘而見咳逆此危証

### 一悸動

悸動有氣虛有停水有汗多榮虛神弱

發汗過多心下悸欲按

桂枝甘草湯

發汗陽汗則譫語而動悸

小柴胡

飲水多歎而心悸雖有他邪先治水

茯苓甘草湯

芩枝各二甘一生姜二

往來多心悸尿瀦煩嘔

小柴胡

脉代結心悸

炙甘草湯

四逆

而悸

四逆散加桂

林戰外慄心戰爲病欲解也正與邪爭則爲鼓慄而戰

振但虛而不至爭故止聳動而振也與桂苓白朮甘草湯

溫經

汗下後戰與救逆湯

發汗後不解仍發熱悸眩振

真武湯

吐下後裏虛氣上逆陽不足起則眩暎沉緊發汗則動經振搖桂苓木甘草湯或小建中湯卒口噤背反張搖頭瘡病也風主動故也形躄如烟直視搖頭者為心絕

一身痛

太陽無汗脉浮身痛拘急

麻黃湯

中濕身痛難轉側尿不利

五苓散

尿利者

木附湯

陰毒躄勢沉鬱身痛如被杖嘔利唇青面黑陰毒甚當選湯

真武湯

汗後脉沉身痛血不足

桂枝加芍藥半夏生姜湯

傳汗後身痛脉沉者桂枝加參治

一咽痛不可汗不可下

陽毒脉浮數而大唾膿血

白扇膏

咽喉痛下利四肢冷無熱証

理中湯加甘一倍

非時暴寒伏於少陰之經脉微弱而咽痛次必下利腎傷寒

也先半夏桂甘湯三味各等分次四逆湯

一蛔厥

林蛔厥元有蛇為藏寒蛇上入膈時煩得食而嘔自吐蛇或因

發汗胃中冷故長虫出或因胃氣困乏不能食食到口蛇聞

食氣而上以理中丸

烏梅丸方見外

溫胃消渴吐蛔

理中加大黃入蜜以利之

蛔者雖有大热忌涼藥蓋胃中寒蛔上

理中加干姜炒

烏梅金煎服蛔定後以小柴胡退熱

林 一汗後不解

發汗病不解及惡寒虛也

芍藥甘草附子湯

汗後仍發熱心下悸動振振

真武湯

汗後身痛脉沉

桂枝加芍藥入參新加湯

大汗出熱不去內拘急四肢疼下利惡寒

四逆湯

發汗過多心悸欲按

桂枝甘草湯

傳桂枝去芍藥  
姜煎東前服

汗後腹脹滿

厚朴生姜入參湯

大汗出胃乾不能飲水少與之

發熱汗出不鮮

心中痞硬嘔吐下利

大柴胡湯

服桂枝後煩渴不解

脉洪大

白虎加入參湯

汗後不惡寒但惡熱及蒸蒸發熱

調胃承氣

傳發汗之後熱不解脉尚浮者

白虎加薑

下後腹滿卧起不安

梔子厚桂湯

有燥屎者

太承氣湯

下後脉促胸滿

桂枝去芍藥

桂枝証誤下之利不止

脉促者表未解喘而汗出者

葛根黃

連黃芩湯

避經十餘二三下之

嘔不止煩

大柴胡湯

傳汗下後熱未能除用梔子豆鼓湯

或東垣加減涼膈散

一勞復

林病瘥後勿早起梳頭洗面勞神多言用心令勞復

病後忌酒肉菓難消之物

又勿過飽更結熱難救謂之食復

瘥後未滿百日氣力未平復而犯房室者死謂之女勞復

勞復生熱脉浮以汗解之

枳殼梔子湯

瘡後渴

竹葉石膏湯

門甘灸等分粳米竹葉

勞復發熱欲絕

麥門冬湯

食復脉沉實腹滿譫語

枳實大黃湯

大柴胡湯

少陰陽俱虛熱不正脉乍躁乍數者死

一陰陽易

掌

男病新瘥婦與之交曰陽易婦病新瘥男與之交曰陰易婦則裏急腰跨連腹痛男則陰腫小腹絞痛

男女俱或熱上衝胸頭重不舉眼生花離經脈見者死一呼一至摸脈離經一呼三至至脈離經二脈易病有之用

燒襯散

竹皮湯

小便不利

五苓散

一狐惑之証

齒燥惡飲食面白乍赤乍白舌上白苔黑有瘡四肢重喜眠虫食爲感食下部聲喫喫爲狐甚者食藏而死

細言道中

唇瘡齶耳喫

麻子湯

葛根湯

掌一藏結

其狀如結胸飲食如故時時下利舌上白胎脅痛引張筋不寒熱<sub>一云寒而無熱</sub>其人反靜此藏結也死

而掌一不治脉証

陽病見陰脉者死

代脉者死

譫言身熱脉洪大生

身冷脉沉細死

發往陰脉死

傳咳逆上氣脉散耳聾脈浮濇難瘥

下利脉反實逆

吐衄血脈浮大凶

下不至關陽氣絕上不至關陰氣絕

少陰厥逆無脉服藥通脈脉漸續生脉暴出死

少陰四肢厥逆下利惡寒而拳發躁無脉不治

脈陰陽俱虛熱不正脉乍躁乍數者死

伏脉必是有正汗服麻黃甘草附子湯

多衣無汗者脉不至者死 褥衣摸床熱內結脉弦著濡著死

赤癥出五死一生 黑癥出十死一生

發動氣汗者死 陰毒陽毒過六七日者不治

兩感傷寒者死 大發溫家汗則為症熱而瘡者死

結胸証見煩躁者死

發少陰汗則動血九竅出血者死 謂之下厥上衄

發少陽汗則譴言汗只在頭面不至遍身衄血逆

發溫溫汗身青面皓耳聾耳不語不治

發風溫汗者死亦主譴言咳逆不止者死

發厥至七八日膚冷而躁無時暫安者名藏結死

汗出如珠不殊絕肝也

喘不休衛氣敗也

發黃變黑不治

發汗不至足者逆

汗後嘔吐水藥不入逆 腹大滿下泄不治

目眩目陷不治 垂本爛熱不止逆

發狂自利不治

陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足攣者死

厥而下利當不能食反能食者不治

傷寒七八日以上大發熱者難治

諸逆發汗刺者言訛目眩不治 独惑咽乾聲嘶唇瘡不治

張口喘氣乾嘔骨熱痛逆 譴言直視或喘滿或下利並不治

下利發熱或汗不止或厥不止並不治 汗後不為汗襄發

汗而不得汗發熱脉躁疾狂言不能食者謂之三死

擣頭直視如煙薰心絕 唇吻反青四肢多汗肝絕  
反目直視狂言遺尿腎絕 環白黧黑尿汗發黃脾絕  
汗出如油喘促無已肺絕 水漿水不入形神不仁命門絕  
絕及三四歲則死

掌

一禁戒

服藥中病即病停後服 痘後百日犯房者死  
瘡後少食糜粥常令稍飢勿飽  
若食諸肉肥血油腻等物必大使濁難治  
又莫勞射不可多言不可使意皆勞復

取汗但脉微弱遲細動氣瘡淋亡血虛煩不可用之夏時  
用桂麻宜加涼劑其性熱故有癥瘕之患也

食蘆爪必再病

食蘆爪必再病

食蘆爪必再病

食蘆爪必再病

食蘆爪必再病

食葵菜失明

飲酒太早狂悶

飲酒太早狂悶

飲酒太早狂悶

飲酒太早狂悶

汗後飲冷水損心包

早梳頭潮熱

早濯足必痺

早洗浴熱悶

早洗浴熱悶

遠行腳風

不得早起

不得勞心費力

一發表解肌之劑

○傳

麻黃湯 治太陽脉浮頭身痛惡寒發熱無汗而喘

麻去根節枝一兩甘六枚杏十個右先煎麻黃一沸掠去上沫下  
餘藥煎去粗溫服覆取汗冬及春初宜用蓋性熱夏至後  
服發斑黃狂悶

桂枝湯 治太陽中風發熱自汗鼻鳴乾嘔

芍半甘一右加生姜三片大棗二枚煎冬及春初宜用

半

枝二兩

半



○小陷胸湯 治下之太早變為結胸，胸中作痛，痞滿。

連 一分半 二分 菓 連穰 二右先煮瓜萎去粗納諸藥再熬

○黃連湯 治傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹痛欲嘔吐者。

連 甘 大 姜 枝 各二參 半各一 大棗二枚右

○紫胡飲子 治內實便難不惡寒反惡熱 紫 參 芎

甘 大 癸 勻 右等分加姜

防風當歸飲子 治身熱便祕不惡寒而煩渴上紫 參

芩 甘 大 歸 芍 風 潤 右等分加姜

解利兩感神方大恙活湯 風 巷 独 巳 芎 連

荳 白朮 甘 多細各二知 芍 生地 各一右

○惠沖和靈寶飲 治兩感頭疼惡寒發熱口噤舌乾

少用汗下

柴胡雙解散 治寒熱嘔而口苦耳聾脈弦數

○小柴胡加芍 陳入姜束煎入生艾汁溫服

嘔者入姜汁竹茹

胸痛加青皮

尿不利加芩

痰多加薑貝

○桂枝麻黃各半湯 枝五芍 甘 麻去根葛杏二分研

生姜大束末

○桂枝桂枝湯 柴一兩枝 芎 參 芍 各半四分甘三分

右姜束

一攻裏之劑

○小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿悶汗後不惡寒潮熱

傳 小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿悶汗後不惡寒潮熱

狂言而喘者，大朴實各三味半右煎服以利為度。

甲子

五  
十

狂言而喘者  
大承氣湯  
口燥目晡發熱脉沉實者  
枳朴一去粗內大黃再煎  
利為度

大七朴 實各三  
治胃寶 諺語五六自不  
大便腹脹滿煩渴舌乾  
大七朴 實各一  
芒半 合右先煎  
芒硝更煎一二沸服以

調胃承氣湯 治太便秘結譫語而嘔。日晡潮熱者。  
大半六味甘三芒 合右煎法同前。

○大陷胸湯 治太結胸高起手不可擗  
二一厘半 右先煮大黃去粗納芒一升沸納遂末服以利為度  
涼膈散治表未解半入裏下詎未全懊惱不眠煩渴口舌生  
瘡譴便溺閉結發斑黑陷 翹一梔大苦芩

○黑奴丸 治溫毒發斑煩渴及熱病六七日未得汗，脉洪大而數，色赤，狂走渴甚，若微利不渴，不可用。芩、桑根皮、煤樹突墨、芒、麻、梁上塵、小麥奴各一錢，一兩右為細末，煉蜜丸，新汲水調下。

桔梗大黃湯 大柴一兩 桑梔二錢  
桔各二錢 甘草二錢 右以通瀉為度

○傳白虎湯 治陽明証汙後脈洪大而渴及虛煩中暎等証  
知大汗二膏一兩粳五右水煎待米熟去粗溫服

○竹葉石膏湯 去石膏名竹葉湯 糜二兩  
半  
加葛根一兩  
大半



導赤各半湯 治病後神昏不語目赤唇焦舌乾

○連 楔芩滑甘知犀神參門右加燈心姜棗

連 楔芩滑甘知犀神參門右加燈心姜棗

○酸棗湯 治吐下後心煩乏氣不眠 酸升門升甘炙一

○酸棗湯 治吐下後心煩乏氣不眠 酸升門升甘炙一

知兩芩芍姜各三右

一除煩益元之劑

○白朮散 治病後氣脈不知食復勞復 桔芩芷

陳玄青白芍甘山各三

木四姜炮二右加姜棗瓜蘇並

如吐瀉入白梅

增損白朮散 痘後服之生津止渴順氣下痰

桔芩芷

芩藿參木各一陳二

乾生姜一右

溫膽湯 治病後虛煩不眠并心膽虛怯一切病後用

○益元湯 治身熱頭疼不煩面赤飲食不復口此元氣虛

弱無根虛火泛上非熱証不用涼劑

熟附甘參

姜門連知五味葱艾棗右入姜棗

當歸活血湯 治頭不疼不惡寒只身熱渴小水利大便黑

口無倫語此內傳心脾二經令膏迷沉重不可作熱証

飯赤芍生地甘姜桂參柴枳桃紅

三服後去姜桂桃紅加芩木右姜片水煎入酒三匙調服

○枳實梔子湯 治太病後勞復者實枚梔十四鼓升右

一涼血逐瘀之劑

○犀角地黃湯 治大便黑衄血脉微發狂發黃

當芍

生地牡犀如無以荆麻代右

○生地芩連湯 治熱毒入深吐衄不止

生地芩連

惠生地芩連湯 治熱毒入深吐衄不止

生地芩連

梔

桔

甘

柴

芎

芍

犀

如無以升

麻代之

右入東東二枚煎

臨服入芻根汁如無芻汁亦可

梔

桔

甘

柴

芎

芍

犀

如無以升

麻代之

右入東東二枚煎

○傳桃仁承氣湯

外證已解小腹急大便黑小便不利為瘀血証此藥主之

大

三

芒

桂

各一

甘

一

桃

子

去皮尖研若水煎

去粗糲芒工一沸溫服血盡為度

梔當湯

治血結胸譯語因瘀血結於胸中狂言小腹亦滿微

永

不欲嚙者

水蛭

炒

窟

虫

各十五枚去

桃

子

桂皮尖研右煎服

血下

止後服

一

治癰瘍之劑

梔

甘

柴

芎

芍

犀

屑

升

丹

甘

右

○傳陽毒升麻湯

治陽毒赤斑出狂言吐膿血升丹犀屑

射干

甘

生各

敗毒加飯 芍 茅

風 荆 蒼

生地

各等入

姜棗

此因虛而感風寒而發斑者佳

調中湯

治內傷外感所發陰斑

荳蔻一錢

陳一縮

霍芍

半

麻

枝各三

右加荳蔻

甘橘桔

半升

芷

羌

枳各十

芍五

分

麻

枝各三

陰毒升麻盤魚甲湯

治陰斑

升麻二錢

甘

二分

椒粒二十

盤魚

冬一雄

另研

右煎調雄末服

一分利之劑

○傳五芩散

治傷寒中暍煩躁小便不利

而渴或霍亂吐利

澤半

苓一兩

木

猪各一

桂半

右為細末

每服三錢白湯

○或清米飲調下或細切加姜枣煎服

熱甚去桂加芩

半

加芩

去桂加芩

熱甚去桂加芩

○猪芩湯

猪芩膠沵滑

右各等分水煎去滓

下膠候消服

○赤茯苓湯

赤茯苓一錢

東

參各二錢

芍各二錢

甘草各一錢

半

桔梗

參各一錢

芩各一錢

連

○惠加味道守痰湯

治內傷七情致痰迷心竅神不守舍如鬼

○紫憎寒壯熱頭痛上氣喘息口出涎沫

為傷寒治誤

芩半

陳實

星半

甘

术半

桔

參半

蔓芩

連

右剉

姜束水煎臨服入竹瀝

姜汁

○金大橘皮湯

治傷寒嘔噦胸滿虛煩不安

陳一兩

參二兩

芍二兩

大橘皮湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

○小橘皮湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

橘皮湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

○大半夏湯

治傷寒嘔噦胸滿虛煩不安

陳一兩

參二兩

芍二兩

半夏湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

○小半夏湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

半夏湯

治傷寒嘔噦手足逆冷

陳一兩

參二兩

芍二兩

○一溫經溫中之劑

○四逆湯

治節病太陰自利不渴及陰證脈沉細而遲身痛

陳一兩

參二兩

芍二兩

附子二兩

甘草二兩

大腹皮二兩

厚朴二兩

大黃二兩

附一枚去皮作甘炙六分右煎服取少汗而愈

八片生用

姜炙六分右煎服取少汗而愈

右半两生用

姜炙六分右煎服取少汗而愈

右半两生用

姜炙六分右煎服取少汗而愈

右半两生用

姜炙六分右煎服取少汗而愈

右半两生用

○附通脉四逆湯

姜三两

附大者一两

附小者一两

附中者一两

附大者一两

附中者一两

附小者一两

附中者一两

附大者一两

○附茯苓四逆湯

苓二两

附三两

附一两

附二两

附三两

附二两

附三两

附二两

附三两

○附理中湯

治即病太陰自利不渴寒嘔腹痛鴨溏

蛔厥霍亂

等証

惠曰吐蛔者雖有太熱忌涼藥蓋胃中寒蛔上

加半

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

甘草

半片

字半片

○附等証

惠曰吐蛔者雖有太熱忌涼藥蓋胃中寒蛔上

加半

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

甘草

半片

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

甘草

半片

○附加半

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

甘草

半片

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

甘草

半片

姜炒烏梅

煎服蛔定後以小柴退熱參

○附真武湯

治即病陰證脉沉細身痛或發少陰汗筋惕肉瞤等証

苓芍生姜附炮去皮

各三分

附炮去皮

各三分

附炮去皮

各三分

附炮去皮

各三分

附炮去皮

○附腹滿下利脈沉遲而微者加炮附

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附芩芍生姜附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○附細各半

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

附炮去皮

○海藏肉桂散 治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆

冷眼昏不知人變為陰毒惡證 桂木朴炒

良各三白芍陳前白附炮參各一茱半右入金束

○再造飲 治無陽証頭疼發熱惡寒項脊強無汗用表割

汗不出殊不知陽虛不能作汗 冬月用之夏加芩膏

葛參枝甘熟附細卷風芎生姜煨

○林木附湯 治中寒中氣四肢厥冷牙關緊急痰壅脉弱

术七分附炮甘三分右分二貼每貼姜十片煎化蘇合香丸併進

○惠調榮養胃湯 治勞力感寒証即補中益參茵

右八姜棗東升柏川芎白芍

○金人參養胃湯 治外感寒內傷生冷憎寒壯熱頭目昏

疼及夾食停痰俱能治之 蒼朮各一橘紅七分

霍薑苓參各半甘炙一右加生姜烏梅 寒多加附

一 瘟疫

○傳經曰冬不藏精者春必病瘟是以多感房勞辛苦之人安樂者未之有也俗名瘟病醫書曰瘟癆一皆觸冒四時不正之氣而為病

○龐安常曰疫氣之發大則流下天下次則一方次則一鄉次則偏著一家悉由氣運鬱發所致也仲景無治法後人用敗毒散治甚得理切不可作傷寒主治而大汗大下也但當從乎中治而用小陽陽明藥看陰陽脈証二方加減和

治之

目錄

丹溪曰衆人病一般者此天行時疫也治有二法宣補宜散宜降用大黃芩連參桔蒼風渭莎白芍  
神曲糊丸氣虛以四君子湯下血虛以四物湯下

痰多以二陳湯下

敗毒散

治瘟疫四時通用

羌

獨

前

柴

芍

枳桔白芩參各等分甘減半右為末每服三錢加姜三片煎服或沸湯點服亦可此藥治傷寒、瘟疫、風濕、風眩、肢痛、憎寒、壯熱、頭強、睛疼、或多風痰或處卑湿之地脚氣痿弱此藥可不缺一方加薄荷小許

九味羌活湯

治瘟疫初感二日間服之取汗而愈其妙如神

山嵐瘴氣之妙劑也陳紅荳朴各一甘葛各一葛各半藿香

右作二服加姜三片棗一枚煎服下方無菖有香附子

十神湯

治時令不正瘟疫妄行或四時感冒風熱頭疼身痛

寒熱無汗陰陽兩感並宜服之麻芻甘蘇姜

升麻葛根湯治瘟疫頭痛發熱升白芍甘

○升麻葛根湯治瘟疫頭痛發熱升白芍甘

葛十五右

柴胡升麻湯治時行瘟疫壯熱惡風頭痛身疼鼻塞咽乾

痰嗽涕唾稠粘柴升前赤芍膏葛各十粒

桑各六荆去梗十右入姜三片豉十余粒

桑两半荆两半

神木散 治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼耳子  
兩  
藁本  
細辛

卷柏

甘草  
一兩  
右加姜葱

一  
兩  
加姜葱

○林辟瘧病 赤小豆新布囊盛之置井中三日出舉家服男十枚女二十枚

又法 傲豆和白术浸酒常服之

又法 用狐狸鼻尖及糞燒之以薰除此病狐狸拋在竹木石間頭尖堅者是也

又雄黃研早晨水塗入鼻孔中及臨卧亦可塗同床不傳染

天行疫癘者東行桃枝剉者湯食蒙浴

溫病勞役及食復燒人屎存性為末酒調方寸匕服

天行瘟疫及小兒熱癇狂啼大人酒後異熱用臘月八日

屠蘇酒方 大根 柑橘 桂花 風藤 木川烏 菊葉

○各一右八味剉以絳囊貯之歲除日懸井中令沉至

泥正旦出之將囊浸酒中略煎向東從小至大飲之棄

囊于井中

### 一大頭天行病

傳

○東垣曰大頭病乃陽明邪熱太甚少陽相火為之也濕熱為腫太盛為痛此邪見于頭多在兩耳前後

治法不宣藥速速則過其病上熱未除中寒復生其腫勢

在何部隨經處治陽明為邪首大腫少陽為邪出於耳前後

丹溪曰濕熱在高顴之上用葛及酒炒芩酒蒸大黃隨病

加減切不可用降藥

二黃湯 治大頭天行疫病

芩

酒制衣

連

生甘

各等分

右水煎徐徐呷之スラ如未退用鼠粘子シカス不拘水煎入芒硝マグサ等分亦時時少與毋令飲食在後レタ如未已只服前藥タヤ取太便邪氣已則止タナム前方宜各少加引經藥タマツク陽明渴加石膏カイソウ少陽渴加桔カク陽明行經升スル葛カモハ芍カウ甘カク太陽行經荆カシ風カク甘カク並與上藥相合用之或云頭疼カク酒芩カク口渴カク葛カモハ身痛カク羌カク枝カク風カク均俱宜加之カク

## 一 蝦蟆溫

傳丹溪曰蝦蟆瘻屬風熱ハヌカニス防風通聖散加減用之或用小柴胡加風カク羌カク荆カシ芍カク桔カク煎服スル外以側柏葉搗汁ツバキ調火煖蠅カブトムシ米糞付之或用丁香尖カク附子尖カク南星カク醋カク調付之或五葉藤カク車前草皆可搗付之効カク

麻白芷カク羌カク杏カク甘カク青木香カク芍カク各半右水煎

太頭不行病從頤頷腫熱者又名鶯鵡瘻カク用羌カク酒芩カク酒太黃カク加減十五六月服小柴胡湯不愈者仍用陳蘇カク發散而愈カク

又法酒芩カク連カク為君カク剝甘カク為佐水煎細細呷之カク再加

梔粘子カク酒蒸太黃カク煎入對硝カク亦頻與之カク

甘結湯カク治冬溫咽喉腫痛カク甘カク桔カク各等右水煎時時頻呷之

## 一 感冒

傳不換金正氣散カク治四時感冒傷寒瘻疫寒熱霍亂吐

瀉出遠方不伏水土並皆治之カク朴カク炒陳カク白霍カク半  
荳

米泔浸甘カク半右加芻姜束束カク

藿香正氣散カク治四時感冒頭痛增寒壯熱或風濕霍カク

亂吐瀉

腹

酒洗，曝乾，再鳥蘇連莖藿霍芷苓各六分

朴姜木

陳去白桔半各四分

甘炙二右加姜束束

消風百解散

治四時感冒頭疼發熱鼻塞聲重咳嗽喘急等証

荳蔻

麻節荆穗

陳芷各一

甘半右加

姜葱

咳甚者加白梅一箇

八鮮散

治四時傷寒、頭疼、身熱、惡風多汗、惡心嘔逆

參木

芩甘

陳守

藿桂

朴各等

右加姜束束

和解散

治四時傷寒、頭痛煩燥自許咳嗽吐利

荳蔻

桔甘

陳朴各半

陳柏各四分

右加姜束束

香蘇散

治四時傷寒、頭痛發熱、惡寒

莎蘇各二

陳一

甘炙半

右加姜葱

頭疼加芍芷

芍芷各二分

參蘇葛木半

前芩各三分

枳桔炒

甘炙

陳半

各半右加姜束束

氣盛者去利香

十味芎蘇散

治四時傷寒、發熱頭痛

芎七分

蘇葛

各二

柴芩各半

桔二分

甘三分

枳六分

陳三分

右加姜束束

頭疼甚加芷

各二分

桔半

甘三分

枳六分

陳三分

中和散

治感冒

風濕頭目不清、鼻塞聲重、肢節倦怠不

伸、出淚

荳蔻六分

荆穗二分

荆穗束

治感冒

風濕頭目不清、鼻塞聲重、肢節倦怠不

伸、出淚

荳蔻六分

荆穗二分



