

醫法明鑑


二

X
—
139

F 1-123

490.9
Ih-10
4

No. 2104
19/39



富士川文庫

1315

醫書法明鑑卷之二



中暑門 一

一 中暑中熱之異

傳內經曰靜而得之為中暑動而得之為中熱。暑有熱之時無病之人或避暑於深堂太廈得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心脰膚大熱無汗為房室之陰寒所遏使周身之陽氣不得伸越太順散等熱藥主之。

若行人或農夫於日中勞役得之名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惱之則膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃為天熱外傷肺氣荳朮白虎等涼劑主之。

愚按傷寒論中一證曰中暯昂中暑者也脈虛而微弱煩渴

東垣清暑益氣湯等補益之劑
引飲射熱自汗此蓋得勞役射虛而暑邪干衛之候是宜

一証同熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身熱口燥心煩此
蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發乃挾暑而成太熱
之候是宜黃連白虎解毒等清涼之劑

一方法

○中暘而死切不可用冷宜溫養以湯熨胸前嚼生姜或大蒜
送下不能嚼水研灌之或生乾姜末湯點下亦佳也

○傳清暑益氣湯 治感長夏濕熱四肢困倦精神短小胸滿氣
促身熱而煩小便黃而數大便溏而頻或渴或不渴自汗
躄重脉洪緩上苔汗少蒼各半升仁參 术 陳 曲 炒

澤各五甘草炙柏酒浸飯 青門 葛各三 五味粒右

白虎湯

治暑熱發渴方見傷寒門

脉虛加參

益元散

一名天水散 治中暑煩渴小便不利方見

痢門

香薷飲

治暑熱腹痛霍亂吐利煩心等証

薷三 朴姜製

扁炒各一 右水煎

惠氣虛者不可過多方見

黃連香薷散

治証同前 前方去扁加連七分

十味香薷飲

金清暑氣和脾胃方見

薷一 參 陳 术

苓 扁 茵 朴

甘各半 右

桂苓甘露飲

治伏暑發渴脉虛方見

桂 參 茵 荸

术 甘 葛 濤 膏

寒水各一 清二木一 右為末白湯

下玉無 蕺有薷

生脉散 參 五味 門

各等 右水煎夏月時代熟水飲之

垣曰加芪 甘分 純人氣湧出

○林香薷剉散

解暑止霍亂

薷二

朴姜製衣

芩陳甘

炙各半兩

良

右入塙一捻水煎

縮脾飲

鮮伏熱除煩渴

消暑毒止吐瀉

霍亂

縮果

梅肉

甘炙各四兩

扁炒葛

各二兩

右水煎

袖

五芩散

治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉尿赤少

如心神恍惚加辰砂

名辰砂五芩散

方見傷寒門

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

杷丁

陳去白皮

朴製各等分

薷七朱

茅門

甘炙瓜

各二兩

右入姜水煎

煩躁冷水調下

香朴散子

治伏熱吐瀉霍亂煩悶

參芩各一連

甘炙蘇

瓜

芥半

扁炒陳

烏梅

朴各等分

右入姜東東

著

夏月傷暑者發熱汗大泄無氣力

脈虛細而遲暑傷元

氣也

參芪各一

蜜門白芍陳白苓各一連

炒甘五分

柏术

一分知

薷各七右加姜煎

夏暑

如在途中常服

壯元氣驅暑免暑霍亂泄痢等証

參一朱門

白芍炒白芩各一

五味碎十粒

木一朱

甘五分

知炒陳

薷各七芩分

右加姜

夏秋暑熱

因過飲食冷物傷內又取涼風傷外以致惡寒發

熱胸膈飽悶

飲食不進或嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也

參姜

炒紫朴姜水

陳羌實白芩各一

术甘五分

右入姜水煎

中濕門

二

○居卑濕之地或衝行風雨或辛苦汗沾衣皆外感之湿也恣飲酒漿多食瓜菓之類皆內傷之湿也

○外感多癰瘍肺腫疼痛，內因多中滿痞膈瀉痢。
脉沉而緩沉而細微，皆中濕。脉滑數尿赤澁引飲濕熱小便自利，大便瀉身疼，自汗，湿寒。

○傳一身盡腫痛或無汗，是濕流關節，邪氣在表。五苓加蒼微汗之。

自汗多者宜白术甘草湯。

小便自利清白大便泄瀉身痛，自汗為寒濕。五苓散加

生附 蒼廩

二陳湯 加酒芩 巷 蒼 通 散風行濕最妙。

防己黃芩湯 治風濕脉浮身重，汗出惡風或周身疼痛。

已 三 甘 一 术 二 茵 三 右 作 一 服 加 姜 三 片 束 二 枚，

加味五苓散 治濕勝身痛，小便不利，身重發渴者。

本方中加羌活一倍。

除風濕羌活湯 治風濕相搏一身盡痛。巷分風 升柴

各五 藥 蒼 各 一 右

羌活勝濕湯 治肩背痛不可顧。

此手太陽氣鬱而不行，以風藥散之。脊痛項強腰似折，項似拔，此足太陽經不通行，此藥主之。巷 独 各一 藥 風 甘 茴 各 五

蔓 分 右

如身重，腰痛沉沉然，經中有寒濕，加酒洗。

漢防己 分

家傳白朮酒 治中濕身痛。

治中

濕身痛

丸

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

瘧疾門 三

○傳經曰：夏傷於暑，秋為瘧瘧。云云瘧得於暑，當以汗解。或因取涼太過，汗鬱成瘧。其初感也，弱者即病，胃氣強者，伏而未動，至於再感，復因內傷，其病乃作。宜其難瘥。夫暑與風皆外邪也，故非汗多不解。今之遘此疾者，已經再三，仍試冒氣重傷，何由得愈？欲治此証，必先與參木等補劑，為君，加柴葛等發散藥，漸而取汗，得汗而虛，又行補養，當以汗之難易較輕重。

下財屬陰，最難得汗。補藥力汗出至足，方是佳兆。

大忌飽食，遇發日食飽，病愈重。

陰虛証，午後惡寒，發熱至晚，亦微汗而解。脉必虛濡，而數目。

瘧脉弦而虛脉不太弦，為辨耳。

暑瘧 宜人參白虎湯之類。

在瘰者，二陳湯加常荳紫荳，不能食者必於飲食上得之，當從食治。

虛者必用參木，一二貼托住其氣，不使下陷，後用他藥。

有汗要無汗，正氣為主，帶散無汗，要省汗散邪為主，帶補。

久瘧二陳加芎、蒼、紫、葛、白朮，一補一發，藥也。

痰滯胸滿，熱多寒少，大便燥實，大柴胡利之。

久瘧不得汗，以二陳湯倍加二朮，少加枳。

小兒瘧疾者，有瘧塊一。

生地 芍各一。

半

芩炒各

一

甘二分入生姜並調醋，火燉魚甲末一。

瘧安用丸藥，消導之，醋燉魚為君。

稜莎海粉青

青

桃紅麴芽隨証加減為丸醋湯送下

老瘧風暑入在腹分宜用血藥引出陽分而散

草 撫草 叛 紅 蒼 正 柏 甘

○用火虛瘡寒熱不多或無寒但微熱者丹參茶飴無之

八物加紫

陽瘡多汗用參芪木斂之無汗紫朮芩

陰瘡多汗用白

芳升紅發之

○傳
截瘡常山飲常葉旗知

右等分每服五錢水酒各半盡前

晨令服欲吐則須之忌熱湯一自

大不月當日更以之
痰飲大渴真氣虛弱者勿輕用

截瘡七寶飲 常水 菓 椒 甘草 朴 青

右作一服，酒水各半盞。寒多加酒，熱多加水煎。

不作二用。湘方言半壁。寒多也。

用丁痛忘之以腹惡熱茶湯一日至午食渴強
因嘔中桂枝湯五溫竈^ノ其膏五口四升一升枝

白虎加桂枝湯 治溫瘧。曹參知冬甘水桂枝
小導或去心抽丁 通也。常軍醋條黃芪半

相傳截瘡神方

太東東
个右水

一方常累知換名酒一盞浸一日臨發

治久瘧不愈一服便止永不發其妙如神

丁香半
水梅少

○截瘧 穿木敵魚各等分，為末一錢，空心酒調下。

○桂枝羌活湯

枝差風

麻黃卷活湯 治証如前惡風無汗 麻去風甘各等右

清脾湯 治脈弦數熱多寒少口苦咽乾木小便赤澁

青朴术果柴芩半芩甘炙各等分右加姜

散鯉甲飲子 治瘡久不愈腹中結塊名曰瘡毒肝之積也

鱉魚炙木茲果枳陳白芍甘炙朴各等分

右入姜七片棗東一箇烏梅一箇

○林清脾湯

治脾瘡食瘡

朴青守梅肉良各二分

果一甘炙五分右姜三片棗東一枚

人參養胃湯

治外感風寒內傷生冷發為瘧瘧

蒼炒朴製半製各參芩

蔻藿各半陳三甘炙一

一方加桂

右每服八錢姜烏梅半水煎

沿諸瘡

辰魏等分

為末糊丸如皂子大每服一丸空心米飲調下不適

百草霜 黃丹等為末每服二錢發日空心米飲調下不適

兩服愈發時再服

瘧瘧 小柴胡加芩

小柴胡湯 方見傷寒門

袖治熱多寒少

頭痛胸滿咽乾

如渴甚而嘔去半加天花胸下痞滿加芩

傳瘧瘧

發於子午卯酉日寒熱嘔吐舌乾口燥少陰經瘧也

二陳加歸 芎柏連柴之類

發於辰戌丑未旦寒熱嘔吐不食或腹滿自利太陰經瘧也

二陳加二木 柴芍之類

發於寅申巳亥日寒多熱少或腹痛引悶如淋狀厥陰經瘧也

二陳加桂枝 附姜之類

老瘧飲 治久瘧在胸膈諸藥不効者

蒼朮

袖

菜 桔 青 陳 良 各半 苓 茵 芍 枳 楚半 炒
姜 炮各 三升 蘇 芎 各二 右入鹽少許煎

林 一方 治霍亂 用雄黃 凤蒂

赤小豆 為末每服半錢溫水調下以吐為度

一方 治勞霍亂 鱼甲三兩 酥炙黃為末臨發時溫酒調下三錢也

△霍亂門

○陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐利憎寒壯熱頭痛眩暈洞間日因渴而大飲飲而過量或因飢而始食食而過飽以致濕熱內甚故陰陽交錯而不和是為吐瀉 挑霍亂而不得吐瀉者此名乾霍亂多死

塗湯令吐不吐更服三吐乃止吐定用鍾中藥

熱多欲飲水 五苓散 寒多不飲水 理中丸

河間曰凡覺此証急用五苓 益元

桂苓甘露乃吐瀉之聖藥也慎勿與粟米粥湯吐瀉止過半月飢甚方可與稀粥

少食以漸將息

轉筋屬血熱 四物加酒芩 紅 蒼 星 男子以手挽

其陰女子以手牽乳遍兩邊

林 甚則轉筋入腹即死霍亂惡証無越於斯

內經曰脉伏者霍亂

少不言者死 傳脉大者生 微弱漸遲者死 脉結促代皆不可斷以死

丹溪曰有宿吐者雖自吐利還須以吐法提其氣用二陳湯

探吐或鹽湯皆可吐之ヲ

季節穴出血或十指頭出血皆良法

半夏湯

治霍亂轉筋吐瀉不正

半

麵

芩

木各

冬淡桂

二分

甘炙一右為末

每服一錢

渴者涼水調下

渴者

涼水調下

不渴者溫水調下

理中丸 术 参 姜 甘各等為末

分燒蜜丸

凉水化下

六和湯 治霍亂吐瀉不正

术 半 緩 杏

參 甘

各五

赤苓 蕤 扁搘

各半

炒風

各一

薷 朴

製炒各

右加姜三

片棗一枚

漿水散

治暴泄如瀉周身汗出盡冷脉弱吐不任

半

水

附

乾生姜

甘炙桂各半

良

右將水水煎

姜附湯

治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗

半

水

附

加陳皮青皮

方見傷寒門

理中湯

治過食生冷成霍亂吐瀉心腹滿悶

半

水

附

加陳皮青皮

方見傷寒門

丹溪曰凡霍亂不渴用桂姜理中湯

渴五苓散加五味門
名治中湯更加丁附名丁香治中湯

方見傷寒門

謂又云冬用理中湯夏用黃連香薷湯

丹溪曰凡霍亂不渴用桂姜理中湯渴五苓散加五味門

謂又云冬用理中湯夏用黃連香薷湯

一方 治吐瀉

藿 蓼 苍 朴 陳 縮 芍 半 荑

參 麵

水煎

遇寒加乾姜

寒甚加附

通脉四逆湯

治霍亂多寒身冷脉絕

茱二兩附炮一

桂 通草 細 白芍 甘

炙各半兩白芍三分

右水酒各半加生姜

茯苓澤瀉湯

治吐利後煩渴飲水

五苓去猪加甘

木瓜湯

治霍亂吐下舉財轉筋八腹悶絕

風一 茄半

茵一 甘炙一右八生姜蘇葉

詞子散 治心脾冷痛霍亂吐利如神

訶 甘炙朴製

姜 果 陳 良 苓 曲 炒各 二分 右八鹽步煎

火分

○林七氣湯 治七氣鬱結五藏之間陰陽不知霍亂吐利
半兩 白芍 芍各四桂 朴製各蘇 陳各二參一兩

右加姜末

止渴湯 治霍亂煩渴 甘炙參 門 苓 桔括葛 沢
各等右為末每服二錢蜜水調下

麥門冬湯

治霍亂已愈煩熱不解多渴小便不利
門 陳去半 白芩 木炒各三 甘炙參各一水 小麥一水
水半二分半

右分二貼水一盞姜五片烏梅煎八分服

袖不換金正氣散

治霍亂轉筋吐瀉不止

方見傷寒門

藿香正氣散

治濕氣霍亂吐瀉 方同前

姜溫飲

治乾霍亂

鹽

生姜

半

司

炒令色變

以水

下

既濟湯 治霍亂後虛煩不得眠 參 甘炙竹葉

各四兩

門一附炮半半右入姜五片粳米百餘粒

林吐藥汁無法可治用井泉水半椀百沸湯半椀薈服之妙

清法 治霍亂轉筋入腹 塹多用煎湯漬之

洗法 治霍亂轉筋 用蓼一把去兩頭水煎薰洗

一方 用陳大蓼

灸法 治霍亂已死腹中尚有暖氣用塙用脐中灸二七壯

壯仍灸氣海二七壯

又灸霍亂吐瀉 上官中官各二七壯 傳灸天樞氣海

又水穀不分而泄瀉 灸水分七壯

又轉筋入腹欲死者使四人提手足灸脐左边二十四壯

又轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

內傷門 五

一辨內傷外傷

○外傷風寒有餘之証發熱惡寒寒熱併作其熱發皮毛之上鼻氣塞不通心中煩悶不安一時一日增加愈甚內傷飲食勞役不足之証寒熱間作其熱蒸蒸燥熱發肌肉之間口鼻中氣短不足以息腹中不和口不知味大小便或閉或溏或心下痞悶或胸中痛

○內証頭痛有時而作有時止外証頭痛常常有之須傳裏方罷

一治法

○傳惡寒發熱頭目沉重之証世醫不察內外虛實便作傷寒用汗下之法故東垣先生著内外傷辨惑論脾胃論等皆以扶相胃氣為本或內傷挾痰與食清氣藥平下濁氣塞胸中之候驟用補中益氣等藥則氣滿痞塞遂謂補藥不宣此証改用汗下而死故王安道著內傷不定中有有餘

○玉勞倦傷誠不足飲食傷當於不定中分有餘不足酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈次利小便二者分消其湿

○惠傷食必思食氣氣白脉緊盛胸膈痞塞亦有頭痛發熱者但身不痛

二陳加术

查 芎 苍

如聞食氣

○傳即嘔

二陳加縮

青

○傳有痰者有挾外邪者有熱鬱于內而發者皆補元氣為主看所挾而兼用藥挾痰者補中益氣加半

氣虛甚者，少加附以行參芪之氣，

林脉緩急，惜嗜卧，四肢不收，或便瀉，從平胃散。

脉弦氣弱，自汗，四肢發熱，或便瀉，或皮毛枯槁，從黃芪

建中，脉虛而血弱，從四物湯而加減，真氣虛弱及氣

短，脉弱，從四君子湯，或渴，或小便閉澁，赤黃從裏拿散去，桂

○傳補中益氣湯

芪一，甘炙五參，病甚，木

白芍七，陳五分

升柴各三，右

脾胃虛肺氣先絕，故用芪，益皮毛

閉腠理不令自汗

上喘氣短，損其元氣，用參，補之

心火乘脾，用炙甘瀉火，熱補胃中，充氣，若脾胃急痛

腹中急縮者，宜多用之，此三味除濕熱之聖藥也

木除胃中熱，利腰膝間血

升柴升胃中之清氣

又用歸和血柴商工理

引芪甘，上升能補衛生氣之散

用歸和血柴商工理

胸中之氣又助陽氣上升，散滯氣，或加柏子仁救腎水

瀉陰中之伏火，也表熱者，二服氣和微汗而愈

咽乾者，加葛根

心刺痛乃血溢不足，加歸

精神短少

者，加參五味

頭痛加蔓荆子，甚痛加芎，頂痛腦

痛加藁本，細辛

有痰加半生姜，效嗽夏加五味，門

秋冬加連節麻

春加佛耳，欬冬久嗽肺中伏火

去參，食不下乃胸中

有寒，或氣滯，加木陳青

寒月加益智草豆蔻

夏月更加芩連，秋更加

楨縮

心下痞悶，加芍連

腹脹加實木朴縮

天寒加生姜桂，腹痛加白芍

甘，有寒加桂，夏加

芩葛芍，冬加益智草豆蔻

半夏，胸痛或縮

急加柴甘，膈下痛加熟地，不已是寒也，加桂，太便

解，腹痛或縮

芩葛芍，膈下痛加熟地，不已是寒也，加桂，太便

閉澁加大 歸一 腳軟之力或痛加稻不已更加包

氣浮心亂以硃砂安神丸鎮固之

硃砂安神丸 連一小朱一酒生地 酒歸身 甘 炙各

右為末湯浸蒸餅丸津唾吞下食後服一方無散地

調中益氣湯

脉弦洪緩而沉時四肢倦怠煩心腹難舒伸二便清利而數或大便滯夏月飧滯完穀或便後見

歸加木

一 分或如陰火蒸熱加生地二柏三分太便虛坐或

血或膾胸滿膈噎痰嗽此藥主之

補中益氣湯去歸加木分身躬沉重雖小便

多亦加芩

二 苓一分 沢五分柏三分胃氣不和加半分生姜三分

有嗽加生地二分

以制半夏之毒 痰厥頭痛非半夏不能除

而半夏腹痛

春夏加白芍 冬月腹痛不可用芍只加乾姜

升陽補氣湯

治因飲食勞役胃氣不足脾氣下陷氣短無力不能寒熱早飯後昏悶倦怠五心煩熱

朴三升

羌獨白芍風甘炙澤各五柴二分生地

木香化滯湯

治食濕結中脘心痞不食或胃脘痛

半一草蔻

濕蔻果甘炙各七分柴六分橘紅各四實

飯各三酒紅一

右加生姜

門冬清肺飲

治脾胃虛弱氣喘精神短少或吐衄

苑草一

白芍甘炙各參門自分五味粒右

白朮和胃丸

治久不食大便或閉或溏此胃氣虛弱也

木一兩半

朴各一陳去白參五甘炙各二實柏各二木半

乾生姜 右為末湯浸蒸餅丸米飲送下

枳木丸 治痞滿消食強胃

木二實 麵炒
右為末用

沸湯包青荷葉乾者亦可頃間去葉用湯浸晚粳米
杵粉以原湯煮糊丸白湯送下 加橘紅各名橘皮枳木丸

治元氣虛弱飲食不消心下痞悶

加炒麵二炒蕷麴兩

枳木丸 破滯氣消飲食 加半兩名半夏枳木丸治

傷食加酒炒黃連酒蒸大黃炒神曲

橘紅各二

芩四名三黃枳木丸 治傷肉食濕麴辛辣味厚之物填塞悶舌

丹溪保和丸 治宿食心腹飽脹者分服

備急大黃丸 治心腹卒痛大巴皮膜乾姜各等分

右為末煉蜜丸小豆大每服二丸

丹溪保和丸 治宿食心腹飽脹者分服

右為末別用生神曲水入姜汁打糊丸白湯米飲下

一方無芽有米二兩 脘胃虛 四君子湯送下

祖傳 通涼散 凡傷食寒熱久不已或傷寒後食後以厚食

之物燒存性一兩為末用生韭根葉杵冰調服過一二時

以東垣枳實導滯丸主之

枳實導滯丸 治傷溫熱之物痞滿悶亂 大寶

炒麵各半兩芩子連术各三克右蒸餅丸以利為度

加木 桔各半名木香導滯丸

參芩白木散 治脾胃虛弱飲食不進或嘔瀉大病後補助

脾胃極妙參木芩山扁姜汁浸炒甘桔葛

蓮各一右為末每服二錢東棗湯調下 一方有縮丁兩

禁中廁用粳米湯下

惠

○平胃散 治脾胃不和

蒼朴

陳夫白各半
甘草二分

右加姜棗

氣不舒

快中脘痞塞

加沙縮一

欲進食

○加曲芽 吳茱洗蜀椒

吳茱洗蜀椒

陳夫白各半
甘草二分

大半
甘草二分

○益胃湯 治頭悶動熱

則微痛不善飲食口不甜味躁熱

氣短鳴便溏口乾不渴

食冷

芪歸黃升

各五分

○甘守 分各二分

芩木參柴

益各一分

芩半

甘草一兩治

○林凝神散 取欽胃氣清涼肌表

參木芩山梔

各一分

竹葉地骨門各半

○梗扁炒知 生地 甘草各一兩

生地

甘草一兩治

竹葉地骨門各半

○右加姜棗

○感應丸 治傷冷物不能消化或漏臭如抱壞雞子

○百草霜 鑄底者杏仁四十粒姜炮一巴七分去皮

葛根二分

木丁半

右姜蔻木丁四味為末同餘三味用蠟六

分

右姜蔻木丁四味為末同餘三味用蠟六

分

右姜蔻木丁四味為末同餘三味用蠟六

分

○兩鎔化入好酒一升煮熟沸候酒冷其蠟自浮於上取蠟

秤用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半煎熟下酒

煮蠟四兩同化乘熱拌和藥末丸姜湯下

秤用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半煎熟下酒

煮蠟四兩同化乘熱拌和藥末丸姜湯下

秤用春夏修合用清油一兩秋冬用一兩半煎熟下酒

煮蠟四兩同化乘熱拌和藥末丸姜湯下

○全黑圓子 治宿食不消吞酸或腹痛飧泄如痢

○烏梅肉百草霜杏去皮尖分

巴殼油半枚縮小

右為末麪糊丸姜湯下

右為末麪糊丸姜湯下

右為末麪糊丸姜湯下

右為末麪糊丸姜湯下

○阿魏圓 治脾虛弱食肉麪糰不消化

○薺炒芽炒曲炒青蘿炒木 姜炮各半兩

百草霜三分去殼油

巴殼油半枚縮小

魏酒浸桂

桂化水

桂化水

○右為末糊丸姜湯下

麪傷用麪湯下

生薑傷用麝香湯下

生薑傷用麝香湯下

生薑傷用麝香湯下

生薑傷用麝香湯下

生薑傷用麝香湯下

○著人遇勞倦辛苦用力過多服之免生內傷發熱之病此方

主於補氣

○蔴蜜炙一參門陳木各一甘草五分

味二十粒 右入姜棗 勞倦甚 加熟附分

○全養胃湯 治脾虛胃寒 嘔逆惡心腹脹痛腸鳴泄瀉或

有外感寒熱如瘡骨筋頸疼並皆治之 薤朴

半芩各一葉 附甘陳參各三分 术半兩 右姜五片

棗一枚 乌梅半

補血湯

遇勞心思慮損傷精神頭眩目昏心虛氣短驚悸

煩熱並治

酸棗門各一芍

生地

陳桔

甘各五分 一冬味十五分

右

泄瀉門 六

傳
○李子

原病式曰瀉白為寒瀉青黃赤黑為熱

大抵瀉利小便清白不瀉為寒

赤瀉為熱

又太便完穀不化色不變

肚利不腥穎水夜登散清冷尿清

不瀉身冷不渴脈遲細而微寒証也

穀肉消化無問色及他証便斷為熱

穀不化亦有熱証

火性急速

傳化失常完穀不化而為飧瀉者亦有之

久瀉穀道不合

或胎貯此元氣下陷及太陽不行攻令而然

术芍曲

陳詞蔻 五倍 烏梅為丸四君子加

湯水

升風煎湯送下

食入胃不

住完穀氣虛

參术芍加茵升柴風提之

瀉水

腸鳴痛一陣瀉一陣火

四苓散加滑芩通施伐

火利尿

或瀉或不瀉或多或少

痰瀉石黛芩曲為丸

腹痛甚而瀉後痛減

食積以大實曲消滌之

○瀉証須積滯已消後用斷下藥便固止之多成痢先理中

○瀉証須積滯已消後用斷下藥便固止之多成痢先理中

焦次分割水穀治中不効然後斷下

○著泄本屬濕然多因飲食不節至傷脾胃而作須看時令寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝湿亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜取泄之

主方

木二白芩

白芍各一陳一甘炙五分

若傷食泄黃或食積加曲

芽查各一炒連分以消之

腹中痞飽悶再加朴

實木各五分

尿赤滲亦加沴

猪通各一以分割之

夏月再加茵陳

七炒梔仁四分口渴引飲加葛一木參

門各一升四梅二分

若夏秋之間湿熱大行暴注水瀉加連炒蕎

沴各一升

通各五分飲酒便泄此酒積熱瀉也加連炒茵

葛各一分

木五曲芽各八分

寒月塘泄清冷腹痛或易生冷飲食

久泄胃氣下陷服利尿藥不効宜加參芪各一以補中氣

新加柴各四分以升提之再加芪

助風以平之更加姜五分以固之

久瀉中虛食少難化加

芪參各一曲芽各二分

木煨姜各一分

木煨姜各一分

○葵莖湯治傷冷飲泄注續作白痢或赤白相交腹痛食減

熱躁四肢沉困無力

芩生一坂二桂甘炙各二分半

猪苓各三

分五分芍七分芩

生甘升柴各一分

右

黃芪補胃湯治大便一日三四次溏而不多腹鳴尿黃

芭 柴 歸身 益

橘紅各一升 二甘煖半 紅光許 右

治竇泄 ^ノ 术 炒白芍炒各二兩 陳一兩 半炒 風兩右水煎或丸服

夕瀉加升 六分

白芍散

治濕瀉及食積湿熱作瀉 ^ノ 术 芎 各等

右水煎或為末米飲調下

神木散

治脊傷於風夏必殲泄 ^ノ 术 芎 各等

卷四 甘多三細二分

右加姜 ^ノ

胃風湯

治証如前及治風冷乘虛入腸胃泄瀉完穀及濕毒

下如豆汁或下瘀血或如魚膾 ^ノ

參 芎 白朮

桂

生料五芩散

治泄注如水 ^ノ 方見傷寒 加蒼車倍末為末米湯調

白芍各等右入粟米不撮水煎

如腹痛加木香 ^ノ

平胃

五芩合和姜末煎服

平胃散

治暴瀉身冷汗出脉微 ^ノ 方見霍亂門

理中湯

治藏府停寒泄瀉不已 ^ノ 方見傷寒門

升陽除湿防風湯

治大便閉塞或裏急後重 ^ノ 圓而不

能便或有白膿或血慎勿利之 ^ノ 蒼四風二术 白芍

白芍各一右

○實腸散

治泄瀉不止

蔻 詞 ^{去核} 宿 陳 蒼 芎

朴各二木

甘多各分右加姜末末 手足冷加干姜炮

赤石脂散

治腸胃虛泄注完穀腹鳴痛 ^ノ 脂煅

甘煖各一兩

縮兩蔻

右為末米飲調下

六和湯 治暑月泄瀉ノ 此方見霍亂門 蕃朴各一甘矣

赤苓 扁瓜 蕃藿各一參术 守杏 縮各分

右加姜棗末

調中散 治腸虛泄瀉不正 嘔吐不食

蒼炒曲 炒桔各一

芽炒益

橘紅各二藿藿縮

莪炮姜炮桂

茵炒果各半

甘灸三右入姜棗并步鹽前

止瀉秘方 參术

苓 甘灸

姜炮訶核木

藿 莪

右等分煎服

金粟蔻圓

治暑泄不止

蜜

蔻炮右為末

○林木香散

治脾腎俱虛泄瀉

蔻煨破炒木

白苓 各半

兩术

甘灸各一兩右姜棗末

二神丸

治脾腎虛寒世薦不食

破酒四日生

生二右為

○膏丸桐子大鹽湯下

加术半茴二名四神丸

治脾腎

虛腸鳴泄瀉腹脇虛脹胸膈不快飲食不化

○五味子散

治腎泄味二茱半兩細粒

右二味炒香為末

陳米飲下

○傳祖傳

治腹痛泄瀉艾葉車前葉各一握右細切用冰

二盞煎至一盞去粗入姜汁再煎一沸稍熱服立愈

灸法 治吐瀉不正

灸天樞氣海立愈

○同陷下則灸之百會 脾俞 中脘 關元 腎俞

太腸俞 長強

全痢病門

七

○傳丹溪曰痢疾乃外感兼內傷之候也須分表裏治之

在表者、惡寒、發熱、身首俱痛。 小柴去參、東加蒼

芍生芍陳微汗以散之

在裏者、後重、窘迫、腹痛下積早宜以大小承氣酒煎

大黃湯之類下之。 餘邪未盡更以芍藥湯香連丸之

類穢積已盡而更衣未息者此太陽不行取令故也以

固腸丸 參香散之類止瀉之

腹痛自芍甘草為君。 反木為佐。 恶寒加桂。 热加柏

腹痛因肺氣鬱在大腸間以苦梗發之後用痢藥

一云實則可下虛則以苦梗發之

初下痢腹痛用溫藥姜桂之屬勿用參木縱氣虛胃

虛不可用

後重者氣與氣家下故兼升氣有木香兵部丸方見腹保和丸之類方見內傷門

發熱不止者屬陰虛用寒芩兼溫藥升藥

孔痛因熱流於下 木 桧 芩 連加炒姜

又云冬病身冷自汗脉沉小而孔痛慎溫暴病身熱脉洪大

宜清之

下血者宜涼血活血

歸芩桃之類風邪下陷外提之

方見暑送下保和丸

溫熱下痢小便澀少煩渴能食脉洪大而緩腹痛後重

桂苓甘露飲 方見暑送下保和丸

濕多熱少食少腹痛後重夜後利下 胃苓湯平胃合送

下保和丸

氣虛面色萎黃或枯白色疲倦痢頻併痛後重不食脉

細弱或微汗出 方見暑送下保和丸

濕熱為痢，不渴者。

建中湯加芩、荳下保和丸。

脾胃不和食少，腹脹痛，後重脉弦緊。

平胃散加芍、桂。

葛、术、荳下保和丸。

血氣大虛，腹瀉，後重不食，或得此証。

四君方（見虛加損門）。

歸陳下保和丸。

下痢白積者。

芍藥湯加木、陳、甘、滑、桃。

下痢赤積者，身熱。

一元散加通芍、炒陳木、湯下保和丸。

下痢日久而不能起於床，不食疲弱之甚者，用參、芪、地榆

縮

沵各五木

芍、陳各一、板七、瞿、芍各一、木、升、梔

各三分，右煎服。

著治痢主方。

芩炒二連炒一、白芍炒三昧，痢疾必用之藥。

初後重加滑，再加板，板分生芍、芩用條實者。

亦加五分，

月久而後重不去，此太腸墜下也。去翫板，用條實、黃芩，加升、木提之。

白痢加木

白苓

陳

滑炒各一

初欲下之再加大、木

兼食積，加芩

實各一

紅痢加歸

芩

桃各半

初欲下之加大、木

紅白相雜加歸

芩

桃各半

以理血加滑、陳、木各半，以理氣，有食積加芩、實各半。

傳芍藥湯

行血則便膿自愈，和氣則後重自除，此藥是

也。

白芍

二、歸尾

連、芩各一大、木、桂各半

分

甘、板各一

桂木桂各五分

初後重窘迫甚者倍大黃加芒

各半

瘡滿不宣通加

實タツ 藏毒下血加柏タツ

黃芩芍藥湯

治瀉痢腹痛或後重身熱久不愈脉

洪數及膿血稠粘者タツ 芩タツ 芍タツ 各三兩タツ 甘タツ 一兩タツ 右煎服

腹痛加桂タツ 分タツ 热服

黃連湯

治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血

連タツ 歸タツ 各二兩タツ 右

芍藥黃連湯

治便後下血腹痛謂之熱毒下血

芍歸連各一兩半タツ 大三分桂半タツ 甘三分右

大黃湯

治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脉

沉實者或初腹痛甚者タツ 窮迫不安者タツ 太黃一味

好酒浸半日並去粗賴服後以芍藥湯和之又再服黃

芩タツ 芩タツ 治下痢膿血相交裏急後重タツ 連用茱萸
香連丸タツ 治下痢膿血相交裏急後重タツ 連用茱萸
蜜同炒去菜タツ 木八兩右為末醋糊丸米飲下加石蓮半

治禁中痢尤佳

益元散タツ 治痢之聖藥也

白滑六甘一兩右為末白水調下

神効參香散

治痢日久穢積已少腹不痛或微痛不後重

窮迫只滑留不正乃取功之後藥也

罌タツ 一兩タツ 二兩タツ 二兩タツ 二兩タツ

陳一兩タツ 蔴タツ 麴裹煨

芩タツ 扁タツ 各四兩タツ 木タツ 參各一兩タツ

祖傳和中飲

治痢疾不分赤白久近服之但發禁口不可服

陳木芩タツ 芍各一兩タツ 薤タツ 甘三兩タツ 陳倉米二兩タツ 砂糖三兩タツ 栗殼一兩タツ 醋

一兩タツ 鳥梅一個タツ 右作一服加姜三片末末一枚水煎

二防飲

治痢後感寒濕脚膝腫痛名鶴膝風

參木

葛 彙 歸 芎 熟地 芍 仲 姜汁
薑各一 甘 炒薑各一 甘 炒
風已

羗 膜各七附童尿浸三日去皮右作一服入姜三片棗米二枚分
禁中痢胃凸熱甚故也用連參煎湯終日呷之如吐則再

強飲但得一呷下因便好

又用田螺搗盦臍中以引下其熱

又禁白不食者參苓白木散方見內傷門加葛末陳倉米飲下或

參苓蓮八味少菖蒲為末與之胸次一開自然思食蓮陳壁土一味細末東姜煎湯調下

○丹溪主方 治熱痢血痢即古方四黃散連芩柏枳鳥

一方 治虛弱患痢曲炒七升五右水煎下參白苓木等為末麵糊丸加太黃米飲下

治痢後腳細弱細弱一付芩君兩白苓板各二柏五右為末鴨糞糊丸

四物湯加陳甘煎湯下

○黑丸子 治宿食腹痛飧泄赤白痢方見內傷門

駐車丸 治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛甚

連三

膠兩歸各一姜炮一右為末醋糊丸米食下

白术聖散子 治鴉痢久不瘥并婦人產後痢

歸 蔴 縮

榴皮 詞 姜炮各一陳木各一甘各一芍各一

右水煎入乳香末空心服

加減平胃散久下痢則脾胃虛損而不流於四肢却入胃

中為血痢宜服此滋養脾胃木

根各三木各三朴各三陳

谷一甘七參一連一白芩一膠炒桃各五右為末每服五錢

姜三斤束束一枚水煎去粗服

血多加桃

氣不

行後重加桃

水

腹痛加

桂芍甘

熱泄加連

脉洪大加大黃

尿澁加參

濕多加木

加附

加減木香煮散

治一切痢神妙

木甘

酸

蔻

桂

芍

參

參桂芍訶

鳥梅核膠蚌蛤白苓各五錢

蜜炙一兩半

葛根湯

右每服四錢姜三斤束二枚煎去粗服

加味四君子湯

服藥已多痢不愈蓋攻擊藏府之藥轉

覺難安宜用和氣之藥

參木

白苓

桔參芩

葛根

柴胡

葛根湯

葛根湯

右每服三錢姜三斤束二枚

百中散治一切痢一日去五六十行只一服便止

葛根蜜炒赤朴製四兩

右為末米湯調下忌生冷油膩魚鮮等

葛根蜜炒赤朴製四兩

右為末米湯調下忌生冷油膩魚鮮等

葛根湯治癰瘍俱作寒熱腹痛煩渴及禁口者

葛根半加芩半右分二貼姜五斤束一枚

金粟米百粒水煎

葛根蜜炒赤朴製四兩

右為末米湯調下忌生冷油膩魚鮮等

真人養藏湯治下痢腹痛及酒毒便血

葛根湯治酒痢

葛根半芩半生地杏各二

葛根蜜炒赤朴製四兩

右為末米湯調下忌生冷油膩魚鮮等

氣門 八

目錄三

○傳內經曰百病皆生於氣也若不善攝養者五志之火無時不起五味之偏無日不傷是以釀成膠痰固積留滯於六府鬱火邪氣充塞乎三焦使氣血失其常候府藏不能傳導是故外邪得以乘虛而湊襲

脈經曰脉滑者多血少氣澀者少血多氣大者血氣俱多脉來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少細而緩者血氣俱虛代者氣壅細者氣少

○心氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣必先豁痰如七氣湯半夏為主官桂佐之調氣雖用豁痰亦不可無溫中之剂

○傳二陳湯 方見氣結于胸臆之間而為痞滿刺痛伏梁等証

○在下焦而為奔豚七病等証者加桃 桑 桃 柏 核 枳核

茴 棍 荔枝之類

○在兩脇攻築作痛者加青 柴 苓 膽之類

婦人胎前產後一切氣疾作楚者 四物為主加行氣之藥

○林七氣湯 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脅脹面肢浮腫大便秘難 參 桂 半 各 二 甘 炙 一 右作一貼入

姜三片 惠半 五桂 一人 甘 各 五

○四七湯 治証同前 方見痰門

○三和散 治証同前又治背脇痛妨食及脚氣攻胸腹滿悶太便不通 太便不通 卷 蘇 沉 凤 腹 各 二 甘 三 甘 六 分 甘 各 一

陳木 桤 木 各 九

一方加姜 縮 燈心 各 一

右

木香飲一名流氣散子
一名木香流氣飲治氣壅塞脚浮腫無不効

蘇青飯酒芍鳥芩桔半甘多芎葛

炙實炒風

換枳炒麸

腹子姜汁浸宿

培各八分

陳一分

木右分二貼姜三片束一枝水煎

木香流氣飲

治氣痞胸膈脹面白四肢浮腫二便秘

半朴青

蘇梗莎甘

腹子各六分

陳去白桂

丁皮火

通去蘇門

木赤零

甘多

芎葛

一方去藿菖加沉六枳四大黃

快氣湯

治氣積心腹脹滿胸塞吞酸痰逆嘔吐宿酒

香附燃

一縮

四甘多

兩

右為末

鹽湯點服或入姜煎

抑氣散

治七情怒

中脘不快

氣不升降

降氣張

蘇炒四陳

右為末每服二錢

姜三片束一枝

女人尤宜服

分心氣飲

治因寒客氣留滯胸膈痞悶頭眩口舌

乾食減漸羸瘦

女增寒氣不快欬嗽氣用妙

蘇四卷半桂

青陳腹桑炒通

芍甘多

赤苓各一右每服七錢

姜三片束二枝燈心十莖

氣炒枳

萊炒皂角子各一

分心氣飲治証同前

桔炒門

荳腹皮木桑

丁皮腹子朴木參各半

蘇炒蘇陳藿各一

甘炙一右入姜束束燈心十莖

兩

蘇合香丸專能順氣化痰並治傳屍骨蒸心痛鬼魅

赤白下痢小兒驚癲搐等証

沉麝研可

用丁木

安別^{アリル}石^シ用^テ無灰^{アシカ}沙炒機木 檀^{タケ}各^二薰^{ハラハラ}蘇合香油^{ハラハラ}
酒^{サケ}丁升^{トスリ}研各^朱飛^{ヒツク}膏^{カス}沙炒機木 檀^{タケ}各^二薰^{ハラハラ}蘇合香油^{ハラハラ}
膏^{カス}腦^{カブト}研各^朱飛^{ヒツク}膏^{カス}沙炒機木 檀^{タケ}各^二薰^{ハラハラ}蘇合香油^{ハラハラ}
內^{ナカニ}月^{ヅキ}一兩^{イチロウ}石^シ和^{ハグ}劑丸^{スリガマ}如梧桐子^{スリガマ}大空心^{スリガマ}溫水化下^{スリガマ}四九酒服^{モモタカヒトリ}亦可^{アリ}

紫沉通氣湯 治^ス三焦氣滯不能宣通腹脹便秘^ス

蘇 枳^{シキ}麸^{ヌシ}陳^{ミツ}去^{スル}赤苓^{セイリ}甘炙梅^{シキ}各^一沉^{スル}木^シ門^ム味^ミ桑^{コウヤク}

茲^{スズ}姜^ガ苛^{ハラハラ}荆^{ハラハラ}實^{ハラハラ}炒^{ハラハラ}各^右

木香枳榔丸 距^{スル}三焦利胸膈^{ハラハラ}破瘀逐飲快氣消食^ス

木^シ枳^{シキ}榔^{ハラハラ}青^{シキ}陳^{ミツ}莪^{ハラハラ}煨^{ハラハラ}連^{スル}歸^{スル}枳^{シキ}炒^{ハラハラ}各^百柄^{ハラハラ}大^{ハラハラ}各^三

莎^{ハラハラ}炒^{ハラハラ}牽^{ハラハラ}末^{ハラハラ}各^右為^{スル}末^{ハラハラ}水丸^{ハラハラ}如梧桐子^{スリガマ}大^{スル}每服五十丸食後毒^ス

湯^{スル}下^{スル}

○傳正氣天香湯 治婦人氣痛或胸脇腹中結塊刺痛因之

用^{スル}水不^{スル}調^{スル}或^{スル}微^{スル}寒熱及^{スル}胎前產後^{スル}一切氣証^ス

沉香降氣湯 治^ス氣不升降胸膈痞悶吞酸^ス

甘^{ハラハラ}灸^{ハラハラ}一兩^{ハラハラ}莎^{ハラハラ}童便浸^{ハラハラ}右為末^{ハラハラ}每服二錢入鹽少許白湯調下^ス

○玉異香散 治^ス胃氣不和腹脅脹食難化一切冷氣結聚^ス

莪^{ハラハラ}稊^{ハラハラ}益^{ハラハラ}甘^{ハラハラ}灸^{ハラハラ}各^青陳^{シキ}朴^{ハラハラ}各^二蓮^{ハラハラ}右入姜棗^ス

○全和氣散 治^ス脾胃不和中脘氣滯^ス脅脹滿嘔吐^ス

蒼^{ハラハラ}甘^{ハラハラ}灸^{ハラハラ}各^一兩^{ハラハラ}陳^{シキ}去桂^{ハラハラ}良^{ハラハラ}莎^{ハラハラ}桔^{ハラハラ}各^三右為末^{ハラハラ}鹽湯點服^ス

順氣木香散 治^ス氣不升降胸痞引痛及酒食過傷噫酸^ス

蒼^{ハラハラ}桔^{ハラハラ}茴^{ハラハラ}炒^{ハラハラ}各^一兩^{ハラハラ}姜^{ハラハラ}炮^{ハラハラ}陳^{シキ}去桂^{ハラハラ}縮^{ハラハラ}丁皮^{ハラハラ}甘^{ハラハラ}灸^{ハラハラ}良^{ハラハラ}桂^{ハラハラ}

木^シ各^一兩^{ハラハラ}右姜棗煎服或入鹽少許沸湯點下亦可^ス

紫蘇子湯 治^ス憂思過度心腹脹喘促煩悶腸鳴二便不^ス

利脈虛累而瀉^ス

蘇子^{ハラハラ}一腹^{ハラハラ}果^{ハラハラ}半^{ハラハラ}朴^{ハラハラ}木^シ陳^{シキ}

通术 實炒甘炙參 各半 右加姜末末

一
兩

林鍼灸法

憂死肢冷心腹口鼻溫目神不轉口無涎舌卯

不縮口無涎舌卯

口鼻溫目神不轉口無涎舌卯

不縮鍼合谷三分徐徐出針押穴復活

刺兎骨用針口中溫入三分徐出押穴

驚死心下溫

冷身口溫針入中三分灸百會三壯

又法

神道五推針三

奔豚氣捨心不得息灸中極五十壯

徐氏○灸心氣法

男左女右掌內五指與一寸之脾心二條結

一磊正坐，脾心分開，加頸上以指按定磊於天突骨上兩邊

金消氣散

治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫飲食

無味小便不清

沉术參半青桔

各半

陳一兩

白芩 藥燒復燃株連各半

右姜末末

痰飲門

九

○傳丹溪曰：有熱痰有濕痰有酒痰有食積痰有風痰有寒痰有老痰。痰脉皆弦微沉滑雙弦者寒飲偏弦者飲也沉而弦懸飲肉痛。

肺飲不弦但苦喘短氣四肢歷節走痛脈沉者有留飲兩關

浮弦大而實者痰眼胞及眼下如炭煙薰黑者亦痰也。

關伏而大者痰

用藥連一濕痰身多軟而重用二术又曰用芩

熟痰用薑連一湿痰用薑蜜丸噙化

莎半貝

酒痰用薑蜜丸噙化

食積痰用

曲芽

查或化痰丸消積藥攻之

風痰用星白附

寒痰用半夏

老痰用海石

莎半薑五倍

一云五倍子佐他藥大治頑痰

痰結核在咽喉嗽而不能出化痰藥加鹹能軟堅之味

一云五倍子佐他藥大治頑痰

痰結核在咽喉嗽而不能出化痰藥加鹹能軟堅之味

萎 杏 海石 桔

翹少佐以朴硝姜汁蜜丸噙化

痰在脇下非白芥子不能達在四肢非竹瀝不行在腸胃間

可下而愈

脉浮當吐痰在脯上必用吐膠固稠濁必用吐痰在經絡中非吐不可吐中就有發散之儀

凡吐法宜先升提其氣用風 楩

桔 萎茶生姜之類

或就以此藥探吐時須先以布勒腰腹而於不通風處行之又服瓜蒂藜蘆等藥不用探吐自吐

油炒半夏大治濕痰又治喘心痛粥丸生姜湯下

三陳湯 治痰之要藥也

欲下行加柏 通 巳之類

欲上行加升柴 風之類

又曰加升提之藥能使太

右作二服加姜三片更開而小便長

東去白半湯泡七

甘半

風痰壅盛喘咳加風 卷星 柘 皂之類

著向附

熱痰腹脹喘滿加芩 連 楩

萎茶滑膏瀝之類

濕痰身重倦怠加二木 星之類

酒痰加葛 枳 編

曲 芽之類

寒痰加姜 附 益

草豆蔻之類

氣痰加木 桔 編

枳 乌 莎之類

燥痰加萎 杏 貝

味之類

陰虛咯血痰嗽加二兩知

相貝 粉 蔴 呕之類

如痰在中焦作嘔氣香酸胃脘當心而痛或嘔清水惡心

等証多加二木 曲 莴 苓 編 草蔻 猪 沦 寶連

茱 橘 木 桔 之類作丸服之

○著氣虛有痰者加參术。脾虛者宜補中氣以運痰。

○降下加木白芍曲芽兼用升痰提起

○血虛有痰者加天門知藜莎瀝姜汁

○帶血者再加芩白芍桑

○血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生姜韭菜自然汁吃三

○五銀盞必胸中煩燥不寧後愈

○傳痰在胸腹痛或痞滿加木曲芽縮之類

○在脇下痛或癰癰有聲加柴青芍之類

○在經絡中或胸背手足臂膊痛者在上加羌風歲

○在下加巴通膝冬月加烏附行經

○在腰股膝下腫痛加蒼巴通百薢膝之類

○在左合四物湯又加風荆苦細葛蔓柴瀝等芩之類

○項痛者加芎藁升柴蔓細芍等

丹溪加味二陳湯導痰補脾消食行氣

○橘紅芩曲炒各莎半各一甘炙二芍蒼白朮各八

○查一糸縮芽麪炒各五分右麵芽別研餘細切加姜棗冰

○煎調曲芽末服

○導痰湯治風濕痰等証半二星煨陳枳麸甘炙

○芩各一右作二服加姜五片如久嗽肺燥熱者去半

○加味粒杏分

○千緒湯治風痰壅盛半個皂皮炒黃甘炙一寸去半右作二服

○入姜三片

○利膈化痰丸星煨蛤半貝萎莎童便皂皮去半

尖、黛各等分右以前六味研為末以皂角杆碎煎濃汁搗杏仁如泥再以姜汁和蒸餅丸菉豆大青黛為衣每服五十丸

姜湯送下

神木丸 治痰飲

蒼一升米生芝麻五分用水二升大棗

十五枚煮右以蒼木焙乾為末以芝麻醬水及棗肉和勻角研細取漿

丸如梧桐子大每服五七十丸溫湯下

辰砂化痰丸 治風化痰安神定志止嗽除煩

枯礬研辰研各半兩星炮半兩右為末姜汁糊丸如菉豆大硃砂為衣每服三十九食後姜湯下

破痰丸 治五飲 機丁縮胡椒木蝎梢鳥去

枝

青巴去殼各等分右以青皮同巴豆入漿水內浸一宿次日同

如菉豆大每服十九至十五丸姜湯下婦人頭風服愈

蓋頭風是痰飲所致也

芎辛散

治熱痰壅塞頭目不清語言不出

芎細

風桔芷

卷甘

炙各桑炒苛各一右入姜

五飲湯

留飲心癱飲腸下痰飲胃溢飲膈流飲腸

後及傷寒飲冷過多故有此痰

參旋

陳

白蜜

木芩朴半沵猪前桂芍甘

各等分

右入姜因酒有飲加葛根葛花縮

金蘇子降氣湯

治虛陽上攻上盛下虛痰涎壅

歸甘炙前朴各二桂

陳去白各三兩

蘇子半兩

各五

右入姜束束

四七湯

治氣鬱痰涎如破絮或如梅核在咽喉滿

歸甘炙前朴各二桂陳去白各三兩蘇子半兩

各五

蘇子二朴三芩四半五加姜束束

去零

桔梗湯治胸脹滿短氣痰逆

桔炒半陳去零

實桂炒右入姜

枳木湯

治飲癖氣分心下堅水飲不下

桔炒桂

甘炙枳各七附炮細

木各一

實桂炒

右入姜

茯苓飲子

治癥飲蓄心胃怔忡

赤芩半

神去陳去

門各二沉

甘炒枳各半

右入姜

咳嗽門十

附肺痿肺癰

○傳風寒者鼻塞聲重惡寒

二陳加麻杏桔之類

○風寒鬱熱于肺夜嗽者

三拗湯加知母大而澀者有熱

加芩生姜

下三十九

火咳嗽者有聲痰少面赤

芩 萎 海石 黑 桔 薏

半 詞 青 蜜丸噙化

勞欬者盜汗出痰多寒熱

四物加竹瀝姜汁

陰虛火動而嗽者

四物合二陳加炒柏

知

陰虛喝嗽或吐紅者

四物加知柏味參

門桑

地骨皮

好色入元氣虛弱咳嗽不愈

瓊玉膏最捷

咳嗽聲嘶者乃血虛受熱

用黛蛤粉蜜丸調服之

痰嗽半萎各五貝桔各二口一枳一兩為末姜汁糊丸服

痰嗽因酒傷肺萎杏俱杵連為末以竹瀝紫蘇煎入韭汁丸服

又用黛萎蜜丸噙化

痰嗽氣急蒼朮三沙一兩蘿蒸杏

萎半各一枚

苓各五
芍三
右丸服

用鉢二

三十二

著主方

杏去皮

白芩各一

橘紅七分

味桔

甘炙各五分

分各一門

炒芩知各五分

春多上升之氣宜潤肺

抑肝加芩芍半各一

各一門

炒芩知各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散

加風苛蘇炒芩門各一

各一門

炒芩知各五分

夏多火熱火上最重宜清金降火加桑

知炒芩門膏各一

各一門

膏各一

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑各一

各一門

火芩施炒各一

各一分

冬多風寒外感宜解表行痰加麻桂半風生平姜各一

各一門

姜各一分

各一分

肺經素有熱者再加酒炒芩知各五分

若發熱頭痛鼻塞聲重再加荳蔻芍前柴各一

各一門

火芩施炒各一

各一分

若血痰加半枳

風痰再加星姜各一

各一分

湿痰脾困少食加二术

各一分

各一分

上半日咳者胃中有火加貝

膏連

各一分

五更咳者全上

黃昏咳者火滯於肺不可正用寒涼藥

各一分

午後咳者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加芩

歸芍柏

各一分

熟地知瀝姜汁天門萎貝補陰血也

各一分

各一分

若咳嗽久肺虛滋氣補血加參芍膠歸芍柏

各一分

各一分

熟地酒芍生姜之類肺熱喘咳去參用沙參此兼補

各一分

各一分

若勞嗽見血加膠歸芍天門知貝桑各一

各一分

各一分

亦於前肺虛陰虛一條擇用太抵咳嗽見血多是肺受熱邪

氣得熱而變為火火盛而陰血不得安寧從火上升故治宜

各一分

各一分

渴火滋陰忌用人参等甘溫補氣之藥，然亦有氣虛而
欬血者，則宜用參芪欬等藥。但此等証不多耳。
因欬而有痰者，咳為重，主治在肺。因痰而至咳者，痰為重，
主治在脾。但是食積成痰，痰氣上升，以至欬嗽，只治其痰。
湍其積而嗽自止，不必用肺藥以治欬。

火鬱嗽謂痰鬱火邪在中，宜開鬱消痰，用荊皮、便香附、
萎半、海石、黛芩為末，蜜丸噙化，仍服前補陰降火湯。藥失治則成勞。

痰積食積作咳嗽者，用沙萎海石貝黛半查。

軟石膏 實姜炒連為末，蜜丸噙化。

○久嗽有積痰留肺，如膠氣不升降，或挾濕與酒而作。

用苦根草、便香附、海粉杏葵炒，水煎服。

嗽而煩不安，六一散 一名盜先散，加辰砂，方見痢門。

痰嗽寒熱交作，小柴加知。

夏月嗽而發熱，小柴加石膏知。

冬月嗽而寒熱，小青龍加杏。

二陳湯 治欬去痰伐病根，陰虛血虛火盛乾咳者勿用。

喘嗽遇冷，則發此寒包熱也，解表熱自除。

枳桔各一，治嗽而失聲。

潤肺散 治嗽而失聲。

三拗湯 治風寒欬嗽喘急。

半右加姜末末。

麻根不去甘生杏不去皮。

尖各一分。

溫肺湯

治冬感寒而咳嗽吐痰，久嗽欬欬熱者勿用。

半陳去味白味 姜桂杏各五分 細膠甘灸各二分

右入姜末一 方有芍一

半陳去味 姜桂杏各五分 細膠甘灸各二分

○華蓋散

治感寒而嗽胸滿聲重

蘇子陳赤芩

桑麻各一两半 右八味一

○金沸草散

治感寒鼻塞聲重，咳嗽不已寒熱無汗

荆四 麻去前各二两灸赤芍半各一两

旋二 杏右加姜末一

橘皮湯

治感寒欬嗽頭痛上氣不得下

陳苑

○杏蘇飲

治上氣喘嗽面白浮腫

蘇七 杏味腹

○麻去 蘭歸 酒浸 杏炒枝

甘灸各二

○東垣加漏三 奇湯

治咳嗽上氣喘促胸膈不利

桔陳甘青參蘇桑

各五半七 杏味四

○右入姜減桔青參加木貝名橘蘇散

治傷風

○咳嗽惡風有汗脉緩

東垣

加減漏白散

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐

桑一 地骨七 陳青味

參各五白芩右入粳米粒煎

寶鑑加減漏白散

治咳而口乾煩熱胸膈不利喘促

桑一 地骨七 陳青味

參各五白芩右入姜

大橘皮湯

治面腫上喘

滑九甘炙木

平氣散

治諸嗽并吐痰

橘半陳三右

桂味

甘瓜蘇子神杏炒

鳥藥芷各等右入姜

平肺湯

治肺氣上壅

咳嗽痰實寒熱往來咽乾口燥

陳一桔炒半 苛蘇

鳥梅

桔梗死五味

知

桑蜜

杏炒銀星

蜜炒各半甘

炙半右入姜

大降氣湯

治上盛下虛痰實喘嗽咽乾

芎細

前歸焙朴

桔半

白芍

陳桂甘

炙各等分

右加姜五斤蘇五葉

半夏丸

治肺熱痰嗽胸膈塞滿

藜

穀半燒各等分

○參木調中湯

右為末姜汁麥糊丸食後姜湯下

芪四桑五參

甘炙白芍木各二味二十

地骨門參杏生甘

○五味子湯

治咳嗽不已皮膚乾燥唾血胸膈痛

祖傳

潤肺除嗽飲治遠年咳嗽如神

參杏生甘

桑蜜

半右入姜

枳橘桑桔膠味各一

右加姜三序細茶一撮

陳白麻桔膏半桑蜜

○九仙散

治一切效久嗽乃擊其脅歸之藥也

參欵

林貝母湯

治久嗽

貝姜汁浸味芩

半白

桑蜜

右入姜

○桑炒半桂各一

柴倍用木甘

炙各半杏炒桂右入姜

人參散

治久嗽

桂一兩水龜桂一兩右為末吸喉中

神功散

治久嗽

甘炙各半桂一兩桂四粒右入姜

人參散

治久嗽

桂一兩水龜桂一兩右為末吸喉中

○製各五門

門參膠陳五

甘炙各半桂一兩桂四粒右為末吸喉中

寧肺湯

治虛勞發熱自汗咳嗽痰啞

木芍芍

桑蜜

右加姜

○製各五門

門參膠陳五

甘炙各半桂一兩桂四粒右為末吸喉中

寧肺湯

治虛勞發熱自汗咳嗽痰啞

木芍芍

桑蜜

○扳酒浸地

甘炙味門

桑多芩各一分膠二分右加姜

寧肺湯

治虛勞發熱自汗咳嗽痰啞

木芍芍

桑蜜

黃芪散 治咳血成勞能解肌熱

芪蜜地門

桂 白芍 各三 甘草一右加姜

神効寧嗽散 治勞嗽諸嗽通用

味芩桑炒

蘇細陳去枳 杏炒膠 甘炙蜜炒各半

五芎三

右入姜棗烏梅

人參芎白湯

治勞嗽寒熱咯血

白芍各二

分參半陳赤芩 膠味細甘炙各右入姜棗

紫苑膏

治肺熱冬嗽身如火炎將成肺勞

杷通

欬苑杏炒桑炙各大半右為末煉蜜丸夜間噙化

紫苑散 治咳血肺癆

參苑知貝半桔

甘味芩膠右

林人參參白湯

治肺寒咳嗽後熱聲耳風者

柴枳右加姜棗

知母芩苓湯

治肺痿喘嗽不已寒熱自汗

芩甘炙各

一知味參苟

半柴木欬桔門芩各

兩芎

膠各三

右入生姜食後通口服

保和湯

治勞嗽肺燥成痿者

知貝天門脣

欬意

杏炒味各二

甘炙燒實各半桑仁

各一膠

白生地各一半

右入姜

痰盛加星

半

陳芩枳

大連

芩柏翹

熱盛加梔

大連

芩柏翹

芩柏翹

喘盛加桑

陳腹

蘇子蘿子

大連

芩柏翹

風盛加風

荆旋

菊細莎

大連

芩柏翹

○傳肺癰先須發表

千金曰咳唾膿血脉數竇或口中咳胸

中隱隱痛脈滑數者為肺癰要畧先以小青龍一貼
解表之風寒邪然後以草薢太棗瀉肺湯 桔梗湯
草薢湯隨証用之此治腫瘍之例也終以黃芪湯補裡
之陰氣此治潰瘍之例也

草薢太棗瀉肺湯

治肺癰肺脹喘促不得卧

草薢一斤兩炒黃為細末大棗十枚右以水三盞煎至二盞去

棗入草薢一丸再煎至二盞攪勻服之

草薢湯

治欬有微熱煩燥胸心甲錯

草薢升

薏半斤桃五十個分爪瓣半右以水一斗煮草薢至五升去粗入

諸藥取二升再服當吐痰如粥而愈

桔梗湯

治肺癰心胸氣壅熱血心神煩悶多

桔

貝各一

知

百合各三分右作一服加姜五片

太便秘加大

小便不通加通

一方有味骨

知

又方 治前証 菓

桔 貝 芝 甘各一

右水煎食後服

一方無貝芷有草薢

黃芩湯

治胸中甲錯隱痛知為肺癰

歡皮

丁掌

以水三盞者取一盞半分三服

吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者

消風散入無病

男子髮灰清米飲調下二服而愈

方見中風門

鴟白散

治喘咳脇痛胸滿氣促肺經蘊熱等証

桑桑桔萎升半杏

尖炒骨各一甘分五

右入蜜姜

驗○升麻湯

治肺癰胸乳間痛吐膿血作腥臭

升桔

意地榆

芩

赤芍

牡

生甘各三右分

排膿散

肺癰吐膿後服此排膿補肺

芪

芷

味炒參各等右爲末

蜜湯調食後服

四順湯

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝 茄苗去

桔炒各一兩

甘各半

右

理肺膏

治肺癰咳唾不利胸膈迫塞

味炒條參去芦數桑杏

知母

貝

訶子去核

百藥煎

治肺癰咳嗽不利胸膈迫塞

甘節各五

右爲末

白茅根研取

三

研取

甜葶苈

百合

甘節各五

右爲末

白茅根研取

三

研取

自然汗石突口熬成膏

更入蜜一兩再熬和前藥丸溫

水下

治肺癰

下方水煎服當下膿血便愈上

咳嗽灸法

正灸兩乳下黑白際各數十壯即瘥

又以菖蒲當乳頭周匝圍身令前後正中當脊骨灸三十壯

又上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯即中府穴也

上氣咳嗽逆短氣風勞灸肩井一百壯

上氣咳嗽逆短氣胸滿多唾冷痰灸肺俞五十壯

○從大椎下第五節下六節上灸一處年壯

咳嗽咽冷聲破喉鳴猜猜灸天突五壯

勞嗽膏肓年壯三里七壯肺俞二七壯

喘急門

十一

傳

凡喘者由痰火內鬱風寒外束而致之又有陰虛發喘氣

從脣下起直衝清道而上又有氣虛發喘短氣不能以接續
戴氏曰凡喘則有痰聲者痰也乍進乍退得食則減食已則

喘者火炎也

凡喘未發時以扶正氣為主已發以致邪為主

火急甚者不可用苦寒藥火盛故也宜溫刦之

刦藥用椒自五七錢研為細末生姜湯調服喘止之後因痰

治痰因火治火

千緝湯

治痰喘不得卧人扶而坐數日一服而安

丁方用

導痰湯合千緝湯服二方並見痰門

丁方用蘿菔子

二兩皂角五分燒

薑海粉各一星

用白

一方用半研細入水浸右為末煉蜜丸噙化

一方治喘而嗽用蜜丸

半兩

東

蘿

海

粉

各

一

星

攀

一

氣實人因服黃芪過多而喘者宜用

三拗湯治肺感風寒喘急不已

方見咳嗽門

三拗湯治肺感風寒喘急不已

方見咳嗽門

草薢大棗瀉肺湯治肺雍脹胸膈滿悶上氣喘急身

躬面目浮腫等証方見咳嗽門

濟生草薢散治過食煎燂或飲酒過度致肺雍喘不

得卧及肺壅咽喉燥不渴濁唾腥臭

甜草薢子炒桔

萎升意桑蜜葛各八分右作一服加生姜五片

分加生姜五片

加生姜五片

瀉白散治大人小兒風寒傷肺喘急咳嗽桑骨各一

升桑半右加姜一方有風荆各七分

又方加麻杏各半

其効尤捷

想傳秘方治遠年喘急桑木內蠹蟲糞一升蘿半升杏半

升桑半升蘿半升杏半

不去甘生二右為細末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五七十
皮尖兩丸淡姜湯送下

又治哮喘用苧麻根和砂糖爛者火時時嚥下永絕病根
神效

○林玉液散治久近喘嗽口乾渴一括貝炒知各四參二
甘灸一右

人參胡桃湯治喘急不得卧參一末胡桃五十粒湯浸
右作二貼加姜三片

杏仁煎治喘嗽杏去皮各右研膏煉蜜丸

如彈子大每服一丸細嚼臨卧姜湯下

又胡桃肉三姜三臨卧嚼吃飲湯二兩口再飲就可

人參定喘湯

治肺氣上喘喉中有聲物甘潤取利

右分二貼入姜三片

安神散治喘嗽

蜜蜜參

陳去甘灸各等分右為末每服

一二錢煎烏梅湯調食後服

人參散治喘嗽

枯礬石一兩

參一右為末每服一錢臨

臥乾糞之白湯調服亦可

一方古文錢洗淨白梅

右水浸至宿空心一呷良久得吐効

杏仁飲治身熱咳嗽喘急柴前枳桔蘇陳去

半甘灸芩參水杏各等分右入姜

又一方參蘇飲去葛木加柴杏治証同前

清氣散定喘止嗽

蜜味蘇

甘青陳去枳

各等分右慢火炒焦水煎加生姜半夏尤妙

各等分右慢火炒焦水煎加生姜半夏尤妙

清氣散定喘止嗽

蜜味蘇

各等分右慢火炒焦水煎加生姜半夏尤妙

寧肺湯 治喘嗽

罌粟

陳去白桔

星炮半

桑炒

姜參各等分右入姜

神秘湯 治上氣喘急不得卧者

橘桔蘇味參各等分

分氣紫蘇飲 治脾胃不和氣逆喘促

味桑芩

陳去白甘炙菓腹灸桔各一右入紫蘿生姜鹽少許

五味子湯 治喘促脉伏而厥者

味兩半參門杏橘

林灸法 肺俞三壯束束枝右

白生姜各二半束束枝右

△虛損門 十二

○虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脉虛少不能治能治於胃則可治風熱則損陰陽虛則陽盛自下而上一損損于腎骨瘦不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消克治宜以苦酸咸過於脾則不可治

○飲食勞倦內傷元氣真陽下陷內生虛熱用補中益氣參芪甘溫之類補氣提其下陷此用氣藥以補氣之

不足也

勞好色內傷真陰陰既傷則陽氣勝而變為火是陰虛火旺用四物知柏甘寒苦寒之類補陰火自降此用

血藥以補血之不足也

○四君子湯 治氣虛林補益脾胃進美飲食加陳名異功散參一錢大芩各二半右如自汗或小水利者去芩加柴

四物湯

治血虛

飯

熟地各二芍 芍各一
水半

右春倍芎

夏倍芎

秋倍地

冬倍歸

八物湯

治氣血兩虛

四君

四物為一劑

六君子湯

治氣虛挾痰

陳芩 參各一

木 半各一
水半

甘半右姜棗

十全大補湯

治氣血俱虛而挾寒暑

八物加葛桂

各等分八生姜

大補陰丸

降熊火補腎水一柏

搘酒拌口去皮酒拌濕熟地

酒洗板

醉炙黃

炒褐色知炒各四兩

焙乾板各六兩

右細末續脊髓和藥蜜丸如梧桐子大

每服

五丸空心姜鹽湯下

補腎丸

柏 板 仲

姜汁拌膝

陳各二味一姜五水加
兩

右為末姜汁糊或潤糊丸溫酒或白湯空心下

六味地黃丸

治腎經虛損憔悴盜汗發熱痿弱下血咯

血等方見淋病門

千金延壽丹

治諸虛怯弱欲成勞瘵及本病後虛損不復凡

人中年後常服可却癥延年

五味

兔絲煮煉膝

仲姜汁拌歸

山 天門 麥門 生地 熟地各一

葛根二參

白芩

茴 沢 地骨 鹿茸 花椒

葛 巴戟去遠枸

覆盆

柏子各五右勿犯

鐵器為末煉蜜丸如桐子大

每服

一百丸空心溫酒或姜鹽湯下

如精滑或夢遺加赤石

山茱各五

忌蘿蔔菜

班龍丸

治真陰虛損及老人虛人常服延年益壽

鹿角膠

炒成鹿角霜

兜絲酒浸

柏子取熟地各半白芩

補骨

各四右為末酒煮米糊丸或以鹿角膠入好酒洋化丸

平

如桐子大每服五十丸空心姜皮鹽湯下
益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生
發之氣 曲 柴 外各二炙甘 歸身 酒陳各五參各半
分半 炒各七 茯一木 一木半生芩二分 右 如腹中痛加白芍五
桂 分半 味如渴或口燥加葛根三分
茯神湯 治六脈虛軟咳嗽心痛喉中介介或腫或痛
神 參 遠 通草 門 茯 桔各六甘味各三右入姜
祖傳秘方 治心虛手振歸身甘 生地各一半
兩遠 去心二酸 桔子各三辰半 星各五
神七 菖六 金鉢二十右為末蒸餅丸如棗豆大辰砂為衣每
服七八十九津唾嚥下或姜湯下
玉竹甘草湯 治虛勞不足汗出而悶脉結悸行動如常
大棗枝右水煎入酒些少服
火棘甘紅枝 生姜各半門合麻仁合參 膬各一生地紅
十味人參散 治虛熱潮熱身躄倦怠 柴 甘 參 芍
术 半 芍 歸 白芍 茯各等右入姜
十四味建中湯 治血氣不足形瘦弱短氣嗜卧
歸 白芍 术 門 茯 甘灸薺 參 芍 桂 半
苓 熟地各五附分右入姜棗
惠治虛勞潮熱 木 陳 反 芍 熟地 芍 桔 門
甘 槐 右水煎
嗽而瀉加訶鑿天花自汗加芪炒浮麥
棗 五味一 冬嗽不宜知母 心神恍惚加神 遠
痰多加萎貝 咳嗽加酸
虛甚無勞加山破拘 肥白加參 黑瘦不宜

潮熱不宜柴胡

柴胡

大根

根皮

根皮

根皮

根皮

人參柴胡散

柴胡

根皮

根皮

根皮

根皮

經絡煎熱，痰嗽頭目眩，胸痛，五心煩燥，盜汗，婦骨蒸

柴胡

根皮

根皮

根皮

根皮

歸、赤芍、半葛

葛

葛

葛

葛

葛

茯苓補心湯

茯苓

茯苓

茯苓

茯苓

茯苓

芩參地芍

芩

芩

芩

芩

芩

分甘減半

右姜棗

桂熟地

桂

桂

桂

辰砂妙香散

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

新增黃芪益損湯

黃芪

黃芪

黃芪

黃芪

黃芪

甘灸歸酒芍

芍

芍

芍

芍

芍

桂熟地斛

桂

桂

桂

桂

桂

黃芪益損湯

黃芪

黃芪

黃芪

黃芪

黃芪

桂熟地斛

桂

桂

桂

桂

桂

白芍二味

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

八味丸

杜仲丸

杜仲丸

杜仲丸

杜仲丸

杜仲丸

杜仲丸

桂熟地斛

桂

桂

桂

桂

桂

白芍二味

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

三才封髓丹

三才封髓丹

三才封髓丹

三才封髓丹

三才封髓丹

三才封髓丹

柏六縮

柏六縮

柏六縮

柏六縮

柏六縮

柏六縮

人參養榮湯

人參養榮湯

人參養榮湯

人參養榮湯

人參養榮湯

人參養榮湯

白芍三歸

白芍三歸

白芍三歸

白芍三歸

白芍三歸

白芍三歸

熟地味芩各七分右入姜棗遺精加龍骨一兩

咳嗽加膠

仙傳草還丹治虛勞添精髓常眼神清氣爽延年
破熟地酒浸遠去地骨膝酒浸菖蒲等右為朱酒糊丸空心溫酒或鹽湯下

人參養榮丸治男婦諸虛不足

參术白芩白芍

生地陳各一縮莎炒胡連甘炙各半兩右酒糊丸如桐子大每服五七十丸空心白湯或酒鹽湯下

固真丹治諸虛五勞七傷下元虛冷脣腹疼痛

參木白芍炒各半山一兩仲酥炙炒破燒白芩

牡山茱萸各一玄半澤半熟地四兩仲酥炙炒破燒白芩

復春丹

明耳目治癰瘍兼療一切風寒

參山茱萸熟地

芩半各二遠心膝酒浸仲酥反酒

芩君

龍骨各一斛酒浸天麻

羌

益各五

右酒糊丸

溫酒或

鹽湯下

樂令建中湯

治一切寒厥拘急病疼

黃芪建中湯

加

參細陳白芍白芍

參

木

酸微

陳

半

玄

桂

烏藥

黃芪十補湯

補虛勞養血氣

黃芪

建中湯

加

袖各半白芍

參

木

酸微

陳

半

玄

桂

烏藥

柏子仁湯

治肝虛寒腸滿筋急腰膝無力小腹痛面青口噤

柏子

炒去

白芍

風

神

白芍

附炮

各一細

桂

甘炙各六分

右入姜

芩

六分

右入姜

芩

加味沉珠丹治氣血不寧虛弱之力

心神悶亂

芩

六分

右入姜

芩

辰 木 炒參各二神 鳥藥 沉 木 没 星各一
飯

芪 瑰

麝各二

丁方 加酸遠各二

丁方 加乳山 龍齒各二

右為末煉蜜丸食後茶酒任下

秘傳 固本丸

治諸虛生精血補五歲進飲食

參

生地

熟地門

枸

兔

酒浸二十宿

晒乾入

覆盆

茴

鹽

味

蓆酒浸宿巴戟去山茱去核酒仲

姜汁炒芩

椒

焙出通

芪蜜炙各

木一桂半柏

知口并酒炒

各四兩

右煉蜜丸溫酒或鹽湯下

袖參香散

治心氣不足諸虛百損調榮衛寧心志

參

术

芩

丁

姜

各半

山

鳥藥

縮

沉

各二

蓮

一

橘紅

芪

木

檀

各一

甘炙各半

右加姜東東

丁方加附

芩

芍各一桂

參

甘炙各半

右入姜

芩

橘紅

芪

木

檀

各一

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

柴胡散

治寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

芩

芍各一桂

參

甘炙各半

右入姜

芩

橘紅

芪

木

檀

各一

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

柴胡散

治寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

柴胡散

治寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

熟地

各七

門三

甘炙五

右入姜

芩

橘紅

芪

木

檀

各一

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

有歸

青各一桂

芩

橘紅

芪

木

檀

各一

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

柴胡散

治寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

勞瘵門

十三

○勞傷心腎而得之心主血腎主精精竭血燥則勞疾生

傳經曰陰虛生內熱嗜慾無節起居不時七情六慾之火時動于中飲食勞倦之過屢傷于射漸而至真水枯竭陰火炎上而發蒸之燥熱或寒熱進退似瘧非瘧古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同證亦少異大抵不過

心傳

○勞傷心腎而得之心主血腎主精精竭血燥則勞疾生

傳經曰陰虛生內熱嗜慾無節起居不時七情六慾之火時動于中飲食勞倦之過屢傷于射漸而至真水枯竭陰火炎上而發蒸之燥熱或寒熱進退似瘧非瘧古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同證亦少異大抵不過

咳嗽發熱咯血吐痰白濁白濁遺精盜汗或心神恍惚夢與
鬼交婦人則月水閉日漸虛羸成勞極之候日久至發
熱不休形貌瘦甚真氣已脫雖倉扁復生莫能救其萬一
熱毒鬱積之久則生異物惡食藏府精華變生諸般奇
狀治之法一則殺其虫以絕其根本二則補其虛以復其真元
其侍奉親密之人或同氣連枝之屬薰陶日久受其惡氣多
遭傳染名曰傳屍又曰喪屍

丹溪曰此陰虛之極痰與血病多有虫者其傳屍一證不可云
無大法四物湯加童便竹瀝姜汁
身瘦屬火因火燒爛也肉脫甚者難治

氣血虛甚發熱成勞者

補夫丸加骨蒸藥佐之

骨蒸藥

知柏錄

門丸

散

青蒿

竹葉

二十四味蓮心散 次以蓮心散

歸芪甘鱉箭柴獨翫

風

已

芩

半

芩

陳

膠珠桂

芍

枳

麴

各半

荳

黑

右作二服

蓮肉

此味當用蓮花內瓣

星

芎

枳

麴

各半

豆

黑

右作二服

加姜

三片棗一枚

水二盞煎

至二盞去粗

溫服須待

吐有異

物

茺花漸減少

蓋茺花反甘草

所以殺虫

炒之所以

斷熱去

寒妙處在此

麝香散

治男婦骨蒸發熱五勞七傷等証

天靈蓋

麝

各二分

柴一斤

犀屑半斤

東引桃枝

東引柳枝

東引榴枝

各半兩

兩

東引

桃枝

各半寸

青蒿

各一握

魏研

味蘿白

各七寸

右為末

童便二升半浸藥

一宿明日早煎至一升半去粗分作三服每服入候末三錢溫服五更初進一服約入行五七里再進一服若恶心欲吐嚼白梅止之三服後瀉出惡物異蟲或身如蠶行不可名狀後用荔枝止之忌風一月及忌食油膩濕麯鹹酸併牛羊雞猪犬肉魚腥年遠重病不適二服全女男病女煎女病影煎取虫後須大補茯神散補之凡此藥忌猪犬雞僧尼孕婦孝子見之

取屍虫神仙秘方

青桑枝 柳枝 梅枝 桃枝 榴枝

各七莖長七寸皆東引者

青蒿握葱白

七莖

魏研

安息

研右除魏安

研

研

研

研

餘藥用童便一升半煎去一半去粗將藥汁魏安細研再煎十數沸分作二服調辰未候末各五瓣研許右三味亦分作二服入前湯五更初進一服三點時又進一服至已午晚必取下虫其如角者可治青黑者不治但可絕後人之傳注耳取虫後進軟粥溫和忌食生冷毒物凡合此藥不可令患者先知氣味亦不得令猫犬孕婦孝子僧尼等不祥人見之

神授散

傳戶

勞病血氣未甚虛元氣未盡脫者用之

川椒
川椒
或用酒米糊丸如梧子大每服二三十丸漸加至八十九丸空心酒或米湯下愚治一婦人用花椒三分苦棟一分丸服屍虫盡從太便泄出

補天丸

紫河車

即胞衣也

男用女胎

女用男胎

以初胎為

洗淨去筋膜以

嫩龍盛之外以

希糊使不

右以補腎丸藥

再研酒糊丸或新取紫河車蒸熟同藥未搗為丸亦可

虛勞者以膏蒸藥佐之

一云氣虛加補氣藥血虛

泄氣焙乾要用時米醋浸一宿焙乾用

虛勞者以膏蒸藥佐之

一云氣虛加補氣藥血虛

加補益藥

目錄三

四十九

紫河車丹 治飛屍鬼注虛勞羸瘦痰喘等証

胎衣 穴角水洗淨以米醋洗一宿乾葛竹籠盛之以帛糊之不令泄氣烈火焙乾加入後藥

參半兩木神

歸熟地各一木白芍各半乳

沒各四辰研

鹿麝分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸煎入參湯送下或服煉蜜丸亦可

林奪命散 治傳尺勞

桃二十一个去皮尖皴炒甘

參各半錢

知蓋醋浸一宿

柴

蒿各一魏

四棗

葱白一握右蓋

鰐魚為末

次下參知

柴

甘又同搗

次下葱蒿桃魏杵成餅

予慢火焙乾為末秤一錢用童便二盞煎至一盞去渣露星

下二宿五更暖服半盞服了衣被甚暖天明又暖半盞

扶行病久服之強行五七步三百更不得洗手面指頭候生毛

為驗每旦早晨先喫白湯投之

桃仁散

治婦女一切蓄熱腹內悶著骨蒸及月水不行

瘦勞肌熱

桃

一兩去皮尖皴炒

赤芍一兩

參各一

枳殼

個

陳七冬半犀

安息

各二

鹿麝

紅右加姜煎早晚食前服

若取下虫便宜服

心劑未取下虫亦須先服之

青蒿飲 治勞疾

蒿

赤根者取子

一桃枝

嫩者

升葉五兩

煎

柳枝嫩者柴

甘各一

地骨二

梔一兩量

右加烏梅煎

茯神散

以麝香散

取下虫之後

宜服此

補五藏

白芍 神參遠

龍骨桂

甘各一

歸味

各

半枝兩

大棗五十

右入生姜

一錢

秦艽鱉甲散

治骨蒸壯熱肌肉

消瘦唇紅頰赤

困

半枝兩

大棗六個

右入生姜

一錢

秦艽鱉甲散

治骨蒸壯熱肌肉

消瘦唇紅頰赤

困

倦盜汗

地骨

柴各二分

芍

知母六分

敝魚酥

三分右入烏梅一个

木

葛

春夏用葉秋冬

一方 治男婦骨蒸勞瘵增寒壯熱

桑

桑葉秋冬用子童便浸酒乾一两

地骨

鱉白芩

甘草

桑蜜

參括各五分右入姜

續斷散

治骨蒸熱勞傳戶潮熱喘嗽盜汗及咳嗽膿血

續苑

桔

茹

味

各一分

生地

桑蜜

各二分

甘草

八分

小豆

四分

生地

甘草

小豆四分右分一貼每貼入小麥五十粒

參黃芪散

治虛勞客熱肌肉消瘦五心煩熱口燥咽乾

赤心忪盜汗胸膈不利欬唾膿血

參

芩

芍

柴

天門

鱉白芩

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

芍

芍

芍

芩

味

各一分

生地

桑蜜

各二分

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

芍

地骨

桔各一分

芩

參各二分

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

芍

芍

龍膽丸

治積熱勞瘦不食消瘡腫

膽

柴

芩

芍

芍

鱉鱉

鱉鱉各一分

桃去皮

柏

陳大

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

芍

白湯

桔各二分

生地

桑蜜

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

芍

芍

清骨散

治男婦五心煩熱欲咸勞瘵

柴

生地

甘草

歸酒

甘草

十全大補湯

治氣虛俱虛

生地

桑蜜

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

柴加五味

痰加半

汗加

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸勞嗽寒熱聲嘎自汗

柴

生地

桑蜜

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

四肢急痛

柴

生地

桑蜜

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

半

甘

生地

桑蜜

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

歸酒

甘草

○心保和湯 治勞嗽肺燥成癆者或治吐膿血 方見該門

保真湯

治勞証虛虛骨蒸 離 茜 木 生地

白苓

赤苓

蓮心

各半

天門

麥門

味 知

柏柴

赤芍

白芍

地骨

甘

陳各二

右

入姜棗

敬驚慘加神

遠

柏子

酸棗

通

嵩

淋濁加解

烏藥

猪

沵

澑澑

加石韋

躁熱加膏

滑嵩

遺精加龍骨

蛎

蓮鬚

蓮子

麻根

冷汗加浮麥

蛎

苡

肉

鱉魚

著男子二十前後色慾過度損傷精血生陰虛火動之病

後發熱咳嗽盜汗飲食少進甚則痰涎帶血脉沉數脉

肉消瘦此名勞瘵最重難治如到肌肉消爍沉匱著床

尺脉沉取細數則難為此病大忌眼不參若服遺精加龍骨亦難治

亦難治

主方

芍

知水

拌炒

天門去皮心

白芍炒木

各一

柏

寧水浸炙

陳各七

熟地一

生地酒

甘炎各洗

五分

姜三歸一分

右入姜

咳盛加桑

桑葉

萎味

痰盛加半

萎貝

潮熱加桑

地骨

盜汗加蛎

酸

浮麥

夢遺精滑

加蛎

龍骨

山茱

赤白濁加白苓

連

血咳嗽

血加桑

芩

梔

地骨

袖地骨皮散

治骨蒸壯熱

肌肉消瘦盜汗

地骨

艽柴枳

知歸

敝藥

醋炙右等分末入桃柳枝頭各

七箇姜三片烏梅一箇

前

參芪散

治勞瘵喘嗽咯血潮熱盜汗

芩半

貝

甘炙枳

桔

艽

芪蜜

白苓

茺蔚歸

芩半

貝

甘炙枳

桔

艽

各五參

味 羌 風 杏 欽

桑炒各二兩

魚醃右入藥

分治虛嗽不止脉沉遲聲曾不岡速平復

灸法 傳凡骨蒸勞熱元氣未脫者灸四花六穴無有不安者真濟世之妙法也

濟世良方 婦人纏足不遂生成之理若以足則不及當於右肩顎穴點記以繩頭按其穴上伸手引繩向下至中指尖截為法

○林取勞蟲三節骨上一穴膏肓一穴各灸七壯然後飲食調理方下取虫藥其虫如舌絲或如紅絲線者是也

患門一壳四花左右二穴四處同時下火各七壯至三十七螺灸一百或一百五十壯候瘡欲瘥又灸當脊骨上三穴各一百壯百壯傳初之四穴同時灸各三十七壯每穴至一百壯候灸瘡骨上三十穴瘡骨上三十穴徐當脊骨上三十穴當脊骨上三十穴一

次只可灸三五壯多灸恐入蹊背

凡灸膏肓四花瘡發欲瘥可灸三里穴以下氣

遇仙灸勞瘵捷法

癸亥日二更時直身平立用筆於腰上

兩傍微陷處點謂之腰眼然後上床合面而卧一穴灸七壯勞虫或吐出或漏下用火焚之棄於江河恐害人故也灸後宜服將軍丸

將軍丸 治傳屍勞瘵

錦文大黃

九蒸培

半兩

麝蔚一管仲炒

牙皂

去皮桃去皮

雷丸

一枚

蕪半兩

鱉魚

一丁兩

右為末先將青蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七

片水一丁碗煎至七分去粗入蜜一木盞再敷成膏

入前藥禁

及麝末安息香搗丸如桐子大每服三十九食前末湯送下

三汁丸 炙後宣服

生地汁

青蒿汁

薄荷汁

童便

酒

升各

二同煎成膏

却入後藥末

柴

鱉魚各半

醋

丸各兩

辰 麋麝

右各半

為末入前膏內丸如桐子大

每服十五丸溫酒送下

灸勞瘵

灸乳

後三寸

十四壯男左女右不

已加壯數

又灸大推

身柱

諶諶

氣海

△眩暈門

十四

○肥白之人濕痰滯於上，陰火起於下，是以痰挾虛火上衝頭目，正氣不能勝敵，故忽然眼黑生花，如坐舟車而旋運也。

○黑瘦之人躬弱，真水虧欠，或勞役過度，相火上炎，亦有

時時眩暈，太抵肥白作眩者，宜清痰降火為先，而兼補氣之藥。

丹溪曰：痰在上火在下，痰在上而重其痰也。

○陳加荅肝之劑。

活套云：眩暈者，中風之漸也。肥白氣虛而挾痰。

○四君加葛根湯。

半 橘紅或少加芎、荆以清利頭目。

○痰盛而挾氣虛。

○陳加參、术、芪或少加炮附，入竹瀝、姜汁。

○諸般眩暈挾風，則加風荆、天麻。

○竹瀝、姜汁、童便。

○諸般眩暈挾風，則加風荆、天麻。

○陳加芍芩連梔。

○挾寒加姜桂附之屬。

○去血過多而眩暈者，芎歸湯。

○防風通聖散

○治風熱眩暈。

○方見頭痛門。

○半夏白朮天麻湯

○治風痰眩暈。

○方見頭痛門。

○川芎散

○治風眩頭暈。

○方見頭痛門。

○山茱萸一兩

○山藥

○甘菊

參 神 小芎 各半 右為末每服二錢溫酒調下

○林川芎散 治風証眩運惡風自汗 芎 白芩 各三細

枝各二末 累甘 束一右入姜

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目昏運

方見頭痛門

茯神湯 治氣鬱生涎隨氣上厥頭目眩昏心中怔悸

參門 山各一前

熟地各九

枳二末

甘炙遠

甘草水煎

炒白芩

神各二末

芎炙半

各九

右加生姜末

○正香橘飲 治氣虛眩運

木半 术 橘

芩 縮各

兩丁 甘

灸各二末

芎炙半

各九

右加桂枝

甘

歸

○桂治血虛眩暉

明灸法

頭風目眩

灸前項三壯在

入髮際三寸半

○灸法

頭風目眩

灸前項三壯在

入髮際三寸半

灸陶道五壯在大椎節下

○風門二穴各五壯在

第上推下兩傍各一寸半

○頭旋目眩

灸兩眼小臂上髮際各一壯

○自汗門

十五

○丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與熟盜汗屬血虛與陰虛

○桂枝湯 治外感風邪自汗之聖藥也

桂半 芎一末

甘一束

右姜東束

○黃芪建中湯 治外感挾氣虛自汗

桂枝湯加黃芪一

補中益氣湯 治內傷氣虛自汗

方見內傷門

甚者六脉浮軟而虛如附以治陽虛

左寸浮洪而自汗者心火炎也倍參芪加門味連各半

左關浮

弦而自汗者，挾風邪也。加桂枝、芍各半。右關浮無力而自汗者，倍參芪。右尺洪數無力而自汗者，或盜汗相火挾君火之勢而克肺金也。加連芩、柏各半。只用當歸六黃湯。左尺浮洪無力而自汗者，水虧火盛也。加知柏各半熟地一錢。凡內傷及一切虛損之証，自汗不休者，總用本方少加附子、麻根。浮小麥但升柴俱用蜜水製衣炒以殺升發勇悍之性。又欲引參芪等至則表故不可缺。

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也。歸酒、芪蜜炙各生地、熟地柏、連芩各一分。

麥煎湯 治諸虛及新病暴虛津液虧欠，脉常自汗，心忪驚惕。白木散 治飲酒中風多汗，食即汗出，久不治必成消渴。蛎（三味）木一兩二錢半，右為末，溫水調下。

桂枝加龍骨牡蛎湯

治六脉芤動微緊，盜汗自汗及失精。

枝白芍各三錢，二龍骨、蛎各三錢，加姜末一錢。

辰砂妙香散 治心氣不足虛損少睡，盜汗。方見遺精門。

林黃芪湯

治表虛身微熱，汗出不已，或因發汗表虛，脉虛者。

芪參白芩木

白芍各一錢，甘草七錢半，陳皮五錢，右入姜。

黃芪湯

治喜怒不節，房室勞傷寒熱，自汗盜汗。

芪參白芩熟地桂

麻根、龍骨、天門各一錢。

味風小麥炮

歸酒浸甘草各七錢，右入姜，發熱自汗，加解。

發厥自汗加附炮

大補黃芪湯 治自汗虛弱之人可服。

芪蜜風芎

山茱歸木炒桂甘炙五味參各一白芩一兩熟地

三
兩
三
一
右入姜束

石斛散治虛盜汗

桂斛木炒甘炙芩各等分右入姜

參芩散

治睡中汗出酸參芩等分為末米飲調下

治盜汗極効

木半切咸小塊用浮麥一升水一斗煮乾如尚硬又加水煮取出切片焙乾去麥為末浮麥煎湯下

參芪湯

治虛盜汗

參甘炙扁炒木葛芩茇各等分右入姜束

人參柴胡湯

治邪熱客於經絡肌熱煩燥盜汗參木

芩甘炙柴葛

白芍酒芩各等分洗芍入姜束

心汗盜汗只心頭出者名心汗

芩為末每服一錢以薑梅

陳艾煎湯臨卧調服

一方青桑第一二葉燒乾為末空心米飲調服最止心汗

陰汗濕痒

用蒜煨剥去皮爛研同淡豉末搜和丸桐子大硃砂為衣每服三十丸空心敷莖煎空心湯下

清蛾丸治陰汗不止

方見腰痛門

一方 爐甘石分蛤半右為末乾搗患處

脚汗 牡蛎散

蛎煅枯凡蜜佗僧黃丹各等分為末用

少許乾搗脚指縫

溫粉 止汗法

芎木藁各等分為末每藥末一兩入

米粉三分和搆身無藁本亦得

又蠣煅一定粉

五分為末綿裹搆患處

△水腫門、十六

○傳經曰諸濕腫滿皆屬於脾。夫脾虛不能制水。水漬妄行。故遍身面目手足皆浮而腫。名曰水腫。

○丹溪曰水腫因脾虛當以參术補脾氣實則健運升降則水自行宜補中行濕利尿切不可下。

○又有水氣者微腫先見於目下也。
又曰水氣始非氣鬱飲食溫熱諸証勿妄下。

○心目胞上下微起肢躰重著咳嗽怯忪股間清冷兼寒瀉也。
○傳丹溪曰水腫脉多沉伏病陽水兼陽証脈必沉數病陰水兼陰証脈必沉遲煩滿小便赤澁大便秘結為陽水不煩滿大便溏小便少而不赤澁為陰水。

○以指按之成凹不即起者溫也。

○一身腫脉浮不渴續自汗無大熱風水也。

○著肺受邪上喘則失降下之令故小便漸短以水溢皮膚生腫滿此則喘為本腫為標治當清金降氣為主行水次之。

○全下

○脾受濕不能制水則水濕妄行浸漬肌肉既上溢則邪反侵

○全上

○肺氣不得降生喘此則腫為本喘為標治當實脾行水

○全上

○為生清金次之。

○水病基本在腎其末在肺故下為跗腫大腹上為喘呼不得

○全上

○臥者標本俱病。

○心腹者不治或男從足下腫而上女從身上腫而下並皆不治

○全上

○腰以上腫者宜發汗腰以下腫者宜利小便此仲景之法

○傳腰以上腫者宜發汗腰以下腫者宜利小便此仲景之法

熱水腫 用梔子炒為末米飲調下三五錢若胃脅熱病在上
者連冠用

荸薺桑木香散 治濕熱甚水腫腹脹小便赤澁大便滑泄

荸薺薺紙炒 赤苓 猪朮 各二分半 沢甘灸通各五桂二分

渭另研 三分兩右為末白湯調下

白朮木香散 治喘嗽腫滿不能自尿閉

沢通 赤苓各五木 桦各三分陳去白桂二分渭二分右作一

服加姜三片

林道滯通經湯 治脾濕有餘氣不宣通面目四肢浮腫

桑木木苓沢陳各等右

赤茯苓丸 治脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁

大每服三十九食遠桑白皮煎湯送下

踈鑿金飲子 治遍身浮腫喘急煩燥多渴二便不利

沢小豆炒陸羨腹目通丸 桦苓皮各一分

右分二貼入姜三片

蕷蘿葡萄飲 治水病浮腫 丑炒取苦荸薺各一分甘灸半

赤苓另右分二貼入姜三片

五皮散 治風濕客於脾經氣血凝滯以致四肢浮腫心腹脹

脹上氣喘急 姜皮桑皮腹皮苓皮陳皮各等

右水煎一方用五加地骨無桑陳

木香分氣湯 治氣留滯四肢脹急胸膈脹脹尿臭濁

木赤苓猪沢 桂枳橘半蘇子火分各等

右每服七錢水一盞姜三片煎分入鹿蔚末少許食遠溫服
內挾七情停滯涎飲腹滿脇脹名曰氣分宜分心氣飲

木香流氣飲二方並見氣門

皂澤瀉散

治痰病化為水氣不能食

术 沢 芍

陳白芩

木

按各等

右每服七錢加姜三片

癌加枳

腫甚加丑末

杏蘇飲

治上氣喘嗽面白浮腫方見咳嗽門

溫白丸

治積塊久不治變成脹

川烏

炮去皮解皂皮

炙色

去皮心膜去朴

姜茱

湯洗

苑

蕷苓

參

桔

葛

柴

姜炮桂

蜀椒

炮去目及

連各五

右為末

入巴豆

令勻煉蜜

丸如梧子大每服五七丸姜湯下

三七丸

治水腫喘急二便不通

郁李仁皮杏去皮葛根各半兩

○消腫丸

治水腫喘滿小便不利

滑

通

术

黑丑

通脫

芩

神

半

陳各五

木

瞿穂

丁各五

右為末

保脾散

治陰水發腫用此先實脾土

朴姜木

血

木

姜炮各

一兩

荳

腹子

附炮

白芩

甘

炙各半兩

右入姜棗

各

半兩

右水煎

○林當歸散

水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火不能溫

養脾土故土不能制水水飲盈溢氣脉發為浮腫之証心腹

堅脹喘滿不安此湯主之

歸酒木

赤芩

芍

牡

一方

治酒腫及脾虛發腫

蘿蔔

根皂角

五味子

各一分

蘇六分

右水煎

用水同莫乾去皂角將蘿蔔搗爛入蒸餅和丸如雞頭

水

各一分

桂枝

陳通木瓜

各一分

右二味

實火蘿蔔子煎湯送下

犀角湯

治結陽証四肢腫滿熱毒不散

犀 玄參

翹

紫各半

外 通各九沉

射干

甘

炒各一

芒三門三

冬半

冬門冬

右水煎

赤小豆湯

治猝少血熱生瘡疥變為腫滿

小豆炒

歸酒陸

澤

翹

赤芍

巴

猪

桑

各半

右分二

貼加

姜三序

熱甚加犀

神分氣補心湯

治心氣鬱結發為四肢浮腫

腹炒

莎炒白芩

桔各一通

甘

条

甘

前

枳

熟

青

炒

木

各半

右加姜末束

茯苓湯

治脾氣不實手足浮腫小便赤澁喘滿

赤芩

莎 藤 藥 腹

腹

炒

腹

炒

腹

炒

腹

炒

腹

炒

腹

炒

腹

炒

腹

炒

塗膚膏

治腫滿小便少

地龍

針沙

猪

分

各等

為末

葱涎調敷

中高以帛束之

水病初得危急者

冬瓜白水煮熟任食之神効

卒腫滿身面皆腫

用皂角刺炒黃剉三升用酒十枕煎至

四枕每服一盞日進二服

治一切水腫

紅花二兩杵爛入水半盞取汁服之不過三服

便痊

醋附丸

治酒腫及脾虛發腫用醋煮香附焙為末醋糊為

丸如桐子大每服四十九粒

白湯吞下

灸法

分水灸七壯治水病腹腫不能食穴在臍上一寸

神闕灸三壯治水腫鼓脹腸鳴當臍中一

石門灸七壯治水脹水氣行皮中穴在脇下二寸

三里灸七壯主腫脹皮腫穴在膝下三寸骲骨廉兩筋間

水溝灸三壯主水腫人中蒲穴在鼻柱下一名人中

水腫惟得針水溝若針餘穴水盡而死針分水殺人多

水腫灸足內踝下白肉際三壯妙

心域肉硬八絕唇黑缺盆平臍凹背平足平掌平

林忌盜百日外忌魚蝦麴食並房事

▲ 脹滿門 十七

○心經曰諸腹脹大皆屬熱靈樞曰內虛不足中寒濕食人中滿宜從權以寒熱藥治之大抵寒脹多熱脹少而致腹脹者熱脹也

傳治脹大法補中行濕利小便宜生之參木為君橘芩為臣芩門為使以制肝木加朴以消腹脹氣可運加通木下陷加升柴提之血虛加補血藥瘀盛加利瘀藥凡腹脹須用姜製衣厚朴

肥人用利湿芩蒼滑之類瘦人脹是熱用芩連

梔朴之類林加莎白芍

色白人脹氣虛用參术芩之類林加橘朴

如因有故蓄血而腹脹者用桃紅

如因食積而腹脹者保和丸加木梔魏之類

如因外寒鬱鬱內熱而腹脹者用藿桂升葛之類
如因多怒鬱鬱氣脹者用蒼芎莎青芍柴及龍會丸之類

凡腹脹初得是氣脹宜木樅枳青陳朴之類
久則成水脹宜行濕利水之劑
○腹滿按之不痛為虛溫之升之以補為要按之痛者為實
下之消之而後補之

脈經曰關上脉虛即脹內遲而滑者脈盛而緊者脹
針經曰脉大堅以濶者脹嚴昏脹脉浮者易治虛者難治
○太實滿燥實痞閉氣滯或始因內傷脉洪實宜下服下劑
過多或漏痢後或素脾胃虛者補脾行湿

樅木姜黃木各四右
楂 薑 陳 腹子 白蔻 白芍 桔 分 緇 參 青

廣木瀆堅湯 治脹滿內有積塊二便滯滯上氣喘促通身虛腫

朴製芩連益草蔻歸各五半分廣术升紅

茱各二生甘

柴 沢

麵炒青

陳各三

渴加薑四分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎七分溫服忌酒醋

濕麪二服之後中滿減半止有積塊未消再服後藥

半夏厚朴湯 紅蘇木各半分

木青各二分

茱乾生姜

連各一桂 蒼白芩 沢柴 陳生芩 草蔻生甘

各三分

稜

歸梢

赤芩 升各四分

曲

朴姜製半

一桃子

分

皮

昆布

如渴加葛

分

右細切作一服水三盞煎至二

盞稍熱服此藥二貼後前証又減一半却於前藥中加減
研沙泥昆布如渴加葛分

服之

中滿分消丸

治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹

芩

去朽細切
酒拌燒半

次六連

實

麪半泡湯七次去參二冬木

姜黃

各二甘炙
水皮臍各五冬參半

赤苓

各一乾生姜

白芩

縮

各二朴

姜製口酒

陳白

各三右為末蒸餅丸如梧桐子大每服百丸焙熟白湯或淡

姜湯下

木香順氣湯

治濁氣在上則生腹脹

木

草蔻各三分

朴四青

陳益岑

乾生姜

沲茱

半各二

白朮

紫蘇子湯

治憂慮過度心腹脹滿喘促腸鳴二便不利脉虛

而緊濶

方見氣門

平肝飲子

治恚怒太甚心腹脹滿兩脇妨悶頭眩嘔逆

甘

右分二貼姜三片棗一枚

風枝

枳芍桔

各一

木參

桂白朮

酒洗芩

陳

溫白丸

治積癥大如杯心脇脹滿及反胃吐逆

方見水腫門

木香勻氣散

治虛弱飲食脹

木

芍

稜

莪

枳

炒茵陳

各一

右咬咀分三貼水二鍾姜三片棗一枚

救煎八分溫服

沉香散

治腹脹喘急睡卧不安

沉木

枳

各一

蘿卜

冬右分一貼入姜三片

大正氣散

治脾胃虛寒外為風寒暑濕所傷心腹脹滿

秀

外

心腹脹滿

水

六

朴 姜製 蕃 半 陳 木各二枚 枝 枳 姜炮各一下半

甘炒半右分二貼入生姜三片末末一枚

袖參香散 治一切氣脾虛作脹 火灸 參桂 甘各三半

甘各三半

桔 實 陳桑 青門 腹各五蘇子 蘿蔥

各六

木右加姜末末

小使赤瀉太便不利或浮腫

木通散 治脇肋刺痛，臍脹

蘇梗 通 陳去甘各一兩右加姜末末

草荳蔻湯 治腹中虛脹

澤分木三分曲四半 寶麸

草蔻 益 甘各五青

陳各六苓 白分右入姜

冬加芪五七分春夏止服正藥

雄雞矢 晴月內取干研末各

林雞屎體 治鼓脹

右和勻酒煮糊丸溫酒下

一方 治鼓脹心腹痞滿

大黃 桃 雞屎等分為末

治鼓脹身乾黑瘦多渴煩悶

馬鞭草細剉曝乾勿令見火

以酒或水煎至味出去滓溫服

以六月中旬雷鳴時採有功

治腹滿不能服藥

煨生姜如指大綿裹乘熱內下部冷即易之

灸法 脾俞灸年壯或百壯

肝俞灸百壯或五十壯

分水灸百壯 治腹脹癓筋結痛

三焦俞 治腹滿腰痛甚小便不利羸瘦少氣

城上院下院 章門 三里 脾俞竇灸之

積聚門

十八

傳積陰故始有處痛有部聚陽故始無根痛無定

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形在右為食積在左為死

血在中為瘀飲

○心婦人腹中有塊多屬死血

○玉癥者腹中堅硬按之應手如地 瘢者中雖硬忽聚忽散無常未及癥

無常未及癥

脉來細而附骨者積也在左積在右在右積在左

○心痞塊在皮裡膜外須用補藥香附開之兼二陳加補氣

一斷厚味

瓦龍殼能消血塊次消瘀 蝑殼也

妊娠婦血塊難服酸劑

芍 醋煮桃各一兩

海粉 醋冀

四兩 桃皮各一兩

二兩

右為宋神麴糊丸

○傳婦人死血食積瘀飲成塊在兩脇雷鳴身熱

連 一兩

桂 附炮

苓 各一甘

炙附炮

桔 木

各十

右為末糊丸煎水下

散聚湯 治氣積聚心腹痛及腰脅二便不利

半 槟 歸各四陳 杏 去皮尖桂

桂

苓 各一甘

炙附炮

芎 各五 枳 桔 各五兩 桃 木 各五兩

姜 茄

湯泡去梗燜乾

大 酒拌溫蒸半水或

大 便利去之

右作二服加姜三斤

○玉助氣丸 治氣積三焦痞悶或腹痛

稜炮 药炮各

青 陳 並法术各十

根

桔 木 各十

右為末糊丸煎水下

大七氣湯 治積聚隨氣上行心腹痛小腹脹滿

益 陳 稜 药

莎 炒各一

桔 桂 薤

甘冬青各三

右

○傳導氣枳殼丸 治氣結心脾痛

白桑炒茱炒白丑

炒黑丑

荳 炮 茄 炒

陵 炖右各等分為末

姜汁調麥煮糊丸 如桐子大每服三十丸煎橘皮湯下

白桑炒茱炒白丑

炒黑丑

荳 炮 茄 炒

陵 炖右各等分為末

林木香槟榔丸 治氣積 方見氣門

勝紅丸 治脾積氣滯胸滿氣促酒積食積 陳青

稜 義 二十味并一
醋鬱丸 良炒姜炮各右為末醋糊丸姜湯下

流氣丸

治積聚癥塊皆寒氣客腸胃之間久而成

木茴炒橘紅 菖 青去蘿炒義炮槟

薑澄茄

縮

蘖

炒各

丑

炒一兩半

右為末糊丸

如桐子大

每服

五十九嚼白

三

蔻

一枝

白湯

下食後

香稜丸

治五積破瘀癖消癥塊

木丁各五穀剉酒

枳

義

剉一兩入

素皮

巴豆三十

粒同炒黃色去巴豆不用

青

練肉

炒茴各

一兩

醋莫三稜丸

治諸積遠年日近皆効

木

丁各五穀

稜剉酒

稜

四兩

醋煮軟

大

半兩

醋溫紙裹

右為末糊丸如桐子

三稜丸

化積聚去米麪五穀等積

陳倉米

一兩四豆

宿蒸切片焙乾

同炒巴豆焦色去

巴豆不用

陳

稜

煨各

一兩縮

蘖

炒各

二兩木

木各

右為末

醋

糊丸姜湯下

保安丸

治癰積心腹內結如拳痛

大

三兩新水

浸一下宿蒸切片焙乾

姜炮

一大附子

炮去皮

膚半兩

海魚

一兩半

醋煮

右為末用

三年米

醋一升先煖火去

四五合後

和藥丸

如桐子大

每服二十九空

心醣湯或米飲下取積如魚腸膿血青泥而下

麥蘡丸

治酒癖腹滿

不食脇肋痛

曲炒蘖

炒各

一兩

連

五分剉同巴豆

五粒炒黃同用

右為末

沸湯搜丸姜湯下

醉卿室屑

治酒傷積

平胃散加丁

縮芽曲

或香蘇散亦可

并用姜棗鹽煎服

脾積丸 治食積飲食減少面黃腹痛亦治茶積一元名茶積、茶積丸

倉米半竹四豆七粒去皮同炒去豆青陳去白各二兩右為末醋丸姜湯下

魚解蟲積 香蘇散多加生姜陳皮煎服

果菜積

平胃散加丁香鹿麝香鹽湯點服

惠治茶積

菖蒲芩升為末砂糖水調服

○治茶積

菖蒲芩升為末砂糖水調服

○食魚鱠及牛肉不化成瘕搗馬鞭草汁十升入生姜亦可

灸法 治卒厥上氣心腸痛欲絕此為奔豚氣即急以湯浸手

足頻易乏次灸氣海一百壯又關元一百壯期門一百壯章門一百壯中極五十壯

冬冷泄利癥瘕灸天樞一百壯胃脘一百壯

△嘔吐門 十九 附吞酸

○丹溪活套云胃中有熱膈中有痰作嘔吐清水吞酸等証

二陳加薑炒連施加生姜煎服

香附帶氣加生姜煎服久病虛者加參木

胃寒縮曲

者加益草蔻姜桂之類去連梔甚者加丁附

脇痛脾痛右關弦嘔吐不已此木來土之分也

本方加參木等分米飲調下吐血而嘔用之効

冬病吐者胃氣虛不納穀也

生姜參芪木莎

凡痞滿短氣而嘔宜補中氣用調中益氣湯

等分米飲調下吐血而嘔用之効

凡嘔吐者切不可下逆之故也

夏月嘔吐不止

五苓散加姜汁入湯調服

瘀飲為患或食生冷脾胃不和致嘔吐恶心

二陳湯加丁香

烏梅 生姜

心下痞痛加草蔻

痰熱惡心嘔吐氣盛者 道療湯加縮 姜 炒連 竹茹

藿香安胃散 治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐恶心

藿 參 陳各一丁半右水煎

和中桔梗湯 治上焦氣熱上衝食色暴赤脈浮而洪

桔 术 各一半二味陳桂實炒白芩 朴 姜炒各

水煎去粗調木香散一錢空心服

木香散 木 桔等分為末煎藥調之服

藿香平胃散

治內傷飲食填塞嘔吐不色

藿 朴

陳各一蒼一升甘炙三縮 曲半升各

丁附治中湯 治胃傷寒冷之物心腹痛嘔吐不色

參五

紫沉丸 治中焦吐食由食積與寒氣 半

烏梅肉

茯苓半夏湯 治脾胃虛弱有痰恶心欲吐風邪羈絆於

脾胃之間當先實脾土

木 茯苓 半 曲各二橘紅

天麻各七 藥麪炒黃色一

右加姜

紫沉丸 治中焦吐食由食積與寒氣

半

烏梅肉

丁 柴各二代赭石三杏去皮尖沉 木 术各一縮三

陳五巴豆霜另自蕊各半

右為末入巴霜和勻醋麪糊

丸姜湯下

○味木香白术散 治中焦嘔而吐食腹中痛先服去積之藥，次用此藥和其氣 木 丁各一半一木五分芩四分

甘炙一两 右加姜ヲ

温白丸 治下焦吐朝食暮吐暮食朝吐太便不通ルラ 腹門セイ 见

大藿香散

治七情傷感氣鬱於中痞悶嘔吐不食ハラ

半藿术

木各二白芍桔炒參杷毛桂

甘各

右每服七錢姜三片棗二枚スルヲ

傳

加味平胃散

治因食欝吞酸スルヲ

本方加炒曲炒芽

姜棗煎服ヲ

吐清水

用蒼陳皮芩滑自木

陳皮煎服

麴术丸

治中脘宿食留飲心痛ハラノシテ 吐清水

曲炒蒼

浸一縮

陳去白各右為末姜汁別煮神麴糊丸姜湯送下スルヲ

參耆散

治脾胃不知停積痰飲嘔吐痰水スルヲ

參四青

粳燜各十姜炮丁皮各六芍

蒼各半芍一甘灸

右加姜棗

八味理中丸

治脾胃虛寒飲食不化嘔吐痞悶或腸鳴泄瀉

縮姜芽各二白芩

曲炒參各一术

四甘灸一右為末

燥蜜丸

姜湯嚙下或加半夏一兩為末入鹽點服亦可スルヲ

安中湯

治脾胃一切不利ハラノシテ

芍曲炒各良炒姜炮義炮

陳去白荳

甘炙稜各一兩右為末鹽湯點下スルヲ

人參子香散

治脾胃虛弱停痰留飲腹脹噎悶吞酸不食ハラノシテ

白芍半錢

丁丁皮山姜炮芩莎炒木

甘各四

藿香養胃湯

治嘔吐不已ハラノシテ

藿陳各二半朴

附丹甘各二

蒼三

右姜棗

△噎膈門二十附反胃

○傳其病嘔反胃大率以血濁乾槁其或咽喉塞食不能下其槁在吸門或食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛止其槁在黃門此皆上焦之膈嘔也或食物可下良久復出其槁在幽門此中焦之膈嘔也或朝食暮吐暮食朝吐其槁在蘭門大小腸之間此下焦之膈嘔也

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰 氣虛脉緩而無力

血虛脈數無力

痰寸關脉沉或伏而大

氣滯結者寸關

沉而濁 又曰脈濁而小血不足

大而弱氣不足

屎如羊屎者不治

大陽無益故也 年高者不治年五十餘

則不可治

氣血俱虛者口中多泡沫俱大出者必死

丹溪活套云 凡膈嘔反胃悉用二陳湯加姜汁竹瀝童便

胸中見抉闊

本方加甘炒連 荸 萋 桔之類

血虛瘦弱 本方合四物亦加杏紅 童便韭汁之類潤之

可飲 飲酒之人 本方加砂糖

如朝食暮吐暮食朝吐或食下須臾即吐者此胃可容受

而脾不能傳送也或大小腸秘結不通食返而上奔也

本方加酒蒸大黃 桃仁之類潤之

脾不磨者 本方多加蘆米麪神麴之類

如氣虛肥白人者 本方合四君亦加竹瀝姜汁

因七情鬱結成氣嘔者 本方加香附

桔 莴 木 槟

姜 縮之類

瓜蔞實丸 治膈嘔胸膈痞痛徹背脇喘急妨悶

萎 蒜 积 炙 半 桔 炒 各右為末姜汁米糊丸姜湯送下

人參利膈丸 治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿

木 桔各七參 歸藿甘 實麸炒各大酒濕朴

蒸朴各二

右為末滴水丸溫水下

祖傳潤腸膏

治膈噎大便燥結飲食良久復出者

新取威靈仙四兩

五月

開花者

搗汁四兩

麻油二

白砂蜜

四兩煎

若

四味入

銀石器內慢火煎候如鍤時時食之一料未愈再服一料

治噎膈久不納穀者

隔年炒飯乾右一味以急流順水煎煮

糜爛取濃汁時時與之待能食後以調脾進食生益順氣之

藥調治而安

○沉香開膈散 治膈噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇脹

沉 穎 荘 仁

白蔻 澄茄 縮 果 益

川白姜

丁

皮

參

苓

桂

枳

陳

姜

炮各

朴

木

桔

枳

木

木

木

木

木

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

炒一兩

布入姜東來

炒一分

布入姜東來

七冬甘各一右每服三錢姜三片束束一下枚煎服

半五噎入乾棟蒂一枚

膈氣吐逆入雞白三寸棗五枚

○漢防已散治五噎

已一分半桂二冬細一冬八陳

杏

去皮尖炒各一半半

蘇一冬分半

右分二貼姜五片水煎

一方

羚羊角屑米飲下亦以角磨噎上良

灸法膏肓

灸至百壯以多為佳

膻中禁針

三里灸三

束東肉平胃散

開胃進食朴

陳去白各三甘炙紅棗

生姜

各二枚泔浸一宿炒五分

一方加芩

參右剉拌勻以水

浸過面上半時許煮乾為末

每服二錢鹽湯空心點服

△秘結門

二十一

傳丹溪

曰有虛有風有溫有火有津液不足者有寒者有氣

外病勝中有實大便不通宜用潤腸丸微利之上

○外病勝中

有實大便不通宜用潤腸丸微利之上

惠邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此太陽挾

熟然也

能飲食

小便赤實秘不能飲食小便清虛秘

吐瀉後腸胃虛腹熱多者為熱結

肺受風邪傳入腸中為風結宜麻仁丸

年老氣弱津液不足或產後亡津液而結宜地黃丸

太便秘小便數則為脾約宜養血潤燥

服承氣不利者

四物加枳

枳桃紅

傳潤腸丸

治脾胃中伏火太便閉澁或乾燥閉塞不通

思食及風結血閉皆能治之

桃去麻仁杏殼各歸梢

大酒濕卷各半

右桃麻別研如泥其餘為末煉蜜為丸

如桐子大每服三五十丸空心白湯下。如風濕而太便不利加草角(皮)去秦艽。

○惠麻仁丸

治大便秘風秘脾約

麻仁 郁李 枳

梔各五

大(兩)一山

風各七右燒蜜丸白湯下

丹溪方

治太腸虛秘而熱

白芍一(兩)陳生地歸各二

甘二右為末

粥丸白湯下

七宣丸

治風氣結聚宿飲不消心腹脹滿大便秘小便澀柴實麸頭皮木各五桃去皮尖甘炙四大(兩)一

右燒蜜丸

如桐子大每服二十丸米飲下食後服增至四十丸宣利為度

厚朴湯

治胃虛而秘者不能飲食小便清利

○脾納丸

麻仁井中藥水面差一指許次日曝乾研之粒粒皆實炒朴姜芍各二大(兩)杏去皮尖炒右燒蜜丸溫水下

通幽湯

治幽門不通噎塞不便燥閉氣不得下歸身

桃升各一

生地各二熟地各半紅

甘炙各一分

右水煎去粗

潤燥湯

升半錢食前稍熱服

升各一紅分右

槐子各二

生地熟地各二熟地各三歸身甘梢各四

大(酒)濕生甘

桃青

升陽瀉熱湯

治膈噎不通逆氣裡急太便不行

升各一桃十(分)去皮右

活血潤燥丸

治風秘血秘常燥結

歸梢五(分)風三(分)大(酒)

煨卷各一皂仁燒存性一桃二(兩)去皮尖

兩五(分)麻二(兩)半右燒蜜丸如

煨卷各一皂仁燒存性一桃二(兩)去皮尖

如桐子大每服三五十丸空心白湯下

如風濕而太便不利加草角(皮)去秦艽

升各一桃尖另研

升各一桃尖另研

桐子大每服五十丸白湯下三兩服後以麻仁煮粥食之此丸藥磁石盛之紙包封毋令見風

潤膚丸

潤血燥通太便

麻仁 归梢 生地 桃枳

等分 煎蜜丸

枳蔻丸

治三焦約二便不通穀氣不得下行

枳 二
木

陳一
兩

換半
兩

木二
半
黑丑

四兩一
半生一
半炒

右煎蜜丸

姜湯下

林千金丸

治臟腑壅滯氣結或虫積心腹痛瘡疔積熱便結

大十
兩木一
右為末

醋糊丸如桐子大每服三十丸白湯下

皂角丸

治太腸有風大便閉結老人虛人宜服

皂
弦子

枳
等分

麸炒為末

煉蜜丸或飯飲丸亦可米飲下

小通氣散

治虛人憂愁悲傷肝秘結或燥藥太過

沙脂麻

浸瀝取濃汁水桃去皮

右入鹽少許同荆

穗煎去粗

可代茶飲之以利為度

歲靈仙丸

治老人津液不能內潤氣滯不能運道而秘結

歲

芪蜜各一
兩

實麸炒右煉蜜丸如桐子大每服七十九

米飲下

三和散

治氣結心腹痞悶太便秘澁 方見氣門

蜜煎導

虛羸之入服藥不得通者

用蜜四兩內銅器

微火煎之稍凝似餳攬之勿令焦捻作挺子

令頭銳大如指長熱時急作冷則硬內穀道中以掌急抱欲太便

時乃去之

惠以帛巾為骨尤妙

○心用蜜熬入皂角末少許作丸以道引之

冷秘生姜丸

亦好

司金三

十一五

○林治一便不通。用白礬末冷患人仰卧蒲牕中以新汲水灌之覺冷透腹內即自然通。

太便不通。

大由螺三五枚以鹽一匙和搗置脣下一寸

三分以帛札定

二便不通。連根葱一枝帶土不洗生姜一塊淡豉二十粒鹽一匙同研作餅熱掩脣中以帛札定良久氣

通自下

虛人大便不通。用皂角燒烟薰即通。

淋病門

二十二

附轉胞胞痺

關格

○傳原其為病之由皆膏粱之味或燒酒炙肉之類鬱鬱升濁陽不降而成天地不交之不口

渴而小便不利者熱在上焦氣分肺主之宜芩澤

琥燈

通草車葵

葛根

芩澤

火麻仁

桂圓

下焦無血小便澀數而黃者四物加柏知膠甘梢

老人氣虛而小便不通四物加芪參吞滋腎丸

因鬱熱成淋不通用赤芩芩車澤門桂渭通甘梢

氣虛者加芪木香淋痛加柏生地夏月煎調益元散

腎虛極而淋者當補腎精而利小便

心淋病之諸藥宜加牛膝傳牛膝損胃不食宜斟酌

治五淋赤芍一兩換水煎空心服之

○傳 參苓琥珀湯 治淋莖中痛相引臍下不可以忍者
參 茸各半 練去核甘梢生延各七琥柴歸尾澤各三
右加火心十數莖

○林琥珀散 治五淋 滉 通 归木 鬱金
扁蓄各二右分一貼蘆葉同煎服

淡竹葉湯 治諸淋 竹葉 甘燈棗烏豆車各等
右水煎濃湯代熟水服甚妙

冷淋 生附湯 治冷淋小便秘竊中痛 附皮滑各
兩瞿 通各三半冬右加姜燈蜜

八味丸 治冷淋臍虛淋水不出也 牡白苓澤各三

熟地八山茱肉 山藥各四附皮桂各二右煉蜜丸如桐
子大每服五十丸空心溫酒下

熟湖八正散 治熱淋血淋癰閉秘結 車瞿甘蓄
滑 甘 桑 通 大麥麴裏煨

石葦散 治熱淋多因臍氣不足或脅腹疼或治石淋
勞倦則發一葦去通各一甘 歸玉不留行 滉 术

瞿赤芍葵各一右為末每服二錢煎小麥湯調食前
瞿 赤芍 葵各一右為末每服二錢煎小麥湯調食前

月三服

立効散 治熱結淋閑作痛 甘炙梔各一瞿各三右作二

服姜三序葱三莖燈五十根

道赤散 治心虛蘊熱小便赤澁或淋痛 通甘

生地各等入竹葉煎

火府丹 治證同前

木通湯下

○^傳清肺飲子 治渴而小便閉澁熱在上焦氣分

燈一通草

澤

瞿佳

琥珀

通草

車

芩

各一

冬右水煎

滋腎丸

治不渴而小便閉熱在下焦血分

柏

酒洗

知

酒洗焙乾桂半兩

冬右熟水丸白湯下

淡鹽湯

下

○林石淋

石燕圓

治小便滻痛不可忍出沙石而後方通

石燕燒紅水淬二次研細

滑葦去毛

瞿佳穗各等

右麵糊丸如桐子

大每服五十丸明佳燈煎湯下日三服

氣淋

沉香散

治五內鬱結氣不舒行小腹脹尿不通

五葦散內去木瞿佳

通加沉陳為末太麥前湯調服

血淋

小薊飲子

治下焦結熱尿血成淋

生地

四兩

小薊根通草

滑施蒲炒

蘿蔔節生甘

竹葉

髮灰散

治血淋

亂髮燒灰

麝少許

右醋湯調空心服

加味五苓散

治血淋

加辰砂末燈心煎調服

丁方治血淋

膠二兩

猪赤苓滑澤

各一車半右

膏淋

五淋散

治諸淋或如豆汁或尿血如膏

赤苓二分

赤芍柏各五

甘歸酒溫各三

半兩煎服

鹿角霜丸

治淋閉黃赤如膏

鹿角霜白芩秋石

各等分

右為末麪糊丸如桐子大

每服五丸米湯或白湯空心服

勞淋

地膚子湯

治下焦結熱小便赤莖中痛出血

膚二分知芩

猪瞿實炒升

通草葵海藻

各九分

右入姜

茯苓調血湯 治酒麯過度房室勞傷小便出益

赤苓

赤芍 芍半各一
水半前

柴

青

枳

炒桔

桑

燈

甘

茅各二分半

右姜三片蜜少許

鹿角膠丸

治房室傷損小便

尿血

鹿角膠

五

油髮灰

沒藥各三

為末

茅根煎汁

打糊丸

鹽湯下

地黃丸

治腎虛小便淋漓及婦人子淋

八味丸去

附子桂

林轉脬

髮灰散

治男女轉胞不尿

方見右

八味丸

治腎虛小便閉溢及下元冷胞轉不得小便

方見右

心有胞系轉戾

小便不通者凡強忍尿急疾走飽食忍

尿飽食走馬刀心尿入房水氣上逆迫於胞故屈而

不舒張也或曰胞落則死

又以蒲黃裹患人腎令頭至地二度即通

玉茯苓丸

治胞痺小便內痛

赤苓

風細附炮

澤桂各五

天花苑

膝浸茲

芍甘二分生地

山茱

山藥獨半各一分

右蜜丸溫酒下

腎瀝湯

治胞痺小腹急小便不利

門通桔

赤芍五

右入羊腎一箇竹瀝少許

傳關格脉兩寸俱盛其証嘔逆而小便不通者是也用

二陳湯

探而吐之吐中便有降

有氣虛不運者補中益氣加梔使清氣升而濁氣降

吐逆而小便不利者急灸氣海天樞各三七壯其吐止

然後以益元散等利小便

祖傳秘方 治關格吐逆小便不通

藿香平胃散合

五苓散

加姜棗煎服立効

藿香平胃散方見嘔吐門
五苓散方見傷寒門

鐵服丸

治大小便不通神効

太皂角

燒存性煉蜜丸如桐

子大七十丸白湯下

林治卒淋

牛尾燒存性每服二錢空心白湯服

治淋

黑豆百二十粒甘草剉煎去粗乘熱入滑石末一錢空心服

治石淋

以

髮灰為末每服一錢空心井水調服

○惠小便不通

火鹽熱熨小腹數易之即通

○灸淋澁

以炒鹽填滿膀胱或小艾炷灸壯立効或灸三陰交

△濁濁門

二十三 附遺尿

○丹溪曰赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱用二陳加升柴

或有挾寒者本方加炒于姜桂甚者加附

氣虛者 李方加參芪木或加附

赤者多血虛瘦弱之人得之四物加酒知酒柏煎湯送

下珍珠粉丸 胃弱濁主參加升柴

赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治

宜酒煮當歸丸

珍珠粉丸

治精白濁等証

柏炒蛤各一

珍兩右為末水

和丸如桐子大每服一百丸溫酒下

酒煮當歸丸

茴黑附炮良各七

歸兩右四味以好酒丁半

煮至酒盡焙乾炙甘練生丁各五木升各一柴

炒黃鹽

全蝎各三

延年右與前四味同朱酒煮炒糊丸如

桐子大每服五七十丸空心淡醋湯下

草薢分清飲

治下焦虛寒小便白濁類數或如膏糊

或如膏糊

菖 菖 益 薜

白苓各一升水右作煎入鹽一錢煎

林清心蓮子飲

治心中發熱憂思抑鬱小便赤白濁

芩 門

地骨 車各一升水半升甘草一升

白苓 蓼

心參各二

半右水煎

熱加柴

苛各一升半水

道赤散

治心虛蘊熱小便赤濁遂成赤濁

方見淋門

加味五苓散

治赤濁本方加苡仁蓮水煎

遠志丸

治赤濁因勞心者如神

遠甘草水去心半斤茯神

益各三升水

右酒糊丸東棗湯下

治白濁出體條一酸炒木

參 芩 破炒

益 苗 嫩娘

桑螵蛸散

治男子小便數如米泔急脾瘦憊恍惚及遺尿

葛

溫龍骨煅桑螵蛸鹽水

遠志甘草水去心水三分

桑螵蛸散

右為末臨卧人參湯調二錢服

五子丸

治小便頻數時有白濁

龍骨大者一兩小者五錢五縮五辰仁

林秘真丸

治遺尿失禁

龍骨大者一兩小者五錢五縮五辰仁

益 蛇

去皮炒右酒糊丸米飲鹽湯任下

雞膾腎

一具并腸洗焙乾燒

右為末空心溫酒調服

△遺精門

二十四

○夫遺精者夢與鬼交而泄目夢遺或隨溺而出目精滑

思想無常所願不遂而得之者宜安神降火

因房勞致虛而得者宜滋水藏以復真陰

夢遺主熱精滑主濕熱

珍珠粉丸

治精滑方見尿濁門

加減溫膽

治因思想而得精滑者，方見傷寒門

去竹茹加參遠蓮酸神煎服

妙香散 治心虛遺精自濁 荸

神 茵

蜜遠

去心炒各一兩

參桔

甘各五山二兩姜木半分辰分麝

分右為末每

服一錢溫酒調服

和真丸

治思想無窮所願不遂為自淫隨溲而下或夢與

陰人通泄

方見尿濁門不可多服太秘也如要通喫葱茶半盞

○故三仙丸

治夢泄 益

二兩用鹽二兩炒去鹽

烏藥一兩炒右為末用

藥一兩為糊丸

如梧子大以硃砂為衣

每服五十丸空心臨卧

○臥鹽湯下

三白丸

治遺精自濁

龍骨

蛎

煅各鹿角霜二兩為末

右白苓一兩

金丹治陽丹

治遺精

桑螵

蟲

龍骨

兩

白苓一兩

一方有附

五味無

零右糯米糊丸空心

茯苓

鹽煎湯送下

○說博金散

治脫証自泄遺精

參

龍骨

略煅各

白苓一兩

絡石

各二

右為末空心臨卧米飲調下

○袖小草湯

治憂愁過度遺精自濁虛煩不妥

小草

茲

歸酒門

酸炒去斛去根各參

甘炙各

右加姜

○說歸洗門

酸炒去斛去根各參

甘炙各

右加姜

△怔忡驚悸門

二十五附健忘

○夫怔忡驚悸或因怒氣傷肝或因驚馬氣入膽母能令字

虛因而益為之不足又或遇事繁冗思想無窮則心君亦

為之不寧

神地 芹參 茴遠

怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也
驚慄者驚然而跳躍敬馬動而有欲厥之狀有時而作者

是也二証之因亦有清痰積飲留結心胞冒口而為之者又不可固執為心虛而治宜以脉証參究

丹溪曰有慮便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多是血少肥人只是痰多時覺心跳者是血虛

○健忘者由憂愛思過度損其心胞以致神舍不清遇事多忘病在心脾兼理心脾神意定其病自除理脾水

○精神短少者有痰者令健忘

○養心湯 治肥人因痰火而心中悸動 茯 神 半 芎

各半 遠 桂 柏子 酸炒 五味 參

各二 甘四右作二

服姜三斤

茶末一枚

如麝水加神曲

換

定志丸 各三 遠

葛各二 右煉蜜丸如桐子大石砂為衣白湯下

葛九連各二牛黃一錢辰分金箔十五片右為末猪心血丸如黍米大金箔為衣每服五十丸煎燈心湯下

朱雀丸 治怔忡驚慄

神二沉半朱半兩右蒸餅丸如桐

子大每服五十丸入參湯下

祖傳秘方 治憂愛思傷心敬馬慄

歸身酒 生地酒 神各五

葛九連各二牛黃一錢辰分金箔十五片右為末

如黍米大金箔為衣每服五十丸煎燈心湯下

補氣湯 治氣虛怔忡脉浮而軟

芪二參各一連炒一斤半右猪心血丸

各七右加姜分各七右加姜

○丹溪 治勞役太虛心跳者

辰 白芍 側柏 歸各三

分各一連炒一斤半右猪心血丸

益榮湯 治思慮過心血耗傷心帝無輔

正怔忡恍惚夜多不

寐

芩陳 甘各一連炒一斤半右猪心血丸

分各一分各一門桔

分各一分各一門桔

小使渾濁一歸 茂 小草 酸炒柏子炒神 紫石英

煅各一木 甘炙參各七分半右入姜東

分半

木

甘炙參各七分半右入姜東

林

茯苓飲子 治瘀飲薑於心胃

治心血虛怔忡散驚惕

柏子

遠

姜汁

淹炒

酸湯

方見瘦門

十四友丸 治心血虛怔忡不已

去皮隔紫石英

煅熟地

歸參桂

遠

姜汁

淹炒

酸湯

方見瘦門

辰砂炒杏散 治心氣不足恍惚少睡

白茯神 膠

炒各龍齒二兩辰為右

煉蜜丸米飲下

加味茯苓湯

治心虛膽怯易驚夜夢不祥

遠志丸

治因事有所大驚神魂不安驚慄夢驚夜夢不祥

遠志

淹炒各龍齒二兩辰為右

煉蜜丸米飲下

溫膽湯 治心虛膽怯易驚夜夢不祥

遠志丸

淹炒各龍齒二兩辰為右

煉蜜丸米飲下

丁方 加酸炒遠五味熟地參

遠志丸

淹炒各龍齒二兩辰為右

煉蜜丸米飲下

癲癇門

二十六

遠志丸

淹炒各龍齒二兩辰為右

煉蜜丸米飲下

遠志丸

淹炒各龍齒二兩辰為右

<p

○癇病獨主乎痰因火動之所作也發則旋暈顛倒口眼相引

目睛上搖手足搐搦背脊強直食噴乃更

先身熱制手足散驚馬啼呻吟而後發癇脉浮者為陽癇在六腑

在肌膚易治

先身冷不驚制手足而發時脉沉者為陰癇在五臟在骨

髓難治

○傳治法 痘宜吐 狂宜下 頸宜安神養氣兼降痰火

丹溪曰大率屬痰與驚不以分五等大法行痰為生用連星

半 薑尋痰尋火分多少治

神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱
如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

控涎丹 治痰迷心竅狂言譖語如有所見方見痰門

狂病者宜開痰鎮心神亦有中邪者以治邪之法治之有熱者

用涼藥以清心有痰者必用吐後用東垣安神丸及平肝
之藥青黛 柴胡 川芎之類 安神丸 方見內傷門

寶鑑 龍腦安神丸 治五般顫癇無間遠近發作無時

神參 地骨 甘 門 桑各二升硝二兩 麝各三

牛黃 五辰半犀一兩

金鉢 三十

右煉蜜丸如彈子大金鉢為

矣冬溫水化下夏涼水日進二服每服一丸小兒半丸

錢氏五色丸 治諸癇

石半水銀二兩雄一兩珍珠一粒

熬 金鉢三

元戎二白丸 治痰涎為患致癇癇狂妄驚悸等証

白礬 一

字或半水銀量虛實加減

右用生蒸餅割墨裹蒸熟去皮入輕

粉丸如桐子大每服二三十丸姜湯下小兒如黍米大

麪糊丸如梧子大每服五丸 心中痰患姜湯下

心痛酸石榴皮湯下

○林灸顛狂不避水火狂言間使穴灸二十壯在掌後三寸兩筋間
卒中鬼魅恍惚顛狂灸入中穴又灸兩手足大指甲金龜炷

在半肉半丸各七壯不止灸十四壯一法合掌定太指縛之

灸半丸半肉立効

神庭一穴在入前髮際五分灸三壯主登高而歌角弓反張
少衝二穴在手小指內廉灸二壯主驚癇沫出
前頭一穴在入髮際三寸半灸三壯主小兒驚癇
長強一穴在脊骨端灸五壯主小兒驚癇

晝醫發灸陽蹻申脉穴在外踝下陷中

夜發灸陰蹻照海穴在內踝下陷中先灸之後服藥

綱○風痰癇病化痰丸

生白礬兩細茶末為末煉蜜丸如梧子大

梧子大茶湯下

一歲十九大人五十丸久服痰自大便中出

斷病根

中惡門 二十七 附鬼擊尸厥

○傳病有心虛敬驚傷如醉如痴如為邪鬼所附或陽明肉實以致

登高而歌棄衣而走皆痰火之所為實非妖邪祟

丹溪曰血氣者心之神也神既襄乏邪因而入理或有之指此

魅而言若夫血氣兩虛痰迷心竅妨碍升降不得運行以致十二官各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治未必死

脉絳躁乍數乍大乍小或促或結皆邪脉也

林飛尸卒厥此即中惡也因冒犯不正之氣忽然手足冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語口噤皆不知人頭旋

暁倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊吊死及入廟登塚多有此
疾以蘇合香丸灌之俟甦以調氣散和平胃散服名調氣

平胃散

○惠中惡之證或暮夜登廁或入所不至之地忽然眼見鬼物
吸著惡氣倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口清血與尸厥同
勿移動即令人圍繞燒火打鼓燒鹿角樟木蘇木候醒方可
移歸或到久無人居睡中為鬼物所厭但吃吃作聲令人
久叫喚如不醒不得點燈近前敬馬喚祖痛咬足跟并太
拇指中邊或皂角末吹鼻或雄朱散灌之方見救急門
夜夢或被刺或杖打諸般不祥卒九竅出血名鬼擊

升獨地續各半桂分右為末白湯下

○傳桃奴丸治心氣虛怯夢魘鬼中惡方見癲癇門

蘇合香丸治諸般怪疾方見氣門
治厥鬼死不還半夏末吹入鼻中即醒

禪傳辟邪丹治疔惡怪疾及山谷間狐精為患

參神遠

恩箭羽菖蒲白朮蒼歸各一

桃奴丸

○五雄辰各三牛黃一金箔二十或加麝香若以桃奴已上
諸藥為末入雄辰牛藥和匀以酒調米糊丸如龍眼大
金箔為衣臨卧以木香湯化下十九諸邪不敢近身更以絳
囊盛五七九粒床帳中尤妙

○調氣散

白蔻丁檀木各一

藿甘八兩

○林灸各縮四兩

右鹽湯點服

○傳灸法兩手太拇指方見癲癇門

灸尺厥膻中二十八壯入中七壯陰囊下百壯

婦人兩乳間針中至齒立起

醫法明鑑卷之二終

