

醫
法
明
鑑

四

✕
i 39

卷之四
目錄

5册

490.9
Ih-10
1

No. 2106
12 / 39



富士川文庫

1312

破傷風 一

瘡瘍 二

癰疽 骨疽 二

馬刀 五 癰疽 六

瘰癧子 九 內疽 十

便毒 十三 囊癰 十四

賺瘡 十七 疥瘡 十八

乳癰 廿一 楊梅瘡 廿二

救急 三四

瘰癧 三

四

八

十一

諸瘡 十九

二十

癩風 廿三

醫法明鑑卷之八

破傷風門

傳若夫破傷風証因事

邪乘虛而容... 變... 候又諸瘡久不... 口風邪

亦能內龍... 破傷風邪無異其為証也皆能得

寒熱澗作甚則口噤目斜身射強直如角... 反張狀死在旦

夕治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏之

不同故不離汗下和三法也 羌活防風湯 治破傷風邪初得在表 羌 風 芎 藭

歸 芍 各一 甘 地榆 細各五 右水煎去粗熱服

熱則加大黃錢一 大便秘加大黃五分

白朮防風湯 如服前藥大過令自汗者宜服此

朮一風二芪一右水煎三藏府和而有自汗可用此

如破傷風藏府秘小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者知無寒也宜連下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

小芎黃湯 芎二芎二苓一甘五分右水煎三服即止用後

大芎黃湯 芎一羌一苓一大各右水煎服以和為度

大羌活湯 治破傷風邪在半表半裏頭微汗身無汗

羌 菊 麻 芎 膏 風 前 苓 細 甘 白 苓

枳 蔓各芎各芷各右細切作一服入半姜五片

防風湯 治破傷風同傷寒表証未入裏者風 羌 獨

養血當歸地黃湯 治破傷風日久氣血漸虛邪入胃

歸 地 芍 芎 藁 風 芷各細半右

白朮湯 治破傷風大汗不止筋攣手足搐搦

朮 葛各升各苓各芍各右

九味羌活湯 治破傷風發熱方見傷寒門

相傳敷藥 治初破傷風發熱紅腫風邪未入深者

杏研皮白麩各等分右和勻新汲水調和付傷處腫消熱退

△瘡瘍門 二

○夫癰疽瘡瘍皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不

調而發多生於膏粱富貴之人平昔所食肥膩炙博安坐

不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也

○宜分外發內發初發疽之時一粒如麻豆大身軀便發

熱生疔處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後色紅紫為外發
如用藥有理百人百可活初發疔時身射無熱自覺倦怠
生疔處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低
陷而壞爛破後色黑為內發未發見之先臧府已潰爛百人
百不救

○凡瘡腫大按之乃痛者膿淺
○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿
○疔發深不痛者胃氣大虛死肉多而不知痛也

○夫瘡疔腫毒須辨虛實虛者難補實者易瀉云云

腫起堅硬膿稠者瘡疔之實也

腫下軟慢膿稀者瘡疔之虛也

瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足冷脈弱皮寒小便自利

或時難聲不出精神不爽者臧府之虛也

大便硬小便澁飲食如故腹滿膨脹胸膈痞悶肢節痛口舌

咽乾煩渴身熱脈大精神昏者臧府實也

膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒自汗色脫氣血虛也

腫起色赤寒熱疼痛膿水稠粘頭目昏重氣血實也

頭疼鼻寒目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語

咬牙者上實也

精神不滯大便自利腰脚沉重睡卧不寧者下虛也

肩項不便四肢沉重目視不正睛不了了食不知味音嘶色

敗四肢浮腫者真氣之虛也

腫爛左甚痛不可近積日不潰寒熱往來大便秘

小

又曰脉洪大而數者實也微細而軟者虛也

治法或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是

故腫瘍為實宜瀉痢潰瘍為虛宜補益浮露而淺者為

癰疽外消截伏而深者為疽宜內托

其証善而易治者為順惡而難治者為逆

目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上翳一逆也 不能飲

食納藥而嘔食不知味二逆也 傷痛渴甚三逆也

膊項轉動不便四肢沉重四逆也 聲嘶色脫唇鼻青

黑面自四肢浮腫五逆也 煩躁時咳腹痛甚泄利無度

小便如淋六逆也 膿血大洩燉腫尤甚膿水臭敗莫逆

七逆也 喘鹿氣短恍惚嗜卧八逆也 未潰先黑陷

下青唇黑便汚九逆也 又如噫氣痞塞喘咳身冷自

汗目眩耳聾耳恍惚驚悸語言錯亂皆是惡証

動息自寧飲食知味一順也 便利調勻二順也 神形精

明語聲耳清朗三順也 膿潰腫消色鮮不臭四順也 體氣

和平五順也 凡五順見三則吉九逆見六則危

○灸法 凡疽瘡便宜灸之 一工百壯灸後覺燉痛經一宿火

氣下徹腫內熱氣隨火而出也若瘡痒宜備鼓餅子灸之其

餅須以椒姜鹽葱相加搗爛捏作餅子厚如二錢當瘡頭餅

子上灸之餅子若乾更換若瘡痛須急灸壯數多為妙若膿

已成者不可灸即針開之

又赤皮蒜搗爛作餅子如豆鼓餅子灸之效佳

○用大蒜去皮切二三錢厚安瘡頭上用艾灸之至三壯填

用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換

又云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者托之而不內出者接之而令外最宜灸為上一日二日十灸十

活三四自六七活五六日三四活過七日則不可灸

乾處

○癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發宜灼艾

凡腦疽及項上瘡不可直灸灸三里氣海穴而漸漸服涼膈化

血之藥

凡治癰疽用騎竹馬灸法無不安愈兩穴各或五壯或七壯可

以起死救危先從男左女右臂腕中曲橫紋起量至中指頭

剪斷令病人脫去衣服以丈長撮一條跨定兩人徐扛起足

離地五寸許却以量臂則子貼定竹扛從尾間起貼脊量

至則子盡處以墨點之非灸穴却關左右各同身一寸記之

即是灸穴也

用蟻針法 凡癰腫響作用大馬蟻一條安瘡疽之頭上吮其

正穴膿血出毒散如毒大蟻小須三四條方見効腹傍黃者

力大若血不止泥藕節或貼白茅花

○傳 蟻針之法可施輕小証候吮出惡血若積毒在臈府者徒竭

其血於外無益

內托之法 腫爛于外根盤不深形証在表脉多浮病在皮肉

非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣

和平如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却

與復煎散

○林 治瘡之大要有托裏內疎通行榮衛之三法

外之內者其脉浮數焮腫在外恐毒氣極而內攻當先托裏
內之外者其脉必沉實發熱煩躁外無焮赤痛深於內其毒
深矣當先疎其內以絕其源深也

內外之中者外無焮惡之甚內則清便自調知其其在經當和滲
衛也能用此三法縱未即瘥必無變壞之証

○膿出而反痛者為虛宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜却
解之風冷所逼者宜溫養之

腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老
潰後發嘔不食又宜參 芪 木 峻補隨証加使藥

河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白朮
癰疽發渴乃血氣兩虛用生芪以補氣 歸 地以養血或

忍冬丸 黃芪六一湯皆効
癰疽大作毒氣炎盛太渴急服神仙追毒丸每日 一服取下惡

毒次服清腫湯

疽疾既安之後忽發渴疾者多不救預服加減八味圓而防未
然未發疽人有渴疾亦須服之

清腫湯 右癰疽熱盛焮腫疼痛作渴 生地 芩 芍

參 知 甘 白苓 各二升 芪 麥 門 各三升 右水煎

加減八味圓 癰疽未生或初生或既安渴証出來並用之

地 酒浸蒸 山菜 各一兩 桂 味淡者 澤 牡 苓 各八

五味 炒一兩 右煉蜜丸如桐子大五更初未言已前溫酒或鹽

湯吞下三四十九累驗

忍冬圓 治癰疽大能止渴 忍冬根莖花葉皆用入瓶內以

無灰酒浸以塘火煨一宿取出曝乾入甘草少許為末以所

浸酒打麩糊丸如梧子大每服五七十丸酒下

○傳黃芪六一湯

治癰疽發渴

芪六兩甘多一右水煎

○林竹葉黃芪湯

治瘡腫渴甚

竹一兩生地四門芪飯

芎 甘 芩 芍 參 半 膏 各一右水煎

榮衛返魂湯

治癰疽發背大能順氣均血扶胃氣蕩滌邪穢

自然順通不生變証真仙劑也

何首烏 鐵 飯 通 茴 妙

赤芍炒

不見鳥藥炒枳 芎 各等 右水酒相半

煎 流注加獨活流注傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡為

流注 如尚有潮熱則裏有寒邪未盡散加升 蘇

如此而不退可加乾葛 如有頭疼加芎並姜水煎

如無潮熱可用水酒相半煎酒大能行血生氣故也

如氣血盛者減當歸多則生血發於他所再結癰腫生不生

絕斯乃秘傳 癰疽生痰有二証一胃寒生痰加半夏健脾

化痰二熱鬱而成風痰加桔梗以化咽膈之痰並用姜水酒煎

腦疽發背在上者可去末通恐導虛下元為上盛下虛之病

老人虛弱者尤宜去之 病人有瀉者不可便用此方宜先

用止瀉藥白礬生用為末溶開黃蠟丸米飲下二十九

內托復煎散

治腫爛於外根盤不深形証在表

地骨

芪 風 各三 芍 芩 木 苓 參 甘 飯 已 各一

分 柳 桂 淡味者

右分四貼先煎制衣蒼木二兩八錢用水十

盞煎至六盞去蒼木每用一盞半入藥一貼再煎至八分去粗服

若大便秘及煩熱少服黃連湯 如微利煩熱已退却服

復煎散如此榮衛俱行邪氣不能內侵也

內疎黃連湯

治嘔呃心逆發熱而煩脈沉而實毒氣在內藏

府秘^ス滋^ス當^ス急^ス疎^ス刺^ス之^ラ 連^ス施^ス芍^ス 歸^ス栝^ス木^ス 芍^ス
各半^ス 翹^ス 芩^ス 桔^ス 甘^ス 各半^ス 大^ス 二分^ス 右^ス 如^ス 二便^ス 不^ス 閉^ス 澁^ス 且^ス
未^ス 可^ス 入^ス 太^ス 黃^ス

黃連獨活散 治^ス 背^ス 疽^ス 一^ス 切^ス 惡^ス 瘡^ス 初^ス 發^ス 腫^ス 甚^ス 者^ス 三^ス 四^ス 服^ス 即^ス 消^ス 散^ス

連^ス 獨^ス 卷^ス 風^ス 藁^ス 芩^ス 風^ス 梢^ス 浸^ス 歸^ス 梢^ス 參^ス 陳^ス 方^ス

甘^ス 梢^ス 已^ス 各^ス 半^ス 知^ス 酒^ス 桔^ス 各^ス 一^ス 生^ス 地^ス 二^ス 歸^ス 身^ス 翹^ス 各^ス 三^ス 甘^ス 身^ス 炙^ス

芪^ス 栝^ス 各^ス 一^ス 澤^ス 七^ス 分^ス 右^ス 每^ス 服^ス 八^ス 錢^ス 水^ス 二^ス 盞^ス 煎^ス 八^ス 分^ス 入^ス 好^ス 酒^ス 半^ス 盞^ス 臨^ス 卧^ス 服^ス

小補湯 治^ス 發^ス 背^ス 疼^ス 痛^ス 嘔^ス 吐^ス 及^ス 發^ス 咳^ス 逆^ス 參^ス 甘^ス 芪^ス 飯^ス

白^ス 芍^ス 各^ス 二^ス 乳^ス 沒^ス 木^ス 芷^ス 各^ス 一^ス

防風當歸散 治^ス 諸^ス 般^ス 瘡^ス 癢^ス 癩^ス 熱^ス 毒^ス 風^ス 歸^ス 尾^ス 甘^ス 節^ス 芪^ス

赤^ス 芍^ス 芷^ス 各^ス 五^ス 左^ス 纏^ス 藤^ス 皂^ス 角^ス 刺^ス 各^ス 五^ス 桂^ス 陰^ス 五^ス 大^ス 陰^ス 五^ス 各^ス

右^ス 吹^ス 咀^ス 水^ス 四^ス 椀^ス 砂^ス 鍋^ス 煮^ス 至^ス 二^ス 椀^ス 入^ス 好^ス 酒^ス 一^ス 椀^ス 再^ス 煎^ス 服^ス

當歸黃芪散 治^ス 癰^ス 疽^ス 証^ス 臍^ス 疔^ス 已^ス 疔^ス 痛^ス 不^ス 可^ス 忍^ス 者^ス 歸^ス 芍^ス

生^ス 地^ス 芍^ス 芪^ス 地^ス 骨^ス 等^ス 右^ス 水^ス 煎^ス 發^ス 熱^ス 加^ス 芩^ス 煩^ス 躁^ス 不^ス 得^ス

睡^ス 加^ス 施^ス 嘔^ス 是^ス 濕^ス 氣^ス 侵^ス 胃^ス 加^ス 木^ス

五香連翹湯 治^ス 惡^ス 瘡^ス 癰^ス 疽^ス 瘰^ス 癧^ス 等^ス 病^ス 沉^ス 乳^ス 甘^ス 生^ス

青^ス 木^ス 各^ス 一^ス 翹^ス 射^ス 干^ス 升^ス 桑^ス 寄^ス 生^ス 加^ス 無^ス 以^ス 升^ス 獨^ス 通^ス 各^ス 三^ス

丁^ス 半^ス 酒^ス 蒸^ス 麝^ス 一^ス 分^ス 右^ス 煎^ス 空^ス 心^ス 服^ス 半^ス 日^ス 以^ス 上^ス 未^ス 利^ス 再^ス 服^ス 以^ス 利^ス

下^ス 惡^ス 物^ス 為^ス 度^ス

九珍散 治^ス 癰^ス 疽^ス 腫^ス 毒^ス 因^ス 氣^ス 壅^ス 血^ス 熱^ス 而^ス 生^ス 者^ス 腫^ス 物^ス 惣^ス 藥^ス

芍^ス 赤^ス 芍^ス 生^ス 地^ス 芷^ス 大^ス 空^ス 飯^ス 萹^ス 甘^ス 等^ス 分^ス

右^ス 水^ス 酒^ス 相^ス 半^ス 煎^ス 服^ス 婦^ス 人^ス 乳^ス 癰^ス 尤^ス 宜^ス 服^ス

內^ス 托^ス 十^ス 金^ス 散 治^ス 腦^ス 背^ス 癰^ス 疽^ス 乳^ス 硬^ス 等^ス 惡^ス 瘡^ス 虛^ス 冷^ス 証^ス

芷^ス 飯^ス 芍^ス 參^ス 芪^ス 風^ス 甘^ス 芍^ス 萹^ス 桂^ス 栝^ス

金銀花 各二
右水煎入酒再煎去粗服
如痛甚倍加飯芍
又加乳香 瘡口內有黑血或遍身汗出皆藥之効也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔瘡
翹二兩 朴二兩 風
桔各二 芫一兩 芎芷 芍 桂 參 甘 兩各一 飯兩半 乳二

木 沒各三 右酒煎
○傳 千金托裏散 治背疽諸惡瘡如三日以裏未針灸及利木
便者則可消 歸身 翹 芩 浸酒大 各三 門 二 薤 藁

芪 炙 丹 參 猪 各 一 生 地 洗 桔 施 酒 連 各 一 風 洗 酒
風梢 生甘 歸梢 陳 方 五味 酒栢 酒已 各半

右分二服用水三大盞浸半日煎至一盞稍熱服已冷冷水
如覺病即忙服無不効如瘡勢已發三四日或成膿則不
消也

升陽益胃散 治一切惡瘡發背腦疽等証
飯三 翹二
菘 藁 芪 炙 丹 生 甘 生 地 知 芩 桔 各 一

澤 七 獨 風 連 栢 風 梢 參 歸 梢 陳 酒 已
方 各 半 右 分 二 服 用 水 二 大 盞 浸 半 日 煎 至 一 盞 滴 酒 數 十

點去粗臨卧温服 忌飲水再作膿効遲初患二三日者服
之立消作膿者立潰隨病上下食前後服老人尤宜之或
加乳沒各一尤妙

當歸 菘 活 湯 治 腦 疽 芩 酒 連 酒 歸 身 各 二 栢 酒 翹
風 菘 甘 炙 梔 各 一 獨 藁 各 七 澤 半 右 作 一 服 水 二 盞

先浸一時許入酒一匙煎至八分去粗食後稍熱服日二服
俱將藥汁調下後項栢柳散

櫛 榔 散 大 斂 瘡 占 栢 木 各 三 右 為 末 用 前 湯 調 下

或飲瘡由油調塗生肌飲肉甚速膏染熱瘡所宜也
丹溪治背疽方 生地 歸身 甘節 風 羌 大

赤芍 貝 芷 芩 皂刺 作大劑煎服 氣虛加參
芪 瘡潰後亦宜加之

○托裏溫中湯 治瘡為寒變而肉陷者膿出清鮮皮膚最

心下痞滿腸鳴切痛大便微溏嘔逆氣短昏憤 羌 姜 各
水附 炮去皮 益 水 丁 沉 木 茴 陳 各 一 甘 炙 右 入 姜

五香湯 治毒氣入腹 丁 木 乳 沉 各 一 麝 射 三 右 水 煎
嘔去麝射加藿 兩 渴者加參 兩

定疼托裏散 治瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實先用

踈利後服此藥 粟殼 去蒂炒 飯 白芍 芍 各 半 乳
沒 桂 各 三 右

黃芪入參湯 治諸瘡破後食少無睡虛熱 芪 一 參 水

蒼 陳 門 歸身 炙甘 各 半 升 分 栢 四 分 曲 三 分 味 九 右

聖愈湯 治諸瘡血出多而心煩不安不得眠此亡血也

生地 熟地 苜 參 各 半 歸身 芪 各 一 右

內補黃芪湯 治諸瘡破後體倦無力懶言食無味少睡脈澀

自汗口乾 芪 門 各 一 熟地 參 苓 甘 炙 各 白芍

芎 桂 遠 飯 各 半 右 入 姜 束 束

十六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等証 芎 飯 芍

風 參 芪 木 桂 桔 芷 枳 朴 烏 蘇 枳

芎 各 一 右

托裏內補散 治諸瘡膿潰之後 參 木 苓 飯 洗 酒

芎 白芍 甘 芷 風 桂 金銀花 芪 右 等 分

麥門冬湯 治癰疽潰後膿水不絕 參 芪 飯 芎

桂 白苓 門 五味炒遠 各一分 各一分 各一分 右入姜末束

內托散 治諸腫毒惡瘡一服立愈 大 蛎 各半 蔓 二

亦可用甘 三水

金銀花散 治發背惡瘡托裏止痛排膿 金銀花 四兩 無 花用苗

葉嫩 兩 右酒水各半煎 一方加芪

義內消丸 治瘡腫初生及癰癧結核熱毒鬱滯服之內消

陳 膏 兩 二 丸 八兩取頭 苛 皂 各八兩去麤皮碎 二味水 煎成 右 陳 丸 為末用前膏丸食後荆艾湯茶清

膏 溫水任下

○金鍼散 治發背諸瘡腫 皂刺 春取一半 黑 右一味 為末食後酒調二三錢服之

○洗藥 越桃散 越桃 苓 甘 飯 卷 芷 各一分 右每一

兩用水五椀者三四椀去粗洗諸瘡毒

貼藥 傳 貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥神効夫氣得熱 則散得冷則斂何謂神効經曰發表不遠熱是也

解毒散 去赤腫收熱暈 寒水 二連 栢 各一 龍骨 五

輕 右為末雞清調以翎掃瘡四畔 熱瘡加黃丹 五

一方 荷葉 秋後採 草烏 南星 等 姜汁調塗瘡四畔

一方 大黃 東墻上土 右為末用無根井花水調付諸般 惡瘡乾即再傳

治諸瘡口膿水不乾 寒水 三龍骨 二國丹 飛 右乾 瘡口

乳香散 治瘡口痛甚 寒 煨 滑 各一 乳 沒 各五 腦 少 右同前

瘡口有虫膿不能自出如透深者用紙撚蘸此入瘡

內淺者搽之 芎 兩 芷 兩 白芍 輕 各三 右細末用

雄黃散

治瘡有惡肉不能去者

雄

巴

各一

右同

煎如

泥入乳

沒

許

再

研

勻

細

步

上

惡

肉

自

出

保生定子

雄

巴

油

杏

各

二

乳

沒

各

一

草

麻

粒

三

右為末

唾

津

調

作

定

如

太

麥

大

疔

瘰

問

新

日

皆

可

治

之

生肌換柳丸

治

癰

疽

瘡

癩

膿

潰

之

後

外

水

清

稀

出

而

不

絕

好

肉

不

生

亦

治

金

瘡

日

久

不

斂

一

方

加

麝

乳香膏

木

別

壳

各

一

柳

枝

三

尺

五

右

黑色

去

粗

次

用

乳

沒

各

三

白

膠

香

了

用

生

絹

濾

淨

入

黃

丹

一

兩

半

攪

候

油

沸

住

攪

滴

水

中

成

珠

為

神

仙

大

乙

膏

癰

疽

惡

瘡

軟

癩

已

斧

所

傷

並

可

內

服

外

貼

玄

參

芷

生

地

各

一

右

以

咀

用

麻

油

二

竹

十

日

瀝

去

滓

油

熬

次

下

黃

丹

一

其

麟

喜

月

血

竭

桔

連

歸

甘

芷

各

栝

各

四

黃

丹

兩

香

油

半

桃

柳

桑

枝

對

各

右

除

黃

丹

外

用

銅

銚

盛

火

熬

令

焦

瀝

去

葶

入

黃

丹

用

柳

候

烟

起

離

火

滴

水

成

珠

傾

水

中

玄

武

膏

治

癰

疽

瘡

疔

膿

血

生

肌

國

丹

兩

四

麻

油

兩

槐

柳

嫩

枝

各

一

方

治

癰

瘡

中

冷

瘡

口

不

合

鼠

治癰腫 括萋根 醋熬燥 搗篩醋和塗紙貼服 金石人宜用
瘡腫已成膿懼針不得破 取雄雀屎塗瘡頭上頻易之雄雀

屎直者是

治發背 生蝟牛二百箇入瓶中用新汲水一盞浸一宿蝟牛

放之其水如涎將蛤粉調以雞翎掃瘡上日十餘度熱痛止

瘡便愈

一方 治發背欲死 伏龍肝末以酒調厚傅瘡上口乾即易

瘡腫若息肉突者 烏頭 五枝以苦酒三升浸三日洗之夜三四度

一 附骨疽 二

夫附骨疽者其毒氣深沉附著於骨也與賊風相類而不同

風邪之氣搏骨筋故痛深徹骨髓遇寒則痛甚初按之應骨

皮肉微急洪如肥狀者是也

流注者傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡然表未盡則餘毒

附骨而為骨癰 夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注之

敗証也流注醫者表之未盡也骨癰涼藥之過也

傳 丹溪曰附骨疽者因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽

滯於陰之証也 又曰環跳穴痛不止防生附骨疽

羌活防已湯 治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

羌 活 防 已 芍 芎 蒼 翹 木 射 干 甘 白 芍 歸 尾

通 蘇 木 各 七 分 右 水 酒 各 半 煎 食 前 服

托裏黃芪湯 治骨疽初發於足少陽陽明分者 歸尾 一 分

柴 一 分 芪 桂 翹 黍 粘 子 各 八 分 栢 升 甘 各 一 分

右 作 一 服 酒 一 盞 水 一 盞 半 煎 空心 服 美 膳 壓 之

內托黃芪酒煎湯 治瘡生腿外或因寒濕得附骨疽於足少

陽經分微侵足陽明經堅硬漫腫行步作痛

歸尾八分

柴六分 芷二分 桂一分 翹各八分 升七分 栝一分 枳五分 芩五分 芒一分 大力子各炒

分四右酒水各一盞煎食前溫服

黃連消毒飲 治附骨疽 連 羌 各一分 芩 栝 桔 已

藁 各五分 生地 知 獨 風 歸尾 翹 各四分 芩 參 澤

蘇木 各二分 甘 陳 各三分 右水煎

一老人因寒濕地氣得附骨疽於左腿外濶六七寸長一尺

堅硬滿腫以指按至骨大痛與此藥即愈

加味八味丸 治附骨癰疽真氣不足虛火炎上之証及疽

愈後發渴者俱効 方在右

一疔瘡 三

義夫疔瘡以其瘡形如丁甚之狀者是也古人論皆不離於氣

容於經絡五藏內蘊毒熱生三頭凹腫痛青黃赤黑無復定

色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛

無血是其候也急用艾灸之若不覺痛者針了四邊令血出

若或針之不痛無血者以猛火燒鐵針於瘡上烙之令如焦

炭取痛為効如針不痛眼黑或見火光者不可治也此邪毒

之氣入臟腑故也

又曰刺瘡心至痛處又刺四邊十餘下令血出傳藥藥力得入

針孔中則佳

丁腫十三種形色禁忌 一曰麻子疔狀肉起頭如黍米色稍

黑四邊微赤多痒忌食麻子近油衣布衣并入麻由中行

二曰石疔狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌

瓦礫磚石之屬 三曰雄疔狀炮頭黑靨四畔仰炮漿起有

水出黄色黄大如钱孔形高者忌房事 四日疔状瘡相

黄向裏靨亦似灸瘡四面胞漿起心凹色赤如钱孔者忌房

室 五日火疔状如汤火灼瘡頭黑靨四边有烟焰又如赤

粟米者忌火燒烙 六日爛疔状色稍黑有白斑瘡中潰有

膿水流淌瘡形大小如匙面者忌沸熱食爛物 七日三十

六疔狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今自生一明日生

二及至十若滿三十六不能治未滿可治忌嘆怒愁恨 八

日蛇眼疔状瘡頭黑皮浮生形如小豆似蛇眼大疔硬忌惡

眼人看并嫉妬人見毒藥 九日鹽層疔状大如匙面四边

皆赤有黑粟粒起忌食鹽味 十日水洗疔状大如钱形中

如钱孔瘡頭白裡黑靨汁出中硬忌飲漿水水洗渡河 十

一刺及刀鎌切割可以其藥治不其乱攻 十一日浮瀉疔状瘡

射曲圓少許不合長而狹如薤葉大肉黃外黑黑處刺之不

痛黃處刺之痛 十三日牛狗疔状肉色胞起搯不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱四肢沉重

心驚眼花重則嘔逆嘔逆者難治麻子疔一種始末惟痒録

忌者不可犯犯者作難治浮瀉疔牛狗疔無禁忌縱不瘡不

殺入 林 赤芍藥湯 治疔瘡癰疽初覺憎寒疼痛 赤芍 金銀

花 各五 大 各二 飯 廿 枳 各三 右水蘆煎

通利藥 黑丑 末一 巴 十五粒 大 五 右為末水丸白湯下

荆黃湯 治風熱結滯生瘡毒 荆 五 大 二 右

托裏湯 治惡瘡發背疔疽毒始發脈洪數腫甚欲作膿者

三服消盡 大 蛎 括 皂刺 朴硝 麴 各三版

金銀花 各一 赤芍 各二 右水酒各一盞煎

傳 雄黃丸 雄 蠶 皂 蝎 各一 巴 十四枚 麝 許右為末滴

水丸如菘豆大每服二十丸亦看虛實如減丸數茶清送下

二活散 精義曰十三疔形狀雖異皆熱毒之甚也治法先以

雄黃丸去其毒熱次服二活散病熱緩而用引經藥

各四 紅 蘇木 荆 蟬 葛 各三 檀 紅 右為末煎湯下

獨蟾丸 併取蟾酥法 拿取活蟾大壯癩蚶捉住後脚以大桑

葉或油紙包掩其頭用鉄針取眉白汁澆葉上凝結如濕真

粉丸如菘豆一蟾作一丸多者作二丸懸當風處陰乾患疔

瘡者即以一二丸置舌尖上仰臥片時若水滿口嚥下或以

鐵刺開疔瘡頭上納菘豆一丸以薄皮紙貼護疔瘡疔初起

時依此法可治之 取蟾酥時入眼 眼睛

驗 ○ 追疔奪命湯 羗 獨 青 用風膠連 赤芍 細

甘節 蟬蛻 僵蚕 脚連 連各等分 加河車 金銀花

澤蘭 有膿加何首 芷 要利加青木 梔 大

丑 在脚加木瓜 各等 右水煎

丙 托連翹散 疔瘡出皮色不變不疼用針刺仍服此消散

翹 芷 生地 赤芍 各一 大 梔 苛 各七 朴硝 兩 二 半

甘 一 兩 右入灯心竹葉煎如喘加參少許

五聖散 治疔瘡 皂針 二 蔓 个 大 金銀花 生薑

甘節 各一 右酒煎 百二散 又名護心散 治發疔瘡煩躁手足不從發狂者

甘節 菘豆 辰 各等 右為末每服三錢熱水下

○蟾蜍丹 蟾蜍一枚為末以白麩和黃丹捏作劑丸如小麥

大針破患處一粒內之神妙仍以水澄膏貼之

水澄膏 白芨半為末水盞內沈下澄去水皮紙攤貼

治疔瘡腫甚者 附子末醋和塗之乾即再塗

治一切疔腫取蒼蒼耳根莖葉燒作灰醋浸和如泥塗乾即易十

餘度即拔出其根

魚臍疔瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿 蛇蛇燒灰存性為

末雞子清調敷

治魚臍疔 絲丸葉連鬚葱韭菜右石白內搗爛酒和服以

相貼腋下如病在左手貼左腋下在左腳貼左膝下右同如

在中貼心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白色則安令人抱住

灸法 灸掌後橫文五指男左女右七壯即瘥

○以大蒜搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾灸之 以爆為度

如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○有紅絲疔頭生手足間有紅紫一條急用針刺斷不然

其絲入心必難治

一瘰癧 四

○夫瘰癧瘡者在風毒熱毒氣毒之異瘰癧瘡結核寒熱

之殊皆由忿怒氣逆惡息過甚風熱邪氣內搏於肝經蓋怒

傷肝肝主筋故令筋縮結畜而腫多生於頸項胸腋之間結

聚成核初如豆粒後如梅李累累相連大小無定初覺憎寒

壯熱咽項強痛腫結不消者便當服散腫潰堅湯或五香連

翹湯散之或用牡蛎大黃湯踈利之瘡上可用十香膏貼

之或隔蒜灸之

又有馬刀瘡亦生頸腋之間類癰癤但其形如馬刀赤色如火燒極痛宜急治之

○林夫癰癤者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頤或在頸下連及缺盆皆謂之癰癤或在胸及胸之側或在兩腋皆謂之馬刀乃手足少陽經多氣少血之病也

○傳丹溪曰癰癤必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱滯氣之積須分虛實實者易治虛者難治

救苦化堅湯 治癰癤馬刀 莖 漏芦 升 翹 羗

藥 各一 參 牡 生地 歸身 熟地 白芍 牛 莪

連 栝 各三 炙甘 葛 獨 風 各半 桂 昆布 益 稜

各二 柴 八 枳 一 各 曲 一 右 為 末 湯 浸 蒸 餅 捏 作 餅 子 同 乾 搗

如米粒大每服三錢白湯下 如止在陽明分者去柴牛

如氣不順加橘紅甚者加木香少許 如在少陽分者去

獨 漏 升 葛 加 瞿 三 如 人 素 氣 弱 病 勢 來 時 氣 盛

而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病變之權也

芩 連 栝 知 巳 之 類 在 上 焦 芩 在 中 焦 連 並 洗

生 在 下 焦 酒 製 栝 知 巳 如 大 便 不 通 而 其 邪 盛

者加酒制表太黃以利之 如血燥而大便乾燥者加桃仁

酒制表太黃 風燥加麻仁 如風澁而大便不行加煨皂角

仁 木黃 秦 朮 如 人 素 氣 弱 去 苦 寒 之 藥 加 參 芪

甘之類 凡母冷藥多妨其飲食此為大治之法也

又冬寒不可用芍 如有煩燥去桂 無腫不可用半 如瘡堅硬甚者用莪不甚堅硬不用 如唾多吐食用

益智不然不用井 如煩燥用栢不然不用井

散腫潰堅湯 治馬力瘡結硬如石或在耳下缺盆或有上

脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頰或至頰車堅而不

潰在足陽明經中所出或瘡已被流膿水並治之

芩一分酒洗 膽酒洗 栢酒製 知酒製 昂酒洗 桔各五分 柴四分

炙甘半炒 稜酒洗 翹各三分 白芍葛 飯梢連各二分 升

分右作 一服水一盞先浸半日煎至一盞去粗食後稍熱服

於卧處伸足在高處頭低垂每含一口依十次吞下服畢

頃依常安卧取藥在臍上停畜故也別制一料為未煉蜜丸

如蒙豆大每服百餘丸以前藥送下或加海藻五分 赤如

升陽調經湯 治瘰癧 外八 葛膽 酒製 煎升 芩酒 莖酒 稜酒

服外為未煉蜜丸如前方法

柴胡連翹湯 治男婦馬力瘡 瞿二 柴翹 知酒 芩炒

半一 牛炙 甘栢 酒生 地各一 飯梢五分 桂一分 右水煎稍熱服

消腫湯 治馬力瘡 翹二 生芩 柴各一分 拈菝 各一

飯梢甘 各七分 牛炒 連各三分 紅少 右水煎稍熱服

集驗 ○ 檳榔散 治氣毒瘰癧心壅飲食不下 檳前

赤苓牛 一炒 各一 枳炒 沈風 各半 甘灸 一右 入姜

射干連翹湯 治瘰癧寒熱 射翹 玄參 赤芍 木

升前 丹 飯甘 各一 大炒 二右 水煎入芒硝少 食後溫服

瞿麥飲 治瘰癧馬力瘡 瞿穗 半翹 右水煎服此藥經効

累多但不能速驗待歲月除

○ 治結核耳前後或耳下頷下有者皆瘰癧也 桑椹

黑色者以布裂取自然汁砂器內文武火慢熬成薄膏白湯
點一匙食後服

○林連翹丸 治瘰癧結核破或未破 新苛葉 二斤取自然汁皂角一條
去皮水浸已上二味銀石器內熬成膏 青 陳 丑 半半生

各一翹五皂角子 煨去皮為末用膏子丸每服三十九
煎連翹湯下十日効

貼瘰癧 大田螺連殼燒存性研末破者乾貼未破者香油
調付

治頭間少陽經中疔瘡赤腫硬痛 草麻 个生山藥 條一

右二味搗爛攤帛上貼

治瘰癧不問有頭無頭用大蜘蛛五枚晒乾研細調貼之日
兩度

一方 烏菌菜陰乾燒灰臘月猪脂和以暖泔水洗瘰癧拭乾
傳之日三度

○傳龍泉散 龍泉粉 炒磨力右 瓦粉 莪 稜 酒洗 昆布 各五
右為末煎熟水調塗之効速

集驗 ○一方 五倍 海蝶 楨 雷 灵脂 麝 右為末清
油調塗濕則乾摻

又 星 半 血竭 各一 輕許為末津唾調傳

○灸法 治瘰癧 以手仰置肩上微舉肘骨尖上是穴隨患
處左即灸左肘右則灸右肘七壯再灸如前三次永無恙四
五年用藥不退辰時著灸申時即落

一法以蒜片貼瘰癧上灸七壯易蒜多灸取効

瘰癧 五

○林 喜怒不節 息多思過度 致氣滯血凝 為癭瘤瘰癧者 多結於頸項之間 瘤者隨氣凝結於皮肉之中 忽然腫起 狀如梅李 又則滋長 醫經所謂癭者 有五種 石肉筋血氣也 瘤有六證 骨脂膿血石肉也 治法 癭不可破 則膿血崩潰 多致大疔 瘤惟有脂瘤 可破去 脂粉則愈 餘五證 亦不可輕易決潰

○傳 破結散 治五癭及馬力瘰癧等証 海藻酒洗 龍膽酒洗

海蛤粉 通草 貝母 昆布酒洗 枯礬 松蘿 各二錢 今以

麥麩炒四 半 右為末 每服二錢 熱酒調 食後服 忌甘草

鯽魚 雞 豬 五辛 生菓 菜

○林 昆布丸 治一切癭瘤瘰癧 昆布酒洗 海藻酒洗 小麥醋煮乾 各一兩

一方 昆布酒洗 搗為散 或為丸 每一錢 綿裹於好酒中 浸含 嚥津 藥味盡 再含之 或切指大 醋浸 含嚥津

南星膏 治皮膚頭面生瘤 或軟或硬 不痛 生南星 大者一枚

研如膏 無生昔調 如膏先將小針刺令氣透 以膏攤紙上 如者乾者為末 酒調 如膏先將小針刺令氣透 以膏攤紙上 如

○傳 十六味流氣飲 最宜瘰癧 方見右

○林 灸法 治諸癭 天突穴灸三七壯

肩禺二穴 男左十一壯 右十一壯 女左十七壯 右十八壯 壯在膊骨頭骨端 兩骨間 陷中 舉肘取之 又灸兩耳後髮際 七壯

一結核 六

○傳 丹溪曰 凡結核在項 在項在臂 在身如腫 毒不紅不痛 不作膿者 多是痰注不散 名曰痰核 一陳加酒炒 大黃 翹 結

紫煎服

又方 治辟核作痛

二陳加翹 芎 皂刺 風 蒼

酒芥

○又方 小腹連毛際結核不思必寒熱 梔炒 桃炒 枳炒

查各等 右水煎入薑汁

一漏瘡

○蓋漏瘡須先服補藥以生血 參 芪 朮 飯 芎 各葉

為大劑服之外以附子末唾調作餅如錢厚以艾灸之漏大

艾炷亦大但令微熱不可令痛餅乾易之如困倦則止來日

又灸至內平為効仍用好膏藥貼之

截疔飲 治年深疔瘻

連 五 白芨 白欵 黃丹 蜜佗

僧各一 右為末入輕腦 麝 各半 乾 參 或成膏貼

一瘰子

南星為末酸醋調塗數次即落

一方 地膚子 白礬 等 為末煎湯洗數次即去

取蜘蛛絲纏根下妙或用髮纏根下

又以針穿髮於患處數次穿

又灸瘰子六一壯以水滴之即去

一內疽

○傳丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發其發

在腔子而頭向內宜以內托之藥托出于外以針開之而愈

先用四物湯加桔 莎 生薑煎服 膿出後亦用四物湯

調理而安

一肺癰 十

集驗 ○四聖散 治腸癰便毒生黃 括萋一枚去皮若乾則用二枚粉草

牡丹散 治腸癰冷註腹濡而痛時時利膿 牡參 苳

天麻 白苓 木 飯 芎 桂 桃去皮尖 芷 蕙 甘

炙各二分 右水煎食前溫服

梅仁湯 治腸癰裡急隱痛大便閉澀 梅核仁四十九

尖大 兩牡一分 冬瓜仁四 犀一 芒二 兩 右水煎服下膿血

三四行為度

傳 灸法 屈兩肘正肘頭鎡骨端灸百壯下膿血安

一便毒 十二

○便癰者血疝也俗呼為便毒乃是厥陰肝之經絡及衛任督

脈亦屬肝之經絡是氣血流行之道途也途壅而為癰疔之

宜以導水丸 桃仁承氣湯大下之

集驗 ○夫便毒者生於小腹下兩腿合縫之間初發寒熱腿間腫

起疼痛是也初起慎不可用寒涼之藥恐血氣愈結得不宜

散反成大患當發散寒氣清利熱毒

傳 ○丹溪曰便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發 射干三寸同生

姜並食前服得利二三行効 射干紫花者紅花者勿用

一方破故紙 黍粘子微炒 黑丑炒 大黃酒蒸 右等分為末每服

一兩酒調下

便毒已結成膿者 大黃酒拌 翹各五 實三 朴 甘節各三 桃

蘇方散 治便毒 木敞魚去殼 飯尾 芍 芷 甘 芎

射干 忍冬即金花 大黃 川山甲煨 胖沒 蘇木各六

右水酒各一盞煎至一盞食前服

牡蛎大黃湯

一名內托散治便毒

雙解散

治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結疼痛

桂

白芍 澤 丑 炒桃 去皮尖各半 甘 姜 右水煎

集驗 ○退毒散

治便毒腫結 穿山甲 浸炙焦 猪苓 微炙

右為末食前酒下次醋煮肥皂研膏敷之妙

枯菜散

治便癰等惡瘡 蕪 去皮 金銀花 牛 炒各

生薑

甘 兩各半 右不犯銅鐵酒煎空心溫服微利為度

三物湯

治便癰 蛎 大 梔 等為末酒水煎露一宿空心

溫服

五消毒散

治便毒初發三四白可消 白針 金銀花 風

中髮立効

集驗

敷藥 治便毒腫痛 雄 乳 各三 栢 兩 右為末新汲水

調敷腫處自消

林

便毒初發 生薑一大塊米醋一合以姜蘸醋磨取千步

峯泥敷之即散

手足步峯乃地上入行日久其泥突起者是

便毒初覺腫痛以稱錘放正按摩數次自消散

灸便毒法 隨所患左右手自掌後橫灸量至中指頭盡處

是穴灸三壯

一專囊癰 十三

傳

丹溪曰專囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣下流入

道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在

善調攝耳

癰疽入囊者由濕熱入肝經雖膿潰皮脫畢丸懸掛者宜死
○陰腫者由膀胱蘊熱風濕相乘或濕熱水腫流注或疝氣攻
作或暴風客熱所致也

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹二便不利

白丑二兩 桑炒木 通 陳各五 右為末姜湯調下

一方 治外腎腫脹 茴炒穿木各等 為末每服二錢空心
酒調下痛止立効

敷藥 治陰囊瘡癢痒不已自汗不收 瑰 黃丹各

枯凡一 麝四 龍泉粉二 右為末手心搽患處

地龍膏 治大人小兒外腎腫硬或疝氣風熱暴腫

生乾地龍為末先以葱椒湯無風處洗用津調敷或用熱

男婦陰腫如斗核痛 馬鞭草搗汁塗之

又 荏葉杵為泥傳之腫即消 又蕪菁根搗傳之

外腎腫及陰瘡 地龍米異研生薄荷汁調傳

又 桃仁研膏傳之

率外腎月偏腫疼痛 太黃末和醋塗之乾即易之

傳 一方 野紫蘇面青北背紅 焙乾為末付之如燥香自油調付

囊脫無皮者以青荷葉包之其皮自生

○牡蛎散 治小兒陰腫大莖物通明 蛎粉研細先以津

塗腫處次以粉擦之桃仁研膏唾調敷

蟬蛻散 治浮囊腫小兒坐地為風或蟻吹着所致

蟬蛻五 右水煎洗仍與五苓散加灯心煎服

治小兒外腎嫩赤腫痛 老杉木燒灰入膩粉麻油調敷

灸法 崑崙灸一次灸三壯 治陰腫在外踝後跟骨上陷中

肉崑崙灸三壯 治小兒陰腫在內踝後五分筋骨間

久病陰腫不可救者宜速灸水分蓋水分能分水穀水穀不分

故陰腫也

治陰卵偏大一灸關元百壯

一蒸瘡 十四

○陰頭生瘡因年少陽道興起當泄不泄不當泄強泄脹斷

嫩皮初如針眼大畏疼不敢洗自以攻入皮肉連莖潰爛用

荆 栢 蒼耳 生葱煎湯洗去膿掩以訶子燒灰入麝

少許乾疹仍禁房事三五日臨睡喫冷水三口勿令陽興脹

陰頭生瘡先用陳大螺螄殼燒存性為末先以鹽湯洗淨

津調散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛連 欬等為末先以

地骨 蛇床子煎湯洗搗乾津調藥敷之

一方 大田螺兩箇和殼煨存性為末入輕少許傅之

治陰瘡痒痛黃汁注 石膏末入輕少許傅之

又 生白礬冷水汁洗之

治陰莖腫爛 防己為末先葱湯洗搗搽之

治陰瘡疼痛出水久不瘥 椒 荆 床 等 槐 柳枝 各二

右水煎去粗洗用鷄子清調朴硝末塗之

治陰頭瘡 鰵魚甲燒為末雞子白和傅之

又以蜜煎甘草塗之

治痲瘡及陰莖疔瘡 雞卵殼 連 輕粉 等 為末香油

調先用香附 芷 五倍煎湯洗傅之用朴硝煎湯洗亦可

鹿射香輕粉散 治血疔陰蝕下疳一切惡瘡 鹿射

輕各半 乳 沒 礬 各一 右為末乾貼

治下疳瘡 燈心灰 輕粉 麝少 右為末乾貼

治下疳瘡腫不消 荆風 膠 甘 等水煎洗之

治下疳瘡 枯凡 輕 麝少 為末先以口含漿水洗搥

乾貼日三兩次

又 蜜佗 連 栢 輕 等為末鹽艾煎湯洗乾搽

治走馬牙疳下疳 伏龍肝 乾胭脂 各二 麝 枯凡 各

右為末先將水洗搥乾貼之

治陰莖疔瘡 蚕退 燒存性 輕 乳 各少 為末溫將水洗傳

傳 治下疳瘡 鳳凰退 燒存性 研香油調付外看瘡大小剪

又 青黛 蛤粉 蜜佗 黃連 為末付之

○下疳瘡洗藥 連 栢 飯 芷 獨 風 朴硝 荆

等 右入錢五十文 烏梅 五 個 塩 一匙 同水煎洗 木 枳

連 銅青 輕 枯凡 桑螵 麝 等 為末洗後至夜敷上

集 驗 ○鹿射香散 治如精瘡 黛 欸 等 鹿射 許 為末先以地

骨 桑白煎湯洗拭乾次以津唾調藥敷

治男女陰瘡 米粉 一 杯 許 芍 苓 芩 蛎 附 芷 各一 右以

入水猪脂一斤 微火煎三上三下 候白芷黃瀝去粗入米粉

和調敷

換桐散 治陰莖下疳瘡蝕透久不愈 換 雄 輕 蜜佗

連 栢 朴硝 等 為末先以葱白湯洗搥乾瘡濕乾搽若乾

油調塗

治陰瘡疼不止 滑 蜜佗 寒水 烟各兩 臑 麝射各少 右未付

○治丈夫陰下濕痒 蒲黃傳之三四次

治股內陰下長濕且臭或作瘡 用胡粉傳之大驗

一殿背癰 十五

○丹溪曰殿背居小腹之後在下此陰中之陰雖自太陽多血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此証總有腫痛灸之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉若無積補之功其瘡多在結痂之後慎之

內托羗活湯 治尻殿背生癰堅硬腫痛大作 羗 栢 酒炒 各二

風 藁 飯尾 各一 桂 三翹 甘 炙 蒼 陳 各五 芪 一 柴 一 柴

石作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空心服以衣

一膿瘡 十六

集驗 ○夫膿瘡者由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三重之傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫

隔紙膏 治內外膿瘡 歸 芷 連 五倍 雄 沒 血竭

海螵 白芨 白欽 栢 朴 各半 黃丹 六 乳 二 糸 輕 一

右為末清油調成膏用油紙貼藥敷上絹帛縛定有膿水

解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈須先用燒鹽湯洗

淨拭乾待水氣乾貼藥示 治膿瘡下注 白石脂 龍骨 各半 枯凡 一 五倍 二 兩 燒 黃丹

飛 雄 許 右為末先葱鹽湯洗見赤肉後敷藥 赤石 黃丹 各半

○治外膿脚瘡 竈心黃土研細入黃栢 赤石 黃丹 各半

乳 沒 輕 各一 研和清油調如膏以油絹攤藥將絹面

貼瘡上外以油紙掩之札縛縱痒不可開視數日後未愈
再換藥去藥先必以茶清洗淨付藥

○治外腫瘡臭爛多年一龜一箇去肉以米醋一椀炙醋盡
仍煨令白烟盡存性用碗蓋地上出火毒為末入輕粉

麝香和勻先以葱椒湯洗搥乾傳之

治多年腫瘡及脚上老瘡一輕粉連等為末以濃茶清入搥

口含漱洗瘡搥乾傳藥又將油調赤石脂末傳油紙貼之絹

帛縛定二三日劫

治脚肚生瘡初如粟漸大黃水出痒不愈百藥前研唾調傳

自外而入以貫仲煎洗搥乾傳

一疥癬 十七

○夫疥癬者皆由脾經濕熱肺氣風毒淺浮者為疥深沉

者為癬久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛二者有細
虫而能傳染人也

○當歸飲子 治瘡疥癬濕毒燥痒 飯 芎 白芍 地

風 蒺藜 荆 各一 何首烏 莖 甘 各一 右水煎

升麻和氣飲 治瘡腫癬疥痒痛 升 桔 蒼 葛 甘

大 煨 各 陳 二 飯 半 苓 芷 菴 枳 各 五 芍 一 右水煎

苦參圓 治遍身癢痒癬疥瘡傷 苦 四 玄參 獨 連 大 炒

枳 炒 風 各 二 芩 梔 菊 各 一 右為末煉蜜丸如梧子大每

服二十九丸食後將水 下茶酒亦可

○傳 治疥瘡 馬鞭草不犯鉄器搗自然汁半盞飲盡

治瘰癧 浮萍 苦參 各一 蒼耳子 蒼朮 各二 香附 二 各

芩 五 右水煎洗之

身上虛痒

四物加艾煎調浮萍末一盞服

白癩風癬

以小麥攤石上以鉄器熨紅壓出油搽之立効

治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡火丹諸般惡瘡

蛇床 苦參

蕪荑

各一兩 雄 硫 大風子 肉椒 各五 枯凡 一兩 猪油調付

又方治証如前及小兒癩頭瘡治之

蛇床 硫 栢黃丹

各一雄

大風子 肉椒 各五 枯凡 二兩 輕 二兩 牛皮岸 薰牛皮烟

○林

如聖散 治肺截風毒血氣凝滯瘡疥癢痒 蛇床 五

連

七 胡粉 一兩 水銀 二兩 半 同 胡粉 右為末香油調和稀滑

先鹽將水洗後塗之乾更換

玄精散

治疥瘡 硫 椒 枯凡 玄精石 等分 無鹽代

浴散

治濕身瘡疥 硫 椒 枯凡 玄精 雄

輕

許 早起飽食乾物勿飲湯先防風通聖散一貼入白

蜜二錢

送下神芎丸 方見頭 五七十九入浴室內令汁出批

破瘡搽藥

再煎再搽

一方 苦參

蛇床 白礬 末 荆 等 右 吹 咀 煎 湯 濕 洗

一方 朴硝

三 硫 一 枯 礬 五 右 為 末 油 調 臨 卧 敷

治疥癬

松膠香 輕粉 研 勻 先 用 油 塗 疥 上 了 擦 末

又 竹葉燒末

雞子白 和 塗 不 過 三 四 次 癢

又 用柳絮葉

煮汁洗 立 愈

治遍身風痒瘡疥

茵陳 煮 濃 汁 洗 差 羊 蹄 根 搗 絞 汁 用 膩 粉 少 許 如 膏 傳

治癬瘡久不瘥

如乾猪脂調傳

瘡乳方

彙聚單方
二日馬齒莧
根葉共搗
良

癬初生或始痛痒以姜黃末傳之妙

又初生或始痛痒嚼鹽塗之妙

濕癬白禿 馬齒莧膏塗之若燒灰傳之良

治瘡癬用米醋熬嫩皂角針濃煎汁傳之

又苦練根醋磨塗疥 又梨蘆末生油調敷

又羊蹄根和猪脂塗或著鹽少許

治婦人風瘙癢疹身痒不止 蒼耳 花葉子 等為末豆淋

酒調服二錢七

集驗 ○治乾濕膿窠疥癬等証 煇 蛇床 各一兩 蝟 半 倭硫黃

一兩 右化開硫黃入荆末 數沸候冷加輕粉 冷再破末

加三柰 右為末先將小油滾過候冷調上藥擦瘡

入寶散 治風癩松皮頑癩久不瘥者 藿 破故 煇

腹 則擦之 輕 硫 枯凡 右為末油調擦日三五次瘥

祛風白芷散 治面上風癬 芷 冬 苓 半 黃丹 連 栢 各

糸 輕 右為末油調擦

治諸癬 半夏 兩 搗末陳將薑汁調和摩塗瘡上日二三度

一△癩風 十八

○追風丹 治癩風 何首烏 木 荆 苦參 等為末和皂

角膏丸如梧子大每服五十九空心酒下忌動風物

治紫白癩風 硫 輕 杏 等為末姜汁調擦

又 硫 一兩醋海螵 一為末浴後生薑蘸擦數度絕根

又 硫黃末醋調以茄蒂蘸擦患處或加附子姜汁調

一△諸瘡 十九

○夫諸瘡者謂諸般瘡也凡人躰虛感風濕之氣發瘡瘍
 痒痛燉腫身熱多汗是為惡瘡或生於手足間相對如新菜
 莢痒痛搔破則黃水淋漓在乳如癩又面生虫是為癩瘡或
 初生如飯粒漸大而根頭破血流膿出肉反如花開之狀
 是為翻花瘡或初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛延及遍
 身名曰浸淫瘡或生於兩耳鼻面爛及下部諸處敷浸入筋
 絡月中則瘡盛月未則瘡衰是為月蝕瘡或毒氣攻手
 足指弩肉裡上指甲疼痛出血瘡中有虫是為甲蝨瘡或
 指頭先腫燉制手痛然後於爪申邊結膿甚者爪申俱脫
 是為代指盛暑之時腠理易開風熱搏皮膚輕者如
 撒粟重者熱汗浸漬成瘡是為癩瘡或心神煩燥遍身
 發瘡赤爛如火名曰熱瘡或觸風寒血淚不行其瘡頑滯

不知痛痒經久難瘥名曰冷瘡或身發瘡腫非癩非
 疽非疥狀如惡瘡或瘥或劇名曰無名瘡或頭生白團
 斑剥如癬者有白皮久則成痂遂致滿頭瘡中有乳有
 膿細出入裏不痛微痒少長不瘥名曰疣瘡或冬月
 因寒手足皸裂成瘡名曰凍瘡

連翹飲

治惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血風赤斑圓點

開爛成瘡痒痛流黃汁 翹 飯 括 生地 赤芍

荆 芩 門 瞿 通 牛 炒 梔 風 芎 甘 等 入 灯 心

二十莖

○廉 活魂丹 治一切惡瘡 血竭 乳 沒 銅綠 枯凡

穿 煨 黃丹 各 蟾 酥 分 麝 許 右 為 末 用 蝸 牛 搗 膏 丸

如 菜 豆 大 每 服 一 丸 用 葱 白 一 寸 嚼 爛 裹 藥 熱 酒 送 下

林內固清心散 治惡瘡熱盛燉痛煩渴 辰 雄 朴硝

苓 參 白朮 菘豆 甘 腦 麝 皂 右等分為末

每服一錢蜜湯調下

黃連獨活散 治一切惡瘡初發腫甚者三四服消散方見

五香連翹湯 治一切惡瘡方見右

涼血飲 心肺有熱或作寒熱口乾身痛面赤先服敗毒散

後用此 瞿 遲 荆 苛 芷 天花 甘 芍 生地

門 槐 車 翹等 右入竹葉灯心新生地黃廬加飯菴

平血飲 治遍身生瘡膿血瞽腫極痛且痒 敗毒散加

葛 芍 升 甘 天麻 蟬蛻 苛 生地 門入姜棗

萬金散 治腫毒惡瘡 大分芷 六為末酒調三錢服茶調

治無辜瘡毒 連 栢為末芭蕉根汁調敷留口搽或加

輕粉 有汁加黃丹 燒麝和勻乾搽

越桃散 洗諸瘡毒方見右

治遍身熱毒瘡痛而不痒手足尤甚粘著者夜被不得卧

菖蒲末 多用布於席上恣卧其間五七日效

合掌散 治遍身生瘡百藥不效 煨 五入个 硫 生者 五 膩 半

右和勻每用二錢安手心內香油調夜卧時塗外膏不可

洗手但揩擦令乾一二日愈

竹茹膏 治黃疱熱瘡 香油二 青木香 五 杏 十 四 粒 青竹茹

塊 右慢火熬杏仁色黃去粗入松香末五錢熬膏塗瘡效

手掌心生瘡 牡蛎灰泡湯浸洗至湯冷止不三二次便可

脚上瘡 鹿角燒存性為末入輕粉香油調敷

濕脚氣生瘡 平胃散末乾搽之 又葱椒湯洗可

又五積散酒煎服 脚指縫瘡爛濕 枯凡二 黃丹半 右末搽之

集驗 ○治伐指手指甲頭腫 烏梅仁 槌去殼 右研細米醋調稀

入指浸之自然愈

○林 甲疽瘡及諸瘡奴肉 烏梅搗細和蜜捻成餅子如錢厚

貼之 又用硫黃末薄敷便消縮

又膽凡燒乳香等為末傳之肉消愈

又瘡腫毒 桑葉末水調敷

治凍爛脚成瘡 生附子 去皮為末麩水調貼

又治凍瘡 茄根濃煎湯洗以雀腦髓塗之

又黃蘗燒存性雞子清調傳

治凍耳成瘡痒痛 黃栢 白欬各五為末先湯洗次用香

油調傳

治火丹毒遍身赤腫痛 寒水 膏 各三 栢 甘 各一 為末

芭蕉汁調敷 又百合根研爛傳

○傳 治一切惡瘡 姜蚕 蟬等 為末油調付亦拔疔効

又經霜芭蕉葉為末油調付先用忍冬藤 葱 蒼耳 椒

煎湯洗搥乾付外以油紙掩之

又用黃丹入香油煎入朴硝抹之

手痂瘡 用皂 枯凡 輕連 栢為末付之

桃花散 治一切瘡生肌 艾 欬 栢 連 乳 麝

黃丹 右等分為末搽之二三日生肌

集驗 ○葵花散 治一切瘡 葵花 鬱金 連 栢 梔

右等分為末水調貼瘡痛處

七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不巳 芪 飯 風 荆

地骨 通 各二 白礬 一 右水煎去粗稍熱淋潔患處拭乾

避風少時 苦練散 治浸淫瘡 練根 晒乾燒 為末猪脂調敷濕則乾

先用苦參大腹皮煎湯洗 治惡瘡連痂痒痛 搗蒴芫田封痂落即瘥

治一切瘡肉出 烏梅 燒灰存 惡肉立盡極妙

輕粉散 治種瘡 蚕退 燒灰存 輕 乳 各少 右為末先以

温將水洗淨乾 又 爐甘石煨醋淬為末油調塗

治癩匿虫無問去處皆治之 蝦蟇燒灰存性為末醋調敷

治月蝕耳瘡 韭地 虫 蝦蟇 燒灰存性為末猪脂調傳清油亦可

胡粉散 治月蝕瘡 胡粉 炒 枯凡 黃丹 煨連 輕 各一

胭脂 麝 許 右為末温將水入塩洗淨拭乾傳之乾者油

調敷 治瘡生耳鼻口間痒時發 枯凡 蛇床 各一 連 五 右為末

摻之蜜水調塗亦可 治月蝕耳瘡並諸瘡生肌肉欬瘡口

沒 乳 枯凡 黃丹 煨 白欽 栢 各一 白膠香 麝 各二

右為末葱白煎湯洗 淨挹乾摻之

一方 胡粉 東壁土為末摻 一 乳癰 二十

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

○林 乳癰 證有兒者名外吹妳有孕者名内吹妳

集驗 ○初起則用發散流氣之藥已成膿宜內托排膿養血順

氣慎勿妄用針力

○傳丹溪曰乳棟多因乳母不知調養所致蓋乳房陽明所經

乳頭厥陰所屬忿所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之

氣不行故竅閉而津不通陽明之血沸騰故熱甚而化為

膿或因所乳之子膈有滯痰舍乳而睡口氣煥然所吹成結

核初便忍疼揉令核軟吃令汁透可散否則結成矣

治法以青皮厥陰之滯 石膏清陽明之熱 生甘草節行

汚濁之血 瓜蒌子清腫毒或加沒藥 青橘葉 皂角刺

金銀花 當飯身或湯或散以少酒佐之

又於痛處灸之二三壯尤妙粗土使用針力必成拙病

妳岩始有核腫結如魚鱗其骨大不痛不痒五七年方成瘡初

便宜多服疎生氣行血之藥見清思如意則可愈未破者尚

可治成瘡者不可治

集驗 ○外麻托裏湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下及乳癰

初起 外 葛 翹 飯身 栢 各二 芪 三 桂 五 甘 多 牛 各

右水一盞酒半盞煎至一盞食後熱服

連翹飲子 治乳癰 翹 芎 萎 皂刺 橘葉 桃 青

甘節 各二 右 玉 未破者加柴 已破者加參 芪 飯 白芍

百齒霜圓 治吹乳結核腫痛及乳癰 百齒霜 上 頭垢

右為圓如雞頭子大黃丹為衣每服一圓好酒送下

如不飲酒白湯下不可化開亦不可令病人知極有效

一方 治乳癰 人牙齒 燒存 為末 酥調塗

生甘 飯各半 沒二各 乳一各 右用無灰酒沙啞慢火熬食後服之

究原五物湯 癰疽發背乳癰通用 萎一枚 皂刺半燒

沒各半 乳各二 右酒煎服 木 茴 青 穿 酥

○復元通氣散 治乳癰結核不散 陳 芷 甘 各等 貝 美製衣 加漏蘆 右水煎或酒調亦可

陳 芷 甘 各等 貝 美製衣 加漏蘆 右水煎或酒調亦可

又方 青 陳 翹 金銀花 各一 穿 各三 甘 一兩 生熟

右為末熱酒調服一錢

橘皮湯 治乳癰初發即散已潰即効因小兒吹妳者並治

陳皮 湯浸去白晒乾 右為末麝少許每服二錢酒調服

一方 紫蘇一味濃煎湯頻服及用葉盒蓋乳房

一方 治吹妳 東家去核入罈炙七粒煨存性研末入麝少

許溫酒調服 又點角 煨合粉和執滴一盞服以手揉散

治乳頭裂 秋後冷露加列衣開者 乾燒存性為末水調敷

甚驗 治乳赤腫欲成癰者 南星末姜汁調塗初發之時効

○橘葉散 治婦人百不如意久積患鬱射乳房有核

青 膏 煨 甘 節 沒 蒲公英 各半 菜 一 飯 頭 半 皂 刺 一 各

尖 畧 炒 金 銀 花 分 三 右 作 一 服 加 青 橘 葉 一 小 握 酒 煎 食 後 卽

時服 丁香散 治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香 一味為末乾付列衣處燥則唾津調付

治乳癰 蒲公英 忍草藤入少酒煎服即欲睡是甚効也

十六味流氣飲 治妳岩 方見右

單煮青皮湯

治婦人憂鬱乳房有核 青水一盞半

煎至一盞日二服已上二方間服至核消住藥

一△楊梅瘡 廿一 一名天庖瘡 一名翻花瘡 一名綿花瘡

○楊梅瘡近年以來極多庸醫務速效以輕粉丹麝香等

毒劑幸而氣血實成血者得愈怯弱之人變生壞証不知戒

守變成癘風又輕粉多用兼以麝香香透入骨節遂成風

塊經年痛痺膿爛輕粉但量入虛實用之可也

○疑素無天庖楊梅綿花等瘡故無治法丹溪於通聖中加減

量入厚薄治得効雖遲十無一壞

○傳丁方治翻花瘡 芎 天花 各五 輕 二 水 雄 辰 各一 水 麝 各二分 半

五分右為末蒸餅丸如菘豆大每服八丸溫酒下日三服

○惠一方 飯 芍 胡麻 牛 蔓 狗 並炒紫色 白 疾

苦參 括風 卷 何首 芷 蚕炒 荆 翹 芥 槐

玄參 皂刺 甘 芙蓉葉 歲 各一 右為末米糊丸如梧

子大每服七十九茶下煎服亦可 實熱瘡盛者入輕粉二錢

○疑薰藥 汞 輕 雄 鉛錫各一 水 鱉 五 麝 三 右將汞鉛

化開共為末以紙摻入如筒燃之令患人飲食以壯其胃然

後令年坐薰瘡以綿被圍之勿令藥烟風泄出汗其患即

効射虛氣弱不宜薰恐發腫 茯苓湯 治楊梅瘡 土苓 搗碎 桔 風 各一 乳 沒 各五

右剉水五碗煎至三碗溫服下日服盡忌茶水諸物五貼全

除忌鐵器

茯苓糕 土茯苓去皮為末 白蜜 糯米粉 三味和勻

蒸糕食常以茯苓煎湯當吃不可吞茶水

一 癩風 二十二 與癩通

傳經曰風之傷人也或為寒或為熱或為寒中或為寒中或為癩風又曰癩者因榮衛熱府肉其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘡瘍潰風寒容於脉而不去名曰癩風

丹溪曰是受天地間殺物之風故也在上血受之則在下皆不外陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看其疔瘡與瘡上躰先見者多者在上也下躰先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三稜針於赤白二出血委中二穴在曲脚內兩筋合面解舒提兩脚取血也

近見粗工用藥法以丸風子油珠不知此藥性熱有燥痰之功而傷血有病將愈而先失明者

木風有五黑色不治餘皆可治重食肝眉落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或痺或痛食身則皮如虫行

○林 凡癩風肌肉麻木瘡癬疔瘡膿汁淋漓眉髮墮落手足指脫頑痺痛痒白皮脫落鼻梁塌倒眼爛齒豁色枯唇揭病証之惡無越乎此負此病者百無一生切戒房室公私無務一切口味悉宜屏置治法先服糠皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡愈後又灸三灸之後服二聖散泄熱去血中之風時更以升麻湯送下瀉青丸倘年深日久則以愈風丹換肌散方治之

樺皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癩疹瘙癢搔之成瘡或

面上風刺 樺皮四兩荆穗 杏各二枳四兩去穢性穢性甘草多半

右杏去皮尖用永一碗熬候冰減半取出乾研外都為末入

杏每服二錢食後溫酒調下

醉仙散 治大風疾遍身癩疹瘙癢麻木 胡麻 牛 狗

蔓各一兩白蔞 苦參 括風各半右為末每十五錢末

入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五

七日先於子縫內出臭黃涎渾身疼痛昏悶如醉次後利下

膿血惡臭病根乃去 二聖散 皂角刺三竹炭火為末每服二錢大黃煎湯調服

河間治法早服樺皮散午前升麻湯下瀉青丸晚服二聖

散此數藥皆自是經劑疎泄脈中之風熱也

升麻湯 治諸風熱瘧痢肉極熱身上如鼠走口反縱皮色變

升三神 參 風 犀 鎊 鈴 鎊 卷各一桂兩半右為末每服

四錢入生薑三片竹歷少許煎服

瀉青丸 方見小兒驚風

通天再造散 治大風惡疾 鬱金一兩大 煨 皂刺炮各一兩

白丑炒六右為末每服五錢日未出面東以無灰酒調服盡

量為度至晚心利黑頭小虫或如魚腸臭惡物忌食 塩醬醋

諸般魚肉椒料果實煨燒炙燻等止可食稠粥軟飯及煮

熟時菜亦須淡食茄亦不可食惟諸般蛇以淡酒蒸熟食

之可以助藥須戒房室勞力及終身不可食牛馬大肉等

大風丸治疥癩 大風子一兩蝎 芎各一蟬 蚕各二歸 獨右為末用

米飯丸如桐子大每服五十九茶清下

一方 治癩風年深鼻塌眼爛遍身紅烏藥百兩沈五十

參兩甘兩半右用大風油化開和藥麩糊丸如桐子大每服

五十九茶清下

○加減通聖散先服此大瀉惡物穢積又用三稜針看肉黑

處及委中紫脉刺出死血不可令出太過後服神仙紫花丸

芎風 荆穗 桔 枳炒膏 柴連 羌各五 翹 白芍

飯酒 麻去根第色夫 木殼 甘 滑 芩去 朽栢各三 芎二 生地熟地

並酒浸各 錦大黃兩 芒一兩 皂刺去尖兩右分八服用水一碗半

煎至一碗空心服日二服五六日後又進二服待補養完

又行二次然後服後丸藥

神仙紫花丸 治癩風及諸般惡瘡風瘡如神

白花蛇許連皮骨用二兩半 荆穗 藏各四 麻連

節二 胡麻子一蛇床二右各細切用無灰酒一大碗浸一宿

濾出晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度晒乾為末別包

木 沈各三 參一飯七 天麻 牙皂 各五 麝一各半鼻塞

乳 沒各一 雄 辰各五分木 薏一 枚 定風草二各半

麻草益還瞳子明一兩右麝至辰砂五味各別研不見火

餘味亦別研連前五味和勻別包 羌 風 甘 細

芎 獨 蒼 米泔浸 杷去筋毛 白芍 芷 白蒺 金銀花

五加 苦參各五 胡麻子 白附米泔炒 麻黃 膝 草烏米

浸川烏米泔炒各二右為末別包揔合用大風子三斤

磁罐盛之少入無灰酒以皮紙重重包口勿泄氣文武火蒸

候黑爛為度杵無渣滓成油分作三分每二分入第一碗

候黑爛為度杵無渣滓成油分作三分每二分入第一碗

藥八錢重第十號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻
加糯米飯搗極膠粘如桐子大晒乾勿見火每服二十九漸
加至五六十九鷄鳴午時臨卧各一服茶清下 忌房勞鹹

酸糟淹猪羊雞馬肉魚腥煎燂水果

五辛姜椒大料辛辣熱物蕎麥菘豆之類

一方荆穗柅大鬱金地仲風卷獨白蔴

等為末以大風子油入熟蜜丸如桐子大每服四五十九茶

清送下日三服日誦觀音千萬聲身以攝其心林示其意

浴浸法桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯太缸浸坐沒

頸一日俟湯如油安矣

○治惡疾遍身生瘡濃煎萍湯浴浸半日大効

葛蒲蒼耳何首烏簡葉右八件葉晒乾等分燒存

性為末如面藥洗身上

一法桑柴灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大黑豆 菘豆

漿添湯三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸膠乾 白膠

香等分為末炒蜜丸如桐子大每服五七十丸溫水下

○傳一方蒼耳葉為苦參為更以酒煮烏魯魚代補蛇之或缺

研細糊丸如梧桐子大每服五六十九加至七八十九熱茶

清送下月三服一二月而安若入紫萍尤捷紫萍多水蛭須

寒月於山沼取之淨洗去泥畧蒸透乾用

救急門

○林破棺散治癩癧卒死及為墻壁竹木所壓溺水金瘡卒致

閉絕產婦惡血冲心諸暴絕証 半夏 湯泡七次去滑 或

救急

以皂角末吹入亦可

雄朱散 治到又無人居睡中為鬼物所魘但吃吃作聲便令

吽喚如不醒可用 牛黃 雄黃 各一 硃砂 右為末每用一

錢床下燒一錢酒調灌之

凡魘者不可用灯照亦不得近前急喚但痛咬其足跟並大拇

指甲邊

下方竈心土為末每服二錢新汲水調下

又 雄黃末一錢桃葉湯調下

又 魘死 灸兩足太按指聚毛中三五壯

又 魘死及一切卒死 灸人中穴三五壯又灸臍中百壯

○ 救自縊自且至暮雖已冷可治心下微溫者雖一日已上可

治急抱使繩寬解不可割斷撚正喉嚨放卧用被蓋急用

竹管吹其兩耳一人急牽其髮不放手就脚踏其兩肩

一人摩其胸及屈伸其手足摩持之如活即以粥飲與之

一方 治自縊死以藍汁灌之 又刺雞冠血滴入口中男

用雌 女用雄仍塗喉下

○ 救溺水法 凡人溺水者急上岸即將牛一雙却令溺水之

人將肚橫覆在背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹

中之水如醒即以蘇合香丸之類或老姜擦牙或橫腹於圓

木上亦可仍取壁土一堵置地上以死者仰卧其上更以

壁土覆之上露口目自然水氣翕入土中仍急用竹管各

於口耳鼻膈鼻門內更迭吹之令上下氣相通

又用半夏末少許搗其鼻如畧活用粥飲灌之

又急解去衣帶艾灸臍中即活矣

○惠一法 皂角為末葱白汁和九棗核棧內下部中其水自出効

凍死 四肢直口噤只有微氣 用太釜炒灰令煖以袋盛熨

心上冷即易之目開氣出以清粥少步進之若不先溫其心

便將火炙則冷氣與火爭必死

凡冬月凍倒扶在煖處不得便與熱湯及向火炙雪中行凍便

迎火脚指墮者洗

一方 治凍死 生姜 研陳去右各一兩水煎溫服

○袖 伏暑不可使冷之即死用溫湯熨心腹間如途中則用路

上熱土放臍腹間令人尿其中

○墜墜瘀血沖心氣絕不能言取藥不能及急辟開口以熱小便灌之 治法詳于損傷門

○急喉閉腫痛手足厥冷即時氣閉不通用皂角二三度擲水

盡灌下立愈 治法詳于損傷門

○金 毒蛇救急人急握地坑埋瘡處堅築其上毒入土中痛止

蛇入穴敷用刀割尾挾辛辣物用絲縛定自出不可按

中蛇毒勿渡水渡水則痛甚也 治法詳于損傷門

○林 凡臘月收雄狐膽如有人卒暴亡未移者溫水微研灌入喉

即活常須預備救人移時即活如無膽宜用雄狐屎燒之碎

惡在木石上者是

醫法明鑑卷之四終

日
金
田

