

明鑑

✕
1-128

F 2
1-124



富士川文庫

1309

490.9

Ih-9

2

No. 22-92

IE 18/29

△五方香

一沈香 五方

一白檀香 四方

一甘松香 二方

一丁香 五方

一薑陸香 五方

右五種末入

△懷中香

一槌腦

一丁子香

一甘松

醫法明鑑卷第二目錄

虛損 一 勞瘵 二

眩暈 三

自汗 四 水腫 五

脹滿 六

積聚 七 嘔吐 八 附吞酸

噎膈 九 附反胃

秘結 十

淋病 十一 附轉胞胞痺

溺濁 十二 附遺尿

遺精 十三 怔忡驚悸 十四 附健忘

癩癩 十五 中惡 十六 附鬼擊尸厥

頭痛 十七 心痛 十八

腹痛 十九

腰痛 二十 腸痛 二十一

脚氣 二十二

黃疸 廿三 消渴 廿四

諸症 廿五

衄血 廿六 吐血 廿七

痰血 廿八 咳血 廿九

下血 卅 溺血 卅一

脫肛 卅二

疝氣 卅三 飢逆 卅四

○九仙王道糕 常用養精神扶元氣健脾胃進飲食補虛損生肌肉除濕熱

白糖二兩 柿霜一兩 蓮肉 薏苡

白朮 山藥 各四兩 白扁豆

芡實 各二兩

右為細末入粳米粉五升蒸糕晒乾不拘取任意食之未湯下

醫法明鑑卷第二
虛損門一
虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脉虛少不能榮于臟腑婦人則月水不通三損損于胃飲食不為肌膚治宜以辛甘淡過於胃則不可治感熱則損陰陰虛則陽盛損自下而上一損損于腎骨疼不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅治宜酸鹹過於脾則不可治

醫法明鑑卷第二

虛損門一

傳

○虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脉虛少不能榮于臟腑婦人則月水不通三損損于胃飲食不為肌膚治宜以辛甘淡過於胃則不可治感熱則損陰陰虛則陽盛損自下而上一損損于腎骨疼不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅治宜酸鹹過於脾則不可治

○著飲食勞倦內傷元氣真陽下陷内生虛熱用補中益氣參芪甘溫之類補氣提其下陷此用氣藥以補氣之不

足也

○勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣勝而變為火耳補氣壯用四物知栢甘寒苦寒去人自降此

用血藥以補血之不

○四君子湯

治氣虛林補益脾胃進

美飲食參半錢苓木各二廿个

右如自汗或小便利者去苓加芪

○四物湯

治血虛飯熟地各二

芎芍各半右春倍芎夏倍芍秋倍

地冬倍飯

○八物湯

治氣血兩虛四君四物為

一劑

○六君子湯

治氣虛挾痰陳苓

參苓一朮半各一廿半右姜棗

○十全大補湯

治氣血俱虛而挾寒

暑八物加芪桂各等分人姜棗

○大補陰丸

降陰火補腎水栢酒

拌炒知去皮酒拌熟地酒洗板煎

黃各右細末猪脊髓和煉蜜丸如梧

桐子大每服五丸空心姜塩湯下

○補腎丸

栢板仲姜汁拌膝

陳各二五味兩一姜五冬加右為末姜汁

糊或酒糊丸温酒或白湯空心下

○六味地黄丸

治腎經虛損憔悴盜

汗發熱痿弱下血咯血等防見淋病

○千金延壽丹

治諸虛怯弱欲成勞

瘵及大病後虛損不復元人中年後

常服可却疾延未藥天

研膝中藥天

門麥門生地熟地略一菴二

參白苓苧苧沢地骨鹿茸

花椒 菖菴 節巴戟 法遠 拘 覆盆
栝子 各五 石勿 犯 鉄器 爲末 煉蜜 丸如
桐子 大每服 五十丸 或姜鹽湯下
如精滑或夢遺如

○斑龍丸 治真陰虛損及老人虛人
常服延年益壽 鹿角膠 鹿角
霜 兔絲 酒浸 栝子 取熟地 各半

白苓 補骨 各四 右爲末 酒煮 米糊
丸或以鹿角膠入好酒泮化丸如桐
子大每服五十九丸空心姜鹽湯下

○益胃升陽湯 血脫益氣古聖人之
法也先補胃氣以助生發之氣

柴 升 各二 炙 苒 飯身 酒陳 各五
參 久嗽 曲 各七 苒 行 木 半
生 苓 右 如 腹 中 痛 加 白 芍 桂 各
如 渴 或 口 燥 加 葛 根 各

○茯神湯 治六脈虛軟咳則心痛嘔
中介或腫或痛 神 參 遠

通草 門 苒 桔 各六 苒 五味
各三 右入姜

○祖傳秘方 治心虛手振 飯身

其 生 地 各 半 苒 參 各 一 遠 法 心
半 酸 栝 子 各 三 辰 半 星 絡 五
麝 行 琥 神 行 欲 金 鉞 二十 右 爲
末 蒸 餅 丸 如 菘 豆 大 辰 砂 爲 衣 每 服
七八十九津唾嚥下或姜湯下

○炙甘草湯 治虛勞不足汗出而悶
脈結悸行動如常

生 姜 各 一 門 合 苒 行 絡 一
生 地 各 半 門 合 苒 行 絡 一

○干味人參散 治虛熱潮熱身躰倦

息柴 甘 參 苓 木 半

麥 飯 白芍 葛 路等 右入姜

○平四味建中湯 瘦弱短氣嗜睡 不足形躄

門 芪 甘 炙 從 參 芍 桂

半 苓 熟地 烙五 附右入姜棗

○慧 治虛勞潮熱 木 陳 飯 芍

熟地 芍 桔 門 甘 梔 右

水煎○心神恍惚加神遠○咳嗽加

酸棗五味○久嗽不且知母○痰多

加萎貝○嗽而瀉加訶罌天花○自

汗加芪炒浮麥○虛甚無力加山破

拘○肥白加參黑瘦不宜○潮熱不

宜柴胡 治男婦氣虛無汗潮

熱 或邪熱客經絡肌熱痰嗽頭

目眩胸膈五心煩燥盜汗婦骨蒸

參 木 苓 飯 赤芍 半 葛

柴 各等 并減半 右入姜服

○扶神補心湯 治男婦血虛無汗潮

熱咳嗽面無顏色 苓 參 地

芍 芍 飯 陳 枳 桔 前

○辰砂妙香散 治男婦心氣不足精

神恍惚虛煩少睡 方見遺精門

○新增黃芪益損湯 治諸虛勞倦客

熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減

食多渴咳血不止 熟地

其 炙 酒 芍 熟地

桑 女 知 地 驚 醋

參 苓 苑 桔 柴 天 門 斛

生地 枳 蒞 炒 麥 門 各等 每服兩

半夏三棗散

○黃芪益精湯

治男女怯弱潮熱婦

人胎前產後反胃

斛法根 飯酒 熟地

其祿五木仁白芍 右每服七

○八味丸

治腎氣虛之下元冷憊臍

○杜中丸

補心腎益氣血暖元臟縮

小便 蓮四兩龍骨土各半瓦上三火

時益 破 苜炒膠酒浸 神 桃

各一兩 右為細末用乾山藥四兩煮

○三才封髓丹

降心火益腎水

天門心 熟地 參各一栢六 縮

○人參養榮湯

治積勞虛損肌肉消

瘦短氣倦怠不食 白芍三飯 陳

眩莖雞桂 參 木根甘各各遠心

兩半 熟地 味 苓各七右入姜棗

○仙傳草還丹

治虛勞添精髓常服

神清氣爽延年 破 熟地酒遠法

地骨 膠酒各等 右為末酒糊丸

○人參養榮丸

治男婦諸虛不足

參 木 白苓 飯 生地 陳各

兩宿 莎妙胡連 其各右酒

丸如桐子大每 湯或酒塩湯

○固真丹

治男婦諸虛不足

冷膈腹痛痛 參

栝子各山半兩和酥

牡蠣山菜肉酥女兩

四兩右為末和地黃膏入煉蜜刀空

心淡塩湯下○鹽

龜板酥炙一兩半

○復春丹 明目治癱瘓兼療一切

風參生地熟地苓半各

兩遠心藤酒仲炒去飯酒蒼九節

苜苢菊莖龍骨各一兩薛酒

天麻菴益各五石酒糊丸温酒

或塩湯下

○樂令建中湯 治一切寒厥拘急疔

疾黃芪建中湯加細陳酥

飯酒苓門半前各等

○黃芪干補湯 補虛勞養血氣莖

饘飯酒浸熟地神酪半白芍

參朮酸微陳半玄桂

烏藜甘炙門酪一木沉各一

右入姜棗

○栝子仁湯 治肝虛寒脇滿筋急腰

膝無力小腹脹面青口燥栝子

羌白芍風神飯酒芍附炮

一分細桂其炙各右入姜

○加味沉珠丹 治氣血不寧虛弱乏

力心神悶亂辰朮炒參各二神

烏藜沉木没星酪一飯

莖瑰麝酪二一方加酸遠酪各二

一方加乳山龍酪各二右為末建

蜜丸食後茶酒

○秘傳固本丸 治諸虛生精血補五

藏進飲食參生地熟地

枸兔酒浸二石

味從酒浸

膠酒仲

通 芪

采衛寧心志

姜各半

蓮兩

右加姜棗

○驚田地黃湯

悸婦人血室乾

驚酥

木 苓

右入姜烏服

○柴胡散

乾煩燥

柴 芪

赤苓

木

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

熟地

地骨

枳

桔

桑

赤芍

熟地

地骨

味從酒浸

膠酒仲

通 芪

采衛寧心志

姜各半

蓮兩

右加姜棗

○驚田地黃湯

悸婦人血室乾

驚酥

木 苓

右入姜烏服

○柴胡散

乾煩燥

柴 芪

赤苓

木

參

地骨

枳

桔

桑

赤芍

熟地

地骨

枳

桔

桑

赤芍

熟地

地骨

與鬼交婦人則月水閉日漸疴癯漸成勞極之候日久至發熱不伏形骸瘦其真氣已脫雖倉扁復生莫能救其萬一

○熱毒鬱積之久則生異物惡虫食蔬在精華變生諸般奇狀治之決一則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復其真元

○其侍奉親密之人或同氣連枝之屬薰陶日久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍

○丹溪曰此陰虛之極痰與血病多有虫者其傳屍一證不可云無大法四物湯加童便竹瀝姜汁

○身瘦屬火因火燒燥也肉脫甚者難治

○氣血虛其發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之

○骨蒸藥 知 栢 錄 門 朮

幣 青蒿 膏 竹葉 烏梅之類

○傳屍勞寒熱久嗽咯血羸瘦先以三拗湯方見咳嗽門次以蓮心散

○二十四味蓮心散 飯 苾 苳 苳

驚 酥 前 柴 獨 卷 風 已

苓 陳 半 苓 膠 珠 桂 芍

麻 根 不 祛 杏 蓮 肉 此 味 當 用 芫 花 醋 炒 黑 右 作 一 服 加 姜 三 片 棗 一 枚 水 二 盞 煎 至 一 盞 夫 相 溫 服 須 待 吐 有 異 物 芫 花 漸 減 蓋 草 所 以 殺 虫 炒 之 所 以 斷 其 去 其 妙 處 在 此

○麝香散 治男婦骨蒸發熱五勞七傷

傷等証 天灵蓋 麝各半柴一

犀屑 附片 三東引 桃枝 東引如和

東引 檉枝 青高路 一握 研 不 雜 白

葱白 格七 右為末 重一升

一宿明白 早煎至一升半 去粗分作

三服 每服入 枳末三錢 溫服 五更初

進一服 約 行 五七里 再進一服 若

惡心 欲吐 嚼白梅止之 三服後 瀉 散

惡物 異虫 或身如 蠶行 不可名狀 後

用葱粥止之 忌風 一月及 忌食油膩

濕麩 鹹酸 併牛羊雞猪犬肉魚腥 年

遠重病 不過二服 全安 男病 女煎 女

病男前 取虫 後須 大補 扶神 散補之

凡此藥 忌猪犬雞 僧尼孕婦 孝子 見之

取屍虫 神仙秘方

青桑枝

柳枝

梅枝 桃枝 柘榴枝 格七 皆東引者

青蒿 屋葱白 魏研 安息 研

右除 魏安 餘藥 用童便 一升半 煮去

一半 去粗 將藥汁 魏安 細研 再煎十

數沸 分作二服 調辰末 枳末 格五 麝

砂 許 右三味 亦分作二服 入前湯 五

更初 進一服 二點時 又進一服 至已

午晚 必取下 虫 其嘴 紅者可治 青黑

者不治 但可絕後人之傳 注耳 取虫

後進 軟粥 溫和 忌食 生冷 毒物 凡食

此藥 不可冷 患者 先知 氣味 亦不得

令 猫犬 孕婦 孝子 僧尼 等不祥 人見

神授散

傳尸 氣夫

氣未盡 脫者 用之 川椒 開口者 與

米湯下 或用酒 米細 煎

服二三丸漸加至各二葉一
酒或米湯下患治一婦人用花枝二
分苦棟一分丸服屍虫盡從大便泄
出

○補天丸

紫河車

即胞衣也男用及胎者為胎若不可得無病婦人者皆可初取長流水洗淨去胎膜以篋盛之外以宿糊使不泄氣焙乾要用時米醋浸令宿焙乾用

右以補腎丸藥檢門方見虛同河車取酒糊丸或新取紫河車蒸熟同藥末

搗為丸亦可

○虛勞者以骨蒸藥佐之

一二云氣虛加補氣藥血虛加補血藥

○柴河車丹

治飛屍鬼注虛勞羸瘦

痰喘等証

胎衣以皂角水洗淨以米酥洗一云宿乾篋盛之以帛糊之不令泄氣

烈火焙乾加入後藥 參半 兩木

神飯 熟地略 木白苓 各半

乳 沒各 研辰研 麝分 右為末酒

糊丸如梧子大每服五十丸煎入參

湯送下日二服煉蜜丸亦可

○林奪命散

治傳尸勞

桃二十斤 皮尖 麩法

其 參各半 驚酥 知 蓋醋 宿炙

兩柴 高各一 魏四 葱白 樹

右蓋煎 為末次下參知柴其又同搗

次下葱蒿挑魏杆成篩子慢火煎

為末秤一錢用童便煎 至一盞

去粗露星 一宿至五更服 半盞

服衣 被蓋卧 天明暖 半行

病人服之強行五七步三日更不得

洗手面指頭候生毛為驗每早 辰

先喫白湯投之

○桃仁散

著骨蒸及月水不行瘦勞服熱桃
一兩去皮尖疑炒赤苓兩分參絡一棋四

陳去首不半犀安息絡二麝石加
姜煎早晚食前服若取下虫便宜服

補心劑末取下虫亦先服之

○青蒿飲 治勞疾高赤根及子
陰乾桃枝三兩柳枝三兩柴一甘一

兩地骨兩二梳一兩量右加烏梅煎
○茯神散 以麝香散取下虫之後宜

服此補五藏白苓神參遠
龍骨桂二甘一陳酪一飯一五味

各一苾二大棗五右入生姜
二錢

○秦升鱉甲散 治骨蒸壯熱肌肉消
瘦辰紅頰赤因倦盜汗地骨柴

各二分芎知一飯酒浸各一鱉酥

三分右入烏梅各一

○一方 治男婦骨蒸勞瘵憎寒壯熱
蒿春夏用葉秋冬用子木地骨

鱉酥白苓甘柴一桑一鱉一枯
絡五右入姜

○續斷散 治骨蒸熱勞傳尸潮熱喘
嗽盜汗及咳唾膿血續芫一桔

茹味各一分生地一桑一鱉一甘一
分小豆四右分一貼每貼入小麥五

十粒

○人參黃芪散 治虛勞客熱肌肉消
瘦五心煩熱口燥吐頰赤盜

汗胸膈不利咳唾膿血參苓為
芎一苓一各一分知柴一桑一鱉一
酥一各一分生地一各一分桑

苑 半絡九桔欬 右

○清肌十全散

治骨蒸勞熱

瘦柴三分 生地 地骨 桔絡

分風 苓 參 絡 二 其 飯 酒

亢 各 六 右

○龍膽丸

治積熱勞瘦不食息膈腫

膽柴 苓 驚 酥 各 桃 尖 皮 指

陳大 飯 酒 浸 其 炙 右 煉 蜜 丸 白 湯

下 一 五 無 苓 有 苓 地 骨

○清骨散

治男婦五心煩熱欲成勞

療柴 人生地 絡 三 參 風 熟地

丸 赤苓 胡連 絡 半 苛 行 右

○十全大補湯

治氣血俱虛 換門 虛

肌熱加地骨 骨蒸加柴 嗽加五

味 嗽加半汗 加蚘 氣短加參

○素丸扶羸湯

治肺痿骨蒸勞嗽

熱聲嘔自汗四肢怠惰 柴 仁 參

驚 炙 丸 飯 地骨 絡 半 花 半

甘 絡 一 右 入 姜 棗 烏 梅

○保和湯

治勞嗽肺燥成癆者或治

吐膿血 方見咳嗽門

○保真湯

治勞証躄虛骨蒸 飯

芪 參 朮 生地 熟地 白苓

赤苓 蓮心 絡 半 天門 麥門 味

知 栢 柴 赤芍 白芍 地骨

甘 陳 絡 二 右 入 姜 棗 驚 悸 加 神

遠 栢 子 酸 棗 淋 濁 加 薛 烏 藥 猪 沢

○ 溺 澁 加 石 韋 通 蓄 遺 精 加 龍 骨

蚘 蓮 鬚 蓮 子 躁 熱 加 膏 滑 魚

盜 汗 加 浮 麥 蚘 芪 麻 根

○ 著 男 子 二 十 前 後 色 慾 過 度 血

生 陰 虛 水 動 之 疾 午 後 發 熱 咳 嗽 益

汗飲食少進其... 肌肉消瘦此名勞瘵最重... 則難為此病大忌服... 多者亦難治

○**玉方芎** 知蜂蜜水 天門去皮心 白芍

妙木各一分 百浸水 陳各七 熟地行生地
酒各五分 姜三分 飯一分 右全姜 ○咳盛
加桑堯菜味 ○痰盛加半菱貝 ○

潮熱加桑地骨 ○盜汗加蚘酸淨
○夢遺精滑加蚘龍骨山茱 ○赤白

濁加白苓連 ○**地骨皮散** 治骨蒸壯熱肌肉消瘦

盜汗各 地骨 尤 柴 枳 知
飯 鱉醋 右等分未入桃柳枝頭
各七箇姜二片烏梅一箇煎

○**桑芪散** 治勞瘵喘嗽咯血潮熱盜

汗 柴 膠炒 芪蜜 白苓 苑茸
飯 芎 半 貝 甘 枳 桔
尤各五分 參 味 卷 風 杏 款
桑炒 各二 鱉醋 右入姜棗

○灸法 傳凡 骨蒸勞熱元氣未脫者 灸
世之妙 法也 四花六先無有不效者 真濟

○**林** 取勞虫三節骨上一穴膏盲二穴各
灸七壯然後飲食調理方下取虫藥
其虫如亂絲或如紅絲線者是也

○患門二穴四花左右二穴四處同時
下火各七壯至二七累 灸一百或下

百五十壯猴瘡欲瘥 又灸當脊骨上
二穴各一百壯 傳初之 四火同時灸
百壯後灸瘡瘥 又灸當脊骨上
徐當脊骨上二十九宜
灸三五壯多
灸惡人跳時

濟世良方婦人... 不遂生成之理... 以繩頭按其... 申指尖... 截斷... 為法

○凡灸膏肓四花瘡發欲癒可灸三里穴以下氣

○遇仙灸勞瘵捷法癸亥日三更時有身平立用筆於腰上兩傍微隔處點謂之腰眼然後上床合面而吐穴灸七壯

勞重或吐出或瀉下用火焚之棄於江河恐害人故也灸後宜服將軍丸

○將軍丸 治傳屍勞瘵 錦文大黃

九蒸焙麝香管仲牙皂醋皮雷丸
各一兩 蘇合香一兩 右為末先將青蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水一碗煎至七分去粗入蜜一大盞再熬成膏入前藥末及麝末安息香

搗丸如桐子大每服三十丸食前棗湯送下

○三汁丸 灸後宜服 生地汁 青

蒿汁 薄荷汁 童便 酒絡二同煎成膏却入後藥末柴驚醋花各一

辰 麝各半 右為末入前膏內丸如桐子大每服十五丸溫酒送下

○灸勞瘵灸乳後三寸十四壯男左女右不已加壯數

又灸太推 身柱 諱諱 氣海

○**眩暈門** 二

○肥白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰挾虛火上衝頭目不能勝敵故忽然眼黑... 花如坐舟車而

○旋運也黑瘦之人身弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有眩暈而兼補氣之藥黑瘦作眩者宜滋陰降火爲要而帶抑肝之劑

○丹溪曰痰在上火在下炎上而動其痰也二陳加芩蒼卷

○活奪云眩運者中風之漸也肥白氣

虛而痰四君加芪錢半橘紅或少

加芎劑以清利頭目○痰盛而痰氣

虛者二陳加參木芪或少加炮附入

竹瀝姜汁○軀瘦血虛而痰火兼盛

者二陳合四物加片苓薄荷入竹瀝

姜汁童便○諸般眩運痰風則加風

荆天麻尤等○痰熱加片苓連梅○

痰寒加姜桂附之屬○去血過多而

眩運者芎級湯

○防風通聖散 治風熱眩運方見中風門

○半夏白朮天麻湯 治風痰眩運方見

頭痛門

○六合湯 治風虛眩暈四物加芎卷

○川芎散 治風眩暈 山茱去核 兩

山藥 其菊 參 神 小芎各半

右爲末每服二錢溫酒調下

○芎散 治風証眩暈惡風自汗

芎 白苓 絡 三細 枝 絡 二 不 紐 其

後一右入姜

○川芎石膏湯 治風熱上攻頭目昏

暈方見頭痛門

○茯神湯 治氣鬱生涎隨氣上厥頭

目眩肩心中怔忡 參 明 山 各

小前 熟地 絡 九 二 公 垣 遠 其

水煎夫心姜汁各七分白芍半各九右加生薑米

○**香橘飲** 治氣虛眩暈 木 半

木 橘 苓 縮各半 丁 廿各

半右入姜煎吞蘇合香丸加芎藭桂

治血虛眩暈

○**灸法** 頭風目眩灸前頂二壯在入

髮際三寸半○又灸懸會壯在入髮

際二寸○又灸後頂壯在入髮際六

寸半○灸陶道壯在大椎節下○風

門二穴壯各五在第二椎下兩傍各一

寸半○頭旋目眩灸兩眼小背上髮

際絡

○**白木天麻湯** 治風氣眩暈

○**白芍湯** 治血虛眩暈

○**白朮湯** 治氣虛眩暈

○**自汗門**四

傳 丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與熱盜汗

屬血虛與陰虛

○**桂枝湯** 治外感風邪自汗之聖藥

也方見傷寒門

○**黃芪建中湯** 治外感被氣虛自汗

○**桂枝湯加芪** 治外感被氣虛自汗

○**補中益氣湯** 治內傷氣虛自汗見

內傷○甚者六脉浮軟而虛加附以

治陽虛○左寸浮洪而自汗者心火

炎也倍參芪加門味連絡半○左關

浮弦而自汗者被風邪也加桂枝芍

絡半○右關浮無力而自汗者倍參

芪○右尺洪數無力而自汗者或盜

汗相火焚君火之勢而尅也加

連苓柏絡半只用當歸湯○左

十六 尺浮洪無力而自汗者，此為大盛也。

加知栢各半，熟地各五分。

切廬積之証，自汗不休者，總用本方。

必加附子、麻黃根、浮小麥，但升柴俱

用，蜜水製炒，以殺升發勇悍之性，又

欲別參芪等，至肌表故不可缺。

○當飯六黃湯 治盜汗之聖藥也。

飯酒浸芪蜜炙各生地 熟地 栢

連 芍藥 一右水煎。

○麥煎湯 治諸虛及新病暴虛津液

虧欠，躄常自汗，心忪驚惕。 芎 芪

麻一根各一右作一服入小麥百餘

粒。

○白朮散 治飲酒中風多汗，食即汗

出，久不治必成消渴。 芎二分 朮二分

半分 風半兩 右為末，溫水調下。

○桂枝加龍骨牡蠣湯 治六脈搖動

微緊盜汗及失精。 枝 白芍各三

其後二龍骨 芎各三右加姜東

○辰砂妙香散 治心氣不足，虛損少

睡，盜汗方見遺精門。

○黃芪湯 治表虛身微熱，汗出

或因發汗表虛，脈虛者。 芪各參

白苓 朮 白芍各一其後牡陳伍

右入姜。

○黃芪湯 治喜怒不節，房室勞傷，寒

熱自汗盜汗。 芪各二分白苓 熟

地 桂 麻黃根 龍骨 天

門各半味 風 小麥炒飯瀝其各

半分 右入姜。○發熱自汗加解。○發

厥自汗加附炮。

○天補黃芪湯 治自汗之人。

服 芪 蜜 風 芍 山 木
妙 桂 其 炙 五 味 參 各 半 日

熟地兩三從兩右入姜棗

石解散

治虛盜汗 柴 風 味

小草 遠 芪 蜜 桂 斛 木 麩炒

其炙苓格等 右入姜

參苓散

治聽中汗出 酸 參

苓等為末米飲調下

治盜汗極效

水研切成小塊用浮

麥一升水一斗煮乾如尚木硬又加

水煮取出切片焙乾去麥為末浮麥

煎湯下

參芪湯

治虛盜汗 參 其 炙

扁 木 葛 苓 芪 炙 陳 山

半各等右

人參柴胡湯

治邪熱客於經絡肌

熱煩燥盜汗 參 木 苓 其 炙

柴 葛 飯 酒 芍 格 等 入 姜 棗

頭汗乃陽氣上脫也須早治宜柴胡

桂姜湯 柴 欬 枝 苓 枯 酪 姜

其 蛻 絡 六 右

心汗盜汗只心頭出者名心汗 苓

為末每服一錢以烏梅陳艾煎湯臨

卧調服一方青桑第一葉焙乾為末

陰汗濕痒用大蒜煨剥去皮爛研同

淡豉末糲和丸桐子大硃砂為衣每

服二十九丸東一枚灯心數莖煎湯空

心下

清蛾丸

治陰汗不止方見腰痛門

一方爐其石分蛤蚌右為末乾糲患

處

脚汗 牡蛎散

蛻 殼 丸

蜜 陀

僧黃丹各等為末用許乾糝脚
指縫

○温粉 止汗法 芎 芷 木 藜

各等為末每藥末一兩入米粉三分
和撲身無毫本亦得

○又蛎殼煨一定粉五為末綿裹瘡患處

○水腫門五

傳經曰諸濕腫滿皆屬於脾夫脾虛不

能制水水漬妄行故通身面目手足
皆浮而腫名曰水腫

○丹溪曰水腫因脾虛當以參朮補脾

脾氣實則健運升降則水自行宜補
中行濕利尿切不可下

又曰水氣始非氣鬱飲食濕熱諸証

○有水氣者微腫先見於目下也

○心 目胞上下微起肢躄重著咳喘怔忡

股間清冷黃皮尿澀是也

傳丹溪曰水腫脈多沉伏病陽水兼陽

証脈必沉數病陰水兼陰証脈必沉

遲煩滿小便赤澀大便秘結為陽水
不煩滿大便溏小便少而不赤澀為
陰水

○水病脈洪大可治微細不治

○水病腹大脈實生虛死

○以手按之成凹不即起者濕也

○身腫脈浮不渴續自汗無大熱風

水也

○著肺受邪上喘則失降下之故小便

漸短以水溢皮膚生腫滿此則喘為

十九本應為標治當清金降氣為主行水

○次之脈主肺夫肺主氣之

○脾受傷不能制水則水濕妄行浸漬

○肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不得

○降生喘此則腫為本喘為標治當實

○脾行水為主清金次之

○水病其本在腎其末在肺故下為肺

○腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱

○病

○心凡水腫先起於腹而後散四肢者可

○治先起四肢而後散於腹者不治

○或男從定下腫而上女從身上腫而

○下並皆不治

○傳

○腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜

○利小便此仲景之法

○熱水腫用梔子炒為末米飲調下三

五錢若胃脘熱病在上者連穀用

○葶藶木香散 治濕熱甚水腫腹脹

小便赤澁大便滑泄苦苧搗碎赤苓

猪木各二半木半沢半其多通各五

桂二滑三另兩右為末白湯調下

○白米木香散 治喘嗽腫滿不能卧

尿閉木猪其沢通赤

苓猪五木枳各陳去桂分胃

行右作一服加姜三片

○道滯通經湯 治脾濕有餘氣小宜

通面目四肢浮腫 桑木木

苓沢陳各等 右

○赤茯苓丸 治脾濕太甚四肢腫滿

腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁

四已兩赤苓兩木半右為

如桐子大每服三十丸食後桑白煎

湯送下

○蘇鑿飲子

治通身浮腫 煩燥

多渴二便不利 沢 小豆 炒 陸

菴 腹 目 通 芩 枳 苓 皮

絡 半 右 分 二 貼 入 姜 三 片

○蘿蔔子飲

治木病浮腫 不 忍 嘔 吐

苦 苣 各 其 餘 半 半 苧 枳 桂

青 陳 青 木 白 商 陸 絡 四 羅 一

赤 苓 半 木 右 分 二 貼 入 姜 三 片

○五皮散

治風濕客於脾經氣血凝

滯以致面肢浮腫心腹膨脹上氣喘

急 姜 皮 桑 皮 腹 皮 苓 皮 陳

皮 各 等 右 水 煎 一 方 用 五 加 地 骨

無 桑 陳

○木香分氣湯

治氣留滯四肢腫腹

急胸脇膨脹尿臭濁 木 赤 苓

猪 沢 枳 枳 炒 半 蘇 子 灯

各 等 右 每 服 七 錢 水 二 盞 姜 三 片 煎

八 分 入 麩 未 少 許 食 遠 温 服

○內按七情停滯涎後凡備腸脹各日

氣分宜分心氣飲木香流氣飲二丁防

喘

○白木沢瀉散

治痰病化為木氣不

能食 木 沢 芍 陳 祛 苓 木

枳 各 等 右 每 服 七 錢 加 姜 三 片

○痞加枳腫甚加芩木

○杏蘇飲

治上氣喘嗽面自浮腫見

門 咳 嗽

○溫白丸

治積塊久不治變成腫脹

川 烏 炮 去 皮 臍 皂 去 皮 巴 皮 心 腹

附 子 製 姜 湯 洗 沈 桂 苓 參 桔

首柴 姜炮桂 蜀椒去目及閉口
連絡五 右為末入巴豆令爛蜜丸
如梧子大每服五七丸姜湯下
○三仁丸 治水腫喘急二便不通
郁李仁去皮杏仁去皮薏苡各等 右為末米
糊丸如桐子大每服七十丸空心米
湯下

○消腫丸 治水腫喘滿小便不利
滑通木 黑豆 通脈 茯苓
神半 陳絡五木 罌穗 丁路
分 右為末酒糊丸灯心門冬湯下

○保脾散 治陰水發腫用此先實脾
土 朴姜木 瓜 木 姜炮各莫
腹 附炮白苓 其糝略右入姜棗
○當飲散 水腫之疾多出腎水不能
根養心火火不能溫養脾土故不能制

○水木食氣脈發為浮腫之証心
腹堅脹喘滿不安此湯主之 飯
木 赤苓 芍 牡 桂 換 陳
通 木 瓜各一分 蘇分 右水煎

○分心氣命 方見氣門
○一方 治酒腫及脾虛發腫 薑蘿蔔
一枚皂角五右二味用水同煮乾去皂
角將蘿蔔切爛入蒸餅和丸如雞頭
實大羅蔔子煎湯送下

○犀角湯 治結腸証四肢腫滿熱毒
不散 犀 玄參 翹 柴絡半升
暹路九沉 射干 其妙各七芒仁
門仁 右水煎

○赤小豆湯 治年少血熱生瘡疥
為腫滿 小豆炒飯酒漚
赤芍二已 猪 桑椹絡石分二匙

加姜三片熱甚加犀

○補分氣補心湯 治心氣鬱結 為四

肢浮腫喘急 腹中漉漉白苓 桔

略一通 其多訶 煎 枳殼青殼

末絡粗細 木略半右加姜末

○茯苓湯 治脾氣不實手足浮腫小

便赤遊喘滿 赤苓 沢 莎 陳

桑 腹 姜各等 右

○林水腫喘急者先導降氣宜二和散加

蘇草方見氣門 凡水腫喘急者

○退腫羌活散 羌 蘿微炒 右為末

每服三錢空心温酒調服

○塗臍膏 治腫滿小便少 地龍

針沙 猪鬃等為末葱涎調敷臍中

亦高以芎藭之

○水病初得危急者冬瓜白水煮熟任

意食之神效

○卒腫滿身而皆腫用皂角刺炒黃錫

三升用酒十椀煎至四椀每服一盞

且進二服

○治一切水腫紅花二兩并爛入水半

錢取汁服之不過三服便痊

○醋附丸 治酒腫及濕風發腫 用

醋煮香附焙為末醋糊為丸如桐子

大每服四十九白湯吞下

○灸法 分水灸七壯治水病腹腫不

能食穴在臍上一寸

○神闕灸三壯治水腫鼓脹腸鳴當臍

中

○石門灸七壯治水腫水氣行皮中穴

在臍下一寸

○三里灸七壯主腫脹皮腫穴在膝下

三三寸筋外廉兩筋間

○水腫冬三壯主水腫人中滿定在鼻柱下一名人中

○水腫惟得針水滿若針餘穴水盡即死

○針分水殺人多

○水腫灸足內踝下白肉際三壯妙

○八絕 唇黑 缺盆平 臍凸 背

平 足平 掌平 肉硬 大便滑

泄並皆不治

○忌塩百日外忌魚蝦麩食並房事

腹滿門 六

○諸腹脹大皆屬熱天樞曰內虛

不足出寒濕令人中滿宜從權以寒

熱藥治之天樞寒脹多熱脹少

○斤傷酒麩厚味膏粱之人食已便即

濕熱之氣不能消化而致腹脹者熱

脹也

○因食積腹脹有熱用木香枳榔丸和

方說有寒用丁香脾積丸

○治脹大法補中行濕利小便使溼去之

參朮為君橘朮為臣芩門為使以制

肝木加枳以消腹脹氣不運加通木

下隨加升柴提之血虛加補血藥痰

盛加孔痰藥

○凡腹脹須用姜製厚朴

○肥人用利濕芩蒼滑之類瘦人脹是

熱用芩連梔枳之類枳加芩白芍
○色白人脹氣虛用參朮苓枳加

○如因有故蓄血而腹脹者用桃紅

○如因食積而腹脹者用保和丸加木

換魏之類

○如因外寒鬱內熱而腹脹者用藿桂

升葛之類

○如因多怒鬱氣脹者用蒼芎莎青芍

柴及龍會丸之類

○凡腹脹初得是氣脹宜朮枳枳青陳

枳之類久則成水脹宜行濕利水之

劑

○林腹滿按之不痛為虛溫之形之以補

為要按之痛者為實下之消之而後

○脈經曰閉上脈虛即腹內遲而滑者

脹脈盛而緊者脹

○針經曰脈大堅以瀉者脹嚴氏曰脹

脈浮者易治虛者難治

○大實滿燥實痞閉氣滯或始因內傷

脈洪實宜下服下劑過多或瀉痢後

或素脾胃虛者補脾行濕

○破滯氣湯一名木香破滯氣心腹滿

枳 牛膝 檀 藿 陳 腹子

白蘞 白苓 桔 二縮 參 青

枳 木 姜黃 木 各四右

○廣末潰堅湯 治脹滿內有積塊二

便滯滯上氣喘促通身虛腫 枳 姜

芩 連 益 草 薏 飯 各五半 枳

廣 不 升 紅 朮 各二 生 苳 柴

右細切作一服加生姜三片水二盞煎七分溫服忌酒醋濕麪一服之後中滿減半止有積塊未消再服後藥

○半夏厚朴湯

紅 蘓木 各半木

青 各二茶

乾生姜 連路一桂

蒼 白苓 沢 柴 陳 生 苓

草 薈 生 苈 各三稜 飯梢 赤 苓

升 各四麩 炒 大 杜 姜 製 半 八 分 去 皮

尖 研 昆 布 如 渴 加 葛 石 細 切 作

一服水三盞煎至一盞稍熱服服此

藥一貼後前証又減一半却於前藥

中加減服之

○中滿分消丸

治中滿鼓脹氣脹水

脹熱脹 苓 去 細 切 酒 麩 陳 日 實

麩 半 湯 泡 各 七 次 去 參 半 木 姜

黃 絡 甘 其 炙 赤 苓 各 一 乾 生 姜 白

苓 縮 絡 二 枳 殼 製 知 照 沢 陳 自

仁 右 爲 末 蒸 饒 丸 如 梧 桐 子 大 每

服百丸焙熱白湯或淡姜湯下

○木香順氣湯

治濁氣在上則生腹

脹 木 草 薈 各三 枳 殼 青 陳

益 苓 各 乾 生 姜 沢 茱 半 各

分 飯 蒼 朮 五 升 柴 朮 一 米 行

右水煎

○柴蘇子湯

治憂慮過度心腹脹滿

喘促腸鳴一便不利脉虛而緊濡

脈

○大異香散

治失飢傷飽痞悶停酸

且食不能暮食名曰穀脹 稜 炮 莖

炮 青 陳 半 薤 桔 益 枳

妙 莎 妙 各 一 苈 半 右 分 二 貼 姜 片

吏 枳

○平肝飲子

治患怒太甚心腹脹滿
兩脇妨悶頭眩嘔逆不風二枳
殼芍 桔各分不木 參 枳 飯
酒芍 陳各八其後四右分一貼加
姜片

○溫有丸

治積癥大如赤心腸脹滿
及反胃吐逆方見木腫門

○木香勻氣散

治虛弱飲食膨脹
木不涉 稜煨莪塊枳炒茵炒陳
宿炒各右以咀分一貼水二鐘姜片
棗炒煎八分溫服

○沉香散

治腹脹喘急睡卧不安
沉木 枳炒各羅紗六右分二貼
入姜片三

○天正氣散

治脾胃虛寒外為風寒
暑濕所傷心腹脹滿村姜薑半

陳木絡二枚 枝二枚 姜炮各
二分甘炒半一 右分二貼入姜片棗
二枚

○參香散

治一切氣膈虛作脹 參
桂各半三 枳 實 陳 桑
青門 腹絡五蘊子 莎 苓各
木細 右加姜棗

○木通散

治腸助刺痛膨脹小使赤
通大使小利或浮腫 蘇梗 通

○草豆蔻湯

治腹中虛脹 沢分木
分麩半 實煨草蔻 益 甘各
分青 陳各六苓 飯各七右入姜
冬加芪五七分春夏止服正藥

○雞屎醴

治鼓脹 雄雞矢臘月內
研末各右和勻酒煮麩糊丸

○「一方」治鼓脹心腹痛滿，大黃

桃 雞屎乾等分爲末，每服一錢生

姜三片水煎食後臨臥服

○治鼓脹身乾黑瘦多渴煩悶馬鞭草

細剉曬乾勿令見火以酒或水煎至

味出去滓温服以六月中旬雷鳴時

採有功

○治腹滿不能服藥煨生姜如指大綿

裏乘熱內下部冷即易之

○灸法

○脾俞灸年壯

○分水灸百壯治腹脹遠脘結痛

○三焦俞治腹滿腰痛吐逆小便不利

羸瘦少氣
上腕中腕下腕章門三里脾俞宜灸

乏

積聚門

○積陰故始有處痛有部聚陽故始無

根痛無定

○丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形

在右爲食積在左爲死血在中爲痰

飲

○心 婦人腹中有塊多屬死血

○肝 癥者腹中堅硬按之應手如地

○癥者中雖硬忽聚忽散無常未及癥

脈來細而附骨者積也在左積在左

○心 痞塊在皮裡膜外須用補藥香附開

之莖二陳加補氣須斷厚味

○厚薑殼能消血塊次消痰

○雄婦血塊難服峻劑 莎四兩 桃

○駐木酪二海粉二兩 右為末神麴糊

丸

○婦人死血食積痰飲成塊在兩脇雷

鳴身熱 連二兩半 以益

查酪 右為末蒸餅丸姜湯下

○散聚湯 治九氣積聚心腹痛及腰

脇二便不利 半 枳 飯各四

陳 杏別破尖 桂 苓各一 甘炙

附炮芎各五 枳 蘇朴 姜菜 湯泡去

右作一服加姜二片

○助氣丸 治氣積三焦痞閉

稜 炮莪 二斤 青 陳 并去 木 各十 枳

木 酪 十 右為末糊丸煎水下

○大七氣湯 治積聚隨氣上行心腹

痛小腹脹滿 益 陳 稜 莪

莎 妙各一 桔 桂 藿 耳炙青 各

○導氣枳殼丸 治氣結心脾痛 枳

殼 通妙青 陳 晚去 桑 妙菜 妙白丑

妙黑丑 莪 煨面 妙陵炮 右各等分

為末姜汁調麴煮糊丸如桐子大每

服三十丸煎橘皮湯下

○林 木香枳柳丸 治氣積 丸見氣門

○勝紅丸 治脾積氣滯胸滿氣促酒

積食積 陳 青 稜 莪 醋煮

良妙姜一兩 莎 妙二 右為末醋糊丸

○流氣丸

治積聚癰塊皆寒氣客腸胃之間久而成木苗妙橘紅

菖青祛蘿炒莪炮枳破炒麴炒

枳炒量澄茄宿藥炒各牽炒一兩兩半

右為末糊丸如桐子大每服五十九

嚼白豆蔻一枚白湯下食後

○香稜丸

治五積破痰癖消癥塊

木丁各五稜剉酒浸枳炒莪剉入

去皮巴豆三十粒同炒書練肉剉

黃色去巴豆不用右為末醋糊丸塩酒送下

○醋煮三稜丸

治諸積遠年日近皆

効芎二兩醋煮微稜四兩醋煮軟

子晒大半兩醋濕紙裹右為末糊

丸如桐子大每服三十九温水下

○三稜丸

化積聚去米麩五穀等積

陳倉米一兩巴豆五枚去殼同炒巴

陳稜煨各縮葉炒各木行右為

末醋糊丸姜湯下

○保安丸

治癥積心腹內結如拳痛

大二兩新水浸姜炮大附子炮

皮脂鱉一兩半醋煮右為末用三

年米醋一升先煮去四五合後和藥

丸如桐子大每服二十丸空心醋湯

或米飲下取積如魚腸膿血青泥而

○麴蘗丸

治酒癖腹滿不食脇助痛

麴炒蘗炒各連五批炒黃同用右為

末沸湯搜丸姜湯下

○醉鄉寶屑

治酒傷積平胃散加

一宿芽麴或香蘇散亦可並用姜枣

塩煎服

○脾積丸

治食積飲食減少面黃腹

寸九痛亦治茶積

一名茶積丸 倉米半斤

七粒去豆皮 青

陳去白各石 末醋

丸姜湯下

魚蟹積

香蕪散多加生姜陳皮煎

服

果菜積

平胃散加丁香麝香塩湯

點服

治茶積

膏 芩 升 為末砂糖

水調服

林

食魚鱸及生肉不化成瘕搗馬鞭草

汁飲一升入生姜亦可

灸法

治卒厥上氣心腹滿痛欲絕

此為奔豚氣即急以湯浸手足頻易

之次灸氣海 又關元 期門 滯章

門 壯中極 壯五十 久冷泄利瘕瘕灸天

樞 壯胃脘 壯

嘔吐門

八附吞酸

傳

丹溪活套云胃中有熱膈中有痰作

嘔吐清水吞酸等証一陳加姜炒連

梔蒼蒼言淋宿麴查少加木香行滯氣

加生姜煎服 久病虛者加參朮

胃寒者加益草蔻姜桂之類去連梔

甚者加丁附 脇痛脾痛右關弦嘔

吐不已此木來土之分也本方加參

朮升柴青芍芍宿麴 如常惡心吐

清水心胃作痛得食則暫止飢則甚

者此胃中有蛇也本方加練史君煎

服或用黑錫炒灰枳櫚末等分米飲

調吐吐重而嘔用之效

久病吐者胃氣虛不納穀也生姜參

朮木莎

五痞滿短氣而嘔宜補中氣用調中

益氣湯方見內傷門

○凡嘔吐者切不可下逆之故也

○夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯

調服

○痰飲為患或多食生冷脾胃不和致

嘔吐惡心一陳湯加丁香烏梅生薑

○心下痞痛加草薤

○痰熱惡心嘔吐氣盛者導痰湯加宿

姜炒連竹茹

○藿香安胃散 治胃氣虛弱不能飲

食時時嘔吐惡心 藿 參 陳 各

各半 右水煎

○和中桔梗湯 治上焦氣熱上衝食

已暴吐脈浮而洪 桔 木 各半

仁陳祛實炒白苓 朴姜炒各 右作

一服水煎去粗調木香散二錢空心

服

○木香散 木 枳 等分為末煎藥

調之服

○藿香平胃散 治內傷飲食填塞嘔

吐不已 藿 朴姜陳 絡 一 蒼 半

其 餘 三 宿 麴炒絡 右 加 姜 末

○丁香治中湯 治胃傷寒冷之物心

腹痛嘔噦不已 參 紅 木 姜 陳

青 丁 絡 一 其 餘 三 附 分 右 加 姜 末

○丁香安胃湯 治嘔吐噦胃虛寒所

致 丁 炙 其 柴 升 飯 身

陳 絡 半 菜 草 薤 參 蒼 絡 一 莖

仁 栢 分 右

○茯苓半夏湯 治脾胃虛弱有痰惡

心欲吐風邪羈絆於脾胃之

實脾土 木 苓 半 麴 絡 一 橘

紅 天麻 各七 芽 麩 炒 黃芩 二分 右加
姜

柴沉丸 治中焦吐食由食積與寒

氣 半 烏梅肉 丁 枳 各二

代赭石 紅杏 祛破 尖沉 木 木 各

宿仁 陳紅 巴豆 霜 破 白 苾 絡 半

右為末入巴霜和勻醋麩糊丸姜湯

下

木香白木散 治中焦嘔而吐食腹

中痛先服去積之藥次用此藥和其

氣 木 丁 絡 半 枳 木 苓 各

不 煇 行 其 後 四 右為末用芍藥乾姜

煎湯調服

溫白丸 治下焦吐朝食暮吐暮食

朝吐大便不通 亦見水腫門

大萆薢香散 治七情傷感氣鬱於中

痞悶嘔吐不食 半 藿 木

木 絡 二 有 苓 桔 炒 參 枳 後 去

桂 甘 多 略 右每服七錢姜煎

加味平胃散 治因食鬱吞酸本方

加炒麩炒芫姜東煎服

吐清水用蒼 陳 壁 炒 苓 滑 甘 白 水

陳皮煎服

麩木丸 治中脘宿食留飲心痛吐

清水 麩 炒 三 蒼 米 泔 浸 宿 陳 祛

略 右為末姜汁別煮神麩糊丸姜

湯送下

人參煮散 治脾胃不和停積聚飲

嘔吐痰水 參 四 青 稜 煨 各 十 姜

炮下皮 各 一 分 苓 蒼 各 半 枳 後 去

兩右加姜東

○**六味理中丸**

治脾胃虛寒飲食不

化嘔吐痞悶或腸鳴泄瀉薑

芽各二白苓 麴參各一木四其

加半夏一兩為末入塩煎服亦可

○**安中湯**

治脾胃一切不利芽妙

麴參各一木四其 益

飲腹脹噎膈吞酸不食白芍餅飯

丁皮 山姜炮 苓莎妙木

甘參各桂 莪參各二右如姜

附陳土白各半 朴甘各二蒼三

右姜棗

治嘔吐不已藿

○**噎膈門**

膈噎反胃大率以血液乾槁其或咽

喉窒寒食不能下其槁在吸門或食

下則胃脫當心而痛須更吐出食出

痛止其槁在賁門此皆上焦之膈噎

也

或食物可下良久復出其槁在齒門

此中焦之膈噎也

或朝食暮吐暮食朝吐其槁在蘭門

大小腸之間此下焦之膈噎也

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰○氣

虛脈緩而無力○血虛脈數無力○

痰寸關脈沉或伏而大○氣滯結者

寸關沉而瀋○又曰脈瀋而小血不

足○大而弱氣不足

○尿如羊屎者不治太陽無血

三
二
年高者不治年五十餘則不可治

○氣血俱虛者口中多出沫俱大出者必死

○丹溪活套云凡膈噎及胃悉用二陳湯加姜汁竹瀝童便韭汁之類為生

治○胸中覺熱悶本方加土炒連苓萎枯之類○血虛瘦弱本方合四物

少加杏紅童便韭汁之類仍不可缺○飲酒之人本方加砂糖○如朝食

暮吐暮食朝吐或食下須更即吐者此胃可容受而脾不能傳送也或大

小腸秘結不通食返而吐本方加酒蒸大黃桃仁之類潤之○脾不磨

者本方多加芽麩神麩之類○如氣虛肥白人者本方合四君亦加竹瀝

姜汁○因七情鬱結成氣噎者本方

加香附樺芽木枳麥宿之類

○此藥實丸

治膈噎胸膈痞痛徹背

膈喘急妨悶 萎蕤枳炒半枳各炒

兩右為末姜汁米糊丸姜湯送下

○人參利膈丸

治膈噎胸中不利大

便結燥痰嗽喘滿 木 枳各七參

飯 藿 甘 實炒大酒濕朴姜製

右為末滴水丸濕水下

○祖傳潤腸膏

治膈噎大便燥結飲

食良久復出者 新取威靈仙四兩

剉五兩開 生薑四兩麻油一白砂蜜

去上煎右四味入銀石器內慢火

煎候如飴時時食之一料未愈再服

○下料決効

○治噎膈久不納穀者隔年飲會乾石

一味以急流順水煎煮糜爛取濃汁

時久與之待能食後以調脾進食生血順氣之藥調治而安

○沉香開膈散

治膈噎痞滿嘔吐心

腹刺痛脇助脹 沉一稜 莪白
薤 澄茄 宿 果 益 川 白
姜 丁 丁皮 參 各半 木 白苓
莎 藿 半 青 陳 各 丁 耳 兩 分
右入姜棗

○膈氣散

治喜怒無時飲食不節積

滯在膈上痰嗽噎塞 參 苓 桂
枳 甘 炙 麴 炒 芽 炒 莪 稜 煨 木
訶 煨 去 陳 姜 炮 各 朴 製 枳 木 各
兩 右為末 塩湯煎服 如覺脾胃不和
腹脹滿悶加姜七片塩少許水煎三
五沸連相服

五噎散

治噎食不下胸背刺痛淚

涎俱出 參 苓 朴 製 甘 炙 枳
訶 煨 去 桂 木 陳 姜 炮 稜 煨 麴
芽 炒 各 木 枳 莪 各 半 右 分 煎
姜 五 片 棗 二 枚

○嘉禾散

治脾胃不和膈噎痞悶氣

逆生痰飲食不進 杷 法 毛 姜 白 苓
宿 意 炒 丁 白 薤 煨 去 參 各 一 木
炒 桑 炒 沉 味 炒 各 枳 炒 青 谷
藥 炒 藿 仲 炒 去 皮 姜 汁 酥 塗 隨 風 子
鮮 酒 和 腹 子 炒 陳 半 姜 丁 分 同 搗
麴 炒 各 二 木 半 枳 兩 半 右 每 服 三
錢 姜 二 片 棗 二 枚 煎 服 ○ 五 噎 入 乾
柿 蒂 一 枚 ○ 膈 氣 吐 逆 入 薤 白 三 寸
束 五 枚

○漢防已散

治五噎 已 分 半 二 桂

二 不 細 分 半 陳 杏 各 一 不 半

五羚羊角屑丁各一分蘇合丁各一分右分二貼
姜五片水煎

○**一方** 羚羊角屑米飲下亦以角磨
噎上良

○**灸法** 膏肓灸多至百壯膈中灸七壯
三里灸七壯

○**藥肉平胃散** 開胃進食 朴陳
去白各三 甘草紅棗 生姜各二蒼
朮酒浸一宿

○**一方** 加苓參右剉拌勻以水浸過面
上半寸許煮乾為末每服一錢塩湯

空心點服

○**秘結門**

○**傳** 丹溪曰有虛有風有濕有火有津液
不足者有寒者有氣結者切不可例

○**用利藥** 久病腹中有實熱大便不通宜用潤
腸丸微利之

○**邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津**
液中乾此大腸枝熱然也

○**虛人臟寒而血脈枯老人腸寒而氣**
道塞此大腸枝冷然也

○**能飲食小便赤實秘**
不能飲食小便清虛秘

○**吐瀉後腸胃虛服熱多者為熱結**
肺受風邪傳入腸中為風結宜麻仁

○**年老氣弱津液不足或產後亡津液**
而結宜地黃丸

○大便秘小便數則為脾約宜養血潤燥

○服養氣不利者四物加枳椇桃紅

○酒腸丸 治脾胃中伏火大便閉澀

或乾燥閉塞不通全不思食及風結

血閉皆能治之 桃豉麻仁 去壳各

飯荷 大酒濕 卷各半 右挑麻別研

如泥其餘為末煉蜜為丸如桐子大

每服三五十九空心白湯下如風濕

而大便不行加皂角煨去秦光

○麻仁丸 治大便秘風秘脾約 麻

仁 郁李 枳 棗 煨各五大煨

兩山 風絡半右煉蜜丸白湯下

○丹溪方 治大腸虛秘而熱 白芍

半兩陳 生地 飯各一廿仁右為

末粥丸白湯下

○七宣丸 治風氣結聚宿飲不消心

腹脹滿大便秘小便時澀 柴 實

麩訶皮 木各五 桃去皮尖廿 炙四

大煨一兩 右煉蜜丸如桐子大每服

二十丸米飲下食後服增至四五十

丸宜利為度

○厚朴湯 治胃虛而秘者不能飲食

小便清利 朴製二兩 木 陳仁廿 炙

半絡二實 煨半一右加姜

○脾約丸 麻仁 下兩半生絹袋盛百

入井中與水面差一指許次日 實 煨

煨乾磨之粗末指完 大 醜 蘇 杏 去皮尖煨

右煉蜜丸白湯下

○通幽湯 治密閉不通噎塞不便燥

閉氣不得下 飯身 桃 升 絡 一

生地 熟地各半紅 甘 炙各右水

前云祖調按末半錢食前稍熱服

○潤燥湯 升 生地各二錢地 飯

稍大 酒濕土厚 桃 麻各一紅

五右

○升陽瀉熱湯 治膈噎不通逆氣裡

急大便不行 青 槐子各二生地

熟地 柏各二飯身 其枳各四蒼

升社武行桃皮尖箇去又右

○活血潤燥丸 治風秘血秘常以燥

結 飯搗伍風紅大 酒着酪一烏仁

燒存性一挑皮尖 麻二兩半 右煉

蜜丸如桐子大每服五十九白湯下

三兩服後以麻子仁煮粥食之此丸

○潤肺丸 潤血燥通大便 麻仁

飯枳 生地 桃 枳 燻右煉蜜丸

○枳殼丸 治三焦約二便不通殺氣

不得下行 枳 小腹痛不得大小便日

三焦約証 枳 兩陳 兩枳 碎木 二

黑豆 用頭末 一兩半 一兩半 右煉蜜丸

姜湯下

○千金丸 治藏府壅滯氣結或重積

心腹痛瘡疥積熱便結 大耐木 兩

右為末醋糊丸如桐子大每服三十

○皂角丸 治大腸有風大便閉結老

人虛人宜服 皂 炙去皮 枳 等分

右為末煉蜜丸或飯飲丸亦可米飲

下

○潤腸湯 治大便秘澀連日不通

麻仁 浸瀉取濃汁 水 脂麻 研末 浸瀉

取臘 挑去皮刺穗各一右入鹽少煮

同判穗煎去粗可代茶飲之以利爲度

○小通氣散

治虛人憂悲傷脾秘結

或燥藥太過 陳白嫩紫蘇莖葉

枳殼通法各等分右水煎

○歲吳仙丸

治老人津液不能內潤

氣虛不能運導而秘結 歲 苳 葱

酪一實 礎 右煉蜜丸如桐子大每

服七十丸米飲下

○三和丸

治氣結腹痛悶大便秘結

方見氣門

○蜜煎導

虛羸之人服藥不得通者

用蜜四兩內銅器微火煎之稍凝似

飴攪之勿令焦捻作匙子令頭銳大

如指長二寸許熟時急作冷則硬內

穀道中以手急抱欲大便時乃去之

惠以梨爲骨 尤効

○心

用蜜熬人皂角末少許作丸以導之

冷秘生姜兌亦好

○林

治二使不通用白礬末入患人仰臥

滿臍中以新汲水滴之覺冷透腹內

即自然通

○太

大便不通太田螺三五枚以塩一匙

和搗置臍下一寸三分以帛扎定

二使不通連根葱一枚帶土不洗生

姜一塊淡豉二十粒塩一匙同研作

餅烘熱掩臍中以帛扎定良久氣通

自下

○虛

人大便不通用皂角燒烟薰臍即通

○林病門

十一附轉胞

腹身 閱格

○傳原其爲病之由皆膏粱之味或燒酒
炙肉之類鬱遏成痰或用心太過房
勞無節以心腎不交清陽不升濁陰
不降而成天地不交之否
○渴而小便不利者熱在上焦氣分肺
主之宜苓沢琥證通草車葵菹蓄之
類

○不渴而小便不利者熱在下焦血分
腎膀胱主之宜滋腎丸
○下焦無血小便澀數而黃者四物加
相知腰其枳

○老人氣虛而小便不通四物加菴參
吞滋腎丸

○因鬱熱成淋不通用赤苓苓車沢門
桂滑通其枳

○氣虛者加芪木淋痛加栝生地夏月

煎調益元散方見初門

○腎虛極而淋者當補腎精而利小便

○淋病之諸藥宜加牛膝傳告膝損胃
不食宜斟酌

○治五淋 赤芍所換仁木煎空心服
之

○傳參苓琥珀湯 治淋莖中痛相引脇

正不可忍者 參 苓 各半 練 麩 其

梢 生 延 各 七 琥 柴 飯 尾 沢 各

分 右加灯心十數莖

○林 琥珀散 治五淋 滑 琥 各 四 通

飯 木 鬱 金 扁 蓄 各 二 右 分 二

貼 蘆 葉 同 煎 服

○淡竹葉湯 治諸淋 竹葉 其

灯 棗 烏 豆 車 各 等 右 水 煎 濃 湯

代 熟 水 服 甚 妙

○冷淋 生附湯 治冷淋小便秘澀
竅中痛 附桂枝滑略半瞿 通各

分半一不右加姜灯蜜

○八味丸 治冷淋 吐 白苓 沢

略二熟地兩八山茱肉 山藥各四附

法及桂兩各二右煉蜜丸如桐子大每

服五十九丸空心温酒下

○熱淋 八正散 治熱淋血淋癰閉

秘結 車瞿 蓄滑其

○梔通 大棗 右入灯心煎

○石葦散 治熱淋多因腎氣不足勞

倦則發 葦去通略 苈飯王

不留行 滑 木 瞿 赤芍 葵

略半 右為末每服二錢煎小麥湯

調食前日三服

○立効散 治熱結淋閉作痛 苈多

○梔絡 半瞿行 右作一服姜片葱三

灯根

○導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀或

淋痛 通 苈 生地各等入竹葉

煎

○火府丹 治証同前 苈通略

生地兩 右煉蜜丸木通湯下

○清肺飲子 治渴而小便閉澀熱在

上焦氣分 灯心通草分沢 瞿

琥絡半蓄 通絡七車 苈猪各

不右水煎

○滋腎丸 治小便渴而小便閉熱在下

焦血分 栢酒洗乾知酒洗焙乾 桂絆

右熟水丸白湯下云淡塩湯下

○石淋石燕圓 治小便滲痛不可忍

出沙石而後方通 石燕燒紅水

研滑 葶法瞿穗分六 右麴糊如桐
子大每服五十九丸瞿疔煎湯下月三
服

○氣淋沉香散 治五內鬱結氣不舒

行小腹脹尿不通而石薑散內去未

瞿通加沉陳為末大麥煎湯調服

○血淋 小劑飲子 治下焦結熱尿

血成淋生地 小劑根 通草

○滑 施蒲 節生其竹葉五

飯絡五 右木煎木煎

○髮灰散 治血淋亂髮

麴少 右醋湯調空心服又治婦人

轉腰不尿男子尿血皆效

○加味五苓散 治血淋加辰砂末灯

心煎湯調服

○一方 治血淋 膠二兩 猪三 赤苓

滑 沢略 車解 右

○膏淋 五淋散 治諸淋或如豆汁

或尿血如膏 赤苓紅 赤芍 施略

各二 飯酒 浸各 三分 右煎服

○鹿角霜丸 治淋閉苗赤如膏

鹿角霜 白苓 秋石各 等 右為末

麵糊丸如桐子大每服五十九丸米湯

或白湯空心服

○勞淋地膚子湯 治下焦結熱小便

赤莖中痛出血 膚心分 知 黃苓

猪 瞿 實少 升 通草 葵 薤

藻略 九右入姜

○茯苓調血湯 治酒麵過度房室勞

傷小便出血 赤苓三 赤芍 芍

半略 一前 柴 青 枳越 桔

桑 灯 甘 第略 分半 右姜三 蜜

鹿角膠丸

治房室傷損小便尿血
鹿角膠五 油髮灰 沒藥各三 右爲
末 葶根煎汁打糊丸塩湯下

地黄丸

治腎虛小便淋瀝及婦人
子淋 八味丸去附干桂

轉脾 髮灰散

治男女轉胞不尿
方見右

八味丸

治腎虛小便閉澀及下元
冷胞轉不得小便方見右

心有胞系轉疾小便不通者凡強忍尿
尿急疾走飽食忍尿飽食走馬忍尿

入房水氣上逆迫於胞故屈戾而不
舒張

舒張

惠忍小便久致胞轉自取瓜申燒服之

又以蒲黃裹患人腎令頭至地二度

通

茯苓丸

治胞痺小便內痛 赤苓
風細木 附炮沢 桂各五 天

花 苑 膠酒 莖 芍 甘各

生地 山茱 山藥 獨 半各

右蜜丸温酒下

腎溼湯

治胞痺小腹急小便不利
門 通 桔 桑 仲炒犀角五加

略一赤芍五 右入羊腎个 竹瀝少許

傳 關格脈兩寸俱盛其証嘔逆而小便
不通者是也用一陳湯探而吐之吐

中便有降

○有氣虛不運者補中益氣加枳椇使

清氣升而濁氣降也

○吐逆而小便不利者急灸氣海天樞

各二十七壯其吐必止然後以益元散

等利小便

等利小便

祖傳秘方

治關格吐逆小便不通

藿香平胃散合五苓散加姜棗煎服

立効藿香平胃散見傷寒論

鐵服丸

治大小使不通神効

大皂角燒存性煉蜜丸如桐子大七十

丸白湯下

林治卒淋半尾燒存性每服二錢空心

白湯服

○治淋 黑豆百粒其仁剉煎去粗葉

熟入滑石末一錢空心服

○治石淋 髮灰為末每服一錢空心

井水調服

○惠小使不通炒塩熱熱小腹數易之即

通

○玉灸淋流以炒塩填滿臍中以小艾炷

灸七壯立効或灸二陰交

濁門

十二附遺分

○傳丹溪曰赤白濁乃胃中痰積下流滲

入膀胱用二陳加升柴風之類以是

之○肥白人屬濕熱加二末炒栝之

類○或有挾寒者本方加炒干姜桂

甚者加附○氣虛者本方加參芪木

或加附○赤者多血虛瘦弱之人得

之四物加酒知酒栝煎湯送下珍珠

粉丸

○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒

治宜酒煮當飯丸

珍珠粉丸

治精滑白濁等証栝

蛤各五珍配右為末水和丸如桐

子大每服一百丸溫酒下

酒煮當飯丸

茵五黑附炮良各七

飯配右四味以好酒一升煮者全酒

四畫焙乾炙甘草練生丁絡玉木升

柴行炒黃塩 全蝎各三延細石
與前四味同宋酒煮麩糊丸如桐子
大每服五七十九空心淡醋湯下

○單薛分清飲 治下焦虛寒小便白濁
獨類數或如膏糊 苜烏 益
薛 白苓 絡 其梢 右作二服入
塩一錢煎

○清心蓮子飲 治心中發熱憂思抑鬱
小便赤白濁 苓 門 地骨
車絡 半 其後 一 白苓 苳 窠 蓮 心 參
絡 半 右水煎 ○熱加柴苟 各 半

○導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀遂
成赤濁 亦見淋門
○加味五苓散 治赤濁本方加苳蓮
水煎

○遠志丸 治赤濁如神 遠 甘草 水
半斤 扶神 祛益 略 三 右酒糊丸 棗湯
下

○治白濁出髓條 王酸 木 參 苓
破 益 苳 蚘 煨 青 塩 各 等 右酒
糊丸酒或米飲下

○桑螵蛸散 治男子小便數如米泔
羸瘦恍惚及遺尿 苳 塩 龍 骨 煨 桑
螵 蛸 水 遠 志 甘草 水 參 飯 洗

○五子丸 治小便頻數時有白濁
菟 酒 韭 炒 益 苳 炒 蛇 去 皮 炒 右
酒糊丸米飲塩湯任下

○秘真丸 治遺尿失禁 龍 骨 兩 說
大 者 五 續 徑 辰 二 半 右 米 糊 丸 空

○心温酒下臨卧熱水下
○雞腔腔一具先腸洗焙乾燒石為末
空心温酒調服

遺精門 十三

傳 夫遺精者夢與鬼交而泄曰夢遺或
隨夢而出曰精滑

○思想無窮所願不遂而得之者沮安
神降火

○因房勞致虛而得者宜滋木藏以後
真陰

○夢遺主熱精滑主濕熱
珍珠粉丸 治精滑方見尿濁門

○加減温膽湯 治因思想而得精滑
者方見傷寒門去竹茹加參遠酸蓮神煎

服

○妙香散 治心虛遺精白濁 苓
神 菖 遠 各去心炒 參 桔 其
絡 五 山 二 兩 姜 汁 炒 木 半 煨 辰 行 麝

行石為末每服二錢温酒調服
○秘真丸 治思想無窮所願不遂為
白濁隨溲而下或夢與陰人通泄方見

尿濁不可多服大秘也如要通與葱
茶半錢

○三仙丸 治夢泄 益二兩用鹽二
烏藥半兩 右為末用山藥一兩為

糊丸如梧子大以砂砂為衣每服五
十丸空心臨卧塩湯下

○三白丸 治遺精白濁 龍骨
蛻各鹿角霜二 右為末麵糊丸如
桐子大每服五十丸空心温酒下

○鎖陽丹

治遺精

桑螵三兩龍

骨酥白苓兩一方有附五味右糯米

糊丸空心茯苓煨煎湯送下

○博金散

治脫証自泄遺精

龍骨各白茯苓絡石各二右為

末空心臨吐米飲調下

○金鎖丹

治男婦滑精夢交遺泄

龍骨煨遠各三蛇煨四神白苓各

二右為末酒糊丸空心煨湯或酒下

○小草湯

治憂思過度遺精白濁虛

煩不安小草莖飯酒浸門酸

此法去根各參甘各右加姜

說

一人夢精日夜常遺作心不足治而

不驗又作腎虛補之無驗問腦冷否

答曰腦冷即與驅寒之藥兼服益心

腎藥而愈

○怔忡驚悸門

十四附健忘

傳

夫怔忡驚悸或因怒氣傷肝或因驚

氣入膽母能令子虛因而心血為之

不足又或遇事繁冗思想無窮則心

君亦為之不安

○怔忡者心中惕然動搖而不得安

靜無時而作者是也○驚悸者驚然

而跳躍驚動而有欲厥之狀有時而

作者是也二証之因亦有清痰積飲

留結心胞胃口而為之者又不可固

執為心虛而治宜以脈証參究

○丹溪曰有慮便動屬虛時作時止者

痰因火動瘦人多是血少肥人只是

痰多時覺心跳者是血虛

○健忘者由憂思過度損其心胞以致

神舍不清遇事多忘病在心脾

○傳○惠 精神衰少者有痰者令健忘

○養心湯 治肥人因痰火而心中悸

動 苳 神 半 芎 絡 半 遠

桂 栢子 酸 薑 五 味 參 絡 半 苳

○右作一服 姜 三 片 棗 一 枚 如 停 水

加 神 枳

○定志丸 治心氣不足恍惚多忘及

怔忡驚悸 參 白 苓 朮 遠 芎 苳

○右煉蜜丸如桐子大 硃砂為衣

白湯下

○朱雀丸 治怔忡驚悸 神 沉 兩

硃 砂 兩 右 蒸 餅 丸 如 桐 子 大 每 服

五十九人參湯下

○八物定志丸 平補心氣鎮驚除膈

間痰熱 遠 芎 苳 皮 芎 門 神 白

苓 朮 朮 附 參 兩 牛 黃 仁 右 煉 蜜

丸如桐子大 硃砂為衣 每服二十丸

白湯下

○祖傳秘方 治憂思傷心驚悸

飯 身 神 生 地 酒 遠 神 絡 五 菖 軌 連

絡 半 生 黃 錢 辰 仁 金 箔 計 五 右 為 末

猪 心 血 丸 如 黍 米 大 金 箔 為 衣 每 服

五十五煎灯心湯下

○補氣湯 治氣虛怔忡脉浮而軟

苳 苳 參 苳 絡 一 門 桔 絡 七 右 加

○丹溪治勞役大亂心跳者 辰 白

芍 一 側 栢 飯 絡 三 芎 陳 苳 各

不 連 妙 一 右 猪 心 血 丸

○益榮湯 治心血耗傷怔忡恍惚夜

多不寐小便渾濁 飯 苳 小 草

酸 補 子 健 神 柴 石 英 各 一

木 參 參 絡 七 右 入 姜 棗

〔茯苓飲子〕 治痰飲蓄於心胃怔忡

不巳方見痰門

〔十四友丸〕 治心血虛怔忡驚悸

柏子遠浸汁 酸湯浸去皮 柴石莖

煨熟地 飯入參 桂 芍 炙 炙 白苓

白茯神 膠 龍齒 略 辰 研 右 煉

蜜丸米飲下一門

○治思慮過度勞傷心脾怔忡 神

木 絡 參 甘 木 絡 半 右 加 姜 棗

○平補鎮心卍 治心血不足怔忡多

夢 隨 層 崖 白 苓 味 車 神

門 桂 各 兩 遠 煎 草 水 天 門

山 藥 姜 汁 浸 炙 酸 法 皮 炒 熟 地 兩

參 伍 龍 齒 兩 辰 為 右 煉 蜜 丸 米 飲

下

○辰砂妙香散 治心氣不足恍惚少

眠方見遺精明

○溫膽湯 治心虛膽怯易驚夜夢不

祥方見傷寒門 丁方加酸炒遠五味

熟地參

○遠志丸 治因事有所大驚神魂不

安驚悸夢不祥 遠 姜 汁 苜 略 一 神

白 苓 參 龍 齒 各 五 右 煉 蜜 丸 辰

砂 為 衣 脂 膳 湯 下

○加味茯苓湯 治痰迷心胞健忘

半 陳 參 略 半 白 苓 益 莎 各 煉

丁 其 後 五 右 姜 片 烏 伴

○二丹丸 治健忘安神和血見

中風

○飯脾湯 治思慮過度勞傷心脾健

志 性 木 神 芍 炙 酸 炒 龍 眼

肉 參 各 二 分 木 不 其 緣 半 右 分 二
服入姜一片棗一枚

○**珠砂安神丸**

治心神悶亂怔忡

內傷門

○著

人遇勞心思慮積傷精神眩昏氣短
驚悸煩熱 參 二 分 味 壯 五 飯 酒 門
白芍 炒 神 酸 妙 各 搗 炒 生 地 酒
甘 炙 陳 芍 各 五 右 加 姜

○**癲癩門** 十五

○傳 大抵狂為痰火實盛顛為心血不足
多未望高遠不得志者有之

○癲時作時止 ○癲狂失心妄作經久
不愈

○王 癩病獨主乎痰因火動之所作也發

則旋暈顛倒口眼相引目睛上搖手
足搖指背脊強直食頃乃甦

○先身熱製痰驚啼叫喚而後發癩脈
浮者為陽癩在肉在肌膚易治

○先身冷不驚制寒不啼呼而病發時脈
沉者為陰癩在五藏在骨髓難治

○治法癩宜吐狂宜下顛宜安神養血
蕪降痰火

○用溪日太密屬痰與驚不必分五等
大法行痰為主用連星半莖尋痰尋

火必多少治

○神不守舍狂言妄作經年不愈如心
經苦熱當清心除熱如痰迷心竅當
去痰寧心宜大吐大下愈

○狂病者宜開痰鎮心補亦有中邪者
以消邪之法治之有難者用原藥以

清心瀉火者必用吐吐後用東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類安神丸見內傷

寶鑑龍腦安神丸 治五般頭癩無

間遠近發作無時 神效參 地骨 甘 門 桑酪 二 牙硝行腦 麝香 各

分玉 牛黃 伍辰 料 犀 兩 金 錘 五 料 右煉蜜丸如彈子大金海為衣冬溫

水化下夏凉水日進二服每服一丸 小兒至丸

錢氏五色丸 治諸癩 硃 兩 水 銀

二 不 姓 一 兩 珍珠 兩 鈇 三 兩 同 右 麩 糊丸如麻子大有服二三丸煎金銀

薄湯易下 元戎二白丸 治痰涎為患致癩癩 狂女驚悸等証 白礬 或 半 兩

庫量 盧 右用生蒸餉劑裹蒸熟去皮 實加煨 入醉粉丸如桐子大每服二三丸

姜湯下小兒如黍米大一兩而愈 妙香丸 治時毒傷寒解潮熱積熱

及小兒驚風癩等証 辰 兩 腦 臟 麝香 五 牛黃 伍 金箔 九 十 巴 十 五 粒

及油心 右煉蜜丸每兩作二十九丸 飲下

牛黃清心丸 治心氣不足神志不

定驚風惡顛往虛煩少睡 方見中風門 桃奴丸 治心氣虛怯有熱尿注

夢驚癩等証 桃奴 乾 桃 木 上 不 落 研 七 另 辰 兩 桃 仁 另 研 竹 玳 瑁 一 烏

犀 五 不 磨 琥 珀 三 不 研 牛 黃 行 腦 行 麝 香 不 雄 桃 葉 煮 水 安 息 灰 酒 研 龍 右 以 安

息 桃 仁 琥 珀 熬 成 膏 和 諸 藥 丸

陰乾人參湯下

○**當飯龍膽丸**

治腎水陰虛風執益溫

積驚悸植椽暗風人癩飯二膽

大花子連栢苓各一兩大一黛

蒼酪半木行麝半右煉蜜丸姜湯

下

○**寶鑑沉香天麻湯**

小兒因心懼發

積痰涎有聲目多昏睛強項驚一時

計方醒後因恐惶即發多服犀朱腦

麝鎮墜之藥四年此証尚在脉沉弦

而急先灸兩躡二七壯次服此藥

沉益川烏絡二天風半

附炮各羌醉甘多飯蚕酪分獨

○**烏巴丸**

治癰癩結熱狂亂不避親

卑醜罵巴烏梅煨訖右同研水

丸如桐子大硃砂為衣三五丸加十

五丸姜湯夜卧吞下通利三五行自

○**金露圓**

治痰迷心竅恍惚狂言婦

人痰血上衝狂亂多生地焙貝各一

○**巴**去心膜醋煮三沸煎連二兩枯

紫花苗去菜風苜米夜浸姜炮

白苓一椒出相朴錢根參甘多

○**驚**者黃茸松各一草一烏兩二一号

桂酪一右為末麪糊丸如梧子大每

服五丸心中痰患姜湯下○心痛酸

石榴皮湯下

○**灸**顛狂不避水火在言間使穴灸二

寸壯在堂後三寸兩筋間

○**卒**中鬼魅恍惚顛狂灸人中穴又灸

兩手足太指甲令艾炷在羊肉半丸

各七壯不止灸十四壯一法合手足

太指縛之灸半爪半肉立効

○神庭一穴在人前髮際五分灸三壯

○主登高而歌角弓反張

○步衝一穴在毛小指內廉灸二壯主

驚癇沫出

○前頂一穴在入髮際三寸半灸三壯

○主小兒驚癇

○長強一穴在脊骶端灸五壯主小兒

驚癇

○盡發灸陽蹻申脈穴在外踝下陷中

○夜發灸陰蹻照海穴在內踝下陷中

先灸之後服藥

○風痰癰病 化痰丸 生白礬

細茶研爲末煉蜜丸如梧子大茶湯下

一歲十九丸大人五十九丸又服痰

自大便中出斷病根

○中惡門

十六附鬼擊尸厥

傳

○病有心虛驚惕如醉如痴如爲邪

鬼所附或陽明內實以致昏高歌棄

衣而走皆痰火之所爲實非妖邪崇

○丹溪曰血氣者心之神也神既衰乏

邪因而入理或有之

夫血氣兩虛痰迷心竅妨礙升降不
得運行以致十一官各失其職視聽
言動皆爲虛妄以邪治之必死
○脈乍疎乍數乍大乍小或結或促皆
邪脈也
○飛尸卒厥此即中惡也因冒犯不正
之氣忽然手足冷肌膚粟起頭面青

黑精神不守或錯言妄語口噤或昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客牒飛尸鬼擊而死及入廟查塚多有此疾以蘇香合丸灌之候甦以調氣散和牛胃散服名調氣平胃散

○中惡之証或暮夜盥廁或人所不至之地忽然眼見鬼物咬著惡氣倒地四肢厥冷兩手握拳鼻口清血與尸厥同多移動即令人圍繞燒火打鼓燒麝香木蘓米候醒方可移歸

○或到夕無人居睡中為鬼物所魘但吃吃作聲令人呼喚如不醒不得點燈近前驚喚但痛咬足跟并大指中邊或皂角末吹鼻或雄朱散灌之

○夜夢或被刺或杖打諸般不祥卒丸

竅出血名鬼擊 升 獨 地 續

各半 桂 右為末白湯下

○桃奴丸 治心氣虛怯夢魘中惡見

癩癩門

○蘓合香丸 治諸般疰疾 方見氣門

○治魘死不還半夏末吹入鼻中即醒

○祖傳辟邪丹 治衝惡疰疾及山谷

間狐精為患 參 神 遠 鬼箭

○羽 九節菖蒲 白朮 蒼 飯 各

挑奴 雄 辰絡三牛黃行金箔 兩

二十或加麝香 右以桃奴已上諸

藥為末入雄辰牛末和勻以酒調米

糊丸如龍眼大金箔為衣臨臥以木

香湯化下 一丸諸邪不敢近寐更以

絳囊盛五七丸懸床帳中尤妙

○調氣散 白菝 丁 檀 木 酪

○藿 甘各八縮四右塩湯煎服

○灸法兩手大指見癩癩門

○林

灸法厥腫中二十八壯人中七壯陰囊下百壯婦人兩針人中至齒立

起

○頭痛門 十七

○傳

頭痛其鳴九竅不利者腸胃之所主及氣虛頭痛也

○

心煩頭痛者病在膈中乃濕熱頭痛也

○

如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也甚則入腎寒溫頭痛也

○

如頭半寒痛者偏頭痛也

○

有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至驚者死

○

有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓

者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也血虛頭痛宜飯為主氣虛頭痛

參芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加芍蔓細其效如神○白朮半

夏天麻湯治痰厥頭痛藥也○清空膏乃風濕熱頭痛藥也○老活附子

湯治厥逆頭痛藥也如濕氣在頭者以苦藥吐之不可執方而治先師嘗

病頭痛發時面頰青黃量數目不欲開便言身軀沉重允心欲吐時潔古

曰此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以石方王奎凡治之更多俠溪先即

愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不失可謂上工

矣學者其可執一而不知變乎○丹

溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火○撰淺近者名頭痛其痛卒然而至易解散速安

○深遠者名頭風其痛作止不常愈難感後發風邪則驅散之痰厥則溫利之○肥人頭痛濕痰半倉瘦人頭

痛是熱酒本風○傳形瘦色弊而頭痛者是血虛宜用散膏方酒相之類

○勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火自下衝上宜補中益氣湯加苜飯甚者加知蔓細

○偏頭風在右屬痰屬熱痰蒼半熱酒片苓○在左屬風及血虛風荆芎或荆芎頭痛要藥宜詳証加用血虛苜飯芍酒相少

陽偏頭痛者多太便秘或可下之○王額角上痛為偏頭痛足少陽經也

痛久不愈令人喪目○偏痛久不愈眼藥針灸不効者濕氣在頭也凡帶

一味為末少許吹鼻中水徐出一盡夜濕盡痛止

○偏頭痛連睛痛石膏鼠粘子炒為末茶酒下

○雷頭風頭上有赤腫結核或如酸棗用針出血愈子和以茶調散吐以神

芎无下後服愈風餅子藥不効宜清

○傳治風濕熱頭痛片苓一兩酒蒼羌風絡五蒼耳子仁細仁右為末

生薑片搗細和藥末三錢茶清調下

○一方無風細有生其酒連芎半

○清空膏治偏正頭痛久不愈及治風熱頭痛除血虛頭痛不治片苓

三兩酒拌溫一柴甘草風各

兩連一兩柴甘草右為末每服二

錢茶清調如膏臨臥抹口內少用石

湯送下○如苦頭痛加細○脈緩有

服之不愈加柴一倍○如發熱惡寒而

渴陽明只服白虎湯加止立愈

○細辛散 治偏正頭痛 細 瓦粉

各二生芍 芍各三酒連 芍各半

甘草炒芍八酒炒各 柴右水煎食後

服

○羌活湯 治風熱壅盛上攻頭目昏

眩灸芍半分沢酒相 白芍

酒柏各四柴伍酒芍 風 羌 酒

連各六右

○玉壘丸 治風濕頭痛亦治痰患

雄紅星煨木 半 天絡一右為末

姜泔浸蒸餅丸

○如聖餅子 治風寒伏留陽經痰飲

氣厥頭痛 風 天 半各半星

姜 芍 甘草略一川烏去皮右為末

蒸餅細調檢作餅子如錢樣每用五

餅同荆末嚼茶清下

○川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏

痛鼻塞聲重 芎四荆穗略一羌

芷 甘草各一兩細半風半右為末每

服一錢食後茶清調下

○川芎散 治頭目不清和 芎伍

柴七羌 風 藁 生甘 升各一

炙甘 生地各一兩半連酒酒片芍略二

右為末食後茶清調下

○祖傳治頭風熱痛不可忍者 片芍

二兩酒拌濕燉再拌再燉如比三次不可令焦 小兒煎並
醉細茶 芽仁荆穗細芎二各 右為
末每服二錢白湯或茶清調下

○清上瀉火湯

少年人於氣海三

里節次灸之至年老成熱厥頭痛高
寒風風吹之頭痛即愈 荆蘓 芎

生甘遂二蔓 飯身 蒼六細各三

酒連 生地 藥各四升 風各三

酒拍 灸甘 莖路五酒知 酒芩

各七卷八柴一酒紅紗右

○治眉後骨痛屬風熱與痰 芷片

芩酒製右等分為末每服二錢茶清

調下

○又方

卷 風絡一廿下不夏 酒片

芩下不半冬不用 右煎服食後片

○治少壯人氣實有痰或頭暈而重痛

在效 大黃酒拌炒乾 右為末茶清

調下

○川芎石膏湯

治風熱上攻頭目昏

眩痛悶鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳

膜 芎 施 芍 荆 飯 芩

大 參 木 菊各半膏 風 芎

翹各一桔 寒 甘 滑各二宿三

半右水煎食後溫服忌姜蒜熱物

○厥頭痛

治風寒在腦頭痛及傷寒

風一切頭痛 芎 香附 菖 蒼

芷煎各一兩細 芎各七荆 甘各

兩芎一芷各二右為末每服二錢食

後茶清調服

○羌活附子湯

治冬寒犯腦大痛

亦痛名腦風 麻根去 黑附 炮

芩 蚕 栝各三卷 蒼各半風

草二錢或一升分寒嗽加佛手草分右水煎食後溫服

○追風散

治諸風上攻頭痛目眩鼻

塞聲重皮膚癢痺肩角牽引婦人無風及一切頭風用烏梅風二膏各

兩炙甘草各去刺各五錢

芎七麝二右為末茶清調下

○甄頭散

治偏正頭眩芎二香附

四右為末茶清調服○偏頭痛連

睛痛加青葙粘子酒炒末茶

○三生丸

治痰厥頭痛半風南

有附等為末姜汁浸蒸餅丸姜湯

送下

○治痰厥頭痛

烏梅肉分塩仁水一

盞煎七分去粗溫服吐即佳或以好

茶煎二三升雙飲須臾吐吐畢又飲

如此頓過待得即瘥

○治頭風腦蓋骨痛

皂角水浸春三

夏一晨洗新瓦上焙為末每一空茶

調服以少許搖鼻

○加味調中益氣湯

治氣血俱虛頭

痛其効如神陳栢酒各升

柴各參各甘多蒼倉芎各六芪行

蔓各細死一方有木二無栢○林

無栢有切飯下味

○半夏白朮天麻湯

治痰厥頭痛眼

黑惡心煩目上喘心神顛倒目不開

四肢厥冷栢一分姜二分沢白苓

天麻芪參蒼各三麴湯木瑤

分麥芽半橘紅各七右作一服加

姜二片水煎食前稍熱服可一服而

愈半夏治痰厥天麻治眼黑頭旋風

虛內作甚其溫瀉火補氣實表止汗
參茸溫瀉火補中益氣一二末若其溫
除濕補中足利尿導瀉福紅若溫
益氣溫中麴消食湯胃中滯氣麥葉
寬中助脾干姜辛熱滯中寒相若耳
治冬天小火在泉發燥

○天追風散 治久新偏正頭痛肝虛

血氣寒風毒上攻頭 芎 天 兩 右
為末煉蜜丸酒茶任下

○二芎餅子 治氣厥頭痛上盛下虛

痰飲風寒伏留陽經偏正頭疼連腦
巔吐逆惡心目眩耳聾清頭目化風痰

撫芎 川芎 姜 藁 蒼耳 星

風 甘 炮 右為末姜汁浸餅丸晒

乾細嚼茶酒任下

○神芎丸 治心經積熱風痰壅滯頭

目赤腫咽膈不利 大生芎各一牽
生滑各四連 芎 略半 右為末
滴水丸如桐子大每服五十九溫水
食後下

○愈風餅子 治雷頭風眩暈先吐後

服此芎 川烏炮各五錢 芷
風 細 天麻 羌 荆 芎 甘

各各 二兩 右為末餅子作餅子細嚼或

茶或湯下

○清震湯 治雷頭風頭面疔瘡腫痛

寒熱狀如傷寒 升 蒼略 荷葉
全 右吹咀每服五錢水煎去粗

溫服

○一方荷葉一箇燒研細煎藥調服

亦可

○頭風痛遇天陰風雨先發者桂一兩

○為末酒調傳頂上額角

○頭痛不可忍多是風痰所致梳末和蜜濃藥舌上吐即止

○治頭風痛大豆泔炒葉熟投酒中蜜封七日溫服

○治頭風熱痛不可忍者打礪大

黃等為末用深井底泥和作餅子貼

兩太陽穴眉上髮際動麻處外睛

大陽十四經腫子穿鼻外去五分

外去五分

○心痛門 十八

○丹溪曰心痛即胃脘痛須分久新身

犯寒氣口得寒物而病於初得之時

當用溫散溫利之藥矣病久則成積

久則成熱若欲行溫散溫利無助

火漆病耶由是多用山梔子為熱

藥為之嚮道病安之後若恣口不

前非病必再作難治此病雖日久不

食不死若痛方止即吃物必復作必

須每服三五服藥後以漸而少食方

可獲全安

○致病之由多用恣口腹好辛酸飲熱

酒食煎燒復食生冷朝傷暮損日積

月深自積成積有積成痰痰火煎熱

血亦妄行痰血相雜妨礙升降故胃

脘疼痛吞酸嘈雜皆屬噎反胃之漸

者抑俗醫不究其源例以辛香燥熱

之劑治之以火濟火良可痛哉古方

丸種心痛皆在胃脘而不在心右

心痛者大寒犯心君又曰汚血衝心

手足青週節者且發身死發且死

手足青週節者且發身死發且死

手足青週節者且發身死發且死

○心膈大痛，或走腰背，或發嘔吐，諸藥不効者，以鴉錢（鴉片）探吐，出痰積，許而痛止。此或薑葉生薑合汁服，又愈。

○脈散，薑不（不）大便者，正之亦可。以物（物）柱按，而痛定者，屬虛。二陳加妙姜和之，而愈。

○平日好熱物，死血流於胃口，而作痛者，桃仁（桃仁）姜氣（姜氣）正之。

○更痛者，必面上有白斑，辰紅能食時，作（作）曉止。二陳加苦練根，或錫灰。

○濕痰作痛，白螺螭（白螺螭）殼去泥砂，煨（煨）末，方寸七溫酒調下。久者良妙。

○氣痛者，牡蛎粉一二錢，溫酒調下。（粉與）痛甚者，脈必伏，且溫藥附子之類，不可用參朮。

○一方用海粉，佐以香附，以草棉煎湯入姜汁調服。

○無藥處，以鹽置刀頭，燒紅，淬水中，乘熱飲之，此痰而愈。

○一方山梔大者七枚，炒焦，黃水煎入姜汁一二匙，令熱飲。

○草薺性溫，能散滯氣，利腹上痰，若胃脘因寒而作痛，用之如鼓應桴。若濕痰鬱結成痛，服之多効。若因熱鬱而痛者，理固不當用此，但宜以涼藥監制，如芩連施之，屬其功太速。東垣

草薺薤丸寒熱心痛俱權奇功，但因熱者不可多服，久服恐有積溫成熱之患。

○草薺薤丸

治寒犯胃痛或因濕

之患

熱鬱結痛亦可救而止之。又治氣弱
心痛亦好。 草薹燻 沃小便 各
而痛紅 菜燻 乾參 菖 蚕 益
絡入生耳 炙多耳 飯身 青絡六
桃七煨 棗黃 柴煨 不痛 麩炒 各
藜炒 右為末 蒸餅丸 白湯下
林
末附湯 治寒厥心痛手足逆冷冷
汗出脈微氣弱方見傷寒 厥暴痛非
久病朝發暮死急當救之 煎上藥
○愈痛散 治急心胃痛 五靈脂炒
石延炒 莖 煨良 剉飯 碎右為末 醋湯
調服
○鐵刷湯 治心脾積痛 婦人血刺氣
鼻及中酒泄瀉 良剉 甘 炙 蒼 藥
二兩 茵 七 右為末 鹽湯煎服 或酒
煎服亦可

○加味七氣湯

治七氣病發心腹刺

痛欲死 半斤 不延 炒 桂 絡 粉 參
半斤 其後 一乳 粉 二分 一貼 姜 片
棗 核 婦 人 加 飯 苜 各 一

○麩脾散

治喉生冷 凡菓生菜 留中

焦心脾冷痛 姜 朴 果 宿
麩 炒 芽 炒 陳 良 炒 各 一 分 其 後 一 右
入 鹽 少 許 水 煎 服 又 鹽 湯 煎 服 亦 可

○訶子散

治心脾冷痛 不怒 又治霍

亂吐利 訶 煨 去 其 炙 朴 製 姜 炮 菓
陳 良 炒 荅 麩 炒 芽 炒 絡 右 水 煎
入 鹽 少 許 溫 服

○參朮散

治虛弱 人心脾疼 參

未 炒 姜 炮 白 苜 蕞 縮 丁香
其 絡 二 石 分 二 貼 入 姜 片 水 煎 炒
過 蚌 粉 全

○**辛柏散** 治心脾疼 菓 延 五

散 沒各等 為末酒或米飲

○**芍氣散** 治證同前半日效此方氣

氣藥方見中風門

○**順氣木香散** 治氣不升降嘔逆痞

悶腸助脹滿及婦人血氣刺痛方見

氣門

○**得** 祖傳加味枳朮丸 治痰積食積酒

積痰積肉積在胃脘而痛及痞滿惡

心嘈雜嘔氣吞酸嘔吐脾疼等證

白朮三蒼 焙實 麩 芽麩 炒

半酪一澤 赤苓 芎 連 陳壁土

白螺 椰殼 服各宿 草蓼 苓 陳壁

炒青 萊 乾生薑 絡五 陳眩香附

子 鐘 菱 朴 藜 藜 各三木 其

絡二 吞酸加茱 與月五錢熱 久病枳

○**扁** 加參扁連 絡五 ○口吐清水加炒

滑而 蚘 伍名為末用青荷葉包湯浸

晚粳米研粉丸清米湯下

○**白螺散丸** 螺殼 煨滑炒蒼 星 煨

施 香附 鐘 便浸 宿 木 半 青

枳 炒各 右為末姜汁浸蒸餅丸 啖

等夏 加連 朱

○**三石散** 治氣自腰腹間攻心痛腹

中 自汗如洗手足攣急厥冷

施 連 附 九粒 附 一枚 腕 右酒煎

溫服

○**金鈴子散** 治熱厥心痛 鈴 木 延

略一 為末溫酒或白湯下

○**林** 煮黃丸 治太實心痛心膈高起

之愈痛 雄 斷 巴 皮 湯 入 白

麵二兩研勻水丸如桐子大漿水煮

十二丸熟漉入冷漿水內令沉用長藥冷漿水下下丸日盡十二丸如得利不可再服宜服藥本湯利後用此去餘邪 蔓醉蒼右水煎

○五積丸 治心脾痛如刺或酸水不正 百草霜兩巴十四粒去 右飯丸如菜豆大每服三丸先煎醋滾入艾葉一握無煎去粗送下

○香附散 治心脾疼 良妙香附等分為末塩湯點服下方加木香烏藥

○一方治心痛熊膽如豆大和水服
○治卒心痛經年不愈 延齡五甘一 右水煎

○化虫丸 治虫心腹痛方見諸虫門
○一方治虫扁乾漆研細炒烟 醋糊丸

温酒下

○芍氣湯 治九種心痛 棟子肉

延 姜黃等分為末酒服

○集効丸 治藏腑虛弱或多其肥致蛇動方見諸虫門

○治心疼欲絕 銅底煤紅塩 研湯調服

○平補鎮心丹 治心血不足時怔忡夢隨層崖方見諸虫門

○灸法 治心痛手中指端灸三壯

○腹痛門 十九

○東垣曰腹中諸痛皆由勞役過甚飲食失節中氣不足寒邪乘虛而入之故卒然而作大痛○難知日傷寒中

院痛大陰也理中湯苗我建中湯膈
 脹痛者少陰也四物湯真武湯附子
 湯小腹痛厥陰也重則正陽散回陽
 丹輕則當飲四逆湯云雜病腹痛四
 物苦練湯酒煮當飲丸夏月腹痛肌
 熱惡熱脉洪數黃芩芍藥湯秋月腹
 痛肌寒脉沉實桂枝芍藥湯四時腹
 痛芍藥甘草湯

○血虛瘦弱之人津液枯涸傳送失常
 鬱火燥熱煎成結糞滯於大小腸之
 間而作痛者宜以枳實道滯丸備急
 大黃丸之類先通其滯止其痛然後
 用四物等生血潤燥之劑以治其本
 ○卒然心腹大痛欲吐不得吐欲瀉不
 得瀉唇青厥逆死在須臾此內因食
 積外感寒邪是名乾霍亂宜急以塩

湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈

○食積為患者保和丸枳朮丸消之枳

實道滯丸木香枳實丸下之

○丹溪曰腹痛多宜血脉凝滯不行必

用酒洗白芍藥惡寒而痛加桂惡熱

而痛加栝如腹痛欲以物桂枝者屬

虛用參朮姜桂之類手不可按者屬

實用建中湯加大黃或調胃姜氣湯

加桂枝下之而愈

○因飲食過傷而作痛者必問傷何物

如傷生冷硬物者東垣木香日不眠

丸三稜消積丸如傷熱物者枳實導

滯丸三黃枳朮丸看強弱用而下之

○氣虛之人飲食過傷而腹痛者宜補

馮善施二陳湯加芍朮麴芽參朮

類或送下前推積等丸子以下心腹

中當覺有熱而暴痛暴止者為積熱
 謂胃美氣湯上之因跌撲損傷而作
 痛者此瘀血桃仁美氣湯抵當湯逐
 去其血而愈如口裏損傷或酒後洗
 冰血疑腹痛者大養氣湯加桂
 ○戴氏曰痛甚欲大便去後痛減者食
 積也綿綿痛而無增減者寒也時痛
 時止者熱也其痛有常處而不移者
 死血也
 ○因寒氣作痛者小建中加姜桂芍蒼
 芷香附
 ○因熱而痛者一陳加芒連芩扁甚者
 凡此姜從之
 ○腹痛不禁下者芍藥正苓香附芎加
 美前服
 ○飲食過傷而腹痛者木香枳榔九下

之

○小腹實痛用胃皮以行其氣
 ○小腹曰寒而痛桂枝
 ○小腹軟滿而痛不利者蓄血之証尿
 不利者溺溢之證
 ○腹中水鳴及火擊動其水一陳加苓
 連施又有瀉藥
 ○心腹傳痛不得息脉細小遲者生大而
 疾者死
 ○腹痛脉反浮大而長者死
 ○臍下忽大痛人中里色者多死
 ○高良姜湯 治因寒心腹太痛 良
 仁 朴 桂 絡 一 右
 ○單葶藶湯 治臍腹虛脹作痛
 沢 葶 藶 半 實 炒 武 勿 用
 益 茸 駱 絡 飯 苓 絡 七 青 陳

各六翅研木在右作二服加姜三片

益胃散

治因服寒藥過多腹痛不

正參 朴 甘 白朮 姜黃

宿姜 沢路 三益 茯苓 陳路 七

右加姜水煎

厚朴温中湯

治胃虛寒脹滿疼痛

朴 陳路 一苓 草薶 甘 木路

姜 三分 加姜

酒煮當飯丸

治小腹寒痛及婦人

白帶如癩寒熱 九身尿瀉門

五辛湯

治心腹冷痛 板 細

桂 姜 菜 芍 風 苦參 甘

乾地 飯酪 一施 烏梅 大棗 路

枚

小建中湯

治寒氣入腹痛輕按痛

重按愈脈弦緊 桂枝 細 白芍 八甘

後一 右分二貼 姜 三 枣 枚

歸葱散

治脾胃虛冷心腹脇肋刺

痛胸痞嘔逆及外腎腫痛及女人血

氣攻刺癥瘕一切疼痛 延 七 不 蒼

仁 芍 莖 稜 青 各 半 丁 皮 宿

楸 絡 一 桂 姜 炮 各 甘 後 一 虛 寒 甚

者加菜木 後 一 右分一貼 人葱 白 一

垂水煎

理中湯

治冷氣心腹疼痛六脈俱

沉 方見傷寒門

草薶散丸

治客寒犯胃痛者 心腹

當飯湯

治心腹絞痛諸虛冷氣滿

痛 飯 芍 朴 半 酪 一 桂 甘

莖 參 酪 三 姜 四 枚 大 冷 加 附

一枚 右

大七氣湯

治按冷腹痛七氣四成

面色青白方見積聚門

○葱白散 治一切冷氣及腦尻氣刺

痛婦人胎前產後血氣刺痛芍

飯 枳殼朴 青 練去姜炮 茴

胞芍 稜胞 莢醋 芽炒 熟地 麩

炒芍 木 參各 右分二匙葱三

鹽炒 水煎加大使閉

○河間木香枳殼丸 治食積氣滯作

痛 木 枳各 三青 陳 水各 五

芽炒 枳七 實炒 枳炒 右為末湯浸

蒸餅丸如桐子大每服五十九溫水

○芍藥甘草湯 治四時腰痛汗白芍

甘草各 入姜

○芍藥散 治一切心腹疼痛不可忍

者 沒 乳絡 三穿山甲炒 煨以

大驚去 右再煎服

○枳實道滯丸 治傷濕熱之物不得

化化 腹痛滿悶方見內傷門

○黃連湯 治胸中有熱胃中有邪氣

腹內痛時欲嘔吐此藥升降陰陽

連 甘草 姜各 五半半 大各 皮各

參仁 右入大棗一枚 水煎

○四順清涼飲 治腹痛大便結小便

澀喜飲冷以手按之痛甚赤芍

大蒸 各飯 半不 其後一 右一 方加青

○天柴胡湯 治証同前方見傷寒門

○烏梅丸 治胃冷蛔虫攻心腹痛嘔

吐四肢冷方見諸再門

○化虫丸 治腹中有塊以手按之不寬

痛無依止嘔吐涎沫清水面色青黃

或寒或熱沉人嚙嚙不知病之去處

或腹

○治虫咬心痛，備虱而為未空心，溫醋

下重當出

腰痛門

三十五 六十七 七十八

○傳丹溪曰：有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃

有痰，戴氏曰：疼之不一，腎虛痛且輕，夜

重者，瘀血天寒及久坐而發者，濕也

○諸腰痛不可用補氣藥，亦不宜峻用

寒涼藥

○腎虛腰痛用柏仲枝知枸五味地猪

脊骨髓丸服

○瘀血宜行血順氣，補陰丸加桃紅鈔

委中出血

○濕宜燥，濕行氣用柏仲蒼芎或苓通

已卷膠

○痰宜半南加枳氣，藥佐之使痰隨氣

運

○因房勞辛苦而腰痛者，四物加知柏

仲五味之類，吞補腎丸或大補陰丸

○風寒濕流注經絡而作痛者，二陳加

麻蒼芎芷風羌獨之類

○因挫閃跌撲死血流本經而作痛者，

四物加桃紅蘇木之類，脈實入壯盛

者，大寒氣加桂下之安

○醉飽入房酒食之積，乘虛流本經，腰

痛難視仰者，四物湯合二陳湯加

芽仲柏桂宿菴花桔

○腰曲不能伸者，針委中立愈

三因青蛾丸

治腎虛腰痛壯筋補

盧仲炒一斤 生姜十兩 破一斤 右爲
末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮
膜研膏煉蜜些少丸如梧子大每服
五十九丸塩湯姜湯送下

○三因不安丸

治五種腰痛温補腎
元壯健腰脚 破瓦各一兩 膝酒洗仲
姜花續各一兩 薛二一兩 右爲末煉蜜
丸如桐子大每服五十九丸温酒下

○補骨脂丸

治腎虛及寒濕腰痛
薛四兩每一兩分製童便 仲四兩
米泔塩湯各一兩分 畫夜 斷補三兩
胡桃八兩去油 右不犯
鐵器糯米糊丸秋冬煉蜜丸如梧子
大每服五十九丸空心温酒下乾物壓

○補腎丸

治腎虛腰痛

亦見虛損門
獨治奇生湯 治因腎虛坐卧冷濕

當風所得 獨小桑奇 仲炒細

膝并苓 白芍 桂枝 炙甘草

芎風參 熟地 椒略 五石水

煎空心温服

林 八味丸

治房勞傷曾腰痛淋瀝

加飯葶續瓜

治積年腰痛有時發地厚子

未酒服方寸匕

○杜仲酒

治風冷傷腎腰痛不能屈

佛碎杜仲炒斷絲 右用無灰酒三

升浸十日每服二三合或爲末酒調

一錢下

○生膝酒

治腎傷風毒攻刺腰痛

地骨 五加 薏苡 芎 膝 卷

海桐皮略 生地 耐其右包入無

灰酒內浸冬七日夏三五日宿一法加

杜仲炒 每服一盞酒氣不絕

○五積散 治寒傷經腰痠寒門傷

加姜片桃欬

○神應丸 治腎經不足風冷乘之腰

痛或勞役傷腎或畏濕地或墜隨傷

損腰痛 葳二桂一飯酪一右為末

酒糊丸空心酒下茴香湯亦可婦人

桂枝湯下忌茶麪等

○麻黃蒼朮湯 治寒濕所傷身軀沉

重腰痛面色萎黃 沢白苓

麴炒陳絡一蒼 其後各杏仁猪

半 草炒 枝絡半芪炒右

○川芎肉桂湯 治冬月露卧感寒濕

腰痛傳治瘀血在足大陽少陰三經

腰痛多 卷半柴 桂桃 飯尾

蒼 其後各絡一獨 麴炒絡風

漢已酒製各 右酒煎

○腎者湯 治居處卑濕雨露所襲腰

冷如水重而痛小使有和謂之腎者

之証 姜炮苓絡半其後半木二半

右

○獨活湯 治勞役腰痛如折 獨

風 卷 沢 桂絡二大酒浸其

已酒栢酒炒飯 翹絡五桃三右

酒水煎

○豬痛湯 治濕熱為病有肯沉重展

節腰脇疼痛胸膈不利 木炒參

升 若參酒葛 蒼絡五知酒風

沢 芩 猪 飯絡六豨草 生芩

酒茵酒卷絡八右

○如神湯 治桂閉腰痛甚者不過三

服平安 飯 桂 延各等 右為末

每服一錢七熱酒調下或細切酒煎亦可

○**地龍散** 治腰脊痛或打撲損傷或

從高墜下惡血在大陽經腰脊痛或

髀股脛膈痛 飯尾仁桂 地龍略

○**熟大黃湯** 治墜隨閉胸膈痛不能

屈伸 大炒生姜略半右咬咀水浸

○一方治腰痛 大黃半生薑兩同切

如小豆大鐵內炒黃投水兩碗五更

○**治腰疼如神** 桂朮 仲妙去

右為末酒調下

○又苗香根搗爛酒下甚妙一方加紅

麴

○**敗毒散** 治風熱濕毒腰痛寒見傷

加續天苛瓜各等

○**薏苡仁丸** 治腰脇疼痛手足拘痺

薏苡仁細切附細參其

枳 栢子 芎 飯各半 膝 桃 各

分 乾地 右為末煉蜜丸酒下

○**塗藥** 治反腰有血痛 桂仁搗篩

醋和塗痛上乾再塗

○**療腰痛黃狗皮灸** 暴腰痛處取煖徹

為度頻即瘥

○**生薑** 搗爛鍋內炒極熱安地上出

火毒絹包裏烘熱繫腰疼處覺熱甚

妙

○**治反腰有血痛** 杜仲仁搗醋和塗痛

處乾復塗并灸足踵自肉際三壯

○治寒濕腰腿疼痛用蒼朮麩陳薤白如雞子大作餅子安於患處用艾十數炷灸之令透出汗為度其餅破不效不被病痊將餅送東流水永不再發

○灸腰痛不可俛仰令患人正立以竹扶柱地度至臍乃度背脊灸行頭盡處年壯灸訖藏竹勿令人知

○又灸腎愈七壯

○治腰尻痛崑崙穴在尻踵後眼骨上陷中

○治腰卒痛脊骨上一寸壯又左有一寸灸各七壯

○治腰痛灸腰俞

○頭暈 此風熱...

○陽虛

○經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人

善怒虛則目眩令人無所見耳無所聞善恐如人撻捕之云蓋因大怒而血

不歸經留本經而為脇痛或歲木太過而木氣自甚或歲金有餘而木氣

被鬱皆能令人脇痛經曰病脇下滿氣逆二三歲不已名曰息積是亦肝

木有餘之証也外有傷寒發寒熱而脇痛者足少陽厥陰二經病也治以

小柴胡湯無不効或有清痰食積流注脇下而為痛者或有登高隨仆死

血阻滯而為痛者又有飲食失節勞役過度以致脾土虛乏肝木得以乘

其土位為胃脘當心痛上交兩脇痛膈噎不通之証

○肥白氣盡發寒熱而脇痛 參芪補氣柴苓退熱木青調氣

○瘦弱人寒熱脇痛多怒者必有瘀血 桃紅散大柴青之類

○凡脇痛者多是肝木之餘也小柴胡加青芍為膽甚者煎成正藥入黛麝

○痰流注者本方倍半加橘紅星蒼白木苓芍之類 ○瘀血作痛者本方

合四物湯加桃紅或乳沒痛甚而元氣壯實者桃仁美氣下之 ○性急多

怒之人腹脇作痛者本方加芍青芍之類甚者以前藥送下當飯龍薈丸

○左脇痛以柴芍為君芍青膽為佐 ○右脇痛推氣散

○咳嗽脇痛一陳加星香附黛姜汁 云四物加青疎肝氣

○氣弱之人脇下痛脈細緊或弦多從勞役怒氣得之入物加木青或加桂

○發寒熱脇痛似有積塊是飲食太過勞力所致必用龍薈丸

○當飯龍薈丸 濕肝火大盛內有積熱兩脇痛者用之 飯 膽 施

連 栢 芍 略 大 黛 薈 略 半 木 麝 分 五 右 麴 糊 丸 如 桐 子 夫 每 服

二 十 丸 姜 湯 下 ○ 一 方 加 青 兩 柴 五 林 一 方 加 芍 柴 略 半

○椎氣散 治右脇痛甚脹滿不食 姜黃 枳 枳 桂 各 五 茸 後 五 右 為 末

姜湯下 水煎亦可 和芍散 治右脇疼痛不可忍

實 炒 芍 各 五 茸 後 一 右 為 末 姜 棗 湯 或 酒 調 下

○**芎藭湯** 治腸下疼痛不可忍

芎藭 細 風 枝路 八芍 枳

麻參 其路 右入姜

○**分氣柴蘓湯** 治腹脇疼痛氣促喘

急急 方見喘急門

○**加味二陳湯** 治濕痰流注脇內作

痛 方見痰門 加蒼朮

○一方治死血作痛 桃去皮 紅

乾 芎 香附 青 右等分水

煎

○**積殼煮散** 治悲哀煩腦有傷肝氣

兩腋骨痛筋脈拘急腰脚重滯大治

腸痛 芎 細 風 枳 枳 枳 枳 枳

半 萸 甘 後 各 右入姜水煎

○**三和散** 治脇痛皆痛妨飲食

○**積實散** 治肝氣不足兩脇痛

實兩 方 芎 參 絡 五 右 為 末

姜湯或酒下

○**天柴胡湯** 治傷 治脇痛口燥渴服

此仍間服者黃九 癖 心 治脇下疼

癖如神加蝎梢更妙

○**芍藥散** 治婦人脇痛 香附 醋

同 煮 白 芍 桂 延 各 右 為

末白湯調食煎服

○治脇痛如打大豆半并炒焦好酒一

升煮之熱飲取醉

○息積証脇下滿氣逆二三歲不已不

可針灸宜導引服白朮丸 朮 實

炒 桂 朮 半 陳 桔 枳 枳 枳 枳 枳

煉蜜丸溫酒送下

○**琥珀膏** 貼脇痛之處 大黃 扑

硝 礬 為 末 以 大 蒜 膏 調 貼 之

○芥菜子水研信○又方吳茱萸研水調信○又韭葉搗爛熟麩而以熨

○林 灸法治腸卒痛以繩橫渡兩乳中間屈繩從乳橫以趨痛脇下灸繩下屈處三十壯

○治腸痛不得卧章門二穴灸七壯在大橫外直臍季肋端側卧屈上足伸下足舉管取之

○治胸脇滿痛不得息丘墟二穴灸三壯在外踝下如前陷中去臨泣三寸

脚氣門 元

○傳 經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之蓋脾主四肢足居於

下而多受其濕濕鬱成熱濕熱相搏其病作是以先從氣衝穴陰核痛起及兩足脛紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋攣劇痛是其候也或一旬或半月復作如故漸冷而致足筋腫大如瓜者多有自之東南卑濕之地比之者是西北高燥之方鮮有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有內外之殊其為濕熱之患則一也

○大抵病因有內外之殊而治法無表裏之異耳故為治者宜通用二木之類以治其濕知栢條苓之類以去其熱飯生地方之類以調其血凡栢之類以行其氣羌獨以利關節而散風濕兼用通已膝之類引藥下行及消腫去濕

○男子多由腎虛而生，婦人亦因血海虛寒七情而病。

○自外入者止於下脘腫而痛，自內致者乃或至於手節。

○脚氣是壅痰，故用宣通之劑，若壅既成而盛者，刺惡血而去其腫，勢然後

藥之

○脚氣入心則恍惚謬言，吐食不入，眠

卧不安，左寸脉在大，右寸有毛無者，死。入腹則腰脚腫，小便不通，呻吟與

額皆里氣衝胸而喘，左尺脉絕者死。

○脚氣之禁第一忌噴，大則心煩脚氣發，又禁大語大語則傷肺發動，不得

露足，當風入水冷水洗足。○夏時騰理開不可當風卧睡。○暑月冬月俱

宜溫暖兩脛。○平生莫過酒，損胃下

法成脚氣。○不可嗜慾，管慾則脚氣

發。○忌濕食飽食，濕地濡衣。○每食

後行數百步，惡氣下散，經日逸者行

之。○每丑寅日割手足甲，少浸肉去

治濕熱脚氣方

菴 栢 鹽 酒 芍

瓜 沢 通 已 栢 菴 枳 楚

其炙香附 羌 〇痛加木 〇腫甚加

腹 〇發熱加大連 右水煎服 痛除腫

退則生服

防已散

栢 酒 菴 鹽 水 白 木 已 恪

分生地 栢 芍 各半 犀 屑 其 節

通 連 絡 三 右 水 煎 食 前 温 服 〇 有

熱加芍 〇熱甚及天令 〇熱加膏 〇

有痰加竹瀝姜汁或南星 〇大使秘

加桃 〇小便秘加膝 〇常腫者專主

濕熱○肥人加痰藥

○健步丸 蒼 飯尾酪 生地 芍

陳酪 膝 伍腹子 仁菜 條 芍 絡 五

桂 右為末湯浸蒸饒丸如桐子

大每服一百丸有湯木通煎湯食前

送下

○加味四物湯 治脚氣衝心 虛 方 現

加炒柏煎服更於湧泉穴用陷子末

津調作餅貼穴上以艾多灸引熱下

行

○一方治食積流注 蒼 已 栢

燿星 苧 芷 枳 犀 各等 血虛

加藤枝酒糊丸服

○轉筋屬血熱四物加酒芍紅有筋動

足太極上至入腿近腰結了此奉養

厚因風寒而作又當加蒼星

○菴活道滯湯 治脚氣初發一身盡

痛或肢節腫痛便溺阻滯先以此導

之用當飯粘痛湯以徹其和 菴獨

各一分 已 飯尾 各七分 大二分 實紅

右水煎

○當飯粘痛湯 治濕熱脚氣肢節煩

疼者背沉重胸膈不利及遍身疼痛

足悉腫痛脚膝生瘡赤腫

菴 苧 酒 芍 酒 苧 酒 其 後 各 風 大 飯

身 悉 知 製 沢 猪 木 絡 半 蒼 葛

升 參 苦 參 各 四 右 空 心 臨 卧 温 服

○麻黃左經湯 治風寒濕流注是太

陽經腰脚攣痺關節重痛瘡寒壯熱

無汗惡寒或自汗惡風頭痛脚軟

麻 葛 細 米 苓 已 桂

羌 活 風 絡 右 入 姜 蜜

○**辛夏左經湯** 治足少陽經為風寒濕流注發熱腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食煩心腿脾緩縱不能行

半 葛 細 米 門 苓 桂
○**風黃姜** 各半 小 草 其 柴 各
分右加姜棗○熱悶加竹瀝○喘加

杏 桑
○**天物附子湯** 治四氣流注足大陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足時浮腫 附 炮 桂

已 絡 一 甘 緩 五 木 苓 絡 七 右 入 姜
○**換腿丸** 治足三陰經為四氣所乘為攣痺緩縱上攻胸脇肩背下注脚

膝夜痛足心熱行步艱難 薏 炒
星 炮 斛 右 南 葉 枚 薛 膠 酒
差 風 瓜 各 四 錢 鉸 尾 一 天 續

各 一 右 酒 糊 丸 塩 湯 下
○**五積散** 治寒濕流注經絡脚膝腫痛 方 見 傷 寒 門

○**相傳杉木節飲** 治脚氣發作惡寒發熱兩足腫大心煩體痛垂死者

杉木節 兩 枚 牡 腹 酒 洗 一 兩 青 橘 葉 四 十 片
右作二服用順流水三升煎至一升分二服一日服盡如大便通利黃水其病除根未愈過數日再煎一劑服病根去為度外以杉木橘葉煎湯洗之神效

○**加味敗毒散** 治足三陽經受熱毒氣脚蹠上嫩赤腫痛寒熱自汗惡風或無汗惡寒 方 見 傷 寒 門 加 大 蒼 各 等 入 姜

○**竹瀝湯** 治兩脚痺弱或轉筋皮肉

不仁腹脹惡心不食 瀝升 其

芎藭 芩 麻 已 細 桂

姜略一風 升略半 苓三附於杏仁

右在咬咀以水七升合竹瀝煮取三

升分三服取汗有末一兩

○風引湯 治兩脚夜痺或不仁拘急

不得行 麻 膏 獨 苓 略 二 茶

附 芎 細 桂 參 風 芎

已 甘 略 姜 一 兩 木 三 杏 十 六 枚

右煎服取汗

○枳實大黃湯 治脚氣腫痛 大實

各半 羞 半 飯 行 右 水 煎 空 心 服 下

利一兩行痛止

○核柳湯 治一切脚氣腫痛順氣防

壅 核 香 附 陳 蘇 芎 五

加 甘 後 各 二 右 分 二 貼 入 姜 五 片

○婦人脚氣多由血虛加飯○室女

脚氣多由血實加芍○大便秘加大

黃壯者加枳實

○天腹皮散 治脚氣腫滿小便不利

腹 四 分 凡 仁 核 紫 蘇 子 微 蘇 葉

陳 荆 穗 白 烏 萊 菔 子 四 各

沉 桑 炙 枳 殼 各 二 分 右 入 姜 煎

○石南丸 治風毒脚弱疼痺脛腫生

瘡足心痛頭面浮腫心腹脹滿二便

秘澁 赤芍 五加 小豆 陳

麻 芎 仲 炒 腹 各 二 杏 去 皮 黑 牽

石南葉 薏 膝 各 三 獨 薺

凡 各 四 右 爲 末 酒 浸 蒸 餅 丸 如 桐 子

大 每 服 一 二 三 九 空 心 木 丸 湯 下

○木丸丸 治腎氣虛弱下攻腰膝步

履艱難 熟地 焙 陳 白 烏 藥 各 四

黑牽姓二杏 扶皮石南葉 膝酒

飯酒浸續 瓜赤芍 右為

末酒煮麵糊丸空心温酒送下

○三和散 治脚氣上攻胸腹滿悶大

便不通氣門

○紫蘘散 治風毒脚氣脚腫虛腫

蘘通入桑 苗各一 投各三

羌獨荆 瓜青 甘各七

腹子二分 右分三貼姜三片葱一莖

水煎

○澄寮方 治脚氣入腹衝心疼痛腫

滿大小便秘沉 木羌 白芍

枳各五 甘芎 青枳 各二 蘘

瓜各半 蕪子右入 姜水煎

○一方治風寒濕熱足膝痛赤腫脚骨

熱痛及痿癭 蒼米泔 浸一 栢

酒浸一宿 炙焦右水煎 空心服百用

○治婦人足腫 生地 栢 蒼 星

膽 膝 紅 芎 右水煎

○治脚氣筋骨痛 金銀花 瓜

飯 芍 桂 甘 右水酒煎

○核蘘散 治風濕脚痛 蘘 苴 各

各陳 甘 核 瓜各一 右加姜葱

○加減地仙丹 治風濕留滯下焦足

膝拘攣腫痛方見痛風門

○思仙續斷圓 治肝腎風虛脚膝痛

引腰背一切風毒流注薛

思仙木即杜仲 薏 風各五 膝酒

續 羌各三 生地 五加各一 右為

末酒三升化青塩二兩木瓜半斤去

皮子以塩酒煮成膏杵空心温酒

塩湯任下

烏藥平氣湯

治脚氣上攻頭目昏

眩喘滿脚膝酸疼

正神 甘草 多

芷 飯 木 芍 味 蘓子 烏

藥 凡 參 各 等 右入姜枣

搜風散

脚氣愈後可常服之

芷 芍 苓 甘 芍 飯 桔

略 陳 朴

枳 木 各 二 麻 祛 根

姜 施 各 蒼 十 一 兩 桂 醉 右入姜

林

治脚氣衝心悶乱不知人 大豆升水

煎濃者取汁頓服半升如未定可更

服半升即定

洗藥 王 外感濕和腫痛禁洗 滌內致

濕氣淋滌開道瀉其邪 礬石 右用

漿水一斗五升煎沸浸脚治脚氣衝

心

又方

蕨 風 荆 地骨 飯

升 白芍 糊 藿 葉 各 等 右到咀水

二斗煮一斗五升去粗熱淋洗

又方治脚氣每朝用塩搽腿膝至足

甲淹少時却用熱湯泡洗

敷藥

芷 蒼 卷 各 半 細 半 右

為末姜汁調敷患處

一方治脚氣止痛草烏同酒糟搗爛

點 姜 汁 調 草 烏 點 又 可

又小豆南星為末姜汁調塗

又時嗅者煮熟蘿蔔令飽以下氣醋調

氣飛麴 菴 扁 廋 處

又猪牙皂角 各 等 大皂角木香 各 等

右為末醋調先於不腫處塗之截斷

毒氣不令上冲次塗下腫留消失不

塗仍剪去足爪甲出毒氣

○**艾草為** 芷 風 獨 老 各 等

右為末生地龍數條研爛米醋調敷

○一方治脚氣痛不可忍黑牛糞以衣

水調開敷患處用布裹於暖處蓋之

痛立止

○**林** 脚跟疼不著地黃牛糞入塩炒熟

几脚氣服補藥及用湯洗者皆醫

之大禁也

○**王** 脚氣是壅疾故用宣通之劑若壅既

成而盛者刺惡血而去其腫勢然後

藥之

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 黃疸, 濕熱, 脾胃, 中久, 不散, 故其, 土色, 形于, 面與, 肌膚, 丹溪, 曰不, 必分, 五等, 是濕, 熱如, 蠶, 廾, 黃疸, 之病, 當以, 十八, 日為, 期治, 之十, 日以上, 為差, 又刺, 者難, 治, 病疽, 而渴, 者難, 治不, 渴者, 其病, 易治, 發於, 陰部, 其人, 必嘔, 發於, 陽部, 根寒, 而發, 熱, 諸黃, 疸但, 宜利, 小便, 脈浮, 當以, 汗解, 之宜, 黃芪, 建中, 湯, 黃疸, 小使, 色不, 變欲, 有利, 腹滿, 而喘, 不可, 除熱, 熱除, 必噦, 今者, 宜小, 半夏, 湯, 方見, 傷寒, 門, 病酒, 發黃, 必小, 使不利, 心中, 熱足, 下

○**黃疸**

夫黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋

濕熱鬱積脾胃之中久而不散故其

土色形于面與肌膚

○丹溪曰不必分五等是濕熱如蠶廾

○黃疸之病當以十八日為期治之十

日以上為差又刺者難治

○病疽而渴者難治不渴者其病易治

○發於陰部其人必嘔發於陽部根寒

而發熱

○諸黃疸但宜利小便脈浮當以汗解

之宜黃芪建中湯

○黃疸小使色不變欲有利腹滿而喘

不可除熱熱除必噦今者宜小半夏

湯方見傷寒門

○病酒發黃必小使不利心中熱足下

熱又心中懊懣而熱不能食時欲吐
名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者
吐之即愈又曰酒疸心中實熱而煩
宜小柴胡加茵大連葛藟

○額上黑微汗出手足心熱薄暮即發
○勝既急小便自利名曰女勞疸腹如
○水狀不治

○又曰黃家目睛黃發熱而反惡寒此
為女勞得之勝既急小腹滿一身盡
黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹
如水狀大便必黑時流此女勞之病
非水也腹滿者難治硝石散主之

○林黃疸通身面目悉黃宜生料五苓散
加茵陳又宜小柴胡加茵苓實
穀疸食已頭眩心中拂鬱不安飢飽
所致胃氣蒸衝而黃宜小柴胡加穀

芽朴實施大黃

○黃汗者因脾胃有熱汗出入水濕浴
所致故汗出黃染衣而不渴黃芪散
茵陳湯又以苦丁香豆大深吸鼻中
出黃水而瘥

○急黃者脾胃有熱穀氣鬱蒸因為熱
毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在
頃刻故云急黃有得病即身軀面目
發黃者有初不知是黃死後及身面
黃者其候得病但發熱心戰者是急
黃也宜速用梔子丸

○諸疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱
小便有澀此為濕証宜四君子湯吞
八味丸不可過用涼劑強通小便
○脈經曰寸口脈近掌無脈口鼻冷並
不可治

○黃芪散 治黃汗 芪絡赤芍 茵
絡三 膏從門 豉絡半 其後粉七

右分二貼入姜三片
○茵陳散 治黃疸 茵 通 施 各

粉六 大二分 不膏 不粉 其後 不右作
半貼姜二片葱一莖水煎

○黃連散 治黃疸 二便秘澀壅熱累
効 連杜大 一兩醋 芥五 其後 五右

為末每服二錢食半飽溫湯調服日
三服

○梔子湯 治時行急發黃如腹脹氣
喘不消 茵 施 芒 大 蒸各二

杏微粉 豉 鮮 碎 浸 驚 鑿 常 巴 祛 油
不右為末餅丸如桐子大每服三丸

米飲下得即利効未効加一丸此証
殺人最急如覺氣有異便急製服

之不拘時
○茯苓施子湯 治黃疸寒熱嘔吐而
澁欲飲冷身目黃小便不利不得安

卧全不思食 白苓 二 不 沢 粉 不 茵
經已 苓 木 連 施 蒼 白 木 味

並米 陳 青 絡 一 右 木 煎 一 方 加
枳實 萎 炒 不 右

○茵陳蒿湯 治穀疸寒熱不食心
頭眩心中不安 茵 仇 大 粉 不 施

○葶根湯 治酒疸 葶 從 實 炒 施
豉 絡 三 其 後 半 右 水 煎 本 方 去 葶 其

加大 五 名 梔 子 枳 實 大 黃 湯 治 酒 疸
心中懊懣或熱痛可服

○酒蒸黃連丸 治酒疸發黃小便不
利 連 法 蒸 三 好 酒 瓶 右 封 黃 連

利 連 法 蒸 三 好 酒 瓶 右 封 黃 連

以酒煮乾為度為末水者麵糊丸如梧子大每服二十丸食後一服湯加蒼茵等分姜棗煎湯送下○傷酒下血米飲吞下

○石木湯 治酒疸下後變成黑疸目青面黑心中如絞非狀大便黑皮層不仁脈微而數 桂 木 投共妙各三 芍 杏去皮尖 豉 其後各一

○當飯白木湯 治酒疸發黃結聚飲癖心胸堅滿不飲食 木 苓 枳殼前 杏去皮尖 飯浸 苓 其 炙茵各七 半不 右分二劑入姜

三片 治醉後行房酒熱蓋於心經方見 遺再 加辰行茵陳湯下

○辰砂妙香散 治醉後行房酒熱蓋於心經方見 遺再 加辰行茵陳湯下

○大參散 治飲酒房勞酒入百脈恍惚失常 參 栝 枳殼 白芍 神酸絡二 其後 半熟 地行 右水煎

○一方治黃疸 芍 連 施 茵 猪 泚 蒼 青 膽各五 ○穀疸加稜菝宿陳通石木煎

○硝石礬石散 右二石等分煨為末每服二錢以大麥粥汁和服取汗愈

○茯苓湯 治胃疸消穀善飢面色萎黃心中煩熱胸脇脹滿小便赤澀 赤苓 陳酥泚 桑絡三 赤芍 木參 桂絡二 膏以 病甚 者加 大黃枳

硝絡一 右作一 服加 姜伍 ○胃冷湯 治脾胃不和黃腫方見 泄小 便赤 澀者 加滑

○腎疸湯 治腎疸目黃或黃小

便赤澀

升菴獨風藁

柴葛 木絡半蒼行猪細河 其
麴燒參絡三苓 栢絡二石方無

分二

○百藥五苓散

治傷寒或伏暑發黃
小便不利煩渴本方加茵陳入姜棗
煎服

○百藥扶苓湯

治發黃脉沉細數四
肢冷尿澀心躁而渴 苓 枝 猪
各一滑半行茵行右煎服如脉未出
加飯一

○茵陳四逆湯

治發黃脉沉細而遲
肢躄逆冷腰以上自汗 其一

○養榮湯

治五疸脚弱心忪口淡甘
鳴微寒發熱小便自澀作虛勞治之

方見虛
損門

○秦丸散

治証同前 凡飯酒
芍米 桂 陳 赤苓 熟地
小草 芎略分一半七其後半右入

姜

○治黃疸

絲瓜連子燒灰為末因麴
得病麴湯下因酒得病酒調數服可
愈

○一方濃煎樺木汁時飲之多服効

○一方柳枝一杷濃煎汁不拘時服

○治心急黃疸百合蒸過蜜和之食之

作粉食尤佳紅花者名仙丹花不堪

食白花者可用

○治皮膚眼睛如金色生蔓莖子為末

熟水調每服二錢不拘時服

○治黃疸身眼皆如金色東引桃枝一

握細切用米二鍾煎至一鍾去粗生
心酒服令後二五日黃如薄雲散多
服麩百疋左平服身黃漸散後可時
少飲一盞飲酒則眼中黃易散不飲
酒則黃散遲忌食熱麪猪魚等物凡
修合不可令婦人雞犬見之
○治黑疸多死宜急治括麥根一斤搗
絞汁入合頓服當有黃米隨小便出
如未出更服之

消渴門 九四

傳
經曰二陽結謂之消東垣曰二陽者
陽明也手陽明太陽主津液若消則
日黃口乾及津液不足也足陽明胃
主血若熱則消穀善飢血中伏火乃

血不足也結者津液不足結而不潤
皆燥熱為病也此因數食甘美而多
肥故其氣上溢轉為消渴

○岐伯曰脈實病久可治脈弦小病久
不可治

○并溪曰三消者多屬血虛不生津液
俱宜四物湯為主

○上消者肺也多飲水而少食小便如
常加參門五味天花煎入生藕汁生
地汁人乳飲酒人加生薑汁

○中消者胃也多飲食而小便赤黃也
加知膏滑寒水降胃火

○下消者腎也小便濁淋如膏加柏知
熟地五味淋腎水

○未傳能食者必發腦疽背癰不能食
者必傳中滿鼓脹皆為不治之症

○能食而渴者，白虎加人參湯，不能食而渴者，錢氏白朮散倍葛根。

○太法黃連天花粉二味，為末，藕汁人乳汁生地黄汁佐，以蜜姜汁為膏，和一味，留舌上，徐以和湯少許送下，能食者加石膏。

○天花粉治消渴之聖藥也。

○凡消渴藥中大禁，半夏及不可發汗。

○消渴証人皆知其心火上炎，唇赤下泄小便愈多，津液愈竭，飲食滋味皆從小便消焉，是水火不交濟然，孰知脾土不能制腎水而心腎二者皆取氣於胃，平當服參苓白朮散以養脾，自生津液，兼用好粳米煮粥，以養肉，碎細入塩醋油葱椒薑調和，煎熟而後入，以此養腎則水有所司。

○九消渴大忌，飲酒房事食油麵煎炙，燥蒸鹹物及一切熱物百日以上，不可針灸瘡中生膿水或成癰疽膿水不止者死。

○傳和血益氣湯 治口乾舌乾尿數各

赤生津除燥生肌 柴 甘草生耳
 麻黃根 絡三 飯梢 酒洗 知 酒洗 菴 蕪
 已 酒洗 各 膏 杏 去皮 桃 去皮 尖
 生地 酒連 酒洗 分 栢 酒洗 升 絡 紅 砂
 右水煎忌酒醋熱濕麵

○當飯潤燥湯 治小便多大便秘渴

好溫飲香乾口燥眼澁難開陰頭濕縮 細分生耳 炙耳 熟地 各
 分一本 柴 分栢 酒洗 膏 桃 飯
 身 麻仁 風 荆穗 絡一升 手
 紅砂 杏 仁 小椒 右水煎忌辛熱物

○生津甘露湯

一名清涼飲子

治消中能食

而瘦口舌乾自汗大便燥燥小便頻數酒麩膏栝栝半酒芍酒知甚灸其柴卷絡一飯身秋升和生耳生地風漢已絡不紅紗挑任杏仁右水煎入酒一匙稍熱服

○幸潤緩肌湯

前証終愈此有口乾

腹不能忍此藥主之生地細栝栝熟地膏栝栝酒連生耳知絡半柴飯身荆穗桃風

絡一升半不紅紗杏仁小椒粒右

○人參白朮湯

治胃膈瘕熱煩滿飢

不欲食為消中善食而瘦多飲水而小便數及酒過中風產後煩渴參朮飯芍施大荆穗芍

栝知知沢絡五苓翹栝

葛栝二甘兩藿青木桂寒水

栝二膏兩白滑八右為末入姜煎入

蜜少許服得利取效

○絳雪散

治消渴飲水無度小便數

者大効芍芩黃丹漢已萎栝

分為末溫漿水調下

○人參散

治腎消善飲而食小便頻

數白濁如膏參芍朮沢栝

栝施翹縮絡二葛芩大

苛有芍栝五芍七膏徑滑寒各

以右水煎入蜜少許再煎腎消食前

上症食後服

○麥門冬飲子

治心移熱於肺名膈

消心膈熱久則引飲為消渴門去

行栝知芍五味生地參

菖 神絡半 右作一服入竹葉七片

○原蚕繭湯 治腎消白濁及上十二

消飢渴不生肌肉其效如神 原蚕

却海養批蚕也其繅絲湯極效如無
繅絲湯以重煎絲綿煎湯皆可代之

○防風羌活散 治一陽病心脾受之

精血虛少真氣日消口乾 芪蜜絲

半斛 風 枳殼 參 生地 苓

斷 附炮五味 膝絡一續狂地骨

七分右水煎

○參苓丸 治胃中結熱消穀善食不

生肌肉名食飢 參 苓 苜

遠 膝酒地骨各等 右煉蜜丸米飲

下

○加味白朮散 治消穀善飢 參

朮 苓 甘 多藿各一分 葛 三分

米 枳殼 五味 柴各八分 右水煎

○獲神丸 治消中煩熱消穀小便數

參 神 生地 枳殼 連 門 蚘

蓮 芪 蠟 知 絡 五 菱 各 一分 右煉蜜丸

湯下

○生地黄飲子 治消渴咽乾面赤煩

燥 生地 天門 麥門 參 芪

蜜斛 炒枳殼 枳殼 枳殼 各一分 右

熟地絡新 右

○天神湯 治三消渴疾 蓮房 菖

枳殼 枳 芪 蜜 右等分小便不

利加苓

○三和甘露飲 大治消渴有此証者

每日必頻進一二服 滑石膏 細知

參 朮 苓 沢 絡 半 其 猪 各

右分三貼加葛粉天花粉各一分 水煎

○降心湯 治心火上炎腎水不足煩

湯引飲氣血且治遠用甘草水

煨料飯身熟地白苓或

五味甘粉石人糞
煎食後溫服

○三消丸 治消渴骨蒸 黃連為末

搗丸自然汁和未成餅陰乾無為

未再用冬丸汁拌和成餅如此七次

又用冬丸汁丸如梧子大每服五十

丸冬丸煎湯下或大麥煎湯下

○茜莖湯 治肺消飲少澀多 莖行

炙 五味 參 門 桑 各 拘

○栝蒌散 治心慾腎氣虛弱不能房

室却多服丹石燥藥唇口乾焦精自

泄小便頻併白苓 天花門連

白遍膏 水 甘節 寒水 參

指 右等分為末白湯調下

○珍珠粉丸 治腎消白液因澀而下

或夢遺精滑方見尿濁門

○三才封體丹 治証同前方見虛損

○烏梅木瓜湯 治飲酒積熱血液焦

枯小便多肌肉消好冷飲 梅方 木瓜

○硃砂黃連丸 治心虛蘊熱或因飲

酒過多發渴疾 辰兩 生地兩 連

兩右煉蜜丸煎燈心棗湯送下

○酒蒸黃連丸 治名黃連丸解酒毒止

渴

○三神湯 治証同前 烏梅 遠 草

沐煮 姜 實 炒 右每服七錢

糯稻根一握如無以菜根代之加

連伍

○**和成八味丸** 治腎水枯竭 火熾

炎煩渴 尿數肌肉且削 熟地

山藥 山茱肉 桂 附 牡 白苓

沢 絡 八 五 味 料 兩 右 煉 蜜 丸 如 桐 子

大 五 更 初 末 言 時 塩 湯 送 下 五 十 丸

牛 時 日 晡 一 日 三 服 〇 房 勞 傷 腎 冷

水 竭 心 火 炎 上 口 舌 焦 乾 消 渴 使 數

精 神 恍 惚 羸 瘦 加 鹿 角 兩 一 沉 伍

〇**消痞丸** 治 二 焦 壅 滯 癰 熱 消 渴 及

心 火 盛 而 咳 血 下 血 等 証 連 葛

黛 小 麥 三 絡 苓 大 相 施 尙 苛

藿 朴 茵 砂 絡 桂 白 木 絡 一 右 水

糊 丸 食 前 白 湯 下 〇**加 減 二 黃 丸** 治 消 渴 及 服 丹 石 成

消 渴 苓 春 四 兩 夏 秋 六 兩 冬 三 兩 大 春 三 兩 夏 一 兩 秋 二 兩 冬 兩 連 春 四 兩 夏 七 兩 右 煉 蜜 丸

〇**錢氏白朮散** 亦治消渴 參 行

朮 苓 其 絡 半 藿 木 絡 一 葛

枳 絡 三 右 水 煎 空 心 送 下 二 黃 丸 最

妙 〇**有虎加人參湯** 治 嘔 消 煩 渴 不 欲

多 食 〇**清心蓮子飲** 治 渴 而 小 便 濁 或 澀

〇**玉泉丸** 治 煩 渴 口 乾 門 參

苓 芪 蜜 生 半 烏 梅 焙 其 酪 一 枳

葛 酪 半 右 煉 蜜 丸 温 湯 下

〇**至壘丸** 治 消 渴 引 飲 無 度 參

枳 各 等 煉 蜜 丸 門 冬 湯 下

〇 治 肺 燥 熱 渴 大 腸 秘 枳 麥 實 丸 月

十 月 間 取 穰 以 葛 粉 拌 焙 乾 銀 石 器

中 慢 火 炒 末 食 後 夜 卧 沸 湯 服

○主胃中熱消渴利水 陳粟米炊飯食之良

諸蟲門 九五

傳 ○經曰腸胃為市無物不受無物不存又曰飲食自倍腸胃乃傷若失飲食不能謹節則朝損暮傷自傷成積久成熱濕熱相生而諸般奇形之虫各從五行之氣而化生若腐草為螢之類是也其諸虫依附腸胃之間若元氣尚實未為大害稍有虛損遂能侵蝕隨其虫動而變生諸病也若夫腸噎勞瘵癩風蟲脹狐惑等証無不生虫
丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕

○上半月虫頭向上易治下半月虫頭

向下難治 以上月字並且作日字蓋虫無半月轉頭之理

○先以蜜或砂糖或炒肉吃引虫頭向

上然後用殺虫藥

○腹內熱腸胃虛虫行求食上唇有瘡

口惑更食其藏下唇有瘡口狐虫食

其肛

○藏寒蛔虫動作上入膈中煩悶嘔吐

時發時止得食即嘔常自吐蛔謂之

蛔厥

○林 經曰既者長虫也胃中冷即吐既虫

謂之蛔厥理中湯加炒川椒研碎

吞烏梅丸效既見椒則頭伏故也

○烏梅丸 梅 細 附 炮 桂 參

栝各六分 飯 椒各四兩 姜兩 連六分

右以苦酒浸烏梅一宿去核

泥餘藥為末和勻入蜜料先煎
大每服二十九丸米飲下

○集効丸

治藏府虛弱多食甘即

虫動作心腹疼痛發作往來腹中煩
熱口吐涎沫即是蛇咬又療下部有

虫生痔痒痛大對炒木 枳 虱

妙訶煨去核酒附炮去 蕪 煨姜炮

一兩 右煉蜜丸陳皮湯下婦人醋

○花虫丸

小兒病多有虫因藏府虛

弱而動食甘肥腹痛嘔吐清水面青

黃寒熱沉嘿不知痛處 虱 枳

胡粉炒 練根去浮皮 白礬一兩二 右

為末麩糊丸如梧子大一歲五丸米
飲下

○木香三稜散

治腹中有虫面色痿

黃一切積滯 黑丑半炒半 腹子

枳略 雷丸 錫灰煨 枳 煨木

大略 右為末每服二錢空心蜜水

調服

○通仙丹

逐虫積消痰癥 枳 斤

大枳後 枳各 牽斤 木不 漏

右為末皂角斤 去皮核切碎用水

六碗浸一宿冬二宿去粗磁器熬膏

待冷和藥丸如桐子大每服四十九

壯弱加減茶清五更初下如未通再

喫溫茶清助之下 虫積惡物盡了白

○桃仁湯

治狐惑之証 桃 槐子

艾絡五 大棗十五 水煎

○雄黃銳散

治前証 雄 青

苦參 連絡二桃行 右為末中

艾叶和槲如小指頭大內穀

虫食其肛也

○外臺化虫丸 能化虫為水 疏兩

木紅蜜陀僧 附炮一枚右先以附子

末醋一盞熬膏餘藥為末和勻丸劑

芥茶清下

○丁方 黑鈆成槌末各等米飲調

下

○丁方 棟根 虱 槌 二味濃煎湯飲之

○丁方 酸石榴根陳引者槌細切右

以水七升煮取一升半去粗以糲米

者稀粥空腹食之小聞虫死快利又

苦棟根生者棟引刮去鹿皮取白

皮二兩以水二碗煮一碗半去粗用

晚糲米二合煮糜粥空心先吃炒肉

引虫向上進藥粥一二日少頃又吃

下二日漸加至一碗二碗虫盡下而愈

○祖傳槌柳丸 治小兒疳積塊腹

痛有虫証 茵荻 稜細切醋

槌實槌陳雷漆盡

芽麩麵各蕪半不風略甘炙

木好見胡連各良陳壁土縮行右

醋糊丸空心炎姜湯下加使君肉紐

○林 治蛇虫攻心痛 薏苡根切斤水

七升煮三升先食盡服之虫死盡出

○治蛇虫攻心如刺吐清水龍膽兩水

煮去粗隔宿下且頓服

○治虫心腹痛 青代蠶麵糊丸冷水送

下

○治寸白虫 雷丸水浸去皮切焙置

為末五更初先食炙肉便以銅錢

藥稀粥調服之

○又樵子日食七顆七日滿更化爲

○治重食下部痒漏蓋一把水二升煮

空心服

○**衄血門**

北六

傳 口鼻出血者皆是陽盛陰虛有并無

降法宜抑陽補陰四物加知柏爲主

治

又曰衄血涼血行血爲主犀角地黄

湯入鬱金方見傷寒門

傷寒衄血者邪氣不得發散壅盛於

經逼迫於血因而致衄也解經中邪

氣則愈脉浮緊麻黃湯浮緩桂枝湯

微者一藥俱不可用宜黃芩芍藥湯

傳 ○**人參飲子**

治衄血全加羌活名門冬

弱氣促氣弱精神短門飯身白

芍 芎 絡 參 芪 絡 半 五味 枳 右

○**生地黄散**

治鬱熱衄血咯血等証

芪 生地 熟地 枸杞 地骨 柴

連 白芍 芎 天門 芎 絡 等 右

林 ○**門冬飲子**

治衄血不止 門 生

地 等 右

○**五黃丸**

治衄血不止大便結燥者

大 麻 芒 生地 絡 六 芎 行 連 仁 枳

芩 行 右 爲 末 煉 蜜 爲 丸 如 桐 子 大 每

服 三 十 丸 食 後 白 湯 下

○**茜根散**

治衄終日不止心神煩悶

茜 芩 膠 粉 側 柏 葉 生 地 絡

等 其 後 下 右 入 姜

○**川芎三黃散**

治積熱衄血加薑

芎 芩 連 絡 等 右 爲 末 每 服 一 錢
食 後 井 水 下 入 茶

○**正血散** 治氣鬱發血 芩 茨 赤 苓
白 芍 故 酒 生 地 膠 等 分 石 水 煎
臨 卧 服

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

○**黃芪芍藥湯** 治衄血多歲面黃眼
洗 手 麻 芩 配 其 兩 二 升 葛 芍
各 一 卷 酢 右

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

在入髮際一寸

又大椎啞門灸二三壯即止啞門入

後髮際五分

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

在入髮際一寸

又大椎啞門灸二三壯即止啞門入

後髮際五分

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

在入髮際一寸

又大椎啞門灸二三壯即止啞門入

後髮際五分

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

在入髮際一寸

又大椎啞門灸二三壯即止啞門入

後髮際五分

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

在入髮際一寸

又大椎啞門灸二三壯即止啞門入

後髮際五分

右研吹入鼻孔

治衄血百治不止 蒲黃血竭爲末

吹 灸法口鼻出血不止灸上星五十壯

○唾血咯血及潮熱咳嗽在腎中來也
本方加梔柏並鹽炒桂炒

○治吐血醫金為末以姜汁童便和酒調服

○又童便二分酒一分補側柏葉溫飲

○又乾姜炮為末童便調服

○旋子最能清胃脫之血

○唾血用二門知貝桔柏熟地遠或加

○咳血痰盛身熱多是血虛用黛茶詞
貝梔海石為末姜汁蜜丸陰化嗽盛

○者加杏後入物加煨調理
○二黃補血湯 治吐血 莖 飯
柴絡一熟地 芎絡一芍 芍 生地
絡二壯 升絡半 右

○黃連散 治咳血成方 方見咳門

○一方 治痰帶血咳出 木一
飯 芍 壯絡 桃 門絡半 菹分
黑妙 其生 三分 右水煎

○雞柳散 治方傷肺經咳嗽有血
雞柳一 葛 生地 膠珠貝 茅

絡 桔 蒲炒 門 其絡半 右水煎
林有桑微 半

○犀角地黃湯 治吐血成方 方見傷寒

○四生丸 治吐血成方 陽乘於陰血
熟艾行 生荷葉 生艾葉 生

地 生側柏葉絡 等細研丸 鹽湯下

○聖餅子 治咯血 黛行 杏四 右
研杏仁入黛末作餅子以柿餅一 餅
破開以藥餅置於柿中合濕紙包煨
連補研細米飲調下

○赤茯苓湯 治暴怒傷肝氣逆胸中

吐血衄血 赤苓 參 桔 陳

絡三門 芍 枳 絡 右加姜

○飯脾湯 治思慮傷脾心健忘吐血

下血 枳 腹 症

○和味理中湯 治醉飽傷胃吐血其

色鮮紅 參 姜 炮 末 絡 三 芍 行

○百末散 治飲食過度傷胃吐血

血 末 參 白 苓 苾 蜜 灸 各 一

百合 前 柴 絡 六 多 芍 行 右 入 姜

麥

○雞蘇散 治虛損氣逆吐血不止

雞蘇 芍 絡 軒 飯 酒 芍 絡 半 膠 炒 三

苾 小 蘗 生 地 絡 軒 伏 龍 肝 行 右

分 二 匙 姜 二 片 竹 茹 一 彈 大

○側柏散 治內損吐血下血或因酒

太過血妄行口鼻皆流須臾不止則

死 側 柏 散 各 半 參 荆 穗 各 一

右為末入飛羅麵一錢每服一錢

新汲水調如稀糊空心服

○生地黄散 治衄血吐血下血屬熱

者方見衄血門

○救脈散 治吐血屬羸脈虛渴

升 柴 參 蒼 苾 飯 酒 熟 地

芍 苾 蘇 木 絡 三 炙 其 陳 絡 半

○一方 治吐血 百草霜 白芷 絡

分為末每服一錢糯米飲下或加

蚌粉等治損傷吐血用側柏葉

○一方 側柏葉 焙 為 末 每 服 一 錢 米

調下尤妙

飲調下

○**一方** 治吐血 陳椴花 醋 二百草
霜 伍為末 湯煎湯下

○**黑神散** 治食飽吐血 羌血妄行 口

鼻俱出 但聲味失 昔效百草霜 取村
中燒草 銅底煤 最妙為末 每服一錢
糯米飲調下

○**傳** 治吐血 如線 槐花炒末 參之 〇又

蒲黃炒焦末 仕之妙

○**灸法** 治虛勞吐血 灸胃脘 二百上

即上院在 巨關下 一寸

○治吐血 嘔血 上氣 咳逆 灸肺俞 年壯

○治吐血 嘔逆 灸太陵 穴在掌後兩骨
間 手厥陰經之俞之穴也

下血門 九八

○**傳** 大便秘下血 有熱 有虛熱 四物加炒地

升 升膠 虛四物 加干姜 炮升

○便血 有風 邪下陷 者 蓋風傷肝 肝生

血 故也 宜升提之 四物加風荆 升柴

芫 槐 枳 條 岑 地 榆 枳

○有濕傷血者 宜行濕消熱 一木連

飯 芎 芩 視 地 榆

○因積熱下血 蒼 陳 略 行 翹 行 芩

連 栢 絡 半 為 末 地 黃 膏 丸 服

○血黃前來 曰 近血 四物加枳 岑 實 槐

○血黃後來 曰 遠血 四物加通連

○治近血 面色黃 榴皮末 茄子枝煎

湯調下 錢下

○治遠血 不止 艾葉 不以多 姜汁 一

合和服

○壬治先血後糞 赤豆湯 飯等爲

○壬治先血後糞 赤漿水調服

○治先糞後血 伏龍肝炙甘草 熟地

膠 芍 朮 略 三 右 咬咀 水煎服 名

龍肝湯

○意腸風藏毒 因坐此風濕醉飽房勞生

冷停寒酒麴積熱所致 ○枳 煎下血

清而鮮腹中右痛清腸風 連柴 ○枳

冷下血濁而色黯腹中略痛濁藏毒

桃散

○治法太要先解散腸胃風邪熱則敗

毒散冷者不換金正氣散

○傳方 治腸風下血 桃 大 各 三

飯 煑 皂角仁 栢 荆 枳 略

久 蠟 皮 煑 連 煑 片 枳 角 子 略 丁 右

爲末 麴 糊 丸 如 桐 子 大 每 服 五 十 丸

白湯 日如鮮血下其甚者加蒜栢灰蓮
房灰 各 五

○治便血 白芷五倍丸服效

○寫梅丸 治下血如神 蚕炒 兩 烏

梅肉 一兩半 右醋糊丸醋湯下

○槐花散 治腸風藏毒下血 槐 煑

側栢葉 枳 荆 穗 枳 煑 炒 右 爲 末

心米飲調下

○加減四物湯 治腸風下血 生地

飯 芎 側 略 八 枳 煑 槐 煑 枳 穗

甘 酸 地 榆 條 芍 風 略 六 烏 梅

大 醋 右 入 姜

○當飯和血湯 治腸辟濕毒下血

槐 煑 青 荆 穗 熟 地 木 略 六 飯

身 升 絡 丁 芎 四 右 爲 末 每 服 三 錢

米飲調下

秘方枳殼湯

治腸風下血

枳殼

一連一兩以槐花四右水煎

升陽去熱和血湯

治腸痔下血

作一汎嚼之然出者有力而遠因散

腸中痛熱毒所作也 陳分熟地

飯身 蒼朮 桂枝 生地 牡

生芍各五升炙炙甘草 芍各一白芍

半不右

林敗毒散

治風熱入大腸下

血不止加姜芎桑烏梅 因酒毒

通

防風散

治食熱物過多風氣蓄盛

銷燦大腸脂膏以流滲下血 卷

風荆

枳殼 蚕豆 芎 右等分水

煎

胃風湯

治腸胃受濕下如豆汁或

如瘀血 方見泄瀉門

黃連湯

治便後下血腹不痛者

毒下血 連 飯各半 甘草 右水

煎

芍藥黃連湯

治大便後下血腹痛

謂熱毒下血 芍 連 飯各四不

大 桂枝 甘草 右水煎 痛者

調木槿末送下 黃丸

聚金丸

治因酒毒大腸蓄熱下血

不已 芍 風 各一連 四兩生 一兩

一兩 右醋糊丸空心米飲下

平胃地榆湯

治結陰便血

陳 芍 朴 葛 姜 各半 地榆 牡

甘草 飯 麩 煨 白芍 參 益 路 二

蒼 升 附 炮 各 右 姜 棗

槐角散

治腸胃不調膿血

蒼 升酒陳 飯 投 煎 用 二
甘 烏梅各半 右木煎

○下血因寒者四物加升姜炮揀灰

○卷柏散 治藏毒神效 卷柏 焙 路

○分爲末米飲調下 或酒調下 或水

○又補骨 煙上薰乾 爲末米飲調下 隔

年者尤佳 或酒調下 或水

○又積子 研破袋盛用酒三盞煎

至三盞服 煎服立止 或酒調下 或水

○又荆穗宿穉爲末米飲調下 入百葉

霜一錢亦何 或酒調下 或水

○治瀉血乾柿餅燒灰存性清米飲調

下三五錢立止

○灸法治便血不止灸脊中對臍下穴

○又灸旁宮二穴在掌中橫紋屈無名

指著處厥陰之經也中指頭與無

名指頭之間也

○又灸太白二穴在足內側核骨下隴

中太陰經俞穴也

○又灸會陽一穴在陰尾骨兩傍

○又灸三里二穴在膝下三寸斷筋外

膝兩筋間舉足取之

○玉 按血症宜灸然火熱脈盛實者非所

宜

○弱血門 元九

○王 尿血因心腎氣結或憂勞或房勞得

之

○心 尿血屬熱有血虛熱炒梔水煎服血

虛四物加膠生地

○慮 小便出血不痛者血從精道中出也

四物加連柘條苓

○又白血出於小便者或四
槐以清之或四物加滑通之小劑以
行之

○惠 瀉血或四物加連按灰或用六味地
黃丸方見淋門

○治赤瀉血髮灰每服二錢淡醋湯調下
急治瀉血神效 生地四分小劑 滑

通炒蒲炒竹葉 藕節 飯酒 煎點
其各七分 右水煎

○一方五苓散合四物煎服

○一方拖子炒為末水煎連服之
林 生地黄飲子一名生地黄黃散治瀉血
屬熱者如脈微身涼惡風加桂

○一方竹茹一大塊水煎服

○又飯苳為末每服二錢米飲調下
○治尿後有血乾柿燒存性為末米飲

調下

○治小便出血酒蒸黃連丸方見瀉門
第根煎湯下

○又辰砂五苓散方見傷寒門灯心煎
湯調服本方加辰砂

○茯苓調血湯 治酒麪過度房勞小
便出血方見淋門

○鹿角膠丸 治証同前方見淋門
傳 小兒尿血甘草升麻煎湯調益元散

○凡用血藥不可單行單止又不可純
用寒涼藥必加辛溫升藥如加涼藥

用酒煮酒炒類乃寒因熱用之法也
○單琥珀散為末燈心薄荷煎湯調服

二錢治小便尿血神效

○脫肛門

傳法音工下切 病也俗作肛非

三十

脫肛屬氣血虛與熱○氣虛者參芪升
芩○血虛四物○熱加柏

○丁方

治腸風下血等証 乾柿餅

燒存酒瓶箬三酒過一在者或烏梅
各存性百藥煎一兩如無以五倍
槐花半兩炒枳半兩炒右為末醋糊

丸如桐子大每服七八十九醋湯下
或加換餅

○蠟皮散

治肛門或因洞泄或因用石

脫症在性 蠟在性 磁石在性 桂絡在性

右為末每服一二錢空心米飲下

○若女人陰脫加鷓鴣頭一枚燒灰研

○治肛門凸出用骨燒末水調服方寸

○七日三服血脈通黃散 生鐵仁水一

○治脫肛歷年不愈

斗者取五升洗之且雜

○香附散 香附炒 荆穗炒 為末

煎湯洗丁方加皂角

○艾略散

五倍子為末水煎洗更入

白碧蛇床子在性 洗後用赤石脂末

搽芭蕉葉上頻用托入傳以五倍子

丁次末必收至

○小兒脫肛五倍子未蜜調攤油紙上

貼之手托醋調如前用

○丁方

治脫肛煎葱湯洗軟用芭蕉

葉托出

○丁方木賊燒存性為末搽肛門上按

入即瘥

○治瀉多時脫肛及痛 大蜘蛛一

箇葉重裹線繫定盒丁內燒令黑

存性取出細研入黃丹少許同研生

用白凡葱銀煎湯洗拭乾後將藥末
搽之將手掌按花妙

○一方石灰炒熟以故帛裹坐其上冷
即易之

一方冬麻鞋底類按又故麻鞋底驚
頭各一枚將管頭搗為末傳肚門將
鞋底被入即不出

○一方蒲黃成膏塗之

○一方治脫肛 香附 荆 宿石煎洗又
煎服亦可

○一方陳壁土泡湯先薰後洗

○又驚頭燒存性為末麻油調付即收
龜頭亦可

○全方 艾葉濃煎湯浸之即收

○林久脫肛大人長強穴七壯又灸臍中

壯小兒百會穴三壯又灸長強穴

邪氣門

卅一

○傳丹溪曰邪氣者華丸連小腹急痛也

有痛在華丸者有痛在五樞穴者

皆足厥陰之經也自裏間而下清以

為寒蓋寒主收引經絡得寒則收而

不行所以作痛大抵此証始於濕熱

在經絡而至又又得寒氣外束不得

鍊散所以作痛若只作寒論恐為未

備
○以為頭暈子作湯服之效速後隨証
加減又當分濕熱多少而治濕則瀉
多瀉病是也

○又有按虛而發者當以不為虛証

導藥佐藥 棟子 茴香 枳實 山查 蓮子 之類

○三因葱白散

治寒疝作痛

芍

飯 投炒朴 炒茴 炒桂 青 姜 苓 練 麩 炒芽 炒稜 炮莖 炮熟地 來 白芍 參 絡 等 右每服五錢 葱白三莖 鹽少許 水煎 空心服

○吳茱萸湯

治厥疝腹中冷痛積氣

上逆 陰囊冷 菜 絆 川 烏 炮 去 細 各 半 良 飯 姜 炮 桂 絡 半 右 水 煎

○五苓散湯

治陰疝 引小腹痛 疾

蔡 姑 剝 附 炮 施 絡 一 右 水 煎 食 前 溫服

○沉香桂附丸

治脾胃虛寒 心腹痛

手足厥逆 便利無度 七疝引痛 沉 附 炮 川 烏 炮 姜 炮 桂 良 吳 茱 萸 炮

醋 炒 各 一 右 為 末 醋 為 糊 丸 空 心 米 飲 下

○加味五苓散

治疝氣 卒腹痛 小便

秘 澁 五 見 傷 寒 門 本 方 加 棟 子 一 分 為 末 每 服 一 錢 空 心 米 飲 下

○全愈疝痛丸

治連根葱白一寸 釘心

七 莖 煎 湯 下 青 木 香 丸 五 十 粒

○祖傳馬蘭花丸

治疝氣及婦

人 陰 癰 墜 疝 小 兒 偏 墜 等 証 馬 蘭 花 蠟 棟 子 橘 核 海 藻 海 帶

昆 布 三 味 俱 桃 法 皮 刺 撲 通 實 鹽 酒 洗 桂 木 換 略 半 脈 沉 細 手 足

逆 冷 者 加 川 烏 炮 五 右 為 末 酒 糊 丸 如 桐 子 大 每 服 五 七 十 丸 酒 或 姜 鹽 湯 送 下

○方治疝

橘核 桃 炮 莖 菜 炮

川烏炮石水煎

○小腸氣骨夜脹痛 蒼 陳 棟各

料其性蘇幹 不右酒水各一盞連鬚
葱白五莖煎服

○丁香補腎丸 治男子疝痛婦人瘕

聚帶下皆任脈所生也 飯 附炮
茴 椒 酪 一右細切用好酒三升煮

酒盡為度焙乾為末每末子一兩入
丁木絡半延紐全鴨銜碎右為末與

煎藥拌勻酒糊丸空心溫酒送下

○烏藥散 治小腸疝氣牽引臍腹痛

烏 木 檜 檉 青 良 酪 半 棟 二
棟子封巴地 右先以巴微打破用

棟子麩炒黑去麩及巴不用其餘藥
同為末每服一錢溫酒下甚者姜酒

調下

林 ○膏飯散 治疝氣大便秘陰囊腫小

腹痛唇青者不治 桂 牽 頭 取
絡半飯一太 桃 核 二 粒 全 蠟 七

半右剉每服二錢入蜜一錢煎服後
以青陳苓木宿其生薑等分煎服和

胃

○一方諸疝發時服海石香附煨丁左

去香附用薑查石為末姜汁調服一
錢亦治心痛

傳 一方治疝 蒼 莎 絡 楮 相 上 酒 炒 已

青 延 益 桃 駝 附 炮 茴 其
駝 配 上 右 順 流 水 煎 服

全 ○加味通心散 治腎膀胱實熱小腸

氣痛小府不通 瞿 通 拖 苓
翹 其 枳 棟 絡 等 右 煎 燈 心 車

煎于煎

○補腎湯 治寒疝入腹小腸氣痛時

泄瀉胸膈痞塞 參 菖蒲 苓

附炮木枳 沉四 瓜 半 薤 半 其 各

芍 絡 二 蘓 牡 各 右加姜枣 嘔吐加

半 薑 餅 生 姜 比 右 煨 良 湯

○敷法 治腎囊偏墜 蚘 蝦 良 湯

右為末 海 調 傳 杷 葉 蘓 葉

○五葉湯 洗疝痛 椒 葉 蒼 耳 葉 滿 桃 葉 水 煎 洗

痛 止 此 痛 止 此

○灸法 大敦 二穴在足大指端去

甲 如 韭 葉 及 三 毛 中 灸 三 壯 千 金 日

足 大 指 聚 毛 中 灸 三 壯 千 金 日

○三陰交 一穴在內踝上三寸骨下陷

中 灸 三 壯 或 蒸 臍 中 灸 三 壯 千 金 日

一法治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內

風鳴灸風市 七壯

○亦在腹內氣海穴 七壯在臍下 一寸

半 又灸臍 左右各去 一寸半灸外陵灸

毛壯 止 效 永 不 發 不 知 何 處 也 如 此

○關元灸百壯 在臍下 一寸治陰卵偏

大癩病 治 諸 氣 心 腹 痛 疝 氣 小 腹 急 痛 足 大 指

○全 諸氣心腹痛疝氣小腹急痛足大指

次指下中節橫紋當中灸五壯男左

女右極妙又治疝氣偏墜

○又量病人口角兩角為一相斷如此

則三指成一角如△樣以一角安臍

心兩角在臍之下兩旁盡處是穴左

偏灸右右偏灸左 一七壯左右兩邊

亦無害 小兒疝氣扁墜將見陰物扶向上陰

林 小兒疝氣扁墜將見陰物扶向上陰

頭盡處是穴多三壯如存者科狀向
左盡處右亦如此大人亦依此法補
効

飢逆

傳韻書與飢通氣上逆作
聲之名也古方以飢逆為
咳逆又誤以咳為咳逆
孫真人誤以嘔為咳逆

○杯難知云咳逆証古人斷為噦逆其說
似是非非蓋噦者乾嘔也如有物直
出則為吐也嘔物旋出則為嘔也嘔
無物出則為噦也咳逆者或水漬於
肺而心痞或連續不已而氣逆或喜
笑過多而氣噎或噤飲而錯喉而氣
搶或急食乾物而氣塞皆能作咳逆
之聲連續不絕俗謂之吃忒是也大
抵咳逆者不須之義吃忒者差錯之

義二者皆氣不得下為火熱托之而
使上至咽喉中壅而止也或以紙撚
鼻嚏而止或許竟盜賊回恐而止或
鼻執蘭食香調氣而止皆抑之駭之
而使氣下也

○傳太率有痰有氣虛有虛火上衝視有
餘不足治之

○痰與食在上者吐之參蘆稀涎散之
顛

○不足者補之參朮煎湯下大補丸
○痰用陳半氣虛用參朮陰火用連栢
滑

○飢逆自利滑其栢芍參朮陳竹瀝
○痢疾發飢用參朮煎湯調益元散煇
服自止

○陳皮竹茹湯 治傷寒食積未解氣

虛發能 陳法伯青竹茹得參仁其
後下右入姜棗

○橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦惡

心不進飲食 陳茹赤苓 梔

門 半絡二分 炙甘草 參各一分 右

入姜

○橘皮乾姜湯 治咳逆不止 陳

姜 桂 通草 甘草各一分 右

傳 橘皮半夏生姜湯 治氣虛有痰發

飢 陳半 乾生姜 參 通草

絡下右

○六君子湯 治痰挾氣虛發飢 陳

苓 參 絡下木 半絡半 其伴右入

姜棗

○林 生姜半夏湯 通治咳逆欲死 半

下生姜二右水煎

○下香散 治咳逆 下 柿蒂 絡下

炙甘草 良絡半 右為末每服二錢熱

湯調服

○柿葉湯 治胸滿咳逆不止 柿蒂

下後三右入姜五片下方加參等分

下加青陳等

○蒼活附子湯 治吐利後胃寒咳逆

蒼活附炮回微煨各木 姜棗各一

右入塩一檢水煎熱服一方無木有

下

○天美氣湯 治咳逆大便秘者 傷寒

門

○瀉心湯 治咳逆大便秘者 中連

下為末水調與之

○皂莢丸 治咳逆上氣時時睡濁但

坐不得眠 皂莢八兩 右為末

煉蜜丸如桐子大東陽卷三九

○**王** **小柴胡湯** 治陽証咳逆門見傷寒

○**傳** 凡傷寒發熱有四証○中氣不足脉

虛微氣不相續而發熱者用補中益

氣加生脉散黃柏以降虛火或少加

附子立愈○陽明內實失下而發熱

者大承氣下之○渴而飲水太過成

水結胸而又發熱者小陷胸湯或水

青龍湯去麻加附○傷寒傳經熱証

誤用姜桂等熱藥咳逆者黃連解毒

白鬼湯及竹瀝之類

○**灸法** 乳根二穴灸七壯直乳下

寸六分婦人在乳房下起肉處林婦

人屈乳頭向下盡處骨間丈夫及乳

小者以下指為率男左女右與乳相

直間陷中動脈處是穴

○又氣海一穴灸二十七壯直臍下一寸

半

醫學大明鑑卷第二終

氣加生... 水結... 青... 有... 人... 半... 又...

表定養生主論衰老門

○熟地黃圓

治肝腎俱虛精血不足

眼昏黑花頭暈耳鳴腰重筋骨痠疼
 陰汗濕痺 膝浸飯 巴戟法從酒
 煆二山茱萸杓子 白苓 兔酒
 蒸研一覆盆二五味 芎略二風兩
 半仲釀煆一桂附斛 續略半熟地
 二煉蜜丸空心塩湯温酒任下

○神仙巨勝子丸

安寢定氣改

易容顏通神仙延壽命添髓駐精補
 虛益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒
 落更生目視有光心力無倦行步如
 飛寒暑不侵能除百病 巨勝子丸
 兩生地 熟地 何首烏略四枸杞
 子 兔絲子 五味子 酸棗仁
 破故紙煆栢子仁 覆盆子 雞頭

實 廣木香 蓮花葉 巴戟天法
牛膝酒浸 肉苁蓉酒浸 天門冬 官桂
人參 茯苓法 楮實子 韭子 天
雄炮 鹿法 蓮肉 川續斷 山藥比
略西石為細末春夏煉蜜為丸秋冬
蒸棗肉入胡桃丁十箇楊如泥同藥
未和更搗千餘杵丸如梧桐子大每
服三十丸空心用溫酒送下塩湯亦
可日二如久眼去天雄用鹿茸亦得
此藥耳聾復聰眼昏每日服一月元
藏強勝六十日髮白變黑一百日容
顏改變目明可黑處穿鍼冬月單衣
不寒若將白雞用藥拌飯喂六十日
則變為黑雞矣

聖濟總錄百九十九日酒浸巨勝九蒸鹿茸牛膝

神仙巨勝丸 巨勝酒浸鹿茸牛膝

地黃或二法三月之法心山芋
熟地黃 柳桂法鹿酸棗仁 覆盆
子 遠志去心 兔絲子酒浸別菊花
人參 白茯苓去黑皮右一十四味
棟擇淨搗羅為末煉蜜為丸如梧桐
子大每日空心溫酒下三十丸服一
月身輕躰健萬病不浸

寶

木香凡 諸虫

胸ノツカハコハリハウ

ツクテウニハ逆酸

トリストスルヨシ

香派子三十 苗拍女

胡考子三十

石類丸

子

...

岡崎藏本

