

明鑑利

8
-128

F 3
イ-124

490.9
II-9
3

No. 2293
12 / 129



富士川文庫
1310

醫公明鑑卷第三目錄

眼目一 耳病二

山唇咽喉舌咽喉五

髮三七 痔漏八

損傷九九處皆 跌打跌打 骨痛骨痛

破傷風 癩疽

疔毒 疔毒

文十三知

一香丸一各 一藥丸一各

一木本二各 一早針一各

一肉針一各 一坐墊一各

一丁子一各 一白藥一各 一藥丸一各

一干葉一各 一紙不

每冊六分
〇下
〇下
〇下

〇丁子田

- 良香 六支
- 一千姜 四支
- 一我不 五支
- 一丁子 一支
- 一白朮 一支
- 一陳皮 一支
- 一茯苓 一支
- 一肉桂 一支
- 一生黃柏 一支五分
- 一木香 二支
- 一早揀 一支
- 一丁香皮 一支
- 一縮砂 一支

右十三味 末入蜜 煉米泔
丸スルモ可

醫法明鑑卷第三目錄

眼目 一
耳病 二
口唇 四附舌 咽喉 五

鼻病 三
牙齒 六

髮 三 七
痔漏 八

損傷 九 墜墮 跌撲 金瘡 竹木刺
湯火傷 獸傷 虫傷 骨鯁 瘰癧

破傷風 十

瘡瘍 十一 癰疽 一

附骨疽 二

疔瘡 三 瘦癧 馬刀 四

瘰癧 五 結核 七 六

漏瘡 七 瘰子 八

內疽 九 肺癰 十

腸癰 十一 便毒 十二

囊癰 十三 莖瘡 十四

脣癰 十五 膿瘡 十六
疥瘡 十七 癩風 十八
諸瘡 十九 乳癰 廿
楊梅瘡 廿一 癩風 廿二

救急十二

本方延命散

- 一香附 一白木各
- 一川芎 一地黃
- 一三稜 一山藥
- 一莪朮 一枳實
- 一木香 一丁子
- 一檳榔 一陳皮
- 一胡椒 一胡黃連各
- 一人參各 一厚朴各
- 一當歸 一白芍藥
- 一青皮
- 一茯苓
- 一黃芪
- 一干姜各
- 一良香
- 一甘草

右末口味細末

○健中丸

- 一良香六 一干姜四
- 一丁香 一莪朮各

醫法明鑑卷第三

○眼目門

○至經曰諸脉者皆屬於目目得血而能視

○聖人雖言目得血能視然亦有太過不及太過則目壅塞而發痛不及則耗竭而失明故年老之人多不及年少之人多太過但年少之人則無不及年老之人間有太過

○原病或曰目昧不明目赤腫痛醫膜皆瘍皆為熱或言目昧為肝腎虛冷者誤也

○林上虛則肝虛也下虛及腎虛也肝虛則頭暈耳聾目眩腎虛則虛癭生花耳作蟬鳴大宜補肝益腎

○再作蟬鳴大宜補肝益腎

風熱上壅散云苓柴菊瘦人
血少養血加風藥柳芸菊

○傳久病昏暗熟地飯為君羌風甘菊佐
之

○暴發赤腫苓風為君以瀉之連飯為
臣以養血羌柴升芷甘為使

○白睛紅加白芷葱少許

○血熱壅痛四物加膽已風羌

○肥人風熱上壅眼疼羌風荆酒苓

○瘦人目痛血少兼熟飯生地酒玄參

芎風荆菊

○勞役飲食不節內障昏暗蔓甘炙芪

白芍栢參

○惠滋陰地黃丸 治血弱陰虛瞳子散

大視物則花生地半兩熟地兩

柴天門其炙枳地骨連

味絡二參行飯身酒苓各五右為末

煉蜜丸茶清下婦人尤宜

○傳益陰腎氣丸 此壯水之主以鎮陽

光沢神各半生地酒牡山菜

飯梢洗五味山藥柴各五熟地

兩右為末勿犯鐵器蒸鶴煉蜜丸如

桐子大每服五十丸空心淡塩湯下

○林地黃湯 治眼久昏澁熟地

飯參苓連苓風羌各

分右水煎食後服

○當飯湯 補益腎水瞳子飯身

白芍各二連酒苓各半生地行甘後

柴四右

○補肝散 治睛上有圓翳日中見之

差小陰處見之則大視物不明乃肝

虛也宜補肝腎 熟地 白芍

花樹細格行芍芍七份相子
耳多風各九 北柴三份右水煎

○明目地黄丸

治肝腎虛熱眼見黑

花醫膜遮障等証 生地 熟地

並洗焙 膠酒浸 去積 炒 風 去 兩 杏 去 皮 尖 炒 研 右 為 末 煉 蜜 丸 食

前溫酒下或飯飲塩湯亦可 動風之

物治熱昏膜 膠滾黑花

○定志丸

治眼不能近視反能遠視

者恢明

○地芝丸

治目不能遠視能近視或亦

妨近視 生地 焙乾 天門 去心 枳 兩 兩 其 菊 兩 右 為 末 煉 蜜 丸

○六味地黄丸

治証同前 方見淋門

○益氣聰明湯

治飲食勞役脾胃不

足內障耳鳴

菘 參 甘 兩 各 半 升

葛各三 蔓打各 芍 相 酒 炒 各 右 水

煎臨睡熱服近五更每服之得腫更

妙○如煩悶或有熱漸加黃柏春夏

加之盛暑倍之如此一味多則不効

○冲和養胃湯

治內障眼脾胃元氣

虛弱心火與壬焦俱盛飲食勞役不

得休息故為此疾服之効 柴 芍

連絡七 風 辭 卷 炙 其 苳 酪 半 飯

酒 升 木 參 葛 酪 一 自 芍 行 白

芍 仁 姜 行 五 味 仁 右

○還睛丸

治眼內赤澁有花或黑或

白或紅 參 桔 芍 熟 地 風

荒 車 知 酪 一 細 味 兩 各 二 玄 參

兩 右 為 末 煉 蜜 丸

○明目流氣飲

治風熱上攻眼目不

明 大 煨

參 槐 芥 其 多 蔓 賊 荆 絡
兩 草 決 半 兩 蒼 兩 二 右 為 末 臨 吐 溫
酒 調 下

○復明散 治內障 陳眩等 蒼絡

青 三 分 多 耳 生 地 翹 柴 絡 一
其 半 不 飯 身 行 石 水 煎 去 粗 稍 熱 服
忌 酒 醋 溫 麩 辛 熱 火 料 物 之 類

○秘傳撥雲退翳丸 治內外障膜遮

睛昏暗大效 實 括 甘 多 蔓

苛 草 決 明 絡 五 等 賊 障 使 退

龍 姑 蜜 蒙 花 荆 地 骨 其 菊

白 蕪 羌 略 蛇 蛻 蟬 蛻 連 絡

小 川 椒 七 去 目 炒 飯 酒 兩 半 右 為 末

煉 蜜 丸 食 後 臨 吐 吐 三 服 醫 障 米 飲

睛 暗 當 飯 湯 內 障 木 香 湯 下

○當飯龍騰湯 治眼中白翳 風

膏 絡 二 柴 羌 味 升 絡 三 其

連 酒 莖 絡 二 芥 酒 兩 相 炒 飯 身 酒 膽 酒

芍 絡 七 右 煎 去 粗 入 酒 少 許 熱 服

○石膏羌活散 治久近內外翳障風

熱昏暗倒睫 拳毛 一切眼疾頭風

羌 兩 羌 兩 蜜 蒙 兩 治 羞 明 賊 障 醫 疳 清

頭 細 乾 采 子 二 味 起 麻 子 二 匙 拳

芎 兩 治 頭 蒼 明 目 髮 今 退 翳 其 菊 荆

穗 治 翳 蒙 治 偏 頭 風 其 鮮 藥 右 等

分 為 末 食 後 臨 吐 蜜 水 調 下 茶 清 亦

可 凡 三 服

○明目細辛湯 治目赤微痛羞明怕

風寒鼻塞涕瀦稠粘 芎 行 生 地 酒

蔓 絡 二 飯 身 梢 白 苓 蒙 各 四 荆

麻 根 羌 各 八 紅 紗 川 椒 四

或及失法右水煎

助陽和血湯 治眼發之後微有上

熱有睛紅隱淚難開睡多眵淚 葛

分芷柴 芫 甘後飯身酒風絡

兩升壯右水煎稍熱服

救苦湯 治眼暴發赤腫驗高古攻

不可忍者 桔 翹 紅 細 絡 二

飯身 藏 靴 耳 後 絡 蒼 膽 略 分 不 蒙

風 連 卷 太陽升陽明柴少湯各

生地 栢 芩 知 絡 三 芎 壯 右 水

煎食後服若苦疼則多用苦寒藥若

本經之藥如睛昏加知栢

散熱飲子 治眼暴赤腫 風 卷

芩 連 絡 等 右水煎食後服○大便

秘加大黃○痛甚者加破生地○煩

不得服加施○熱痛赤腫小柴加大

飯生黑豆

四物龍膽湯 治目赤暴發雲翳疼

不可忍 芎 飯 芍 地 絡 半 卷

風絡半膽 壯 絡 右

洗肝散 治風毒上攻目暴腫痛難

開隱淚眵淚 芎 飯 卷 甘

大 風 施 芎 絡 等 為 末 白 湯 調

服到煎亦可

菊花散 治目赤腫痛麻豆傷寒後

食熱物腫痛 芩 大 菊 甘

風 飯 絡 等 右

羚羊角散 治大人小兒風熱上攻

眼暴赤腫生瘡疼 羚羊 鈔 芩 升

甘後車酪五梅 膽酪半決明兩右

為末食後白湯調下

藥石柴胡散 治肝風實熱頭眩目

敗眼赤心煩 柴 地骨粉 玄參

玲 其菊 赤芍 芩略 一井 厥半

右入姜

○菊花散 治風毒眼目赤腫昏暗翳

肉痛癢漸生 醫膜 白蒺藜 去毛 蒼耳

灰 賊蠃 蟬退 各三兩 起 菊 酥 石 爲 末

食後臨牀茶清調下

○洗藥大青散 治暴風客熱目赤睛

疼 應 波 難 開 銅 青 醋 姜 粉 半 丁 不 右

和 勻 每 用 些 少 沸 湯 泡 帛 膏 槐 洗 造

姜 粉 法 臘 月 生 姜 切 搗 爛 布 槐 汁 淫

取 粉 陰 乾

○秦皮散 治風毒赤眼腫痛痒淚眵

淚 昏 暗 羞 明 秦 滑 連 等 爲 末

每 用 半 錢 沸 湯 泡 去 粗 乘 熱 洗

○湯泡散 治風熱上攻眼目赤眵暗

疼 漸 生 醫 膜 赤 芍 飯 連 等

右 收 咀 每 用 一 錢 用 極 滾 湯 泡 乘 熱

洗 冷 再 溫 洗 一 日 六 七 次 或 加 荆 芥

○凡眼目之病 雖疑氣滯使然 故以行

血 藥 合 黃 連 血 得 熱 即 散 必 熱 洗 之

有 效

○一方加風杏煎洗亦可

○一方加滑細古豆錢煎洗

○一方截惡眼 明礬 如豆大 梔 丁 斤

二 味 碎 包 井 花 水 小 半 一 方 治

○一方 治晚不見物 取鼠膽點之

○常洗目法 空心用塩末搽齒漱口水

時吐水於手中洗眼 冷目明夜見細

字

○眼春雪膏 治肝經不足風熱上

致眼目昏暗疼痛羞明不能遠視
風石有淚多見黑花 腦子打碎麝仁
法去壳去油二兩 右用生蜜六錢和勻
銅筋點皆頭

○傳退翳膏 治黑白翳 麝仁 升

各三翹 風 青略四 飯身於耳

柴絡半荆棘半生地半不連行石細

末水一碗煎至半碗生粗更上火煎

半盞入荆芥水兩匙蜜少許無名上火

熬勻磁器盛貯頻點之

○光明丹 治風熱上壅目赤腫痛及

內外翳障等証 白牡丹右一兩以

兩煎濃七去粗炭火煨於耳右

通經淨黃汁如此七次

辰行鵬仁輕研片腦三分多麝分○

如赤眼腫痛加乳沒各五○內外翳

障加真珠伴膽礬分能膽分○爛弦

風眼加銅青飛丹絡半或以諸藥合

為一治諸般眼疾右各研為極細末

和勻無研蜜封點眼極妙

○林一方 治翳膜遮睛雪白塩用無砂

者生研少許以大炷草蘸塩輕手浮

擊點之凡二三次不疼切勿驚恐累用

効

○治飛絲入眼睛脹突出痛不可忍新

筆兩二管濡好墨更換頻運眼上飛

絲纏筆而出

○又鉗爪甲上細屑筋頭蘸津點其絲

自聚枝出

○又石苜蒲地碎加飛絲傷左目則塞

右鼻傷右目則塞左鼻自發百中

○蜂蟻糞入眼取蟻蟻以布裹目上
 持蟻蟻於布上摩之其芒出著布上
 ○治倒睫拳毛木鱗介去殼為末綿裹
 塞鼻中左目塞右右目塞左一二夜
 其瞳自正

○灸法

○眼暗灸大椎下頸第十節脊中二百
 壯以多多為佳
 ○三里治目不明人年二十以上不灸
 三里灸氣上目不明
 ○風驚灸手中指本節頭骨上五壯左
 患灸右右患灸左
 ○目卒生翳灸大指節橫文二壯左灸
 右右灸左
 ○小兒雀眼夜不見物灸手大指甲後
 一寸內廉橫文頭各一炷

○小兒疳眼灸合各一炷各一壯

○耳病門二

○傳經曰耳為腎之外候一日腎通於
 耳二日心通於耳其腎慾無節勞
 役過度或中年之後大病之餘腎水
 枯過陰火上炎故耳痒耳鳴治法宜
 瀉南方之火補北方之水無有不效
 者

○慧厥聾必有眩暈之証流氣飲加苜蓿
 葱方見氣門

○風聾必有頭痛之証桂星散

○憂思傷心心虛血耗而聾或鳴當寧
 心順氣平補鎮心丹

○方過度腎虛精竭而聾或鳴當生

補腎肉苁蓉丸

○大病後及陰虛火動而聾者宜補陰降火四物加栝

○耳鳴宜當飯龍膏丸方見癩癰門林

○多飲酒人宜木香枳椇丸方見氣門

○耳聾以朱黃烏頭尖太黃二味為末津調貼湧泉穴以引火下行

○大補丸 治耳鳴欲聾 黃柏一味

細切塩酒拌炒褐色為末滴水丸四君子湯下血

○滋腎丸 治耳鳴耳聾方見淋門

○蔓荆子散 治上焦熱耳鳴而聾及

出膿汁 桑耳 升 通 赤芍

桑製門 生地 前 甘菊 蔓

赤芍各半 右作一服加姜片大棗一枚

○程星散 治風虛耳聾 桂 芎

飯 細 苜 通 莢炒木 麻

甘各半 星煨 芷各四 蕪行右入葱白

煎食後服

○地黃丸 治劣損耳聾 刺地 飯

芎 桂 兔絲 椒炒 破炒 莢炒 胡

芩也 炒 仲炒 芷 苜各半 磁燒 醋淬

飛二分半 右蜜丸葱白温酒下

○平補鎮心丹 治心氣不足精神恍

惚夜多異夢及腎氣傷敗足脛酸疼

遺精白濁漸羸弱以致耳聾 熟地

生地 山 天門 麥門 栝子

神各四兩 辰另研 桔炒各升

遠去心七兩 飯兩龍骨兩 右煉蜜丸

如栝子大每服三十丸空心飯飲或

酒下此方見証仲門但無生地栝子

○**經絡丸** 治腎虛耳聾或風邪入水

經絡耳內虛鳴多 葱酒煨 山菜 石

龍肉 菖酒 兔酒 鹿茸酒 長酒 卷 斛

磁煨醋 淨附 炮去皮臍 蝎去毒 麝

字七 右煉蜜丸如桐子大每服七十九

空心酒送下

○**清神散** 治氣壅於上頭目不清耳

常重聽上 甘菊 蚕炒 去絲嘴各 五各 下

荆穗 菴 風 芎 通絡四 其多

木 苜絡半 右為末食後臨卧茶清

調下

○**正芎散** 治風入耳虛鳴不聞 芷

芎 苜 蒼 蕪 甘 陳 細

朴 半 桂 通各 等右 入姜葱各

○**普蒲圓** 治卒聾耳內卒痛 苜

附炮去皮臍 右為末醋糊丸如杏

仁大綿裹置耳中日 二易 之ヲ

○**慧** 治聾 苜麻子四 粒棗肉入 入乳

搗膏石上晒乾丸如梧子綿裹塞耳

○**林** 治聾 苜打巴一 粒去 右為末

葱涎丸如棗核綿裹塞耳中或用生

烏頭為末綿裹塞耳中亦效

○**治耳鳴** 草烏半 炮苜各 等為 末綿

裹塞耳日三度

○**治聾** 苜打巴一 粒去 右搗合 分

作七丸每用一丸綿裹此即塞耳

○**耳** 又以醇醋微火煎附子軟削令失塞

○**耳** 又雄黃硫黃等 為末綿裹塞耳

○**治** 又聾 生鼠膽汁滴入耳中或生

腦綿包塞耳或生鯉腦亦可

○治聾耳 芥菜子搗人乳和綿裹塞耳
○治耳痛及卒聾 杏皮七粒去研綿裹塞耳

○通耳法 堅磁石一豆大如穿山甲燒存字一右新綿裹塞耳口中含小生鐵一塊覺耳內如風雨声即効

○一方治久聾 蜴黃色小者生薑切如蠟大四十右二味為末作一服九粒漫火煨乾臨卧空心温酒調服一法何晚勿飲

食酒調作一服至二更徐々盡量飲五更如耳中聞響百筆音自聞

○治耳聾耳中如風水声或如鐘鼓声板目巴去油菖松枝各半為末以蠟溶化同攤紙上候冷捲作筒子塞耳內一日一易効于

○治聾用猫尿滴入耳中効取尿法用
猫尿上共
尿自出收用

○治耳內痛用白塩炒熱重帛包慰耳場四圍

○治耳痛及聾耳桑螵蛸炙黃末加麝少許吹入耳中妙

○治耳內大痛如有虫奔走或血水流出或乾痛不可忍者蛇退燒右細研以鴨翎管吹入耳中立愈

○治耳痛以粘卷吹入耳中
○犀角飲子 治風熱上壅耳內龍耳閉腫痛膿血流出犀菖通玄參赤芍小豆炒耳菊各二右入

姜煎服
○風客熱壅膿血流出名曰聾耳 白礬連烏賊骨赤石脂各等為

○治耳中爲膿爲木 枯礬 龍骨 研各

黃丹 煨丁 不乾胭脂 分 麝香 右爲末
先用綿杖 拭淨 蘸藥敷於耳內

○治聾耳底耳膿出不止 陳皮 煨 爲
末 麝香 右如前法

○又方乾胭脂枯凡 等 如前法 又枯凡
黃丹 等分

○又方 五倍子 兩 燒存性 如前法
○又方 治耳中出血 龍骨爲末吹

入耳內
○治聾耳膿不乾 香附 去毛 爲末 搽耳
中 日三次效

○百虫入耳好酒少許灌耳中却起行
自出 ○又灌脂麻油可 ○又灌藍青

汁少頃虫出 ○又灌鷄冠血 ○又滴

小蒜搗汁

○惡虫入耳用葱湯灌 ○又用桃葉 搗

細塞耳 ○又桃葉 搗 頭虫自鼻出 葉
搗 作角子切齊其頭入耳中其虫從角中走出

○治蟻虫入耳 猪肉 一 指許置耳孔
邊即出

○治蜈蚣入耳 生姜汁灌耳中韭汁
亦可即出

○灸法 治耳聾耳鳴 聽會 灸五 在
耳微前陷中張口得之

○治耳聾耳痛 醫風 灸七 在耳後陷
中按之引耳中又耳門 灸三 在耳前
起肉當缺之前

鼻病門

經曰鼻者肺之外候也。溪曰肺之為藏其位高其體脆性惡寒又惡熱故好飲熱酒者始則傷于肺醫執久則見於外而為鼻鼽。津赤之候得熱愈紅得寒則黑此謂熱極或或觸目風寒始則傷于皮毛而成鼻塞不通之候或為濁涕或流清涕久不已名曰鼻淵此為外寒束內熱之証也。原病式曰肺熱則出涕是也。

選

河間謂鼻病悉屬平熱理固當矣然鼻者肺之候經曰形寒飲冷則傷肺溫散寒和則氣自通。

傳

丹溪曰寒傷皮毛氣不利而壅塞麻黃桂枝之類表之熱壅清道氣不宣通以芩連施之類清之。

酒渣鼻及熱血入肺四物加片苓酒

紅酒苓 陳 甘 生 姜 煎 調 五 吳

脂末服氣弱者加芩酒 外用山硫

黃入蘿蔔乳輕烏頭尖醋調付○或

用膳禁付之

慧

酒渣皆壅熱所致又有肺風不能飲自生者非盡因酒

一方治酒渣梔子末蜜丸如彈子大

空心白湯嚥下

鼽鼻息肉乃肺氣盛用括禁末胭脂

綿裹塞鼻數日自消

林

芎藭散

治鼻塞為鼽 芎 藭

麻 祛 桂 已 通 細 芷 苜 各

木 椒 甘 等 各 右 入 生 姜 紫

蕪 煎

瓜丁散

治鼻鼽息肉不聞香臭俗

呼鼻痔 瓜蒂 細等為末綿裹
鼻中即黃水點滴三四日愈

○**下方** 通草附炮細右為末煉蜜丸
綿裹內鼻中

○**方** 治久患鼻瘡膿極臭者百草
霜為末每服一錢食後冷水調服

○治鼻鼈皂角炙末小豆許以竹管吹
入鼻中

○又方干姜末蜜和如鼻字大塞鼻中
又方枯蠶為末猪脂和綿裹塞鼻中

○數日瘰肉隨藥出

○治鼻中生瘡楊杏仁乳汁和傳之

○**葶澄茄丸** 治鼻塞不通 葶附
苛三荆穗粒 右為末煉蜜丸如梅
桃大每服一丸臨吐嚼化津燕

○**菖蒲散** 治鼻塞不通 菖 皂
為末綿包塞鼻內

○**辛夷散** 治肺虛風寒加之鼻塞涕
出不已不聞香臭 辛夷仁 細

藁 升 芎 通 風 卷 甘 炙
芷等為末食後茶清調服

○**人參散** 治肺氣上攻鼻塞不通
參 白苓 苓 陳 祛 麻 節 根 卷 椒 炒

○**溫肺湯** 治鼻不聞香臭多涕淚
醋右煎食後服

○**林** 丁香分風 葛 卷 炙 甘 炙 半 升
芫 絡 料 麻 不 去 節 右 入 葱 白

○**離澤通氣湯** 治鼻不聞香臭忌
切冷物及風寒涼處坐卧 芫 四 卷

獨 風 升 葛 蒼 絡 三 甘 炙 二
芷 麻 酥 祛 椒 各 一 右 每 服 五 錢 姜

三片棗二枚葱白三寸水煎稍熱服

○治鼻寒麻黃散吹鼻中立通

○**防風湯** 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久不已必成衄血 芩 參 其

灸芎 門略 風 軒 右為末沸湯調服

林 ○**抑金散** 治肺熱鼻塞濁涕 芷

細 風 菴 飯 半 芎 桔

陳 苓 分 入 生 姜 薄 芎 煎 服

○**川芎散** 治鼻流濁涕 椒 芩 訶 煨

角 蚕 芎 桂 細 木 分 為 末 食

後酒調服

○**防風通聖散** 方見中加芎連治頭旋

腦熱鼻塞濁涕

傳 ○**祖傳** 治鼻時流臭黃水甚者腦亦

痛此有虫食腦中 絲瓜藤近根三

五天燒存性為末酒調服

林 ○**硫黃散** 治酒酸鼻及女人鼻上生

黑粉刺 硫 斤 輕 訶 杏 研 膏 去 皮

為末杏膏和作餅臨臥塗鼻次早洗

去 ○ 一法以白塩常擦為效

○**下方** 治赤鼻久不瘥太黃朴硝等

為末水調懸患處

○治鼻面酒酸炮鷓鴣糞下合研臘月

猪脂和每夜敷之

○治酒酸馬蘭子 弁 花 拌 爛 傅 之

○治鼻準赤新銀杏嚼爛敷不過五七

次復用

○**灸法** 治鼻鼈

○鰓會一穴灸七壯入髮際一寸

○通天一穴灸七壯在兼光後一寸灸後

鼻中必出鼻積一塊方愈

○上星一穴灸七壯入髮際一寸治鼻鼈

不聞香臭

○風門二穴^後治^此氣不止及清涕流

口唇門 附舌 四

○肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口

甘肺熱則口辛腎熱則鹹又有口淡

者胃熱也外有謀慮不決肝移熱於

膽而口苦者又有脾胃氣虛弱木乘

土位而口酸者或膀胱移熱於小腸

膈腸不便上為口糜生瘡

○肝膽有實熱口酸而苦小柴胡加其

膽青甚者用當飯龍薈丸^{方見癩癩}

○心熱而口苦或口舌生瘡黃連瀉心

湯^{連生地知母}牛黃清心丸^{方見中}

涼膈散^{方見傷寒門}

○脾熱而口甘者三黃丸^{方見消}平胃

散^{方見內傷門}

○肺熱而口辛者甘桔湯瀉白散^{方見}

○金沸草散^{金沸草二斤不刺四斤不麻}

○腎熱而口鹹者滋腎丸^{方見大補}

○陰丸^{方見}滋陰大補丸^{方見}

○謀慮不決膽熱口苦者小柴胡加門

酸地骨遠

○謀慮不決肝膽虛而口苦者參遠神

其^為柴^君膽^君其甚者錢氏地黃丸^{方見}

○益膽湯^{治謀慮不決肝膽虛氣上}

○溢則口苦^{方見}苓^{方見}桂^{方見}

○苦參^{神各三}遠^祛右水煎

○龍膽湯^{治熱口苦名曰膽瘰}柴

行其參 天門 連 膽 施

麥門 知 味絡五右

○道赤散 淋眼治膀胱移熱於小腸上為口糜水煎調五苓散方見傷寒門

○柴胡地骨皮湯 治証同前及治心胃壅熱水穀不化 柴 地骨 等右水煎食後服大便秘實加大黃

○甘露飲 治胃中客熱齒齦腫痛及口舌生瘡咽喉腫痛 梔 熟地 生地 天門 枳 茵 麥門 芩 斛 絡 一 廿 五 分 右 水 煎 食 後 服

○升麻湯 治上膈熱毒口舌生瘡咽喉腫痛 升 赤芍 參 枳 葛 各 二 廿 粒 一 右 分 二 貼 入 姜 片 各 半 水 煎 服

○水蘗圓 治口舌生瘡 研 甚 者 加 藥 苛 各 等 生 蜜 九 如 彈 子 大 每 服 一 丸 含 化

○治口舌生瘡 牛膝酒浸含之無酒亦可

○治口舌生瘡胸膈痛且鼓燒為未含之宿瘡

○治口瘡用好酒煮黃連汁呷下即愈

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上用理中湯反治之甚者加附子或用官桂含之亦妙

○治口瘡 細 栢 蜜 右 等 分 為 末 搽 舌 上 吐 涎 乃 愈

○治口瘡野薑黃花根煎湯漱之 白 薑 薇 根 梓 汁 什 之

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 黛 鵬 煇 硝 生 耳 痔 為 末 什 之 咽 喉 腫 痛 鵝 管 吹 入

真蒲黃一兩 味類 研舌上 自退 若不能
藥以黃連煎濃汁細細呷之效

○林治口瘡生白瘡末貼之極效

○柳花散 治口舌生瘡 延兩相

連略各半 蜜陀僧黛各一 右為末少許

貼瘡上津液吐出再用

○兼金散 治瀉毒上攻口舌生瘡

細連等為末以皂蘘水洗淨口舌

搽藥涎出愈

○胡黃連散 治口糜生瘡 胡連伴

藿行細行連行右為末少許貼之有

涎吐之瘻

○綠雲散 治口瘡爛臭久不愈 相

蜜炙無名右為末臨吐搽舌鹹津妙

又五味子兩滑 相蜜炙各為末搽

於舌上亦可

○又明礬伴相 蜜炙為末傳患處吐去
苦水再傳

○必効散 治口糜 明礬 大黃 等

為末臨吐乾搽涎漱之

○又朴硝行寒水石兩 硃砂鈔其伴

為末搽患處

○治口瘡發熱腫連喉 蘿蔔自然汁

含漱吐之 一方生薑自然汁漱亦

可

○水火散 治口瘡 干姜黃連等為

末乾搽涎出為效

○一方 甘草白礬等為末搽口內

○一方 膽礬醃銀鈎內火煨通赤放

地上出火毒一夜細研少許傳瘡上

吐酸水清涎

○龍石散 治上膈蘊熱口舌生瘡咽

膈腫痛 寒水燻 辰半 不 疔 疔 疔
為末 少許 搽患處

○治口瘡 縮 煨 為末 搽之 又換炭灰
存性 為末 入 輕粉 付

○治熱壅上 攻 古生 瘡 皂 葉 搗爛 傳脚
心

○**黑散子** 治血熱舌忽然腫硬 金底

煤醋調傳舌上下脫去更傳先能出
血竟傳之尤佳 一法用塩等分調

○治重舌 五灵脂 米醋 一枕同煎 旋漱
立安

○治舌腫脹 鵬砂 為末 薄姜片 蘸藥 搽
腫漸消

○**玄參升麻湯** 治心脾壅熱舌上生

瘡 木舌重舌舌腫或連頰腫痛
玄參 赤芍 升 犀 犀角 桔 苓

管仲 各 一 甘 半 不 右 作 一 貼 生 姜 一
片 煎 食 後 服

○治重舌喉閉 朴硝 白礬 為末 搽
入口中

○治重舌 五灵脂 一兩 去 為末 米醋 一
盞煎 含漱

○**薄荷煎** 治口舌生瘡咽喉腫痛痰
涎壅塞 苛 二兩 甘 半 不 芎 仁 腦 律

右煉蜜和成餅嚼服 一丸去腦加桔
○**蒲黃散** 治舌忽然腫硬或血出如

湯 烏 鱧 魚 骨 蒲 黃 等 份 為 末 傳 舌 上

○治舌上血出 香薷煎汁 飲數盞 瘥
○治舌無故出血 名曰舌衄 櫻花炒末

乾 搽 舌 上
○**丁香圖** 治口臭 穢 丁 行 甘 半 不 甘

後 芷律煉蜜丸彈子大綿裹含嚥

○一方乾甜瓜子末蜜丸如櫻桃大每
日瀨口了食一丸

○治口臭及醫齒腫痛細辛煮濃汁熱
含冷吐之

○治口臭香薷一把以水一斗煮取三
升稍々含嚥之

○訶子湯 治失音不語 訶四箇半
桔一兩五分不生甘草二寸半右分二貼水

一盞童便一盞煎食後服

○玉粉丸 治冬月寒痰結咽喉語音
不出 桂字草烏字半伍為末姜汁

浸蒸餅丸如鷄頭大每服一丸至夜
含化多年不愈者亦效

○響勝破笛丸 治歌謔失音不語者

翹 桔 廿各二兩半 芎 兩四 訶肉 炒九縮
大略 一 芎 半 兩 百藥煎 兩 右為末 鷄

子清和丸如彈子大每用一丸臨卧
含化

○一方 治失音不語 百藥煎 杏
去皮百合 訶肉 薏等右為末雞

子清和丸如彈子大每用一丸臨卧
含化

○一方 杏去皮桂 槐等為末煉蜜
丸如彈丸綿包含嚥

○一方 薑日江茶湯點自如常生入香
油二滴良臨卧之時乘熱服聲音漸
々自通揚

○又槐花尾上炒令香夜倒三便仰卧
床指取花來如意食明朝聲響漸眼

加附子肉桂一两各八味地黃丸

○瀉黃飲子

治風熱在脾經唇燥

裂無色 芷 升 枳 風

半 斛 各 二 升 右 入 姜 煎

○薏苡仁湯

治風熱在脾唇口瞤動

或生結核或為浮腫 薏苡仁 小

豆 甘 棘 各 右 入 姜

○石布散

治唇緊口小不能開合飲

食不得下急治則死名曰緊唇又名

審唇用白布作燈炷如指大安分升

上燒冷汁出取敷唇日三度用青布

亦佳或青布燒灰酒調一錢服亦可

○和猪脂調敷可

○一方生馬齒莧濃煮汁洗冬月用乾

○膏

一方驚甲及頭燒灰作末傳之

○一方治緊唇以頭垢傳之

○治唇上生瘡連年不瘥用八月藍葉

○所搗汁洗

○治口吻瘡掘經年其根燒灰傳之妙

又楨柳燒灰細研傳患處

○灸法

○治緊唇不能開合灸虎口男左女右

○一法灸業漿三壯在頤前下唇之下

宛人中

○喉門五

○喉病或曰喉痺痺不仁也俗作閉口

閉塞也云云經言喉痺則咽與舌其

兩間取然其病同於火故不分也後

醫者各詳其壯強立又名熱氣上行

傳於喉之兩傍近外腫作以形似

是謂乳蛾一為單二為雙其乳蛾
差小者名閉喉雙熱結於舌上復生
一小舌子名曰子舌脹熱結於舌中
舌為之腫名曰木舌脹木者強而不
柔也熱結於咽喉腫遠於外且麻
且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴
發暴死者名曰走馬喉痺此八種之
名雖詳若不歸之火則相去遠今之
醫者皆有其藥至起馬喉痺何待此
乎其生死反掌之間耳無如破針出
血

傳

其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾
易治一邊腫者謂之單乳蛾難治古
方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳
火者痰之本痰者火之標火性急速
故病發則暴悍治之法必先大湧其

痰或以鉞鐵刺其腫處此急則治標
之法也用藥者必須以內經從治之
法而以桔甘玄參升風羌荆參木苓
之類少加姜附等藥為嚮導徐參頻
與不可頓服此為治之太法也切不
可驟服寒涼之藥非徒無益而且促
其死耳俗人未諳此理而復用芩連
梔柏之類正治之腫勢稍退生肌獲効
殊不知上熱未除中寒復生

林

銅人中亦有灸法然痛微者可用病
速者恐是則殺人故治喉痺之火與
殺火同不容少待

生瘡

○巢氏病源云脾胃熱其氣上衝喉咽
懸癰任在上脘懸門暴腫閉塞喉嚨
赤如喉痺

○耳枯湯 治喉咽熱腫聲不出 桔
伍耳咽右水煎食後服

○一方 治喉痺并持疫毒 桔
升 翹 風 牛 芩酒炒各右水

煎食遠細心飲服

○牛房子湯 治風熱上壅咽喉塞
或痛或生瘡 牛 玄參 升 桔
耳 遲 通 芩各等右

○敗毒散寒門 治諸同前加芩半翹
倍桔痰盛加石膏

○解毒雄黃丸 治纏喉風急喉痺牙
關緊急不省人事并小兒喉痛赤腫
驚風痰涎壅盛並宜服之方見中風

○玉鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風
焰硝半兩鵬伍法去絲嘴腦打右
研勻少許吹入喉中

○三聖散 治纏喉風急喉痺鴨嘴擔
攀行白姜蚕紗五右為末少許吹入
喉中立驗

○經驗丸 明礬 白梅肉等丸如皂
子大含之牙緊擦之

○石礬散 治纏喉風急喉痺 明礬
行三個去壳 右將礬豆於鉢內慢
火熬為水候乾去豆取礬加輕礬各
少許吹喉

○通關散 治咽喉腫痛水穀不下
青塩仁枯礬仁鵬行右為末少許吹
入喉內有涎吐出一二次腫自消

○吹喉散 治咽喉腫 黛 雄 鵬
膽礬 焰硝等右為末少許吹入喉
中

○奇方 治喉痺 射于新者橫攢取

汁吞或用米醋同研取汁含引吐涎更妙

○**一方** 治纏喉風急喉痺 陳白梅 入膽礬在內綿裹含之 惡白梅 鵬砂亦良

○**一方** 治走馬喉痺波腫馬鞭草根 研自然汁含之

○**一方** 治喉痺桃皮汁含而服之或 煮豉汁含吞之

○治急喉風牙關緊閉 巴豆去殼紙包 去油在紙上以此紙作紙捻點吹 滅以煙薰鼻中即時口鼻涎流牙關 遂開

○治急喉閉 皂角去皮子生半兩為 末少許以筋頭點腫處更以醋調藥 未傳項下須臾便破少血出愈

○治喉癭 牛房子 分馬蘭子 分為末 空心暖水調下

○治纏喉風 生白礬末冷水調一錢 下

○治喉腫不下食 生韭礬煎飲喉原 下

○治喉痺初起腫痛 鵬砂含津嚥之 傳

○**通關飲** 治喉痺腫痛不能言語者 參 木 苓 絡 一 荆 荷 姜 炮 各 風 砒 砒 仁 甘 後 或 加 附 炮 研 石 水 煎 徐 入 與 之 一 方 去 末 苓 姜 附 加 茶 穀 子 各 煎 湯 治 喉 癭

○治咽喉痛腫 荆穗 飯身 桔 其 等 分 石 水 煎 溫 漱 而 服 之 有 熱 加 荊 刺 少 許 出 血 立 愈 喉 乾 燥 痛 四 物 煎 若 荆 知 梅 立 已

○治癰喉風燈心草燒灰吹入喉中
○治喉痺鴨嘴爛喉三分或為末吹入喉中吐痰而愈

○一方新取艾葉榨汁灌入喉中即愈
○又方蛇床子有嘴瓶中燒令病人以瓶嘴布口中吸煙立愈

○治喉痺及喉中熱痛上好消梨榨汁頻令飲之自噤噤下亦可多食為良

○**桔梗湯**

治熱腫喉痺 桔 甘草 翹 梅 岑 奇 右入竹葉

○全治走馬喉痺 巴豆去綿裹隨左右塞鼻中左右俱有者用二枚立透

○慧誤吞穀芒刺在喉中芝麻湯煎細小啜之

○喉痺心腹腰脇痛難治

○**牙齒門**

傳

夫齒者腎之餘也足陽明胃之脈絡止齦手陽明大腸之脈絡下齦

手陽明惡寒飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其痛有惡寒惡熱之不同也開口呼風則痛甚者腸胃中有風邪也開口則穢臭不可近

者腸胃中有積熱也或痛而齒動搖或痛而齒大抵齒齦宜露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎慎寒惡

熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火風和虫蝕之証蓋曰熱生風而風生虫也腸胃之火既平更以擦牙

誅虫之藥以治其標也

○**獨活散**

治風毒牙疼牙根腫痛

獨活 芍 羌 卷 風 各半 細 荆 一 寸 生地 各 二

右水煎服

○定痛散 治風牙立効 芷 川烏

略下細行乳行 右為末每用少許 擦牙此延須臾以鹽湯漱

○烏辛散 治風牙疼 細辛 草烏分

為末先以水漱口淨少許擦患處下 方加川椒

○細辛散 治風牙疼腮頰浮腫 紅

椒 風 縮 牙皂 撥絡 五荆穗 細各一 芷 草烏略二 右為末少許

頻擦患處存涎吐之仍用鹽湯漱

○玉池散 治風牙疼腫痒爛宣

露出血口氣 飯 藁 地骨 風 芷 梔 芎 苳 升 細 絡 等 右

為末每用一字搽之痛甚取三錢加 黑豆半合姜三片水一盞半煎七分

濕熱

○下方 治風牙疼 芷 酥 硃 砂 煉 蜜

○花如櫻桃大擦牙

○如神散 治風牙疼注疼痛牙齒

動搖連頰浮腫 板 出 蜂 房 等 各 右為末水煎熱漱即止

○一方 治風牙疼 板 細

風 喝 荆 獨 勝 右水煎乘熱漱

○一方 治風牙疼 膏 升 細

草烏 芷 風 荖 勝 右為末擦牙

○一方 升 細 膏 藁 檀 皂

分 磨 少 許 擦 牙 風牙不怕冷熱宜用皂荖勝房草烏

等藥

○美牙柏熟湯宜用良檢細等藥

○白芷散 治大寒犯腦牙齒疼痛

麻 草薹 絡半 苳 升 仁 吳 菜 芷

酪 四 散 熟地 絡半 藁 分 枝 半 二 分 老

分 右 爲 末 先 用 溫 水 洗 淨 以 藥 爲 之

○丁香散 治牙疼 丁 檳 榔 蠟 梢

大 板 檳 榔 爲 末 搽 患 處 有 津 即 吐

○一方 草薹 芷 細 草 烏 丁

蠟 梢 右 搽 牙

○一方 升 飯 藿 細 檳 芷

荆 穗 檳 右 爲 末 瓦 盒 貯 之 堅 閉 勿 泄

氣 每 用 少 許 搽 痛 處 後 以 荆 芥 湯 漱

之

○百方 治牙疼 薑 棗 爲 要 藥 也

○熟牙柏冷水宜用牙硝姜黃雄荆等

藥

○驅毒飲 治熱毒上攻宜露出血牙

眼腫痛 犀 遊 韻 犀 犀 右 水 煎 澄

清 入 鹽 一 撮 頓 飲

○犀角升麻湯 治陽明經受風熱口

唇頰車連牙腫痛 犀 七 升 行

○風 羌 絡 五 芎 芷 芩 白 附 各

半 其 煎 右 水 煎 食 後 漱 服

○姜黃散 治牙疼不可忍 姜 黃

細 芷 等 分 爲 末 搽 牙 須 臾 吐 涎

塩 湯 漱 口 又 治 牙 疼 面 赤 腫 去 姜 黃

加 薑 立 效

○消胃散 治胃脹熱藥齒夜引頭腦

蒲 面 發 熱 喜 寒 惡 熱 生 地 酒

連 飯 酒 各 壯 升 行 右 水 煎

食 逐 冷 服

○兩切丸 治多食肉口臭牙齦腐蝕

蘇因欲展牙落血不止 蘭香葉

如無毒 飯身 藿木 升絡下

生地 細生茸 絡三連 細宿絡五石為

宋湯漫煮餅丸白湯食遠非

祖傳治胃石實就齒痛涼痛散

門以大黃 蒸為君加知膏升為佐類

含鹽即愈

○ 砂糖散 治蛀牙石灰為末 破糖丸

如黃米大塞蛀孔

○ 方 枯凡 滴乳 為末 同燻 溶

化充塞蛀穴

○ 方 川椒 細十巴 右飯丸 如

豆大 綿包塞蛀穴

○ 治虫牙 疔 藜 末 塞孔中 勿令 噉汁

○ 又雄雀 糞 昂 畏 塞 蛀孔 且 三 三 次 易

○ 之 雄雀 糞 且 者是

○ 治風虫 牙 疼 鷓鴣 以 醋 搗 爛 入 塩

少許 漱 口 良 久 吐 出 又 含

○ 治齒 虫 痛 蟬 糞 陸 香 噉 其 汁 搗

○ 又雄 黃 末 蜜 丸 如 棗 核 塞 牙 間

○ 又 層 蒼 末 先 以 鹽 搗 齒 令 淨 傳 少 末

於 上 搽 子

○ 又 杏 仁 燒 煙 末 盡 研 如 膏 物 裹 內 孔

○ 中 天 天 藥 子 搗 碎 內 入 酒 及 膏

○ 又 荊 墟 李 樹 根 取 白 皮 細 切 水 浸 濃

汁 含 之 良 久 吐 去

○ 治 風 虫 牙 疼 藉 殺 老 絲 凡 燒 存 性 為

末 搽 之 效

○ 又 苜 蒲 切 片 抵 痛 牙 處 咬 定

○ 取 食 齒 根 齒 黑 者 以 松 木 灰 搗 之 末

雞 黃 墜 眼 上 百 段 效

○安腎丸 治腎虛牙齒腫敗 從酒浸

桃去燬尖木 補砂山 斛 白蔞

○川烏 蘇 川烏 蘇 巴戟 諸心 各

右為末煉蜜丸空心鹽湯送下

○宣風牢牙散 住頰補腎牢牙固齒

青鹽 細絡 芎 飯 酒洗乾 右為

末少許清晨擦牙漱滿口連藥嚥之

○牢牙石嚙子散 治斷肉不固及腎

弱齒疎或血出侵蝕 青鹽 研麝 研

石合研末每用半錢以指蘸藥擦斷

上合口少時後溫酒漱嚙不嚙亦可

○治牙根動欲脫 生地黄剉為裹著

牙上嚙之漬齒根三五次嚙之十日

○效 黑鉛 柴皮 灰 柳木 搗 研 合

取齒藥 黑鉛 柴皮 灰 柳木 搗 研 合

在盆內以水洗眼能明目黑鬚鬢治

牙齒動搖疼痛大能安牙

○擦牙散 穿牙 芎 風 升 細

苓 芷 櫻 其松 香附 酪 丁 石

為末少許擦之

○一方 治牙疎腫物 寒水石 煨 炒

其石 生 等分為末少許擦牙忘用刷

牙脂煎茶物

○香鹽散常用治虫牙去風熱宜露一

切齒疾 香附 炒 青鹽 半兩 右為

末擦牙

○治諸般牙疼 香附 生艾葉 等濃

煎湯漱之

○一方 枯凡蜂房等分為末煎湯含

漱冷則吐出無毒

○一方莧菜槌燒灰爲末擦攻牙止

○一方茄蒂燒灰爲末擦之

○一方馬夜眼燒存性爲末敷上立愈

○一方蒼耳子水煮汁熱含之莖葉亦可入鹽亦可

○治一切風牙疳牙疼痛不可忍者

撥良 草烏 草 加胡椒爲末

酒糊丸一丸咬在患處有涎吐之立愈

○治牙疳燕子屎丸桐子大用攻牙上咬之丸消愈

○治風熱上攻牙齒疼痛稀筴草霜後

收之曬乾爲鹿末每用行以滾湯泡漱之醋煎尤妙

○治牙疳眼宜露每日以鹽末擦牙後用湯漱之百遍其牙自牢密

○治齒腫痛及口氣 細辛煮濃汁熱含冷吐出

○治卒齒痛苦竹燒下頭下頭得汁多灌齒瘻

○治諸牙斷疼 杏仁 百枚鹽切寸水一升煮令沫出含之

○治牙疳微惡寒飲大惡熱

飲 細辛炙甘草升升風行膽酒洗

右爲末水煎去粗以匙抄在牙疳處

得少時則止如多惡熱飲更加膽行

如惡風作痛加葱連各五 勿加膽

○治走馬牙疳如神 干姜棗各煨枯

○小兒走馬牙疳味一齊燻爛即死此

方神效婦人尿痛中白若火煨銅綠
死麝一分右末付之立愈

○林取牙藥 草烏 檢略打板 細洛
石為末少許搽患處其牙自落

○全地龍散 治牙痛宜露出血分地龍
法延 檢 等分為末綿裹隨左右
痛處耳內塞之

○林灸一切風腫虫牙疔痛以草量手中
指至掌後橫文止將草折為四分去
三分將一分於橫文後量臂中灸三
壯隨左右灸

○跌一法兩手交叉又中指盡處灸七壯是
又灸肩髃七壯隨左右在肩端兩骨
間陷中築臂取之

○又灸耳垂下盡骨上三壯末効再加

○壯壯數
治口齒蝕生瘡斷痛藥漿一穴灸三
壯

○傳上牀痛灸足三里一穴七壯足陽
明經

○下牀痛灸手三間二穴七壯在手指大
本節後內側脈
中手陽明經

○髮髮病明七
五神還童丹 仙家傳授髮明目

延壽 赤石 川椒 辰 神 乳
酪一右為末棗肉九如梧子大每服
三十丸空心温酒下

○治白髮 烏麻丸九蒸九曝為末以棗
膏丸服

林還精丸 治白髮極效燒已髮合頭

指等分丸如大豆大每服三丸令頭不白

○意治髮落不生側柏葉陰乾為末菜油調塗

○治無髮 甜瓜葉搗汁塗之即生

痔漏門

○選痔漏者肛門邊內外有瘡是也成瘻不破者曰痔破潰而出濃血黃水淋瀝不止者曰漏

○諸痔出血肛門間別有小竅下如血線不與便物共道久不愈必至穿穴墮口不合漏無已時此變為癰也

○腸風藏毒與痔瘻同出而異名久則

通能腸頭瘰癧可畏致重是也治法當化血

○傳丹溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也

治血為主大法用芩涼大腸參連生地槐角涼血生血當飯和血芍丹枳實腸

○漏瘡先用補氣血藥參芪飯木為主大劑服之外以附子為末津和作餅

如錢厚以艾多灸之令灸微熱不可令痛餅乾即易之再灸又以補氣血藥作膏藥貼之

○秦丸卷活湯 治痔漏成塊下垂不

在其痔 卷二升丸 芪絡 丁風分升 各身 麻 柴絡 五葉分紅

○秦丸蒼木湯 治痔核已破謂之漏

大便秘澁必大痛此濕熱風燥四氣合而為病 朮 桃去皮皂仁 煎酒洗各 枳行大亦不可多用 右除枳桃皂餘藥水煎去粗入枳桃皂再煎空心熱服待少時以姜膳壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麪椒姜等

○**秦朮當飯湯** 治痔漏大便結燥疼痛 大糲四朮 實各一泔 飯稍皂仁 朮各五 紅朮桃去尖 右煎服忌如前

○**秦朮防風湯** 治痔漏大便時發痛如無痛者非痔漏也 朮風取身朮各一炙甲 泔各六 枳酒洗大糲 陳朮三葉 升各二 桃去尖 紅朮

右煎服避風寒忌房事酒麪辛熱 ○**當飯即杏仁湯** 治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛 郁 皂仁 各

各實分朮 麻 飯稍 生地 蒼朮半大糲 泔各三 右除皂為末水煎去粗入皂仁空心服忌如前

○**紅花桃仁湯** 治痔漏經年 枳行半生地行泔 分蒼朮飯稍 漢巴風稍 猪各半 麻仁 分紅朮桃行 右水煎稍熱服忌如前

○**毛聖丸** 治大腸疼痛不可忍 羌 耐郁湯浸去皮炙大糲八枚 桂木 芎朮各五 右為末煉蜜丸白湯下微利而愈切不可多利其痛滋甚

○**秦朮白朮丸** 治痔漏有膿血大便燥硬疼痛不可忍 朮 桃去皮

皂仁各一兩飯搗酒浸實煨末五各
不地榆行右為末麩糊九如雞頭實
大冷藥光澤焙乾五十九空心白湯
下待少時以美膳壓之忌生冷菜
硬物酒濕麩辛辣太熱

○香殼丸 治因而飽食腸滯為痔久

而成漏速治悉愈也木 栢 飯
酒荆蕙各三枳製枳麩各連兩蠟

皮燒灰右為末麩糊九如桐子大每
服三五十九白湯下日三服

○五痔散 諸痔不問冷熱內外並治

驚醋浸蟾皮剉研猪甲後蹄者剉蜂
房炒略蛇皮一條燒存性右為末入麩炒

每服一錢半食前米飲調下

○收痔丸 諸痔通用 膠 連 貫

衆酪半盈尺皂角法蜂炒

蛇皮略燒皂刺燒穿山入麩灰猪後

蹄垂甲燒各飯芎槐各二

右為末醋煮麩糊九如桐子大每服

七十九調氣用枳殼散枳殼消血熱

荆芥煎湯下食前服

○乾薑湯 治酒痔葛枳炒半

苓 生地 杏去核各苓 茸各

半右每服五錢黑豆百粒姜白梅

一箇煎服

○猪甲散 治諸痔 猪後蹄垂甲

為末陳米飲調服

○福皮湯 治氣痔 陳 枳炒芎

槐炒各枳木 桃去皮蕪連蔞炒

甘草各右入姜煎

○逐瘀湯 治痔漏熱証瘀血作疼通
利大小腸取下黑物 芎 芷

生地 赤芍 五苓 枳殼膠炒

苓 莪 煨神 通 生甲絡 丁大

桃去皮尖各 右每服八錢姜片蜜三

匙水煎服以利為度

○地榆散 治痔腫痛 地榆 莪

枳殼 芍 芎 赤芍 槐 荏

各半 白朮 蜂房炒甘多右水煎

○皂刺丸 治痔痛而復發 皂刺兩

燒盡 白礬 煨枳 白蒺藜 荏 荏

各半 風 槐各三蛇床五蜂房炒

五倍絡 右為末醋調菘豆粉為糊

丸以練根煎湯下仍用童子熱尿入

白礬未洗肛門

○芎飯丸 治痔下血不止 芎飯

莪 麩炒 地榆 槐 微炒各膠炒

荆穗 木賊 頭髮燒存性 右為末

煉蜜丸米飲下

○瀉腸丸 服此以防肛門急燥欲無

澁痛而已 枳殼大 飯等 右為末

煉蜜丸空心白湯下

○槐角丸 治腸風下血痔瘻脫肛服

此除根 槐角一兩 地榆 飯酒浸

芎 風 枳殼各 右為末酒糊丸

如桐子大每服三四十九米飲下投

瓦上炙理

○神應黑玉丸 治腸風痔漏痔痛此

邊多生硬核此疾多人外墜殊不知

病在腸藏有虫去根易愈 蝟皮 剉

牛角腮各 八箇懸蹄百槐角 雷

脂麻各 二 亂髮皂角煎 敗棕阻各

練二兩 右咀碎用瓷罐燒存性為

末入乳香斷續研合和酒糊丸

如桐子大每服五十丸先細嚼胡桃
一枚以溫酒吞下日二服甚者三服
空心切忌別藥

○**地黃丸**

治五痔滋陰 地酒蒸熟

不槐角炒栢炒仲炒芷略山藥

山藥 獨絡八沢壯苓絡六

莖平兩白附行 右為末煉蜜丸如

桐子大每服五十丸空心米湯送下

○治五痔蒼耳莖葉端半日搗陰乾為

末空心水服方寸匕

○慰法凡用栢痔藥後及大小使間好

肉疼如針刺及痛上時檢令人糝衣

物火上烘之令熱慰痛處三五次痛

立止衣物二字

○又治痔初起痛痒不止以自已穿舊

鞋裏底烘熱頓慰之冷則再烘其時

即止

○又慰痔頭出或痛不可忍枳殼於瘡

灰中煨熱慰盡七枚立定發即慰之

○**洗痔方**

槐 荆 枳 艾碎水煎

入白礬煮薰洗

○一方白礬末洗薰枳殼末煎湯薰洗

亦可

○**一方**

連 芩 荆 麻 側柏葉

槐條 鏡面草 蚬殼草碎水煎洗

○一方用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾

灸七壯

○治腸痔大便常下血葱白三五斤煮

湯盆中坐洗立瘥

○**傳**

一方韭菜湯薰洗

治痔瘡風腫夜痛胡麻子煎湯洗之

○又五倍 朴樹 桑寄 蓮房煎湯

先薰後洗

○寒藥 煆其石尿煆童 牡蛎煆 為末

付之

○又木鱉五倍為末付

○治痔腫痛蝟牛陰 為末付之或香油

浸曬月餘而以其油沫之立効

○敷藥蝟牛膏 蝟牛林 鹿茸計 參茸

合盛次早取汁付不用腦亦可

○一方熊膽腦子研并花水調以雞卵

拂痔上

○一方寒水石朴硝末津調手指點藥

敷痔上

○治腸痔下部如虫醫 蝟皮煆 末生

油和傳之

○治痔殺道痛 杏仁炒料 膏敷之

○治痔發疼痛 大棗一枚 剥去皮取

水銀掌中以唾研令極熱傳裏 麩上

內下部瘡

○治痔痛 批把葉塗蜜兔同烏梅肉

搗爛先用烏梅核煎湯洗後敷藥痔

上

○痔有頭如雞冠者菓連末傳之更加

小豆末尤良

○治翻花痔 馬齒莧斤燒 灰細研猪

脂調敷之

○治漏 蜂房一枚 為末每用一錢

臘月猪脂調敷又龍骨煆 軟石膏

同止 黃丹等 為末搽 瘡口

○治痔漏 蒲兩血蝟兩為末少計點

患處 漏瘡血水不止 蛇皮魚五倍 龍

骨絡半續，須為未入，麝少許，津唾調傳。

○痔久不差，用熊膽塗神效。一切方不及。

○**灸法** 治五痔對臍脊骨上灸七壯。又治五痔便血灸長強穴，年壯在脊竅骨上。

○**下法** 治痔疾大如胡桃，貫腸頭熱如爛火發，則僵仆，以柳枝濃煎湯洗之。次灸其上三五壯，若覺下道熱氣入腸中大瀉，鮮血穢惡，一時許甚痛，瀉後乃愈。

損傷門

墜隨 跌撲杖瘡 金瘡
竹木刺 湯火傷 犬咬 貓咬 鼠咬 蛇傷 馬咬 人咬 蜈蚣傷 蜂傷

蟹蛛傷 蝨虫咬 虱咬

○**王** 從高墜下，敗血凝滲，從其所屬入於肝，逆所行之血氣，以破血行氣之藥治之。

○**林** 肝膽之經俱行於脇下，屬厥陰少陽。况血者肝之所藏，故惡血必歸於肝，法當以柴胡引用為君，佐以破血之藥，煎之。

○**玉** 墜隨打撲皮不破而內損者，必有瘀血。若金刃破皮出血，或致亡血過多，一者其治不同。有瘀血者，攻利之，亡血者，兼補而行之。宜先逐瘀血，通經絡，和血止痛，然後調氣養血，補益胃氣，則無不効。

○凡傷重者，未服損藥，先服氣藥，如白氣散之類。

傳 凡治損傷燥在補氣血俗工不知惟
在速効多用自然銅以接骨然此藥
必煨煉方可服新出火者其火毒與
金毒相感故香熱藥毒其燥散之禍
甚於刀劍戒之

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以
淨火白朮以和中童便煎為妙在下
者可上癥血但先須補托在上者宜
飲韭汁或和粥吃切不可飲冷水蓋
血得寒則凝但一絲血入心即死

○打撲墜墮刀及傷便覺氣絕不能言
取藥下及急開口以熱小便灌之

○凡手脚骨傷甚者不可治

○凡損傷用火灸則醫不得服藥不効

○凡傷重必用藥水洗然後塗藥傷輕
不必洗便塗藥

○凡損大小便不通未可便服損藥蓋
損用酒以熱且服四物湯又服大羌
氣湯加木通如二便尚未通又加朴
硝待二便通後服損藥

○凡傷重者用此方洗之然後傳藥生
葱方作荆飯 右三味煎湯溫熱
洗

○**神正散**

洗藥治骨斷用此煎水洗

後整骨却用烏龍角煎之如破留口
當夾縛 桂仁飯去尾荆四蒼風各
兩延 芷 赤芍各五石咬咀每用五

錢水五升乾荷葉兩片煎至三升去
滓於損斷處及冷水風脚筋狀拘急
行步艱苦可用此藥用被蓋覆候溫

淋洗

○一方治骨斷 仲麻五加耐葱根批

右每服一兩半水五升煎至七分去粗淋洗洗後整骨了用烏龍角貼傷破魚口用藥

○烏龍角貼藥 治跌撲傷損筋骨碎斷

姜文 蚕蠶絲小豆 腰各六桂

桔 白芨 山批把葉生剉百草霜

絡 骨碎補 蛇尾 細條半芷

南星 煨赤芍 何首烏 白欬略十

知 草 烏錢三兩煮右爲末以姜汁

或冷水茶調攤紙上於痛處貼之

二日一洗換貼

○打撲及刀刃傷皮肉破青腫急用末

經水葱搗爛炒乘熱暴傷處冷即換

○指爪抓破煨葱葉熱貼冷再換

○一方 治傷損筋骨腫痛 草烏行

夫皮飛羅麵 貝母 南星各半

○黃丹紅右爲末姜汁調貼如潮熱茶

清調貼○皮破見血者去草烏

○止痛法 白礬爲末每用一匙沸湯

一碗衝了以手帕醃熱貼傷處少時

痛止然後用貼藥

○接骨丹 南星四兩木別去壳沒五桂

耐乳五右爲末生姜一片去皮搗汁

入米醋少許自麵糊調藥攤紙上貼

傷處以帛縛之麻皮纏之

○追毒散 白礬 雄黃等爲末乾擦

或油調塗

○治腦骨破及骨折葱白研和蜜厚封

損處立瘥

○治因傷血出不止大黃燒存性爲末

傳端半日合加石灰葱姜各炒已爲

魚骨韭窩苜菜

○治打撲瘀血流注紫黑大黃末姜汁調塗一宿黑者紫一宿即白

○接骨散 治從高墜下筋斷骨碎痛不可忍 朋砂七各半 一定粉 飯

各五 右為末煎蘇木湯調一二錢服

○如病在上先喫淡粥半碗服藥別

作糯米粥入藥末和勻攤紙上裹傷處

○當飯散 治打撲傷損皮肉破筋骨

斷瘀血壅滯結腫不散或作癰疽痰痛甚及傷後中風手足痿痺

沃蘭 飯 膠 續各十 芍 芷

芍 桂 白楊皮不用細各五 川烏

川椒各三 桔 甘各四 右為末熱酒調

○勻氣散 凡傷重先用此藥調氣然

後服藥 尚 青 朴 芷 烏藥

杏法各陳 藥 煎 桔 蒼

甘各 右每服一二錢姜三片棗一枚

煎空心服

○大羌氣湯 傷損極重二便不通者

左服此可加木通如未通加朴硝候

二便通服稍藥不可用酒煎命不通

矣然亦須量人肌弱用孕婦小兒莫

服 大枳各四 芒 甘 陳 紅 飯

蘇木通各二 朴少 右水煎專治傷

重瘀血不散腹脹二便不通上攻心

腹悶亂急將此藥通下瘀血後再服損藥

○陰紅湯 治婦人傷損瘀血不散腹

脹二便不通上攻心腹悶亂急將此

藥通下瘀血後服損藥 產婦油

髮燒 鹿角膠各一 沒行 右為末温

酒調服

○止痛當飯散

治打撲損傷腫痛不可

忍 米殼去青隔 芷 甘草炙各

半加乳沒各少 右每服二錢水一盞

酒半盞同煎至八分溫服

○復元活血湯

治墜墮惡血流於腸

下疼痛不可忍 柴二分 枳 飯瀝

行紅七 大酒浸 耳炙 川山甲炮

分桃二十 筒去皮尖 右分二貼水一盞半

酒半盞同煎至八分五更平明溫服

得利為度利後痛未盡更服

○當飯導滯散

治墜打壓逐 腫滿疼

痛 大兩飯尾半 麝一字 方二

用 右為末熱酒調服通利為度

○補損當飯散

治隊馬落車傷脫 析

臂服三百筋骨即相連神效沃 蘭

附炮去皮 分飯炒椒炒甘草桂格三 芍

炒六一 右為末每服二錢溫酒下忌

海藻松菜葱猪肉

○沒藥乳香散

治打撲傷損痛不可

忍 木炒二 飯焙 甘草炙 沒乳

桂格五右為末 溫酒下

○雙鳥散

治打撲特痛及肉損者

川烏草烏 並炮 各 飯 白芍 藕

木 大黃 生地 紅麴炒 各 麝

少 右為末酒煮一飯放 令服如覺

麻痺無害但二鳥生用雖好恐大猛

故炮之去皮臍用也

○一方

治顛撲傷損瘀血留經絡成

痼疾老黃茹種薄切瓦上 焙乾 為末

溫酒或鹽湯調二錢服雖十年積血

亦可下

續骨良方

乳香每兩 煨過人骨一兩 男骨女用 飛羅麵半斤 右為末用無根水丸如梧子大每服三十丸好酒送下

益母膏

治折傷內損有瘀血每遇天陰痛方見婦人門

元戎接骨丹

沒乳飯椒

自熬銅醋煨 骨碎補酒煨 赤芍 敗

龜板酥炙 虎脛骨 芷 千金藤細

李仁各等分 右為末化蠟五錢丸如彈子

大每服一丸好酒半斤化開煎用向

東南柳枝攪散執服一方加龍骨

川芎

鷄鳴散

治從高墜下及木石所壓

瘀血凝積痛不可忍 大黃兩 杏仁一 皮尖去 右酒煎去粗雞鳴時服至

頭服免成杖之方

曉必下瘀血即愈 此方用香而不用氣分故用香以行氣中血

治遭杖打不青不腫不成杖瘡以不

骨燒灰為末頭先酒調二錢空心服

入服皮益厚

治打傷血聚皮不破 蘿蔔研爛入 鹽

治跌瘡及湯火惡瘡不生肌肉者黃

蠟兩 清油斤 先二味煎三五沸次入

黃丹一兩 再煎五七沸候冷入乳沒

末各五不攪勻成膏厚紙攤貼患處

金瘡出血過多 四物加參芪

兵器傷血出者必渴不可與水只食

乾食肥膩之物不妨如食薄粥則血

滿而出必死 治棒瘡刀刃傷疼痛不

可忍 防風 南星 湯洗 右姜一片
水酒煎食遠服

○金瘡腸出欲入之 磁石滑石 各二兩
為末米飲調方寸匕日三服

○治金瘡未愈而交接血出不止婦人
衣帶二寸燒末水調服

○治箭頭在骨內不出者大雄鼠一枚
取精肉薄批為末每服二錢熱酒下
若覺箭瘡痒不抓忍痒少時箭頭自
出

○治金瘡已發箭中悶絕無所識 琥珀 研 童便 調服

○新被毒箭搗藍青絞汁飲并傳瘡上
如無藍可漬青布絞汁飲之

○龍骨膏 治金瘡 龍骨 海螵蛸
五倍 赤石脂 黃丹 煨各 石各研

細入麝少許先搗水洗搥乾傳

○一方 治金瘡止痛止血 連 枚
等分 研末付

又大黃燒存性末付
又紫蘊一味末付之

又龍骨黃柏末付之
○破血丹 治金瘡止血止痛 天花
粉 芷 姜黃 各一 赤芍 各一 右為

末少許乾搽於患處或蜜調塗

○黃丹散 治金瘡并一切惡瘡 黃
丹 軟石膏 煨通紅 右為末搽傷
處甚妙

○治金瘡人膽汁敷患處極妙不可再
用他藥傷益爛如先已敷他藥亦不

可用此

○金瘡止痛 桑葉灰研傳佳

金瘡血不止，黃痛，鱗蟻，末傳之，立止。

又方：柴檀末傳之。

○一方治金瘡止血：石灰炒和雞子，白丸如彈子，人炭火煨赤，搗末傳瘡上。

○又石灰同韭菜搗陰乾，為末，搽之，縛定，痛血皆止。

○又止血止痛，白芍藥末傳之，即止。

○金瘡出血，急以石灰厚付，敷之，瘡深不寬速合者，加滑石末付之。

○又老杉木皮為末付之。

○又用松香加琥珀末付之。

○又茛菪花或綿花或紙灰填瘡，只血止不膿。

○又野苧葉或茄葉，搗付冬乾者付之。

林筋縮及針力不出，鼠肝及腦傳之。

○又螻蛄搗汁，臈三五次，箭頭自出。

○又象牙屑水和傳上，即出。

○沒藥散 治刀箭傷止血定痛。

胡粉 石灰各一 枯凡三 乳香 沒

藥各一 右為末，付傳乳香，沒字。

○出箭鏃頭方 蟻娘 乳酪等麝，詳為末，撥動搽之。

○治箭入骨不可檢者，巴辭蟬娘，箇右同，研傳傷處，微痒且忍，極痒不忍。

即撼動，按之以黃連貫眾，洗以牛膝，製石灰傳之。

○治竹木刺在肉中不出。

生牛膝，莖搗塗之，即出。

○又以頭垢塗之。

○以蠟傳之。

牙屑搽之

又嚼白梅肉傅之

又白菊根燒末脂膏和塗之

又以鼠腦厚塗之

○湯火傷

神効當皎膏

治湯火傷

嗽赤疼痛腐化成膿 當皎 黃蠟

各一 麻油 兩 右先將油煎令當皎焦

黑去滓入蠟急攪之放冷入瓷盒內

每用故帛攤貼之

○赤石脂散

治湯火所傷赤爛熱疼

赤石 寒水 太黃等分為末新水調

塗

○一方

治湯火傷神妙

草麻子

蛤蚧等分為末湯搗油調火傷水調塗

又蛤蚧殺燒為末油調塗

○湯火灼成瘡 柳枝燒灰以粉塗之

○又石灰水和塗

○治湯火灼爛 竹中虫蚶末傅之

○治湯火瘡水煎腹令稀稠待冷塗之

○一方雄與蜜搗塗

○又單傳溫牛屎立已

○又一方生胡麻如泥厚搽之

○黃蘗散

治湯火傷 栢大

朴硝 雞子殼 寒水石 右等分

為末水調塗

○傳 治湯火瘡 經霜桑葉焙乾燒存性

為末香油調付或乾付

○林 治中熱油燒痛以白蜜塗之

○治熱油及湯火燒瘡痛不可忍 石

膏末傅瘡上

○治中熱油及火燒瘡檢白皮末猪脂

或根皮為末付

●大咬傷不可便貼膏藥及生肌散之

顛謂毒不出也先用導水丸再切散

馮干餘行即時拭腫然後敷貼之末

香板柳丸亦可下

●**導水丸** 大 今略 牽 滑略二

右為末水刀白湯下

○**再切散** 牽 西苗 兩 或加水 兩 右

為末姜汁調服

○**定風散** 治大咬毒氣入腹嘔不下

食頭痛 星 生 防風 等 右為末 抄

○或南星洗防風 姜汁酒調服童

便更佳○又姜煎入酒服可

○狗咬倉卒無藥用葱搗爛貼之○又

牛糞塗之○一方嚼杏仁傅之○又百

草霜末油調付○又鼠矢末油調傅

○治犬傷腫肉色黃爛 草麻子 十

去殼水研成膏先以鹽水洗次以此

膏貼

○人口咬者亦用此方

○**一方** 治顛犬所傷或經久復發

雄雞麝右研勻用酒調一錢服必

使得睡切勿驚起在白醒利下惡物

再進下服

○治顛犬咬韭菜根搗汁多服又灸傷

處三五壯○又膽礬為末貼瘡上

○治狗咬桃白皮下榿木煎服○一方

枯礬妙

又方拖子皮燒末石硫黃分為末傅

日二三度

虎牙兕頭

●治猫咬搗薄荷汁塗之

●治鼠咬麝香末津調塗

●蛇傷凡初被傷用針挑起咬處皮輕

人剪去俾出血即愈慎勿妄用雄

黃傳瘡恐毒氣不泄攻肉仍服後藥

芷細各五雄仁右為末入麝少許

酒調服

○「方」治蛇毒及一切重傷 五灵

酒洗去沙雄五右為末酒調服又

為末傳名靈痛散

又龍腦薄荷研汁溫酒調服又塗傷

處露中心出毒氣

又細撥雄研入麝少許酒

調服治蛇毒及惡犬傷

解毒散 凡毒蛇傷人眼黑口噤手

足強直白礬研或甘草等分為末

冷水調下

全 毒蛇螫人急掘地坑埋瘡處取其

上毒即入土中痛止

○中蛇毒勿渡水渡水則痛甚

○蛇入穴窠急用刀割尾挾辛辣物用

絲縛定自出不可拔

○辟蛇法 雄黃成塊秤五兩帶之入

山則諸蛇不敢近

○蛇傷取大糞塗又灸咬處或付

馬咬用栗子嚼傳又燒灰油調付可

入咬龜枝燒灰末油調塗

○蝮蛇傷 香油點燈火吹滅以烟薰

傷處不痛即愈又用雞糞塗又用雄黃

林 一方用雞冠血塗又巴豆研猪脂

又鹽傳之止痛又鹽湯良爲
妙又井底泥塗之溫則易之又麻鞋
底灸以指之即瘡
○凡蛇蝎蜈蚣咬傷灸傷處三五壯按
去毒

○凡一切虫獸咬傷腫毒及杖瘡爛發
或透入裏者宜先用導水丸禹功散
或木香換柳丸下之

○治蛇蜂蜈蚣傷雄黃末水調敷仍酒
調服諸虫傷主
亦用之

○治蜂螫入蜂房末猪膏和傳蜂房煎
湯洗亦可

○治蜘蛛瘡用清油擦之

○治蚯蚓虫咬其形如大風眉鬚皆落
以石灰水浸身

○治壁虱草撥烏頭各二雄三

煇硝五煉蜜爲膏曬此燒一炷於床
下其虫自死

○驅蚊蚋壁虱蒼斤本別雄各二
右煉蜜九加彈子大床下燒一炷或
於蚊合時當門燒之

○薰蚊香附斤蒼斤半雄檀腦各
右爲末入雄黃檀腦重羅隔此時
略焙令燥

○辟蚊木別芎各一雄半蜜九
如皂子火燒辟惡虫

○治頭上虱子刺芎末參髮中經有虱
子皆死

○治骨鯁入喉縮其等爲末縮
畏險之噫津父之隨痰出
丁方野苧根槁丸噲之又含水備食

鱈魚鱗皮燒末水服末世更
又鹿角末合之曬津又瞿麥末服方
寸七又以魚骨於頭上立即愈

服生

漆瘡用貫仲煎湯洗之效

○又用磨刀石上泥塗效

○又薄荷葉斤水行煮取五升洗瘡即
瘡

瘡

○又以韭菜研傳之妙

○又以湯浴其硝令濃搽之即愈

○又用蜀椒煎湯洗之○又取蟹黃塗

之

○又以蓋漆紙燒烟薰之

○又用萹荑煎湯洗之

○又用有礬煎湯浸洗

○又用杉木煎湯洗

○又用木葉葉煎湯洗

○糯米生末付立効

破傷風門

傳若夫破傷風証因事擊破皮肉往往

視為尋常殊不知風邪乘虛而容

之軀而變為惡候又諸瘡久不合口

風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾

焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪

無異其為証也皆能傳蟻經絡燒爛

真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜

身軀強直如角弓反張之狀死在旦

夕治之法當同傷寒屢治因其有

在表在裏半表半裏之不同故不難

和二三法也

○活防風湯

治破傷風邪在表
表裏風 芎藭 藁 飯 芍
各五 地榆 細各五 右水煎去粗
熱服○熱則加大黃錢○大便秘加
大黃五分

○白朮防風湯

如服前藥太過令自
汗者宜服此 朮行 風行 芎藭 芍
右水煎藏府和而有自汗可用此如
破傷風藏府秘小便赤自汗不止者
因服熱藥汗出不休者知無寒也宜
連下之先用小芎黃湯二三服後用
大芎黃湯下之

○小芎黃湯

芎行 芍 芎 各五 右水
煎三服即止用

○大芎黃湯

芎行 芍 芎 大 各半
右水煎服以和為度

○大羌活湯

治破傷風邪在表半
裏 羌 芎 麻 芎 膏 風
前 芍 細 芎 白 芍 枳 蔓
各四 芎 芷 各二 右細切作一服入
生姜五片

○防風湯

治破傷風同傷寒表証未
入裏者 風 羌 獨 芎 各一 不
右水煎

○養血當飯地黃湯

治破傷風日久
氣血漸虛邪入胃 飯地 芍 芎
藁 風 芷 各一 細 半 一 右

○白朮湯

治破傷風大汗不止筋攣
手足搐搦 朮 葛 各二 升 芍 各
一 芍 細 半 一 右

○九味羌活湯

治破傷風發熱濕見

○疔毒藥

治初破傷風

風邪未入深者，各法及自麵粉等
石和勻，新汲水調和付傷處，更腫消熱
退。

○瘡瘍門

集

○夫癰疽瘡癤皆由氣血不和喜怒
不時飲食不節寒暑不調而發多生
於膏梁富貴之人平昔所食肥膩炙
博安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱
毒內攻煎熬氣血而成也。

精

○疽分外發內發○初發疽之時一
粒如麻豆大身軀便發熱生疽處肉
亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色

紅紫為外發如用藥有理百人百可
消。

○初發疽時身軀無熱自覺倦怠生疽
處亦不熱數日之間漸大開大不腫
不高不疼不癢低陷而壞爛破後色
黑為內發未發見之先藏府已潰爛
百人百不救。

精

○凡瘡腫大按之乃痛者膿深少按
之便痛者膿淺。

傳

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無
膿。

○疽發深不痛者胃氣太虛死肉多而
不知痛也。

○夫瘡疽腫毒須辨虛實虛者難補實
者易瀉云。

○腫堅硬膿稠者瘡疽之

○腫下軟慢脹稀者瘡疽之
○瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足
冷脈弱皮寒小使自利或時難聲不
出精神不爽者藏府之虛也

○太便硬小使澁飲食如故腹滿膨脹
胃膈痞悶肢節痛口苦咽乾煩渴身
熱脈大精神昏者藏府實也

○膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒
自汗色脫氣血虛也

○腫起色赤寒熱疼痛膿水稠粘頭目
昏重氣血實也

○頭眩鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌
生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也

○精神不滯太使自利腰脚沉重睡卧
不寧者下虛也

○肩項不便四肢沉重目視不正睛不

了了食不知味音嘶色敗四肢浮腫
者真氣之虛也

○腫焮大其痛不可近積日不潰寒熱
往來太便秘小使澁心神煩悶恍惚
不寧者邪氣之實也

○又曰脈洪大而數者實也微細而軟
者虛也

○傳治法或疎散或消毒或針烙或內托
或外消或瀉利或補益是故腫瘍為
實且瀉痢潰瘍為虛且補益浮露而
淺者為難且外消藏伏而深者為疽
宜內托

○其証善而易治者為順惡而難治者
為逆

○目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子
上者一逆也

○不能飲食納藥而嘔食不化也
 ○傷痛渴甚三逆也
 ○膊項轉動不便四肢沉重四逆也
 ○聲嘶色脫唇唇鼻青黑面目四肢浮腫五逆也
 ○煩躁時咳腹痛甚泄利無度小便如淋六逆也
 ○膿血大洩厥腫大甚膿水臭敗莫近七逆也
 ○喘促氣短恍惚嗜卧八逆也
 ○未潰先黑陷下唇青黑便汚九逆也
 ○又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目眩耳聾恍惚驚悸語言錯亂皆是惡証
 ○動息自寧飲食知味一順也
 ○便利調勻二順也

○神彩精明語聲清明三順也
 ○膿潰腫消色鮮不臭四順也
 ○體氣和平五順也
 ○凡五順見三則吉九逆見二則危
 ○灸法凡疽瘡便宜灸之一二百壯灸後覺熾痛經一宿火氣下徹腫內熱氣隨火而出也若瘡深宜置餅子灸之其餅須以椒姜鹽葱相加搗爛裡作餅子厚如三錢當瘡頭餅子上灸之餅子若乾更換若瘡痛須急灸壯數多為妙若膿已成者不可灸即餅開之
 ○又赤皮蒜搗爛作餅子如豆豉餅子灸之亦佳
 ○用大蒜去皮切三文錢厚安瘡頭上煎艾灸之至二三壯換蒜餅

灸至不痛不痛灸至痛味
如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上
燒之蒜敗無換

○又云瘡瘍自外而入者不宜灸自內
而出者宜灸外入者托之而不內內
出者按之而令外

最早灸為上一日二日十灸七活三
四日六七日活五六日三四活過七日
則不可灸

○癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初
發並宜灸

○凡腦疽及項已上瘡不可直灸灸三
里氣海穴而漸入服涼膈化血之藥

○凡治癰疽用騎竹馬灸法無不安愈
兩穴各或五壯或七壯可以起死救

危

○用蠅針法凡癰腫舉作用大馬蠅一
條安瘡疽之頭上吮其正穴膿血出

盡散如毒大蠅小須三四條方見功
腹傍黃者力大若血不止泥藕節或

貼白菊花

○傳 蠅針之法可施輕小証候吮出惡血
若積毒在臟腑者徒竭其血於外無

益

○內托之法腫爛于外根盤不深証

月五二

Kitasato Memorial Medical Library

在表麻多浮病在皮肉非氣盛則必
復于內急須內托宜復煎散除濕散
醫疾胃氣和不_不如太使閉_及寒熱_其
服黃連湯如微利及煩熱已退却與
復煎散

○林治癰之太要有托裏內疎通行榮衛
之三法

○外之內者其脈浮數軟腫在外恐毒
氣極而內攻當先托裏

○內之死者脈必沉實發熱煩躁外無
脈赤痛深於內其毒深矣當先疎其
內以絕其深源也

○內外之中者外無嫩惡之甚內則清
便有調知其_在經當和榮衛也能用
此二法縱末_即瘡必無變壞之証

○膿出而反痛者為虛宜補之亦有穢

氣所觸而_在痛者宜和解之風冷亦
通者宜溫養之

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之
後當作陰虛補之若年老貴後發嘔
不食又宜參芪末峻補隨証加佐使

○藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也
宜倍白朮

○癰疽發渴及血氣兩虛用生芪以補
氣服地以養血或忍冬丸黃芪六
丁湯皆効

○癰疽大作毒氣炎盛大渴急服神仙
追毒丸每日丁服取下惡毒次服清
腫湯

○直疾既安之後忽發渴疾者多不救
須服加減八味圓而防未然_未及_未
人在渴疾亦須服之

○**膏腫湯** 治癰疽熱盛微腫疼痛作

湯 生地 芩 芍 參 知 其

白苓 略二升 莖 萸 門 略三

右水煎

○**加減八味圓** 癰疽未生或初生或

既安湯証出來並用之 地 酒 酒 蒸

山藥 去 山藥 各一 桂味淡者 沢

牡 荅 絡 八 五味 酸 右煉蜜丸如

桐子大五更初未言已肌溫酒或每

湯吞下三四十九累驗

○**忍冬圓** 治癰疽大能止渴忍冬根

莖花葉皆用入瓶內以無灰酒浸以

燻火煨丁宿取出曝乾入甘草少許

為末所浸酒打麩糊丸如梧子大每

服五七十九酒下

○**黃芪六一湯** 治癰疽發湯 芪 六

○**林 養 其 酸 行 石 水 煎**

○**竹葉黃芪湯** 治瘡腫湯甚 竹 行

生地 細 門 莖 飯 芍 其 門 苓

芍 參 半 膏 絡 半 右 其

○**榮衛通湯** 治癰疽發背大能順

氣均血扶胃氣蕩滌邪穢自然順通

不生變証真仙劑也 何首烏 不 犯

飯 通 赤 芍 炒 芷 不 見 茵 炒 烏 藥

炒 枳 殼 炒 若 惡 心 其 各 等 右 水 酒 相

半煎 ○ 流注加獨活 ○ 流注傷寒表

未盡餘毒流於四肢經絡為流注 ○

如尚有潮熱則裏有藥和未盡散加

升麻 ○ 如此而不退可加乾葛 ○ 如

有頭疼加芎並姜水煎 ○ 如無潮熱

再用水酒相半煎酒大能行血生氣

散也 ○ 如氣血盛者減當飯後則生

發於他所無，若癰腫生，人不絕斯
乃秘傳。○癰疽生，或有一証，一胃寒
生，痰加半夏，健脾化痰，一熱鬱而成
風，痰加桔槓，以化疔，疔之痰，並用姜
水酒煎。○腦疽發背，在上者可去木
通，恐導虛下元，為上盛下虛之病，老
人羸弱，在右宜去之。○病人有瀉者，
不可使用此方，宜先用止瀉藥，白礬
生用，為末，溶開黃蠟丸，米飲下，三十
丸。

丙托復煎散

治腫狀於外，根盤不

深形証在表

地骨 莖 風 各三

分芍 芩 木 苓 參 苁 飯

已各一分 柳桂 九分 者右分四匙先

煎製蒼木三兩八錢，用水十盞，煎至
二盞，去蒼木，每用一盞半入藥一匙。

再煎至八分，去粗服，若大便秘及嘔熱，
少服黃連湯，如微利，煩熱已退，却服復

煎散，如此，榮衛俱行，和氣不能內侵也。

丙疎黃連湯

治嘔啞心逆發熱而

煩，脈沉而實，毒氣在內，藏府秘澁，薑

急疎利之。連 施 芍 飯 楨

木 苛 各半 翹 一 芩 桔 其 各半

大 二 分 右 如 一 便 不 閉 澀 且 未 可 入

大黃

黃連獨活散

治背疽一切惡瘡初

發腫者，三四服即消散。連 獨

菴 風 藁 芩 風 梢 洗 飯 枳

參 陳 蘇 木 其 梢 已 各半 知

酒 枯 各 一 生 地 行 飯 身 翹 各 三 莖

其身發，枳各半，決分，右每服八錢水
一盞，煎八分入好酒，去盡渣。

○**補湯** 治發背疼痛嘔吐及發酸
逆參 甘 苾 飯 白芍 各二
乳 沒 木 芷 絡 一 右

○**防風當散** 治諸般瘡毒熱毒
風 飯尾 甘 節 赤 芍 苾 芷
各五 左纏藤 皂角刺 各五 桂 陽 一
五 大 陽 五 不 右 咬 咀 水 四 椀 砂 鍋 煮
至 一 椀 入 好 酒 一 椀 再 煎 服

○**當散黃苾散** 治癰疽腫膿膿已行
痛不可忍者 飯 芍 甘 生 地 各 芍
苾 地 骨 等 右 水 煎

○發熱加芍 ○煩躁不得睡加施 ○嘔
是濕氣侵胃加木

○**五香連翹湯** 治惡瘡癰疽瘰癧等
病 沉 乳 甘 生 青 木 路 一 翹
射干 升 桑 寄生 如無以升 獨
麻代之

通絡三丁 爛天 酒蒸 麝 半 不 右 煎 空
心服 半日 以上未利再服 以利 惡
物為度

○**九珍散** 治癰疽腫毒因氣壅血熱
而生者 物藥 芍 飯 赤 芍 生
地 芷 大 芍 萎 苾 等 右 水
酒 相 半 煎 服 婦 人 乳 癰 亦 宜 服

○**丙托千金散** 治腦背癰疽乳硬等
惡瘡 宜用也 芷 飯 芍 參
苾 風 苾 芍 萎 桂 桔
金銀花 各 半 右 水 煎 入 酒 再 煎 去 粗

服 ○如痛甚倍加飯芍 又加乳香瘡
口內有黑血或遍身汗出皆藥之效
也

○**千金托裏散** 治一切瘡腫發背疔
瘡 翹 二 兩 朴 風 桔 各 二 錢 兩

芎 芷 芍 桂 參 茸 各一
飯醋木 沒各三乳二不右酒煎

○**傳** 千金托裏散 治背疽并諸惡瘡

三百以裏未針灸及排大便者則可

酒 飯身 翹 芥酒酒大絡三門

行卷 藁 苾 灸茸 參 猪絡

絲生地 酒 桔 施 酒連絡一風洗

風稍 生茸 飯稍 陳 蕪木 五味

酒酒 酒已 絡半右分一服用水三

大盞浸半日煎至一盞稍熱服忌冷

水如覺病即忙服無不効如瘡勢已

發三四日或成膿則不消也

○**升陽益胃散** 治一切惡瘡發背腦

疽等証 飯行翹行卷 藁 苾

灸茸 絡 生茸 生地 知 芥

桔絡 丁 沢 獨 風 連 栢 風

梢 參 飯稍 陳 蕪木 酒已

絡半 右分一服用水二大盞浸半日

煎至一盞酒酒數下點去粗臨卧温

服忌飲水再作膿效遲初患一二三日

者服之立消作膿者立潰隨病上下

食前後服老人尤宜之或加乳沒各

不心妙

○**當取羌活湯** 治腦疽 芥 酒連 酒

飯身 絡 二 栢 翹 風 羌 茸 灸

梔 絡 獨 藁 分 七 沢 絳 右 作 一 服

水二盞先浸一時許入酒一匙煎至

八分去粗食後稍熱服且二服俱將

藥汁調下後項栢柳散

○**栢柳散** 大斂瘡口 栢 木 絡 三

右為末用煎湯調下或斂瘡口油調

塗生肌斂肉其速膏藥熱瘡所宜也

○丹溪治疔瘡方 生地 敗身 廿
節 風 羌 大 赤芍 貝 芷
芩 皂刺 作大劑煎服 ○氣虛加
參 芪 瘡潰後亦宜加之

○托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷
者膿出清鮮皮膚蒼涼心下痞滿腸鳴
切痛大便微溏嘔逆氣短昏愢 羌
姜各三附 炮去皮益風丁 沉香 木
荷 陳 各一其後二右入姜

○五香湯 治毒氣入腹 丁 木
乳 沉 各一麝 右水煎 ○嘔去麝
加藿 一 渴者加參 一

○定疼托裏散 治瘡腫疼痛不可忍
如少壯氣實先用疎利後服此藥
粟殼 法帶炒 飯 白芍 芎 各半 乳
沒 桂 絡 三 右

○普芪人參湯 治諸瘡破後食少無
脈虛熱 芪 行 參 木 蒼 陳
門 飯 身 炙 草 各 半 升 枳 殼 四 分

○聖愈湯 治諸瘡血出多而心煩不
安 不得眠 此 亡 血 也 生 地 熟 地
芎 參 絡 半 飯 身 芪 絡 一 右

○丙補黃芪湯 治諸瘡破後體倦無
力 懶 言 食 無 味 少 睡 脈 澀 自 汗 口 乾
芪 門 各 一 熟 地 參 苓 各 三 各

右方 芎 桂 遠 飯 各 半 右 入
姜 棗 一

●十六味流氣飲 治無名惡瘡癰
疽等証 芎 飯 芍 風 參 五

莖 木 桂 枳 芷 枳 朴
烏 梅 枳 半 各 一 右

○**托裏肉補散**

治諸瘡膿潰之後

參木 苓 飯 芎 蘇 芍 芩
芷 風 桂 金銀花 芪 右等
分

○**麥門冬湯**

治癰疽潰後膿水不絕

參 芪 芎 飯 桂 白 苓 門
五味 煖 遠 各一其 分三右入姜東

○**內托散**

治諸腫毒惡瘡一服立愈

天 芍 略 羊 麥 芥 可 燒 子 其 仁 右

○**金銀花散**

治發背惡瘡托裏止痛

排膿 金銀花 四兩無花用 廿兩右
苗 葉 嫩 莖 代

酒水各半煎一方加葱

○**丙消丸**

治瘡腫初生及癰癧結核

熟毒 歸 帶 脹 之內消 陳 青 各二

牽 八兩取 頂 一 芎 芍 皂 各八兩去
末 二兩 蘇 皮 碎 二

軟 揉 汁 升 煮 成 膏 右 青 陳 牽 為

未用前膏丸食後荆芥湯茶清溫水

○**金銀散**

治發背諸瘡腫 皂針

一 半 新 取 一 右 一 味 為 末 食 後 酒 調

半 煎 者

○**洗藥越桃散**

越桃 芩 甘 飯

卷 芷 等 右 每 一 兩 用 水 五 碗 煮 三

四 碗 去 粗 洗 諸 瘡 毒

○**解毒散** 去赤腫收熱暈寒水

連 栢 略 一 龍 骨 紅 輕 行 右 為 末 雞

清 調 以 翎 掃 瘡 四 時 ○ 熱 瘡 加 黃 丹

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○**一方** 荷葉 秋後採 草烏 兩星

○方 大黃 東牆土 右爲末
用無根井花水調行諸般惡瘡乾即
再傳

○治諸瘡口膿水不乾 寒水 煎龍骨
分國丹 飛 一右乾 搽瘡口

○乳香散 治瘡口痛甚 寒水 煎
滑 各一 乳 沒 各五 腦 抄 右 同 煎

○捏膿散 瘡口有膿不能自出如
透深者用紙捻蘸此入瘡內淺者搽

之 亨 兩 芷 兩 白 芍 輕 絡 三 右
細末用

○雄黃散 治瘡有惡肉不能去者
雄 巴 各 一 右 同 研 如 泥 入 乳 沒 各

許 再 研 勻 細 少 上 惡 肉 自 去
○保生定子 雄 巴 祛 杏 祛 沒 祛

乳 沒 祛 一 草 麻 祛 右 爲 末 唾 津 調

作定如太癩火疔瘡發背癰癰附骨
及諸般惡瘡不問新旧皆可治之

○生肌栴檀散 治癰疽瘡癤膿潰之
後外觸風寒腫軟結硬膿水清稀出

而不絕好肉不生 栴 連 木 等
右爲末乾貼亦治金瘡日久不斂○

一 次 加 麝 香
○乳香膏 木 別 祛 取 略 青 柳 枝 三 塊

剉 右 同 麻 油 四 兩 慢 火 熬 令 黑 色 去
粗 次 用 乳 沒 各 五 白 膠 香 四 兩 明 右

將 藥 入 油 煎 化 了 用 生 絹 濾 淨 入 黃
丹 一 兩 半 以 兩 柳 枝 再 上 慢 火 不 住

手 攪 候 油 沸 住 攪 渣 水 成 珠 爲 度
傾 在 水 中 出 火 毒 用 之

○神仙太乙膏 癰疽惡瘡 已 成

膿 未 成 膿 貼 之 即 斂 重 者 湯 火 刀 斧 所

傷風可內服外貼
飯桂 大 赤芍 生地 各一石

吹咀用麻油二斤浸春五日夏二日
秋七日冬十日瀝去滓油熬次下黃
丹一斤以滴油在水中煎散為度

○麒麟膏

血竭 枯 蔓 黃

芷絡 三蒼 風 差 杜 檉 黃

丹 晒香油 辟桃 柳 桑 槐 榆

梅 棗 銀 鐵 枝 剉 右除黃丹外用銅

銚盛油入諸藥 并七枝浸一宿慢火

熬令焦黃瀝去藥入黃丹用柳木篋

再上慢火不往手攪候烟起離火瀝

采成珠傾水中出火毒用

○玄武膏 治癰疽瘡疔膿血生肌肉

巴 法 燒木 別 法 燒 國 丹 兩 麻 油 耐 槐

柳嫩枝各七寸 餘 右製法同前

○方

治癰瘡中冷瘡口不合 鼠

皮一枚燒為灰細研封瘡口上

○治癰腫 枯萎根醋熬燥楊節醋和

塗紙貼服金石人須用

○瘡腫已成膿懼針不得破取雞雀屎

塗瘡頭上頻易之雞雀屎直者是

○治發背 生蠅牛二百箇入瓶中用

新汲水一盞浸一宿蠅牛放之其水

如涎澁粉調以雞翎掃瘡上日十

度熱痛止瘡便愈

○去 瘡發背欲死 瘡未以

酒調厚傅瘡上口乾即愈

○瘡腫若有息肉突者 烏頭極以苦

酒二升漬三日洗之夜三四度

義... 也與賊風相襲而不同風邪之氣擲
骨節故痛深徹骨髓遺寒則痛甚初
發之應骨皮肉微急洪人如肥狀者
是也

○林流注者傷寒表未盡餘毒流於四肢
經絡然表未盡則餘毒未盡而為骨
癰

夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流
注之敗証也流注醫者表未盡也
骨癰涼藥之過也

傳丹溪曰附骨疽者因久得厚味及勞
役與酒後涉水得此陽滯於陰之証
也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽

○活防已湯 治附骨疽初發於太
陽厥陰分者 卷 已 芎 蒼

木 翹 射干 其 白芍 通

漢尾 蕪木 各七 右水酒各半 煎食

煎服

○托裏黃芪湯 治骨疽初發於足少

陽陽明分者 飯尾 柴 二 升 芪

桂 翹 黍粘子 各八 升 升 其

各 芷 行 衣 作 二 服 酒 一 盞 水 一 盞
半煎空心服 義膳歷之

○內托黃芪酒煎湯 治瘡生腿外或

因寒濕得附骨疽於足少陽陽分微
侵足陽明經堅硬漫腫行步作痛

飯尾 柴 六 升 桂 翹 各 升

升 拍 其 枝 五 葉 太 力 子 各

右酒水各一盞煎食煎溫服

○黃連消毒飲 治附骨疽 連 卷

各 一 升 相 桔 已 藜 各 五

生地 知 獨 風 飯 尾 翹 略
分 莖 參 蘓 木 沢 路 二 耳 陳
絡 三 右 水 煎

○老人曰寒濕氣得附骨疽於左腿
外濶六七寸長一小尺堅硬滿腫以
指按至骨大痛與此藥即愈

○加味八味丸 治附骨癰疽真氣不
足虛火炎上之証及疽愈後發渴者
俱効方在右

疔瘡

○義夫丁癰者以其瘡形如丁蓋之狀者
是也古人論皆不離於氣密於經絡
五藏內蘊毒熱生丁頭四腫痛黃
赤黑無復定色便令煩躁悶亂或憎
寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛

無血是其候也急用艾又之若不覺
痛者針丁四邊冷血出者或針之不
痛無血者以猛火燒鐵針於上烙
之令如焦炭取痛為効如針不痛眼
黑或見火光者不可治也此邪毒之
氣入藏府故也

○又曰刺瘡心至痛處又刺四邊十餘
下令血出傳藥令力得入針孔中則
佳

○丁腫十二種形色禁忌

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色
微黑四邊微赤多痒忌食麻子細衣
布衣并入麻田中疔
二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆
甚硬刺之不入肉微痛忌用礮礮石
之屬

三日雄疔其狀炮頭黑屬四畔仰起
漿起有水出色黃大如錢孔形高者
忌房事

四日雌疔其狀瘡指黃血裏屬赤似
反瘡四面癩漿起心凹色赤如錢孔
者忌房室

五日火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑
屬四邊有烟焰又如赤粟米者忌火
燒烙

六日白爛疔其狀色稍黑有白斑瘡中
潰有膿水流出瘡形大小如匙面者
忌沸熱食爛物

七日三十六疔其狀頭黑浮起如
黑豆四畔起赤色今日生一明日生
一及至十者滿三十六不能治未滿
者治忌噴怒愁恨

八日蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形
如小豆似蛇眼大難硬忌惡眼人看
井嫉妬人見忌毒藥

九日鹽屑疔其狀大如匙面四邊皆
赤有黑粟粒起忌食鹽味

十日水洗疔其狀大如錢形如錢
形瘡頭白起黑屬汁出中硬忌飲漿
水水洗渡河

十一日刀鎌疔其狀闊挾如薤葉大
長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀
鎌切割可以藥治不可亂攻

十二日浮瀝疔其狀瘡體曲圓少許
不合長而狹如薤葉大肉黃外黑黑
處刺之不痛黃處刺之痛

十三日牛狗疔其狀肉色炮起搨不
破

右十二種疔瘡初起瘡心先痒後痛
先寒後熱四肢沉重心驚眼花重則
嘔逆嘔逆者難治麻子疔一種始末
惟痒錄忌者不可犯犯者作難治浮
濕疔牛狗疔無禁忌總不瘡不殺人

林赤芍藥湯

治疔瘡癰疽初覺憎寒

疼痛 赤芍 金銀花 絡五 大紅菱
仁飯 苒 枳 各三 右水酒煎

通利藥

黑牽 末一 巴 十五粒 大行
去油

有為末水丸白湯下

荆黃湯

治風熱結滯生瘡毒 荆

紅大半 右

托裏散

治惡瘡發背疔癰便毒始

發脈洪數腫甚欲作膿者二服消盡

大 蜈 枯 皂刺 朴硝 翹 各
不飯 金銀花 各一 赤芍 芩 絡二

石水酒各一盞煎

黃九

雄 爵 皂 蝎 絡 一 巴

十四指磨細右為末滴木九如粟豆
去壳

大每服一十九亦看虛實加減丸數

茶清送下

一活散

義 十 三 片 取 狀 雞 異 若 熱 毒
之 掛 也 治 法 先 以 雄 雀 九 下

飯 烏 赤芍 金銀花 酒 翹 天

花 芷 苒 節 絡 紅 蘇 木 荆

蟬 脫 葛 絡 三 檀 行 右 為 末 茶 手

煎湯下

獨蟾丸

每取蟾酥法

拿取活蟾大壯癩疔捉住後脚以大

桑葉或油紙包掩其面用鐵針取眉

間白汗幾葉上凝結如濕直粉丸

如葉豆一蟾作一丸多者作二丸懸

當風處陰乾患疔瘡者即以一二九
置古尖上仰臥片時若水滿口嚥下
或以銀鍼刺開疔瘡頭上納藥一丸
以薄皮紙貼護之癰疔初起時依此
法可治之取藥時入

集驗○**追疔奪命湯** 羌 獨 青 膠 扇

膠連 赤芍 二細 甘節 蟬蛻

姜蚕 脚連 各等分 黃連 加 河車 沢

蘭 金銀花 ○有膿加何首正 ○要利

加青木 梅 大 牽 ○在脚加木

瓜 各等 右水煎

○**丙杜連翹散** 疔瘡出皮色不變不

疼用針刺仍服此消散 翹 芷

生地 赤芍 各一 大 梅 荷 絡 七

驗集 煎如喘加參妙

○**五聖散** 治疔瘡 皂針 二 萎 斷

六 金銀花 生姜 其節 絡 一

右酒煎

○**百十二散** 治發疔瘡 煩躁 手足

不住發狂者 其節 菘豆 辰 絡

分右為末每服二錢熱水下

林 ○**蟾蜍丹** 蟾蜍 一枚 為末以白

麵和黃用捏作劑丸如小棗大針破

患處一粒內之神妙仍以水澄膏

○**水澄膏** 白芨 伴為末水盞內沉下

澄去水皮紙攤貼

○治疔瘡腫甚者 附子末醋和塗之

乾即無塗

○治一切疔腫取蒼耳根葉燒作灰

醋浸和如泥塗乾即易十餘度即拔

出其根

○魚臍疔瘡頭里深破之黃水出四時
瀉漿蛇蟻燒灰存性為末雞子清調
敷驗狀似魚臍也

○治魚臍疔 絲瓜葉 連鬚葱 非

○菜石石白肉梅爛酒和服以粗貼
腕下如病在左手貼左腕在左脚貼
左膝正石同如在中貼心臍用酒縛
住候肉下紅線處皆白色則安令人
抱柱心顛倒則難救

○灸法灸掌後橫文五指男左女右七
壯即瘥

○傳以太蒜搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以
艾灸之口爆為度如不爆稍難愈宜
多灸百餘壯無不愈者

○有紅絲疔頭生手足間有紅紫一
線急用針刺劫不然其絲入心必難

瘰癧

○夫瘰癧瘡者有風毒熱毒氣毒之

異瘰癧結核寒熱之殊皆由忿怒氣
逆憂思過甚風熱和氣內搏於肝經
蓋怒傷肝肝主筋故令筋縮結毒而
腫多生於頸項脊腋之間結聚成核
初如豆粒後如梅李累累相連大小
無定初覺憎寒壯熱咽項強痛腫結
不消者使瀉服散雁潰堅湯或香
連翹湯散之或用牡蛎大黃湯疎利
之瘡上可用丁香膏顛貼之或隔蒜
灸之

○又有馬刀瘡亦生項腋之間類瘰癧
但其形如馬刀赤色如火燒極痛宜
急治之

林夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頰頰或在頰下連及缺盆皆謂之瘰癧或在胸及背之側或在兩腋皆謂之馬刀乃手足少陽經多氣少血之病也

傳丹溪曰瘰癧必起於少陽之經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚氣之積須分虛實人者易治虛者難治

○寂苦化堅湯 治瘰癧馬刀 莖

漏芦 升 菴藜 絡 參 牡

生地 版身 熟地 白芍 牛

莖 連 栢絡 炙甘 葛 獨

風絡 半桂 昆布 益 稜 各 柴

分 村 丁 不 越 分 右 爲 末 湯 浸 煮 會 捏

作 餅 亦 且 乾 搗 如 米 粒 大 每 服 三 錢

右 湯 下

○如氣不順加橘紅甚者在加木香少許

○如心在陽明分者去柴牛

○如在少陽分者去獨漏升葛加

○如入素氣病勢來時氣盛而不短

促者不可考其平素宜作氣盛而從

病變之權也加苓連栢知已類在上

魚脊在中魚連栢生膠洗在下焦酒

製栢知已

○如太便不通而其邪盛者加酒製太

黃以剋之

○如血燥而太便乾燥者加桃仁酒製

太黃風燥加麻仁

○如風溼而太便不行加煨皂角仁太

黃秦朮

○如人素氣弱去苦寒之藥多加參芪

○凡母冷藥多妨其飲食此為治之太
法也○又冬寒不可用芍○如有煩
燥去桂○無腫不可用牛○如瘡堅
硬其者用莪不甚堅硬不用○如嘔
多吐食用益知不然不用○如煩燥
用酒不然不用

○散腫潰堅湯

治馬力瘡結硬石

或在耳下使益或肩膊上脇下皆手足
少陽經中及瘦癭遍於頰或至頸車
堅而不潰在足陽明經中所出或
証瘡已破流膿水並皆治之 芩八
酒洗半膳酒洗 桔酒洗 知酒
昆洗 桔酒洗 柴酒洗 棧酒洗
然翹各二白芍 葛 飯稍 連各
分 分 右作一服水一盞先浸半日
煎至一盞去粗食後搗熱服於即處

神足在高處頭低垂每食一吐作十
次不作服畢少頃依常安卧取藥在
臍上停畜故也別制一料為末煉蜜
丸如棗豆大每服百餘丸以煎藥送
下或加海藻五分亦如前法

○升陽調經湯

治瘰癧 升瓜葛

膳酒製 炒 芩 糯莪 棧 炙 甘
各四飯稍 芍 各三 栢 酒妙 知 酒妙
右水浸半日煎臨卧稍熱服外為不
煉蜜丸如前方法

○柴胡連翹湯

治男婦馬力瘡 瞿

仁柴 翹 知 酒 芩 糯 栢 芍 炙 甘
其 栢 酒 生地 絡 一飯稍 強 桂 分 石
水煎 稍熱服

○消腫湯

治馬力瘡 翹 仁 生 芩

柴 各 分 栢 芪 絡 一飯稍 其 各

分牛炒連絡五紅砂石水煎稍熱服

集

○**棋捕散**

治氣毒瘰癧心塞飲食

石下_下 棋_前 赤苓 牛_各參_兩

枳_炒沉 風_略半_斤 其_炭一_石入_姜

○**翹于連翹湯** 治瘰癧寒熱_射

翹_前 玄_參 赤_石 木_升 前_前

梅_飯 其_各大_兩 二_石 入_前

芒_硝炒_食後_溫服

○**瞿麥飲** 治瘰癧馬_刀 瞿_穗半_翹

石_右水_煎服_此藥_經効_累多_但不_能

○**王** 治結核耳前後或耳下領正右者皆

瘰癧也 桑_椹二_斗極_熟以_布裂_取

自然_汁破_器內_文武_火慢_熬成_薄膏

白_湯煎_一匙_食後_服

林

○**連翹丸**

治瘰癧結核破或未破

新荷葉_二斤_新紙_包角_一條_去皮_水已

上_珠銀_石器_內熬_成膏_青 陳

膏_半生_半炒_翹五_皂角_煨去_皮扇_末

右_為末_用膏_子凡_每服_二平_丸前_連

翹_湯下_平日_効了

○**此瘰癧** 大田螺連殼燒存性破末

破者乾貼末破者香油調付

○**治頂間少陽經中疔瘡赤腫硬痛**

麻_節生_山藥_陰右_二味_搗爛_攤帛_上貼

○**治瘰癧不閉有頭無頭用木**

一枚晒乾細研酥油調貼之日_兩度

○**一方馬齒菜陰乾燒灰臘膏**

以_暖泔_水洗_瘡拭_乾傳_之日_三度

○**龍泉散** 龍泉粉_炒磨_力石_瓦粉

義_稜洗_昆布_絡五_石為_末煎_熟水_調塗_之効_速

○**一方** 五倍 海螵 楨 靈脂 麝 右為末清油調塗濕則

乾搽

○又 星 牛 血場絡 輕紗為末 津嗎調傳

○**灸法** 治瘰癧以手仰置肩上微舉

肘骨尖上是穴隨患處左則灸右則灸右肘七壯再灸如前二次永

無恙四五年用藥不退辰時者灸申時即落

○一法以蒜片貼瘰癧上灸七壯易蒜多灸取効

瘰癧

○**林** 喜憂不節息思過度致氣滯血凝為瘰癧瘰者多結於頸項之間瘰者隨

氣凝結於皮肉之中忽然腫起狀如

梅核又則滋長醫經所謂瘰癧有五種

石內筋血氣也瘰癧有六證骨脂膿血

石肉也治法瘰癧不可決破破則膿血

崩潰多致天柱痛惟有脂瘰癧可破去

脂粉則愈餘五證亦不可輕易決潰

○**破結散** 治五瘰及馬力瘰癧等証 海藻酒龍膽酒海蛤粉通草 貝母

昆布頰枯礬 松羅各三錢今以麥麩炒四半仁右為末每服錢熱

酒調食後服忌其草鯽魚雞猪五辛生菓菜

○**昆布丸** 治一切瘰癧 昆布洗

海藻洗小麥醋者乾石為末煉蜜丸如香枝大每一丸食後嚼嚥

○**一方** 昆布去鹹洗搗為散每以

錢綿裹於好醋中浸令藥津盡以蓋
再會之或以指入醋浸令藥津

○南星膏 治皮膚腫面生癰或軟或

硬不痛 生南星大者一枚研如膏

醋調如膏先將小針刺令氣透以膏

攤紙上如癰大小貼覺痒則頻易貼

○十六味流氣飲 最巨瘤亦見若

林 灸法 治諸癭天突穴灸三七壯

肩隅穴灸左十八壯右十七壯女

間胸中裏肘取之灸之

○又灸兩耳後髮際七壯

○結核 治天井鼠針或鼠留口如法

傅丹溪曰凡結核在項在臂在身如腫

毒不紅不痛不作膿者多是痰注不

散名曰痰核一陳加酒炒大黃翹桔

柴煎服

○又方 治臂後作痛一陳加翹苴皂

刺威倉酒

林 治小腹疝疝毛際結核痛不可忍必寒

熱 梔榔桃殼枳殼查路等右水煎

入姜汁服

○漏瘡 治

林 蓋漏瘡須先服補藥以生血參芪朮

散芍藥等為大劑服之外以附子末

唾調作餅如錢厚以艾灸之漏大艾

炷亦大個令微熱不可令痛餅易

之如困倦則止來日又灸至肉平為

效仍用好膏藥貼之

○截瘡散 治年深疔癩 連社白皮

白銀 黃丹 密佗僧略 右為末

入輕腦麝各等乾椽或成膏貼

瘰癧子

瘰癧子

南星為末釀醋調塗數次即愈
○一方地膚子白礬等為末煎湯洗數次即愈

○取蜘蛛絲纏根下效○或用髮纏根下效

○又以針穿髮於患處數次穿

○又灸癩子上一壯以水適之即愈

○**內疳**丸

○傳丹溪曰內疳者皆因飲食之火披七情之火相驚而奪其氣在腦子而頭

向內宜以內托之藥托出于外以針

開之而愈先用四物湯加桔梗香附

生姜煎服膿出後亦用四物湯調理

而安

○**肺癰**

○肺癰者乃肺經感受風邪熱毒所

致也多因久嗜炙博肥膩或勞傷氣

血以致心火炎熾薰灼肺金令咳嗽

咳而不已遂成肺癰寸脈數而咳中有

濁唾涎沫若口中碎小燥欬又胸中

隱心而痛脈反滑數此為肺癰咳唾

膿血脈數而虛者為肺癰實者為肺

癰初起宜早救若日久唾膿臭敗者

不治

○**肺癰**之候口乾喘滿而渴咳唾膿血

或腥臭胸中隱心微起者肺癰也又

曰中府隱心而微痛者肺癰也上肉

微起者肺癰也脈微緊而數者天有

膿聚甚而數者已有膿短而濇者自

空浮大者難治方法具見咳嗽門

○**腸癰**

○腸癰者小腹腫強按之則痛小

淋時久汗出復惡寒身皮甲錯
急如腫狀脈洪數已有膿脈遲數者
未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或
遠臍生瘡或膿自臍出或大便膿血

○天黃牡丹湯

治腸癰有膿血

無膿即下血

大兩壯一兩桃去皮尖

芒鈔菱餅右水六升煎取一升去粗

入芒硝每服分三服

○林薈以仁湯

治腸癰腹中疔癰煩毒

不安或脹滿不食小便澀婦人產後

羸熱多有此病疑非是疑似亦服

薤白壯桃去皮尖妙藥女右水煎

○射干湯

治胃脘壅熱成癰身皮甲錯

咳嗽膿血射梅赤苓升各

一合蜜少許服

粉草四升沒行

集驗

○四聖散

治腸癰便毒 生黃

指粉草射干去皮粉草四升沒行

研乳研末右用好酒慢火煎兩日服

盡大便下惡物

○牡丹散

治腸癰冷証腹濡而痛時

人利膿 牡 參 天麻 白苓

芪 木 飯 芎 桂 桃去皮尖

芷 薏 苈 麥 右水煎食煎温

服

○梅仁湯

治腸癰裡急裏痛大便閉

淡 梅核仁四十九箇大兩壯

冬瓜仁兩犀兩半 芒 石水

下膿血三四行爲度

傳灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸百壯

玉膿血而安

便毒

便毒者血疔也俗呼為便毒
陰用之經絡及衝任督脈亦屬肝之
傍絡是氣血流行之道路也途壅而
為癰溢之疽以導水丸桃仁美氣湯
大下之

集 ○夫便毒者生於小腹下兩腿合縫
之間初發寒熱腿間腫起疼痛是也
初起慎不可用寒涼之藥恐血氣愈
結不得宣散反成大患當發散寒氣
清利熱毒

傳丹溪曰便毒是厥陰經濕熱回旁倦
而發用射干三寸同生姜煎食前服
得利一二三行效射干紫花者是
紅花者勿用

○一方破故紙 桑枯子微黑牽炒太
黃微熟右等分為末每服一兩酒調
下

○便毒已結成膿者 大黃酒炒 翹各
半 薤仁 朴 其節 各二桃二寸 生姜
三水煎服之

○菴方散 治便毒 木鱉去 鼠尾
芍 芷 甘 芎 射干 忍冬 錮
銀 大黃 川山甲糖 沒 蘗木各
分 右水酒各一盞煎至一盞食前服

○牡蛎大黃湯 治便毒
和精血交錯腫結攻痛 桂 大
白芍 沢 牽 桃 法 彼 甘 半 姜
行 右 水 煎

○雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒
邪精血交錯腫結攻痛 桂 大
白芍 沢 牽 桃 法 彼 甘 半 姜
行 右 水 煎

集 ○退毒散 治便毒腫結 穿山甲
半兩 醋 浸 猪 苓 三 不 醋 三
炙 焦 微 右 為 末 食 前
老 酒 下 次 醋 煮 皂 研 膏 敷 之 妙

○佑嬰散 治便毒等惡瘡 薑

金銀花 牛乳各生薑 甘草
右不犯銅鉄酒煎空心温服微利爲度

○三物湯 治便毒 蚘疔 天 蛇 瘡
爲末酒水煎露一宿空心温服

○王 消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂針 金銀花 風 飯 犬 骨
節 萹 等 右水酒各半煎食前温服
仍頻提制壘頂中髮立効

○敷藥 治便毒腫痛 雄 乳 各

西 栢 耐 右爲末新汲水調敷腫處每消

○林 便毒初發 生薑 一 大塊米醋 一 合

以姜蘇醋磨取干步峯泥敷之即散
其泥突起者是 千 泥 突 起 者 是 千 人 經 行 日 久

○便毒初覺腫痛以稱銼於上按摩數

次自消散

○灸 便毒法隨所患左右手自掌後橫

文量至中指頭盡處却從橫文量
至臂盡處是穴灸二三壯

○囊 癰 丹 溪 曰 囊 癰 者 濕 熱 下 注 也 有 作 膿

者此濁氣下流入陰道曰陰道或虧
水道不利而然膿盡自安不藥可也

惟在善調攝耳

癰疽入囊者由濕熱入肝經雖膿

○林 皮脫 羣 丸 懸 掛 者 皆 不 死
陰腫者由膀胱蘊熱風濕相乘

熱水腫流注或如氣及 或暴風客
熱所致也

○二白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰

囊腫脹一便不利 白 牽 木

通 陳絡五 右為末 姜湯調下

○**一方** 治外腎腫脹 苜蓿蝎尾

穿炙木烙等 為末每服二錢空心酒調下痛止立効

○**敷藥** 治陰囊瘡癢癢不愈自汗不

取 琥 黃丹絡六 枯凡行囊可 龍泉粉 右為末 手心揉患處

○**地龍膏** 治大人小兒外腎腫硬

痲氣風熱暴腫 生乾地龍為末 以葱椒湯無風處洗用津調敷或

熱雞子清調敷或加牡蛎 男婦陰腫如斗核痛馬鞭草搗汁塗

之 又荏菜杆為泥傳之腫即消 又蕪

善根搗傳之 外腎腫及陰癢 地龍真研生薄荷

○**法調傳** 又 仁研膏傳

卒外腎偏腫夜痛 大黃末和醋塗 之乾即易之

傳 一方點紫蘊面青者紅者 焙乾為末 以

之如慢香調傳是也 麝脫無皮者以青 荷葉包之其皮自生

○**牡蛎散** 治小兒陰腫大莖物遇明 蛻粉研細先以津塗腫處次以粉擦

之桃仁研膏時調敷 蟬蛻散 治淫囊腫小兒坐地為風

或蟻吹着所致蟬蛻 行石水煎洗仍 與五苓散加灯心煎服

○ 治小兒外腎嫩赤腫痛老杉木燒灰 入臍粉麻油調敷

○**灸法** 崑崙一穴灸二壯治陰腫在 外腰後跟骨上陷中

○內崑崙灸三壯治小兒陰腫
後五分筋骨間

○久病陰腫不可救者，且速灸之，蓋
水分能分米穀，米穀不分故陰腫也

○**艾瘡**十四

○陰頭生瘡，目年少陽道興起，當泄不

泄，不當泄，泄泄脹，斷嫩皮，初以針眼

大畏，恐不敢洗，日久攻入皮肉，連莖

潰爛，用荆柏鞭蒼耳生葱煎湯洗去

膿，掩以訶子燒灰，入麝少許，乾糝仍

禁房事，二五日臨睡，喫冷水兩口，

勿令陽興，脹

○陰頭生瘡，先用陳太螺螄殼燒去性

爲末，先以鹽湯洗淨，乾糝之

○**津調散**

治妬精瘡，膿汁淋漓，臭爛

連欬等爲末，先以地骨蛇床子煎

湯洗淨，乾津調散，敷之

○一方大由螺兩條，粗殼煨存性，研末

入輕少許，糝之

○治陰瘡，癢痛，黃汁注，石膏末

許，傳○又生白礬，冷水

○治陰莖腫爛，木防己爲末，先以

○治陰瘡，癢痛，出水，小瘻

○床燂槐枝，拾一二石，水煎去粗洗

○用雞子清調，朴硝，土硫，塗之

○治陰頭瘡，敵鼠山燒，香木雞子白和，傳

○之，又以蜜煎，其直塗之

○治痔瘡及陰莖瘡，雞卵殼

○連輕粉，研末，香白調，先用香附

○白芷五倍煎湯洗，衝之，用朴硝煎湯

洗亦可

○麝香輕粉散

治血痔陰蝕耳痔

切惡瘡 麝 輕各半 乳 沒 礬 略 右為末乾貼

○治下疳瘡 灯心末 輕粉 日 藥 詳

右為末乾貼

○治下疳瘡腫不消 荆 風 膠

其礬水煎洗之

○治下疳瘡 枯凡 輕 麝 詳為末

先以口含泉水洗 搗乾貼日二兩次

○又蜜化 連 栢 輕 詳為末搗艾

煎湯洗乾搽

○治走馬牙疳下疳 伏龍肝 乾脂

脂絡 二 麝 枯凡 絡 一 右為末先漿

水洗搥貼之 奎退 燒 存 脂 輕 乳

絡少為末溫漿水洗傳

○傳 治下疳瘡 鳳凰退燒存性研香湯

調付外看瘡大小剪殼中右膜貼之

須靜坐一日不動即結痂

○又青黛 蛤粉 蜜化僧 黃蓮為

末付之 連 栢 飯 芷

○下疳瘡洗藥 獨 風 朴硝 荆 詳石入錢五十

文烏梅伍監一匙同水煎洗 木

栢 連 銅青 輕 枯凡 桑 蠟

麝 詳為末洗後至夜敷

○集 麝香散 治如精瘡 然 詳 詳

麝 詳為末先以地骨桑白煎湯洗之

乾次以津唾調藥敷

○治男女陰瘡 米粉 酒 方 苓

粉 附 芷 略 一 右以公人水 猪 脂

一斤微火煎三上三下候白氣黃濁
去粗入米粉和調敷

○**檳榔散**

治陰囊上疔瘡腫透久不
愈 煨 煨 雄 輕 蜜 陀 連 柏

林硝等分末先以葱白湯洗把乾瘡

濕乾疹着乾油調塗

○治陰瘡不止 滑 蜜化 寒水

煨 略 煨 鹿 絡 石 末 煨

○林 治丈夫陰下濕痒蒲黃末傅之三四

次 治陰囊

○治股內陰下長濕且臭或作瘡用明

粉傅之天驗

○**腎丸** 十五

○傳 丹溪曰腎居小腹 延在下此陰中

之陰雖曰太陽多血氣運 剝血

亦罕來中年後尤虛心此証 有腫

痛多 尿証但見虛弱便與滋補血
不可保終世者無積補之功其禍多
在結痂之後慎之

○**內托毒活湯**

治尼腎生癰堅硬腫

痛 煨 煨 卷 柏 酒 紗 絡 風 藜

飯 元 俗 一 桂 仁 翹 其 灸 倉 陳 絡

分 式 料 右 作 一 服 水 一 盞 酒 一 盞

煎 至 一 盞 去 粗 務 熱 空 心 服 以 衣 覆

○**腰瘡** 十六

○夫腰瘡者由腎臟虛寒風和毒氣

外攻二里傍溝於陰交之側風熱

毒氣流注兩脚生瘡腫

○**膏紙膏**

治內外腰瘡 飯 芷

連 五 倍 雄 沒 血 竭 海 螵

白 反 白 欽 柏 朴 酪 黃 丹 不

乳_半不輕行右爲末清油調成膏此
油或貼藥敷上絹帛縛定有膿水解
開刮去不潔再貼藥如此數次再愈
須先用麩鹽湯洗淨拭乾待水氣乾
貼藥

○治腰墜下注 白石脂 龍骨略半

柏凡兩五倍存性 麩黃丹飛 不雜抄

右爲末先葱鹽湯洗見赤肉後敷藥

○得治外腰脚瘡 蜜心黃土研細入黃

百亦石黃用略半 乳沒輕絡下 研和

清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼

瘡上外以油紙掩之杜縛縫痒不可

開視數日後未愈再換藥去藥先必

以茶清洗淨付藥

○林治外腰瘡臭爛多年 龜下箇去 貼

以米醋一椀炙醋盡仍煨令白烟盡

存性用碗蓋地上出火毒爲末入輕

粉麩香和勻先以葱椒湯洗搥乾傳

之

○治久年腰瘡及脚上老瘡輕粉黃連

等爲末以濃茶清入鹽口含漱洗瘡

搥乾傳藥又將油調赤石脂末傳油

紙貼之絹帛縛定二五日効

○治脚肚生瘡初如粟漸大黃水出痒

不忍 百藥煎研唾調傳自外而入

以貫仲煎洗搥乾傳

○疥癬 十七

○夫疥瘡者皆由脾經濕熱肺氣風毒

淺浮者爲疥深沉者爲癬久而不愈延

及遍身浸淫潰爛或痒或痛二者有

細虫而能傳染人也

○當飯飲子 治瘡疥風癬濕毒燥

飯 芎 白芍 地 風 蕪 麥
荆絡 何首烏 莖 苁 苁 各一 右水煎

○升麻和氣飲 治瘡腫癰疥瘡痛

升 桔 蒼 葛 苁 苁 各一
陳仁 飯 半 苓 芷 姜 枳 路
芍 芎 右水煎

○苦參圓 治遍身瘙癢癰疥瘡傷

苦 參 獨 連 大 枳 枳
風 各二 苓 枳 菊 各一 右為末 煉
蜜丸 如梧子大 每服二十九 食後漿
水下 茶酒亦可

○傳 治疥瘡 馬鞭草不犯鐵器 搗自然
汁 半盞 飲盡

○治疥瘡 浮萍 苦參 各一 蒼耳子
蒼米 附 半 苓 右水煎 洗

○乏

○身上腫痒 四物加苓煎調浮萍末

○一錢服 治風癩 以小麥攤石上以鐵器燒

○紅壓出油 搽之立效

○治疥瘡及婦人陰蝕瘡 漆瘡火丹諸

般惡瘡 蛇床 苦參 蕪 萸 略
雄 硫 大風子 取椒 各五 枳 九

○又方治註如前及小兒癩頭瘡 治之

○蛇床 硫 相 黃丹 各一 雄 大

○風子 取椒 各五 枳 九 輕 行 牛 皮 岸
蕪 手 皮 如 岸 也 如 無 以 香 於 右 為 末
岸 代 之 一 兩

○生豬油調付

○如聖散 治肺藏風毒血氣凝滯瘡

疥瘡 蛇床 行連 牡 不胡粉 煎水

銀水銀研令黑 右為末香油調

和稀滑先搥藥水洗後塗之乾更換

○玄精散 治疥癩 硫 椒 枯凡

玄精石等分如無搥代石為末油調

敷方

○三浴散 治渾身瘡疥 硫 椒

枯凡 玄精 雄格等 輕紗早起飽

食乾物勿飲湯先煎防風通聖散一

匙入白蜜二錢送下神效去見頭

五七十九入浴室內浴令汗出如破

○干方 苦參 蛇床 白礬末荆等

右吹咀煎湯溫洗

○一方 朴硝三兩 柏礬行 右為末

油調搥敷

○治疥癩 松膠香 輕粉研勻 先用

油塗疥上了 搥末

○又 藥燒末雞子白和塗不過三

四次瘡

○又用柳絮葉煮汁洗立愈

○治遍身風痒瘡疥茵陳煮濃汁洗

○治癬瘡久不瘥 羊蹄根搗絞汁用

臘粉少許如膏傳如乾猪脂調傳

○癬初生或始痛痒以姜黃末傳之效

○又初生或始痛痒搗塗之效

○濕癬有禿 馬齒莧膏塗之若燒灰

傳之良

○治瘡癬用米醋熬嫩皂角針濃煎汁

傳之

○又苦練根醋磨塗

○又羊蹄根和猪脂塗或著搥少許

○又薤蔥末生油調敷

○治婦人風瘙癢疹身痒不止 蒼耳

○花葉子等為末豆淋酒調服二錢

○治乾濕癩瘡疥癬等証 枳 蛇

床略一蝎 酥硫黃 半兩 右化開硫

黃入荆末行數沸候冷加輕粉行冷

再碾末加二三兩酥右為末先將小油

滾適候冷調上藥擦瘡

○八寶散 治風癩疥皮頑痺久不瘥

者 藿 破故 枳 腹 雄 輕

硫 柏元略 一右為末油調擦日三

五次痺則擦之

○祛風白芷散 治面上風癩 芷行

苓 半兩 黃丹 連 柏絡 一輕行右

為末油調擦

○治諸癬 半夏 麻 末 陳 醬 清 調

和摩塗瘡上日二三度

○瘋風 十八

林 追風 治癩風 何首烏 木

荆 苦參 等為末和皂角壹九如梧

子大每服五十九空心酒下忌動風

物

○治紫白癩風 硫 輕 杏 等為末

姜汁調擦

○又硫 煮 兩 海 螺 斤 為 末 浴 後 生 姜

煎 擦 數 度 絕 根

○又硫黃末醋調以茄蒂煎擦患處或

加附子姜汁調

○諸瘡 十九

○夫諸瘡者謂諸般小瘡也凡以鉢

盪感風濕之氣發瘡瘍痔漏腫身

熱多汗是為惡瘡或生於手足間相

對如新菜莢在痛搔破則黃水淋漓

在孔如疔久而生虫是為癩瘡或初
生如飯粒漸大而有根頭破血流膿
出肉反如花開之狀是為翻花瘡或
初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛
延及遍身名曰浸淫瘡或生於兩耳
鼻面爛及下部諸竅浸入筋絡月中
則瘡盛月未則瘡衰是為月餘瘡或
毒氣攻手足指發肉裡上指甲疼痛
出血瘡中有虫是為甲虫瘡或指頭
先腫微熱刺痛然後於甲邊結膿
甚者爪甲俱脫是為代指或成瘻者之
瘻膜理易開風熱搏皮膚輕者如微
粟重者熱汗浸漬成瘻是為癰瘡或
心神煩燥遍身發瘡赤爛如火名曰
熱瘡或偏風寒血泣不行其瘡頑滯
不知痛痒經久難瘥名曰冷瘡或身

發瘡腫非癰非疽非癩非疥狀如惡
瘡或暖或刺名曰無名瘡或頭生白
團斑利如癬者有白皮久則成癩遂
致滿頭瘡中有孔有膿細面入裏不
痛微痒少長不瘥名曰疥瘡或冬月
因寒手足皸裂成瘡名凍瘡

○連翹飲

治惡瘡紅赤痛痒心煩亡

赤芍 荆 芥 門 瞿 通 牛
步 梳 風 芍 甘 罌 入 心 二十

傳 活魂丹

治一切惡瘡 血竭 乳

沒 銅 綠 枯 凡 穿 膠 黃 丹 絡 下
輕 蟾 酥 各 五 麝 許 右 五 為 末 用 蠟
牛 槁 膏 丸 如 菴 豆 大 每 服 一 丸 用 葱
白 一 寸 嚼 爛 裹 藥 熱 酒 送 下

○**內固清心散** 治惡瘡熱盛喉痛煩

渴 辰 雄 朴硝 苓 參 白

藜 菘豆 耳 腦 麝 皂 石

等分爲末每服一錢蜜湯調下

○**黃連獨活散** 治一切惡瘡初發腫

甚者三四服而消散方見右

○**五香連翹湯** 治一切惡瘡方見右

○**涼血飲** 心膈有熱或作寒熱口乾

身痛面赤先服敗毒散後用之 瞿

通 芎 苳 芷 天花 甘 芍

生地 門 桅 車 翹等右入竹

葉灯心新生地黃盧加飯卷

○**平血飲** 治遍身生瘡膿血壅腫極

痛且痒 敗毒散加葛 芍 升

甘 天 蟬蛻 芎 生地即入

姜棗

○**萬金散** 治腫毒惡瘡 大升

並取爲散 三錢服又茶調敷

○**治無辜瘡** 連 柏 爲末芭蕉

根注調敷留口捺或加輕粉 百汗

加黃丹炒麝少許和勻乾搽

○**越桃散** 洗諸瘡毒方見右

治遍身熱毒瘡痛而不痒手足甚

粘者衣被不得貼苜蓿末多用布於

席上恣貼其間五七日効

○**合掌散** 治遍身生瘡百藥不効

煨新硫生者五臈拌右和勻每用

一二錢安手心內香油調夜貼時塗

腎不可洗手但指擦令乾一二日愈

○**竹茹膏** 治黃疔熱瘡 香油配青

木香五 杏十四粒 青竹茹右慢

火熬杏仁色黃去粗入松香末五錢

蒸膏塗瘡效

○手掌心生瘡，牡蠣灰泡湯浸洗，至湯冷止，不三二次便吐。

○脚上瘡，鹿角燒存性，為末入輕粉，香泔調敷。

○濕脚氣生瘡，平胃散末乾參之。

○又葱椒湯洗可。○又五積散酒煎服。

○脚指縫瘡爛濕，枯凡行黃丹拌右末，參之。

○以代指手枯，中頭腫，烏梅仁，麩壳取石研細，醋調稀，入指浸，自愈。

○林甲疽瘡，乃諸瘡發肉，烏梅搗細，和蜜捻成餅子，如錢厚貼之。○又用硫黃末薄敷，便消縮。

○林膽凡燒乳香，等為末，傳之肉消愈。

○又瘡腫，弄桑葉末水調敷。

○治凍爛脚成瘡，生附子去皮為末，麩水調貼。○又治凍瘡，茄根濃煎湯洗，以雀腦塗之。○又黃蘗燒存性，研雞子清調傳。

○治凍耳成瘡，辟痛，黃柏，白斂，略各三拍，甘草略一為末，芭蕉泔調敷。

○又百合根研爛傳。

○治一切惡瘡，姜蚕，蟬等為末，油調付亦效。

○又經霜芭蕉葉為末，油調付，先用惡冬藤葱荅耳椒煎湯洗，梘乾付外，以油紙掩之。

○又用黃丹入香油煎入村硝，抹之。

○手麻瘡 用皂 枯元 輕 連
相 爲末付之

○桃仁散 治一切瘡生肌 芫 斂
栝 連 乳 麝 黃丹 右等分

爲末參之二三白生肌

○葵花散 治一切瘡 葵花

鬱金 連 栝 施 右等分爲末
水調貼瘡痛處

○七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不
已 芪 飯 風 荆 地骨 通

略 二白礬 右水煎去粗稠熱淋
深患處裁乾避風少時

○若練散 治浸淫瘡 練根 煨乾
雁 爲末猪脂調敷濕則乾 參 先用苦

參 大腹皮煎湯洗

○林 治惡瘡連痂痒痛傷腐封痂落即

瘡

○治一切瘡肉出 烏梅燒灰并末傳

惡肉立盡極效

○輕粉散 治疔瘡 蚕退 煨 存性

輕 乳 絡 右爲末先以溫藥水洗

淨乾搽

○又炊芋石煨醋淬爲末油塗

○治疔瘡無問去處皆治之 蝦蟇燒灰
存性爲末醋調敷

○治月蝕瘡 蝦蟇燒灰存性爲末和
猪膏傳之

○治月蝕耳瘡 非地蚯蚓糞煨爲末
猪脂調傳清油亦可

○胡粉散 治月蝕瘡 胡粉 栝 元

黃丹 煨連 輕 絡 胆 脂 煨 麝 砂 石

爲末溫藥水入盥洗淨拭乾傳之乾

者油調敷

○治瘡生耳鼻口間瘰時發 枯瓦

蛇床略一連行 右為末搽之蜜水

調塗亦可

○治月蝕耳瘡並諸瘡生肌肉斂瘡口

沒乳 枯瓦 黃丹 飛 赤斂

栝絡 丁白膠香 麝絡 二右為末葱

白煎湯洗淨搽乾之

○一方 胡粉 東壁土 為末乾搽

○乳癰 二十

林乳癰証有實者名吹妳有孕者

內吹妳

○初起則用發散流氣之藥已成膿

宜內托排膿養血順氣慎勿妄用針

刀

○傳丹溪曰乳梗多回乳母不知調養所

致毒積於陽明所經乳頭厥陰所屬

忿怒所逆鬱熱所滯厚味所釀以致

厥陰之氣不行故竅閉而汁不通陽

明之血沸騰故熱甚而化為膿或回

所乳之予腫有滯痰食乳而腫口氣

熾然所吹而成結核初便忍夜燻令

移軟吮令汁透可散否則結成矣

○治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽

明之熱生甘草節行汚濁之血凡嬰

子消腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺

金銀花當歸身或湯或散以少酒佐

之

○又於痛處灸之一三壯尤妙粗土便

用釘力必成痼病

○妳始有核腫結如醫者多子大不痛

不痺五七年方成癰初便宜多服疎

氣行血之藥須情思如意則可愈未
破者尚可治成瘡者不可治

集驗

○**升麻托裏湯**

治婦人兩乳間出

黑頭瘡瘡頂陷下及乳癰初起

升 葛 翹 敗身 栢絡 其仁桂 分

其多生絡一右水一盞酒半盞煎至

一盞食後熱服

○**通翹飲子**

治乳癰 翹 芎 萎

皂刺 橘葉 桃 青 其節 仁 二

右玉未破者加柴已破者加參芪飯

白芍

○**百齒霜圓**

治吹乳結核腫痛及乳

癰 百齒霜 即 梳 樹 右為圓如雞

頭子大黃丹為衣每服一圓好酒送

下如不飲酒白湯下不可化開亦不

可冷病人知極有效

○**下方**

治乳癰 人牙齒 燒存 為末 酥調塗

○**括萎散**

治乳疽妳癩 黃括萎子

急則只爛焙為末如 生甘 飯絡

兩沒料乳行右用無灰酒沙器慢

火熬食後服

○**究原五物湯**

癰疽發背乳癰通用

萹 研 枚 皂刺 帶生 沒 各半 乳 甘

絡 二 右酒煎服

○**復元通氣散**

治乳癰結核不散

木 苜 青 穿 酥 陳 芷 甘 各

分貝 浸 攪 加 漏 蔥 右水煎或酒調亦

可

○**又方**

青 陳 翹 金銀花 酪

穿灸括酪 三 甘 生 熟 右為末熱酒調

服一錢

○橘皮湯 治乳癰初發即散已潰即
効因小兒吹妳考並治 陳皮湯 煖
晒乾趁炒 微黃色 右為末麝少許每服二
錢酒調服

○一方 紫蘊一味濃煎湯類服及用
葉盒乳房

○一方 治吹妳 棗核去核入鼠
矢七粒煖存性研末入麝少許温酒
調服

○又 皂角燒蛤粉和熱酒一盞服以
手擦散

○治乳頭裂 秋後冷露茄裂開者乾
燒存性為末水調敷甚驗

○治乳赤腫欲成癰者 南星末姜汁
調塗初發之時効

○傳 橘葉散 治婦人百不如意久積憂

鬱乳房有核 青膏煖其節沒

清公英絡 蔓行飯頭待息刺半去
煖畧金銀花左右作一服加青橘葉
一小握酒煎食後卧時服

○丁香散 治乳頭破裂或曰小兒吹
乳血紫自裂開多痛 丁香一味
為末乾付裂處燥則唾津調佈

○治乳癰 蒲公英 忍藤入少酒煎
服即愈睡是其効也

○十六味流氣飲 治妳岩方見石

○單煮青皮湯 治婦人憂鬱乳房有
核 青皮細水一盞半煎至一盞且

二服 玉玉方間服至核消住藥

○楊梅瘡 二十一 名天庖瘡 名瘡 名瘡

楊梅瘡近年以來極多庸醫務速効
以輕粉丹麝等毒劑幸而氣血實盛

者得愈怯弱之人變生壞證不知戒
守變或病風又輕粉多用蕪以麝香
透之口能遂成風壞經年痛痺膿爛
輕以油量入厘實用之可也

素無天庖楊梅棉花等瘡故無治法
用浸於通聖中加減量入厚薄治得
效雖遲亡無一壞

傳【方】治翻花瘡 言 天花絡五

輕半下雄 辰各分料麝研右為末
蒸餅丸如棗子大每服八丸溫酒下
且三服一方無言夫花亦効也

傳【方】版 方 胡麻 生

蔓 杓杞 牡蠣 白痰 苦參 括
風 羌 何首 芷 蚤 荆 翹
芥 拖 玄參 皂刺 甘 芙蓉
葉 葳 酪 一右為末米糊丸如梧

子大每服七十丸茶下煎服亦可實
熱瘡盛者入輕粉二錢

疑【薰藥】 承 輕 雄 鉛錫絡 一木

驚顛 麝 后 燕 水 鈔 化 鼎 共 為 末
以紙摻入如膏然之令患者飲食以
壯其胃然後令正坐薰瘡以綿被圍
之勿令藥烟風泄出汗其患即効然
厘氣弱不宜薰恐發腫

一 癩風 一 汗 二 與 癩 通

傳經曰風之傷人也或為寒熱或為熱

中或為寒中或為癩風又曰癩者曰
柴箇熱傷其氣不清故使鼻柱燥而
色敗皮膚癢潰風寒客於脉而不去
名曰癩風

丹溪曰是受天地間殺物之風故也
氣受之則在上血受之則在下皆不

外陽明一經陽明者胃與大腸也無
物不受受之者須致意者其疼痛與
瘡口熱先見者多者在上也下跡先
見者多者在下也在上者以醉仙散
而逐血於齒縫中出在下者以通天
再造散取惡物更積於穀道中出後
用此風通聖散調之更用二稜針
於口內出血

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不
知此藥性熱有燥痰之功而傷血至
看病將愈而先失明者

●大風有五黑色不洽餘皆可治更食
肝眉落食肺鼻閉食脾聲啞食心足
底柔麻濕腫食腎耳鳴嗽入耳生
瘡或痺或痛食身則皮痒如虫行

○林

凡癩風肌肉麻木瘡癩疔瘡膿汁林

澳眉髮墮落手足指脫頑痺痛痒白
皮脫落鼻梁塌倒眼爛齒齦色枯唇
揭病証之惡無越乎此員此病者百
無一不切戒房室公私無勞一切口
味悉宜屏置治法先服樺皮散從止
至多服五七日灸美漿穴七壯灸瘡
愈後又灸凡三灸之後服二聖散泄
熱去血中之風時更以升麻湯送下
瀉青丸倘年深日久則以愈風丹換
肌散等方詳而治之

○釋皮散

治肺藏風毒遍身瘡疥及

癩疹瘡痒極之成瘡或面上風刺

樺皮脚兩 荆穗 杏酪一棗四兩

燒存 甘兩 右杏去皮尖用水一碗

熬候水減半取出乾研外都爲末入
香每服一錢食後溫酒調下

○醉仙散

治大風疾遍身癢疹癩毒
麻木 胡麻 牛 杓 蔓 各一兩
白疾 苦參 枯 風 各半 右為末
每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服
一錢茶清調下晨午夕各一服後五
七日先於牙絳內出臭黃涎渾身疼
痛昏悶如醉次後利下膿血惡臭病
根乃去

○三聖散

皂角刺三斤炭火 為末
每服一錢太黃煎湯調服

○河間治法

早服樺皮散于前升麻湯
下瀉青丸晚服三聖散此數藥皆是
緩劑疎泄脈中之風熱也

○升麻湯

治諸風熱癩肌肉極熱
上如鼠走口反綻皮色變升
神 參 風 犀 鎊 羚 鎊 羌 各一桂

酢 右為末每服四錢入生姜二片
竹歷少許煎服

○瀉青丸

五見小兒驚風

○通天再造散

治太風惡疾 鬱金

大根 皂刺炮經年者 白牽炒
右為末每服五錢日末出向東以
無灰酒調服盡量為度至晚必利黑
頭小虫或如魚腸臭惡物忌食鹽醬
醋諸般魚肉椒料果實煨燒夕火燻等
年止可食稠粥軟飲及煮熟時菜亦
須淡食茄亦不可食惟諸般蛇以淡酒
蒸熟食之可以助藥須戒房室勞力
及終身不可食牛馬大肉等

○天風丸

治疥癩 太風子行蝎

芎 各半 蠅 各半 飯鬚 大略
不苦參 風 羌 荆 烏蛇肉

兩獨斷右為末用米飯丸如桐子大
每服五十九茶清下

○【下方】治癩風年深鼻塌眼爛遍身

紅七烏藥百沉五參三甘四
右用太楓油化開和藥麵糊丸如桐
子大每服五十九茶清下

○傳加城通聖散先服此大瀉惡毒穢

積又用三稜針看肉黑處及委中紫
脈刺出血不可令出太過後服神

仙紫花丸 芎 風 荆穗 桔

根妙膏 柴 連 羌各五翹 白

芍 飯酒 麻去根節 施去殼甘

滑 芩去根節 各三 苛行 生地 熟地

並酒 浸 錦大黃 芒兩 皂刺 一兩

右分八服用水一碗半煎至一碗空

心服日一服五日後又進一服待

補養完又行一次然後服左藥

○神仙紫花丸 治癩風及諸般惡瘡

風瘡效如神 白花蛇一貝去頭尾

連皮骨 用 何首烏 荆穗 歲各四

麻連 根節 胡麻子行 蛇床行 右

各細切用無灰酒一大碗浸一宿瀝

出晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡

為度晒乾為末別包 木 沉各二

參兩 飯粒 天麻 牙皂各五 麝行

者倍 乳 沒各一 雄 辰各

粉大 塊 寇一 枚 定風草二 參兩 天

野天 麻兩 還腫子即 草一 兩 右麝至 辰

砂五味各別研不見火餘味亦別研

連煎五味和勻別包 羌 風 甘

細 芎 獨 蒼米 浸一 把夫 筋毛

白芍 芷 白蔞 金

有芍 芷 白蔞 金

苦參 絡石 胡麻子

白附 蔓荊子

藤 草烏

米泔浸

川烏

米泔浸

蒼朮

右為末別包

檢合法用大風子二斤，法以磁罐盛之，入無灰酒，以皮紙重包，口勿泄氣，文武火蒸候黑爛，為度，并無查滓，成油，分作三分，每一分入第一號藥八錢，重第一號藥六錢，重第二號藥一兩五錢，重和勻，加糯米飯搗極膠，粘如桐子，大晒乾，勿見火，每服二十丸，漸加至五六十丸，雞鳴時臨臥，各一服，茶清下，忌房勞，醃酸酒醋，糟淹，猪羊，雞馬肉，魚腥煎燻，水果，五辛，姜椒，太料，辛辣，熱物，蕎麥，菜豆之類。

○**一方** 荆穗 樞 大 鬱金 地

仲 風 羌 獨 白 蔞 等 為 末 以

太風子油入熟蜜丸如桐子大每服四五十九茶清送下日二服日誦觀音千萬聲以攝其心禁其慾

○**浴浸法** 桃 柳 桑 槐 猪

五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸下日俟湯如油安

○本草治惡疾遍身生瘡濃煎淨湯浴浸半日大効

○**八葉湯** 淋洗大風瘡 桑葉 荷

葉 地黃 皂角 菖蒲 蒼耳 何首烏 藟藥 右八件葉晒乾等分燒存性為末如面藥洗身上

○**法** 桑柴灰一斗熱湯淋取汁澆頭面次用大黑豆漿豆漿添湯二百一浴下日一洗面却用側柏葉

乾白膠香等分爲末煉蜜丸如梧子
大每服五七十九溫水下

○傳 一方蒼耳葉爲君苦參爲臣更上酒煮爲

蠱魚花補蛇之或鉄研細糊丸如梧

桐子大每服五六十九加至七八十

丸熱茶清送下且二服一月而安

若入藥滓在捷紫萍多寸蛭須寒月

於山沼取之淨洗去泥略蒸透乾用

○最急門 十二

○被糖散 治厥暴卒死及爲墻壁竹

木所壓溺水金瘡卒致悶絕產婦惡

血冲心諸暴絕証 半夏湯泡七次去

蠱或以皂角末吹入亦可

○雄朱散 治到久無人居暗處爲鬼

物所屬但吃食作聲便令呼喚如不

醒可用 牛黃 雄黃各一硃半

右爲末每用挑一錢床下燒一錢酒

調灌之

○凡屬者不可用灯照亦不得近煎急

喚但痛咬其足跟並大指指甲邊

○一方竈心土爲末每服一錢新汲水

調下

○又雄黃末一錢煎挑葉湯調下

○又履死 灸兩足大指指聚毛中三

五壯

○又履死及一切卒死灸人中穴三五

壯又灸臍中百壯

○救自縊自且至暮雖已冷可治心下

微溫者雖一日已上可治急抱使繩

寬解切不可割斷燃正喉籠放

被蓋急用竹管吹其兩耳
其髮不放手就用脚踏其兩肩
摩其胸及屈伸其手足摩持之如活
即以粥飲與之

○**一方** 治有縊死以藍汁灌之

○又刺雞冠血滴入口中男用雌女用
雄仍塗喉中

○救溺水法凡入溺水者急上岸即將
生一雙却令溺水之人將肚橫覆在
牛背上兩邊用人扶策徐牽牛而
行以出腹中之水如醒即以蘇合香
丸之顛或老姜擦牙或橫腹於圓木
上亦可

○仍取壁土一堵置地上以死者仰臥
其上更以壁土覆之止露口鼻自然
米氣翁入土中

○仍急用竹管吹其口鼻臍黃兩內更
迭吹之令上下氣相通

○又用半夏末少許搗其氣如略活用
粥飲灌之

○又急解衣帶艾灸臍中即活矣

○**下法** 皂角爲末葱白汁和左棗核
樣肉下部中其水自出效

○凍死四肢直口噤只有微氣用太金
炒灰令煖以袂盛熨心上冷即易之
目開氣出以清粥少少進之若不先
溫其心更將火灸則冷氣與火爭必死

○凡冬月凍倒杖在腰處不得便與熱
湯及血火多雪中行凍便近火脚指
墮落

○**方** 治凍死 生姜 研陳 祛石 各

一兩水煎溫服

袖伏暑不可便冷之即死用溫湯
心腹間如途中則用路上熱土放臍
腹間令人尿其中

○墜墮瘀血冲心氣絕不能言取藥不
能及急擊開口以熱小便灌之詳法
損傷用

○急喉閉腫痛手足厥冷即時氣閉不
通用皂角二皮攤水一盞灌下立愈

○治法毒入土中痛此
○毒入土中痛此

○蛇入人窠用刀割尾枝辛辣物用絲
縛定仰出不可拗

○中蛇毒勿渡水渡水則痛甚也治法
損傷用

○林元臘月艾雄狐膽如有人卒暴亡求

移者溫水微研灌入喉即活常須預
備救入移時即活如無膽且用雄狐
屎燒之辟惡在木石上者是

醫法明鑑卷第二終

六味地黃丸

熟地黃

牡丹皮

山萸肉

山藥

茯苓

澤瀉

小

多

多

多

多

多

