

明

金

氣

×

-128

F
1-124

4909
Th-9
4

No. 22
12/29

皮炎丸

三九丸

皮炎丸



1311

人參 茵蔴 紫草 紫蘇葉

甘草 大黃 桃仁 芒硝

香附

黃連

赤芍 青皮 黃芩

○神香散 積慢妙藥

一香附子 三分

一黃連 八分

一蓀木 一錢

一不香 八分

一甘松 八分

一甘草 七分

一人參 三分

一茯苓 八分

右八種佃末メ白粉ノト



醫法明鑑卷第四目錄

上婦人

月經一

崩漏二

帶下三附無子

中胎前一

惡阻二

胎動三

腹痛四

胎漏五

胎腫六

子煩七

子淋八轉胞九

子懸十

子癟十一

子癥十二傷寒十三

痢泄十四

兒哭十五

胎肥十六腰痛十七

半產十八

胎死十九

難產二十

胎衣不下二十一

子下二十二

產後二十三

血暈二

惡露不盡三

兒枕痛四

乍寒乍熱五

蓐六

瀉痢七

浮腫八

腹脹九

乳汁十附乳十一

乍見鬼神十二

中風十二附風

不語十三身疼十四

脚氣十五腰痛十六

項軟九	丁奚哺露十四	一脫囊四十
脫肛四十四	二 膻病四十	盤腸內吊四十
齒不生四五	三 斷乳四十六	七十五
諸熱証四十	五 誤吞諸物四十七	七十六
癰瘍一	六	七十七
驚風四十一	附慢脾風	八十三
痘疹五十	馬脾風	八十二
癰瘍一	噤風	八十三
癰瘍一	瘡	八十四
癰瘍一	發搐	八十五
癰瘍一	癰証	八十六

小兒

醫法明鑑卷第四

月經一

婦人門

上

傳婦人百病皆自心生，如五志之火一
起，則心火亦從而燔。若夫經閉不通，
之証，先曰心事不足。由是心血虧耗，
故乏血以歸肝而出納之用已竭。
又曰，因食少肺金失所養，而氣滯不行，
則無以滋腎陰。况月經全藉腎水，
施化腎水既乏，則經血日以乾涸，以
致或先或後，淋瀝無時，漸而至閉塞。
不通甚，則爲癥瘕血膈勞極之証。
又如崩漏不止之証，先曰心火尤甚，
於是血脉泛溢，以致肝實而不納血，
出納之道遂廢，月水錯經妄行，無時
而泛溢漸而至崩中不息甚，則化爲
白濁白澀血枯發熱勞極之証。

丹溪曰。經不通或、墮胎多產傷血。或久患潮熱錯血。或久盜汗耗血。或脾胃不和飲食少進。而不生血。或痢疾失血。治宜生血補血。除熱調胃之劑。○或七情傷心。心氣停結。故血閉而不行。

○四物湯乃婦人衆疾之總司也。飯

芎 白芍 熟地 右等分

○經水常不及期而行者。血熱也。用生

地加連芩香附。

○過期而來者。瘦人多是血少倍。取地加芪。其少佐以桃紅。肥人大槩是氣虛。扶炎阻升降去地。加參芪。芩莎半陳。

○過期而紫黑成塊者。熱也。多作腹痛。

用生地加香附連乳沒五灵。血淡色者。痰多血少也。用生地合一陳。○經候將來。腹中痛者。血實也。一日瘀血鬱滯也。用生地加香附桃紅延牡連木義。

○經候過而腹中痛。綿々無休息。屬血虛。倍取地黃。氣虛者。加參芪。木香。加連香附二木。

○經水適來。適斷往來寒熱如瘧者。命門。小柴胡。

○調經散。經水或前或後或多或少。或踰月不至。或一月兩來。皆可服。

飯酒洗

半

門仁

吳茱

擇去。開酒泡

次

○月經先期而來者宜服 飯身一
乾桂各半半湯炮參 白芍 芎
牡絡一膠 芉絡半右作一服加姜
三片

○月經過期而不行者宜服 飯身半
芎 膠 艾葉 芉 百 知絡半
連姜汁白芍絡八生地 條芩 香
附絡一右

○月經水不止其色鮮
芎 桂絡半熟地 白芍 香附
蘿木 義絡一桃箇二十紅分甘知通
八右

○柴胡調經湯 治經水不止其色鮮
紅項筋急腦痛脊強 火芎 飯身
葛各三 獨 藁 升絡半柴分七
蒼絡一紅少許 右煎服取微汗立
止

○升陽舉經湯 治經水不止右尺脉
候之空虛是氣血俱脫太寒之証輕
手數疾舉指弦緊或濶皆陽脫之証
陰火亦亡見熱証於口龜眼或渴此
皆陰燥陽欲先去也當溫之舉之升
之此法乃升浮血氣補命門之下脫
桂不通用白芍分紅瓣細分參熟地
芎絡半獨 黑附炮炙芎絡半姜
藁 風絡一末 飯 茗 柴絡二
分桃訥 右

○膠艾湯 治勞傷氣血衝住虛損月
水過多淋澀不 止 膠 芎 芉絡
拌飯 艾絡半熟地 白芍絡一右
一方加地榆芪入棕灰

○升陽除溫湯 治月事不調或暴崩
不正多下水漿之物皆因飲食勞倦

或曰心氣不足致飯酒獨絡半葛

壯風 芎炙升 蓼絡 柴 差

蒼 芈絡一 右煎空心溫服少時

以早食壓之可一服而已如灸足太陰經血溢三七壯亦已此藥乃從權之法爲胃氣下陷而氣逆於上以救其血之暴崩也住後必服參芪多苡飯之類數服以補之

○當取芍藥湯

治婦人經水漏下不正其色鮮紅時值癸月先因勞役脾腎虛弱氣短氣逆自汗身熱

甘草生地絡三芪一陳芍熟地絡

分荳 白朮 白芍 飯絡半右

○香附一物丸

治經候不調血氣刺痛腹脇脹頭眩惡心

香附米醋浸一日夜用瓦銚煮

右爲末醋糊

合熟

焙乾

右爲末醋糊

九如梧子大每服五十丸淡醋湯

○艾附丸

治証同前又崩漏帶下並宜治之

莎一千克

艾四兩

飯兩

右爲末醋糊丸

林白

右爲末隨胎升降胎氣不固宜服此

○四制衣醋附丸

莎一千克

分醋酒鹽水

童便海七百克各浸一日焙乾

右爲末醋糊丸

如桐子大每服七十九空心酒下

人加澤蘭赤苓各三

膝絡二芍絡一右

○加味烏沉湯

治經水欲來臍腹巧

痛

莎炒去毛二兩

烏宿

延紅

○一方

饭殊醋

延

紅

設絡半

西芍絞一兩半

右加姜

○一方

饭殊醋

延

紅

設絡半

右爲末，每服二至空心下。

○桂枝桃仁湯 治月候前先腹痛不

可忍，枝芍生地桃仁等石

每服七錢姜棗煎服。

○八物湯 治經事欲行，腹脅痛，血

濁也。四物湯加木梔延練子。

○逍遙散 治血虛煩熱，月水不調，脅

腹脹痛，咳嗽潮熱。辰砂白芍

白芍、木柴各一錢，炙半兩，右每服

八錢生姜片薄荷訛煎服。更加知地

骨丸，或加芩渴，加桔心煩，加門羚

角，嗽加烏梅數五味。

○牛膝散 治婦人室女血閉不通，五

心煩熱。紅紐膝、辰尾各一桃

別研右爲末，每服二錢溫酒調下。

○萬病丸 治月經瘀閉，繞脅痛。

乾漆碎，久用益時膝，丁酉酒浸右爲末。

用生地黃，入一味末，銀石器內慢

火熬丸如桐子大，每服三丸空心酒

正

○活血湯 治血熱氣虛經候，滯不

通，肢體麻木，生瘡，鞭荆壯

赤芍、枳桂、飯芎各二錢，烏梅

去核右分二貼，前服至半月或一月

經行病除。

○傳通經丸 治婦人室女月經不通或

成血瘕，疼痛。桂青大酒濕紙

飯桃核皮尖，去核，右等分爲末，將

四分之一以米醋熬爲膏，和餘藥末，杵丸如梧子大，每服二十丸空心淡

醋湯下，漸加至三四十九。溫酒亦可。

性畏寒者，入雞子清和藥。

柴胡丁香湯

治婦人年二十歲左右

右臨經先腰脅痛，生地分

細飯身 風

羌活一柴二分竭枝

右

烏藥湯

治婦人血海疼痛，飯不

耳

木硝五烏半
不莎仁 右

增味四物湯

治婦人血積血瘕，

攸 考

白芍熟地 穴 乾漆

炒，炮盡，別研

桂 羌 右等分

林琥珀丸

治婦人血瘕小腹腰背相引而痛，

琥珀去

川烏皮濟酒浸各

木 桂 檉蘭葉

麝各半右爲末

酒糊丸如桐子大，每服七十丸空心

溫酒米湯下

無極散

一名通經耳露散，又名四順丹

治經血

不通崩漏陽風帶下血風五淋產後積血

錦文太黃一斤淨分四處

四兩

用紅花四兩入水取汁浸，大黃一兩，童便入塗二分，浸大黃一日不用紅花晒乾

四兩

用當歸四兩入淡醋內浸，大黃一兩，童便入塗二分，浸大黃一日取出晒乾，不用當歸晒乾

四兩

用當歸四兩入淡醋內浸，大黃一兩，童便入塗二分，浸大黃一日不用當歸晒乾

四兩

用好酒浸，一日念軟切，如香核大晒乾，巴豆三十五粒去皮同蜜炒豆黃色，不用豆黃色

右四分同爲一處，入南木香一百草

霜分爲末，每服三錢好酒空心調下

又煉蜜丸如桐子大，每服三四十九

空心溫酒下，即四順散也。凡修合用

大癸擇一且

傳經不通馬鞭草杵汁，熬膏爲丸，或燒存性爲丸，飯紅煎湯下

○祖傳桃奴飲子 治婦人室女月經

不通漸成脹滿

桃奴桃樹上嫩桃乾枝不

落諸股月取假鼠糞即雄鼠糞也

西頭尖者是 小者是

桂 莪 灵脂各半宿 奄去皮尖別

研右等分細末每服三錢空心溫酒

調下

○治月經不通鼠糞丁合略炒研細溫酒調下立効

崩漏二

○心崩中者由藏府傷損衝任二脉血氣俱虛一脈爲經脈之海若勞動過極藏府俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中崩下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮心藥

○涼血地黃湯

血崩是腎水陰虛不

能鎮守胞絡相火故血走而崩也此湯主之 苓 荆穗 蔓谷各一百
知 藜 細 芎 肉桂 二連 卷柴
升 風 桔 三 生 地 飯 桔 半 甘 血 紅
渺石

○丁香膠艾湯 治崩漏不止蓋心氣

不足勞役及飲食不節所得覺崩下

如水冷白帶及白滑之物間有如星

漏水 熟地 白芍各三 芎

○香 桔 四 膠 大 分 生 艾 葶 各 一 份
右芎地丁香別爲細末飯芍艾各細切連前共六味入水五大盞煎至二
盞半去粗入膠再煎空心熱服

○治血崩不止荳耳草燒存性好酒調服立止或入四物湯中亦可

○老婦崩血久不止諸藥不効緣乎

蒼耳根二物燒存性用四物湯加正
菴花于姜煎湯調服効

○林加味四物湯治血崩 芎 飯酒

生地 白芍 膜蛤粉 艾葉各二
右一方用熟地加姜

○一方 治崩中不止 桂圓肉絲丸
各燒存性 右爲末每服一錢鹽酒或

等分 蒜湯食前調下

又塗梅燒存性爲末空心米飯下

○五倍子散 治血崩帶下 艾葉兩
醋煮五倍子一兩赤色炒烏梅五枚
去核 芎伍

右爲末米湯下

○伏龍肝散 治氣血勞傷衝任脈虛
經血崩中或如豆汁或五色相雜脅

腰冷痛久不止虛煩驚悸 伏龍

赤石脂一兩熟地酒浸宿

艾葉二兩微炒

○當歸地黃丸 治產後所下過多及
崩中傷損虛弱之氣 芎 繢
門半兩 右每服七錢棗三枚去核
煎服

○崩中傷損虛弱之氣 芎 繢

姜 附 膠各三兩 地五
右爲末陳蜜丸如桐子大每服四五十
丸空心溫酒下

○白芷湯 以白芷煎湯調百草霜甚
者棕灰 後四物加于姜調理曰寒

用乾姜因熱用芩因涼參芪

○帶下附無

○林 帶下風氣寒熱所傷入胞門或中經
脉流轉藏府而發

○傳 帶下是濕熱白屬氣赤屬血一腹加
蒼朮爲主氣虛入參木無虛入苦味

○帶下是胃中痰積流下滲入膀胱當升之二陳加一末升柴仍用尾灌子以燥其濕痰

○肥人帶下多是濕痰
○瘦人少有此病有者是熱

○當歸附子湯治赤白帶下臍下冷痛

歸四炒鹽分蝎梢 升絡五甘
柴分附炮一柏硝許爲姜胞良
分附炮八右煎服或酒麴糊丸亦可

○延胡苦練湯治臍下痛陰冷大寒

白帶下 柏分延 練子絡二附炮
桂絡三炙耳硝熟地一右

○桂附湯治白帶腥臭多悲不樂大

寒証 柏爲引知絡五桂硝附炮三

右

○如些食當飽腹中蒲悶加白芍半

不思飲食加五味子半如煩惱面上
如血行乃胃中元氣極虛加芪半
參牡灸甘升絡半

○益母丸治赤白帶惡露時下不止

又治久無子常服驗 益母草五月

株陰乾爲末煉蜜丸如彈子大每服
一丸用熟酒加童便化下兼氣者木

香湯化下

○苦練丸治赤白帶下最妙 練酒

浸茴炒飯絡等爲末酒糊丸如梧子

大每服五十丸空心溫酒送下

○淋芍藥湯治赤白帶下臍腹痛神妙

白芍二千姜一兩右爲末微炒黃色每

服一錢空心臨卧米飲下半月效

○督灸丸治久冷赤白帶下腹痛面

色痿黃四肢無力久無子息

苓 艾葉 酵八莎 飯酵四 吳茱三
爾芳 白芍 酵二 右用醋五升 砂鍋

煮乾爲末 醋糊丸 姑梧子大 每服五
十九空心 醋湯 下 日三服

當飯丸 治帶下不正腹痛四肢煩

不食羸瘦 全 飯浸赤芍 白芍 蜀

粉 熟地 膠蛤粉續酒浸各 地榆

伍 右爲末 醋糊丸 姑桐子大 每服

五十丸空心米湯 下

如聖丹

治赤白帶下月經不來

枯瓦 蛇床

右等分爲末 醋糊丸

姑彈子大 乾臘脂衣內陰中 捾極

無換。

婦寶飯耳丸

治赤白帶下子官虛

冷四物湯 加芷胡黃柴 蜀一兩 茄

煮糊丸 半斤醋浸十宿

石爲末 醋糊丸 一兩

梅格四稜炮姜炮桂格五末 柴

參格二青 吳茱炒 蜀炒附炮並

草蔻煨赤芍

柏葉絡三桃桂皮板

醋鱉炙各六升

天竺石爲末 煉鱉丸

如桐子大 每服二十丸空心酒下 千

煎至晚更進一服 如覺熱晚不須服

姑腹內積塊攻築 鱉桃 桃

稜 各加一倍

如味四七湯

治婦人小便不順甚者 陰戶疼痛 全

半酒朴 赤苓絡五

蘿卜 甘仁 莎根 五分 右分四貼姜

五斤煎去粗加琥珀末一錢調服

烏金散

治婦人久無子息及顛躯

胎皆日衝任之脈宿瘀經水不時
暴下月內無行或崩漏帶下臍下冷

痛

烏梅

干姜

敗棕

三味並燒存性

各三

右爲末烏梅湯調下

詫人丸

治衝任虛寒胎孕不成或

損陰

澤蘭葉

木各一桂

姜各半兩

熟地

飯酒浸各

芍

解酒洗白芍

桂延齡

石爲末醋煮麴糊丸如

桐子大每服五十丸空心酒下

秦桂丸

治婦人無子丸

桂

仲炒風

朴絡半附炮白芩各一

膝

白微半

生乾姜

泄參各五參

細二兩

右爲末煉蜜丸如桐子大

米飲亦可

每服五十丸空心醋湯下

可

未効加丸數已覺有娠便不可服

物加莎苓之類

傳婦人無子者多由血少

少血醫悉謂之

宮虛冷以辛熱之藥煎熬臍脉血氣

沸騰禍不旋踵

○瘦怯婦人子宮乾澀宜滋陰養血

四物加莎苓之類

○體盛者乃軀脂滿溢閉塞子宮宜行

濕燥痰星半芎滑風

羌一本有蒼木無活防風

或導痰湯之類

○墮胎乃血氣虛損不能榮養胎元而
自墮草一婦有胎即墮其脉左大無
力重取則濡乃血少也白木濃煎湯
調黃芩末一錢服至三四兩得保

全而生

固胎飲

熟地飯參白芍

木芎陳芍桑寄生少加

連柏入糯米五七十粒煎服○血虛

不安者加膠珠○胎氣痛者加宿

安胎散 胎氣不安或腹微痛或腰

痠或食不倦宜服或至五六箇月

常服數貼甚好 木 飯 白芍

熟地絡一參 蒴 陳 條芩絡半

甘 縮 蘭絡三 右作二服加生

姜三片

○安胎丸 术 僧芩 麵炒右等

分爲末粥丸每服五十丸清米湯下

條芩木乃安胎之聖藥俗以芩爲寒

而不用殊不知胎孕宜清熱養血必

用細挺沉實者縮砂安胎以止漏行

氣但縮砂非八九箇月內不宜多用

○懷姪嗜醋物乃肝藏正能養胎而

虛也

傳一惡阻乃有孕而惡心其飲食者
是也多從痰治用一陳之翫又以木
丸服一日肥人痰瘦人熱

○半夏茯苓湯 治惡阻不食吐逆頭

眩忘寐煩渴惡寒自汗

半湯泡去

心黃色半生姜各一苓紮熟地 陳

桔 参 旋覆花無嗽芍 甘 蒴

絡半右一方石蘆 細絡半

不食或心虛煩悶 橋紅 荸各

冬門 术 朴 甘絡絡右作二服

加生姜三片竹茹一錢或加參一錢

○加味二陳湯 治受胎一二年之嘔

吐擗食可中院宿有瘀飲 陳 白

芩絡四分半虢三木二分半 四甘絡一

右分二貼加姜五片烏梅一箇有妊娠

雖忘半夏然即用姜製其毒服之利
癥，遂飲必見功效。

○用條今香附之類，
健一胎動者因火逼動胎遊上作喘急，

○小腹艾湯 治婦婦因煩作胎動不安或胎捨上逼心或腹痛下血一膠珠一兩艾葉二兩

○膠艾湯 不問月經安胎熟地艾 叢 芮 無 蒴 膜各一錢生地二分右

○治胎動冲心煩悶欲死安胎止偏飯酒 蒴 參 膜 芮 無 膜各一錢葱白切一升右

○因作跌損傷胎氣不安或子死腹中
芎 無 為末每服一七連進二十服死胎即下

○如聖散 治妊娠腹痛胎動不安或
血下 鯉魚皮 叢 熟地 膜珠白芍 荘 繼酒 芮 無 各一錢
錢姜三片苧麻根拌煎服一方石子
姜竹茹無續斷

○杜仲丸 妊娠三月胎動不安石子
血腹痛蓋由子宫久虛致令胎墜且
服此以養胎 仲 皮 姜桂 繼酒
各一右爲末煮東肉丸如梧子大每
服三五十丸空心米飲下

○一方 茅木 叢身 宿炒各
右煎服

○加減安胎飲 治胎動不安腹痛漏
下或胎上刺心短氣婦婦氣血弱者
宜服此免右積墜之患 參 芮
芍 芮 熟地 繼側柏 膜蛤

妙甘矣。右等分每貼七錢姜三片漏下不止加艾葉，

林二胎動腹痛皆因飲食冷熱或因交合傷犯其候多嘔氣不調和變成漏胎則難安矣

○當取芍藥散

治姪娠腹痛巧痛心

下急滿 一錢 苓 木各一錢 澤

絡二白芍右煎服爲末酒調服亦

可如胎動口噤唇青下刺快加減安胎

飲加熟艾酒煎

○火龍散

治姪娠心氣痛 艾半錢

炒荷炒練肉砂各一錢右煎服

○通氣散

治姪娠腰痛不可忍 补

骨馬上 炒香 右爲末嚼胡桃仁一箇空

○當取地黃湯

治胎痛 一錢

○當取地黃湯

治胎痛 一錢

○姪娠偶有所傷腹痛不安或從高墜

下胎痛及下血有宿砂和皮略炒勿

令十分焦黑去皮爲末燒酒調服或

米飲或艾湯鹽湯如見胎中其胎即安此方即驗凡常服安胎易

產

○姪娠一二箇月忽心腹疼痛不安用

飯仁膠耳二錢葱四右

○姪娠四五箇月忽心腹疼痛 大棗四枚鹽五杯燒右爲末一撮許

酒調服立愈

○治姪娠心腹大痛氣欲絕 芎 一錢

苓 朴各一錢

○胎漏謂石胎而血漏下者屬氣虛有

熱四物加膠木條芩宿炒香附水而

米煎服

治胎漏下血
木西保子社
膠珠各右爲末每服一錢煎艾湯調
服水煎亦可

又方 枳炒芩各半木酉水煎食前

○治妊娠下血不止胎生冲心四肢厥
冷悶作死火炒膠 芝酌一茹
丸奉白砂蜜合火右用水二升煎至
一升入蜜更煎火二沸分二服火

治妊娠下血如月信來，胎動非水
損子亦能損母。熟地 姜 炮各
右爲末，每服三錢，一日夜三四服。

加味四物湯 治姪娠下血不止本
方加艾葉片三十膠珠一烏梅肉
計水煎熟服

桑寄生散 治姪娠下血不止胎動
不安 桑寄 飯酒續眉芎 沙
膠 神 杏仁 參 甘草半右作
五服加生姜二片

○林
草根湯 治胎無故下血腹痛或下
黃汁如漆或如豆汁 葛根四兩
金伍銀伍右分一貼酒水各一盞煎

○賈芩湯治胎漏不妄
飯酒縮貉半煎服
芩木

○治胎動漏血產門痛
服一錢溫酒空心下
黃連爲末每

急救方 治漏胎下血不止胎乾子
母俱死 生地黃汁升酒紅煎分三
服如無生者用乾薑爲末酒調一三
錢食前服

○保氣散 治頭眩傷胎漏血安胎質

枳炒桔 莎炒右等分煎服

○傳胎腫謂有胎或手足或頭面遍身浮腫者是也屬濕多或用槐子丁合炒爲末米湯調下丸服亦可也

○治妊娠腰脚腫痛 白苓 木姜子 炒杏仁去皮尖研右水煎

○木通散 治妊娠身躰浮腫四肢脹急小便不利謂之子腫 通薦桑藕莖葉各枳炒杏仁條芩各半水酒子皮各三石作一服加生姜三片

○全生白朮散 治妊娠面目脹浮肢躰腫脹 木一兩生姜皮 腹 陳茶各半右爲末每服一錢米飲調下

丁方用芩皮
桑皮無朮

○鯉魚湯 治妊娠眼澀或通身浮腫

○小便不利 飯 白芍各一白苓不半木紅橘紅伴鯉魚一尾不拘大小右作二服將鯉魚去鱗腸白水煮熟去魚用汁一盞半生姜七片煎一盞空心服如水未盡再合一劑服之

○澤鴻散 治妊娠氣壅身躰腹脹浮腫喘急小便不利謂之子滿 沢桑枳 梅 通赤苓各等分右每服四錢加姜五片

○防己湯 治妊娠脾胃虛遍身浮腫

心腹脹滿喘促尿不利 己二分桑赤苓 蘇各三分木九分右分一貼加

姜三片

○妊娠止兩脚浮腫名曰臘脚遍身腫

月五日

蒲心胸氣脹名曰胎水鯉魚湯皆治之

○平胃散 治腳，加姜棗熟藥煎

眼

○赤小豆湯 治手腳腫，小豆商陸絡分煎服忌食鹽

○八正散 治姪娠心氣壅手足浮腫

草瞿薑滑苡旋通大棗果根入茴丁根

傳子煩謂姪娠苦煩，不安，門，芩，風，知各一右水煎入竹瀝二匙，服

丁方去芩，加芩

○犀角散 治子煩，犀地骨條

芩門赤芩各一甘拌右水煎入竹瀝一合溫服

○當歸散 治子煩，歸半不芎膠

○政桑寄各七葱七右

○麥門冬湯 治子煩，門，風，白

芩絡四參仁右加姜竹葉

○知母飲 治姪娠心脾壅熱，口乾渴

苦，煩悶，赤芩，芩，葛絡二知門，甘條各一，桑拌右入竹瀝

○飯涼節命散 治姪娠面赤，口苦舌

乾心煩腹脹或一便閉泄皆因醉酒或食生菓鷄魚煎燙熟毒物所致

芍，苧根，芍，門，飯，木各二

糰五百，甘半右煎服

○林子淋姪娠酒色過度，或飲食積熱致水道閉滯名曰子淋

○安榮散 門，通草，滑絡一飯酒浸，燈心，甘炙細洗參絡五，右爲末

每服二三錢麥門冬煎湯調空心服
脾治不効此方屢効 桂 赤芍 等分
右煎服一應男女血淋水道溼痛皆
効

○**枳榔散** 妊娠淋澁小便不通作轉

脾治不効此方屢効 桂 赤芍 等分
右煎服一應男女血淋水道溼痛皆
効

○**地膚子湯** 治子淋小便澁數

膚 車絡一知炒芩 赤苓 白芍

枳殼各七升 芒通草各三 右

○**又方** 地膚草分 以水四升者取

二升分二服或新取地膚草搗自然

汁服亦可不獨治子淋兒淋閉皆效

○**冬葵子散** 治子淋小腹疼痛胎動不

安 葵炒柴桑 赤芩 赤芍

○**車前散** 治子淋或尿不通下焦有

熱 桂 通陳牡丹赤芩 車 赤

○**白芍散** 治妊娠遺尿不知出

白 薇 白芍等分末每服二錢食前

酒調服

○**天膜皮散** 治妊娠大小便赤澁

枳炒腹其半兩 赤芩半兩右爲

末每服三錢葱白湯下

○**轉胞之證** 古方皆用滑利鮮石蠍丹

溪日胞不自轉爲胎所壓轉在一邊
胞糾戾不通身四物加參木陳半
甘加姜煎服

○**子懸胎氣不和** 濕上心腹脹滿腹疼
謂之子懸

○紫蘆散 考 腹 白芍 陳 蘿
飯酒各參 甘桔石分二時姜
五片葱一根

○保安散 治胎動心悶唇青口乾上
衝下築手足厥冷 飯 參各半
芩仁 右水煎入膠珠二兩葱白一
握再煎溫服

○一方 治妊娠身癟或衝心欲死不
能食 末五兩 苓兩 右水煎
子癟妊娠中風頸項強直筋脈急
言語蹇澁痰涎壅盛或發搐不省人
事名曰子癟

○羚羊角散 治妊娠中風子癟 羚
鈎 獨 酸炒五加絡半 杏仁各一分
飯酒浸 考 神 杏仁木香
甘桔半 右分丁貼入姜一片

○獨活防風湯 治妊娠角弓反張口
噤謂之風瘡又曰子癟 麻鳩風
獨活各一桂 羚鈎升 甘桔酸
棗炒丸各八克 飯 杏絡六枚右
每服七錢姜四片行瀝一合煎
後絳石

○防風葛根湯 治妊娠臨月發風瘡暈悶
不省人事吐逆醒後發謂之子癟
貝 葛 牡 已 風 飯 考
桂 苓 澤絡半 甘桔半 獨 膏
參各一右煎服見母念大易產未臨
日者升麻代之

○防已湯 治妊娠中風口噤四肢痺
月五日

明治四

服三錢加姜五片水煎

○治姪傷寒火柴一前
散硝七參分

芍生地各六克分右作一服加生姜三片葱白二莖

婦治姪傷寒憎寒發熱火葱薑生姜火石前連服取汗愈

○草胎散治姪傷寒太熱悶亂燥渴恐傷胎蛤粉五
克敷捲荷葉火兩右爲末每服一錢蜜少許水調服十

方搗家園生葛汁服

○姪娠寒熱火小柴胡去半夏最效

○熟病誰胎方乾浮萍朴硝硝大炒蛤粉炒藍根石等分爲末水調三

錢貼臍上安胎解煩極效

○方佐龍肝末水調塗臍下乾則換用井中泥塗心上又可

○赤白痢火泄瀉當散方藥湯治姪妊娠白痢赤白腹痛

白芍仁散白苓沢末條芩絡半甘連木枝絡三

右姪白痢腹痛甚者恐有寒去芩連加乾姜二分

○芎木香連丸治証同前膠珠末縮炒芎絡五乳木絡二枳

姜炮絡連火兩茱萸同炒右爲末醋糊丸

姪梧子大每服三十九白湯火下

○治姪娠泄瀉兩脇虛鳴臍下冷痛由食生冷及當風取涼火調子煅末各

名陳良炒木白芍火絲絛芎絡半葛薢裹煨石加生姜五片

○兒在腹中叫哭臍帶上癰瘡火乃兒口中含者且姪妊娠取物脫兒口以

月五日

此作藥令姪婦臘肥回地拾物使兒
復得。今人中即止用多年空屋下
鼠穴中土一塊令姪婦含之即止。

○又方用黃連三五錢濃煎汁騎呻吟

角止

本胎肥身居富貴口廝其肥聚樂不常
食物無度即飽便卧致令胎肥厚
根蒂堅牢行動氣急蓋緣不曾預服
瘦胎之藥致於臨產必難產八月可
服無憂散

無憂散

飯酒

芎

芍

木

苡

炙格半枚炒乳研各血餘霜髮灰
鹽猪心右爲末每服三錢水煎服

滑胎易產散生散

安胎益氣易產

冷子緊小念母無病

參

調根

木炒麥芽炒曲炒陳妙等右爲

枳殼散 瘦胎易產抑氣 枳

四兩炒

粉草

炙二兩

右爲末沸湯調食煎服

孕七月便宜服太便閉澁加防風肺
弱加取本

軟胎方

甘草生姜

焉梅

每服

五錢水煎食前服便令腰膝軟弱爲

生養

不妥

灌腹

服三四十九白湯

不妥

灌腹

舟溪東胎丸

七八箇月內服之

不妥

灌腹

數貼易產腰少痛

不妥

腹原本二不恐

不先酒洗乾再用

烏豆汁洗左可用

參陳

蘿蔔

白芍大取

穀一草後二

石作一服外人黃楊腦七箇食少胎變者不

鹽葱五莖夏加芩連五味春加芎風

秋加沴冬加縮氣上逼心加蘿地性

急加柴多怒加芩食少加縮麵湯加

門芩能食加黃楊腦胎不長此物能變右痰

加半芩

○丹溪臨月用以養胎方 飯 番

芩 陳 米 莘各 芝拌其分右

水煎調益元散一錢服虛者加參分

○仲景當歸散

安胎養血清熱孕婦時常宜服每次一錢

芩 右等分爲末每服一錢溫酒或

湯調下

○局方枳殼散 嫩娠八九箇月內胎

氣壅滿當宜服之滑胎易產 枳殼

五兩 茱萸炙一兩半莎炒兩半右爲末每服一錢

空心沸湯點服

一方加糯米炒如妊娠弱者置表

胎寒腹痛者胎弱多驚者加飯酒木

酒半

○婦腰痛腎主腰曰勞其經虛風冷乘

乏則腰痛甚則胎墮取三芎一兩

右水煎入膠珠二葱白七分煎

○一方 大黑豆炒熟二合以酒煮熟去

豆空心頓服

傳妊娠腰痛如折不能轉側取鹿角

右火燒令赤酒淬無燒無淬以磚爲

度細末酒調服

○通氣散 治妊娠腰痛不可忍補

骨髓爲末嚼胡桃仁一箇空心溫酒

調下一錢

○青娥不老丸

治妊娠腰痛不可忍補

之腰痛，胡桃仁一錢皮二分，蒜研膏四兩。
破胡酒浸妙仲去皮姜汁一斤，右爲末。
蒜膏丸如梧子大，每服五十丸空心。
醋湯下。

○半產臘時虛弱或氣血衰敗，或先因
婚嫁失時或醉酒飽食觸熱冒寒疲
極勞傷，日數天周使墮胎。

○**芎藭補中湯** 養新血，去瘀血，補虛。
扶危，姜胞膠蛤粉芎，五味各二分。
分芪蜜水，飯酒浸，木參赤芍各一分。

木參仲紹去甘葛各右

○**奪命丸** 治小產血子死，憎寒手
指唇口爪甲青黑色黃黑或胎上
捨心悶欲死冷汗出或食毒物傷動
胎氣，下血不已胎未墮服之可安已
死，服之可活。牡白芍桂桃。

○**安榮湯** 治胎氣不周，時常小產，宜
預服此，固胎元，西物加膠珠莎木
宿條芩糯米桑寄。

傳

○**安榮湯** 治胎氣不周，時常小產，宜

預服此，固胎元，西物加膠珠莎木

宿條芩糯米桑寄。

○治小產後心腹疼痛，飯芎熟地白芍酒炒各分，延祉桃紅。

芍三

芍青黑澤蘭

杜仲各半

右水一盞半童便酒各半盞煎至一

盞溫服。

○治小產後下血不止，參芪飯

术白芍芎艾葉甘草膠炒

青莎宿右等分煎服。
○**安胎散** 治胎寒，腰痛，胎熱，多驚，腰
痛，腹滿，胞急卒崩，斬下或因頭化或

食毒物或感冒時致胎傷

枳椇半熟地三 糯米一合右作一服

生姜三片大棗一枚更加金銀二五錢同煎

○孕而服毒藥及胎牙閂緊急強直自汗身微熱與中風相似且服白扁豆

一味生爲末新汲水調酒之清米飲亦可

○胎死母因患熱病府藏極熱薰蒸其胎是以致死緣兒死身冷不能自出

醫家以黑神散治之恐本方內有姜附桂之太熱宜用熱病之人宜以草麻子 朴硝散 濟陰丹 佛手散

之劑主對

○下死胎草麻子搗碎敷脚心即下如子腸隨下急去脚心却敷頸心即收

○一方雄鼠屎七枚水二升為丁升去粗取汁作粥食之即下婦搗胎不特病薰所致或曰頭生或因驚恐或出入目觸壞胎最多其候舌青知子死

○一方治熱病胎死是即黑神散即桂頭飯 白芍 芡 生地 姜各

各黑豆妙去皮附炮去臍右爲末空心酒調下一方無附子有蒲黃

○一方王熱病胎死紅一味酒水煎飲二三盞

○催生散

治熱病胎死身冷居青不能自止
桂 芒硝各一錢酒姜炮朴 苓

半

亨

枚

各

子木

杏

妙

分

右作一服姜三片棗一枚

香桂散

生死胎麝研末桂

三枚

右爲一服溫酒調下

亨飯湯

半錢佛

治妊娠因事跌仆

死腹中惡露妄石疼痛不已日噤欲

絕用此藥探之若子死腹中立便平

看腰痛隨此子母俱安又治臨產難

生胞衣未下及產後血量一切胎崩

產後危急並皆治之

飯酒洗亨不一兩

右作四服用水一盞煎本料乾投酒

半盞半煎五七沸溫服如口喫灌之

如人行五里詎無進盡四服省

○治橫逆不順子死腹中伏龍肝爲築

溫酒調下二十錢其兒頭戴土而出

甚驗

絕

瞿

通草三桂

四

白榆白

瞿

通草

三桂

四

白榆白

○治產難數日子死腹中不出母氣欲絕
王瞿通草三桂四白榆白

丁方無榆白有天花粉四兩能墮胎

右水九升煎取三升去粗分三服頓飲即下

○治子死腹中不出用黃柏牛屎墮母

腹上直出

○云牛屎炒令大熱入醋半盞以青布包於母腹上正熨之立下

傳難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有因八九箇月內不

能謹禁者

○又曰臨產翕喚用力失宜遂有難產危

催生散

白芷炒百草霜

白眉石

各等爲末。芎飯湯調正三錢。

林神應散

治難產及橫逆皆曰坐草。

太早努力過多兒轉未速或以破水先下其血必乾若先覆至謂之橫或先露定謂之逆此藥無固其血服之如魚得水。

白芷

百草霜

右

等分爲末。童便米醋各半盞調藥二三錢。沸湯泡溫服。分二次服。服畢又用蜀葵子四十九粒滑石末二分順流水煎湯調服。如人行五里即生。

○加味芎飯湯

治產難二十五日垂死。

芎飯各一。乾龜殼一箇。婦人髮搘。右爲末。每服三錢水一盞煎。它分服。約行五里。生胎死胎皆可下。

○催生鉢丹

治橫生逆產。黑鉢各一。

右以小銚子火上鑄化投入水銀二

錢急攬結成砂子。傾出用紙糊作丸子。如菉豆大。臨蓐以香水送下。立產。

○如神丹

治難產。

巴草

麻各去

七枚

研入麝少許。搘作餅子貼臍須臾。

子母便分張。

○無憂散

治難產及胞衣不下。臨月。

預服之則子易生。

飯酒芎

白芍

各七枚。甘略五枚。乳絡一血條。

灰硇右爲末分作二服。水一盞煎。不分去粗。溫分去粗。溫。

○來甦散

治孕婦欲產未產之時忽

然暈悶。不省人事。

木

麫

炒陳桂

芩

麥芽炒生姜切片。膠炒成白芍

絡半木

芍絡五枚。炒乳絡一血條。

灰分右爲末分作二服。水一盞煎。八

分去相溫服

○來避散

治孕婦欲產未產之時忽然暈悶不省人事木

鰣此陳法

葛麥芽炒生薑切碎膠炒成白芍

各半糯米碎苧根仁甘分右作二服水

一盞半煎

至

一盞

主

祖

灌

未

醒

無

服

○灸法

治難產及胞衣不下急於產

母

右脚

小指

尖頭

上

灸

一

壯

如

小

麥大立度

又灸井至陰二寸穴在足小指外側去爪

甲如韭葉灸三壯又灸太衝一寸穴在

足太指本節後一寸骨鑪間灸二壯

肝經俞也

○婦

胞裂先破下多胎乾先與四物湯養

血氣

次濃煎

放冷

洗

產

戶

令氣

上下通暢仍滑石末蜜調塗產戶裏次服催牛藥乳香末蜜丸溫湯下佳

○傳

若手足先露者用細鍼刺兒手足心

二三分深三四刺之以鹽墜其上輕

令送入兒得偏驚轉子縮即順生

○或兒脚先下急以鹽塗兒腳底又可急

擦之併以鹽摩母暖止則正生

○又燒羊角一枚刮火爲末酒調服方

七

○又龜甲燒末酒服方

七

○又方用鱉甲

又燒末酒調服方

七

又大麻根三莖水一升煎半升頓服

立產

產衣不下亦可

○治難產珍珠末一兩和酒服之立生

立產

產衣不下亦可

月五日

又赤小豆生蚕七枚即生

○治橫倒梁上塵酒服方寸匕

○治搘產鑑杵薦藥者是地若無可用斧或銅鑑亦可

右燒令赤投酒中飲之自然順生

○治難產及胞衣不下人滿一升用姜

葱各十分煎三兩沸乘熱飲便下

○治倒產子死腹中艾葉半升酒四升

煮取一升服

○難產惡證身重熱寒面黑舌青及舌上冷子母俱死面赤舌青母活

子死面青舌赤口沫出者母死子治唇口俱青吐沫子母俱死婦口舌下

脣青黑而反卷冰冷者子母俱死

一婦胎衣不下母生子訖流血入衣中爲血脹故不下但服奪命丹逐衣中血

血散脹消衣自下

○**奪命丹**

附炮半壯一于漆二不半兩

炒烟盡右爲末釀醋一升熬大黃末一兩成

膏和藥丸如桐子大每服五七丸溫酒吞下一衣爛下一盆如金卒無此藥宜朴硝散方見胎死忌

○一方紅花一兩酒煮濃汁服之

一方每角棘燒末每服一錢溫酒調

末通經滑

○四葵子粃不右水煎連進三四服立

下即洗去

○治胞衣不出婦人槐覆井口口五下本

草麻一兩去壳雄仁研成膏塗母石足心

綻下即洗去

○治胞衣不出婦人槐覆井口口五下本

婦人者佳本

○又燒鐵杵，冷赤水投酒飲之。又牛膝水一升煎，取二升分三服。

○**下方** 治血道閉塞，胎衣不下。黑豆丁合炒熟，入醋一盞煎二五沸去粗分，工次服。仍取鞋底，炙熟，慰小腹上七，三五次。

○**下方** 米麥赤小豆同煮濃汁，服立出。

○治產後惡血冲心，胎衣不下。腹中血塊，錦文大黃爲末，米醋熬成膏丸，如彈子大，每服十九湯化開服。溫童便調，更好。

○一方酸米醋升沙鍋內慢火熬至三升，入百草霜末一兩，大黃末二兩，熬成膏丸，如彈子大，每服十九溫。童便化開服。

○**三方酸米醋升沙鍋內慢火熬至三升**

神丸可代黑丸，用大効。

○**三方退飲** 治胞衣不下。蛇退全者益退紙方，蟬退九術，右薑瓶盛燒在盆，細研順流水調服。並下逐風藥。

○**婦人科下**

○**產後**

○傳丹溪曰：產前當清熱養血，爲主。產後宜大補氣血，爲要。雖有雜証以末治之，此萬世不易之論也。

○產不可用芍藥，以其酸寒能伐發生之氣。內風之只以芪易芍，如腹痛者，非芍藥不可。雖新產亦用，但以酒燉不妨。

○產後之諸疾或在室，熱似瘧或太

熟頭疼，駁痛，如傷寒，或卒中，俱噤，如
瘡，如癪，或角弓反張，或妄見鬼心，
神惶惑，或耳目口鼻忽覺黑氣，如煙
薰之狀，或腹中作痛，綿心不絕已上，
諸証若非惡露不盡，即是勞傷血氣。

大虛之証

產後補虛，用參末，桂陳散，身尾膏，參
茸，如發熱輕，則加茯苓，淡滲之，其熱
自除，重則加于姜。

或云大熱用于姜何也？曰：此熱非有
餘之邪熱，乃陰虛生內熱，半蓋于姜，
能入肺分利肺氣，又能入肝分引乘
藥，生血，然必與補陰藥同用之，此造
化之妙。

一、產後血暈，因氣血俱虛，痰火沉上，作

暈，二陳導痰，膻氣，加減礞砂安神。

丸亦可服，以麥門冬湯下。

林

血暈者，曰產時下血過多，血氣虛，致暈悶甚，則昏不知人，氣息欲絕，若

作暗風治之，誠爲謬。

○血暈由敗血入肝經，眼見黑花，頭目旋暈甚，則昏不知人，其曰有三，一有

用心使力過多而暈者，二有下血多，而暈者，三有下血少而暈者。

○生子了，燒硬炭或江中黃石，令通赤量，產後一兩時，人作妙，一七日也。

○一法燒干漆，令烟濃薰面。

○一方 治產後血暈危困

飯分

劉赤芍二分 生地汁一盞 右水煎數沸

溫服，如煩熱，去飯，入童便妙。

清魂散

治產後氣虛不安，血隨氣

上迷亂心神故眼赤生花甚不知人

口噤氣冷

澤蘭葉

參

荆

兩

芎

半

右細末溫酒熱湯調灌入童

一方右耳草傳

每服二錢溫酒入童

便調下

○傳產後血暈用韭葉，細切盛於布嘴瓶中，以滾醋盪之急封瓶口，以瓶嘴納產婦鼻中即甦。

○又方用鹿角一丁段燒存性出火毒，爲未酒調灌下即甦。

林

一方

紅花一錢爲末分二貼酒二盞

煎一盞溫服

○鴟薦湯治產後去血過多及傷胎去血多昏暈，飯身、房右等

分每服五錢水二盞煎八分服。

五靈

○一方治產後血暈沖心悶絕

分

芒硝一錢

○牡丹皮散治產後血隨熱上交心昏暈腦絕，壯大蒸芒硝三冬

鳳子桃核皮淡右分一貼水盞

半煎至一盞入芒硝煎一二沸去粗

服，口噤灌之。

○奇効方治產後血上心已死，真鬱金燒存性爲末，溫米醋調灌下立活，入蜜少許服。

○蒲黃散治產後惡露不快，血上，捨心煩悶昏迷或狂言，乾荷葉炙延

壯生地甘葛各二蒲生六石芥少入蜜少許服。

○凡產婦昏暈敗血上冲者，牡丹散

○蒲黃散 奇効方 五靈脂 紅花 湯爲主對若盆虛者 清魂湯 芸芻

○產後惡露不盡腹痛 血土散 可通用也

○產後惡露方盡或感邪或喜怒斯然而止餘血停滯故腹痛 治法同上

○一方 治惡露不盡腹痛往來胸滿步氣 血土散 澤蘭熬 生乾地 飲各三

芍 生姜各十甘草棗子十四右水煎溫服欲死塗身得瘥

○一方 治產後下血不盡腹內堅痛不可忍 飲 芍 桂略三桃仁二

右煎服未瘥加大黃二兩

○一方 治產後惡物不盡腹內疼痛 生乾地 飲各一兩 生姜切大尾

○一方 治積血而刺痛者宜桃紅飯之頰

○丹溪活套云惡露不盡作痛 四物湯調香附五灵未服甚者加桃

○惡血不去發寒熱成癥瘕者 四物加 稗 菓 乳 没 香附 桃

紅 五靈 乾漆之頰

○產後腹痛不息 四物加烏藥 香附 桂 良 嘴童便和醋煎服甚

效

○當歸養血丸 治產後惡血不散發熱腹痛及經候不調赤白帶下腹痛

飯 赤芍各四

牡桂

炒延

各二兩

各

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三十丸或酒或米湯任下

○定痛散 治產後惡血不盡腹中作

篇七 飯一 芍藥二 桂各右生十一服

酒水一 盆半姜五片

黑神散

○治惡露不盡血氣攻心腹，

○痛及血量等証

○黑豆炒去皮熟地半升

酒

飯酒浸桂

○蒲酪一方無蒲有附石爲末每服

○一錢童便和酒調服

○林治產後腹痛，鯉魚鱗燒灰酒調服

○治產後血不盡心中疼痛，荷葉熬令

香薑末煎水王方寸七

○治腹中絞痛末桂溫酒服方寸

但酒燃

○產後惡寒發熱腹痛者當去惡血，

腹不滿者非惡血

兒桃 ○治勝漏非芳藥不可雖新產亦可用

○下方治兒桃勝漏，延飯酪二

○失笑散 治產後心腹絞痛欲死及

兒桃痛，蒲炒五灵粉等右爲末，醋

調一錢熬成膏湯化服之

三聖散 治兒桃痛，飯桂

延洛等右爲末每服一錢熟酒或童便調下

○四物一黃散 治產後腹中血塊作

篇 飯炒熟地 白芍

蒲公英右爲末每服二錢溫酒

調下

○四神散 治產後留血不消作塊疼
瘡下荆不止 飯 姜炮 芍 赤芍

右等分爲末每服三錢溫酒調
下

○林治兒枕痛 伏龍肝爲末溫酒調
一錢服效

○產後消血塊 滑石沒仁血竭如無
牡丹代 右爲末醋丸如梧子大每

服三十丸醋湯吞下

一產後仔寒亡熱 阴癰

○林回產勞傷血氣陰陽互相乘爲亡寒
亡熱亦有惡露下少留滯經絡亦令

入寒熱必小腹急痛陰陽不和增損
入寒熱必小腹急痛陰陽不和增損

四物湯敗血停留奪命丹

○增損四物湯 治產後陰陽不和亡

寒生熱 飯 芍 參 姜炮甘草
白芍各等右煎服

○奪命丹

服衣不拘無奪命丹可之內用

五積散加醋煎服或黑神散

○大調經散 治產後血積惡露未消

榮衛不調陰陽相乘增寒發熱或目
汗腫滿皆血氣未平所致 大豆

去皮

兩半神一塊右爲末每服三錢濃
煎紫蘿黑豆湯空心調服喘急煩悶

小便不利亦效

○知母湯 治產後仔寒生熱通身溫

壯心胸煩悶

知四分赤芍

芩

桂六分甘草一右煎服或四物湯加
紫芩亦可

○小柴胡湯加生地黃治產後寒熱方
干忽然斷絕寒熱往來其經卷之附狂言此乃熱入血室

○傳增損四物湯治產後陰虛發熱或

日間明夜暮發寒熱 飴 芍 生 地 柴 分 等右水煎

○當歸散

治產後氣血俱虛恐寒客熱宜服此以去惡露 飴 白芍

芎 芎各一兩 未研右爲末每服二錢童便入溫酒調下

○甘草飲子

治產後癰寒熱相半或多熱者 半 赤芩 藥根 茜草

陳 芎 芎各一分 薯 良 青 各

分 葛 四分 右分一貼水二盞姜五

片棗一枚煎至八分當發自早連進

三服無不効者

○婦治產後癰疾熱多寒少 清脾湯
養胃湯佳也

○產後蓐勞

○婦產理不順疲極筋力憂勞心虛令虛羸容溼食不消邪感肺咳嗽口乾痰迷喘乏頭昏節痛腋中絞刺榮衛受邪頻發時盜汗寒熱如瘧背膊煩悶肢重着床名曰蓐勞

○傳產後發熱自汗肢躄疼痛日久不愈名蓐勞可用當歸羊肉湯 飴身參各七錢一兩生姜半兩右用羊肉一升煮取清汁五大盞去肉入藥慢火煮取四盞分五次服徐徐飲之

○人參當歸飲治產後去血過多

地 參 蔘身 桂 門 白芍各一錢熟

○婦
治
瘧
勞
熟地
參
白芩

木名續茂桂五味飯

門 莢分三右入生姜木煎

羸勞寒熱自汗羸瘦用之

地骨參各半
酒浸桂絡二壯

方治血

咳痰
飯莖
茅各一
柴

分名一右入桃柳枝三寸太棗烏梅各

梅，不以爲奇也。

下方 治產後虛乏不食四肢倦怠

心腹痛神虛治氣 參芍桂甘生
姜各一錢 一兩生地二錢

卷之三

三分散
治產後日久虛勞針灸具

不効
芎
旣
熟地
芍
未

英行三公柴參裕二李半
其後各七古外二點之二盡其三

棗一枚煎八分服

犀角飲子 治產後亡血津液虛損

自汗發熱困倦口乾 扁門木

炙取參芩芩芪各一分半右

分二貼水一盞半

人參鱉甲散 治暮勞由產內未滿

白日或動作勞傷成蓐勞其壯羸羸

不走作田飲食不濟果咁頭目日癟
瘦曷無常盜干寒熱更惡毛一帶向急

卷之三

參

卷三

卷之三

五

五味各續二下

膝半

各

右

甘

爲末。猪腎一對去脂膜水二大盞生
姜一片棗三枚去核者一盞去粗入
藥末二錢葱三寸烏梅半箇荆芥五
穗煎空心服。晚食前亦一服。

○八珍散

治月水不調臍腹疼痛全
不思食。藏府怯弱。泄濁小腹堅痛時

寒熱四君四物合爲一劑。各等右姜
棗煎服。

○一方產後補虛

參 大 芩 甘

炙格芩

菝葜身

芎格半

陳仁右分

二貼大一盞姜三片煎八分溫服

○一林產後漏利腹痛者。未滿月飲冷當風

邪毒留分肉之間。布腸胃之內。致腹
痛洞泄。又有食肉太早。強食過多。停

○調中湯

傳治產後漏利腹痛六味沉

後回飲冷當風腹痛腹

鳴泄利者用之

良

炒菝

酒浸

桂白芍附炮芎各二錢

各參各

○桂白芍附炮芎各二錢參各

右

○胃風湯

治產後當風致漏泄腹痛

諸參芩芍菝桂木

自芍各等右入粟米一小撮

附炮芎各二錢參各

○治中湯

加砂仁治因停食而腹痛泄

乾姜

酒炒滑

芩甘炙煎服立効

一方有

○林產後面目四肢浮腫此因敗血聚

停積於五臟。循經流入四肢。而浮腫

深筋膜如水令浮腫

水治

深筋膜如水令浮腫

水治

之大柱者，多但服調經散，而以腎消。

○調經散

浸 球各 在亦芍

飯酒浸各麝半細拌甘菊二石爲末，

每服半錢姜汁溫酒各少許調勻空心服。

○大調經散 治產後惡露不消，敗濁成腫滿，方在乍寒

○加味四物湯

治產後浮腫氣急腹大，喉鳴。

本方加壯術荆桑

赤豆 腹杏半 馬兜入葱姜

苛脚腫，又加芩皮生姜皮陳桑。

○枳木湯

治腹大如盤水飲所作

實一兩木

半

右每服四錢水煎溫服。

○正脾散

治產後通身浮腫，及治婦人太病後脾氣虛弱，腹脹。

義炮香

調經散治血分

○附米

童便

苟 苓 多陳

右等分爲

末，每服二錢灯草木通湯調下。

○丹溪活套

云產後通身浮腫，四物加

乳沒桂通腹良極血竭。

○桂枝

產後腹脹滿悶，嘔吐者因惡露下步

敗血散，脾胃受之爲脹滿，胃受之

爲嘔逆，宜用抵聖湯，亦有惡露過多

氣無所主，聚脾胃而脹滿嘔逆者，抵

聖湯去澤蘭芍倍陳姜。

○桔梗半夏湯

赤芍 半 澤蘭葉 陳

參絡一耳條半生姜切片倍

乾二石

右每

服七錢水二盞煎八分食，遠溫服。

○桔梗半夏湯

調和陰陽，治腹脹吐逆，桔半

陳絡五丁方加枳石

○千方

治產後嘔逆。

水五

半

分服。

○桂枝半夏湯

調和陰陽，治腹脹吐逆，桂半

陳絡五丁方加枳石

水五

半

分服。

姜五片煎入分服

○傳_○拒勝湯

治產後腰脹滿悶嘔吐

赤芍 半 澤蘭葉 參 穀各白
各分一右加姜一片

○八味理中丸 治新產血氣俱傷體
弱多汗一百日内常服壯氣補虛止
嘔吐 參 姜炮霜 白苓 麥芽
麴炒麴熟各半兩半木酒一末二
糊丸如梧子大每服三十九姜湯下

有寒加半夏

○乳汁不行

附吹婦乳藥

婦乳汁不行有一種氣血盛乳脈壅閉
而不行 通草 漏芦 土沉根佳

也血止氣弱乳汁絕止者

猪蹄

鯽魚 鐘乳佳也

年少初產乳雖脹汁不行有風熱脣
清利藥則乳行累經產而無乳亡津
液故也服滋溢之藥以動之
雖有乳不多者服通經之藥以動之
以姜臘引之

婦人素衝任之經有疾乳汁少而其
色黃生子怯弱多疾也

末產前乳汁自出多者生子多不育
乳子忽腫乳不時泄結癟亦有不痒
不痛腫硬如石日吹斂不急治則癰
腫急與枯樓散以手摩之則散

○枯樓散

乳香研一分枯樓根末兩右

酒調下

○兒不飲乳脹結相其汁不盡皆蓄留
輕爲吹斂始乳重爲難

○方

治女癥作癰

及子石

未酒服方守七

傳治乳汁不通

通草七

柴

天花粉絡一桔子青芷木通

赤芍堯甘絡半右爲一貼水煎

食後細人飲之更摩乳房或無子食乳者要消乳來芽丁兩炒

作四服白湯調下

漏芦湯

治婦人肥盛氣脈壅滯乳

汁不通或留結成膿漏芦半蛇退條一土瓜根十根切右爲末每

服一錢酒調下仍吃熟羹湯助之松

實十箇火燒存性桉土瓜當作王瓜其實如瓦萎而小如荔枝色黃藤蔓

葉圓無缺者是

鐘乳散

治婦人氣虛血少脈滯不

行乳汁絕少鐘乳粉細每服二錢

濃煎漏芦湯調下

母猪蹄湯

治乳汁不通林服藥仍

梳頭乳自下

母猪蹄一通草四用

水一斗煮取四五升飲之未下更俟

二料服之

生露散

治產後乳脈不行身熱頭

目昏痛大便澀滯參白芩苡

各一桔炒芎芷絡三飯粒分芍仁

粉石水煎

奇効方麥門去心酒磨犀角絞一

錢石門冬末一錢用犀角酒服

去粗分二服立下
葛子合生苡泔一升石同研藥令細

醉乳方澤米酒

粳米糯木絡半葛

分四生地三分茴

入花各

右分

二點水煎草藥服

○消毒犀角飲

治產後血

荆穗

四風仁甘絃二鼠粃子八右水煎食
後頻服以手擦之乃用芙蓉葉搗爛
井水調稀塗之加密少許調丸如梧子

○鍼法 乳癰腫痛諸藥不能止痛鍼
足三里入五分通立止

○婦乳癰足陽明經涉不竊血氣不散結
聚成癰四十歲以下治之愈五十歲
以上難差又妊娠乳癰無害

○連翹湯 治產後乳汁內結而腫硬

瘡癰

翹

丹

芒硝

十玄參

芍

白斂

巴射子略八大黃十三甘

六杏八十箇右剉水煎下并硝服

○一產後乍見鬼神

○林因產走耗其血敗血奔沖濤於心所

以乍見鬼神言語顛倒非風邪但服
調經散方在面白四肢浮腫之内加生龍腦一捻
煎服得勝即安

又有曰血虛心氣不足驚悸恐怖者
宜用蘇合香丸溫童便調服
或辰砂妙香散生地黃當歸煎湯調
服

又有熱入血室而顛狂者小柴胡加
生地

○傳琥珀散

治產後瘀血攻心迷悶妄

言日鬼

琥

鐵粉

各一參

神

生地 膜珠各半硃砂伍甘

麝

各

右爲末每服一錢用金銀煎湯調

正

眼見黑花或發狂

胞衣不下

○父感地黃煎丸

治

後失語

不語

生地新根生姜各二錢
以新瓦各各燒乾飯延炒碗各一蒲炒四右
爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸煎
當飯湯化下以生姜汁炒黃苗粗
以地黃汁炒生姜粗各至乾甚爲末
爲度

○**柏子仁散** 治產後證妄皆心血虧
欠心神不守所致 柏子 遠參

桑寄 風 瓢 飯 熟地 甘冬

右等分細切每服五錢先用白羊心

一枚煮汁二盞去羊心及粗溫服

○**茯苓散** 治產後心虛怔忡言語錯

亂 参 甘 山 飯絡一遠 茯

桂 門絡半右作一服加生姜二三片

大棗一枚水一盞半煎至二盞去粗

○**溫服**

○**婦人方** 治產後七日內宿血不敢時

人衝心迷悶荷葉三分地黃汁

合右細切水一升者沸下延胡空

心三服忌肉一日

○**產後中風** 治產後風邪乘虛而入或身熱發熱或

不仁或口目不正或忽悶亂及中風

僕宜小續命又有產後五七日得力

正床或月裏房室或懷憂喜怒動擾

沖和得病之初眼澁口噤肌肉瞶搐漸致腰背筋急僵直者不可治此乃

人作非的余風也

○**婦邪乘虛入諸陽經則腰背反折如角弓**

○**血虛因理不密故多汗風搏之則變**

產日嘔者強，僵頭，自天折灌小續人，
稍緩。若汙出，手找不及者，治。

○林產後中風，小續命最爲要藥，但手足
搐搦者，當去附子。

○與鄉古并散 治產後中風口嘔，手
足痺脹。

荆芥穗、焙，每服二錢。

豆淋酒調服。婦童便亦可。口嘔者，
灌之，繫其喉吹氣，或以乳丸也。

○一方 治產後中風，不省人事，吐涎。
橘核、飯、荆穗等右，每服五錢水。
酒各一盞，煎七分溫服。如未開緊急，
幹開灌之。

○大豆子湯 治產後中風，如角弓反

張，口噤，涎潮。

黑豆半升，研細，以馬糞火燄起，以黑

無灰好酒二升，入此酒下，入破器中，獨活

五根，

同前，煎六七分去滓，溫服。

○婦治產後中風四肢痺，偏背項強急。

○風雨芍桂、芍半、羚羊角屑、芍、卷
坂、酸棗仁、牛蒡子三分，右水煎，
溫服。

○篡產後中風口眼喚斜等証，不可作風
治，必大補氣血，然後治療。

○傳產後中風口眼喚斜，八物加附荆少
加風羌，煎服。

○林產後不語者，敗血停蓄，上于心，心氣
閉塞，則舌瘶，不語宜服。

○八珍散 參、首、生地、酒、蒸、芍
各一朱砂 風絡五細、芍、酸半、右

爲末，每服二錢，薄荷湯調服。地黃、戀
膈，脾胃不快者，以當歸代之，尤妙。

○孤鳳散 治產後閉目，不語明鑿爲
末，一錢白湯調服。

○林產後遍身疼痛者，是血走動，血氣升

降失常，留滯，閔節筋脈引急是以遍身疼痛甚則腰背強不能仰俯手足不能屈伸或無熱頭痛不可作他病治之但服趁痛散，循流血氣使筋脈舒暢痛自止。

○趁痛散 腎浸飯浸桂 木蕊

獨 生姜各半薤白一分半 甘草一
右水煎加桑寄生七錢

○如神湯 治產後餘血不盡流入腰

脚痺 痛 朴 半 芍 枝 木

桂 陳 白姜各六蒼芷結 甘草

香附少茴少參 天 蒿 飯 止

桃皮尖各分大右分二貼水二盞姜

三片煎八分食前溫服

○產後腳氣者產後熱脚氣上轉爲腳氣亦有產婦本日感風寒暑濕之氣

蒸襲足經乘虛而發其狀來一起脚弱熱悶心煩兩足痛嘔吐氣止皆止候也服小續命兩三劑必愈惡附子者宜服獨活寄生湯若嘔者去地黃倍加生姜。

○產後腰痛婦人腎繫胞產則旁腎損

肺諸虛未復感風寒腰故腰痛

獨 苓 芍 桂 繢 生姜 桑

寄各六錢 風各八右水煎

○當歸黃芪湯 治產後失血過多腰

痛身熱自汗 故身紅赤芍半錢

右加生姜三片

○產後血崩者曰產血氣暴虛未得平復曰勞役或曰驚怒或血量崩又有

氣裹血聚亦變崩中右小腹痛甚此

爲肝經已壞難治。但用固經丸止之。
若小腹脹滿此爲內寒瘀血未可止
之。且服芎薑湯。

○傳固經丸

○治產後血氣未復而有房事及勞役損傷致血暴崩或淋瀝不
止。沒赤石補骨木賊絡半附一雙炮去皮尖右爲末米糊丸如梧子大每服二十丸溫酒下或陳米飲下。林無沒藥有艾葉半兩。

○熟地黃散

○治証同前亦治一切崩中下血不止頭目沉重熟地半
半耳半分蒲夢黑蟹爪微炒白苓半桂半分膠角膠太妙得真鹿自芍半分伏龍肝丸分男子視當燒存性飯仁右作
一服入竹茹一錢水一盞煎至一盞溫服。

○傳二方

○治產後七八日惡露不止。飯炒芍續各八分芍各四生地炒乾十分右水煎空心須服。

○傳丹溪活人書曰產後月餘經血淋瀝不

止四物加芷升調血餘灰

○傳烏金散

○治產後血迷血運敗血不止。

止淋瀝不斷腹臍疼痛頭目昏眩多汙又治崩中下血不止。血竭百

草霜

○治男子亂髮灰

松墨

鰣漬鯉鱗燒飯

延桂

赤芍右等分爲

末。每服一錢空心溫酒調服。

○壯勝散

○治產後淋瀝不絕心悶短氣不舒面黃體瘦。勝粉芎熟

地白苓龍骨各二錢飯炒

艾葉酒參五味尤榆各一錢

朱右分一貼水二盞姜二斤枣一枚

前服

六十四

○産後淋附尿不通
尿數遺尿

傳產婦不善損破，尿脬而致淋瀝不禁。其脉虛甚，與峻補參木爲君，芎藭爲臣，桃陳莪苓爲佐，以猪羊脬煎湯，熬藥汁，極飢飲之，一月而安。

○林第根湯

治產後諸淋無間冷熱膏

石氣血，悉主之。白茅根五錢，穗有苓各二錢，葵子參各一分半，蒲黃

桃膠

渭絡半錢，甘草一錢，紫貝殼

一箇，石首魚腦沙

二箇，右分三貼水二盞，姜三片

火心二十莖煎八分溫服爲末，每

服一錢，木通煎湯亦可，如氣壅木

通橘皮煎湯

○木通散

治產後小便不通

通 麻仁 葵子 滑石 枳

○桑螵蛸散

治產後小便數及遺尿

○桑螵蛸散

其半右水煎

○灸法

治產後小便不通，腹脹悶亂

用鹽於產婦臍中填臍，臍平，却用葱白，剝去鹿皮，作一束，切作一指厚，安塗上，用艾炷於上，以火炙之，覺熱氣入腹內，即時便通，勿須述。

○桑螵蛸散

治產後小便數及遺尿

○桑螵蛸散

桑螵蛸筒，妙鹿茸，阿膠各一兩，蟄蟲參

赤石

朴硝半石爲末，每服一錢，空

心米湯調下，不禁者加龍骨，一方無

石崩厚朴右甘草生姜

酒服方寸匕

○婦方

治証同前，雞毛，毛燒末，溫

○婦方

治調子

○方

治產後尿數，遺尿，益智仁

○**橘杏丸** 治弱人氣秘太腑不通
橘子一升 杏各半升 右爲末，煉蜜丸如桐子大，每服五十丸，米飲送下。

橘杏丸

治弱人氣秘太腑不通

橘子一升 杏各半升 右爲末，煉蜜丸如

橘仁丸

治產後太使秘結

麻仁二两

橘仁丸

治產後太使秘結

麻仁二两

橘仁丸

治產後太使秘結

麻仁二两

橘仁丸

治產後血氣虛損，大

血去喘止

婦一方 治產後血入脈而黑喘欲死
參細末蘿木兩右蘿木一味前去滓

參細末蘿木兩右蘿木一味前去滓

奪命丹 治惡露不快敗血薰肺喘
急若感風寒者因憂怒者食鹹冷者

並不可服此況孤陽絕陰者半胎方見

不下之內

○產後咳嗽

治產後惡露上攻流入肺

○母散 治產後惡露上攻流入肺

經咳嗽

知貝參白芍桃

杏皮石等分水煎

旋覆散 治產後血風感寒暑濕喘

蒲咳痰坐卧不寧

旋赤芍

前半杏

荆穗五味苓

麻甘草等右入姜棗

○方 治產後肺虛感微邪咳嗽

甘桔各六錢

生麥門冬生地

各十分葱白惺右水煎

○方 治產後咳嗽痰稠粘氣急

前五味花貝各六錢

苓各八錢

分竹葉忙十右水煎

○方 治產後喫鹽太早而咳嗽者難治

○產後頭偏

○加減四物湯 治產後頭偏血虛氣

弱痰癆寒厥背冷頭偏

羌活

風香附炒熟地各一錢芷薑

各一錢甘草飯各半膏半右水煎

○如百汗者是氣弱頭痛者加芍桂桂

一錢生姜片

○如瘧癆頭痛者加半桂苓一錢生姜片

○如熱厥頭偏加正桂骨知各一錢

如寒厥頭痛加天雄附一半各炮姜

酒浸倍
乾下下

一產後虛汗

○林麻黃根湯角 茯苓 麻黃根 蜈蚣

粉參 甘灸小麥等石前服

○當歸黃芪湯角 治產後自汗壯熱氣短腰脚痛 芪 菖活四錢桂石分

○二貼入生姜二片角

○傳蓄黃湯角

○當取黃芪湯角 治產後虛汗不止 芪仁

○木通風熟地 蜈蚣白芩 門

○甘草桂石入大棗一枚角

○林熟地黃湯角

○治產後虛渴口乾少氣

○脚弱眼昏飲食無味 熟地

酒浸倍
乾下下

○半參四錢門冬甘灸一錢六分

○貼水一盞糯米一撮姜五片棗一枚

○煎八分服

○見現丸

○治產後食麵太早麵毒甚，肺口乾煩悶或飲食過飽所致。

○良妙姜黃 草澄茄 陳參 茵

○炮棗炮各右爲末用蘿蔔煮爛研化

○煮麵糊丸蘿蔔湯下

○人參白朮散

○治產後勞傷虛羸怒

○氣上逆口乾煩悶

○參 朮 苓 酒

○婦門冬飲

○治產後血虛煩渴不正

○芦根切一枯 参 朮 苓 酒

○棗二十個門冬四兩石水煎服四劑而

○瘥忌菘菜

○產後陰脫

○婦治產時力大過陰脫如脫肛狀逼

○治腫痛，以鐵精粉上推之。
○又灸臍下橫爻二七壯。

又用枳殼煎湯浸良久即入。

○又用五倍白礬煎湯浸良久即入。

○又革麻子十四枚去殼研塗頑心如人即去。

傳當歸黃芪飲

治產後陰脫。

謂陰戶中官脫

虾蟆白芍各半升

水前參各二升

半升右

當歸散

治婦人陰脫。飯

芩

白芍各半兩

蟬皮半兩燒研

右爲

朱溫酒或米湯調下忌登高舉重。

○丹溪活龜曰：產後子腸不收，八物加升風，以酒炒黃爲君。

桃仁膏

治產後陰脫，煩悶。

桃

五味

枯凡爲末，研桃仁膏拌付。

硫黃湯

治產後玉門不斂。硫黃

附吳茱萸絲各半

蛇床一右水煎

頻洗之。白欽

林治產後陰脫。硫

烏賊骨各五

味半右爲末，參付

方加蛇床子炒布包乘，熟熨之亦

治產後陰痛。

枯凡爲末，以紙片塞乘，杞

子入。

○治子官不收，痛不可忍，以淡竹葉根

煎湯洗，仍用五倍白礬爲末，干參立

効。

○王門瘡腫此乃雖非產後之証，次產後陰脫之証

林治婦人陰瘡，先以荆芥蛇床子煎湯

薰洗，軟帛包，乾次以枯凡東丹扁膏

藥本各一，硫醉荆芥蛇床各五

白蛇

乾松
著

○一方治陰中生瘡如虫咬痛生
癰，綿裹內陰中日三四易之。

○**[黃芩散]** 治陰戶生瘡。芩
蕎白藜連右等分煮湯薰洗。
○治陰門腫芽菊苗研爛百沸湯泡先
薰後洗。

○治陰腫不消。麻黃荆荊茄種皮
蛇床真杉木蝟皮右爲末敷
或煎湯薰洗。

○**[方]** 小麥朴梢白凡五倍
葱白右煎湯淋洗。亦效。

○治陰瘡不可忍。麝少杏燒存
看爲末如瘡口深用輕絹包藥線繩

○**[大黃散]** 治陰瘡。大黃微芩
赤芍玄參丹參山茱微芩
蛇床各半右爲末每服一錢食前溫
酒調服。

○治婦人陰中生瘡凡久塞中直肉
草烏七箇燒右用小瓦罐盛米醋淬
乘熱薰候通毛洗之。

○治婦人交接輒痛出血。桂心伏
龍肝各等分末每服三錢空心溫酒
調服。

○**[方]** 連竹膝甘各四右爲
二貼水四升煎一升洗之。度
○治婦人交接陽道違經及他。

○血出淋瀝髮灰免苦
○一方 刺雞冠血塗之
堅痛 桂實碎搘合熟故服
冷即易之

○斷產

○林四物湯加芸草子撮經行後空心前
眼點產

○升麻葛根湯正加瞿穂 膜枯 豉
炮各七分半右分水貼水二盞煎八分空
心午前一服一粗并煎晚食前服通作四日服當亦每日經行後便服亦

加芸草子一撮炒

○一方 白麵麴升無灰酒瓶打作糊
煮至二升半絳帛濾去粗分作二服
候月經來日晚喫一服次早五更一

服天明一服經便行終身無勞

○下胎不動聲色二四日後如月水通
爲驗 五積散一貼蘿木二分桂
紫金牛 稅 我 乾漆炒黑色
各三分 正半分牡仁紅不取半分右酒水各
一盞煎一盞服

○返冤丹

一名益母丸

名濟陰丹

不塞

頭

目

耳

鼻

口

舌

齒

牙

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

齒

益母草一味此草生二種於端半小

暑或六月六日

花正開時

連根收採

透風處陰乾用時以石臼搗羅冬至

細

末

煉蜜

丸

如彈子大

每服一丸

專

治橫生倒產難產產後諸証及孕婦

胎氣不安或跌墮觸動下血胎漏溢

証若量加木香全當服赤芍藥末

不限丸數以病愈爲度日服二丸

丸桐子大服五七十丸

熬膏法

益母草依

方

法

莖洗淨石臼搗爛以麻布袋收濃汁
入砂鍋內文火熬成膏沙糖色
爲度入磁罐內收貯每服用一二匙

極妙方

○子死腹中腰悶冷痛小便淋血沫出
腹脹四肢如冰冷指甲青者是也或
臨產時服此藥一丸血氣調順諸病
不生破血止痛補虛養肝童便酒各
七分化下或只生取一粒連根搗爛
敍汁入蜜少許服立下

○產難者或產後惡物不盡臍腹刺痛
惡露上衝心胸煩悶童便好酒化下
○胎衣不下者發寒熱時有冷汗但出
敗血其衣即出始帶斷了眼此藥自
下或橫生不順心悶欲死者童便好
酒化下薄荷炒鹽湯亦可

○產後二日起卧不得眼前黑花俗呼
爲暗風或血熱口乾渴心悶亂如見
鬼神狂言童便好酒各七分化下
○產後四肢浮腫多寒熱者或氣喘或
小便澁滯喘嗽胸膈不利兩脇疼痛
溫酒化下

○產後寒熱往來如癟或臍痛溫米湯
化下桂枝湯亦可

○產後中風牙關緊急半身不遂童便
好酒各七分化下

○產後太便閉絰口苦煩渴童便好酒
化下薄荷湯亦可

○產後痢疾枣湯下

○產後身癟腹脹痛溫米湯上
化下當取桂枝湯亦可

○產後崩中漏下不止者童便好酒
化下當取桂枝湯亦可

下

○產後吐逆不止溫酒化下

○產後赤白帶下秦艽糯米湯化下可
每服用末二錢食前溫酒調下

○胎崩臍腹痛或作聲溫米湯下

○產後漏血枣湯下

○婦人久無子息溫酒下至十九二十

九大有效四物下亦可

○急用時連根莖生搗入水飲可治
喉閉即愈冬用根

○產後一切血病并傷損用膏一匙酒
化服內損亦可

○產後不治之三證

○產後氣急喉中作痛見聲者敗血入

心肺萬無一生不治也

○產後中風者蓋因七日未滿勞動百
日之中傷房事中風其狀眼澁腰痺
筋急角弓反張牙閔緊急如此者非

外邪自傷死者一不治

○產後面色黑青遍身黑斑者百無一
生不治也

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○產後腹痛以冰麻天南星果散煎

○拔穢之法

○生下急用軟帛械淨或綿裹手搘蘸連耳汁械口惡汁稍定更以鹽少許調朱砂一字株火口中鎮心安神解毒一出生免瘡痘之患

○惠灸甘草細切水煎去滓綿裹稍蘸灌兒口中令嚥吐痰涎及瘀血方與乳汁智取無病

○臍帶斷法

附回氣法
附臍腫

○婦斷臍帶可只留二寸許帶中有小虫急去之留之異病或綿札定然後洗之不然濕氣入腹生臍風兒生三日烙臍帶三壯別處勿加火艾恐成驚癇

○初生氣欲絕不能啼者蓋曰難產氣

○臍或冒寒所致急以綿絮包裹未可斷臍帶且將胞衣置炭火上燒之仍用大紙燃蘸油點火燒臍帶得火氣由臍入腹復臾氣回方可斷臍帶○斷臍之後爲水濕所傷或胞衣濕氣傷臍中臍腫多喫不乳黃柏金王墨亂髮灰等分爲末傳之○臍中汁出并痛枯芩傳之或柏末之

○臍風撮口三

○臍風創傷風或尿在胞中遂成臍風發熱面赤啼聲赤足金頭蝶

○傳右未鴉管吹入鼻中如噴嚏叫可治後用薄荷汁潤喉

○日黃亦氣急喘急呼聲不出蓋由

六十一

胎熱流心脾故令舌痴唇青撮口飲
乳石茹 真姜蚕絲散 蛋調塗

口

又牛黃研竹瀝調二字抹口中

○ 蝶梢散

治臍風及百日內撮口臍

風 蝶梢

四十九箇每一箇用蘆薈
共轉火令薄一姜桑汁四十九箇生姜
草頭馬齒莧

姜桑汁四十九箇生姜
草頭馬齒莧

右二一味爲末更以腦麝各少許研匀

雄雞肝二片煎湯調服二字抹口中

○ 炙法臍風撮口諸治不効炙然谷三

壯

尤在內踝前起大骨下陷生

○ 二便不通 四

○ 惠初生二便不通腹脹欲絕急令婦人

熟湯漱口吸嘔

小兒前後心并臍下

手足心共七處每處三五次漱口吸

嘔紅赤爲度須臾自通

○ 二便不通 四

○ 林生下不大使先用葱尖在入肛門次
用牛黃散送下硃砂丸

牛黃散見附
硃砂丸見附
裏生赤之內

○ 一破泡五

○ 一膏貼顫六

○ 惠生下即死急看口中上腭有泡以手

指摘破用綿擦淨便治若入喉不可

治

○ 林每日頻於無風處看小兒上腭頸內

有白泡起以指甲刮破拭淨之

○ 一貼顫六

○ 初生鼻塞乳食不下用牙皂草鼻取

膏貼顫上病去

○ 葱涎杵成膏貼顫會穴甚效

○ 不飲乳土

○ 林治初生不飲乳及未便用葱白日二十寸

○四破之以乳汁銀石器煎灌之立效
○治初生口噤不開不飲乳少脚蜈蚣一條去足灸令焦細研如粉每用半錢以猪乳汁二合和勻灌之

○扶芩丸

治極口不淨穢惡入腹人

蒲短氣不能飲乳赤芩桂連枳

樹各等分右爲末煉蜜丸乳汁調灌下

○白姜散

治產婦胎中受寒兒腹痛

不飲乳木陳枳殼一桂白

姜甘桔各右剉水煎繩蘸鼻之

加木瓜丁香

人不可口

○洗浴八

○婦兒生浴

寅卯酉日吉壬申丁

巳癸巳日凶用益母草金銀草煎

汁浴則不生諸瘡

○小兒新生浴

之用五根湯終年不生

○瘡疥柳桃棟榆槐謂之五根

○廝帶未脫不可頻浴頻浴則水入廝

中致廝風撮口

○謹養之法九

○天氣和暖抱之使見風日則血成氣

剛可也風寒

○當令着地氣便筋骨壯若厚衣過寢

傷皮膚損血脉發瘡瘍汙出腠理開

○風卦易入腸胃尚脆而寒凡魚肉果

蔬燒炙稠粘等物皆宜禁絕苟務茹

急隨所欲積成痼疾

○勿冷食枕乳母臂作口袋枕之

○天寒用父母常服舊衣忌新綿太縷

則筋骨軟弱

○乳母與兒同睡口鼻氣吹口顧門兒

咬鼻塞

○ 涼衣火燒兒心丹毒等疾

○ 兒衣服晒甚日正被惡鳥落遂成無藥之疾

○ 瓢惡相異物嬉戲忽見遂成驚忤

○ 胎驚十

○ 胎中受驚故滿月而發驚目上視脹硬手足抽掣角弓反張痰涎壅盛

○ 胎驚宜辰砂研牛黃訕乳汁調

○ 盛名胎驚一丸太妣母服防風通聖散

○ 蜈筍入口史太妣母服治胎驚及急慢驚風

○ 蜈筍白附南星炮僵炒炭麝

○ 風絡天麻風絡二金指肚蟬蛻不右爲細末粳米飯丸每兩作四十九丸初生兒半丸乳汁化下周歲兒十九

○ 金銀薄苛湯化下十歲左右有候者二丸薄苛湯化下

○ 藥方正赤

○ 胎驚之證兒生下遍身黃色如金身熱一便不通乳食不進啼不止母曰受濕熱或衣被太暖所感漸入哉

○ 綿厚衣被服生地黃

○ 一月裏生赤十一

○ 林初生兒月裏生赤肌膚如丹塗者先用牛黃散一丸裏次用藍葉散塗外乳

○ 母眼清涼飲子三服

○ 牛黃散

○ 銀花粉

○ 葛根一錢

○ 等分

○ 升柴寒水石膏

○ 赤芍一錢

○ 等分

○ 石水煎

○ 清涼飲子

○ 甘草

○ 大赤芍

○ 茯苓

○ 分量

○ 胎驚生赤十二

○ 林胎驚之證兒生下遍身黃色如金身熱一便不通乳食不進啼不止母曰受濕熱或衣被太暖所感漸入哉

○ 綿厚衣被服生地黃

九十九

○生地黃湯

生地

赤芍

芍

飯 桔絡等水煎子母俱服之

視手紋除頭面腹上

傳一歲至六歲曰嬰孩以男左手女右手次指三閏脈爲驗病輕重死生之訣名曰虎口



第一節名風閏無脈則無病有脈則病輕第二節名氣閏脈見則病重第三節名命閏脈見則病劇九死一生惡候也二閏通度脉候是極重之證必死

○林三閏通度斜入指甲者不治

○兀頭面或肚腹有大脣係青筋見者并是食毒物及驚積難治

○惠胸背百會穴下有一條青脈下對其尖久而愈青不治

○診脈十四

○兀診小兒太指按三部丁息六七至平和八九至發熱五至內寒弦脈風

痳沉緩傷食

○七八歲曰亂九十歲曰瞽始可以一下指探掌後三部之脈以丁息七八至爲無病

○十一歲至十四歲曰聾以丁息五六至爲常脈

○觀形十五

○林兩眼無精光黑睛不運頭無鋒鉗如魚眼猫眼者不治

十六

卷之四

六
六
十

○傳
龜門黑燥渴難禁面赤唇干口渴裏有
肚大青筋俱惡候更變腹痛直易絳
顛門腫起定爲風此候應知最是凶
忽陷成坑如盃足寒過七日命須終

一審外證十六

卷之十七

○惠變薰有十變五薰者乃生精神意智俗謂之牙生骨長出漢日是胎毒散

魚生之日始無三十二日一變其治
不汗而熱者發其淫大吸者微下止不
可別治

林變蒸之時切不得艾灸即宜形與郭食亦不可妄投藥餌

【醫學散】 治兒癰瘍發熱或咳嗽痰
延鼻塞聲重

桔細芎各等分右煎去芎如桔梗名惺人散

不苦皮尖元不爾巴十

利生湯
瀉薦餌用如黍米大二錢以
下兒一三丸八歲以上六
米飲或乳汁送下

○人參散 治變蒸骨熱心煩啼叫
參 甘草門 比紫胡符 膽 風

右煎服

○調氣散

治變蒸吐漏不乳多喘

木 香附 朴 參 陳 薤 牛
喉各 右水煎

○神仙黑子散

治變蒸與傷寒相侵
者當詳其証若上唇中心有白點子
者爲變蒸宜服此 麻節大 杏皮連
右燒存性爲末每服一字水煎服抱
見於溫煖處有微汗身涼效奇

○吐漏十八

○傳 小兒初生吐蓋械口中穢惡不盡嚥
入喉中故吐可用木瓜丸一丸快
木 糜 腸粉即輕粉也右各一字研勻
糊丸如黍米大每服三五丸甘草

湯送下

○初生三日內吐漏壯熱不乳大便孔
食不消或白色傷食當下之而後和
胃下有餅子和胃益黃散

○石餅子

○治小兒腹中有癖但飲乳
嗽而生痰 清 輕 半 南各
糸巴二十四粒去皮膜用冰一丸者
水盡爲度一作水三升右研勻
右研勻巴豆後入粟藥糯米飯丸如
菉豆大三歲已上三五餅已下一二
餅薄可湯送下

○益黃散

○治小兒脾胃虛寒 陳一
青 詞子皮 甘粃各一香仁右水
煎加參木各一

○吐漏泄黃傷熱乳也漏青傷筋也
皆當下白餅子主之傷寒者王露
散傷冷乳者益黃散加桂心一兩並於下

後服之亦有不復下者此藥俞者

○玉露散

露飲名曰

膏寒各半

生甘半右爲末每服一字或

溫水調下

○溫中丸 参甘炙木酪一右爲末
姜汁麴丸如棗丘大每服一二十
丸粳米飲下

○吐瀉調脾平胃散入熟蜜和蘿合香
丸米飲調服

○林兒生月裏生嘔先用硃砂丸下之後
用朱沉煎惡物下而止

○硃砂丸 辰南巴霜各半右爲
末麴糊丸如黍米大每服二丸薄苛
湯下

○朱沉煎 硫砂二个薑三滑五朱沉
仁丁香十四右爲末每服半錢用新

汲水一盞香油滴成花批篋在上須
臾墜下澄去水別用冰空心送下
○紫金核 治男女一切嘔吐小兒尤
効 半湯泡七參木

丁香 薤各二右爲末麴糊丸如李
核大姜汁糊不効

沉香 硫砂絡一細研爲衣陰冤每
丁丸用棗一枚去核內藥在內溫經
累燠熟嚼服米飲壓之

○掌中散 治吐乳 白豆蔻 砒
仁略甘半兩半右爲末安掌中
乾吃兒參口中

○白末散 治小兒脾胃久虛嘔吐瀉
不止津液枯竭煩渴飲水乳食不進

羸瘦困劣 參木大苓

藿甘淡略葛二

右水煎

苓

三十六

一 腹脹傳

○由脾胃虛氣攻作也亦有必謂

亂喘蒲可下之用紫霜丸白飯之不

喘滿者服也不可下

○**膈氣丸**

治小兒虛脹如腹大者加
蘿蔔之名褐色丸子右爲末 胡椒一兩 蝎尾

去毒半兩

右爲末麴糊丸如粟米大每

服五七丸至一二十九陳米飲下一

左右木香一錢

○治小兒虛脹先服普膈氣丸不愈腹中
有食積結糞小便黃微喘肺伏而實
時欲飲水能食者可下之宜消積丸
紫霜丸蓋脾初虛而後結有積所治
宜先補脾而後下之後又補脾則愈
也

○**一方**

治腹脹 蘿蔔子

紫蘆梗

○**消積丸**

丁香丸

砂仁針二巴箇

及波心膜去油右爲末 麴糊丸如粟米
大二歲已上三五丸已下一二九溫

水下之

○**腹痛傳二十**

多是飲食所傷

末半冬陳豆青

分洛山楂桂皮縮麥芽一格 吳茱萸熟加芩右

爲末米飲或白湯下之

○腹痛口中氣溫面黃目無精彩或白
睛多及多眠畏食或大便酸臭者當
磨積宣消積丸甚者用白餅子下之
後和胃用白衣散下

○心腹痛面㿠白口中汗出及清水出

發癟有時當作蛇虺火丘積偏食
痛寒癟正痛大同小異惟重者當
口淡而沫自出小兒本怯冒冷故正
動而心頭痛與癰相似但目不斜手
不稽其安虫散主之

花安虫散宝鑑用米糊丸黃粉嫩黃色明
名安虫丸粉也 桂 川練子去核 風各二兩 柏凡

半右爲末每服一字大者半錢或
一錢溫米飲臨癟時服

○集効丸

治正痛 木 風 桂

訶娘去燕炒附皮磨去 姜各七分半 大

半烏梅去核半 右爲末煉蜜丸陳皮
湯下或醋湯下一方有茶連

治蛇虺作痛火 陳湯加苦練根煎服
或只以苦練根向東南生不出土者
去龜皮取白皮細功濃煎汁一盞徐

徐飲之不可多飲先以糖蜜或炒肉
食之引頭向上然後服之小兒大
小斟酌與之

○下方

治小兒腹痛 甘 姜各二

伏龍肝一參 苓 百草霜 末各

名右爲末粥丸梧子大每服三五十
丸陳皮湯下

○一痞癖二十六

○小兒寒溫不調乳哺失節或啖糯米
食生冷爪膜脾胃微弱不能消化致
五藏不利二焦壅滯腹內堅硬或委
寒熱如瘧漸致羸羸

○紅丸子

治血膜包水腸傍時痛發

寒熱日久結癖亦効

稜炮義娘芳

花酢 桃 杏各去皮破烏梅巴十二

粒取

硃砂

琥珀石爲末

蜜糊丸如棋

明五十四

豆大碌砂爲衣米湯王三五丸

○**天黃膏** 治瘡癰小兒大人俱用之
大黃 朴硝 等分爲末蒜泥成膏

用絹帛攤成膏藥貼之自軟消

○**木別膏** 治瘡癰 木別多用去壳獨蒜

半雄半楨爲膏入醋少許蠟紙貼之
處取積後調理宜異香散

○**異香散** 治腎氣不和腹脇脹痛

悶噎塞喘蒲飲食難化噫氣刺痛能
破癰瘍和胃進食 蓬皮荳蔻

益生甘草各青 陳法六味各朴姜製

右爲末每服一錢水丁盞姜片棗一枚

鹽擦一煎分通口服

○**灸法** 乳下丁子灸七壯

○**小兒癆氣久不瘥** 炙中脘一穴竇門

二穴各七壯又臍後脊中灸七壯

○**小兒腸瀉濁利** 積聚腹痛不嗜食灸七壯

脾俞一穴灸七壯

○**夜啼傳二十二**

夜啼者心經有熱在虛 參連姜

微絡一井五竹葉丘十右角一貼加
姜炭

○**花火膏** 灯花三乳汁調抹兒口或

抹母乳方見前兒吃之

○**治驚啼邪熱粟心也** 安神丸主之
安神丸主之

○**錢氏安神丸** 治邪熱驚啼門 白

芩 馬牙硝 山藥 寒水 甘草各半
硃砂一兩附子右爲末煉蜜丸如葵實

大每服半丸白水下

○**林導赤散**

治心躁號啼 小便亦口中

熱腰熱或有汙仰身而啼至曉方息

生乾地黃 通 甘洛 等右每服二

三錢入升葉煎右証加參用之半効

日通心飲 加門 車 心薄舌

通心飲 通 堯 瞽 指 甘

芩洛等右水煎

○**下方**

治夜啼 蟬蛻

十四全者去

大脚爲末入硃砂一字蜜丸吃之

○**龍齒散**

治夜啼不寐

龍齒 蟬

蛻足翅 鈎藤 苓 参 右等分

爲末每服一錢水煎

○**八神散**

治腰痛夜啼面青口中冷

氣四肢冷或泄鴻青白及不吮乳

参 山梔木洛五 甘祿二 白苓 無

燒略右入姜棗

○**五味子散**

治夜啼及腹痛似有鬼

崇 五味 飴 赤芍 木 神 五

陳桂

甘祿各二右水煎

○**乳頭散**

治夜啼不止腹痛

茲

甘 烟飯 赤芍

木祿等爲末塗乳

與吃

○**驕丸**

治令證腹痛夜啼面青手心

大蒜

一枚慢火烟熟研

擗

乳香半

右研

不

右研

大芥子

大每服七粒乳空

時服

○治夜啼 乾牛糞如手大安肚席下

勿令出知子母俱吉

○**黃土散**

治客忤夜啼 竈中黃土

蚯蚓屎等右爲末水和塗夏五心良

○凡小兒口到乳上便啼身額心微熱急看口內或瘡或重舌於舌頭治之

○客忤

口惡

二十三

○小兒神微弱，外邪客氣卒暴，觸忤口，吐青黃白沫，面色變易，喘，腹痛反側，瘞瘿狀如驚癇，但眼不^{七竅}，視其口，中上脣左右，如^有小泡以竹針刺之，或以指甲摘破宜服蘿合香丸，姜湯化開頻與之，仍以皂角燒薰鼻，次用淡豆三合水濕搗丸如雞子大，摩兜，顧上及足心各五六遍，次摩^腰心良。

○庫角散 治客忤驚癇壯熱，天麻犀門釣藤硃砂絡一鐵粉，雄絡半麝渺石爲末，每服半錢金銀煎湯調服。

○安神丸

治証同前，在

○黃土散

亦可方在前

○惠小兒中惡卒死

以葱白內下部及龕中，去

○口瘡附搗口二平血

○如聖散

治小兒口瘡不能吃乳者

○巴豆

三粒研爛入硃砂絡或黃丹赤土少許

○上如四面起粟米泡，使用

溫水洗去

○恐成瘡

用菖蒲湯洗使安其效神

○傳治口瘡，黃連爲末，蜜水調服

又方 黃柏 細辛 等分爲末，付

○小兒白唇滿舌及兩脢名鵝口，用髮

纏指頭蘸井花水拭口令淨，又用濃

煮粟汁以繩纏頭減之，更以濃過

黃丹擦之即愈。

○麻油鵝口，桑白皮汁和胡粉傳之

○治小兒口瘡，端半蝦蟆肉杵末傳，

上即瘥。

○重舌

附重脢重蠶

二十五

林重舌乃心脾熱也心脾熱於舌脾之脉絡出於舌下心脾熱則血氣俱盛而之根而重生一物形如舌而短小有著頰及上脣者曰重瞼著牙齦者日重瞼皆當刺去其血也真蒲黃敷之或燒灰或牙硝或硝石或竹瀝浸黃柏點敷之皆効。

○治小兒重舌黃丹如豆大內醫中安舌下。

又方益土苦酒和塗舌下。

又蜂房燒灰研酒和傅舌下三四用

之

又蛇蛻炙焦末一豆許傅舌下日

治小兒舌上瘡飲乳不得以白繒和

雞子置醋中塗舌足底二七即愈

傳重舌末舌用二稜針於舌下紫蘇剝之

乞出惡血即愈

又用竹瀝調蒲黃末杜舌已神効

○治小兒木舌塞口欲満者累雪二錢

竹瀝半合研勻頻付即愈

○紫雪

治內外煩熱不解口中生瘡

煎狂驚癇等証

黃金百寒水石

磁石石膏滑石各二巴上用冰

一石煮至四斗去粗火下項藥甘八

兩青木犀屑姜屑沉香五

丁香一升玄參各一巴上再煮至

一斗五升入下項藥硝石二斤亦可

硝石所擇已上入前藥汁中微火煎

柳枝不住手攬候有七升投放水盆

中半日入下項藥攪令白砂糖當

門子即靈香一升半右煎成霜雪服

服一錢或一錢涼水調下並食後服

一弄舌十六

○脾藏微熱令舌絡微緊時人多舌之治之勿用冷藥及土人當少與馮黃散漸服之或飲水醫曹疑爲熱非也飲水者脾虛津液少也又如面黃肌瘦心煩熱弄舌爲病黃宜胡黃連丸太病後弄舌者凶

○傳漏苗散 蕺社施膏桂甘牛風四石細功作一服用蜜酒燒香點以水一盞煎至半盞去粗與之

○一吃泥二十七

○傳吃泥灸氣熱也用軟石膏芩陳艾未分令熱而治

○一滯頤十八

○林帶頤乃口涎常流而瀉於頤領也宜前服

○溫脾丸 治脾胃虛冷而流涎不能取約

○半丁香 木絡五姜蚕木青 陳絡半右爲末糊丸麻子大每

○通心飲在夜通心氣分水穀退熱

○利尿口瘡加地黃

○林菖蒲丸 治小兒在胎其母卒有驚

怖衆乘心舌本不通長四五歲猶不能言參菖門遠火燒姜

○飯絡三乳 疣絡一右爲末煉蜜丸如麻子大每服十九米飲

○一行遲三十

○行遲乃稟受氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或肝腎俱虛蓋肝主筋弱不能束腎主骨人弱不能動故也

○**地黃丸** 肉桂四兩 山茱萸四兩 各一
澤瀉半兩 白苓各一
如豆大空心塗湯下二三十丸

○**虎骨丸** 虎腰骨酒炙各一
肉桂半兩 生地白芍各一
東坡浸生地白芍各一
分右爲末煉蜜丸如麻子大每服十五

丸酒或水煎湯下
左酒或水煎湯下

○**羚羊角丸** 治小兒五六歲骨氣虛弱脚弱不能行 白苓酸羚虎胫

骨髓灸生地各五錢 桂風散
名二右爲末煉蜜丸如小豆大食

前溫酒化下三五丸服之十月漸
即可行也

○**五加皮散** 治二歲不能行 五加
一膝凡絡五在爲末每服一錢半

粥飲調次入好酒而滴調日一服
鶴節三十八

○**鶴節**乃瘦弱不足血氣不充故肌肉
瘦薄骨節呈露乃得之腎虛精髓內
枯膚革不榮易爲邪氣所襲日乾枯
悴其形如鶴腳之節宜地黃丸

○**一腳拳**三十二
林脚拳不足乃瘦弱不足血氣未
榮脚指拳縮無力不能伸屈宜

○**海桐皮散** 海桐 牡丹皮熟地
一山茱萸 神絳五石粗末每服

一錢葱白一根水丁盞煎半盞服
繩縮兩手伸展無力宜

○**一手拳**三十三
林脚拳不展蓋瘦弱肝氣怯弱致兩脉

繩縮兩手伸展無力宜
薏苡丸 依倍丸 惠酸風

卷六一右爲末煉蜜丸雞頭大每服

一粒麝香荆芥湯化下

一顱暗三十四

○林顱暗乃曰藏府右熱渴引水滌致泄
痢久則血氣虛弱不能上充腦髓故
如坑用黃狗頭骨炙黃爲末雞
子清調敷之

一顱填三十五

○林顱填乃顱門腫起地蓋脾主肌肉乳
食不常飢飽無度或寒或熱致使藏
府不調其氣上衝爲頃脹顱矣而高
毛髮短黃如寒氣上逆則堅硬熱氣
上冲則柔軟寒者溫之熱者涼之肝
盛風熱交侵亦然

袖防風

柏子

白及

各末乳汁調

塗顱上十日愈

○顱門腫起定作風此候應知最是凶
急陷成挑如盍足未過七日命須終

一解顱三十六

○解顱頭繒不

因田氣虛與熱多也錢

氏曰生下而顱不合腎氣未成也雖
長必生瘻更冇目白睛多面能白多
愁生喜也丹溪用八物有熟加酒炒
蓮煎服更以帛緊束及以石斂末住

乏

○地黃丸在行遲內治年長頭縫開解不
合服此丸仍用炮南星末米醋調搘
紺角上烘熟貼之

二辛散

治頭骨不答

細

桂絡

不吞牛石右爲末乳汁調敷乾毋敷
之而赤即効

龜胸傳三十七

○林龜胸丸 治肺熱脹滿，攻齒，膈冒高，如龜蓋，乳母多食酒麴，熱物五辛，燉燒，而得之。

○值鶯白散

治龜胸

桑蜜水拌地黃色，不入地

○骨行甘綠半加芩，行水煎。

○林合丹

治龜胸

大補七天門丸去火加百合

○粉軟石膏各五分，右爲末，煉蜜丸，菉豆大，每服五丸，食後臨卧熟水下。

○龜背 三十八

○傳龜背小兒生下，客風入背，逐骨髓即成龜背，以龜尿點背脊骨節，即平。○取龜尿法用蓮葉置龜於上，尿自出，或令向龜，於明鏡則必反出。

○灸肺俞三五壯

○項軟筋散三十九

○林五加皮散 治項缺，頭不得正，五加皮末酒調塗項骨上。

○健骨散 治父患癰瘍，眩虛，不食，及諸病後，天柱骨剗，白姜益末二兩，兌半錢薄荷酒調下，服後用生筋散貼。

○生筋散

木鱉六寸草麻六寸，粧右

爲末，手摩頸項上，令熱，漬唾調貼之。

○涼肝丸卽鴻青丸，見急驚內方 治風熱項軟

○貼項方 治肝膽風熱，致冷筋軟，附星等爲末，姜汁調貼項軟處。

○次服防風丸，涼肝丸。

○防風丸

又名天麻丸

天麻

防風

參各一株

雄

麝各半

牛黃一

甘綠二

右煉蜜丸，薄荷湯下。

○小草丸

治胎中受熱，遍身筋軟。

天麻

防風

參各一株

雄

麝各半

牛黃一

甘綠二

右煉蜜丸，薄荷湯下。

麝茸 徒容 膜 凡 莛絲 熟
地 飯 天麻 仲 青塙 等爲

未煉蜜丸如皂角子大每服一丸盐
湯溫酒化下

羚羊角散

治面紅唇白腸熱項軟

白芩 恃地 酸虎脰骨酒等爲

風桂 甘蘇右爲末每服半錢或一錢溫酒或鹽湯調服

丁奚呻露四十

○林小兒手足極細頸小骨高尻削駄瘻
臍突晚哭晝附或生穀藏是名丁奚
虛熱往來頭骨分開反食吐蟲煩渴
嘔噦是名呻露者皆無事種類之

疾最爲難治宜十全丹救之

十全丹

青陳桂芍白豆蔻

芍五味 桂葛根五木 使君

○脫囊四十

○傅燒囊陰囊脣大墜下而不收也亦有

浸蒸糕丸麻子大每服二十九米飲

正有熟薄苛湯下

○傅脫囊者野紫蘿葉細者搗爲末香油

調竹漆則捲之皮脫兩丸露者以膏

荷葉包之付藥後自生皮

一 脱囊四十二

○傅脫肚用東壁土泡湯先薰後洗

又五倍子爲末付而頻拍入之

○又鱉頭燒存性香油調付_{云燒烟}薰之良多

又浮萍末乾貼患處

收

四七

又草麻子四十九粒研爛水調作餅
子貼項上即收入洗去

○小兒鴻刺後肛門不收

赤石 伏龍所分爲末每用半錢傅

腸頭上

一、泄病四十三

○聖慧方治小兒生十餘月後母又有
姦令兒精神不爽每驚夜驚爲鬼病
用伏翼燒灰細研粥飲調正米餳日
四五服效

○寵膽湯一治孕婦被惡祟導腹中致
令兒病其証下利寒熱去來又治婦
人有兒飲乳復有娠孕兒喫此乳亦
作此病 北紫 膽 苓 桔 約

藤皮 茯 苟 夜苓各半錢 姜黃二
紙裹煖煖右水煎得利則止量大小

多少與服

一盤腸內吊四十四

○鈎藤膏

治小兒盤腸內吊腹中大
痛乾啼

乳

沒木

姜黃

四分

研末木別研爛成膏

敷右以木別膏和

西味更入陳蠚少許九櫻桃大煎鈎
藤湯化下次服

○魏香散

蓬术 祛真阿魏 行先以溫

湯化開阿魏浸蓬术一日夜焙乾爲
末每服半錢煎紫蘿蔔米飲空心調服

○方 乳 没研細許木

一塊碧水
調一味煎

數沸服

五加丁

○荷香散

治盤腸氣痛 苘处木炮

附炮金鎗子

去核蘿蔔子 炙

補

白芷根右入鹽水煎

○木香散

治小兒盤腸氣痛 已面

青手冷啼叫尿如米泔 川續子七

去皮核巴豆三十五粒同炒使君肉令豆黃去皮上豆不用

木通 荷絳仁右爲末清米飲空

心調下量覶太小與之

○齒四十五

○齒不生蓋齒者骨之餘髓之所養氣不足則髓不能充於骨故齒久不生宜

○芎黃散

芎木飯白芍地山

略沉伍甘紅石爲末溫鹽湯調服半錢仍用少許擦牙根

○方

雄風糞頭七粒酒者是每日用

一粒指齒根上至一十一且當生

○斷乳四十六

○蓋眉膏

施存性燒雌黃硃砂各

奇右爲末入香油輕粉少許調勻候寸匕服即出

○治小兒誤吞錢燒火炭末白湯調方寸匕服即出
又服蜜一升即出
又濃煎艾汁服之効了

○治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下南燭根燒細研白湯調一錢服之

○諸熱證四十八

○治熱者胃熱也時間發熱過時即退來日依時發熱此欲發驚也地骨皮

散生

○壯熱者心熱也一向熱而不已甚則

○發驚癇道赤散主之

○風熱者肝熱也身熱而口中氣熱有

○風証人參生犀散主之

○溫熟者脾熟也但溫而不熟鴻黃散

○壯

○肺熟者手據目眞耳桔湯主之

○心熟者視其瞳口中氣溫或合而曉及上竇咬牙皆冒者心熟也道赤散

○主之

○肺熟者手據目眞耳桔湯主之

○地骨皮散治虛熟潮熱亦治傷寒

○壯熱知柴 芡 參 地骨

○赤苓 半絡等右每服一錢姜一片水煎

○導赤散方在夜啼之內。

○生犀散治小兒骨蒸肌瘦頰赤口乾

○晚潮熱及病後餘熱不除大薑鱉魚肉各一斤

○參 芡 地骨 赤芍 柴 桔等

○一方有知母有痰加半夏右入青蒿少許煎

○鴻黃散治脾熟日黃肚大口唇生

○瘡眼生偷針等証 蕤 楠 膏

○風酒微炒香右爲末溫湯調服

○加減鴻黃散治濕熱胸膈煩悶皮

色如橘子黃白睛亦黃連 苗各不柏 芡 楠 芡 澤絡三右煎

○眼

○桔湯治肺熟手揩眉毛 桔五

○耳露飲子治胃熱口臭齒龈腫痛

○咽口有瘡赤眼及瘡疹熱盛者杷

○祛熱地門枳苗 生地 天

○門芩 石斛 甘草等分水煎

一方加通方

○驚風 附慢脾風 天瘑 發搐
四九 馬脾風 嘶風 瘡証

○驚風石二証急驚屬瘓熱慢驚屬脾熱

○夫急驚之候曰聞不常之聲或驟馬禽獸之嘯以致面青口噤或聲嘶而厥發過則客色如故良久復作其身熱而赤惺々不睡蓋熱甚則生瘓々盛則生風偶回驚而發耳宜用錢氏利驚丸鴻青丸抱龍丸宣風散五福化毒丹等

○慢驚之證多日飲食不節損陽脾

以致吐瀉日久中氣大虛而致發病發則無休止時身冷面黃不渴口臭中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘺癥筋脉拘攣蓋脾虛則生風人盛則筋急俗名天吊風者即此候也治宜東垣黃芪湯錢氏釣藤丸溫白丸溪參木湯送下硃砂安神丸之類

○急驚者十生一死慢驚十死一生王有合病者身涼精神倦怠不吐不瀉又能乳食而發搐者是半陰半陽合病如傷寒半表半裏也有急驚涼瀉不愈或與吐下藥太過變爲慢驚有慢驚溫補不愈或與溫補之劑太過變爲急驚

○利驚丸

治急驚風神効子

天竺黃仁輕
黛洛一黑丑頭末半兩生用
右研勻煉蜜丸如梧桐子大一歲兒
十九二歲兒二九五歲三九溫薄奇
水下食後

○鴻青丸又名鴻治肝丸治肝熱急驚搐搦等
証林氏涼肝丸卷

大潔俗裹烟一
木無大黃

芎 橘 膽 仮 風各等右爲末
煉蜜丸如皮實大每服半丸至一丸
竹葉湯下

○抱龍丸

治傷風瘟疫身熱昏睡氣
壅風熱痰實壅嗽又治驚風癇搐及
蟲毒中暑壯實小兒宜時與服之則
免痰熱驚悸之証

雄二冬半辰伍
水飛入

竺牛膽南星

四兩苦木簾月納半
膽申陰乾日取研

麝半兩另研恐太
多今用二分半
丸如皂子大溫水化下百日兒每丸

分作三服一歲兒半丸五歲二九童

頃二五丸臘雪水煮甘草和丸吞

下方漿水或新水浸南星二百丸

五沸去皮取白肉切焙炒黃色爲末

每八兩以甘草二兩半梅破用木工
碗慢火煎至半碗去粗旋以酒入肺

星末徐々研之入餘藥

治急驚風搐搦不定

換散陳

耳絡五黑丑四兩半生半
外一本收頭

未一右爲末蜜湯調下二三歲兒半

錢四五歲一錢食前服

等証

桔微炒玄參洗焙
六兩黛炒牙硝各

兩參二苓五耳絡一銀鉗八片麝半

兩半銀鉗爲衣麝半

右爲末煉蜜丸每兩分作十三丸一
歲兒每丸分四服薄荷水化下

○奪命丹

治急驚不省人事日定宜

視牙門不開唇白或黑者

星半

各四分爲末以姜汁和珍珠新白者
作餅舌焙乾

四十五分油硃砂四金鉛銀鉛各十輕

麝絡半右爲末麵糊丸如黍米大每

歲兌一丸燈心湯化下

○鎮驚丸

鎮驚竈神退心熱夜啼化

痰止嗽

珍谷碗竺雄絡二全

金鉛十片膽星伍牛

麝絡辰半右

爲末麥麵糊丸如梧子大每服五六

丸薄荷姜蜜湯化下

○鍤氏安神丸

治邪熱驚啼心疳面

黃頰赤壯熱

門牙硝白芩

山寒甘

半兩各辰一脣一右爲末

煉蜜丸如芡實大每服半丸砂糖水

磨化下慢驚參木煎濃汁化下

○金鉛丸

治急慢驚風瘡涎壅盛

半星

白附炮風各半雄

半犀牛

腦麝絡各半金鉛片

右爲末姜汁麵糊丸如麻子大每服

三五丸至一二十丸人參湯下慢驚

去腦

○林宮活湯

治急驚風角弓反張

參芩杏

膏各一麻節甘炙桂

芎葛升

辰砂獨絡各三右入姜

煎

○人參湯

最能利驚小柴胡加風

枝

○蟬蛻散

治驚風天鈞心熱夜啼驚

癇蟬六十五箇

去足翅荆穗一耳

大蜜大根

芩各五

蠟梢五十箇去毒

右入白茅根少

許少則

○**神功萬全丹** 治急慢驚風十無一失 砥 輕分各等右研勻用青蒿內

虫兒取於淨磁盞內以碟輕瓦汁和

丸黃米大一歲兒一丸二歲二丸乳

汁送下取蟲時七月初五日最靈

傳 **千金龍膽湯**

治嬰兒出腹血脈實

盛寒熱交作四肢驚掣係諸疳驚等

証 膽 鈎鈎藤 柴 苓 枝

芍 神 甘 各三蟬蠅七枚去脚大五右水

煎徐服

傳 **一方**

治急慢驚風

薄苛 寒

各半 黃 蚕 珠名

蝎二枚去足牙皂

角 槐角半右爲末

燈草湯 和乳

汁調時入灌之

傳 **黃芪湯**

治慢驚風之神藥也

慢驚者

告由久而成也 芪仁參各二錢耳

半加白

芍一兩右水煎

○ **益黃散**

治冒中風熱

芩仁陳去白

參絡一白芍七生甘炙甘絡各五連

渺右爲末水煎食前服

○ **錢氏白朮散**

治積病和胃生津止渴

渴頻瀉利將成慢驚風者服之效

參木 白朮 甘朮 木 薤絡各一

乾葛仁石水煎

○

丹溪加山 扁

肉蔻一錢各入姜一片煎

○

如慢驚已

作加細 天麻各一錢去白附

八分瘦同前服

○ **一方**

治慢驚風子母俱服

參

木絡一苓 陳絡半甘 荀絡各二半

天絡七細分蟬去毒火右作二服加

姜二斤水煎

○ **鈎藤散**

治吐利脾胃氣弱風慢

驚 鈎藤半蟬 風 參 素 蘆去
蚕炒 蝎尾蛇毒 天麻各二錢 炙芍各一錢

粉石水煎服寒者加附子分服

○溫白丸

治脾氣虛弱泄瀉瘦怯冷

瘧癰等証

天雨蚕炒白附子生蝎

去毒星湯泡七次焙炒各二錢分右爲末麵丸如

菉豆大每服五七丸至二三十丸空

心姜米湯下

○灸法

木

其火木

各

○林治急驚風，名前項一穴，在百會筋外

前一寸五分

愈須灸兩眉頭及人中，丁穴各三壯

慢驚風、陰証也。曰吐瀉，病久脾胃虛

困

至似稽不搖眉心顫骨丁穴

在入髮際二寸

百會丁穴各三壯

又治慢驚風

灸

一穴各七壯

○一慢脾風

○林 小兒慢脾風証蓋爲吐瀉，損脾病傳

已極，總歸虛處，惟脾所受，故曰慢脾。

若逐風則無風，可逐若鎮驚，則無驚。

可鎮，但脾間痰涎虛熱往來，其眼合

者，脾困氣乏，神志沉迷，痰涎凝滯，而

然矣。

○二小兒頭雖熱，眼珠青白而足冷

○三頭雖熱，或渴而足冷

○四頭雖熱，或嘔而足冷

○五頭雖熱，或渴而足冷

已上五証忽然吐而作搐者，名曰慢脾風，速與補脾益真湯，每服三錢，

加附子

丹五十四

○慢脾之候如身冷粘汗直吐如戶喘
嗽頭軟二便不禁虛痰上攻呼吸氣
廉者不可治

○丑慢脾十一枝二慈當生胃回陽如太
衝脉在則取百會穴多數之

○補脾益真湯

治小兒胎稟體弱外
實裏虛同嘔吐乳熾糞便青色而成
慢脾風氣逆涎潮眼珠直視四肢抽
掣或因變薰客性而作或日特拘驚
癇而作或日慢服鎮心寒涼藥而作
木般參芪丁香調肉
陳朴姜製蔻麴裹甘灸薑苓术
桂半湯泡七次
姜汁製右每服三錢姜一片枣一枚
竹箇去毒去滓半煎分分去滓肺飢糜熟服

服訖心腹棟軋以助藥力候一時久
喫乳食○渴者去附子蔻加參苓○
渴者加丁詞○嘔吐者加陳丁半○
腰痛者加朴良○腹脹者加朴丁前
枳○咳嗽加荊五味去附桂果蔻○足
痺痛加前枳赤苓去附子蔻○足
冷加附子○氣逆不下加前枳去
般附蔻○泄風利汗加桂芪○
腰脹肚痛或發驚悸○前木

○異方銀白散

治或吐或瀉涎鳴微

喘露暗驚跳

石蓮白扁芩各一

冬參一人白附炮金蠅去木

菟絲半陳米炒香右每服一錢冬

凡亡一粒姜一片水半盞同煎服此藥助胃氣風慢驚通用

○天鉤証

○林小兒壯熱翻眼手足搐掣如魚之鱗皆用乳母過食熱毒旋即乳兒兼挾風邪所致但解利風熱則應手而愈

○九龍控涎

○治小兒蘊熱癆瘍經絡頭目仰名爲天吊滴乳研絲仁半雄研膈茶枯瓦各一錢炙荆穗炒菉生半錢赤脚蜈蚣一條酒右爲末每服半錢至一錢人參薄荷湯調下

○鈎藤飲

○治天吊潮熱鈎藤參各半錢天冬犀角半錢各右爲末每服一錢水煎

○發搐

○傳男發搐目左根無聲右視有聲女發搐目右視無声左視有聲

○寅卯辰時發搐潮熱目上視手足動

○搖口流熱涎頸筋急此肝木太旺當補腎抑肝補腎地黃丸抑肝瀉青丸

○巳午未時發搐潮熱驚悸目上視白睛赤牙關緊急口流涎手足動搐此

○心火太旺當補心瀉心神肝地黃丸瀉心導赤散涼驚丸主之

○申酉戌時發搐潮熱搐而喘目微斜視瞬則露睛手足冷大便下淡黃水此肺病當補脾而抑心肝補脾益黃散抑心導赤散抑肝瀉青丸

○亥子丑時發搐潮熱不堪搐而眩不穩身熱溫無壯熱目睛緊計中味中

右瘧亦使銀褐色乳食不消多睡不
醒當補脾心補脾益黃散補心導
赤散涼驚丸

○傷風發搐身體溫多睡多睡或吐不
飲食而搐當先定搐人退用甘餅子
後服安神丸

○百日內發搐有真假二証真者不過
三二次必死假者發搐不爲重直者
內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未
實不能勝邪乃發搐也奚知假者口
中氣出熱也治之宜發散大青膏主
之及用陰顯法與俗躬法

地黃丸

在行遲瀉青丸之內

在急驚道上

在急驚道上

散在夜啼
之內

涼驚丸

膽 風 黛絡三鈞藤

仁

連十兩腦一牛

麝絡

右爲末麥

麴九如

大

每服二五丸至一

二十九金銀湯送下

益黃散

在吐瀉
之內

大青膏

治小兒傷風吐瀉心溫乍

涼乍熱

天 簡各一

白附半

牛蝎

尾鼈烏蛇肉

酒

砂

竹 麝各

字右爲末生蜜和成膏每服半皂子
大或一皂子大月中見粳米大同半
黃膏溫薄苛水化一處服之五歲已
上同甘露飲服

錢本有天麻
無大青

牛黃膏

治熱及傷風壯熱引飲

雄

苦硝

寒 生各一

鹽金

汞

五脣行

右爲末蜜

趙威膏薄

九十九

苛水トス半皂子ハーバイ大食後タシ
甘露ミツロウ正吐漏之內モトトロウノナカニ○白餅子シロヒヨウ在吐
肉シテ安禪丸エンジンマル在夜啼ヨクヒ之內ノチナカニ

字蝎尾エビテ糲福薄苛葉エビテ糲福薄苛葉祥石爲末熟束
肉爲膏新綿上塗引貼應上四方可
出一指許火炙手頻慰ヒヤウ百日裏外兒
可用此及浴法

○塗顛法

麝 蟹蠅末 牛 熏各

烏蛇肉

酒浸
培養

自礬

薰絡

二天仁

蝎尾エビテ毒硃名半麝字エビテ右爲末每用二

錢水三碗帶葉エビテ桃枝モモノハ丁槿同煎至下
敷沸溫熱浴之勿浴背

○馬脾風

謂鼻喘也

○林 小兒肺脹喘滿氣急兩助扇動鼻竅

張悶亂嗽漫声喫痰延潮塞俗呼馬

脾風如不急治死在旦夕牛黃奪命
散無價散主之

○牛黃奪命散

白梔

黑梔

各半生

頭末大 桂略

右爲末二歲兒一

○無價散

錢冷藥水調正述多加輕粉蜜少許加

呼馬脾風

珠半分輕拌甘遂半錢

許滴香油下點

並藥在油上沉下云

却藥水灌之

丁甘加滑石二錢名油

墜膏

○暴喘俗呼馬脾風大小便硬疽急玉

乞用牛黃奪命散上之次用白虎湯

平之

○噤風

眼閉口噤啼聲漸步舌上寒肉如粟

米狀，陰乳不得口，吐白沫，便不通，蓋由感受，執氣流毒於心脾，故見於喉舌，或爲風邪所搏致之，宜

辰砂膏

辰砂研細，牙硝各半，

玄明粉一撮，真珠各一撮，字右爲

朱油紙包，自然成膏，每用一工豆許，乳

汁調敷乳頭，七吮，金銀薄苛湯，亦

可有潮熱，耳草湯，

單方 治初生七日口噤，

牛黃一錢細研，以竹瀝調二字灌之

一癇証 五十

○傳 凡治共小兒五癇，皆當隨癥治之，並五色丸治之，五癇重者，死，病後甚者，亦死。

○惠 風癇，廢手足，如癱，或口喎，食癇，傷肉食，肢搐，角弓反張，太声吐食，方定

驚癇，廢頭目，吊口目，或昏或邪視，痰癇，似狂，耳不聞，目不視，如夢，如醉，或日發，或經年，急，手足搐動，食不知飴，或數日不食，寐中發，餽亦發

○林 風熱驚駭，不時，旋遺，潮搐，吐痰沫，忽然倒地，不省人事，名曰癇，先身熱，掣瘓，驚啼，而後發，癇，脈浮者，爲陽癇，易治。

○治風癇之法 大卒行，痰爲主，星半，萎，連，尋痰，尋火，發多，少治者，爲陰癇，難治。

○治風癇之法 大卒行，痰爲主，星半，萎，連，尋痰，尋火，發多，少治。

五色丸

硃，珍珠各五，水銀二雄

酒黑，金，水銀熬石煉蜜丸，如麻子大，

告服，四丸，金銀薄苛湯，

○**麻砂流延丸** 治五癰 砂白芩
生赤石 硝石各等右爲朱砂、芒硝
丸如棗大每服三十丸食後荆芥
湯下

參朱丸 治癰大神妙 參蛤

朱砂 右爲末，循心血丸如梧子大
每服三十丸金銀湯下

○**灸法**

神庭一穴在入髮隆五分治角弓反張半癪
吐舌灸三壯

少衝一穴

在手小指端內廉治驚癇吐舌沫
出灸二壯

前頭一穴

在入髮隆五分治驚癇灸二壯

長強一穴

在腰端治驚癇灸五壯

○**唐**治急慢驚風危証及諸癇癆病，絹帛

縛兩手足太指，甲角縫半申半內之

○**問**灸三壯先足後手或髮際或額會

○**辨証**五十

○**丹溪**曰：小兒嬌嫩飽則易傷飲食不
調，其肥無節或嬰幼缺乳粥飲太早，
五疳病成甚者，晝暗啞噦，直竄，腫滿，
腹脹，脹疼，肌肉光紫，最難治。

○**五疳** 元雜斑

○**辨**頭，目，腹，膜，齒，汗，流，腦熱，
合面，卧筋青，髮立，肉色青黃，羸瘦，當
補肝，宜地黃丸，或生熟地黃湯。

○心病而黃，臉赤煩，滿壯熱，口瘡虛驚，
當補心，宜安神丸，或黃連丸。

○脾病而黃，肚大，吃泥土，脹滿，氣急，利
下酸臭，當補脾，宜益東散。

○肺病咯嗽，氣逆，多喘，候真火，寒熱

白鳩生瘡當補脾此虛者也耳
益黃散或清肺湯主之

○腎疽、肺癰身有瘡亦寒熱時作頭髮
熱足冷如冰當補腎宜地黃丸

○筋疽、瘻血而瘦當補肝地黃丸
骨疽喜卧冷地黃丸地黃丸

○內疽目腫腹脹利色無常或沫青白
熱而瘦弱此冷証也宜木香丸

○外疽、頭下赤爛自裸頭有瘡不結
瘻遠耳而生當治瘡藥宜蘭香散白
粉散

○熟辨潮熱如火大便乾燥肌肉黃瘦
在自宜胡黃連丸

○冷辨時久泄鴻虛汗如雨不正宜至
聖丸

○脊疽、重食脊脂身熱下痢羸瘦頻咬
粉散

○蛇疽食肉太早或腸胃停蓄肥膩其
証多啼嘔吐清水腹痛脹滿唇紫黑

○腸頭及齒痒宜下至丸

○鼠疽、上焦壅滯疽虫上餌食中亦痒
壯熱喘呼皮毛乾焦肌膚瘦削頭下
連唇生瘡亦爛宜麝香散

○走馬牙疽牙斷潰爛由臟府虛熱乳
食不調致成疽病內有疽虫上齦齒
牙腫爛消黑口多臭氣

○尿白乳哺失節脾陽便濁白色久而
成疽宜生芩散地黃丸在行建

林生熟地黃湯

生地

熟地

芎

赤苓

桔杏

連

半

天

甘

灸地骨

散略等

右每服一錢水

丁蓋姜三片黑豆十五粒煎半盞服

○**安神丸** 在驚風治邪熱驚叫心肝面
黃頰赤壯熱

○**益黃散** 在吐瀉之內治脾胃虛寒脾神

○**黃腹大食土口鼻生瘡**

○**林清肺湯** 治肺脾咳嗽喘急見咬甲寒
熱

○**桑根五蘿**

○**前芩白朮**

○**桔生地**

○**天門堯風赤芩**

○**桔生地**

○**葛根半麌砂仁續隨子兩蝦蟆油**
大者三枚

○**木香丸** 治瘦冷症
木青根葛根半麌砂仁續隨子兩蝦蟆油

○**右爲未練蜜丸**
如棗豆大每服三丸至二十丸薄奇湯送下

○**胡黃連丸** 治肥熱毒
胡連川連各半硃砂半石爲末和入猪膽內用醋漬煮以枚子置銚子上用線鉤之勿著底候一炊時取出研入

○**蘆薈礬香粉** 飯丸如麻子大每服五七丸至二十九丸米飲下林白青燒半錢各二分

○**燒半錢各二分**

○**燒灰**

○**蘭香散** 治外痔鳩尾下赤爛
蘭香葉各存性

○**銅青輕粉**
各半分

○**右爲**

○**朱乾竹之**

○**白粉散** 治痔瘡
先燒竹乾化之

○**林至聖丸** 治冷瘡時人泄瀉虛汗不

○**正木丁皮丁香朴** 史君

○**肉桂陳皮** 葛根 右爲末 麵糊丸至

○**麻子大** 每服七丸食前米飲下

○**大蘆薈丸** 治瘧疾
木桑根枳連各一錢退二十年胡連伍

○**麝香右爲末** 肥脂一箇蜜汁浸糕丸

○下五丸 治蛇癬 新白 細根皮

○酒浸綠色 貢衆 木 桃 無一絲
脂

雞心 桃榔 狂風妙一輕拌乾蝦墓焦

三使 五十箇肉右爲末 麵糊丸如菉豆

大每服一平丸 天明用清肉汁下加

飯連絡半治脊癱及痔勞

爛 麝半雄 升絡半枯礬五石

爲末入乳調敷

○茯苓散 治尿白少而成瘕亦心膈

伏熱壅而得之 穀娘義 縮赤

芩絡五青 滯 滑 芎絡各二右

爲末每服一錢麥門冬阿心煎湯調

正

○傳如聖丸 治冷熱癲癩 使一升酒去壳胡

連 用連 白蕪荑去皮炒而乾蝦墓

五箇酒膏麝半右爲末 蝦墓膏和九丸如

麻子大二三歲兒五七丸已上十九

至十五丸人參湯下

○香蟾丸 治疳消食積虫積肉積及

治腹脹大

大半

稜 菓 青 嘰 曲

炒麥芽曲

炒膽

枳絡

五

木仁

川練

四

木

神

一

川

練

一

乾

蟾涎 右爲末以蟾蜍膏用醋煮成膏

和藥丸無加醋丸如麻子大每服

十五丸清米飲送下

○盧薦丸 治疳氣腹脹爲熱 蒼

木 桉絡二半蝦酒浸炙連去骨各一蕪皮

青 嘰絡五巴三十七粒去殼同味炒去豆

爲末猪膽汁丸如小豆大二錢丸三

十九米湯下

又方 治脾積腹大 胡連 醉浸

各五錢當門子川連炒 茶葉石爲

末猪膽汁和丸如麻子大每服三十

丸白木湯送下一方石荳薑

祖傳桂竹丸

治脾疾積塊腹大右

虫等証 枇杷稜

根去毛各半切醋炒 義

青燮陳去白各無二个雷

去壳不燒 木炭

三不漆

五不燒 不良土

繩一麥芽

炒山楂肉 胡連三甘

趣

黃色五不炒 石爲朱醋糊丸

如菉豆大每服二十五丸空心淡姜

湯下水

五疳保童丸

治五疳五藏之蓋 小

兒骨肉輕軟腸胃微細如乳哺有節

則藏府相調或乳曲寒溫失理飲食

無常醉飽喜怒反小兒百病以後五

歲以前乳食漸多不挾生冷好食肥

膩耳酸之物即成五疳並皆治之

連 白鰣 草龍膽

青皮 胡連各

蟬頭 棱根 夜明珠砂炒雄

雀天槳子 熊膽 蒜 胡連各

分右爲末糯米糊丸麻子大一錢兒

每服一丸米飲下水 三服

一方有乾蝎半微炒一分

水湯下水

○肥兒丸

治諸疳多因闕乳喫食太

早因患泄瀉胃虛運動日漸羸瘦腹

大不能行髮豎發熱無精神通

○ 麵略 麥芽炒五木仁核仁葛根 粉
央君肉絡 五石爲末麵糊丸蘿蔔子
大每服三十丸量兒歲數加減熟水下

○ 方

○ 治諸毒便桶中蛇河水浸三日新尾上頭放外以火燒乾爲末與皂亦治走馬毒貼患處良

○ 蛇墓丸

○ 治五痔腹脹面黃身瘦寒熱喫泥揉鼻咬甲頭髮不長肌肉瘡癬吐乳食利色不定日漸黃瘦

○ 蜈

○ 中肉取皂角 燒各一兩半

○ 膽

○ 四兩雄雞二兩右爲末水糊丸粟米大

歲七丸乳米飲下

○ 方

○ 治痈病 梣箇 中央肉各一兩半

○ 薏

○ 各一輕貼右爲末每服一錢飯湯空心調服同肉食亦可次日有蜜

○ 穴

○ 穴空心調服同肉食亦可次日有蜜

○ 從

○ 痘中出

○ 灸法

○ 痘多者尾骨上三壯

○ 腸

○ 腸滿鴻利積聚腹痛癰癧寒熱瘦黃

○ 矢

○ 脾俞一穴各七壯

○ 一無毒毒

○ 一無毒毒

○ 脣

○ 脣後項邊有核如彈按之轉動而不

○ 痛其間有虫如米粒不速破之則隨

○ 氣流散滯蝕藏府以致肢節作瘡便

○ 利膿血壯熱羸瘦頭露骨高皆由氣

○ 血虛憊所致用二棱鍼刺破膏藥貼

○ 而愈

○ 林

○ 蚊蝮丸

○ 治無毒毒項邊結核如癰壓拔之不疼兼治諸毒一服虛熱退二服渴止二服瀉利住蟾蜍及

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒月下被惡鳥羽屎落遂成無毒之疾

○ 棱壓拔之不疼兼治諸毒一服虛熱

○ 退二服渴止二服瀉利住蟾蜍及

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○ 惡鳥羽屎落

○ 遂成無毒之疾

○ 婦

○ 小兒在腹勿晒

○ 月

○ 下

○ 被

○

夏日瀟渠中取腹大蛇頭右取其蟲不鳴者其瘡磊落多

一杓置桶中以屎浸之桶更空不令食一日夜次以新布袋盡包繫定置急流米浸一宿取出瓦上焙乾爲末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服

二三十丸米飲下

一方 白蕪荑連 胡連 黃芩
外蛇頭去骨右爲末糊丸如粟米大每服二三十丸食後米飲下

一方 白蘚 蝶豆 雜癬 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮 白朮
癩自孩提至成童潮熱發瘡乃辨氣使然迺虫餌其肌膚遍身熱瘡瘍無已

林 小兒一二歲頭及遍身生瘡瘍因胎中父母交合所致名曰胎瘡先用

平血飲 治諸般瘡毒敗毒散加生姜生地門冬薄荷煎服一方有葛根

蟬

○甜瘡多生面部耳前陰莖白疕嚼石米成膏臨臥塗之三五次効忌鯉魚動

風物

連 桔

右爲末水調刷患處

一方 青黛 土朱 石爲末井水

入蜜調敷

一方 黄丹用碧刀水調刷

○丹毒腫痛如火 大黃 朴硝等爲末水調塗立効

藍青散

一名藍葉散 方見

治丹毒赤

亦

○腫身熱如火

○小兒赤癰熱毒管結肉間發瘡亦

○如癰宜生地通大荆芍桃

○苦寒帶表之劑外芩熟連之前

湯入硝泡洗セヨ

○又芭蕉根汁塗之

○小兒遍身赤腫乃久伏熱毒之氣防

○其火腹之腎則死宜

○**防已散** 已經朴硝犀芩芒芪

升硝半右入竹葉五片末煎與之

○治石癩瘡及髮生瘡取熊脂付

之

○又搗榆白皮醋和塗之亟即出髮即

生

○治石癩瘡及髮生瘡取熊脂付

和胡粉傳主

○又小兒頭無髮鯽魚燒末薑汁和傳
之

○**金線錠子** 治走馬牙疽丸

○瘡無如此藥最効人言行雖一不

乾胭脂伴飛羅麵四右爲末水和用

米泔洗患處貼

○**銅青散** 治口內生瘡牙齦潰爛

○蟾酥丸治諸瘡殺虫止腹痛退虛

熱○蟾蜍一枚酥油胡連川連

○膽鍊去木史君馮蕪各一瓣

○巴豆十四粒去殼油同陳各一右爲末猪膽

油丸或糊丸或蜜燉紫油湯下

○**一粒金散** 治走馬牙瘡

○白芙蓉飛青鹽飛草綿燒麝香石等分

爲末先溫水洗淨乾

唇鼻一應症 驂 蚊蛇燒連 熏右等分研末入麝少許敷之

鼻 瘡 半柏子 麝 右研匀先搣湯洗 大者燒 瘡

瘡 青牛散 治牙齒 蝸牛 在性者燒 乾鵝翎點之

桃葉湯 治不行頭面鼻瘡 桃葉 二兩 搗研 水五升煎去粗洗五七次安

瘡 香散 治鼻瘡及鼻下連瘡生瘡赤爛 麝半 雄 升麻各二兩 枯九

名右爲未人乳調和

方 熊膽湯化塗鼻中 小兒丹頰 柳葉研水煮去滓沈日

七八度

瘡 小兒癰瘡 蛇床末和猪脂塗之

諸 脂傳之

耳瘡 小兒耳後月飾瘡 胡粉東壁土末塗之

又黃連末傳之

又燒蚯蚓灰猪脂調傳之

又黃連枯丸末傳之

洗瘡瘍 芒 苦參 腹痛前瘡林洗之

妙方

又柏 甘 馬鞭草 連鬚蜜忽 荆

等水煎

瘡 瘡 赤芍 連 蛇床膏輕紗布爲末香油調敷

辨真瘡

五十一

傳承醫經卷之太極與傷寒

喉嚨亦昏紅身痛頭疼寒熱噦

噴呵久喘嗽寒延始發之時有因傷

風傷寒而得者有時氣傳染而得者

有因傷食發熱嘔吐而得者或目竄

驚搐如風之狀或口舌咽喉肚腹疼

痛或自汗或下利或發熱或不發熱

證候多端卒未易辨必復以耳冷尻

冷驗之蓋瘡疹屬陽腎藏無証其耳

與尻俱屬腎改腎之所部獨冷又不

知視其耳後有紅脉赤縷爲之真

寒傷寒重面革女面赤喘急憎寒

口中氣熱呵欠頭悶項急也

痘疹腮赤多嚙噴悸動昏倦四肢冷

尻冷

○傷食大便酸臭腹堅不消化畏食宜

○紫石白傷風皮潰拘急龜寒班疹瞓

中醫呼欠噦

○辨內外因并疑似

○瓦瘡欲出而未出曰發瘡者是外感

風寒之邪而內發心熱也宜惺人散

或升麻葛根湯參蘿飲

○瘡欲出而未出而吐利者是中焦停

寒或按宿食宜四君子湯加縮陳或

和中散如按宿食者用紫石并

○瓦瘡疹覺身熱似傷寒疑似未明先

與脾人散或參蘿飲○熱甚者升麻

葛根湯人參敗毒散○若見紅點者

便忌葛根湯不得寒虛也

○林苗走以升麻葛根湯治已發未

發壯冒以爲常蓋葛根毒散犀角地

胃氣凝血脈不能發

傳丸不可驟去。且輕能止痘瘡無

熱則不能發。比之種豆值天時。暖

煖則易生

○瓦瘡疹初欲出時身發熱耳尻冷。叫
欠咳嗽面赤必是出痘之候宜升麻
葛根湯加大力子山楂痘必稀而易

愈

一治法

○痘未出已出之時辰砂細末看視太
小或一錢或半錢蜜水調服多者可
少者可無

又絲瓜近蒂二寸連皮子燒存性細
研砂糖拌乾吃入砂石妙

○痘瘡發熟之時以惡實子爲末蜜調
貼顴門上免眼障之患

○痘初出須看膚前若稠密急宜服消
毒飲加查苓酒紫草減食者加參

○痘初出之時色白者便當大補氣血

參木朮芪芍升葛甘

木丁飯酒白芍如太便泄瀉加

訶蔥

○初起發時自汗不煩蓋濕熱薰蒸故
也甚者當以參朮等實表之藥防其
難醫也

○初起發時煩躁譁語狂濶引飲吞飲
水則後來靡不齊急以涼藥解其標
如益元散之類或去桂五苓散

○瓦瘡瘡已出可少與化毒湯出不快
者加味四聖散紫草飲子紫草木香

湯或班湯絲瓜湯之類

○瘡出稠密者人參夏毒散犀角地

黃湯

○凡痘瘡疎則毒少，密則毒甚，宜以清涼之藥解之。酒炒芩連之類雖數服亦不妨，庶無害眼之患。

○治痘大法活血調氣安表和中輕清消毒溫涼之劑，而治之此平治之法也。溫如黃飯木葷。

涼如前葛斤輩，以白芍、甘根桔羌通紫草之屬。

○顏色正者以前法不治，則安無成就。腳色淡者宜助血藥，如酒芍之類或少加紅花以潤血色。脚色之際或黑或紫者，屬熱用涼藥解其毒，升麻葛根湯妙。芩連及連翹之類甚者，必

用犀角、蓋犀角、大盤痘毒。

○消息太小使如小使赤濁者，大連翹

湯甘露飲、大便秘結內煩外熱者，小柴加枳殼或步服四須清涼飲子。大便黃黑色者，毒氣已盛，不可多與熱劑，但少用化毒湯可也。若二使一有秘結，則腸胃壅遏，脉結氣滯，毒氣無從發泄，目閉，声啞，肌肉鰲黑，不旋踵而變矣。

○大熱當利小便，宜五苓散導赤散。○

○小熱當解毒，宜消毒飲四聖散。

按陳氏木香散異功散乃從治之法

又謂之新因熱用，也蓋痘瘡熱毒怫鬱于內，而不得起發，故用下附木蔻桂等辛散劫鬱之劑十二服，劫而開之，使鬱于內者盡，因藥氣而發越于外。黃帝伏灰白色者皆當然，每治凸綻而內無遺邪矣。切勿退劑，如一二

服後劫不起者亦不多與多則反其毒轉增黑爛閉而死

○瓦疽瘡爛灰色白淨者白寒紫黑色者齊湧者煩躁者作熱○黑屬血熱涼血爲主○白屬氣虛補氣爲主○中黑陷而外白起得遲者則相兼而治

○瓦疽瘡氣虛者參木加解毒藥血虛者四物湯加解毒藥酒炒芩連各解毒

○瓦疽瘡難分氣血虛實大概多屬氣血不足右挾外邪而實者必加防風等藥

○瘡乾者宜退火此用輕清之劑荆苟升葛之類○瘡濕者肌表間有濕也宜鴻濕芷風之類蓋風藥能勝濕也

○咽喉痛者如聖散鼠粘子湯

○喘滿氣壅者麻苗黃芩湯

○煩渴者甘草散烏梅湯

○下利嘔逆者木香理中湯

○瓦疽瘡當分表裏虛實吐瀉少食爲裏虛不吐瀉能食爲裏實裏實而補則結壅毒陷伏倒壓灰白色者爲表虛紅活凸綻者爲表實表虛而復實其表則潰爛而不結痂也表虛不起發者或用燒人屎驗

○黑陷甚者用燒人屎別用無病小兒糞燒存性蜜水調服

一方用人猫猪大四糞臘月燒灰名萬金散

○黑陷二種因氣虛而毒氣不能盡者酒炒葵紫草人參等藥

○暗入者加味四聖散更以胡荽酒薄
朴其身厚付其足疇其床帳衣被保
以厚綿衣蓋之若未起獨聖散入木
香煎服若其瘡已黑可用宣風湯加
青皮

○錢氏云黑暗青紫者百祥丸下之不
黑者慎勿下

○又云下後身熱氣溫欲飲水者可治
水穀不消或寒戰者爲逆

○又云百祥丸恐太峻當以宣風散代
之瀉後溫脾用參芩朮等朴木甘葛
半爲妙

○辨瘡者實則脈有分氣壯虛則脈無
分氣怯

○虛瘡實表之劑加涼血藥

○實瘡如大便不通者以大黃等藥

○將瘡時金白色如豆蔻者蓋因初起
時飲水多其瘡不齊名曰倒瘡不好
宜服實表之藥及消息一便

○瘡已出而聲不變者形病也瘡未出
而声變者氣病也宜補肺散加生芪
瘡出而声不出者形氣俱病也身溫
者宜解毒防風湯大便閉者宜當散
丸

○形氣俱病禦賊素弱者宜預服十奇
散倍散外加木香煎服

○陽証足腫熱膿紅大便秘小便渴
不正氣急脈洪數已上證不可服熟
藥瘡疹一發便蜜如杏種布者宜清
表連翹升麻湯瘡出不快清便自調

知其在表升麻葛根湯若瘡乾黑附
身不大熱大小便滯是熱毒內
宜煎大黃湯下宣風散如表大熱者
不可下黑陷甚者百祥丸若瘡已發
稠蜜微喘渴欲飲水且微玉之當取
丸及龐氏地黃膏外以黃柏膏塗面
佳

○陰証足腫冷腹虛脹糞青面白能食嘔
乳食目睛青脈沉微已上証不可服
寒藥痘出四肢逆冷或色利宜急溫
之異功散附子理中湯調中丸
痘瘡平塌灰白色不汎此正氣不足
宜十補托裏散倍荳加附或四肢厥
逆時橘桂宜溫之異功散加青風或
和中散去葛蘆加附桂

○肺氣不足之証自汗聲不出瘡頭陷

榻不定肥並宜十奇散自汗倍荳聲
不出倍桔

○心血不足之証灰白色根窠不紅不
光沵並宜芎藭湯加芍紫草紅

○痘瘡日數輕重

傳痘瘡二三百始見微熱欲出如粟黍
米或如粟豆或如冰珠光沵明淨者佳

○四白五目大小不等根窠紅光沵者
輕稠密而灰白色沵而漏者重
戰慄亂腰脹煩渴氣急咬牙者重之
至也

○十二月十三日瘡當結膿而不出者爲逆

時將愈

身熱稍利之以防其餘毒身不壯無
可利之以防其餘毒身不壯無

乏

○一痘出不快者有五証

○一証天時嚴寒爲寒所蔽不能起發宜散寒溫裏紅斑初見宜用五積散

正氣散參蘓飲調鮮散木香散

○一証炎暑隆盛煩渴昏迷瘡出不快宜辰砂五苓散煎生地門冬調服身

熱甚者小柴加生地煩渴而便實者有虎加入參湯輕者人參竹葉湯加生地前服

○一証服涼藥損傷脾胃或冒虛吐利當溫中益氣宜理中湯吐利甚者加附子或異功散木香散豆蔻丸

○一證或成血胞一半尚是紅點此毒氣發越不透心不能食大便如常者

宜半溫裏半助養之劑用四聖散加城及紫草木香湯絲凡湯阮氏萬金散湯氏安斑湯

○一証外實之人皮膚厚肉膜密毒氣難以發泄因出不快宜消毒飲透肌散如大便秘於消毒飲內加大黃梔子煎服瘡出太稠宜犀角地黃湯解毒防風湯○血氣不足奇散咽嗌不利如聖湯加枳芍○口中氣熱咽痛口舌生瘡且甘露飲子

○解肌清熱之劑

傳王氏惺人散

林治風熱瘡疹變蒸吐

熱疑似之間皆宜服水炒桔細

參苓甘炙桔各二石入薄苛三

片煎

升麻葛根湯

林傷風身熱未明痘與

不痘宜服。如既出，不可服。葛升。

芍药、甘草、右等分水煎。

○木香參蘓飲 參三分蘓 桔梗 葛根

前各四陳 莹祿半枳殼三木一分

半分右作一服，加生姜三片。

○解毒防風湯 風、地骨、芪、生芍

荆穗、鼠粘子各右水煎，或爲末湯。

調下。

○滋毒飲

麻痘疹欲出及未出已出熱未解急宜服之。

牛三分荆、行、甘、伴

生風、右水煎，加犀角末、大妙、黃芩。

○溫表補氣血之劑

傳十奇散

即桂裏十補散
又名子宣散

芪、參、

皎絡二朴、桔絡一桂、

桂、芍、風

草、鹽絡六右爲末，每服一錢或二

錢溫酒調下，水煎亦可。

○亨飯湯 飯亨右等分水煎。

○散寒溫表之劑

○亨飯湯

飯亨右等分水煎。

○五積散

芷、芎、各三分桔半分芍、苓

芍、炙飯、桂、半分

陳、枳壳、麻根

節半、蒼、姜、炮、朴、

分、朴、分、右除桂、枳二

味別爲末，外一十三味細切慢火炒

令轉色，搘冷次入二味，末作一服水

一盞半入姜三片煎一盞去粗熱服。

○正氣散 朴半各姜製各陳、藿

梗木各半、甘草三分半右作一服，加姜三

片大棗一枚，水煎。

○調解散

或治食傷痘瘡黑頭青

枳、炒桔、參、半、亨、通、葛各

月盡日

分甘 蕃荔二右作 丁服加姜三片
枣一枚 一方有紫草糯米

一補中溫養之劑

○四君子湯 參 木 苓各一 甘半
右加宿陳名六君子湯

○和中散 朴姜制不炒 木半 姜炮甘炙
右加姜一片水煎

○理中湯 参 甘灸木 卷炮各八分右作
二服加炮附甚者 五分

○木香散 木 腹 参 桂 青 赤苓前
訶炮去半 丁香 甘各三分右作二
服加姜二片棗一枚水煎

○異功散 木 飯酒桂 木炒苓 陳
朴 参 菟麵果 丁香 半 附炮各三分
右作二服加姜二片太康丁枚水煎

○調中丸 木 炒参 甘灸各炮四分

右爲末 梼蜜丸如菉豆大溫米食前
送下

○肉豆蔻散 木 縮 白龍骨 訶

肉各半 赤石 枯丸各七 荚半兩 豉

右爲末 豉糊丸如黍米大每服三十

丸異功散送下

○清肌涼血之劑

○連翹升麻湯即升麻葛根湯 加連翹一分

○耳露飲子 生地 熟地並酒 天門

麥門 柏去毛 枳去皮 茅去梗 解 茵

甘各等 右水煎

○紫草湯 名紫草木香湯治痘出不

快及太使白利即 紫 木 苓 术

各一 芡 甘草右佐 一眼 入 糜米百粒

○四聖散 林 治痘出不快 及倒壓

紫草 芡 木通各一 枳 楚妙甘半右

水煎

○透肌散

〔云〕名化毒湯 每服二勺
入 糜米五十粒

紫草 芡 緣升麻 芡 格 右水煎 或

與消毒飲同煎尤妙

○如聖湯

治身熱如火頭痛頰赤
瘡已出未出並宜服

白芍 升葛 格 二 芡 紫草 通去節各右每

服二三錢 姜三片 葱白一根 同水煎

服 ○壯熱心煩加參 赤苓 膏

門

○紫草木通湯

治痘出不快

紫參 通鈍芍 芡 〔灸各等分〕右水煎

○連翹散

治痘瘡發熱

翹 風

○梔 芡 格 等右水煎

○升麻湯

治斑在面 升麻犀角各一半

干 芋 酒浸參 芡 格 半右

○和解之劑

○小紫胡湯

柴半 芡 半 参各一半
分 芡 半 右 加姜二片 大棗二枝

○人參白虎湯

〔云〕名化斑湯 知膏膏
十粒 加膏 二兩八名竹葉石膏湯

○竹葉湯

門一兩參 芡 格 半
四半字竹葉二右每服五錢內 糜米三十粒加膏 二兩八名竹葉石膏湯

○五苓散

沵一兩术 赤苓 猪各半

○兩桂醉石爲末 白湯或清米飲調服

或加姜蜜煎服亦可。加辰砂研末辰

砂五苓散。

○一通便之劑

○傳紫霜丸方在要薦之內。

○當啟丸林痘疹欲行大使宜此。啟

半連半分大半各一
兩右先以當飯熬成膏入三味末爲丸如胡椒大三歲已下兒十九食前清米飲下漸加以利爲度。

○宣風散 桑枝陳 甘各半黑丑四

收頭末右爲末蜜湯調服林氣快者一兩

加木香先下黑糞次下福參後以

四君子湯加朴木陳米湯服和胃良久糞黃自出透。

○百祥丸

紅牙太戰

陰乾水煮軟去骨日乾復納汁

中者汁盡培乾爲末

右一味蒸餅丸如粟米

大每服三十丸赤芝麻湯

○瘧毒攻口舌

○加味犀角消毒飲

治毒氣壅遏壯

熱心煩痘疹雖出未能勾透口舌生

瘡不能吮乳牛

三兩研荆穗門

桔絡五

一兩

風升洛牡犀仁石

水煎

○解子湯

治痘疹後身熱大使硬口

舌生瘡咽喉腫痛牛

筋升各一兩

射干各石水煎

○五福化毒丹

治瘡疹餘毒上攻口

齒參玄參蕉甘牙硝枯

各半

芩桔芩一麝腦絡半一方

無腦子石金銀箔石爲末煉蜜丸每

兩作十二丸一歲兒一丸分作四服

用薄苛湯化下

○口舌生瘡者，宜服黃柏汁飲之。

○痘疹入眼，氣火發風，動火之物，一切發風，則傳染。

傳染明散 草决明、赤芍、木花。

甘桔等爲末，食後茶清調下。

癩瘡散 卷 風柴、甘桔各爲末，水煎服，或薄荷汁茶清或菊花苗煎湯調，皆可。

林蟬菊散 治斑瘡入眼，或病後生翳障，蟬白菊花各等分，右每服一錢水一盞，入蜜少許，煎乳食，後與之，屢煎湯調，皆可。

驗

○決明丸 治痘瘡入眼，雖赤白障翳，遮睛，但障子不隔者，可治。石決明、蝦子、柏子各一錢，加黃連，右爲末，用兒肝爛，和丸如黍豆大，每服二三十丸，食後，臨時米泔水送下。

○金蟬花無比散 治瘡疹入眼。芩

甘桔風各四

石決明水研細末

苦參

卷

飯各三

赤芍十

三英藜

皮蟬頭去足翅

蛇蛻

一石爲末，食後米泔水調服，茶清亦可。

○林虎方 黃連、剉白滑石研，銅青研石細，包泡湯候溫洗眼。

○治出瘡，眼內有翳。

輕粉、黃丹各

分右研，左眼翳吹入右耳，內右吹

左。

○痘後餘毒

○痘瘡者，毒氣當出而不得出，流於脾經，則瘡發四肢，手腕膝臍，腫痛或頭項，咽喉，赤腫，宜消毒飲，或五香連翹散，鮮之未成膿者，小柴胡加減，用之

重者，或面赤便秘，或渴嗽，睡驚，尿赤，散鮮之，未成膿者，小柴胡加減，用之。

○如更受怯弱厥後面青不能飲食身
熱倦怠無熱證與調平藥安養之不
可一於解利也。虛則十補湯加枳桔，
傳痘後壅毒不問發於何經初起紅腫
時即用黑豆赤豆以嚴醋浸研擦
以鵝翎刷之效。

○必勝膏 馬齒莧汁_以猪脂石蜜右共
敷爲膏塗腫處。

○蠅子水

蠅子水_{活者以水養五日取}
_{死者洗去面漬生肉無}

○痕

○毒氣入大腸則便濃血或下腸垢或
太便秘結宜用犀角地黃湯身煩熱
渴_白黃連解毒湯熟盛者小柴氣湯
下利者黃連解毒湯黃連阿膠丸駐

○車丸

○通

○痘後一旬不大便其糞燥作癰用大
芒根巴等葉及蜜導及服香油一碗
不適令一婢以真麻油含口內用小
竹筍內敷道中吹油入腸內須臾即
通。

○消毒飲

_{方在前}

○五香連翹湯

乳木沉丁

翹射子升通桑寄獨

大麝分等水煎

○愈後瘀已落其癰黑或凹或凸瓦楞
輕粉石研猪脂調塗

○十六味流氣飲

參葛白取各一

苦桂朴芷甘風烏

杏芍柏木各半桔分蘇半

○右水煎

氣血虛而自利者，加熟附大便實，加天黃。

○干祐湯名于奇散

方見前

○黃連解毒散

連竹芩 柏 機各三右

○不表氣湯

大社朴 實各半右

○林小黃連阿膠丸

白豆蔻 莪 苓

○刺炮去核連微丸

右爲末阿膠一兩醋

○前和丸

粟米大正歲兒十粒米湯下

○駐車丸

連酢膠飯酪半姜炮一兩

○右爲末醋糊丸米飲下

○惠若又疽疹利無作

瘡疹者此餘毒未

盡也且解利之氣虛者未可解利

○中地風

○瘡疽疹愈後忽遍身青或黑手足厥冷

○白噤延喘如鋸者此名中地風蓋瘡

○疹五愈後尚弱而暑感時令寒暑

○風散二不入蟬蛻末二不外三服酒

○生姜薄荷汁數點湯調三服立醒

○或少酒而睡或再出瘡疹而愈

○清風散

荆 甘炮各一兩陳醉參芩

○蚕炮風 芒 蟬蛻炮藿略二朴

○羌活右爲末

○一斑藥水痘

附溫毒發斑

○小兒斑駁癰毒之病俗言癰子是肺

胃有熱也其肺胃蘊積熱毒或以時

氣所作薰發於膚甚如蚊蚤所咬故

亦班遍膚也凡發赤斑者十生一死

發黑斑者十死一生

○又小兒時氣咳嗽聲重，兼噃咽，口

睡赤熱渴，躁此則肺胃蘊積熱

毒發則易出遍於肌皮之上如

泡子見而漸沒病在表受毒之淺此名癰子亦名膿瘡俗曰麻子。

○或時行溫毒熱氣薰蒸病在裏受毒之深發皮膚遍躰狀似錦紋或如虫咬痕頭小豆大或黑是曰斑也。

○又有水痘一証與正痘不同易出易癯不宜燥濕或濕亦不爲害但不能結痂則爛成瘡。

○**葛根麥門冬散** 治小兒熱毒發斑或赤或黑頭痛壯熱心神煩悶。

葛門冬二參升其赤芩

赤芍各二膏半右水煎

○**生地黃散** 治小兒癰子身熱口乾咳嗽心煩生地六門杏皮去

款冬陳各一耳後二右水煎

○**旋覆湯散** 治小兒水痘麻子人經

熟知卷甜葶苈臙微參各一

渭 地骨皮各半分右爲末每服半錢水一小盞入小麥七粒同煎溫服。傳傷寒溫熱病而發斑如錦文者名曰發斑皆執毒之所致也是皆冬應寒而反溫人受不正氣故至春夏而發爲斑爛陽脉浮數而陰脉實大者名爲溫毒治法用化斑湯升麻葛根湯玄參升麻湯黑奴丸黑膏之顫散中消息。

○戴氏曰有色點而無顆粒者曰斑。○內傷發斑者胃氣極虛一身之火遊行於外宜補以降之。

○疹屬瘍頭熱在肺者是也隨出即潰而又有出通聖散。

分三右作一服加姜三片

○調中湯 治內傷各感所發陰症

蒼半
陳半縮 蕤芍桂枝去梗
桔

分三右作一服加生姜三片

○加味敗毒散 治瘟疫及癰瘍等証

巷獨前柴芎枳桔

參芩各五分

芍各二分加木風

荆蒼飯芍

生地各五分右作

一服加姜二片棗一枚此因虛而感

風濕致發斑者服之良

○孕婦痘瘡

○傳瓦孕婦發痘宜單胎散胎動不安宜

蜀聖散安胎飲身熱甚宜木香參蘿

飲或蘿蔔蜜宜可散倍芍飯減桂加

加莎烏如胎已五月則桂心半夏之

○單胎散

赤苓本飯

白芍

北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去

粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

屬俱不必禁

止

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

大戟苦宿太熱

加蠶金各

分石作一服水一盞半煎至一盞乾

補帶七箇野苧根七寸研丸帶一箇

用銀器煎以荷葉蓋定熬至八分去粗仍用荷葉蓋覆空心溫服

○獨聖散 用連殼宿砂慢火炒去殼

爲末每服半匙熟酒調下胎動則服

服後覺胎動則安

○安胎飲 腹酒洗淨焙乾

參陳

木白芍飯芎香附米

浸童使

宿蘿參甘桔半右作一服水

丁盞半燈少七莖糯米一撮煎一盞

○單胎散

赤苓葛北柴參桔

條芩

風陳荆枳紫草膠

橘

食前温服

○痘瘡膿汁不乾

傳蓋瘡出太盛表虛難壓以致膿水粘衣着席濕痛不能轉側宜白龍散敗草散附之

○白龍散

苗牛糞日乾火煅成灰取心中白者爲末布裹搗之

○敗草散

用蓋屋及牆背上遠年瘡草洗淨焙乾爲末布裹搗之及鋪床席上佳

○或以麥麸移席簾上可

○惡證

瘡瘍寒戰咬牙渴不止脰紫黑色喘渴不寧灰白色暗頸脹頭溫足冷

○瘧亂飲水氣促泄瀉濁

○瘡正出而吐利者困

○惠瘡正出而吐利者困

○而譖語不止者惡候

○便血而累者死

○便血而累者死

○漏血而瘡爛無膿不治

○大小便秘目閉聲啞肌黑者死

○遍身黑陷目閉無魂者死

○面色青者死

○瘡後發驚者危

○面黑或有黑氣不治

○燥渴尿澁泄瀉不食者危

○頭面腫瘡盡挑破臭爛不可近或足

○冷至膝不治

○面腫冕帽目閉咬牙不治

○痘瘡里焦風火鬱領唇項腫硬或胸

○脯高突不治

○室中禁事

○并禳法

○避風寒常和暖忌生冷忌聞諸微

○氣忌見外人忌犯房色忌近

月水婦人脳臭者，宜燒大茴，蘇木以辟惡氣燒木香亦佳勿燒沉檀

降真 乳香 腦 麝

○憚帳之內，須胡妥或以胡妥清酒噴床帳，痘瘡最怕穢物之氣觸犯

一痘不出方

○傳凡值天時不正，鄉隣痘瘡盛發，宜服禁方不出方。三豆湯油飲子鳳龍膏

○三豆湯

赤小豆 大黑豆 菓豆

各一升，水八升，煮豆熟爲度，遂用空心任意食

汁七日永不出

○油飲子

真麻油升遂日飲盡，永

出已上一方，出扁鵲金公丸

○石以雞卵，開一小竅，入地龍在內，夾

皮紙糊其竅，飯鍋上蒸熟去地龍頭，覘食，年歲十春日食一枚，終身不出痘隣里。有此証流行時食一枚亦好。

○雜方

○龐氏地黃膏

瘡已發稠蜜，微喘

欲飲水以此下之，生地四錢，雄紅麝半右以猪膏一斤和勻，露宿煎五六沸，令三分去一錢去粗，下雄黃，射香攬勻，稍火飲，毒從皮膚中出即愈。

○黃柏膏

瘡已發稠蜜用此塗面佳

柏皮酒拌炒，去粗，菉豆一兩，右爲末。

以生芝麻油調從耳前至眼眶，厚塗之，日三二次，如用早能令瘡不至面縱，右亦稀少，林一方有紅花，二兩，人云或只用乾鴨脂塗。

眼
亦可加

林周天散

治痘黑陷腰脹直視喘急

發搐

蟬退征地龍

右爲末

每服半錢大兌

一錢研

乳香湯調下

連進二服愈

奇方

治痘出不透腹痛甚或黑瘡

者蟬蛻

足翅脚乾洗去右爲末每服

一錢白湯調下腰痛立止乳母亦可

服一錢

又人齒散

治痘初出光壯忽然

黑陷心煩性躁氣喘妄語或見鬼神

不速治毒氣入藏必死人齒

燒石爲末每齒作一服酒下

傳活血散

治痘未出已出煩躁及瘡

發身痛者白芍味甘未再服一錢

溫水調下此偏酒調丸驗痘四服出

不快加防風一方用赤芍

阮氏萬全散

有作萬金治痘出不紅

潤風參蟬絡等石每服四錢

水一盞薄荷三葉煎不分溫服執

實者加升麻

絲凡湯

絲凡連皮子燒存性至

每服一撮時分用米湯調服此物

豆蔻最妙或紫草甘草煎湯調服下

可

慶祝元

岡峯本

