

醫方類聚

✕

i 41-2

F 1
4-125

命勤文

元亨元年



會中

3冊 { 490.9
Ih-8
1

No. 2112
18 j 41-2



富士川文庫

1305

後學州全重校

延壽醫院東井先

寬永戊辰孟春吉日

生類編醫方明鑑

命梓一字無訛

醫法明鑑卷第一目錄

中風 一附痛痺 痿麻

傷寒 二附中寒傷風瘟疫大頭病
蝦蟇瘟 感冒

中暑 三
中濕 四

癰疾 五
霍亂 六

內傷 七
泄瀉 八

痢病 九
氣 十

痰飲 十一
咳嗽 十二 附肺痿
肺癰

喘急 十三

醫法明鑑卷之一

中風門

附 痛痺 痿麻

一 三賢風因

傳 河間曰將息失宜心火暴甚腎水虛
衰不能制之則陰虛陽實熱氣怫鬱
心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知
也夫五志過極皆為熱甚俗云風者
言末而忘其本也

東垣曰中風者非外來風邪及本氣
自病也凡人年踰四旬氣衰之際或
因憂思忿怒傷其氣者多有此証壯
歲之時無有也若肥盛者間而在之
亦是形盛氣衰故如此取

丹溪曰有氣虛有血虛有痰盛西北
二方真為風所中者在之東南之人
皆是濕土生痰痰生熱熱生風也

真風類風之辨

●有真中風邪者有類于中風者不可
槩治

●傳因風者真中風也從昔人而治之因
火因氣因濕者類中風非中風從三
賢而治之

真風經臟腑之辨

●慧面加五色有表證脈浮惡風寒拘急
不仁中腑也加城心續命發表調以
通聖辛涼之劑

●唇緩失音鼻塞眼瞽耳聾便秘中臟
也難治三化湯通其滯調以十全四
物之劑

●外無六經之見証內無便溺之阻瞞
肢不能舉口不能言中經也當從中
治 大秦朮湯補血以養筋

一真風類風不可為一途

●傳中風蓋因先傷內而後感於外之候
也但有標本輕重之不同耳

●古人論中風者言其証三賢論中風
者言其因真中風邪者未必不由氣
躄虛弱然後感於外邪經曰邪之所
湊其氣必虛是也因火因氣因濕者

亦未必絕無外邪侵侮而作也若無
外邪侵侮則因火因氣因濕各自為
他証豈有喎僻癱瘓暴仆暴瘖之候

乎豈可以一途哉治
法外感重先驅外邪而後補中氣內
傷重先補中氣而後驅外邪或以散

風藥為君以補損藥為臣使或以滋補
劑為君以散邪藥為佐使

一似中風之數証

●^慧傷熱証卒暴偶化者顛中風

氣激痰碍心竅類中風宜吐後調理痰証諸痿諸痺皆類中風

●^林尸厥痰厥氣厥血厥酒厥各似中風氣中者暴怒心傷陰暴喜傷陽憂愁不

已氣多厥逆便涎潮昏塞牙閉緊急似中風灌蘓合香丸醒後隨寒熱

虛實而調之中風脈浮身溫多痰氣中者脈沉身冷無痰

●酒濕之病作痺証口眼喎斜半身不遂舌強不正似中風當瀉濕毒

口眼喎斜半身不遂之病豈止風之一端而已况六氣皆能中入有縱急

搐搦不知人等証不可不以脈証分別也

●^五口噤筋急或由風熱甚勝濕或因津液滯胞為痰則筋大燥或筋反緩者

及燥之甚血液衰少也故經曰諸筋牽易愈燥証微也筋痿難復燥証甚

也

●^林風病外感善行數變其病多實發表行滯痿証內傷起肺熱四肢不舉舌

本強足痿不收痰涎有聲皆是虛証無寒可散無實可瀉

●^五後世編集以外中風邪立名而與內傷痿証家同出治此千古之弊也

理氣者氣滯氣鬱肩膊麻痛之類此七情也宜烏藥順氣八味順氣

之類理血者無表裏之急証唯血弱舉發不時者用大棗丸養活愈風之類

●已上皆不可用風藥者也

一 緩治之治法

纂

丹溪曰大率主血虛有痰或杖火與

傳

濕治法以痰為先補養次之

初得之即當順氣及日久則當活血

初病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅

盛舌強不語兩寸脈浮大而實急用

吐法人迎脈緊盛或六脈俱浮強者

急小續命表之看所按見証與時

令寒溫加減施治病勢稍退精神稍

復當改用補氣補血清痰之劑調養

其本氣而安此急則治其標標而本

之治也

凡人或手足漸覺不遂或臂膊及髀

股指節麻木不仁或口眼喎斜言語

蹇澁或胸膈迷悶吐痰相續或六脈

弦滑而虛軟無力雖未致倒仆為中

風量厥之候早當從丹溪之法而調

治

左脈不足及左半身不遂以四物補

血之劑為主治

右脈不足及右半身不遂以四君補

氣之劑為主治

痰盛者 二陳 道痰 等湯兼

用

氣血兩虛而按痰 八物加半 星

寶 竹瀝 姜汁之類

若真元漸復痰飲漸消或覺風邪未

退者仍以 羌活愈風 防風通聖

之類出入加減調治而安此緩則治

其本本而標之之治也

一 卒風治法

五 急中卒風氣絕不語 至寶丹主之

連進生姜汁

●選 初中風卒倒牙關緊急不省人事

蘊香圓 灌之候其甦便可用辨脈

証從法治之

●慧 痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆

用吐法 瓜蒂散 稀涎散 口噤

者灌入鼻內虛甚者不可吐

●至 年老虛弱之中風及氣虛卒倒不可

吐

一肥瘦之辨

●傳 肥人中風口喎肢麻不分左右皆屬

痰用 貝 菱 守 星 陳 末

連 百 苓 云 羌 荆 歲

薄桂 甘 天花粉 因痰者加附

子 竹瀝姜汁入酒一匙行經隆火

又曰肥白火多濕 烏 附 行經

宜便者浸入塩下行衣梳

瘦人中風屬陰虛火熱 四物 加

膝 芩 栢 有痰加治痰藥

●惠 肥人中風者以其氣盛於外歎于內

也肺為氣出入之道肥者氣必急痰

涎壅盛所以急之必先理氣

一半身不遂左右之辨

●傳 半身不遂大率多痰

在左屬死血少血宜四物 桃仁

紅花 竹瀝 姜汁 宜一陳四君竹

瀝姜汁

一辨治

●惠 醒後小便少不可利之汗液死亡榮

衛枯竭無以制火熱退汗止小便自

行

●中風遺尿氣虛 參 芪 補之
●飲食坐卧如常但失音 小續命
去附 加薑

●中風証內外邪已盡當服愈風湯以
導諸經久服太風悉去縱有微和如
減用之然治病之法不可失其通塞
或一氣之微汗一旬之通利如此為
常治之法

一 脈辨

傳

大法中風脈浮遲者吉急疾者凶

林

寸口脈浮而緊緩而遲皆日中風脈
經日浮而大者風

●被風不仁痿蹙其脈虛者生堅急疾
者死也

一 不治之証

●口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿

腎絕聲嘶肺絕也

林

髮直吐沫搖頭上竄直視口開手撒
眼合遺尿不知人或面赤如熟或頭

面青黑汗綴如珠聲如射驢皆不可

治

一 灸治

林

●風中血脈口眼喎斜聽會頰車地倉
左喎灸右右喎灸左

●風中腑手足不遂百會肩髃曲池風

市足三里絕骨四肢麻痛在左灸右

在右灸左

●風中臟性命危百會風池大椎肩非

間使曲池足三里中臟氣塞涎上不

語心憤肢麻灸之各至年壯

●凡中風治法莫如發表攻裏調氣養

血治痰若要收全功宜艾灸

●林 凡五藏中風各灸其本藏之俞百壯
皆眼續命湯救之治風之法大良宜
灸凡心中憤亂神思不怡或手足麻
痺此將中藏之候不問風與氣可速
灸

●中風眼戴不能上視者灸二椎第五
椎上各五壯或七壯齊下火立愈

●失音不言灸天突
目反口噤腹痛灸囊下第一橫文十
四壯

●中風口噤灸美漿巨闕
一通開竅之劑

●搐鼻法 治卒中風不省人事牙關
緊急藥不下咽者 細洗去 猪牙
皂角去子各右為細末以紙捻蘸藥
入鼻或用竹管輕々吹入得嚏後進

●藥 參絡一膏 右為末吹入鼻中一
字就提頭頂髮立甦有嚏者可治

●通頂散 治中風中氣昏不知人急
用吹入鼻 藜蘆 甘生芎 細

●治大人小兒禁口風 皂角灸去皮
蘿蔔如無右以皂角研末用蘿蔔
或于同米醋研雞翎拂藥塗于牙根即

●皂角散 蘿蔔子 猪牙皂角各等
右為細末每服二三錢水煎熱服半

●麝香散 治卒中風昏倒地癱瘓口
喎諸藥未服者服之 真麝香杏仁
真香油兩 右麝香研細入油攪勻
開口灌之自甦蓋麝香自通開節可以

●蓋即吐

●真香油兩 右麝香研細入油攪勻
開口灌之自甦蓋麝香自通開節可以

行至病所也

稀涎散

治風涎不可咳中作聲如

牽鋸半夏四箇 半夏大者十箇 猪牙皂角一箇

右水煎入姜汁少許服不能嚙者徐
令灌之

稀涎散

治中風痰涎壅盛口眼喎

斜膈塞不通 明礬一兩半生 猪牙

皂角四錢去皮 右為末每服一二錢

溫水調下以吐為度

獨聖散

治諸風痰盛及諸癰瘰飲

壅益等証 甜瓜蒂一兩妙黃色凡

右為細末每服半錢或一錢量入虛

實用之以酸漿汁調下以吐為度凡

行吐法宜於天氣清朗之日行之晦

日難得吐病暴急者不拘先冷病者

備宿食如服藥不吐再用熱漿水

投之如吐風癰者加全蝎半錢 如有

重者加猪油五七點雄黃末各 甚者

加芫花末半錢立吐其中

道痰之劑

林

三生飲

治卒中不知人口眼喎斜

半身不遂痰壅喉鳴及氣厥痰厥駭

暈 南木香一兩 南星六兩 川烏

附子各生各 右煎服

省風湯

治中風痰涎壅塞口眼喎

斜半身不遂不知人 半風

其灸白附 川烏生木 星生絡

蝎一箇 右加姜

貝母凡萎湯

治肥人中風口喎麻

木左右俱作痰治 貝 萎 星 炮

荆 風 羌 栝 芩 連 木

陳 祛 半 薄 桂 甘 炙 威 天 花

粉各等 右加姜煎至夜服

●秘方白丸子 治卒風半身不遂口眼喎斜痰涎壅盛喘急咳嗽胸膈滿悶及小兒驚風婦人血風

大半夏湯泡 白附洗 星洗 川烏炮去 天蝎炮去 木枳麩炒各 右為細末姜汁糊丸如梧桐子大每服二三十九丸臨卧茶清下熟水亦可小兒驚風生薑薄荷湯下

●解毒雄黃丸 治中風牙關緊急及痰涎咽喉腫閉如牙關緊閉開口灌

下鬱 雄飛各二巴 十四箇去皮油 右為末醋煮麩糊丸粟豆大每服七丸熱茶清下吐出血涎立甦

○去風解表之劑

●小續命湯 治暴中風不省人事漸

覺半身不遂口眼喎斜語言蹇澀肢體麻木神昏亂頭目眩暈痰涎壅多傳東垣曰中風自汗者不可重發其汗故此藥亦不可輕用 王仲景謂汗出則止藥已 桂 芍 杏

白芍 甘草 麻去 參略 一分 風 紅附炮 七 右分二貼每服水一盞 姜瓦 棗一枚 去核煎八分服 精神恍惚加茯神 遠志 骨節煩疼有熱者 去附倍芍 心煩多驚 加犀

●骨節疼痛 倍加桂附 嘔逆腹脹 加半倍參 藏寒下利 去已 芍倍附加木 自汗 去麻杏加

米 脚膝弱加膝解 身疼加凡 腰痛加桃仲 失音加杏 無汗惡寒倍麻風杏 有汗惡風倍桂芍杏

●身熱無汗不惡寒加知膏去附
身熱有汗惡風加葛桂苓●無汗身
涼倍附加姜●有汗無熱倍桂附耳
●皮節疼痛不仁加羌翹

消風散 治諸風上攻頭目昏眩項
背拘急鼻嚏聲重耳鳴皮膚瘙癢癩
疹婦人血風頭皮腫痛 荆穗 芩
參 蟬蛻 羌 藿 芎 風 蚕
參 各二 陳 桂 枝 半 兩 各 右
為細末每服二錢●感風頭疼鼻流
用荆芥湯茶清調下●遍身瘙癢癩濕
酒下

八風散 治風氣上攻頭目昏眩
身拘急癢痺癢疹鼻寒聲重 藿 半
兩 桂 枝 一 錢 芩 參 各 二 錢
風 格 三 方 為 末 每 服 二 錢 薄 荷

湯調下食後服茶清亦可

羌活散 治風氣不調頭目昏眩
涎壅滯遍身拘急及風邪壅塞頭痛
項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨
頭覺不安 前 羌 麻 白 苓
芎 芩 炙 本 蔓 枳 細 風
膏 研 菊 各 去 梗 萵 各 一 兩 右 咬 咀 每 服 一
兩 姜 四 片 薄 荷 三 葉 水 一 盞 煎 至 三
盞 去 滓 溫 服 去 麻 細 膏 菊 加 參 天 桔
獨 芎 名 人 參 羌 活 散

清氣宣風散 治上焦風熱膈痰

日赤耳鳴 芎 羌 半 生 地
蚕 炒 各 八 木 飯 木 白 芍 各 一 風 枳
甘 菊 陳 荆 外 連 梔 炒 各
蟬 退 炒 各 六 分 三 右 分 二 貼 水
一 盞 姜 二 片 棗 一 枚 食 遠 溫 服
去風順氣之劑

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨

節疼痛遍身頑麻凡卒中手足癱瘓
言語寒澁者先宜服此藥以疎氣道
然後隨証投風藥 麻去根陳去白

烏各二蚕炒芎正 苴多桔枳
蘇炒各兩姜炒半右為末每服三錢

水一盞姜三片棗一枚煎七分溫服

瀉寒壯熱頭痛倦息加葱白三寸
身熱不能屈伸溫酒調服蜜尾拋之
成透用薄昔煎常服

八參順氣散 治感風頭眩鼻響聲

重及一應中風服此藥疏通氣道然
後進風藥 參各一姜兩芎正 苴

炙桔枳 朴木 陳去白麻節正各四

葛三兩 右每服三錢姜三片棗一

文黃四片葉煎七分溫服

八味順氣散 中風先宜服此散進

治風藥 木白苓青 眩正 陳

眩烏 參絡一苴核一右

順風勻氣散 中風中氣半身不遂

口眼喎斜先宜服此散大全無順木四

天參絡一沉苴青苴炙

菴瓜絡半烏疝二大全右分一匙

水二盞姜三片煎八分食遠溫服或

風熱腰腿疼痛亦宜服之

勻氣散 方見心 治心脾疼

木半苴苴苓絡三沉參陳

青台烏苴絡二天木姜

菴瓜絡一右入姜

防風天麻散 治麻痺走注肢節寒

痛 風天芎苴苴川烏白

附荆飯苴姜酪半滑二

右為未熟酒化蜜調服藥力運行
微蘇為度或蜜丸熟酒化下白湯化
下亦得

一夫風養血之劑。

○**大養丸湯** 中風外無六經之形証

內無便溺之阻瞞知血弱不能養筋
故手足不能運動舌強不能言宜養
血而筋自榮此方主之 凡 其

芍 版 自芍 膏 獨 自芍 各
不 羗 風 芍 芷 木 生地

熟地 各五細二分 右作一服水煎

○如遇天陰加生姜三片○心下痞
滿加枳實一錢

○**養活愈風湯** 治腎肝虛筋骨弱語

言蹇澁精神昏憤安心養神調理陰
陽使無偏勝治中風內外無和服此

以行中道 羗 牛 風 蔓

芍 細 枳 熟地 參 麻 苜

其菊 版 知 苳 地骨 狗子

獨 芷 伸 苳 柴 守 西

已 絡 三 自 苓 芍 芍 各 四 膏 蒼

生地 各六枝半 分○天陰用加姜三

片右作一服空心一服嚙下一參丹

臨助一服嚙下四白丹○望春大寒

之後加柴半參 絡三迎而奪少陽之

氣○望夏之月加膏冬知 絡三迎而

奪陽明之氣○季夏之月加已 木 苓

絡三勝脾土之濕○初秋大暑之後

加朴藿 絡三桂 半 分迎而奪太陰之

氣○望冬之月加附桂 絡半 版 仁 勝

少陰之氣

○**大防風湯** 去風順氣活血壯筋又

治癩後脚弱緩痛不能行各曰癩風
或兩脚腫痛足脛枯暗各曰鶴膝風
一切麻痺痿軟風濕按虛之候服之
如神 風 熟地 飯酒各 白

芍 仲姜汁接炒木一各不各羌 參
膝酒 其各 芎 附炮各七
右作一服水二盞姜五片棗一枚煎
至一盞空心溫服

林

天麻丸 治風因熱而生熱勝則動
以靜勝其燥是養血也此藥行榮衛

壯筋骨 生地斤 羌附四 飯附
仲附三天 膝酒浸三 草薢 玄
參各六 附兩炮 一方有獨活五
右細末煉蜜丸

續命者散 治風氣留滯心中昏憤
四肢無力口眼瞤動或時抽搐及

產後中風自汗宜服之 風 獨
飯 參 細 葛 芍 芎 甘

熟地 遠 荆 半絡五 桂 半
右每服一兩生姜片汗不止加蝎半

八寶回春湯

治諸虛不足風痰脈
絡拘急痰涎壅盛飲食不進 白芍

五苓三 木二 半一兩 生地 熟
地 甘 桂 烏 姜 附炮參
麻 祛 芩 已 苳 杏 風 芎
飯 神 陳 略 一 沉 川 烏 半各
右加姜棗

去風清熱之劑

防風通聖散 治諸風潮搐手足癩

癩小兒急慢驚風大便結閉邪熱暴
甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竅睡語筋

轉筋痿痺肌肉蠕動 風 苧 皎

芍 大 芒 翹 苧 麻 絡 針

膏 楮 桔 芩 木 荆 絡 半 苧

滑 絡 半 右 力 善

●**上清散** 治因風頭痛眉骨眼目昏

痛不可忍 苧 鬱 芍 乳 荆

穗 沒 絡 一 腦 絆 苧 芒 酪 半 右 爲

細末每用一字鼻內搐

●**獨活散** 消風化痰治頭目眩暈

細 風 藁 旋 蔓 苧 獨 各

兩膏 苧 各 半 右 爲 末 每 服 一 錢 姜

三片水一太盞煎七分食後熱服

●**攻裏通滯之劑**

●**三化湯** 中風外有六經之形証先

以加減小續命治之若內有便溺之

阻滯以此湯導之 朴 大 實 麩

卷 各 三 不 半 右 分 二 服 每 服 水

一盞煎八分去粗食前溫服微利則

●**靈慧濟方** 治中風六七日太便秘

結煩劇轉增 外 柴 芩 枳

炒 赤 芍 大 半 生 桃 去 皮 芒

麻 仁 去 殼 將 桃 仁 以 下 三 味 先 生 木

黃 一 半 研 細 貯 碗 右 將 升 麻 已 下 五

味 羌 大 黃 到 水 煎 數 沸 攪 勻 用 水 冷

服

一 鎮 神 之 劑

●**參用** 治健忘養精神定志 人 參

丹 參 熟 地 各 兩 半 人 參 一

丹 砂 遠 苧 絡 五 神 灸 耳

麥 門 名 一 右 爲 細 末 煉 蜜 丸 如 梧

子 大 每 服 五 十 丸 空 心 以 愈 風 湯 下

四百丹 清肺氣養魂中風昏冒氣不清利者宜服之 芷兩檀卷

有重各一 白苓 木 縮 參 風耳 莎 芎 兩 田各二

甜竹葉二 苛 三 不 麝 一 字 牛黃 腦 各 半 不 右為細末煉蜜丸每兩

作下丸隨口嚼下丸分五七次嚼以愈風湯送下

至寶丹 治卒中急風不語中惡氣

絕及心肺積熱小兒諸癩急驚心熱並皆治之 生烏犀屑 硃砂飛

雄飛 玳屑 琥 各 一 麝 腦 各 一 牛黃兩 安息 一兩半為末以蘇灰

土得淨一兩 酒攪澄飛過濾去沙慢火熬成膏 金箔 一 半 入 藥 銀

箔 各 五 右將玳瑁為細末研勻 和成膏丸如梧子大人參湯送下

牛黃清心丸 治諸風緩縱不隨語 言蹇涉痰涎壅盛心怔健忘或發癲

狂 羚 兩 風 木 白芍 門 芩 兩 各 一 犀 兩 麝 腦 各 一 參 麩

妙 蒲黃 炒 各 二 白苓 芎 柴 桔 杏 各 一 兩 牛黃 一 兩 雄 仁 甘

炙 五 山 七 姜 白 斂 各 七 飯 兩 兩 酒 大 豆 黃 卷 桂 膠 各 一 兩

片 為 右除棗杏金箔一角末及牛 膏腦雄四味為末入餘藥和勻煉蜜

同蜜肉膏為丸每兩作十九以金箔 為衣每服一丸食後溫水化下

珍珠丸 治肝風為風和所干即

治肝風為風和所干即

治肝風為風和所干即

塊散而不守狀如散鳥悸 珍珠母

三分 版 熟地 各一兩半 參 酸枣

栝子 各一兩 犀 神 沉 龍齒 各半

右為末煉蜜丸如栝子大辰砂

為衣每服四五十九金銀薄荷湯食

後吞下

大辰砂丸 清頭目化痰涎及感目

風寒頭目昏眩皆治之 天 苜

苜 灸 芷 各一 風 兩 細 苛 各

兩 辰 為衣 右七味為末煉蜜丸如

彈子大硃砂為衣每服一丸細嚼食

後姜湯下茶清亦可

一雜方。

貝母瓜蒌湯 治肥人中風口喎麻

木 左右俱作痰治 具 菱 星

炮 荆 風 羌 柏 杏 道

陳 酥 木 半 薄 桂 甘 菊 歲

天花粉 各等 右每服七錢水一盞

姜三片煎八分至夜服

資壽解語湯 治中風心脾舌強不

語半身不遂 附 炮 風 酸

天 略 二 不 羚 桂 各 二 不 甘

菴 各 一 不 右 分 一 貼 每 貼 水 二 盞

煎八分去粗入竹瀝二匙再沸服

稀發丸 治偏風口喎時吐涎沫

語言蹇澀筋脉拘挛緩弱久服耳目

聰明髭髮烏節力壯健 稀發一味

五月五日六月六日採洗去土搗取

葉九蒸九曝每次蒸用少酒蜜水洒

之蒸一飯久曝乾如此九次為末煉

蜜丸如桐子大每服一百丸空心温

酒或米飲送下

姜活丸

治風氣不調頭目昏眩

痰涎壅滯遍身拘急及風邪壅塞頭
痛天陰先覺不安 羌 其菊

麻 芎 風 前 膏 芥 其 炙

細 枳 白 苓 蔓 去 破 各 硃 砂

一兩半 右為末水糊丸如桐子大

每服四十丸姜湯下臨卧食後服

一易簡

林

治中風口眼喎斜枯樓絞取汁和
麥麵作餅炙令熟熨正便已勿令太

過

又巴豆七枚去皮爛研啗左塗右手

心嚙右塗左手心仍以燖水一盞安

向手心須更便正洗去藥并頻抽掣

中指用蓖麻子亦可

一方皂角一兩去皮弦子炒為末醋

又桂心酒煮取汁故布蘸搗病上正

即止左啗搗右右啗搗左常用大效

治風壅痰涎喘多中膈不利 牛蒡

子 微 荆 穗 各 一 耳 炙 半 共 為 末 食

後臨卧湯點一錢服

一方五月五日午時取蒼耳葉曝乾

為末酒或漿水服方寸七日三服作

散若吐逆蜜丸準計一方七風輕易

治者每服若身軀有風處皆作粟肌

出或如麻豆此風毒出也以錫雜潰

去之黃汁出乃止五月五日多取陰

乾着大瓮中稍取用之若時氣不和

舉家服之并殺三虫勝痔一周年服

之佳七月七日九月九日採用之

痺痛

痛風并痺証

●傳 夫古之所謂痛痺者即今之痛風也
 諸方謂之白虎歷節風丹溪曰大率
 因血虛受熱又曰濕痰濁血流注為
 病大法用 蒼 星 芎 芷 皈
 酒 在上加 羌 枝 枯 威 在下加 膝 已
 通 栢。因痰者一陳加酒洗 芩 羌 蒼
 因濕者用 二木佐以竹瀝姜汁及
 行氣之藥

加味四物湯

治白虎歷節風

本方加桃膝陳芩甘芷膽。在上者
 加羌枝威。在下者加膝已通栢。
 氣虛加參木枝。有痰加星半生姜
 血虛倍皈芎佐以桃紅

丁方

治上中下痛風

連 酒 炒 蒼 米 苡 浸 星 各 二 兩 麩 炒 芎 各 一
 兩 羌 芷 已 絡 五 歲 酒 枝 橫 行 各

不 膽 五 分 酒 紅 冠 右 爲 細 末 神 麩 糊
 左 如 梧 子 大 每 服 一 百 丸 空 心 服

大羌活湯

治風濕相搏肢節疼痛

羌 活 升 絡 一 獨 朮 蒼 威 已 木
 皈 苓 沢 絡 五 右 作 一 服 水 下
 盞 半 煎 至 一 盞 去 粗 空 腹 溫 服

四妙散

治走注疼痛

歲 乾 酒 浸 獨 羌 羊 角 灰 仁 蒼 耳 子 半 一 斤
 白 朮 子 炒 一 斤 右 爲 末 每 服 一 錢 七
 姜 湯 調 下

一方

治飲酒濕痰痛風

栢 酒

歲 酒 炒 各 蒼 米 薈 浸 羌 耳 麥 絡 陳
 眩 芍 絡 一 右 爲 末 每 服 一 錢 七 姜
 湯 下

●肢節腫痛濕熱流注於肢節之間翻
 筋之靈仙 麻祛根赤芍絡一風

荆 卷 獨 芷 蒼 歲 實
片 今 燭 桔 葛 苜 絡 半 苁 飯 梢
升 絡 三 下 焦 加 酒 栢 ○ 婦 人 加 酒
紅 ○ 腫 多 加 枳 腹 沃 更 加 沒 一 錢 定
痛 木 妙 ○ 脈 澁 數 有 瘀 血 用 桃 紅 苜
飯 大

二妙散 治脚膝濕熱成痛

栢 酒 二 醋 蒼 葛 苜 葛 浸 春 秋 二 宿 冬 三
右 爲 細 末 沸 湯 入 姜 汁 調 服 或 爲 丸
姜 鹽 湯 送 下 氣 實 者 加 少 酒 佐 之

潛行散 栢 一 味 酒 浸 曝 乾 爲 末 每
服 方 寸 匕 四 物 湯 調 下 治 血 虛 陰 火
痛 風 多 服 效

手臂痛是上焦濕痰橫行經絡中作
痛也 半 酒 芍 木 星 莎 各
各 貴 苓 絡 五 蒼 半 不 歲 三 苁 各
右 爲 一 服 生 姜 煎 水 一 盞 煎 至 一 盞
食 後 服

加味二陳湯 治臂痛

本方加酒芍 卷 歲 入 姜 水 煎
食 後 溫 服

一方 治痛風神效 赤芍 青

歲 木 一 驚 絡 半 紫 威 苜 風 絡
粉 苁 右 酒 煎 服

治婦人胸背脇走痛 赤芍 莎

栢 絡 一 枝 蒼 絡 半 歲 批 半 酒 苁
右 酒 煎 服

治走注疼痛 木 歲 蒼 枝 飯

桃 祛 皮 袪 炒 生 桃 飽 苁 苜 半 不
右 加 生 姜 五 片 水 煎 入 童 便 竹 瀝 各
半 盞 煎 熟 服

舒筋湯 治臂痛不能舉是氣血凝

滯經絡不行所致一名五痺湯効如神
片子姜黃仁其炙卷絡半海桐皮
麩牙飯赤苟木絡一右作一服
生姜三片水一盞半煎至一盞
去粗沉香磨末少許入內溫服

●加味二妙丸

治兩足濕痺疼痛或

從足趾熱起蒼朮 柏二兩 膝飯尾糲 草已 板酥各右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服一百丸空心姜盪湯下

●林 卷活湯

治白虎歷節風毒注骨髓

皮發不定桂 卷仁附炮尤 桂 不芎 飯 膝麵 桃炆燉 骨碎補 風絡一其燉六 右分二貼 姜炆

●加減地仙丹

治風冷和濕留滯下

焦足膝拘急腫痛 地龍炒去 吳脂祛烏藥 白膠香礪椒紅炒去 蕨瓜 小豆炒黑豆炒去 天仙藤 川烏炒去五加 蒼朮復木別炆燉 礪 右為末酒糊丸空心薑酒湯下

●^慧 仙酒方

治諸風疾手足拘挛半身

不遂 膝 尤 桔 風 卷 晚 蚕沙洗淨炒 拘分蒼朮炒牛蒡根炆 大麻子絡一牛蒡子併 右為末糯米酒二斗磁甕內浸藥封口七日開封勿令面近瓶內恐藥氣犯眼 日進三服每一盞

●秘傳藥酒方

治男婦風濕相搏腰

膝痛及風濕脚氣 芷 桔 半 已 芎 苓 桂 苟 麻 甘 各 兩 竹 飯 凡 陳 枳 獨

棋各半 膠 烏酪 二蒼 四兩 米 湯
仲如 粥 酒 右 剉 布袋 貯 用 無 灰 酒
三斗 壘 蒸 封 口 煮 一 時 夕 過 三 日 後
取 酒 飲 盡 粗 晒 乾 爲 末 酒 糊 丸 如 梧
子 大 七 八 十 丸 酒 下

● 茯苓湯 治 痛 痺 四 肢 浮 腫

赤苓 桑酪 二芍 風 桂 芍

麻酪 半 右 入 姜 棗 水 煎 溫 服 以 姜

粥 投 之 汗 泄 爲 度 有 痺 留 注 加 飯 其

● 防風湯 治 血 痺 皮 膚 不 仁 風

獨 飯 芎 赤苓 赤芍 芍 酪 桂

杏 甘 棗 酪 右 入 姜

● 全 芎附散 治 痺 痛 自 腿 臂 發 作 不 定

者 小 芎 附 苾 木 柴 風

熟 地 飯 桂 甘 右 等 分 入 姜

● 續斷圓 治 風 濕 流 注 四 肢 浮 腫 肌

肉 麻 痺 飯 炒 續 薛 芎 絡 耗

乳 風 附 沒 酪 半 天 附 右 爲

末 煖 蜜 丸 溫 酒 米 飲 任 下

● 生料五積散 治 寒 溫 麻 痺 方 規 湯

● 蠲痺湯 治 風 濕 相 搏 手 足 冷 痺 腰

腿 沉 重 身 軀 煩 疼 氏 鑑 風 各

糲 苳 赤 芍 姜 黃 飯 酒 服 各

茸 酸 半 右 加 姜 式 五 十 粒 半 生

● 烏藥順氣散 治 塵 節 走 注 骨 節 疼

痛 加 凡 沒 蕪 木 方 見 右 不 取

● 附子八物湯 治 塵 節 身 痛 不 可 忍

附 炮 姜 炮 芍 苓 甘 多 桂 參 各

兩 木 兩 右 一 方 去 苳 用 乾 地 二

● 三痺湯 治 男 婦 血 氣 凝 滯 手 足 拘

● 林

垂風痺氣痺等 續仲風桂

細參 苓 芍 飯瀾其炙尤

生地 芍 獨絡一 膝翅芪絡二

右每服七錢姜五片棗一枚木一盞

煎至八分溫服

〔薏苡仁湯〕 治手足流注疼痛麻痺

不仁難屈伸 薏 飯 芍 麻

桂 其炙 酪蒼朮 右每七錢半生

姜七片煎食前服。自汗減麻。熱

減桂

〔通氣防風湯〕

有背痲不可回顧及

腰似折項似拔此太陽經氣鬱不行

也此湯治之此法視

卷 獨絡二風 其炙 藁絡一 芍 伍

蔓 右如身重腰沉沉經中有寒

濕更加酒洗漢防已半錢附沙

〔三味劉散〕

治風濕走注疼痛

盟 丁皮 麻 風 芍 飯 甘

二絡 右咬咀炒黃每服七錢入二

盞煎八分去粗入乳沒各少許再煎

熱服出汗

〔如神救苦散〕

治風濕痺痛走注癱

瘳 嬰祛頂 陳祛和虎照骨

鱗乳 沒 其綠絡二 右為末每服

三錢煎通酒熱服

〔十味劉散〕

治中風血弱臂痛

飯 芪炙 白芍絡三 附 龍 芍 風

木 絡半 桂 苓 熟地 酒洗 糖 各

右分二貼姜八片棗一枚食後臨卧

服

〔活絡湯〕

治風濕臂痛諸寒不效者

木 飯 卷 獨 其炙 芍 絡 半

右分一匙姜三片

烏沉木香四物湯 治濕滯脾經者

臂手足疼 莎烏 芍 飯 芍

熟地 莪絡 二其炙木絡一右

加味陳湯 治臂痛

本方加翹 風 芍 皂刺 酒 芍

蒼

芍活湯 治木飲留滯背痛 芍

獨半 苓 陳 枳絡 木 其

炙絡 右加姜

羚羊角散 治筋痺皮節束痛 羚

薄桂 附 獨絡 三兩白芍 風

芍略一 右加姜

五加皮浸酒方 治風濕相搏腰腿

疼痛四肢垂急皮膚發痒添精補髓

五加麻木配右以咀生繪感應下好

酒一壺將藥袋入酒中用竹葉密封

曝口入痰銅內煮一時取出後浸二

十七日開壺空心臨卧飲一二匙麥

服効

一痿証并麻木 傳丹溪曰內經謂諸痿起於肺熱又謂

治痿獨取陽明一經蓋腎氣無節則

水失所養火寡于畏而侮所勝肺得

火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金

失所養木寡于畏而侮所勝脾得木

邪而傷矣肺熱則不能管一身脾傷

則四肢不能爲用而諸痿作矣馮南

方則肺金清而東方不實何脾傷之

有補北方則心火降而西方不虛何

肺熱之有又曰內經論風論痿各有

篇且治法迥異局方以治風藥通治

諸痿何其謬哉

東垣治痿無一定之方黃柏為君黃芩等補藥為佐視所擬之証制其方濕熱用健步丸加柏蒼蒼之類

濕痿一陳加一木岑柏竹瀝姜汁之類

血虛四物加蒼柏補陰丸 補腎丸 補脾丸 補肺丸 補心丸 補肝丸 補脾丸 補肺丸 補心丸 補肝丸

虎潛丸 補腎丸 補脾丸 補肺丸 補心丸 補肝丸 補脾丸 補肺丸 補心丸 補肝丸

虎潛丸 柏澣煎 知酒熟地 板鹼 白芍 陳 膝略 二虎脛 兩 瑣 飯酪半 右為末酒煮羌羊肉

為丸塩湯下冬加乾姜半兩 氣虛 四君加蒼蒼柏丸 柏蒼治痿之要藥也

加味四物湯 治諸痿四肢軟弱不能舉動 飯身 柏 蒼絡 一熟地

行白芍 芎 仲絡 杜門 木 五味 參 連絡 半知 分膝 軟弱 足 不 右煎 服又酒糊丸服亦可

健步丸 治膝中無力屈伸不便 脚沉重行步艱難 羌 柴 滑 炒 其炙 枯酒 桂絡 五風 沢絡 三苦參

酒川烏 炮絡已 酒洗 右為末麩糊丸如梧子大每服七十丸愈風湯下

一云荆芥湯下按荆芥湯又號愈風湯也

大防風湯 治兩足痿弱或麻痺或兩膝虛腫名曰鶴膝風方見右

相傳經驗 治兩足痿弱軟痛或如火焙 蒼米 二 飯 柏 酒 熟 地 兩 膝 飯尾略 二 板 繼 虎 脛 骨 麩 已 酪 一

右為末麩糊丸如梧子大每服七十

右為末麩糊丸如梧子大每服七十

九姜盪湯下方加炮附五分

●鹿角膠丸 治血氣虛弱兩足痿軟

不能行動 鹿角膠一斤鹿角霜 熟

地絡半膠 白苓 兔絲 參 木

仲酪二飯身 晒虎脛骨 細板酥炙各

右為末別將鹿角膠用無灰酒二盞

煇化丸如梧子大每服一百丸空心

姜盪湯下

●除風濕差活湯 治諸痿濕氣勝風

証不退眩暈麻木不仁 羌一風

蒼 苾絡一升杜其炙獨 柴絡五

芎 栢 陳 藁絡三沢 猪茯苓

分連分 右

●清燥湯 治濕熱成痿腰以下痿

軟不能行 苾半炙蒼仁木 陳

沢絡半五味仇白苓 參 升絡三

門 飯身 生地 麴 宿 酒栢

絡二柴 其炙連絡一右慧無連

●加味四行丸 治腎肝虛弱骨痿

痿脊酒膠酒天 凡 鹿茸 醃麩熟

地 兔膠 碾五味酒浸各 右為末

煇蜜丸如梧子大每服五十丸食前

米飲下

●丹溪曰十指麻木胃中有濕痰死血

二陳加二木桃紅芩加附料參仁

●人參益氣湯 治兩手指麻木四肢

困倦熱傷元氣也 苾仁炙車 升

絡半五味苾十柴枳生苾所參絡二

粉白芍此 右各 參三 鹿四

●道氣湯 治兩腿麻木沉重 苾仁

其半 炙青行升 柴 飯栢 沢絡

不陳二分紅紗五味三十 右

天麻黃芪湯

治素有風証因醉飲

其証復來右口角攸眼牽引側視及

左手腿脚麻木疼痛天芍芍麴

妙差如不苓絡三參連絡四

飯短芪其升葛栢蒼格

分沢壯柴純或加猪欲右

神效黃芪湯

治麻木不仁或兩目

蓋明昏花睛痛蔓和陳祥參分參

其白芍絡一芪行右水煎去粗

臨卧熱服如麻木不仁雖有熱不

加黃栢只加黃芪行通行如麻木

甚者加芍藥行通行如有太熱証

加酒栢參天山煎其類類

祖傳經驗三妙丸

治濕熱下流兩

脚麻木或如火燥栢兩兩切炒茶

六兩米泔浸主膝二帳右爲末麴糊

丸如梧子大每服五七十九丸空心姜

塩湯下忌魚腥香麥熟麴煎炒等物

傷

△傷寒門

附 中 大 喉 感 日

一傷寒溫病熱病之異

林 中而即病名傷寒寒毒藏肌膚至春

變為溫病至夏變為熱病醫者均謂之

傷寒

一傷寒中寒之異

林 寒邪傷胃急痛拘急戰掉強直昏迷

厥冷口噤失音此中寒也

無汗惡寒頭痛面慘發熱拘急手足

微寒此傷寒也

一傷寒中寒為一之說

傳 有至人傳云傷寒大法有四日傳經

專經即病鬱病夫即病者多為專經

鬱病者多為傳經云或但中於太陽

未及鬱熱而即發首尾只在本經而

不傳變者宜 麻黃 桂枝 等湯

驅散表邪而愈或有從大陽未及醫
熱不從陽明小陽而入於三陰之經
者亦有初不覺入於陽經而直傷於
三陰之經而即病者因其未嘗醫熱
是以一切為寒証故多身霜降後至
春分前發者是也為其無頭眩無大
熱脈沉遲而微故古方又出中寒一
條實此証也

一傷寒傷風之異

以印傳變與傷寒無異但寒泣血故
無汗惡寒風散氣故有汗惡風為不

一傷寒感冒之異

傳傷寒溫病熱病之死有四肢感冒新
受風寒之輕証而見頭痛體痛惡寒
發熱等証非營衛傳經重病之此

百
一、二日、太陽脈浮惡風寒頭項強痛
腰脊強

一、二、三日、陽明脈長不惡寒反惡熱日
夜鼻乾不得睡

三、四日、少陽脈弦細口苦咽下堅滿
往來寒熱耳聾

四、五日、太陰脈沉細腹滿咽乾
五、六日、少陰脈沉欲寐而渴

六、七日、厥陰脈絳氣上衝胸飢不食
食吐蛆煩滿囊縮

一兩感
掌五日、太陽、少陰、頭痛口乾渴

二日、陽明、太陰、身熱譫言腹
滿不食

三日、少陽、厥陰、耳聾囊縮而

厥內外兩感府藏俱病表裏不能一治故難治脉從陽可治從陰難治

傳

經曰兩感於寒者死是內外兩感藏府俱病欲表之則有裏欲下之則有

表表裏既不能一治故死然所稟有

虛實所感有淺深虛而感之深者必

死實而感之淺者猶或可治治之而

不愈者有矣未有不治而復生者予

嘗用此間有生者七得二三故立此

方名鮮利兩感神方大卷活湯方有

一表證

脉浮緊表實無汗麻黃湯

脉浮緩表虛自汗桂枝湯又惡寒自

脉浮緩反無汗脉浮緊反煩躁各

半湯本黃桂枝合為一劑

半表半裏

金匱云發熱惡寒在死若小便黃非在死

蒸蒸發熱邪在內若小便清非在內

脉浮大是表証尿赤煩渴是裏証是

表裏俱見也 五苓散

心下滿不食大便堅脉沉細是裏証

頭汗出微惡寒手足冷是表証此在

半表半裏 小柴胡湯

不大便頭痛有熱是裏証小便清不

在裏此表裏俱見也 桂枝湯

裏証已急或脉浮或頭痛表証仍有

者用 大柴胡謂之雙解

一裏証

裏証者內熱是也宜下之

不惡寒反惡熱下汗也咽乾糞結

潮熱腹滿喘或譫妄脉沉滑是裏証也

小便少手足心身腋下不滋潤者不可攻

一表裏寒熱

●發熱反欲得衣熱在肌表寒在骨髓
●脈沉遲手足或微厥下利清穀此陰
証發熱表未解 四逆湯或通脈四
逆湯

●活人曰表熱裏寒先與 陰且湯

芍 甘草 附子 芍藥 桂枝 膠東

附子 右剉煎 寒已次小柴胡加

桂 身裏反不欲近衣熱在骨髓寒在肌

表先用 白虎加入參湯熱除次各

半湯

●脈滑而厥口燥舌乾惡寒而踈時以

煩不欲厚衣 大柴胡

二陽毒

初受病時和毒深重當活失汗當下

失下或吐下後知熱乘虛而入或誤

服熱藥並為陽毒必發狂登高歌棄

衣走身面錦斑鼻燥舌卷焦黑脈洪

大五日可治六七日不可治

若執甚時昏口噤咬牙藥不可下者

用水清法候牙寬狂定用藥

一陰毒

●初受病時寒邪深重致陰氣獨盛或

汗吐下之後變成陰毒唇屋見面黑厥

冷身疼如被杖腹中絞痛或自利咽

不利虛汗嘔吐脈沉微三日可治五

日不可治或 真武湯 或飯 桂

升 甘草 雄 鱉 椒 水煎溫服

蓋覆取汗或用葱熨法溫臍下漸醒

肢温有汗即瘳續用四逆湯之類如
烈而肢不温不可治

葱熨法 治中寒氣虛氣息欲絕及
傷寒陰厥葱一握以糸纏如餅去根
葉惟存白長二寸許以火煨令通熱
以執處著臍上下熨一餅壞即易手
足温有汗更服姜湯一盞良

又法葱一握取白二寸檢成餅先用
麝香半分填臍肉上放葱餅以火熨
之連換二三餅稍醒灌姜汁如不醒
灸關元氣海二三十壯手足温即醒
者生手足不温汗不出不省人事者
死

選 手足厥冷腹中絞痛唇青氣冷急於
丹田穴灸之或二五十壯或百壯視
輕重手足煖為度

● 風温頭痛身熱自汗四肢不收多眠
肝息陽脉浮滑陰脉濡弱 黃芪防
日湯切忌汗 左見中温門

● 温瘧脉陰陽俱盛重感寒者變成温
瘧 小柴 白虎之類

● 温家之二三證

● 温温暑濕相搏成濕温胸間多肝頭
如勞脈冷身言陽脉濡而弱陰脉小
而急枝苓白木湯 苓木姜其枝

● 中温一身盡痛發黃大便秘尿澁脉
沉而緩 五苓散

● 風濕肢身痛重難轉側額上汗出不
欲去被身腫日晡劇其脉浮發汗微
太出則風濕俱去也

一 瘳證 堂林

太陽經中風又感寒温又大發温家

汗則成瘧發熱惡寒似傷寒及張口
噤如痲

有汗不惡寒瘧瘧 桂枝加葛根湯
無汗惡寒剛瘧 葛根湯

一惡寒林
太陽發熱無汗惡寒 麻黃湯

陽明雖有下証但惡寒表未解也
麻黃湯

太陽發熱無汗惡風 桂枝湯

陽明脈遲汗多微惡寒表未解也 桂枝湯

少陽頭痛發汗惡寒 小柴胡

少陽發熱微惡寒 柴胡桂枝湯

少陰惡寒脈沉細 四逆 理中湯

汗後惡寒虛也 芍藥甘草附子湯

芍 甘 略 三 附 一 枚 右

下後惡寒而踈肢溫脈微惡寒表裏

虛小建中湯

汗下後不解執湯時以惡寒表裏俱

熱白虎湯

潮熱林

少陽王叔寅知太陽王叔巳午必此

時發熱邪未入胃應於未申發者謂

之潮熱邪在胃

惡寒潮熱或漉咳逆 小柴胡

脈浮潮熱兼寒 小柴胡加桂

脈浮弦小便難噦腹滿脇痛無汗嗜

助小柴胡加茯苓

汗後不惡寒腹滿喘潮熱 大小柴

氣

脈實潮熱 大承氣

下後潮熱大便復硬 大柴胡

汗下後不解日晡潮熱微衣摸床喘

急直視女 羨氣湯 脈弦生滿死
日晡潮熱脈虛微汗之之 桂枝湯

一煩熱林

為煩而執無時而渴者是也

心煩喜嘔大 小柴胡

汗後煩熱而渴六 辰砂五苓散

汗後胃乾煩不眠欲飲水少與之心傳

煩不得開 桂枝

一煩躁林

煩為內不安躁為外不安邪氣在表

者在裏者因火劫者陽虛者陰盛者

煩躁者證之常也非逆也

結胸煩躁者發熱下利厥逆煩躁不

得卧者吐利煩躁四逆者自利煩躁

不得卧者皆死

惡寒而躁時自煩欲去衣 大柴胡

煩躁消渴 辰砂五苓散

汗後煩躁不得眠欲飲水少與之

自汗心煩小便多 芍藥甘草湯二

一

五五六日不大便繞臍痛煩躁發作有

時此有燥屎 小羨氣

吐利厥冷煩躁欲死六 吳茱萸湯

藥 生姜略半 參三分 棗三 右

陰盛而煩躁名陰躁 四逆湯

下利咳嘔煩躁不得卧 猪苓湯

傷寒五六日脈微手足厥冷煩躁六

厥陰背第四椎兩傍各一寸半 名

一自汗盜汗肢汗頭汗林

發熱惡風自汗太陽中風 桂枝湯

自汗小便數 芍藥甘草湯

自汗身熱不渴 柴胡 加桂

多發汗汗漏不止名漏風上陽桂枝附子湯

陰証四肢厥冷自汗四逆湯

陽明証汗多渴不大便調胃承氣

汗多不止木藁苧芷各一

米粉半兩為細末周身撲之見汗

○汗多亡陽煩躁惡風不得臥先與防

風白朮牡蛎湯二味等分為末米飲

調常時酒調極佳汗止後用小建

中湯

○肢汗大便難難言四肢汗出熱聚於

胃也可下

不食小便澀四肢汗出中寒也可溫

不可下

盜汗睡而汗出覺則止非如雜病

之風邪在半表半裏也

○汗出而微惡寒小柴胡加桂

脈浮潮熱或盜汗黃芩湯 芩

芍 其絡等 棗

○頭汗汗下後胸脇滿結小便不利往

來寒熱心煩而頭汗出柴胡桂姜

湯

頭汗出惡寒小柴胡加桂

汗不止者難治喘亦然心下滿頭汗

出水結胸小半夏茯苓湯

○無汗林脈浮而遲不能作汗身必痺桂麻

各半湯

陽明主有汗今反無汗身痺皮中久

虛故也

木附湯 黃芪建中湯 桂枝湯

一頭痛太陽証多頭頂痛屬厥陰頭角痛屬少陽額痛及鼻陽明

無汗發熱惡寒頭痛 麻黃湯

六七日不大便頭痛有熱尿清不在裏仍在表須汗痛甚者必衄 葛根

葱白湯 荆防散 川芎石膏湯

頭痛 汗出發熱惡風頭痛 桂枝湯

輕者 柴胡桂枝湯

半表半裏往來寒熱頭痛脈弦細

小柴胡湯

發熱頭痛似瘧為欲愈 各半湯

厥陰少陰頭痛嘔吐涎沫 吳茱萸

湯 方見前

夏月頭痛身冷自汗中暑濕也木附

湯

散

夏月頭痛惡寒心下煩躁不快五苓

散

自汗頭痛風暑及雜病俱宜白虎或

少加蔓荆尤妙 或竹葉石膏湯

表邪入裏不大便熱脈沉澀而長頭

痛即下

熱不惡寒或不大便小便赤者胃實

也調胃承氣湯

汗後不能頭痛不止 芷 辛 烏

搗膏貼額上或用不卧散吹入鼻內

一胸脇滿

胸滿多帶表証 脇滿多使半表半

裏半表半裏脇下痞鞭 冲和湯

去棗加蚘別名也

汗下後胸脇滿微結小便不利渴而

不嘔但頭汗出或往來寒熱柴胡姜

桂湯下利身熱脇痛 大柴胡

寒中誤下之愈不快腹脹或吐或利

理中湯 枳 陳輩

心下滿而不痛 半夏瀉心湯

嘔滿而發熱者 小柴胡

飲水多心下痛脹 牡蛎澤瀉湯

一結胸 腹上硬而不痛者大柴胡

結胸有下之早而成者脈浮緊心下

硬痛未可下之按之則痛為水結胃

不按而痛為大結胸

結胸証悉具而加之煩躁者不治

結胸有熱或煩渴先沖和加枳實次

下本藥

飲水不散而結 小半夏茯苓湯或

小柴胡加芍藥或五苓合枳實湯

枳木湯 實 酢 木 右

結胸喘促狂亂大躁用龍水一服

未効再服自然汗出愈

和熱在上胸膈痞結未辨虛實先與

理中加枳實芍藥或桔梗枳殼湯

分 結胸不可近用陷胸藥至効 枳

實 理中丸 苓 參 木 姜 炮

甘草略實斤六右煉蜜丸溫酒或白

湯下

湯者加粘莖

汗後未全解誤下之為小結胸煩渴

脈實宜 二黃瀉心湯 各等分 表

未全解亦不可用

熱實脈沉緊心下痛 大陷胸湯

寒實脈浮滑心下按之痛無熱証

三物小陷胸湯 白散亦可

項強如瘥或從心下至臍上手不可
近大陷胸湯

灸黃連一牙許為末巴豆七粒去殼
研細入黃連末檢作餅子按臍中以
艾炷如指頭大灸之輕者一炷重者
不過二三壯熱氣入腹作聲取下惡
物而愈

意心下飽悶未經下者非結胸及表
邪傳至胸中未入腹小柴胡加枳桔未
效本方合小陷
胸加枳桔即愈

一痞

痞心下滿而不硬按之不痛曰痞硬
水停滯氣聚不滿不硬但妨悶者非
痞謂之支飲 小柴胡加桂 胸滿

而濡者半夏瀉心湯 旋覆代赭湯

旋 甘酪一參六字 赭三字生薑

一兩半八兩十二右 輕者 枳梗

枳實湯 枳 半酪一實附 陳仁

右或加苓耳又用苓白木耳草生

姜湯

胸滿硬按之不痛因脈沉緊 大柴

胡痞滿水便不利 五苓散

一腹脹滿

腹中滿痛 小柴胡 去芍

六七日不大便腹滿痛急下之小承

氣

大實痛者 桂枝大黃湯

譫妄脈沉數煩渴不拘日數調胃養

氣

太陽病反下之因而腹滿時痛 桂

枝芍藥湯

小腹滿硬小便自利如狂者血証也

小腹急結者 桃仁莢氣

小腹痛，尿不利，為無血，當逐利之。
一 腹痛，頭暈，小便不利，自汗，或發熱，或血虛，心
按之不痛，為虛，尺脈弦，腸鳴泄利。

小建中湯
按之痛者，為實，關脈實，腹滿而大便
秘，桂枝加大黃湯。
少陰腹痛，或泄利，通脈四逆加芍藥
湯。

陽脈瀉陰脈弦，泄利，桂枝芍藥湯。
厥陰証，小腹痛，當四逆湯。
飯酒枝，芍，細各三，耳灸，通草各
兩，棗五，附子右。

少陰病利而嘔，厥逆，腹滿，四逆五
味子干姜湯。

少陰腹瀉，泄而脈微，不惡寒，面
赤，裏寒外熱，通脈四逆湯加芍。

腹瀉時痛，桂枝加大黃湯。

咳嗽，掌林。
在表之邪，于於肺氣，則咳嗽，當發散
而愈。

太陽發熱而咳，小青龍。
表未解，心下有水，乾嘔發熱而咳，
小青龍。

發熱嘔噦而咳，小柴胡。
少陽寒熱往來而咳，胸脇滿，或泄利，
小柴，去參，棗，加五味，姜。

少陰四肢厥逆，腹瀉，或泄而咳，四
逆散，加五味，姜。

有痰而咳，大半夏湯。
春冬傷寒，秋夏傷，冷濕之咳，喉鳴，

上氣 橘皮湯 方見咳嗽門

小陰或咳或悸小使不利 四逆散

小陰腹痛尿不利四肢重疼自利而

咳 真武 加五味 細辛 干姜

一喘急

和氣外盛而喘 雖汗喘不已 雖經汗

下亦可發之 麻黃杏子石膏湯

麻 一分 杏 五十 膏 二兩 甘草 六分 右

脈盛自汗喘 大柴胡

大陽下之微喘者表未解也 桂枝

加厚枳杏子湯

水停心下小使不利腹滿而喘 小

青龍 去麻 加苓

汗後飲水多咳嗽 小青龍去麻加

杏 陰翕喘促或陰証脈伏喘促理中四

逆

腹滿而喘潮熱者外欲解 大柴胡

汗後潮熱不惡寒腹滿大便實喘

小兼氣 桂枝証反下之利不止脈促喘汗出

葛根黃連黃芩湯 葛 芍 甘草 各

一連 三 右

直視譫語喘滿者死汗出身潤喘不

休肺絕身汗如油喘不休命絕

一嘔吐

嘔吐先嘔後渴為欲解先渴後嘔為

未傳心下 赤茯苓湯 小柴胡加

嘔發熱柴胡証具心下急發微煩

大柴胡 胃腸滿嘔潮熱小柴胡加

芒 吐逆二便不通厥逆無脈 大承氣

月 廿 一

半表半裏証多嘔吐 小柴胡

胸熱腹痛嘔吐 黃連湯 連 其

姜 枝絡一參 半絡一棗二 右

嘔吐手足冷 小橘皮湯

寒多而嘔 理中湯 不飲水而吐

理中 去朮 加生姜

一經汗下閉脈遲胃虛冷而吐 干姜

黃芩黃連大參湯 絡等

發汗後水藥不下及諸嘔吐穀不下

小半夏湯

煩渴欲飲水水入即吐 五苓散

嘔而思水者急與 猪苓湯

有虛熱少氣氣逆欲吐 竹葉石膏

湯

瘧後餘熱在胃而嘔者 竹葉加生

姜汁湯

治熱嘔不可無烏梅

一渴和傳裏熱氣薰蒸焦膈

脈弦而嘔渴邪在半表半裏 小柴

胡加枳

消渴氣上衝心中夜熱 桂苓白

木甘草湯 桂三兩 苓四兩 白二兩 右

汗下後胸膈滿微結尿滿渴少嘔頭

汗出往來寒熱心煩 柴胡桂枝于

姜湯

汗多而渴 小柴去半夏加參 枳

脈浮發熱渴飲飲水小便不利猪苓

湯

下利咳嘔煩渴不眠 猪苓湯 汗

多者不用 汗後脈洪大而渴陽明脈長有汗發

熱而渴並 白虎湯

吐汗下後七八日不能表裏俱熱惡
風大渴舌乾欲飲水太陽服桂枝
大汗出煩渴中暈四肢冷汗出煩渴
並自虎加人參湯

夏至前後煩渴發熱不惡寒 竹葉
石膏湯

自利而渴尿白下焦虛寒甘草干姜
湯 其四兩 姜二兩 右

心煩欲眠自利而渴 理中湯

汗後脈浮煩渴 五苓散

小便不利而渴必發黃 茵陳五苓
散 茵兩 五苓兩 右末米飲下

陽明脈長而實有汗而渴 調胃承
氣

脈沉滑熱實煩躁而渴 大陷胸湯

陽毒發在煩躁而大渴潮熱咽痛
犀奴丸

汗下之後煩渴飲水 涼膈散及減
桂五苓 甘露 益元 選而用之

益元散方身熱
門又名六一散

一衄血

傷寒衄久不止梔子豨薟末吹入鼻

中脈浮鼻燥口乾漱水不欲嚥者是
欲衄也

發煩目瞑劇者必衄衄乃解

太陽脈浮緊發熱無汗衄者愈

脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯

脈浮自汗而衄 桂枝湯

六七日不大便頭痛熱衄 小承氣
或涼膈散 加生地

衄而渴心煩飲水水入即吐先五苓
散 次竹葉湯

瀉汗而失之熱瀉為血及吐血
犀角地黄湯 黃芩芍藥湯 黃芩芍

芍 甘草半
少陰病厥而無汗強發之必動血或
從口鼻出血或從目中出血下厥上

竭難治 姜附湯治本
血者頭汗出身無汗汗出不至足者
死

汗後熱退血不止新水濕紙貼於鼻
上及頂項數易之

傷寒七八日不解自胸上至頭面色
黑紫壅腫寸脈浮大而數是欲血而

不能出刺鼻中出血數升而安或兩
尺沈穴出血如射即安

一 證語

謹語身微熱脈浮大者生逆冷脈沈

細者日內死

直視謹語喘滿者死下利者死謂正

氣脫絕也

汗多亡陽反身和謹語此津液不和

也不可下 柴胡桂枝湯

傷寒發熱經水適來盡明者甚難治

熱入血室 小柴胡

發熱四五日大便穢小便赤謹語熱

厥急用 大柴胡

陽虛陰盛而謹言脈沉細弱者當溫

經助陽

謹言不惡寒反惡熱 白虎

煩不眠謹言 白虎加梔子

腹滿身重面垢謹言遺尿脈滑實不

可下 白虎湯

喘滿口乾咽爛或不大便久則謹言

是被火劫所致 白虎湯

下之緩熱病久神不清狂言脉虛而

長微弦滑 大承氣 柴胡飲

汗出謔言為風下之不利謔言有燥

屎 小承氣

潮熱反不食有燥屎大熱入胃水竭

煩躁必謔言又身熱汗出大便硬謔

言田田言並 調胃承氣

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不

利謔言身重 柴胡加龍骨牡蛎湯

歛鎮神氣

發狂

發狂邪執至極也新汲水濕布搭於

背上頻易之

熱病六七日未得汗脉洪數面赤目

張煩燥狂走大渴 大柴胡

不飽 承氣湯

血上逆則喜忘下畜則內爭其人如

狂犀角地黄湯 重抵當湯

喜忘如狂身黃大便黑血証也抵當

湯

胃滿唇痿舌青口燥漱水不欲嚥無

熱有瘀血必發往下血 犀角地黄

湯加芍

自利抵當湯下血脉弦而長調胃承

氣沉實有表証大柴胡小腹急結桃

仁承氣

陽毒狂躁發狂 桔梗大黃湯 桔

梔 芩 柴酪 大群其行 右

傳 汗吐下後熱甚脉洪數喘促身黃在 走三黃石膏湯連進三四服而愈

月五

升麻梔子湯 升一兩 柴三兩 梔十

膏二兩 生地汁一升 右入黃芩

吐下後及虛人未解發狂人參白虎

辰砂之類清淨火或寒水石昔連末

水調下又龍膽草一物湯治陽狂

火劫者周身用艾迫煖出汗其人反

陽煩躁驚狂 桂枝甘草龍骨牡蛎

湯

狂言直視為腎絕汗出復熱狂言不

食為失志皆死

一發黃

發黃寸口近掌無脈鼻氣冷不治形

身黃如疸直視搖頭心絕環口黎

黑溼汗發黃腸絕瀉內淫其久咳

發熱身痛身自俱黃太陽中濕 麻

黃連越赤豆湯 麻法根甘炙翹各

白皮待 右 各半湯

發黃脈浮緊不可下 各半湯

往來寒熱身痛發黃小柴胡加梔子

湯

脈浮弦咳逆短氣腹滿心脇痛鼻乾

無汗身自黃小使難潮熱少陽中風

也小柴胡湯大柴胡湯正日也六寸

身熱頭汗尿澀渴飲水此痲熱在裏

而身黃茵陳湯

身黃脈沉結小腹硬尿利在畜血在

下焦桃仁養氣

發熱頭汗渴飲水小便利大便快五

苓加茵陳

小便不利四肢沉重似癰不欲飲茵

陳五苓得湯小便利如皂莢汁則黃

從小使出也 小兒發熱得黃赤痢者
食後發黃用枳木內消也 心為肝苗

○林

一症 赤痢五死 一生黑痢十死 下
生有下之太早熱氣乘虛入胃故發
瘕有下之太遲熱留於胃中亦發瘕
有陽証熱藥多用胃熱焦爛發瘕陽
毒發瘕紫黑熱毒隔於內也不治

陽毒已深舌卷焦黑鼻燥狂言面赤
瘕如錦陽毒升麻湯五日可治六七
日不可治

○傳

陽毒生瘕 家臍散加飯
赤瘕熱証具咽痛 玄參升麻湯
溫毒嘔者 葛根橘皮湯 葛根
杏 芩 麻 甘 絡 一 右 半 湯
吐水眼赤口瘡下部生瘡咳而下利
黃連橘皮湯 連仁陳 杏 實

麻 黃 湯 半 湯 其 絡 一 右
冬溫受不正之氣至春發瘕爛癰疹

謂之溫毒 化毒丹
溫毒身無太熱煩渴大便實或腹滿

痛生赤瘕 調胃承氣
發斑面赤謔言脈大而無力或絕而

不見用參生地絡五炮附子大黃仁
半右

一

自利謂不經攻下為有溇泄
身涼脈小順身熱脈大逆

下利至甚脈不止者死

下利且十餘行脈反實者死

直視謔言下利者死

下利煩躁不得寐者死

下利手足厥冷無脈者灸之不溫脈

不遷者死

下利身熱腸滿乾嘔寒熱往來脈長

大承氣

發熱後重泄色黃赤此為有熱脈遲

而滑內實數而滑宿食 小承氣

自利清水心下痛口燥宜下

自利而渴白虎湯或黃連阿膠散

自利不渴 理中湯

咳而嘔者下利心煩不眠猪苓湯

腸垢熱也協熱而利必臍下熱黃芩

湯 芩 芍 其 各 等

鴨瀉寒也協寒而利必臍下寒理中

湯

自利十餘日不止手足微冷無熱証

理中湯

陽病自利便膿血者協熱也下後脈

數不解自利不止必燥熱而便膿血

俱犀角地黃湯

太便不利

太便不利脈數能食名陽結調胃承

氣大柴胡

脈遲不能食名陰結金液丹疏一 味 煎法見

麻厚朴湯 木 醜 朴 陳 其 酪 三

枳 半 酪 二 右 姜 棗

太便不利尿難有津液可作汗

尿數不可汗症似煩卧不著麈尾子

湯

太便堅小便數不可下 跋陽脈浮瀉

麻仁丸 枳實丸

三下不通不可攻當吐之

小便不利

小便不利和熱當於內瀉液不下行

故不利

汗後小便不利微熱消渴五苓散消其痞苓湯

汗下後尿不利心煩桂枝干姜湯

渴小柴胡

小便不利大便難上為微熱胃中

有燥屎

傷寒七八日身黃尿不利腹滿茵陳

湯

頭汗出尿不利渴飲水發黃茵陳

湯

傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利

利謹言身重不轉側柴胡龍骨牡

蛎湯柴胡芍藥生薑欬母參

枝苓各三六行棗枚半合龍骨

各二右

四逆林掌百

諸四逆不可下

吐利煩躁四逆者死吳茱萸湯主之

九見

發熱七八日身冷名藏厥難治惡寒

踰脈厥逆陰氣極不治

得病後四肢逆冷脈沉細足攣卧惡

寒不飲水下利清穀陰厥也四逆

湯

手足指頭微冷理中湯

無熱証而厥當飯四逆加吳萸更生

姜湯虛者宜附子湯

陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆

脈微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛

或乾嘔或咽痛或利止脈不出者此

陰盛於內不相通也與通脈四逆湯

寒熱而厥面色不沢多冒昧兩手忽無脈或一手無脈必是有汗也與各半湯厥而心下悸先治其水茯苓甘草湯 苓 枝格二半 其格一 生姜仁 右

初身熱頭痛已後六便秘小便赤或畏熱或飲水煩躁不眠譫昏而厥陽厥也 大柴胡 厥而渴白虎

脈沉滑頭面有汗爪溫二便秘赤四肢逆冷熱深也 承氣湯

○傳

裡熱內盛陽厥極深皆因失下以致身冷脈微昏將死切不得以寒藥下之誤下即死又為陰厥與溫藥必死但進涼膈解毒養陰退陽如未愈解毒合承氣少下之次解毒 涼膈 天水合而為一用之

舌胎

舌胎傷寒二三日後舌上有膜白滑如胎甚者或澁或黃或黑皆熱氣之淺深也表邪無舌胎和氣傷裏深液結搏則舌胎伸長白舌上台胎不可致與小柴胡

腸下鞭滿不大便而嘔舌胎小柴胡熱聚於胃則舌黃熱深也未下者下之

黑滑亦下之經曰熱病口乾舌黑者死

咳逆 蘇掌

胃有寒又飲水而咳逆先與理中湯

次用旋覆代赭湯 旋 甘酪 一參

六不赭仁半八生薑六兩棗對二右

青龍去麻加附脈微細橘皮于

美半夏生姜湯 卷活附子湯 卷

附 茵絡半一木行于生姜 右

脈浮洪或有熱而咳逆者火熱奔急
上行肺不得納故也 甘草瀉心湯

甘草瀉心湯 姜兩半連 參兩半半兩

分棗散 右

少陰因失下所致大便硬大承氣大
便軟瀉心湯脈散者死

藥不効硫黃乳香等分末酒煎急令

變之

灸期門婦人屈乳頭向下盡處骨間

丈夫及乳小者以一指為率

頭汗謔謔腹滿微喘而見咳逆此危

証

一悸動

悸動有氣虛有停水有汗多榮虛神

弱汗後膈下悸欲驚奔豚 茯苓桂

其大棗湯 苓兩枝一兩其餅棗四

右 發汗過多心下悸欲撲 桂枝甘草

湯 桂枝仁甘草各右

發少陽汗則謔謔而動悸 小柴胡

飲水多厥而心悸雖有他邪先治水

茯苓甘草湯 苓 枝絡二其仁生

姜仁

往來多心悸尿泄煩嘔 小柴胡

脈代結心悸 炙甘草湯

四逆而悸 四逆散加桂

一戰慄

戰慄并振証戰外慄慄心戰為病欲

解也正與邪爭則為鼓慄而戰振但

虛而不至爭故止發動而振也與桂

苓朮末并草湯溫經 桂仁苓細木
并絡二右

汗下後戰與 救逆湯
發汗後不解仍發熱悸眩暈振真武
湯

吐下後裏虛氣上逆陽不足起則眩
脈沉取弦者汗則動經振搖桂苓朮并
草湯或小便建中湯

卒口噤背反張搖頭痙病也風主動
故也形軀如爛宜視極頭心絕
一身痛

大陽無汗脈浮身痛拘急 麻黃湯
中濕身痛難轉側尿不利五苓散尿
利者木附湯

陰毒勢沉篤身痛如被杖嘔利唇
青面黑陰毒 甘草四逆湯 真武
湯

汗後脈沉身痛血不足 桂枝加芍
藥半夏生姜湯傳桂枝加參治汗後
身痛脈沉者 小建中湯
一咽痛不可汗不可下

少陰腹痛猶有熱咽痛 黃連龍骨
湯 連兩苓 芍各一龍辭 右
脈緊主無汗反有汗曰下陽當咽痛

甘草湯
陽毒脈浮數而大時膿血 烏扇膏
咽痛下利四皮冷無熱証理中湯加
并一倍

非待暴寒伏於少陰之經脈微弱而
咽痛次必下利腎傷寒也先半夏桂
枝湯煎味各等分次四逆湯

一蛔厥
其湯煎味各等分次四逆湯

林蚘厥元有蚘為藏寒。蚘上入膈時煩。

得食而嘔。自吐蚘。或因發汗。胃中冷。

故長虫出。或因胃氣困乏。不能食。食到

巨。蛇聞食氣而上。以理中。凡烏梅丸。

訪。見溫胃消渴吐蚘。理中加大黃。入

蜜以利之。

嘔吐蚘者。雖有大熱。忌涼藥。蓋胃中寒。

蚘上。理中加干姜。烏梅。飯前服。蚘

定後。以小柴胡。退熱。

汗後不解。林

發汗病不解。反惡寒。虛也。芍藥甘草

附子湯。

汗後仍發熱。心忡動振振。真武

湯。

汗後身痛。脈沉。桂枝加芍藥人參

新加湯。

汗出。熱不去。內拘急。四肢厥。下利。

惡寒。四逆湯。

發汗過多。心悸欲按。桂枝甘草湯。

汗後腹脹滿。厚朴生姜人參湯。

大汗出。胃乾。不眠。飲水少。與之。

發熱。汗出不解。心中痞硬。嘔吐下利。

大柴胡湯。

服桂枝後。煩渴不解。脈洪大。白虎加

林

得食

故長

巨。蛇

訪。見

蜜以

嘔吐

蚘上

定後

汗後

發汗

附子

汗後

湯。

汗後

發熱

大柴

服桂

大參

汗後

傳發

一。下

大。七

大。七

子路湯

下後腹痛時起不安施子厚桂湯有燥屎者大承氣湯

下後脈促胃滿桂枝去芍藥湯桂枝証誤下之利不止脈促者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯

過經十餘日一二三下之嘔不止心煩大柴胡湯

汗下後熱未能除用栀子豉湯或東垣加減涼膈散

勞復林

病後後勿早起振頭洗面勞體多巨思心令勞復

病後忌酒肉莫難消之物又勿過飽更結熱難救謂之食復

病後未滿自息氣力未平復而能房室者及謂之食復

勞復生熱脈浮以升解之枳殼栀子湯

瘵後渴林竹葉石膏湯

勞復發熱欲絕麥門冬湯門其灸等

食復脈沉實腹滿譫語枳實大黃湯

大柴胡湯林掌

陰陽易林男病新瘵婦與之交以陽易婦病新瘵男與之交以陰易婦則裏急腰膝連腹痛男則陰腫小腹絞痛

男女俱或熱上衝目頭重不舉眼生花離經脈見者死一呼一至損脈離

經一呼二至不至脈離經二脈易病有

以爛燒視散竹皮湯小便不利五苓

散

一狐惑之証

齒燥惡飲食，面目皴，乍白，舌上白，唇黑，有瘡，四肢重，喜眠，虫食喉，為惑。食下部聲，嘔，為狐。甚者，食，藏而死。上唇瘡，虫食其藏，下唇瘡，虫食其肌，以雄黃，銳散膏，納穀道中。

一瘡瘡聲嘔

桃仁湯，或黃連犀角湯，連辭犀兩烏梅，化木，化右。

一掌

藏結，其狀如結胸，飲食如故，時以下利，舌上白胎，臍痛，引陰，筋不寒，熱，云寒，而其人反靜，此藏結也，死。

一不治脈証

陽病見陰脈者死，代脈者死。

謔言身熱，脈洪大，生身冷，脈沉細，死。發斑陰脈死。

○

咳逆上氣，脈散，其鬲脈浮，瀦，難，下利，脈反實，逆。

吐衄，血脈浮大，凶，下不至，關，陽氣絕。

上不至，關，陰氣絕。

少陰厥逆，無脈，服藥，通脈，漸續，生。

脈暴出，死。

少陰四肢厥逆，下利，惡寒，而拳，發，躁。

無脈，不治。

脈陰陽俱虛，熱不止，脈乍疎乍數者，死。

死。

依脈，必是有正汗，服麻黃甘草附子湯，多衣，無汗者，脈不至者，死。

循衣摸床，熱內結，脈弦者，生，瀦者，死。

赤瘧出，五死，一生，黑瘧出，十死，一生。

發動氣，汗者，死。陰毒陽毒過，六七

日者，不治。

兩感傷寒者，死。

大發溫家汗則為瘧熱而瘧者死

結曾証見煩躁者死
發少陰汗則動血九竅出血者死謂
之下厥上竭

發少陽汗則謔言汗只在頭面不至
遍身衄血逆

發濕溫汗身青面變其聲不語不治
發風溫汗者死亦主謔言咳逆不止

者死 臟結者死 發厥至七八日
膚冷而躁無時暫安者名藏厥死

厥陰舌卷囊縮者死 少陰吐利煩
躁四逆者死 九甲青陽衰敗也

口乾舌黑不治 汗出如貫珠絕汗
也喘不休衛氣敗也 發黃變黑不
治 發汗不至足者逆

汗後嘔吐水漿不入逆
腹大滿下泄不治 目張目閉不治

舌本爛熱不止逆 發斑自利不治
陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹

絞痛手足攣者死
厥而下利當不能食反能食者不治

傷寒七八日以上大發熱者難治
視惑咽乾聲啞唇瘡不治

諸逆發汗劇者言亂目眩不治
張口出氣乾嘔骨熱痛逆

謔言直視或喘滿下利並不治
下利發熱或汗不止或厥不止並不
治

汗後不為汗衰發汗而不得汗發熱
脈躁疾狂言不能食者謂之二死

搖頭直視如煙薰心絕
唇吻夜青四肢多汗肝絕

反目直視往言遺尿腎絕

環口如蠶黑果汗不發黃脾絕

汗出如油喘促無已肺絕

木漿不入形骸不仁命門絕

絕及三四藏則死

一禁戒 掌林

服藥中病即停後服

瘵後百日犯房者死

瘵後少食糜粥常令稍飢勿飽

若食諸肉肥血油膩等物必大瀉難

治又莫勞射不可多言不可使意皆

勞復取汗但脉微弱遲細動氣瘵淋

亡血虛煩必不可用之夏時用桂

麻宜加涼劑其性熱故有瘵變之患

也

食燒肉消渴

食濕麥薄熱

食茄子成瘵

食莖菜失明

食魚能發黃

食黃瓜必無病

食生菜顏色不復

飲酒太早年悶飲白酒浮腫

汗後飲冷水損心包

早梳頭潮熱

早洗浴熱悶

思慮重則氣消

不得早起

早濯足必癩

躁怒成痞

遠行脚風

不得勞心費力

一發表解肌之劑

麻黃湯

治太陽脉浮頭身痛惡寒

發熱無汗而喘

其大杏仁

右先煎麻黃一沸掠去

上沫下餘藥煎去相濕服覆取汗冬

及春初宜用蓋性熱夏至後服發斑

○桂枝湯

鳴乾嘔スラ

治太陽中風發熱自汗鼻枝二芍一苓一甘草一右加

生姜二片太棗二枚煎冬及春初宜用夏至則加苓一錢夏至後加知一

膏一

○葛根湯

風身躄痛

治太陽陽明合病無汗惡葛半麻一甘草一枝

芍一苓七

右加姜棗

○小青龍湯

嘔咳發熱スラ

治表未解心主有水氣麻一芍一味一半一苓二

細姜一甘草一

枝一苓一右湯去半加

括一汗後飲水多咳喘去麻一加杏一

咳嗽心主有水氣而小便不利去麻

加苓半

○大青龍湯

寒脈弱汗出勿服

麻伍枝一甘草一

治傷寒見風或傷風見

○惠

○如聖飲

治剛柔二症搖頭口噤身反張搖擗面赤項強一羌風一芍

芷柴一芍一甘草一飯一烏一半

芍一右加姜煎入竹瀝姜汁一口噤咬

牙大便實者加大黃一無汗剛症加

麻一蒼一右有汗柔症加枝木一

○正

○六神通解散

治發熱頭痛發渴身

疼脈洪無汗

麻仁甘草一膏

滑一芍一苓一四一蒼一八一右入姜葱

○傳

○小柴胡湯

治傷寒四五日往來寒熱胸脅滿脇痛心煩喜嘔風濕身熱邪

在少陽經柴一芍一苓一參一苓一甘草一

半一分一右加姜棗

○大柴胡湯

治傷寒內實大便難不

惡寒反惡熱者 柴細芩 芍絡二
半 大絡二實一作右加姜棗以利
為度

林

○柴胡姜桂湯 柴二枝 芩絡三括

兩姜炮甘 蛎煨略 右

○

○半夏瀉心湯 半一兩芩 參 甘

炙姜炮略連辭 右加姜棗

○

○小半夏茯苓湯 半甌白苓 甌右煎

去滓入生姜自然汁熱服

傳

○小陷胸湯 治下之太旱變為結胸

胸中作痛痞滿 連三分半二升

萎連子按二右以水二盞先煮瓜萎去

粗納諸藥再熬

王

○黃連湯 治傷寒胃中有熱胃中有

邪氣腹痛欲嘔吐者 連 甘炙

姜 枝絡二參 半絡半大棗二枚

右

全

○柴胡飲子 治內實便難不惡寒反

惡熱 柴 參 芩 甘 大 飯

方 右等分加姜

○防風當飯飲子 治身熱便秘不惡

寒而煩渴 柴 參 芩 甘 飯

芍 風 滑 右等分加姜

○

○解利兩感神方大羌活湯 風 羌

獨 已 芩 連 蒼 白朮 甘

炙細絡三知 芎 生地絡一右

惠

○中和靈寶飲 治兩感頭疼惡寒發

熱口燥舌乾 風 羌 芩 甘

細 生地 芎 柴 葛 芷 膏

加黑右入姜棗取微汗為度如未

愈視表裏証多少用汗下

○

○柴胡雙解飲 治寒熱嘔而口苦甘

薑尿弦數多 小柴胡加芍陳入姜棗煎入生艾汁温服。嘔者入姜汁竹茹。脇痛加青皮。尿不利加苓。痰多加葶貝。

○桂枝麻黃各半湯 枝伍芍 芩 麻去根節 杏去皮尖炒 生姜大棗

○柴胡桂枝湯 柴三 細枝 芩 參 芍各半 半四 牡 牡 仁 姜棗

○小承氣湯 治六七日不大便腹脹滿悶汗後不惡寒潮熱在言而喘者

大枳 實 枳 右煎服以利爲度

○天承氣湯 治胃實證言五六日不大便腹滿煩渴舌乾口燥日晡發熱

脈沉實者 大枳 枳 實 各一芒 右煎服枳枳去粗內 大黃無煎

○調胃承氣湯 治大便秘結證言而嘔日脯潮熱者 大枳 枳 芒 合

右煎法同前

○大陷胸湯 治大結胸高起手不可

○京脯散 治表未解半入裏下証未

○黑奴丸 治温毒發斑煩渴及熱病

六七日未得汗脈洪大而數面赤在走滑其若微利不可用 芩

走滑其若微利不可用 芩

釜底煤灶 突墨 芒 麻 梁上
塵 小麥 奴酪 一大三細右為細
末煉蜜九新及水調下

○林 桔梗天黃湯 一大兩柴 芥 槐
一清熱生津之劑

○傳 有虎湯 治陽明証汗後脈洪大而
渴及虛煩中暈等証 知杖甘仁膏
一兩粳伍 右水煎待米熟去粗溫
服○口燥煩渴不止或發赤瘧參
名花斑湯又名參白虎湯○陽明
下後大便不固熱不退者或濕溫便
溼熱不退者加蒼朮

○林 竹葉石膏湯 去石膏名竹葉湯
膏仁兩八門一兩參 廿各三各半
四各竹葉仁右無服五錢內粳米三
一匙煎服

○三黃石膏湯 治瘟疫發在大便泄
者 膏仁芥 連 栢各半 豉餅麻
不施麵 右

○黃連解毒湯 治大熱不止乾嘔煩
渴錯語呻吟不得安眠 連仁芥
栢 栢各二右

○首蔞湯 首蔞大粒肥栢三枚右先
煎首蔞水一半內二味煎服

○梔子豉湯 治汗下後虛煩不眠
心中懊懣或大下後熱不去心下結
痛 肥栢四香豉餅 右先煮栢子
水減半內豉同煮去粗溫服得吐止
後服

○東垣加減涼膈散 退六經熱及傷
寒餘熱育煩 麴仁栢 苛 竹葉

芍 桔絡半 甘 生 行 者

○耳露飲 治汗下之後煩渴而欲飲

承 芍 膏 寒 苓 沢 略 二 木

枝 升 附 半 滑 和 右 爲 末 每 服 三

錢 白 湯 下

○神 梔子烏梅湯 治傷寒瘧後不得眠

梔 芍 各 半 柴 一 烏 梅 十 四 箇

右 加 生 姜 竹 葉 豆 豉

○鬼 逍遙散 治病新瘵患勞傷或陰陽

易 參 知 連 甘 生 地 消

薤 根 柴 犀 竹 青 痛 倍 如 右

姜 棗 木 煎 臨 服 入 燒 視 補 末 半 不 調

粘 汗 出 爲 效

○升陽散火湯 治撮空弄衣摸床謔

言 沈 昏 如 小 便 不 利 者 不 可 治 參

飯 柴 芍 門 芍 木 甘

陳 附 右 加 姜 棗 大 便 燥 結 謔

語 發 渴 加 大 黃 泄 瀉 者 加 升 木 炒

○道赤各半湯 治病後體弱不語目

赤 唇 焦 舌 乾 連 梔 芍 滑

甘 知 犀 神 參 門 右 加 灯

心 姜 棗

○酸毒湯 治吐下後心煩乏氣不眠

酸 枳 門 各 甘 一 兩 知 仁 苓 芍 姜

各 三 右

一 除煩益元之劑

○金 百水散 治病後氣脈不和食復勞

復 桔 芍 芷 陳 眩 青 眩 莎

甘 山 略 二 木 四 姜 二 兩 右 加 姜 棗

瓜 蘇 煎 煎 吐 瀉 入 白 梅

○增損百水散 病後服之生津止渴

順 氣 王 痰

木 葛 苓 藿 參 朮 各一陳

二乾生薑各右

○**溫膽湯** 治病後虛煩不眠并心膽

虛怯一切病後用 橘紅半 枳實

半兩 苓 甘 枳 右加姜棗竹茹

惠 ○**益元湯** 治身熱頭疼不煩面赤飲

水不得入口此元氣虛弱無根虛火

浮上非熱証不用涼劑 熟附 甘

參 姜 門 連 知 五味 葱

艾 棗 右

○**當歸活血湯** 治頭不夜不惡寒只

身熱渴小水利大便黑口無倫語此

內傳心脾二經今昏迷沉重不可作

熱証 飯 赤芍 生地 甘 姜

參 柴 枳 桃 紅 二服後去

姜桂桃紅加苓木右姜一片水煎

入酒三匙調服 ○**枳實梔子湯** 治大病後勞復者

實三 梔四 豉一 右

神 一涼血逐瘀之劑

○**犀角地黄湯** 治大便黑衄血脈微

發狂發黃當汗不出汗內有瘀血

芍 生地 壯 犀如無以升麻代

右之名二不

惠 ○**生地芩連湯** 治熱毒入深吐衄不

止 生地 芩 連 梔 桔 甘

柴 芍 芍 犀如無以升右入棗

二枚煎服入茅根汁如無藕汁亦

傳 ○**桃仁承氣湯** 外証已解小腹急木

便黑小便不利為瘀血証此藥去之

大行芒 桂 絡 半 升 芍 升 芍 升 芍

升 芍 升 芍 升 芍 升 芍 升 芍

右水煎去粗納苦丁... 為度

○抵當湯 治血結胸謔謔因瘀血結於胸中在言小腹亦滿飲水不欲嘔者

水蛭 虻虫 各十五枚去三足炒黃 桃十箇去皮尖研 右煎服血下止後服

一治瘰癧之劑

○傳 陽毒升麻湯 治陽毒赤斑出在言

吐膿血 升仁犀屑射下 芩 參 茸生各 右

○陽毒梔子湯 治傷寒壯熱身痛發

斑爛 梔子 升 芩 芍 柴絡一 膏仁知半 芩 伍杏七分 右入姜豉

○犀角消毒飲 治發斑癰疹 牛細

荆穗 風絡二 芩 仁犀 不入湯煎 右煎調犀末服

○梔子仁湯 治發斑煩燥面赤咽痛

潮熱 梔子 赤芍 大青 知各一 升 芩 膏 杏 祛 波 枳 柴 其 絡

○傳 玄參升麻湯 治發斑咽痛 玄參

升 芩 右各等分

○傳 大青四物湯 治瘟疫發斑 大青

細膠 玳瑁 其 炙 絡 香 豉 合 右

○解毒防風湯 治發斑及癰疹痒痛

風半 炙地骨 苳 芍 荆 枳 牛炒各七 右

○加味羌活散 治感不正之氣發癰

疹 羌 前 絡 一 參 桔 其 炙 枳 芎 天 苓 絡 半 蟬 苛 絡 三 右 加

○祖傳經驗加味敗毒散 治瘟疫及

瘰癧等証 敗毒加散 芍 木
風 荆 蒼 生地 絳等入姜棗此
因虛而感風濕而發斑者佳

○調中湯 治內傷外感所發陰斑

蒼半 陳紅宿 霍 芍 煨其炙桔
半 芷 菴 枳 絡七 芎 旣麻 枝
絳二 右加姜

○陰毒升麻鱉甲湯 治陰斑 升仁

飯 廿 各一分 椒二 鱉炙一 雄廾
研 右煎調雄未服
一分利之劑

○五苓散 治傷寒中暗煩躁小便不

利而渴或霍亂吐利 沢半 兩苓
木 猪 酪一 桂 朮 右為細末每服
二三錢白湯或清米飲調下或細切加
姜棗煎服其去桂加苓

○猪苓湯 猪 苓 膠 沢 滑

右各等分水煎去滓下膠候消服

○赤茯苓湯 赤苓 陳 參 各二木

芎 半 酪一 右

一道痰之劑

○加味道痰湯 治內傷七情致痰迷

心竅神不守舍如鬼祟憎寒壯熱頭痛
上氣喘息口出涎沫為傷寒治誤

苓 半 陳 實 星 甘 木

桔 參 菴 芎 連 右劉姜棗

木煎隨服入竹瀝姜汁

○全 大橘皮湯 治傷寒嘔噦胸滿虛煩

不安 陳 參 酪一 甘 朮 右每服五
錢加生姜片

○小橘皮湯 治傷寒嘔噦手足逆冷

陳 兩 生 姜 兩 右

○林 大半夏湯

半 白苓 生姜倍一

右加棗箇

○小半夏湯

半 甌赤苓 右加棗箇

一 溫經溫中之劑

○林 四逆湯

治即病太陰自利不渴及

陰証脉沉細而遲身痛 附皮一枚去

脐生其後六姜紐右煎服取少汗而

愈

○林 通脉四逆湯

姜兩廿二附箇生用一

右傳無其有參

○茯苓四逆湯

苓兩參三附生一枚

片八廿字半二姜斛右

○傳 理中湯

治即病太陰自利不渴寒

嘔腹痛鴨溼蛇厥霍亂等証 慧日止

蛔者雖有大熱忌涼藥蓋胃中寒故

上加大姜炒烏梅二煎服細定後

小柴退熱參廿姜木餘半

右●如腎氣動者去木加桂○吐多

者去木加生姜○腹滿下利脉沉遲

而微者加炮附

○真武湯

治即病陰証脉沉細身痛

或發小陰汗筋惕肉瞤等証 苓

芍 生姜 附 去皮木仁右如咳

者加五味姜細絡一小使利者去苓

○下利者去芍加姜仁○嘔者去附

倍生姜

○姜附湯

治下後復發汗不得眠無

表証而脉微者 姜紐附生一枚右如

下利厥逆脉不至者加其倍姜面赤

者加葱九莖○嘔者加生姜○利止

脉不出加參三錢名通脉四逆湯○

咽痛加桔小陰証腹痛或泄利加芍

一二錢半

○^林附子散 治陰証唇青面黑身痛四肢厥冷熟附子桂枝木各二

姜炮半各一右加姜棗

○^全生料五積散 治感寒頭身痛惡寒嘔吐或感寒濕腰脚酸疼芷芍

甘草苓 飯桂芍 半酪三升

○^全陳根 麻酪六指耐二蒼四耐

右加姜葱

○^全白朮散 治陰毒傷寒心煩四肢逆

冷川烏炮去皮桔木附炮去細

各一姜炮半右

○^全桂枝湯 治傷寒服冷藥過度

心腹脹滿四肢逆冷眼昏不知人變

為陰毒惡証 桂木木

附炮參各一姜耐右入棗

○^慧再造飲 治無湯証頭疼發熱惡寒

項脊強無汗用表劑汗不出是陽虛

不能作汗冬月用之夏加苓膏也

芪參枝甘熟附細羌

風芍 生姜煨右劉棗二枚水煎

熟加炒芍一撮煎三沸溫服

○^林木附湯 治中寒中氣四肢厥冷牙

關緊急痰壅脈弱 木七分附三升

年三升右分二貼每貼姜十片煎

化藕合香丸併進

○^慧調榮養胃湯 治勞力感寒証中益

氣之加減參芪飯柴陳甘

木芍 生地細羌風右

入姜棗葱白

○^全人參養胃湯 治外感風寒內傷生

○^全人參養胃湯 治外感風寒內傷生

冷憎寒壯熱頭目昏眩及夾食停痰
俱能治之 蒼朮半 朴略一橘紅
七 藿 菓 苓 參 略 半 茸 後 半
右加生姜烏梅寒多加附 煎 其

一 瘟疫

傳 經 日 冬 不 藏 精 者 春 必 病 瘟 是 以 多
感 房 勞 辛 苦 之 人 安 樂 者 未 之 有 也
俗 名 瘟 病 醫 書 曰 疫 癘 皆 觸 冒 四
時 不 止 之 氣 而 為 病 龐 安 常 曰 疫 氣
之 發 大 則 流 行 天 下 次 則 一 方 次 則
一 鄉 次 則 偏 著 一 家 悉 由 氣 運 替 發
所 致 也 仲 景 無 治 法 後 人 用 敗 毒 散
治 甚 得 理 切 不 可 作 傷 寒 正 治 而 大
汗 大 下 也 但 當 從 乎 中 治 而 用 少 陽
陽 明 藥 所 中 者 看 陰 陽 脈 証 一 方 加 減

丹溪曰 衆人病一 般者此天行時疫
也 治 有 三 法 宜 補 宜 散 宜 降 用 大 黃
芩 連 參 桔 蒼 風 滑

沙 人 一 中 黃 神 麴 糊 丸 氣 虛 以 四
君 子 湯 下 血 虛 以 四 物 湯 下 痰 多 以
二 陳 湯

○ 敗毒散

治 瘟 疫 四 時 通 用 卷

獨 前 柴 芎 枳 桔 白 苓
參 略 等 其 絳 右 為 末 每 服 二 錢 加 姜
三 片 煎 服 或 沸 湯 頓 服 亦 可 此 藥 治
傷 寒 瘟 疫 風 濕 風 眩 肢 痛 增 寒 壯 熱
項 強 睛 眩 或 多 風 痰 或 處 卑 濕 之 地
脚 氣 痿 弱 此 藥 不 可 缺 一 方 加 薄 芎
少 許

○ 九味羌活湯

治 瘟 疫 初 感 一 二 日

間 服 之 取 汗 而 愈 其 効 如 神 卷

風 蒼各半 芍 芷 芩 生地 甘
絡二 細八 右

○天無神木散 治四時瘟疫頭痛項
強身痛增寒壯熱專主山嵐瘴氣之
妙劑也 陳仁蒼 朴各一 甘 藿
苜各半 右作一服加姜二片棗一
枚煎服下力無首右香附全

○十神湯 治時令不正瘟疫疾行或
四時感冒風熱頭疼身痛寒熱無汗
陰陽兩感並宜服之 麻 芍 甘
藜 葛 升 芷 赤芍 陳 蔞
各等 右加姜葱 如中滿氣實者
加枳殼全

○升麻葛根湯 治瘟疫頭痛發熱
升 白芍 甘 芍各十五 右
柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱
風頭痛發熱鼻塞咽乾咳嗽涕唾

粘 柴 前 赤芍 膏 葛 枳
兩 芍 桑各六 荆去梗十 升 右入
姜二片 豉十 余粒

○神木散 治四時瘟疫頭痛發熱及
傷風鼻塞聲重 蒼 藜 藜 芷

○林 細 羌 芎 甘 各 右加姜葱
辟瘟病赤小豆新布囊盛之置井中
三日日出與家服男十枚女二十枚

○又法熬豉和白木浸酒常服之
○又法用狐狸鼻尖及糞燒之以薰除
此病狐糞粘有竹木石間頭尖堅者
是也

○又雄黃研早晨水塗入鼻孔中及臍
臍亦可塗同床不傳染

○天行疫癘者東行桃枝剉煮湯合家

澡浴佳

○温病勞役及食復燒人尿在性爲未
酒調方寸七眼

天行瘟疫及小兒熱癩在啼大人酒
後暴熱用臘月八日雪磁罈盛之遇
此病服効

○屠蕪酒方

大椒 桔 桂 風

略半木 川烏 葶藶各一右八味

剉以絳囊貯之歲除日懸掛井中令

沉至泥正且出之將囊浸酒中略煎

向東從小至大飲之棄囊于井中

傳

○東垣曰大頭病乃陽明邪熱太甚資

實少陽相火而爲之也濕熱爲腫木

盛爲痛此邪見于頭多在兩耳前後

治法不宜藥速速則過其病上熱未

除中寒復生當視其腫勢在何部

○丹溪曰濕熱在首高巔之上用葱及酒

少酒蒸入黃隨病加減切不可用

降藥

○一黃湯 治大頭天行疫病 芥酒

炒連同生甘草等 右水煎徐徐呷

之○如未退用鼠粘子 炒水煎入

芒硝等分亦時少與母令飲食在

後○如未已只服前藥取大便邪氣

已則止

前方直各加引經藥○陽明行經升麻

膏○少陽湯加括○陽明行經升麻

葛芍甘○太陽行經荆風甘並與上

藥相合用之或云頭疼酒發口渴葛

身痛羌枝風芍俱宜加之

一 蝦蟇溫

傳 丹溪曰 蝦蟇溫屬風熱 防風通聖散
加減用之 或用水柴胡加風羌荆苟
桔煎服 外以側柏葉搗汁調火煨
蛭蚓糞付之 或用水香尖附子尖南
星醋調付之 或五葉藤車前草皆可
搗付之效

○ 萎蕤散

治冬溫頭面腫 萎蕤仁
半膏 菊絡半麻 白薇 羌 杏
其 青木香 芍絡半 右水煎

○ 大頭天行病從頭領腫熱者又名
鴻瘟 用羌酒芍酒大黃加減十五
六月眼小柴胡湯不愈者仍用陳蕪
發散而愈 又法酒炒芍連為君 水
其為佐 水煎細心呷之 再加鼠粘子
酒蒸入金黃煎入半 亦煩與合

○ 耳枯湯

治冬溫咽喉腫痛 其
桔各等 右水煎時久頻呷之

傳 二 感冒

○ 不換金正氣散 治四時感冒傷寒

瘟疫寒熱霍亂生瀉及出遠方不伏

水土並皆治之 朴姜 陳眩
半 蒼 米泔浸 其半 右加姜棗

○ 藿香正氣散

治四時感冒頭痛增
寒壯熱或風濕霍亂吐瀉 腹
蘇連 藿 芷 苓 絡 六

朴姜 木 陳眩桔 半 絡 四 其 二
分 右加姜棗

○ 清風百解散

治四時感冒頭疼發
熱鼻塞聲重咳嗽喘急等証 蒼
麻 荆穗 陳芷 絡 一 其 半 右加
姜葱 咳甚者加烏梅丁香

八餅散 治四時傷寒頭疼身熱惡

風多汗惡心嘔逆 參 木 苓

甘 陳 守 霍 朴 枳 等 右加

姜棗

和餅散 治四時傷寒頭痛煩燥身

汗咳嗽吐利 蒼 去 煎 藁 枳 甘

各半 陳 朴 枳 四 右加姜棗

香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡

寒 蘇 略 二 陳 兩 甘 枳 半 右加

姜葱 頭疼加芎芷

參蘇飲 治感冒風頭痛發熱咳嗽聲

重涕喘稠粘大解肌熱覺中快膈或

勞察潮熱往來並能治之 參 蘇

葛 木 半 前 苓 各 三 枳 麩 桔

其多陳半兩各 右加姜棗氣盛者去

十味苧藜散 治四時傷寒發熱頭痛

痛 苧 苧 藜 各 二 枳 苓 各 半

桔 半 生 甘 三 半 枳 三 半 陳 半 半

右加姜棗 頭疼甚加芷

沖和散 治感冒風濕頭目不清鼻

塞聲重皮膚倦怠怠欠伸此淚 蒼 枳

荆穗 兩 甘 一 兩 一 右煎服

中暑門 三

一 中暑中熱之異

傳 內經曰 謹而得之 為中暑 動而得之

為中熱

○ 暑熱之時無病之人或避暑於深堂

大廈得之者名曰中暑其病必頭痛

惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌

層大熱無汗為房室之陰寒所逼使
周身之陽氣不得伸越大順散桂枝
姜糖
等熱藥主之ヲ

○若行人或農夫於日中勞役得之各
日中熱其病必苦頭痛發躁熱捫之
肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣
以動乃為天熱外傷肺氣蒼木白虎
等涼劑主之ヲ

愚按傷寒論中一證曰中脘即中暑
也脈虛而微弱煩渴引飲熱自汗
此蓋得勞役熱而暑邪干衛之候
是宜東垣清暑益氣湯等補益之劑
一証曰熱病即中熱也脈洪而盛
頭身熱口燥心煩此蓋得之於冬
感寒邪鬱積至夏而發乃按暑而成
大熱之候宜黃連白虎解毒等清

之劑
方法

○王 中脘而死切不用冷宜溫養以湯
臍中嚼カカテ生姜或大蒜送下不能嚼水
研灌之或生乾姜末湯點下亦佳也

○傳 清暑益氣湯

治感長夏濕熱四肢

困倦精神短少胸滿氣促身熱而煩
小便黃而數大便溏而頻或渴或不
渴自汗身重脈洪緩スラ 按汗少蒼各
半升各參各木各陳各麴各沢各五
苓各栢各酒浸飯各青門各葛絡三

○ 五味糲右

○ 白虎湯

治暑熱發渴方見傷寒門

王 脈虛加參

○ 益元散

治中暑煩渴方見痢門

小使不利方見痢門

○香薷飲 治暑熱腹痛霍亂吐利煩
心等証 薷 行 朴 姜 扁 紗 各 一 右 水
煎 氣 膈 者 不 可 過 多

○黃連香薷散 治証同前前方去扁
加連 七分

○十味香薷飲 全 疴 暑 氣 和 脾 胃 常
一 參 陳 水 苓 扁 莖 凡
朴 各 半 右

○桂苓甘露飲 治伏暑發渴脈虛
桂 參 莖 苓 木 甘 葛
沢 膏 寒 水 略 一 滑 二 水 一 右 煎
采 白 湯 下 五 無 莖 有 薷

○生脉散 參 五 味 門 各 等
右 水 煎 夏 月 時 久 代 熟 水 飲 之 每 日
加 莖 其 令 人 氣 力 湧 出

○縮脾飲 解 伏 熱 除 煩 渴 消 暑 毒 止
吐 瀉 霍 亂 縮 果 烏 梅 肉 甘
一 兩 苓 陳 甘 麥 略 良 行 右
塩 一 捻 水 煎

○五苓散 治中暑煩渴身熱頭痛霍
亂吐瀉尿赤少如心神恍惚加辰砂
名辰砂五苓散 亦見傷寒門

○枇杷葉散 治中暑伏熱煩渴引飲
嘔 噦 惡 心 頭 目 昏 眩 杷 炙 丁 陳
去 白 朴 糊 各 兩 藿 牡 不 茅 門 甘 炙

○香薷散子 治伏熱吐瀉霍亂煩悶
參 苓 甘 炙 蘇 凡 沢 薷
半 一 扁 炒 陳 烏 梅 朴 略 等 右 入
姜 棗

○暑夏月傷暑發熱汗大泄無氣力脉重細而遲此暑傷元氣也 參 芪 苓 門 白芍 陳 白苓 絡 一連 炒 其 五 分 栝 分 末 二 分 知 薑 栝 七 右 加 姜 煎

○夏暑如在途中常服壯元氣驅暑免中暑霍亂泄痢等証 參 二 分 門 白芍 炒 白苓 絡 一 五 味 附 粒 末 五 分 其 炒 五 知 炒 陳 薑 栝 七 分 炒 三 右 加 姜

○夏秋暑熱因過飲食冷物傷內又取涼風傷外以致惡寒發熱胸膈飽悶飲食不進或嘔吐泄瀉此內外俱傷寒冷也 參 姜 炒 紫 朴 煨 木 陳 菴 實 白 一 苓 絡 一 木 半 一 其 各 五 右 入 姜 木 煎

中濕門

○傳 居卑濕之地或衝任風雨或辛苦淋瀝衣皆外感之濕也 恣飲酒漿多食肥菓之類皆內傷之濕也

○外感多痿痺附腫疼痛內因多中滿痞膈瀉利

○脉沉而緩沉而細微皆中濕

○脉滑數尿赤澀引飲濕熱小便自利大便溲身疼自汗濕寒

○傳 一身盡腫癰或無汗是濕流關節邪氣在表五苓加羌蒼微汗之

○自汗多者宜白朮甘草湯

○小便自利清白大便泄瀉身痛自汗為寒濕五苓散加生附蒼朮

○一懷湯加酒芍 菴 蒼 通 散 風

行濕最妙方

○防己黃芪湯

治風濕脈浮身重汗

出惡風或周身疼痛

已行其本

半木仁莢二粒右作一服加姜三片

棗一枚

○加味五苓散

治濕勝身痛小便不

利脉重發熱者本方中加羌活一伍

○陳風濕羌活湯

治風濕相搏一身

盡痛

羌壯風升

柴各五

藁 蒼絡一右

○羌活勝濕湯

治肩背痛不可饑此

手太陽氣鬱而不行以風痰散之各

痛項強腰似折項似拔此足太陽經

不通行此藥主之

羌 獨各一藁

風 甘炙亨各五

蔓三 右如身重

腰痛沉人然經中有寒溫加酒洗

○防己黃芪湯附子加重者經

○家傳白朮湯

治中濕身痛難轉側

及皮肉痛難者朮 木屑細切酒下

盡半煎至一盞去粗服

○對金飲子

治脾胃受濕腹脹不食

身重皮屑微逆肢節酸痛 平胃散

一兩桑白炒一兩右為末入麩煎服

瘧疾門五

傳

經曰夏傷暑秋為瘧瘧云云瘧得於

暑當以汗解或因取涼太過汗鬱成

聚其初感也弱者即病胃氣強者伏

而未動至於無感復因內傷其病及

作宜其難瘧夫暑與風皆外邪也故

非汗多不解今之過此疾者已經無

三叔試胃氣重傷何以得愈欲治此証必先與參朮等補劑為君加柴葛等發散藥漸而取汗得汗而風又行補養下條屬陰最難得汗補藥力到汗出至足方是佳兆

○當以汗之難易較輕重

○大忌飽食遇發且食飽病愈重
○陰虛証午後惡寒發熱至晚亦微汗而解脈必虛濡而數且瘧脈弦而虛脈不大弦為辨耳

○暑瘧宜入參白虎湯之類
○在痰者一二陳湯加常菓柴

○不能食者必於飲食上得之當從食治虛者必用參朮一二貼托生

○不使下陷後用他藥有汗要無形

帶補 氣為主散無汗要有汗散邪為主

○渴者 生地 門 天花 膠 知 妙柏 葛 甘生

○大渴大熱 小柴胡去芩加知 門 連 栢 杷 天花

○久瘧 一陳加芎 蒼 朮 葛 朮 一補 一發散也

○痰帶胸膈熱多寒少大便燥實 大 柴胡利之

○久瘧不得汗以一二陳湯倍加一二朮少 加 枳

○小兒瘧疾若有痞塊方生地各半陳 芎 半 苓 妙各二分入生姜煎調 醋炙驚甲末

○瘧母用丸藥消導之醋煎為君 稜

○ 莎 海粉 青 桃 紅 麴 芽
隨証加補為丸醋湯送下

○ 老癩風暑入在陰分用加藥引出
陽分而散 川芎 撫芎 飯 紅

蒼 朮 芷 柏 甘 煎露一宿
服之

○ 著 日久虛癩寒熱不多或無寒但微熱
者加氣既無之入物加柴芍芍陳

補氣血
陽癩多汗用參芍末飲之無汗柴末
芍甚發之

陰癩多汗用飯方地芍柏飲之無汗
柴木芍升紅發之

○ 傳 截癩常山飲 常 菓 枳 知
其 炙 烏梅 穿爛火右等分每服五

錢水酒各半盞煎至八分露星月一
宿清晨冷服飲吐則順心之忌熱湯

然常山性暴燥善逐痰飲大傷真氣
虛弱者勿輕用

○ 截癩七寶飲 常 菓 枳 其 炙
朴 青 陳 各半 右作一服酒水

各半盞寒多加酒熱多加水煎八分
露星月一宿空心冷服忌熱茶湯一

日至午食溫粥
○ 百虎加桂枝湯 治溫癩膏 伍知
細其行桂枝行類分右

○ 祖傳截癩神方 通 尤 常 穿
醋炙黃 辰 研 梅 斮 大 棗 斮 右 水 煎

先以重和辰砂末食後服藥
○ 一方 常 果 知 枳 各 一 酒 一

盞浸一日臨發日早服
○ 治癩不愈一服便止永不發其效

如神 常一不枚紅丁香律烏梅一
右作一服用好酒一盞浸之宿臨發
且清晨飲之

○心 截癘 穿 木鱉絡等為末一二錢空
心酒調下

○王 桂枝羌活湯 治處暑以前發頭項

痛麻浮惡風有汗 枝羌 風

甘絡等 水煎逆發而服之如吐加

半夏

○麻黃羌活湯 治証如前惡風無汗

麻黃 羌 風 甘絡等右

○清脾湯 治脈弦數壯多寒少口苦

咽乾大小便赤澀 青 朴 木

菓 柴 苓 半 芩 甘 各右

加姜

○鯨魚甲飲子 治瘧久不愈腹中結塊

名曰癘母肝之積也 鯨魚 木

菓 枳 苜 陳 白芍 其 各

○林 清脾湯 治脾癰食癘 朴 青

守 梅肉 良 絡二菓 甘 五右

姜三片棗一枚

○人參養胃湯 治感風寒內傷生

冷發為瘧癘 蒼 朴 制半制各參

苓 菓 霍 各半 橘紅 三 分 一

方加桂右每服八錢姜伍烏梅簡水

煎

○參 諸癘 辰 魏 等分為末糊丸

丸每服一丸空心人參湯化

下以諸藥不損脾胃最為穩當

百草霜 黃丹 等為末每服一二錢發

日空心米飲調下不過兩服愈發時

再服世

○痰癘 小柴胡加枳

○小柴胡湯方見傷寒所 神治熱多

寒少頭暈目滿咽乾如渴甚而嘔去
半加大花腎下痞滿加枳

○痰癘發於子午卯酉且寒熱嘔吐舌

乾口燥少陰經癘也二陳加飯芍栝

連柴之類○發於辰戌丑未且寒熱

嘔吐不食或腹滿自利太陰經癘也

二陳加一二木柴芍之類○發於寅申

巳亥且寒多熱少或腹痛引陰如淋

狀厥陰經癘也二陳加桂枝附姜之

類

○老瘧飲 治久瘧成癖在胃腸諸藥

不效者 蒼朮 藜蘆 青 陳

良格半苓 芷 枳 藜半 甘 炙 棗

姜 炮 絡 菴 苧 絡 二 右 入 壺 少 許 煎

○林 一方 治瘧用雄黃 瓜蒂 赤小

豆為末每服半錢溫水調下以吐為

度

○一方 治勞瘧 鱉甲二兩酥炙

為末臨發時溫酒調下二錢匕

霍亂門

○傳 陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下

痢憎寒壯熱頭痛眩暈

○河間曰因渴而大飲飲而過量或因

飢而始食食而過飽以致濕熱內甚

故陰陽交錯而不和是為吐瀉

○揮霍撥亂而不得吐瀉者此名乾霍

亂多死三因 用極鹹鹽湯令吐不吐

更服三吐及止吐定用理中藥
熱多欲飲水五苓散寒多不飲水理
中丸

○河間曰凡覺此証急用五苓 益元
桂苓甘露 及吐瀉之聖藥也慎勿
與粟米粥湯吐瀉止過半日飢甚方
再與稀粥少食以漸將息

○轉筋屬血熱 四物加酒芍紅蒼星
男子以手挽其陰女子以手牽乳近
兩邊

○林 甚則轉筋入腹即死霍亂惡証無越
於斯

○內經曰脈伏者霍亂脈訣曰霍亂脈
微細者生微遲氣少不言者死

○厚 脈大者生微弱漸遲者死脈結律代
皆不可斷以死

○丹溪曰有且吐者雖自吐利還須以
吐法提其氣用二陳湯探吐或溫湯
皆可吐之

○委中穴出血或十指頭出血皆良法
○半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止

半 麴 苓 木 各五 淡桂 二 其
後一右為末每服二錢湯者凉水調
下不滑者溫水調下

○理中丸 木 參 姜 其 各等為
末煉蜜丸凉水化下

○天和湯 治霍亂吐瀉不止 木
半 縮 杏 參 其 各五 赤苓
藿 扁 姜 枳 瓦 各一 藟 朴 制 炒 各

右加姜二片棗一枚
○漿水散 治暴泄如水周身汗出盡
冷脈弱吐不止 半仁附 乾生姜

甘草桂各半良半右漿水煎

○姜附湯 治霍亂吐瀉轉筋手足厥冷多汗亦見傷寒門

○理中湯 治過食生冷成霍亂吐瀉心腹滿悶方見傷寒門加陳皮青皮

名治中湯更加丁附名丁香香治中湯

○厚朴散 凡霍亂不瀉用生姜理中湯

○五苓散 加五味門滑又曰冬用理中湯

○一方 治吐瀉 藿 蒼 朴 陳 縮 芷 甘 半 苓 參 麴 各 分 水煎遇寒加乾姜寒甚加附

○通脈四逆湯 治霍亂多寒身冷脈絕 柴二兩附炮一桂 通草 細 白芍 甘草 粳米 白 右水酒各半加

○五苓 夫獨加其

○木瓜湯 治霍亂吐下身熱轉筋入腹悶絕 凡用柴胡白芍各一右 入生姜蘘葉

○訶子散 治心脾冷痛霍亂吐利如神 訶 甘草 朴 製 姜 果 苓 陳 良 麴 各 右入鹽些少煎

○七氣湯 治七氣鬱結五臟之間陰陽不和霍亂吐利 半兩 白芍 苓 各 四 桂 朴 製 各 三 兩 蘘 陳 各 兩 參 兩 右加姜棗

○止渴湯 治霍亂煩渴 甘草 參 門 苓 桔 括 葛 沢 各 等 右 為末每服一錢蜜水調下

○麥門冬湯 治霍亂已愈煩熱不解

多渴小便不利 門 陳法半自苓
未徼格二甘炙參各一分小麥一分
右分二貼末一盞姜五片烏梅一箇
煎六分服

○**不換金正氣散** 治霍亂轉筋吐瀉
不止 方見傷寒門

○**藿香止氣散** 治濕氣霍亂吐瀉
頭

○**姜鹽飲** 治乾霍亂 鹽一兩生薑兩
切同炒黃色變以水一椀煎熟溫服

○**既濟湯** 治霍亂後虛煩不得眠
其甚者加童便一盞

○**洗法** 治霍亂轉筋用蓼一把去兩
頭水煎薰洗

○**一方** 用陳太參
參 其炙竹葉四兩門兩附兩半
伍右入姜五片粳米百餘粒
吐藥汗無法可治用井泉水半椀百

○**灸法** 治霍亂已死腹中尚有暖氣
用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海二
七壯又灸霍亂吐瀉上管中管各二
七壯 傳灸大樞氣海

又木穀不分而泄瀉灸木分七壯
又轉筋入腹欲死者使四人捉手足
灸臍左邊二十四壯

又轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外
踝骨上七壯

○**洗法** 治霍亂轉筋用蓼一把去兩
頭水煎薰洗

○**一方** 用陳太參

○**灸法** 治霍亂已死腹中尚有暖氣
用鹽內臍中灸二七壯仍灸氣海二
七壯又灸霍亂吐瀉上管中管各二
七壯 傳灸大樞氣海

又木穀不分而泄瀉灸木分七壯
又轉筋入腹欲死者使四人捉手足
灸臍左邊二十四壯

又轉筋十指攣急不得屈伸灸脚外
踝骨上七壯

內傷門七

一辨內傷外傷

○傳外傷風寒有餘之証發熱惡寒寒熱
 傑作其熱發皮毛之上鼻氣塞不通
 心中煩悶不安一時且增加愈甚
 ○內傷飲食勞役不足之証寒熱間作
 其熱蒸人燥熱發肌肉之間口鼻中
 氣短不足以息腹中不和口不知味
 大小便或閉或澀或心下痞悶或胸
 中痛

一治法

○傳惡寒發熱頭目沉重之証世醫不察
 內外虛實硬作傷寒用汗下之法故
 東垣先生著內外傷辨惑論脾胃論

等皆以扶植胃氣為本

○或內傷於痰與食清氣鬱于下濁氣
 塞胃中之候驟用補中益氣等藥則
 氣滿痞塞遂謂補藥小宜此証改用
 汗下而死故王安道著內傷不足中
 有有餘

○勞傷傷誠不足飲食傷當於不足中
 分有餘不足

○酒者大熱有毒氣味俱陽及無形之
 物也若傷之止當發散汗出則愈其
 次利小便一者分消其濕

○傷食心惡食氣氣口脈緊盛胸膈痞
 塞亦有頭痛發熱者但身不痛一陳
 加末查言蒼如聞食氣即嘔一陳加
 縮青

○傳有痰痰者有扶外邪者有熱鬱于內

傷內

而發者皆補元氣為主看所採而兼
用藥拔痰者補中益氣加半夏氣虛
甚者少加附子以行參芪之氣

○脉緩怠惰嗜卧四肢不收或便瀉從
平胃散

○脉弦氣弱自汗四肢發熱或便瀉或
皮毛枯槁從黃芪建中

○脉虛而血弱從四物湯而加芪

○真氣虛弱及氣短脉弱從四君子湯
或瀉或小使閉泄赤黃從五苓散去
桂

○傳
補中益氣湯 芪仁甘草 五參 病甚

木 飯烙七 陳旣 升 柴烙三 右

脾胃一虛肺氣先絕故用芪益皮毛
閉腠理不令自汗○上喘氣短損其
元氣用參補之○心火乘脾用參

瀉火熱補胃中元氣若脾胃急痛腹
中急縮者宜多用之此二味除濕熱

聖藥也未除胃中熱利腰膝間血升
柴升胃中之清氣又引芪其上升能

補衛氣之散用飯和血脉橘紅理胸
中之氣又助陽氣上升散滯氣或少

加補以救腎水瀉陰中之伏火也表
熱者一二貼氣和微汗而愈○咽乾

者加葛○心刺痛及血澁不足加飯
○精神短少者加參五味○頭痛加

蔓荆子甚痛加芎○頂痛腦痛加藁
細○有痰加半生姜○咳嗽夏加五

味門秋冬加連節麻春加佛耳款冬
○久咳肺中伏火去參○食不下及

胸中有寒或氣澁滯加木陳青寒月
更加益智草豆蔻夏月更加苓連秋

更加栝縮○心下痞悶加芍連○腹
脹加實木朴縮天寒加生姜桂○腹
痛加白芍其有寒加桂夏加苓葛為
冬加益智草豆蔻半夏○腸痛或縮
急加些其○臍下痛加熟地不巳是
寒地加桂○大便閉澀加大飯○脚
軟乏力或痛加栝不巳更加已○氣
浮心亂以硃砂安神丸鎮固之

硃砂安神丸

連半 硃砂 酒生地

酒飯身

其五分

右為末湯浸蒸

飭在津唾吞下食後服一方無飯地
用生其

謂中益氣湯

脈弦洪緩而沉時澀

四肢倦怠煩心腹難舒伸二便清利
而數或大便澀夏月飧滯完穀或便
後見血或白膿育滿膈壅咳吐此藥

王

補中益氣湯去飯加木一分或二分
如陰火蒸熱加生地分栝分○大便
虛坐或下而不下腹中逼迫血虛血
澀加飯身分○身軀沉重雖小便多
亦加苓分蒼分沢短栝分○胃氣不
和加半兩生薑分○有嗽加生地分
以制半量之毒○痰厥頭痛非半夏
不能除○腹痛春夏加白芍冬月腹
痛不可用芍只加乾姜或加半夏

升陽補氣湯

治因飲食勞役胃氣

不足脾氣下陷氣短無力不能寒熱
早飯後昏悶倦怠五心煩熱 朴分

製升 羌 獨 白芍 風 其分

沢路 五柴一分 生地七分 右加姜棗

○腹脹乃窄 枳倍枳○腹似硬加縮

步

○木香化滯湯

治憂食溫熱結中脘

心痞不食或胃脘痛

半斤

草薢溫熱畏

其後各七柴六木一

橘

紅各四實各四

飯各三酒紅分右加生

姜

○門冬清肺飲

治脾胃虛弱氣喘精

神短少或吐衄

花茸各二白

芍其後各參門

飯身各五

五味粒右

○白朮和胃丸

治久不食大便或閉

或澹此胃氣虛弱也

水一兩半

朴酪一陳法白

參五其後二實

其後二木一乾生姜石為末湯煮

蒸餅九米飲送下

○枳木丸

治痞滿消食強胃

枳一兩

右為末用沸湯泡薄荷葉

乾者亦可填間去葉用湯浸晚梗米

枳粉以原湯煮糊丸白湯送下加橘

紅一名橘皮枳木丸治元氣虛弱飲

食不消心下痞悶○加妙麴一炒麴

麴一名麴積木丸治飲食太過心

腹滿悶○加木一名木香枳木丸破

滯氣消飲食○加半兩名半夏積木

丸治傷冷食○加酒炒黃連酒蒸大

黃炒神麴橘紅各一黃芩各二黃

枳木丸治傷肉食濕麴辛辣味厚之

物填塞悶亂

治心腹卒痛

○備急大黃丸

治心腹卒痛

大巴及法膜乾姜各等右為末煉

蜜丸小豆大每服二丸

○丹溪保和丸

治宿食心腹飽悶脾

冒虛者勿服

查五麴少半略三

苓 陳去白各兩 蘿腹子炒翹各一麥

芽麴兩一右為末別用生神麴五水

入姜汁打糊丸白湯米飲下方無

二脾胃虛四君子湯送下

○祖傳遺源散

凡傷食寒熱久不已

或傷寒後食復以原食之物燒存性

一兩為末用生韭根葉并汁調服過

一二時以東垣枳實導滯丸下之

○枳實導滯丸

治傷濕熱之物積滯

悶亂大兩實麴麴半兩各一苓

連水各三沢仁右蒸饒丸以利

為度加木棋各二名木香導滯丸

○參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不

進或嘔瀉大病後補助脾胃極妙

參朮各一山扁各一姜汁浸炒

其桔薏蓮各一右為末每服

二錢薑湯調下方有縮一兩禁口

○麻用粳米湯下

陳法各一右加姜棗氣

不舒快中脫痞塞加莎縮欲進食

加曲芽吳菜洗蜀椒

○益胃湯

治頭悶動勞則微痛不喜

飲食口不知味陳熱氣短腸鳴便瀉

口乾不善食冷茵飯貴升

絡五其守絡二苓水參柴

益絡三蒼半右

○林 擬神散

收斂胃氣清涼肌表

參木苓山絡二麴扁炒知

生地其各一絡竹葉地骨門各

粉右加姜棗

○感應丸 治傷冷物不能消化或瀉

臭如抱壞雞子 百草霜錫底者 兩

杏二百四十粒 姜炮一巴 皮心油 膜去

薤二十 木半 丁一兩 右姜薤木

丁四味為末同餘三味用蠟六兩銚

化入好酒一升煮數沸 候酒冷其蠟

自浮於上取蠟秤用 春夏修合用清

油一兩 秋冬用一兩半 煎熟下酒煮

蠟四兩同化乘熱 拌和藥末九姜湯

○黑圓子 治宿食不消吞酸或腹痛

殭泄如痢 烏梅肉酢 百草霜分 杏

去皮尖 箇三枚 去半 九枚縮 二十

右為末麩糊丸姜湯下

○可魏圓 治脾胃虛弱食肉麩菓不

消化魏酒浸 桂 莪炒 芎炒 麩炒

青 蘿炒 木 姜炮 各百 草霜分 巴

去殼 油 箇 右為末糊丸姜湯下麩傷

用麩湯下生菓傷用麩香湯下

○著 人遇勞倦辛苦用力過多服之免生

內傷發熱之病此方主於補氣 莪

蜜炙一 參 門 陳 木絡 一廿 瓊

分味二十 右入姜棗劣 倦甚加熟附

細五

○養胃湯 治脾胃胃寒嘔逆惡心腹

脇脹瀉腸鳴泄瀉或有 外感寒熱如

瘧骨節煩疼並皆治之 藿 朴

半 苓 略 一 菓 附 其 陳 參

各 三 木 酢 右姜胚 棗枚 烏梅半

○補血湯 遇勞心思慮損傷精神頭

眩目昏心虛氣短驚悸煩熱並治

飯 白芍 白朮神 酸棗 門 各

不_レ言 生地 陳 施 甘 各五_レ參
二分 味 薑 五_レ右

泄瀉門八

傳 厚 痼 或 曰 瀉 白 為 寒 瀉 青 黃 赤 黑 為 熱

○ 大 抵 瀉 利 小 便 清 白 不 泄 為 寒 赤 瀉 為 熱

○ 又 大 便 完 穀 不 化 色 不 變 吐 利 不 解 穢 水 液 澄 徹 清 冷 尿 清 不 澀 身 冷 不 渴 脈 遲 細 而 微 寒 証 也

○ 穀 肉 消 化 無 問 色 及 他 証 便 斷 為 熱 穀 不 化 亦 有 熱 証 凡 火 性 急 速 傳 化 失 常 完 穀 不 化 而 為 澀 泄 者 亦 有 之 久 泄 穀 道 不 化 或 脫 肛 此 元 氣 下 陷 及 大 腸 不 行 取 命 而 然 木 芍 麩 陳 訶 蔻 玉 倍 烏 梅 為 丸 四 君 子 加 升 風 煎 湯 送 下

○ 瀉 水 腹 不 痛 瀉 四 苓 散 加 蒼 朮 倍 白 朮

○ 飲 食 入 胃 不 化 完 穀 不 化 氣 虛 參 朮 若 加 桂 升 柴 風 損 之

○ 瀉 水 腸 鳴 痛 一 陣 瀉 一 陣 火 四 苓 散 加 滑 石 通 施 伐 火 利 尿

○ 或 瀉 或 不 瀉 或 多 或 少 痰 海 石 黛 石 麩 為 丸

○ 腹 痛 甚 而 瀉 瀉 後 痛 減 食 積 以 大 實 曲 消 滌 之

○ 正 瀉 証 須 積 滯 已 消 後 用 斷 下 藥 便 固 止 之 多 成 痢 先 理 中 焦 次 分 利 水 穀 浴 中 不 效 然 後 斷 下

○若泄本屬濕多因食食不節治法消食燥濕利尿補脾亦有升提下陷之氣有用風藥勝濕亦有久泄腸胃虛瀉不禁者收止之

主方 木仁苓 芍各一兩 陳不其五分
傷食泄黃或食積加連朴實○尿赤瀉少加沢猪通施○口渴引飲加葛參門升梅○夏秋濕熱大行暴泄加連蒼沢升通○積酒熱瀉加連肉麩葛○寒月冷泄加麩姜縮木益○久泄胃氣下陷服利尿藥不效加參芪升柴○久瀉中虛食少難化加耆參麩大姜○久瀉腸胃虛滑不禁加訶藜末姜脂

○正瀉力 藜紅白滑春冬一兩二兩 夏二兩半 秋二兩 右為末姜汁調神麩作糊丸服

○茯苓湯 治傷冷飲泄瀉變作白痢或赤白相交腹痛食減熱躁四肢沉困無力 苓生一飯仁桂 甘各二分 猪苓各三沢五分 芍七分 蒼 生甘升 柴絡一右

○黃芪補胃湯 治大便一日三四次瀉而不多腹鳴尿黃 芪 柴 飯 身 益 橘紅絡半升仁其後半 紅 紗右

○治痛泄 木 炒白芍二兩 陳一兩 風 兩 右水煎或丸服久瀉加升六分

○白朮散 治濕瀉及食積濕熱作瀉 朮 芍 絡等 水煎或為末米飲調下

○神木散 治春傷於風夏必飧泄 蒼半 不藁 芍 絡 六 卷 分 其 分 三

細分 右加姜

○**胃風湯** 治註如前及治風冷乘虛

入腸胃泄瀉完穀及濕毒下如豆汁

或下瘀血或如魚腦參苓芍

飯桂木 白芍各等 右入粟米

一小撮水煎如腹痛加木香

○**生料五苓散** 治泄注如水方見傷寒門

加倉車倍木為末米湯調服○濕熱

甚下泄如熱湯者去桂加滑苓施通

之類○腹痛下泄厚冷不渴寒泄也

倍桂加菴木

○**胃苓湯** 治脾胃不和及夏秋之間

脾胃傷冷水穀不化平胃 五苓

○**漿水散** 治暴瀉身冷汗出脉微方見霍亂

漿水

○**理中湯** 治藏府停寒泄瀉不化方見傷寒門

理中湯

○**升陽除濕防風湯** 治大便閉塞或

裏急後重數至圍四不能便或有自

膿或血慎勿利之蒼四風仁木

白苓 白芍各一右

○**實腸散** 治泄瀉不止菴 訶 煨

菴陳 蒼 苓 朴 各二木

其各右加姜棗手足冷加干姜炮

○**赤石脂散** 治腸胃虛泄注完穀腹

鳴痛脂 煨 其 各 兩 縮 兩 菴 煨 八 右

為末米飲調下

○**六一和湯** 治暑月泄瀉此方見傷寒門 藟

朴各二 甘草炙 赤苓 扁 瓜 藿各

參 守 杏 縮各五 右加姜棗

○調中散 治腸虛泄瀉不止嘔吐不

食不 蒼妙 麩妙 桔各 一芽妙 益

橘紅絡三 藿 續 莪炮 姜炮 桂

苗妙 果酪 各半 其妙 三 右入姜棗并少

鹽煎

○袖 止瀉秘方 參 木 苓 其多 姜

炮訶祛 木 藿 菘煨 右等分前服

○全 粟殼圓 治暴泄不止 豎去 密多 菘

炮 右為末醋糊丸米飲下

○林 木香散 治脾腎俱虛泄瀉 菘煨

煨砂妙 木 白苓各 半 木 其多 各

右加姜棗

○二神丸 治脾腎虛寒泄瀉不食

砂妙 四 菘生 二 右為末以棗四十九

箇生姜四兩切同煮棗爛去姜研束

肉為膏丸桐子大塩湯下加 木詳 茵

兩名四神丸治脾腎虛腸鳴泄瀉腹

○五 五味子散 治腎泄 味二 菜半 兩

者綠 色 右二味炒香為末陳米飲下

○傳 祖傳 治腹痛泄瀉 艾葉 車前

葉各 一 握 右細切用水二盞煎至一

盞去粗入姜汁再煎一沸稍熱服立

愈

○灸法 治吐瀉不止灸天樞氣海立

愈

○林 同陷下則灸多百 會 脾俞 中

脘 關元 腎俞 大腸俞 長強

痢病門 九

○傳 丹溪曰痢疾乃外感兼內傷之候也

須分表裏治之在表者惡寒發熱身
首俱痛小柴去矣裏加蒼芎生芍陳
微汗以散之在裏者後重窘迫腹痛

下積早宜以大小承氣酒煎大黃湯
之類下之餘邪未盡更以芍藥湯香

連丸之類穢積已盡而更衣未息者
此大腸不行收令故也以固腸丸參

香散之類止瀉之
腹痛 白芍甘草為君飯木為佐惡

寒加桂惡熱加枳
腹痛因肺氣鬱在大腸之間以苦梗

發之後用痢藥一云實則可下虛則
以苦梗發之

初下痢腹痛用溫藥姜桂之屬勿用
參朮縱氣虛胃虛不可用

後重者積與氣墜下故兼升兼木
香檳榔丸痢門 保和丸之類內傷

發熱不止者屬陰虛用寒冷兼溫藥
升藥

孔痛因熱流於下 木 檳 芩
連加炒姜又云久病身冷自汗脈沉

小而孔痛宜溫暴病身熱脈洪大宜
清之

下血者宜涼血活血飯芩桃之類風
邪下陷升提之

溫熱下痢小便澀少煩渴能食脈洪
大而緩腹痛後重桂苓甘露飲暑門

送下保和丸
濕多熱少食少腹痛後重夜多利下

胃苓湯 金匱方送下保和丸
氣虛面色痿黃或枯白色疲倦痢頻

併痛後重不食脉細弱或微汗出黃芪建中湯下保和丸

○濕熱為痢不渴者建中湯加蒼朮下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍桂葛木苓下保和丸

○血氣大虛腹滿頻併後重不食或產後得此証四君方見虛加飯陳下保和丸

○下痢白積者芍藥湯加木陳耳滑桃

○下痢赤積身熱益元散加通芍炒陳木湯下保和丸

○下痢日久而不能起於床不食疲弱之甚者用參芪地榆縮

沢絡五木芍陳絡一飯杜壘甘炙木升白蘞絡三右煎服

○諸治痢主方芍絡二通木根枳絡一甘少○初後重加滑升加枳生芍無加條苓○日久後重

不去此大腸墜下也去枳枳用條苓加升麻根之○白痢加木苓陳耳初

欲下之加大黃○紅痢加飯芍赤初欲下之加大黃○紅白相交加飯芍

以理血加滑陳木以理氣有食積加枳實

○傳芍藥湯行血則便膿自愈和氣則後重自除此藥是也白芍仁飯尾

連芍絡一大分甘枳木桂絡五初後重窘迫甚者倍大黃加芒

紅○痞滿不宜通加實紅藏毒下血加栝紅

○黃芩芍藥湯治瀉痢腹痛或後重

身熱久不愈脈洪數及膿血稠粘者
芩 芍各二廿右煎服腹痛加桂
分熱服

○黃連湯 治大便後下血腹中不痛
謂之濕毒下血 連 飯各二右

○芍藥苗通湯 治便後下血腹痛謂
之熱毒下血 芍 飯 連各半大
三桂半一分廿三右

○大黃湯 治痢久不愈膿血稠粘裏
急後重日夜無度脈沉實者或初腹
痛甚者窘迫不安者 大黃一味好
酒浸半日煎去粗類服後以芍藥湯
和之又再服黃芩芍藥湯徹其邪此
乃蕩滌邪熱之劑

○香蓮丸 治下痢膿血相交裏急後
重 連二十兩用茱萸十兩同炒

木八兩 右為末醋麩糊丸米飲下
加石蓮 治禁口痢尤佳

○益元散 治痢之聖藥也 白滑石
廿 右為末白米調下

○神効參香散 治痢日久穢積已少
腹不病或微痛不後重窘迫只滑留
不止乃收功之後藥也 鹽 麩 帶
兩二陳三補 薤 麩 粳 苓 二補 四各
木 參 絡 一右為末每服一錢七清
米飲調下食遠

○祖傳和中飲 治痢疾不分赤白久
近服之但發熱禁口不可服 陳

木 苓 芍 各一 藜 七 廿三 陳 倉 米
仁 砂 糖 三 粟 殼 醋 炙 一 烏 梅 箇 右 作
一服加姜二片枣一枚水煎

○防飲 治痢後感寒濕脚膝腫痛

石鶴膝風 參 木 莖 飯 芎

熟地 芍 仲姜汁 薛各一 其 煖

不風 已 羌 膝各七 附童尿 履

皮臍七分 冬二分 右作一服入姜三片東二

枚

○禁口痢胃口熱甚故也用連參煎湯

終日嘔之如吐則再強飲但得一呷

下咽便好

○又用田螺搗盒臍中以引下其熱

又禁口不食者參苓白朮散方見內

加苜蓿陳倉米飲下或參苓蓮入些

少苜蓿為末與之宵次一開自然思

食蓮陳壁土一二味細末棗姜煎湯調

○**丹溪主方**

治熱痢血痢即古方

連 芩 栢 枳 白 芍 飯 滑

苤 桃 木 各 等 為 末 麴 糊 丸 加 大

黃米飲下

○**一方** 治虛弱患痢 參 三 白 苓 二

木 芍 各 一 蒼 苓 麴 糊 七 升 五 分

右水煎○下重加風 酒飯各一 枚

壯連炒泥絡六 甘 炙 滑 各 五 分 木 三

○治痢後脚細弱 蒼 苓 白 苓 板 各

兩 栢 五 右為末粥糊丸四物湯加

○**陳其煎湯** 下

○**黑丸子** 治宿食腹扁食泄赤白痢

○**駐車丸** 治冷熱不調下痢赤白日

夜無度腹痛甚 連 三 膠 飯 各 一

姜 炮 一 右為末醋糊丸米飲下

○**白朮聖散子** 治瀉痢久不瘥 并 婦

人產後痢 飯 菘 縮 榴 皮

訶 姜炮陳 木 甘 芍 等水煎

入乳香末空心服

○加減平胃散

久下痢則脾胃虛損而血不流於四肢却入胃中為血痢宜服此滋養脾胃 木 枳 各三

木 枳 陳 酪 一 甘 七 參 連 白

苓 膠 炒 苑 絡 五 右為末每服五

錢姜三片棗一枚水煎去粗服○血

多加朮○氣不下後重加枳木○膿

多加膠○濕多加朮○腹痛加桂芍

其○熱泄加連○脈洪大加大黃○

尿澁加苓沢

○加減木香煮散

治一切痢神妙

木 甘 飯 菘 參 桂 芍

訶 烏梅 枝 膠 炒 蚌 蛤 白 苓 各 五 罌 罌 一

半 蜜 右每服四錢姜三片棗一枚

煎去粗服

○加味四君子湯

服藥已多痢不愈

蓋攻擊藏有之藥轉覺難安宜用和

氣之藥 參 朮 白 苓 甘

菘 芍 罌 罌 炒 各 每服三錢姜三

片棗一枚

○百中散

治一切痢下日去五六寸

行只一服便疎 罌 罌 炒 赤 芍 罌 罌 四

右為末米湯調下忌生冷油膩魚鮮

等

○獨神丸

治痢疾 罌 罌 炒 罌 罌 為 末 煉

蜜丸如桐子大每服五十九○赤痢

甘草湯下○白痢干姜湯下

○倉廩湯

治瘧痢俱作寒熱腹痛煩

渴及禁口者 柴 紅 煎 三 卷 獨

枳 桔 參 苓 芍 絡 半 其 炙 一

苛半加苓半右分二點姜五片東
一枚倉米燂水煎服之三五貼之後
後重服痛寒熱煩渴脈沉實以大柴
胡湯宜下之

○葛根湯 治酒痢 葛 枳 半

苓 生地 杏酪二分 苓一分 其粉

右分二點 黑豆百粒 姜五片 白梅

一箇水煎

○全 真人養湯 治下痢膿血腰痛及酒

毒便血 鹽蜜炙三分 參 飯 木焙

六桂八訶皮二兩 木一兩 葱起煨

白芍六兩 其一兩 右水煎藏寒者

加附三

○調和飲 治下痢稍久者 白芍三

芍 苓 連絡 一飯 桃絡 一升紅

右水煎

氣調十

○傳 內經曰百病皆生於氣也若不調攝

者五志之火無時不起五味之偏

無敗不傷是以釀成膠痰固積滯

於六腑鬱火和氣充塞乎二焦使氣

血失其常候腑臟不能傳導是故外

邪得以乘虛而湊襲

○脈經曰脈澀者多血少氣濇者少血

多氣大者血氣俱多脈來大而堅者

血氣俱實小者血氣俱少細而緩者

血氣俱虛代者氣衰細者氣少

○心 氣結則生痰痰盛則氣愈結故調氣

必先豁痰如七氣湯半夏為主官桂

佐之調氣雖用豁痰亦不可無溫中

之劑

○傳 一陳湯方見 氣結于胸臆之間而

為痞滿刺痛伏梁等証者加連實結
萎木之類。在中焦而為痞滿脹急
者加木朴枳椇或用平胃散。在下
焦而為奔豚七疝等証者加桃查枳
枳核茴棟荔枝之類。在兩脇攻聚
作痛者加青柴方膽之類。
○婦人胎前產後一切氣疾作楚者四
物為主加行氣之藥。

○**七氣湯** 治五藏不調三焦不和心
腹痞悶脇助脹面肢浮腫大便秘
難參桂半絡二其後一

右作一煎入姜三片葱半兩桂兩參
其各五

○**四七湯** 治証同前方見痰門

○**三和散** 治証同前又治背脇痛効
食及脚氣攻胃腹滿悶大便不通

羌 薤 沉 凡 腹絡一尋六分
其炙陳木枳木路九一方加
生姜 縮 燈心各一右

○**木香飲** 治氣滯
六名流氣飲
治氣滯
脚浮腫無不効 薤青飯酒芍

烏 苓 半 耳炙芍 芪炙
實炒風 枳 枳 腹子 姜汁浸
路八陳二分木烟右分一煎姜二片
棗二枚水煎

○**木香流氣飲** 治氣痞胃膈膨脹面
目四肢浮腫一便秘 半兩村 青

藜梗莎 其炙路陳二斤桂 枳
我煨下皮不見腹 薤木 果絡
兩通法簡門 芷 木 赤苓 凡

參 各四 右每服四錢姜二片葱
一枚

一五去藿藹加沉兩六枳兩四大黃兩一
快氣湯 治氣積心腹脹滿胃塞石

酸痰逆嘔吐宿酒 香附炒一縮

兩并酸二右為末塩湯煎服或入姜煎

抑氣散 治七情所傷中脘不快氣

不升降腸脹上 莎炒四陳兩三甘五

右為末每服二錢食遠自湯煎服心

妙女人尤宜服

分心氣飲 治因憂思氣留滯胸膈

痞悶嘔吐頭眩口舌乾食積漸羸瘦

藜細羌半桂青陳腹

桑炒通芍其炙赤各一右每

貼七錢姜仁棗一枚燈心十莖○氣秘

加枳炒萊炒皂角子各一

分心氣飲 治証同前 桔炒明

菓 腹皮絡一木 桑炙腹子 朴

木 參各半 莎炒藜 陳 藿各半

丁皮 其炙絡右入姜棗灯心十莖

藜合香丸 專能順氣化痰并治傳

屍骨為平心痛鬼魅赤白下痢小兒

驚搐等証 沉 麩研訶梨用下

木 安別研用無灰 莎炒櫻 木

檀各二薰別 藜合香油入安息

鴨研各硃飛烏犀酪一右為末和勻

安息膏并煉蜜和劑丸如梧桐子

大空心温水化下因丸酒服亦可

要沉通氣湯 治三焦氣滯不能宣

通腹脹便秘 藜 枳炒陳祛赤

苓 其炙核酪一沉 木 明 味

桑 莖 姜 芎 荆 實祛炒各

○木香煨榔丸 疎三焦利胃膈破痰

逐飲氣消食 木 煨 青

陳 莖煨連 枳 炒各相 大酪三

沙 炒 牽 酥 酪 右 爲 末 水 丸 如 桐 子 大

每服二十九食後姜湯下

○正氣天香湯 治婦人氣痛或胃脹

腹中結塊刺痛因之月水不調或感

嘔寒熱及胎前產後一切氣証

烏 半 不 莎 炒 陳 藜 姜 酪 半 右 水

煎

○沉香降氣湯 治氣不升降胃膈痞

悶吞酸 沉 四 縮 紅 其 一 次 一 兩

莎 炒 便 浸 右 爲 末 每 服 一 錢 入 薑

少許白湯調下

○異香散 治胃氣不和腹脇膨脹飲

食難化 切 冷 氣 結 聚 莖 稜

益 其 煨 絡 青 陳 枳 炒 一 蓮 心

○和氣散 治脾胃不和中脘氣滯腹

滿嘔吐 青 茜 炒 蒼 其 炒 酪 陳

任 桂 良 莎 枳 酪 右 爲 末 薑

湯點服

○順氣木香散 治氣不舒噎膈胃氣不

痛及酒食過傷噎酸 蒼 枳

茜 炒 酪 姜 炮 陳 枳 枳 一 皮

其 炒 良 桂 木 酪 右 爲 末 薑 湯 點 服

或入鹽少許沸湯點之亦所

○紫菀子湯 治息患過度心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴一便不排脈虛寒而

瀉 菀 子 兩 腹 菓 半 枳

木 陳 通 木 實 炒 耳 炒 枳 酪

兩 右 加 姜 棗

鍼灸法

憂死肢冷心腹口鼻溫且神不轉
無延舌印不縮鍼灸全三分灸心出

驚死心下溫此充為出氣口中溫此

悲使欲死肢冷身口溫此灸人中三分

又法 神道此推下對二命此

奔豚氣搶心此不得息灸脊極五十壯

分開加頸上此以指按足在極心天突骨

上兩邊垂向背後兩背心齊垂下者

急中滿四肢浮腫飲食無味小便不

清沉木參半青桔絡

兩陳兩白苓 菓此腹此蕪此通

痰飲門十一

○丹溪曰有熱痰有濕痰有酒痰有食

積痰有風痰有寒痰有老痰

○痰脈皆弦微沉滑雙弦者寒飲偏弦

者飲也沉而弦懸飲內痛脈飲不弦

也 痰眼胞及眼下如炭煙黃黑者亦痰

○熱痰用黛黑連

○濕痰身多軟而重用一木又日用參莎半貝

○酒痰用麥冬黑蜜丸噙化

○食積痰用麩芽查或化痰丸消積藥攻之

○風痰用星白朮

○寒痰用半夏

○若痰用海石莎半葵五倍云五倍子佐他藥大治頑痰

○痰結核在咽喉嗽而不能出他痰藥加鹹能軟堅之味 萎 杏 海石

桔 翹少佐以柿硝姜汁蜜丸噙化

○痰在腸下非白文子不能達在四肢非竹瀝不行在腸胃間可下而愈

○厥浮瀉吐痰在膈上必用吐膠固稠

潤心用吐痰在經絡中非吐不可吐中或有發散之儀

○凡吐法宜先升提其氣用風 施

芎 桔 芽茶 生姜之類或就瓷

藥探吐吐時須先以布勒腰腹而於不通風處行之又服凡帶藜蘆等藥

不用探吐自吐

○油炒半夏大治濕痰又治喘心痛嗽

丸生姜湯下

○二陳湯 治痰之要藥也

欲下行加相 通 已之類

欲上行加升 柴 風之類

又日加升提之藥能使大便潤而小便長

陳去白半湯泡七苓一其伴右作下服加姜二片

○風痰壅盛喘咳加風着星枳皂之類
者白附 天麻 蚕

○熱痰腹脹喘滿加芩連栝萎滑膏瀝
之類

○濕痰身重倦息加二木星之類

○酒痰 加葛根宿曲芽之類

○寒痰 加姜附益草豆蔻之類

○氣痰 加木枳宿枳烏沙之類

○濕痰 加藜杏仁味之類

○陰虛咯血痰嗽加二門知栝貝欬
堯之類

○如痰在中焦作噯氣吞酸胃脘
而痛或嘔清水惡心等証加二木

○曲芽甘宿草蔻猪沃實連栝枳木枳
之類作丸服之

○者 氣虛有痰者加參朮

○脾虛者宜補中氣以運痰降下加木

○白芍薤芽兼用升痰提起

○血虛有痰者加天門知薑赤瀝姜汁
帶血者再加芩白芍桑

○痰在胃腹痛或痞滿加木曲芽宿之

類

○在腦下痛或漉必有聲加柴木青芍

之類

○在經絡中或胸背手足臂腫痛者在

上加重風蕞在下加已通膠冬月加

烏附行經

○在腰股膝下腫痛加蒼已通栝藤

之類

○如偏頭痛在右加芎芷風荆芎升之

類

○在左合四物湯又加風荆芎細葛葉

酒片苓之類

頂痛者加芎藭并柴葛細切等

○丹溪加味二陳湯 導痰補脾消食

行氣 橘紅 苓 麴炒各沙

半絡一廿煨一芎 倉 白朮各八

查半分縮 芽麴炒各五分 右麴芽別

研餘細切加姜棗水煎調曲芽木服

○導痰湯 治風濕痰等証 半二

星煨 橘紅 枳炒 廿炙各一

右作一服加姜五片○如久嗽肺燥

熱者去半加味丸杏伍

○千緡湯 治風痰癱盛 半七

皂炒黃 不去皮 廿分 右作一服入姜

○利膈化痰丸 星煨 蛤 半

貝 薑 莎障便皂 杏去皮

右以前六味研為末以皂

角許碎煎濃汁橘杏仁如泥再以姜

汁和蒸餅丸某豆大青黛為衣每服

五十九姜湯送下

○神木丸 治痰飲 蒼下 新米

生芝麻五不用水二小大棗十五枚

右以蒼木焙乾為末以芝麻覆及棗

肉和勻丸如梧桐子大每服五七十

丸溫湯下

○辰砂化痰丸 治風化痰安神定志

止嗽除煩 枯礬研辰星融

半三右為末姜汁糊丸如某豆大硃

砂為衣每服三十九食後姜湯下

○破痰丸 治五飲 檢下 縮

胡椒 木 蝎梢 烏楸 青 巴

右以青皮同入漿水

內浸一宿次日同煎青皮焦去豆為
末淹烏椎肉蒸研為膏入棗末和丸
如菟豆大每服十九至十五丸姜湯
下婦人頭風服愈蓋頭風是痰飲所
致也

○芎辛散

治熱痰壅塞頭目不清語

言不出

芎 細 風 桔 芷

羌 其 各 各 桑 炒 芎 各 一 右 入 姜

○五飲湯

留飲下癖飲下痰飲中澀

飲上流飲間此五飲酒後及傷寒飲

冷過多故有此痰 參 旋 陳

眩實 棗 木 苓 朴 半 澤 猪

前 桂 芍 其 鞞 各 右 入 姜 因

全 酒有飲加葛根葛花 縮

○蘧子降氣湯

治虛陽上攻上盛下

虛痰涎壅 級 其 灸 前 朴 各

葶 棗

○四七湯

治氣鬱痰涎如破絮或如

梅枝在咽喘滿 蘧子 兩 朴 三

苓 兩 半 加 姜 棗

○桔梗湯

治胸膈脹滿短氣痰逆

桔 炒 半 陳 去 白 各 實 五 兩 右 入 姜

○枳木湯

治飲癰氣分心下堅木飲

不 下 桔 炒 桂 其 多 枳 各 七 附 炮

細 木 略 一 實 五 炒 右 入 姜 汁

○茯苓飲子

治痰飲蓄心胃怔忡

赤 苓 半 神 去 陳 眩 門 略 二 沉

甘 炒 枳 略 半 右 入 姜

咳嗽門

十二 附肺痿 肺癰

○風寒者鼻塞聲重惡寒 二陳加

麻 杏 桔 之 類

○風寒鬱熱于肺夜嗽者 三拗湯

○加知 脉大而浮者有熱加麥生薑

○寒嗽以生薑切薄焙乾為末糯米糊

丸如芥子大空心清米飲下三十九

○火咳者有聲痰少面赤門茶 蔓

海石 黛 桔 莎 半 訶

青 蜜丸噙化

○勞咳者盜汗出痰多寒熱 四物加

竹瀝姜汁

○陰虛火動而嗽 四物合二陳加

炒栢知

○陰虛喘嗽或吐衄者 四物加知栢

五味參門桑地骨

好色之人元氣虛弱咳嗽不愈

蔓玉膏 最捷

咳嗽聲嘶者及血虛受熱用蜜蛤粉

蜜調服之

○痰嗽 半 麥略五貝 桔略二

知一枳半 為末姜汁糊丸服

○痰嗽因酒傷肺 麥 杏 俱并

黃連 為末以竹瀝紫藕煎入韭汁

丸服又用蜜蔓蜜丸噙化

○痰嗽氣急 蒼朮沙 兩 羅蒸 杏

蔓 半 略一 苓 各五 芎 仁 右 丸

○主方 杏 去皮 白苓 絡一 橘 紅 此

五味 桔 甘 各五分

○春多上升之氣宜潤肺抑肝加芎芍

半絡一門炒苓知絡五

○春若傷風致咳鼻流清涕宜辛涼解

散加風荷藕炒苓門絡一

○夏多火熱炎上最重宜清金降火加

桑知妙本門膏各一

○秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼桑絡一風芥施各五分

○冬多風寒外感宜解表行痰加麻枝半風生干姜各一肺經素有熱者每

加酒炒各五分○若發熱頭痛鼻寒聲重再加藁苈前柴各一○若有

痰加半只風痰再加星姜汁○濕痰脾困少食加一木○有痰口燥咽乾

勿用半星宜加知蜜水貝蓼各一○若夏月熱痰或素熱有痰加芥連知

膏○上半日咳者胃中有火加貝膏連五更咳者全上

○黃昏咳者火浮於肺不可正用寒涼藥宜加五味五倍訶子皮斂而降之

○牛後咳者屬陰虛即咳也宜補陰降火加芍版方熟地柏知瀝姜汁

天門蓼真補陰血也○若咳嗽久肺虛滋氣補血加參芪膠飯款天門馬兜酒方生薑之類

○肺熱喘咳去參用沙參此兼補血氣也

○若勞嗽見血加膠飯方天門知貝桑亦於前肺虛陰虛一條擇用大抵咳

嗽見血多是肺受熱和氣得熱而變為火火盛而陰血不得安寧從火上

升故治宜瀉火滋陰忌用人參等其溫補氣之藥然亦有氣虛而咳血者

則宜用參芪款等藥但此等証不多取

○火鬱嗽謂咳嗽火郁在肺宜開鬱消

火鬱嗽謂咳嗽火郁在肺宜開鬱消

痰用訶皮便香附薑半海石黛各為
末蜜丸噉化仍服煎補陰降火湯藥
失治則成勞

○痰積食積作咳嗽者用莎薑海石貝
黛半軟石膏查實姜炒連為末蜜
丸噉化

○久嗽有積痰留肺如膠氣不升降或
挾濕與酒而作用茜根童便 蛋炒

海粉 杏 薑 麩 蜂房為末姜
汁竹瀝調噉化

○嗽而心煩不安六一散一名益元散 散方見前
門加辰砂

○痰嗽寒熱交作者小柴加知一方
加白芍五味桑

○夏月嗽而發熱小柴加膏知
冬月嗽而寒熱小青龍加杏

○一陳湯 治咳去痰伐病根陰虛血
虛火盛乾咳者勿用

○喘嗽遇冬則發此寒包熱也解表熱
自除 枳桔各一麻 風 甘 陳

蘓 通 苓 各等如嚴寒去苓加杏
半

○潤肺散 治嗽而失聲訶 五
倍五味苓甘各等蜜丸噉化

○三拗湯 治風寒咳嗽喘急 麻不
根 其生杏不去皮尖 右加姜棗

○溫肺湯 治冬感寒而咳嗽吐痰久
嗽鬱熱者勿用 半 陳 祛 五味

姜 桂 杏 各五 細 膠 其 各
半 右姜棗一方有

○王蓋散 治感寒而嗽胸滿聲重
蘓子 陳 赤苓 桑 麻 各一 甘

兩半 右入姜

○林 金沸草散

治感寒鼻塞聲重咳嗽

不已寒熱無汁 荆衄麻節前各三

其灸赤芍 半各一旋去蘇右加姜

棗

○橘皮湯

治感寒咳嗽頭痛上氣不

得下 陳 苑 麻 飯 浸 杏

炒枝 其灸苓各二右

○傳 杏菹飲

治上氣喘嗽而目浮腫

菹 杏 五味 腹 烏梅 各五 陳

桔 麻 去根 桑 膠 各半 花 茸

三分 其灸二右入姜

○五 東垣加減三奇湯

治咳嗽上氣喘

促曾瞞不利 桔 陳 其青

參 蕪 桑 絡 五 半 杜 杏 仁 味 細 右

入姜 減桔青參加木貝名橘菹散

治傷風咳嗽惡風有汗脈浮

○東垣加減瀉白散

治陰氣在下陽

氣在上咳喘嘔吐 桑 兩 地 骨 仁 陳

青 味 參 絡 五 白 苓 仁 右 入 粳 米

二十煎

○寶鑑加減瀉白散

治咳而口乾煩

熱胸膈不利喘促 桑 兩 地 骨 知

陳 桔 絡 五 細 青 苓 其 疎 絡

右

○大橘皮湯

治面腫上喘 滑 玃 其

炙木 枳 各 半 陳 仁 右

○平氣散

治諸嗽先吐痰惡風不食

參 木 芍 既 桂 味 其

虎 藜 子 神 杏 炒 烏 藥 芷 絡

分 右入姜

○全 平肺散

治肺氣上壅而嗽痰實寒

熱往來咽乾口燥 陳醋焙炒半

甘 蕪 烏梅 棗花 五味 知

桑螵杏炒鹽炒各半 右入姜

○大降氣湯 治上盛下虛痰實喘嗽

咽乾 蕪子微炒 細 前胡 故焙

枳 桔 半 白苓 陳祛桂 其

款各右加姜五宁 蕪五葉

○半夏丸 治肺熱痰嗽胃膈塞滿

薑去半 糖各 右為末 姜汁麩糊丸食

後姜湯下

○五參調中湯 瀉熱神氣止咳定喘

和中進食 芫分 桑五 參 其後

白苓 木各 二味各 地骨 門

陳路二青分 水煎早晚後服

○五味子湯 治咳嗽不止皮膚乾燥

啣血膏胸痛 味 桔 花 其

續絡二 茄三 小豆 椒 生地 桑各 半

○祖傳潤肺除嗽飲 治遠年久嗽如

神參 杏 生其 苛各 三味九

款 苑其 陳祛 麻 桔 膏

半 桑蜜 枳 烏梅 鹽蜜 各

右加姜二片細茶一撮

○九仙散 治一切咳久嗽及擊其惰

歸之藥也 參 款 桑 桔 膠

味各 烏梅 薑 貝各 鹽蜜 右入

姜

○貝母湯 治久嗽 貝蜜 汁浸 味

苓 姜熱 戒半 陳各 一 桑炒 半 桂各

柴熱 者六 木 其各 杏炒 右入

姜

○神功散 治久嗽 款 其各

雄半兩桂兩一右爲末吸中

○人參散

治遠年嗽 麻酥杏各一兩

并各四陳一味桑 豐瓊裕門三

○寧肺湯

治虛勞發熱自汗咳嗽痰

味門桑炙苓各一分膠二右

加姜

○黃芪散

治咳血成勞能解肌熱

芪蜜地門桔白芍各二其

○神効寧嗽散

治勞嗽諸嗽通用

味苓桑炒二蘓細陳去

枳杏炒膠其炙豐蜜炒各半行

○人參芎敗湯

治勞嗽寒熱咯血

飯芎白芍各二參半陳

赤苓膠

○柴花膏

治肺熱久嗽身如炙煎成

肺勞把通欬花杏炒

化

○紫花散

治咳血肺痿參花

知貝桔其味苓膠

○人參養肺湯

治肺痿咳嗽午後熱

聲颯者參其炙膠各一苓味

貝杏炒桔炒實炒各一桑仁柴四

○知母茯苓湯

治肺痿喘嗽不已寒

熱自汗苓其炙各一味參

苜半 柴木 欬 桔門
苓酪半 亨 膠絡三 右入生薑煎食
後通口服

保和湯

治勞嗽肺燥成痿者

知貝 天明 麥門 欬 蕙
杏炒味絡 二甘炙 兜 苑 百合
桔 蕪 苜 絡 膠 飯 生地各
料 右入姜 ○痰盛加星半 橘紅苓
枳 ○熱盛加栝大連 杏栢 翹 ○喘盛
加桑陳腹蕪子 羅子 ○風盛加風荆
旋菊細莎

傳

肺癰先須發表 千金曰 咳唾膿血脉
數實或口中咳胸中隱心痛脉滑數
者為肺癰 要畧先以小青龍一貼解
衣之風寒邪然後以葦薹大棗瀉肺
湯 桔梗湯 葦葉湯 隨証用之 此治腫

瘍之例也 然以黃昏湯 補裡之陰氣
此治清瘍之例也

葦薹大棗瀉肺湯

治肺癰肺脹喘

促不得卧 葦一兩炒黃為細末
煉蜜丸如彈子大
大棗枚 右以水三盞煎大棗至二
盞去棗入葦一丸煎至一盞攪勻
服之

葦葉湯

治咳有微熱煩燥胃心甲

錯 葦葉 二葦 桃 五十凡辨
辨 右以水一斗者葦葉至五升去
粗入諸藥者取一升再服當吐痰如
粥而愈

栝栢湯

治肺癰心胃氣壅咳嗽膿

血心神煩悶咽乾多渴或兩脚腫滿
小便赤黃大便多澁 栝 具各
不飯 萹 蕙 絡 八 枳 炒 已 桑

芪各五 其節 杏枝皮 百合 各三

右作一服加姜五片大便秘加大黃
小便澀加木通一方有味骨知

○**又方** 治前証 菱 飯 桔
貝 芷 廿絡 一石水煎食後服 一
方無貝芷有草

○**黃昏湯**

治胸中甲錯隱痛知為
肺癰合歡皮大 一掌 以水三盞煮取 一

盞半分 一服

○吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者
消風散入無病男子髮灰清米飲調
下 一服而愈 方見中風門

○**瀉白散**

治喘咳腸痛管滿氣促肺
經蘊熱等証 桑 炙 桔 菱 升

集

○**升麻湯**

治肺癰音乳間痛吐膿血
半 杏 尖 坡 骨 絡 一 廿 烺 右 入 姜

作 腥 臭 升 三 桔 薏 地 榆
芩 赤 芍 牡 生 耳 各 三 右

○**排膿散**

肺癰吐膿後服此排膿補
肺 芪 芷 味 參 絡 等 右 為 末

蜜湯調食後服

○**四順湯**

治肺癰吐膿 五心煩熱壅
悶咳嗽 貝 苑 去 桔 各 兩 廿 各 兩

右

○**理肺膏**

治肺癰咳喘不利 腎膈迫
塞 訶 藜 百 藥 煎 味 微 條 參

去 聲 款 葉 杏 貝 甜

葶 苑 百 合 廿 節 絡 五 右 為

末 白 茅 根 斤 研 取 自 然 汁 砂 器 熬 成
膏 更 入 蜜 二 兩 再 熬 和 煎 藥 丸 溫 水

下

○**治肺癰**

薏 末 糯 米 飲 調 下 或 入 粥

內者喫亦可一方水煎服當下膿血便愈

○咳嗽灸法

○灸兩乳下黑有際各數十壯即瘥

○又以蒼蒲當乳頭周圍身冷前後

正中當脊骨灸十壯

○又上氣咳嗽短氣氣滿食不下灸肺

募五十壯即中府

○上氣咳嗽短氣風勞灸脊井一百壯

○上氣咳逆短氣胸滿多唾冷痰灸肺

俞五十壯

○林從大推拿第五節下六節上灸一處

年壯

○咳嗽咽冷聲破喉鳴猜猜灸天突五

壯

○勞嗽膏肓年壯二里七壯肺俞二十七

壯

喘急門十三

傳

凡喘者由痰火內鬱風寒外束而致

乏又有陰虛發喘氣從臍下起直衝

清道而上又有氣虛發喘短氣不寐

以接續

○載氏曰凡喘則有痰聲者痰也乍進

乍退得食則減食已則喘者火炎也

○凡喘未發時以扶正氣為主已發以

攻邪為主

○火急甚者不可用苦寒藥火盛故也

宜溫散之

○劫藥用椒目五七錢研為細末生薑湯調服喘止之後因痰滯痰因火治

○子緝湯 治痰喘不得臥人扶而坐
數日一服而安一方用道痰湯合子
緝湯服一方並見

○一方用蘿服子二兩 蒸熟 皂角五斤 燒
萎 海粉各一星 細白粉 棗一升 半 研
醃右為末 煉蜜丸 噲化

○方 治喘而嗽用星 萎 半
莎 橘 紅 蘿 儻 皂角 為

采神麴丸 姜湯送下 一方有杏仁
氣實人因服黃芪過多而喘者宜用

二物湯瀉氣

○三物湯 治肺感風寒喘急不絕
門咳嗽

○葶藶大棗瀉肺湯 治肺壅脹胸膈
滿悶上氣喘急身熱面自浮腫等証

方見咳
嗽門

○濟生葶藶散 治過食煎燂或飲酒
過度致肺壅喘不得卧及肺壅咽燥
不渴濁唾腥臭 甜葶藶子炒 桔

萎 升 薏 桑 棗 葛 絡 八 甘 細
右作二服加生姜五片

○瀉有散 治大人小兒風寒傷肺喘
急咳嗽 桑 骨 絡 一 甘 半 右加

姜 一 方 有 風 荆 各 半 又 左 加 麻 杏
各 半 其 效 尤 捷

○祖傳秘方 治遠年喘急

桑木內蠹虫糞一升 羅 半 杏 炒 并 下 去 皮 尖
甘 兩 右 為 細 末 湯 浸 蒸 餅 丸 梧 子 大
每服五七十九淡姜湯送下

○又治哮喘用苧麻根和砂糖爛煮時
時嚼燕下末絕病根神效

又用猫兒頭骨燒灰酒調二三錢之服便止

○**玉液散** 治久近喘嗽口乾渴

括貝母知母各四分參仁甘草一右

○**人參胡桃湯** 治喘急不得卧

參 一不胡桃五十箇湯浸去皮取仁右惟一貼

加姜片

○**杏仁煎** 治喘嗽 杏尖破胡桃

肉去皮各右研膏煉蜜丸彈子大海

服一丸細嚼臨卧姜湯下

又胡桃肉仁姜片臨卧嚼吃飲湯二

兩口再嚼再飲就卧

○**人參定喘湯** 治肺氣上喘喉中有

聲胸膈緊滿 參 麻去半膠

炒各桑炙味各分二鹽蜜右分二貼入姜三片

○**安神散** 治喘嗽 罌粟 參 陳

能甘各右為末每服一二錢煎

烏梅湯調食後服

○**人參散** 治喘嗽 枯礬兩甘三

參二右為末每服一錢臨卧煎嚙之

白湯調服亦呼

○**方** 古文錢七箇 白梅七 右

水浸二宿空心一呷良久得吐效

○**杏仁飲** 治身熱咳嗽喘急 柴

前枳 桔 蕪 陳去半 甘炙

苓 參 杏各等 右入姜

又一方參蕪飲土香木加柴杏治

証同前

○**清氣散** 定喘止嗽 罌 味炙

乘炙蕪 甘 青 陳去枳 欬各

分右慢火炒焦木煎加生姜半夏

妙方

○寧肺湯

治喘嗽

製

陳眩

桔 星炮半

桑炒姜

參各等

右入姜

○全補秘湯

治上氣喘急不得卧者

橘 桔 藕 味

參各等 右

○分氣紫菀飲

治脾胃不和氣逆喘

定 味 桑 苓

陳眩 甘草 桑

○五味子湯

治喘促脉伏而厥者

味 神 參 門 杏

橘 射 生 姜 各 半

棗 三 右

○林灸法

肺俞 廿七

天突 此

醫法明鑑卷第一終



