

醫方明鑑

三

✕

i 41-2

F²
1-125

490.9

Ih-8

2



No. 2143

IR 1; 41-2

富士川文庫

1306

醫法明鑑卷第三目錄

眼目一 耳病二 鼻病三 牙齒六

口唇四 附舌咽喉五

髮七 痔漏八

損傷九 墜墮 跌撲 金瘡 竹木刺 湯火傷 獸傷 車傷 骨鯁 漆瘡

破傷風十

瘡瘍十一 癰疽一 附骨疽二 疔瘡三 癰瘡五 結核六 瘰癧子八

漏竅七 瘰癧九 肺癰十

內疽九 腸癰十一 便毒十二

囊癰十三 莖瘡十四

腎癰十五 膿瘡十六

疥瘡十七 癩風十八

諸瘡十九 乳癰廿

楊梅瘡廿 癩風廿二

救急十二



醫法明鑑卷第二

眼目門

○玉經曰諸脈者皆屬於目目得血而能視

○聖人雖言目得血能視然亦有太過不及太過則目雖塞而發痛不及則耗竭而失明故年老者人多不及年少之人多太過但年少之人則無不及年老之人間有太過

○原病或曰目昧不明目赤腫痛醫膜皆湯皆為辨或言目昧為肝昏屬心者誤也

○上虛則肝虛也下虛及腎虛也肝屬則頭暈耳聾目眩腎虛則耳鳴生花耳作蟬鳴大宜補肝益腎

○傳丹溪曰目病屬風熱血少神勞腎虛

○肥人風熱上壅嗽云苓柴菊瘦人血少養血加風藥物共菊

○久病昏暗熱地飯為君老風其菊佐之

○暴發赤腫芬風為君以瀉之連飯為臣以養血老柴升其其為使

○白睛紅加白芩莖少許

○血熱壅滯四物加膽已風老

○肥人風熱上壅眼疼老風荆酒苓

○瘦人目痛血少老熱飯生地酒玄參

芎風荆菊

○勞役飲食不節內障昏瞶蔓其炙莖

白芩栢參

○濕陰地黄丸

治血弱陰虛瞳子散

大規物則花

生地行兩熟地兩

柴公天門

其炙根地行連

味裕二參行飯身酒苓右為末煉蜜九茶清下婦人公宜

○益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽

光沢神絡半生地酒牡山宋

飯術酒五味山藥柴各五熟地

斷右為末勿犯鐵聖蠶鶴煉蜜九如

桐子大每服五十九丸空心淡塩湯下

○林地黄湯

治眼久昏涉熟地

飯參苓連苓風老絡

分右水煎食後服

○管飯湯

補益腎水瞳子飯身

白芍絡二連酒苓半生地行耳後

木柴細右

○補肝散

治睛上有翳擊日中見之

熱小陰處見之則大規物不明及肝

腎俱虛也宜補肝散熱地白芩

家菊花糖細條分各七分煎
耳灸風各九北柴三分右水煎

○明目地黄丸 治肝腎虛熱眼見黑

花翳膜遮障等証 生地 熟地

並洗焙膠酒浸三兩剉夫剉妙去風各四兩

杏去皮尖匙妙研右為末煉蜜丸食

煎溫酒下或飯飲壻湯亦可動風切

治熱昏膜
淚黑花

○定志丸 治眼不能近視反能遠視

考方明在

○地芝丸 治目不能遠視能近視或亦

妨近視 生地焙乾天門去心枳殼二

兩其菊二兩右為末煉蜜丸

○六味地黃丸 治証同前方見淋門

○益氣聰明湯 治飲食勞役脾胃不

足內障耳鳴 莖 參 苳各半升

蒼各三兩蔓打不方 梅酒各右水

煎臨睡熱服近五更再服之得醒更

妙○如煩悶或有熱漸加黃柏春夏

加之盛暑倍之加此一味多則不效

○沖和養胃湯 治內障眼脾胃元氣

虛弱心火與二焦俱盛飲食勞役不

得休息故為此疾服之效 柴 芩

連各七分 風解卷 炙甘 苳各半飯

酒升 木 參 葛各一白芍白

芩一 姜行 五味仁右

○還睛丸 治眼內赤沒有花或黑或

白或紅 參 桔 芩 熟地 風

菴車 知各一細 味各半玄參

研右為末煉蜜丸

○明目流氣飲 治風熱上攻眼目不

明常見黑花多淚難開 加煎

牛膝 芍 菊 白茯苓 細 柴 參 梔 芩 其 炙 蔓 賊 荆 各 兩 葶 決 半 兩 蒼 妙 二 右 爲 末 臨 卧 温 酒 調 下

傳 復明散 治內障 陳眩 蒼 各 兩 青 行 炙 耳 生 地 翹 柴 絡 一

莖 半 不 飯 身 行 右 水 煎 去 粗 稍 熱 服 忌 酒 醋 温 麩 辛 熱 火 料 物 之 類

秘傳接雲退翳丸 治內外障膜遮

睛昏聩大效 實 括 其 炙 蔓 苛 草 決 明 絡 五 莖 賊 童 使 浸 一 宿 去

白 荻 羌 略 一 蛇 蛻 蟬 蛻 連 絡 不 川 椒 去 酥 餅 飯 酒 浸 半 右 爲 末 煉 蜜 丸 食 後 臨 卧 服 三 服 零 隙 米 飲 晴 睛 當 散 湯 內 障 亦 查 湯 下

膏 絡 二 柴 羌 味 升 絡 三 其 連 酒 芍 各 半 芩 獨 相 酒 飯 身 酒 膽 瀝 芍 絡 牡 右 煎 去 粗 入 酒 少 許 煎 服

石膏羌活散 治近內外翳障風 治服也 白 風

熟昏暗倒睫拳毛一切眼疾頭風 羌 獨 熱 蜜 蒙 煎 湯 明 賊 眼 翳 並 清 照 細 乾 米 子 二 味 起 麻 子 起 等 芎 風 蒼 蒼 明 目 雙 芩 洗 心 其 菊 荆 穗 生 翳 蒙 治 腐 風 二 其 歸 藥 右 等 分 爲 末 食 後 臨 卧 蜜 水 調 下 茶 清 亦 可 日 三 服

明目細辛湯 治目赤微痛羞明怕 風寒鼻塞淚滿稠粘 芎 行 生 地 蔓 絡 二 飯 身 稍 白 芩 蔓 絡 四 斤 風 麻 根 羌 各 八 紅 紗 膠 細

蔓 絡 二 飯 身 稍 白 芩 蔓 絡 四 斤 風 麻 根 羌 各 八 紅 紗 膠 細

桃紅牛膝右水煎

○助陽和血湯

治眼發之後微痛
熱白睛紅隱淚難開睛多眵淚
蔓
赤芷分柴 芪 甘炙飯身酒風絡
兩升神右水煎稍熱服

○救苦湯

治眼暴發赤腫險高苦疼
不可忍者 桔 翹 紅 細絡二
飯身瀉甘淡各等 膽略分 不蔓
風 連 羌 太陽升陽明柴少湯各
生地 柏 芩 知絡三 芎 右水
煎食後服若苦疼則多用苦寒藥
本經之藥如晴昏加知柏

○散熱飲子

治眼暴赤腫 風 羌
芩 連絡等 右水煎食後服
○大便秘加太黃
○痛甚者加飯生地
○煩不得眠加施
○熱痛赤腫木柴加大

飯生黑豆

○四物龍膽湯

治目赤暴發雲翳疼
不可忍 芎 飯 芍 地絡半 羌
風絡半 膽 已絡一右

○洗肝散

治風毒上攻目暴腫痛難
開隱淚眵淚 芎 飯 羌 甘
大 風 梔 芎 絡等 爲末白湯調
服到煎亦可

○菊花散

治目赤腫痛麻豆傷寒後
食熱物腫痛 芩 大 菊 甘
風 飯絡等右

○羚羊角散

治大人小兒風熱上攻
眼暴赤腫生翳疼 羚羊 芩 升
甘炙車酪五 梔 膽酪半 决明耐右
爲末食後白湯調下

○蒙古柴胡散

治肝風實熱眼赤目

眼眼赤心煩 柴 地骨 木 苓 甘菊 赤芍 芩 酪 一 畢 灸 右入姜

○菊花散 治風毒眼目赤腫昏暗癢肉痛癢漸生翳膜 白蒺藜 羌活 以賊蝮蟬退 各三錢 起菊 酥右為末 食後臨此茶清調下

○洗藥大青散 治暴風客熱日赤睛疼 蕤波 雞 銅青 醋 姜粉 干 不右 和白每用此三少沸湯泡常育極洗造 姜粉法臘月生姜切棉爛布搥汁澄 取粉陰乾

○秦皮散 治風毒赤眼腫痛痒淚眩淚昏暗羞明 秦 滑 連 每用半錢沸湯泡去粗粟熟洗

○湯泡散 治風熱上攻眼目赤淚睛 疾漸生翳膜 赤芍 飯 連 右吹眼每用一錢用極滾湯泡粟熟洗冷飛溫洗一日六七次或加荆芥

○凡眼目之病血凝氣滯使然故以行血藥合黃連血得熱即散必熱洗之 有劫

○一方加風本煎洗亦可

○一方加滑細古文錢煎洗

○一方截惡眼 明礬 大 毒 碎 帛 包 井 花 水 小 半 盞 浸 之 候 水 色 黃 洗 眼 一 方 治 眼 淚 出 不 止 黃 連 煎 濃 汁 清 魚 肝 油 一 方 治 晚 不 見 物 取 鼠 膽 點 之

○常洗目法空心用塩末搽齒漱口少時吐水於手中洗眼令目明夜見細

點眼春雪膏

治肝經不足 履 山

攻眼目昏暗痒痛羞明不能遠視迎風有淚多見黑花
腦子半研雞木
去^去法^法油^油二兩
右用生蜜六錢和勻
銅筋^筋點^點皆^皆頭

退翳膏 治黑白翳 狷仁 升

烙^烙三翹 風 青^青略^略四 飯身^{飯身}於^於其

柴^柴絡^絡半 荆^荆木^木半 生^生地^地半 不^不連^連行^行右^右細
未^未木^木一^一碗^碗煎^煎至^至半^半碗^碗去^去粗^粗更^更上^上火^火煎

半^半盞^盞入^入荆^荆芥^芥木^木兩^兩匙^匙蜜^蜜少^少許^許再^再上^上火^火
熬^熬勻^勻磁^磁罈^罈盛^盛貯^貯題^題點^點之

光明丹 治風熱上壅目赤腫痛及

內^內外^外翳^翳障^障等^等証^証 白^白炒^炒其^其石^石 一兩以
黃連半

兩^兩煎^煎濃^濃平^平去^去粗^粗相^相炭^炭火^火煨^煨炒^炒其^其石^石
如^如此^此七^七次

辰^辰行^行鵬^鵬仁^仁輕^輕研^研片^片腦^腦 三五分多麝^麝分^分○

如^如赤^赤眼^眼腫^腫痛^痛加^加乳^乳沒^沒各^各五^五○內^內外^外翳

障^障加^加真^真珠^珠拌^拌膽^膽礬^礬亦^亦能^能瞻^瞻○

風^風眼^眼加^加銅^銅青^青飛^飛丹^丹絡^絡半^半或^或以^以諸^諸藥^藥合

為^為一^一治^治諸^諸般^般眼^眼疾^疾若^若各^各研^研為^為極^極細^細末

和^和勻^勻飛^飛研^研蜜^蜜封^封點^點眼^眼極^極妙^妙

一方 治翳膜遮睛雪白翳用無砂

者^者生^生研^研少^少許^許以^以大^大灯^灯草^草蘸^蘸極^極輕^輕手^手浮

擊^擊點^點之^之凡^凡三^三次^次不^不疼^疼切^切勿^勿驚^驚恐^恐累^累用

効^効

○治飛絲入眼睛脹突出痛不可忍新

筆^筆兩^兩二^二管^管濡^濡好^好墨^墨更^更換^換頭^頭運^運眼^眼上^上飛

絲^絲纏^纏筆^筆而^而出^出

○又翳^翳凡^凡甲^甲上^上細^細眉^眉筋^筋頭^頭蘸^蘸津^津點^點其^其絲

自^自聚^聚拔^拔出^出

○又石^石苴^苴浦^浦地^地碎^碎加^加飛^飛絲^絲傷^傷左^左目^目則^則塞

右^右鼻^鼻傷^傷右^右目^目則^則塞^塞左^左鼻^鼻自^自發^發百^百中

一方 治沙石草木入眼不得出以

書^書中^中白^白衣^衣魚^魚和^和乳^乳汁^汁法^法目^目中^中自^自出

○活種麥芒入眼取蟻蟻以布覆其上
 持蟻蟻於布上磨之其芒出者布上
 ○治倒睫拳毛木鱗仁去殼為末綿裹
 塞鼻中左目塞右右目塞左一二夜
 其睫自正

○灸法

林
 ○眼暗灸大椎下雙第十節脊中二百
 壯以多多為佳
 ○三里治目不明人年二十以上不灸
 三里令氣上目不明
 ○風驚灸手中指本節頭骨上五壯左
 懸灸右右患灸左
 ○目昏生翳灸大指節橫文三壯左灸
 右右灸左
 ○小兒雀眼夜不見物灸手大指中後
 一寸內廉橫文頭各一壯

○小兒疳眼灸合各二穴各一壯

耳病門

傳
 ○經曰耳為腎之外候一日腎通竅于
 耳一日心通竅于耳其腎竅無節方
 役過度或中年之後大病之餘腎水
 枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴治法宜
 瀉南方之火補北方之水無有不效
 者

○慧
 ○厥聾必有眩暈之証流氣飲加首姜
 葱方見氣門

○風聾必有頭痛之証桂星散

○憂思傷心心虛血耗而聾或鳴當寧

心順氣平補鎮心丹

○房勞過度腎虛精竭而聾或鳴當生

精補腎肉苁蓉丸

傳 大病後及陰虛火動而聾者宜補陰

降火四物加栝

○耳鳴宜當飯龍膏丸 方見癩癩門

○多飲酒人宜米香換柳丸 方見氣門

○耳聾以茱萸為頭尖大黃二味為末
津調貼湧泉穴以引火下行

○大補丸 治耳鳴欲聾 黃柏一味

細切塩酒拌炒褐色為末滴水丸
四君子湯下血

○滋腎丸 治耳鳴耳聾 方見淋門

○蔓荆子散 治上焦熱耳鳴而聾及

出膿涕 炙耳 升 通 赤芍

系 門 生地 前 甘菊 蔓

赤苓 絡半 右作二服加姜行大棗

○程星散 治風虛耳聾 桂

飯 細 苜 通 疾 炒 木

其 絡 半 星 煨 芷 絡 四 蕪 行 右 入 葱 白

煎食後服

○地黃丸 治勞損耳聾 地 飯

芎 桂 兔 絲 椒 炒 破 炒 疾 炒 胡

芩 巴 炒 仲 炒 芷 苜 絡 半 磁 燒 醋 淬

飛二分半 右蜜丸 葱白温酒下

○平補鎮心丹 治心氣不足精神恍

惚夜多異夢及胃氣傷敗足脛酸疼

遺精白濁漸羸弱以致耳聾 熟地

生地 山 天門 麥門 栝子

神 各 四 兩 辰 枳 研 桔 炒 各 兩

遠 去 心 七 兩 飯 兩 龍 骨 兩 右 煉 蜜 丸

如 桐 子 大 每 服 三 十 丸 空 心 飯 飲 或

酒 下 此 方 規 龍 骨 有 酸 車 五 味 白 芍

桂 參 龍 齒

〔菴蓉丸〕

治腎虛耳聾或風邪入於

經絡耳內虛鳴上菴蓉酒浸山茱酒浸

龍肉酒浸菴蓉酒浸兔酒浸鹿耳酒浸菴蓉酒浸解

磁煨醋淬附炮去皮臍蠟去毒二麝

字石煉蜜丸如桐子大每服七十九

空心酒送下

○清神散

治氣逆於上頭目不清耳

常重聽上甘菊炒去絲各五分

荆穗卷風芎通絡四其炙

木苜絡右為末食後臨卧茶清

調下

○芎藭散

治風入耳虛鳴不聞

芎藭蒼蘓甘陳細

朴半桂通各等右入姜葱

○首蒲圓

治卒聾耳內卒痛

附炮去皮臍右為末醋糊丸如杏

仁大綿裹置耳中旦二易之

○聾治聾草麻子四粒棗肉炒入乳

搗膏石上晒乾丸如梧子綿裹塞耳

中

○林治聾首打巴一粒蝎一粒右為末

葱涎丸如棗核綿裹塞耳中或用生

烏頭為末綿裹塞耳中亦効

○治耳鳴草烏糕生各等為末綿

裹塞耳旦二度

○治聾首打巴一粒去皮右搗合分

作七丸每用一丸綿裹貼即塞耳

○又以醇醋微火煎附子軟削尖塞

耳

○又雄黃硫黃等為末綿裹塞耳

○治又聾生鼠膽汁滴入耳中或宰

○治聾 芥菜子搗人乳和綿裹塞耳

○治耳痛及卒聾 杏仁此粒法研綿

裹塞耳

○通耳法 堅磁石丁粒如穿山甲煨存

蒜下右新綿裹塞耳中口中含小生

鉄下塊覺耳內如風南聲即效

○一方治久聾 錫黃色水者生薑

切如鴨大四粒右二味為末作一服

臨卧空心温酒調服一法向晚勿飲

食酒調作一服至三更徐令盡量飲

五更如耳中聞響白筆音自聞

○治耳聾耳中如風水声或如鐘鼓声

板目 巴去油菖 松枝絡半為末

以蠟溶化同攤紙上候冷捲作筒子

塞耳內一且一易效

○治聾用猫尿滴入耳中效取尿法用

油牙上其尿自出效用

○治耳內痛用白塩炒熟重帛包慰耳

○患四圍

○傳 治耳痛及聾耳桑蠶蚶炙黃末加麝

少許吹入耳中妙

○治耳內大痛如有虫奔走或血水流

出或乾痛不可忍者蛇退燒存細研

以鴨翎管吹入耳中立愈

○治耳痛以枯葱吹入耳中

○林 屋角飲子 治風熱上壅耳內聾閉

腫痛膿血流出 犀 苜 通 玄

參 赤芍 小豆炒耳菊各二右入

姜煎服

○風客熱壅膿血流出名曰聾耳 白

礬 連 烏賊骨 赤石脂各等為

末吹入耳中即效

○明礬散

治執壅氣滯或冰浴水入

耳中為膿為水 枯礬 龍骨研各

黃丹煨分 不乾胭脂麝 鈔右為末

先用綿杖拭淨 蘸藥敷於耳內

○治聾耳底耳膿出不止陳皮 煨為

絲麝 鈔右如前法

○又方乾胭脂枯凡等 如前法又枯凡

黃丹等分 亦可方

○又方

五倍子半 蝎燒存性 如前法

○又方

治耳中出血龍骨 為末吹

入耳內

○治聾耳膿不乾

香附去 為末搽 耳

中日三 次效方

○百虫入耳好酒少許灌耳中却起行

自出○又灌脂麻油可 ○又灌藍青

汁少填耳出○又灌鷄冠血○又滴

小蒜搗汁

○惡虫入耳用葱湯灌○又用桃葉按

細塞耳○又桃葉按取 虫自鼻出轉

葉捲作角子切其頭入耳中其虫從角中走出

○治蟻虫入耳

猪肉一 指許置耳孔

邊即出

○治蜈蚣入耳

生姜汁灌耳中韭汁

亦可即出

○灸法

治耳聾耳鳴聽會 在

耳微閉中 張口得之

○治耳聾耳痛腎風 在耳後腫

虫按之引耳中又耳門後 三在耳前

起肉當缺之前

鼻病門 三

傳經曰鼻者肺之外候丹溪曰肺之為
藏其位高其體脆性惡寒又惡熱故
好飲熱酒者始則傷于肺鬱熱久則
見於外而為鼻鼈赤之候得熱愈
紅得寒則黑此謂熱極云或觸冒
風寒始則傷于皮毛而成鼻塞不通
之候或為濁涕或流清汁久不愈名
曰鼻淵此為外寒束內熱之証也原
病式曰肺熱則出涕是也

選 河間謂鼻病悉屬乎熱理固當矣然
鼻者肺之候經曰形寒飲冷則傷肺
溫散寒邪則氣自通

傳 丹溪曰寒傷皮毛氣不利而壅塞麻
黃桂枝之類表之熱壅清道氣不宜
通以芩連梔之類清之

酒釀鼻及熱血入肺四物加片苓酒

紅酒苓 陳 甘 生 姜煎調五吳

廣末服氣弱者加芪酒 外用山硫

黃入羅布乳輕烏頭尖醋調仕或

用膽礬付之

酒瘡皆壅熱所致又有肺風不能飲

仲生者非盡因酒

一方治酒瘡梔子末蜜丸如彈子大

空心白湯嚼下

鱧魚息肉及肺氣盛用拍礬末胭脂

綿裹寒鼻數日自消

林 芎藭散 治鼻寒為鱧 芎 棋

麻 祛 桂 已 通 細 芷 苜 各

木 椒 其 等 分 右 入 生 姜 紫

蘇 煎

○ 瓦丁散 治鼻鱧息肉不聞香臭作

呼吸鼻痒 瓜蒂 細分 為末 綿裹塞
鼻中即黃水點滴三四日愈

○**方** 通草附炮細右為末煉蜜丸
綿裹鼻中

○**方** 治久患鼻瘡膿極臭者用草
霜為末每服一錢食後冷水調服

○治鼻齧鼻角多味小豆許以竹管吹
入鼻中

又方干姜末蜜和如菓子大塞鼻中
又方枯蠶為末猪脂和綿裹塞鼻中

數日瘰肉隨藥出
○治鼻中生瘡搗杏仁乳汁和傳之

○**萹澄茄丸** 治鼻塞不通 草酢
苛仁荆穗半 右為末煉蜜丸如梅

桃大每服一丸臨吐驗化津燕
○**苜蒲散** 治鼻塞不通 苜 皂等

為末細包塞鼻內

○**辛夷散** 治肺風寒加之鼻塞涕
出不已不聞香臭 辛夷仁 細

蒙升 芎 通風 羌 甘炙
並等為末食後茶清調服

○**人參散** 治肺氣上攻鼻塞不通
參 白苓 苓 陳祛麻 祛根 羌 椒各

研右煎食後服
○**溫肺湯** 治鼻不聞香臭多膠淚

丁香 芩 風 菖 羌 炙 姜 炙 半 升
荳蔻 牡 麻 不 祛 半 右 入 葱 白

○**離澤通氣湯** 治鼻不聞香臭忌下
切冷物及風寒涼處坐卧 荳蔻 羌

獨 風 升 菖 羌 各 三 升 後 一
並 麻 酥 法 椒 各 一 右 每 服 五 錢 姜

三片棗二枚葱白三寸水煎稍熱服

○治鼻寒麻鞋燒灰吹鼻中立通
傳

○防風湯 治鼻淵腦熱滲下濁涕
正久不已必成衄血 芩 參 芍
炙 芍 門 酪 一 風 半 右 爲 末 湯 湯
調服

林 ○抑金散 治肺熱鼻塞濁涕 芷
細 風 羌 飯 半 芎 桔
陳 苓 等 入 生 姜 薄 苳 煎 服

○川芎散 治鼻流濁涕 椒 炒 訶 煨
芎 桂 細 木 等 爲 末 食
後 酒 調 服

○防風通聖散 方見中 加芎連 治頭旋
腦熱鼻塞濁涕

傳 ○祖傳 治鼻時流臭黃水甚者腦亦
痛此有虫食腦中 絲丸藤 近根三
五片燒存性爲末酒調服

林 ○硫黃散 治酒酸鼻及女人鼻上生
黑粉刺 硫分輕紗杏研膏 去皮
爲末杏膏和作餅臨卧塗鼻次早洗
去 ○一法以白塩常擦爲妙

○一方 治赤鼻久不瘥大黃朴硝等
爲末水調敷患處

○治鼻面酒酸飽鵝鷄糞一合研臘月
猪脂和每夜敷之

○治酒酸馬蘭子 并花拌爛傳之
○治鼻准赤新銀杏燻爛敷不過五七
次復旧

○灸法 治鼻齷
○顯會一穴灸七壯入髮際二寸
○通天二穴灸七壯在兼光後一寸灸後
鼻中必出臭積一塊方愈
○上星一穴灸七壯入髮際一寸治鼻塞

不聞香臭

○風門二死^七後^一治^一無^一不止及清涕流

口唇門 附舌 四

傳

肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口

甘肺熱則口辛腎熱則鹹又有口淡

者胃熱也外有謀慮不決肝移熱於

膽而口苦者又有脾胃氣虛弱木乘

土位而口酸者或膀胱移熱於小腸

膈腸不便上為口糜生瘡

○肝膽有實熱口酸而苦小柴胡加其

膽青甚者用當歸龍薈丸方見癰瀰

○心熱而口苦或口舌生瘡黃連瀉心

湯連生地知母右等分水煎牛黃清心丸方見中

原膈散亦見傷寒門

○脾熱而口甘者三黃丸方見消平胃

散方見內傷門

○肺熱而口辛者甘桔湯瀉白散方見

附金沸草散金沸草二斤荆四斤麻

各一斤右分二則姜三片炙

○腎熱而口鹹者滋腎丸方見大補

陰丸方見滋陰大補丸方見

○謀慮不決膽熱口苦者小柴胡加門

酸地骨遠

○謀慮不決肝膽虛而口苦者參遠神

其君為柴膽為甚者錢氏地黃丸方見

○益膽湯治謀慮不決肝膽虛氣上

溢則口苦方見苓法甘參絡桂律

苦參神絡遠祛石水煎

○龍膽湯治熱口苦名曰膽薈此藥

行其參天門連膽施

麥門 知 味絡五右

○**導赤散** 治膀胱移熱於小腸上為口糜水崩調五苓散方見傷寒門

○**柴胡地骨皮湯** 治証同前及治心

胃壅熱水穀不化 柴 地骨分右 水煎食後服大便實加大黃

○**甘露飲** 治胃中客熱齒齲腫痛及口舌生瘡咽喉腫痛 施法熟地

生地 天門 枳殼炒 麥門 苓 斛絡一廿五分右水煎食後服

○**升麻湯** 治上膈熱毒口舌生瘡咽喉腫痛 升 赤芍 參 枯 葛

各二廿生一右分二貼入姜片 ○**水蘖圓** 治口舌生瘡 礪其者加

藥 苛絡等生蜜丸如彈子大每服一丸含化

○治口舌生瘡 牛膝酒浸含之無酒者含亦可

牛膝 鹽汁 亦可

○治口舌生瘡胸膈痛豆豉炒為末含之一宿瘡

○**傳** 治口瘡用好酒者黃連汁呷下即愈

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上用理中湯反治之甚者加

附子或用官桂含之亦妙 ○治口瘡 細木栢蜜右等分為末搽舌上吐涎乃愈

○治口瘡野薔薇花根煎湯漱之白薔薇根梓汁付之

○治口瘡及咽喉腫痛 蒲 鱸 鵬 燭硝 生其等為末含之咽喉腫痛

鵝管吹入

○**祖傳** 治舌腫大塞口不通飲食者

真蒲黃一味頗刷舌上自退若能燕藥以黃連煎濃汁細々呷之効

○林治口瘡生白瘡未貼之極効

○柳花散 治口舌生瘡 延兩栢

連酪半蜜陀僧儼絡各一右為末少許

貼瘡上津液吐出再用

○兼金散 治蕈毒上攻口舌生瘡

細連等為末以帛蘸水洗淨口舌

搽藥涎出愈

○胡黃連散 治口糜生瘡 胡連半

藿行細行連行右為末少許貼之有

涎吐之瘡

○綠雲散 治口瘡爛臭久不痊 栢

蜜灸五栢各為末臨吐搽舌曠津効

○又五味子兩消 栢蜜灸各為末搽

於舌上亦可

○又明礬半栢蜜灸為末傳患處吐去

苦水再傳

○必効散 治口瘡 明礬 大黃等

為末臨吐乾搽延敷之

○又朴硝行寒水石兩硃砂許甘半

為末搽患處

○治口瘡發熱腫連喉 蘿蔔自然汁

含漱吐之 一方生薑自缺汁漱亦

可

○水火散 治口瘡 干姜黃連等為

末乾搽涎出為妙

○一方 甘草白礬等為末搽口內

○一方 膽礬許銀錫內火煨通亦放

地上出火毒一夜細研少許傳瘡上

吐酸水清涎

○全龍石散 治上膈蘊熱口舌生瘡

膈腫痛 寒水 辰半 生腦 爲未少許 搽患處

○治口瘡 縮服爲未 搽之 又烘燒灰 存性爲未 入輕粉 付

○治熱壅上攻舌生瘡 烏桕搗爛 傳脚

○黑散子 治血熱舌忽然腫硬 釜底

煤醋調傳舌上 脫去更傳 先能出 血竟傳之尤佳 一法用塩等分調

○治重舌 五灵脂 米醋 一椀同煎 旋漱 立安

○治舌腫脹 鵬砂爲末 薑片 蘸藥 腫漸消

○艾參升麻湯 治心脾壅執 舌上生

瘡 木舌重舌 舌腫 或連頰 腫痛 艾參 赤芍 升 犀角 桔 苓

管仲 絡 廿 半 右作 一貼 生姜 一 片煎食後服

○治重舌 喉閉 朴硝 白礬爲末 搽 入口中

○治重舌 五灵脂 砂 兩 去 爲末 米醋 一 盞煎 含漱

○一方 朴硝 研黃丹 分爲末 搽之

○薄荷煎 治口舌生瘡 咽喉腫痛 痰 涎壅塞 荷 二兩 廿 半 行腦 絆

右煉蜜和成餅 嚼服 一方去腦 加桔

○蒲黃散 治舌忽然腫硬 或血出 如 鴈鳥 鱧魚 骨 蒲黃 等 爲末 傳舌上

○治舌上血出 香薷煎汁 飲數盞 瘡 乾 乾 檢舌上

○丁香圓 治口臭穢 丁香 廿 仁 廿

後ル正レ律レ煉レ蜜ヲ丸ニ彈子大綿畏含噫津

○一方乾甜瓜子末蜜丸如櫻桃大每
日瀨口了含下丸

○治口臭及蠶齒腫痛細辛者濃汁熱
含冷吐之

○治口臭香薷一把以水了者取二
升稍大含噫之

○訶子湯 治失音不語 訶四箇半
桔一兩五分甘二寸半右分二貼水
一盞童便一盞煎食後服

○玉粉丸 治久月寒痰結咽喉語音
不用 桂字草烏字半伍為末姜汁

浸蒸餘丸如雞頭大每服一丸至夜
含化多年不愈者亦效

○響勝破苗丸 治歌謔失音不語者
翹倍 其兩半青訶肉炒縮

大略一芎半兩百藥煎兩右為末雞
子清和丸如彈子大每用一丸臨卧

含化
○一方 治失音不語 百藥煎 杏
去皮百合 訶肉 薏等右為末雞

子清和丸如彈子大每用一丸臨卧
含化

○一方 杏去皮桂等分為末煉蜜
丸如彈丸綿白膏煎小不開合煎

○一方 調日江湯煎自如常生入香
油三滴良臨卧之時乘熱服聲音漸

○自通揚
○又槐花瓦上炒令香夜倒三便柳

床拈取花來如意食明朝聲響漸環

○

○瀉黃飲子

治風熱在脾經唇燥

裂無色芷升根煨苓風

半斛絡其行右入姜煎

○慧苡仁湯

治風熱在脾唇口動

或生結核或為浮腫慧炒已小

豆其等分右入姜

○白布散

治唇緊口小不能開合飲

食不得不急治則死名曰緊唇又名

瀝唇用白布作燈熇如指大安方升

上燒冷汁出取數唇日三度用青布

亦佳或青布燒灰酒調一錢服亦可

和猪脂調敷可

○一方生馬齒苋濃煮汁洗冬月用乾

者一方驚甲及頭燒灰作末傳之

○一方治緊唇以頭垢傳之

○治唇上生瘡連年不瘥用八月藍葉

煎搗汁洗

○治口吻瘡搗經年葵根燒灰傳之妙

又槐柳燒灰細研傳患處

○灸法

○治緊唇不能開合灸虎口男左女右

○一法灸美索三壯在頰前下唇之下

宛人中

咽喉門五

○原病或曰喉痺痺不仁也俗作閉曲

閉塞也云內經言喉痺則咽與舌其

兩間取然其病同於火故不分也後

醫者各詳其壯強立以名熱氣上行

傳於喉之兩傍近外腫作以其形似

是謂乳蛾一為單一為雙其此乳蛾
 差小者名閉喉雙結於舌下復生
 一小舌子名日子舌脹熱結於舌中
 舌為之腫名曰木舌脹木者強而不
 柔和也熱結於咽喉腫達於外且麻
 且痒腫而大者名曰纏喉風喉痺暴
 發暴死者名曰走馬喉痺此八種之
 名雖詳若不歸之火則相去遠今之
 醫者皆有其藥至走馬喉痺何待此
 取其生死反掌之間取無如針出
 血

傳其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾
 易治一過腫者謂之單乳蛾難治古
 方通謂之喉痺皆相火之所衝逆取
 火者痰之本痰者火之標火性急速
 故病發則暴悍治之法必先大湧其

痰或以銀鍼刺其腫處此急則治標
 之法也用藥者必須以內經從治之
 法而以枳其玄參升麻羌荆參木苧
 之類少加姜附等藥為嚮導徐從頻
 與不可頓服此為治之大法也切不
 可驟服寒涼之藥非徒無益而且促
 其死耳俗人未諳此理而復用艾連
 施栢之類正治之腫勢稍退為獲効
 殊不知上熱未除中寒復生

林銅人中亦有灸法然痛微者可用病
 速者恐遲則殺人故治喉痺之火與
 移火同不容少待

巢氏病源云脾胃熱其氣上衝喉咽
 生瘡
 懸懸雖在上上勝懸閉暴腫閉寒喉嚨
 亦如喉痺

耳枯湯 治喉咽熱腫聲不出 桔
梗耳兩右水煎食後服

三方 治喉痺并時疫毒 桔 甘
升 翹 風 牛 芩 酒 各右水
煎食遠細心飲服

牛房子湯 治風熱上壅咽喉窒塞
或癰或生瘡 牛 玄參 升 桔
甘 遲 通 芩 各等右

敗毒散 治喉咽傷治證同前加芩半翹
倍桔痰盛加石膏

解毒雄黃丸 治纏喉風急喉痺牙
關緊急不省人事并小兒喉嚨赤腫
驚恐痰涎壅盛並宜服之 附見中風

王鑰匙 治風熱喉痺及纏喉風
煇硝半兩 鵬 伍 蚕 炒 去 絲 嘴 腦 穿 右
研勻少許吹入喉中

一聖散 治纏喉風急喉痺鵬嘴腦
蟾行白姜蚕炒五右為末少許吹入
喉中其驗

經驗丸 明礬 白梅肉 礞石如皂
子大食之牙緊松之

有礬散 治纏喉風急喉痺 明礬
往巴 作 片 右 將 礬 瓦 於 鐵 內 慢
火 熬 為 末 候 乾 去 豆 取 礬 加 輕 麝 各
少許吹喉

通關散 治咽喉腫痛水穀不下
青塩 三 括 礬 仁 鵬 行 右 為 末 少 許 吹
入喉內有涎吐出一二次腫自消

吹喉散 治咽喉腫 黛 雄 鵬
膽礬 煇硝 將 右 為 末 少 許 吹 入 喉
中

奇方 治喉痺 射于新者橋爛取

汁吞或用米醋同研取汁含引吐涎
更效

○**方** 治纏喉風急喉痺 陳白梅
去入膽礬在內綿裹含之 懸白梅
鵬砂亦良

○**方** 治走馬喉痺 滋腫 馬鞭草根
研自然汁 蘸一金

○**方** 治喉痺 桃皮汁含而服之 或
煮皮汁含吞之

○治急喉閉 牙關緊閉 巴豆去殼紙包
去油在紙上 以此紙作紙捻點吹
痰以煙薰鼻中 即時口鼻涎流 牙關

遂開

○治急喉閉 皂角去皮子生半兩為
末少許以飯頭點腫處 更以醋調藥
末傳項下須臾便破少血出愈

○治喉痺 牛房子分馬藟子 分為末
空心暖水調下

○治纏喉風 生白礬末冷水調二錢
下

○治喉腫不下食 生韭研爛敷喉頂
下

○治喉痺初起 腫痛 鵬砂含津噀之
通關飲 治喉痺腫痛不能言語者

參 朮 苓 各一劑 芎 藭 姜 炮 各

風 杜 桔 仁 甘 後 半 或 加 附 從 律 右 木
煎 徐 入 與 之 一 方 去 木 苓 姜 附 加 茶
煎 子 名 利 膈 湯 治 喉 癢

○治咽喉痛腫 荆穗 飯身 桔
甘 等 分 右 木 煎 溫 漱 而 服 之 有 熱 加

岑 枳 刺 少 商 出 血 立 愈

○喉乾燥痛 四物加桔荆知柏立已

○治纏喉風燈心草燒灰吹入喉中
○治喉痺鴨嘴鷹拳二分或為末吹入喉中吐痰而愈

○一方新取艾葉拈汁灌入喉中即愈
○又方蛇床子有嘴甌中燒冷病人以甌嘴布口中吸煙立愈

○治喉痺及喉中熱痛上好消梨拈汁頻飲之有嚼嚙下亦可多食為良

正 栝核湯 治熱腫喉痺 栝 廿 翹 施 芩 奇 右入竹葉

○全 治走馬喉痺 巴豆去皮 緋裏隨左右

○懸 治左右穀芒刺在喉中芝麻湯煎細 人呷之

○喉痺心腹腰痛難治
牙齒門 六

○傳 夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脈絡上齧手陽明大腸之脈絡下齧手陽明惡寒飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其痛有惡寒惡熱之不同也開口呷風則痛甚者腸胃中有風邪也開口則穢臭不可近者腸胃中有積熱也或痛而齒動搖或痛而齒侵蝕大抵齒齧宜露而動搖者腎元虛也治宜滋陰補腎慎寒惡熱而口臭穢者胃氣熱也治宜安胃瀉火風和虫蝕之証蓋且熱生風而風生虫也腸胃之火既平更以擦牙誅虫之藥以治其標也

林 獨活散 治風毒牙疼牙根腫痛

獨 芎 羌 風 各 半 荆 一 苛 生地 各 二

右水煎漱

○定痛散 治風牙立効 芷 川烏
略 細 衞 乳 行 右爲末每用少許
擦牙吐涎瘕以塩湯漱灌

○烏辛散 治風牙疼 細辛 草烏 分
爲末先以水漱口淨少許擦患處一
方加川椒

○細辛散 治風牙疼腮頰浮腫 紅
椒 風 縮 牙 皂 檉 枝 五 荆 穗
細 各 一 芷 草 烏 略 二 右 爲 末 少 許
頻 擦 患 處 有 涎 吐 之 仍 用 塩 湯 漱

○玉池散 治風蛀牙疼腫痒齧爛宣
露 出 血 口 氣 飯 藁 地 骨 風
芷 槐 炒 芎 其 炙 升 細 絡 等 右
爲末每用一字擦之痛甚取二三錢加
黑豆半合姜二十片水一盞半煎七分
溫漱

○一方 治風牙疼 芷 所 殊 心 煉 蜜
丸如櫻桃大擦牙

○如神散 治風虫牙攻注疼痛牙齒
動搖連頰浮腫 椒 炒 出 蜂 房 等 各
右爲末木煎熱漱即止

○一方 治風牙虫牙疼 椒 細
風 蟬 荆 獨 得 右 木 煎 熱 漱

○一方 治風牙 耳 膏 升 細
草 烏 芷 風 卷 得 右 爲 末 擦 牙

○單方用鷓鴣風
○一方 升 細 膏 藁 檀 皂
等 藥 少 許 擦 牙

○風牙不怕冷熱宜用皂蚕蜂房草烏
等藥

○寒者怕熱湯宜用良橙細筆藥

○有芷散 治大寒犯腦牙困疼痛

麻草蔻各半 莖 升 各 吳茱 芷

各四 飯 熟地各半 藁 分 枝 半 分 莖

分右為末先用溫水漱淨以藥擦之

○丁香散 治牙疼 丁 橙 蝎梢

大椒 等 為 末 擦 患 處 有 津 即 吐

○一方 草薺 芷 細 草 烏 丁

蝎梢 右 擦 牙

○一方 升 飯 齏 細 橙 芷

荆穗 等 右 為 末 瓦 盒 貯 之 緊 閉 勿 泄

氣 每 用 少 許 擦 痛 處 後 以 荆 艾 湯 漱

之

○古方 治牙疼 薑 橙 為 要 藥 也

○熱牙怕冷水宜用牙硝姜黃雄荆等

藥

○驅毒飲 治熱毒上攻宜露出血牙

酸腫痛 犀遊 胡 瓦 上 青 右 木 煎 澄

清入盞一椀頓飲

○犀角升麻湯 治陽明經受風熱口

唇頰車連牙腫痛 犀 半 升 伍 一

風 羌 各 伍 芎 芷 芩 白 附 各

料 其 料 右 木 煎 食 後 漱 服

○姜黃散 治牙疼不可忍 姜黃

細 芷 等 分 為 末 擦 牙 須 臾 吐 涎

塩湯漱口又治牙疼面赤腫去姜黃

加 芎 立 效

○清胃散 治因服熱藥齒疼引頭腦

滿面發熱喜寒惡熱 生地 酒 二

連 飯 酒 各 壯 升 行 右 水 煎

食遠冷服

○神功丸 治多食肉口臭牙齦疳蝕

蝦肉欲脫牙落血不止 蘭香葉

如無薤 飯身 薤木 升格一

生地 麵生 苒 絡三連 麵宿 絡五石 爲

朱湯 慢蒸 餅丸 白湯 食遠下

○祖傳治胃有實熱齒痛涼膈散 方見傷寒

門 以大黃 蒸爲君 加知膏 升爲佐 類

金鱗即愈

○牙 必自竅 用雄黃 石灰 等藥

○砂礫散 治蛀牙 石灰爲末 砂礫丸

如黃米 大塞 蛀孔

○一方 枯凡 滴乳 味爲末 同 蠟 溶

化 凡 塞 蛀 穴

○一方 川椒 粗 十 巴 斫 右 飯 丸 如

豆 大 綿 包 塞 蛀 穴

○治 虫 牙 咬 藜 刺 末 塞 孔 中 勿 令 膿 汁

又 雄 雀 糞 綿 裹 塞 蛀 孔 日 二 三 次 易

之 雄 雀 糞 綿 裹 塞 蛀 孔 日 二 三 次 易

○治 風 虫 牙 疼 鶴 虱 以 醋 搗 爛 入 盞

少 許 漱 口 良 久 吐 出 又 愈

○治 齒 虫 痛 嚼 薑 陸 香 噉 其 汁 瘥

○又 雄 黃 末 蜜 丸 如 棗 核 塞 牙 間

○又 薑 蒼 末 先 以 鹽 揩 齒 令 淨 傳 少 末

於 上

○又 杏 仁 燒 煙 末 盡 研 如 膏 物 裹 內 孔

中

○又 蒜 薤 李 樹 根 取 白 皮 細 切 水 浸 濃

汁 含 之 良 久 吐 出

○治 風 虫 牙 疼 藉 殺 老 絲 凡 燒 存 性 爲

末 擦 之 效

○又 苜 蒲 切 片 抵 痛 牙 處 咬 定

○更 食 齒 根 齒 黑 者 以 松 木 灰 搗 之 末

雞 黃 塗 齦 上 百 年 效

○安腎丸

治腎虛牙齒腫疼

菴酒浸

桃去核去尖木

補砂山

斛

白蔞

射去薛

川烏去皮

巴戟去心

等分

右為末煉蜜丸空心監湯送下

○宣風穿牙散

生頰補腎穿牙固齒

青鹽

細絡七芎

飯

酒洗乾

右為

末少許清晨擦牙漱滿口連藥嚥之

○牢牙石嚥子散

治斷肉不固及腎

弱齒疎或血出侵蝕

青鹽研麝研

紅石燕子

後對火煨酸去七毒氣

右合研末每用半錢以指蘸藥擦斷

上合口少時後溫酒漱嚥不嚥亦可

○治牙根動欲脫

生地黄剉皂裹者

牙上嘔之漬齒根三五次嚥之十日

效

○堅齒藥

黑鈆半斤砂錫溶化入糸

在盆內

以水洗眼能明目黑髮鬚髮治

牙齒動搖疼痛大能牢牙

○擦牙散

穿牙芎風升細

苓

芷

檉

其

松

香附酪

石

為末少許擦之

○一方

治牙疎墮物

寒水石煨

其石生等分為末少許擦牙忌用刷

牙脂麻茶物

○香鹽散常用治虫牙去風熱宜露一

切齒疾

香附醃

青鹽研

石

為

末

擦牙

煎湯漱之

○治諸般牙疾

香附

生

艾

葉

等

濃

煎湯漱之

○一方

枯凡蜂房等分為末煎湯含

漱冷則吐出去毒名

○一方竟菜梗燒灰為末擦疼牙止

○一方加荷燒灰為末擦之

○一方馬夜眼燒存性為末敷上立愈

○一方蒼耳子水煮汁熱含之莖葉亦可
可入鹽亦可

○治一切風牙疳牙疼痛不可忍者

發良 草烏 芎 加胡椒為末

酒糊丸一丸咬在患處有涎吐之立愈

○治牙疳燕仔屎九桐子大用疼牙上

咬之九消愈

○治風熱上攻牙齒疼痛稀莖草霜後

取之曬乾為鹿末每用行以滾湯泡

漱之醋煎尤妙

○治牙疼齦宜露每且以鹽末擦牙後

用湯漱之百遍其牙自牢

○治齒腫痛及口氣 細辛煮濃汁熱

含冷吐出

○治卒齒痛苦竹燒一頭一頭得汁多

搗齒差

○治諸牙斷疼 杏仁胡椒鹽坊寸水

一升煮令沫出含之

○治牙疼微惡寒飲大惡熱

飲 細辛炙其待升於風行膳酒洗

右為末水煎去粗以匙抄在牙疼處

得少時則止如多惡熱飲更加膳

○治牙疼諸藥不効其宜煎濃汁含漱二

五日愈

○治走馬牙疳如神 干姜棗核燒枯

凡疔為末付之即愈

○小兒走馬牙疳一齊齒爛即死此

方神效婦人尿桶中白垢火煨銅綠
研藥一分右末存之立愈

○取赤藥草烏煨略半椒細落
不右為末少許搽患處其牙自落

○地龍散 治牙痛宜露出齒 地龍
法延 檢 等分為末綿裹隨左右
痛處耳內塞之

○林灸一切風腫由牙疼痛以草量手中
指至掌後橫文止將草折為四分去
三分將一分於橫文後量臂中灸三
壯隨左右灸

○一法兩手交又中指盡處灸七壯疑
穴

又灸肩髃七壯隨左在右有端兩骨
間陷中與臂取之

又灸耳垂下盡骨上三壯未効再加

○治口齒蝕生齦斷痛藥漿一穴灸三
壯

○傳上牀痛灸起三里一穴七壯足陽
明經

○下牀痛灸手三間一穴七壯在手大
本節後內側陷
中手陽明經

髮病門七

○五神還童丹 仙家傳授髮明目

地靈 赤石 川椒 辰 神 乳

略一右為末棗肉丸如梧子大每服

三十丸空心溫酒下

○治白髮 烏麻九蒸九曝為末以棗
膏丸服

還精丸

治白髮極效燒已髮全頭
垢等分丸如大豆大每服三丸合頭
不白

○治髮落不生側柏葉陰乾為末菜油
調塗

○治無髮 鮮血葉搗汁塗之即生

痔漏門

痔漏者肛門邊內外有瘡是也成瘻
不破者曰痔破潰而出膿血黃水淋
瀝不止者曰漏

○諸痔出血肛門間別有水竅下如血
線不與便物共道久不愈必至穿穴
瘡口不合漏無已時此變為癰也

○腸風藏毒與痔瘻同出而異名久則
滿腫腸頭濕爛可畏致重是地治法
當此重

傳

丹溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也
治血為主大法用芩涼大腸參連生
地槐角涼血生血當飯和血芍丹枳
寬腸

○漏瘻先用補氣血藥參芪飯木為主
大劑服之外以附子為末津和作餅
如錢厚以炙多灸之冷灸微熱不可
冷痛餅乾即易之再灸又以補氣血
藥作膏藥貼之

秦九卷活湯

治痔漏成塊下垂不
任其瘻 卷二升元 芪裕下風
升 參身 麻 柴路五葉紅
細路少石煎服忘寒風處大小便

秦九蒼木湯

治痔核已破謂之漏

大便秘澁必大痛此濕熱風燥因氣
合而為病 芫 桃去皮皂仁燒研
下不蒼米泔風浴七相酒洗沃 飯
稍酒洗各枚大少計鱗大使澁
右除核桃皂餘藥水煎去粗入核桃
皂煎前空心煎服待少時以姜膳壓
之不犯胃氣也服藥自忌生冷硬物
及酒濕麪椒姜等

○秦九當飯湯

治痔漏大便結燥疼

痛多 大襪四芫 實絡一沃 飯梢

皂仁 木浴五紅抄桃二干片右煎

服忌如前

○秦九防風湯

治痔漏大便時發痛

如無痛者非痔漏也 芫風飯身

木浴半多半 沃六相酒洗大煨

陳絡三柴 升絡二桃三干紅抄

右煎服避風寒忌房事酒麪辛辣

○實取郁李仁湯

治痔漏大便硬努

出大腸頭下血苦痛多 郁 皂仁各

不實神芫 麻 飯梢 生地 蒼

絡半大煨沃絡三右除皂為末水煎

二和粗入管仁空心服忌如前

○紅花桃仁湯

治痔漏經年 相行

半生地行沃丸蒼丸飯梢 漢已

風梢 猪絡半麻仁分紅抄桃行

石水煎極熱服忌如前

○七聖丸

治大腸疼痛不可忍 卷

斷郁湯法去破五核大襪八枚 桂

木 芫絡五右為末煉蜜丸白湯下

微利而愈切不可多利其痛甚

○秦九白木丸

治痔漏有膿血大便

燥梗疼痛不可忍 芫 桃去皮

皂仁各一兩 存性 飯枳酒沃 實燒水 路
各地榆仁右為末麩糊丸如雞頭實
大冷藥光澤焙乾五下丸空心白湯
下待少時以姜鹽壓之忌生冷菜
硬物酒濕麩辛辣大熱

香殺丸

治因而飽食腸滿為痔久
而成漏速治來愈也 木 栢 飯
洗荆蕪絡三寸製和麩紗各連兩蠟
皮燒研右為末麩糊丸如桐子大每
服二五十九丸白湯下日三服

五痔散

諸痔不問冷熱內外並治
蟹醋浸蠟皮剉研 後蹄者劉蜂
房糞醋各 蛇皮一條 燒右為末入麩紗
每服一錢半食前米飲調下

殺痔丸

諸痔通用 膠 連 貫
象酪半方 盈尺皂角去核 蟹殺 蠟殺 蜂殺 蜂殺

蛇皮無焦 皂刺路穿山 人中黃 猪後
蹄番甲 燒各 飯 芎 槐絡 半
右為末米醋煮麩糊丸如桐子大每服
七十丸調氣用枳殼散見消血熱
荆芥煎湯下食前服

乾薑湯

治酒痔 葛 枳炒 半
冬 生地 杏去皮 各半兩 芩 苈各 絡
半右每服五錢黑豆百粒姜煨白梅
一箇煎服

猪甲散

治諸痔 猪後蹄 番甲燒
為末陳米飲調服

橘皮湯

治氣痔 陳 枳燒 芎
橘炒 各枚 木 桃去皮 蘓連 蒞炒
苈各 右入姜煎

逐毒湯

治痔漏熱証瘀血作疼通
利大小腸取下黑物 芎 芷

生地 赤芍 五灵 枳殼膠炒
苓 莪 煨神 通 生 苁 各 一 大
挑去皮大各 右每服八錢 姜 片 蜜 三
匙 水 煎 服 以 利 為 度

○地榆散 治痔腫痛 地榆 莪
枳 枳 芍 芎 赤芍 槐 羌
略半 自斂 蜂房炒其 灸右木煎

○皂刺丸 治痔痛而復生 皂刺 兩
煨薑 白礬 煨枳 白藜 桑 枳 末 羌
略半 風 槐 各 三 蛇 床 伍 蜂 房 炒
五倍 各 一 右 為 末 醋 調 菘 豆 粉 為 糊
丸 以 練 根 煎 湯 下 仍 用 童子 熱 尿 入
自礬 末 洗 肛 門

○芎飯丸 治痔下血不止 芎 飯
芫 麩 炒 地 榆 槐 微 炒 各 膠 炒
荆 穗 木 賊 頭 髮 燒 存 性 右 為 末
煉 蜜 丸 米 飲 下

○雷陽丸 服此以防肛門急燥致無
澁痛而已 枳 殼 大 煨 飯 等 右 為 末
煉 蜜 丸 空 心 白 湯 下

○槐角丸 治腸風下血痔瘻脫肛 服
此除根 槐 角 炒 兩 地 榆 飯 酒 煎
芫 風 枳 殼 各 右 為 末 酒 糊 丸
如 桐 子 大 每 服 三 四 十 九 米 飲 下 殺
再 止 爽 痔

○神應黑玉丸 治腸風痔漏痔痛肛
邊多生硬核 此 疾 多 入 外 墜 殊 不 知
病 在 腸 藏 有 虫 去 根 易 愈 蝟 皮 剉
牛 角 膠 略 八 猪 鬃 蹄 百 槐 角 雷

脂 麻 略 二 丸 髮 湯 洗 痔 敗 棕 阻 各
練 半 兩 右 咀 碎 用 瓷 罐 燒 存 性 為
末 入 乳 香 兩 麝 鈔 研 入 和 勻 酒 糊 丸

自五三 二五五

如桐子大每服五十凡先細嚼胡桃
一枚以溫酒吞下且服甚者二服
空心切忌別藥

○**地黄丸** 治五痔發陰 地酒蒸熟下酒六

各摺角炒相炒仲炒並略 山藥
山菜 獨絡八沢 壯 苓絡六

莖平兩白附仁 右為末煉蜜丸如

桐子大每服五十凡空心米湯送下

○治五痔蒼耳莖葉端午日搗陰煎為

末空心水服方寸七

○**痔瘡** 凡用枯痔藥後及大小便間好

勿取如針刺及痛上腎根令人將衣

物火上烘之令熱熨痛處三五次痛

立止林物二字一
林作故綿

○又治痔初起痛痒不止以自已穿舊

鞋底烘熱熨之冷則再烘其痒

即止

○又慰痔頭出或痛不可忍取殼於煙

灰中煨熟慰盡七枚立定發即慰之

○**洗痔方** 槐 荆 枳 艾 等水煎

入白礬薑洗

亦可

○**丁方** 連 芩 荆 麻 側柏葉

槐條 鏡面草 蚶蚶草等水煎洗

○一方用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾

灸七壯

○治腸痔大便常止血葱白三五斤煮

湯盆中坐洗立瘥

○**德** 方韭菜湯薰洗

○**傳** 治痔瘡風腫疼相麻子煎湯洗之
腫即消

○又五倍 朴枹 桑寄 蓮房煎湯
先煎後洗

○寒藥 芫其石 牡蛎炭為末
代之

○又木鱉五倍為末代
治痔腫痛 蝟牛 乾為末代之或香油
浸蝟月餘而以其油塗之立效

○敷藥蝟牛膏 蝟牛 鹿茸 麝香
合盛次早取汁代不用腦亦可

○一方熊脂腦子研并花水調以雞翎
拂痔上

○一方寒水石朴硝末漆調手指點藥
敷痔上

○治腸痔下部如虫齧 蝟皮燒末生
油和傳之

○治痔發痛 杏仁炒研膏敷之
水銀掌中以唾研令極細傳膏乳上
內下部瘻

○治痔痛 枇杷屎塗蜜炙同烏梅肉
梅爛先用烏梅核煎湯洗後敷藥痔
上

○痔有頭如雞冠者黃連末傳之更加
小豆末尤良

○治翻花痔 馬齒莧斤燒灰細研
脂調敷之

○治漏 蜂房 赤色 為末每用一錢
臘月宿臘調敷又龍骨 煅石膏
印正黃丹 碎為末按瘡口

○治痔漏 蒲町血竭 研為末少許點
患處

○心 漏瘡血水不止 蛇皮鱗五倍 龍

○心 漏瘡血水不止 蛇皮鱗五倍 龍

骨絡半續行爲未入麝少許津唾調

傳

○惠壽以公羞用熊膽塗神效一切方不

及

○**灸法** 治五痔對臍脊骨上灸七壯

○又治五痔便血灸長強穴年壯在脊

竅骨上

○**丁法** 治痔疾大如胡瓜貫腸頭熱

如瘡火發則僵仆以柳枝濃煎湯

洗之次灸其上三五壯若覺一道熱

氣入腸中大瀉鮮血穢惡一時許甚

痛瀉後乃愈

損傷門九

墮隨 跌撲杖瘡 金瘡

竹木刺 湯火傷 犬咬 猫

咬 鼠咬 蛇傷 馬咬

人咬 蜈蚣傷 蜂傷

○**王** 從高墜下敗血凝滯從其所屬入於

肝遊所行之血氣以破血行氣之藥

○**林** 肝膽之經俱行於腸胃屬厥陰少陽

况血者肝之所藏故惡血必歸於肝

法當以柴胡引用爲君佐以破血之

藥治之

○**王** 墜隨打撲皮不破而內損者必有瘀

血若金刃破皮出血或致亡血過多

一者其治不同有瘀血者攻利之亡

血者兼補而行之宜先逐瘀血通經

絡和血止痛然後調氣養血補益胃

氣則無不效

○凡傷者未服損藥先服氣藥如

白氣散之類

傳元治損傷效在補氣血俗工不知惟
在速効多用自然銅以燒骨然此藥
必煅煉方可服新出火者其火毒與
金毒相窮挾香熱藥毒其燥散之禍
甚於刀劍飛之

○治跌撲損傷用藕朮以治血黃連以
淨火白朮以和中童便煎為妙在下
者耳下瘀血但先須補托在上者宜
飲韭汁或和葱吃切不可飲冷水蓋
血得寒則凝但一絲血入心即死

○林
元打撲墮腫及傷便覺氣絕不能言
取藥不及急開口以熱小便灌之

○元手脚骨傷甚者不可治

○元損傷用火灸則醫不得服藥不効

○元傷重必用藥水洗然後塗藥傷處
不必洗便愈

○元損大小便不通未可便服損藥蓋
損用酒必熱且服四物湯又服大羌
氣湯加木通如二便尚未通又加升
確待二便通後服損藥

○元傷重者用此方洗之然後傳藥生
葱方作荆飯 右三味煎湯溫熱
洗

○仙正散

洗藥治骨折用此煎水洗

後整骨却用烏龍角煎之如破蟹口
當交縛 桂仁飯法從荆劑倉風各
兩延 芷 赤芍絡五右以咀每用五

錢水五升乾荷葉兩片煎至三升去
滓於損斷處及冷水風脚筋肤拘急

行步艱苦可用此藥用被蓋覆候溫
淋洗

○一方治骨斷

仲麻五加耐葱根此

右每服一二兩半水五升煎至七分去
粗淋洗洗後整骨用烏龍角煎傷
破留口用藥

○烏龍角煎藥治跌撲傷損筋骨碎斷
麩交 蚕蠶絲小豆 膝酪六桂

桔 白芩 山枇杷葉 陳錦百草霜
絡一骨碎補法毛 飯尾 細絡半並

南星煨赤芍 何首烏 白斂酪
知 草一烏饒三醮右為末以姜汁

或冷木茶水調攤紙上於痛處貼之
三百一洗換貼

○打撲及刀又傷皮肉破青腫急用末
經水葱搗爛炒乘熱貼傷處冷即換

○指爪抓破葱葉熟貼冷再換
一方 治傷損筋骨腫痛 草烏行

去皮飛羅羅通 貝母 南星 絡半
清調貼 ○皮破見血者去草烏

○止痛法 白礬為末每用一匙沸湯
一碗衝了以手拍離熱熱傷處少時

痛止然後用貼藥
○接骨丹 南星 木別 三兩 沒徑桂

兩乳行右為末生薑一片去皮搗汁
入米醋少許白麵調藥攤紙上貼

傷處以帛縛之麻皮纏之
○追毒散 白礬 雄黃 等為末乾擦

或油調塗
○治腦骨破及骨折葱白研和厚封

損處立瘥
○治因傷血出不止大黃燒存性為末

傳瑞半日合加石灰葱葉尤妙思為
魚骨非窩窩菜

○治打撲瘀血流注紫黑大黃末姜汁調塗一宿黑者紫二宿即白

○接骨散 治從高墜下筋斷骨碎痛不可忍 明砂七个半 一定粉 飯

絡五右為末煎藕木湯調一二錢服

○如病在上先喫沙鷄子碗服藥別

作糯米粥入藥末和勻攤紙上裹傷

處ヲ

○當取散 治打撲傷損皮肉破筋骨斷瘀血壅滯結腫不散或作癰疽疼痛甚及傷後虫鼠手足痿痺

汎蘭 飯 膝 續各十芍 芷

芎 桂 白楊皮亦用細絡五 川烏

川椒各三桔 甘各四右為末熱酒調下

○白氣散 凡傷重先用此藥調氣

後服藥 苧 青 朴 芷 烏藥

杏去皮各兩陳 葉 前 桔 蒼

甘各一右每服一二錢姜三片棗一枚煎空心服

○大美氣湯 傷損極重一便不通者

左服此可加水通如未通加朴硝各候

一二使通服損藥不可用酒煎愈不通

矣然亦須量入肌弱用孕婦小兒莫

服各大 枳各四芒 甘 陳 紅 飯

藕米通各二朴少右水煎專治傷

重瘀血不散腹脹一便不通上攻心

腹悶亂急將此藥通下瘀血後再服損藥

○陰紅湯 治婦人傷損瘀血不散腹

脹一便不通上攻心腹悶亂急將此

藥通下瘀血後服損藥 產婦油

髮燒 鹿角膠各一沒行右為末温

煎服

○

○

○

酒調服

○止痛當飯散

治打撲損傷腫痛不可忍 米殼去青腸 芷 其各 酪二兩 半加乳沒絡少 右每服一錢水一盞酒半盞同煎至八分溫服

○復元活血湯

治墜墮惡血流於腸下疼痛不可忍 柴三 枳三 桔 飯鬻 行紅神大酒浸 其條 川山甲炮 分桃二 六一 右分一貳水一盞半酒半盞同煎至八分五更平明溫服得利為度利後痛未盡更服

○當飯導滯散

治墜打壓逆 腫滿疼痛 大町飯尾半 兩一字 方二 用 右為末熱酒調服通利為度

○補損當飯散

治墜馬落車傷腕折 附地 各一 分飯炒 椒炒 甘炙 桂各 三分 炒六一 右為末每服一錢溫酒下忌

○沒藥乳香散

治打撲傷損痛不可忍 木炒 二飯 焙甘 炙芷 沒乳 桂各 五右 為末溫酒下

○雙鳥散

治打撲時痛及內損者 川鳥 草鳥並 各 飯 白芍 蘓木 大黃 生地 紅麴炒 各 麩射 沙 右為末酒煮一椀放冷服如覺麻痺無害但二鳥生用雖好恐大猛故炮之去皮臍用也

○一方

治躓撲傷損瘀血留經絡成痼疾老黃茹種薄切瓦上焙乾為末溫酒或鹽湯調二錢服雖十年積血亦可下

○接骨良方

乳香研燒過入骨男用
女用飛羅麵生肌
無根水丸如梧子大每服二十丸好
酒送下

○益母膏

治折傷內損有瘀血每遇
天陰痛方見婦人門

○元戎接骨丹

沒乳飯椒
自然銅煨 骨碎補酒 赤芍 敗
龜板炙 虎胥骨 芷 千金藤印
李仁各等分 右為末北蠟五錢丸如彈子
大每服一丸好酒半斤化開煎用何
東南柳枝攪散熱服○一方加龍骨
川芎

○鷄鳴散

治從高墜下及木石所傷
瘀血凝積痛不可忍 大黃兩 香
一粒 去 右酒煎去粗雞鳴時服至
曉必下此方用香 行氣中血

林

治遭杖打不靛不腫不成林瘡以火
骨燒灰為末覆先酒調三錢空心服
久服皮益厚

○治打傷血聚皮不破

蘿蔔研入 之

○治杖瘡及湯火惡瘡不生肌肉者

蠟四兩 清油斤 先二 味煎三五 沸次入
黃丹一兩 每煎五七 沸候冷入乳沒
末各五不攪勻成膏厚紙攤貼患處

○金瘡出血過多 四物加參芪

○兵器傷血出者必溼不可與水只食
乾食肥膩之物不妨如食薄粥則血
流而出必死

林 禁聲飲子

治瘡刀刃傷疼痛不

可忍 防風 南星湯洗 右姜一片
水酒煎食遠服

○金瘡腸出欲入之 磁石滑石各二
為末米飲調方寸七日三服

○治金瘡未愈而交接血出不止婦人
衣帶二寸燒末水調服

○治箭頭在骨內不出者大雄鼠一枚
取精肉薄批為末每服二錢熱酒下
若覺箭瘡痒不抵忍痒少時箭頭自
出

○治金瘡已斃箭中悶絕無所識 琥珀
研童便調服

○新被毒箭搗薑青絞汁飲并傳瘡上
如無薑可漬青布絞汁飲之

○龍骨膏 治金瘡 龍骨 海螵蛸
五倍 赤石脂 黃丹各 右各等

○丁方 治金瘡止痛止血 連 換
等分 研末付

又大黃煨存性末付
又紫蘊一味末付之
又龍骨黃柏末付之

○破血丹 治金瘡止血止痛 天花
粉三 芷 姜黃各 一末各 右為

末少許煎於患處或蜜調塗
○黃丹散 治金瘡并一切惡瘡 黃
丹 軟石膏各 等分 右為末搽傷

處甚妙

○治金瘡人膽汁敷患處極妙不可再
用他藥傷益爛如生已敷他藥亦不
可用此

○治金瘡止痛 桑葉灰研傅佳

○治金瘡血不止甚痛變鳩末傳之立止

又方柴檀末傳之

○一方治金瘡止血石灰炒和雞子

白丸如彈子大炭火煨赤搗末傳之

上

○又石灰同韭菜搗陰乾為末搽之縛

定痛血者止

○又止血止痛白芍藥末傳之即止

○金瘡出血急以石灰厚封裹之瘡深

不宣速合者加滑石末付之

○又老杉木皮為末付之

又用松香加琥珀末付之

又菊花或綿花或紙灰填瘡口血止

不膿

又野苧葉或赤葉槿付之乾者付之

○筋錯及針刀不出用肝及腦傳之

又蜈蚣搗汁滴三五次筋頭自出

又象牙屑水和傳上即出

○疫藥散 治刀箭傷止血定痛

胡粉 石灰略 一枯凡三乳香 沒

藥絡 一右為末付傳乳香沒字

○出箭鏃頭方 麩蝦 乳絡等腐妙

者末搗動搽之

○治箭入骨不可拔者 巴箭蟬蝦節

石同研傳傷處微穿且忍極痛不忍

即撼動拔之以黃連貫衆洗以牛膝

製石灰傳之

○治竹木刺在肉中不出

生牛膝莖搗塗之即出

又以頭垢塗之

又搗鱗增傳之

又象牙屑^{カク}搽之

又嚼白梅肉^{カク}傳之

又白菊根^{カク}燒末^{カク}脂膏^{カク}和塗之

又以^{カク}鼠腦^{カク}厚塗之

○湯火傷 神効當飯膏 治湯火傷

嫩赤疼痛腐化成膿 當飯 黃蠟

各一麻油^{カク}兩^{カク}右先^{カク}將油煎令^{カク}當飯焦

黑去^{カク}滓入^{カク}蠟急攪之^{カク}放冷入^{カク}瓷盒內

每用故帛攤貼之

○赤石脂散 治湯火所傷赤爛熱疼

赤石 寒水 大黃^{カク}分^{カク}為末^{カク}新水調

塗

○一方 治湯火傷神効 草麻子

蛤蚧^{カク}分^{カク}為末^{カク}湯損油^{カク}調火傷水調塗

又蛤蚧^{カク}殼燒^{カク}為末^{カク}油調塗

○湯火灼成瘡 柳枝^{カク}燒灰^{カク}以粉塗之

○又石灰水^{カク}和塗

○治湯火灼爛 竹中車^{カク}蚬末^{カク}傳之

○治湯火瘡水煎膠^{カク}令^{カク}稀稠待^{カク}冷塗之

○一方^{カク}薤^{カク}與^{カク}蜜^{カク}搗^{カク}塗

○又單傳^{カク}溫牛^{カク}屎^{カク}痛^{カク}立^{カク}止

○又一方^{カク}將^{カク}生^{カク}胡^{カク}麻^{カク}如^{カク}泥^{カク}厚^{カク}貼^{カク}之

○黃蘗散 治湯火傷 栢 大

朴硝 雞子殼 寒水石 右等分

為末水調塗

○得 治湯火瘡 經霜桑葉^{カク}焙乾^{カク}燒存^{カク}性

為末香油調^{カク}付^{カク}或乾^{カク}付

○林 治中熱油^{カク}燒痛^{カク}以^{カク}白^{カク}蜜^{カク}塗^{カク}之

○治熱油及湯火燒瘡^{カク}痛^{カク}不可^{カク}忍^{カク}石

膏末傳瘡上

○治中熱油及火燒瘡^{カク}榆^{カク}白^{カク}皮^{カク}末^{カク}猪^{カク}脂

煎塗

○治灸瘡多時不愈痒痛出黃水椒葉或狼皮為末付

○犬咬傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒不出也先用導水丸禹功散瀉干餘行即時減腫然後敷貼之末

○導水丸 大 芩 朮 滑 石 香 檳 榔 丸 亦 可 下

○禹功散 牽 四 箇 兩 或 加 木 兩 右 為 末 水 鬼 白 湯 下 為 末 姜 汁 調 服

○定風散 治犬咬毒氣入腹嘔不下 食頭痛 星 朮 防 風 等 右 為 末 糝

○或南星洗防風去姜汁酒調服童便更佳 ○又姜煎入酒服可

○狗咬倉卒無藥用葱搗爛貼之 ○又 牛 糞 塗 之 ○ 一 方 嚼 杏 仁 傅 ○ 又 百

○草霜末油調付 ○又罌矢末油調付 治犬傷臍肉色黃爛 草 麻 子 五 十 去 殼 水 研 成 膏 先 以 鹽 水 洗 次 以 此 膏 貼

○人咬者亦用此方

○一方 治頭犬所傷或經久復發 雄 雞 肝 切 勿 驚 雞 在 自 醒 利 下 惡 物 再 進 下 服

○治頭犬咬韭菜根搗汁多服又灸傷 處 三 五 壯 ○ 又 膽 礬 為 末 貼 瘡 上

○治狗咬桃白皮一握水煎服 ○一方 枯 礬 炒 好

又方槐子皮煨末石硫黃分為末傳 且 一 二 三 度

○治犬咬人發在 虎 牙 虎 頭 骨 末 酒

服方寸匕

○治猫咬鵝薄苛汁塗之

○治鼠咬麝香末津調塗

○蛇傷九初被傷用針挑起咬處皮輕

人煎去棹出少血即愈慎勿妄用雄

黃傳瘡恐毒氣不泄攻肉仍服後藥

○芷細絡五雄仁右為末入麝少許

酒調服

○一方治蛇毒及一切虫傷五靈

酒洗法沙雄五右為末酒調服又

為末傳名靈脂散

又龍腦薄荷研汁溫酒調服又塗傷

處露中心出毒氣

又細撥雄研入麝少許酒

調服治蛇毒及惡犬傷

○解毒散治毒蛇傷入眼黑口噤手

足強直白礬研或甘草等分為末

冷水調下

全毒蛇螫入急掘地坑埋瘡處其

上毒即入土中痛止

○中蛇毒勿渡水渡水則痛甚

○蛇入人最急用刀割尾挾辛辣物用

絲縛定自出不可拔

○辟蛇法雄黃成塊秤五兩帶之入

山則諸蛇不敢近

○蛇傷取大糞塗又灸咬處朱砂

○馬咬用栗子嚼傳又燒灰油調佳所

○人咬龜枝燒灰末油調塗

○蟻咬傷香油點燈火吹滅以烟薰

傷處不痛即愈又用雞糞塗又用雄黃

一方用雞冠血陰又巴豆研猪脂

和塗又用頭垢傳又桑葉莖梗研汁

塗之。又醫監傳之止痛。又監湯浸瘡。她。又并底泥塗之。溫則易之。又麻鞋底灸以搗之即瘥。

○凡蛇蝎蜈蚣咬傷灸傷處三五壯枝去毒。

○凡下切虫獸咬傷腫毒及杖瘡熨發或透入裏者宜先用薄水丸再功散或木香換柳丸下之。

○治蜂蟻咬傷雄黃末木調敷仍酒調服諸虫傷亦用之

○治蜂螫入蜂房末猪膏和傳蜂房煎湯洗亦可。

○治蜘蛛瘡用清油搽之。

○治蚯蚓虫咬其形如大風眉鬚等落以石灰水浸身。

○治壁虱草撥烏頭略雄三

烟硝紅煉蜜為膏貼貼燒下挂於床下其虫自死。

○驅蚊蚋壁虱蒼斤木別雄各二兩半

右煉蜜丸如彈子大床下燒下丸或於政合時當門燒之。

○薰蚊香附丁香蒼斤雄樟腦各兩右為末入雄黃樟腦重羅隔餅時略焙令燥。

○辟蚊木別芎各一兩雄半蜜九

如皂子火焙辟惡虫。

○治頭上虱子利蒼斤末髮中經白虱子皆死。

○治骨鯁入喉縮其等一為末編

暴噉之嘔津父之隨痰出

一方野苧根樞丸噉之又含水獺骨

即下。

又鯉魚鱗皮燻末水服末山史服
又鹿角末含之噓津又羅麥末服方
寸七又以魚骨於頭上立即愈

- 漆瘡田貫仲煎湯洗之妙
- 又用磨刀石上泥塗妙
- 又薄苛葉斤木打煮取五升洗瘡即瘥

- 又以韭葉研傳之妙
- 又以湯溶砒石令濃搽之即愈
- 又用蜀椒煎湯洗之○又取蟹黃塗

- 又以葦蔴紙燒烟薰之
- 又用苧菜煎湯洗之
- 又用白礬煎湯浸洗
- 又用杉木煎湯洗

- 又用芥菜葉煎湯洗
- 糯米生末付立効

破傷風門

傳若夫破傷風証因事擊破皮肉往往
視為尋常殊不知風邪乘隙而客襲
之斬而變為惡候又諸喉又不合口
風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾
焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪
無異其為証也皆能傳毒經絡燒燥
真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜
身軀強直如角弓反張之狀死在旦
夕治之之法當同傷寒處治因其有
在表在裏半表半裏之不同故不離
汗下和二法也

○**著活防風湯** 治破傷風邪初得在
 表 羌 風 芎 藁 飯 芍 各
 各 地 榆 細 各 五 右 木 槲 去 相
 熱 服 ○ 熱 則 加 大 黃 錢 ○ 大 便 秘 加
 大 黃 五 分

○**石末防風湯** 如 服 前 藥 大 過 令 自
 汗 者 宜 服 此 木 一 風 二 芎 半 各
 右 水 煎 藏 存 和 而 有 自 汗 可 用 此 如
 破 傷 風 藏 存 秘 小 便 赤 自 汗 不 止 者
 因 服 熱 藥 汗 出 不 休 若 知 無 寒 也 宜
 連 下 之 先 用 小 芎 黃 湯 二 三 服 後 用
 大 芎 黃 湯 下 之

○**小芎黃湯** 芎 行 羌 芎 各 一 右 水
 煎 三 服 即 止 用
 ○**大芎黃湯** 芎 行 羌 芎 各 一
 右 水 煎 服 以 和 爲 度

○**大羌活湯** 治破傷風邪在半表半
 裏 羌 菊 麻 芎 膏 風
 前 芎 細 芎 白 苓 枳 蔓
 各 四 芎 芷 各 二 右 細 切 作 三 服 入
 生 姜 五 片

○**防風湯** 治破傷風同傷寒表証味
 以 裏 者 風 羌 獨 芎 各 一 各 一 各
 右 水 煎

○**養血當飯地黃湯** 治破傷風日久
 氣 血 漸 虛 邪 入 骨 飯 地 芍 芎
 藁 風 芷 各 一 細 半 一 右

○**石末湯** 治破傷風大汗不止筋攣
 手 足 攣 攣 木 葛 各 二 升 芎 各
 各 芍 細 半 右

○**九味羌活湯** 治破傷風發熱慄
 門

○和傳敷藥

治初破傷風發熱紅腫

風和味入深者 杏_核及白麵_{各等}

右和勻新汲水調和作傷處腫消熱

退

瘡瘍門 十一

集驗

○夫癰疽瘡癩皆由氣血不和喜怒

不時飲食不節寒暑不調而發多生

於膏梁富貴之人平昔所食肥膩炙

燔安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱

毒內攻煎熬氣血而成也

精要

○且分外發內發○初發疽之時一

粒如麻豆大身軀便發熱生疽處肉

亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色

活

○初發疽時身軀無熱自覺倦怠生疽

處亦不熱數日之間漸大開大不腫

不吉向不疼不痛低陷而壞爛破後色

黑為內發未發可少之先藏府已潰爛

百人百不救

精義

○凡瘡腫大按之乃痛者膿深少按

之使瘡有膿淺

傳

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無

膿

○疽發深不痛者胃氣大虛死肉多而

不知痛也

義

夫瘡疽腫毒須辨虛實虛者難補實

者易瀉云

○腫起堅硬膿稠者瘡疽之實也

○腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也

○瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足冷脈弱皮寒小便自利或時難聲不出精神不爽者藏府之虛也

○大使硬小便澁飲食如故腹滿膨脹

○胃脯痞悶肢節痛口苦咽乾煩渴身熱脈大精神昏者藏府實也

○膿水清稀瘡口不合裏腫不赤肌寒自汗色脫氣血虛也

○腫起色赤寒熱疼痛膿水稠粘頭目昏重氣血實也

○頭眩鼻塞目赤心驚咽喉不利口舌生瘡煩渴飲冷睡語咬牙者上實也

○精神不滯大使自利腰脚沉重睡卧不寧者下虛也

○肩項不硬四肢沉重目視不正睛不

者真氣之虛也

○腫嫩赤甚癰不可近積久不潰寒熱往來大使秘小便澁心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也

○又曰脈洪大而數者實也微細而軟者虛也

○治法或疎散或消毒或針烙或內托

或外法或瀉利或補益是故腫瘍為實疽瀉利潰瘍為虛疽補益浮露而淺者為癰疽外法藏伏而深者為疽

其証善而易治者為順惡而難治者為逆

○目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看一逆也

○不能飲食，納藥而嘔，食不知味，一逆也。

○傷痛渴甚，三逆也。

○膈項轉動不便，四肢沉重，四逆也。

○聲嘶色脫，唇鼻青黑，面目四肢浮腫，五逆也。

五逆也。

○煩躁，時咳，腹痛甚，泄利無度，小便如淋，六逆也。

六逆也。

○膿血大洩，厥腫木其膿水臭敗，莫近，七逆也。

七逆也。

○喘，氣短，恍惚嗜臥，八逆也。

○未潰先黑，陷下，唇青黑，便溏，九逆也。

○又如噴氣，痞塞，喘咳，身冷，自汗，目睛耳聾，恍惚驚悸，語言錯亂，皆是惡証。

○動息自寧，飲食知味，一順也。

○便利，識言，一順也。

○神彩精明，語聲清朗，二順也。

○膿潰腫消，色鮮不臭，四順也。

○體氣和平，五順也。

凡五順見，二則吉，九逆見，全則危。

○灸法：凡疽瘡，便宜灸之，一上二百壯，灸後覺熾痛，經一宿，火氣下徹，腫內熱氣隨火而出也。若瘡深，宜置破餅子，灸之，其餅須以椒姜蒜葱相加，搗爛。

搗作餅子，厚如二錢，當瘡頭，餅上灸之，餅子若乾，更換。若瘡痛，須急灸，壯數多為妙。若膿已成者，不可灸，即

鐵開之。

○又赤皮蒜搗爛，作餅子，如豆豉餅子，灸之，亦佳。

○用大蒜去皮切，二文錢厚，安瘡頭，上用艾灸之，至二三壯，換蒜片瘡痛者。

○外

○用艾灸之，至二三壯，換蒜片瘡痛者。

○外

○用艾灸之，至二三壯，換蒜片瘡痛者。

○外

○用艾灸之，至二三壯，換蒜片瘡痛者。

○外

○用艾灸之，至二三壯，換蒜片瘡痛者。

灸至不痛不痛灸至痛未成者即減
如瘡大用蒜搗爛攤患處攤艾鋪上
燒之蒜敗再換

○又三瘡瘍自外而入者不宜灸自內
而出者宜灸外入者托之而不內內
出者按之而令外

最忌灸為上一日二日十灸七活三
四日六七活五六日三四活過七日
則不可灸以濕紙覆上
先乾處瘡頭

○癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初
發並宜灸

○凡臍疽及項已上瘡不可直灸灸二
里氣海穴而漸入服涼膈化血之藥
凡治癰疽用驢行馬灸法無不立愈
兩穴各或五壯或七壯可以起死救

先從男左女右臂中曲橫艾起量
至中指頭射斷令病人脫去衣服以
丈長棍一條際定兩人徐行起足離
地五寸許却以量臂則子貼定竹其
從尾間起貼脊骨量至則子盡處以墨
點之非灸穴却開左右各同身一寸
記之即是灸穴也

○用蠅針法凡癰腫瘰癧作用大馬蠅一
條安瘡疽之頭上吮其正穴膿血出
盡散如毒大蠅小須三四條方見功
腹傍黃者力大若血不止泥藕節或
貼白菊花

○傳 蠅針之法可施輕小証候吮出惡血
若積毒在臟腑者徒竭其血於外無

益

○內托之法腫炊于外根盤不深形証

在表脉多浮病在皮肉非氣盛則必
侵于内急須内托宜復煎散除濕散
醫使胃氣和平如大便閉及寒熱少
服黃連湯如微利及煩熱已退却與
復煎散

林治癰之大要有托裏内疎通行榮衛
之三法

○外之內者其脉浮數脈腫在外恐毒
氣極而内攻當先托裏

○內之死者脈必沉實發熱煩躁外無
脈赤痛深於内其毒深矣當先疎其
内以絕其深源也

○内外之中者外無熱惡之其内則清
便自調知其其在經當和榮衛也能用
此一法終末即瘰必無變壞之証

傳膿出而反痛者為虛宜補之大有機
氣所觸而作痛者宜和解之風冷所
逼者宜溫養之

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之清
後宜作陰虛補之若年老潰後發嘔
不食又宜突養未峻補隨証加佐使
藥河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也
宜倍白朮

○癰疽發潰乃血氣兩虛用生芪以補
氣敗地以養血或忍冬丸黃芩六
一湯皆效

○癰疽大作毒氣炎盛大渴急服神仙
追毒丸每日一服取下惡毒次服清
腫湯

○疽既安之後忽發潰者多不救
覆服加減八味圓而防未然未發疽
人有渴疾亦須服之

○清腫湯 治癰疽熱盛焮腫疼痛作
湯 生地 芍 芎 參 知 母
白苓 略二升 莖 萋 門 略三
右水煎

○加減八味圓 癰疽未生或初生或
既安湯証出來並用之 地 酒 酒 蒸
山藥 去 山藥 各一 桂 味 淡 者 沢
牡 荅 絡 八 五 味 兩 半 右 煉 蜜 丸 如
桐子大 五更初未言已煎温酒或益
湯吞下 三四十九丸 累驗

○忍冬圓 治癰疽大能止渴 忍冬根
莖花葉皆用入瓶內以無灰酒浸以
煖火煨一宿取出曝乾入甘草少許
為末所浸酒打麩糊丸如梧子大每
服五七十九酒下

傳 黃芪六一湯 治癰疽發背 莖 六

○林 竹葉黃芪湯 治瘡腫渴甚 竹 行
生地 細 門 莖 飯 芎 母 芍
芍 參 半 膏 各 半 右

○榮衛通魂湯 治癰疽發背大能順
氣均血扶胃氣蕩滌邪穢自然順通
不生變証真仙劑也 何首烏 鐵 犯
飯 通 赤 芍 炒 芷 不見 茵 炒 烏 藥
炒 枳 殼 炒 姜 汁 炒 心 各 等 右 水 酒 相

未盡餘毒流於四肢經絡為流注○
如尚有潮熱則裏有寒邪未盡散加
升菴○如此而不退可加乾葛○如
有頭疼加芎並姜水煎○如無潮熱
可用水酒相半煎酒大能行血生氣
故也○如氣血盛者減當較多則生

血發於他所再結癰腫生人不絕斯
 乃秘傳○癰疽生痰有二証一胃寒
 生痰加半夏健脾化痰二熱鬱而成
 風痰加桔梗以化咽喉之痰並用姜
 水酒煎○腦疽發背在上者可去木
 通恐導虛下元為上盛下虛之病老
 人虛弱者亦宜去之○病人有瀉者
 不可使用此方宜先用止瀉藥白礬
 生用為末溶開黃蠟丸米飲下三十
 九

○丙托復煎散

治腫焮於外根盤不

深形証在表

地骨 苾 風 各三

分芍 芩 木 苓 參 耳 飯

已各一分 柳桂 淡味者 右分四分 匙先

煎製蒼木一二兩小錢用米十匙煎至

六匙生薑食人每用一匙半入藥下匙

再煎至八分去粗服若大便秘及煩熱

少服黃連湯如微利煩熱已退却服復

煎散如此柴蘅俱行邪氣不能內侵也

○丙疎黃連湯 治嘔皖心逆發熱而

煩脈沉而實毒氣在內藏府秘澁當

急疎利之 連 施 芍 飯 楨

木 苛 各半 翹 各一分 桔 各半

大二分 右如一便不閉澁且未可入

太黃

○黃連獨活散 治背疽一切惡瘡初

發腫甚者三四服即消散 連 獨

羌 風 藁 芩 風 梢 洗酒飯楨

參 陳 蘇 木 其 梢 已 各半 知

酒 桔 各一分 生地 行 飯 身 翹 各三 莖

其身炙栢各半 沢 各七分 右每服小錢水

二匙煎八分入好酒半匙臨卧服

○小補湯 治發背疼痛嘔吐及發咳逆參 苳 芎 白芍 絡 乳 汝 木 芷 絡 丁 右

○防風當散 治諸般瘡癩熱毒 風 飯尾 苳 節 赤芍 苳 芷 各五 左纏藤 皂角刺 各五 桂 陽 陰 五 大 嘔 五 右 吹 咀 水 四 椀 砂 鍋 煮 至 二 椀 入 好 酒 一 椀 再 煎 服

○當飯黃芩散 治癰疽證臟腑已行 痛不可忍者 飯 芎 生地 芍 苳 地骨 等 右 水 煎

○發熱加苓 治煩躁不得睡加菘 嘔 是濕氣侵胃加米

○五香連翹湯 治惡瘡癰疽瘰癧等 病 沉 乳 苳 青 木 絡 丁 翹 射 于 升 桑 寄 生 如 無 以 升 獨 通 分 三 丁 附 大 酒 煎 藥 半 右 煎 煎 空 心 服 半 日 以 上 未 利 再 服 以 利 下 惡 物 為 度

○九珍散 治癰疽腫毒因氣壅血熱 而生者 腫 物 芎 飯 赤 芍 生 地 苳 大 苳 苳 苳 等 右 水 酒 相 半 煎 服 婦 人 乳 癰 尤 宜 服

○丙朴千金散 治腦背癰疽乳硬等 惡瘡 宜 用 也 苳 飯 芎 參 苳 風 苳 芍 萎 桂 桔

金銀花 絡 半 右 水 煎 入 酒 再 煎 去 粗 服 如 痛 甚 倍 加 飯 芍 又 加 乳 香 磨 口 內 有 黑 血 或 遍 身 汗 出 皆 藥 之 效 也

○千金托裏散 治一切瘡腫發背疔 瘡 翹 二 兩 朴 風 桔 各 二 錢 兩

半芍 芷 芍 桂 參 茸 略 丁
飯醋木 沒各三乳二各右酒煎

○傳 千金托裏散 治背疽并諸惡瘡如

三百以裏未針灸及熱大便者則可

消 飯身 翹 本酒酒大絡三門

行差 藁 莖 灸茸 參 猪絡

粉生地洗桔 施 酒連絡丁風洗

風梢 生茸 飯梢 陳 藕木 五味

酒梢 酒已各半右分一服用水三

大盞浸半日煎至一盞稍熱服忌冷

水如覺病即忙服無不効如瘡勢已

發三四日或成膿則不消也

○并陽益胃散 治下切惡瘡發背腦

疽等証 飯 行翹 行差 藁 莖

灸茸 絡 丁 生茸 生地 知 芩

桔 絡 丁 沢 独 風 連 酒 風

梢 參 飯梢 陳 藕木 酒已

絡半右分一服用水二大盞浸半日

煎至一盞酒數十點去粗臨臥温

服忌飲水再作膿効遲初患二三日

者服之立消作膿者立潰隨病上下

食前後服老人尤宜之或加乳沒各

○當飯差活湯 治腦疽 芩 酒連 酒

飯身 絡 二 梢 翹 風 差 茸 灸

施 絡 一 獨 藁 絡 七 沢 伴 右 作 一 服

水二盞先浸一時許入酒一匙煎至

八分去粗食後稍熱服且二服俱將

藥汁調下後項換柳散

○換柳散 大 斂 瘡 口 換 木 絡 三

右為末用煎湯調下或斂瘡口油調

塗生肌斂肉其速膏梁熱瘡所宜也

○丹溪治背疽方 生地 飯身 其

節 風 羌 大 赤芍 貝 芷

芩 皂刺 作大劑煎服○氣虛加

參芪瘡潰後亦宜加之

○托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷

者膿出清鮮皮膚涼心下痞滿腸鳴

切痛大便微溏嘔逆氣短昏愊 羌

姜 柘三附 炮 桂 皮 益 丁 沉 木

尚 陳 絡 丁 其後二右入姜

○五香湯 治毒氣入腹 丁 木

乳 沉 酪 一 麝 行 右 水 煎 ○嘔去麝

加 藿 兩 ○渴者加參兩

○定疼托裏散 治瘡腫疼痛不可忍

如少壯氣實先用疎利後服此藥

粟殼去蒂炒飯 白芍 芍 各半乳

沒 桂 絡 三 右

○黃芪人參湯 治諸瘡破後食少無

睡虛熱 莖 行 參 木 蒼 陳

門 飯 身 灸 身 兩 升 六 柏 燂 分

○聖愈湯 治諸瘡血出多而心煩不

安不得眠此亡血也 生地 熟地

芍 參 絡 半 飯 身 莖 絡 一 右

○內補黃芪湯 治諸瘡破後體倦無

力懶言食無味少睡脈澁自汗口乾

莖 門 酪 一 熟 地 參 苓 其 各

白 芍 芍 桂 遠 飯 酪 半 右 入

姜 棗

集 ○十六味流氣飲 治無名惡瘡癰

疽等証 芍 飯 芍 風 參

芪 木 桂 桔 芷 枳 朴

烏 蘓 枳 其 絡 一 右

○托裏內補散

治諸瘡膿潰之後
參木 苓 飯 芎 桂 白芍 其
芷 風 桂 金銀花 芫 右等
分

○麥門冬湯

治癰疽潰後膿水不絕
參 芪 飯 芎 桂 白芍 門
五味 煨 遠 附 一 廿 分 三 右 入 姜 棗 一 分

○丙托散

治諸腫毒惡瘡一服立愈
大 蛎 附 各 半 菜 二 子 施 子 其 行 右

○金銀花散

治發背惡瘡托裏止痛
排膿 金銀花 四兩 無花用 母 兩 右
酒水各半煎一方加芪

○義內消丸

治瘡腫初生及癰瘰結核
熱毒鬱滯服之內消 陳 青 各 二
兩 牽 牛 兩 取 頭 一 芎 皂 各 八 兩 去
朱 末 二 兩 未 二 兩 右 生 黃 連 各 一 兩 去
朱 末 二 兩 未 二 兩 右 生 黃 連 各 一 兩 去

朱用前膏丸食後荆芥湯茶清溫水
任下

○玉金鐵散

治發背諸瘡腫 皂針取
一 半 煎 取 一 右 一 味 為 末 食 後 酒 調
半 黑 者 二 三 錢 服 之

○洗藥越桃散

越桃 芩 甘 飯
羶 芷 等 右 每 一 兩 用 水 五 碗 煮 三
四 碗 去 粗 洗 諸 瘡 毒

○貼藥 傳外施藥亦發表之意精要
得藥則效何謂神効夫氣得熱則散
經日發表不遠熱是

○解毒散

去赤腫收熱暈 寒水 兩
連 栢 各 一 龍 骨 伍 輕 行 右 為 末 雞
清 調 以 翎 掃 瘡 四 畔 ○ 熱 瘡 加 黃 丹

○一方

荷葉 秋後採 草烏 南星
等 姜 泔 調 塗 瘡 四 畔

○**一方** 大黃 東牆上土 右為末
用無根井花水調付諸般惡瘡乾即
再傳

○治諸瘡口膿米不乾 寒水三龍骨
分國丹煉一右乾搽瘡口

○乳香散 治瘡口痛甚 寒水煨
滑石乳 沒絡五腦諺右同煎

○**捏膿散** 瘡口有膿不能自出如
透深者用紙捻蘸此入瘡內淺者搽
之 芎藭 芷兩白芍 輕絡三右
細末用

○**雄黃散** 治瘡有惡肉不能去者
雄 巴絡一右同研如泥入乳沒絡
詐 再研勻細少上惡肉自去

○**保生定子** 雄 巴去杏祛皮火
乳 沒絡一草麻根右為末嚼津調
作定如太麥大赤瘡毒背癩癰附骨
及諸般惡瘡不問新舊皆可治之

○**生肌板柳散** 治癰疽瘡癤膿潰之
後外觸風寒腫燥結硬膿水清稀出
而不絕好肉不生 板 連 木等
右為末乾貼亦治金瘡日久不斂
一方加麝香

○**乳香膏** 木別殼飯略一柳枝三枚
剉右同煎油四兩慢火熬令黑色去
粗次用乳沒絡五白膠香四兩明石
將藥入油煎化了用生絲瀝淨入黃
丹一兩半以兩柳枝煎上慢火不住
手攪候油沸住攪滴水中成珠為度
傾在水中出火毒用之

○**神仙太乙膏** 癰疽惡瘡軟瘡已成
膿未成膿貼之即效更蛇湯火刀斧所

傷並可內服外貼 女參 芷

飯 桂 大 赤芍 生地 各一石

咬咀用麻油二斤浸春五日夏二百

秋七日冬十日瀝去滓油熬次下黃

丹一斤以瀝油在木中不散為度

○**麋麟膏** 血竭 桔連 飯 其

芷絡二卷 風 羌 栢絡四 黃

丹 椰香油 辟桃 柳 桑 槐 榆

梅 棗 罌 礞 搗 到 右 除 黃 丹 外 用 銅

銚盛油入諸藥并七枝浸一宿慢火

熬令焦黃瀝去藥入黃丹用柳木篦

再上覆火不往手櫓候烟起離火滴

永成珠傾木中出火毒用

○**玄武膏** 治癰疽瘡癤新桃膠血生肥肉

巴法燒木別法燒國丹四麻油耐棍

柳嫩枝各七條右製法同前

○**三方** 治癰瘡中冷瘡口不合 鼠

皮一枚燒為灰細研封瘡口上

○治癰腫 枯荖根醋熬燥楊節醋和

塗紙貼服金石人溷用

○瘡腫已成膿懼針不得破取雞雀屎

塗瘡頭上頻易之雞雀屎直者是

○治發背 生蠅牛二百箇入瓶中用

新汲水一盞浸一宿蠅牛放之其水

如涎將蛤粉調以雞翎掃瘡上日十

餘度熱痛止瘡便愈

○**一方** 治發背欲死 伏龍肝末以

酒調厚傅瘡上口乾即斃

○瘡腫若有息因突者 烏頭極以苦

酒三升漬三日洗之夜三四度

○義夫附骨疽者其毒氣深沉附著於骨也與賊風相類而不同風邪之氣搏骨節故痛深徹骨髓遇寒則痛甚初按之應骨皮肉微急洪冷如肥狀者是也

○林流注者傷寒表未盡餘毒流於四肢經絡然表未盡則餘毒附骨而為骨癰

夫流注者傷寒之餘毒骨癰者又流注之敗証也流注醫者表之未盡也骨癰涼藥之過也

○傳丹溪曰附骨疽者因久得厚味及勞役與酒後泄水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽

○羌活防已湯 治附骨疽初發於木陽厥陰分者 卷已 考 蒼君

水 翹 射干 升 白芍 通
飯尾 蘓木 礞石 右水酒各半煎食
煎服

○托裏黃芪湯 治骨疽初發於足少陽陽明分者 飯尾 升 柴 升 芪

桂 翹 黍粘子 礞石 升 升 升
喉各芷行右作下服酒一盞水一盞
半煎空心服羨膳慶之

○內托黃芪酒煎湯 治瘡生膿外或因寒濕得附骨疽於足少陽經分微侵足陽明經堅硬漫腫行步作痛
飯尾 升 柴 升 升 升 升 升
升 升 升 升 升 升 升 升
升 升 升 升 升 升 升 升
右酒水各一盞煎食煎溫服

○黃連消毒飲 治附骨疽 連 卷 絡 升 升 升 升 升 升 升 升

生地 知 獨 風 飯 尾 翹 略
分 氏 參 蕪 木 沢 路 二 耳 陳
路 三 右 水 煎

○老人目寒瀉地氣得附骨疽於左腿
外瀾六七寸長丁小尺堅硬滿腫以
稱按骨大痛與此藥即愈

○加味八味丸 治附骨癰疽真氣不
足屢火灸上之証及疽愈後發瀉者
俱效方在右

一疔瘡三

○義夫丁瘡者以其瘡形如丁蓋之狀者
是也古人論者不離於氣客於經絡
五藏內蘊毒熱生丁頭凹腫痛青黃
赤黑無復定色便令煩躁悶亂或憎
寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛

無血是其候也急用艾灸之若不覺
痛者針丁四邊冷血出若或針之不
痛無血者以猛火燒鐵針於瘡上烙
之令如焦炭取痛為效如針不痛眼
黑或身如火光者不可治也此邪毒之
氣入藏府故也

○又曰刺瘡心至痛處又刺四邊十餘
下冷血出傳藥入力得入針孔中則
佳

○丁腫十二種形色禁忌

一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色
微黑四邊微赤多痒忌食麻子油衣
布衣并入麻田中行

二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆
甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石
之屬

三日雄疔其狀如頭黑腐四畔仰施
漿起有水出色黃大如錢孔形扁者
忌房事

四日雌疔其狀瘡穢黃白裏屬赤似
灸瘡四面題漿起心凹色赤如錢孔
者忌房事

五日火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑
屬四邊有烟焰又如赤粟米者忌火
燒烙

六日爛疔其狀色綠黑有白斑瘡中
潰有膿水流流出瘡形大小如匙面者
忌沸熱食糧物

七日二平六疔其狀頭黑浮起形如
黑豆四畔起赤色今日生明日生
二及至七者滿三平六不能治未滿
可治忌頭怒愁悶

八日蛇眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形
如小豆似蛇眼大舛硬忌惡眼人者
非嫉妬人見忌毒藥

九日鹽膚疔其狀大如匙面四邊皆
赤有黑粟粒起忌食鹽味

十日水洗疔其狀大如錢形中如錢
孔瘡頭白裡黑屬汁出中硬忌飲漿
水水洗渡河

十一日刀鎌疔其狀闊狹如薤葉大
長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀
鎌切割可以藥治不可亂攻

十二日浮腫疔其狀瘡體曲圓少許
不合長而軟如薤葉大肉黃外黑黑
處刺之不痛黃處刺之痛

十三日牛狗疔其狀肉色飽起擱不
礙

右十二種疔瘡初起瘡心先痒後痛
先寒後熱四肢沉重心驚眼花重則

嘔逆嘔逆者難治麻子疔一種始末
惟癢銀忌者不可犯犯者作難治浮

濕疔牛狗疔無禁忌癢不癢不殺人
○赤方藥湯 治疔瘡癰疽初覺憤寒

疼癢 赤芍 金銀花絡 五十大杜萎
仁飯 廿 枳絡 三右水酒煎

○通利藥 黑牽藤 丁巴 封油 粒大徑
右為末水丸白湯下

○荆黃湯 治風熱結滯生瘡毒 荆
徑大 半 不右

○托裏散 治惡瘡發背疔疽便毒始
發脉洪數腫甚欲作膿者二服消盡
大 吻 栝 皂刺 朴硝 翹 絡

不飯 金銀花絡 丁赤芍 芥絡 二
右水酒各一盞煎

○傳 雄黃丸 雄 鬱 皂 蠟 各 丁 巴
十兩 粉麝 許右為末酒水丸如菜豆
去壳 粉麝 許右為末酒水丸如菜豆
大每服二十丸亦看虛實加減丸數
茶清送下

○一活散 義 針 疔 形 狀 雖 異 皆 熱 毒
為去其毒勢次服一活散卷 獨
病勢緩而用引經藥

飯 烏 赤芍 金銀花 酒 翹 天
花 芷 廿 節 絡 細 紅 菴 木 荆

蟬 脫 葛 絡 三 檀 行 右 為 末 蒼 耳
煎湯下

○獨蟾丸 係取蟾酥法
拿取活蟾 大 熱 癩 疔 根 在 後 脚 以 大
桑葉或油紙包捲其頭用鐵鈎取眉
間白汗濕葉上凝結如濕直粉丸
如葉壹二蟾作下丸多者作二丸懸

○獨蟾丸 係取蟾酥法
拿取活蟾 大 熱 癩 疔 根 在 後 脚 以 大
桑葉或油紙包捲其頭用鐵鈎取眉
間白汗濕葉上凝結如濕直粉丸
如葉壹二蟾作下丸多者作二丸懸

○獨蟾丸 係取蟾酥法
拿取活蟾 大 熱 癩 疔 根 在 後 脚 以 大
桑葉或油紙包捲其頭用鐵鈎取眉
間白汗濕葉上凝結如濕直粉丸
如葉壹二蟾作下丸多者作二丸懸

當風處陰乾患疔瘡者即以一二九
置舌尖上仰臥片時苦水滿口嚥下
或以鐵針開疔瘡頭上納藥一九
以薄皮紙貼護之癰疔初起時依此
法可治之取蟾蜍時入

集驗 ○追疔奪命湯 羌 獨 青膠風

膠連 赤芍 細 其節 蟬蛻

姜蚕 脚連 雞卵黃連 加河車決

蘭金銀花 ○有膿加何首正 ○要種

加青水 拖 大 藥 ○在脚加木

瓜各等 右水煎

○內杜連翹散 疔瘡出皮色不變不

疼用針刺仍服此消散 翹 芷

生地 赤芍 酪 大 拖 苛絡七

朴硝 兩 苓 兩 其 兩 右入燈心竹葉

○玉聖散 治疔瘡 皂針 兩 姜 兩

大 金銀花 生姜 其節 酪 一

右酒煎

○百一散 治發疔瘡煩躁手足

不住發狂者 其節 菘豆 辰 各

分右為末每服二錢熟水下

○蟾蜍丹 蟾蜍 一枚 為末以百

麵和黃丹埋作劑丸如小棗大針破

患處一粒內之神妙仍以水澄膏貼之

○水澄膏 白芨 半 為末水薑內沉下

澄去水皮紙攤貼

○治疔瘡腫甚者 附子末醋和塗之

乾即再塗

○治一切疔腫取蒼耳根莖葉燒作灰

醋浸和如泥塗乾即易十餘度即拔

出其根

○魚臍疔瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿蛇蛻燒灰存性為末雞子清調敷驗狀似魚臍也

○治魚臍疔 絲瓜葉 連鬚葱 韭菜 右石臼內搗爛酒和服以粗貼臍下如病在左手貼左臍下在左腳貼左臍下右同如在中貼心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白色則安冷人抱住恐顛倒則難救

○灸法灸掌後橫文五指男左女右七壯即瘥專治疔瘡

○傳以太蒜搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○有紅絲疔頭生手足間有紅紫一條急用針刺斷不然其絲入心必難

一 瘰癧 四

○夫瘰癧瘡者有風毒執毒氣毒之

異瘰癧結核寒熱之殊皆由忿怒氣逆憂思過甚風熱和氣內搏於肝經蓋怒傷肝肝主筋故令筋縮結畜而腫多生於頸項臂腋之間結聚成核初如豆粒後如梅李累人相連大小無定初覺膈寒壯熱咽項強痛腫結不消者便當服散腫潰堅湯或五香連翹湯散之或用牡蛎大黃湯疎利之瘡上可用丁香膏類貼之或隔蒜灸之

○又有馬刀瘡亦生項腋之間類瘰癧但其形如馬刀赤色如火燒極痛疽急治之

○林夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頷或在頸下連及缺盆皆謂之瘰癧或在胸及背之側或在兩腋皆謂之馬力乃手足少陽經多氣少血之病也

傳丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積須分虛實人者易治虛者難治

○救苦化堅湯

治瘰癧馬力 莖

漏芦 升 菴藜 絡 參 牡

生地 取身 熟地 白芍 牛

莖 連 栢絡 三 灸 茸 獨

風絡 半 桂 昆布 益 稜 絡 二 柴

分 村 二 分 麩 分 右 為 末 湯 浸 承 餅 捏

作 餅 子 日 乾 搗 如 米 粒 大 每 服 三 錢

白湯下

○如氣不順加糯紅甚者加木香少許

○如止在陽明分者去柴牛

○如在少陽分者去獨漏升莖加瞿分

○如人素氣弱病勢來時氣盛而不短

促者不可考其平素沮作氣盛而從

病變之權也加苓連栢知已顛在上

焦苓在中焦連並半生用洗在下焦酒

製栢知已

○如大便不通而其邪盛者加酒製不

黃以利之

○如血燥而大便乾燥者加桃仁酒製

太黃風燥加麻仁

○如風澁而大便不行加根皂角仁太

黃秦朮

○如人素氣弱去苦寒之藥多加參芪

其之顛

○元母冷藥多妨其飲食此為治之大法也○又冬寒不可用芍○如有煩燥去桂○無腫不可用牛○如瘡堅硬甚者用莪不甚堅硬不用○如腫多吐食用益知是不然不用○如煩燥用栝不然不用

○散腫潰堅湯

治馬力瘡結硬如石

或在耳下缺盆或肩膊下皆手足少陽經中及癰癤遍於頰或至頸重堅而不潰在足陽明經中所出或一証瘡已破流膿水並皆治之
 芍酒洗半臈酒洗之
 芩酒洗半臈酒洗之
 枳酒洗半臈酒洗之
 知酒洗半臈酒洗之
 昆酒洗半臈酒洗之
 柴酒洗半臈酒洗之
 葛酒洗半臈酒洗之
 連酒洗半臈酒洗之
 分升右作一服水一盞先浸半日煎至一盞去粗食後消熱服於時處

伸足在高處頭低垂每含一口作十次吞下服畢少頃依常安卧
 脯上停畜故地別制一料為末煉蜜丸如棗豆大每服百餘丸以煎藥送下或加海藻五分亦效

○升陽調經湯

治瘰癧升分葛

膽酒製炒
 芩酒製炒
 稜酒製炒
 各四飯稍方各三栝酒炒二分知酒炒
 右水浸半日前臨卧稍執服外為末煉蜜丸如前方法

○柴胡連翹湯

治男婦馬力瘡瞿

仁柴 翹 知酒 芩 枳 栝 牛 炙
 其 栝 酒 生地 枳 一飯稍 枳 桂 分 右
 水煎稍執服

○消腫湯

治馬力瘡 翹 仁 生 芩

柴 枳 分 不 枳 莪 枳 一飯稍 其 枳

分牛步連絡五紅砂右水煎稱熟服

驗集 ○**棋柳散** 治氣毒瘰癧心壅飲食

不下 棋 前 赤苓 牛各參

枳炒沉 風各半 其各 一右入姜

○**射于連翹湯** 治瘰癧寒熱 射

翹 玄參 赤芍 木 升 前

旋 飯 其各 大各 二右水煎入

芒硝抄 食後温服

○**瞿麥飲** 治瘰癧馬刀 瞿穗并 翹

斤右水煎服此藥經効累多但不能

○**王** 治結核耳前後或其下領正有者皆

瘰癧也 桑椹二斗極熟 以布裂取

自然汁砂器內文武火慢熬成薄膏

白湯點一匙食後服

○**連翹丸** 治瘰癧結核破或未破

新荷葉自然 皂角浸 換出汁水已

上二味銀石罌內熬成膏青 陳

牽半生半 翹五 皂角煨去皮為末

右為末用膏子凡每服三子凡前連

翹湯下半 日効

○ 貼瘰癧 大田嚙連翹燒存性破朱

破者乾貼未破者香油調付

○ 治項間少陽經中死痞赤腫硬痛

麻節生山藥條 右味搗爛攤布上貼

○ 治瘰癧不問有與無頭用大蜘蛛五

枚晒乾細研酥油調貼之日兩度

○ 一方馬齒菜陰乾燒灰臘月猪脂和

以暖泔水洗瘰拭乾之日三度

○**龍泉散** 龍泉粉上 磨力右 尾粉

莖 稜酒 洗昆布絡五右為末煎熟

水謂塗之効速

【一方】五倍 海螵 栝 雷

吳脂 麝 右為末清油調塗濕則乾搽

○又 星 半 血場絡 輕謏為末 津唾調傳

○【灸法】 治癭癧以手仰置肩 上微舉

時骨尖上是穴隨患處左即灸左肘

右則灸右肘七壯再灸如前二次未

無恙四五年用藥不退辰時著灸申

時即落

○一法以葶片貼癭瘡上灸七壯易霖

多灸取效

一 癭瘤五

○林 喜怒不節憂思過度致氣滯血凝

癭瘤癭者多結於頸項之間癭者隨

氣凝結於皮肉之中忽然腫起狀如

梅李父則滋長醫經所謂癭有五種

石肉筋血氣也癭有六證骨脂膿血

石肉也治法癭不可決破破則膿血

崩潰多致大柱癭惟有脂瘤可破去

脂粉則愈餘五證亦不可輕易決潰

○傳 破結散 治五癭及馬力癭癭等証

海藻洗酒龍膽洗酒海蛤粉通草 貝母

昆布洗酒枯礬 松蘿各三錢以

麥麩炒四半仁右為末每服一錢煎

酒調食後服忌甘草鯽魚雞猪五辛

生菓菜

○林 昆布丸 治一切癭癧 昆布洗

海藻洗小麥麩炒乾右為末煉蜜丸

如杏棧大每十九食後嚼嚥

○一方 昆布洗 檳榔為散每以

錢綿裹於好醋中浸令熟津藥味盡
飛令多之或切指大醋浸令熟津

○南星膏

治皮膚腫面生癰或軟或

硬不痛

生南星大者一枚研如膏無生者乾者為末

醋調如膏先將小針刺令氣透以膏

攤紙上如癰大小貼覺痒則頻易貼

○十六味流氣飲

最宜痛方見石

○灸法

治諸癰天突穴灸二十七壯

○肩周

一此男左十八壯右十七壯女左十七壯右十八壯在臑

間頭肩端兩骨間中舉肘取之

○又灸

兩耳後髮際七壯

○結核

六

傳丹後日凡結核在項在臂在身如腫

毒不紅不痛不在膿者多是痰注不

散名曰痰核一陳加酒炒太黃麩括

柴煎服

○又方 治臂核作痛一陳加麩言皂

刺風蒼酒炒

○林 治小腹連毛除結核痛不可忍必寒

熱 施炒桃炒枳炒查路等右水煎

入姜汁服

○漏瘡

七

○林 蓋漏瘡須先服補藥以生血參芪木

版弓各等分為大劑服之外以附子未

睡調作餅如錢厚以艾炙之漏大艾

炷亦大但令微熱不可令痛餅乾易

○截癰散

治年深癰癩連頸白皮

白斂 黃丹 密佗僧各一右為末

入輕腦麝絡律草搽或成膏貼

一材

○癰子

八

南星爲末醋調塗數次即落

○下方地層子白礬等爲末煎湯洗數次即去

○取蜘蛛絲纏根下效○或用髮纏根下效

○又以針穿髮為形患處數次穿

○又灸癩子上二壯以禾藁之即去

一 內疽九

○傳丹溪曰內疽者皆因飲食之火披七情之火相鬱而發其發在腔子而頭向內宜以內托之藥托出外以針開之而愈先用四物湯加桔梗香附生姜煎服膿出後亦用四物湯調理而安

一 肺癰十

○肺癰者乃肺經感於風邪熱毒致也多日久噴炙燔肥臍或勞傷氣血以致心火炎熾薰蒸肺金令咳嗽咳而不已遂成肺癰寸脈數而咳中有濁唾涎沫若口中碎少燥欬又胸中隱隱而痛脈反滑數此爲肺癰咳唾膿血脈數而虛者爲肺癰實者爲肺癰初起皆可救若日久唾膿臭敗者不治

○議肺癰之候口乾喘滿而渴咳唾膿血或腥臭胸中隱隱微起者肺疽也又曰中府隱隱而微痛者肺疽也上肉微起者肺癰也脈微敗而數者未有膿敗甚而數者已有膿短而澀者自痊浮大者難治方法具見咳嗽門

一 腸癰十一

○傳腸癰者小腹腫強按之則痛小便數

淋時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脈洪數也右膿脈遲或若未有膿甚者腹脹大轉側有米聲或遠臍生瘡或膿自臍出或大便膿血

○天黃牡丹湯

治腸癰有膿即下膿

無膿即下血 大四壯 一桃 五十枚 兩桃 去皮尖

芒合萎餅右水六升煎取一升去粗

入芒硝再煎分三服

○林意以仁湯

治腸癰腹中疔痛煩毒

不安或脹滿不食小便澁婦人產後

虛熱多有此病縱非是癰疑似亦服

意以仁壯 桃去皮尖炒萎餅右水煎 各三升

○射干湯

治胃脘壅熱成癰身皮甲錯

咳嗽膿血 射干 赤苓 升各

終赤芍行木打右水煎入地黃汁

一合蜜水許服

驗

○四聖散

治腸癰積毒 生黃

枳麥 乾薑 法及若 粉草 研末沒仁

糊乳研末右用好酒慢火煎兩日服

盡大便下惡物

○牡丹散

治腸癰冷証腹濡而痛時

人利膿 牡參 天麻 白苓

莖木 飯芎 桂 桃祛皮尖

並意 甘沒各 右水煎食煎溫

服

○梅仁湯

治腸癰神急惡痛大便閉

澁 梅核仁 四十九箇 大兩 壯一分

冬瓜仁 兩 犀角 一芒 二兩 石水煎服

下膿血三四行爲度

○傳灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸百壯

下膿血而安

一便毒 十三

○林 便毒者血疔也俗呼為便毒及足厥陰肝之經絡及衝任督脈亦屬肝之傍絡是氣血流行之道路也途壅而為癰治之宜以導水丸桃仁羹氣湯大下之

○夫便毒者生於小腹下兩股合縫之間初發寒熱眼間腫起或痛是也初起慎不可用寒涼之藥恐血氣愈結不得宣散反成大患當發散寒氣清利熱毒

○傳 丹溪曰便毒是厥陰經濕熱且勞倦而發用射于三五同生姜煎食前服得利二三行效射于紫花者是紅花者勿用

○方破故紙 黍粘子微炒 黑黍炒大 黃酒蒸 石等分 為末每服一兩酒調下

○便毒已結成膿者 大黃酒洗 薤白各 不實仁 升 其節絡 一桃二十 生薑 三水煎服之

○蘓方散 治便毒 木鱉去尾 芍 芷 芩 射干 忍冬金 銀 大黃 川山甲煨 沒 蘓木各 分石水酒各一盞煎至一盞食前服

○壯甥大黃湯 治便毒 方見右 托散 治便毒 和精血交錯腫結及痛 桂 大 白芍 沢 牽炒桃法 殺其得 姜 行石水煎

○退毒散 治便毒腫結 穿山甲 牛兩 醋浸 烙令 微火 醋右 為末食前 老酒下次 醋者肥皂研膏敷之妙

○括萎散 治便毒等患 芩 薑去皮

金銀花 牛膝 各生薑 甘草 各半
右不犯銅鐵酒煎空心溫服微利為度

○三物湯 治便毒 蚘 大 梔 等
為末酒水上煎一宿空心溫服

○消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂針 金銀花 風 飯 大 甘
節 蔓 等 右水酒各半煎食前溫服
仍煩提掣項中髮立効

○敷藥 治便毒腫痛 雄 乳 各
兩 柏 兩 右為末新汲水調敷腫處自消

○林便毒初發 生薑 一 大塊米醋 一 合
以美盞醮醋磨取千步峯泥敷之即散

其泥步峯乃地上人經行日久
其泥突起者是
○便毒初覺腫痛以稱餅於上按壓散

欠自消散

○參後毒法隨所患左右手自掌後橫

文量至中指頭盡處却從續文且
至臂盡處是穴灸三壯

囊癰 十三

○傷丹溪曰囊癰者濕熱下注也
有作膿者此由氣下流入滲道
且陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也
惟在善調攝耳

○癰疽入囊者由濕熱入府經
雖膿潰皮膚畢九懸者皆不效

○陰腫者由膀胱蘊熱風濕相乘
或濕熱水腫流注或邪氣攻作
或暴風客熱所致也

○二白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰

囊腫脹一便不利 白牽 兩 桑 妙 不

通 陳絡五石為末姜湯調下

○**一方** 治外腎腫脹 苗然蝎炒

穿炙木各等為末每服二錢空心酒調下痛止立效

○**敷藥** 治陰囊瘡癢痔不愈自汗不

取 琥珀 黃丹各六分凡疔瘡癰

龍泉粉 石為末手心擦患處

○**地龍膏** 治大人小兒外腎腫便或

疝氣風熱暴腫 生乾地龍去末先

以葱椒湯無風處洗用津調敷或用

熱雞子清調敷或加牡蛎

○男婦陰腫如斗核痛馬鞭草搗汁塗

之

○又荏菜并為泥傳之腫即消○又蕪

菁根搗傳之

○外腎腫及陰癰 地龍糞研生傳奇

津調傳○又排仁研膏傳之

卒外腎偏腫疼痛 大黃末和醋塗

之乾即消之

傳一方點紫菀青紅焙乾為末白

之如燥香海調付裏脫無皮者以青

荷葉包之其皮即生

○**牡蛎散** 治小兒陰腫入莖物通明

蛎粉研細先以津塗腫處次以粉散

之桃仁研膏腫調敷

○**蟬蛻散** 治浮囊腫小兒坐地為風

或蟻吹着所致蟬蛻行石木煎洗仍

與五苓散加灯心煎服

○治小兒外腎嫩赤腫痛老杉木燒灰

入麝粉麻油調敷

○**灸法** 其益一穴灸二壯治陰腫在

外踝後跟骨上陷中

○內出毒命灸二壯治小兒陰腫在內踝後五分筋骨間

○久病陰腫不可救者宜速灸水不蓋水分能分水穀水穀不分故陰腫也

○治陰疔偏大灸關元百壯

一 陰瘡 十四

○陰頭生瘡日久年少陽道與起當泄不

泄不泄宜泄強泄脹斷嫩皮初如針眼

大畏疼不敢洗日久攻入皮肉連莖

潰爛用荆柏鞭蒼耳生芎煎湯洗去

膿掩以調子燒灰入麝少許乾粉仍

禁房事二五日臨睡吹冷水兩三日

勿令陽興脹

○陰頭生瘡先用鹽湯洗淨乾搽之

○藥調散 治妬精瘡膿汁淋瀝臭爛

連 數等為末先以地骨蛇床子煎

湯洗搽乾津調藥敷之

○一方大由螺兩箇和殼煨存性為末

入輕少許傳之

○治陰瘡痒痛黃汁注石膏末入輕少

許傳○又生白礬冷水研汁洗之

○治陰莖腫爛 防已為末葱湯洗

搽搽之

○治陰瘡疼痛出水久不瘥 柃 荆

床等槐 柳枝格二石水煎去粗洗

用雞子清調朴硝末塗之

○治陰頭瘡散魚甲燒為末雞子白和傳

之又以蜜煎耳其塗之瘥

○治痔瘡及陰莖再瘡 雞卵殼 柴

連 輕粉等分為末香油調先用香附

白芷五倍煎湯洗傳之用朴硝煎湯

洗亦可

麝香輕粉散

治血痔陰蝕耳丹一

切惡瘡 麝 輕絡半乳 沒藥 略一右為末乾貼

○治下疳瘡 灯心灰 輕粉 麝

○治下疳瘡腫不消 荆風藤 其瘡水煎洗之

○治下疳瘡 枯凡 輕 麝抄為末 先以口含漿水洗搥乾貼日二兩次

○又蜜佗 連 栢 輕等為末 煎湯洗乾搥

○治走馬牙疳下疳 伏龍肝 乾胸 脂絡二麝 枯凡絡一右為末 先漿

○治陰莖海瘡 蚤退燒存性 輕乳 水洗搥貼之

傳治下疳瘡 鳳凰退燒存性研香油 調付外看瘡大小剪殼中有膜貼之

須靜坐一日不動即結痂

○又青黛墨 蛤蚧 蜜佗僧 黃連為

○下疳瘡洗藥 連 栢 飯 芷

獨風 朴硝 荆等右入錢五十 文烏梅伍鹽一匙 同水煎洗 木

○檳 連 銅青 輕 枯凡 桑螵 麝等為末 洗後至夜敷上

○麝香散 治疳精瘡 黛 款等 麝抄為末 先以地骨桑白煎湯洗搥 乾次以津唾調藥敷

○治男女陰瘡 米粉下酒 芍 芩 蛎 附 芷 酪下右 以下 入水猪脂

一斤微火煎三上三下候白芷黃濃
去粗入米粉和調敷

○**栝柳散**

治陰毒上疔瘡腫透久不
愈 栝 雄 輕 蜜陀 連 栝

持硝礬為末先以葱白湯洗搗乾瘡
濕乾移若乾油調塗

○治陰瘡疼不止 滑 蜜陀 寒水

○**藥酪臑** 麝路少右末

○**林** 治丈夫陰下濕痺蒲黃末傅之三四
次

○**治**

○治皮內陰下長濕且臭或作瘡用胡
粉傅之大驗

一 **醫癰** 十五

○**傳** 丹溪曰腎居小腹之後在下此陰中
之陰雖曰太陽多血然氣運不到血
亦空乘中年後在屬虛此証纒

痛參之脈証但見脈弱便與滋補血
氣可保終吉若無積補之功其禍多
在結痂之後慎之

○**內托羌活湯**

治疔敗見生癰堅硬腫
痛太作 羌 栝 酒炒 各風 藜

飯尾絡一桂分翹 甘炙蒼 陳路

分芪新不右作一服水一盞酒一盞
煎至一盞去粗移熱空心服以衣覆

盡癰上便藥力行去衣

一 **膿瘡** 十六

集

○夫膿瘡者由腎臟虛寒風邪毒氣
外攻三里之候灌於陰父之側風熱
毒氣流注兩脚生瘡腫

○**備紙膏**

治內外膿瘡 飯 芷
連 五倍 雄 沒 血竭 海螵

白芨 白欬 栝 朴酪 黃丹 六

乳_半不輕_石右為末清油_{調成膏用}
油紙貼藥數上絹帛縛定右膿水解
開刮去不_勢毒貼藥如此數次即愈
須先用_{鹽湯洗淨}拭乾待水氣乾
貼藥

○治_{腫瘡下}注 白石脂 龍骨_{略半}

枯_凡斷五倍存性燒黃丹_飛不_雜少
右為末先葱_{薑湯洗}見赤肉後敷藥

○傳治_外腫脚瘡 蜜心黃土研細入黃

碩赤石黃丹_{略半}乳沒輕_{各一}研和

清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼
瘡上外以油紙掩之札縛_縱痔不可

開視數日後未愈再_{換藥}去_藥先以
以茶清洗淨付藥

○林治_外腫瘡臭爛多年 龜一箇_去兩

以米醋_下旋及醋盡仍_候令_白如書

存性用_碗蓋地上出火毒為末入_輕
粉麝香和勻先以葱_{薑湯洗}搥乾傳

之

○治_女年_腰瘡及脚上者瘡_輕粉黃連

等為末以濃茶清入_鹽口含漱洗瘡

搥乾傳藥又將油調赤石脂末傳油

紙貼之_{縮帛縛定}三五日_効

○治_脚肚生瘡初如粟漸大黃水出_瘡

不_愈百藥煎_研唾調傳_自外而入

以_貫仲煎洗_搥乾傳

一 疥癬 十七

○夫疥瘡者皆由脾經濕熱_肺氣_風毒

洩_浮者為疥深_沉者為癬久而不愈_延

及遍身浸滿潰爛或_痒或_痛二者有

細虫而能傳染人也

○當飯飲子 治瘡疥風癬濕毒_再燥_痒

飯 芎 白芎 地 風 蕪 藜
荆 絡 半 何 首 烏 菘 苁 苓 各 一 石 水
煎

○升麻和氣飲 治瘡腫癰疽疔瘡痛
升 桔 蒼 芩 苁 苁 各 一
陳 行 飯 半 苓 芷 姜 枳 殼
芍 藥 半 石 水 煎

○苦參圓 治遍身瘙癢癰疽疔瘡
苦 參 女 參 獨 連 大 熟 地 枳 殼
風 略 二 苓 梔 菊 各 一 石 薑 末 煉
蜜 丸 如 梧 子 大 每 服 二 十 丸 食 後 鹽
水 下 茶 酒 亦 可

傳 治疥瘡 馬鞭草不犯鉄器搗自然
法 半 盞 飲 盡

○治癩瘡 浮萍 苦參 略 一 蒼 耳 子
蒼 木 略 一 香 附 半 石 水 煎 亦 可

○身上癩瘡 四物加艾煎調浮萍末
一 錢 服

○自癩風癰以水麥攤石上以致黑燒
紙 壓 出 油 搽 之 立 効

○治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡火丹諸
般 惡 瘡 蛇 床 苦 參 蕪 荑 略 一
雄 硫 大 風 子 取 椒 各 五 拈 凡

○又方治証如前及小兒癩頭瘡治之
紅 輕 紅 樟 腦 紅 右 爲 末 生 猪 油 調 付
蛇 床 硫 栢 黃 丹 略 一 雄 不

○風子 取椒各五拈凡二輕行牛皮岸
薑 半 皮 烟 出 岸 也 如 無 以 香 砂 右 爲 末
岸 代 之 二 兩
生 猪 油 調 付

○如聖散 治肺藏風毒血氣凝滯瘡
疥 癩 瘡 蛇 床 伍 連 牡 不 胡 粉 兩 水

銀水銀、研令黑、胡粉、點、右為末、香油調、和稀滑、先塗、鹽漿水、洗後、塗之、乾、更換。

○玄精散 治疥瘡 硫 椒 枯凡 玄精石等分如無、鹽、代、右為末、油調、敷。

○浴散 治渾身瘡疥 硫 椒

枯凡 玄精 雄烙 等輕紗 畢起飽 食乾物 勿飲湯 先煎防風通聖散

點入白蜜一錢 送下 神芎丸方見頭

五七升丸入浴堂內浴 冷汗出 抓破 瘡疥藥無洗再搽

○一方 苦參 蛇床 白礬 未荆 等

右咬咀 煎湯 溫洗

○一方 朴硝 兩 硫 兩 枯礬 兩 右為末

油調 臨卧敷

○治疥癬 松膠香 輕粉 研勻 先用

油塗 疥上 了 搽末

○又 竹葉燒末 雞子白 和塗 不週 三四次瘡

○又用柳絮葉煮汁洗 立愈

○治遍身風痒瘡 疥 茵陳 煮濃汁 洗瘡

○治癬瘡 久不瘡 羊蹄根 搗絞汁 用

臍粉 少許 如膏 傳如乾猪脂 調傳

○癬初生 或始痛痒 以姜黃末 傳之 妙

○又初生 或始痛痒 鹽塗之 妙

○濕癬 白秃 馬齒莧膏 塗之 若燒灰

傳之良

○治瘡癬 用米醋 熬燥 皂角針 濃煎汁

傳之

○又苦練根 醋磨 塗疥

○又羊蹄根 和猪脂 塗或著鹽 少許

○又薊蘆 未生油 調敷

○治婦人風癩癭疹身痒不止 蒼耳
花葉子等為末且淋酒調服二錢七

集驗

○治乾濕膿窠疥癬等証 楸 蛇

床略一蝎半後硫黃半西右化開硫

黃入荆末行數沸候冷加輕粉行冷

再碾末加二茶半右為末先將小油

滾過候冷調上藥搽瘡

○八寶散

治風癩松皮頑痺久不瘥

者 藿 破故 楸 腹 雄 輕

硫 柏九酪一右為末油調搽日二

五次痺則擦之

○祛風白芷散

治面上風癩 芷行

苓半小黃丹 連 柏絡二輕行右

為末油調搽

○治諸癬

半夏二搗末陳醬汁調

和麝塗癬上日二三度

一 瘋風 十八

林 追風用

治癩風 何首烏 木

荆 苦參等為末和皂角膏九如梧

子大每服五十丸空心酒下忌動風

物

○治紫白癩風 硫 輕 杏等為末

姜汁調搽

○又硫煮一兩醋一日海螺斤為末浴後生姜

蘇擦數度絕根

○又硫黃末醋調以茄蕪蘇擦患處或

加附子姜汁調

一 諸瘡 十九

集驗 ○夫諸瘡者謂諸般小瘡也凡以躰

虛感風濕之氣發瘡瘍痒痛嫩腫身

熱多汗是為惡瘡或生於手足間相

對如新菜黃痒痛搔破則黃水淋漓

在孔如癩久而生虫是為癩瘡或初
 生如飯粒漸大而有根頭破血流膿
 出肉反如花開之狀是為翻花瘡或
 初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛
 延及遍身名曰浸淫瘡或生於兩耳
 鼻面爛及下部諸竅浸入筋絡月中
 則瘡盛月未則瘡衰是為月餘瘡或
 毒氣攻手足指贅肉裡上指甲疼痛
 出血瘡中有虫是為甲蛆瘡或指頭
 先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿
 甚者爪甲俱脫是為代指或盛夏之
 時腠理易開風熱搏皮膚輕者如撒
 粟重者熱汗浸漬成瘡是為癩瘡或
 心神煩燥遍身發瘡赤爛如火名曰
 熱瘡或觸風寒血淡不行其瘡頑滯
 不知痛痒經久難瘥名曰冷瘡或身
 發瘡腫非癰非疽非癬非疥狀如百
 瘡或癢或刺名曰無名瘡或頭生白
 團斑刺如癬者有白皮久則成癬遂
 致滿頭瘡中有孔有膿細虫入裏不
 痛微痒少長不瘥名曰疥瘡或冬月
 因寒手足皸裂成瘡名凍瘡

○連翹飲

治惡瘡紅赤痛痒心煩亡

乾及婦赤血風赤斑圓點開爛成瘡
瘡痛流黃汁 翹 飯 括 生地

赤芍 荆 芥 門 瞿 通 牛
炒槐 風 言 甘 等入灯心二十

○傳活魂丹

治一切惡瘡 血竭 乳

沒 銅綠 枯凡 穿眼黃丹絡下
 輕 蟾酥各五麝少 右為末用蠟
 牛槁膏丸如芩菴大每服一九用葱
 白一寸嚼爛裹藥靴酒送下

林內固清心散 治惡瘡熱盛脈痛煩

渴 辰 雄 朴 礪 苓 參 白 藜 菘 豆 甘 腦 麝 皂 右 等分爲末每服一錢蜜湯調下

○黃連獨活散 治一切惡瘡初發腫甚者三四服而消散方見右

○五香連翹湯 治一切惡瘡方見右

○涼血飲 心肺有熱或作寒熱口乾身痛面赤先服敗毒散後用之 瞿 麥 荆 苜 芷 天花 甘 芍 生地 門 梔 車 翹 等右入枳 葉 灯 心 新 生 地 黃 虛 如 飯 卷

○平血飲 治遍身生瘡膿血壅腫極痛且痒 敗毒散加葛 芍 升 甘 大 麻 蟬 蛻 苜 生 地 門 入 姜 東 棗

○萬金散 治腫毒惡瘡 大 斤 芷 酖 爲 末 酒 調 二 錢 服 又 茶 調 敷 治 無 辜 瘡 毒 連 柏 爲 末 芭 蕉 根 泔 調 敷 留 口 擦 或 加 輕 粉 ○ 有 汗 加 黃 丹 麝 少 許 和 勻 乾 搽

○越桃散 洗諸瘡毒方見右 治遍身熱毒瘡痛而不痒手足尤甚 搽者衣被不得貼背背未多用布於 席上恣臥其間五七日効

○合掌散 治遍身生瘡百藥不効 換 駙 射 硫 往 硃 五 臟 往 右 和 勻 每 用 二 錢 安 羊 心 內 香 油 調 夜 臥 時 塗 外 腎 不 可 洗 手 但 楷 擦 令 乾 一 二 日 愈

○竹茹膏 治黃痘執瘡 香 油 配 膏 木 香 五 杏 十 四 粒 青 竹 茹 搗 右 慢 火 熬 杏 仁 色 黃 夫 粗 入 松 香 末 五 錢

熬膏塗瘡效

○手掌心生瘡 牡蛎灰泡湯浸洗至湯冷止不三四次便愈

○脚上瘡 鹿角燒存性為末入輕粉香泔調敷

○濕脚氣生癩 平胃散末乾蒸之

○又葱椒湯洗可 ○又五積散酒煎服

○脚指縫瘡爛濕 柿斤行黃丹拌右

未修之

○治疔指疔疔疔疔腫 烏梅仁

○取右研細米醋調稀入指邊自

愈

○林 甲疽瘡乃諸瘡發肉 烏梅樹細根

蜜捻成餅子如錢厚貼之 ○又用研

黃末薄敷便消縮

○林 膽凡燒乳香等為末傳之肉消愈

○又瘡腫毒發葉末水調敷

○治凍爛脚成瘡 生附子

麵水調貼 ○又治凍瘡茄根濃煎湯

洗以雀腦塗之 ○又黃葉燒存性

研雞子清調傳

○治凍耳成瘡疔痛 黃柏 白斂

各為末先湯洗次用香油調傳

○治火丹毒遍身赤腫痛 寒水膏

略二相 甘草 為末芭蕉泔調敷

○又百合根研爛傳

○傳 治一切惡瘡 姜蚕 蟬等為末

油調粘亦按疔效

○又經霜芭蕉葉為末油調付先用冬

冬藤葱蒼身椒煎湯洗極乾付外以

油紙掩之

○手癩瘡 用皂 栝元 輕 連 栝 爲末 傅之

○桃仁散 治一切瘡生肌 芫 欵 栝 連 乳 麝 黃丹 右等分 爲末 傅之 王再 生肌

○芫花散 治一切瘡 芫花 鬱金 連 栝 施 右等分 爲末 水調貼瘡痛處

○七寶散 治熱汗浸漬成瘡 痒痛 不 止 芫 飯 風 荆 地骨 通 略 二白 礬 石 水煎去粗 稠熱 淋 滲患處 乾避風少時

○若練散 治復發瘡 練根 芫 爲末 猪脂調敷 濕則乾 搽先用苦 參大腹皮煎湯洗

○治一切瘡肉出 烏梅燒灰 研末 傅 惡肉立盡 極效

○輕粉散 治疥瘡 蚕退 燒灰 存性 輕 乳 酪 少 右爲末 先以溫藥水洗 淨乾 搽

○又炒并右煨醋 淨爲末 油塗 治疔腫 無問去處 皆有治之 蝦蟇燒灰 存性 爲末 醋調敷

○治月蝕 蝕乾蝦蟇 燒灰 存性 爲末 和 猪脂調傅 清油亦可

○胡粉散 治月蝕瘡 胡粉 栝元 黃丹 煨連 輕粉 一朋 脂 研 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

○治月蝕 直瘡 非如虫 蚋 糞 煨爲末 爲末 溫藥水入盥洗 淨乾 傅之 乾

者油調敷

○治瘡生耳鼻口間瘻時發 枯瓦
蛇床酪 一連疳 右為末 參之蜜水
調塗亦可

○治月蝕耳瘡並諸瘻生肌肉 飲瘻口
沒 乳 枯瓦 黃丹 飛 赤欬
栢絡 一 白膠香 麝絡 二 右為末 葱
白煎湯 洗淨 梘乾 搽之

○一方 胡粉 東壁土 為末 乾搽

乳癰 二下

林乳癰証有見者名吹林有孕者名
內吹胎

驗集 ○初起則用發散流氣之藥 已成膿
宜內托排膿養血順氣慎勿妄用針
乃

傳丹 漢曰乳梗多曰乳母不知調養亦
致蓋乳房陽明所經乳頭厥陰所屬
忿怒所逆鬱悶所滯厚味所滯以致
厥陰之氣不行故窵閉而汁不通陽
明之血沸騰故熱甚而化為膿或曰
所乳之子腫有滯咳含乳而睡口氣
穢然所吹而成結核初便又坐按令
發軟吮冷汁透可散否則結成矣

○治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽
明之熱生甘草節行汚濁之血瓜蒌
子消腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺
金銀花當歸身或湯或散以少酒佐
之

○又於痛處灸之一二壯亦妙粗工便
用針力必成痼病

○瘻若始有核腫結如蠶豆爭大不痛
不痒五七年方成瘻初便多服疎

氣行血之藥，復情思如意，隨可愈。味
破者尚，可治成瘡者不可治。

藥

○升麻托裏湯

治婦人兩乳間出

黑頭瘡，瘡頂脂下及乳癰初起，升

葛，翹，飯身，栝絡，二芪，行桂，升

其炙牛絡，一右水，一盞酒，半盞煎至

一盞，食後熱服。

○連翹飲子

治乳癰，翹，芎，萎

皂刺，橘葉，桃，青，其節，絡，二

右至末破者，加柴，已破者，加參，其飯

白為

○百齒霜圓

治吹乳結核，腫痛及乳

癰，百齒霜，即麻齒，右為圓如雞

頭子，大黃丹，為衣，每服一圓，好酒送

下，如不飲酒，白湯，不可化，開亦不

可，令病人知極有效。

○一方

治乳癰，人牙齒，存為末

醃調塗

○栝萎散

治乳疽，妳，乳，黃栝，菜，子

一箇，去皮，焙，為末，如急，則只爛，研，生，其，飯，絡

兩，沒，二，各，乳，行，右，用，無，灰，酒，沙，黑，腹

火，熬，食，後，服。

○究原五物湯

癰疽發背，乳癰，通用

蔓，研，教，皂，刺，帶，生，沒，各，半，乳，其

各，二，一，右，酒，煎，服。

○復元通氣散

治乳癰結核不散

木，苧，青，穿，陳，芷，其，各

分，貝，姜，襪，加，蒲，蔥，右，水，煎，或，酒，調，亦

可。

○又方

青，陳，翹，金，銀，花，酪，一

穿，炙，栝，酪，三，其，生，熟，右，為，末，熱，酒，調

服，一，錢。

橘皮湯

治乳癰初發即煎此湯服即
効因小兒吹姦者並治 陳皮湯
微乾色 右爲末麝少許每服一
錢酒調服

○一方 紫蘊一味濃煎湯頓服及用
葉盒乳房

○一方 治吹姦 棗核去核入單
矢七粒煨存性研末入麝少許溫酒
調服

○又 皂角燒灰蛤粉和熱酒一盞服以
手揉散

○治乳頭裂 秋後冷露茄裂開者乾
燒存性爲末水調敷甚驗

○治乳赤腫欲成癰者 南星末姜汁
調塗初發之時効

傳 橘葉散 治婦人百病不效者人遺

鬱乳房有核 青膏 煨其節沒

浦公英絡半萸行飯頭伴皂刺行
煨零金銀花分右作一服加青橘葉
丁小握酒煎食後時時服

○丁香散 治乳頭破裂或見小兒吹

乳血乾自裂開多痛 丁香一味
爲末乾付裂處燥則唾津調付

○治乳癰 蒲分英 忍藤入少酒煎
服即欲睡是其効也

○十六味流氣飲 治妳岩 方見右

○置煮青皮湯 治婦人憂鬱乳房有
核 青皮細水一盞半煎至一盞
二服已上二方服至核消在藥

一楊梅瘡 二十一 花薺 三各翻花瘡

慧 楊梅瘡近年以來極多庸醫務速効
以輕粉丹麝等毒劑幸而血實盛

者得愈怯弱之人變生瘰癧不知戒
守變成癩風又輕粉多用蕪以麝香
透入鼻節遂成風瘰經年痛癩膿爛
輕粉但量入虛實用之可也

○**疑**素無天庖楊梅綿花等瘡故無活法
丹溪於通聖中加減量入厚薄治得
效雖遲十無一壞

○**傳**一**方**怡翻花瘡 芎 天花絡五
輕粉不難 辰洛分半 麝香右為末
蒸餅九如菘豆大每服八丸溫酒下
日三服一**方**無言天花亦効

○**傳**一**方** 版 芍 芎 胡麻 生
蔓 杓起上四味 白蔞 苦參 括
風 羌 何首 芷 蚤炒荆 翹
岑 施 玄參 皂刺 甘 吳茱
葉 歲略一右為末 米泔丸如梧桐

子大每服七十片茶下前服亦可實
熱瘡盛者入輕粉二錢

○**疑**一**方** 永 輕 雄 鈔錫絡一木

驚師 麝香右搗末 永鈔化開 共為末
以紙捲入如膏燃之令患人飲食以
壯其胃然後令正坐薰瘡以綿被厚
之勿令藥烟風泄出亦其患即効矣
虛氣弱不宜薰恐發腫

一**方** 癩風 一十二與癩通

○**傳**經曰風之傷人也或為寒熱或為熱
中或為寒中或為癩風又曰癩者目
米衛熱腐其氣不清故使鼻柱壞而
色敗皮膚瘡潰風寒客於脈而不去
名曰癩風

○丹溪曰是受天地間殺物之風故也
氣受之則在上血受之則在下皆不

外陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意者其疔瘡與瘡十餘先見者多者在上也下者先見者多者在在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀道中出後用中風通聖散調之更用二錢針於方中出血

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

○大風有五黑色不治餘皆可治由食肝眉落食肺鼻崩食脾聲啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴嗽入耳或生瘡或癰或痛食身則皮痒如虫行

○淋凡癰風肌肉麻木瘡癩疥癩瘰癧

滴眉髮隨落手足指脫頑痺痛瘰白皮脫落鼻梁塌倒眼爛齒豁色黃楊病証之惡無越乎此身此病者日無一生切戒房室公私無務一切口味悉宜屏置治法先服樺皮散從少至多服五七日灸葉幾穴七世多瘡愈後又灸凡二三灸之後服一聖散泄熱去血中之風時更以升麻湯送下瀉青丸倘年深日久則以愈風丹換肌散等方詳而治之

樺皮散

治肺藏風毒遍身瘡疥及

瘡疹癩痒極之成瘡或面上風刺

樺皮燭燭 荆穗 杏酪二枚四兩

燒存甘草酸半右杏去皮尖用水一碗

熬俟水減半取出乾研外都為末入

杏仁每一錢食後溫酒調

○**醉仙散**

治大風疾遍身癢疹癰瘡

麻木 胡麻 牛 杓 蔓略一兩
白疾 苦參 枯 風略半 右為末
每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服
一錢茶清調下晨午各一服後五
七日先於牙縫內出臭黃涎澀身疼
痛昏悶如醉次後利下膿血惡臭病
根乃去

○**三聖散**

皂角刺三斤 炭火一 為末

每服一錢大黃煎湯調服

○河間治法早服樺皮散午前升麻湯

下瀉青丸晚服三聖散此數藥皆足

緩劑疎泄脈中之風熱也

○**升麻湯**

治諸風熱癩肌肉極熱然

上如鼠走口反綻皮色變升

神參 風 犀 鎊 鈐 鎊 羌 活

辨 右為末每服四錢入生薑三片

竹歷少許煎服

○**瀉青丸**

治小兒驚風

○**通天再造散**

治大風惡疾鬱金

大煨 皂刺炮經年者 白牽六

右為末每服五錢日末出向東以

無灰酒調服盡量為度至晚必利黑

頭小虫或如魚腸臭惡物忌食鹽醬

醋諸般魚肉椒料果實煨燒及火燻等

年止可食稠粥軟飯及煮熟時菜亦

須淡食茄芥不可食惟龍蛇以淡酒

蒸熟食之可以助藥須戒房室勞力

及終身不可食牛馬大肉等

○**大風丸**

治疥癩 大風子 疔蝎

芎 藎 半 蠲 蚕 絡 半 飯 鬚 大 瑤

不 苦 參 風 羌 荆 烏 蛇 肉 各

兩獨耐右為未用梨飯九如桐子大
每服五十九茶清下

○**丁方**

治癩風年深鼻塌眼爛遍身

紅烏藥兩沉五十參三甘炒四兩

右用大楓油化開和藥麵糊丸如相

子大每服五十九茶清下

○**加減通聖散**

先服此大瀉惡毒穢

積又用三稜針看肉黑處及委中紫

脈刺出血不可令出大過後服神

仙紫花九 芎 風 荆穗 枯

枳炒膏柴 連 羌各五翹 白

芍 飯酒 麻去根節 搥去殼甘

滑 苓 桂栢各三 苛 行生地 熟地

並酒浸 錦大黃 枳芒 兩皂刺一兩

右分小服用水一碗半煎至一碗空

心服日一服五六日後又進一服

○**神仙紫花丸**

治癩風及諸般惡瘡

風瘡効如神 白花蛇一良去頭尾

連皮骨用 何首烏 荆穗 葳各四

麻連根節 胡麻子行 蛇床行 右

各細切用無灰酒一大碗浸一宿瀝

出晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡

為度晒乾為末別包 木 沉各二

參耐飯粒 天麻 牙皂各五 麝行

群大塊 麝一枚 定風草二枚 半兩天

粉佳 葳煨 還腫子鴨 草一兩 右磨細

益世 草一兩 還腫子鴨 草一兩 右磨細

砂五味各別研不見火餘味亦別研

連前五味和勻別包 羌 風 耳

細 芎 獨 蒼米泔浸 把去毛

白芍 芷 白朮 金銀花 五加

君參絡五胡麻子 白附 藜蘆 麻黃
膝 草烏 罌粟 川烏 罌粟 苜蓿 荊
右為末別包

檢合法用大風子二斤，去其殼，以磁罐盛之，入無灰酒，以皮紙重人包，口勿泄氣，文武火蒸，俟黑爛，為度，并無渣滓，成油，分作三分，每下分入第一號藥八錢，重第一號藥六錢，重第二號藥一兩五錢，重和勻，加糯米飯，搗極膠，粘如桐子，大晒乾，勿見火，每服二十丸，漸加至五六十丸，雞鳴午時臨臥，各一服，茶清下，忌房勞，醎酸酒醋，糟淹，猪羊，雞馬肉，魚腥煎燻，水果，五辛，姜椒，大料，辛辣，熱物，蕎麥，菘豆之類。

○一方 荆穗 柅 大 爵金 地

仲 風 菴 獨 白 蒺 分 為 末 以
大風子油入熟蜜，丸如桐子大，每服四五十九，茶清送下，日三服，日誦觀音千萬聲，以攝其心，禁其慾。

○浴浸法 桃 柳 桑 槐 楮

五般枝濃煎湯，大缸浸坐，沒頸，一日候湯如油安矣。

○本草治惡疾，遍身生瘡，濃煎淨湯，浴浸，半日，大効。

○八葉湯 淋洗大風毒，桑葉 荷

葉 地黃 皂角 苜蓿 蒼耳 何首烏 藜蘆 右八件葉晒乾等分燒存性，為末，如面藥洗身上。

○下法 桑柴灰，下斗熱湯，淋取汁，洗

頭面，次用大黑豆，煮豆漿，添湯，三日，一各浴，下日一洗面，却用側柏葉，煮湯。

乾白膠香等分爲末煉蜜丸如桐子
大每服五七十九溫水下

傳一方蒼耳葉醜苦參爲更以酒煮烏
蠱魚代補蛇之或鉄研細糊丸如梧
桐子大每服五六十丸加至七八十
丸熱茶清送下日三服一月而安
若入藥漿木捷紫萍多寸蛭須與月
於山沼取之淨洗去泥略蒸透乾用

救急門十二

林破棺散

治厥弱寐卒死及爲墮墜什
木所壓蹶水金瘡卒致悶絕產婦惡
血冲心諸暴絕証 半夏湯泡七次去
鴨或以皂角末吹入亦可

雄未散

治到久無人居腫中爲驚

物所壓厥但吃作聲使令叫喚如不

醒可用

牛黃

雄黃各一硃拌

右爲末每用桃一錢压上燒一錢酒

調灌之

凡屬者不可用燈照亦不得近煎急

喚但痛咬其足跟並大梅指甲邊

一方龜心土爲末每服一錢新汲水

調下

又雞黃末一錢煎桃葉湯調下

又屬死灸兩足大梅指聚毛中中

五壯

又屬死及一切卒死灸人中穴三五

壯又灸臍中百壯

救自縊自且至暮雖已冷可治心下

微溫者雖一日已上可治急抱使繩

寬解切不可割斷正唯唯唯放肚用

發蓋急用竹管吹其兩耳一人急牽其髮不放手就用脚踹其兩脅一人摩其胸及屈伸其手足摩捋之如活氣以粥飲與之

○**一方** 治自縊死以藍沙灌之

○又刺雞冠血滴入口中男用雌女用雄仍送喉中

○**水法** 凡火瀉水者急上屋頂將牛一雙却念瀉水之人將肚橫覆在牛背上兩邊用人扶策徐牽牛而行以出腹中之水如醒即以蘇合香丸之類或老姜擦牙或橫腹於圓木上亦可

○仍取壁土一堵置地上以死者仰臥其上更以壁土覆之止露口鼻自然水氣翁入土中

○仍急用竹管吹其口鼻時蓋兩內更遊吹之給上下氣相通

○又用半量末少許搗其鼻如略用粥飲灌之

○又急解去衣帶艾灸臍中即活矣

○**下法** 皂角為末葱白汁和丸棗核樣內下部中其水即出

○凍死四肢直口噤只有微氣用大金炒灰令煖以袋盛懸心上冷即易之日開氣出以清粥少火進之若不先溫其心便飛火灸則冷氣與火爭必死

○凡冬月凍倒扶在煖處不得便與熱湯及血火灸等中行凍便近火脚指墮落

○**一方** 治凍死 生姜 研陳酥 各一兩 水煎溫服

○伏暑不可便為冷之即宜用溫湯
心腹間如途中則用路上熱土放臍
腹間令人尿其中

○墜墮癆血冲心氣絕不能言取藥不
能及急摩開口以熱水使灌之治法詳于
損傷門

○急喉閉腫痛手足厥冷即時氣閉不
通用皂角二皮攤水一盞灌下立愈

○治法詳于
損傷門

○毒蛇螫人急掘地堑埋瘡處堅築其
上毒入土中痛止

○蛇入人竅用刀割尾枝辛辣物用絲
縛定自出不可拔

○中蛇毒勿渡水渡水則痛甚也治法詳于
損傷門

○林九臘月及雄狐膽如有毒人卒暴亡未

逐者溫水微研灌之喉即活常須預
備救人移時即活如無膽宜用雄狐
屎煨之辟惡在木石上者是

醫法明鑑卷第二終



