

醫方明鑑

乙

※

i 40

F 126

490.9  
Ik-12  
2

4冊  
1-4

No. 2109  
12-40



富士川文庫  
1319

一 虛損

三 眩暈

五 水腫

七 積聚

九 噎膈

十一 淋病

十三 遺精

十五 癩痢

十七 頭痛

十九 腹痛

廿一 腰痛

廿三 黃疸

廿五 諸蟲

廿七 吐血

廿九 溺血

卅一 疝氣

附及胃

附轉胞 胞痺  
閉格

附唾血 咳血  
痰血

二 勞瘵

四 自汗

六 脹滿

八 嘔吐

十 秘結

十二 溺濁

十四 怔忡驚悸

十六 中惡

十八 心痛

廿 腰痛

廿二 脚氣

廿四 消渴

廿六 衄血

廿八 下血

卅 脫症

卅二 飢逆

附天岐

附遺尿  
附健忘

附鬼擊尸厥

醫法明鑑卷之二

一虛損門



傳  
 虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽虛則  
 陰虛損自上而下損於手肺皮聚而毛落二損於手  
 心脈虛少不能榮於臟腑婦人則月事不通三損  
 於胃飲食不為肌膚治宜以辛甘淡過於胃則不  
 可治感熱則損陰虛則陽虛損自下而上二損於手  
 腎骨痿不能起於床三損於手肝筋緩不能自收持三  
 損於脾飲食不能消耐治宜以苦酸鹹過於脾則不可  
 傷  
 飲食勞倦內傷元氣真陽下陷內生虛熱用補中益  
 氣參芪甘溫之類補氣提其下陷此用氣藥以補氣  
 之不足也

傳  
 勞心好色內傷真陰之血既傷則陽氣勝而變為火是  
 陰虛火旺用四物知柏甘寒苦寒之類補陰火自降  
 此用血藥以補血之不足也

傳  
 四君子湯 治氣虛 補益脾胃進養飲食  
 參一錢 木苓各二錢 甘草一錢 右如自汗或小便利者去甘草

四物湯治血虛 歸熟地各二 芍藥各一 右春倍芍

夏倍芍 秋倍地 冬倍歸

八物湯治氣血兩虛 四君合四物為一劑

六君子湯治氣虛 痰喘 陳冬各一 木半一 甘草十 右

十全大補湯治氣血俱虛 而扶寒胃者 加蒼桂各半 入薑棗

大補陰丸 降陰火補腎水

補腎丸 枳板仲 姜汁拌 膝陳各二 五味一 姜五 右為集

姜汁糊或酒糊丸 溫酒或白湯空心下

六味地黃丸 治腎經虛損 遺精盜汗 發熱痿弱 下血咯血等

千金延壽丹 治諸虛怯弱 欬或節瘵 及大病後虛損 不復元

人中年後常服 可却疾延年

五味 兔絲煮煉 膝仲 姜汁拌 歸山藥 天門 麥門

生地 熟地各一 茯苓 白朮 茵澤 芎藭 鹿茸

葛蒲九節者 花椒 巴戟去心 遠志 覆盆 枳子 各五

右石祀鐵器為末 煉蜜丸 如相子太 每服一百丸 空心溫酒或

姜鹽湯下 如精滑或夢遺 加赤石山藥各五 忌蘿蔔菜

睡龍丸 治真陰虛損 及老人虛人常服 延年益壽

鹿角膠炒成 鹿角霜 兔絲同浸 枳子 取仁 熟地各半斤

白朮 補骨各四 右為末 酒煮末 糊丸 或以鹿角膠入 好酒詳

化 丸如相子太 每服五十丸 空心姜鹽湯下

益胃升陽湯 血既益氣 方聖人之法也 先補胃氣 以助

生發之氣

柴升各二 炙甘 歸身同洗 陳各五 參各一 麴炒各七

蒼一 木一 生苓二分 右如腹中痛 加白芍五分 桂三分

如渴或口燥 加首根三分

茯苓神湯 治六脈虛軟 咳則心痛 喉中介氣 或腫或痛

神參 遠志 通草 門冬 枳各六 甘 五味各三 右入姜

祖傳秘方 治心虛手振

歸身 甘 生地各一 芎各一 參各一 遠志各三 酸 枳各三

辰半星各五 麝一分 琥珀一分 神一分 葛一分 金鈎一分

石為末黃餅丸如菉豆太辰砂為衣每服七八丸津唾嚥下

或甘草湯治虛帶不足汗出而闕脈結悸行動如常

炙甘草 二斤 茯苓 一斤 附子 一分 麻仁 一分 參膠 各一分 生地 三斤

大棗 二枚 右水煎入酒些少服

汁味人參散治虛熱潮熱身體倦怠

柴甘參苓木半苓歸白芍首烏 各等分 右等

高味建中湯治血氣不足形體瘦弱短氣嗜臥

歸白芍木門着甘冬菴冬芎藭桂半苓

熟地 各五分 附子 三分 右入姜棗

治虛帶潮熱

本陳湯芎 熟地芍桂門甘梳石水煎

心神恍惚加神遠咳嗽加酸棗五味久嗽不宜知母

痰多加葶貝嗽而浮加訶嚶天花自汗加葛炒浮麥

虛甚無力加山破柏胞白加參黑瘦不宜潮熱不宜柴

人參柴胡散治男婦氣虛無汗潮熱

參木苓歸赤芍半首烏柴甘 各等分 右入姜

茯苓補湯治男婦血虛無汗潮熱咳嗽面無顏色

苓參地芍芎歸陳枳前穗首甘 各等分 右

辰砂妙香散治男婦心氣不足精神恍惚虛煩少睡

新增黃耆益損湯治諸虛帶倦客熱肌肉消瘦四肢

煩熱心悸盜汗減食多渴欬血不止

桂熟地半甘冬歸酒浸芎藭木芍木半棗

五味知地骨苧煎 各等分 參苓菴桂柴天門解

生地枳芍炒麥門 各等分 每貼一兩半每三片棗一枚

黃耆益損湯治男女性弱潮熱婦人胎前產後最為要藥

桂熟地解酒湯 芎藭 木 各一分 木 各五分

芍芍 五錢 右每服七錢子麥首粒如寒熱過加參

八味丸治腎氣虛多下元冷備胸腹疼痛

杜仲丸補心腎益氣血暖元臟縮小便

蓮 四兩 龍骨 七斤半瓦上大塊 益破苜 膠 神

桃 各一斤 右為細末用乳山菜四兩為糊丸每湯送下

三才封髓丹 降心火益腎水

天門心 熟地各一 栝縮 縮三四 右為棗水丸三方有廿四

人參養榮湯治積勞虛損肌肉消瘦短氣倦怠不食

白芍三四 歸陳各一 蒼朮各一 桂參各一 煨甘各一 遠志各一

熟地五味 苓各一 右入五車遺精加龍骨二 咳喘膠

仙傳草還丹治虛勞添精髓常脈神清氣爽延年

破熟地酒浸 遠志心 地骨膝酒浸 葛各一 右為棗酒糊丸

空心鹽酒或鹽湯下

人參養榮丸治男婦諸虛不足

參朮白芍 歸生地 陳各一 縮香附 胡連甘 各一

右酒糊丸如桐子大每服五七十丸空心白湯或酒鹽湯下

固真丹治諸虛五勞七傷下元虛冷胸腹疼痛

參朮歸 芍炒 山各一 山各一 仲各一 熟地各一

白芍牡 山各一 五味各一 澤各一 熟地各一 右為

手和地黃膏入煉蜜丸空心淡鹽湯下 脾膝無力

加膝酒炒 龜板酥炙 復春母明耳目治癱瘓兼療一切風

參各一 熟地各一 苓各一 遠志各一 膝酒浸 仲各一 歸各一

蒼朮九節 苜菊各一 蒼朮各一 龍骨各一 薜各一 天麻各一

益各五 右酒糊丸溫酒或鹽湯下

樂令建中湯治一切寒厥拘急疔疼黃春建中湯加

細陳各一 歸各一 苓各一 門各一 前各一

黃春十補湯補虛勞養血氣

春各一 歸各一 熟地各一 神各一 白芍各一 參各一 木各一 友各一

陳各一 半各一 五味各一 桂各一 烏各一 甘各一 門各一 木各一 沉各一 友各一

栝子仁湯治肝虛寒眩滿筋急睡膝無力小腹脹面青

口燥栝子 白芍各一 風神各一 附各一

細桂各一 甘各一 右入棗

加味沉珠丹治氣血不寧虛弱之心神悶亂

辰木各一 參各一 神各一 烏各一 沉木各一 歸各一

脊瓊各一 齋各一 加酸各一 遠志各一 加乳山龍各一

右為棗煉蜜丸食後茶酒任下

秘傳固本丸治諸虛生精血補五臟進飲食

參生地 熟地 門栢 兔而浸二日 西復盆 苗鹽炒

五味苳而浸 巴戟去心 山茱去核 膝酒浸 竹善炒 苓斷絲

煨酒浸 椒焙出 通香各名 木二兩 桂半兩 栢知各四兩

右煉蜜丸溫酒或塩湯下

補 參香散 治心氣不足諸虛百損調榮衛寧心志

參木 苓丁 姜各一兩 山 烏朮 縮瓜各二兩 蓮二兩

橘紅 香木 檀各一兩 甘各一兩 右加姜東一兩加附

驚甲地黃湯 治虛勞手足煩熱怔忡婦人血室乾

羸瘦飲食不為肌膚

驚酥各 熟地而焙 歸而浸 柴門餅五根 木苓

苳各一兩 桂 參 寸各一兩 右入生薑烏梅

柴胡散 治寒熱羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

柴香 赤苓 木各一兩 參地骨 枳 桔 桑 赤芍

熟地各一兩 門三 寸各一兩 右合林無香地骨枳地 有歸青芍升

二帝瘵門

勞傷心胃而得之心主血腎主精六竭血燥則勞瘵

繼曰陰虛生內熱嗜慾無節起居不時七情六欲各一 時

動于中飲食勞倦各一 過勞傷中停漸而至真水枯竭

陰人上炎而發蒸之燥熱或寒熱進退似瘵非瘵古方

名曰瘵病或二十四種或三十六種名雖不同證亦少異

大抵不過咳嗽發熱咯血吐痰白濁白淫遺精盜汗或

心神恍惚夢多手鬼交婦人則月水閉日漸至 羸漸成

勞極各一 假日久至發熱不休形體瘦其真氣已脫

雖禽痛復生真能救其各一

熟毒耐積各一 久則生異物惡虫食藏府精華變

生諸般奇狀治各一 法一則殺其虫以絕其根本一則補

其虛以復其真元

其侍奉親密各一 人或同氣連枝各一 屬薰陶日久受其

惡氣各一 遭傳染名曰瘵屍又曰喪屍

丹漢曰此陰虛極瘵手血病多有虫者其傳屍一證

不可云無大法四物湯加童便竹瀝姜汁  
身瘦屬火因火燥燥也肉脫甚者難治

氣血虛其發熱或勞者補天丸加骨蒸藥佐以骨蒸藥  
知柏地骨門光驚青蒿膏竹葉烏梅類

傳辰勞寒熱久嗽必血虛脈瘦先以巨物湯次以蓮心散  
二十四味蓮心散

歸芪甘散前柴獨尾風已冬子

苓陳膠珠桂芍麻根杏蓮肉此味常用

星芎枳芫花一握右作服加每三行連

一枚水二盞煎至一盞去粗溫服須待吐有異物芫  
花漸減以蓋芫花及甘草所以殺虫炒所以斷熱去寒  
妙處在此

膈香散治男婦骨蒸發熱五勞七傷等證

天靈蓋各二麝各二柴一兩犀屑半兩甘半東引桃板

東引柳枝東引榴枝青蒿各一握魏一薤白葱白

右為末童便二升半浸菜一宿明旦早煎至一升半

去粗分作三服每服八錢末三錢溫服五更初進一服約

人行五七里再進一服若惡心欲吐嚼白梅止三服後

浮出惡物異虫或身如蟻行不可名狀後用葱粥止惡

凡一月及忌食油膩溫熱鹹酸併牛羊雞猪大肉魚腥

年遠重病不過二服全安男病女煎女病男煎取出後須

大補在神散補人以此藥忌猪大雞魚及孕婦孝子見之

取辰虫神仙秘方青桑枝柳枝梅枝桃枝榴枝

魏母餘茶用童便一升半煮去一半去粗將茶汁魏

女細研再煎十數沸分作二服調辰末各五麝少許

右三味亦分作二服入前湯五更初進一服三點時之進一服

至巳午晚必取下虫其嘴紅者可治青黑者不治但可絕

後人傳佳耳取出後進軟粥溫初忌食生冷毒物凡

合此藥不可令速心者先知奇味亦不得令猶太孕婦孝

子備尼等不祥人見之

神授散傳尸勞病血氣未甚虛元氣未足服者用



川椒 二斤擇去閉口者 右一味為末每服二不食末湯下或  
手裡裏炒出 用酒末糊丸如梧子太每服三二十九漸加至八九十九空酒  
或米湯下愚治一婦人用花椒二分苦練一分丸服屎出  
谷從大便世出

補天丸 紫河車 即胞衣也常用也胎中男胎初胎者為勝者不可  
得無病婦人為佳初取長流水洗淨去胎膜及  
穢物外以酒糊使不壞可煨乾  
要用時木醋浸一宿煨乾用 右以補腎丸茶 見虛  
換門 同河車  
再研酒糊丸或新取紫河車蒸熟同茶末搗為丸亦可  
虛勞者以滑蒸茶佐之云氣虛加補氣茶血虛加  
補血茶

紫河車丹 治飛辰鬼住虛勞贏瘦痰喘等症  
胎衣以皂角水洗淨以米醋洗 一云浸  
一宿 乾後籠盛以紙  
糊之不令泄氣烈火焙乾又後茶 參 木神丹  
熟地 各一  
兩 木白苓 各半  
兩 乳沒 各四  
分 辰砂 二  
分 麝香 二  
分 右為  
末酒糊丸如梧子太每服五丸煎人參湯送下日三服建元亦  
奪命散 治傳尸疔

批 二十个五  
皮大匙炒 甘參 各半  
兩 鱖魚 醋炙  
一宿 知母 醋浸一宿  
炙二兩 柴  
蒿 各一  
握 葱白 一握 右盪釐為末次下參知母  
甘又同搗次下葱蒿桃魏杵成餅子慢火焙乾為  
末秤二錢用童便二盞煎至一盞去渣露坐下一宿  
至五更暖服半盞服了衣被蓋卧天明又暖半盞  
扶行病人服之強行五七步三日更不得洗手面指頭  
候生毛為驗每日早晨先喫白湯投之  
桃仁散 治婦女面黃肌瘦腹內悶着骨蒸及月經不  
行瘦勞肌熱 桃 二兩五錢  
去核炒 赤苓 二兩 芍藥 各一  
兩 枳實 各一  
兩 陳 七  
分 犀 安  
息 各二  
分 麝香 二  
分 右加每前早晚食前  
服若取下車便宜服補心劑未取下車亦須先服之  
青蒿散 治勞瘵 蒿 赤根者取子一  
升葉五兩陰乾 桃核 三兩  
燉者 柳枝 三兩  
燉者  
柴甘 各二  
兩 地骨 二兩 槐 二兩 右加烏梅煎  
茯苓散 以麝香散取下車後宜服此補五臟  
白苓神 參 遠 龍骨 桂 甘 陳 各一  
兩 歸 五 味 各一  
兩  
香 二兩 大棗 五十  
个 右入生薑二兩

秦艽鱉甲散 治骨蒸壯熱肌肉消瘦唇紅頰赤困

佟盜汗 地骨柴 各一分 瓦知歸 酒浸各一分 鱉 酥炙各一分 右入烏梅一不

一方 治男婦骨蒸勞瘵增寒壯熱

蒿 春夏用重秋冬用子童便浸晒乾一兩 木地骨 鱉 酥炙 白苓 甘味

藥 各五分 冬 括 各五分 右入烏

續斷散 治骨蒸壯勞傳尸潮熱喘盜汗及吐衄膿

續 苑 桔 味 各一分 生地 藥 各一分 甘 小豆 各一分 右

分二貼每貼入小麥五十粒

人參黃芪散 治虛勞寒熱肌肉消瘦五心烦熱口燥咽乾

煎赤心松盜汗胸膈不利咳嗽膿血

參 苓 芍 芩 苓 各一分 知 柴 天 白 鱉 酥炙各一分 葛 各一分

生地 各一分 桑 葉 棗 各九分 桔 各一分 右入烏

清肌十全散 治骨蒸勞熱肌肉消瘦

柴 各三分 生地 地骨 桔 各一分 瓜 苓 參 各三分 甘 歸 葛 各一分 右

龍膽 且 治積熱立瘦不食消癆腫

膽 柴 苓 鱉 酥炙各二分 桃 棗 梳 陳 太 歸 酒浸各一分 甘 各一分 右

煉蜜丸白湯下之方無苓有苓地骨

清骨散 治男婦五心煩熱欬成勞瘵

柴 生地 各三分 冬 瓜 熟 地 芩 赤 苓 胡 連 各一分 可 各一分 右

十全補湯 治氣血俱虛 方見虛損門 肌 瘦 加 地 骨 骨 蒸 加 柴

嗽 加 五 味 痰 加 芩 汗 加 芍 氣 短 加 參

秦 苳 枝 葛 根 湯 治 肺 痿 骨 蒸 勞 瘵 咳 寒 壯 熱 聲 啞 白 汗 胃 積

柴 各三分 冬 鱉 各一分 花 歸 地 骨 各一分 桑 中 甘 各一分 右 入 烏 梅

保和湯 治勞嗽肺痿成痔者 方見咳嗽門

保真湯 治勞證伴虛骨蒸

歸 苓 參 朮 羌 熟 地 白 苓 赤 苓 蓮 肉 各一分 天 門 冬 門

五 味 知 柏 柴 赤 芍 地 骨 甘 陳 各二分 右 入 烏 梅

鷓鴣 湯 加 神 遠 柏 子 酸 棗 附 湯 加 解 烏 菜 楊 梅 湯

瀉 痢 加 通 石 韋 黃 遺 精 加 龍 骨 蛎 蓮 鬚 蓮 子

躁 熱 加 膏 滑 蒿 散 盜 汗 加 浮 麥 枳 者 麻 根

男子 于 前 後 色 慾 過 度 損 傷 精 氣 虛 弱 大 動 之 病

午後 發 熱 咳 嗽 盜 汗 飲 食 少 進 其 則 痰 涎 帶 血 肺 風

數肌肉消瘦此為勞瘵最重，雖治如到肌肉消瘦院困者，宜尺脈取細數則難為此病，大忌服人參，若胃服過多者亦難治。

主五苓 知參水 天門五皮心 白芍炒 木各一分 栝參水 陳各七分 熟地二分 生地一分 甘各五分 葶一分 葶一分 夏一分 夏一分

咳盛加桑寄生 葶五分 五味 痰盛加葶五分 貝潮熱桑寄生 盜汗加晒酸浮麥 夢遺精滑加晒龍骨山茱

赤白濁加白朮連 衄血咳血加桑寄生 按骨皮散 治骨蒸壯熱肌肉消瘦盜汗

地骨皮 柴胡 知母 散各一分 右等分末入桃柳枝 頭各七個 葶三斤 烏梅一個 煎

參春散 治勞瘵喘嗽咯血潮熱盜汗 柴膠炒 葶各五分 白朮各五分 歸身各五分 貝各五分 甘各五分

松栝各五分 冬各五分 五味各五分 羌活各五分 香欬各五分 桑各五分 散各五分 右入葶連

灸法 傳 凡骨蒸勞瘵元氣未脫者灸四花穴 灸有不效者真濟世妙法也

科

取勞虫三節，骨上二穴，直骨上二穴，各灸七壯，然後飲食調理，方下取虫，其虫或如乳絲，或如紅絲線者是也。

患門，二穴，四花左右，二穴，四處同時下，各七壯，至二七，累灸一百或一百五十壯，後瘡款瘡，又灸當脊骨上

二穴各一百壯 傳初四穴同時灸，各三七壯，累灸至一百壯，後當脊骨上，三四壯，各灸一壯，只可灸三五壯，多灸恐人踐背。

凡灸其骨上四花瘡，灸款瘡，可灸三里穴以下，氣過仙灸，勞瘵瘵法，灸五日，三更時，直身平，立用筆於腰

上兩傍微陷，灸點，謂之腰眼，然後上床，合面而臥，一穴灸七壯，勞虫或吐出，或浮下，用大艾，棄於江河，恐

害人故也，灸後宜服將軍丸 將軍丸 治傳屍勞瘵

錦文大黃九分 藤一分 管仲炒 牙皂醋炙 桃去核 雷凡各一分 燕半兩 散二兩 右為末，先將蒿草三四束，邊

桃柳李桑葉各七片，水一碗，煎至七分，去粗入蜜，天

盡存熱，以膏入前菜末及腐末，其息香，搗丸如桐子

大每服三十九丸食前湯送下

。巨汗丸 灸後宜服

生地付 青蒿付 薄荷付 童便 酒升各二 同煎成膏

却入後茶末柴煎思醋冬 芫各一 辰 腐各半 右為末

入前真月內丸如桐子大每服十五丸溫酒送下

。灸帝瘰灸乳後三寸十四壯男左女右亦已加壯數

又灸大椎 身柱 諶諶氣海

三眩暈門

。肥白之人濕痰滯於上陰火起於下是以痰扶而不上衝

頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑生花如坐舟車而眩暈

黑瘦之人体弱真水虧欠或勞役過度相火上炎亦有時眩

暈天抵肥白作眩者宜清痰降火為先而兼補氣之藥

惡痰作眩者宜滋陰降火為要而帶抑肝之劑

舟後白痰在寸天在下六六上而動其痰也。陳加苓苓是

。痰養之眩暈者中風之漸也。晚白氣虛而痰者四邑加苓

半橘紅或加芎藭以清利頭目痰感而扶氣虛者。仁

陳加參木菖或加炮附入竹瀝薑汁。體瘦血虛而痰

太兼盛者。仁陳合四物加片苓薄芎入竹瀝薑汁。童便

諸般眩暈痰厥則加風荆天麻芫荽扶熱加片苓連梅

扶寒加姜桂附。屬

。去血過多而眩暈者。芎藭溫

。防風通聖散 治風扭眩暈 方見中

。半夏白朮天麻湯 治風痰眩暈 方見頭

痛門

六合湯 治風虛眩運 四物加苒藎

川芎散 治風眩運 案去桂 山茱萸 甘菊 參 神

小芎各半 右為末 每服二錢 溫酒調下

川芎散 治風證眩運 惠風自汗

芎 白苓各三 細枝各二 木各五 甘各一 右入姜

以芎石薑湯 治風熱上攻 頭目昏運 方見頭痛門

疾神過 治氣鬱 生涎隨氣上厥 頭目眩 冒心中怔悸

參門山各一 前 熟地各九 枳各二 甘各十 遠各七 甘中者 遠心 善汁 炒 各七

白苓 神各三 者各半 右加生薑末

香橘飲 治氣虛眩運 木不辛橘 苓各十 丁

甘各合 右入毛前香 煎合 凡如芎 淨桂 治血虛眩暈

冬法 頭風目眩 灸前頂三壯 在入髮際 三寸半

又灸顛會三壯 在入髮際 寸 又灸後頂三壯 在入髮際

六寸半 灸陶道五壯 在大椎節下

風門二穴各五壯 在第二椎下 兩傍各一寸半

頭旋目眩 灸兩眼小骨上髮際各一壯

傷 四自汗門

再漢自汗 屬氣虛 屬濕 與盜汗 屬血虛 與陰虛

桂枝湯 治外感風邪 自汗 聖藥也 方見傷寒門

黃耆桂枝湯 治外感挾氣虛 自汗 桂枝湯加耆

補中益氣湯 治內傷氣虛 自汗 方見內傷門 甚者

六脈浮軟而虛 附以治陽虛 尤寸浮洪而自汗者 心火炎

倍參或加門五味連各半 尤關浮強而自汗者 挾風邪也 加桂枝

芍各半 右關浮無力而自汗者 倍參耆 若尺洪數無力而

自汗者 或盜汗 相火挾君火 勢而尅肺金也 加連苓

栝各半 只用當歸六黃湯 尤尺浮洪無力而自汗者 水

斷大盛也 加知栝各半 熟地一 凡內傷及一切虛損之證

自汗不休者 總用本方 少加附子 麻根 浮小麥 但和柴槩

用蜜水煎 炒以殺升發 勇悍 性又欲引參 芪等至

肌表 故不可就

當歸六黃湯 治盜汗 聖藥也

歸 熟地 生地 熟地栝連 苓 右水煎

歸 熟地 生地 熟地栝連 苓 右水煎

。痰前湯 治諸虛及新病暴厥津液虧欠伴常自汗心

松驚湯 蚝蛄 麻根各一 右作一服小麥百餘粒

。白朮散 治飲酒中風多汗食即汗出久不治必成消渴

蚝三 木二 風三 右為末溫水調下

。桂枝加龍骨牡蛎湯 治脈孔動微緊盜汗自汗及失精

枝三 白芍各三 龍骨各三 蚝各三 右加姜枣

。辰砂妙香散 治心氣不足虛煩少睡盜汗 方見遺精門

。黃芩湯 治表虛身微熱汗出不止或因發汗表虛脈虛者

黃芩各 參各 白芍各 木各 白芍各 甘草各 陳各 右入姜

。黃芩湯 治喜怒不節房室勞傷寒熱自汗盜汗

黃芩各 參各 白芍各 木各 白芍各 甘草各 陳各 右入姜

。風小麥 治自汗虛弱 不可服

風小麥各 歸各 甘草各 右入姜發厥自汗附地 發熱自汗附

。芍藥散 治虛盜汗 柴瓜味 小麥 遠志 桂

芍藥各 風芍藥 歸木各 炒桂甘各 五味各 參各 右

。白芍 熟地 蓮 右入姜

白芍各 熟地各 蓮各 右入姜

。解木 煎炒 甘 苓 右入姜

解木各 煎炒 甘各 苓各 右入姜

。參苓散 治睡中汗出 酸 參 苓 為末米飲調

參各 苓各 散 治睡中汗出 酸 參 苓 為末米飲調

。高硬之聚 為取出芫片焙乾去寒藥淨麥煎湯下

高硬之聚 為取出芫片焙乾去寒藥淨麥煎湯下

。陳山 參 右

陳山各 參各 右

。參木 苓 甘 柴 葛 歸 芍 入姜

參木各 苓各 甘各 柴各 葛各 歸各 芍各 入姜

。頭汗 乃陽氣上脫也 須早治宜

頭汗 乃陽氣上脫也 須早治宜

。陳艾煎湯 臨卧調服 方見青桑葉第二重 為末空米飲

陳艾煎湯 臨卧調服 方見青桑葉第二重 為末空米飲

。陳艾煎湯 臨卧調服 方見青桑葉第二重 為末空米飲

。陳艾煎湯 臨卧調服 方見青桑葉第二重 為末空米飲

脚汗 牡蠣散 蛎殼 枳殼 蜜陀僧 黃丹 為末用  
少許 乾搽 脚指縫

溫粉 止汗 芎藭 木藁 為末 每末 一兩入  
米粉 三分 和搗 身無 黃末 亦得

又 蛎殼 五冬 為末 綿裹 搽患處

五水腫門

備

經曰 諸濕腫滿 皆屬於脾 夫脾虛 不能制水 之漬  
妄行 故通身 面目 手足 皆浮 而腫 名曰水腫

母

丹溪曰 水腫 因脾虛 當以參朮 補脾之氣 實則健運  
升降 則水自行 宜補中 行濕 利尿 尿切不可下

母

又曰 水氣 始壯 氣鬱 飲食 濕熱 諸證 為妄下  
有水氣者 微腫 先見於目下也

母

自胞 卡微起 肢体重着 咳喘 怔忡 肢間 清冷 黃段 尿  
淡是也

備

丹溪曰 水腫 脈多沉伏 病陽水 兼陽證 脈必沉 數病  
陰水 兼陰證 脈必沉遲 煩滿 小便赤澀 大便秘結 為

母

陽水 不煩滿 大便溏 小便少 而不赤澀 為陰水  
水病 脈洪大 可治 微細 不治

水病 腹大 脈實 生虛死

以手 按之 成凹 不起 者濕也

一頁 腫脈浮 不得 續自汗 無大熱 風水也

肺受邪上喘則失降下之令故小便漸短以水溢皮膚生腫滿此則喘為本腫為標治當清金降氣為主行水次之

脾受邪不能制水則水濕毒行漫漶肌肉水既上溢則邪及侵肺氣不得降生喘此則腫為本喘為標治當實脾行水為主清金次之

水病其本在腎其末在肺故下為附腫大脈上為喘呼不得卧者標本俱病

凡水腫先起於腹而後散四肢者可治先起四肢而後歸於腹者不治

或男從足下腫而上女從身上腫而下並皆不治

身有熱水在表可汗身無熱水在裏可下

腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便此仲景之法

熱水腫用梔子砂為末末飲調下三五錢若胃腕熱

病在上者連穀用

葶藶不香散 治濕熱甚水腫腹脹小便赤澀大便

葶藶 隔紙炒 赤苓 猪苓 各二分 木 半斤 澤 甘 冬

通 各一分 桂 三兩 滑 三兩 為末白湯調下

白木香散 治喘嗽腫滿不能卧尿閉

木猪 甘 澤 通 赤苓 各五分 木 枳 各三分 陳 五分 桂 三分

滑 二分 右作一服加薑三片

導滯通經湯 治解濕有餘氣不宣通面目四肢浮腫

桑木 木 苓 澤 陳 各等分 右

赤茯苓丸 治脾太過而肢腫滿胸脹喘逆氣不宣通

小便赤澀

葶藶 四分 已 三兩 赤苓 一兩 木 半斤 右為末棗肉丸如桐

子太每服三十九丸食遠桑白煎湯送下

疎鑿飲子 治通身浮腫喘急煩燥多渴二便不利

澤 小豆 炒 陸 羌 腹 目 通 苳 栝 苓 皮 各一分

右分二貼入薑三片

蘿蔔子飲 治水病浮腫

葶藶 取 苦葶 炒 甘 各半 半 苳 栝 青 陳



青木 白高陸各 蘿一不赤苓半 右分二貼入  
姜三片

再皮散 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面肢浮  
腫心腹膨脹上氣喘息

姜皮 桑皮 腹皮 苓皮 陳皮各等 右水煎一用五加地骨

木香分氣湯 治氣留滯四肢腫腹急胸膈膨脹尿臭濁

木赤苓 猪 澤 枳 半 枳 殼 炒 蘊子 灯心各等

右每服七錢水三盞再三片煎八分入麝末少許食遠溫服

內挾七情停滯涎飲腫滿腹脹名曰氣分宜分心氣

飲不香風氣飲二升並見氣門

白木澤澤散 治痰病化為水氣不能食

木澤芍陳各等 苓木枳各等 右每服七錢加姜

三片子枳加枳 腫甚加之干末

杏蕪飲 治上氣喘嗽面目浮腫市見咳嗽門

溫白丸 治積塊久不治變成腫脹

川烏炮去皮臍 皂去皮子 巴去心膜玄四 朴姜製 萊湯洗炒

芡去葉 苓 參 栝 萹 柴 姜炮 桂 蜀 椒玄目及閉口

連各五 右為末入巴豆令有煉蜜丸如梧子大每服五七丸

姜湯下

巨仁丸 治水腫喘急二便不通

柳杏仁去皮 杏去皮 薑各等 右為末米糊丸如桐子大

每服七十九丸空心米湯下

消腫丸 治水腫喘滿小便不利

滑通木 蓮耳 以脫 苓神 半 陳各 木

瞿穗 丁各五 右為末酒糊丸燈心門冬湯下

保脾散 治泄水發腫用此先實脾土

朴姜製 木似木 姜炮各 果腹子 附炮 白苓

甘各 右入姜末

當歸散 水腫疾多由胃水不能振養心火大不

能溫養脾土故土不能制水飲為盈溢氣脈發為

浮腫證心腹堅脹喘滿不安此湯主之

歸 兩 棗 木 赤 苓 芍 牡 桂 枳 陳 通 木

紙各一分 蘓各六分 右水煎

一方治酒腫及脾虛發腫

蘿蔔十枚 皂角五斤 右二味用水同煮乳去皂角

將蘿蔔搗爛入葱餅和丸如雞頭實太羅甸子

煎湯送下

厚朴湯 治結陽証四肢腫滿熱毒不散

厚云參 麴柴各半 升通各九 射干 甘各一分

芩三不門 右水煎

赤小豆湯 治年少血熱生瘡疥变为腫滿

小豆炒 煨而浸 陸澤 麴赤方 已猶 桑各一分

右分二貼加姜三片熱甚加厚

神 分氣補心湯 治心氣鬱結發為四肢浮腫喘急

腹炒 苜炒 白苓 桔各一 通甘 芎前 枳殼

青炒 木各七 細木 右加 薑各

茯苓湯 治脾胃不安手足浮腫小便赤淡喘滿

赤苓 澤苜 苜陳 桑腹 薑各等 右

林

水腫喘急者先當降氣且和散加蘓苜

退腫危活散

蘓微炒 右為 末每 服三 錢空 心溫 酒調 服

陰府膏 治腫滿小便少

地龍猪 針沙 等分 為末 葱涎 調敷 臍中 寸高

水腫初得危急者冬瓜白水煮熟任意食之神效

卒腫滿身面皆腫用皂角刺炒黃對三升用酒十椀

煎至四椀每服一盞日進三服

治一切水腫紅花二兩杵爛入水盞取汁服之不過三

服便痊

醋附丸 治酒腫及脾胃虛發腫用醋煮香附焙為末醋

糊為丸如桐子大每服四十丸白湯吞下

灸法

命水灸七壯治水病腹腫不能食穴在臍上一寸

神闕灸三壯治水腫鼓脹腸鳴當臍中

石門灸七壯主水脹水氣行皮中穴在臍下二寸

三里灸七壯主腫脹皮腫 穴在膝下三寸筋外兩筋間

水溝灸三壯主水腫人中滿 穴在白鼻柱下一名人中

水腫推得針水溝若針餘穴水盡即死針分水殺

不多

水腫灸足內踝下白肉際三壯妙

八絕 厲寒 缺盆平 胸口 背平 足平 掌平

肉硬 大便滑泄 並皆不治

林 忌鹽百日外忌魚蝦麪食并房事

六脹滿門

經曰諸腹大皆屬脾真樞曰內虛不足中寒濕冷

中滿宜從權以寒熱系之木抵寒脹多熱脹少

凡傷酒麪厚味膏粱之人食已便卧濕扭之氣不能

施化而致腹脹者扭脹也

因食積腹脹有熱用木香枳椇丸有寒用丁香脾積丸

治脹大法補中行便利小便宜生之冬木為君橘皮為

臣芩門為使以制肝木加朴以消腹脹氣不運加通木

氣下陷加升柴提之血虛加補血藥痰盛加利痰藥

凡腹脹須用善制者朴肥人用利濕蒼朮冬滑之類

瘦人脹是熱用芩連枳朴之類色白人脹氣虛用

冬木冬之類如固有故蓄血而腹脹者用枳紅

如因食積而腹脹者保和丸加木枳魏之類如因外

寒而內熱而腹脹者用蒼朮升葛之類如因怒

而氣脹者用蒼朮芍藥青芍柴及龍薈丸之類

凡腹脹初得是氣脹宜木枳枳青陳朴之類久

久腹脹初得是氣脹宜木枳枳青陳朴之類久

林

則成水脹宜行泄利水之劑  
腹滿按之不痛為虛溫之升之補為要按痛者  
為安下之消之而後補之

脈盛而緊者脹 針難回脈大堅以滿者脹

脈難回關上脈虛即脹內 遲而滑者脹

嚴氏曰脹脈浮者易治虛者難治

大實滿燥實痞閉之氣滯或始因內傷脈洪宜下

脈下利過多或泄痢後或素脾胃虛者補脾行濕

破滯氣湯一名木香化滯散 破滯氣心腹滿悶

甘各一分 檀 藿陳腹子 白朮 白苓 桔各二分

縮 參 青 樵 木 薑 黃 木各四分 右

廣菜漬堅湯 治脹滿內有積塊二便澀滯上氣喘  
促通身虛腫

朴各一分 芩 連 益 草 苳 婦各五分 半七分 廣菜

升 紅 菜各二分 生 甘 柴 澤 麴炒 青 陳各三分

湯加葛四分 右細切作一服加生薑三片水二盞煎七分

溫服忌酒醋濕麵二服後中滿減半止有積塊未  
消再服後葉

半夏厚朴湯 紅 藕 木各半 木 青各二分 菜

乾 生 姜 連各一分 桂 蒼 白 苓 澤 柴 陳

生 苓 草 薏 生 甘各三分 核 婦 栝 赤 苓 升各四分

麴炒六分 朴各一分 半一分 桃七筒去皮 吳 布 如 渴 加 葛三分

右細切作一服水三盞煎至一盞稍煎服之此葉二貼後  
後前證又減一半却於前葉中加減服之

中滿分消丸 治中滿鼓脹氣脹水脹熱脹

苓 去 打 細 切 兩 升 連 實 麴炒 半湯泡七次去 木

薑 黃 參各二分 甘 苓 赤 苓各一分 乾 生 姜 白 苓

縮各二分 朴各五分 知 而 炒 澤 陳去白各三分 右為末煮

餅丸如梧桐子大每服百丸倍煎白湯或淡薑湯下

木香順氣湯 治濁氣在上則生胸脹

木 草 薏各三分 朴四分 青 陳 益 苓 乾 生 姜

澤 辛 萊各二分 婦 蒼各五分 升 柴各一分 木一錢 右水

紫蘘子湯 治憂慮過度心脈脹滿喘促腸鳴二便不利脈虛而緊市見

大異香散 治失飢傷飽痞向停酸食不能為食

食名白散 脹積 菽 青陳去白 半 菴 桔 益 枳炒 芍 炒各一 甘各半 右分二貼 姜三片 棗一

肝肝飲子 治志怒太甚心腹脹滿兩脇妨悶頭眩逆

風枝枳 枳 芍 枳各一 木 冬 枳 歸而洗 芎 陳各八 甘各四 右分二貼 加姜三片

溫白丸 治積癥大如心腹脹滿及反胃吐逆方見水腫門

木香白氣散 治虛弱飲食膨脹

木 芍 枳 棗 枳 炒 茵 炒 陳 縮炒各二 右分咀分二貼 水二鍾 姜三片 棗一枚 煎八分 溫服

沉香散 治腹脹喘急睡卧不安

大正氣散 治脾胃虛寒外為風寒暑濕所傷

心腹脹滿

朴 姜 剉 菴 半 陳 枳各二 枳 枳 姜腹各一 甘各半 右分二貼 入姜三片 棗二枚

參香散 治而氣脾虛作脹

參 桂 可各三 半 枳 實 陳 桑 青 門 腹各五 蘘子 莎 苓各一 木四 右加姜棗

木通散 治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便不利或浮腫

蘘梗 通 陳去白 甘各一 右加姜棗 灯心 草 苳 苳 湯 治腹中虛脹

澤 一 分 木 三 分 麩 四 分 半 實炒 草 苳 益 甘各 青 陳各六 苓 沛各七 右 拿冬加香三七分春夏止服正棗

雞屎醴 治鼓脹 雄 鷄 矢臘月內取 芎研末各 右 和 白 酒 煮 麵 糊 丸 溫 酒 下 一 方 治 鼓 脹 心 腹 痞 滿 大 黃 枳 雞 屎乾 等 分 為 末 每 服 一 錢 生 姜 三 片 水 煎 食 後 臨 卧 服 治 鼓 脹 身 軀 重 瘦 多 渴 煩 悶 馬 鞭 草 細 剉 曝 乾 勻 令 見 大 以 酒 或 水 煎 至 味 出 去 滓 溫 服 以 六 月 中 旬

雷鳴時抹有功

治腹滿不能服藥生毒如指太綿累未熱內下部冷即易

灸法

脾俞灸年壯 肝俞灸百壯

分水灸百壯 治腹脹遠胸結痛

三焦俞 治腹滿腰痛吐逆下便利去肌瘦少氣

上脘中脘下脘章門三里脾俞且灸

七積聚門

精陰故始有刺痛有部聚陽故始無根痛無定

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形在右為食積

在左為死血在中為痰飲

婦人腹中有塊多屬死血

癥者腹中堅硬按之應手如地

瘕者中急硬急取急散急帶未及癥

脈未細而附骨者積也在左積在左在右積在右

痞塊在皮裡膜外須用補藥香附同用薑三陳加

補氣須斷厚味

瓦礫 穀能消血塊次消痰

雌婦血塊雞服峻劑 醋煮 桃 木 海粉 醋煮

右為末神麩糊丸

婦人死血食積痰飲成塊在兩脇雷鳴身熱

連 三兩半 一兩以吳茱 中四同炒玉菴 菜 一兩半 芎 藭 梳

積 莖 醋煮 麥 麩 批 各五斤 荷 童便浸 查 各一兩 右為

朱熈餅丸姜湯下

散取冰湯治九氣精取心腹痛及腰膝二便不利

半栴歸分陳香五皮米桂苓各一分

附炮芎各五分枳麩炒朴姜切萊湯浸去梗焙乾

太而并溫葶葶半不或右作一服加姜三片

助氣丸治氣積三焦痞閉

枳炮莪炮荳白青陳並去木各十栴各十枳木

右為末糊丸煎水下

大七氣湯治積聚隨氣上行心脈痛小脈脹滿

麥陳枳莪步枳各一桔桂薤甘青各三分

導氣枳莪丸治氣結心痞痛

枳麩炒通炒青陳並去桑炒萊炒白丑炒

黑丑炒莪煨苗炒枳炮右各等分為末姜汁調

麩者糊丸如桐子太每服三十九煎橘皮湯下

木香枳椇丸治氣積方見氣門

勝紅丸治脾積氣滯胸滿氣促酒積食積

陳青枳莪二味並

良炒姜炮苧炒右為

手醋糊丸姜湯下

流氣丸治積聚癖塊皆寒氣客腸胃間久而成

木苗炒橘紅薑青去白蘿炒莪炮枳破

麩炒枳麩炒葶澄茹縮蘗炒辛炒右

為末糊丸如桐子太每服五十九嚼白豆豉一枚白湯下食後

香枳丸治五積疝瘕癖積癥塊

木丁各五枳對酒浸枳麩炒莪對一姜皮又豆三十粒

青練肉對炒苗炒右為末醋糊丸鹽酒送下

醋煮三積丸治諸積遠年日近皆効

芎二西醋煮微枳四面醋煮微太手西醋浸炒右為

手糊丸如桐子太每服三十九溫水下

三積丸化積取去未麩五穀等積

陳倉米一西巴三五枚去土陳枳二西縮蘗

木二右為末醋糊丸姜湯下

保母丸治癥積心腹內結如拳痛

保母丸治癥積心腹內結如拳痛

保母丸治癥積心腹內結如拳痛

大三兩新中浸一宿 薑 大附子 去皮 鱉魚 一兩半 煎 一伏時 煮 右

為末用三年米醋一升先煮去四五合後和藥丸如桐子大

每服二十九丸空心醋湯或米飲下取積如魚腸膿血青泥而下

麴蘗丸 治酒癖脹滿不食眩助痛

麴 炒 蘗 炒 連 五斤到同巴豆 右為末沸湯搜丸薑湯下

醉御寶散 治酒傷積 脾胃散加丁縮蘗麴或為

蘗散亦可 並用薑棗鹽煎服

解積丸 治食積飲食減少黃腹脹亦治茶積 一名茶積丸

倉米 半升巴豆七粒 青 陳 去白各二兩 右為末醋及薑湯下

魚鱗積 香蘗散 多加生薑陳皮煎服

采萊積 脾胃散加丁香射香鹽湯煎服

治茶積 膏苓 升 為末砂糖水調服

食魚鱗及生肉不化或癰搗馬鞭草汁飲一升生薑亦可

灸法 治卒厥亡心脈滿數絕此為奪脈氣即急搗

手足頻易之次灸氣海 百壯 又關元 百壯 期門 百壯 章門 百壯

中極 五十壯 又冷世利癰癥灸天樞 百壯 胃脘 百壯

嘔吐門 附吞酸

丹溪活套云胃中有熱膈中有痰作吐清水吞酸等證

二陳加薑炒連振蒼芎苳縮麴查少加木香行滯氣

聖善煎服久病虛者加炙木香胃寒者加益草荳蔻桂

類去連振甚者加丁附 脹痛脾痛右關弦吐不已此

木來土之分也本方加參朮升柴青芎苳縮麴

如常惡心吐清水心胃作痛得食則暫止飢則甚者此

胃中有蠱也本方加練史君煎服或用黑錫炒灰楨榔

末等分米飲調下吐虫而吐用之効

久病吐者胃氣虛不納穀也生薑參苓木香

丸痞滿短氣而吐宜補中氣用調中益氣湯

凡吐者切不可下送之故也

夏月吐不止五苓散加薑汁入湯調服

痰飲為重或多食生冷脾胃不和致吐惡心二陳湯

加丁香烏梅生薑心下痞痛加草薤

痰熱惡心吐氣盛者導痰湯加縮薑炒連竹茹



藿香世胃散 治胃氣虛弱不能飲食時嘔吐惡心  
藿香 參 陳 各二 丁 半 石水煎

和中桔梗湯 治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪  
桔本 各一 半 陳 去白 實 麩炒 白苓 朴 每炒各 一 右作

一服水煎去粗調林香散二錢空心服  
木香散 木 枳 等分 為末 煎茶調服

藿香世胃散 治內傷飲食頃塞嘔吐不已  
藿 朴 每割 陳 各一 不 甘 各三 縮 麩 每炒各 半 右加姜末

附治中湯 治胃傷寒冷物脹痛嘔噦不止  
參 五分 木 姜 陳 青 丁 各一 不 甘 各三 附 二 不 右加姜末

丁香 柴 升 歸 身 陳 各 半 萊 草 葱 參

蒼 各一 苧 二 不 栝 二 分 右  
茯苓 半 真 湯 治脾胃虛弱有痰惡心致吐風邪羈

絆於脾胃向當先實脾去  
木 苓 半 麩 各一 橘 紅 天 麻 各 半 藜 麩 炒 黃 色 二 右加姜

紫沉丸 治中焦吐食由積與寒氣  
半 烏 梅 肉 丁 栝 各二 代 赫 石 三 杏 玉 皮 末 另 研 沉 木

木 各一 縮 三 不 陳 五 不 巴 豆 霜 另 研 白 菴 各 半 右 為

末入巴霜和勻醋麩糊丸姜湯下  
木香白朮散 治中焦嘔吐食腹中痛先服去積

某次用此藥和其氣  
木 丁 各一 半 一 兩 木 苓 各五 栝 二 不 寸 各四 右 為 末

用芍藥乳姜煎湯調服  
溫白丸 治下焦吐朝食暮食朝吐大便不通 市見水腫口

區 陳 香 散 治七情傷感氣鬱於中痞門嘔吐不食  
半 藿 木 木 各二 白 苓 栝 炒 參 枳 各 半 桂 甘 各 一 西

右每服七不姜三片棗二枚  
加味平胃散 治因食前各酸 本方加炒麩炒芽姜末 煎

吐清水用蒼 陳 壁 下 苓 滑 白 木 陳 皮 煎 服  
麩 木 丸 治中脘宿食留飲心痛吐清水

麩 炒 三 蒼 朱 肉 浸 一 兩 半 縮 陳 去 白 各 一 西 右 為 末 姜 汁 別 煮

神效糊丸善湯送下

人參為散 治脾胃不和停積痰飲嘔吐痰水

參<sub>四兩</sub> 青<sub>棧</sub> 煨<sub>各</sub> 姜<sub>炮</sub> 丁<sub>皮</sub> 各<sub>六兩</sub> 苓<sub>各</sub> 苓<sub>各</sub> 芍<sub>各</sub> 甘草<sub>十</sub> 右加姜連

八味理中丸 治脾胃虛寒飲食不化吐酸痞悶或腸鳴泄

縮<sub>善</sub> 藜<sub>各二</sub> 白<sub>苓</sub> 麴<sub>炒</sub> 參<sub>各一</sub> 木<sub>四兩</sub> 甘<sub>各一</sub> 右

為末煉蜜丸善湯嚼下或加半夏一兩為末入鹽煎服亦可

甘<sub>冬</sub> 棧<sub>各二</sub> 右為末鹽湯送下

人參丁香散 治脾胃虛弱停痰留飲脹噎問

天<sub>酸</sub> 不<sub>食</sub> 白<sub>芍</sub> 歸<sub>丁</sub> 丁<sub>皮</sub> 山<sub>萸</sub> 炮<sub>各</sub> 苓<sub>各</sub> 芍<sub>各</sub> 木

甘<sub>冬</sub> 桂<sub>枝</sub> 我<sub>冬</sub> 各<sub>二</sub> 右加姜

九噎膈門 附及胃

膈噎及胃大率以血液乾槁其或咽喉窒塞食不

能下其槁在吸門或食下則胃脘當心而痛須臾

吐出食出痛止其槁在贛門此皆上焦之膈噎也

或食物可下良久復出其槁在肅門此中焦之膈噎也

或或朝食暮吐暮食朝吐其槁在肅門大小腸之

間此下焦之膈噎也

丹溪曰大率傷血虛氣虛有痰

氣虛脈緩而無力血虛脈數而無力痰寸關脈沉

或伏而大氣滯結者寸關沉而滿

又曰脈滿而少血不足大而弱氣不足

屎如羊屎者不治<sub>大腸無</sub> 年高者不治<sub>年五十餘</sub>

氣血俱虛者口中多出沫但不出者必死

童便非計類仍不可缺飲酒人本方加砂糖

如朝食暮吐暮食朝吐或食下須臾即吐者此胃可

容受而脾不能傳送也或大小腸秘結不通食返而

上奔也本方加酒芍大黃桃仁類潤之脾不磨者

本方多加藥麩神麩類如氣團肥白人者本方

合四君亦加竹瀝姜汁因七情鬱結成氣噎者本方

加香附撫芎木樨等類

瓜蒌實丸治膈噎胸膈痞滿做背脹喘急妨悶

葶藶炒半桔炒右為末姜汁米糊丸姜湯送下

人參利膈丸治膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿

木樨各七參歸藿甘實炒太而朴善

右為末滴水丸溫水下

祖傳開腸膏治膈噎大便燥結飲食良久復出者

新取威靈仙四兩搗付四生薑四兩搗汁兩由二兩白砂蜜四兩煎

右四味入銀石器內慢火煎候如餲時食一料兼食

治噎膈久不愈者隔年炊飯乳右一味以急流順水

煎煮糜爛取濃汁時時食待能食後以調脾進食

生血順氣氣調治而安

沉香開膈散治膈噎痞滿嘔吐眩刺痛脇肋脹

沉香各半木白芍炒藿中青陳各二甘炒右各

膈氣散治喜怒無時飲食不節積滯在胸上痰嗽噎塞

參苓桂枳甘各麩炒藜炒枳煨木訂陳煨

和腹脹滿同加每七片塩少許水煎三五沸連祖服

五噎散治噎食不下胸背刺痛痰涎俱出

參苓各枳各木各陳各桂各木各陳各枳各

麩各木各枳各右各二各姜五片棗二枚

嘉禾散治脾胃不和膈噎痞悶氣逆生痰飲食不進

枳炒丁香炒白芍炒薑炒丁炒白芍炒參炒木炒桑炒

沉香炒木樨炒青炒藜炒仲炒隨風子炒

斛炒腹子炒陳炒木炒甘炒右炒

每服三錢姜三片棗二枚煎服五噎入乳柿帶一枚  
膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚

林 漢防已散 治五噎 已一不桂一不細一不陳香各一不

羚羊角屑一不 蘊一不 右分二貼姜五片水煎

一方羚羊角屑米飲下亦以角磨噎上良

灸法 膏肓灸至百壯 臆中灸下壯 三里灸三七壯

十秘結

傳

丹溪曰有虛有風有濕有公有津液不足者有寒者有  
氣結者不可例用利藥

意

久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利  
邪入裏則胃有燥熱三焦伏熱則津液中乾此大腸挾熱也  
虛人臟寒而血脉枯老人腸寒而氣道塞此大腸挾冷然也

能飲食小便赤實秘不能飲食小便清而厚秘

吐瀉後腸胃虛脹熱多者為熱結

肺受風邪傳入腸中為風結宜麻仁丸

年老氣弱津液不足或產後亡津液而結宜地黃丸

大便秘小便數則為脾約宜養血潤燥

脈象氣不利者四物加枳椇桃紅

傳

潤腸丸治脾胃中伏太便秘閉或氣燥閉塞不通  
全不食食及風結血閉皆能治

批去厚 麻仁云云各 枳椇而臣 太各 養各 右批麻別研如

汲其餘為末煉蜜為丸如桐子太每服三五丸空心白湯下

如風濕而大便不行加皂角煨去 秦艽

麻仁丸 治便秘風秘脾約 麻仁 柳李枳 麩各五

太山煨 山風各七 右煉蜜丸白湯下

丹滌方 治大腸虛秘而熱

白芍二兩 陳生地一兩 甘草二錢 右為末粥丸白湯下

世宣丸 治風氣結聚宿飲不消心脈脹滿大便秘不便時時

柴膏麩炒 訶皮木 桃五皮末 甘草多 太五兩 右煉蜜丸

如桐子太每服二十丸米飲下食後增至四五十丸宜利為度

厚朴湯 治胃虛而秘者不能飲食米便清利

朴剉 木四兩 陳三錢 半二錢 實麩炒 右加毒

解約丸 麻仁一兩 生絹袋盛 右湯連袋泡浸湯冷入井

朴剉 芍各三 太四兩 杏一兩 右煉蜜丸溫水下

通幽湯 治幽門不通噎塞不便燥渴氣不得下

煨身桃升 生地各半 熟地各半 紅甘一分 右水煎去粗

調糝末升 食前相煎服

潤腸湯 升生 熟地各二 煨身桃 太環 甘批 麻紅 右

升陽浮熱湯 治膈噎不通逆氣裡急大便不行

青槐子各二 生地熟地 枳各三 煨身甘 梢各四 蒼升 升各七

或一 桃十 去皮右

治血潤燥丸 治風秘血秘常結

煨身桃 風三 太酒 煨各一 皂仁煨 桃二 五三 麻三

右煉蜜丸如桐子太每服五十九丸白湯下三兩服後以麻子仁煮

爾食此 凡菜 雄盛 紙包 封母 令見 凡

潤腸丸 治血燥通大便 麻仁 煨身桃 枳各分 煉蜜丸

積穀丸 治三焦約三便不通穀氣不得下行

枳二 西陳 二西 枳半 西木 二黑 五四 西半 生半 砂右 煉蜜丸下

并金丸 治臟腑壅滯氣結或至積心脈痛瘡疥積熱便結

太十 西木 二右 為末 醋糊 丸如桐子太每服三十九丸白湯下

皂角丸 治大腸有風大便閉結老人虛人宜服

皂子 枳各分 為末 煉蜜丸或飯飲丸亦可米飲下

潤腸湯 治大便閉澀連日不通

麻仁二 西半 細研 水沒 應取 濃汁 脂麻 半五 西裏 炒研 水沒 應取 濃汁 批各 砂半 升各 西

潤腸湯 治大便閉澀連日不通

麻仁二 西半 細研 水沒 應取 濃汁 脂麻 半五 西裏 炒研 水沒 應取 濃汁 批各 砂半 升各 西

潤腸湯 治大便閉澀連日不通

麻仁二 西半 細研 水沒 應取 濃汁 脂麻 半五 西裏 炒研 水沒 應取 濃汁 批各 砂半 升各 西

右入塩少許同煎糖煎至稠可代茶飲以利為度

小通風散治虛人直要悲傷肝秘結或燥葉太過

陳去白嫩紫種葉枳 炒去毒 通去毒 右水煎

藏靈仙治老人津液不能内潤氣後不能運導而秘結

藏莖蜜炙 右煉蜜丸如桐子大每服七丸茶飲下

三和散治氣結心腹痛同大便秘法方見氣門

蜜煎導 虛贏人服茶不得通者用蜜四兩内銅器微

火煎稍凝似飴 攪入血令焦 捻作挺子 令頭銳大如指長五

時急作冷則硬 内穀道中以手急抱款 大便時乃去意為

用蜜熬入皂角末少許作兌 以道導之冷秘生 皂角亦好

治二便不通用白礬末令 患人仰卧滿胸中以新汲水滴

之覺冷透腋内即自然通

大便不通大田螺三五枚以塩一匙和搗置脐下寸三分以帛

二便不通連根葱二枚帶土不洗生薑一塊法取 二十粒以

一匙同研作餅烘熱掩脐中以帛扎定良久氣通自下

度大便不通用皂角燒烟薰即通

土淋病門 附轉胞胞痺閉格

傳 原其為病之由得膏梁之味或燒酒炙肉之類許 過

感發或用心太過房勞無節以心腎不交清陽不升濁

陰不降而成天地不交不 治

渴而小便不利者按 在上焦氣分肺主宜荅澤瑠

燈通草車荅甘菊蓄類

不渴而小便不利者按 在下焦血分腎膀胱主宜

下焦無血小便澀數而黃者四物加栝知膝甘菊

老人氣虛而小便不通四物加荅參吞滋腎丸

因許執成淋不通用赤荅荅車澤瑠桂滑通甘指

氣虛者加芪木淋痛加栝生地黃月煎調益元散

腎虛極而淋者當補腎精而利小便

淋病諸菜宜加牛膝傳 牛膝搗碎不食宜斟酌

治五淋赤芍二兩按 水煎空心服

參荅琥珀湯 治淋莖中痛相引膝下不可忍為

參荅各 練去 甘稍生 延各 瓊各 柴各 歸各 尾各 澤各 右各

十枚

Kitano Memorial Medical Library

八

琥珀散治五淋 滑瓊各二 通淋各二 木鬱金各二 扁蓄各二  
右分二貼等分葉同煎服

淡竹葉湯治諸淋 竹葉 甘瓊 赤白豆 車各等分

右水煎濃湯代熟水服甚妙

冷淋生附湯治冷淋小便秘澀數中痛

附各半 滑各半 瞿各半 通各半 右加姜燈蜜

八味丸治冷淋

牡白苓澤各三 熟地各四 山茱由 山茱各四 附各二 滑各二 桂各二

右煉蜜丸如桐子太每服五十九丸空心溫酒下

熟淋八正散治熱淋血淋癰閉秘結

車 瞿 甘 通 太各等分 右入燈心煎

石障散治熱淋多因腎氣不足帝供則發

葶各一 通各一 甘 歸 王不留行 滑 木 瞿 赤芍

右為末每服二不煎小麥湯調食前日三服

立効散治熱結淋閉作痛

甘 枳 拖各一 瞿各一 右作一服 薑 葱 燈 根

通甘生地各等分 入竹葉煎

通甘生地各等分 入竹葉煎

大府丹治證同前 苓 通各一 生地各二 右煉蜜丸木通 湯下

清肺飲子治渴而小便閉澀扭在上焦氣分

燈一分 通草二分 澤 瞿 瓊 葶 通各七 車炒

苓 猪各一 右水煎

核腎丸治不渴而小便閉扭在下焦血分

栢酒洗 知酒洗焙 桂炒 右熟水丸白湯下去後燈湯下

石淋石燕圓治小便澀痛不可忍出沙石而後方通

石燕洗紅水淨 滑 葶各等分 瞿各等分 右麵糊丸如桐子

太每服五十九丸煎燈煎湯下日三服

氣淋沉香散治五內鬱結氣不舒行小腹脹尿不通

石葶散內去木明佳通加陳為末大麥煎湯調服

血淋小薊飲子治下焦結熱血成淋

生地 小薊根 通草 滑 拖 蒲 藕 節 甘

竹葉 歸各五 右水煎

髮灰散 治血淋 亂髮 疔疔 痛 石醋湯調空心服

又治婦人轉胎 不尿 男子尿血 皆效

加味五苓散 治血淋 加辰砂末 煇心煎湯調服

一方 治血淋 膠 麩 赤苓 滑澤 西車 右

膏淋 五淋散 治諸淋 或如豆汁 或尿血 如膏

赤苓 赤芍 枳 甘草 右煎服

鹿角霜丸 治淋閉 黃赤如膏 鹿角霜 白苓 枳石

石為末 麩糊丸 如桐子 太每服五十九丸 米湯或白湯空心服

流淋 地膚子湯 治下焦結熱 小便赤 莖中痛 出五

膚 八分 知苓 楮膠 實 升 通草 苓

海藻 各九 右合煮

茯苓調血湯 治酒麵過度 房室勞傷 小便出血

赤苓 赤芍 芍 半 前柴 青 枳 麩

桔 桑 礬 甘 茅 右姜 蜜 少許

鹿角膠丸 治房室傷 損小便 尿血

鹿角膠 油髮灰 沒藥 為末 茅根煎汁 打糊丸 鹽湯下

地黃丸 治腎虛 便淋 澀及婦人子淋 八味丸 玉附桂

轉胎 髮灰散 治男女轉胎 不尿 方在右

八味丸 治腎虛 便閉 澀及下元冷 胞轉 不得小便 方在右

有胞系 轉底 小便不通 者丸強 忍尿 急 疾 走 飽食 忍尿

飽食 走馬 忍尿 入房 水氣上逆 迫於胞 故屈底 而不舒 張也

忍小便 久致 胞轉 自取 瓜甲 燒服

又以蒲黃 裹患人 腎令 動至 地三度 即通

茯苓丸 治胞痺 小便內痛

赤苓 風 細木 附 淨 桂 天花 菴 膝 卷 芍

甘 生地 山 菜 山 菜 獨 半 右 蜜 丸 溫 酒 下

腎瀝湯 治胞痺 小腹 急 便不利 門通 桔 桑

仲 炒 厚 屑 五 加 赤 芍 右 入 羊 腎 竹 瀝 少 許

閉 檢 脉 而 下 俱 盛 其 證 嘔 逆 而 小 便 不 通 者 是 也 用

陳 湯 探 而 吐 吐 中 便 有 降

有 氣 虛 不 運 者 補 中 益 氣 加 枳 櫛 使 滿 氣 升 而 濁 氣 降 也

吐 逆 而 小 便 不 利 者 急 灸 氣 海 天 樞 各 三 七 壯 其 吐 止 然 後



以益元散等利小便

祖傳秘方 治因格吐逆小便不通 藿香平胃散 合五苓散

加姜末煎服立効 藿香平胃散見吧吐門 五苓散見傷寒門

鐵服丸 治大小便不通神効

大皂角 煨存性 煉蜜丸如桐子太七丸白湯下

治卒泄牛尾燒存性每服二不空心白湯服

治淋濁 百二 廿二粒 煎去粗末入滑石末一不空心服

治石淋 髮灰為末每服一不空心并水調服

小便不通 炒鹽煎熱小服數日即通

多淋 治以炒鹽填滿臍中 以小火燒去其汁之効 或灸三陰交

十二閉瀉門 附遺尿

丹溪曰赤白濁乃胃中痰積下流滲火膀胱用二陳加升

柴風之類以提之 肥白令屬濕熱加三木砂栢之類或有

扶寒者本方加砂乾等桂甚者加附 氣虛者本方加參

芪本或加附赤者多血而虛瘦弱之人得之白濁加酒知酒栢

煎湯送下 珠珀粉丸 赤白濁 腹痛疼痛不可忍者宜作

寒治宜酒煎當歸丸

珠珀粉丸 治精滑白濁等證

栢 炒 蛤 各一 珠 三四 右為末水和丸如桐子太每服二百丸溫酒下

酒煎當歸丸 苗 五不 黑附 原 良 各七 歸 二兩 右四味以好酒

一升半煮至酒盡焙乾 炙甘練 半 丁 各五 木 升 各一

柴 二不 炒黃鹽 全蝎 各三 延 四不 右子前四味同末酒

煮麩糊丸如桐子太每服五十九丸空心淡醋湯下

單解分消飲 治下焦虛寒小便白濁頻數或如膏糊

葛烏 益薊 白苓 各一 甘栢 半七 右作一服入鹽一錢煎

清心蓮子飲 治心中發熱身思抑鬱小便赤白濁

芥門地骨車各一 甘苓各一 白苓各一 蓮各一 參各一

右水煎熱加柴荷各一

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澀遂成赤濁方見淋門

加味五苓散 治赤濁本方加蒼蓮水煎

遠志丸 治赤濁如神 遠甘草水煎 茯神去心半斤 益各二

右酒糊丸末湯下

治白濁出髓條酸炒木參苓破炒益苗

蛎煨 青鹽各等 右酒糊丸酒或米飲下

桑螵蛸散 治男子小便數如米泔高羸瘦恍惚遺尿

葛蘆炒 龍骨煨 桑螵鹽水 遠甘草水 參煨 酒洗

神效魚醋炙 右為末臨臥人參湯調二錢服

五子丸 治小便頻數時有白濁

菟酒蒸 韭炒 益炒 蛇去皮炒 右酒糊丸末飲鹽湯任

秘真丸 治遺尿失禁 龍骨二兩 訂大者五 縮五不 辰三不

右米糊丸空心溫酒下臨臥熟水下

雞腔脰一具并腸洗焙乾 右為末空心溫酒調服

十三遺精門

傳 夫遺精者夢多鬼交而泄遺或隨溺而出白精滑

思想無窮所願不遂而得者宜安神降火

因房勞致虛而得者宜滋水藏以復真陰

夢遺主熱精滑主濕熱

珍珠粉丸 治精滑方見尿濁門

藏溫勝湯 治因思想而得精滑者方見傷 去竹茹加參

遠蓮 酸神煎服

妙香散 治心虛遺精白濁

苓神膏各冬 遠各二 參各三 桂各三 甘各三 山各三 木各三

辰不腐 右為末每服二錢溫酒調服

秘真丸 治因思想無窮所願不遂為白濁隨便而下或

夢多淫人通泄方見尿 不可多服大秘也 如夢遺與夢交茶半匙

三仙丸 治夢泄各二 烏各一 石為末用山茱

二兩為糊丸如梧子大以硃砂為衣每服五十九空心臨臥溫酒

三白丸 治遺精白濁 龍骨煨 蛎煨 鹿角霜各二 右為

手麴糊凡如桐子大每服五十九空溫酒下

鎖陽丹 治遺精 桑螵三兩 龍骨一兩 白朮二兩 有附子味

右糯米糊丸空心茯苓鹽煎湯送下

博金散 治脫證自泄遺精

參龍骨各一兩 白朮各二兩 右為末空心臨卧米飲調下

金鎖丹 治男婦精夢交遺泄 龍骨取 遠志各三兩 蛎殼各

神白朮各二兩 右為末酒糊丸空心鹽湯或酒下

草湯 治真思過度遺精白濁虛煩不安

草 為 師通變 門酸 解五根各 參各 甘各 石各

一人夢精日夜常遺作心不足治而不驗又作腎虛補

無驗同腦冷不昏白腦冷即子配寒 兼脈益心腎其

而愈

十四怔忡驚悸門 附健忘

夫怔忡驚悸或因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令

子虛因而心血為不足之或遇事 亦思無則

心君亦為不寧

怔忡者心中惕然動搖而不得安靜無時而作者是也

驚悸者昏然而跳躍驚動而有致厥之狀有時而健

是也二證之因亦有清痰積飲留結心胞胃口而為之

不可固執為心虛而治宜以脈證參究

丹溪曰有慮使動屬虛時作時止者痰因火動

瘦人多是血少肥人只是痰多時覺心跳者亦是血虛

健忘者由直愛思過度損其心胞以致神舍不清過多

七忘病在心脾

精神短少者有痰者令健忘

養心湯 治肥人因痰太而心中悸動

菖神半芎各半 遠桂 栝子酸炒 五味 參各二分

甘四分 右作一服薑三片棗一枚如停水加神極

定志丸 治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸

參 白朮各三 遠志各二 石煉蜜丸如桐子大每服五十九丸參湯下

朱桂丸 治怔忡驚悸

神二兩 石二兩 石煉餅丸如桐子大每服五十九丸參湯下

八物定志丸 平補心氣鎮驚除腦間痰熱

遠志五兩 芎藭二兩 神各一 白朮各一 木各一 西各一 參各二 牛黃各一

煉蜜丸如桐子大每服二十九丸白湯下

祖傳秘方 治憂思傷心驚悸

歸身兩法 生地兩法 遠志各五 芎藭各九 連各二 牛黃一錢

辰二兩 金箔十五片 右為末猪心血丸如黍米大每服為衣每服

五十九煎燈心湯下

補氣湯 治氣虛怔忡脈浮而軟

參二分 芎藭各一 門各一 桔各一 右加姜

丹溪 治勞役大慮心跳者

辰白芍 側柏各三 歸身各一 芎藭各一 陳甘各一 連各一 右猪心血丸

益榮湯 治心氣虛怔忡恍惚夜多不寐便渾濁

歸身各一 草各一 酸各一 枳子各一 神各一 紫石莖各一 木各一 右加姜

參各一 石各一 入各一 姜各一

茯苓飲子 治痰飲蓄於心胃怔忡不記市見痰門

十四夜丸 治心氣虛怔忡驚揚

枳子遠志 酸枳子 紫石莖枳子 熟地枳子 歸身枳子 參枳子 桂枝枳子

白朮 白茯苓 膠枳子 龍齒枳子 辰枳子 右煉蜜丸每湯下

治思慮過度勞傷心脾怔忡

神木 參木 甘木 右加姜

平補鎮心丹 治心氣不足怔忡多無儲層崖

白朮味車 神門 桂各二 遠志各二 天門各二 山各二 右煉蜜丸每湯下

酸五兩 熟地二兩 參五兩 龍齒二兩 辰二兩 右煉蜜丸每湯下

辰砂妙香散 治心氣不足恍惚少睡市見遺精門

溫膽湯 治心虛膽怯易驚夜夢不祥市見傷寒門

一方加酸炒 遠志炒 熟地炒

遠志丸 治因事有所大驚神魂不安驚悸夢寐不祥

遠志各一 高各一 神各一 白朮各一 參各一 龍齒各一 煉蜜丸辰砂為衣 臨睡湯下

四味茯苓湯 治痰迷心胞健忘

半陳參<sup>各一</sup> 白苓<sup>各一</sup> 益母<sup>各一</sup> 石菖<sup>各一</sup> 烏梅<sup>各一</sup>

二丹丸<sup>一名二</sup> 治健忘安神和血 方見中

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

木神<sup>各一</sup> 酸<sup>各一</sup> 龍眼肉<sup>各一</sup> 冬<sup>各一</sup> 木<sup>各一</sup> 甘<sup>各一</sup>

石分二貼入姜一片棗一枚

珠砂安神丸 治心神亂怔忡 方見內傷門

人過勞心思慮損傷精神眩昏氣短發昏怪煩熱

參<sup>一分</sup> 味<sup>十五</sup> 歸<sup>酒浸</sup> 門<sup>白芍</sup> 神<sup>酸</sup> 梳<sup>炒</sup>

生地<sup>酒洗</sup> 甘<sup>各一</sup> 陳<sup>各一</sup> 芎<sup>各一</sup> 石<sup>各一</sup> 芩<sup>各一</sup>

十五癲癇門

大抵狂為痰火實盛顛為心血不足多求望高處

不得志者有之

癲時作時止癲狂失心妄作經久不愈

癲病獨主于痰因天動之所作也發則旋暈顛倒

眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃乃甦

先身熱刺癢驚啼叫喚而後發癲脈浮者為陽癲

在六腑在肌膚易治

先身冷不驚刺不啼呼而病發時脈沉者為陰癲

癲在五臟在骨髓難治

治法癲宜吐狂宜下顛宜吐神養血煎除痰火

丹溪曰大率扁痰手筋不必分五等大法行痰為主

用連星半菴身痰身太分多少法

神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心

除熱如痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

有扭者用涼茶以清心有痰者必用吐之後用東垣母神

且及平肝之藥青黛紫胡川芎之類母神丸見內傷門

寶鑑龍腦安神丸 治五般顛病高遠近發作無時

神 三兩 參 地骨 甘 門 桑 各二 牙 硝 二 腦 麝 各三分

牛黃 五 辰 犀 犀 犀 三 犀 犀 五 犀 犀 三 犀 犀 五 犀 犀 三 犀 犀 五 犀 犀 三

為衣冬溫水化下夏涼水日進二服每服一丸小兒半丸

鐵氏五色丸 治諸病

硃 半兩 水銀 二 雄 一兩 玳 玳 珠 一兩 鉛 三兩 同 右 麩 糊 丸 如 麻

丸每服三四丸煎金銀薄荷湯下

凡我百白治痰涎為患致顛病狂妄驚悸等證

白 礬 一兩 輕 一字或半 量 虛 實 服 右 用 生 薑 餅 劑 裹 並 煎 去

便入輕粉丸如桐子太每服三十九丸姜湯下小兒如黍米大

妙香丸治時毒傷寒餅潮扭積扭及小兒發驚痲等證

辰 九兩 腦 臟 腐 各五 牛 黃 五 金 箔 九十 巴 二百二十五粒

右煉蜜丸每兩作三十丸米飲下

中黃情心丸 治心氣不足神志不定驚恐頭狂虛煩步健

方見中黃

桃奴丸 治心氣虛怯百扭屢注廳夢驚痲等證

桃 奴 即 桃 木 上 不 落 乳 桃 辰 半兩 桃 仁 十四個 玳 瑁 二 烏 犀 五

珠 三 牛 黃 一 腦 二 腐 一 雄 桃 葉 煮 水 飛 安 息 二 腐

右以安息香同桃仁琥珀熬成膏和諸藥丸陰乳人參湯化下

當歸龍膽丸 治腎水陰虛風熱蘊積驚悸抽搐暗風病

歸 膽 大 梔 子 連 栢 苓 各一 太 使 膏 各半 木 一 腐

半斤 右煉蜜丸姜湯下

寶鑑沉香天麻湯 小兒因恐攪致抽搐涎有聲目多

白 睛 強 項 背 一 時 許 方 醒 後 因 恐 墮 即 發 多 眠 犀 朱 腦

麝 鎮 墜 一 葉 而 此 證 尚 在 脈 沉 沉 而 急 先 灸 兩 膝 各

二十七次服此藥沉益川烏 各二 天 風 半 附 各三 龜 半兩

甘 歸 蚕 各一 榴 四 右 拿 每 前 食 前 服 三 劑 而 愈

烏 巴 丸 治 癩 癩 結 扭 狂 亂 不 避 親 卑 醜 罵

巴 五 烏 梅 五 右 同 研 水 丸 如 桐 子 太 硃 砂 為 衣 三 五 丸 四 五

丸姜湯夜卧吞下通利三五行白粥補之

金 露 圖 治 痰 迷 心 竅 恍惚 狂 言 婦 人 疾 血 上 衝 狂 亂

金 露 圖 治 痰 迷 心 竅 恍惚 狂 言 婦 人 疾 血 上 衝 狂 亂

生地各一 貝各一 巴取二 連各二 桔各一 柴各一 芩各一

某風一名 苴一名 白一名 椒一名 朴一名 枳一名

參一名 甘一名 散一名 苴一名 瓜一名 西一名 芎一名 桂一名 右一名 末一名 蕤一名 糊一名

丸如梧子天每服五丸心中痰患甚湯下心痛酸石榴皮湯下

卒中鬼魅恍惚顛狂灸人中穴又灸兩手足大指甲各艾柱

在手肉中瓜各七壯不止灸十四壯一法合手足大指縛灸

半八羊肉立効

神庭一穴在入前髮際五分灸三壯 主登高而歌角了及張

少衝二穴在手小指內廉灸二壯 主驚風沫出

前頂一穴在入髮際三寸半灸三壯 主小兒驚癇

長強一穴在脊最端灸五壯 主小兒驚癇

晝發灸陽蹻申脈穴在外踝下陷中

夜發灸陰蹻照海穴在內踝下陷中先灸後服藥

十六中惡門 附鬼擊尸厥

病有心虛驚揚如醉如痴如為邪鬼所附或陽明內安

以致登高而歌棄衣而走昏痰大之所為實非妖邪出

丹溪曰血氣者心之神也神既衰之邪因而入理或有

若夫血氣西虛痰迷心竅妨碍升降不得運行以致

十二官各失其職視聽言動皆為虛妄以邪治必死

脈乍疎乍數乍大乍小或促或結皆邪脈也

飛尸卒厥此即中惡也因冒犯不正之氣忽然手足冷

肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯言妄語口噤昏不知

穴頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼擊等症死及全廟

登塚多有此疾以蘇合香丸灌之候甦以調氣散和脾胃

服名調氣脾胃散

中惡之證或暮夜登廁或人所不至之地忽然眼見鬼物

惡氣倒地四肢厥冷握拳鼻口清血手足厥同身移

動即令以圍繞燒火打鼓燒麻掃不蘇不甦醒方可移歸

或到久無人居睡中為鬼物所屬但吃作聲令人叫喚

如不醒不得急診近前驚喚但痛咬足跟并大指中或  
鼻角末吹鼻或椎朱散灌方見救急門

夜夢或被刺或杖打諸般不祥辛九散出血病名鬼擊  
升得地續各半桂一分右為末白湯下

桃奴丸治心氣虛怯夢魘中惡方見癲病門  
蘇合香丸治諸般怪疾方見氣門

治癰死不還者夏末吹入鼻中即醒

祖傳辟邪丹治衝惡怪疾及山谷間狐精為患

冬多神遠鬼箭羽九節菖蒲白朮蒼術各一

桃奴各五雄辰各三七牛黃二小金箔三十或加麝一末

右以桃奴已上諸藥為末入雄辰牛末和勻酒調米糊  
丸如龍眼太金箔為衣臨時以不香湯化下一丸訪邪不

敢近神更以絳囊盛五七丸懸床帳中尤妙

調氣散白蔻丁檀木各一蒼甘各各石鹽湯煎

灸法兩手大指見癲病門  
灸了厥腫中二十人中七壯陰囊下百壯婦人針人中至齒之透

傳 十七頭痛門

頭痛耳鳴九散不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也

心煩頭痛者病在膈中乃濕熱頭痛也如氣上不下

頭痛癲疾者下虛上實也甚則入腎寒濕頭痛也

如頭半寒痛者偏頭痛也者真頭痛者甚則腦疼痛

手足寒至即者死有厥逆頭痛者所犯太寒內至骨髓

髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也

血虛頭痛芎歸為主氣虛頭痛參芪為主氣血俱虛

頭痛調中益氣湯少加芎藭其効如神白朮并夏天

麻湯治痰厥頭痛也情虛者乃風濕熱頭痛也陰陽

附子湯治厥逆頭痛也如濕氣在頭者以苦茶吐之不可  
執方而治先師嘗病頭痛發時面頰青黃暈眩目不數開  
懶言身體沉重元氣致吐禦古曰此厥陰太陰合病名曰風  
痰頭痛以角方玉盡丸治之更灸俠溪即愈是知方者  
伴也法者用也徒執伴而不知用者弊伴用不灸可謂上  
工矣學者其可執之而不知變乎



丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者太多且清痰降火

淺近者名頭痛其痛卒然而至且解散速安深遠者名頭

風其痛作止不常愈解感復發風邪則驅散之痰厥則驅利之

肥人頭痛濕痰生痰瘦人頭痛是熱而芩風

形瘦色弊而頭痛者是血虛且用芎藭芍藥酒柏之類

勞役下虛之人似傷寒發熱汗出而太陽穴痛甚此相火自

下衝上且補中益氣湯加芍藥甚者加知母細

偏頭風在右屬痰偏熱痰蒼耳子煎片茶在左屬風在

血虛風刺奇或去刺奇是頭痛血虛芎藭芍藥酒柏

少陽偏頭痛為多大便秘或可下之

額角上痛為偏頭痛足少陽經也痛久不愈令以喪目

偏痛久不愈服針灸不効為濕氣在頭也似帶一味為

末少許吹鼻中水徐出一寸立夜濕止痛止

偏頭痛連睛痛石膏鼠粘子炒為末茶酒下

雷頭風頭上有赤腫結核或如酸末用針出愈子和以

茶調散吐以神芎丸下後服愈風餅子茶不効宜清痰湯

備

治風濕扭頭痛片茶二兩蒼耳子各五蒼耳子三

細茶右為末生薑一兩搗細和茶末三錢茶清調下

一方無風細有生可酒連芎藭

清空膏治偏正頭痛久不愈及治風濕扭頭痛除血

虛頭痛不效片茶三兩酒連二甘藷各一卷風各一

連酒炒柴七芎五右為末每服二錢茶清調如常服

Kitasato Memorial Medical Library

風天<sup>各半</sup> 犀角<sup>各半</sup> 甘草<sup>各一</sup> 川烏<sup>去皮</sup> 右為末

蒸餅調作餅子如錢樣每用五餅同煎末對茶清下

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏痛鼻塞聲重

芎<sup>留</sup> 荆穗<sup>各二</sup> 羌<sup>各</sup> 芷<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 細<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 二不<sup>各</sup>

右為末每服二錢食後茶清調下

川芎散 治頭目不清利 芎<sup>五</sup> 柴<sup>各</sup> 羌<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 葉

生<sup>各</sup> 升<sup>各</sup> 炙<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 生<sup>各</sup> 地<sup>各</sup> 連<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 片<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 右為末

食後茶清調下

祖傳 治頭風熱痛不可忍 片<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 二酒<sup>各</sup> 梓<sup>各</sup> 濕<sup>各</sup> 炒<sup>各</sup> 再<sup>各</sup> 拌<sup>各</sup> 再

小<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 西<sup>各</sup> 芷<sup>各</sup> 細<sup>各</sup> 茶<sup>各</sup> 芽<sup>各</sup> 荆<sup>各</sup> 穗<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 右為末每

服二錢白湯或茶清調下

清上浮火湯 一少年人於氣海三里節次灸之至年老

成扭厥頭痛喜寒風吹之頭痛即愈

荆穗<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 生<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 葛<sup>各</sup> 艾<sup>各</sup> 歸<sup>各</sup> 身<sup>各</sup> 蒼<sup>各</sup> 細<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 連<sup>各</sup>

生<sup>各</sup> 地<sup>各</sup> 葉<sup>各</sup> 升<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 柏<sup>各</sup> 炙<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 蒼<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 知<sup>各</sup>

酒<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 羌<sup>各</sup> 紫<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 紅<sup>各</sup> 右

治肩核骨痛屬風扭子痰 芷<sup>各</sup> 片<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 右等分為末  
每服二不茶清下

文<sup>各</sup> 方<sup>各</sup> 羌<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 酒<sup>各</sup> 片<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 右煎服

治少壯人氣實有痰或頭暈而重痛立効

大<sup>各</sup> 黃<sup>各</sup> 石<sup>各</sup> 為<sup>各</sup> 末<sup>各</sup> 茶<sup>各</sup> 清<sup>各</sup> 調<sup>各</sup> 下

川芎石膏湯 治風熱上攻頭目昏眩痛同口瘡項濕淋

閉眼生翳膜 芎<sup>各</sup> 梔<sup>各</sup> 荆<sup>各</sup> 歸<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 太<sup>各</sup> 矣<sup>各</sup> 木<sup>各</sup>

菊<sup>各</sup> 膏<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 翹<sup>各</sup> 結<sup>各</sup> 寒<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 滑<sup>各</sup> 右煎服

石水煎食後溫服忌辛辣熱物

厥頭痛治風寒在腦頭痛及傷寒風而頭痛

芎<sup>各</sup> 香<sup>各</sup> 附<sup>各</sup> 羌<sup>各</sup> 蒼<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 菊<sup>各</sup> 細<sup>各</sup> 茵<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup>

甘<sup>各</sup> 西<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 石<sup>各</sup> 為<sup>各</sup> 末<sup>各</sup> 每<sup>各</sup> 服<sup>各</sup> 二<sup>各</sup> 不<sup>各</sup> 食<sup>各</sup> 後<sup>各</sup> 茶<sup>各</sup> 清<sup>各</sup> 調<sup>各</sup> 服

鬼<sup>各</sup> 名<sup>各</sup> 附<sup>各</sup> 子<sup>各</sup> 湯 治冬寒犯腦痛齒痛名曰腦風

麻<sup>各</sup> 里<sup>各</sup> 附<sup>各</sup> 芎<sup>各</sup> 蒼<sup>各</sup> 苓<sup>各</sup> 羌<sup>各</sup> 蒼<sup>各</sup> 風<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup>

升<sup>各</sup> 艾<sup>各</sup> 加<sup>各</sup> 佛<sup>各</sup> 耳<sup>各</sup> 草<sup>各</sup> 右水煎食後溫服

追風散 治諸風上攻頭痛目眩鼻聲重皮膚癢痒肩

角辛引婦人血風及一切頭風 川烏炮 風膏各一 西冬甘

蚕炒去 荆 蝎各五分 芎 藜各五分 右為末茶清調下

煎頭散 治偏正頭疼 芎二兩 香附四兩 右為末茶清調

服。偏頭痛連睛痛加膏鼠粘子炒 為末茶酒任下

三佳丸 治痰厥頭痛 半兩白附手分 為末姜汁浸

蒸餅丸姜湯送下

治痰厥頭痛 烏梅肉十 塩二 水一盞 煎七 全去 粗溫 服

吐即佳或以好茶煎三升煖飲頂更吐半 又飲如此

數過待渴即疾

治頭風腦蓋骨痛 皂角水浸春三夏二浸洗新瓦上

焙為末每一字茶調服以少許搗碎

加味調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其効如神

陳柏兩炒各 升柴各四 參各六 炙甘各六 蒼芎各六 香一

蔓三分 細二分 方有木二分 無柏每無柏有方 淨五

半夏白木天麻湯 治痰厥頭痛眼黑意心煩向上喘心神

顛倒自不開口厥厥冷

栝一分 姜二分 澤 白苓 天麻 芩 蒼各三 麴炒

木各五 藜各七 橘紅各七 右作一服加姜三片水煎

食前稍執服可一服而愈 半夏治痰厥天麻治眼黑

頭旋風虛內作 春甘溫厚太補氣實表止汗 知甘溫

厚太補中益氣 二和 苦甘溫厚太補中 澤苓利水導

便糯皮苦溫益氣調中 麴消食滯胃中滯氣 麥藷

寬中助脾 乾姜辛熱滌中寒 枳苦辛治冬小大在泉

散躁

大陷散 治久新偏正頭痛肝虛血氣衰風毒上攻頭

芎四兩 天二兩 右為末煉蜜丸酒茶任下

二芎餅子 治氣厥頭痛上盛下虛痰飲風寒伏留陽

經偏頭疼連腦巔吐逆惡心頭暈耳聾清頭目化風痰

撫芎 川芎 姜 薑末 蒼木 蒼耳 澤風甘各

右為末姜汁浸餅丸晒乾細嚼茶酒任下

神芎丸 治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫咽膈不利

太生 芎各一 辛各一 滑各四 連 芎 芎各半 右為末滴

取丸如桐子太每服五十丸溫水食後下

愈風餅子 治雷頭風眩暈先吐後服此

芎藭炮名 甘菊 芷 風 細 天麻 羌 荊 苧

多各 右為末餅丸作餅子細嚼或茶或湯下

清震湯 治雷頭風頭面疔瘡腫痛寒熱狀如傷寒

升 蒼 各一 荷葉不 石 以 咀 每 服 五 錢 水 煎 玄 祖 溫 服

一方荷葉一箇虎研前葉煎調服亦可

頭風痛天眩風雨先發者 桂 三 兩 為 末 酒 調 傳 頂 上 額 角

頭痛不可忍多是風痰所致 梳 末 和 蜜 湯 傳 古 上 吐 即 止

治頭風痛 大豆三升 炒 乘 熟 投 酒 中 密 封 七 日 溫 服

治頭風熱痛不可忍者 朴 硝 大 黃 為 末 用 深 井 底

泥和作餅子貼兩太陽穴

眉上髮際動脈之外睛下

又作灸童子穴一石太陽

十四經時子齊同外玉牒五分

### 十八心痛門

備

丹溪思痛即胃脘痛頂分久新身犯寒氣口得寒

物而痛於初得時當用溫散溫利之藥若病久則

成疝則成疝若致行溫散溫利寧無助久添病

耶由是多用山梔子為君熟藥為之嚮道治病久後

若惡口不改前非病必再作難治此病魚肉久不食不死

若病方止即吃物必復作必須再服三五服藥後以漸而

少食方可獲全安

致病由多因思口脹好辛酸飲酒食前痔復食

生冷朝傷暮損日積月深自前成積自積成痰久煎

熬血亦亦行痰血相雜妨礙升降故胃脘疼痛吞酸

嘈雜守膈噎及胃之漸者也俗醫不究其源例以辛

香燥熱利治之或以肉太良可痛或方九種心痛皆

在胃脘而不在心有真心痛者大寒犯心君又曰行血衝

心手足青過節者立灸夕灸旦灸

心膈大痛致走腰背發厥吐諸藥不知者以鴉翎探吐

出痰積痰許而痛即止

脉堅實不大便者下之亦可

筋柱骨而痛定者屬虛 仁陳加炒姜和之而愈

平日好扭物或血流於胃口而作痛者桃仁長氣下之

虫痛者必面上有白班唇紅能食時作時止 仁陳加苦

練根

濕痰作痛白螺螄殼去泥砂煨末方寸匕溫酒調下

氣痛者牡蛎粉三錢溫酒調下 再蛎粉子煨炒

痛甚者脉必伏宜溫菜附子之類不可用冬木

一方用海粉佐以香附以芍藥煎湯入姜汁調服

寒業處以鹽置刀頭燒紅淬水中乘熱飲之痰而愈

一方山槿大者七枚炒焦黃水煎入姜汁三匙令熱飲

草薑惡性溫能散滯氣利膈上痰若胃脘因寒而作

痛用之如鼓應桴若濕痰許結成痛者脈多勁若

因煎前而痛者理固不當用此但宜以涼茶煎制如茶

連梳之屬其功尤速末垣臣臣臣臣臣寒熱心痛俱獲

奇功但因煎者不可多服久服恐有積溫成熱之患

草薑惡丸治寒寒積胃痛或因濕熱許結痛亦可劫而

之文治氣弱心痛亦好

草薑 惡小使多 半各一 橘紅菜湯泡 參湯泡 香

蚕 益各八 生甘 炙甘 歸身 青各六 批去皮太 姜黃

柴眼不痛 麩炒各 藜藟炒一 右為末蒸餅丸白湯下

木附湯治寒厥心痛手足逆冷汗出脉微氣弱

方見傷 寒厥 寒厥 暴痛非苟病朝夕發者急當救之

偷痛散治急心胃痛 五火脂去沙 延炒 菘環

石為末醋湯調服

鐵刷湯治心脾積痛婦人血刺氣痛及中酒泄瀉

良對炒 甘對炒 蒼對炒 苗對炒 右為末湯煎服或

熱酒調或煎服亦可

加味七氣湯治七氣病急心版刺痛欲死

半七不 延炒 桂各二 參一不 甘各一 乳七分 右分二服姜

三片棗一枚婦人加歸芍各一

燒脾散 治發生冷瓜菓生菓留中焦心脾冷痛

善朴果 縮麴炒 藜炒 陳良炒各一 甘草各一 石

入鹽少許水煎服又鹽湯點服亦可

訶子散 治心脾冷痛不思又治霍亂吐利

訶煨去 甘煨去 朴製 善炮 果 陳良炒 苓炒 麴炒 藜

右水煎服又鹽少許溫服

參朮散 治虛弱心脾疼 參朮炒 善炮 白豆蔻

縮丁香 陳甘各二 右金貼入善三片 水煎調炒過蚌粉服

手拍散 治脾疼 果延五石汶等分 為末酒或米飲調

白氣散 治證同前半月効此方同氣茶方見中

順氣不香散 治氣不分降吐逆痞胸肋脹滿及婦

人血氣刺痛 方見氣門

祖傳加味枳朮丸 治痰積食積而積茶積肉積在胃脘

而痛及痞滿惡心滿雜噎氣吞酸吐吐脾疼等證

白朮三四 蒼朮煨 實炒 猪藻 麴炒 麴炒 善各一

澤赤苓 芎 連陳壁土 白螺蛸煨各 縮草 藜

苓陳壁土 青 萊炒 乾生薑各五 陳去白 香附米 浸童便

善 朴善製 枳各三 木 甘各二 春酸加萊寒月五不扭

久病扶虛加參扁蓮各五 白吐清水加炒滑二兩 五不

石為末用薄荷葉泡湯浸晚梗末研粉丸清米飲下

白螺殼丸 螺殼煨 滑炒 蒼 星 煨裂 枳 香附童便浸

縮木半青 枳各五 右為末善汁浸蒸餅丸各加等量

倉卒散 治氣自脾腹間急痛脈中冷自汗如洗手足事

急厥冷 枳大者甲九粒 附一枚 右煎溫服

金鈴子散 治熱厥心痛 鈴 延各二 為末溫酒或白湯下

黃黃丸 治大實心痛心胸高起按之愈痛

雄一兩 巴五不 右白麴二兩 研勻水丸如桐子大漿水煮

十二丸煎液以冷漿水內冷飲用浸至冷漿半下丸日

十二丸如得利不可再服宜服

薑棗湯 利後用此去餘邪 薑二兩 苓二兩 右水煎

五積丸 治心脾痛如刺吐酸水不共百草霜一兩 巴十四粒

右飯丸如草水太每服三丸先煎前滾入艾葉一握再

前法粗送下。

香附散 治心脾疼 良砂 香附 砂 等分 為末 鹽湯 煎服

一方加木香 烏朮

一方治心痛 能膽如豆大 和水服

治卒心痛 經年不愈 延 芍 芍 石水煎

化虫丸 治虫心腹痛 方見諸 虫門

一方治虫痛 乳漆 研細 炒 烟 醋糊 及 溫酒 下

自氣散 治九種心疾 棟子肉 延 姜黃 等 為末 酒服

集劫丸 治臟腑虛弱 或多有肥 致 蛇 動 方見諸 虫門

治痰欬 錫底煤 五 鹽 一 研湯 調服

非補鎮心母 治心血不足 時 吐 甚 直 層 崖 方見性 虫門

灸法 治心痛 手中 指端 灸三 壯

十九腹痛門

傳 東垣曰 腹中諸痛 皆由勞役過甚 飲食失節 中

氣不足 寒邪乘虛而入 故卒然而作 大痛 雜智

傷寒中脘痛 太陰也 理中湯 黃耆建中湯 胸膈痛

者 少陰也 四物湯 真武湯 附子湯 小腹痛 厥陰也 重

則 芍藥散 四逆散 則 當歸四逆湯 雜病腹痛

四物苦練湯 酒煮 當歸丸 夏月腹痛 肌熱 惡熱 脈洪

數 黃芩芍藥湯 秋月腹痛 肌寒 惡寒 脈沉 實 桂

枝芍藥湯 四時腹痛 芍藥甘草湯

血虛瘦弱之人 津液枯涸 固傳送失常 胃火燥熱 煎成

結壅 滯於大小腸之間 而作痛 宜以枳實導滯丸 備

急 大黃丸 類 先通其滯 止其痛 然後用四物等生血 潤

燥之劑 以治其本

卒然心腹大痛 欬吐不得 吐欬得不得 厚唇青 厥逆

死在頃刻 此內因食積 外感寒邪 是名乾霍亂 宜急

以鹽湯灌之 而以鴉翎探吐 取涎而愈

食積為患者保和丸枳木丸消之枳實導滯丸亦  
枳實檉丸下之

舟車回腹痛多是血脉凝滯不行必用酒炒白芍甚急  
寒而痛加桂煎熱而痛加枳如腹痛欲以物桂按者屬  
虛用參朮苓桂類不可按者屬實用建中湯加  
大黃或調胃承氣湯加桂枝下之而愈因飲食過傷  
而作痛者必因傷何物如傷生冷硬物者東垣木香見  
枳丸枳積消積丸如枳物者枳實導滯丸凡黃枳木  
丸看強弱用而下之氣虛之人飲食過傷而腹痛  
者宜補浮煎施二陳湯加芍朮麴芽參苓朮類或  
送下前推積等丸以下之腹中常覺有熱而暴痛  
暴止者為積熱調胃承氣湯下之因跌撲損傷而  
作痛者此瘀血桃仁承氣湯抵當湯逐去其血而愈  
如因事損傷或酒後涉水血凝脈痛者承氣湯加桂  
戴氏曰痛甚欲大便去後痛減者食積也綿綿痛而  
無增減者寒也時痛時止者熱也其痛常處而不移者死

因寒氣作痛者小建中加薑桂芍蒼朮香附

因扭而痛者二陳加芫連旋痛甚者加炒姜從之

腹痛不禁下者芍蒼朮苓香附滑加姜煎服

飲食過傷而腹痛者木香檉榔丸下之

小腹實痛用青皮以行其氣

小腹因寒而痛桂枝

小腹鞭滿而痛尿利者蓄血之證尿不利者溺溢之證

腹中水鳴乃大擊動其水二陳加苓連枳

心腹痛不得息脈細小遲者生大而疾者死

腹痛脈及浮大而長者死

臍下忽大痛人中黑色者多死

高良薑湯治因寒心腹大痛良二錢 朴桂各一石

草薤薤湯治臍腹虛脹作痛

澤一石 草薤半石 枳殼 芍 芩 夏 益甘 歸

苓各七 青陳各六 麴四分 木三分 右作一服加姜三片

益胃散治因服寒藥過多腹痛不止



參朴甘白葱 姜黃縮 姜澤 各三分 蒼

陳 各一分 石加姜水煎

厚朴溫中湯 治胃虛寒脹滿疼痛

朴陳 各一分 苓 草薤 甘 木 各半 姜 三分 石加姜

酒煮當歸丸 治小腹疼痛及婦人白帶 方見本

五辛湯 治心腹疼痛 椒 細 桂 姜 茱 芎 芎 芎 芎

可乳地 坤 各一分 一 椀 烏梅 大棗 各十枚 石

小建中湯 治寒氣入脈痛 輕按痛重按愈 脈緊急

桂枝 四分 芍藥 八分 甘草 一分 石 三分 姜 三片 棗 一枚

蠲蔥散 治脾胃虛冷 肢厥助刺痛 胸痞噎逆及外

腎腫痛及女人血氣攻刺 癥瘕一切疼痛

延 七不 蒼 二分 苓 莪 稜 青 各一分 丁皮 縮 楮 各一分

桂 姜 炮各半 甘 各一分 虛寒甚者加茱萸木 各一分 石 三分 煎

入葱白一莖水煎

理中湯 治冷氣心腹疼痛 六脈俱沉 方見傷寒門

草薑薤丸 治客寒起胃痛者 方見心

當歸湯 治心腹絞痛 諸虛冷氣滿痛

歸芍 朴 半 西 桂 芍 香 參 各三分 姜 四分

椒 二兩 大冷加炮附 一枚 右

大七氣湯 治扶冷腹痛 七氣而脈面色青白 方見積聚門

葱白散 治一切冷氣及膀胱氣刺痛 婦人胎前產後

血氣刺痛 芍 歸 枳 麩 炒 朴 青 桂 練 煨 去 桂

姜 炮 苜 炮 苓 稜 炮 莪 醋浸一宿 藜 炒 煎 地 麩 炒

芍 木 參 各八分 右 分三貼 葱 三寸 鹽 少許 水煎 大便閉加大黃

何蘭木香 楨 枳 凡 治食滯氣滯作痛

木 樨 各三分 青 陳 木 各五分 藜 麩 炒 實 麩炒 枳 四分

石 芍 湯 浸 蒸 餅 丸 如 桐 子 太 每 服 五 十 丸 溫 水 下

芍 藥 散 治一切心腹疼痛 不可忍 者 右 各 姜

沒 乳 散 治一切心腹疼痛 不可忍 者 右 各 姜

沒 乳 散 治一切心腹疼痛 不可忍 者 右 各 姜

枳 實 導 滯 丸 治 傷 溫 熱 之 物 不 得 施 化 脈 痛 滿 悶 方 見 內

黃 連 湯 治 胸 中 有 熱 胃 中 有 邪 氣 脈 內 痛 特 欬 吐 方 見 內

此系升降陰陽連甘各一枚姜各五片半半合湯泡參三系石入大棗二枚水煎

。瀉清涼飲治腹痛大便結小便澀喜飲冷以手按

之痛甚赤芍六系太系歸一系甘一系石一系右三系加青葱

。大柴胡湯治証同前方見傷寒門

。烏梅丸治胃冷蠱虫攻心脈痛嘔吐四肢冷方見諸出門

。化虫丸治腹中有塊以手按之不見痛無休止嘔吐涎沫

清水面色青黃或寒或熱沉之嘿不知病之去也方見玉門

。治虫咬心痛鶴虱一兩為末空心溫醋下虫當出

二十腰痛門

。丹後曰有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰

戴氏曰疼之不已腎虛日輕夜重者瘀血天陰及久坐而

發者濕也

。諸腰痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

。腎虛腰痛用栝仲極知栝五味地猪脊骨髓凡脈

。瘀血宜行血順氣補陰且加桃紅針委中出血

。濕且燥濕行氣用栝仲蒼芎

。痰宜辛而加快氣藥使痰隨氣運

。因房勞辛苦而腰痛者四物加知栝仲五味類吞

補腎丸或大補陰丸

。風寒濕流注經絡而作痛者三陳加麻蒼芎芷風

卷獨類

。因挫閃跌撲瘀血流本經而作痛者四物加桃紅蘇木

之類脈妄人壯盛者大承氣加桂下之矣

。醉飽食房酒食之積乘虛流本經腰痛難悅仰者

四物湯合三陳湯加麴蘗付栢桂縮首花桔  
。腰痛不能伸者針委中立愈

。手固青娥丸治腎虛腰痛壯筋補虛付一斤生薑十兩

破一斤右為末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮膜研膏

煉蜜些少丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯善湯任下

。手固立每丸治五積腰痛溫補腎元壯健腰脚

破似各一兩膝酒浸付羊肝砂續各一薛二兩石為末煉

蜜丸如桐子大每服五十九丸溫酒下

。補骨脂丸治腎虛及寒濕腰痛

薛四兩每二兩分制奉童便未用付四兩砂補三四胡桃八兩油腰

右不犯鐵器糯米糊丸秋冬煉蜜丸如桐子大每服五十

丸空心溫酒下乾物歷

。補腎丸治腎虛腰痛方見虛損門

獨活寄生湯治因腎虛坐卧冷濕當風所得

獨一桑寄付砂細膝瓦苓白芍桂冬可

芎風冬熟地歸各五石水煎空心溫服

。八味丸治房勞傷腎腰痛門加續茸續似

。二方治積年腰痛有時發地膚子末酒服方寸七

。杜仲酒治風冷傷腎腰痛不能屈伸杜仲一斤薑汁

右用無灰酒三分浸十日每服三合或為末酒調下

。牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛地骨五加意

芎膝卷海桐皮各一生地十兩寸石巾包無灰酒內

浸冬七日夏三五瓶上法加杜仲每服一盞酒氣不絕

。五積散治寒傷腎經腰痛方見傷上宜門加姜五片桃七箇

。神應丸治腎經不足風冷乘之腰痛或勞役傷腎

或瘦暈地或墮墮傷損腰痛散二兩桂湯各一

石為末酒糊丸空心酒下商香湯亦可婦人桂心湯下茶

。麻黃蒼朮湯治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黃

麻澤白苓麴炒陳各一蒼甘冬二杏十猪

半草菴枝各半苾三石  
。川芎肉桂湯治冬月露卧感寒濕腰痛治痰  
血在足太陽少陽少陰三經腰痛卷柴桂桃

帝尾蒼苓甘各一  
獨活湯治勞役腰痛如折獨活風澤桂各三  
便自利謂之腎著之證毒炮苓各一  
木各二

獨活湯治勞役腰痛如折獨活風澤桂各三  
太厚可已酒炒栝各二  
右酒水煎

粘痛湯治濕扭為病有背沉重肢節腰膝疼痛胸  
膈不利木四分參升苦參酒炒首蒼各五分  
知

風澤苓栝歸各六  
冬甘生苓酒洗茵  
右

神湯治挫閃腰痛甚者不過三服平身歸桂延  
右為末每服二錢匕酒調下或細切酒煎亦可

地龍散治腰脊痛或打撲損傷或從高墮下血  
在大陽經腰脊痛或脾股腫脇痛歸尾二分桂

地龍各四分蘊木各二分栝酒  
甘各一分卷各一分  
右水  
熟大黃湯治墮隨閃脚腰痛不能屈伸  
太炒生薑各半  
石叟咀水浸一宿五更三頓服

一方治腰痛大黃生薑  
同切如豆太鑄內炒  
黃投水兩碗五更初頓服天明取下腰間惡血痛即止

治腰疼如神桂二兩不仲  
右為末酒調下  
又茴香根搗爛酒下甚效  
上方加紅

敗毒散治風扭濕毒腰痛  
加續太苛似  
意苡仁丸治腰膝疼痛手足枯痺

薏苡二兩  
附細參甘栝栝子芎歸  
右

膝乳各一分  
乾地二分  
右為末煉蜜丸酒下

塗藥治及腰有血痛桂三分  
搗篩醋和塗痛上  
乳每

療腰痛黃狗皮炙裹腰痛處取炭燉為度頻而瘥  
生毒搗爛鍋內炒極熱去毒出火毒絹包裏烘熱

繫腰疼處覺扭甚妙  
治及腰有血痛杜仲三分  
搗醋和塗痛處乾復塗

并灸足踵白肉際三壯  
治寒濕腰腿疼痛用蕎麥麵陳醋和如雞子大

作餅子于患處用艾十數柱灸令透出汗為度其

餅破不効不破病瘡將餅送東流水永不再生  
冬腰痛不可使仰令患人正立以杖柱地度至胸  
乃度背脊冬竹頭尽公年壯冬訖藏竹向令入知  
又冬腎俞七壯

治腰尻痛 崑崙二穴冬七壯 在外踝後跟骨上陷中

治腰卒痛 窮骨上二寸冬七壯 又凡右一寸冬七壯

治腰痛冬腰俞

傳 冬一腰痛門

經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眩  
無所見身無所聞善怒如人將捕之 蓋因大怒而血  
不歸經留本經而為脇痛或歲木太過而本氣自甚  
或歲金有餘而木氣被斂皆能令人脇痛經曰病腹  
下滿氣逆三三歲不已名曰息積是亦肝木有餘之證也  
外有傷寒發寒熱而腰痛者足少陽厥陰二經病也  
治以小柴胡湯無不効或有清痰食積流注腋下而為  
痛者或有冬高值仆死血阻滯而為痛者又有飲食  
失節勞役過度以致脾胃虛之肝木得以乘其土位為胃  
腕滿心而痛兩脇痛膈噎不通之證  
肥白氣虛發寒熱而腰痛 冬冬補氣柴苓退熱  
木青調氣

瘦弱冬冬熱腰痛多怒者必有瘀血桃紅歸太柴青類  
凡腰痛者多是肝木有餘也小柴胡加青芍芍膠  
其者煎成正葉入寒瀉 痰流注者本方倍半加橘紅

星蒼白木冬等之類。瘀血作痛者本方合四物湯加  
桃紅或乳沒痛甚而元氣壯實者桃仁承氣下之性  
急多怒之人腹脹作痛者本方加芍青芍之類甚為以  
煎茶送下當歸龍薈丸

天股痛藥為君芍青膽為佐右股痛推氣散  
咳救腹痛二陳加星青香附集薑汁一白四物等  
氣弱之人腋下痛脈細緊或注多從帶從怒氣得  
以八物加木青或加桂

發寒熱腹痛似有積塊是飲食太過勞力所致必用  
龍薈丸

當歸龍薈丸 浮肝大大盛內有濕熱兩股痛者用  
歸脾拖連 柏苓 各一 太代 各半 薈 各半 木 一  
腐 五分 右麴糊丸如桐子太每服二十九薑湯下  
二方加青一兩柴五錢桂二兩加芍柴各半兩  
推氣散 治右股痛甚脹滿不食  
薑黃 枳 麩炒 桂 各五 甘 各三 右為末薑湯下水煎可

枳芩散 治右脇疼痛不可忍

實 麩炒 芩 各五 甘 各一 右為末薑湯或酒調下

芍芍湯 治腹下疼痛不可忍

芍 芍 細 風 枝 欒 芍 枳 麻 參 甘 各各 右各

分氣茶蘗散 治腹脹疼痛氣促喘急 方見

加味二陳湯 治濕痰流注腹內作痛 方見 加蒼朮星芩

一方治瘀血作痛 桃 云皮留 紅 同射 芍 香附 童便

青 右 芍 分 水 煎

枳殼煮散 治悲哀頑喘有傷肝氣兩腋骨痛筋

脈拘急腰脚重滯大治腹痛

芍 細 風 枳 麩炒 枳 各二 芍 各一 右各水煎

三和散 治腹痛背痛妨飲食 方見氣門

實 麩炒 白芍 芍 參 各五 右為末薑湯或酒下

大柴胡湯 方見傷 治腹痛口燥渴服此仍同服

煮黃丸 方見 治腹下疝瘕如神加蝎稍更妙

芍藥散 治婦人腹痛 香附 三兩醋一升鹽 白芍 半兩同煮乾

桂延以各右為末白湯調食前服

治腰痛如打大豆半升炒焦好酒一分煮之扭酒取醇

息積證膝下滿氣逆二三歲不已不可針灸宜導引服

白木丸不實桂各一陳桔醋炒甘各一右為末

煉蜜丸溫酒送下

傳 琥珀膏 貼腰痛之處

大黃 朴硝各一為末以大蒜真膏調貼

又芥菜子水研付 又方吳茱萸研水調付

又韭菜搗炒貼而以慰牛盛火慰之

灸法治腰卒痛以繩橫度兩乳中間屈繩從乳橫

以起痛膝下灸繩下屈三寸壯

治脇痛不得臥 章門二穴灸七壯在大橫外直胛季

肋端側臥屈上足伸下足拳臂取之

治胸腹滿痛不得息 丘墟二穴灸三壯在外踝下

如前陷中去臨位三寸

傳 女二脚氣門

經曰諸濕腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受

之蓋脾主四肢足居於下而多受其濕前成阻濕

阻相搏其病作是以先從氣衝穴隱核痛起及兩

足胫紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋挛掣痛

是其候也或有或半日復作如故漸之而致足筋腫大如

似蠶者多有之東南卑濕之地皆足西北高燥之

市鮮有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有

內外之殊其為濕熱之患則一也

大抵病因有內外之殊而治法無表裡之異耳故為治者

宜通用二末之類以治其濕知栢條芥之類以去其熱滯

芍生地之類以調其血瓜楸之類以行其氣菴獨以利

關節而散風濕蓋用通已勝之類引業下行及消腫去濕

男子多由腎虛而生婦人亦因血海虛寒七情而病

自外入者止於下腫而痛自內致者乃或至於手節

脚氣是瘧疾故用宣通之劑若瘧既成而盛乃刺

脚氣是瘧疾故用宣通之劑若瘧既成而盛乃刺

惡血而去其腫熱然後某之

脚氣入心則恍惚謔言吐食不眠卧不安尺寸脉乍大乍小乍有乍無者死入腎則脚腫小便不通呻吟自額皆黑氣衝胸而喘尺脉絕者死

脚氣之禁 忌噎冷則心煩脚氣禁大語則傷肺發劫不得露足當風入水冷水洗足 夏時膝理同不可風濕暑日冬月俱宜溫暖兩膝羊生火過酒預冒下注成脚氣不可嗜飲則脚氣發 忌濕食飽食濕地濡衣

每食後行數百步惡氣下散 經曰遠者行之 每丑寅日割手足甲少侵肉去氣

治濕熱脚氣方 蘊 栝鹽兩 炒 芍 似澤通已 栝炒 枳 豉炒 甘 香附 卷 痛架 腫甚嚴

散熱加太連 右水煎服 痛除腫退則住服

防已飲 栝兩 炒 蒼 鹽水 白朮 已 生地 栝各半 炒

厚 甘 通 連各三 分 右水煎食前溫服 有熱加苓 朮 芫 及天令腫熱如瘰 有痰加竹瀝 薑汁或南星

大便秘加枳 小便秘加膝 常腫者專主濕熱

肥人加痰某

健步丸 蒼 歸尾各一 兩 生地 芍 陳各一 兩 膝五 兩

腹子三 兩 萊 條苓各五 分 桂一 兩 右為末湯浸蒸餅

丸如桐子大每服一百丸白朮木通煎湯食前送下

加味四物湯治脚氣衝心市觀 加炒栝煎服更於湯 泉或用附子末津調作餅貼穴上艾火灸引熱下行

一方治食積流注 蒼 已 栝兩 炒 星 芫 莖 栝 厚 血虛加膝 極稠丸服

轉筋屬血熱四物加酒苓紅有筋動足大指上至大 腿近腰結此奉養厚因風寒而作冬當加蒼星

尾活傳師湯治脚氣初發一身疼痛或肢節腫痛 便閉阻滯先以此導之後用當歸粘痛湯以徹其邪

卷獨各不 二分 已 歸尾各七 分 太二 分 實五 分 右水煎

當歸粘痛湯 治濕熱脚氣肢節頑疼肩背沉重

胸腹不利及遍身疼痛定腫腫痛脚膝生瘡赤腫



菴茵 酒炒 芥 酒炒 甘 各 風 歸身 酒洗 知 酒製 澤

痛木 各 蒼 葛 升 參 苦 參 各 右 忘 臨 卧 留 眠

麻 黃 丸 經 湯 治 風 寒 濕 流 注 足 大 陽 經 脚 掌 痺 閉 節

重 痛 增 大 壯 熱 無 汗 惡 寒 或 自 汗 惡 風 頭 痛 脚 軟

麻 苴 細 木 芥 已 桂 卷 各 甘 風 各 右 姜 棗

半 夏 丸 經 湯 治 足 少 陽 經 為 風 寒 濕 流 注 發 熱 腹 脹 疼

痛 頭 目 眩 暈 嘔 吐 不 食 煩 心 腿 髀 緩 縱 不 能 行

半 葛 細 木 門 芥 桂 風 毒 芥 各 少 早

甘 柴 各 右 加 姜 棗 煎 同 加 竹 鹿 喘 急 加 杏 桑

六 物 附 子 湯 治 四 氣 流 注 足 太 陰 經 骨 節 煩 疼 四 肢 拘

急 自 汗 短 氣 不 便 不 利 或 手 足 時 浮 腫

附 地 桂 已 各 甘 木 芥 各 右 姜 棗

換 腿 丸 治 足 三 陰 經 為 四 氣 所 乘 為 掌 痺 緩 縱 上

攻 胸 腹 肩 背 下 注 脚 膝 疼 痛 定 心 煎 行 步 艱 難

薏 苡 星 地 石 南 葉 附 椒 薤 勝 酒洗 卷

風 似 各 苳 歸 尾 天 續 各 二 石 酒 糊 丸 鹽 湯 下

五 積 散 治 寒 濕 流 注 經 絡 脚 膝 腫 痛 方 見 傷 寒 門

祖 傳 杉 木 節 飲 治 脚 氣 發 作 惡 寒 發 熱 滿 足 腫 太

煩 体 痛 毒 灸 者 杉 木 節 四 楸 七 枚 腹 酒洗 青 橘 葉

如 大 便 通 利 黃 水 其 病 除 根 未 愈 過 數 日 再 煎 一 劑

洗 服 病 根 去 為 度 外 以 杉 木 橘 葉 煎 湯 洗 之 神 効

林 加 味 敗 毒 散 治 足 三 陽 經 受 熱 毒 氣 脚 踝 上 嫩 赤 腫

痛 寒 扭 自 汗 惡 風 或 無 汗 惡 寒 方 見 傷 寒 門 芫 薺 各 各

竹 瀝 湯 治 兩 脚 痺 弱 或 轉 筋 皮 肉 不 仁 腹 脹 惡 心 不 食

歷 五 升 甘 苳 葛 芥 麻 已 細 桂 姜 各

風 升 各 芥 附 二 枚 杏 核 各 右 吹 咀 以 水 七 升 合

竹 瀝 者 取 三 升 分 三 服 取 汗 二 三 無 汗 者 有 木 二 兩

瓜 引 湯 治 兩 脚 疼 痺 或 不 仁 拘 急 不 得 行

麻 苴 獨 芥 各 芥 附 苳 細 桂 參 風

芎 已 甘 各 姜 一 兩 木 三 杏 各 右 煎 服 取 汗

枳 實 大 黃 湯 治 脚 氣 腫 痛 太 實 各 卷 一 歸 一

石水煎空心服下利一兩行痛止

栝榔湯 治脚氣腫痛順氣防壅

煨香附 陳 藕 瓜 五加 甘 各各二 石 二 瓊 姜 五 片

婦人脚氣多由血虛加婦室女脚氣多由血實加芍

大便秘加大黃 壯者加枳實

大腹皮散 治脚氣腫滿小便不利

腹 二不 瓜 二不 檉 紫 藕 子 微炒 藕 葉 荆 穗 陳

台 烏 萊 蕪 子 炒各 沉 末 多 枳 殼 炒各二 石 入 姜 煎

石南丸 治風毒脚弱疼痛腫生瘡足心痛頭面

浮腫心腹脹滿二便秘結

赤芍 五加 薑 陳 麻 芎 仲 炒 腹 各三 杏 去皮

連 牽 炒 石 南 葉 蕪 藤 各 三 獨 薺 瓜 各四 石 為 末

酒浸蒸餅丸如桐子大每服三三十九丸空心木瓜湯下

木瓜丸 治脚氣虛弱下攻脚膝步履艱難

熟地 燒 陳 五 白 烏 朮 各四 黑 牽 炒 各三 杏 去皮 石 楠 葉

膠 兩 浸 歸 酒 浸 苳 酒 浸 續 瓜 赤 芍 各一 石 為 末 酒

煮麩糊丸空心溫酒送下

三和散 治脚氣上攻胸腹滿悶大便不通 方見氣門

紫藕散 治風毒脚氣脚重虛腫

藕 通 桑 苗 炒各一 枳 殼 炒三 羌 獨 荆 瓜 青

甘 各各七 腹 子 二不 石 分 三 瓊 姜 三 片 葱 一 莖 水 煎

瀉毒方 治脚氣入腹衝心痛腫滿大小便秘

沉 木 卷 白 芍 煨 各五 甘 芍 青 枳 各二

藕 瓜 各一 藕 子 二不 石 入 姜 水 煎

一方 治風寒濕熱足膝痛赤腫脚骨疼痛及痿癭

蒼 朮 未切浸一宿 枳 殼 兩浸一宿多焦 石 水 煎 空心服百用百効

治婦人足腫 生地 枳 蒼 朮 星 膽 膝 紅 芍 石 水 煎

治脚氣筋骨痛 金銀花 瓜 歸 芍 桂 甘 石 水 煎

積 藕 散 治風濕脚痛 藕 芍 各二 陳 甘 煨 瓜 各一 石 為 末

臧地仙丹 治風濕留滯下焦定膝拘挛腫痛 方見痛風

思仙續斷丸 治肝腎風虛脚膝痛引脾胃一切風毒風注

薛 四 思 仙 木 即杜仲炒 薑 風 各五 膝 兩 浸 續 菴 各三

生地五加各一 右为末酒三升化青塩三兩木瓜半白去

皮子以塩煎煮成膏杵丸空心温酒塩湯任下

烏菜平氣湯治脚氣上攻頭目昏眩喘滿脚膝腫疼

神甘 芫 芩 歸 木 芍 味 蕪 子 烏 菜 瓜 冬 各等分 右入

搜風散 脚氣愈後可常服之

芫 芩 冬 月 芍 歸 桔 各一 陳 朴 枳 木 各二 麻 去根節

姜 炮各 蒼 蒼 十一西 桂 半西 右入姜

治脚氣衝心悶亂不知人大豆 一升 水 三升 濃煮汁頓

服半升如未定可更服半升即定

洗藥 去外感濕邪腫痛禁洗淨內致濕氣淋瀝同導淨其邪

礬石 三西 右用漿水一斗五升煎沸浸脚治脚氣衝心

又方 蔽 風 荆 地 骨 煨 牙 白 芍 桐 蓯 菓 等分

右剉咀水二斗煮一斗五升去粗煎淋洗

又方 治脚氣每朝用塩搽腿膝至足甲淹少時却用

煎湯泡洗

敷茶 芫 蒼 卷 各半 細 辛 二兩 右为末姜汁調敷患處

二方 治脚氣背痛 草烏同煎搗爛貼 姜汁調草烏

又小豆南星为末姜汁調塗

又時喫煮熟蘿蔔令飽以下氣醋調飛卷痛處

又猪牙皂角 不蛀者 大皂角 木香 各等分 右为末醋調先

於不腫處塗之截斷毒氣木令上冲次塗下腫留指

尖不塗仍剪去足爪甲出毒氣

又草乌 芫 芩 枳 壳 等分 右为末生葱散條研

桐米醋調敷

一方 治脚氣痛不可忍 生牛黄以滾水調開敷患處

用布裹於暖处至忍之痛立止

脚跟疼不着地 黄牛粪入塩炒热卷之

凡脚气服补药及用湯洗者皆醫之大禁也

脚气是壅滞故用宣通之剂若壅积成而盛者刺恶

血而去其腫热然後藥之

婦人黃疸門

大黃疸為病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱積脾胃之中久而不散故其土色形于面与肌膚

丹溪曰不必分五等是濕熱如金龜

黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又處

者難治

病疸而渴者難治不得者其病易治

發於陰部其人必嘔發於陽部振寒而發熱

諸黃病但宜利小便脈浮當以汗解之宜黃芪建中湯

黃疸小便色不變故自利腹滿而喘不可除熱除必

噦之者宜小柴胡湯方見傷寒門

病疸發黃必小便不利心中熱足下熱之心中懊憹而

熱不能食時欬吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欬吐者吐

之即愈又曰酒疸心中實熱而煩宜小柴胡加茵太連黃連

額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便不利名

曰女勞疸腹如水狀不消

辨作不利

又曰黃家日晡當發熱而又惡寒此為女勞得之膀胱

急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹

脹如水狀大便必黑時溲此如勞之病非水也腹滿者

難治硝石礬石散主之

辨黃疸通身面目悉黃宜桂枝湯散加茵陳又宜

小柴胡加茵太連

穀疸食已頭眩心中拂逆不安飢飽所致胃氣蒸

衝而黃宜小柴胡加穀芽枳實枳實大黃

黃汗者因脾胃有熱汗出入水漂浴所致汗出黃

染衣而不渴黃者散茵陳湯又以苦丁香薷太深

吸鼻中出黃水而癢

急黃者脾胃有熱穀氣訶藜因為熱毒所加故卒然

發黃心滿氣喘余在頃刻故云急黃有得病即身

面目發黃者有初不知是黃死後及身面黃者其能得

病但發熱心戰者是急黃也宜連用梔子散

諸疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛

證宜四君子湯吞八味丸不可過用涼劑強通大便

脈經曰寸口脈近掌無脈口鼻冷並不可治

黃芪散 治黃汗 芍 赤芍 茵 蒿 膏

門 散 各一 寸 各七 右分二貼入薑三片

茵陳散 治黃疸 茵 通 梳 各一 太 炒 不 膏 二 不

等 一 不 可 後 右作一貼每三片煎一薑水煎

黃連散 治黃疸二便秘澀壅熱煎服

連 十 不 太 一 兩 醋 芍 五 不 寸 各 五 右為末每服二錢食半飽

溫湯調服日三服

梔子丸 治時行急發黃如腹脹氣喘不消

茵 梳 芒 太 各 二 杏 炒 一 散 十 不 沒 煎 醋 各

帝 巴 一 不 右為末餅丸如桐子太每服三丸米飲下

得吐利効未効加一丸此證較人最急如覺伴氣有異

便急刺衣脈之不拘時

枳 枳 梔 子 湯 治 黃 疸 寒 熱 嘔 吐 而 渴 飲 飲 冷 身 面 目

黃 小 便 不 利 不 得 安 卧 全 不 思 食

白 苓 三 不 澤 一 不 茵 三 不 已 苓 連 枳 蒼 白 木 二 味 並 末

陳 青 三 不 右 水 煎 一 方 加 枳 實 三 炒 一 不

茵 陳 蒿 湯 治 較 疸 寒 熱 不 食 即 頭 眩 心 中 不 再

茵 九 不 太 四 不 枳 一 不 右

茵 根 湯 治 酒 疸 茵 三 不 實 三 炒 枳 三 不 散 三 不 甘 三 不

右 水 煎 一 方 去 葛 甘 加 太 五 不 右

枳 子 枳 實 大 黃 湯 治 酒 疸 心 中 懊 懊 或 熱 痛 可 脈

兩 莖 黃 連 丸 治 酒 疸 發 黃 小 便 不 利

連 五 不 三 好 酒 五 升 右 將 黃 連 以 酒 煮 氣 為 度 為 末 水

煮 麵 糊 凡 如 梧 子 太 每 服 三 十 丸 食 後 二 陳 湯 加 葛 茵

等 分 姜 棗 煎 湯 送 下 傷 酒 下 血 未 飲 吞 下

白 木 湯 治 酒 疸 下 後 變 成 黑 疸 目 青 面 黑 心 中 如

豎 非 狀 大 便 黑 皮 膚 不 仁 脈 微 而 數

桂 木 枳 三 不 葛 三 不 杏 三 不 散 三 不 石 三 不 姜 三 不

當 歸 白 木 湯 治 酒 疸 發 黃 結 聚 飲 癯 心 胸 堅 滿 不 飲 食

木 苓 枳 三 不 前 杏 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不

枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不

枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不 枳 三 不

茵 各七半一 右分三貼入姜三片

辰砂妙香散 治醉後行房酒熱蓄心經 方見遺精門 再加辰

茵陳湯下

人參散 治飲酒房勞酒入百脉恍惚失帝

參 白芍 枳殼 各二 神酸 各二 甘草 各二 熟地 各二 右水煎

二方 治黃疸 苓連 梔 茵 獨 澤 苓 青 膽 各五

穀疸加棗 莢 結 陳 麴 右水煎

硝石礬石散 右石等分煨為末 每服二錢 以大麥粥

訂和服取汗愈

茯苓湯 治胃疸 消穀 善飢 面色萎黃 心中煩熱 胸

膈脹 滿 小便赤澁 赤苓 陳 澤 桑 各三 赤芍

木 參 桂 各二 膏 各一 且病甚者加大黃 朴硝 各一

右作一服加姜五片

胃苓湯 治脾胃不和 黃腫 方見世厚門 小便赤澁 加滑

腎疸湯 治腎疸 目黃 或渾身黃 小便赤澁

升 羌 獨 風 薑 柴 葛 木 各半 苓 一 和

猪 胆 澤 可 麴 炒 參 各三 苓 枳 各 二 右 方見桑有白苓七分

茵陳五苓散 治傷寒 或伏暑 發黃 小便不利 煩渴

本方加茵陳入姜枣煎服

茵陳茯苓湯 治發黃 脉沉細 數而腹冷 尿澁煩躁

而渴 苓 枚 猪 各 一 滑 石 茵 二 右 煎 服

如脉未出加滑石一合

茵陳四逆湯 治發黃 脉沉細 而逆 肢體逆冷 脾以上有汗

甘草 姜 炮 附 一 枚 作 茵 二 兩 右

醫長榮湯 治五疸 脚弱 心忪 口淡 耳鳴 微寒 發熱 小

便 白 當 作 虛 勞 治 方見虛門

秦朮散 治證同前 朮 歸 兩 芍 木 桂 陳

赤 苓 熟 地 小 草 芍 各 一 兩 半 七 分 甘 各 半 右 合 姜

治黃疸 絲瓜連子 燒灰 為末 因麵 得病 麵湯下 因酒

得病 兩調 數服 可愈

一方 豫煎 梓木 汁 時 飲 多 服 効

一方 柳 枚 一 把 豫 煎 汁 不 拘 時 服

。治急黃疸。百令薑蜜和食之作粉食。尤佳。紅花者。名山丹。花不堪食。白花者可用。

。治皮膚眼睛如金色。生薑黃子為末。熟水調。每服三升。不拘時服。

。治黃疸。身眼皆如金色。東引批枝一握。細切。用水二鍾煎至一鍾。去心。空心酒服。之後三五日黃如薄雲。散多。

。服瘥。百日方平。復身黃。漸散。後可時飲一盞。飲酒則眼中黃。易散。不飲。酒則黃散。遲。宜食熱麵。猪魚等物。凡飲合不可令婦人雜。太。見之。

。治黑疸。多氣。宜急治。括萆根一斤。搗絞汁。六合。頓服。當有黃水。隨小便出。如未出。更服之。

備 治消渴門

。經曰。三陽結。謂之消。東垣曰。三陽者。陽明也。手陽明。大

腸。主津液。若消。則目黃。口乾。乃津液不足也。足陽明。胃血若熱。則消穀。善飢。血中伏火。乃血不足也。結者。津液

不足。結而不潤。皆燥熱為病也。此因飲食甘美而多肥。故其氣上溢。轉為消渴。

。岐伯曰。脈實。病久。可治。脈虛。小病。久不可治。

。丹溪曰。三消者。多屬血虛。不生津液。俱宜四物湯為主。上消者。肺也。多飲水。而少食。小便如常。加參。門。五味。

。天花煎。入生藕汁。生地汁。人乳。飲。酒。人。加。生。薑。汁。中消者。胃也。多飲食。而小便赤黃。加知。真。骨。滑。寒。降。胃。入

。下消者。腎也。小便便濁。淋。如。其。膏。加。栝。知。煎。地。五。味。滋。腎。米。末。傳。能。食。者。必。發。腦。疽。背。癰。不能食者。必傳中滿。鼓脹。皆為不治之證。

。能食而渴者。白虎。加人參湯。不能食而渴者。鐵。白木散。倍。首。根。

大法黃連 天花粉二味為末藕汁人乳汁生地黃汁佐  
以蜜姜汁為膏和二味留古上徐令以白湯少許送  
下能食者加石真耳

天花粉 治消渴之聖藥也

凡消渴藥中大禁半夏及不可飲行

消渴證人皆知其心火上升腎水下泄小便愈多津液

愈固飲食滋味皆從小便消去是水火不交兩然亦

孰知脾土不能制腎水而心腎二者皆取氣於田乎

當服參苓白朮散以養脾胃生津液用炒粳米煮粥

以膏肉碎細入鹽醋油葱椒苗調和少頃粥熟而後入

以此養腎則水有所司

凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎炙痔瘡鹹物及一

切熱物百日以上不可針灸瘡中生膿水或成癰疽膿水

不止者死

和血益氣湯 治口乾舌乾取散舌赤生津除燥生肌

柴胡 芍藥 麻黃根 歸精 知母 卷

漢已 石膏 杏仁 枇杷 生地 連 栝

升 紅 石水煎忌酒醋熱濕麵

當歸同煎湯 治小便多天便秘渴好溫飲舌乾口燥

眼淚難開頭暈縮

細一分 生甘 芍藥 熟地 栝 知 膏

枇杷身麻仁 風 荆穗 升 紅 芍 杏

小椒 石水煎忌辛辣熱物

生津甘露湯 治消中能食而瘦口舌乾自汗不

便結燥小便頻數 酒膳 真膏 栝 酒苓 酒知

芪 炙甘 柴 羌 歸身 升 生甘 生地

風 漢已 紅 枇杷 杏 石水煎六酒一匙

序間緩肌湯 前證統愈正有口氣腹不能努紫赤主

生地 熟地 真膏 栝 連 生甘 知

柴歸身 荆穗 枳 風 升 紅 芍 杏 小椒

人參白朮湯 治胃膈痺熱煩滿飢不欲食者消中善

食而瘦多飲水而小便數及酒過中風產後煩渴



參朮歸芍桂太荆穗奇桔知澤各五  
苓翹括葛各一可三四蒼桂青木桂寒水西  
膏白滑各一右為末入蜜煎入蜜少許服得利即  
降膏散治消渴飲水無度小便數者大効

芩黃丹漢已毒時為末溫漿水調下  
人參散治腎消善飲而食小便頻數白濁如膏

參一分木澤括桔桂翹縮各二葛分苓太  
可白苓各五分甘七分真膏一分滑寒各一分右水煎入  
蜜少許再煎腎消食前上消食後服

麥門冬飲子治移熱於肺名曰賜消心賜熱及則引飲  
為消渴 門不括知月 五味生地 參 葛

神各十右作一服入竹葉七片

原蚕重湯治腎消內閉及上中二消飢渴不生肌肉  
其効如神

原蚕却吞養晚蚕也其繅絲湯極効如無繅絲湯  
以防風羌活散治二陽病心脾受熱精血虛少身熱日消

口氣葛參各一卷不斛風枳魁炒參性地苓  
蛎附地 五味 膝續五分地骨七分右水煎

參苓丸 治胃中結熱消穀善食不生肌肉名曰食位  
參苓 葛 遠 勝酒浸 地骨手 右煉蜜丸米飲下

加味甘木散治消穀善飢 參 朮 苓 甘各一分  
葛三分木 枳魁炒 五味 柴燉 右水煎

茯苓丸 治消中煩熱消穀小便數 參 神 生 地 枳魁炒  
連 門 蛎 蓮 葛蜜炒 知各五分 葶 右煉蜜丸米湯下

生地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁 生地 天門 麥門  
參 苓 卷各一分 斛炒 枳魁炒 杞魁炒 甘各一分 澤各一分 熟地各一分 右

神湯 治三消渴瘵 蓮房 葛 枳 杞 卷 可  
石等分小便不利加苓

巨和甘露飲 大治消渴有此證者每日必須進二三服  
滑各一分 真膏四分 知 參 朮 苓 澤各一分 甘一分 枳各一分

石分三點加葛粉天花粉各一分 水煎  
降心湯 治心火上炎腎水不足煩渴引飲氣血日消

遠用甘草水煮五香并炒 歸身 熟地 參 苓 五味

甘 二 天花粉 七 右余煎食後溫服

巨消丸 治消渴骨蒸 黃連為末搗為餅自然汁漿

成餅陰乾再為末再用冬瓜汁拌和成餅如此七次又用

冬瓜汁丸如梧子大每服五十丸冬瓜煎湯下或大麥煎湯下

黃芪湯 治肺消飲少便多

芪 三 五味 參 門 桑 二 柏 熟地 各一 右

積毒散 治惡毒胃氣虛弱不能房室却多服母石

燥葉唇口乳焦精自泄小便頻併

白令 天花連 白扁 真貝 甘苗 寒水木參 猪

右等分為末白湯調下

珍珠粉丸 治胃消白液因瘦而下或夢遺精滑 方見水 門

巨才封龜母 治訂同前 方見 門

烏梅木似湯 治飲酒積熱血液焦枯小便多肌肉消好

冷飲

梅 少 破 不 瓜 藤 砂 甘 果 右等分如菓

硃砂黃連丸 治心虛極熱或因飲酒過多發得疾

辰 二 生地 二 連 三 石 煉 蜜 丸 煎 灯 心 末 湯 送 下

酒黃黃連丸 一名黃龍丸 方見 解毒止渴

巨神湯 治證同前 烏梅 遠 甘草水煮去心 煎 二

右每服七不糯稻根一握如無以茅根代之夏加連 五

加減八味丸 治腎水枯竭心火熾炎煩渴取數肌肉日削

熟地 三 山 藥 炒 山 藥 四 桂 各 一 牡 白 苓 澤 各 八 五 味 二

右煉蜜丸如桐子大五更初末言時鹽湯送下五十九年

前日晡一日三服房勞傷胃之冰竭心火炎上口舌焦

乳消渴便數精神恍惚高眠瘦加鹿角 鐘 沉 五 木

消痞丸 治三焦壅滯痺熱消渴及心火盛而咳血下血

等 蓬 連 葛 代 參 末 各 三 苓 太 柏 梳 哥 葉 桂

朴 面 二 砂 各 桂 木 各 一 右 水 糊 丸 食 前 白 湯 下

加減三黃丸 治消渴及服丹石成消渴

苓 春 四 夏 夏 秋 太 春 三 夏 夏 一 連 春 四 夏 三 右 煉 蜜 丸

鐵氏白木散 赤 治消渴 冬 三 木 苓 甘 各 一 葉

木各一 括各三 石水煎空心送下 巨黃丸最妙  
 白虎加人參湯 治腸消煩渴不欲飲 傷寒垣加苓杏  
 清心蓮子飲 治渴而小便澀或尿 方見尿渴門  
 玉泉丸 治煩渴口乾 門參苓 荳 羊生半  
 烏梅 糖 甘 括 葛 各一 右煉蜜丸溫湯下  
 玉壺丸 治消渴引飲無度 冬括 煉蜜丸門冬湯下  
 治肺燥熱渴大腸秘 括姜蜜丸九月間取種以葛粉  
 拌焙乾銀石器中慢火炒末食後夜卧沸湯點服  
 主胃中熱消渴引飲陳粟米炊飯食之良

借 五諸蟲門

進曰腸胃為市無物不受無物不包又曰飲食自倍  
 腸胃乃傷若夫飲食不能謹節則朝傷暮傷自  
 傷成積之久成熱濕熱相雜而諸般奇形之虫名從五  
 行以氣而化生若腐草為蠶之類是也  
 若夫腸胃勞瘵懶食盡脹狐惑等證無不生虫  
 丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半日虫頭向鼻易治  
 下半日虫頭向下難治 已上月字並互作日字  
 蓋虫無半日一轉頭其先以蜜或  
 砂糖或炒肉引虫頭向上然後用殺虫藥

。腹內熱腸胃虛虫行求食上居有瘡曰蠹虫食其藏  
 下居有瘡曰狐虫食其肝

。臟寒蛔虫動作上入腸中煩向吧吐時發時止得食  
 即吧帶自吐蛔謂之蛔厥

。經曰蛇者長虫也胃中冷即吐蛇虫謂之蛇厥腹中鳴  
 加炒川椒 換車錢 吞烏梅丸 劫蛇見椒則頭伏  
 故也

烏梅丸 梅細附 桂 參 栝 椒 各六 各四 各四

連 十四 十六 西 石以苦酒浸烏梅一宿去核蒸搗成泥 餘茶為末和勻入蜜杵丸如桐子大每服三十丸 未飲 下

集妙丸 治藏府虛弱多食甘肥蛇虫動作心腹痛 疼發作往來腹中煩熱口吐涎沫即是蛇咬又療下 部有虫生痔痒痛

太 到砂 三西 木 枳 虱 炒 訶 附 薑 草 薑 各一 各一 各一 各一

右煉蜜丸陳皮湯下婦人醋湯下 化虫丸 小兒病多有虫因臟腑虛弱而動腹痛吐清 水面青黃寒熱沉埋不知痛慶

虱 枳 胡粉 練根 白礬 右為末麩糊丸 如梧桐子大一歲五丸米飲下

本香三棗散 治腹中有虫面色痿黃一切積滯 黑耳 半砂半 年二西 腹子 枳 雷丸 錫灰 枳 我 櫻 木 各一 西 右為末每服三不空心蜜水調服

過仙丹 逐虫積消痰疳

枳 一斤 太 十斤 枳 福 卷 我 藥 名 年 三斤 木 不 拘 多 少 為 末

皂角 一斤半 去皮枝切碎用水六碗浸一宿冬二宿去粗 磁器熬膏得冷和菜丸如桐子大每服四十九丸壯弱加 減茶清五更初下如未通再喫溫茶清助下虫積 惡物尽了白粥補之

桃仁湯 治狐惑 論

桃 槐子 艾 各五 各五 大棗 十五 枚 水煎

雄黃 銳散 治前證

雄 青 黃子 苦 參 連 各二 各二 枳 一 枚 右為末搗新艾汁和 捏如小指頭太內穀道中治虫食其肛也

外甚化虫丸 能化虫為水

硫 一兩 木 五不 蜜陀僧 附 一枚 炮 右先以附子末醋一盞 熬其膏餘茶為末和勻丸荊芥茶清下

一 方 黑 鉛 炒成灰 枳 末 等 分 米飲調下

一 方 練 根 虱 枳 三味 濃煎湯飲之

一 方 酸 石 榴 根 東引者 切二分 枳 細切 右以水七升煮取三升去

祖以粳米煮稀粥空腹食之小間虫死快利

又苦練根生子者東引不出者刮去蕨皮取白皮二兩以水三碗煮

一碗才去粗用晚粳米三合煮糜用空心先吃炒肉引虫白

正進菜粥一二日頃吃一二日漸加至一碗虫尽下而愈

祖傳栝榔丸 治小兒疳積塊腹痛有虫證

栝榔並細切醋炒各五斤 檳一兩 青三錢 陳去白 雷漆炒

藥麩炒 麩炒各五斤 蕪二斤 虱炒 甘冬 木不見太 胡連炒

良壁土炒 縮一斤 右醋糊丸空心淡薑湯下加使君肉五斤炒

治蛇虫攻心痛 蕪蕪根二斤水七升煮三升食之即服

治虫心腹痛 青黛麩糊丸冷水送下

治寸白虫雷丸水浸去皮切焙乾為末五更初先食羹

肉便以一錢匕茶稀粥調服

又榧子日食十顆七日滿虫化為水

治虫食下部疳 扁蓄一把水二升煮空心服

### 女六血門

口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降法當抑陽補陰

四物加知柏為主治

又白血涼血行血為主犀角地黄湯入鬱金古見傷寒門

傷寒吐血者邪氣不得發散壅盛於經逼迫於血因致

血也解經中邪氣則愈脈浮取麻黃湯浮緩桂枝湯微者三

茶俱不可用宜黃芩芍藥湯

人參飲子 治吐血參聖藥名門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少吐血

門歸身 白芍 甘草 參 苓 各一 五味 九粒 石

注地黃散 治前熱吐血咯血等證 芍 生地 熟地

拘地骨 柴連 白芍 天門 甘苓 各等 右

門冬飲子 治吐血不止 門 生地 等分

五黃丸 治吐血不止大便結燥者

太兩 芒 生地 各六 甘 一 連 三 梔 苓 二 右為末

煉蜜為丸如桐子太每服三十九食遠白湯下

葛根散 治血絲目赤心神煩悶

黃芩膠粉 側柏葉 生地各三 甘草各一 右入蜜

。川芎三黃散 治積血

大礬 芩 苓 連各等 右為末每服三不食後井水下

。此細散 治氣前發血

。赤苓 白芍 歸同浸 生地 膠抄名 右水煎服

。黃芩芍藥湯 治細多歲面黃眼昏手麻

。芩三四 芍各二 升各一 葛各一 芍各一 西各一 石

。治細四物加側柏葉煎服

。黃芩芍藥湯 治細 芍 芍 芍 芍 右

。蘆子降氣湯 治虛壅鼻血方見痰門

。治大吐血 萱草葉研汁一盞入姜汁三分細 細

。治血血不止 龍骨研細吹入鼻中

。腐香散 柘丸 龍骨各五 腐一分 右研吹入鼻孔

。治血血有治不止 蒲黃 血竭為末吹

。灸法 口鼻出血不止灸上星在髮際一寸

。又大椎 症門 灸三壯即止 症門入後髮際五分

。吐血門 附吐血咳血痰血

。凡諸見血證皆足陽盛陰虛君相二火亢甚前迫其血

而出諸穴敷也悉宜四物湯加知柏為主治

。吐血咳血痰血者皆從肺中來也加酒洗薄荷茅花

。吐血咳血從胃中來也本方加青知

。吐血咳血及潮熱咳血從腎中來也本方加槐柏並鹽桂

。治吐血辭金為末以姜汁童便和好酒調服

。又童便二分酒一分搗側柏葉湯飲

。又乾姜炮 為末童便調服

。梳子最能清胃脫血

。吐血用二門知貝栝栲熟地遠或加乾姜

。咳血痰盛身熱多是血虛用黨參黃芩訂貝梳海石

。為末姜汁蜜丸噙化嗽盛者加杏核八物加減調理

。三黃補血湯 治吐血

。芩 歸 柴 各一 熟地 芍 各一 芍 生地 各一 牡 各一 右

。黃芩散 治咳血成勞 方見咳門

二方治痰帶血咳出

木<sup>一不</sup>歸芍<sup>牡</sup> 桃<sup>各半</sup> 門<sup>各半</sup> 槐<sup>七分</sup> 甘<sup>三分</sup> 右水煎

雞蘇散 治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇<sup>即薄荷</sup> 芩<sup>生</sup> 地<sup>膠</sup> 貝<sup>珠</sup> 芩<sup>各一</sup> 桔<sup>生</sup> 蒲<sup>炒黑</sup>

門<sup>各半</sup> 甘<sup>各半</sup> 右水煎 得有藥砂中不

犀角地黃湯 治吐衄血 方見傷寒門

四生且 治吐血衄血陽乘於陰血熱毒行

生荷葉 生艾葉 生地 生側柏葉 右等分細研丸 塩湯下

聖餅子 治咯血 黛<sup>一不</sup> 杏<sup>四粒</sup> 右研杏仁入黛末作

餅子以柿餅一箇破開以藥餅直於柿中合濕紙包煨

連柿研細末飲調下

赤茯苓湯 治暴怒傷肝氣逆胸中吐血衄血

赤苓 參 枳 陳<sup>各三</sup> 門<sup>各一</sup> 芍 枳<sup>各一</sup> 右加薑

歸脾湯 治思慮傷脾心健忘吐血下血 方見怔忡門

加味理中湯 治醉飽傷胃吐血其色鮮紅

參 薑 炮 木<sup>各三</sup> 薑<sup>三</sup> 甘<sup>一</sup> 石<sup>一</sup>

白朮散 治飲食過度胃虛傷胃吐血

木 參 白 苓 春<sup>蜜炙</sup> 山 百 令 前 苿<sup>各</sup> 甘<sup>各</sup> 友<sup>各</sup>

雞蘇散 治虛損氣逆吐血不止

雞蘇 芩<sup>各一</sup> 歸<sup>酒浸</sup> 芍<sup>各</sup> 膠<sup>炒</sup> 伏龍肝<sup>三</sup>

小煎 生地 芩<sup>各一</sup> 石<sup>分二</sup> 薑<sup>三片</sup> 竹茹<sup>一彈大</sup>

側柏散 治內損吐血下血或因酒太過血毒行口鼻

皆流頭更不救則死

側<sup>一兩</sup> 參<sup>蒸</sup> 荆 穗<sup>燒灰</sup> 右為末入飛羅麩一錢每

服二錢新汲水調如稀糊空心服

生地黃散 治吐血衄血下血鼻衄 方見衄血門

救脈散 治吐血虛羸脈虛

升 柴 參 苓<sup>甘浸</sup> 歸<sup>酒浸</sup> 熟地 芍 芩<sup>各</sup> 蘇 木

甘 冬<sup>各</sup> 陳<sup>各</sup> 石 水 煎

一方 治吐血 百草霜 白芷<sup>等分</sup> 為末每服二錢糯米飲下

或加蚌粉<sup>等分</sup> 治損傷吐血用側柏葉研汁調下尤妙

一方 側柏葉焙乳為末每服三錢米飲調下

一方治吐血 陳槐花炒二 百草霜五 為末芥根煎湯下

黑神散 治食飽吐血并血妄行口鼻俱出但青未赤  
皆效 百草霜取村中燒草銅底煉最妙為末每服一錢

糯米飲調下

右出出血如線 槐花炒末 移入艾蒲煎炒焦末付之妙

灸法 治霍亂吐血及胃脘三 即上脘在巨關下寸

治吐血唾血上氣咳逆及肺命年壯

治吐血吐逆及大陵穴在掌後兩骨間 手脈後任命也

備 夾下血門

大便下血有熱有虛熱四物加炒槐升升 鹿血物加

乳毒 炮升

便血有風邪下陷者蓋風傷肝生血故也宜升提之

四物加風荊分柴芩槐 條芩地榆枳

有濕傷血者宜行濕消熱二木連柏歸芍芍槐地榆

因積熱下血蒼陳各一 翹五 芩連柏各七 為末 生地黃 膏丸服

血黃前來白近血四物加槐芩膏槐

血黃後來白遠血四物加通連 黃炒

治近血面色黃 榴皮末 茄子枚煎湯調一錢下

治遠血不止艾葉不以多少薑汁二合和服

治先血後黃 赤豆沒出芽 歸帶 為末漿水調服

治先黃後血 伏龍半斤 寸多 熟地膠 芩木各三

右以酒水煎服

腸風臟毒因坐卧風濕醉飽房勞生冷停寒酒麪積

熱所致 挾熱下血清而色鮮腹中痛清腸風



扶冷下血濁而色黯腹中略痛濁脈毒

治法大要先解散腸胃風邪熱則敗毒散冷者

不換金正氣散

。二方治腸風下血 枳太各三 歸樨 皂角仁 栝荊

枳各五 蠟皮各五 連炒 芫 槐角子各一 右為末 麩糊丸如桐子大

每服五十九丸白湯下如鮮血下甚者加枳 枳 灰 蓬 房 灰各五

。治便血 白芷五倍丸服効

。烏梅丸 治下血如神 桑炒 烏梅肉二兩 右醋糊丸醋湯下

。槐花散 治腸風臟毒下血

槐炒 側柏葉炒 荆穗 枳炒 右為末空心米飲調下

。加減回腸湯 治腸風下血 生地 歸身各一 側各八 枳炒 槐炒

荆穗可 地榆 併各 芩 風各 烏梅大者 右入等

。當歸和血散 治腸澼濕毒下血 槐炒 青荆穗 熟地

木各 歸身分 芎四分 右為末每服三錢米飲調下

。秘方枳殼湯 治腸風下血 枳二兩 連二兩 右水煎

。升陽去積和血湯 治腸澼下血別作一仙師之然出者

有力而遠回散腸中痛熱毒所作也

陳二分 熟地 歸身 蒼朮 芫 桂各三 生地 牡生甘右五分

分七分 炙甘草右一 白芍一 右

。敗毒散 治風熱入大腸下血不止加善芎 桑 烏梅

因酒毒加連

。防風散 治食熱物過多風氣蓄盛銷燥大腸脂真耳

以流滲下血 羶風 荆 枳炒 桑炒 芎 右等分水煎

。胃風湯 治腸胃受濕下如豆汁或如瘀血示見世浮門

。黃連湯 治便後下血脈不痛名濕毒下血

連 芩各三 甘草各一 右水煎

。芍藥黃連湯 治大便後下血脈痛謂熱毒下血

連 芩各一 芍各四 太 桂各一 甘草各一 右水煎痛甚

調木樨末送下巨黃丸

。聚金丸 治因酒毒大腸蓄熱下血不止

。芩風各二 連四兩 生二兩 煨二兩 右醋糊丸空心米飲下

。平胃地榆湯 治結陰便血

木陳杏朴首<sup>各半</sup>地榆<sup>七分</sup>可<sup>多</sup>歸<sup>麩</sup>炒  
白芍參<sup>各三</sup>益<sup>分</sup>附<sup>炮</sup>石<sup>各</sup>姜<sup>末</sup>束  
槐角散 治腸胃不調脹滿下血

蒼<sup>而</sup>朴<sup>陳</sup>歸<sup>枳</sup>枳<sup>各一</sup>槐<sup>角</sup>甘<sup>烏</sup>梅<sup>各</sup>石<sup>水</sup>煎  
下血因寒者四物加升<sup>地</sup>棗<sup>反</sup>

卷柏散 治脈毒神效 卷<sup>焙</sup> 芩<sup>各</sup> 為<sup>末</sup> 未<sup>飲</sup> 調<sup>下</sup>  
又加<sup>煙</sup>芩<sup>上</sup> 為<sup>末</sup> 未<sup>飲</sup> 調<sup>下</sup> 隔<sup>年</sup> 者<sup>尤</sup> 佳

又栝<sup>子</sup> 研<sup>破</sup> 袋<sup>盛</sup> 酒<sup>三</sup> 盞<sup>前</sup> 至<sup>一</sup> 盞<sup>服</sup>  
又荊<sup>穗</sup> 縮<sup>等</sup> 為<sup>末</sup> 未<sup>飲</sup> 調<sup>下</sup> 入<sup>百</sup> 草<sup>霜</sup> 一<sup>亦</sup> 可

治浮血乾柿餅<sup>灰</sup> 存<sup>性</sup> 清<sup>未</sup> 飲<sup>調</sup> 下<sup>三</sup> 錢<sup>止</sup>

○灸法 治便血不止 灸脊中對胸一穴  
又灸<sup>帶</sup> 宮<sup>二</sup> 穴<sup>在</sup> 中<sup>橫</sup> 紋<sup>出</sup> 無<sup>名</sup> 指<sup>着</sup> 心<sup>脈</sup>  
又灸<sup>太</sup> 白<sup>二</sup> 穴<sup>在</sup> 足<sup>內</sup> 側<sup>核</sup> 骨<sup>下</sup> 陷<sup>中</sup> 大脈經命穴也

又灸<sup>會</sup> 陽<sup>二</sup> 穴<sup>在</sup> 尾<sup>骨</sup> 兩<sup>傍</sup>  
又灸<sup>三</sup> 里<sup>二</sup> 穴<sup>在</sup> 膝<sup>下</sup> 三<sup>寸</sup> 筋<sup>骨</sup> 外<sup>腫</sup> 筋<sup>節</sup> 間<sup>拳</sup> 足<sup>取</sup>

按<sup>大</sup> 熱<sup>脈</sup> 盛<sup>實</sup> 者<sup>非</sup> 所<sup>宜</sup>

女九溺血門

尿血因心腎氣結或白帶或房勞得<sup>之</sup>  
尿血屬熱有血虛熱炒<sup>棗</sup> 水<sup>煎</sup> 服<sup>血</sup> 虛<sup>四</sup> 物<sup>加</sup> 膝<sup>生</sup> 地<sup>二</sup>

小便出血不痛者血從精竅中出也<sup>加</sup> 連<sup>棗</sup> 條<sup>茶</sup>  
又白<sup>血</sup> 出<sup>於</sup> 小<sup>便</sup> 者<sup>或</sup> 四<sup>物</sup> 加<sup>白</sup> 朮<sup>門</sup> 棗<sup>以</sup> 清<sup>或</sup> 四<sup>物</sup> 加<sup>滑</sup> 通

大小<sup>煎</sup> 以<sup>行</sup> 之  
溺血或四物加連<sup>棗</sup> 灰<sup>或</sup> 用<sup>六</sup> 味<sup>地</sup> 黃<sup>丸</sup> 方見淋門

治溺血髮<sup>灰</sup> 每<sup>服</sup> 二<sup>錢</sup> 淡<sup>醋</sup> 湯<sup>調</sup> 下  
治溺血神<sup>効</sup> 生<sup>地</sup> 四錢 小<sup>煎</sup> 滑<sup>通</sup> 蒲<sup>炒</sup> 竹<sup>葉</sup>

藕<sup>節</sup> 歸<sup>而</sup> 棗<sup>炒</sup> 甘<sup>石</sup> 水<sup>煎</sup>  
一方<sup>五</sup> 苓<sup>散</sup> 合<sup>四</sup> 物<sup>煎</sup> 服

一方<sup>梔</sup> 子<sup>炒</sup> 為<sup>末</sup> 水<sup>煎</sup> 連<sup>租</sup> 服<sup>之</sup>  
生<sup>地</sup> 黃<sup>飲</sup> 子<sup>一名</sup> 其<sup>地</sup> 黃<sup>散</sup> 方見血門 治<sup>溺</sup> 血<sup>屬</sup> 熱<sup>者</sup> 如<sup>脈</sup> 微<sup>身</sup> 涼<sup>意</sup> 宜<sup>煎</sup>

一方<sup>竹</sup> 茹<sup>一</sup> 大<sup>塊</sup> 水<sup>煎</sup> 服  
又<sup>歸</sup> 苳<sup>為</sup> 末<sup>每</sup> 服<sup>二</sup> 升<sup>未</sup> 飲<sup>調</sup> 下

治<sup>尿</sup> 後<sup>有</sup> 血<sup>氣</sup> 柿<sup>燒</sup> 存<sup>性</sup> 為<sup>末</sup> 未<sup>飲</sup> 調<sup>下</sup>

。治小便出血 酒蒸黃連丸 方見 牙根痛湯下

。又辰砂五苓散 方見 燈心煎湯調服本方加辰砂

。茯苓調血湯 治 面黃過度房勞小便出血 方見 淋門

。鹿角膠丸 治 證同前 方見 淋門

。小兒尿血甘草升麻煎湯調益元散

。凡用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加辛

溫升藥如用涼藥用酒煎酒炒類乃寒因用也

三十脫症門 俗在音工下部病也

。脫症屬氣血虛身氣虛參香升芎血虛四物

。加黃柏

。一方治腸風下血等證

。乾柿餅 燒存性 酒瓶箬 包酒過一年者或二 烏梅 燒存性

。百葉煎 二兩如無以五倍子 槐花 半兩炒 枳 半兩炒 右為末醋

。糊丸如桐子太每服七八丸醋湯下或加煆半兩

。蠟皮散 治 肛門或因同世或用刀脫肛

。蠟 一枚燒 磁石 煆 桂 名五 石 為末 每服二錢空心米飲下

。若女人陰脫加蠶頭一枚燒研

。治肛門凸出虎骨燒末水調服方寸匕日三服

。治脫肛歷年不愈生鐵二斤水一斗煮取五分洗日再

。香附散 香附炒一 荆穗 三兩 為末煎湯洗一方加皂角

。皮拾散 五倍子為末水煎洗更入白礬蛇床子佳洗後

。用赤石脂末參芭蕉葉上頻用托入 舊以五倍子托而上之次末取

。小兒脫肛五倍子末蜜調攤油紙上貼 三五加百子煎醋

一方治脫肛前葱湯洗軟用芭蕉葉熬

一方木賊燒存性為末搽肛門七換入即愈

治痔多時脫肛疼痛大蜘蛛一箇紙葉重裹線繫  
定盒子內燒令黑存性取出細研入黃丹少許同研先用  
白礬葱椒煎湯洗拭乾後將藥末搽入將手掌搽

托收

一方石反炒粗以故帛裹坐其上冷即易

一方麻鞋底頻換又故麻鞋底熬頭各一枚燒熬  
頭搗為末傳肛門將鞋底搽入即不出

一方蒲黃二兩猪脂二兩石煉猪脂和蒲黃成膏塗  
治脫肛香附劑縮右煎洗又煎服亦可

一方陳壁土泡湯先薰後洗  
又故魚頭燒存性為末麻油調付即收魚頭亦可

一方艾葉濃煎湯浸之即收  
灸脫肛大人長強穴七壯又灸胸中年壯  
灸兒百會穴三壯又灸長強穴

### 世一疝氣門

丹溪曰疝氣者單丸連小腹急痛也有痛在單丸者有  
痛在五樞穴處者皆足厥陰經也自素問而下皆以為

寒蓋寒主收引經絡得寒則收而不行所以作痛大抵此  
證始於濕現在此前而至久又得寒氣外束不得疎散

所以作痛者只作寒論恐為未備  
以烏頭梳子作湯服之効速後隨證加減又當分濕熱多

少而治濕則腫多癩病是也  
又有按虛而發者當以參朮為君疎導葶苈子

茴香枳實山查梳子類  
手圍葱白散治寒疝作痛芎歸枳炒朴炒茴炒

桂青葙葶苈炒蘆炒枳炒熟地木  
白芍各等石每服五錢葱白三莖鹽少許水煎患眼

疾陳黃湯治厥疝腹中冷痛積氣上逆陰囊冷  
萊各等川烏炮去細各等良薑炮桂各二右水煎

蒺藜湯治陰疝牽引小腹痛

蘇去刺附炮去 梳各一 右水煎食前溫服

沉香桂附丸 治脾胃虛寒心腹痛手足厥逆便利無度

五仙引痛 沉附炮 川烏炮 姜炮 桂 良 吳 茱 萸

茵炒各 右為末醋煮麩糊丸空心米飲下

加味五苓散 治疝氣卒腹痛小便秘結方見傷寒門

本方加練子一分為末每服二錢空心米飲下

祖傳白蘭花丸 治疝癩氣及婦人陰癩墜下小兒偏

墜等證 昌圖花醋炒 練子 橘枝 海藻 海帶 昆布

三味俱鹽水洗 桃去皮尖 朴各一 通 實炒 延 桂 木 檉各一

麻沉細辛足逆冷者加川烏炮五 右為末酒糊丸如桐子太

每服五七十九丸或姜鹽湯送下

一方治疝 橘枝炒 桃炒 萊炒 川烏炮 右煎服

小腸氣腎枝脹痛蒼陳練各二 甘半 蕪一

右酒水名一盞連鬚葱白五莖煎服

丁香練實丸 治男子疝痛婦人經聚赤帶下昏任脈所

在也 歸附炮 茵炒 練各一 石細切用好酒三升煮酒

盡為度焙乾為末每末子一兩入下木各半 延五 全鳩

右為末子前菜拌勻酒糊丸空心溫酒送下

當歸散 治疝氣大便秘陰囊引小腹痛唇青者不治

桂辛 芍取末 歸各半 太 桃去皮尖炒 全鳩 右坐每二錢

入蜜三錢煎服後以青陳苓木縮甘生薑等

煎服和胃

一方諸疝發時服 海石 香附等 一方去香附用茴香

右為末姜汁調服二錢亦治心痛

一方治疝 蒼各 芍各 栝各 青 延 苓 桃已 附已

茵炒 右順流水煎服

加味通心散 治腎膀胱實聚小腸氣痛小府不通

瞿 通 梳 苓 剉 甘 枳 練 等 右加燈心車前子煎

補腎湯 治寒疝入腹小腸氣痛時世浮胸膈痞塞

參 苓 苓 附 炮 木 沉 瓜 枳 鹿 甘 苓

芍各二 蕪七 右加姜末各 吐加 半夏 生薑

散法 治腎囊偏墜 蛭良 右加姜末各 吐加 半夏 生薑

傳 五種湯 洗疝痛 枳實 蘇葉 椒葉 蒼耳葉

蒲桃葉 水煎洗痛立止

○灸法 大敦二穴在足大指端五爪甲如韭葉及三毛中  
灸三壯 千金云足大指取毛中

三陰交二穴在內踝上三寸骨下陷中灸三壯或灸臍中  
一法治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內噓鳴冬風重七壯  
亦在腹內氣海穴七壯在臍下一寸半

又灸膈左右各去一寸半外陵灸七壯立効永不發

○灸法 百壯在臍下三寸治陰卵偏大癩病

諸氣心腹痛疝氣小腹急痛足大指次指下中節橫紋  
當中灸五壯男左女右極妙 又治疝氣偏墜

又量病人口角兩角為一摺折此則三摺成三角如△樣  
以一角安臍心兩角在臍下兩旁各灸六壯偏灸

石之偏灸左二十七壯若灸兩邊亦無害

林 小兒疝氣偏墜將兒陰物扶向上陰頭足是灸三壯  
如在左斜扶向上足右亦如此大人亦依此法神効

傳 吐二飲逆 傳 讀吐字氣上逆作吐之名也古方以飲逆為吐逆又  
誤以吐嗽為吐逆孫真人誤以嘔為吐逆

難知云吐逆證古人新為嘔逆其說似是而非蓋嘔者乳  
吧也如有物直出則為吐也嘔物旋出則為吧也吧無物出則

為嘔也欬逆者或水清於肺而心悸或連續不已而氣逆  
或喜笑過多而氣噎或噎飲而錯唯而氣搶或急食乳

物而氣塞皆能作欬逆之聲連續不絕俗謂之吃或是一  
大抵欬逆者不順之義吃或者差錯之義二者皆氣不

得下為大担托之而使上至咽喉中噎而止也或以紙擦鼻  
嚏而止或詐完盜賊自恐而止或鼻担聞食香調氣而

傳 止皆抑之駁之而使氣下也  
大平有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不足治之

痰于金在上者吐之 痰于下者下之 稀涎散之類  
不足者補之 參朮煎湯下大補丸

痰用陳半氣 痰用參朮 痰用連柏滑  
飲逆自利滑甘栝芍參朮陳竹瀝

痰疾發飲用參朮煎湯調養元散頻服自止

陳皮竹茹湯 治傷寒餘熱未解氣虛發熱

陳<sup>三</sup>白<sup>三</sup>青竹茹<sup>四</sup> 參<sup>二</sup> 白<sup>一</sup> 右入姜枣

橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦惡心不進飲食

陳<sup>三</sup>茹<sup>三</sup> 赤苓<sup>二</sup> 枳<sup>二</sup> 門<sup>二</sup> 半<sup>二</sup> 甘<sup>二</sup> 參<sup>各一</sup> 右入姜

橘皮乳薑湯 治欬逆不止 陳<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 桂<sup>三</sup> 通<sup>三</sup> 草<sup>三</sup> 甘<sup>三</sup> 參<sup>各一</sup> 右

陳<sup>三</sup> 半<sup>三</sup> 乳<sup>三</sup> 生<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 參<sup>三</sup> 通<sup>三</sup> 草<sup>三</sup> 右

六君子湯 治痰挾氣虛發熱

陳<sup>三</sup> 苓<sup>三</sup> 參<sup>三</sup> 白<sup>三</sup> 木<sup>三</sup> 半<sup>三</sup> 各<sup>一</sup> 月<sup>一</sup> 石<sup>一</sup> 入<sup>一</sup> 姜<sup>一</sup> 枣<sup>一</sup>

生<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 半<sup>三</sup> 夏<sup>三</sup> 湯 通<sup>三</sup> 治<sup>三</sup> 欬<sup>三</sup> 逆<sup>三</sup> 欬<sup>三</sup> 死

半<sup>三</sup> 通<sup>三</sup> 生<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 石<sup>三</sup> 水<sup>三</sup> 煎

丁香散 治欬逆 丁<sup>三</sup> 柿<sup>三</sup> 蒂<sup>三</sup> 各<sup>一</sup> 甘<sup>一</sup> 良<sup>各一</sup> 右<sup>一</sup> 為<sup>一</sup> 末<sup>一</sup> 每

服<sup>三</sup> 二<sup>三</sup> 錢<sup>三</sup> 煎<sup>三</sup> 湯<sup>三</sup> 調<sup>三</sup> 服

柿蒂湯 治胸滿欬逆不止 柿<sup>三</sup> 蒂<sup>三</sup> 丁<sup>三</sup> 石<sup>三</sup> 入<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 五<sup>三</sup> 片

一方加參<sup>三</sup> 等<sup>三</sup> 分<sup>三</sup> 垂<sup>三</sup> 一方加青<sup>三</sup> 陳<sup>三</sup> 等<sup>三</sup> 分

羌活附子散 治吐利後胃寒欬逆 羌<sup>三</sup> 附<sup>三</sup> 炮<sup>三</sup> 苗<sup>三</sup> 微<sup>三</sup> 炒<sup>三</sup> 各<sup>三</sup> 半<sup>三</sup> 西<sup>三</sup>

木<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 各<sup>一</sup> 石<sup>一</sup> 入<sup>一</sup> 鹽<sup>一</sup> 捻<sup>一</sup> 水<sup>一</sup> 煎<sup>一</sup> 煎<sup>一</sup> 服<sup>一</sup> 一<sup>一</sup> 方<sup>一</sup> 無<sup>一</sup> 木<sup>一</sup> 有<sup>一</sup> 丁<sup>一</sup>

木<sup>三</sup> 姜<sup>三</sup> 各<sup>一</sup> 石<sup>一</sup> 入<sup>一</sup> 鹽<sup>一</sup>

大承氣湯 治欬逆大便秘者 方見傷寒門

厚<sup>三</sup> 心<sup>三</sup> 湯 治欬逆大便軟利者 連<sup>三</sup> 一<sup>三</sup> 兩<sup>三</sup> 為<sup>三</sup> 末<sup>三</sup> 水<sup>三</sup> 調<sup>三</sup> 下<sup>三</sup>

皂莢丸 治欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠

皂<sup>三</sup> 莢<sup>三</sup> 丸 治<sup>三</sup> 欬<sup>三</sup> 逆<sup>三</sup> 上<sup>三</sup> 氣<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 唾<sup>三</sup> 濁<sup>三</sup> 但<sup>三</sup> 坐<sup>三</sup> 不<sup>三</sup> 得<sup>三</sup> 眠<sup>三</sup>

皂<sup>三</sup> 莢<sup>三</sup> 丸 治<sup>三</sup> 欬<sup>三</sup> 逆<sup>三</sup> 上<sup>三</sup> 氣<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 唾<sup>三</sup> 濁<sup>三</sup> 但<sup>三</sup> 坐<sup>三</sup> 不<sup>三</sup> 得<sup>三</sup> 眠<sup>三</sup>

皂<sup>三</sup> 莢<sup>三</sup> 丸 治<sup>三</sup> 欬<sup>三</sup> 逆<sup>三</sup> 上<sup>三</sup> 氣<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 時<sup>三</sup> 唾<sup>三</sup> 濁<sup>三</sup> 但<sup>三</sup> 坐<sup>三</sup> 不<sup>三</sup> 得<sup>三</sup> 眠<sup>三</sup>

小紫胡湯 治陽證欬逆 方見傷寒門

凡傷寒發後有四證 中氣不足脈虛微氣不相續而發

脈者用補中益氣加桂枝散黃柏以除虛火或少加附子以愈

陽明內寒失下而發脈者大承氣下之 渴而飲水大過成

水結胸而又發脈者小陷胸湯或小青龍湯玉府加附

傷寒傳經 拙證誤用姜桂等熱藥欬逆者黃連解毒

白<sup>三</sup> 虎<sup>三</sup> 湯<sup>三</sup> 及<sup>三</sup> 竹<sup>三</sup> 瀝<sup>三</sup> 類

冬法 乳<sup>三</sup> 根<sup>三</sup> 三<sup>三</sup> 定<sup>三</sup> 直<sup>三</sup> 乳<sup>三</sup> 下<sup>三</sup> 寸<sup>三</sup> 六<sup>三</sup> 分<sup>三</sup> 婦<sup>三</sup> 人<sup>三</sup> 再<sup>三</sup> 乳<sup>三</sup> 房<sup>三</sup> 下<sup>三</sup> 取<sup>三</sup> 肉<sup>三</sup> 心

根 婦人屈乳頭向下尺骨間交叉及乳小者以一指為準

男左女右身乳相直同隔中動脈也

又氣海一穴 灸<sup>三</sup> 七<sup>三</sup> 壯<sup>三</sup> 直<sup>三</sup> 胸<sup>三</sup> 下<sup>三</sup> 一寸<sup>三</sup> 半





