

醫
法
明
鑑

丙

✕

i 40

F 3
イ-126

醫法明鑑卷之三

一眼目門



母 經曰諸脈者皆屬於目。得血而能視。

聖人雖言目得血能視。然亦有太過不及太過則目

雍塞而發痛不及則目耗竭而失明。故年老人多不

及年少人多太過。但年少人則無不及。年老人

間有太過。

有病或曰目昧不明。目赤腫痛。翳膜胬眦。皆為熱

或言目昧為肝腎虛冷者。誤也。

上虛則肝虛也。下虛乃腎虛也。肝虛則頭暈耳聾。

目眩。腎虛則生花耳作蟬鳴。天耳補肝益腎。

傳 丹溪曰。目病屬風熱。血少神勞。腎虛。

患 胞人風熱上壅。瘦人血少。養血加風藥。

傳 久病昏暗。熟地歸為君。養風甘菊佐。

暴發赤腫。芥風為君。以浮。連歸為臣。以養血。

養柴升。其甘為使。白睛紅加白芷。翳少許。

血熱壅痛。四物加膽已風。

肥人風熱上壅眼疼羞風利潤茶

瘦人目痛是血少兼熱歸生地酒洗玄參芎風荆菊

勞役飲食不節內障昏暗蔓參甘各各葛白芍栝

磁陰地黃丸治血弱陰虛瞳子散太視物則花

生地酒洗熟地酒洗柴酒洗天門酒洗冬甘酒洗枳酒洗地骨連酒洗五味酒洗各酒洗

參酒洗歸身酒洗苓酒洗右為末煉蜜丸茶清下婦人尤宜

益陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光

淨神酒洗生地酒洗牡山菜酒洗歸梢酒洗五味酒洗山菜

柴酒洗熟地酒洗右為末勿犯鐵器蒸搗煉蜜丸

如桐子太每服五十丸空心淡鹽湯下

地黃湯治眼久昏濛

熟地酒洗歸參苓連苓風酒洗各酒洗右水煎食後服

當歸湯補益腎水瞳子

歸身酒洗白芍酒洗連酒洗苓酒洗生地酒洗甘酒洗柴酒洗右

補肝散治睛上有圓翳眼中見之羞小陰也見之則太

視物不明乃肝腎俱虛也宜補肝腎

熟地酒洗白苓酒洗家菊花酒洗細酒洗各酒洗芍酒洗各酒洗栝酒洗甘酒洗

風酒洗各酒洗北柴酒洗右水煎

明目地黃丸治肝腎虛熱眼見黑花翳膜遮障等証

生地酒洗熟地酒洗各酒洗行酒洗膝酒洗各酒洗斛酒洗各酒洗枳酒洗各酒洗風酒洗各酒洗

杏酒洗右為末煉蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯下

定志丸治眼不能近視及能遠視者

地芝丸治目不能遠視能近視或亦妨近視

生地酒洗天門酒洗各酒洗枳酒洗各酒洗甘酒洗各酒洗右為末煉蜜丸

六味地黃丸治証同前

益氣聰明湯治飲食勞役脾胃不足內障氣鳴

春參甘酒洗升酒洗各酒洗葛酒洗各酒洗芍酒洗各酒洗栝酒洗各酒洗右水煎

臨睡熱眼近五更再服之得腫更妙如煩悶或有熱漸

加黃栝春夏加盛暑倍之如此一味多則不効

沖和養胃湯治內障眼脾胃元氣虛弱心火三焦俱

盛飲食勞役不得休息故為此疾服之効

木參 葛^{各一} 白芍^{各一} 白朮^{各一} 蔓^{各一} 五味^{各二} 右

還睛丸 治眼內赤澁有花或黑或白或紅
參 桔 芩 熟地 風 羌 事 知^{各二} 細 五 味^{各二} 玄 參^{各二}
右為末煉蜜丸

明目流氣飲 治風熱上攻眼目不明常見黑花多淚難開
大 礬 牛 芎 苳 白 蒺 細 風 玄 參 槐 芩 甘

蔓 賊 荆^{各一} 草 決^{各二} 蒼 蒼^{各二} 右為末臨卧湯酒調下

復明散 治內障 陳 玄 白 芎 蒼^{各半} 青^{各半} 羌 甘

生地 翹 柴^{各一} 不 苾 打 歸 身^{各二} 右水煎去粗稍熱服

忌酒醋濕麪辛熱大料物類

秘傳撥雲退翳丸 治內外障膜遮睛昏睛大効

實 枳 甘 蔓 芎 草 決 明^{各五} 芎 賊^{童便浸二宿} 玄 而 煨 乳

密 茨 花 荆 穗 地 骨 甘 菊 白 蒺 羌^{各一} 蛇 蛻 蟬

連^{各三} 川 椒^{各七} 煨^{二兩半} 右為末煉蜜丸食後臨卧

日三服 翳障未飲睛暗苦痛湯內障木香湯下

當歸龍膽湯 治眼中白翳

風 膏^{各二} 紫 菀 味 升^{各三} 甘 連^{各四} 芍 芩^{各五}

栝 瀉 炒 煨 身^{酒洗} 膽 酒 洗^{各七} 右煎去粗入酒少許熱服

若得同起活散 治久近內外翳障風熱昏暗倒睫等

毛 而 眼 疾 頭 風

羌 活 酒 洗^{治眉明} 蜜 麥 拍^{治眉明} 賊 退 翳^{治眉明} 芷 清 利^{治眉明} 細 乳 菜 子^{二味起}

麻 子 起 毒^{治頭} 芎 蒼^{治頭} 蒼 朮^{治頭} 芩 朮^{治頭} 甘 菊^{治頭} 荆 穗^{治頭}

膏 退 翳^{治頭} 葉 治 偏 頭 風^{治頭} 甘 毒^{治頭} 右各等分為末食後

臨卧蜜水調下茶清亦可日三服

明目細辛湯 治目赤微痛羞明怕風寒鼻塞涕唾相粘

芎 一分 生地 酒浸^{各三} 蔓 芎 歸 身 稍 白 朮 葉^{各四} 荆 穗^{各五}

風連 卷太陽 升陽明 柴少陽 生地 栝 苓 知各三

芎 右水煎食後服若苦疼則多用苦寒藥

本經 芎如睛昏加知栝

散熱飲子 治眼目赤腫

風 卷 苓 連 右水煎食後服大便秘加大黃

痛甚者加生地煖不得眠加枳 熱痛赤腫小柴

加大煖生黑豆

四物龍膽湯 治目赤暴發翳障不可忍

芎 煖 芍 地 各二 卷 風 各一 膽 已 各一 右

洗肝散 治風毒上攻目暴腫痛難開隱淚眵淚

苛 煖 卷 甘 太 風 枳 芍 各等 為末白湯調服

劉煎亦可

菊花散 治目赤腫痛麻豆傷寒後食熱物腫痛

苓 太 菊 甘 風 煖 各等 右

羚羊角散 治大人小兒風熱上攻眼暴赤腫生瘡疼

羚羊 芍 芎 甘 炙 車 各五 枳 煖 各二 決明 十兩

右為末食後白湯調下

潔古柴胡散 治肝風實熱頭疼眩眼赤心煩

柴 地 骨 云 木 玄 參 羚羊 甘 菊 赤 芍 苓 各一 各半 右

菊花散 治風毒眼目赤腫昏睛癢肉痛痒漸生翳膜

白 蔞 刺 卷 不見 賊 云 膏 蟬 退 各三 菊 各六 右為末

食後臨卧茶清調下

洗藥大青散 治暴風客熱目赤睛疼癢淚多翳膜

銅 青 各兩 姜 粉 各三 右和勻些少沸湯泡帛膏枳洗

造姜粉法臘月生姜切搗爛布按汁渣取粉陰乾

秦皮散 治風毒赤眼腫痛痒淚眵昏睛翳膜

秦 滑 連 各分 為末每用半錢沸湯泡去粗末熱洗

湯泡散 治風熱上攻眼目赤澁睛疼漸生翳膜

赤芍 煖 連 各分 右吹咀每用二錢用極滾湯泡末

煎洗冷再溫洗百六七次或加荆芥凡眼目之病血凝

氣滯使熱故以行血藥合黃連血得熱即散必執洗

之有效一方加風杏 煎洗 一方加滑細古文錢煎洗

一方截惡眼明琴如豆大 梳一不玄三味碎魚也并花水

一方治眼淚出不止黃連煎膿汁漬帛拭之

一方治晚不見物取鼠膽點之

常洗目法空心用鹽末搗齒漱口少時吐水於手中洗眼

令有明夜見細字

○點眼膏膏治肝經不足風熱上攻眼目昏睛疼痛羞明不能遠視迎風有淚多見黑花

傅 肥子一不手 研二去毒去油二面 右用生蜜六錢和勻點雙頭

退翳膏 治黑白翳 麩仁升各三 翹風青各四 煨身升各

可柴各半 荆穗水半 生地一不 連三不 右細末水一碗煎

至半椀去粗更上火煎半盞入荆灰水兩匙蜜少許再

上火熬勻磁器盛貯頻點之

光明母 治風熱上雍青赤腫痛及內外翳障等症

白灼甘石一兩以黃連半兩煎爛付去粗炭太 辰一不 鵬二不 軒五合

片腦三合多 腐一分 如赤眼腫痛加乳沒各五 內外翳障

加真珠半不 礞石二合 熊膽二合 桐油風眼加銅青飛丹

或以諸藥合為一治諸般眼疾右各研為極細末和勻再研

密封點眼極妙

一方治翳膜遮睛 雪白鹽用無砂者生研少許以大燈

草蘸鹽輕手浮點點入凡三次不疼切勿驚動心未用効

治飛絲入眼睛脹突出痛不可忍新等兩三管滿好等

更換頻運眼上飛絲纏等而出

又刮瓜甲上細屑筋頭蘸津點其絲自取拔去

又石黃蒲搥碎如飛絲傷左目則塞右鼻傷右目則

塞左鼻百發百中

一方治沙石草木屑不得出 以書中白衣魚鱗乳汁注

目中自出

治稻麥芒入眼 取蜘蛛以布覆目上持蜘蛛於布上

摩之其芒出着布上

傅 治倒睫拳毛木蟹一个玄殼為末綿裹塞鼻中

左目塞右目塞左二夜其睫自正

灸法

林

眼睛灸大椎下教第十節脊中三百壯以多為佳
三里治目不明人年三十以上不灸三里令氣上目不明
風翳灸手中指本節頭骨上五壯左患灸右患
灸左

耳
同卒生翳灸大指節橫文三壯左灸右灸左
小兒在眼夜不見物灸手大指甲後一寸內廣文
頭各一柱

小兒疳眼灸合谷二穴各一柱

傳

二耳病

經曰耳為腎之外候一曰腎通於數于耳一曰心通於數
于耳其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病
之餘腎水枯涸陰火上升故耳痒耳鳴治法宜浮南
方之太補北方之水無有不效者

患

厥聾必有眩暈 證流氣飲加苜蓿姜葱 方見氣門
風聾必有頭痛之證桂枝散

憂思傷心虛血耗而聾或鳴當寧心順氣 耳補鎮

傳

房事過度腎虛精竭而聾或鳴當生精補腎 內長

大病後及陰虛大動而聾者宜補陰降火當加栝
耳鳴宜當掃龍茶丸 方見癩病門

多飲酒人宜木杏核栝丸 方見氣門

耳聾以茱萸烏頭尖大黃三味為末泔調貼湯泉也
以引火下行

大補丸治耳鳴或聾 黃柏一味細切塩酒拌炒褐色為

末備水丸氣虛四君子湯下單虛四物湯下

滋腎丸治耳鳴耳聾 方見梅門

蔓刺子散 治上焦熱耳鳴而聾及出膿汁

炙甘草通赤芍藥 製麥門生地前甘草蔓

赤苓 各半 右作一服加姜三片大枣一枚

桂星散 治風虛耳聾

桂芍歸細葛通菝 木麻甘 各一 星 根

芷 各四 蘊 一 右入葱白煎食後服

地黃丸 治勞損耳聾

地坤芍桂兔絲椒 炒破 菝 炒 胡芦巴 炒

仲 炒 芷 各二 磁 燒醋淬七次水 右蜜丸葱白溫酒下

平補鎮心丹 治心氣不足精神恍惚夜多異夢及腎

氣傷敗足睡酸疼遺精白濁漸羸弱以致耳聾

熟地生地山天門麥門 栝子神 各四西一 辰 另研末

桂 炒各 葛 一升 遠 甘 羊 各五 歸 各 龍骨 西 右煉蜜丸

如桐子太每服三九空心飯飲或酒下 此方見証仲門

但無生地栝子結首歸龍骨有酸中耳鳴分令桂冬龍出

旋菴丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

菝 酒浸 山茱 石龍苒 葛兔絲 酒蒸 鹿茸 酒浸

菝解 磁 取醋淬 附 炮去皮胸 蝎 去毒二 麝 一

右煉蜜丸如桐子太每服七九空心鹽酒送下

清神散 治氣壅於上頭目不清耳常重聰

甘菊 蚕 炒去糸嘴 荆穗 菝風芍 通 各四 甘 冬

木 各一 右為末食後臨卧茶清調下

莖芎散 治風入耳虛鳴 芷芍 葛蒼 蘊甘

陳細朴 半 桂 通 各等 右入姜葱

葛蒲圓 治卒聾并耳內卒痛

葛附 炮去皮胸 右為末醋糊丸如杏仁太綿裹置耳

中日二易

治聾 草麻子 四十九粒 末由 十粒 入人乳搗膏石

上晒乾丸如梧子綿裹塞耳中

治聾 葛 可 巴 一粒 蝎 一个 右為末葱涎丸如蠶核

綿裹塞耳中或用生烏頭為末綿裹塞耳中亦効

治耳鳴草烏半生 蔓草蔓草 為末綿裹塞耳日三度

治聾耳 蔓草蔓草 右搗令分作七丸每用一丸綿裹

卧即塞耳

又以醇醋微大煎附子軟削令大塞耳

又雄黃硫黃等分為末綿裹塞耳

治久聾生鼠膽汁滴入耳中或生鼠腦綿包塞耳

或生鯉腦亦可

治聾耳 芥子搗令孔和綿裹塞耳

治耳痛及卒聾耳 杏七粒云 研綿裹塞耳

通耳法 緊磁石一粒如 穿山甲燒存性為 右新綿裹

塞耳中口中含小生飲一塊覺耳內如風而聲即効

一治久聾耳 蝸黃色小者 生薑如蝸太四十九粒

石二味為末作一服睡卧空腹溫酒調服一法向晚而

飲食酒調作一服至三更徐飲之量飲五更如耳中

聞教百葉音自聞

治耳聾耳中如風水聲或如鐘鼓聲

椒油去油 蔓草蔓草 松板各半 為末以蠟溶化同攤紙上

候冷捲作筒子塞耳內一日一易効

治聾耳用猫尿滴入耳中効取尿法用乾薑末擦於

治耳內痛用白鹽炒熱重帛包封耳邊四圍猫牙上其尿自出收用

治耳痛及聾耳 桑螵蛸炙黃末加麝少許吹耳中妙

治耳內大痛如有虫奔走或血水流出或乾痛不可忍者

蛇退炒存 細研以鵝翎管吹入耳中立愈

治耳痛以枯礬吹耳中

犀角飲子治風熱上壅耳內聾耳閉腫痛膿血流出

犀角通 玄參 赤芍 小豆 炒 甘菊 各三 右等煎服

風客壅塞膿血流出名曰聾耳

白礬 連 烏賊骨 赤石脂各等 為末吹耳中即効

明礬散 治壅塞氣滯或沐浴水入耳中為膿為水

枯礬 龍骨研各 黃丹煨一不 乳胭脂七分 麝少許 右

為末先用綿杖拭淨蘆葉敷於耳內

治聾耳底耳膿出不赤綠打土燒為 腐少許 右如前法

又方乾胭脂枯丸等分如前法又柘黄丹等分亦可

又方五倍子半两蝎一枚如前法

又方治耳中出血 龙骨为末吹入耳内

治聾耳膜不乾 香附末为末掺耳中白沫效

有虫入耳好滴少许灌耳中却起行自出又灌麻油可

又灌蓝青汁少顷虫出又灌雄冠血又滴小蒜捣汁

患至入耳用葱汤灌又用桃葉按細塞耳

又桃葉拭頭虫自鼻出 桃葉按作角子切有其頭入耳中 共虫代前中走出

治蟻虫入耳 猪肉一指許炙香置耳孔边即出

治蜈蚣入耳 生薑汁灌耳中並汁亦可即出

灸法 治耳聾耳鳴聽會冬五 在耳微前陷中張口得入

治耳聾耳痛翳風冬七 在耳後陷中按入引耳中

又耳門冬三 在耳前起肉當缺之前

鼻病門

傳 經曰鼻者肺之外候丹溪曰肺之為蔽其位高其体

脆性西寒又惡熱故好飲熱酒者始則傷于肺熱

久則見於外而為鼻鼈準赤之候得熱愈狂得寒

則黑此謂熱極也或解胃風寒始則傷于皮毛而成鼻

塞不通之候或為涕涕或流清汁久不已名曰鼻淵此

為外寒束內熱之證也原病或曰肺熱則出涕是也

選 河間謂鼻病悉屬平熱理固當然然鼻者肺之候

經曰形寒飲冷則傷肺溫散寒邪則氣自通

丹溪曰寒傷皮毛氣不利而壅塞麻黃桂枝類表

一熱壅清道氣不宣通以芥連施類清以

酒醑鼻乃熱血入肺四物加片苓酒紅苓酒陳耳

生薑煎調五灵脂末脈氣弱者等分外用山硫黃

入蘿蔔內壞乳輕白頭大醋調付或用勝黎付

酒瘡皆壅阻所致又有肺風不能斂而自生者非因酒

艷鼻息因乃肺氣感用材藥末胭脂綿裹塞鼻
數日自消

林 芎藭散 治鼻塞為艷 芎 桂 麻 桂 已通

細莖蒿 各一木 椒 甘 各各 右入生姜紫穗煎

似丁散 治鼻艷息因不聞香鼻俗呼鼻痔

似蒂 細 芋令 為末綿裹塞鼻中即黃水點滴三四日愈

一方通草附 炮 細 右為末煉蜜丸綿裹切鼻中

一方治久患鼻瘡膿極臭者

百草霜為末每服一錢食後冷水調服

治鼻齶 卑角炙末小豆許以竹管吹鼻中

又方乾姜末蜜和如皂子太塞鼻中

又方栝瓊為末猪脂和綿裹塞鼻中數日瘻因自出

治鼻中生瘡 搗杏仁乳汁和傳

藥全散 治鼻塞不通 葶 半兩 奇 三不 荆穗 三不

右為末煉蜜丸如櫻桃大每服一丸臨卧嚼化津嚥

高補散 治鼻塞不通 高 皂 芋令 為末綿包塞鼻內

辛夷仁細葉升芎通風 羌 甘 各 芷 各 為末食後

茶清調服

人參散 治肺氣上攻鼻塞不通

參 白 苓 苓 陳 去白 麻 去根 羌 椒 炒各 右煎食後服

溫肺湯 治鼻不聞香鼻多鼻涕 丁香 二分 風 苜 羌

炙 甘 各半 升 苳 各七 麻 一不半 右入葱白

離淨通氣湯 治鼻不聞香氣一切冷物及風寒涼坐卧

苳 四不 羌 獨 風 升 苳 各三 甘 各二 芷 麻 不五

椒 各一 石 海 眼 五 錢 姜 三 片 束 二 枚 葱 白 三 寸 水 煎 稍 熱 服

治鼻塞 麻鞋燒灰吹鼻中立通

傳 防風湯 治鼻淵腦熱淚下瀉涕不止久不愈成血

林 芩 參 甘 各 芎 門 各一 風 二兩 右為末沸湯調服

柳金散 治肺熱鼻塞濁涕 芷 細 風 羌 歸 身

芎 桔 陳 苓 各 入 生 姜 薄 芎 煎 服

以椒散 治鼻流濁涕 椒 炒 訂 環取 蚕 芎 桂

細木 手分 為末食後酒調服

傳 防風通聖散 方見中 加荷連 治頭旋腦熱鼻塞渴痰

祖傳 治鼻時流臭黃水甚者腦亦痛此有虫食腦中
絲瓜藤近根三五尺燒存性為末酒調服

疏黃散 治酒齆白鼻及女人白鼻上生黑粉刺

疏一不 輕少許 香 古个去反 為末香膏和作餅臨臥時鼻

次早洗去 法以白鹽布擦為妙

一方治赤白鼻久不瘥 大黃 朴硝 手分 為末水調敷患處

治鼻面酒齆 鷓鴣糞一合研臘月猪脂和每夜敷

治酒齆馬蘭子并花杆爛時

治鼻準赤 新銀香嚼爛敷不過五七次復回

灸法 治鼻齆

額會一穴 灸七 入髮際二寸

通天二穴 灸七 在承光後寸 灸後鼻中必出臭積一塊方愈

上星一穴 灸七 入髮際一寸 治鼻塞不聞香臭

風門一穴 灸七 治血不止及清涼流

傳



附舌

肝熱則口酸 心熱則口苦 脾熱則口甘 肺熱則口辛

胃熱則口鹹 又有口候者胃熱也 外有謀慮不決

肝移熱於膽而口苦者亦有脾胃氣虛弱木乘土

位而口酸者或膀胱移熱於少腸腸腸不便上為口

糜生瘡

肝膽有實熱口酸而苦小柴胡加甘膽青甚者用

當歸龍薈丸 方見癩病門

心熱而口苦或口舌生瘡黃連厚心湯 連生地知母石等分水煎

牛黃清心丸 方見中風門 涼膈散 方見傷寒門

脾熱而口甘者 三黃丸 方見傷寒門 平胃散 方見內傷門

肺熱而口辛者 甘桔湯 厚白散 方見喘急門 金沸草散

金沸草散 三不 荆 四不 麻 前 各 三 不 甘 各 赤 芍 手 各 不 右 各 二 貼 五 三 片 末 一 个

腎熱而口鹹者 滋腎丸 方見內傷門 大補陰丸 方見虛損門 滋陰養血丸 方見內傷門

謀慮不決 肝膽虛而口苦者 參遠神甘為柴

謀慮不決 肝膽虛而口苦者 參遠神甘為柴

醫者甚者錢氏地黃丸 方見

益勝湯 治謀慮不決肝膽虛氣上溢則口苦

芥 去朽 甘草 各一桂半 苦參 神各三 遠志 十分 右水煎

龍膽湯 治口苦名曰膽痺

柴一不 甘草 天門 連膽 枳 麥門 知味 各五分 右

導赤散 方見 治膀胱移熱於小腸上為口糜水煎

調五苓散服 方見

柴胡地骨皮湯 治證同前及治心胃壅熱水穀不化

柴地骨 寺 右水煎食後服大便安加大黃

甘露飲 治胃中客熱齒齦腫痛及口舌生瘡咽喉

腫痛 枳 去毛 熟地 生地 天門 枳 炒 茵 麥門 芥

解 各一分 右水煎食後服

升麻湯 治上膈熱毒口舌生瘡咽喉腫痛

升赤芍 參 桔 葛 各二分 甘草 一分 右分三貼入薑 三片

水蘼圖 治口舌生瘡

礪 諸者 藥 苛 各子 生蜜丸如彈子太每服一丸含化

治口舌生瘡 牛膝酒浸令勻無痛者含牛膝 行

治舌生瘡胸膈痛 豆豉炒為末含之宿瘡

治口瘡用好酒煮黃連汁呷下即愈

凡口瘡服涼藥不愈者加中氣不足虛火炎上用理中湯

及治之甚者加附子或用官桂含之亦妙

治口瘡 細辛 黃柏 蜜炙 右等分為末搽舌上即愈

治口瘡 野薑 薇花根 煎湯漱之 一云白薑 薇

治口瘡及咽喉腫痛 蒲 代 鵬 煨 生 甘 等分

為末付咽喉腫痛鴨管吹入

祖傳治舌腫太塞口不通飲食者 真蒲黃 一 頻刺

舌上自退若能嚙菜以黃連煎濃汁細呷之效

治口瘡生白瘡末貼之極效

柳花散 治口舌生瘡 延 二 栢 連 各半 蜜 陀 僧

代 黑 各二 右為末少許貼瘡上津液吐出再用

萬金散 治遍毒上攻口舌生瘡 細 連 等分 為末吹

口中蘸水洗淨口舌瘡即愈

胡黃連散 治口糜生瘡 胡連半斤 黃連一斤 細三斤
連三斤 右為末少許貼之有涎吐之瘡

綠雲散 治口瘡爛鼻久不瘳 栢五斤 付三斤 右
為末臨卧搽之神妙

又五味一斤 滑栢三斤 為末搽於舌上亦可
又明礬半斤 栢三斤 為末傳患處吐去苦水再傳

必効散 治口糜明礬大黃等分 為末臨卧乾搽涎散
又朴硝一斤 寒水石一斤 硃砂少許 甘草半斤 為末搽患處

治口瘡發熱腫連唯 蘿蔔自然汁含漱神效
一方生薑自然汁漱亦可

水火散 治口瘡 乾薑 黃連等分 為末乾搽涎出為妙
一方甘草 白礬等分 為末搽口內

一方膽礬半斤 銀鍋內火煨通赤放地上出火毒衣細研
少許傳瘡上吐酸水清涎

龍石散 治上膈蘊熱口舌生瘡咽膈腫痛
寒水石一斤 腦半斤 為末少許搽患處

治口瘡 為末搽之 又煨燒灰存性為末入輕粉付
治熱壅上攻舌生瘡 吳茱搗爛傳脚心

匡散 治血熱舌忽然腫硬 釜底煤醋調傳舌下
脫去更傳先能出血竟傳之尤佳 法用塩等分 調

治重舌 五貝脂末醋一椀同煎旋漱之安
治舌腫脹 鵬砂為末薄薑片蘸茶搗腫漸消

法參升麻湯 治脾壅熱舌上生瘡末舌重舌腫
或連頰腫痛 玄參 赤芍 升 犀 屑 桔 苓
管仲各一斤 右作一貼生薑一片煎食後服

治重舌喉閉 朴硝 白礬 為末搽入口中
治重舌五貝脂二斤 為末末醋一椀煎含漱

一方朴硝二斤 黃丹一斤 為末搽之

薄荷煎 治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞
荷二兩 甘草二斤 芎二斤 腦半斤 右煉蜜和成餅嚼服
一方玄腦加桔

蒲黃散 治舌忽然腫硬或血出如漏

烏鰂魚骨 蒲切各 為末傅舌上

治舌上血出 香薷煎汁飲數盞瘥

治舌無故出血名曰舌衄 槐花炒末乾摻舌上

丁香香圓 治口臭穢

丁香各 芎各 甘草各 芷各 煉蜜丸彈子太綿裹含嚥

三升乳甜似子末蜜丸如櫻桃大每日漱口了含一丸

治口臭及匾齒腫痛 細辛煮濃汁熱含冷吐之

治口臭香薷一把以水一斗煮取三升稍冷含嚥

訶子湯 治失音不語 訶四不半生 桔一兩五小

甘草二寸半生 右分二貼水一盞童便一盞煎食後服

玉粉丸 治冬月寒痰結咽喉語音不出

桂一字 草烏一字 半五不 為末薑汁浸蒸餅丸如雞

頭大每服一丸至辰含化多年不愈者亦効

御音勝破笛丸 治歌謳失音不語者

翻桔甘各二 芎四 訶肉炒各一 縮太西 芎西 芎西

百葉煎三兩 為末雞子清和丸如彈子太每用丸臨卧含化

一方治失音不語 百葉煎五皮 百合等分 訶肉等分 薑等分

石為末雞子清和丸如彈子太每用一丸臨卧含化

一方香五皮 桂等分 槐等分 為末煉蜜丸如彈丸綿包含嚥

一方訶曰江茶湯點白芎中生入香油三滴良臨時之

時來担服聲音漸自通揚

又槐花瓦上炒令香夜到三更仰卧床拍取花來如

意食明朝聲響漸琅々

寫黃飲子 治風熱在脾經唇燥潰裂無色

荖升枳 麩炒 芩風 半斛 甘各三 右各 煎

慈按仁湯 治風熱在脾唇口咽動或生結核或為浮腫

薑炒 已小豆 寸各 右各 煎

白布散 治唇緊口小不能開令飲食不得不急治則死

名曰緊唇又名瀋唇用白布作疋 如指太女斧刃上燒

令什出取敷唇日三度向青布亦佳或青布燒灰滴

調二錢服亦可和猪脂調敷佳

一方生馬齒苋濃煮汁洗冬月用乾者

方 散魚甲及頭燒灰作末傳心。一市治緊唇動喘傳
治唇上生瘡連年不瘳用八月藍葉一斤搗汁洗
治口吻瘡 掘經年艾根燒灰傳心妙
又栴檀燒灰細研傳患心妙
灸法

治緊唇不能開合灸虎口男左女右
一法灸承漿三壯在頤前下唇之下穴中

五咽喉門

原病或曰喉痺不仁也俗作閉由閉塞也

內經言喉痺則咽舌其兩間耳然其病同於太故
不分也後醫者各詳其狀強立八名執氣上行傳
於喉之兩傍近外腫作以其形似是謂乳蛾一為單二
為知其以乳蛾大小者名咽喉_單為_單扭結於舌下復生一
小舌子名曰子舌脹結於舌中舌為之腫名曰木舌脹
木者強而不柔和也扭結於咽喉腫遠於外直麻且痒
腫而大者名曰纏喉_單喉_單痺暴發暴死者名曰走馬
喉痺此種_單者雖詳若不歸之太則相法遠今之醫
者皆有其業至走馬喉痺何待此乎其生死及掌之間
耳無如砭針出血

傳

其會厭之兩傍腫者俗謂之乃乳蛾易治一過腫者
謂之單乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳
火者痰之本痰者火之標火性急速故病發則暴悍
治之法必先大湧其痰或以鉞鍼刺其腫如此急則治

種之法也。用茶者必以內種從治之法。而以桔甘去參。
升風起劑。參、木、苓之類。少加姜附。茶為嚮導。
徐、頻、不可頓服。此為治之大法也。切不可驟服寒涼之
藥。徒益其寒。而且促其死耳。俗人未諳此理。而峻用茶。
連頓拍之類。而平治之。腫勢稍退。為獲効。殊不知上禁。
除中寒復生。

銅人中亦有灸法。然痛微者可用。病速者恐遲。則殺人。
故治喉痺之灸。子救火同。不容少待。

巢氏病源云。脾胃熱。其氣上衝。喉咽生瘡。
懸癰。但在臍。臍內暴腫。閉塞。喉嚨亦如喉痺。

柑桔湯。治喉咽腫聲不出。桔五不甘西。右水煎。食後服。

一方治喉痺。并時疫毒。桔甘升。翹風牛。茶兩炒。
石水煎。食遠細飲。服。

中葉子湯。治風熱上壅。咽喉室塞。或痛或生瘡。

中玄冬。升桔。甘。厚。通。芥。各等。右。

敗毒散。方見。治證同前。加芥。半劑。倍桔。痰盛加石膏。

解毒雄黃散。治纏喉風。急喉痺。牙關緊。急者。有人事。

并小兒喉。龍赤腫。發熱。痰涎壅。口並且服。方見。
玉輪匙。治風熱喉痺。及纏喉風。

煇硝兩。礬五不。蚕二不。腦一字。右研。白。少許。吹喉中。

正聖散。治纏喉風。急喉痺。

鴨嘴膽礬。白礬五不。右為末。少許。吹喉中。立驗。

經散丸。明礬。白梅肉。等分。丸如皂子。大含。牙緊。擦入。

白礬散。治纏喉風。急喉痺。明礬三不。巴三不。作六辨。右將。

礬。豆於鉢內。慢火熬。為水。候氣去。宜取礬。加輕麝。各少。

許吹喉。

通關散。治咽喉腫痛。水穀不下。青鹽三不。枯礬二不。

礬一不。右為末。少許。吹喉內。有涎。吐出。二三。次。腫自消。

吹喉散。治咽喉腫。雄礬。礬等。右為。

末。少許。吹喉中。

奇方。治喉痺。射干。新者。搗爛。取汁。吞。或用。末。醋。同。

研。取汁。含。引。出。涎。更妙。

言治喉風急喉痺 陳白梅去核入膽礬在內綿裹含之 患白梅珊瑚亦良

一方治走馬喉痺 喉腫 馬鞭草根研自然汁含之

一方治喉痺 喉皮寸合而服 或煮豉汁含吞之

治急喉風牙關緊閉 巴豆去殼紙包去油在紙上以此紙作紙捻點穴吹滅以煙薰鼻中即時口鼻涎流牙關遂開

治急喉閉 皂角去皮子生半兩為末少許以筴助頭點腫

必更以醋調末末傳項下頂更使破少血出愈

治喉痺 牛蒡子六分 馬蘭子八分 為末空心暖水調下

治喉腫不下食 生韭研爛敷喉項下

治喉風 生白礬末冷水調二錢下

治喉痺初起腫痛 硼砂含津嚥之

通關飲 治喉痺腫痛不能言語者 參木苓各一分

荆苜苒炮各一分 瓜七分 桔二分 寸各一分 或加附炮一分 右水煎徐服之

煎徐服之 一方云不冬夏皆加黍稷名刺腸腸治喉瘡

治咽喉痛腫 荆穗 湯身 桔甘各一分 右水煎溫漱而服

有熱加芩枳 刺少高出血立愈

喉乾燥痛 四物加桔荆知柏立已

治纏喉風 燈心草燒灰吹入喉中

治喉痺 鴨嘴膽礬三分或半 為末吹喉中吐痰而愈

一方新取艾葉杆汁灌入喉中即愈

又方蛇床子有嘴瓶中燒令病人以瓶嘴布口中吸煙盡

治喉痺及喉中熱痛上好消梨杆汁頻飲之自嚼

下亦可多食為良

桔梗湯 治熱腫喉痺 桔甘 薤白 芍藥 石夏 竹葉

治走馬喉痺 巴豆去殼綿裹隨左右塞白鼻中左右

俱有者用二枚立透

誤吞穀芒刺在喉中 芝麻炒末湯點細細呷之

喉痺心腹腰肢痛者難治

六牙齒門

傳

。牙齒者胃之標骨之餘也。足陽明胃之脈絡上銀
。手陽明大腸之脈絡下銀。手陽明惡寒飲而喜熱飲
。足陽明惡熱飲而喜寒飲。故其為痛有惡寒惡熱
。之不同也。開口呷風則痛甚。為腸胃中有風邪也。閉
。口則穢臭不可近。為腸胃中有積熱也。或痛而齒動
。搖或痛而齒侵蝕。大抵齒銀宜露而動搖者腎元
。固也。治宜滋陰補腎。增寒惡熱而口臭穢者胃氣
。也。治宜安胃降火。風邪齒蝕之証。蓋因熱生風而風生
。也。腸胃之太既平。更以擦牙誅毒之藥。以治其標也。

風

獨活散 治風毒牙疼牙根腫痛

獨芎 羌 風 各半 細荊芎 生地 各二 右水煎漱

定痛散 治風牙立効 芫 川烏 各一 細 乳 各一 右為

末 每用少許 擦牙吐涎 須更以鹽湯漱灌

烏辛散 治風牙疼 細辛 草烏 各等 為末 先以水漱

而淨 少許 擦患處 一方 加川椒

細辛散 治風牙疼 腮頰浮腫 紅椒 貳 縮 牙 皂

撮 各五 荊穗 細 各二 芫 草 烏 各二 右為末 少許 頻 搗

患處 有涎吐下 仍用鹽湯漱

止地散 治風蛀牙疼 腫疔 銀爛 宣露 出血 口氣

歸 葉 地骨 風 芫 槐 炒 芎 甘 牙 細 各等

右為末 每用一字 搗之 痛甚 取三錢 加黑豆 半合 薑三片

水一盞 半煎 七分 溫 漱

一方 治風牙疼 芫 硃 二分 煉 蜜 凡 如 櫻 桃 太 擦 牙

如神 散 治風 虫 牙 攻 住 疼 痛 牙 齒 動 搖 連 頰 浮 腫

椒 炒出 蜂 房 各分 右為末 水煎 熱 漱 即 止

一方 治風牙 虫 牙 疼 椒 細 風 蝎 荆 獨 各等 右

水煎 熱 漱

一方 治風牙 芎 膏 升 細 草 烏 芫 風 羌 各分

右為末 擦牙 單方 用 鶴 風

一方 升 細 膏 葶 藶 皂 各等 腐 少許 擦 牙

風牙 不 怕 冷 熱 宜 用 皂 蚕 蜂 草 烏 等 藥

寒。寒牙拍熱湯宜用。良撥細等菜。

。尚芷散治大寒犯腦牙齒疼痛。麻草葱各一。升各一。菜各一。芷各一。歸熟地各半。薑三分。枝三分。菴一分。右為末先用溫水漱淨以菜擦之。

。丁香散治牙疼。丁撥蝎梢大椒等。為末擦患處身。一方草葱芷細草烏丁蝎梢。右擦牙。

。一方升。歸前細撥芷荆穗等。右為末瓦盒貯。緊閉勿泄。每用少許擦痛處。後以荆艾湯漱。一方升。治牙疼。草撥為要菜也。

熱。熱牙拍冷宜用。牙硝。姜黃。雄荆等菜。

。驅毒飲。治熱毒上攻。宜露出血。牙齦腫痛。

。屋遊即瓦上青苔洗淨。右水煎。渣清入鹽一撮。頻漱。

。犀角升麻湯。治陽明經受風。熱口唇頰車連牙腫痛。

。犀七升。升五升。風各五。芎各二。苓各一。白附各二。甘各一。

。右水煎。食後飲服。

。薑黃散。治牙疼不可忍。姜黃細芷等。為末擦牙。

。頂史吐涎。塩湯漱口。又治牙疼。面赤腫云。姜黃芎等。之功。

。清胃散。治因服熱菜。齒疼引頭腦滿。面發熱。喜寒。急煎。

。羌酒浸。連酒浸各。牡牛。升一。右水煎。食遠冷服。

。神功丸。治多食。肉口臭。牙齦疳蝕。肉軟。脫牙。落血不止。

。蘭香草如無香者。歸身。蒼木各一。生地酒洗。生甘各三。

。連酒洗。縮各五。右為末。湯浸蒸餅丸。白湯食。遠下。

。祖傳。治胃有寒。熱齒痛。涼膈散方見。傷寒。以大黄酒煮為。

。君加知。膏升。為佐。頻含。愈。

。蛀牙。必有。數。宜用。雄黃。石灰。等菜。

。砂糖丸。治蛀牙。石灰為末。砂糖丸。如黃末。太塞。蛀孔。

。一方。柘丸。滴乳。二味。為末。同蠟。溶化。丸塞。蛀穴。

。一方。川椒五十粒。巴一枚。右飯丸。如豆。太綿。包塞。蛀穴。

。治虫牙疼。藜芦末。塞孔中。勿令。汁。

。又雄雀。薰。帛。裹。塞。蛀孔。日。三。次。易。之。雄雀。糞。直。者。是。

。治虫牙疼。鶴虱。以。醋。搗。爛。入。塩。少。許。敷。之。良。久。吐。出。又。冷。

。治虫牙痛。嚼。薑。陸。香。其。行。痰。

○又雄黃末蜜丸如東核塞牙間

○又苦溫蒼末先以鹽揩齒令淨傳少末於上

○又杏仁燒煙末研如膏物果內孔中

○又新掘李樹根取白皮細切水浸濃汁含之良久吐去

○治風虫牙疼霜殺灰絲似燒存性為末擦之効

○又高蒲切片抵痛牙如咬定

○虫食齒根齒黑者以松木灰搗了末雄黃塗根上百日効

虛

○安腎丸 治腎虛牙齒腫疼

菴酒浸 桃去皮末 木補炒 山斛白痰 蘇炒去刺

川烏去皮 巴戟去毒 右為末煉蜜丸空心鹽湯送下

○官氣牙散 注顏補腎牙固齒

青鹽細 芎酒洗乾 右為末少許清晨擦

○牙漱浦口連葉噉之

牙

○牙牙石燕子散 治斷肉不固及腎弱齒疎或血出侵蝕

青鹽研 腐研各 石燕子十對大蝦蟇碎七遍 右合研末每用

半錢以指蘸葉擦斷上合口少時後溫酒漱噉不噉亦可

○治牙根動鬆脫 生地黃剉帛裹着牙上唾之漬齒根

三五次噉之十日効

○堅齒菜 黑鉛半斤砂鍋溶化入桑葉皮灰 右每日早晨

搽牙溫水漱在盂內以水洗眼能明目髮鬚皆治牙齒動

搖疼痛大能寧牙

○擦牙散 牙牙 芎 風 升 細 荅 苳 搥 甘 松

香附各一 膏二 右為末少許擦之

○三方 治牙疎陷物 寒水石煨 煇甘石生 等分為末少

許擦牙忌用刷牙脂麻茶物

○番鹽散 常用治牙去風熱宣露一切齒疾

香附炒 青鹽中 右為末擦牙

○治諸般牙疼 香附 生艾葉等分濃煎湯漱之

○三方 柘瓦 蚌房等分為末煎湯含漱冷則吐去再含

○三方 苋菜梗燒灰為末擦牙上

○三方 茄蒂燒灰為末擦之

○三方 烏夜眼燒存性為末敷上立愈

諸痛

一五蒼耳子水為汁煎合之莖葉亦可合鹽亦可

治一切風牙虫牙疼痛不可忍者 檄良草烏

芎加胡椒為末酒糊丸一丸咬在患處有涎吐之愈

治牙疼 磁子屎丸桐子末用疼牙上咬之丸消愈

治風熱上攻牙齒疼痛 稀荻草霜後收曬乾為末

末每用三不以滾湯泡漱之醋煎尤妙

治牙根宣露每旦以鹽末擦牙後用湯漱之百遍其

牙自牢密

治齒腫痛及口氣細辛煮濃汁煎含冷吐出

治卒齒痛 苦竹皮一頭二頭得付多搗為末

治諸牙斷疼 杏仁百枚去鹽方寸水一升煎令味出含之

立效散 治牙疼微惡寒飲大惡煎飲

細三分 炙甘 中十分 風一不 勝 酒洗 右為末水煎去粗

以匙抄在牙疼處得少時則止如多惡煎飲更加勝一不

如惡風作痛加葱連 勿加勝

牙疼諸菜不効 甘草煎濃汁含嗽五日愈

傳

治走馬牙疳如神 乾薑末 枯丸等 為末付之即愈

小兒走馬牙疳床一奇腐爛即死此方神効

婦人尿桶中白垢 銅綠三分 麝一分 右末付之立愈

取牙菜 草烏 檢 各一 椒 細 各三 右為末少許搗患處

其牙自落

地龍散 治牙痛宣露出血 地龍 延 檢 為末

綿裹隨左右痛處耳內塞之

治一切風腫虫牙疼痛以草量手中指至掌後橫

文止將草折為四分去三分將一分於橫文後量臂中

灸三壯隨左右灸

灸法兩手交叉中指灸七壯 是列缺穴也

又灸肩髃七壯隨左右在肩端兩骨間隔中拳臂取

又灸耳垂下盡骨上三壯未効再加壯數

治口齒蝕生瘡斷痛 承漿一穴灸三壯

上淋痛灸足三里二穴七壯 足陽明經

下淋痛灸手三間二穴七壯 在手大指次指本節後

內側隔中手陽明經

七髮病門

惠 五神還童母 仙家傳授華髮明目延壽

赤石椒辰神乳各一右為末末肉丸如梧子太每

服三十九空心溫酒下

林 治白髮 烏麻九蒸九曝為末以車真膏丸服

還精也 治白髮極効 燒已髮合頭指寸分丸如大

惠 豆大每服三九令頭不白

治髮落不生 側柏葉陰乾為末菜油調塗

治無髮 甜瓜葉搗汁塗之即生

八痔漏門

選 痔漏者肛門內外有瘡是也 或漏不破者曰痔破

潰而出膿血黃水淋漓不止者曰漏

惠 諸痔出血肛門間別有小穴數下如血線不與便物共道

久不愈必至穿穴瘡口不令漏無已時此變為瘻也

腸風臟毒痔瘻同出而異名久則淫蝕腸頭濕腐

下畏致虫是也 治法當化虫

傳 丹溪曰痔病因風熱燥滯于大腸也 治血為主大法用

芩京大腸參連生地槐角涼血生血當歸和血芍汁

枳實腸

漏瘡先用補氣血藥 參芪歸木為主大劑服之 外以附子

為津液和作餅如錢厚以艾多灸之 令灸做熱不可令痛餅

乾即易之再灸又以補氣血藥作膏日貼之

秦光尾治漏 治痔漏成塊下垂不任其痒

差各一分 艾各一分 風七分 升各一分 甘草各一分 麻柴各五分 葶膏各三分

細紅各少許 右煎服忌寒風大小便

秦花蒼木湯 治痔核已破謂之漏大便秘結必大痛此濕
 熱風燥而氣合而為病 尤桃云臣 皂仁燒存性 蒼朮未用
各七 栝四五 澤四五 歸四五 栝三五 枳三五 大三五 右除栝
 枳三五 皂仁三五 煎入栝桃皂仁再煎空心熱服待少時以
 鴨腫之不以冒氣也服藥日忌生冷硬物及酒濕麪椒薑等
 秦花當歸湯 治痔漏大便結燥疼痛
 大四五 枳四五 澤四五 歸四五 皂仁三五 木三五 紅三五 許三五 桃三五
 右煎服忌如前

秦花防風湯 治痔漏大便時發痛如高痛者非痔漏也
 尤風 歸三五 木三五 各一 多甘 澤三五 栝三五 枳三五 大三五 陳三五
 柴三五 牙三五 桃三五 紅三五 許三五 右煎服避風忌房事酒麪
 當歸 郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛
 郁 皂仁三五 實三五 尤麻 歸三五 栝三五 生地三五 蒼三五 木三五
 澤三五 右除澤為末水煎去粗入皂仁空心服忌如前
 紅花桃仁湯 治痔漏紅年
 栝三五 生地三五 澤三五 枳三五 蒼三五 栝三五 漢三五 巴三五 風三五 栝三五 猪三五
 麻仁三五 紅三五 許三五 桃三五 右水煎稍煎服忌如前
 七聖丸 治大腸疼痛不可忍 卷二 郁二 湯二 浸二 去二 皮二 尖二 大二 枳二
 栝二 桂二 木二 芍二 右為末煉蜜丸白湯下微利而愈而不
 可多利其痛滿甚

秦花白木丸 治痔漏有膿臭便燥硬疼痛不可忍
 尤桃云臣 皂仁燒存性 栝三五 枳三五 澤三五 實三五 枳三五 木三五
 地榆三五 右為末麩糊丸如雞頭實太令光澤焙氣五
 十九空心白湯下待少時以姜膳壓之忌生冷菜硬物
 酒濕麪辛辣大熱

番散丸 治因而飽會腸僻為痔久而或漏速治未愈也
 木三五 栝三五 酒三五 洗三五 荆三五 穗三五 各三五 枳三五 枳三五 連三五 二三五 西三五 胃三五 皮三五 二三五 个三五
 右為末麩糊丸如相子太每服三五丸白湯下日三服

五痔散 諸痔不向冷熱內外並治
 驚醋浸 蟬皮 對研 猪甲 後蹄 者對 蚌房 炒各 蛇皮 一五 錢五 炭五
 炙焦 虫炒 焦焦 猪甲 何炒 焦焦 蚌房 炒各 蛇皮 一五 錢五 炭五
 右為末入麩少許每服一錢半食前米飲調下
 收痔丸 諸痔通用 膠連 貫衆 西各 盈不 皂角 去核 殼殼
 滿焦 焦焦

蝟炙蜂炒焦 蛇皮炙 皂刺炙 穿山入煎
猪鬃蹄击甲炙已上 芎藭各二 槐各二 右为末醋煎
糊丸如桐子大每服十丸調氣用枳殼散吉見 消血逐邪
煎湯下食前服

乳膏湯 治酒痔 葛根炒 半苓 生地各 芩
各二 右每服五錢黑豆百粒姜五片白梅一箇煎服

猪甲散 治諸瘡 猪鬃蹄击甲炙 右为末陳米飲調服

橘皮湯 治疔瘡 陳枳殼炒 芎藭炒 槐炒 枳木 桃炙
蘊連各 甘草各 右入姜煎

逐瘀湯 治痔漏 地榆 瘀血作瘀 通利大小腸 取下黑物
芎正 生地 赤芍 五灵松 膠炒 苓 菽 神通
生芩各 大桃各 右每服八分姜三片蜜三匙水煎服

地榆散 治痔瘡 腫痛 地榆 枳殼 芎 芍 赤芍
槐各 白欬 蜂房炒 甘草各 右水煎

皂刺丸 治痔痛而復痛 皂刺二 槐二 白礬各 白蔞各
松各 風槐各 蛇床各 蜂房各 五倍各 右为末

醋調菜之粉为糊丸以練根煎湯下仍用童子豉和入
白礬末洗肛門

芎歸丸 治痔下血 芎 歸 葛 枳 地榆 槐微
膠炒 荆穗 木賊 頭髮燒 右为末煉蜜丸米飲下

間腸丸 服此以防肛門急燥 故無後痛而已
松各 太 歸各 右为末煉蜜丸空心白湯下

槐角丸 治腸風下 痔痔脫肛 服此除根
槐角炒 地榆 枳 苓 風 松炒 右为末酒糊丸

如桐子大每服三四十九丸米飲下殺虫止疼痛

神應正母 治腸風痔漏 疔痛 多生硬核 此疾多人外
塗殊不知病在腸臟 有至去根易愈

蝟皮剉 牛角腮各 猪鬃蹄百 槐角 雷 脂麻各
亂髮身 敗棕各 練各 右咀碎用瓦罐燒存

性为末入乳香各 麝香各 研合和勻酒糊丸如桐子大
每服五十九先細嚼胡批一枚以溫酒吞下日二服甚為三

服宜心切忌別菜

地黃丸治五痔遺陰地兩魚熱一槐角炒栢炒仲炒

西各一山菜山菜各八得各八牡各八艾各八白附各二

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米湯送下

○治五痔蒼耳葉葉端半日採陰乾為末空心水服方寸匕

○煎法凡用粘痔末後及大小便向肉疼如針刺及痛上腎

根今大將衣物木上烘令熱煎痛參五次痛立止衣物二字一本作故綿

又治痔初起痛痒不止以白己穿四匙鞭底烘熱頻煎

冷則再烘其痒即止

又煎痔頭出或痛不可忍煎散於爐反中燥煎六枚

立定灸即愈

○洗痔方槐荆栢艾等分水煎入白礬重洗

一方白礬末洗熏栢散末煎湯重洗亦可

一方連苓荆麻側柏葉槐條鏡面草等分珂蝦草水煎洗

一方用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸七壯

治腸痔大便常下血葱白三五斤煮湯盆中坐洗立瘥

一方煎菜湯重洗

節

治痔瘡風腫疼痛胡麻子煎湯洗之腫即消

又五倍朴硝桑寄生蓮房煎湯先薰後洗

○塞菜炒甘石牡蛎煨為末付

又木薑五倍為末付

治痔腫痛鵝牛法乾為末付或香油浸鵝牛餘而以其

油塗之亦効

數葉鵝牛膏鵝一枚腦腐少許搽之覺合感次平取

付付不用腦亦可

一方熊膽腦子研并衣水調以雞翎拂痔上

一方寒水石朴硝末津調手搗藥末敷痔上

治腸痔下部如虫齧蠟皮及末生油和傳

治痔殺道痛杏仁炒焦研膏敷

治痔發疼痛大棗一枚剝去皮取水銀膏中以硃研

令極盡傳末紙上內下部瘻

治痔痛枇杷葉塗蜜炙同烏梅肉搗爛先用烏梅

枝煎湯洗後敷藥痔上

痔直頭如雞冠者黃連末傅之更取豆末尤良

治龍花痔馬齒莧一斤燒灰細研傷脂調敷

治漏蜂房一握炙為末每用一錢臘月搗脂調敷

又龍骨煨去軟石膏同上芷黃母等分為末搗瘡口

治痔漏膏一兩血竭半兩為末少許貼患處

漏瘡血水不止蛇皮炒焦五倍龍骨各二續五為

末入鹽少許津唾調傅

痔久不瘳用熊膽塗神效一切方不及

○灸法治五痔對臍脊骨上灸七壯

又治五痔便血灸長強穴年壯在脊窮骨上

一法治痔疾大如胡瓜貫腸頭熱如燔火發則僵仆

以柳枝濃煎湯洗之次灸其上三五壯若覺一道熱

氣入腸中大得鮮血截惡一時許甚痛得後乃愈

九損傷門

墜墮跌撲損傷金瘡竹木刺傷大傷大受貓咬鼠咬蛇傷馬咬人咬蜈蚣傷蜘蛛瘡蚯蚓咬氣蚊骨類

從其諸下敗血凝流從其所屬入於肝逆所行之血

氣以破血行氣藥治之

肝膽之經俱行於腋下屬厥陰少陽沈血者肝之所藏

故惡血必歸於肝法當以柴胡引用為君佐以破血之

藥治之

墜墮打損皮不破而肉損者必有瘀血金刃破皮出

血或七血過多三者其治不同有瘀血者攻利之七血

者兼補而行之

宜先逐瘀血通經絡和血止痛之系然後調氣養

血補益胃氣則無不効

凡傷重者未取損藥先服氣藥加向氣散之類

凡治損傷妙在補氣血俗工不知惟在速効多用自然

銅以接骨然此藥必服煉方可服新出者其毒

子毒相相相扶者熱藥毒其燥散之禍甚於刀刺也

治跌撲損傷用穩木以活血黃連以降火白朮以和中

戒

童便煎為妙在下者可下癰血但先須補托在上者宜
飲此汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但
一絲血入心即死

凡打撲墮墮刀刃傷使覺氣絕不能言取茶不及急
開口以熱小便灌之

凡手腳骨傷甚者不可治

凡損傷用大炙則醫不得服茶不効

凡傷重必用茶水洗然後洗茶傷輕不必洗便塗茶

凡損大小便不通未可便服損茶蓋損用酒必熱且服

四物湯又服大養氣湯加木通如二便尚未通又加朴硝

俾二便通後服損茶

凡傷重者用此方洗之然後傳茶

生葱一方作生薑荆歸石三味煎湯溫熱洗

仙正散洗茶治骨斷用此煎水洗後整骨却用

烏龍龍貼之如破留口當夾縛

桂二斤 坤五斤 荆四兩 蒼風 延正 赤芍

右咬咀每用五錢水五升乾荷葉兩片煎至三升去滓於
損斷處及冷水風脚筋脈拘急行步艱苦可用此茶
用被蓋西復假溫淋洗

二斤治骨斷 仲五兩 五七兩 苧根七兩 右每服二兩半

水五升煎至七分去粗淋洗後整骨了用烏龍龍貼
傷破留口用茶

烏龍龍貼茶治跌撲傷損筋骨碎斷差文

牽云系嘴炒 小豆各六 膝各六 桂桔 白友 山杞 桑葉

百草霜各一 骨碎補云毛 歸尾細 苧南 星根

赤芍 何首烏 白欬各十 知草烏各三兩 右為末

以乳汁或冷水茶調搗紙上於痛處貼之三日一洗換貼

并撲及刀刃傷皮肉破青腫急用末茶葱搗爛炒

乘熱卷傷處冷即換指爪抓破根葱乘熱貼於再換

一方治傷損筋骨腫痛 草烏三個 飛羅麵目每

南星各半 黃母各半 右為末乳汁調貼如爛茶清調貼

皮破見血者去草烏

止痛法 白礬為末每用一匙沸湯一碗衝了以手拍之
熱敷傷處少時痛止然後用貼藥
接骨丹 南星四兩 木別三四 沒五 桂三四 乳五 右為末
生薑一片去皮搗入末醋少許白麵糊調業攤紙貼
傷處以帛縛之兩皮纏之

追毒散 白礬 雄黃 等分 為末乾擦或油調塗
治腦骨破及骨折 葱白研和蜜厚封損處立瘡
治因傷血出不止 大黃燒存性為末傅端午令如石
反葱薑尤妙 忌烏魚骨 韭 苣荬菜

治打撲瘀血流注紫黑 大黃末薑汁調塗一宿黑
者紫二宿即白

接骨散 治從高墜下筋斷骨碎痛不可忍
明砂七斤 定粉各五 右為末煎蘆木湯調二三
錢服如病在上先喫淡粥半碗服藥別作糯米粥入
末和勻攤紙上裹傷處

當歸散 治打撲傷損皮肉破筋骨斷瘀血壅滯結腫

氣調

不散或作癰疽疼痛甚及傷後中風手足痿痺

澤蘭 淨膠續 芍藥 桂 白楊皮不用亦可

細各五 川烏 川椒各三 枳各四 右為末煎酒調下

白氣散 凡傷重先用此藥調氣然後服損藥

茵青 朴各一 烏菜 杏各半 陳 蘘 前

枳 蒼 甘各一 右每服二錢薑三片棗一枚煎空心服

大承氣湯 傷損極重二便不通者方服此可加木通

如未通加朴硝後二便通服損藥不可用面煎愈不

通矣然亦須量人肌弱用孕婦小兒忌服

太極各四 芒 甘 沫 紅 歸 蘆 木 通各二 朴各一

右水煎專治傷重瘀血不散脈脹二便不通上攻

心脈悶亂急將此藥調下瘀血後可服損藥

陰紅湯 治婦人傷損瘀血不散脈脹二便不通上攻

脈悶亂急將此藥調下瘀血後服損藥

產婦由髮燒 鹿角膠各一 沒各三 右為末溫酒調服

止痛當歸散 治打撲損傷腫痛不可忍

痰下

末散去蒂隔 苳甘各一 加乳沒 右每服二錢水

一盞酒半盞同煎至八分溫服

復元治血湯 治墜瀉惡血流於膝下疼痛不可忍

紫三 括一 歸一 紅一 太一 甘一 川山甲一

右分三貼水一盞半酒半盞同煎至八分五更

手明溫服得利為度利後痛未愈更服

當歸導滯散 治逐打壓疔腫滿疼痛

太一 兩尾半 臍一 右為末煎酒調服通利為

補損當歸散 治墜馬落車傷腕折臂服三日後骨即

相連神效 澤蘭炮 附各 歸炒 椒炒 甘各 桂各 芎各

右為末每服二錢溫酒下忌海藻菘菜葱猪肉

沒藥乳香散 治打撲傷損痛不可忍

木炒 歸焙 甘各 苳沒乳 桂各 右為末溫酒下

內傷散 治打撲時痛及內損者

川鳥草 草鳥並 歸白 芍二 種木 大黃生 地

紅炒 麩炒 麩炒 右為末酒煮一飯放合服治覺麻

痺瘰毒但二鳥生用用雞好恐大猛故燒之去淫疔用也

一方治躑躅傷損瘀血留經絡成痼疾

老黃茄種薄切瓦上焙乾為末溫酒或塩湯調三錢

眼垂十年積血亦可下

接骨良方 乳香五 燒過人骨二 飛羅麵三

右為末用無根水丸如梧子大每服三十丸好酒送下

益母膏 治折傷內損有瘀血每遇天眩痛方見婦

我接骨丹 沒乳 歸一 椒一 自然銅大 骨碎補兩

赤芍敗 龜板酥 虎胫骨蒸 千金藤即 郁李仁各

右為末化蠟五錢丸如彈子大每服一丸好酒半升化開煎

用向東南柳枝攪散煎服一方加龍骨芍

雞鳴散 治從高墜下及木石所壓瘀血凝積痛不可忍

大黃一 杏三 右酒煎去粗雞鳴時服至曉必下瘀

血即愈此方用杏而不用桃者蓋跌乃

治杖打不青不腫不成杖瘡 人骨燒灰為末酒調服

心脈久服皮益石

治打傷血聚皮不破 蘿蔔研爛食之

治杖瘡及湯火惡瘡不生肌肉者 黃蠟四兩 清油一斤

先二味煎三五沸次入黃丹二兩 再煎五七沸候冷入乳沒

末各五 攪勻成膏厚紙貼患處

金瘡出血過多回物加參芪

兵器傷血出者必渴不可与水只食乾食肥膩之物不妨如

食薄粥則血沸而出必死

聲聲飲日 治棒瘡刀刃傷疼痛不忍

防風兩 而星湯送 石姜二片 水煎食遠服

金瘡腸出致之 磁石滑石 各二 為末飲調方寸匕三 服

治金瘡未愈而交接血出不止 婦人衣帶三寸燒末水調服

治前頭右骨內不出者 大雄鼠一枚取精肉薄批焙為

末每服二錢煎而下若覺前瘡痒不私用此痒少時箭

頭自出

治金瘡好 箭中向絕無所識 琥珀研 童便調服

新被毒箭 搗藍青絞汁飲并傳瘡上如無藍青可漬

青布紋行飲

龍骨薑 治金瘡 龍骨 海螵蛸 五倍 赤石脂

黃丹煨 石各研細入麝少許先塩水洗挹乾傳

二石治金瘡止痛止血 連 檉等 研末付

又大黃煨存性末付 又紫蘊一味末付之

又龍骨 黃栢末付之

破血丹 治金瘡止血止痛 天花粉三兩 姜黃 苾各一 赤芍二兩 石為末少許乾糝

於患處或密調塗

黃丹散 治金瘡并一切惡瘡

黃丹軟石膏 煨通紅 右為末搽傷處甚妙

治金瘡 人膽汁敷患處極效不可再用他藥傷益

桐如先已敷他藥亦不可用此

治金瘡止痛 桑柴灰研傳佳

治金瘡血不止兼痛 麟竭末傳之立止

又市紫檀末傳之

治金瘡止血 石灰炒和雞子白丸如彈子太炭火
煨赤搗末傳瘡上

又石灰同韭菜搗碎為末搽之縛定痛血皆止
又止血止痛 白芍藥末傳之即止

金瘡出血急以石灰厚付裏之瘡深不宜連合者加滑石
末付之

又老杉木皮為末付之

又用松香加琥珀末付之

又茅花或綿花或紙灰填瘡口血止不膿

又野苧葉或苧葉揉付冬乾為付之

箭鏑及針刀不出 鼠肝及腦傳之

又蜂蛭搗汁滴三五度箭頭自出

又象牙屑水和傳上即出

沒藥散 治刀箭傷止血定痛 定粉 石灰各一分 枯瓦三分

乳香 沒藥各一分 右為末付 瘡少許 右為末搗動瘡

出箭頭方 蠅蛆 乳各等分 腐少許 右為末搗動瘡

治箭鏑入骨不可拔者 已去骨 蠅蛆不 右同研傳傷

起微痒且思極痒不思即撼動後以黃連湯洗

洗以牛膽製石灰傳之

治竹木刺在肉中不出 生牛膝葉搗塗之即出

又以頭垢塗之 又搗蜂蠟傳之 又象牙屑搽之

又將白梅肉傳之 又白茅根燒末脂膏和塗之

又以鼠腦有子塗

湯火傷 神效當歸膏 治湯火傷嫩赤疼痛腐化成膿

當歸 黃蠟各一分 麻油四兩 石先將油煎去當歸焦黑

去毒入蠟急攪之放冷入瓷盒內每用故帛攤貼之

赤石脂散 治湯火所傷赤爛熱疼

赤石 寒水 大黃等分 為末新水調塗

治湯火傷神妙 草麻子 蛤粉等分 為末湯換

油調大傷水調塗

又蛤蚧殼燒為末油調塗

湯火灼成瘡 柳皮燒灰粉塗之 又石灰水和塗

治湯火灼爛 竹中虫蚰末傅之

治湯火瘡 水煎膠令稀相待冷塗之

二方 蕪与蜜搗塗 又單傳濕牛屎痛立已

二方 折生胡麻如厚封之

黃蘗散 治湯火傷 栝太朴硝雞子殼 吳水石

右等分為末水調塗

治湯火瘡 紅霜桑葉焙乾燒存性為末香油調付

或乾付

林 治中熱油燒痛以白蜜塗之

治熱油及湯火燒瘡痛不可忍 石膏末傅瘡上

治中熱油及火燒瘡 榆白皮末猪脂煎塗

治冬瘡多時不瘳痒痛出黃水 椒葉或根皮為末付

大咬傷不可便貼膏藥及住肌散之類謂毒不出也

先用導水丸為功散海十餘行即時成腫然後敷

貼之 木香枳榔丸亦可下

導水丸 太苓各一 牽各一 滑各一 右為末水丸內湯下

西 右為末水丸內湯下

為功散 牽四 苗炒一 或加木西 右為末姜汁調服

定風散 治大咬毒氣入腹吧不下食頭痛

星生用 防風手 右為末搽或南星生 防風手 姜汁

酒調服童便更佳 又姜煎入酒服可

狗咬瘡卒無藥用葱搗爛貼之 又牛糞塗之

一方 嚼杏仁傅 又百草霜末油調付 又鼠矢末油調

治大傷腫肉色黃爛 草麻子碎 去殼水研成膏先傳

以鹽水洗次以此膏貼 人口咬者亦用此方

二方 治顛天所傷或經久復發

雄五 腐少許 石研勻用酒調二錢服必得睡切勿

驚起任自醒利下惡物再進一服

治顛天咬韭菜根搗汁多服 又灸傷處三五壯

又膽礬為末貼瘡上

治狗咬 桃白皮一握水煎服

又方 梳子皮燒末 石硫黃等 為末傅日二三度

治大咬人發狂 虎牙虎頭骨末酒服方寸匕

貓。治猫咬搗薄荷汁塗之

鼠。治鼠咬搗香末津調塗

蛇。蛇傷。凡初被傷用針挑起咬處皮輕之剪去捏出少血

即愈。換勿毒用雄黃傳瘡恐毒氣不泄攻肉仍服後藥

正細各五雄二名石為末入罈少許酒調服

一方治蛇毒及一切虫傷五名酒洗去沙石乳二兩雄五名右為末

酒調服。又為末傳

又龍腦薄荷研打溫酒調服。又塗傷如露中心出毒氣

又細檢砒研入罈少許酒調服。治蛇毒及一切大傷

解毒散。治毒蛇傷人眼黑口噤手足強直

白礬研甘礬研為末冷水調下

毒蛇螫人急握地坑埋瘡心堅築其上毒即入土中

痛止

中蛇毒勿渡水中則痛甚

蛇入人穴急急用刀割尾挾辛辣物用絲縛定自

出不可拔

辟蛇法。雄黃成塊秤五兩帶之入山則諸蛇不敢近

蛇傷。取大真塗。又灸咬處

馬。馬咬用栗子嚼傳。又燒灰油調付可

人。人咬。龜板燒灰末油調塗

蜈蚣傷。香油點燈太吹滅以烟薰傷處不痛即愈

又用雞真塗。又用雄黃搽

一方用雞冠血塗。又巴豆研研猪脂和塗。又用頭垢傳

又桑葉。芥梗研汁塗之

又嚼塩傳之止痛。又塩湯浸瘡妙

又井底泥塗之。溫則易之

又麻鞋底。及以指之即瘥

諸毒。凡蛇蝎蜈蚣咬傷。冬傷知三五枚。按去毒

。凡一切虫獸咬傷。腫毒及杖瘡。嫩灸或透入裏者。宜

先用厚紙包。為功散。或木香。棉紙下之

治蛇蜂蜈蚣傷。雄黃末水調敷。仍酒調服治毒傷用

蜂。治蜂螫人蜂房末。搗膏和傳。蜂房煎湯洗亦可

蜘蛛 治蜘蛛瘡 用清油搽之

蚯蚓 治蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落以石灰炒其

壁虱 治壁虱 草撥烏頭各二 雄三 搗硝五 煉蜜為膏

臨臥燒一柱於床下其虫自死

蚊

驅蚊 驅壁虱 蒼一 木別雄各二 右煉蜜凡如淨子

大床下燒一丸或於蚊合時當門燒之

重蚊子 香附一 蒼半 雄 樟腦各半 右為末

入雄黃樟腦重羅臨臥時略焙令燥

辟蚊子 木別各一 雄半 蜜丸如皂子 火燒辟惡虫

頭虱 治頭上虱子 梨葉末搽髮中經宿虱子皆死

骨瘦 治骨瘦入唯 縮骨各 為末綿裹嚼之 嚙津吞之 鹽搽

三方野苧根搗凡嚼之 又含小獺骨即下

又鯉魚鱗皮燒末水服末出更服

又鹿角末含之 嚙津 又瞿麥末服方寸匕

又以魚骨於頭上立即愈

漆瘡 用貫仲煎湯洗之妙

又用磨刀石上五塗之妙

又薄荷葉一斤 水一斗煮取五升洗瘡即瘳

又以韭葉研傅之妙

又以湯溶芒硝令濃搽之即愈

又用蜀椒煎湯洗之

又取蟹黃塗之

又以蓋漆紙燒烟薰之

又用苧葉煎湯洗之

又用白礬煎湯浸洗

又用杉木煎湯洗

又用芥菜葉煎湯洗

十破傷風門

夫破傷風證因事擊破皮肉性之視為尋常
殊不知風邪乘虛而客龍之漸而變為惡候又諸
瘡久不令風邪亦能內龍或用湯淋洗或著艾禁
灸其湯火之毒氣亦与破傷風邪無異其為證也皆
能傳蟠絡燒燥直氣是以寒熱間作甚則口禁目
斜身強直如角弓反張之狀死在旦夕治之法當同
傷寒處治因其在表在裏半表半裏之不同故不離
汗下和三法也

○活法防風湯 治破傷風邪初得在表

羌活 獨活 桑葉 歸身 芍藥 甘草 地榆 細辛 石

水煎至粗粒服 熱則加大黃一錢 大便秘加大黃五分

○白朮防風湯 如服前藥太過令自汗者宜服此

白朮 防風 芍藥 甘草 石水煎 臟腑和而有自汗可思

如破傷風臟腑秘不便赤自汗不止者因服熱藥汗出不
停者知無害也宜連下之先用小黃湯三服後用

大芎黃湯下之

小芎黃湯 芎二升 苓一升 甘五分 右水煎三服即愈

大芎黃湯 芎一升 苓一升 太各一升 右水煎服以和為度

大芎黃湯 治破傷風邪在表半裏

羌菊麻芎膏 風前苓細甘白苓

松蔓各四分 芎一升 右細切作一服生薑五片

防風湯 治破傷風同傷寒表証未入裏者

風羌獨芎 各一分 右水煎

養血當歸地黃湯 治破傷風自入氣血漸虛邪入骨

歸地芎芍藥 風一升 細半升 右

白朮湯 治破傷風大汗不止筋牽手足搐搦

本葛各二升 苓各一升 芎四分 甘半升 右

九味羌活湯 治破傷風發熱 門 方見傷寒

付 祖傳救急 治初破傷風發熱紅腫風邪未入深者

杏五分 白麵各半 右和勻新汲水調和付傷熱腫消熱退

十二瘡瘍門一

精錄

夫癰疽瘡瘍皆由氣血不和喜怒不時飲食不

節多者不消而發多生於膏粱富貴之人平昔

所食肥膩炙博安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒

內攻煎熬氣血而成也

精錄

宜分內外發內發初發疽之時一粒如麻豆大身體便

發熱生疽處肉亦熱腫大而高多生疼痛破後肉

色紅紫為外發如用藥百理百人而可治

初發疽時身體無熱自覺倦怠生疽處亦不熱數

日之間漸之開大不能不高不疼不痛低陷而壞爛

破後色黑為內發未發見之先藏府已潰爛百人

而不救

精錄

凡瘡腫大按之乃痛者膿深少按之使痛者膿淺

腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

疽發深不痛者胃氣大虛死肉多而不知痛也

夫瘡疽腫毒頭并虛實虛者難補實者易得
腫堅硬膿稠者瘡疽之實也
腫下軟慢膿稀者瘡疽之虛也

浮利腸鳴飲食不入嘔吐無時手足冷脈弱皮寒小
便自利或時難聲不出精神不爽者臟腑之虛也
大便硬小便澀飲食如故腹滿膨脹胸膈痞悶腹
痛口苦咽乾煩渴身熱脈太精神昏者臟腑之實也

膿水清稀瘡口不令聚腫不赤肌寒自汗色脫氣血虛
腫起色赤身熱疼痛膿水稠黏頭目昏重氣血實心
頭疼鼻塞目赤心驚咽唯不利口舌生瘡煩渴飲冷
睡語咬牙為上實也

精神不帶大便自利腰脚沉重睡卧不寧者下虛也
看項不便四肢沉重目視不正睛不了之食不知味高
嘶色敗四肢浮腫者真氣之虛也

腫嫩尤甚痛不可近積日不潰定熱佳來大便秘小
便後心神煩悶恍惚不寧者邪氣之實也

又曰脈洪大而數者實也微細而軟者虛也

治法或疎散或消毒或針烙或內托或外消或浮利或
補益是故腫瘍為實宜浮利潰瘍為虛宜補益浮利
而後者為難宜外消藏伏而深者為難宜內托
其證善而易治者為順惡而難治者為逆

逢自視不正睛緊小自睛青赤瞳子上看一逆也
不能飲食納茶而嘔食不知味二逆也
傷痛渴甚三逆也

轉項轉動不便四肢沉重四逆也
聲嘶色脫唇鼻青黑面目四肢浮腫五逆也
煩躁時時腹痛甚泄利無度小便如淋六逆也
膿血大洩嫩腫尤甚膿水臭敗臭近七逆也
喘急氣短恍惚嗜卧八逆也

未潰先黑陷下青唇黑便溺死逆也
又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目眩耳聾恍惚
驚悸語言錯亂皆是惡證

五頭動息自寧飲食知味一順也

便利調勻二順也

神彩精明語聲清朗三順也

膿潰腫消色鮮不臭四順也

伴氣和平五順也

凡五順見三則吉九逆見六則危

○灸法 凡疽瘡便宜灸之三百壯灸後覺嫩痛經一宿

大氣下微腫內熱氣隨大而出也若瘡疔宜備設餅子

塗之其餅須以椒薑葱相和搗爛捏作餅子厚如三

錢當瘡頭餅子上灸餅子若乾更換若瘡痛須急

灸壯數多為妙若膿已成者不可灸即針圍之

又赤皮蒜搗爛作餅子如豆設餅子灸之亦佳

用大蒜去皮切三文錢厚每瘡頭上用艾灸之至三壯換

蒜片之瘡痛者灸至不痛為止灸至痛未成者即消

如瘡太用蒜搗爛推患處將艾鋪上燒之蒜敗再換

又云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出者宜灸外入者

托之而不內出者接之而灸外

最早灸為上一日三日十灸十活三四日六七活五六日

三四活過七日則不可灸

離則皮膚腫高一週則皮厚腫堅初發並宜灸

凡腦疽及項已上瘡不可直灸三里氣海穴漸灸

服涼膈化血藥

凡治癰疽用騎竹馬灸法無不安愈兩穴各灸五壯或

七壯可以起死救危

先從男左女右臂肘腋中曲橫紋起量至中指頭剪斷

令病人脫去衣服以丈長棍一條跨定兩人徐扛起足離

地五寸許却以量臂則子貼定竹扛從尾間起應脊量入

至則子足心以墨點之非灸穴却開左右各同身一寸

記之即是灸穴也

○用棋針法 凡癰腫罌作用大馬棋一條安瘡疽頂上

吹其正穴膿血出毒散如毒大而棋小頂三四條若動

腹傍黃者刀大若血不止用藕節或貼白芨花

傳

蟻針之法可施輕小證彼吃出惡血者積毒在臍府者使竭其血於外無益也

內托之法腫癩了外報盤不保取證在表脈多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復前散除濕散對使胃氣和手如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却于復煎散

科

治瘡之大要有托裏內疎通行榮衛之三法

外之內者其兩浮救癩腫在外恐毒氣極而內攻當先托裏也

內之外者脈必沉實發熱煩躁外無破赤痛深於內其毒深宜當先疎其內以絕其深源也

內外之中者外無癩惡之甚內則清便自調知其在不當和榮衛也能用此三法縱末即瘡必無變壞之證

膿出而及痛者為虛宜補之亦有穢氣所留而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

吧

腫陽時吧者當行毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之

若年老積後發嘔不食宜參芪朮峻補隨證加佐

使某兩間謂瘡瘍吧者濕氣侵于胃也宜倍白朮

得

得○癰疽發湯乃血氣兩虛用生芪以補氣歸地以養

血或思冬丸黃芪六一湯皆効

精

癰疽大作毒氣炎盛太過急服神仙追毒丸每日一

服取下惡毒次服清腫湯

疽疾既安之後忽發湯疾者多不救預服加減味圓而防未然未發疽人有湯疾亦預服之

清腫湯 治癰疽熱盛癩腫疼痛作湯

生地 芍 芎 知 甘 白苓 升 苓 葶 門

右水煎

加減味圓

癰疽未生或初生或既安湯證出來並用

地 兩西垂

山茱 山茱

去核各

桂 味淡者

澤 牡 苓

五味炒

右煉蜜丸如桐子大五更初末言已前溫酒或

鹽湯吞下三四十九粟驗

思冬圓

治癰疽大能止渴

丹冬根芫花葉皆用入瓶內以無灰酒浸以糖大煨
一宿取出曝乾入甘草少許為末以新浸酒打麩糊
丸如梧子大每服五十九丸酒下

傳

黃芪六一湯 治癰疽發背 芪六兩 芍六兩 右水煎

林

竹葉黃芪湯 治瘡腫渴甚 竹一兩 生地四兩 門芪

歸芍甘芍芍芍參芍參膏各一 右

通

榮衛返魂湯 治癰疽發背大能順氣自血扶胃氣

高滌邪穢自然順通不生變證真仙劑也

何首烏不犯 歸通 赤芍炒 芷不見 苗炒 烏茶炒

麩炒若惡心 枳各等 右水酒相半 流注加獨活

流注傷寒表未及餘毒流於四肢經絡為流注如尚有潮

熱則兼有寒邪未及散加升糖如此而不退可加乳葛

如有頭疼等症垂水煎如無潮熱可用水酒相半煎

酒大能行血生氣故也

如氣血盛者減當歸多則生血發於他部每結癰腫

生不絕斯乃秘傳

癰疽疔瘡有二證一胃寒生痰加半夏健脾化痰二

熱許而成風痰加桔梗化痰因膈之痰並用垂水酒煎

腦疽發背在土者可去木通惡毒虛下元為上感下虛

之病老人虛弱者尤宜去之

病人有汗者不可使用此方宜先用止汗藥白礬生用

為末溶開黃蠟丸米飲下三十九

內托復前散 治腫爛於外根盤不深形證在表

地骨苳各三 瓜各三 芍各三 本各三 參各三 寸各三 歸各三 已各三

柳桂淡味者 右分四貼先煎制蒼朮二兩八錢用此十

煎至六去蒼朮每用一盞半又茶一貼再煎至八分去粗

服若大便秘及煩熱少服箇連湯如微利煩熱已退即

服復煎散如此榮衛俱行邪氣不能內侵也

內疎黃連湯 治吧咳心逆發熱而煩脈沉而實毒氣

在由臟腑秘澁當急疎利之

連梅芍歸梅木各半 麩各半 芍各半 結各半 甘各半

太一分 右如三便不閉澀且未可入大黃

黃連獨活散 治背痠一切惡瘡初發腫甚者三四服即消散 連獨活 羌活 桑寄生 獨活

參陳蘇木 甘桔已合半知而浸桔各一生地二各

歸身翹各三 葛 可身各一 栝各一 澤各一 右每服八錢

水二盞煎八分入酒半盞臨卧服

小補湯 治發背疼痛吐及發咳逆

參 可 葛 歸 白芍各二 乳沒木各一 右

防風當歸散 治諸般瘡癰疽毒

風 歸尾 甘菊 赤芍 葛 莖各五 右纏藤 皂角刺各五

桂陽一各 陰五各 太陽五各 右以咀水四碗砂鍋煮至二碗入好酒一

碗存煎服

當歸黃芪散 治癰疽證臟腑已行痛不可忍為

疔 芍 生地 芍 葛 地骨各一 右水煎發熱加芍

煩躁不得睡加枳殼是逆氣侵胃加木

五香連翹湯 治惡瘡癰疽瘰癧等病

乳 乳 甘 生 青木各一 射干 升 桑寄生無以升麻

獨 通各三 丁半兩 太兩 麝一不 右煎空心服半日

以上未利再服以利下惡物為度

九珠散 治癰疽腫毒因氣壅血熱而生者

芍 歸 赤芍 生地 芒 太 芍 莖 可各一 右水

酒相半煎服婦人乳癰尤宜服

內托千金散 治腦背癰疽乳梗等惡瘡

芒 歸 芍 參 葛 風 甘 芍 莖 桂 桑 桔

金銀花各二 右水煎入酒再煎去粗服如痛甚信加

歸芍又加乳香瘡口內有黑血或遍身汗出守茶之効也

千金托裏散 治一切瘡腫發背疔瘡

翹二兩 朴 風 桔各二 椿二兩 芍 莖 芍 桂 桑 桔

可各一 歸半兩 木 沒各三 乳二兩 右酒煎

千金托裏散 治背疽併諸惡瘡如三日以重末針灸

及利大便者則可消 歸身 翹 芍 酒太各三 門二各 薤 葉 葛 炙 甘 參 蓂各一 生地二兩 枳

核 兩 連各一 風 兩 瓜 梢 生 甘 歸 栝 陳 蘇 木

五味酒 栝 酒已各半 右分二服用水三大盞浸半日煎
至一盞稍熱服忌冷如覺病即止服無不効如瘡已
已發三四日或成膿則不消也

升陽益胃散 治一切惡瘡發背腦疽等證

歸三不 翹二不 薤葉各一 者各一 炙甘草生 生地生

知母各一 枳各一 澤各一 獨各一 風連各一 栝各一 風梢各一 參各一

歸栝陳各一 薤木各一 酒已各半 右分二服用水三大盞浸

半日煎至一盞滴酒數十點去粗歸卧溫服忌飲水

再作膿効遲初患三日者服之立消作膿者立潰隨

病上下食前後服尤宜或加乳沒各一 尤妙

當歸各一 羌活各一 治腦疽 苓各一 連各一 歸身各一

栝各一 翹各一 風各一 薤各一 寸各一 梔各一 獨各一 葉各一 澤各一

右作一服水二盞先浸一時許入酒一匙煎至八分去粗

食後稍熱服日二服俟將茶汁調下後項栝搗散

栝搗散大飲瘡口 栝各一 木各一 右為末用煎湯調下

或飲瘡口油調塗生肌飲由甚速膏果熱瘡宜且

丹漢治背疽方 生地 歸身 甘節 風 薤 太 赤芍

貝 苾 苓 皂 刺 作 大 刺 煎 服 氣 虛 加 參 苾 瘡 潰

後亦宜加之

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清鮮皮

層涼心下痞滿腸鳴切痛大便微瀉吧逆氣短昏憤

薤各一 姜各一 附各一 地各一 益各一 丁各一 瓜各一 木各一 苗各一 陳各一 甘各一

右入姜

五香湯 治毒氣入腹 丁 木 乳 沉各一 麝各一 右

水煎吃去麝加薑一兩 留者加參一兩

定疼托裏散 治瘡腫疼痛不可忍如少壯氣實先

用疎利後服此藥 粟殼去蒂炒 歸白芍 芍各半

乳沒桂 桂各三 右

黃耆人參湯 治諸瘡破後食少無睡虛熱

耆一兩 參一兩 木一兩 蒼一兩 陳一兩 歸身 炙甘 升各半 栝各半 麝各半

聖愈湯 治諸瘡血出多為心煩不安不得眠此七血

生地 熟地 芎 參 各半 歸身 存 各一 右

內補黃耆湯 治諸瘡破後体倦無力懶言食無味

少睡脈滿自汗口乳 春門 各一 熟地 參 苓 芍 各三

白芍 芎 桂 遠 歸 各半 右入姜枣

集錄 六味流氣飲 治無名惡瘡癰疽等證

芎 歸 芍 風 參 蒼 木 桂 桔 苳 樵 朴

烏 蘓 枳 甘 各一 右

托裏內補散 治諸瘡膿潰後 參 木 苓 歸 同法

芎 白 芍 甘 苳 風 桂 金 銀 花 蒼 右 等 分

麥門冬湯 治難疽潰後膿水不絕 參 蒼 歸 芍

桂 白 苓 門 五 味 炒 遠 各一 甘 各三 右入姜枣

內托散 治諸腫毒惡瘡一服立愈

太 坊 各半 葶 二 个 梳 甘 各三 右

金銀花散 治發背惡瘡托裏止痛排膿

金 銀 花 四兩無心用 甘 二兩 右酒水各半煎

集錄 內消丸 治瘡腫初生及癰疽結核扭毒消滯服之內消

陳 青 各二 亭 八兩取頭 苛 皂 各八兩去灰皮碎三味水一斗煮

右青陳亭為末用前膏丸食後荆芥湯茶清溫水任下

金銀散 治發背諸瘡腫 皂 針 春取一斗新株 右一味

為末食後酒調二三錢服

洗菜越桃散 越 桃 苓 甘 滑 皂 苳 苳 各等分 右每

一兩用水五梳煮三四梳去粗洗諸瘡毒

貼藥 傳 外施貼藥亦最表之意補毒謂貼於元神功又氣得紐

解毒散 去赤腫收熱量 寒 水 二兩 連 栢 各一 龍 骨 五

輕一不 右為末雞清調以細掃瘡四畔熱瘡加黃丹 五

一方 荷 葉 秋後採 草 烏 南 星 等分 姜 汁 調 塗 瘡 四 畔

一方 大 黃 東 牆 土 右 為 末 用 無 根 井 花 水 調 付 諸 散

惡瘡乾即再傳

治諸瘡口膿水不乾 寒 水 三分 龍 骨 二分 國 丹 飛二分 右 能擦

乳香散 治瘡口痛甚 寒 水 極 滑 各一 乳 沒 各五 腦 行 右 向

披膿散 瘡口有虫膿不能自出如透深者用紙捲蘸散

入瘡內淺者搽之 芎 二兩 苳 二兩 白 芍 輕 各三 右 細 末 用

雄黃散 治瘡有惡肉不能去者 雄一已 一不 右同研

如入乳沒各少 再研勻細少上惡肉自去

保生定子 雄已去油 杏去皮 乳沒各一 草麻三粒 右

為末唾津調作定如大麥大疔瘡發背癰瘰疔骨及

諸般惡瘡不同新舊皆可治

生肌搗散 治癰疽瘡癤膿潰之後外筋已定腫破結

硬膿小清稀出而不絕好肉不生 搗連木等 右為

手乾貼亦治金瘡日久不斂一方加麝香

乳香真 木別去殼 歸各一 柳枝三尺 對 右同麻油四

兩慢火熬令黑色去粗次用乳沒各五 白膠香四兩

右將末入油煎化了用生絹濾淨入黃丹二兩半以四柳枝

再上慢火不住手攪俟油沸住攪滴水中成珠為度頃

在水中出火毒用

神仙太乙膏 癰疽惡瘡軟癯已成膿未成膿貼之即効

出蛇湯太刀斧所傷並可內服外貼

玄參 苾 歸 桂 太 赤 芍 生地各一 右吹咀用麻油二

斤浸春五日夏三日秋七日冬十日德去淨油熬次下黃

丹一斤以滴油在水中不散為度

麒麟膏 血竭 栝 連 歸 甘 苾 蒼 風 葱

栝各四 黃丹四兩 香油半斤 批柳 桑 槐 榆 梅

末取嫩枝對 右除黃丹外用銅銚盛油入諸藥并七

枚浸一宿慢火熬令焦黃濾去葉入黃丹用柳木篾

再上慢火不住手攪俟烟起離火滴小成珠頃水中出入毒

玄武膏 治癰疽瘡癤排膿生肌肉

巴五兩 木別去殼 國丹四兩 麻油十兩 槐柳嫩枝各七條 右同煎

一方治癰瘡中冷瘡口不令 鼠皮一枚燒為灰細研封

瘡口上

治癰腫 括萎根 醋熬 搗篩 篩醋和塗紙貼服食石人

瘡腫已成膿攪針不得破 取雄雀屎塗瘡頭上頻

易之 雄雀屎直者是

治發背 生蝸牛二百箇入瓶中用新汲水一盞浸一宿

蝸牛放其水如涎將粉調以雞翎掃瘡上日十

餘度扭痛止癢便愈

一治發背欬死 伏龍肝末以酒調厚傅癰上只氣
即易

癰腫若有息因突者 烏頭^{五枚} 以苦酒三升漬三日
洗之夜三四度

一附骨疽二

夫附骨疽者其毒氣深沉附着於骨也 于賊風相類而
不同風邪之氣搏骨節故痛深徹骨髓遇寒則痛
甚初起之應骨皮肉微赤洪^林如肥狀者是也

流注者傷寒表未^林盡餘毒流於四肢經絡然表未^林盡則
餘毒附骨而為骨癰夫流注者傷寒之餘毒骨癰
者又流注之敗證也流注醫者表之未^林盡也骨癰^林涼藥之過也

丹溪曰附骨疽者因久得厚味及勞役于酒後涉水得此
陽滯於陰之證也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽
鬼活筋已湯 治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

鬼已膏 蒼朮 射干 甘 白芍 通 坤泥
藕木^各 石水酒各半煎食前服

托裏黃^各湯 治骨疽初發於足少陽之明分者
歸尾^各 柴^各 香 桂 麩 黍粘子^各 枳 升 甘^各

芒^各 右作一服酒一盞水一盞半煎空心服及膝壓之
內托黃芪酒煎湯 治瘡生腿外或因寒濕得附骨疽

於足少陽經分微侵足陽明經硬腫行步作痛
 歸尾朱 柴二 芒三 桂四 升五 栝六 甘七 芩八
 芥子抄各 右酒水各一盞煎食前溫服
 黃連消毒飲 治附骨疽連 羗各一 柘栝各一
 葶各五 生地各五 知母各五 歸尾各五 麴各五 蒼參各五 龜板各五
 澤各三 芍藥各三 右水煎 上老人因寒濕地氣得附
 骨疽杖死腿外圍六寸長一尺堅硬漫腫以指按至
 骨大痛以此藥即愈
 加味八味丸 治附骨癰疽真氣不足虛火炎上之證及
 疽愈後發熱者便效 方在石

一疔瘡三

夫疔瘡以其瘡形如丁蓋之狀者是也古人論疔不離於
 氣客於經絡五臟內蘊毒熱初生一頭凹腫痛青黃赤黑
 無依定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或吐逆以針
 刺瘡不痛無血是其候也急用艾灸之若不覺痛者
 針丁四邊令血出若或針之不痛無血者以猛火燒鐵
 針於瘡上烙之令如焦炭取痛為效如針不痛眼裏或見
 火光者不可治也此邪毒之氣入臟腑故也
 又曰刺瘡心室痛處又刺四邊十餘下令血出傳藥之力
 得入針孔中則佳

○疔腫十三種形色禁忌

- 一曰麻子疔狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒
- 忌食麻子油衣布衣并入麻由中行
- 二曰石疔狀皮肉相連色如黑豆其硬刺之不入勿微痛
- 忌瓦礫磚石之屬
- 三曰確疔狀如頭黑腦四時仰臥墮起有水出色黃

大如錢孔形高者忌房室

四日雌丁狀瘡稍黃向重者膿亦似冬瘡四面飽將起
心凹色赤如錢孔者忌房室

五日大丁狀如湯火燒灼瘡頭黑腐白邊有煙燭又如
赤粟米者忌火燒烙

六日爛丁狀色稍黑有白班瘡中潰有膿水流出血形
大小如匙面者忌沸熱食爛物

七日三十六丁狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生
一明日生二及至十者滿三十六不能治未滿可治

忌喫如愁根
八日蛇眼丁狀瘡頭黑皮浮生形如小豆似蛇眼太硬
忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒菜

九日鹽膚丁狀大如匙面四邊皆赤有黑粟粒起忌
食鹽味

十日水洗丁狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裡黑腐
汗出中硬忌飲將水之洗度可

十一日刀鏢丁狀闊狹如薤葉大長一寸九側肉黑如燒
烙忌刺及刀鏢切割可以藥治不可亂攻

十二日浮腫丁狀瘡伴圓少許不冷長而狹如薤葉
不內黃外黑心刺不痛黃心刺之痛

十三日牛狗丁狀肉色飽起搗不破
右十三種丁瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱四股
沉重心驚眼花重則已逆者難治麻子丁一種始末
推疔歸忌者不可犯者作難治浮腫丁牛狗丁無
禁忌縱不瘳不殺入

赤芍藥湯 治疔瘡腫疽初覺痛寒疼痛

赤芍 金銀花 各五 太 毒 二 歸 甘 各三 右水酒煎

通利藥 黑毒 各一 巴 十五粒 太 五 右為末水丸白湯下

荆黃湯 治風熱結滯生瘡毒 荆 五 太 三 右

抵毒散 治惡瘡發背疔疽便毒始發肺洪救腫
甚效作膿者三服消尽太垢枯臭刺朴硝剋各

時金銀花 各一 赤芍 芍 各二 右水酒各一盞煎

傳

雄黃丸 雄黃 皂 蝎各一十四枚 腐各一 右為末

適水丸如某豆大每服廿丸亦看虛實加減丸數茶清

二活散十三疔狀如生雲皆惡毒也治法先以雄黃丸下之去其毒勢次服二活散病勢緩而用引經藥

紅獨歸 烏 赤芍 金銀花酒洗 翹 天花莖

甘節各四 紅蘊木 刺蟬蛻各三 檀各一 右為末蒼耳煎湯

獨蟬丸 併取蟬蛻

拿取活蟬大壯癩疔 捉住後脚以大桑葉或油紙包掩其頭

用鐵針取眉間白汗淚兼上凝結如濕真粉丸如某豆一

蟬作一丸多者作二丸懸當風吹陰乳患疔腫者即以

一三九置方火上仰卧時若小滿口嚥下或以針刺開

疔腫頭上納某一丸以薄皮紙貼護之癰疔初起時依此

法可治之取蟬酥時入眼即轉

追疔奪命湯

危獨青多用 風多用 連 赤芍 細 甘節 蟬蛻

疆慧脚連 各等分 加河車 澤蘭 金銀花

有膿如何首莖 莫利 加青木 梳太 牽 右脚加木各等 右水

內托連翹散 疔瘡出皮色不變不疼用針刺仍服此消散

翹 芒 生地 赤芍各一 太 梳 可各七 朴 硝各三 苓半兩

甘一兩 右入燈心竹葉煎如喘加參少許

五聖散 治疔瘡 皂針二兩 葶 不 太 金銀花 生薑

甘節各一 石 酒 煎

百二散又名龍 治發疔瘡項蹠手足不佳發狂者

甘節 苜蓿 辰各等 右為末每服三錢熟水下

蟬蛻母 蟬蛻一枚為末以白麵和黃丹搜作劑丸如小

麥太針破患處一粒內之神妙仍以水澄膏貼之

水澄膏 白皮半 為末水盪內沉下澄去水皮紙攤貼

治疔瘡腫甚者 附子末醋和塗之乾即再塗

治一疔腫取蒼耳根莖葉燒作灰醋浸和如泥塗

乾即易十餘度即拔出其根

魚胸疔 瘡頭黑深破黃水出即時浮起 蛇蛻燒灰

存性為末雞子清調敷集腋狀似魚胸也

治魚胸疔 絲似葉 匪鬚者 韭菜 右石內肉搗爛

酒和服以粗紙貼腋下如病在左手貼左腋下在左脚貼左膝下右同如在中心貼胸前用布中縛住俟肉下紅綿如骨白色則毒令人抱佳恐顛倒則難救

冬法冬掌後橫文五指男左女右七壯即瘡 專治疔瘡

以大蒜搗成膏塗瘡周圍留瘡頂以艾冬之以燻者

度如不燻稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者
有紅絲疔頭生手足間有紅紫一條急用針判斷
不然其絲入心必難治

一瘰癧

瘰癧瘡者有風毒劫毒氣毒之異瘰癧結核寒熱之殊皆由忿怒氣逆百憂思過其風劫邪氣內搏於肝經蓋怒傷肝之主動故令筋縮結毒而腫多生於頭項胸腋之間結聚成核初如豆粒後如梅李累累相連大小不定初覺增突壯熱咽項強痛腫結不消者使當服散腫潰膿或五香連翹湯散之或用牡蛎大黃湯疎利之瘡上可用十香膏之類貼之或隔蒜灸之又有馬刀瘡亦生於項腋之間類瘰癧瘡但其狀如馬刀赤色如大塊極痛宜急治之

夫瘰癧者結核是也或在耳後或在耳前或在耳下連及頤頰或在頸下連及缺盆皆謂之瘰癧或在胸及胸之側或在兩腋皆謂之馬刀乃手足少陽經多氣少血之病也

丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚耐氣之積須分虛實者易治虛者難治

救苦化堅湯 治癰疽馬口

脊漏下升翅 麩 參 牡 生 地 燻 身

熟地 白芍 牛 我 連 栢 各 三 分 炙 甘 葛 獨 風 各 一 分

桂 貝 布 益 核 各 三 分 柴 八 分 朴 一 分 麩 一 分 石 為 末 湯

浸 蒸 餅 捏 作 餅 子 日 乾 搗 如 末 粒 太 每 服 三 不 白 湯 下

如 氣 不 順 加 橘 紅 甚 者 加 木 少 許

如 止 在 陽 明 令 者 去 柴 牛

如 在 少 陽 令 者 去 獨 漏 升 葛 加 瞿 三 分

如 人 素 氣 弱 病 勢 來 特 氣 盛 而 不 短 促 者 不 可 考 其

平 素 宜 作 氣 盛 而 從 病 變 之 權 也 加 芍 連 栢 知 己 之 類 在

上 焦 芍 在 中 焦 連 並 半 兩 用 生 用 在 下 焦 瀉 梨 栢 知 己

如 大 便 不 通 而 其 邪 盛 者 加 瀉 梨 大 黃 以 利 之

如 血 燥 而 大 便 乾 燥 者 加 桃 仁 瀉 梨 大 黃 風 燥 加 麻 仁

如 風 溢 而 大 便 不 行 加 煨 皂 角 仁 大 黃 秦 苳

如 人 素 氣 弱 去 苦 寒 之 藥 多 加 參 芪 甘 之 類

凡 母 令 藥 多 妨 其 飲 食 此 為 大 治 之 法 也

又 冬 寒 不 可 用 芍 如 有 煩 躁 去 桂 無 腫 不 可 用 牛

如 瘡 堅 硬 甚 者 用 莪 不 甚 堅 硬 不 用 如 唾 多 吐 食

用 益 智 不 然 不 用 如 煩 躁 用 栢 不 然 不 用

散 腫 清 堅 湯 治 馬 口 瘡 結 硬 如 石 或 在 耳 下 缺 盆 或 有

上 肢 下 臂 手 足 少 陽 經 中 及 癰 疽 遍 於 頭 或 至 頰 車

堅 而 不 潰 在 足 陽 明 經 中 所 出 或 瘡 已 破 流 膿 水 並 治 之

芍 八 分 酒 洗 臙 酒 洗 炒 栢 酒 洗 知 酒 炒 昆 酒 洗

枳 各 五 分 柴 各 四 分 炙 甘 枳 酒 洗 莪 酒 炒 麩 各 三 分 白 芍

葛 歸 梢 各 二 分 連 升 一 分 右 作 一 服 水 二 盞 先 浸 半

日 煎 至 一 盞 去 粗 食 後 稍 熱 服 於 卧 處 伸 足 在 高 處

頭 低 垂 每 含 一 口 作 十 次 吞 下 服 畢 步 頃 依 常 女

卧 取 菜 在 臍 上 停 蓄 故 也 別 制 一 料 為 末 煉 蜜 丸

如 菜 豆 太 每 服 百 餘 丸 以 前 菜 送 下 或 加 海 藻 五 分 亦 妙

升 陽 調 經 湯 治 癰 疽 升 八 分 葛 臙 酒 洗 炒 芍 酒 炒

莪 酒 炒 枳 酒 炒 炙 甘 各 四 分 歸 梢 各 二 分 栢 酒 炒 知 酒 炒

右 水 浸 半 日 煎 臨 卧 稍 熱 服 外 為 末 煉 蜜 丸 如 前 方 法

柴胡連翹湯治男婦馬刀瘡 瞿各五分 柴翹知各五分 牛炙甘草各五分 生地各五分 歸梢五分 桂一分 右水煎稍熱服

消腫湯治馬刀瘡 翹二升 生苓各一分 柴各一分 括各一分 歸梢各一分 牛各一分 連各一分 紅各一分 右水煎稍熱服

橫掃散治氣毒瘰癧心壅飲食不下

枳前各五分 赤苓各五分 牛各五分 連各五分 紅各五分 右水煎稍熱服

射干連翹湯治瘰癧寒熱

射干各五分 連翹各五分 玄參各五分 赤芍各五分 木升各五分 前梅各五分 歸梢各五分 右水煎

太炒 右水煎又芫硝少許食後溫服

明桂麥飲治瘰癧馬刀 瞿各五分 翹各五分 右水煎

服此藥經効累多但不能連服待歲月除

治結核耳前後或耳下頰下有者皆瘰癧也

桑椹三斗極熟 以布裂取自然汁砂器內文武火慢

熬成薄膏白湯煎一匙食後服

連翹丸治瘰癧結核破或未破 新薄荷葉二斤取自然汁

皂角一條去皮水浸去汁 已上三味銀石器內熬成膏

青陳半生半炒 翹五分 皂角子櫻玄皮為末 右為

末用膏子凡每服三十九煎連翹湯下十日効

貼瘰癧 大田螺連殼燒存性研末破者乾貼未破者

香油調付

治項間少陽經中疔瘡赤腫硬痛 草麻不生 生薑一條

右三味搗爛攤帛上貼

治瘰癧不同有頭無頭用大蜘蛛五枚晒乾研油調

貼之日兩度

二方馬齒菜度乳燒壓臘月猪脂和以暖酒洗瘰癧

乾傳之日三度

龍泉散 龍泉粉炒磨刀石上粉也 瓦粉 莪筒洗 棗炒

昆布各五 右為末煎熟水調塗之効速

一方五倍 海蝶各五分 雷各五分 灵脂各五分 麝各五分 右為末

清油調塗過則乾搽

又星中 血竭各一分 輕各一分 許各一分 為末津液調傳

灸法 治瘰癧以手仰置肩土微拳肘骨尖上是穴

隨患此即灸左肘右肘各七壯再灸如前三次
永無恙四五十年用茶不退辰時着灸申時即落
之法以蒜片貼癰瘡上灸七壯易蒜多灸取功

一瘦瘤五

喜怒不節直思過度致氣滯血凝為瘦瘤
者多結於頸項之間瘤者隨氣凝結於皮肉之中
忽然腫起狀如梅李久則滋長醫經所謂癭有五
種石肉筋血氣也瘤有六證骨脂膿血石肉也
治法瘦不可決破則膿血崩潰多致大枉瘤惟有
脂癭破去脂粉則愈餘五證亦不可輕易決潰

破結散 治五癭及馬刀瘰癧等證

海藻酒洗 龍膽酒洗 海蛤 通草 貝母 昆布酒洗
栝黎 松蘿各三小个以 麥麩炒四 半二 右為末每
服二不熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞豬五辛生菓菜
昆布丸 治一切癭瘤 昆布洗 海藻洗 小麥醋煮乳 各一兩

右為末煉蜜丸如杏核太每一丸食後含嚥

一方 昆布一兩洗 搗為散每二錢綿裹於好醋中
浸含嚥津菜味尽吞食之或切指太酢浸含嚥津

南星膏 治皮膚頭面生瘤或軟或硬不痛

生南星大者一枚研如膏 醋調如膏先將小針刺令氣
無生者乳者為末

透以膏攤紙上如瘤大小貼覺痒則頻易貼

灸法 治諸癭 天突穴灸三七壯

肩髃二穴男左十八壯右十七壯女左十七壯右十八壯
在時骨頭肩端兩骨間陷中拳肘取

又灸兩耳後髮際七壯

一結核

丹溪曰凡結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作

膿者多畏痰注不散名曰痰核一陳加酒炒 大黃連翹
結柴煎服

又市治臂核作痛一陳加翹芎 皂刺風蒼酒芥
治小腹連毛餘結核痛不可忍必灸熱

梳抄桃抄棗乃查等分右水煎入薑汁服

一漏瘡林

蓋漏瘡須先服補藥以生血 參 芪 木 歸 芍
分等為大劑服之 外以附子末醋調作餅如錢厚以
艾灸之漏大艾炷亦大但令微熱不可令痛餅乾易
之如困倦則止末日又灸至肉平為効仍用好膏藥貼
截疔散 治年深疔瘻 連五 白芨 白欬

一瘰子林

黃丹 蜜佗僧各一右為末入輕腦腐各 乾搽或以膏
一瘰子 南星為末醋調塗敷次即落
一疔地膚子 白礬等為末煎湯洗敷次即去
取蜘蛛絲纏根下妙 或用髮纏根下妙
又以針穿髮於患處數次穿
又灸瘰子上二壯以水滴之即去

一內疽林

丹溪曰內疽者皆因飲食之太挾七情之太相鬱而發
其發在腔子而頭向內疽以內托之系托出外以針
開之而愈先用四物湯加桔梗香附生薑煎服膿出
後亦用四物湯調理而安

一肺癰林

肺癰者乃肺經感受風邪熱毒所致也多因久嗜炙
煇肥膩或勞傷氣血致心火炎熾薰灼肺金令咳
嗽咳而不已遂成肺癰其肺數而咳中有濁唾涎
沫若口中辟之燥欬又胸中隱隱而痛肺及滑數
此為肺癰咳唾膿血肺數而虛者為肺痿其甚者
為肺癰初起皆可救若日久唾膿臭敗者不治
肺癰之候口乳喘滿而渴咳唾膿血或腥臭胸中
隱隱微起者肺癰也又中府隱隱而微痛者肺癰也
上肉微起者肺癰也肺微脹而數者未有膿膿甚
而數者已有膿短而滿者有痰浮大者難治市法固見

而數者已有膿短而滿者有痰浮大者難治市法固見

傳 一腸癰

腸癰者小腹腫強按之則痛小便數澀時行出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脈洪數已有膿脈遲緊者未有膿甚為腹脹大轉側水聲或遠所生瘡或膿自臍出或大便膿血

黃牡丹湯 治腸癰有膿即下膿即下五

太_{四兩}牡_{二兩} 桃_{五十枚} 芒_{三合} 葶_{半升} 右水六升煎取

一升去粗入芒硝再煎分三服

林 黃芩仁湯 治腸癰腹中疔痛頑毒不效或脹滿不

食小便澀婦人產後因熱多有此病縱非是癰疑似亦

薤_{五斤} 牡_{五斤} 去皮炙炒 葶_{四斤} 右水煎

射干湯 治胃脘壅熱成癰身皮甲錯欬膿血

射干_{半斤} 赤芍_{三斤} 木_{一斤} 右水煎入地黃汁

一合蠶少許服

集錄 四聖散 治腸癰便毒 生黃_{一枚} 枯葶_{一枚} 粉_{二枚} 梨_{四枚}

以_{三斤} 乳_{一斤} 右用好酒慢火煎兩日服尽大便下惡物

牡丹散 治腸癰冷證腹滿而痛時利膿

牡丹_{一斤} 天麻_{一斤} 白朮_{一斤} 蒼朮_{一斤} 桂_{一斤} 桃_{一斤} 各三分

其_{二斤} 薤_{二斤} 右水煎食前溫服

梅仁湯 治腸癰裡急腹痛大便閉澀

梅核仁_{四十九个} 大_{三兩} 牡_{二兩} 冬_{二兩} 杏仁_{四兩} 犀_{一兩}

芒_{三兩} 右水煎服下膿血三四行為度

傳 冬法 屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而安

林 一便毒

便癰者血疔也俗呼為便毒乃足厥陰肝之經絡及衝任督脈亦屬肝之傍絡是氣血流行之道路心淫壅而為癰治之宜以導水丸桃仁承氣湯大下之

夫便毒者生於小腹下兩腿合縫之間初發寒熱腿

間腫起疼痛是也初起慎不可用寒涼之藥恐血氣

愈結不得宣散及成大患惟當發散寒氣清利熱毒

丹後曰便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三升

生毒前食前服得利二三行即效 射干紫花者是紅花者勿用

二方破破紙 黍粘子 微炒 黑牽子 炒 大黃 酒蒸 石等分為末
每服一兩酒調下

便毒已結成膿者 大黃 酒拌 麩 各五 實 三不 朴甘節
各二 桃 三 生薑 三片 水煎服之

蘇方散 治便毒 木賊魚 各 歸尾 芍 芫 甘
芎 射干 忍冬 即金 大黃 川山甲 糖大 沒 蒜木 各

右水酒各一盞煎至一盞食前服
牡蠣大黃湯 一名內托散 治便毒

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交錯腫結
疼痛 桂 太 白 芍 澤 牽 炒 朮 去皮 甘 三不

退毒散 治便毒腫結 穿山甲 半兩 猪苓 三不
右為末食前老酒下次醋煮肥皂研膏敷之妙

疔毒散 治便毒疔惡瘡 毒 一不 金銀花 牛
生毒 甘 各半 右不犯銅鐵酒煎空心溫服微利為度

巨物湯 治便毒疔太極 等 為末酒煎露一宿 空心
消毒飲 治便毒初發三四日可消 溫服

皂針 金銀花 風 歸 太 甘 節 毒 等 右水酒各
半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立效

敷藥 治便毒腫痛 雄 乳 各二 栝 一兩 右為末新汲水
調敷腫處自消

便毒初發 生毒一大塊米醋一合以毒蘸醋磨取千步
峯匠敷之即散 千步峯乃地上人行日久其垢突起者是

便毒初覺腫痛 以紙錘於上按摩數次自消散

女便毒法 隨所患左右手自掌後橫文量至中指
頭尺心卻位橫文量至臂尺是穴灸三壯

傳 一妻癰 十三

丹溪曰妻癰者濕熱下注也有作膿者此得氣下流
入陰道因陰道或虛水道不利而然膿自其不
可也惟在善調攝耳

癰疽入裏者由濕熱入肝經維膿潰皮脫畢丸懸掛者皆不死

陰腫者由膀胱蘊熱風濕相乘或濕熱水腫流注或疝氣攻作或暴風客熱所致也

巨白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰囊腫脹二便不利

白茅 二兩 桑 炒 木通 陳 各五 右為末姜湯調下

二五 治外腎腫脹 面 炒 蝎 炒 穿 各 木 各等 為末每服

二不空心酒調下痛止立效

敷茶 治陰囊瘡癰疔不化自汗不收

瑤黃丹 各六 枯丸 一不 腐 龍泉粉 二兩 右為末手心

搽患處

地龍膏 治大人小兒外腎腫硬或疝氣風熱暴腫

生乳地龍 為末先以葱椒湯無風處洗用津調敷或

用熱雞子清調敷或加牡蛎

男婦陰腫如牙核痛 馬鞭草 搗汁塗之

又荏葉杵為泥傅之腫即消又蕪菁根搗傅之

外腎腫及陰瘡地竜毒研生薄荷汁調傅

又菝仁研膏傅之

卒外腎偏腫疼痛 大黃末和醋塗之乾即易之

一方 野紫菀 種 面青背紅 培乳為末付之如燥香油

林

調付裏脫無皮者以青荷葉包之其皮自生

牡蛎散 治小兒陰腫太莖物通明 蛎粉研細先以津

塗腫處次以粉捺之 桃仁研膏味調敷

蟬蛻散 治浮裏腫小兒坐地為風或蟻吹着所致

蟬蛻 五 右水煎洗仍于五苓散加灯心煎服

治小兒外腎嫩赤腫痛 老杉木燒灰臙粉麻油調敷

灸法 真崙 二穴灸三壯 治陰腫在外踝後跟骨上陷中

內崙崙灸三壯 治小兒陰腫在內踝後五令筋骨間

又病陰腫不可救者宜速灸水分蓋水分能令水穀

水穀不分故陰腫也

治陰印偏太灸關元百壯

一 疔瘡 十四

陰頭生瘡因年少陽道與逆當世不世不當世強世
脈斷嫩皮初如針眼大畏疼不敢洗日以攻入皮肉連生
潰爛用荆柏鞭蒼耳生葱煎湯洗去膿掩以
訶子燒灰入麝少許乾搽仍禁房事三五月臨睡
喫冷水兩三口勿令陽興脹

陰頭生瘡先用陳大螺螄殼燒存性為末先搗湯洗
淨乾搽

津調散 治如精瘡膿汁淋漓臭爛

連欬等 為末先以地骨蛇床子煎湯洗搽乾津調
藥敷之

一方大田螺兩箇和殼煨存性為末入輕少許傳之

治陰瘡疔痛黃汁注 石真末入輕少許傳

又生白礬冷水研汁洗之

治陰疔腫爛 防己為末先煎湯洗搽之

治陰瘡疼痛出水久不瘥 椒荆床等槐柳枝各

右水煎玄粗選用雞子清調和硝末塗之

治陰頭瘡蟹甲燒為末雞子白和傳之

又以蜜煎甘草塗之差

治疔瘡及陰疔疔瘡 雞卵殼 黃連 輕粉等 為末

香油調先用香附白芷五倍煎湯洗傳之用硝末湯洗

腐香輕粉散 治血疔陰蝕耳疔一切惡瘡

腐輕各乳沒各一 右為末乾貼

治下疔瘡 灯炭 輕粉 腐少許 右為末乾貼

治下疔瘡腫不消 荆風膝甘等水煎洗之

治下疔瘡 乾輕 腐各許 為末先以口含將水洗

搽乾貼日三四次

又蜜使連 柏輕等 為末搗艾煎湯洗乾搽

治走馬疔疔下疔 伏龍肝 乳胭脂各 腐各 乾各

右為末先煎水洗搽乾貼之

治陰疔疔瘡 蚕退燒存性 輕乳各許 為末搗湯洗傳之

治下疔瘡 鳳凰退燒存性研香油調付外看其大小

剪髮中白膜貼須靜坐一日不動即落

又青黛蛤粉蜜陀僧黃連為末付
下疳瘡洗菜連栢歸正招風朴硝制

右入錢五十五文烏梅五个塩一匙同水煎洗木樨連
銅青輕枯丸 桑螺 腐等為末洗後至夜敷上

腐香散 治如精瘡 黛欵等腐 訂為末先以
地骨桑白煎湯洗拭乾次以律吐調茶敷

治男女瘡 米粉一兩 芍苓坊附其各一 右以
入水搗脂一斤微火煎上三下俟白芷黃廬去粗米
粉和調敷

栢槁散 治陰莖疔瘡蝕透久不愈
栢雄輕蜜陀連栢朴硝等為末先以葱白湯

洗搗乾瘡濕氣搽若乾油調塗
治瘡瘡疼不止 滑蜜陀 冬水煨各 臙腐許右未

治丈夫陰下濕痒 蒲黃末傳三四次
治股內陰下長淫且臭或作瘡用胡粉傳之大驗

一 臙月離 十五

丹溪曰腎居小腹之後在下此陰中之陰雖曰太陽多
血然氣運不到血亦平來中年後尤慮患此證之緣

有腫痛糸之脈証証但見虛弱便予滋補血氣可
得終志若無積補功其禍多在結痂後填

內托羸活湯 治凡腎生癰堅硬腫痛大作
羸栢同炒各 風葉 歸尾各一 桂三分 麴甘各 蒼

陳各五 苳一 右作一服水二盞酒一盞煎至一盞去
粗稍熱空心服以衣覆蓋攤上使藥力行去衣

一 臙瘡 十六

夫臙瘡者由腎臟虛寒風邪毒氣外攻三里之傍灌
於淫文之側風熱毒氣流注而脚生瘡腫

隔紙膏 治內外臙瘡 歸正連 五倍雄
血竭 海螵 白及 白欵 栢朴各十 黃母六 乳三 車各

右為末清油調成膏用油紙貼藥敷上絹巾縛定有

膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈
燒鹽湯洗淨拭乾待水氣乾貼藥

治腫瘡下注 白石脂 龍骨 各半 枯瓦 二箇 五倍 存性
黃丹 三錢 雄黃 許 右為末先煎湯洗見赤因後敷藥

治外腫脚瘡 電心黃土研細入黃柏赤石黃丹 各半 乳沒
輕研和清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼瘡上外以

油紙掩之札縛縱疔不可開視數日後未愈再換藥去
藥先以茶清洗淨付藥

治外腫瘡臭爛多年 龜一箇 用殼以米醋一椀炙醋
盡仍煨令白相盡存性用破蓋地上出大毒為末入輕

粉麝香和勻先以葱椒湯洗搥乾
治久年腫瘡及脚上老瘡 輕粉 黃連 各等 為末以濃

茶清入鹽口含漱洗瘡搥乾傅藥又將油調赤石脂
末傅油紙貼之綿帛縛定三五日効

治脚肚生瘡初如粟漸大黃水出痒不止百葉煎研
滋潤傅自外而入以貫付煎洗搥乾傅

一癩癬十七

夫疥癬者皆由脾經濕熱肺氣風毒淺浮者為疥深
沉者為癩久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛
二者有細虫而能傳染人也

當歸飲子 治瘡疥風癬濕毒燥痒 歸芍白芍
地風 蒺藜 荆 各一 何首烏 蔓 各一 右水煎

升麻和氣飲 治瘡腫癩疥痒痛 升麻 蒼耳子
太 陳 歸 芍 各五 芍 右水煎

苦參圓 治遍身痒癩疥瘡傷 苦參 蒼耳子
連太 枳 各二 芍 右為末煉蜜丸

如梧子每服三十九食後漿水下茶酒亦可
治疥瘡 烏鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲之

治癩瘡 浮萍 苦參 蒼耳子 蒼朮 香附
芍 五 石水煎洗

身上虛痒 四物加芍前調浮萍末一錢服
白癩風癬 以小麥攤石上取鐵器燒紅壓出油搽之効

治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡大丹諸般惡瘡
蛇床 苦參 蕪荑 各一 雄硫 大風子 椒各一
輕 二不 棗脂 二不 右為末生猪油調付

又方治証如前及小兒癩頭瘡
蛇床 硫 柏 黃丹 各一 雄 大風子 取四 椒 各五 枯丸 二
輕 二不 牛皮屑 以香炒屑代之 右為末生猪油調付

聖散 治肺臟風毒血氣凝滯瘡疥癩瘡
蛇床 五不 連 七不 胡粉 二兩 水銀 二不 半同胡粉 煎水銀研令盡 右為末
香油調和稀滑先塩漿水洗後塗之 乾更換

玄精散 治疥瘡 硫 椒 枯丸 玄精石 等分如無玄精石者青亦可
右為末油調敷

浴散 治渾身瘡疥 硫 椒 枯丸 玄精 雄 各等
輕 少許 早起飽食乳物勿飲湯先防風通聖散一

貼入白蜜二不送下神芎丸 市見 五七十九入浴堂內
令汗出孤破瘡搽茶再煎搽

洗 苦參 蛇床 白礬 寸許 荆 芥 寸許 右以咀煎湯溫洗

散 朴硝 三兩 硫 二兩 枯礬 五兩 右為末油調臨臥敷

治疥癬 松膠香 輕粉 研勻先用油塗疥上搽末
又竹葉燒末雞子白和塗不過三四次瘡

洗 又用柳絮葉煮汁洗立愈
治遍身風痒瘡疥 苜蓿煮濃汁洗差

傳 治瘡瘡久不瘳 羊蹄根搗紋汁用臘粉少許如膏
傳如乳猪脂調傳

癬初生或始痛痒以姜黃末傳之妙
又初生或始痛痒嚼塩塗之妙

濕癬白秃 馬齒莧真膏塗之若燒灰傳之良
治瘡癬用末醋熬煉皂角針濃煎汁傳

又苦練根醋磨塗疥
又羊蹄根和猪脂塗或著塩少許

又葶苈末生油調敷
治婦人風瘙癢疹身痒不止 蒼耳花葉子 等分

末豆淋酒調服二錢匕

集錄

搽

治乾濕膿瘡疥癬等證 搽蛇床各一 西蝸半 條硫黃半
右化開硫黃入荆末三 敷傅候冷加輕粉二 冷再碾末
加三末半 西 右為末先將小油浴過彼冷調上塗搽

公賢散 治風癩松皮癩痺久不瘥者
蒼朮破故 煨腹雄 輕硫 枯凡各一 西 右為末油調
搽三五次瘥則搽

祛風白芷散 治面上風癩 芷三 苓一 黃丹連
栢各二 輕一 右為末油調搽

治諸癬 半夏三 搗末陳醬汁調和瘡塗瘡膏三

一癩風十八

追風丹 治癩風 何首烏 蒼朮 苦參等 為末和

皂角膏丸如梧子大每服五十九空酒下忌動風物
治紫白癩風 硫 輕 杏等 為末薑汁調搽

文硫二 海蝶一 為末浴後生薑煎搽數度絕根
又硫黃末醋調以茄蒂煎搽患處或加附子薑汁調

一諸瘡十九

夫諸瘡者謂諸般小瘡也凡人體虛感風濕之氣

發瘡癢痒痛癩腫身熱多汗是為惡瘡或生於手
足間相對如新菜葉痒痛搔破則黃水淋漓有孔如

稿久而生虫是為癩瘡或初生如飯粒漸大而有根頭
破血流膿出肉及如花筒之狀是為翻花瘡或初生甚小

失痒後痛汗出浸淫濕爛延及遍身名曰浸淫瘡或生
於面耳鼻面頰及下部流膿入節終月中則瘡盛月未

則瘡裏是為卍蝕瘡 或毒氣攻手足指臂肉裡上指
甲疼痛出血瘡中有虫是為甲蛆瘡或指頭先腫破

熱刺痛然後於爪甲邊結膿甚者爪甲俱脫是為
代指 國暑之時膝理易同風熱搏皮膚輕者如撒更

重者熱汗浸漬成瘡是為痺瘡或心神煩燥遍身
發瘡赤爛如火名曰熱瘡或觸風寒血泄不行其瘡

帶不知痛痒經久難瘥名曰冷瘡或身發瘡腫甚癢
非真非癬非疥狀如惡瘡或瘡或劇名曰無名瘡

或頭生白團班刺如癩上有白皮久則成癩遂致癩瘡
中有乳有膿細玉入者不痛微痒少長不瘡名曰癩瘡
或冬月因寒手足皸裂或瘡名曰凍瘡

連翹飲 治惡瘡紅赤痛疔心煩口乾及婦人血風赤斑
圓點疔爛成瘡疔痛流黃汁 翹 坤 括 生 地 赤 芍

荆芥 門 明 通 牛 柳 槐 風 芍 甘 入 燈 心 櫻 桃
治 槐 母 治 一切 惡 瘡 血 渴 乳 沒 銅 絲 柘 瓦 穿

黃 丹 各 一 輕 煨 酥 各 五 腐 少 許 右 為 末 用 鵝 牛 搗 膏
丸 如 小 豆 大 每 服 一 丸 用 葱 白 子 嚼 爛 裹 茶 煎 酒 送 下

內 固 清 心 散 治 惡 瘡 疔 盛 癩 痛 頑 渴
辰 雄 朴 硫 荖 參 白 葱 菖 豆 甘 腦 腐 皂

右 等 分 為 末 每 服 一 小 盞 湯 調 下
黃 連 獨 活 散 治 一切 惡 瘡 初 發 腫 甚 者 三 四 服 而 消 散

五 香 連 翹 湯 治 一切 惡 瘡 方 見 右
涼 血 散 心 肺 有 熱 或 作 寒 熱 口 乳 身 痛 面 赤 失 眠 敗 毒

散 後 用 此 藥 酒 煎 可 並 天 花 甘 芍 生 地

門 梳 車 翹 石 入 竹 葉 灯 心 新 葦 黃 齒 加 煨 葱
并 血 散 治 遍 身 生 瘡 膿 血 壅 腫 極 痛 且 疔 敗 毒 散 加

高 芍 升 甘 天 麻 蟬 蛻 可 生 地 門 入 每 末
更 散 治 腫 毒 惡 瘡 大 疔 甚 者 為 末 酒 調 三 服

又 茶 調 敷
付 治 無 辜 瘡 毒 連 栢 為 末 芭 蕉 根 汁 調 敷 留 搽

或 加 輕 粉 有 汁 加 黃 丹 炒 腐 少 許 和 勻 乳 搽
洗 越 虎 散 洗 諸 瘡 毒 方 見 右

布 席 治 遍 身 熱 毒 瘡 痛 而 不 疔 手 足 尤 甚 粘 著 衣 破 不 得
再 舊 席 末 多 用 布 於 席 上 恣 卧 其 間 五 七 日 効

塗 醫 愈 瘡 散 治 遍 身 生 瘡 百 藥 不 効 楮 五 个 硫 生 五 个
臍 下 石 和 勻 每 用 二 錢 每 手 心 內 香 田 調 夜 卧 時 塗

外 醫 不 可 法 手 但 搽 擦 令 乾 二 日 愈
塗 竹 茹 葛 黃 瘡 疔 瘡 香 油 三 兩 青 木 香 五 斤 木 十 五 粒

青 竹 茹 一 塊 右 慢 火 熬 香 仁 色 黃 玄 粗 入 松 香 末 五 錢
熬 膏 塗 瘡 効

五 皮 丸

洗日于掌心生瘡 牡蛎灰包湯浸洗至湯冷止不效僅可
付日脚上瘡 蔥角燒存性為末入輕粉香油調敷

濕脚氣生瘡 平胃散末乳搽之 又葱椒湯洗可
又五積散 酒煎服

脚指縫瘡爛濕 枯丸二 黃丹半 右末搽之

治代指 指甲頭腫 烏梅仁搗碎 右研細末醋調稀
入指縫自愈

甲疽瘡及諸瘡 烏梅搗細和蜜捻成餅子如錢
厚貼之 又用硫黃末薄敷使肉縮 膿乾 乳香研 為末傅之南唐

又瘡腫毒 桑葉末水調敷
治凍爛脚成瘡 生附子去皮 為末麵水調貼

又治凍瘡 茄根漂煎湯洗以荏腦塗之
又黃蘗燒存性研雞子清調傅

治凍身成瘡 疔痛 黃柏白欬各五 為末先湯洗次
用香油調傅

治大丹毒遍身腫痛 寒水膏合三 柏甘各一

傳 為末薑薑汁調敷 又百合根研爛傅

治一切惡瘡 姜蚕蟬 為末油調付亦效 疔疔
又紅霜色蕉草為末油調付先用忍冬藤煎湯洗身

椒煎湯洗 扼乳付外以油紙掩之
又用黃丹入香油煎入朴硝抹之

手痲瘡 用皂枯丸 輕連栢為末付之
桃花散 治一切瘡生肌 及欬栢連乳腐黃丹

右等分為末搽之 二三日生肌
其法 葵花散 治一切瘡 葵花 爵金 連栢 栢等分

為末水調貼瘡痛處
下賢散 治熱汗浸漬成瘡 疔痛 不愈

香師 夙荆地骨通合二 白礬一 右水煎去

粗精熱淋 濕患 剋乾 避風 少時
昔練散 治浸淫瘡 練根西乳 為末猪脂調敷 濕

則乾 搽先用苦參大服皮煎湯洗
治惡瘡 連而疔痛 搗菖蒲封痂落即瘡

治一切瘡肉出 烏梅皮灰梓木傳惡肉之良藥
輕粉散 治疔瘡 香墨按此存 輕乳按此存 右為末先
以溫湯水洗淨乳搽

又柳甘石椒醋碎為末調塗

治疔瘡無名腫毒 蝦蟇皮灰存性為末調敷

治月蝕瘡 乳蝦蟇皮灰存性為末和猪膏傳

治月蝕耳瘡 非地蚯蚓糞為末猪脂調傳清油亦可

胡粉散 治月蝕瘡 胡粉炒 枯丸 黃丹煨 連乾 輕乾

胭脂乾 腐乾 右為末溫漿水入搗洗淨拭乾傳

乳者油調敷

治瘡生耳鼻口疔瘡時發 枯丸 蛇床各一 西連各一

右為末搽 蜜水調塗亦可

治月蝕耳瘡 並諸瘡生肌肉瘡口 以乳栝丸

黃丹煨 赤斂 栝丸各一 白膠香 腐各二 右為末葱白

煎湯洗淨搽乳搽

一方胡粉 束壁為末乳搽

一乳癰

乳癰 乳癰證有兒者名外吹 姪有孕者名內吹 姪

初起則用翕散流氣之藥 已成膿宜內托排膿

血順氣換勿妄用針刀

丹毒曰乳癰 多因乳母不知調養所致 蓋乳房陽明

所經 乳頭厥陰所屬 忿怒所逆 鬱悶所遏 厚味所釀

以致厥陰之氣不行 故鬱閉而汁不通 陽明之血沸騰

故熱甚而化為膿 或因所乳之子 膈有滯痰 含乳而

睡 口氣燥熱 所吹而成 結核初便 只將揉令核軟 吹

令行透可散 否則結成矣

治法以青皮疎厥陰之滯 石膏清陽明之熱 生甘草節

行行間之血 瓜蒌子清腫毒 或加以青橘葉 皂角刺

金銀花 當歸 貝母 或湯或散 以少酒佐之

文於痛如灸之 二三壯尤妙 粗工使用針刀 必成拙病

好岩始有核腫 結如蟹 若子太不痛 不疔 五年方成

破者尚可治成瘡者不可治

升麻托裏湯 治婦人兩乳向出頭瘡頂陷下及

乳癰初起 升葛翅 歸身 栝各二 香 桂 五分 升

牛 右水一盞酒半盞煎至一盞食後服

連翹飲子 治乳癰 翹 芍 毒 皂刺 橘葉 桃

青 甘草 各二 右 兼破者加柴已破者加參 葛 升 白 芍

百雀痛圓 治吹乳結核腫痛及乳癰 百雀痛 即積毒 二頭垢

右為圓如雞頭子太黃丹為衣每服一圓好酒送下如

不飲酒白湯下不可化用亦不可冷病人知極有效

二方 治乳癰 人牙齒 性 痰 右 為末 酥 調 塗

括葉散 治乳疽疔疔 黃括葉子 不去皮焙為末 生 丹 如急則用 胸 研

歸 各半 沒 二 不 乳 一 右用無反酒沙器慢火熬食後服

疔原五物湯 癰疽發背乳癰通用

葶 取 皂刺 半塊 沒 各半 乳 甘 各二 右酒煎服

復元通乳散 治乳癰結核不散

木苗青 穿 酥 炙 陳 芷 甘 各半 貝 姜 剉 加 漏 芦 一 不

右水煎或酒調亦可

又方 青 陳 翹 金銀花 各一 穿 各三 括 各三 甘 生 熟 二 西

右為末酒調服二名

橘皮湯 治乳癰初發即散已潰即効因小兒吹好者 並 治

陳皮 湯浸去白晒乳 魁炒微黃色 右為末 齋 少許 每服二名酒調服

一方 紫 蘆 一味 濃煎湯頻服及用葉盒乳疔

一方 治吹好 車 七枚 去核入罈炙七粒 飯在性研末入

齋 少許 溫酒調服

又皂角 煨 灰 蛤粉和熱酒一盞服 掬 散

治乳頭疔 秋後冷露露而裂開者乳疔存性為末

水調敷甚驗

傳 治乳赤腫致成癰者 南星末 姜汁調塗 初發時効

橘葉散 治婦人兩乳向出積毒 齋 乳 房 有 核

青 膏 楮 枳 殼 以 蒲 公 英 各半 毒 一 不 歸 頭 半 不

皂刺 一 不 半 去 火 略 炒 金 銀 花 三 分 右 作 一 服 加 青 橘 葉 一 下

握酒煎食後即時服

丁香散 治乳頭破裂或因火吹乳血乾自裂用
多痛

丁香一味為末乳汁裂處燥則唾津調付

治乳癰 蒲公英入少酒煎服即效 睡是

其効也

廿六味流氣飲 治岩 市見右

單煮青皮湯 治婦人真室前乳房有核

青皮四不 水一盞半煎至一盞日二服已上三方同服

至核消住業

楊梅瘡 一名天庖瘡 一名綿花瘡 一名翻花瘡

楊梅瘡近年以來極多庸醫務速効以輕粉丹麝香
毒利辛而氣血膏盛者得愈怯弱之人變生壞證不
知戒守變成疔疔久輕粉多用兼以腐香透骨膏
遂成風塊經年痛痺膿爛輕粉但量人虛實用之可
素無天庖楊梅綿花等瘡故無治法丹後於通聖中
加減量人厚薄治得効雖遲十無一壞

一方治翻花瘡 芎 天花各五 輕二不 雄各二不 辰各二不

三服

一方無芎天花亦効

一方歸芍芎 胡麻 牛蔓 拘已上四味 白蔘並炒紫也

若參枳 瓜 卷 何首 苾 卷 荆 翹 苓 梳 玄 參

皂刺 甘 天 荖 葉 藏各一 右為末末糊丸如梧子大每

服十丸茶下煎服亦可實熱癰盛者入輕粉二錢

黃藥 水 輕 雄 鉉 錫各一 木 欒五 腐三 右將水鉉

化而為毒末以紙捲入如筒燃之令人飲食以壯其胃
然後令正坐垂頭以綿被圍之而令氣相周也出行
其毒而劫体虛氣弱不復驚恐發腫

一 癩風

与癩通

癩風之傷人也或為寒熱或為扭中或為寒中或為癩
風又曰癩者因米衛扭腐其氣不清故使鼻柱壞而
色敗皮膚癢清風寒客於脉而不去名曰癩風

丹溪曰是受天地間殺物之風故也氣受之則在上血受
之則在下皆不外湯明一經陽胃者胃与大腸也無物
不受受之者頂致者其疔瘡与瘰上伴先見者
多者在上也下伴先見者多者在下也在上者以醉仙散
取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物虫
積於穀道中出後用防風用聖散調之更用三稜
針於毒中出血

近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性燥有燥瘵
之功而傷血有病將愈而先失明者

大風有五黑色不消餘皆可治虫食肝肩痿食肺鼻
崩食脚声啞食心定底穿膝腫食腎耳鳴嗽
耳癢生瘡或痺或痛食身則皮膚疥如虫行

凡痛風肌肉麻木瘡癬疥瘡膿汁淋漓眉髮落者
 手足指腕頑痺痛痺白皮脫落鼻樑塌倒眼爛齒齦
 色枯唇揭病證之凶無越乎此頁此病者有無一生切勿
 房室公私無務一切口味悉宜屏置治法先服梓皮散
 從少至多服五七日藥味將空其瘡愈後又次三
 灸之後服三聖散世劫去血中之風時更以升麻湯導
 下浮青丸倘年深日久則以愈風丹換肌散方治之
 梓皮散 治肺臟風毒遍身瘡疥及癢疹瘙癢之
 成瘡或面上風刺 梓皮四兩 荆穗各二兩 柘四兩 存性

甘各半 右杏去皮去水一碗熬候水減半取出乾研外
 都為末入香每服二錢食後溫酒調下
 醉仙散 治大風疾遍身癢疹瘙癢麻木
 胡麻牛 拘各二兩 蔓同炒 白蔞 苦參 括風各半 右
 為末每十五錢末入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下
 晨午各一服後五七日先於牙縫內出臭黃涎渾
 身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭病根乃去

三聖散 皂角刺三行炭大 為末每服三錢大黃煎湯調

清開治法 早服梓皮散午前升麻湯下浮青丸晚服
 三聖散此數藥皆足緩利疎泄肺中之風熱也

附麻湯 治諸風熱癩肌肉極熱上如單走口及縱
 皮色變升三四 神 參 風 犀 鎊 鎊 龜 各一

桂半 右為末每服四錢入生薑三片竹瀝少許煎服
 浮青丸 方見小兒驚風

通天再造散 治大風惡疾 前金二兩 大 櫻 皂刺
 炮碎并者佳 各一兩 白牽炒 右為末每服五錢日未出面東以

無灰酒調服盡量為度至晚必利黑頭小虫或如魚
 腸臭惡物忌食糖醬醋諸般魚肉樹材果實燥煖

多燻等皆可食稠粥軟飯及煮熟特菜亦須淡食
 茹亦不可食堆諸般蚊以淡酒煮熱食之可以助藥

須戒房室勞力及終身不可食牛馬大肉等
 大風丸 治疥癩 大桐子 一打 蝎 各一 蟬 各二

婦鬚太 各五 苦參 風 羌 荆 烏 蛇 肉 各二 獨 各二

右者用米飯丸如桐子大每服五十九丸茶清下
一五治癩風年深鼻塌眼爛遍身紅
烏菜百兩西平參三兩甘炒西右用大楓油化開梨
麵糊丸如桐子大每服五十九丸茶清下

傳
加減通聖散先服此大浮惡毒穢積又用三棱針着
肉黑處及委中紫脈刺出死血不可令出太過後服

神仙紫花丸

芎風荆穗 桔 枳 膏 柴 連 羌 各五

麴 白芍 歸 酒浸 麻 五服 葛 枳 甘 滑 苓 去朽

栝 各三 芎 二 地 熟地 並酒浸各 錦 大 黃 二 西 芒 一 西

皂刺 二西 右分八服用水一碗半煎至一碗空心服日二
服五六日後又進二服待補養完又行二次然後服

後丸茶

神仙紫花丸 治癩風及諸般惡瘡風瘡効如神

白花蛇 一具去頭尾各四五寸許 何首烏 荆穗 藜 各四
連根兩 胡麻子 一石 蛇床 二石 右各細切開無灰酒一大碗

浸一宿濾出晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度

晒乾為末別包 木 沉 各二 參 二 兩 歸 七 兩 天 麻

牙皂 各五 麝 一 不 牛 鼻 寒 乳 沒 各 一 雄 辰 各 五 分 大

葱一枚 定風草 二不半即天麻也今皆 還瞳子 即草决明 二兩

右磨至辰砂五味各別研不見火餘味亦別研連前五味
和勻別包 羌風甘細芎 獨 蒼 一 兩 枳 一 兩 培

白芍 莖 白 蔞 金 銀 花 五 加 苦 參 各 五 胡 麻 子

白附 未 付 浸 炒 麻 黃 膝 草 烏 未 付 浸 炒 川 烏 未 付 浸 炒 葛 各 三

右者末別包 搗合用大風子三斤 以磁罐盛之少

入無灰酒以皮紙重包口勿泄氣文武火蒸俟黑爛

為度杵無渣滓成油分作三分每一分入第一號茶一錢

重第一號茶六錢重第三號茶一兩五錢重和勻加

糯米飯搗極膠粘如桐子大晒乾勿見火每服二十丸

漸加至五十九丸雞鳴午時臨卧各一服茶清下忌房

勞鹹酸酒醋糟淹猪羊雞馬肉魚腥煎棗冰果五
辛姜椒大料辛辣扭物蕎麥菜豆之類

一方荆穗施太爵金地仲風冠獨白蔴分
者末以大風子油入熟蜜丸如桐子太每服四五粒
清送下日三服日誦觀音千方聲以攝其心禁其慾
浴浸法 桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸
坐浸頭一日後湯如油甘矣

林

本草治惡疾遍身生瘡濃煎洋湯浴浸半日大效
八種湯 淋洗大風瘡 桑葉 荷葉 地黃 皂角
膏 蒼耳 何首烏 箭葉 右八件葉晒乾等分
燒存性為末如面葉洗身上

一法 桑柴灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大黑豆漿
豆漿添湯三百一浴一自一洗面却用側柏葉煎湯乾白
膠香等分為末煉蜜丸如桐子太每服五七丸溫水下

儲

一方蒼耳葉為苦參為更以酒煮烏魚鱗代補蛇之或
煎研細糊丸如梧桐子太每服五六十丸加至七八丸熱茶
清送下日三服一二月而女若入紫葺尤捷紫葺多水
蛭須寒月於山活取之淨洗去泥畧蒸透乾用

林 十二救急門

被棺散 治癘 寐卒死及為牆壁竹木所壓溺水
金瘡卒致悶絕產婦惡血沖心諸暴絕證

半真湯泡七次去滑為或以皂角末吹入亦可

魔

雄屎散 治到久無人居睡中為鬼物所魔但吃作
聲便令叫喚如不醒可用

牛黃 雄黃各一硃半右為末每用錢床下燒一錢酒調灌

允魔者不可用燈照亦不得近前急喚使痛咬其足

跟並大拇指甲邊

一方電心者為末每服二錢新汲水調下

又雄黃末一錢煎桃葉湯調下

又魔死灸兩足大拇指聚毛中三五壯

又魔死及一切卒死灸人中穴三五壯又灸胸中百壯

救自縊自息至昏者雖已昏可活心下微溫者雖一日已

上可活急抱使繩寬解切不可割斷撻正喉嚨放臥

用被蓋急用竹管吹其兩耳令人急牽其髮不放手
就用脚踏其兩肩一人摩其胸及屈伸其手足摩持
之如活即以粥飲之

一方治自縊死以藍汁灌之

之刺雞冠血調入口中男用雌女用雄仍塗喉下

救溺水法 凡人溺水者急上岸即將件一隻却令溺者

之人將肚橫覆在背脊上兩邊用人杖策條牽牛

而行以出腹中之水如醒即以蘇合香丸之類或老薑

擦牙或橫版於圓木上亦可

仍取壁土一堵置地上以死者仰卧其上更以壁土覆之

止露口目自然水氣入土中

仍急用竹管各於口耳鼻膈裏門內更迭吹之

令上下氣相通

之用羊身末少許插其鼻如略活用粥飲灌之

又急解去衣帶艾灸膈中即活矣

一法 皂角為末葱白汁和丸凍核內下部中其

水自出如

凍死 四肢直口閉 只有微氣用大釜炒灰令暖以

袋盛尉心上升即易之目開氣出以清粥少進

之若不先溫其心便持火炙則冷氣入大爭必死

凡冬日凍倒投在暖處不得便子熱湯及向火多雪

中行凍便近火脚指隨廢

方治凍死生毒 研陳云白 右各一兩水煎溫服

暑 伏暑者 不可使冷之即死用溫湯尉心腹間如逢

中則用路上土放臍腹間令人入其中

墜 墜墮血沖心氣絕不能言取茶不能及急擊

開口以熱小便灌之 治法詳手攔傷門

喉閉 急唯用腫痛手足厥冷即時氣閉不通用皂角

三皮柳水一盞灌下立愈 治法具于咽喉門

毒蛇螫人急掘地坑埋瘡處築其上毒入土中

痛止

蛇入人竅用刀割尾挾辛辣物用絲縛定自出不

可拔

中蛇毒血脈不通則痛甚 治法詳于損傷門

林

凡臘月取雄狐膽如有人卒暴亡未移者溫水燉

研灌以喉即活常須預備救人移時即活如無膽

宜用雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

