

×

---

i 17

---

490.9  
Ig-5  
10

No 2034  
12 / 17



圖書印

1279

醫國學子管錐卷十九

九折屋山田  
氏圖書之記

三焦

瘡病春夏易秋冬難

膏藥

導赤赤各半湯方非陶節菴創意

聖惠方茵陳散醫國學綱目犀角湯

崔氏增損理中丸原於肘後方

鼻上汗出

竹茹溫膽湯非龍共氏所創

三物黃芩湯類方并治驗

皇朝經驗破棺湯方并類方



竹葉湯解五蒸湯類方

六一泥

讀方書說

灸瘡血出

用黃芩一味方

會集上十法

醫方類聚卷之四

醫方類聚卷之四

醫方類聚卷之四

膏藥

三焦

醫方類聚卷之四

通言醫方類聚卷之四

醫方類聚卷之四



### 三焦

四庫全書太極圖分解提要曰其書列周子太極圖說與朱子之注而申陸九淵之說以駁之案聖人三教使天下知所持循而已未有辨也孟子始辨性善惡亦闡明四端而已未爭諸性以前也至宋儒因性而言理氣因理氣而言天因天而言及天之先轉輾相推而太極無窮之辨生焉朱陸之說既已連篇累牘行朱陸之說者又復充棟汗牛夫性善性惡關於民彝天理此不得不辨者也若夫言太極不言無極於陽變

陰合之妙修吉悖凶之理未有害也言太極兼言  
無極於陽變陰合之妙修吉悖凶之理亦未有  
害也顧舍人事而爭天又舍共睹共聞之天而  
爭耳目不及之天其所爭者毫無與人事之得  
失而曰吾以衛道學問之醇疵心術人品之邪  
正天下國家之治亂果繫於此二字乎醫家之  
論三焦也或曰有名而無形或曰上焦如霧中  
焦如漚下焦如瀆實有名而有形軼轉喧闐動  
盈卷帙乃問其虛實之診則有形無與無形一  
也問其補瀉之方則有形與無形又一也然則

非爭病之生死特爭說之勝負耳太極無極之  
辨適類於是故今於兩家之說率置不錄謹發  
其例於此後不縷辨焉

四庫全書總目 卷九十  
五子部 儒家類



治瘡春夏易秋冬難

劉純曰治此病者春夏易秋冬難大忌飽食以汗之難易為優劣也

玉機微義

類聚百十一八十三

香月牛山曰揔メ瘡疾ハ汗ヲ發スヘシ汗出レハ必ず愈ル也此疔春夏ハ治シヤスニ秋冬ハ治シ難シ別ノ一ニ非ズ春夏ハ汗出ヤスク秋冬ハ汗出ガタキ故也古人モ云ヲカレテ汗ヲ目アテニシタル古方總テ瘡ノ藥ヲ用ハ大料ニスベシ一貼ノ分量ニ夕ヨリ三夕マデノ間ニスベシ瘡ハ暴瘡

ノ邪氣ナレハ小料ノ藥劑テテハ其藥病  
勢ニ勝カタキト知ベシ山活套卷上四十一

### 膏藥

南史四十二 齊高帝諸子傳三十二 豫章文獻王

疑薨後忽見形於沈文季曰我未應便死皇  
太子加膏中十一種藥使我癱不差湯中復  
加藥一種使利不斷吾已訴先帝

膏藥二十一種藥ヲ加フトアルカラハ  
一體膏藥ト云モノハ多味十ルモノカ  
スヘテ煎藥ヲハシメ何ノ方ニテモ藥  
品幾種位ノモノニヤ少キカギリ多キ  
カギリハ指南可以下



但此魂ノ一ナレハ典實ノ一ニモ有  
之ミジク候ヘトモ奉伺シ

明治八年乙亥二月廿八 岡本保孝

答

陶弘景本草經序例可服之膏膏滓亦可酒煮  
飲之可摩之膏膏滓則宜以傳病上

古ハ膏ヲ服シ又身體ヘスリツケタルモ  
ノナリ金匱要畧ノ頭風摩散モ頭上ヘス  
リツケタルヤウナレド主治脱スレハ詳  
ナラズ千金卷九ニ傷寒膏三方アリハ翼方

卷十六ニ諸膏三方ヲ載ス、イツレモ猪脂

ユヘ膏ノ名アリ麻油ニテ製シタル方モ  
アレモコレハ稀ニ後世ノ膏藥ハ多クハ

麻油ニテ製イツレモ四五味ヨリ十味以  
上ナリ醫心方外臺ナドニモ數方アリシ

カト存シ申候藥味ノ多寡ハ定リナシ畢

竟今時ノ膏藥ノ如ク瘡瘍ヘノミ貼シテ

服スヘカラザルモノト異心南史ニ癰トア

レハ今時ノ膏藥ニ類シタレモスリツケ

タルモノニテ今ノ薄貼スルモノニハアラ

サル欵ト覓ヘ申候今ノ製ハ明以來ノ一

ニテモアルベシ其始ヲ審ニセズ、劉君蒞  
庭ノ藥治通義卷九モ說アレハ、御覽ニ入レ  
申候、

煎藥モ仲景ノ方ハ一味ヨリ十餘味ニテ  
ヲ限リトス唐以降ハ一二味ヨリ五十味  
七十味百味餘ナルモ多ク有之候

右下問ニ付申上候

三月一日

山田業廣

導赤各半湯非陶節菴創意

此事難知曰傷寒傳至五六日間漸變神昏不  
語或睡中獨語一二句目赤唇焦舌乾不飲水  
稀粥與之則嘔終日不與則不思六脉細數而  
不洪大心下不痞腹中不滿大小便如常或傳  
至十日以來形貌如醉人虛見神昏不已多用  
淨氣湯下之則誤矣蓋不知此熱傳手少陰心  
經也然而又未知自何經而來答曰本太陽經  
傷風風為陽邪陽邪傷衛陰血自燥熱蓄膀胱  
壬病逆傳於丙丙丁兄妹由是傳心心火自上

導赤各半湯



按已上拔粹方  
文同但不知  
此事難知見  
醫方類聚  
卷六十一

迫而熏肺所以神昏也謂肺為清虛之藏內  
一有大邪致令神昏宜梔子黃芩黃連湯若脉  
一在內者導赤散脉在丁者瀉心湯若誤用涼  
一膈散乃氣中之血藥也如左手寸脉沈滑有  
力者則可用之或用犀角地黃湯近於是本方  
所說若無犀角以升麻代之是陽明經藥也此  
解陽明經血中熱藥若脉浮沈俱有力者是丙  
丁中俱有熱也可以導赤瀉心各半服之則宜  
矣此證膠脫傳丙足傳手經也下傳上也丙傳  
丁也表傳裏也壬傳丁者艮傳離也越經傳也

又謂腑傳臟也活人云傷寒只傳足經不傳手  
經也此言不盡蓋意也有從足經而傳手經者何  
以知之經云傷寒或止傳一經或間傳一二經  
不可一途而取之但馮其脉與外證治之此活  
法也與食則噤者邪不在胃也不與則不思者  
以其神昏故熱邪既不在胃誤與洋氣湯下之  
其死也必矣

王機微義類聚四十三卷五十四卷○心脉  
本此事難知無攷  
微義本書可  
教微義卷十四

治傷寒後伏熱在心煩躁恍惚或多驚恐及不  
 得眠臥宜服茵陳散聖惠方  
 茵陳兩 犀角屑一分 茯苓兩 梔子入兩  
 赤芍藥兩 麥門冬半兩 黃芩兩 生乾地黄兩  
 右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞  
 入生姜半分煎至五分去滓不計時候溫服  
類聚四十七卷九

聖惠方茵陳散醫學綱目犀角湯

拔粹方

治傷寒後伏熱在心煩躁恍惚或多驚恐及不  
得眠臥宜服茵陳散聖惠方

茵陳兩 犀角屑一分 茯苓兩 梔子入兩

赤芍藥兩 麥門冬半兩 黃芩兩 生乾地黄兩

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞

入生姜半分煎至五分去滓不計時候溫服

類聚四十七卷九

治傷寒後餘熱在心恍惚多驚不得眠睡宜服

茵陳散犀角湯



茵陳散方同上

茵陳三兩 犀角屑兩半 麥門冬一兩

梔子入三分 生乾地黄二分 茯神兩

甘草一分 赤芍藥三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入

生薑半分青竹葉二七片煎至六分去滓不

計時候溫服類聚四十八

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不得眠

睡醫學綱目卷三十二

犀角屑半兩 茵陳蒿七錢 茯苓二兩

芍藥 生地焙二兩 麥門冬去心兩半

山梔半兩

右以咀每服五錢水一盞半薑二片竹葉三

七片同煎食後服

治傷寒後伏熱在心中恍惚多驚不得睡臥宜

服茵陳散方聖惠方

茵陳兩半 犀角屑兩半 柴胡兩 茯神兩

赤芍藥兩半 麥門冬兩半 黃芩兩半 梔子入兩半

甘草半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入

生薑半分竹葉二十七片生地黃一分煎至六  
分去滓不計時候溫服類聚四十八、七十八夕

犀角湯治傷寒後伏熱在心怔忡驚悸不  
得眠睡按粹方類聚卷六十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

犀角屑兩半茵陳蒿七錢半茯苓二兩

芍藥各麥冬各山梔子仁半兩

生乾地黄兩右為麩末每服五

錢水薑一分竹葉二十七片同煎

食後服

崔氏增損理中丸原於肘後方

治胃脇痞滿心塞氣急喘急方人參朮各一兩  
枳實二兩乾薑一兩梔子蜜和丸一服一枚若嗽  
加括萎二兩吐加牡蠣二兩日夜服五六丸不  
愈更服肘後方卷二治傷寒時氣溫病



鼻上汗出

破證奪命丹治傷寒陰陽貳證不明或投藥錯  
誤致患人困重垂死七日已後皆可服千不失  
一好人參壹兩去蘆薄切水壹大升於銀石器  
內煎至壹大盞以新水沈取冷一服而盡汗不  
自它出只在鼻梁尖上涓涓如水是其應也甚  
妙選奇後集本書可檢觀聚方引

破證奪命散治傷寒陰陽二證不明或投藥錯  
誤致患人困重垂死七日以後皆可服傳者云  
千不失一好人參壹兩去蘆薄切水壹大升於

鼻上汗出

銀石器內煎至壹盞以新水沈之取冷一服而  
盡汗不自它出只在鼻梁尖上涓涓如水是其  
應也妙甚蘇韜光云侍郎方丈嘗以救數十人  
余宰清流日倅車申屠行父之子婦產後病時  
疫二十餘日已成壞證偶見問因勸其一味只  
服人參遂安是時未知有此方偶然暗合耳是齊

醫方類聚五十五ノ七十六引

差後面腫或腰以下腫治用索矩三和湯橘皮  
厚朴檳榔白木各三兩甘草炙紫蘇各三兩去  
粗梗木通海金沙各一兩右剉每服五錢水壹

盞生薑參斤煎至八分温服如鼻上有汗出必  
氣血和而自愈衛生寶鑑類聚五十八ノ五ノ

有持桂里曰賀川法橋曰淇園皆川先生內  
人產後血脫欲絕朝鮮參獨煎數劑連進シ  
テ起死回生ノ功ヲ得タリ其他人參ヲ用  
テ上證ヲ治スルト比々有之山脇法眼曰  
近ゴロ傷寒敗瘵アリ官參大料濃煎多ク  
服セシメシガ鼻上汗出テ愈ルトヲ得  
ルト方書ニ説アルガ如シト二子ノ談先  
ツ我心ヲ獲タリ因テ録之方輿輓卷二



竹茹温膽湯非龍其氏所創  
 加味温膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥  
 異象感或心逐致心驚膽攝氣鬱生涎涎與氣搏  
 變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲  
 食無味心虛煩悶坐卧不安  
 神珍方類聚六十三  
 五十一引

竹茹温膽湯非龍其氏所創

加味温膽湯治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥  
 異象感或心逐致心驚膽攝氣鬱生涎涎與氣搏  
 變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲  
 食無味心虛煩悶坐卧不安  
 神珍方類聚六十三  
 五十一引

枳實

半夏

竹茹

各八兩

橘紅

十二兩

白茯苓

六兩

甘草

四兩

香附

一斤

人參

各六兩

柴胡

麥門冬

桔梗

各六兩

右吹咀每服一兩生薑五片棗一个水二盞

竹茹温膽湯非龍其氏所創

煎一盞去滓温膽不拘時

竹茹温膽湯治傷寒日數過多其熱不退夢寐

不寧心驚恍惚煩躁多痰不眠者萬病回春卷

柴胡錢 竹茹 桔梗 枳實 錢

黃連錢 人參 陳皮 半夏

茯苓錢 香附 甘草

右剉一劑生薑三片束束一枚水煎服

卷二有麥門冬五分餘同

保元卷

三物黃芩湯類方并治驗

後方傷寒若已五六日以上者苦參二兩黃

芩二兩生地黄半斤水八升煮取一升分再服

或吐下毒則愈

黃芩二兩生地黄八兩

聖惠方治熱病三日解毒氣苦參散方苦參一

兩黃芩二兩甘草半兩右件藥搗麤羅為散每

服五錢以水一大盞煎至六分去滓入生地黄

汁一合攪令勻不計時候分温二服

聖濟總錄治傷寒欲發狂解毒止躁苦參飲方

三物黃芩湯



聖方大畧同故不備載類聚卷五十九七十分

津田玄仙曰千金三物黃芩湯金匱編注曰

此分上下受邪而治也草薈即生產坐草也

兩產後血氣未復或蓋覆不周為自發露得風

頭蓋四肢屬土風邪屬木風乘脾胃淫於四末

故四肢苦煩熱但當辨其上下受邪分治則

如鼓應桴然邪從上受必入陽經勢必頭痛

當與小柴胡湯和鮮表裏風木之邪由風氣

通於肝故也若胞門氣血虛而風從陰戶侵

入血海風化為熱上衝心脾故四肢苦煩熱

而頭不痛所以地黃補其陰血風与濕蒸氣

血化而為蟲以苦參燥濕而殺蟲又去伏風

以黃芩能清風化之熱服之多吐者乃逆上

之標風從上出下蟲者胞門濕盛即從下出

矣又同書產前門當歸貝母苦參丸註

本草引云久苦參入陰能驅大風開結

氣除伏熱トアリコノ兩條ノ註ニ因テ見

レハ病形病因共ニ解キ得テ甚夕明ニシ

テ辨テ費スニ及バズ予前論ノ難證ヲ治  
スル毎ニ爰ニ云フテアル陰戶風入ノ證

トナシテ、此方ヲ用テ、三人大効ヲ得タリ  
ソレヨリツヅバイテ試ミタルニ、甚効アリ  
方后ニ蟲ヲ吐下ストアレモ予ガ治シタ  
ル病人何レモ其事ナシ、是ハ未ダ蟲ヲ生  
セヌ證ト見ヘタリ、サテ此ノ病諸證多端  
ナリトイヘモ、畢竟風性善行數變ストイ  
フ古語ノ通り、其因トイフモノハ陰戸風  
入ノミ、其標證多キニ執泥スベカラズ、且  
此證ノ目的ハ目ガ覺メテ居ルウチハ何  
ノコモナク、昼夜ヲ分タスト口クト熟睡

ニ臨ハ熱モ發シ、汗モ出耳モ鳴口中モ乾  
クナリ、湯中乾トイヘドモ、試ルニ皆カク  
ノ如シ、予コノ理ヲ考ルニ、風邪陰分ノ産  
門ヨリ入り、内胞中ニ隱伏シテ、邪熱トナ  
ル、是乃チ陰火ナリ、凡ソ人開眼動作ノ時  
ハ、眞陽周身ニ散滿シテ、陰火權ヲ執ル  
能ハズ、故ニ陰分ノ旺スル睡中ニナレバ、  
同氣相和シ、陰火顯レテ、獨リ權ヲ專ニス  
譬ヘバ、天ノ太陽照臨スル間ハ、山野荒澤  
ノ怪火陰伏シテ見ヘズ、夜陰ニ及ベハ、頭



然<sup>レ</sup>ト<sup>レ</sup>人<sup>ヲ</sup>苦<sup>ミ</sup>迷<sup>サ</sup>スル<sup>ル</sup>カ<sup>ガ</sup>如<sup>シ</sup>故<sup>ニ</sup>此<sup>證</sup>  
口中乾燥ス<sup>ト</sup>イ<sup>ハ</sup>レ<sup>レ</sup>渴<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>水<sup>ヲ</sup>吞<sup>下</sup>ナ  
是<sup>レ</sup>怪<sup>ク</sup>火<sup>ノ</sup>光<sup>炎</sup>里<sup>外</sup>ヲ<sup>照</sup>ス<sup>ト</sup>イ<sup>ハ</sup>レ<sup>レ</sup>人  
火<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>物<sup>ヲ</sup>燒<sup>フ</sup>ナ<sup>ラ</sup>ス<sup>ガ</sup>如<sup>シ</sup>モ<sup>シ</sup>コ  
ノ<sup>熱</sup>夜<sup>分</sup>ノ<sup>睡</sup>中<sup>ニ</sup>ガ<sup>カ</sup>リ<sup>テ</sup>榮<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>日<sup>中</sup>ハ  
縱<sup>令</sup>熱<sup>睡</sup>ス<sup>レ</sup>レ<sup>レ</sup>熱<sup>セ</sup>ザ<sup>ル</sup>モ<sup>ノ</sup>ア<sup>リ</sup>是<sup>ハ</sup>  
伏<sup>熱</sup>尤<sup>至</sup>陰<sup>ノ</sup>境<sup>ニ</sup>ア<sup>ル</sup>ガ<sup>故</sup>也<sup>ソ</sup>レ<sup>ナ</sup>レ  
ハ<sup>ハ</sup>四<sup>物</sup>湯<sup>ニ</sup>升<sup>麻</sup>柴<sup>胡</sup>ヲ<sup>加</sup>ハ<sup>ハ</sup>六<sup>劑</sup>ニ<sup>シ</sup>テ  
三<sup>四</sup>服<sup>モ</sup>用<sup>ベ</sup>シ<sup>シ</sup>四<sup>物</sup>湯<sup>ノ</sup>熱<sup>地</sup>ヲ<sup>乾</sup>地<sup>是</sup>  
四<sup>物</sup>ヲ<sup>以</sup>テ<sup>至</sup>陰<sup>伏</sup>熱<sup>ノ</sup>血<sup>分</sup>ニ<sup>至</sup>ラ<sup>シ</sup>メ

升<sup>提</sup>ヲ<sup>加</sup>血<sup>分</sup>至<sup>陰</sup>ノ<sup>陷</sup>熱<sup>ヲ</sup>メ<sup>陽</sup>分<sup>ニ</sup>提  
ケ<sup>出</sup>ス<sup>ノ</sup>術<sup>ナ</sup>リ<sup>其</sup>后<sup>ニ</sup>コ<sup>ノ</sup>三<sup>物</sup>黃<sup>芩</sup>湯  
ヲ<sup>用</sup>ベ<sup>シ</sup>此<sup>レ</sup>又<sup>予</sup>ガ<sup>試</sup>シ<sup>タル</sup>良<sup>術</sup>ナ<sup>リ</sup>  
サ<sup>テ</sup>此<sup>方</sup>ヲ<sup>用</sup>ル<sup>ニ</sup>心<sup>得</sup>アリ<sup>原</sup>方<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>  
ニ<sup>修</sup>合<sup>シ</sup>テ<sup>ハ</sup>苦<sup>シ</sup>甚<sup>シ</sup>ク<sup>久</sup>服<sup>用</sup>ニ<sup>便</sup>ナ<sup>ラ</sup>  
ズ<sup>殊</sup>ニ<sup>長</sup>病<sup>ハ</sup>本<sup>ヨ</sup>リ<sup>藥</sup>ニ<sup>厭</sup>テ<sup>イ</sup>ル<sup>上</sup>ニ  
此<sup>通</sup>リ<sup>ノ</sup>苦<sup>劑</sup>ヲ<sup>過</sup>服<sup>ス</sup>レ<sup>バ</sup>忽<sup>チ</sup>不<sup>食</sup>ス  
ル<sup>モ</sup>ノ<sup>ナ</sup>リ<sup>コ</sup>レ<sup>ニ</sup>依<sup>テ</sup>少<sup>シ</sup>甘<sup>艸</sup>ヲ<sup>加</sup>ハ  
頭痛<sup>耳</sup>鳴<sup>甚</sup>キ<sup>モ</sup>ノ<sup>ニ</sup>ハ<sup>柴</sup>胡<sup>葛</sup>荊<sup>子</sup>ヲ<sup>加</sup>  
フ<sup>カ</sup>ク<sup>ノ</sup>如<sup>ク</sup>加<sup>減</sup>指<sup>引</sup>シ<sup>テ</sup>用<sup>來</sup>レ<sup>リ</sup>畢

竟甘草ヲ加フルコト只服藥ニ便ナルバカ  
リテナシ脾胃ヲ調和スル為ニモ宜シキ  
ナリ療治茶談卷一

有持桂里曰臨盆ノ際ハ露體用力他顧ス  
ルニ暇ナシ此時風寒虛ニ乘シテ襲ヒ入  
ルコト有リ又血氣ノ平復スルコト須タス輕  
卒妄動シテ邪ニ感スルモアリ此皆在草  
蓐自發露得風ノ類ナリ其證惡寒發熱頭  
痛脈浮ナラバ油断ナク解肌ノ藥ヲ與フ  
ベシ新産後不互發汗ト言フテ邪氣ヲシ

延纏セシメバ恐クハ変シテ煩熱ノ症ト  
成ラシ如シ煩熱ト成ルトモ猶頭痛スル  
者ハ小柴胡ヲ用レハ即解ス如頭不痛但  
煩スルニ至テハ黃芩湯所主ナリ此症小  
柴胡加地黄湯加味道遙散ナドモ用ユレ  
ドモ黃芩湯ノ單捷ナルニ如カズ唯憾ム  
ラクハ此藥苦力ニシテ喫シ難シ故ニ世  
醫黃連ヲ以テ苦參ニ代ヘ或ハ本草ニ依  
テ甘草ヲ加フ愚按スルニ甘草ヲ加ルハ  
猶可ナリ苦參ヲ去テハ仲景ノ方意ヲ失ス



別錄云、昔參除伏熱方、藥輓卷一

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

格注草シダニ充ル  
ハ穩ナラズシダニ名  
ウニシロ註ニ啓  
家十三ニ出ツクベ

○ 皇朝經驗破棺湯方并類方

破棺湯治膈噎、平井主善名家方選三編

桃仁 杏仁 萊白皮 各一 格注草 二匁

右水煎服、或復用半夏瀉心湯

破棺湯有持桂里方輓卷七

此方、人ノ傳ニ因テ之ヲ噎症ニ試ムルニ、  
時ニ奇效ヲ奏ス、因テ思フ、昔日適所翁余  
ニ語テ曰、茯苓杏仁甘草湯能ク噎ヲ療ス  
ト、方意稍相近シ、

破棺湯 同卷十二 四十一

桃仁 杏仁 桑根白皮

右三味以水二合煮取一合服

此治咽喉痛ノ奇方ナリ或加甘草桔梗噎  
膈ニモ亦良シ方完璧ニ非ルニ似タレド  
モ效意外ニ出ツ初學者蔑視スルヲ莫レ嘗  
有一醫者人咽中疼痛ヲ患フルヲ數月後噎  
疝トナル百計スレドモ不瘥シテ遂ニ鬼  
錄ニ上ル余追思スルニ早ク此方ヲ與ヘ  
バ萬一ヲ僥倖セシモノヲ吁惜乎

○治膈氣心胸妨悶常欲嘔吐湯水不下方聖惠

隨唐以還大率喝噎ヲ治スルニタタク燥劑ヲ用ユ一モ効アルヲナン儒門事

方卷 治膈氣妨悶諸方類聚卷百五ノ百八オ

桑根白皮壹兩 桃人壹兩湯浸去皮光

木香半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入  
生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熟服

親頗ル其室ヲ  
論ス本草備要  
卷四牛肉條下牛  
乳ヲ用ルヲ論  
ス甚吾音心ヲ得  
宜參攷四ノ四ノ



竹葉湯解五蒸湯類方

崔氏療煩躁而渴不止惡寒但熱盛者竹葉湯  
常用亦佳不徒療天行凡虛羸久病及瘡後曾  
上淡熱者服之皆妙方 外臺卷三 四十九

甘草 二兩 棗 十五枚 半夏 一兩 芍藥 三兩

前胡 一兩 黃芩 一兩 小麥 五合 人參 二兩

粳米 一升 知母 二兩 麥門冬 四合 栝樓 一枚

生薑 四兩 竹葉 一把 須以竹葉飲代

右十四味切以竹篠飲一斗五升煮取五升  
分五服若非天行而虛羸久病曾上痰熱亦

竹葉湯解五蒸湯類方

可服之加黃耆二兩除黃芩減知母一兩除  
枯樓用之大効

深師竹葉湯療天行後虛熱牽勞不腹○程本作食復  
四肢沈重或一臥一起氣力吸亡羸弱方同註

竹葉把 小麥升一 甘草一兩

石膏二兩 茯苓二兩 半夏一升 洗去滑

前胡二兩 知母二兩 黃芩二兩

人參二兩 生薑四兩 大棗三十枚 擘

右十二味切以水一斗二升煮竹葉小麥減  
四升去渣內藥煮取三升分三服

古今錄驗解五蒸湯方同卷十三

甘草一兩 茯苓三兩 人參二兩 竹葉一把

葛根 乾地黄各三兩 知母 黃芩各二兩

石膏五兩 粳米一合

右十味切以水九升煮取二升半分為三服  
亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥

竹葉湯主五心熱手足煩疼口乾唇燥皆中熱

方千金方卷十六

竹葉 小麥各一升 知母 石膏各三兩

黃芩 麥門冬各二兩 人參一兩 生薑五兩

○張文仲竹葉湯  
飲外台十三  
又外台十七  
古今錄驗竹葉湯



甘草 桔樓根 半夏 各一兩 茯苓 二兩

右十二味以咀，以水一斗二升，煮竹葉小麥

取八升，去滓內藥者，煮取三升，分三服，老小五

服。

亦可以水三升煮小麥一升，以煮藥。

古方以水一斗，煮取五升，分五服。

甘草一分，以水一斗，煮取五升，分五服。

甘草一分，以水一斗，煮取五升，分五服。

古方以水一斗，煮取五升，分五服。

古方以水一斗，煮取五升，分五服。

### 六一泥

千金方作六一泥法，卷十二，太一神精丹方後

赤石脂 牡蠣 滑石 礬石

黃礬石 蚯蚓屎 鹵土 各二兩

右取醎酢，以足為度，若無鹵土，以塩代之，先

作甘土泥，以泥各別裹前黃礬等五種，作團

裹之，勿令泄氣，以火燒周三日，最好，一日亦

得，出火破團，取藥各擣碎，絹篩，然後與蚯蚓

屎鹵土等分，以酢和之，如稠粥，既得好酢，可

用二分酢，一分水，和用，取前瓦盆，以此泥塗

六一泥

之

本事方六一泥用赤石脂牡蠣滑石礬石黃礬各二兩取醎醋以足為度先作甘土泥各別裹五藥作團令勿泄氣火燒三日出火破團各搗篩然後與蚯蚓屎鹵土各二兩以醋和如稠粥塗瓦盆中無鹵土以鹽代之指迷方中六一泥法亦可參用

卷一神精丹方後

簡易方合六一泥法礬石黃泥裏火燒一伏時研細蚯蚓糞鹵土塩黃礬遠者如金絲色精明其色本綠以黃泥裏火燒通赤如血取研

各用一兩黃泥一斤右同為末以紙筋一處擣和成泥

卷

太乙

神精丹方後

類聚卷廿八十四

運化玄樞一法其日午時於韭畦內面東不語取蚯蚓糞曬乾收之或為魚刺所鯁以少許擦咽外刺即消丹家謂之六一泥是也

類聚七十六

抱朴子卷四金丹卷有六一泥目而不載其法云第一之丹名曰丹華當先作元黃用



雄黃水、礬石水、戎鹽、鹵鹽、礬石注疑礬石牡蠣赤石脂滑石胡粉各數十斤以為六一泥火之三六日成、醫國騰中ノ早ウ

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

### 讀方書說

余嘗テ以為ラク方書浩翰茫然トノ讀過  
スレハタトヒ萬卷ヲ讀破シタリトモ竟  
ニ其要領ヲ得ルト能ハス到底一卷中ニ  
擇テ取ルヘキモノ十中ノ一二過キズ宋  
元以還ノ方書ヲ讀ムニ壁ノハ呉服店ニ  
至リ數百端ノ衣服ヲ檢スルニ意亂目眩  
シ遂ニ適從スルトコロヲ知サルガ如シ  
因テ攷フ方書ヲ讀ムノ法コレヲ律スル  
ニ仲景ノ方法ヲ以テシ其外ハ醫家常用

三ノ温膽四君子六君子大補益氣歸脾養榮  
 四物八物等ノ類數十百方ノ効驗アル方  
 ヲ網紀トナシテ然後ニ看過スレハ時  
 名方名論ヲモ探リ得ルコトアリ若徒ニ博  
 ニ駑馬奇ニ趨リ多キヲ合算ルノミニテハ大海  
 ニ出テ茫洋タルガ如ク竟ニ其要領ヲ得  
 ルコト能ザルモノナリ余常此持シテ方書ヲ近日前人言ヒ及シ  
 タルモノ余ガ宿志ト暗合スル説ヲ得茲  
 ニ撮ケテ參稽具備フカハレタルヲ録ス  
 徐靈胎曰人之死誤于醫家者十之三誤于病

漢方 經前 既言 及之 凡此

家者十之三誤于旁人涉獵醫書者亦十之三  
 蓋醫之為道乃通天徹地之學必全體明而後  
 可以治一病若全體不明而偶得一知半解舉  
 以試人輕淺之病或能得效至于重大疑難之  
 症亦以一偏之見妄議用藥一或有誤生死立  
 判矣間或偶然倖中自以為如此大病猶能見  
 功益復自信以後不拘何病輒妄加議論至殺  
 人之後猶以為病自不治非我之過于是終身  
 害人而不悔矣然病家徃徃多信之者則有故  
 焉蓋病家皆不知醫曹之人而醫者寫方即去見



見有稍知醫理者，議論鑿鑿，又關切異常，情面甚重，自然聽信。誰知彼乃偶然繙閱，及道聽塗談之談，彼亦未嘗審度從我之說，病者如何究竟，而病家已從之矣。又有文人墨客及富貴之人，文理本優，偶爾檢點醫書，自以為已有心得。傍人因其平日稍有學問，品望倍加信從。而世之醫人因自己全無根柢，辨難反出其下，于是深加佩服，彼以為某乃名醫，尚不如我，遂肆然為人治病，愈則為功，死則無罪，更有執一偏之見，恃其文理之長，更著書立說，貽害後世。此等

之人不可勝數。嗟乎！古之為醫者，皆有師承，而又無病不講，無方不通。一有邪說異論，則引經據典以折之，又能實有把持，所治必中。故餘人不得而參其末議。今之醫者，皆全無本領，一書不讀，故涉獵醫書之人，反出而臨乎其上，致病家亦鄙薄醫者，而反信夫涉獵之人，以致害人如此。此其咎全在醫中之無人，故人人得而操其長短也。然涉獵之人，久而自信益真，始誤他人，繼誤骨肉，終則自誤其身。我見甚多，不可不深省也。同涉獵醫書誤人論 下六十七

徐靈胎曰千金外臺云、讀之者苟胸中無成  
 竹則衆說紛紜羣方淆雜反茫然失其所據故  
 讀千金外臺者必精通于內經仲景本草等書  
 胸中先有成見而後取其長而舍其短則可資  
 我博採之益否則反亂人意而無所適從嗟乎  
 千金外臺且然况後世偏駁襍亂之書能不惑  
 人之心志哉等而下之更有無稽杜撰之邪書  
 尤不足道矣醫學源流論卷下千金方外臺論  
 丹波君直庭曰清醫楊西亭トイフ者文政ノ  
 初崎巖ニ來寓セシガ頗學術アリテ識見モ

亦卓ナリシト其言ニイヘラク醫ハ時運ニ  
 隨テ治ノ異ナルヲアリ徒ニ紙上ニ拘ルヘ  
 カラス書籍モ七八葉ノウチ有用ノ處ハ一  
 葉ニ足サルニ大抵前人一家ノ説ヲ主張セ  
 ントスルコヘ空談多キヲニハナリ又然ル  
 何レ書ニ就テ思索セズンハアルヘカラス又  
 病ヲ治スルニ頭ヲ見テ頭ヲ治スルハ庸工  
 ノ所為ニ能病因ヲ尋テ首ノ病ヲ足ニテ治  
 シ下ノ病ヲ上ニテ治スルコソ良醫トイフ  
 ベケレ此等ノ言ハ平近ニテ吾人ノ知トコ



口ナレ氏其異ヲ好ニサレコソ、卓識トイフ  
ベケレ、沼津ノ醫生成武田克巳ナルモ人西亭  
ニ會晤セシトテ、予ニ語リヌ、時還讀我書卷

### 灸瘡血出

丹波君廉夫曰、牛込月桂寺前中嶋元吉ト云  
人ノ地守六十餘ノ男子、背俞ニ灸ス、火肉ニ  
付テ焼入り、痛楚タヘガタシ、水ヲ澆ケ凡消  
ヘズ、或人教テ熬豆ヲ嚙ミテ付サス、立トコ  
ロニ火消ユ、灸ノ節、豆熬ヲ拵トハ、灸穴ヨリ  
血出ル、コノアルセツ、嚙テ付クレハ、血止ル  
ユヘ古ヨリカクハスル、コナルニ肉ニ火ノ  
付タルマテ消ス、ハ誠ニ奇特至極ノコナ  
リト、屋代太郎ノ物語レリ、本朝經驗方

灸瘡血出

高城周庵卜醫談語ニ云、灸スルニ、熬大豆ヲ  
嚙音ヲ聞ハ氣絶ノ一ナシ、同上

又云、吉原新町ニ仲近江屋ノ傾城肺俞ニ灸  
ス血出テ止ズ、三日三夜ニシテ死ス、同上

本草綱目、黃芩附方、灸瘡血出條、引李樓怪  
證奇方云、一人灸火至五壯、血出不止如尿、

手冷欲絶、以酒炒黃芩二錢為末、酒服即止、

卷十三山草類下九

巢源廿五ノ十才針灸瘡發洪候

用黃芩一味方

深師療鼻衄、去五歲熱氣結所為、或吐血者方、

黃芩四兩、右一味切、以水五升煮取二升、分三

服、亦療婦人漏下血、外臺卷三廿六ノウ

李時珍曰、予年二十時、因感冒欬嗽既久、且犯

戒、遂病骨蒸發熱、膚如火燎、每日吐痰盈許、暑

月煩渴、寢食幾廢、六脉浮洪、遍服柴胡、麥門冬、

荆瀝諸藥、月餘益劇、皆以為必死矣、先君偶思

李東垣治肺熱如火燎、煩躁引飲、而晝盛者、氣

分熱也、宜一味黃芩湯、以瀉肺經氣分之火、遂

用黃芩一味方



按方用片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身  
熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯啓如鼓應桴醫中  
之妙有如此哉本草綱目卷十三山草類下黃芩發明十四  
聖濟總錄治血妄行或衄或蟻獨聖湯方黃芩  
去黑心五兩右壹味細剉如麻豆大每服七錢  
匕水二盞煎至壹盞去滓溫服類聚七十九

117

Blank lined page with vertical ruling lines.

Blank lined page with vertical ruling lines.



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11

12







This is a blank ledger page from a notebook. It features a grid of 12 vertical columns, each separated by a thin line. A thicker horizontal line runs across the top of the grid, creating a header space. The page is otherwise empty of any text or markings.

This is a blank ledger page from a notebook, identical in layout to the left page. It features a grid of 12 vertical columns, each separated by a thin line. A thicker horizontal line runs across the top of the grid, creating a header space. The page is otherwise empty of any text or markings.





This is a blank ledger page from a notebook. It features a header section at the top, followed by a grid of 12 vertical columns. The columns are separated by thin vertical lines, and the entire grid is enclosed within a double-line border. The paper is off-white and shows some minor signs of age and wear.

This is a blank ledger page from a notebook, identical in layout to the left page. It features a header section at the top, followed by a grid of 12 vertical columns. The columns are separated by thin vertical lines, and the entire grid is enclosed within a double-line border. The paper is off-white and shows some minor signs of age and wear.

This is a blank ledger page from an old book. It features a grid of 12 vertical columns, each separated by a thin line. A thicker horizontal line runs across the top of the page, creating a header section. The paper is aged and shows some minor staining and wear.

This is a blank ledger page, identical in layout to the one on the left. It has 12 vertical columns and a header section at the top. The page is aged and shows some minor staining and wear.











--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



This page features a header section at the top with a small, irregular mark. Below the header is a table grid with 11 vertical columns and a horizontal line separating the header from the main body. The grid is currently empty.

This page features a header section at the top with a small, irregular mark. Below the header is a table grid with 11 vertical columns and a horizontal line separating the header from the main body. The grid is currently empty.







