

X

k 57

490.9
Ig-51
5

No. 2554
12 K-57



富士川文庫

1274

丸山圖書之記

苦

醫說存疑

書不可恃

小兒搐搦不可捉住手足

飲食宜緩

風土之異

頭邊不可近火

漱口

治小兒初生不飲乳法

食後

溫脣下

貼脣下法

醫卜寧相並稱

駁東垣

病忌溢劑

扁倉傳管見再訂

石實義相通

小兒禁溫飽

癰疽考

生姜一片之弊

甘草安重用

藥不安久煎之品

脚氣空潰足法

腳氣不安淋洗

千金風門 附風火頭

如蟲行皮中

繢頰

代用

自虎湯煎法

厥

脚氣瘤同因

疝因

竹治血熱 附竹根之功

脚氣无補法

用越婢枳茱湯辨

脚氣水腫禁鹽

嗌

古方不可思議

氣衝急痛案

千金風眩不与頭眩

病當分風氣

茯苓補心湯

烏梅

洗：酒：浙：棲：

咳嗽喘急有虛實

九墟非靈樞

建中湯名義并主能

疝候

泄利忌大脉

懸弦同

邪祟之因

傷寒論辨平脉諸不可篇

不泥藥性

服藥當審強弱

黃疸用卦婢

傷食用其物有由來

截瘻法

瘻方服法

亥勿用甘藥

治蛇方服法

霍亂之因

五行說

韭子治糲精

瘻方服法

千金治瘻方編

頭痛

芥子傳方

連翹尤宜小兒

李草衍義拔萃

動風之品

龍骨 本草衍義

脫肛奇訣

傷寒、冬法

傷寒不可拘日數

少陰用柴胡

續命湯

石蓮甘草湯之原

段玉裁曰、廢之
為藏、說文
廢字注

爾雅釋詁、徂在存也、郭注曰、以徂為存、猶以亂為治、以羣叢為日鄉、以故為今、
此皆詁訓義有反覆、苟通、美惡不嫌同名、
孟子盡心下、鼻
之於臭也、趙注、
鼻之好分杳、
臭香也、易曰、
其臭如蘭、

小柴胡湯主治、肩脅苦滿之苦、疑當為喜義而看、
傷寒病多有此証
與喜嘔喜忘、其語意同也、恐非病人自覺之義也、
楊子方言卷二、苦、快也、楚曰苦、又卷三、苦、快也、宋
鄭周洛韓魏之間曰苦、注云、苦而為快者、猶以臭
為香、治為亂、徂為存、攷說文快訓喜、則知苦與喜
相反、而却相通矣、

金匱要略、肺飲不弦、但苦喘短氣、脈經千金、苦
作喜、又澤瀉湯條、苦冒眩、外臺利深師、作喜眩注、云、一作
苦冒
靈樞口問篇、耳為之苦鳴、腸為之苦鳴、甲乙經

引苦並作善。又本藏篇苦字、大素系及甲乙經並作喜。又作善者不一而足今不一一校。

癲狂篇狂始生先自悲也。喜忘心苦怒心善恐者得之憂憂飢太素苦善並作喜。甲乙經喜苦並作善。

廣雅釋詁苦快也。

千金卷十論曰婦人溫病雖差未苦平復按苦猶其酷甚也苦亦可訓甚。

苦

驚風瘻癰

妄捉持

小兒搐搦不可捉住手足

二 小兒驚風亦不可吐出延其患與大人同方其發搐搦時不可捉住手足則延不歸手足而固疾成但當寬鬆抱之可也。

醫說卷三引醫

一 凡諸癇已發手足掣手縮慎不可捉持之捉之則令曲突不隨也。

病源四十五小兒驚風瘻候

醫說卷三引曲突作曲戾十五四十七

三 正發搐搦掣手之時勿捉持之捉之則曲突不隨也。

和濟

生續方卷一論小兒癇病

四 當其搐搦大作時但可扶持不可把捉恐風瘻流入經絡或至手足拘攣也。聶尚恒活心法下急驚風論

飲食宜緩

每日自詠

養性

千金方 卷廿七 道林

美食須熟嚼生食不麤吞。常欲少如飽中飢飢，中飽耳人方。

食欲數而少，不欲頓而多，則難消也。同上八方

飲食須用緩，蓋脾喜溫，不可以冷熱犯之。唯緩食冷熱之物，至脾皆溫矣。醫說卷七引晁氏客話

食不厭熟，嚼飲不厭細呷。同上引食治通說。

食不齧肉

言

食不齧肉

同

食不齧肉

同

食不齧肉

同

食不齧肉

食不齧肉

言

食不齧肉

食不齧肉

言

食不齧肉

言

食不齧肉

言

食不齧肉

言

食不齧肉

言

食不齧肉

言

食不齧肉

書不可恃

許胤宗或勸其著書貽後世答曰醫特意耳思慮精則得之脉之候幽而難明吾意所解口不能宣也

唐書可攷

又曰脉之妙處不可傳虛著方劑終無益於世此吾所以不著書也

不讀本草焉知藥性專泥藥性決不識病假饒

識病未必得法識病得法工中之甲

治病百法

醫之為術苟非得於心而恃書以為用者未見

能臻其妙

醫說卷九引劉顥叔異苑

書不可恃

劉文潔妻有姪、產期將近、偶食斑魚、入夜四肢厥冷、胸滿腹脹、氣塞痰上、喘息不定、須臾叫躁而死、噫斑魚長不滿三寸、然其形狀亦類河豚、有娠者宜禁食、本草云、河豚無毒、然則斑魚其毒若是、况河豚乎、本草之言、吾亦未深信也、續醫說卷七又曰、神之使焉、下垂上壅、皆有殊益、然其不殆宜也、

唐宋友贈其普書誤以爲也答白居易詩有此思書不下計

江湖多氣、嶺南多毒、涼氣多風、濕氣多輝、陰氣多血、嶺氣多瘴、石氣多毒、水氣多痢、野氣多蟲、沙氣多狐、證類本草
之才藥對、序例引徐葛零載之、今

風土之異

夾河風性寒、民多傷風、河洛以東、地鹹水性冷、故民雖哺粟食麥、亦無熱疾、滑臺風水性寒、冷尤甚、士民服附子如芋栗、醫說卷八引瑣碎錄

昔聞老醫云、治北方之疾、宜以攻伐外邪為先、

治南方之疾、宜以保養內氣為本、蓋北方風氣渾厚、稟賦雄壯、兼之飲食倍常、居室儉素、

殊少戕賊元氣之患、一有疾病、輒以苦寒疏利之、其病如脫、而快意通神矣、若夫東南之

東南方陽也、陽者其精降於下、故右熱而左溫、西者其精奉於上、故左寒而右涼是以

風土之異

五常政大論 陰精所奉其人壽陽精所降其人大王水注曰陰精所奉高之地也陽精所降下之地也陰方之地陽不妄泄寒氣外持邪不數中而正氣堅守故壽延陽方之地陽氣耗散發泄無度風濕數中真氣傾竭故夭折即事驗之今中原之境西北方衆人壽東南方衆人天其中猶各有微甚爾此壽夭之大異也方者審之乎

入迥異槩以苦寒之劑攻之不幾殺人乎刊余因其言而推廣之曰固厚安能入人皆實南人稟氣雖人皆虛寧者當以權變處治因其弊之斯無一偏之弊矣

續醫說卷四 權變處治

山廣土厚其俗所食黍麥多梁肉故而多風痺之疾東南之地土薄水深梗稻魚蝦故其稟受差弱而多脾能察此用藥則庶乎可以言醫酉矣

形證肺病

熱治以溫敷強其內守必同其氣可使平也假者反之帝曰善州之氣生化壽夭不同其故何也岐伯曰高下之理地勢使然也崇高則陰氣治之污下則陽氣治之陽勝者先天陰勝者後天此地理之常生化之道也帝曰其有壽夭岐伯曰高者其氣壽下者其氣夭地之大異也小者小異大者大異故治病者必明天道地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣矣

食後漱口

齊中大夫病齲齒之得之風及臥開口食而

不漱 史記倉公傳

口香

食畢當漱口數過令人牙齒不敗

千金方卷九 道林養性十七

夜漱却勝朝漱

醫說卷九 真常子養生

地有高下氣有溫
涼高者氣寒下
者氣熱故適寒

京者張之溫熱者
則瘡已汗

瘡下之前則張已汗

開閉之常太少之
異耳帝曰其於壽

大何如岐伯曰陰精

所奉其壽陽

治之奈何岐伯曰

西芝氣散而寒

之東南氣收

而溫之所謂同病

異治也故曰氣寒

氣京治以寒京行

水清之氣溫氣

熱治以溫敷強其內宗必同其氣可使平也假者反之帝曰善州之氣生化壽夭不同其故何也岐伯曰

高下之理也熱乃使然也

高者其氣壽下者其氣死

地之大異也小者小異大者

之常生化之道也帝曰其有壽夭岐伯曰高者其氣壽下者其氣死

地理陰陽更勝氣之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣矣

美異故治病者必明天道

與西北之人迥異槩以苦寒之劑攻之不幾
於操刃而殺人乎刊余因其言而推廣之曰
北人稟氣固厚安能入人皆實南人稟氣雖
薄安能人人皆虛寧者當以權變處治因其
虛實而藥之斯無一偏之弊矣

續醫說卷四
權變處治

如西北之地山廣土厚其俗所食黍麥梁肉故
其稟差壯而多風痺之疾東南之地土薄水深
其俗所食梗稻魚蝦故其稟受差弱而多脾胃
之疾苟能察此用藥則庶乎可以言醫酉矣

同上形證脈病

後漱口

齊中大夫病齲齒之得之風及臥開口食而

不漱史記倉公傳

口香

食畢當漱口數過令人牙齒不敗

千金方七
道林養性

夜漱却勝朝漱

醫說卷九真常子養生
卷七

支竦中額頭竦

酒面

食畢當竦口邊高

天子不娛

千金

齊中大夫壽

楚人也。早年風氣人謂曰食說

頭邊勿安火爐日久引火氣頭重目赤睛及鼻

乾、千金方道林養性

臥處不可以首近火必有目疾

醫說卷九引瓊碎錄

煙熏不下以管立火燄草目共

韓子集方直林

輕身安大風日入民火麻頭通目赤諸父鼻

治小兒初生不飲乳法

治不小便法附

小兒初生不飲乳及不小便。搣汁二合、葱白一寸、分四破、右以銀石器煎取一合、注子灌立

愈。醫說卷十引集驗方

劉氏療小兒初生不喫。搣方以乳兩合、葱白一寸和前一兩沸去葱與喫即能喫。乳立効以蛤

輔灌之。外臺卷三十五

又小兒初生不小便。方人乳四合、葱白一寸、右二味相和煎分為四服。即小便利神効。同上十五多

和脉。每服四顆。用小動火轉。同上。又小兒喉塹。不小動火。入鼻。食。葱白一寸。甘二
瓣。鹽三分。快鹽。水。同上。

味薄。一兩。輕。去皮。蜜。半錢。大。半錢。鹽。半錢。水。同上。小兒喉塹。不寒。放火。以厚薄。令葱白一寸。
食。酒。鹽。卷。半錢。鹽。水。

大。水。如。古。人。鹽。器。鹽。半。一合。或。毛。薑。三
錢。或。主。不。煩。躁。又。不。小。動。火。十二。合。鹽。白。一
錢。或。小。守。或。主。不。煩。躁。去。鹽。水。同。上。

貼臍下法

象山縣村民。有患水腫者。咸以為鬼祟。訊之。卜者。授以此方。良効。用田螺。大蒜。車前草。和研為膏。作大餅。覆于臍上。水從便旋而出。數日。頃愈。《仲續醫說》卷八引仇遠。碑史。

幾日更念山中餘煙宿火。移築八尺竹圍於其旁。

味同爲雪實，升大瓶，貯于罋。土木炎，則焚而出。
音十音，妙以拙。身校用田，繫大牀，車龍草。
衆山櫟林月，育忠冰。飄香氣，以禽風崇。暗之日，
相呼而去。

醫卜宰相並稱

賈誼曰：古之至人不居朝廷，必隱于醫卜。

史記曰：者傳引賈誼作吾聞古之聖人不居朝廷必在卜醫之中。

范文正公曰：儒者不得為宰相，則願為名醫。

至于東垣。

兒傳而方法。

世頌宗。

所以爲門也。

韓氏醫通要

駁東垣

李東垣內外傷辨先欲理脾胃極本之論也未免藥傷於雜前輩謂其如韓信之用兵多多益善蓋諱之也續醫說卷一引石門劉桂醫論至于東垣執耑理脾胃之說純用升提香燥意見偏而方法亂貽誤後人與仲景正相反後世頗宗其說皆由世人之于醫理全未夢見所以為所惑也醫學子源流論四論大家

張文五公曰醫者不問時節而論者各鑿
又謂日者非以醫病者不論脾氣者不論
實虛自古文王入不吾聽文又謂子醫者
醫學子源流論四論大家

病忌熱劑及澁劑

鴻者不可急以熱藥止之若以熱藥止之便變成痢

醫說卷十小兒瀉痢

仲景治痢法可下者十法可溫者五法謂之下者率用承氣湯加減謂之溫者率用姜附湯何嘗以巴豆粟殼之劑乎俗醫見自利而渴煩躁不眠手足微冷者皆用苦劑攻之殊不知陰盛發燥欲坐井中故前哲用吳茱萸湯甚者用四逆湯經曰陽虛陰乘之謂也丹溪用吳茱萸湯治霍亂吐鴻轉筋者亦此意也

而以寒相處也。寒與熱兩端一偏入寒世或宗其舊皆由古之士固陋全未要明見前而古去猶誤時後人學中景五財又因益善蓋韓文忠公之說醫學上復有宋門學誣醫家李東壁內外代脉詳本末歸本之術由未經東壁

近時醫人不審劑之赤白病之新久驟用覽
粟殼石榴皮之類以為秘方其功但施於久
痢洞泄者則宜若初起者用之閉塞積滯變
生別證以致經年累月謂之休息痢者是也、
世俗但知瀉劑之能塞不知通劑之能塞也、
後之學者貴在變通不可執一而治續醫說卷六瀉

劑禁用條

石與實義相通

能知虛石之堅軟者知補寫之所在

靈樞衛氣篇大素甲乙經石作實

甲乙經石作實

石者絕而止之虛者引而起之

同上乙經石作實

薄脉少血其肉不石

天年篇

大素石作實

案詩椒聊篇實大且篤唐石經作碩大且篤

是實與碩義通也莊子外物篇無石師而能

言釋文石本作碩是石與碩音通也張志聰

等改石作實恐非是成聊攝注傷寒論大陷

膏湯條心下石鞭日心下痛按之實鞭是知

石字可以實義釋也。

曲礼上童子不

卷之三

使不堪苦、正義

云童子骨効不
宜著裘、大溫

傷陰氣也。

見一三出

於外，與子書計，
衣不昂，需斧、

不與禱祝

補為大溫傷

又二十而冠始學禮可以衣裘帛

又王藻、童子

小兒禁溫飽

歷觀前政、貴人之用心也、與嬰兒子何其異哉。
嬰兒有常病、貴臣有常禍、父母有常失、人君
有常過。嬰兒常病、傷於飽也；貴臣常禍、傷於
寵也；哺乳多則生瘤病、富貴盛而致驕疾、愛
子而賊之、驕臣而滅之者、非一也。王符潛夫論 貴忠篇
少小常苦被禡泰溫、泰溫則不能便、柔膚弱體
是以難可防護、而易用感慨、若常令少小之
緼袍、不至於甚厚、則必咸保金石之性、而比

王符論貴忠篇

不裘不帛、
帛溫傷壯氣
也。

千金方五上解

又千金并七引
仲長統可改

巢源卷四
美食小兒候文
男各用引人

千金五上ノ五

外台世五ノ六引
千金
大文畧日レ
亦力クヘ

千金方廿四引
經禮記千金
可攻廿五ノ十六
又十多少引病原

巢源卷四
美食小兒候文
男各用引人

千金五上ノ五

外台世五ノ六引
千金

素問

癰疽病稱

營氣不從、逆於肉理、乃生癰腫。論 生氣通天
魚者使人熱中、鹽者勝血、故其民皆黑色、疎理、
其病皆為癰腫。同異法方互論

諸癰腫筋攣骨痛、此皆安生、歧伯曰、此寒氣之
腫、八風之變也、同脉要精微論

腎移熱於肝、癰腫少氣、同氣厥論

致氣則生為癰瘍、靈樞九針十二原篇

贊刺者、直入直出、數發針而淺之出血、是謂治
癰疽考

兒初生法、宜用父故衣裹之、若生女、宜以母故衣勿用

新帛、切須依之、令兒長壽、外臺卷三十五 小兒初生將

護法引崔氏

千金五上ノ五

又一醉之內、兒衣皆須用故綿帛為之善、兒衣綿
帛、特忌厚子熱、慎之慎之。同上

千金五上ノ五才文畧

兒新生不可令衣過厚子熱、令兒傷皮膚、肌肉血脉、發
雍瘡及黃、凡小兒始生、肌膚未成、不可暖衣、暖衣則
令筋骨緩弱、宜時見風日、若不見風日、則令肌膚
脆軟、便易中傷、皆當以故絮衣之、勿用新綿也、

天和暖無風之時、令母將兒於日中嬉戲、數令見風
日、則血凝氣剛、肌肉牢密、堪耐風寒、不致疾病、若常

藏在幃帳中、裏衣溫暖、譬猶陰地之草、不見風、軟脆不耐、當風寒也。千金翼 卷十一

癰腫也、同官針篇

按癰又作壅、五十六難肺壅、甲乙經脉經並作肺癰、又作雍、素問大奇論、肺之雍、喘而兩胠滿、新校正引甲乙經俱作癰、孟子癰疽、韓非子作雍鉏、又作壅、汉祚臚並見史倉公傳中、

又按說文、癰腫也、釋名、癰雍也、氣壅不結裏而潰也、攷古癰腫、概凡諸瘡瘍腫而言之、故癰腫互稱、素問平人氣象論、目裏微腫、如臥蠶起之狀、而靈樞論疾診尺篇、視人之目窠上、微

癰如新臥起狀、是微癰與微腫同也、傷寒論厥陰篇、熱氣有餘必發癰膿、金匱要略水氣篇、黃汗其脉沈遲、身發熱、胸滿、四肢頭面腫久不愈必致癰膿、枳實芍藥散方後、並主癰膿等、並非癰疽之癰、王冰注素問五常政大論分潰癰腫曰、癰腫膿瘍也、可以見矣、素問有癰腫字、而無瘍瘍字、唯運氣篇中、癰腫瘍瘍並稱、恐非古義、

又按史傳中有云疽發背者、有云癰發背者、並皆憂患不得志之所致、而癰疽互稱、說文、

癰腫也、疽癰也、

繫傳作疽久癰也、段玉裁亦
後漢書注改作久癰並非

是。凡論癰疽、靈樞為最古最詳、究其所言、癰

輕疽重、癰淺疽深、故內經中有以癰為瘍腫者、而無以疽為腫義者、許叔重以腫釋癰、以癰釋疽、良有故也、是知癰疽可以分輕重深淺、而不可以分久新、後人改說文、作疽久癰也、甚謬矣、然析言則癰疽不同、渾言則可互通、靈樞癰疽篇、癰發於嗌中、名猛疽、汲米疽即素問通評虛實論拔癰也、又謂刀馬挾纓為癰類、可以見也、史倉公傳、齊王侍醫遂治之脫疽、脫癰即後世

案云、色將發臃、後百餘日果為疽、又齊侍御史成病疽、內發於腸胃之間、後五日當癰腫、後八日嘔膿死、並癰疽互稱者也、

張子和傳神方

附骨癰即附骨疽也、

生姜一片之弊

顧雨田曰藥引中生姜常寫幾片燈心常寫幾根竹葉橘葉常寫幾瓣葱管荷梗常寫幾寸余謂片有厚薄根有短長瓣有大小寸有麤細諸如此類皆須以分兩為準吳醫彙講卷

甘草重用

汪訥庵曰、益氣補中、鴻火解毒諸劑、皆倚甘草為君、必復重用、方能建効、此古法也、奈何時師每用甘草、不過二三分而止、不知始自何人、相習成風、牢不可破、殊屬可笑、本草備要
卷一
甘草

條

醫書之說、皆以甘草為君藥者、固有之矣、然余醫家、有尊重財草、而弱視甘草者、大抵有二、其一、甘草味厚、性平、無毒、無害、故常以之爲主藥、而用之不疑者、蓋由主藥得之、則無害也、其二、甘草味厚、性平、無毒、無害、故常以之爲主藥、而用之不疑者、蓋由主藥得之、則無害也、

生薑

附注

藥不宜久煎之品

桂枝辛香，經大久煎，則氣散而力有不及矣。故須遲入。凡用桂枝諸方，俱當依此為例。用肉桂，亦當臨用去粗皮，切碎俟群藥煎好，方入。煎二三沸，即服。吳儀洛傷寒分經桂枝人參湯注

釣藤鈎，久煎則無力。本草備要

外台卷十六

九可攷

脚氣互瀆足法

礬石湯治脚氣冲心
礬石二兩右一味以漿水

一斗五升煎三五沸瀆脚良

金匱要略

若腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以瀆脚已下日二為之數日消盡

肘後方卷三

又方削楮或桐木煮取汁以瀆之并飲少許加小豆炒

同上

杉作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處々有

本草行義卷十

曾有士人得脚弱病云々、用杉木為桶濯足、及

令排樟腦於兩股間、醫說卷八引遜齋閑覽

小豆炒

又大頭瘡走肉者、切於火上燒之、其瘡即

一日二服、數日自癒、用燙水洗亦可

豆一撮、黃芩一錢、甘草半錢、大蜜一錢、

苦勸艾四步、前土半斤、火頭四個、入甘草大蜜

一半、五半、煎三五匙、食後、金匱要略

藥石歌、苦勸艾、中火、卷二、兩古一和以藥水

脚氣不妥淋洗

脚氣不妥淋洗

若腫從腳起、稍上進者、入腹則煞人、治之方、小豆一斛、煮令極爛、得四五斗汁、溫以漬膝以下、日二為之、數日消盡、若已入腹者、不復潰但煮小豆食之、用後方卷三

脚氣鍼灸為佳、服補藥、與用湯淋洗者、皆醫之大禁也、活人書卷七

大禁也故人告秦子

謂蟲雖灸燙全頭南華史用陽林於者皆燭西以

曰奇山豆食之卷三

不日二歲之壤日散盡苦乃人謂苦不更責

豆一增者令疫歸野四五半十量又責相

苦謂於相法減省土鹽苦人頭限燒入苦之

祖善不空林永

大金十五上肉極門

十七脾風之狀多汗名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱則實則人身如鼠走

極肌痺走如鼠

走又孟州續命

湯治肉極虛熱

肌膚淫如鼠走

又石南散治肉熱極則體上如鼠走

素問痺論凡痺

之癩逢寒則蟲逢熱則縱

蟲謂皮中如蟲行

走入皮膚中如蟲行按千金更首凜然如寒狀覺

身中水淋狀時如竹管吹及肉中如針刺雜風口錐刀

所刺行人皮膚中無有常處偏有冷處如風所吹

等並与如虫行皮中同義也

脉經八診得肺積多、主皮中時痛、如蟲緣之狀、甚者如針刺、時癢、

千金十九頭上有風如蟲行

三十一

肘後方三、小品癲狂良方散方後云、面當覺急、

額中有蟲行者、額及手足應有赤色處、如此、是

日差候、

五

又卷五、癲病方、初覺皮膚不仁、或淫、苦痒、如蟲

行、或眼前見物如垂絲、

五十七

活人書卷十八、意苡仁酒治脚痺方後云、常令

酒氣醺、不絕、久服覺皮膚下如數百條虫

行、即風濕氣也、

藥行之驗

初服其人身如痺、半日汗復服之三服都盡、其人如冒、狀勿怪、此以附子、木併立皮內逐水氣未得除、故使之耳、太陽下篇桂枝附子去桂加白朮湯方後

初服微煩復服汗出便愈、柴胡桂枝干姜湯方後

服後當如虫行皮中、從腰下如冰、後坐被上、又以一被繞腰下、溫令微汗、差、金匱方、黃耆湯方後

中病勿更服、大便當如漆、百合地黃湯方後、分溫再服、則吐膿血也、桔梗湯方後

其知者如醉狀得吐者為中病、烏頭桂枝湯方後、藥煩

溫服升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以

苦酒阻故也日黃耆芍桂苦酒湯方後

當汗出如虫行皮中即愈日桂枝去芍藥加麻黃附子湯方後

小便當去尿如皂角汁狀色正赤二宿腹減黃從

小便去也日茵陳蒿湯方後

病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也日消石

礬石散方後

新血下如豚肝日瘀血湯方後

以身中覺如針刺狀則藥行也千金八小八風散方後

未發一服發時一服發後一服以吐利四行為瘥
不止冷飯止之同十梔子湯方後

平旦空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭面
習然為定勿更加之日三芫花散方後

藥勢未定不得強起行即運悶旋倒眼花暗
然迷絕此是逐風所致不須疑怪日上

額上手中從文理中赤起是知也無此候更服

千金十四治風癘良名子方主治

服藥十日覺身體瘡疹大癰二十日更大癰三十
日乃漸止此皆是風氣出去故也即上天門冬酒方

欲令病人見鬼加防葵分欲令知鬼主者復增
一分立有驗防葵良薦並令人迷惑恍惚如狂
不可多服大金十四物鳥頭散方後

初服三合漸加微婢為度日十五大黃酒方後
病即下去勿更服也日十六茱萸酒石湯方後
者更可服三卷日十七治積耳氣不瘡無死諸草藥子熟之隔日一服羊肝二味方後
空腹服半寸也須捨針兩食間以冷漿白粥已止
病在頭當鼻日十八治積耳氣不瘡無死諸草藥子熟之隔日一服羊肝二味方後
病在膈上吐在膈下利在四肢當汗出日十九建中又方方後
未次備急散方後

膈上吐膈下下去惡物如糞斗蝦蟆子或長三尺日二十桂梗圓方後

若吐多以醉飯三四口止之日二十一治欬嗽酒肥皂莢三味方
藥入四肢百脉似醉狀且之效日二十二建中又方方後

其藥通中入脾鼻又酸疼勿恠日二十三前無比薯蕷圓方後
始服藥當咽喉並有癰子腫起頰車腫滿齒斷
皆腫唾碎血出勿怪也不經五日即消廿一水腫門治水腫利小便又方水銀等八味方後

葉廣按凡代用者出於不得已而某實非正法更非諸病皆然之謂某病而代用某藥而可耳
淺人執以用之衆病謬也

代用之藥

如無木香可用鹿角杏一分 千金九萎蕤湯方後
無犀角以升麻代 同上十木杏湯方後

蜀棟無以恒山代之 同十牡蠣湯方

不耐木香者以犀角兩代之 同十三溫中當歸湯方後

秦皮如無用柳皮代之 日十五下治下赤連年一方注

王好菖朱氏云蓋入裏若血溢者犀角黃湯乃陽明經聖藥也如犀角升麻代之升麻止角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘草同入陽明耳

李東垣

無當歸用芍藥躬

日三遠志湯方後 又茯苓湯方後

補當歸建中汤方後 卷四白芷圓方後

又

無當歸用芍藥躬

日三遠志湯方後 又茯苓湯方後

補當歸建中汤方後 卷四白芷圓方後

又

無猪膽以羊膽代之。慎守。常留於奉

無澤泻以白木代之

甘草圓方後

內上內補當歸建中湯方後
案李方生姜用六兩

無續斷大薦根代

不能飲酒人以水代之

上葉黃蝶只以青色

無寒水石木漢代之

五上清火口風制女谷行方後

今世乞生金但黑成哭即

金部書

無生妻汨遺千妻三

兩宿用之。方後十三

無羊爭牛爭人爭亦得
若無里魚、洞魚不可用

卷之二

尋、廿治乳癰方後

無爲集

得出肘後五三元粟末二字。

丁皮心腹冷氣諸病方家用代丁香、本綱三十四丁香條李時珍說

門香唐宋本

微始增入而

不著其功用

家多用其節

奇代沒藥
鴉本鋼盞

真發明時珍

如無真阿膠以

龜板膠代之

論

卷之二

葛根生者四兩、

乾者二兩、

總病論卷

葛根龍膽方

葛根龍膽方

葛根龍膽方

小麥炒乃小麥未熟時、取中黑來、

捻之成黑、勃者、是也、

無即以小麥炒黑焦、

地蟲火毒用之亦得、

同上李多丸方後

漏蘆瘡亦相傳深先服

漏蘆湯下之、漏蘆

無莞花、以桃花一鴨

子大不炒代之、總病論

青龍湯方後

漏蘆瘡亦相傳深先服

漏蘆湯下之、漏蘆

鵝鷄十五枚、無以

溫殺鬼丸方

漏蘆瘡亦相傳深先服

漏蘆湯下之、漏蘆

空青一兩、無以石綠代之、同上

漏蘆瘡亦相傳深先服

漏蘆湯下之、漏蘆

白虎湯煎法

白虎湯桃花湯竹葉石膏湯附子粳米湯並

以米熟為藥成之期、外臺白虎湯白虎加人參湯

並改許者法却非古色按千金十卷勞復篇麥門冬湯以水七升煮粳米一升令熟去米內諸藥煎、

取三升知米熟、自為度也

千金卷二鯛魚湯方右四味切豬肪魚不須洗治

清酒三升合煮魚熟藥成絞去滓適寒溫

米湯去甘草加椒

乾姜方後去水弃

煮米熟去滓服、升令盡此

白虎湯煎法

又卷五下桂橘皮湯治小兒五六日不食氣逆方、

散治痘瘡入眼及生翳耳、

白虎湯煎法

白虎湯煎法

白虎湯煎法

白虎湯煎法

白虎湯煎法

古方紫丸治小兒用代赭云無真者、以左顧牡蠣代

使乃知真者難得、本草五引圖經

龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熟

用漏蘆葉無則以山梔子代之亦取其寒能

解熱蓋不知其能入陽明之故也、本草綱目十五引

葉、或言無莞花以桃花代之取其利耳、同十七下莞

花集解時珍

糜茸無即以鹿茸代、本事方卷二糜茸圓

如無茅根以藕搗汁亦可、傷寒六書三生地芩連湯

方後

空青一兩無以石綠代之、同上

空青一兩無以石綠代之、同上

空青一兩無以石綠代之、同上

空青一兩無以石綠代之、同上

空青一兩無以石綠代之、同上

空青一兩無以石綠代之、同上

白虎湯煎法

後云右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取二升次下
薤米米熟藥成稍服之

又六犀角人參飲子方後云右四味㕮咀以水四升半
煮取升七合下米煮令米熟分四服

千金升霍亂附子粳米湯煮法與金匱同
又廿一枸杞湯方後云右三味以水半升煮麥熟藥成
去滓每服升日再三十才

又尸上麥門冬飲方後云右二味以水一升和煮米熟
去滓以下前件丸藥三十才

白蘿馬

十全十四風癆門厥成為癆疾五臍不平六腑閉塞之所生也厥成為癆故附厥於此係也
陰衰發熱厥陽衰發寒厥

又云故經言久厥則成癆是久知似也

次天保己亥六月十五日鶴洋著厥字考為人所奪去因

十七卷可攻

說文并氣也

逆上不順也故

生氣通天論春

於呂者為厥

予逆疾之厥不同

注厥論曰厥謂

淵鳥全因不知疼

解之以厥說厥均屬認扁鵲傳尸厥當化厥

呂覽重疊數篇處
又則為瘓為厥

厥之厥與卒厥之厥不同也呂覽本生篇招厥之機
害已篇多陰則厥是多陽則瘓高瘓以逆寒疾

解之以厥說厥均屬認扁鵲傳尸厥當化厥

陰衰發熱厥陽衰寒厥

又云故經言久厥則成疾是久和也

金十四國痛門厥成為癲疾五臍不平六腑閉塞之所生也厥成為癲故附厥於此條也

厥

天保己亥六月十五日禱詳著厥字乃為人所奪去因
隨其而安此本一度更名以備心日之故

十七卷可改

說文厥發石也段玉裁注凡有撮發皆曰厥

山海經曰相挾之所抵厥郭云抵觸厥掘

孟子若嶧厥角稽首趙云厥角者叩頭

以額角犀撮地也晉灼注漢書曰厥猶豎

也叩頭則額角豎按厥角者謂額角如有

所發角部肅下云角有所觸發是也以上

皆厥之本義若釋言曰厥其也此假借也

假借盛行而本義廢矣此厥字ノ本義

厥字徃ノ厥疊二字ノ假借ニテ厥本義非入

厥說文革氣也トアリテ素靈所言王永以逆氣

釋之ノ厥乃仲景所言ノ手足寒熱ノ厥字皆厥

字ノ義ニテ厥字ノ義非入本雅說文ニ從テ厥ニ作

ルヲ是トス疊又作蹶說文疊僵也トアリテ素

問生氣通天命異法方宣命所言ノ痿厥ノ厥

五藏生成歸血凝於足者為厥ノ厥靈杞寒

熱病篇厥氣上及腹則死ノ厥三十疊字本義

ニ厥ノ義ニテス疊ニ作ラ是トス即後世所称

ノ脚氣心詳十九医掌管雜二疊字考本

下見タリ

逆上不順也故

生氣通天論春

也孟子若山崩角和首走

豆

以額角犀撮地也晉灼注漢書曰厥猶豎

也叩頭則額角豎按厥角者謂額角如

有

注厥論曰厥謂

所發角部脣下云角有所觸發是也以上

皆厥之本義若釋言曰厥其也此假借也

假借盛行而本義廢矣此厥字ノ本義

ニテ厥癥疊三字各同シカラス醫書中所言ノ
厥字徃々癥疊ノ字ノ假借ニテ厥本義非人
癥說文革氣也トアリテ素靈所言王永以逆氣

釋之ノ厥乃仲景所言ノ手足寒熱ノ厥字皆癥
字ノ義ニテ厥字ノ義ニ非ス本雅說文ニ從テ癥ニ作
ルヲ是トス疊又作蹶說文疊僵也トアリテ素

問生氣通天命異法方宣命所言ノ痿厥ノ厥
五歲生成扁血凝於足者為厥ノ厥靈杞寒
熱病篇厥氣上及腹則死ノ厥ニテ疊字ノ義

ニテ厥ノ義ニテス一疊ニ作ヲ是トス即後世所称
ノ脚氣心詳ナリハ医学管雜二疊ニ字考條
下見タリ

ト逆疾之厥不同
而鳥全因不知疾

生篇招疊之機

以逆寒疾

13 尸疊當化厥

後云右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取三升次下
薤米、米熟藥成稍服之

又十六犀角人參飲子方後云右四味㕮咀以水四升半
煮取升六合下米煮令米熟分四服

十五金參霍亂門附子粳米湯煮法与金匱同

又廿一枸杞湯方後云右三味以水半煮麥熟藥成

去滓每服一升日再三才

又曰上來多門冬飲方後云右二味以水一升和煮米熟

去滓以下前件丸藥三十才

十全十四風癲門厥成為癲疾五臟不平六腑閉塞生所生也厥成為癲故附厥於山係也
陰衰發熱厥陽氣不和厥是又知似也

厥

天保己亥六月十五日
擷其要此述其要以備他日之政
厥字考為人所奪去因
說文革氣也

事親可及

十七卷可及

十八卷可及

十九卷可及

二十卷可及

廿一卷可及

廿二卷可及

廿三卷可及

廿四卷可及

廿五卷可及

廿六卷可及

廿七卷可及

廿八卷可及

廿九卷可及

三十卷可及

卅一卷可及

卅二卷可及

卅三卷可及

卅四卷可及

卅五卷可及

卅六卷可及

卅七卷可及

卅八卷可及

卅九卷可及

四十卷可及

四十一卷可及

四十二卷可及

四十三卷可及

四十四卷可及

四十五卷可及

四十六卷可及

四十七卷可及

四十八卷可及

四十九卷可及

五十卷可及

五十一卷可及

五十二卷可及

五十三卷可及

五十四卷可及

五十五卷可及

五十六卷可及

五十七卷可及

五十八卷可及

五十九卷可及

六十卷可及

六十一卷可及

六十二卷可及

六十三卷可及

六十四卷可及

六十五卷可及

六十六卷可及

六十七卷可及

六十八卷可及

六十九卷可及

七十卷可及

七十一卷可及

七十二卷可及

七十三卷可及

七十四卷可及

七十五卷可及

七十六卷可及

七十七卷可及

七十八卷可及

七十九卷可及

八十卷可及

八十一卷可及

八十二卷可及

八十三卷可及

八十四卷可及

八十五卷可及

八十六卷可及

八十七卷可及

八十八卷可及

八十九卷可及

九十卷可及

九十一卷可及

九十二卷可及

九十三卷可及

九十四卷可及

九十五卷可及

九十六卷可及

九十七卷可及

九十八卷可及

九十九卷可及

一百卷可及

一百零一卷可及

一百零二卷可及

一百零三卷可及

一百零四卷可及

一百零五卷可及

一百零六卷可及

一百零七卷可及

一百零八卷可及

一百零九卷可及

一百一十卷可及

一百一十一卷可及

一百一十二卷可及

一百一十三卷可及

一百一十四卷可及

一百一十五卷可及

一百一十六卷可及

一百一十七卷可及

一百一十八卷可及

一百一十九卷可及

一百二十卷可及

一百二十一卷可及

一百二十二卷可及

一百二十三卷可及

一百二十四卷可及

一百二十五卷可及

一百二十六卷可及

一百二十七卷可及

一百二十八卷可及

一百二十九卷可及

一百三十卷可及

一百三十一卷可及

一百三十二卷可及

一百三十三卷可及

一百三十四卷可及

一百三十五卷可及

一百三十六卷可及

一百三十七卷可及

一百三十八卷可及

一百三十九卷可及

一百四十卷可及

一百四十一卷可及

一百四十二卷可及

一百四十三卷可及

一百四十四卷可及

一百四十五卷可及

一百四十六卷可及

一百四十七卷可及

一百四十八卷可及

一百四十九卷可及

一百五十卷可及

一百五十一卷可及

一百五十二卷可及

一百五十三卷可及

一百五十四卷可及

一百五十五卷可及

一百五十六卷可及

一百五十七卷可及

一百五十八卷可及

一百五十九卷可及

一百六十卷可及

一百六十一卷可及

一百六十二卷可及

一百六十三卷可及

一百六十四卷可及

一百六十五卷可及

一百六十六卷可及

一百六十七卷可及

一百六十八卷可及

一百六十九卷可及

一百七十卷可及

一百七十一卷可及

一百七十二卷可及

一百七十三卷可及

一百七十四卷可及

一百七十五卷可及

一百七十六卷可及

一百七十七卷可及

一百七十八卷可及

一百七十九卷可及

一百八十卷可及

一百八十一卷可及

一百八十二卷可及

一百八十三卷可及

一百八十四卷可及

一百八十五卷可及

一百八十六卷可及

一百八十七卷可及

一百八十八卷可及

一百八十九卷可及

一百九十卷可及

一百九十一卷可及

一百九十二卷可及

一百九十三卷可及

一百九十四卷可及

一百九十五卷可及

一百九十六卷可及

一百九十七卷可及

一百九十八卷可及

一百九十九卷可及

二百卷可及

二百零一卷可及

二百零二卷可及

二百零三卷可及

二百零四卷可及

二百零五卷可及

二百零六卷可及

二百零七卷可及

二百零八卷可及

二百零九卷可及

二百一十卷可及

二百一十一卷可及

二百一十二卷可及

二百一十三卷可及

二百一十四卷可及

二百一十五卷可及

二百一十六卷可及

二百一十七卷可及

二百一十八卷可及

二百一十九卷可及

二百二十卷可及

二百二十一卷可及

二百二十二卷可及

二百二十三卷可及

二百二十四卷可及

二百二十五卷可及

二百二十六卷可及

二百二十七卷可及

二百二十八卷可及

二百二十九卷可及

二百三十卷可及

二百三十一卷可及

二百三十二卷可及

二百三十三卷可及

二百三十四卷可及

二百三十五卷可及

二百三十六卷可及

二百三十七卷可及

二百三十八卷可及

二百三十九卷可及

二百四十卷可及

二百四十一卷可及

二百四十二卷可及

二百四十三卷可及

一升中者三湯頤服之四五溫又內

蒲黃三兩廿六人

同卷廿葛氏方治

血氣逆心煩渴者

方生竹皮一升水三升

煮取一升半分三服

九三十六

又尺脉芤下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯

子金大少竹皮湯治欬逆下血不息

桑甘五十九竹皮湯治為兵杖所加木石所正血在胸背及肠

中痛不得氣息方

本草經竹根作湯益氣止渴補虛下氣案竹根古方罕用當

千金卷三婦人虛損門竹根湯治產後虛煩方甘竹根細

切草五升以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗二十枚

復煮麥熟三而沸內甘草二兩麥門冬一升湯成去滓服

五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

安岡村氏云竹根與用茅根薑根同義近言不用不思之甚也

同卷廿治渴方濃煮竹根取汁飲之以差止廿四分

本草經白芍根治血熱血虛血瘀血癆

藥治通義卷七十七

禁補條

脚氣無補法

七亥六月廿九日

病源卷十三脚

氣緩弱候云
若大虛之氣短
可其間作補湯
隨病體之冷熱
而用按此亦

病源卷十三脚

氣緩弱候云

可其間作補湯

隨病體之冷熱
而用按此亦

脚氣無補法

同卷廿葛氏方治

血氣逆心煩渴者

方生竹皮一升水三升

煮取一升半分三服

九三十六

凡脚氣病雖若虛羸要不可補

之補藥唯宜冬月酒中用之丸散

亦不可補服之鹽

非浮不差唯昆布丸用草薢

子大黃乃佳耳唐

醫多不曉此謂

為腎虛多將補藥有不經劑而

歸多不曉此謂

又蘇療脚氣病不

可常服補藥補

藥多令鼓脹緊實難救也

金匱果菜穀禁忌云、鹽多食傷人肺。

咳嗽亦當禁鹽。

千金十七方治肺虛寒云、方用猪腫

大棗、方後云、二吉忌鹽、按本草裏空

方今人不耐鹽而多壽少病好顏色、東方南方人食

絕欲鹹而少壽多病便是損人

則傷肺之效矣。

而未大四食鹽降李時習鹽之氣味

鹹醒人之血氣走血無多食鹹多食則脉

耳勿迷後人脾腎兩虛之說。

活人書

卷七

脚氣方論、千金外臺日取詳此不

復叙大抵越婢湯小續命湯著意以仁酒法

脾約神功圓皆要藥也仍銅灸為佳服補

醫方考卷五防已飲考云大抵脚氣之疾壅疾

也喜通而惡塞故孫真人曰脚氣之疾云

下与千全同但益虛羸也唯冬月得用補藥如冬月仍患腳氣不除者亦不得

服之

引蘇秦

全

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

金

同

<

凝泣而變色。復其
類煎鹽者用皂
角收之。故鹽之味
微辛。乏肺。鹹

乏腎。喘嗽水腫。

消渴者鹽為大
忌。或引痰吐。湿

血麻或助水邪也。

○本事方卷四紫
金丹鹽門名石中
黃丸方名禹

鹽三个月。雖毫
末許不得入口。薦

去後。且以醋少許
調和飲食可也。

又為病者不能忌鹽。不若勿服。徒勞無功。果欲去病從死來。
須依此去鹽至誠服之。

千金方卷二十四解百藥毒。并二甘草解百藥毒。此實如湯沃雪。有同神妙。云始此之事。皆

湏知之。此則成規。更
不湏試練也。五

又五蠅蠻。螺蟲。尿
人影。余以武德年
就中以垂和成泥。

作蠅蠻。螺蟲。土
就中以垂和成泥。

涂之。再塗即愈。方
知天下物相感。莫曉
其由矣。廿五十一
二

而薨。深悔當時不禁鹽。泣血之餘。書而復轍。
之過以戒。

時後方治卒身面腫滿方中曰勿用醋及鹽鼓他物

雜也。用鯉魚方
後三七日勿食鹽。用猪腎
方後日莫雜喫飯及

魚鹽。用小豆方
中日勿與鹽。用生猪肝
方又卷四治卒大

腹水病方中云勿食鹽常食小豆飯。葛蘆一升
云、方

寇宗奭曰。素問曰。鹹走血。故東方食魚鹽之人多

黑色。走血之驗。故可知矣。病嗽及水者。宜全禁之。本草
考、卷四淋濿門石韋散考云治砂淋者必使斷鹽方能取
效。斷鹽有二妙。則淡能滲利。一則無鹹不作石也。

本事續集卷六治十種水病方後五忌鹽一百二十日緣鹽能化水故也。

醫方考卷四淋濿門石韋散考云治砂淋者必使斷鹽方能取效。斷鹽有二妙。則淡能滲利。一則無鹹不作石也。

古方不可思議。己亥七月朔

當歸四逆湯。麻黃升麻湯等類以其不似于諸

方簡約者相類。注家徃謂為後人之攬入然

其說固耽測。辨似有理。而其實則夏虫之見也。
今用其方於其證有殊効。知聖人之所建不可以後

人之淺見。思議也明矣。嘗檢千金方芫花散卷十
二其方六十四味。讀者茫然莫知其義。孫思邈曰

遠覽前古。莫覩此方有高人李孝隆者。自云隨初

受之於定州山僧惠通道人。此後用之大有效驗。秘而不傳。但得其藥。其方不可得而聞。始吾得之於

靜知道人將三紀於茲矣時俗名醫未之許也然
比行之極有神驗其用藥殊不倫次將服節度大
不近人情至於救急其驗特異方知神物效靈不拘
常制至理闡惑智不能知示猶龍吟雲起虎
嘯風生此其不知所以然而然雖聖人莫之辨也
讀傷寒論者當以孫氏此言為針砭夫聖人
且有蓋闕之言在後人欲斷千古之疑案非
明眼如炬遂不免暗投冥行余深慨於茲因
述其說如斯

氣衝急痛 乙亥七月七日

按脈候九重帝十篇
有子陰中氣衝文
又平肝冒萹氣
衝脾裏熱並保
歸全氣衝
又肺裏氣衝熱
十九

余嘗見產後數日後氣衝急痛寒熱便秘
投桃人麤輩諸藥無寸效遂至斃死者當時不得
其解後又遇一夫園子坂堀
金之助氣衝急痛醫以為脚
氣為肝證為歷節雜投無所不至余與醫官田
村元長君診之為屬疎經治血湯用生地黃兼用失
笑散數日奏效後瀆金匱婦人雜病萹得其
解不堪欣躍筆於此夫衝脉為血之海氣衝乃衝
脉之所從來也靈動肺萹衝脉者十二經之海也与
少陰之大絡起于腎下出于氣衝循陰股內廉
氣衝急痛

邪入胸中循脰骨內廉逆順肥瘦篇夫衝
脉者五藏六府之海也五藏六府皆宣焉為其上者
出於頸顎游諸陽灌諸精其下者注少陰之大
絡出于氣街循陰股內廉入胸中伏行骭骨
內下至內踝之後屬而別全匱婦人雜病篇婦
人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷
年無寒積結胞門在下未多經候未匀令陰掣
痛少腹更寒或引腰脊下根氣街氣衝急痛
此皆帶下非有鬼神得以上支而理醫明但用溫藥
而無效得涼劑而愈者以其記多熟候故也

全匱屬瘡創

而

風氣本天間地之二氣散變則風變則氣蓋人身之感邪也風變則氣壅土
故能解散其
風則氣自通
是知疎風即所
以利氣後世方書
既多利氣之法亦
少疎風之治今人
亦不詳其理徒知
利氣而不知疎風
豈非天憾事因
疏以衍之弘化乙巳六月十六日

凡病當分風氣治之己亥七月廿日

風為百病之長素問數言之巢元方撰病源
皆概之于風後世專言氣者棄而不論風病
之因掃地而尽遂至桂麻難用于雜病疏氣杳
竄之呂奉為拱璧是古今治療之大變當着
眼之尤甚者矣而叔世聾聵之徒雷同於吠虛因
怡然陷於窠臼無啓憤者自非明眼如炬豈
能得達觀其理歟乎夫仲景著蘋圓主
治有風氣百疾文是二而一而二唐書張文仲有
有風狀而四氣狀分語古今雖不可知其詳而畢
凡病當分風氣

竟非虛語。蓋古義謂風寒為邪。以乎般
疾難皆屬外邪也。而人身中亦有風經。乃有肝
木風。食某物動風。又至幽經。櫬例引經之地水
火風合和。成人風氣。來調全身。強直諸毛孔閉
塞。風止則氣絕。蓋以大塊噫氣。其名為風。
文攻之。自外而言。則風自人身而言。則氣故在
表。撻則名之風。在裏。在則名之氣。自散漫則
風收斂。則氣然而人身一氣之雍滯。必因外候
風氣之不和。所謂風氣能生万物。又能害万物。及
今之所謂癆。古之所謂風。才金有雜風門。熟讀
風經本天圖。即知風氣之發。不外乎此。

而可知余言之不诬也。如他脚氣屬風毒。隼頭桂
枝湯治癒。方而有賊風入腹。試以脚氣一病言之。
其訖有宜麻黃石膏者。有宜桔梗木茱萸者。若不分
風氣二訖。將何以處之乎。故凡百病當分風氣
而治之。是起腠肉骨。及達觀古今之第結構。而
讀古經方書。亦可迎刃而解。始得可讀破万卷醫
經而已。

午金廿七調氣法。病有四種。一冷癰。二氣疾。三邪
風。四熱毒。尤

金匱水氣篇。脉浮而洪。浮則為風。洪則為氣。風

氣相搏、風強則為隱疹、身體為痒、為泄風、久為癥癩、氣弱則為水、難以使仰。風氣相搏、木擊人身體泄膿。

又首篇、夫人稟五常、因風氣而生長、風氣雖能生万物而亦能害万物、客氣邪風、中人多死、倉公傳、陽虛侯相趙之草病重、去脉來滑、是內風屬氣也。

辨脉法、洒淅惡寒、釋音作灑淅、云上所下切、王音折寒、散馬白、又成氏桂枝湯注、浙者洒淅也、惡風之白也、釋音洒、蘇狠切、驚白八、浙思歷切。

證類本草十六阿膠條洒音鮮

千金卷七諸散第三秦艽散主治洗洗寒

熱、七分才醫國心方卷五引小品方云附骨急疽者、其筋處壯熱、體中乍寒乍熱、麻之惡寒、

不用熱十五分才

風洗、酒、浙然悽然。已亥十月五日
洗、酒、酒浙浙然悽然。已亥十月五日
本草經、洗、酸屑、慈石、寒熱洗、當歸、溫瘡洗、白
又酒之如瘡狀、阿溫瘡酒、牡蠣素問診要終論、酒、時
寒、玉水注酒、寒貌、風論、腠理開則酒然、寒、注酒然、
寒貌、刺瘡篇、足陽明之瘡、令人先寒、酒浙、金匱葵子茯苓散、主治酒浙惡寒、五十六難、肺之積名息竇、
酒浙寒熱、千金方、肺臟引此文作酒、寒、熱、傷寒論、
浙、惡風、刺熱篇、肺熱病者、先浙然、厥、起毫毛、惡寒、甲乙經浙然、作悽然、按洗、酒、酒浙浙然悽並假借相並、一聲之轉、注家以浙朱之義釋之、又能宗立音刺

服建中湯當歸湯。知下焦病乃用建中。未又治中焦更就藥味攷之。此方是緩中調血之劑。何以言之。藏氣法時論曰。肝苦急。食甘以緩之。古難曰。損其肝者緩其中。金匱首篇。肝之病。補以酸。助以焦苦。益以甘味之藥調之。又金匱虛勞小建中主治有訛。聖濟從錄治非時便血。名弓藥湯。按千金亦名弓藥湯。桂沉良方云。此藥偏治腹中虛寒。補血尤主腹痛。以上並以甘緩中更溫補肝血之義。与後前注家補中焦之義異。試取傷寒論攻之弦為少陽之脉。濇為血虛不流利之候理當。其多用芍藥可以觀也。

腹痛故先用建中滋肝之品而緩其中然後用柴胡清解之方而疎其肝。素刺熱扁肝熱病者小便先黃。腹痛多卧身熱。王注肝之脉環陰器抵小腹而上故小便不通先黃腹痛多卧也當与建中條相發。

凡氣血失流利則脉濇。未必專為虛。太陽中篇。二陽併病條。何以知汗出不徹以脉濇故知也。千金卷十九補腎門。名建中湯者八首。並補腎之補下焦之義。未必定為中焦。

小建中加黃耆以養其血

趺陽脉大而
緊者當即下利
為難治

滯下泄泻忌大脉

庚子三月廿日

素問玉機真藏論泄而脉大難治靈五禁篇病泄脉洪大是二逆也傷寒論厥陰篇下利脉沉弦者下重也脉大者為未止脉微弱數者為欲自止又云傷寒下利日十餘行脉反實者死脉經四診百病死生決腸澼下膿血脉沉小流連者生數疾且大有熱者死又云腸澼筋癱其脉小細安靜者生浮大緊者死洞洩食不化不得留下膿血脉微小逕者生緊急者死洩泄脉緩時小結者生浮大數者死

傷寒論辨平脉

方有執為王叔和
自著

傷寒論辨平脉諸可与不可篇辨庚子四月廿三日
辨平二脉法、蓋古之遺法、又非仲景筆、然謂之叔和
所撰、亦恆說耳。何以言之、脉法往、與本經相矛盾、
知非一人筆、脈經卷五引平脉文題以仲景、論脉是
非叔和自著也明矣。傷寒例則叔和之自撰、故曰採
輯仲景舊論、至辨諸可与不可篇、則疑非叔和所
附、王函經辨可奇十七篇、与脉經同、而傷寒論則
缺可溫平諸篇、脉經十七篇外、更有重實、重虛等
六篇、而卷末乃云治傷寒形證所宜進退、晉王叔
和集中景評脉要論、由是觀之、諸可与不可篇原叔

自著集評脉要論卷之二
辨平二脉法、蓋古之遺法、又非仲景筆、然謂之叔和
所撰、亦恆說耳。何以言之、脉法往、與本經相矛盾、
知非一人筆、脈經卷五引平脉文題以仲景、論脉是
非叔和自著也明矣。傷寒例則叔和之自撰、故曰採
輯仲景舊論、至辨諸可与不可篇、則疑非叔和所
附、王函經辨可奇十七篇、与脉經同、而傷寒論則
缺可溫平諸篇、脉經十七篇外、更有重實、重虛等
六篇、而卷末乃云治傷寒形證所宜進退、晉王叔

和所集收之脉經也。六朝隋唐醫學
卷之數耳。謂之叔和所撰。則訛也。要之六經篇則畧存舊式。其他則一部傷寒論採輯本耳。然謂非仲景面目亦僭妄也。

不泥藥性。天保庚子五月十八日。
余嘗觀能言藥性者。往々去加古方。此比之漫然不省者。不同日而論。唯恐不免所以惡智者。為其鑿之義。更憎始學乳臭之後。倣其嚙妄為減。彼增是蓋古方之精義。義消已盡矣。近日讀治病而法曰。不讀本草。為知藥性。專泥藥性。決不識病。假饒識病。未必得法。識病得法。工中之甲。此數句正當為始學書紳之鑑。

方有寒溫藥。有冷熱。方之寒溫。乃其大體。而藥之冷熱。乃其細目也。凡方之為用。數味合和。然後始可定寒熱。溫

夫能知藥性者。乃能忘其藥性者也。善言藥性者。非得藥性者也。得免而忘。歸得魚而忘筌。是非筆舌之所盡。王弼云。義苟在健。順何羸乎。爻苟合順。何不坤。乃為牛。義苟應健。何乾。乃為馬。而或者定馬於乾。案文責卦。有馬无乾。則爲況法。漫難可紀矣。身體不足。遂及卦爻。又其原巧愈猶甚。不知推致五行。天下復或值而義元。所取蓋存象忘意。云由也忘象以求。

不泥藥性

其義甚矣。王氏此言可以推為醫家之鑑。

劑也而溫劑中有冷藥寒劑中有溫藥此古聖能明陰陽升降之理者之所建立而非叔世贊々之徒所得而知乃今論一味藥性漫然去加之何其不知量之甚世猶有鈍質質直不知變者墨守成法不漫去加者假令其有守株刻舟之議寧不失大體則猶勝於肌斷齒奔斷首截尾使成方无完膚者萬々矣余又視方人之醫能測古方宋元_醫書者其議論精確可駭而其處劑去加甚煩愚意不甚以為佳者恐好小察而不通乎大體也呂子別類篇云草有莘有藟獨食之則殺人合而食之則益壽此言可以考立方合和之微意
又本草也本草不可以極仲景氏之蘊已無謂全論也
竊其瑞倪半是余之所以不釋方意也業未廣按此說佳否相混宜擇

之方各味辨其功用如縣境照妍媸毫無差失但某說各自逞其詞鋒竟无一定是非則其說各異其功今天麻黃退各味有各功則固勿論已若至配合之以為一隊則用心不宜各論其功今天麻黃退

黃疸用越婢

余嘗聞之_{時還}野龍貞曰越婢湯用黃疸難治者有奇功當外不省之頃閱李金外臺用石膏者不少見母湯治上氣咽喉塞短氣不得卧腰背痛胸滿不得食面色萎黃方具生姜桂麻黃石膏甘草杏仁半隻右味見十又十卷登黃門齒瘻圓方中有石膏又治女勞疸方用滑石膏外臺卷四許仁則療諸黃芍麻黃等五味湯用麻黃干葛石膏生姜茵陳五味知越婢湯必有效書以

黃疸用哉婢

按金匱水氣篇
越婢加木湯主治
云裏水者、身面
目黃腫、其脉沉小
便不利、故令病水、
假令小便自利、此
已津液故令渴也、
越婢加木湯主之、
或謂黃腫脈徑
化洪腫、是愚謂
越婢有能治黃之
功、則化洪腫非是
書以備資攻、
麻黃醇酒湯治
黃疸、知麻黃之
有治黃之功、

余嘗聞之立野龍貞曰越婢湯用黃疸難治者
有奇功當然不省之頃閱半金外臺用石膏者
不少貝母湯治上氣咽喉塞短氣不得卧腰
背痛胸滿不得食面色萎黃方用生姜桂麻黃
石膏甘草杏仁半夏芍藥見十七卷又十卷登黃門齒
陳圓方中有石膏又治女勞疸方用滑石三膏外臺
卷四許仁則療諸黃芩麻黃等五味湯用麻黃干
葛石膏生姜茵陳五味知越婢湯必有效書以

用後方二治膚黃方、有竹葉小麦石膏三味方、桔

桂枝甘草湯、大黃附子湯、小柴胡湯、大黃硝石湯、

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

大黃附子湯

傷食用本食物有異來十六卷再改

藥澆通義卷二十一
引金及醫說為反
治之類

孫思邈云、治病新瘥、遇美飲食、過多食後者方、
取所食餘、燒為末、飲調服二錢七日一服千金子十粒又、
治一切病食瘡方、還取本食種數多少相似、各少許、
和合布裹燒灰、如杏仁大水服之四十三方、此間人或用、
是法不無由來、而特取倉卒單捷耳、非大方也、
肘後方二、食多而發復方、燒飯篩末、服方寸匕、

良、
等分

李時珍曰、物類相感志云、食荔枝多則醉、以
殼浸水飲之即解、此即食物不消、還以本物消、

傷食其物者良矣

之主意 本獨三十一荔枝條

集驗方、治凡所食不消方、取其餘類燒作末、酒服方寸匕、便吐去宿食、即差、陸光錄說、有人食桃有不消作病時已晚、無桃就樹間得是燒桃子燒服之、登吐出病即差、小品方同之、

醫圓心方卷九廿二

藥治通義卷八

殺蟲條

外臺卷廿六服考
千金同者數見今
不繁引

本事續集卷三

治大風神效追命散

下井方後云、下藥切

不可許病人知、恐虫藏
匿虫則病難愈、二九

平日 千金蛇蟲藥服法 八卷蟲釐可參效

宿勿食平旦飲服一百丸、小兒五十九丸當爛出

治肝

勞生長多云二方後

又治蛇蟲在胃中云二方後宿勿食旦服之

凡合句禁聲勿語道作藥、要當畱聞、便不下切忌

之日治脾肺熱有白蟲云二方

湯方後日廿六ノ三十七

外台卷廿六刪敏系茱萸根下蟲

宿不食空心頤服之日治蛇蟲方後

空腹苦酒下丸

日治心肺熱傷有長蟲云二方後

治蛇蟲攻心腹痛又方空腹服方寸匕

平旦頤服之

治肺心熱生虫云二方後

治腎心熱云二方後平旦并花水服方寸匕

先食服之治蛇蟲攻心腹痛方

又方同

平旦頤服至已時與好食令飽須臾蟲出

治白蟲方後

次早空腹服之

治喜裏又方后

明日空腹以猪羘臚汁漱尽 又方

平旦空腹服一枚

日又方

平旦分二服

日又方

宿勿食平旦空腹頓服

日又方

宿勿食旦服之

日又方

晉空腹服四合

姜蜜湯方后

頓服之 杏人湯及桃皮湯方后

空腹飲三滿口裹死即愈 猪膽苦酒湯

平旦空腹服

治溫瘧方

案以上並千金治蛇藥服法

先齋一日、晚莫喫飯、次早五更溫水吞下、

本事續集九、取寸白虫方後

先齋一日、次日五更喫燒炙淡猪肉一枚、次用溫水送下、

同上又方

五更初先喫炙猪肉一片、次服芥汁已時下了、

同上又方

五更服、晚取下、

同上又方

去月一三日喫藥必差、以蟲頭向上、月三以後、服藥不

效、為蟲頭向下也、今日欲服、預前一日莫食、

外臺六救急瘡白吳方後

卷廿

服藥以月一至五日以前、是蟲頭向上、服之得力、無問
多少、皆得出盡。內廿六崔氏療白疕方廿六十四

截瘡者、又問其愈期、与治法而默識其利害、苟欲
截而不解、往延綿引日、又更生他患、余每遇嘗患
瘡者、釋名瘡、酷瘡也、案此病雖有發間日之別、寒熱
休作之異、而其實不過外來之邪、治法亦与傷寒
無大異、同特疫能傳裏、瘡但在表耳、故治得
其宜、則無死證、輕者十餘發、重者二十餘發、又
愈堤不非唯瘡之愈、徃、因是而愈積年之宿疾、
此當与明者言、難為昧者言、世間有截瘡方法、
醫俗習而不察、半發後猶可用、早截必有害、况
截而不解、往延綿引日、又更生他患、余每遇嘗患

升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發

一服三服訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗

手面及漱口勿進食取過時不發乃潔洗進

食并用藥汁塗五心眉前頭面藥滓置頭

邊曾用神驗 治瘧方後

其令飲有酒氣入密室裏燃炭火厚覆取

大汗即瘥 又方

酒服方寸匕 又方

未食服五丸日二不知漸增 恒山圓方后

欲吐但吐至發令得三服時早可斷食時晚不可

斷食 又方

未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為瘥

不止冷飯止之 旋子湯方后

比發可數服或吐下 治老瘧方后

每發日平旦時服自至發勿食 治瘧方后

未發前服盡 又方后

酒服方寸匕 又方

井花水服之 又方

水服方寸匕 又方

露宿明日塗五心手足過發時瘧斷若不斷可

可飲一合許瘥 治瘡方後

第一服取未發前食頃第二服取臨發時 治瘡

方

發前稍啜飲勿絕吐之並以涂身斷食過時乃
食飲鰣鯉湯方后

酒服十九 烏梅圓

未發前酒服十九 臨發時一服已發時一服 恒圓
分三服至發時令三服盡 恒山湯 下又方：后同

旦服丸已發時一丸百勿飽食 荔蘆圓○以上並
十金方十卷文

未發時服二丸、欲發時服一丸、肘後三、治瘡病方、
未發前服一丸同上文方、百者省之

先發服三丸中服三丸、臨卧服三丸、無不斷者、
先發時一服、比發令三服盡、日常甘草方

空腹服四丸、欲發三丸飲下之、服藥後至過發
時勿喫食日

發日五更酒下三十丸、平旦四十九、欲發四十九、不發日

空腹四十九、晚三十丸、日烏梅丸方後

發日平旦冷水服二丸、日乞鬼瘡

按素問瘡論曰、至病之發也、如火之熱、如風雨不可當也。故經言曰、方其盛時必毀。太素作勿
敢必毀因其衰也、事必大昌。此之謂也。夫瘡之未發也、陰未并陽、陽未并陰、因而調之、真氣得安、邪氣乃亡、故工不能治其已發、為其氣逆也、又刺瘡篇曰、凡治瘡、先發時如食頃、乃可以治過之、則失時也。王水注曰、先其時、真邪異居、波隴不起、故奇治過時、則真邪相合、攻之則反傷、真氣故曰失時。仁齋直指方曰、凡瘡、方來與正發、不可服藥、服藥在於未發兩時之先、否則藥病交爭、轉為深害。

五行

五行見於洪範而後漢儒大敷衍之。仲景在漢末、何特不取之、然宋已下則泥而不暢、故鑿空失實。此其辭耳、然而其大法則有離五行者乎、頃讀焦竑筆乘、先得吾所嗜、因筆于茲、曰、劉向五行傳後世以為牽合、天固不以屑之為事、而殃咎類至、理不可誣。若遽以牽合少之、則箕子之五事庶徵相為影響者、非歟。試以身言之、五行者、人身之五官也、氣應五臟、五氣調順、則百骸俱理、一氣不應、一病生焉。然人之受病、又有所屬、太陽為水、厥陰為木、是也。而

太陽之證為強項為腰痺為發熱為惡寒其患雜然並出要其指歸則一出於太陽之証也猶貌不恭而為恒雨為狂為惡也況五官之間兩失其心節素向所謂陽明厥陰之合病也其為患豈一端所能盡哉劉向直指其事為某之應局於一端猶未察段醫書曰兩証合病之理也後之人主五事多失其心受病不上一證宜乎災異之迭見互出耳

集氏筆
卷二

五
卷二

本事方卷二頭痛頭暉方、十五肝厥頭暉用釣藤散石膏、氣虛頭痛、
用附子、可併攻、同續集二用烏頭者三方、用附子者一方、用白附子者二方、用石
膏者三方、方在

醫方考五頭
痛門三五七散

有附子、
又珍湯考云、

女或問頭痛而
人參陽邪不
益亢乎、金匱
少可補人參黃
耆之類此之謂
也

續醫說卷六頭
痛治驗是俗嘗
言頭無寒疼腹
無熱痛此不經
之說也、下有附子、
子用承氣

案可攷、

續醫說卷六頭
痛治驗是俗嘗
言頭無寒疼腹
無熱痛此不經
之說也、下有附子、
子用承氣

後故有麻黃附子細辛湯侯氏黑散羌活沖和湯
頭痛

連翹尤宜小兒

香月牛山治小兒吐乳用二陳湯加連翹砂仁
且云連翹小兒特效全矣從其言用之應效如
桴鼓頃讀本草衍義云連翹治心經客熱最
勝尤宜小兒牛山氏之說有所據焉

少陰病用柴胡

活人書卷四 少陰病若惡寒而踴時自煩
不欲厚衣者用去大黃 柴胡湯按少陰篇少
九條曰少陰病
惡寒而踴時自煩欲去衣被者可治

又十又問仲景少陰四逆湯又有四逆散何也答
曰大抵少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有
表熱者仲景謂之晚發熱用麻黃細辛之類
以發汗終不成少陰證便不得發汗耶今少陰
病四肢冷亦有內熱者仲景用四逆散是也四逆
湯用附子乾薑而四逆散主四逆而其人或歎或

悸或小便不利或腹中痛或泄利下重已上病

皆熱證耳

又陰證腹痛即四逆散

同卷十九

少陰泄利下重不可投熟藥先濃煎薤白湯內四逆散緣四逆散用枳實芍藥之類少陰病小便不利者四逆散加茯苓也

同上十六

不治直下寒水石散用生大黃大柴胡

或人書寒水石散用生大黃大柴胡

少陰病用寒水石

石連甘草湯之原

深師療柔風體疼白汗出石膏散方

外臺卷十四

石膏二兩研

甘草一兩

右二味擣篩為散以酒服方寸匕可以七服武家黃素方

治傷寒發狂或棄衣奔走踰牆上屋薦石散

本事方卷九

黃連去皮取根再寒水石各等分

右細末每服二錢濃煎甘草湯放冷調服延年療風虛止汗石膏散方

外臺卷十五廿九

石膏研
甘草炙各四分

右一味合搗下竹篩為散先食以漿水水服方寸

老旦三夜再更少水各

少婦用鹽水投熱酒服先食以漿水水服方寸

老婦用鹽水投熱酒服先食以漿水水服方寸

飛黃生末

少室山和善藥中高祖御史平以降等難治

石膏一兩
甘草二錢

黑附子桑風蠶殼白芷出一毫頭大

龍虎酒

石膏甘草粉之東

古音家各四分

右三味金橘、下竹節葛根、透食以漿水服之。
若無夜用，更水煎服。

