醫方要畧

坤

1-129

Kitasato Memorial Medical Library

F
イ-19

499.2
I 9

No. 2295
日 i 129

慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月17日

富士川文庫

3329

醫學小階遠西醫方要略 卷之二

目次

安質沒扣謨 一丁
亞剌比亞膠 兩丁
遏爾託亞 四丁
亞爾鮮 三丁
阿魏 七丁
亞鉛
安倔斯黙剌
撒爾非亞
薩撒弗剌斯
山葯菜精
遏泥孑
阿芙蓉 六丁
安息香華 八丁
亞兜尼加 九丁
亞麻子 十丁
珊篤理
薩毘那 十二
雜腹蘭

Kitasato Memorial Medical Library

碎米薺 十二
撒瓦百奴謨
沙別爾
山午勞
山蘿蔔
幾那
揮發香鼠精法 二四
蚯蚓油
魚膠 二五
葵 二七
金錢花
雙鸞菊
薩爾沙根 十三
山奈 十四
沙刻
羌活 十五
膠泥 二三
堇菜
牛膽
吉納護謨 二六
金花草
榆皮

迷迭香精 二八
咩埒
明礬 二九
酒石 三一
蒸餅
蒸餾水 三四
西瑪爾扱
悉契瓦剌斯
失歇篤
著
芍藥 三七
默栗薩
綿馬
蜜 三十
薔薇水 三三
蒸餾醋
失格刻乙
紫堇
麝香 三五
失鳩荅 三六
蜀羊衆
暗厄利馮利鹽

Kitasato Memorial Medical Library

越栗失爾剥碌布利坦　越列密
鉛糖 三八　越沒里 三九
阨日多　依蘭苔
鷲窩　百合油 四十
烟草　蓖麻油
氷絲糖　菲阿斯失亞密 四一
七葉樹皮
白芥子 四二　沒藥 四三
木炭　消石 四四
石膽 四六　石灰 四九
石鹼 五七　舍利別 五一

石長生舍利別　接骨木附翦篦　肝木
拶那葉 五二　舍謨孛黙謨
燒酒 五三　消痂露
清涼飲　攝綿施那 五四
攝爾扁荅利亞　石腦油 五五
茜草　青蒿
清涼子 五六　蘇甘沒扭謨
斯百兜麻攝的　水銀 五七
水楊梅根 六四　瑞香
睡藥 六五　斯必竭里亞
追加三種

Kitasato Memorial Medical Library

藤黃 六ノ下
耶蔑斯驅熱散
目次 終

醫學小階遠西醫方要略卷之下

凌雲柳田政矩撰
男　政泰
關島良載合
佃　正副
鹽津直俊・校
中田忠朗

●安質沒扣謨アンチモニウム又ハ形金類ニ近ノ質破碎シ易シノ金石ノ間ナルヲ以半金屬ト云伊豫出羽等スピーススガライスガラウトモ云鉛色ノ針紋ヲ為シ有光輝ノ精製法土石汚物ヲ去ル也陶壺ヲ上端迄土中ニ埋鐵版ニ許多ノ孔ヲ穿壺上ニ置安質礦ヲ他ノ陶壺ニ載周圍ニ炭ヲ積燒片ハ内レ是ヲ倒ニメ版上ニ載堀ヲ為雜汚ハ版上ニ殘精礦ハ溶テ下壺ニ流レ下ル主治以製煉術去所含之硫則為一種毒

物而劇ク吐ス其儘用レハ令
發汗メ粘液ヲ稀釋驅除ス長服則粘痰ヲ疎釋シ血液
調ヒ稀釋シ蒸氣ヲ驅發シ頑癬頭瘡諸惡瘡ニ屢液ヨリ
發スル經久皮病梅毒ヲ治ス酸之
服量一匁ヨリ二錢迄水煎
或ハ末或丸劑ニ加服
外用膏ニカテ潰瘍ヲ洗藥トメ蛔腫眼ヲ乾シ治
○安質沒扭若波列デヤボ光無
合為黒色者坩鍋ヲ火ニ上
聲ヲ發ス鐵箆ヲ以テ攪聲止能燒テ赤色ト為后又一
ヒヲ投ルヿ如前法終ニ未
ニ置ヿ八分時放冷スレハ
ル汁ハ毒
ヲ生ス　主治發汗ノ良劑
ヲ散シ水腫傷冷流走痛頭
利總ヘテ發汗ス可キ諸病
ニ用ヒ兼ヲ熱
ヲ服シ温覆　○睚篤綸リ
ニット　安質沒法
ま　ヲ數回温

湯ニ陶泓シ湯終ニ無味ニ至其ヲ硝
内ス火ニ上水氣ヲ蒸散シ乾白堀ト為ス　主治清涼壯熱
病開達發汗利尿ス　瘟疹胸脇痛諸瘧
間歇熱黄疸等　服量十八ヨリ一匁
用ヒ温液ニ和シ温服　○韃爾答律斯越默窒屈斯
タルメチキユス　法亞爾碌
扶散九錢酒石英二ヲ半蒸鎖
入水ヲ加煮ヿ四分時盡ク化
無水五弗二物ヲ硝燐ニ
ルニ至濾テ其液ヲ文
火ニテ水氣ヲ蒸散シ上面結
膜ニ至リ更微火上ニ
テ漸次ニ結芒セシメ其芒ヲ取リ乾
シ為末貯フ　主
故ニ腐熱膽熱胃腸赤痢
ス心嘔氣アルニ効有吐根ハ
効ヲ兼不可不知小兒吐根
ヲ嫌者是ヲ水ニ溶シ用ユ可
シメス瀕々ニ可吐者ニ用
盃含利別一ヲヲ和四分時
○潤燥催吐飲麥煎二升半攪
服量韃爾答一氏ヲ蒸鍋水一
時ニ用得吐ヲ為度小
胃ニ粘着セル汚物ヲ快吐シ或下
毒滯着ノ惡ヲ利ノ
是ハ下利ノ効ナシ　○爽涼催吐飲一頓ニ吐セ
可ノ味
韃爾答五氏薔薇露七匁覆
用吐ヲ得ヲ為度
ニ
尤モ良鞋爾五仁大
參酒一盞宛用ユ
一服毎ニ溶シ為一
ニ常ノ水ハ

Kitasato Memorial Medical Library

快吐ヲ妙ク壯實ノ感觸小者ハ三氏或四氏ヲ用中毒ヲ快吐スルニハ五氏ヲ温湯一ワニ溶シ用神弱知鈍精神朦昧ク胸膈ニ粘物ヲ稀薄ス可量少ク十五氏ヲ與テ度々吐ヲ催ス不止者硫精ヲ用テ微温湯ヲ用ヒ微量ヲ則徒ニ惡心ヲ勞ル過量則吐血或ハ漏精ヲ水ニ滴シ用ル微量ヲ則不解凝發汗良方也胃腸ノ粘汚ヲ溶シ吐瀉ヲ排發ス内攻毒ヲ排發スル一ヨリ加半氏許飲液ニ加用ヒ有捷爾荅半氏阿片等分ヲ數用レハ不吐ノ解凝ノ峻劇ノ毒ヲ微火ニ乾シ封貯

主治峻吐ス六氏ヲ用リ點眼ノ翳膜ヲ去リ角膜及ノ潰爛ヲ治ス

細絡ノ凝血及小ゴウドズ法安質末三ワニ硫華三ワニ水ヲ加鐵壺ニ煮沸シ安質ワニ右羅倨ニ水ヲ加ヘ煮鎔シ適宜ニ蒸餾水ヲ加ヘ煮ハ緑礬精ワニ至リ又濾シ紙上ニ留ル硫ヲ數々水ヲ注洗淨徹火ニ乾シ貯

主治汗及蒸氣ヲ發シ利尿シ血中ノ惡液ヲ排シ凝結ヲ疏解

金硫結爾滅斯密涅剌列ス カ或酸液家ニ與レハ唱其蒸發ヲ進メ血中ノ胸諸病疾ノ肺ニ滯ヲ緘綿咯出セシメハ故喘息ヲ斂嗽劇燃等ノ惡液ヲ排泄疏散ス

主治汗解凝發汗ニハ半氏ヨリ一ワ半氏ノ兒四分氏ノ一ヨリ半氏ノ加減ヲ以テス

多服スル者ハ或ハ瘡腺腫瘍癰瘰癧ヲ生シ或ハ滿下ス

輕痛風瘰癧腺腫瘍癰瘰癧黄龍散

其藏塞ヨリ頑固ノ久キヲ溝已ニ解シ只滯著痰毒ヲ衝動シ脳ヲ疏解スルニ麗春花泡劑等ニテ送下スル可發汗者龍膽少ヲ加ヘ效甚者阿片少加ヘ丸トス

主治汗解凝發汗ニハ半氏ヨリ半氏ノ兒四分氏ノ一ヨリ三氏小兒ハ吐セス

糖ヲ加ヘ或酷粘液滯肺而發熱者或腹ノ欠者與之則痰ヲ溝起シ發汗解凝シ二便ヲ利シ清ニス金硫四氏阿片一氏龍二別ス或他藥液ヲ以一服宛日

主治傷冷乾欠或酷粘液滯肺而發熱者或腹ノ欠者與之則痰ヲ溝起シ發汗解凝シ二便ヲ利シ清ニス金硫四氏阿片一氏龍二別ス或他藥液ヲ以一服宛日

笑

主治峻吐ス六氏ヲ用リ點眼ノ翳膜ヲ

法安質末三ワニ通紅トシ少宛投シ其末ヲ燒盡シ聲魚ニ至レハ豬黄堀トヲ去為末沸湯ニテ數々洗其湯少モ無味ニ至レ

安質末三ワニ硫華三ワニ水ヲ加鐵壺ニ煮沸シ安質ワニ右羅倨ニ水ヲ加ヘ煮鎔シ適宜ニ蒸餾水ヲ加ヘ煮ハ緑礬精ワニ至リ又濾シ紙上ニ留ル硫ヲ數々水ヲ注洗淨徹火ニ乾シ貯

主治汗及蒸氣ヲ發シ利尿シ血中ノ惡液ヲ排シ凝結ヲ疏解

金硫結爾滅斯密涅剌列ス カ或酸液家ニ與レハ唱其蒸發ヲ進メ血中ノ胸諸病疾ノ肺ニ滯ヲ緘綿咯出セシメハ故喘息ヲ斂嗽劇燃等ノ惡液ヲ排泄疏散ス

輕痛風瘰癧腺腫瘍癰瘰癧

多服スル者ハ或ハ瘡腺腫瘍癰瘰癧ヲ生シ或ハ滿下ス

主治峻吐ス六氏ヲ用リ點眼ノ翳膜ヲ

主治汗解凝發汗ニハ半氏ヨリ半氏ノ兒四分氏ノ一ヨリ三氏小兒ハ吐セス

主治汗解凝發汗ニハ半氏ヨリ半氏ノ加減ヲ以テス

主治傷冷乾欠或酷粘液滯肺而發熱者或腹ノ欠者與之則痰ヲ溝起シ發汗解凝シ二便ヲ利シ清ニス金硫四氏阿片一氏龍二別ス或他藥液ヲ以一服宛日

Kitasato Memorial Medical Library

四次ヲ以テ上海蒸溜製ノ金硫七瓦研合初ハ四分ノ一粒ヨリ漸次ニ服度ヲ増ス○金硫排毒飲　主治粗同上錢安投尼半錢金硫七瓦研合初ハ四時ニ一卵ヲ攪ス○芙蓉黄石散　金硫阿片各二瓦炳石一刃研和為一日分ヲ以テ一服ヲ與間歇熱ハ金硫一味半瓦或一瓦宛日三四次用テ有良驗孕婦酒石少シヲ加エ用テ尤モ良　金瘡ノ難發者ヲ泡醸蒸發湯泄驅散シ煩躁ヲ鎮ス　内攻水腫ニ頑固萎黄病　兼瘧女病者尤良　金硫一瓦格昧屈斯孕婦酒石各十瓦研合為一服毎日二服ヲ與間日熱ニモ右ノ劑量ヲ三瓦銀朱少ク肝脾腸間膜硬塊ノ宿疾ヲ攻ム　内攻ニ用テ此品ヲ適宜ニ加用テ血中ノ硫質ヲ融解沸醸セシメ血ルカ敗ニ多血蝕衛壮熱ニ禁忌ヲ適宜ニ加用テ此品ヲ適宜ニ加用テ疏散解鬱シ健胃ス　喜悪ノ有先清涼下劑ヲ兼施ヘシ○結爾蔑斯窓涅剌列ケルメス法　金硫一瓦格昧屈斯孕婦酒石各一弓研末合和坩鍋ニ入文火ニテ攪シ溶ケ是ヲ鐵壺ニ移速ニ為末沸湯五十弓ヲ磁器ニ

或右ノ末ヲ加入攪セ煮ノ分時火ヲ下シ靜定シ熬ニ乗ノ濾去滓ヲ取其液ハ適宜ニ加ヒ至ル前ノ如ク數回スレハ濾其末ヲ剰水ニ和シ坩鍋ニ入文火ニテ攪シ溶ケ是ヲ鐵壺ニ移速ニ為末沸湯五十弓ヲ磁器ニ

Kitasato Memorial Medical Library

外敷ノ止痛愈創（拔爾撒謨撒用共ニ其氣ノ侵刺ニ堪ヘル者ヲ云此漿一錢阿利布幾等分ノ沸湯ヲ加溶化スレハ油氣有乳劑ト為内服外用ヲ研和シ氣郁煎ニ加ノ内服外ニ○護謨漿二錢水一ヲ和スレハ滋養甘和鎮痛滑利良驗有華爾斯類ノ乾固セル龍涎ノ如キ此漿ヲ研シ水三能溶ノ易服ニ龍眼鼻口齒舌爛蝕創ス痛愈火傷娠痛潰瘍加卵白ヲ施ス

具ノ疼酷厲液ヲ包攝ス可キ舍利布白罌粟漿阿片各二合半時或有一時ニ一味ヲ用ヒ諸症ニ速効有ル一時ニ一ヲ用ヒ若阿片若鎮痙ヲ要セハ罌舍ヲ過爾託舍利○護謨和胸飲（主治傷冷毒效亞爾甘各一ヲ黙失良ク調和ス梅毒淋劇痛娠腫者ハ後ニ後和シ淋痛ヲ治ス）

錠酷厲液ヲ包攝ノ侵ス故ニ乾ス欸ニ煮水ニ濾テ文火ニ蒸シ稠ニ為ス花ニ○護謨和胸飲者大麥煎護謨ニヲ六ヲ甘草硫ヲ二ヲ服ス）

氣ヲ減シ後和ス精四ヲ一時ニ毎ニ加ヘ服ス宜ニ乾ス欸ニ研シ白ニ為ス花ニ○護謨和胸飲者主治勞瘵有乾欸咳嗽聲嘎咽喉痛痢承龍涎ヲ適注射ス娠

遏爾託亞葵之一種錦葵花葉同動物ニ多功諸器ノ粘滑液燥澁シ且稀薄硬甘酷厲緩急迫ニ殊ニ根ヲ以テ製ス又方遏六ヲ甘一ヲ石長生一ヲ半夏六ヲ艾水十升煮取六升去滓分温三服外用蒸劑或硬腫ヲ軟ケ攣急ヲ弛メ痛ヲ除キ膿ヲ成痢痛ニ咽喉腺瘍ニ漱藥トシテ灌腸トス

遏泥乎アラビヤ洋芥ノ一種無和産可代用香生治性温精油揮發鹽粘腻樣甘味有緩和シ聊刺戟スレ共無厲氣故不促嫩衝解凝軟硬ノ粘液ヲ釋シ排泄ヲ疏シ喘嗽ヲ治ス

遏爾託亞アルタアヌヘトムスト一種錦葵花葉同動生治舍粘液軟堅

Kitasato Memorial Medical Library

氣驅風鎮痙ヒ胃化ヲ扶ケ乳汁ヲ增（乳房結酸波ヲ消痰ヲ散）水腫淋疾白帶小兒ス（過泥子精同効）法略主治ノ膚癢腹痛ニ有効○過泥子油（毛同効）

同上ニメ峻也外敷凝結ヲ散ヒ諸腫ヲ消ス

●亞爾鮮アルセム又アルスト艾代用　主治花穗艾葉　鑽透解凝性温味苦稍衝動ス故温煖健胃力ヲ以其運營弱ク食難化ヨリ發ル諸病　蓼黄粘液水腫肝脾壅ヲ治シ發諸熱制細虫ス眼法（散服セシ用又越斯大抵温湯或蒟酒火酒等ニ浸シ作香露水ヲ加浓シ用）此藥硫氣ヲ含故ニ多ク外用羅斯ノ姙衝等ヲ治○亞爾鮮塩アルセム法乾シ洗ヒ石土為灰温湯ニ投シ汁ト為製スルヿ剥篤亞斯ノ如シ主治粘液ヲ鑽截シ衝動健運シ鎮嘔ス（發汗利水ノ功酒石塩ニ近シ）

●阿芙蓉ヘウルサップル質（護謨ト撒爾弗ト相混ス）主治鎮痙止痛催睡發汗驅風ノ有奇効（施用宜キヲ得ハ有害可恐ヲ失ハ味辛熱久含メハ口咽燃爛ス多嘗レハ味苦ク催嘔湧唾シ或嚢ス）膚ニ貼レハ發痒シ次テ燃痛シ皰ヲ生シ或爛而為壞疽是熱性侵蝕酷厲毒有テ燃腫痛等ヲ起者タルヿ明也（寒性麻藥ノ蓋一種ノ麻痺毒ヲ遲流ニス但其人ニ因テ一樣ナラス或辛熱藥等ノ配合ニヨリ或元氣之ニ不堪ヲ驅除セシトス為ニ因血行ヲ增シ數脉ヲ起スヿ有）或曰性膠粘而精微揮發ノ硫質ヲ含其氣腦ニ竄入シ精氣ヲ凝澁シ神經ノ知覺ヲ奪除シ睡ラシム禁戒（瞑眩妄ニ長服スレハ厥冷搐搦痿痺下利多汗搔痒惡心嘔吐口燥痿痺眩暈耳鳴息迫腹滿其他ノ

Kitasato Memorial Medical Library

険症ヲ發ス凡壯實熱一切嫩病多血及其續發ヨリ来ル症勞咳肺癆卒倒壅塞結腫惡液等未排除者惡液欝于腦中者嗜眠多汗血液腐敗ニ進者有害服量半氏ヨリ一氏稀ニ三氏迫可用者アリ或一氏ニテ毛瞑眩ス故ニ半氏ヲ初トシ漸増ノ三四氏ニ至可ナリ半錢ヲ頓服スレハ死ニ至頑固病常ニ用慣ル人一刀ニ少不瞑眩者有或能欝亞的現等ノ精徹揮發藥ヲ加テ良功有リ或一味糖ニ和シ用ル凡痛ニ速効有レ氏藥氣消則復痛故次第ニ慣用レハ恰如習慣酒而長飲漸久諸器諸液ノ運營失度シ衰憊シ危ニ陷宜慎戒解毒法誤過用昏睡搐搦等ヲ發セハ速ニ刺絡シ或吐セシムヘシ（滅答爾消夫鹽五氏水四錢舍利サト當溶シ用吐根毛赤可也）若未醒則醯醋ヲ顳顬ニ撒ケ且每八分時ニ一二匙宛灌下ニ接シ或ハ灌腸ス葛私製阿片及舍電阿芙液服量十八滴迄慣ル者可至卅滴

胃痙疝痛頭痛

磁精或龍腦油ヲ加テ患部ニ塗ル嫩衝眼ニ三滴宛日ニ三次點ス初不堪痛メ淚多出ツ或水ヲ加稀クシ施ス

角膜星翳曇暗亦點メ有殊効

○舍電發謨ンハムデ阿芙液（一名香竄阿芙波スペセレイウエイレンハンヘウルサツルツプ）法ニ乃雜腹蘭一方雜腹無シ

桂剉丁香剉各一錢菊酒一升堰二内時々振蕩レ浸ル四日絞濾去滓貯別ニ阿芙桂精ト桂露雜腹ノ方ト阿芙桂精ノ方有

主治鎮痙催睡止痛發汗驅風ノ良藥也嘔吐下ヲ止諸痉ヲ治メ嘔下ノ妨害無香竄品有レ疋服量四五滴ヨリ卅滴ヨリ漸加ス阿芙ヲ服シ發嘔者ニ可用桂露アリ服少ク不減盡冷病ニ尤モ驗アリ○芙蓉薄荷飲（阿芙舍利各二錢阿液卅滴調匀）

凡困痙攣嘔

Kitasato Memorial Medical Library

吐不止者舍電阿魏ヲ温メ頭痛顳顬ニ塗咬牙擦皆有効便閉者先下之而後與ヘシ否則無効

● 阿魏ドイフルスデレツキ熱國一種ノ草根ノ脂液ヲ乾固シ為スデレツ者黄褐赤透明粘潤者上品也

質華爾斯二分饅頭三分醸酢ニ為ル圭治寓透シ壅塞ヲ開浸セハ悉乳白色ノ液ト為ル

刺衝メ凝結ヲ疏解シ兼テ蒸氣ヲ泄ス子宮衝逆痙攣ノ良藥ニ而輕ク瀉下シ其臭氣ヲ以殺蟲ス

一丸ヲ三丸ト為シ三丸宛日四次ヲ以服ノ條蟲ヲ絶滅ス

越斯健質珊篤理葛爾儒氣那等或一物丸服胃弱家ハ苦味

蝋石諸臓硬腫壅塞ハ中和鹽霸鹽孕酒石ニ無動胃腸運營衰タル而腹痛最有功

乘劑安質汝劑魏ハ脾腫麻倨ニ加用或灌腸劑トス

蟲症ハ驅蟲劑瀉劑ニ心腹痛兼嘔者

痛風及脚頂固間歇熱一物或加氣那

疫咳喘急肉内服魏三錢括失亞丸料一錢半ヲ煙熏ノ

瘤發作焚ヲ臭ヲ皷服三ム為一丸甘草衣三丸

宛日三次滴多者或量ス○括失亞丸方盡會蘇甘浸各二ヲ格琅荳一ヲ覇塩丁香油谷二錢右丁油ト攪讀衆ヲ以為丸

皆有良効服量ニ加龍腦一服ノ無害或芳香蒸水ニ和シ舎和利ニ和

禁忌諸失血○阿魏丁幾法魏一ヲ一ヲ以製ス主治前說諸症

● 子宮衝逆痙攣服量十滴ヨリ十六滴迄一服ヲ焼酒或阿芙蓉酒或薄荷湯ヲ加ヘ用ス等分ニ加フ十五滴ヨリ十六滴ニ至ル

安息香華ベイソインブルーメイン溶化升煅ノ二法有溶化法安息

未適宜鹼蓬鹽四分一兩水六陪磁鍋ニテ煮テ四分時火ヲ靜定シ上清液ヲ取其塗ニ水ヲ加ヘ如前煮テ上清ヲ取其清液ヲ合レ文火ニテ永氣ヲ蒸散シ逐一倍ノ量ト為ス文火ニテ糸氣ヲ蒸散シ液黄色ニ濃ミ精ヲ滴加シ液黄ヲ下シ置ハ自ラ凝ヒ壺ノ形ヲ作リ是ヲ固ク口ヲ封シ二ヶ月ヲ過テ用フヘシ

升煅法安息粗末適宜陶壺長ク如筒口窄者ニ入レ硬キ紙ニテ△蓋ヲ帯ヒ凝固スルニ至ル沸湯ヲ加ヘ溶化シ冷ヲ待テ濾過シ乾ニ撒シ硝壌ニ收メ則ハ薬薄ノ芒ヲ結是ニヲ紙上ニ

Kitasato Memorial Medical Library

ヲ換其華ヲ掬取リ終ニ華地褐粘土ノ如ニ至ル下速ニ其華ヲ貯ヘ油ヲ稀散ス喘急（蚊肺ニ喘ス）肺痛（肺ニ膿ヲ結ス）膿血ヲ治シ腦神衰弱ヲ强壯ス服量五氏ヨリ八氏

●亞鉛ハ吐劑ニ似テ流動セス硫夾雜ス華ト為シ溶ル頃蓋ヲ去塩生ル片ヲ他ノ坩ヲ倒シ覆シ緊閉セス蒸氣ヲ漏シ燔テ上坩ヲ去レハ輕絮華滿布ス冷テ後水ヲ加濾ス最モ輕者ヲ取乾シテ貯フ主治發汗或吐劑下劑トス四氏ヨリ十二氏

又鎮痙ス癇癎（搐）神思感動ヨリ發ル諸病ヲ宮衝逆腸胃汚物ヲ除テ後ニ用フ小兒蛔及驚癎初發搐等（蚊性ニ勿用）有良効○亞鉛ハ驚癎ニ因テ心悸シ者ヲ頑固傷冷痛也主治有鎮痙之良効

急小兒疫疹等（或二匁ヲ解毒水四匁ニ溶一匁宛用フ）一日三次○解毒水方荊一丸半亞爾各一丸水適量鮮白豆ヲ蒸餾ノ露水ヲ以テ○鎮痙定喘丸ノ乾燃シ粉末ニシ内藏壅塞ヨリ攣急治暑華越斯一錢半律比丸料一錢魏半錢亞華十五氏右二氏ヲ為一丸嚥右衣五丸宛日ニ三四次○掃蟲銀華丸主治細諸症生汞二錢的列一錢華二錢右末ヲ研ノ不見星ニ至亞華及桂枝ヲ一丸ト為シ初二丸次日三丸ト頑固未サヲ以テ三丸ト加增シ惡心ヲ發シ與健胃下劑又二丸ヨリ用フ大黃吐根無効者外用ス鑽透刺戟シ發汗利尿通經ス經久壅塞（閭壅）悪液分利脈管神經纖維弛衰ノ血液粘滯者虛弱ノ熱病（神熱膿熱）兼粘液

Kitasato Memorial Medical Library

留飲ノ熱病（疏解吐易カ分利痰ラシムル）咽嗽腫久喘欬（為泡劑加盛）神熱揮衝劑ヲ用運力稍回一ノ後亞爾分ヲ加エ泡劑効有危劇ノ時ハ胃力不堪ノ有害赤痢兼腐敗者（亞児二錢ニ纈揃爾倫三ヲ二沒酯三ヲ葵舎利二ヲ九ヲ二ヲ七宛参煎加緑礬油ノ類以用ヒ）痱（各部麻痺ノ半身不遂經久傷冷）痛黒障眼（服之眼痛者粘液去ルノ良徴）閉歇熱（諸器塞結腐敗ニ傾氣那無功者）等皆可用壯實多血（胃鋭敏者ニハ）有害（藥性熱ナル服テ一錢ヨリ二錢或香揮藥ヲ加ヘテ泡劑トスル濃煎ニス濃煎則嘔ヲ發ス）外用痺不遂膀胱ノ尿閉（濃煎蒸湯或焼酒ヲ加ヘ或芭布トス）頭粘液（嚏藥トス）。

●安偃斯黙剌（アングスチツラ一種ノ樹皮巻テ如管外面粗糙色灰黄或淡白ニシテ班裏面滑澤淡黄褐色肌密而ハルス様也）試効香嵐苦味保護強壯藥而性効加ムルニ加律剌ニ近服量（散ハ一刃ヨリ一刃半ヲ等分ニ加用或香的ノ如等ノ揮發劑ヲ等分ニ加製シ去滓亞露水ニ浸用越斯ハ他藥ニ配為丸）

亞麻子（インサート藥試効ヲ舎緩和軟化ス）

（亞麻仁ト呼補胡麻酯腐毒ヲ包摂ノ侵剌其多シ）

止痛ス（酷厲毒ヲ包摂ノ侵剌制シ攣急痛ノ緩弛四錢劑ヲ等分ニ加製シ去滓亞麻嗽ス）

痛淋（嫩性）石淋痛等ヲ緩解ス方（亞麻四錢白蜜一弓半先ヲ煮テ舎利ノ稠トシ去滓蜜ヲ攪和スル口咽嫩痛鵞口瘡黄爛ス）

胸脇痛（諸管牽張剌痛乾欬ニ不堪者）先剌絡ノ後吐油ヲ以緩解ス）輸尿管結石（服之滑利剥脱嫩熱乾燥ヲ服シ頻々ニ多量ヲ飲ム）

導泄腸痛（及疝腹痛ニ又患部ニ擦温覆則極テ有験）便閉（峻下劑無効者或單用シ或卵黄ヲ加エ研和用ユ）熱病口咽乾燥（龍腦少ヲ研シ塗）等ニ有良効外用火傷擦方（亞麻油石灰水各四ヲ舎電阿波四錢調和シ布片ニ浸シ數々換貼ス）

亞麻油（甘扁桃油ト呼阿利布ト同効ナル此新油彼一陳油ニ勝ル）試効酷厲化膿ス。

Kitasato Memorial Medical Library

● 撒爾非亞 サルヒア 又サリー 香草ニノ甚青葉 雖香ニ近 主治葉性温微收 澁捍 發ノ塩油ヲ用ヒ 健運神經 開達塞強壯 心胃ヲ宮虚弱 劑也 痞滞食不化 心腹痛頭眩昏睡癇癖肢節顫 腦攪子宮衝逆傷冷毒咳喘 水氣風氣腫 痛風血虚ノ經閉崩帶諸夫血 羸瘦病皆可用又制 蟲眼法泡劑或麥酒葡萄酒ニ漫或乳汁ニ煮テ桂末ヲ加フ外用ハ口瘡鷲口瘡傷 剤トス又打撲獸蟲毒ニ外數ス 冷ノ咽喉腫ニ漱

● 珊篤理 サントリ形當藥 魚則亞爾鮮ヲ用 淨刷汚物 健胃精強壯ス進食發汗ス 主治性温味苦稀釋粘液 膽液粘液 無次第ニ似 藏壅塞萎蕁諸病萎黄黄疸瘡積家ノ 逐間歇熱序者内 留飲ヲ 衝逆肝脾閉塞ニ有効服法 花蕊共泡浸水煎散 剤及越斯丁幾等

● 薩撒弗剌斯 サツサフラス木 理粗而赭色 有香 主治根及木材性温竅透精微 發塩油ヲ發汗利尿稀粘排惡閉塞驅風治疝實ニ酷厲毒 發池ス ル良劑也 水煎ノ液文リ出ニアリ 傷冷胃寒毒痛風 腳痛水腫梅毒瘍癬及諸内攻腐瘍小瘡皆可用服法 泡浸或散 香氣ニ不堪者水煎ス一ヒ如蒸餾ス一ヒヨリ油三錢出 主治同上而峻也最能發汗ス十滴許ヲ 和五ニ分ヲ 八分時一服 勢三錢ニ

● 薩昆那 サビナ 無和産 主治味辛苦 葉ヲ用 竅透有油 子宮及腹諸器ノ血脉ヲ鑽衝ス通經ノ峻藥也 胞衣死胎ヲ下 辛熱而強刺衝ス壯實多血婦人服之ハ有害 或吐血蚘血ス先刺絡清涼疏滌ノ後可用或體弱 血ヒ者ノ經閉ハ滋養補ス可ヒ此ニ非ス 血脉弛緩ノ 感觸經閉者此藥ノ目的 孕婦勿用 傍治水腫 承閉 黄疸石淋痛風喘急 粘痰湯或 腸間

Kitasato Memorial Medical Library

膜閉塞蟲（水煎或四錢ヲ木十六ヲ二浸用煎服法劑水煎服未ハ半ヲ半ヲヨリ一ヲ日二三次或半ヲ二次）○木屑（浸劑水煎）主治支節痛（發汗劑ニ加用）○同油（生鮮ノ蒸餾ス）主治同上ニ而峻烈一ノ通經丸劑ニ加モ良シ

● 山蒿菜精（ゲーストハニーフルブラート）（揮發也）主治失苟兒ノ要藥ト法（鹽葉穗生鮮者四升焼酒五升格兒弗ヲ以蒸餾ス）凝體ノ弛弱ト塞ヨリ發ル失苟兒及粘液ヨリ來ル諸病也虛冷ヲ温メ竅開シ驅風シ稀粘シ發汗利尿シ萎黃病（黃脾病）粘液腫ヲ治シ寒性粘液家ニ有殊効熱性家ニ有害清涼劑ニ可加斷爛或出血者（或塗或嗽）○同昆設爾弗法（葉生鮮者適宜）痛（發汗劑ニ加用）○同油（生鮮葉ヲ三次ニ和用ス）滿ヲ糖ニ和用ス三次ニ和用ス

● 雜腹蘭（サフランコロクスン）又撰用ス（柔潤光澤芳香微辛苦黯赤色指ニ捻摩ノ不溼而能染）試効亞的兒樣油ヲ含微催睡麻痺ノ効有ト雖モ少用シ

（頭患星昏麻痺）○爽神シ頭ヲ開醒シ睡眠ヲ復一頓多服則頭目昏重痲痺與一ヲ一ヲ泡劑散藥トシ與フレハ多量ニ堪ヘ阿芙蓉ノ如ク通例半ヲヨリ漸慣用シ

● 寢透衝動溫煖開達壯神鎮痙止痛解凝緩和ヲ標的ト（腦神心胃及神經ヲ捍衛シ活發シ驅風シ防腐スル）用シ氣昏冒（卒運シ元氣ヲ失ヒ）倒支節顫振心悸（泡劑ニ用ヒ）ノ神熱（惡性）腐熱ノ阿片症ニ（呼吸）難（使役）ノ喘急不利肺傷勞欬（及諸瘡瘍ノ潛伏危篤ヲ救フ）每欬頑固久欬瘡（前ニ用ヒシ如ク）臨ミ多少不順者（痛詛症ニ由リ惡露閉塞シ）產後不（暈絞痛子宮弛弱惡露閉塞シ）產（兒剝下シ用催生又難產ノ血暈諸症ヲ治ス）滯者對症藥ニ兼用等ニ有聖劑發汗ニハ一ニ加用但壯實熱症ニ有外用凝血ヲ疎シ嫩腫劇痛ヲ解蒸劑布或敷膿又痔痛（及痛腫硬腫）嫩腫眼瘡眼毒）丸乳房腫（痛）嘔吐胃癌（丸藥ヲ加工温メ心）

Kitasato Memorial Medical Library

窩ニ貼ス ○雜腹蘭越仙劑 ヱツセンチ法 雜腹二ヲ亞爾箇ヲ收攝シ 發熱ニ置特々振蕩スルコト三四五次ヨリ止メ其殘底液ニ合シ 前方濾メ前液ニ合シ 蒸餾シ格爾弗底ニ赤色精ヲ許殘ニ至リ止 一ヲ許殘ニ至リ止 經閉或對症藥ニテ有效 片蔔私篤理等ヲ加 用ヲ殊ニ能通經ス ○雜腹丁幾法 雜一ヲ八日ニ燒酒十五ヲ成 浸ス惡性瘧潛伏 熱○雜腹蘭膏サイフランテル 服法 廿滴ニ 理奴謨未各三ヲ雜ニヲ先 物ヲ又ニ烊化メ後餘藥ヲ下シ 煉成ス 主治一切硬 堅結腫ヲ軟化シ止痛 兒瞤闌節 流走痛 ●碎米薺ヲラランダ昆設爾法 生莖葉ヲ以山萮ス 主治汚 液ヲ淨刷シ閉塞ヲ開達シ 昆設ノ如ク製 通經利尿 又萮 粗如山設 ●雙鸞菊トリカ越斯エキス タラクトハソウ法 花前 ヲルフスウヲルトル 塾

萮ヲ採石臼ニ搗爛シ絞汁ヲ磁鍋ニ入文火ニ煎ヲ取ニ 丸ト為可ニ至ル 主治性熱有發汗峻効又利尿又痛風脚痛傷冷痛拘急不遂梅ノ險症腫痛癒瘍頑等諸藥無驗者 加消石間歇熱頑固粘液多者經血過多 經久帶下 服量有大毒日半半者則發汗 隨症加減為丸用 一氏至十氏漸 ●撒瓦百奴謨サガペヌム秘ニメ如孀淡黄赤色 主治瓦爾扶阿疏護謨華爾固經久肝脾腸間膜壅塞 水腫痲癇 排粘液強壯神經 發汗滑利肺經 子宮衝逆 通經利尿 ●薩爾沙根サルサパリルナ牛尾菜ヲ稱分ス用ヲ而不治者ニ 和土茯苓スミラクスノ類ニテ効較似タリ試効發汗清血ノ良藥也 煎劑トシ 長服ス 梅毒投汞劑不治或誤用之者 山午夢根扑屈楊烏篤薩撒瑞

Kitasato Memorial Medical Library

香蜀羊等ヲ薩爾沙ニ加煎服ス長服ノ發汗排毒ノ聖効有殊ニ速ス

○薩朴排毒飲 汞ヲ皮表ニ尋常梅毒汞劑ヲ治ス兼用ヲ薩撒ニ錢水四十勺慢火煮廿勺ヲ汞用主治梅毒諸症ニ

○趲謨薩朴煎 經久頑固梅ヲ治薩児沙朴爲各二匁沸湯四北二浸ス十二時趲謨四錢薩沙二錢ヲ加煮半ヲ一減用其滓ニ適宜水ヲ加煮テ飲料ト午前煎劑百六錢ヲ實家ハ午後ハ再煎ヲ飲料トス朴劑ヲ絡下劑浴湯等ヲ兼施ス飲食ハ化シ易キ粥類ヲ與温保ノ蒸發ヲ助ク服之發汗シ血ノ毒ヲ排ス服量一ヲ

遷延頑固痛風 中ノ毒ヲ排ス服量一ヲ

●沙別爾ペル 驅蟲油法 角油一匁的列並三匁能合和シ收斂四日列篤児ニテ沙火上ニ蒸餾シ其液四分ノ一ヲ取貯大氣ニ觸レハ黒褐色ニ變ズ氣味トナル

試効諸蟲彙 上ニ蒸餾シ其液四分ノ一ヲ取貯大氣ニ觸レハ黒褐色ニ變ズ氣味トナル

有奇効法 毎朝毎夜八分宛水ニ和用其臭ヲ奪ヒ桂ヲ嚼シム但惡心眩暈ヲ屬也亞的児蘿腦油ノ油質水上ニ浮

●山奈 性油ヲ含蒸餾スレハ迷香ニ似タリ

温煖衝動驅風 發汗健胃ス

香竄 迷香ニ及ハス

温煖衝動驅風發汗健胃ス化シ胃腸ニ屬也亞的児蘿腦油ノ油質水上ニ浮

●山奈 性油ヲ含蒸餾スレハ迷香ニ似タリ

温煖衝動驅風發汗健胃ス

香竄 迷香ニ及ハス

温煖衝動驅風發汗健胃ス

排泄 惡液

冒寒傷冷痛 脚痛

梅毒頑癬皮病頑滯 諸症ニ

●山芳 ダバナ

試効用味微辛帶甘 香

發汗利尿稀釋 發泄ス可功

●午芳排毒 乾蔕ヲ加用ス

○午芳排毒 乾蔕ヲ加用ス

攝シ攣急ヲ弛ム 嬴痩虚損乳汁ニ和用ヲ尤良

吐血勞咳膀胱脱潰 有効

弱ヨリ起痞滯惡心嘔噦心腹痛疝痛下利等ニ有効

服量 牛刀ヨリ一刃

他藥ニ配用ス

有ヲ朴屬土狀ノ如シ水煎多服而不起熱

欬嗽煎ジ蔕ヲ去リ一ヲ舍利一ヲ

煎薬ニ ヲ水一升半ヲ以煮取一升良久ク服ノ良効ヲ奏ス

攝シ攣急ヲ弛ム 嬴痩虚損乳汁ニ和用ヲ尤良

吐血勞咳膀胱脱潰 有効

一良藥也 血液ヲ滋生シ精脱ヲ培補シ酷厲稍涼

●沙列布サレブ バメオモトノ球根ヲ代用

試効滋養緩和ノ 球根也ツ

Kitasato Memorial Medical Library

瘍崩帶下（血液酷厲ヲ脫者ニ有効）○沙列布潤燥飲（勞欲様諸病及赤痢下血下利腹ノ裏面剥脫ノ時ニ有効）沙列二ラ錢ニ罌粟殻利一ラ半大麥煎十二ラ調匀毎一小茶碗宛微温ニ用ス　○沙列布吉利詞麥兒（乳十三ラヲ和シ灌腸ス）○罌粟鎮痛飲（前症痛劇下利不止者ニ及ス）罌粟殻利一ラ半大麥煎十二ラ調匀毎一小茶碗宛微温ニ用ス　○沙列布吉利詞麥兒（乳十三ラヲ和シ灌腸ス）○罌粟鎮痛飲（前症痛劇下利不止者ニ及ス）罌粟殻利一ラ半大麥煎十二ラ調匀毎一小茶碗宛微温ニ用ス

Kitasato Memorial Medical Library

質護謨華爾斯酸性鹽（後食子樣有酸收斂）土鐵粘液精揮ノ油少ヲ含ム（護謨ト華爾斯ヲ首稱ス）或云酸收其本効ヲ妨ルト有除之法幾未ニ（瓦斯三錢ヲ和シ加エ搗磨レ濾過シ放冷シテ貯フ）又幾一（ヌ）ヲ水煎熱スレハ護謨七錢出其津ヲ大酒ニ浸（ス）レハ華爾斯十錢出見津ヲ水煎熱スレハ護謨五錢出ツ）又幾ノ赤幾那有峻功（尋常物効ナシ）與尋常物而痞滯者用黃幾那則無害（苦辛香寛ナレハ也）禁戒腸胃汚滯諸藏壅結內外熾衝（壯實凝體強硬血液稠厚（膠粘運行急疾精力極テ虛脫危篤（收濇攣回足ヲ又）二有害若壯實多血（先刺絡後用）膳液過多ノ人止ムヿ無ノ用ニハ緩和清涼（毒消精民埜列）黑膳液家ハ中（血亞爾斯酒）稀達ノ藥ヲ伍用ス（覆盆舍利娑舍利失格列乙舍利乙緩石長生舍利接骨傑列乙等ノ緩）（青黛消石橙汁醋覇王鹽甘孕攀酒石酒石英榮等清涼解釋品）

混在ノ常ニ（瓦老別里塩孕攀石覇王）神志鬱憂先開達下劑ヲ用（塩又ハ大黃枘那ノ軽劑）ニ護以安（没ヲ加）寒粘液家諸管弛弱者的當スト雖甚粘稠ナル者先温衝開達ノ下劑ヲ與（盧會落葉松茸エブリコ石也葯剌巳律比丸孕攀石）ヲ強壯ニシ（凝體纖維盡弱諸症ニ屬スル）覇王塩瀉利塩等或開達稀釈發汗利水强壯劑ヲ兼用ス（亞爾斯酒）石塩鐵劑昆荅剌海蔥等胃感觸甚ク幾那ヲ用テ下利者温壯收濇鎮痛劑ヲ兼用（桂樅皮玫阿片的里亞加）全治試効收濇衝動諸器血液ヲ稠厚ニシ遏腐シ脫泄ヲ止メ虛ヲ固ス（多血燃實胃腸汚滯者服之則燃熱有レ排泄ヲ妨ル症ニシテ已極虛スル者ハ無効）大効神熱腐熱ノ進メ脉管ヲ牽張ノ血運ヲ（腐性咽喉潰瘍諸脫泄失血腺腫癰瘰）壞疽虛燃衝痙搐感觸過甚症處女病蟲症間歇熱（間日發熱難治三日發熱難治重復熱ハ尤モ難シ）發作有常

Kitasato Memorial Medical Library

朔者等宜用諸症ノ大約也喘急時日ヲ定テ發者間遠ニ幾
神經劑ノ萄利角精琥珀精護謨安沒尼沒藥阿魏等
鎮痙ノ阿片解疑塩ノ覇王塩孕礬石亞爾鮮塩酒石塩
拳ヲ無發作時ニ服シ小兒胸背ニ發泡シ脚湯ス小兒喘急荷六錢幾一錢洋石仔
吉利私多痙攣癇孑宮衝無嬰候慢性等ノ
兒トス體脆弱ヨリ七情擾動シ頭眩痙攣悶心腹痛ヲ發者
顳葉沃剌山那乳香葛私萬馬理角精魏琥鐵等芳香神經
藥ヲ兼幾ノ本劑ヲ資クヘシ腹痛痙ヨリ發者鎮痙藥蛔ノ腹痛
劑鮮亞爾尼ノ類吐劑利尿劑ヲ加用ヘシ
劑鐵劑等ヲ伍用ノ本妨ヲ用多汗尿崩
ノ幾那有害或梅毒ニ因來ル是汗尿排泄ノ細管弛緩
吐後退後脫後ノ者ニハ最有効
ノ血液稀薄ナル故ニ幾那有効或阿
或嚥酸精ヲ加工清涼收斂スヘシ失血痔外傷等多

（家ハ刺絡ノ可治幾有害蛔去失血不止者可服之緑
丸精硫精阿片護謨阿仙石膏麒麟血等ヲ伍用スヘシ
肺癆 纖維ヲ壮ニシ防腐愈創シ排膿ス但甚虚危者無
効此病肉食ヲ禁シ麥蔬乳汁等ヲ與テ血ヲ清涼
ニシ藥効ヲ助ルヲ要トス尿ヨリ泄ルハ良下利漏汗
ハ難治多ク吐膿者咎刺侃篤護謨葵類ヲ兼用ス尿ヨ
リ分利セハ屋施減児蔥蜜民垤利覇塩等ヲ加ヘシ若
肺壅塞シ吐咯ヲ妨者先之ヲ治ノ後可用幾那却有害
勞欬 贏痩弘弱瘵癆隠伏ヨリ發ル症ヨク吐痰シ膿ヲ
交ヘ熱間歇シ脉弱精力脫者ニ的應ス但散劑ハ
却テ熱ヲ增吐痰ヲ妨ク浸煎劑佳
胃弱贏痩 依蘭答幾那ヲ用テ冒感シ
ヲ加用 葵甘護謨等ヲ與肺寧遺精白帶諸脫
吐痰俄ニ止煩者急ヲ治後復可用之
經久贏痩 幾ニ緩和滋養ノ乳汁卵黄蘭答等ヲ加用或
幾有害九水腫衆崩倘傻失血多汗弛弱ニ
多痰内盛ニ因漸贏者先壅痰ヲ除テ用ヘシ
壅塞ニ起ル故ニ
因緩慢姙衝者 サク刺絡ノ宜
後用ユ可
瘡瘍發斑 共ニ虚乏發越シ
腐敗班ヲ發スル者皆的應ス凡膿熟ヲ要ス故幾有効
其軽重ニ隨テ纖攝爾扁答龍腦磄阿片等ヲ加用ヘシ

Kitasato Memorial Medical Library

咽痛　惡性腐性或鵞口瘡ヲ兼者淨掃シ嗽去ヲ的用又緩和鎮痛剤ヲ可兼者有或ハ之ヲ灌腸剤トシ施ス

潰瘍　殘ハ鏤謨華爾斯鐵ヲ舍テ投爾散質タリ故ニ過腐ノ纖維ヲ充張シ善瘢ヲ化醸ス故ニ質ノ瘍ニ有良効多膿侵蝕或腐骨等久服ノ可也右片ヲ加劇症ヲ鎮或綠礬精拳參亞爾尼桂等ノ酸強收濡藥ヲ尤肝膽瘍ニ有効其膿小腸ニ漏リ胃ニ滯リ横膈及ス驗質解凝閉逆ノ蒲テ尤良

腹瘍　橫膈ヲ侵肺ニ連ノ昆設爾ヲ加又清涼下劑ノ幾越斯加的列亞丸ト軽下利尿ヲ兼テ排泄ヲ助或緩ハ之ヲ瀉ス

潰爛痔　劇痛者内服シ又吉利詞トス壞疽　惡肉ヲ剥生ス多ク用ヘシ但先利尿ノ煎ノ約剥已蘇甘設盧會藤等ヲ與或解凝閉連ノ後可用又收濕香窠健胃ノ珊瑚ノ益智良姜橙皮拳參鐵劑等ヲ與或解凝閉連ノ後可用又收濕香窠健胃ノ珊瑚ノ益智良姜橙皮拳參鐵劑等

神經熱處方　寒熱初メハ軽シ似レ尤神思沉重夜快寢ス倦情頭重或頭痛味ヲ失ヒ有嘔吐渴ノ不引飲煩擾憂大息シ不齊思慮錯誤身瞤動舌ヲ

神經熱處方　寒熱初メハ軽シ似レ尤神思沉重夜快寢ス倦情頭重或頭痛味ヲ失ヒ有嘔吐渴ノ不引飲煩擾憂大息シ不齊思慮錯誤身瞤動舌ヲ

出毛振搖或舌縮眼鼻陷削頬小便黯濇ニノ蟲逆剥者濃粘スル者是也而終ニ寂

聾衰極ノ諸竅崩燁シ或腐熱ヲ合併ス

幾散　初吐根十五瓦ヲ與ヒ一回ノ吐ヲ得而盡其者與此方ニ同又收濕香窠健胃ノ珊瑚ノ益智良姜橙皮拳參鐵劑等ヲ與或解凝閉連ノ後可用又收濕香窠健胃ノ珊瑚ノ益智良姜橙皮拳參鐵劑等

幾散　或二三日毎ニ一回ノ吐ヲ與ヒ十八ヶ龍腦四瓦ヲ為散二時毎ニ一劑ヲ與フ

幾那壯　日濾製ス二即ヒ赤蜀酒一盞ニ加與フ日三四次或幾ノ煎湯漫剥ニ龍腦ヲ襲擦擣研和シ加ヲ揮衝防腐ノ劾ヲ

腐敗熱　神熱ニ比レハ劇シ初起戰寒シ或寒シ或後レ屢ヒ冒眼劇痛或目黄嫩腹顏慘帶腫脉小弱不齊精力速ニ臟一身煩疼神思困重筋惕息迫痞悶唱噦臭膿液ヲ

神飲病　稍退テ熱往来シ發汗シ精力衰者幾一ヲ纔ニ為未煉酒十ヲ乃ニ沒ヲ三四

神飲病　稍退テ熱往来シ發汗シ精力衰者幾一ヲ纔ニ為未煉酒十ヲ乃ニ沒ヲ三四

神飲　錢維腹一錢橙皮一錢

盞ニ加與フ日三四次或幾ノ煎湯漫剥ニ龍腦ヲ襲擦擣研和シ加ヲ揮衝防腐ノ劾ヲ

冒眼劇痛或目黄嫩腹顏慘帶腫脉小弱不齊精力速ニ臟一身煩疼神思困重筋惕息迫痞悶唱噦臭膿液ヲ

腐敗熱　神熱ニ比レハ劇シ初起戰寒シ或寒シ或後レ屢ヒ冒眼劇痛或目黄嫩腹顏慘帶腫脉小弱不齊精力速ニ臟一身煩疼神思困重筋惕息迫痞悶唱噦臭膿液ヲ

吐呼亦臭劇者脉大ニ數動シ昇鳴訛語舌胎始ハ白逐ニ焦黒芒刺齒燥ヲ塗カ如且煩渴引飲ノ食ヲ惡尿

Kitasato Memorial Medical Library

赤濁如灰汁無塗臭甚久或血色ヲ帶或發班失血黏衣撲床精氣奔散ノ死ス

水浸劑 ヲ以日常飲料トシ避ベシ ヲ覺者是

○幾那解毒飲 熱腐神熱班熱虛憊險症ニ用テ強壯防腐シ微汗ヲ蒸散ス幾二ヲ橙皮一ヲ半擂爾扁三錢雜腹四ヲ燒酒廿ヲ二浸ノ三四日越栗夫爾必篤里北滴ヲ加ヘ毎二時飲液或葡酒ニ加工用

○膳液熱 初發腹硬胸脇下痞及諸瘴結ニハ幾ニ有害勿用

○幾那消毒飲 膳熱危險數班鉛色帶黑藤花色ノ者ニ有峻功幾

一ヲ赤葡酒水各十ヲ緑橙汁舍清適宜若嫌味者橙汁舍利三ヲノ加一特ニ二七宛毋用○龍腦ハ疫毒腐敗ニ封

○閒歇熱方 幾一ヲ半亞爾尼四有リ

二加

○芙蓉幾那散 幾未二ヲ沸二ヲ利適宜為丸

○阿片三厘 經久瘧ニ最良三四劑ニノ未加容列費幾那各小刀三香散二和シ十六ニ分熱歇時二ヲ當テ毎半時一服ス

○香竄幾那飲 主治神經病幾二二ヲ酒石塩二錢水一適宜加煮テ十四ヲ取黙栗蘿清二ヲ揮香精三錢飄一ヲ半加

○阿片三厘 華無二近ノ但多服ハ幾ノ本効ヲ助ケ閒遠強壯ニ有効但多量ニ可服

○幾越斯法 幾未一北滴十二北煮ノ去ヲ上清ヲ去ヲ上其ヲ下ヲ一夫時分ハ

代用及兼用品ニ類スル所有服量製法如幾珊篤里

○幾那和胸飲 主治勞欠膿脈弱精衰者幾一ヲ沙布一錢或護讀右幾ヲ沸湯ニ浸ノ八時沙列苦護讀ヲ加煎ノ八分ニ去滓白及舍利十二錢ヲ加用ヒ一日ヲ一服トシ日ヲ二ニ分ケ數回煎ニ一ヲヨリ二ヲ乞宛浸ハ二ヲ沸湯冷水ニ加密列ハ間歇症ヲ遏防腐スルノ幾ニ類スル心劑ニ

亦同若明乞喘利ヲ發セハ十爾斯酸性塩鐵ヲ含ノ其幾ニ功亞爾尼ハ幾ノ功ナキ閒歇ニ良也幾ノ本効ヲ助ケ揮發香竄苦味閒遠強壯防腐ノ品白壯没藥橙皮柱桂篤里扁縮主木香珊篤里ノ類

○幾那丁 幾ヲ一劑ヲ

Kitasato Memorial Medical Library

可應○錢那亦鎮痙ノ一藥也或因驚駭而發癇シ延滯歷年為痴者纈ヲ加與ヲ或勞動後漸ニ腹攣痛嘔逆發止癖ト為子宮衝ヲ兼發者益智撒兒末與或舞踏病他ノ的藥ヲ與ヘ略穩ニ至睡中搐掣不休者單用凡不兼他病而瘉搐者少モ無效候者ニ有偉効○附錄撰者云本編中百分ノ一ヲ辨ヘヨ○揮發衝動藥品神熱逐次先此劑ヲ以危劇ヲ救終ニ不可久者初ニ緩性品ヲ與ヘ保強劑ヲ用テ收効スヘシ峻性品ヲ排列スル凡神熱遠志四安質沒酒五亞鉛華六甘消石精七加窓列八薄荷九白芷十水楊梅根十一民垤列利二纈草昆荅三剌荅三亞爾尼加十二菖蒲根十三攝爾痛荅十四阿魏十五葛私篤儻謨十六華尼利リハー十七蒟蒻酒十八忽弗滿鎮痛波十九鹿角精廿琥珀鹽

廿一加耶普的廿二龍腦廿三麝香廿四鹿角鹽廿五阿斤廿六亞的兒廿七亞爾箇兒廿八忽斯忽律斯蒟酒揮衝藥中最勝ノ品ニノ如ニ可代者ナシ時ヨリ病未遠少宛數用ヘシ外用法發泡硬膏冷湯法脚湯清涼氣等有奇効○凡神經感覺太緩鈍十ルトノ二大別ヲ不辨妄ニ投藥則有大害其敏銳症精力ヲ揮發シ血行ヲ增進スル劑稍戟脈ノ緊數呼吸短息シ訥語症ヲ激動ノ脈不堪之而諸症ヲ增ス若誤テ感覺鈍ノ症ノ藥ヲ加ルモ不治ヲ施セハ死ヲ免レス初先最其緩性藥ヲ些量ニ用激動セサルヲ度トシ漸ニ量ヲ增シ精力稍復スルニ隨ヒ差峻性劑ニ移リ酣酌スヘシ其感敏ヲ鎮メ神力ヲ輔竟ニ保強劑ニ堪ルニ至ラムヘシ○揮發醒神飲主治感敏症或感冒始終此一方ユテ治者有纈二錢遠志一錢為末水六勺煮去滓民垤列利四錢安質沒酒六十滴橙皮舍利ヲ以煮去滓民垤列利四錢安質沒酒六十滴橙皮舍利ヲ加和シ每一時二匙宛用服之惡症漸減脈稍常一勺ヲ加和シ每一時二匙宛用服之惡症漸減脈稍常調ニ向ヒ漏汗失血便夫禁等歇神經ノ感激精神ノ錯

Kitasato Memorial Medical Library

誤漸鎮スルハ乃適應也爾後保強劑
堪ルニ隨ヒ漸次ニ之ヲ劑中ニ加フ
其緩鈍症
虚憊ノ感觸太
鈍遲力沈衰顏萎悴神懞昧時々昏憒黙々情眠不省人
事呢喃鄭聲或如視鬼狀脈細弱慓悍飲液ヲ與テ脈無
變動者最峻性ノ揮衝劑ヲ與且同性藥ト雖時々其劑
ヲ更換シ藥氣ヲ新ニシ且隨宜藥量ヲ增ス可シ否レ
ハ慣テ不得効也若脈症漸善徵ニ向ハ藥量ヲ减シ徐
々緩性劑ニ移リテ全治ニ至可シ揮衝劑中尤峻ナル
方ヲ左ニ擧テ準
則トス宜酙酌
○揮發囲生飲
主治感動遲鈍者殘一
攝爾扁四錢亞爾尼
服三錢各為末蔔萄酒二丈ニ溶化シ龍腦一刄忽弗滿鎮
液サヲ加研和シ麝一刄阿片液卄滴ヲ加和シ毎一時
若半時一小茶碗ヲ與エ尚ヲ峻効ヲ要セハ
每服幾丁一錢或亞的兒六十滴ヨリ八十滴加
外用方
揮衝
劑ヲ蒸湢芭布貼膏擦藥灌腸皆一部分ニ施ス法也夫
胃ハ神經多ヲ以テ藥氣ヲ感受スル力多ク速ニ之ヲ
百體ニ分達ス然ル神經諸病ハ或ハ一部分ノ羅斃或
麻痺有故胃ノ神經痺スレハ藥力ヲ普達セス如斯ハ
逸ニ代テ方ヲ他部ニ可施大抵胃ニ次テ神經多
循行シ胃藥ヲ感受スルハ腸ノ下部也故ニ灌腸ヲ最
良トス危劇ノ症必此法ヲ內藥ニ兼施スベシ一ニハ
內藥力ヲ輔助シ一ニハ胃感甚ク内藥ニ不堪者ニ有

効但藥力緩者宜シ峻藥ハ腸ヲ刺戟ノ藥氣長ク持
留ス○灌汁一次四弓ヨリ六弓ヲ為度大抵毎二時
施ル一次之ヲ粘膠ニシ持留セシメ緩和
スルヲ要シ或ハ鎮痙藥ヲ加ヘ藥品ハ大抵如左
○灌腸藥
品纈草亞爾尼白芷各二錢不過幾那三四錢芸香薄荷加密列
各錢許白芥子同上蔔萄酒一二七龍麝各不過四ヲ可為粘膠藥品亞
麻子蔡根卵黃鰾膠沙列布其感觸敏鋭ヲ鎮定スルノ腸
攣急ヲ緩メ
藥ヲ持留ス
品菲沃斯越幾二ヲヨリ四ヲ番木鼈越幾斯同上含電
阿液内ヲヨリ六ヲ
○蒸湢洗湢法
以之内服ノ揮
衝藥力ヲ助ク
方
白芥煎二
蔔酒龍腦
ヲ和或羌丁幾サヲ加布片
ニ薔シ褰々支節ニ貼被ス
又
加密列荷菖莉芥ヲ蔔酒
ニ加煮褰全腹ヲ薰湯ス
又
腹諸器胃最感動甚ク不堪内者或小兒ニ施ア
皮膜ヲ芽陽シ蒸氣ヲ宣發ス蔔酒石鹸ニ物水溶レ
芳香草類ヲ浸シ溫メ
適宜ノ部分ヲ洗滌ス
又
皮膚ノ攣縮ヲ弛メ衰精ヲ挽
四ス蔔酒鹸ニ燒酒少或龍少
ヲ加溫湯ニ溶シ暑
全身支節ヲ洗滌ス
○芥子泥芫菁膏精力ヲ挑發起揚

ン各部ノ痛痺ヲ消ス（脚蹠股間胃部脊等ノ知覺鋭敏ニシテ屢泡セシメス除去スルヲ度ト六七日ニ更貼ノ有大効）○病室ハ日々掃除メ乾燥ニシテ蒸氣ヲ去清爽氣ヲ迎引ス可○保固強壯藥品（埋衝劇ハ藥氣ヲ血神經ヲ揮活スルヿ能ハス只其機力ヲ增盈スル耳保強劇ハ全身ノ纖維ヲ活補スル故ニ服後精力速ニ散セス又諸器ノ機力知覺ヲ順調スレ氏初ヨリ用之レハ有害ナリ）幾那七葉樹皮水楊皮蓁皮樹皮萄私加栗刺安傑斯黙刺水楊梅根芸香撒爾非亞蘇格爾需謨苦味健質弛那枯失亞珊篤里亞爾鮮睡菜格綸僕没藥（收斂品諸腐敗腐敗ヲ遏止）參鐵劑寒涼氣○先刺衝劑ヲ與精力ヲ揮活シ危劇ヲ救テ後之ヲ用テ保固滋長せシム可然氏初發但虛衰

而感動不敏又甚鈍ナラサルハ初ヨリ可用ヨリ日之（感敏症初則急激ノ其症轉感也又鈍症ニ用レハ纖維能ク其機力ヲ收斂スル者ハ此劑可用者ハ葡萄酒鎮痛液能腦ヲ攝爾扁燒酒等或幾ノ如ク其劑ヲ精列波用ヘシ或幾亞爾尼幾ノ如ク其劑ヲ精列波用ヘシ）需謨等ノ保固揮發画動藥ヲ用テ保固滋長ス（保強劇ハ固質ヲ含ムヿ多ク煎剤ハ冷浸ニ用ルヿ多シ冷浸ハ精微揮發氣ヲ含ムヿ多シ）感敏症ニ保固劇藥ヲ用テ保固滋長ス（保強劇ハ固質ヲ含ムヿ多ク煎剤ハ冷浸ニ用ルヿ多シ）

感敏症ニ用レハ纖維能ク其機力ヲ收斂スルヿ能ハス又諸器ノ機力知覺ヲ順調スレ氏初ヨリ用之レハ有害ナリ）

緩シ血波敗腐溶崩者精明鬱幾那阿仙薬胃腸有汚滞者不可用之宜除之先神熱兼傷冷毒者應不的脳熇肺熇（用之有害）神熱初發稍有娠候呼吸不利者幾那有喜九諸病幾ヲ服ス呼吸也幾ヲ與テ總身發汗者良非不利舌燥其キハ有害ノ兆也渇少ク或無渇モ幾ノ症也九神熱幾那有効症ハ葡萄酒ハ反之ノ其壯元幾那飲未一ヲ纔四錢

Kitasato Memorial Medical Library

右沸湯十瓦ニ浸去渣一
毎一時半ニ乙宛服ス

○幾那鎮痙丸 幼同上幾赤一瓦
庁一瓦橙皮舎利適宜研合三
四次用 健質越斯四錢阿
ニ瓦ヲ一
丸トシ桂末衣十五瓦宛日

○壮肺幾那飲劇 蚊
吐痰多ヲ治幾ま蘭苔各一瓦
ニ煮ヲ八分時去滓毎一時
半碗宛用

○幾那橙黄膏 虚
便秘ヲ治幾未一瓦大黄一錢
舎利三瓦煉和毎一時一茶
匙ヲ生嬴瘦萎黄黏液留飲胃腸虚弱諸症
一ヲ化未熟悪液ヲ生嬴瘦萎黄黏液留飲胃腸虚弱諸症
ニ難ヲ水一乙ニ和シ用ヒ日三次胃弛疲風氣痞満
及漏汗症ハ緑礬精少ヲ加フ幾橙皮一瓦
二ヲ揭翼扁三錢ト酸液ヲ與シ麻倨ハ
失或剥篤亞斯ヲ加フ幾橙皮一瓦
焼酎五瓦ヲ硝曇ニ内固封
浸ヲ六日去滓テ貯フ

○食料消化力有者ハ滋養物肉羹汁ヲ葡酒加與漸復スルニ隨テ厚味ヲ與フ可シ若胃虚シ或有汚物ニ強テ與レハ悪液ヲ生シ刺戟ノ熱及虚ヲ増ス能消化ス蔬等化シ易キ者ヲ可與
苦カラサルヲ辨知スヘシ

○舌苔有効胃腸汚物ノ排制鎮定スルノ的候也
苦ク鳥黒苔ヲ生ス幾ノ可與盧憊腐敗者ハ要敬ス
神経失常ヲ抑制鎮定スルノ的候也
誤下之則必死ス

○鎮痙劑
其原ヲ除ニ非ス但直ニ其
其薬性ニ各自ノ効力有

○刺戟鎮痙藥 一ハ動脈ヲ熱ヲ起ス
是ヲ熱性鎮痙藥ト云一ハ神経ヲ刺衝
スレハ熱ヲ誘起セスメ泰勢ヲ進メ其血運ヲ進
劾ス是ヲ清涼鎮痙藥ト云

熱鎮痙藥纈草龍膽琥珀鹽
鹿角精屬之者多

清涼鎮痙藥蓬蘩塩亞鉛花吐藥 一種ノ麻痺カヲ以神覚ヲ鈍ク
サルヲ度トス

催睡鎮痙藥 吐根尤佳服量吐セ
其質含ム華爾斯ヲ以テ動脈ヲ刺戟シ熱ヲ誘ヒ血運ヲ多劾ス
意識感動ヲ減ス

進運藥
阿片ノ如キ神熱ニ多劾ス語ル
進ム其ハ衝血運ヲ進メ熱ヲ起ス
痙藥ト云一ハ神経ヲ刺衝

遏運鎮痙藥 唯麻痺毒アリ熱ヲ誘發セス血運ヲ進シメ鎮痙スル者 菲沃斯失亞
容失鳩荅番木鼈越斯曼陀羅越斯○鎮痙劑用法 第一 痙
搐疼痛譫語 凡神經過剌ノ運動ヲ靜息ス ニ用 第二 精力ヲ挑撥メ調保
スルガ爲ニス 第三 感動銳敏ノ者之ヲ不鎮靜則逾罷弊
ノ不能分利毒故ニ鎮痙緩弛シ精力ヲ護ノ 皮膚尿道ノ 攣縮
ヲ寬メ分排ノ順機ヲ與フ 第四 凡藥劑鎮痙ヲ加用則病
勢不激而能堪其劑 假合ハ斂症ニ保强劑ヲ可處者最緩性劑ト雖尼大ニ斂メ不堪者ア
リ是ニ鎮痙藥ヲ加用スレハ不激即斂ニ總 阿片莨菪私多僂菲阿斯木鼈越斯ヲ加ル如シ
●膠泥メシ一法 陶土極末十戈密陀僧末極二戈氷下斗血ヲ拂退トシ牛毛ヲ雜ヘ鳥羽ヲ以
遍塗リ乾カシ又塗リ數回 拇指經ノ厚サニ至リ風乾ス 一陶列篤兒多ヲ武火ニ上
セ蒸餾スルニ以是周塗ス可 破裂セス溶解セス 又生石灰卯白先蒸餾器ノ

罅隙ニ白ヲ塗リ灰ヲ掺カケ布ヲ貼シ又灰ヲ掺カケ獻固メ又白ヲ塗ル乾ケハ甚堅固ナリ又生石灰ニ海
塩六分一ヲ加ヘ半時許研磨シ卵白水各半ノ液ヲ加ヘ為泥用ユ是能酸性蒸氣ヲ鑽透セサラシム
●揮發香竄精法 新鮮橙皮白ヲ去一戔半桂肉豆蔻丁香各二錢硇一戔剝篤亞斷ニ戔燒酒
二斤合和浴光弗一封浸スル丨二日蒸餾ノ精十四戔ヲ取 主治揮衝活潑シ腦神ノ
衰弱及壅塞ヲ健解シ感覺ヲ敏ニシ粘凝 血液 ヲ釋シ失
氣 眩昏 瘫精神虛乏痿滯等ヲ治 又發汗ノ峻動有リ 血行怠慢痘及
傷冷毒ノ内攻ニ有効 雞腹丁一錢ヨリ三錢人參幾ヲ加服量煎及適宜飲液ニ加
●菫菜 スミレ 舎利別 セ一ロ一プンヒオ一レメ 法 菫菜花蕊ヲ去八戔沸湯廿戔糖三
廿戔ニ固封シ慢火上ニ浸ヿ三時絞濾シ糖ヲ和シ再濾シ煮テ製ス 主治緩和滋潤清涼
鎮痙シ粘痰ヲ稀豁シ肺ヲ寬解シ 欬嗽 初生兒ノ胎屎ヲ
下 微利ノ有功 鵞口瘡ヲ 蓬砂ヲ加有良功

Kitasato Memorial Medical Library

● 蚯蚓油（オレウムリユムリコリユム）法　蚯蚓洗淨シ乾燥シ細末トシ一日絞テ油ヲ貯ヘ外敷ノ有良効

● 牛膽（オツセガル）　性甚人膽ニ近シ緑色膠粘臭氣アリ味甚苦　生鮮ノ物腐敗シ易シ磁鍋ニ煮テ水氣ヲ蒸散シ大氣ニ觸レハ漸ク氣ヲ引テ腐敗ス　病牛膽　良味不佳有毒　真牛膽　近江彦根ノ者良四季共ニ粘潤甘味ヲ帶ヒ品缺レハ甘琥珀ト呼フ熊膽ヲ偏平シ造者也　試効　性石鹸樣　亂透刺戟衝動シ苦味強ク解凝淨刷且鎮痙ス　諸酸物酸性鹽　水等　金屬鹽　綠礬皓礬升汞等　鹽酸加爾基重土及單寧植物ノ收斂者等ヲ含ム波ヲ加用レハ膽ノ稟性崩壞メ幼力ヲ脫ス　不可不知　胃虛　粘液過多酸液風氣肝脾及門脈瘀腹大便閉等ヲ治

壅塞　黃疸依剌昆諸蟲症腸膜腺閉塞小兒腹腹四支羸瘦腹諸器病等　殊肝壅ヲ疏解シ膽液ノ虛乏ヲ補資シ酸液ヲ消シ飲食ヲ醸化シ意外ニ殺蟲ス

○牛膽鹼黃丸　主治諸藏壅塞ノ便閉シ殊ニ肝壅黃疸粘液留飲有ル者　膽鹼各四錢大黃一錢右研末シ二服ス

○牛膽魏委黃丸　各等分ヲ二服ス　一丸ヲ朝夕ト丸主治酸液刺戟胃痙心腹痛ヲ發シ心胸苦悶心下刺痛痞氣衝逆呑酸便秘或酸汁ヲ吐ミ頑固諸藥効無者

○牛膽驅蟲丸　膽二錢葛剌巳一錢右三味ヲ細末トシ五丸完用ル丁日ニ一丸ト次但病ノ輕重ニ隨テ增減ス小兒ハ二味等分ヲ一丸ヨリ八丸迄用ユ此方能蟲ヲ驅泄シ且胃藥ヲ加テ瀉下ヲ緩クシ用ユ吉利斯爹兒ハ半錢許ヲ其萠生ヲ制止スル小兒ハ舍別ニテ送下ス　服量生膽ハ一日一錢ヨリ四錢迄　香竄驅水或蒴酒ニ加服ス乾膽ハ九トシ或他藥ニ加ヘ日ニ一二錢用ユ

○牛膽驅膏　小兒瀉下藥有害蟲症ニ適應ス　蓖麻子牛膽石腦油各三匁家猪脂一匁炸シ盡ク膽ヲ加手ヲ休メ炸シテ是ヲ腹部ニ擦スル藥液ニ加用ス

Kitasato Memorial Medical Library

膽一味水溶シ齊部ニ塗レハ能利便殺蟲ス腺腫瘰外角膜斑點密ニ和ス耳鳴乳汁ヲ研和シ綿絮ニ蘸ン耳孔ニ揷ス○鱧魚鱔鯉等之膽亦有牛膽之効

●魚膠一名魚鰾又鰾膠ヒ法大魚ノ鰾ウキブクロヲ洗淨シ半乾シ卷纏重棄メ圓條トシ乾貯フ用ヒ以テ製ス透亮白色乾固無臭味淡沸湯及ヒ燒酒ニ溶化スル物上品也徽黃白色尋常品○獸膠潔白透亮者効魚膠ノ破碎ヲ銲テ固著シ能水ニ堪ユ常用魚膠ハ黑濁汚臭不堪用漢渡黃明膠上品ハ浄白ノ鹿角屑ヲ清甃ノ磁鍋ニ入レ水適宜ヲ加エ煮テ軟化スルヲ候ヒ濾去渣清液ヲ文火ニ煮熬シ粘稠膠ノ如クシ故冷凝固シ貯ヘ試効滋養潤補熱病類胃腸ノ形トシ陰虛過感飲食藥劑ニ堪ヘス或嘔吐下利腹痛ヲ兼或諸脫血過多ニテ虛脫スル症沙糖拘櫞汁ヲ加ヘ美味トス鹿角煎ホ同効○鹿角膠試効ホ同効

●魚膠試効ホ同効

○各ニ匁ヲ水三式煮減二式トシ砂一匁半ヲ攪和ス茲養シ血液ノ虧ヲ補ヒ攣急ヲ弛メ酷厲ヲ包攝シ枯燥ヲ潤シ痛ヲ和シ稀涼酷厲ヨリ發スル勞效羸瘦病諸管弛虛ノ發スル諸分利脫泄過多ノ症ニ用ユ伹シ腐敗ニ噴ク症ニハ適應セス效嗽胸痛吐血咯血淋疾尿澁刺痛下利兼痛咽口胃管裏面剝脫潰爛ヲ愈ス愈瘡ノ一良藥也酸液厲液ヨリ發スル胃腸痛ヲ治ス嬉者ハ桂水等ヲ加用○鰾亞蝮蛇水ニ溶シ或ハ水ニ溶シ沸湯或ハ酸液胃ヲ刺戟ノ嘔吐休ザル症ニ有殊効炳石三錢飲酒水六ヲ魚膠粉末ニ溶ス者ニヲ亞的兒比五滴右

綢和毎半時ニ嚥器ヲ○制酸膠麥飲（兼テ夢洩病ヲ治ス）
振湯ニ一貼宛服ス
乃魚膠炒ニ乃柱舎利一乃
石末四錢阿片液七滴
右銅勻ニ半時若クハ一時毎ニ一ツヽ服ス
○開敷熱以魚膠代氣那其法
上好魚膠十錢水二乃ヲ加ヒ文火ニ溶ノ糊ノ如クニ
分末筆ヲ適宜ニ加甘草ノ四分時前一服發作後十二
分ト為シ發作ノ時ニ一服用此劑閙敷熱ノミナラス
動物膠皆効アリ然ト雖モ魚膠ノミ特ニ非ス患者ノ
是氣那効アルニ非ス患者失血脫泄或貧家外用魚膠
衣食匱之饑寒ニ在テ可滋養者ノ有効
○直腸潰瘍
魚膠炒二乃沒藥沖一錢蒸餾水六乃ヲ吉利詞參一乃
ヲ密ニ加ヒ危篤時ニ一乃半ヲ吉利詞參兒トス
○燥敲湯火傷等
膏ト和シ塗ス
皮膚損傷衄脫枯
○吉納護謨
一種樹脂質難溶華爾斯也亞弗利加產ハ小塊硬脆黯赤色ニシテ微赤曛ヲ有響收濇ノ有佳味無香氣亞米里加產ハ大塊黯赤色ニシテ破碎ノ有光澤磨ノ易碎初酸ヲ帶次ニ甚苦

敗瘡ノ終ニ甘シ而及水ニ溶シ味收濇赤色ト成試効性收濇緩久下利虛脫失血崩漏或淋嫩痛等治後膿液不止者白帶等ヲ治ス服
固下利毎朝吐根末二氏ニ砂糖ヲ和シ毎夜阿片一粒ヲ用テ治シ或胃腸鬱滯候有者ハ以吐下劑之
量未十氏ヨリ半錢或二三錢ハ一錢ヨリ二錢ノ經久頑
加ヘ散トシ或丸トス丁氏宛明礬ト砂糖ヲ和シ毎夜阿片一粒ヲ用テ治シ或胃腸鬱滯候有者ハ以吐下劑之
○收斂鎮痛斂
浄劑ニ次ニ大黄ニ阿片ヲ加ヒ數日ヲ與フ可
○收斂散
劑ニ次ニ大黄ニ阿片ヲ加ヒ數日ヲ與フ可
氏ヲ為散六服二分チ毎一時半一服宛
○吉納
主治向上吉納四氏明礬半乃研末為一
服毎一時半一服宛用
外用水ニ溶シ剝比亞護謨ヲ加ヒ數日ヲ與フ可
創傷ノ失血ヲ止
○葵
葉花共ニ藥用トス根ヲ用フ
故不贅ノ斥尤モ
○性効與遏爾託同
○金花草ギユルデンルーデ試効
和秋ノキリン草用ス
温暖開達微收濇

Kitasato Memorial Medical Library

愈創ス（内外創傷斷腐止血吐血下血赤利ヲ治）利尿（承閉腎膀胱結血ヲ碎解ス肝脾壅塞ヲ疏解ス或散水煎泡劑服ス）

● 金錢花（ゴウドブルーム）試効ヲ用輕ク發汗利尿シ冒寒萬病ニ有大効（或種種惡險重ノ疥癬ヲ治者）○ 榆皮排毒煎（試効可ナリ）

液ヲ驅蒸シ欬嗽頭痛傷冷毒痛ヲ解散ス（風疹瘙痒赤疹ヲ排泄シ疲毒惡風ヲ驅散ス水煎泡劑トス）喘急（乾花一錢糖攸腫胆以ヲ洗フ）

● 榆皮（オルムボーム）春月採細枝去外粗皮裏皮ヲ用ユ甚タ細軟梢枝ハ効ナシ試効收濇ノ愈創蒸汗ノ良藥也疥癬乾癬甚不經久者其他皮膚病ニ有大効（或種種惡險重ノ疥癬者）○ 榆皮排毒煎（試効可ナリ）

榆ハ乎水四升竹煮減半去滓朝夕八乎宛數月連服ス但慢火ニテ久ク煮ヨ勿レ粘調ヘ過服ス○列乙孫云乾癬頑癬禿瘡惡瘡屬頭瘡臉瘡經久頑固皮病對症劑無驗終ニ此ヲ試用得驗者甚多但シ單ニ時々緩下劑ヲ兼ヌレハ必有効也

● 迷迭香精（ローズマリー）光黙栗薩末沃剌ノゲーヌ（迷迭香ノ代用ス）江戸ニテ迷迭香油ヲ吹劑ノ那ヌ（迷迭香草皆代用スベシ）法蘭西ニテ迷迭香油ヲ燒酒ニ溶シ法蘭西ニテ迷迭香精ヲ取ル（迷迭香ハ法蘭西ニ生ズル花穂ノ藥ニシテ揮發油ヲ含ム腦髓神經ヲ強壯ニス動悸（傷冷ニ有）虛冷粘液痛風痛（乾薑ノ粘液ヲ散ス）昏睡（頭痛）痙攣（手足ノ痙攣ヲ治ス）氣鬱（一錢迄飲服ス）鼻塞聲啞（外用ス）齒痛（諸藥ヲ兼ヌ）○ 迷迭香油（オレ）

● 黙衆薩（ベイヨンコロイト）効如迷迭香撒爾非亞（性主治葉性温竄揮ノ鹽ヲ含ム腦髓神經ヲ壯ニス入癇容睡痱（病敗黒膽液閉塞ス）

透如龍腦（性似加耶普的外用腹部攣急疝痛齒痛或瘧或痔）

者胃弱風痞疝痛（泡劑或浸藥酒ニ有効）○ 黙衆薩水法（拙水）主

為泡劑用心動悸孕宮病（經閉或帶下）痔血産後惡露難除者乳汁乏

Kitasato Memorial Medical Library

治精神ヲ欣慰シ鬱憂利水通經驅風○黙衆薩精ニ燒酒浸シ蒸シ去治同上而峻一ニ九ヲ餾ス

● 咳逆メヂー法 白蜜一匙ヲ水氣ヲ煮飛シ三回ニ分服ス

三日餘乃出為滋養飲料或ハ肉湯ヲ其佳香ヲ賞ス

● 綿馬 碎補猿ノ腎ヲ各十二匁藤黄五匁接骨傑列ハ一錢ヲ服一時ヲ經テ無吐下者ハ一錢四リ○蘇衆小兒ハ一錢ヲ與ス

● 明礬 亞斯ニテ成者ハ冷水ニ溶シ濾シ去リ明礬ヲ加ヘ煎テ冷シ服ス

● 砂糖漬也 龍人參ハ一錢ヲ與ス

● 哮逆メヂー法 白蜜一匙ヲ水氣ヲ煮飛シ三回ニ分服ス

● 綿馬 碎補猿ノ腎ヲ各十二匁藤黄五匁接骨傑列ハ一錢ヲ服一時ヲ經テ無吐下者ハ一錢四リ○蘇衆小兒ハ一錢ヲ與ス

● 明礬 亞斯ニテ成者ハ冷水ニ溶シ濾シ去リ明礬ヲ加ヘ煎テ冷シ服ス

● 砂糖漬也 龍人參ハ一錢ヲ與ス

市濃シ桶ニ内シ被市ヲ防塵シ燒磚ヲ熱ニ究醸スルヿ四十日餘其泡醸セサルニ至ラ封ノ穴ヲ塞ヒ置キ泡醸三日又泡沫ヲ去リ又拘攣ニ三箇ノ黄皮ヲ刮リ片ヲ加ヘ桶ニ密貯レ用フ

去加工煮テ泡沫ヲ去リ又泡醸三日又泡沫ヲ濾去リ桶ニ密貯レ用フ

● 綿馬 碎補猿ノ腎ヲ各十二匁藤黄五匁接骨傑列ハ一錢ヲ服一時ヲ經テ無吐下者左ノ下劑ヲ與ス

● 明礬 亞斯ニテ成者ハ冷水ニ溶シ濾シ去リ明礬ヲ加ヘ煎テ冷シ服ス

● 砂糖漬也 龍人參ハ一錢ヲ與ス

● 咳逆メヂー法 白蜜一匙ヲ水氣ヲ煮飛シ三回ニ分服ス

● 綿馬 碎補猿ノ腎ヲ各十二匁藤黄五匁接骨傑列ハ一錢ヲ服一時ヲ經テ無吐下者左ノ下劑ヲ與ス

● 明礬 亞斯ニテ成者ハ冷水ニ溶シ濾シ去リ明礬ヲ加ヘ煎テ冷シ服ス

● 砂糖漬也 龍人參ハ一錢ヲ與ス

○ 蘇衆 小兒ハ一錢ヨリ

○ 蘇衆 小兒ハ一錢ヨリ

○ 芙蓉糖礬丸 主治諸失血痛眩ヲ治甚タ收斂シ稍刺戟シ水液脱泄諸失血ヲ制ス 嘔吐血血

○ 芙蓉糖礬丸 主治諸失血痛眩ヲ治甚タ收斂シ稍刺戟シ水液脱泄諸失血ヲ制ス 嘔吐血血

崩漏剌痘ハ每二時半錢ヲ大麥煎ニテ送下ス漸次用多服スレハ有害

崩漏剌痘ハ每二時半錢ヲ大麥煎ニテ送下ス漸次用多服スレハ有害

○ 斂

○ 斂

刃ヨリ一錢適宜ノ飲液ヲ以服ス

刃ヨリ一錢適宜ノ飲液ヲ以服ス

Kitasato Memorial Medical Library

糖各二錢為丸如五分一時服ス但隨症增減ス
半ニ一服ス
朝空心ニ用下血モ同シ○
用明丸而便秘者時々兼下剤ノ頑固遺精梅ノ粘液淋
浴冷水而服之　承諸具衰性淋尿失禁白帶對症藥ニ加服　腐熱腐瘡
內服之
ノ遺承舍利別加用腸衰弱ノ疝痛下利腸粘液及滑利單味或加
阿片
二有効外用亦收斂清涼强防腐沸湯六了二洋シ放
片
交者良ス多○清眼膏卵白一攀適宜研和柿膏ト一時布
令シ點ス
ノ増嗷ス數換貼スレハ膜絡ヲ收斂ノ淚ヲ他部ニ驅
許ニノ泥去一特ヲ經テ又貼スル久貼スレハ淚鬱住
散ス故刺絡疲泡ス眼膜障翳星斑研和點ス○攀糖粒顆
角法等ヲ兼施ス
料明丸糖卵白薔薇水研和煮爲混温ニ乘メ拇指大錠多
トシ乾固ス面ノ小脆赤疹汗疹汚斑ヲ消シ燃眼
淚ヲ治脫肝子宮下墜ニ良　金創出血　腫膝水棉樣腺腫腋臭皆効
枯攀ゲブラレンドリュイム水氣ヲ脫シ輕虛ト為者收斂愈而侵蝕ス主治

同上

●蜜メルヌ精製ニ　水ヲ加エ卵白ヲ拌一分ノ一ニ煮浮ヲ抄去鷄卵ヲ殺ス
浮ヲ度トシ毛篩ニ濾故冷ヲ
トシ二箇月ヲ經レハ結ヲ
結ヲ疏解ス粘液肺ノ攣急ヲ弛メ尿ヲ滑ニシ利尿ニ
久病血液枯涸勞瘵初起
老人虛冷飲液ニ和シ用利害糖ニ有瘍腫比レハ疏釋ノ効多シ故肺
胸病ヲ治潤燥生液又有レバ也拔爾撒謨情不的當胃弱不消化者
多用則有害又少用多外用灌腸者不腸劑ト腸絞痛ヲ消シ
膀胱ノ効有小參ヲ加為泥蒸混燥屎ノ潤ス外塗ノ軟化淨
剥ノ効多シ硬堅ヲ軟ケ釀膿ヲ助ク
家多眼則有害
業ニ取者色　生治拔爾撒謨樣也外敷ノ堅硬ヲ軟ケ解凝緩和急迫釀
飲液ニ用利害糖ニ比レハ疏釋ノ効多シ故肺
有瘍腫比レハ疏釋ノ効多シ故肺
膿シ消散瘍又乳頭腫モ有効ニ白品ハ清涼効多ク黃品
ハ軟化効多シ內服○玆蠣昆設爾弗黃蠣四錢甘扁桃
○蠣せラスワス蜜脾ノ取者白色陳
新ヨリ
無漏

Kitasato Memorial Medical Library

油一匁牛先蠟油ヲ文火ニ煉シ秋堀見設黄蠟方
ヲ合和ス赤痢ニ用テ能ク緩和シ防腐ス○薫
レニ乳香没藥等分ヲ加小鍋ニ内文火ヲ以漸煉解主治
ハ佳香ヲ生ス其蒸氣ヲ口ニ受ケ吸入ス
瘵疾稟弱怖勞欬喘血痰聲嗄或傷冷痰欬甚者
○酒石タルタリユスヌウム主治性酸涼解熱両便ヲ利
エインスティインン又ウ
シ粘液ヲ釋ス然ル氣ヲ為藥用諸種ノ
スティンキリ法酒石ヲ加文火ニ投陶土サヤ
タルレンン煮溶シ濾ノ清液ヲ放冷スレハ白粒
ヲ結又磁罐ニ内沸湯ニ容シ濾テ文火煮上面膜ヲ
生ニ至リ掬ニ移テ放冷ス主治
酸爽涼滋潤生津止渇解熱
血液沸騰ス二便ヲ快利シ釋
粘防腐ス壮熱煩躁過多可清涼瀉下者羅斯産後發熱惡露壅滞肝
脾腸胃膜壅硬蒌黄依昆剌昆
喘急間歇熱失苟兒疾粘液症ニ有効
水腫腹水四錢ヨリ一ヲ逸水一升ニ溶シ毎朝空心數服則速ニ脉管壅塞ヲ疏解メ治ス清涼

解熱ニ瀉下ニハ四錢ヨリ一錢ヲ散ス一ヲ消化シ易ク疼滿止シ
メサル○蓬砂四分一ヲ加文火ニ煉シ○純精酒石クレタルモ
ム○純精酒石クレタル法粗末ト為水ニ投シ文火ニ煉シ浮汚物ヲ抄去シ上面ノ膜ヲ抄取如之
ス則液粘調ニ至レハ不生ニ膜ヲ生ス數回膜ヲ不生ニ至レハ磁鍋ニ入沸湯ニ容シ濾テ乾固ス
ル不生膜其膜ヲ紙上ニ展シ毛筯ニ内レテ乾亞爾加利ノ塩ヲ取
主治如酒石英○純精酒石英附孕婦酸酒石法
純酸ト為英未三兀雨水十兀ヲ以テ煮洋シ結麗土末サ加レ十五兀磁罐ニ内レ文火ヲ以テ
陶水ト合濾ノ文火ニ煮上面膜ヲ生ス片放冷結其白ニ綠磐油一兀雨水ヲ加ヘ以木棍攪静定十八時
ス其上清液ヲ取ル白末少底ニ沉ニ至徐々上清液ヲ去ル又清液ヲ加ヘ以木棍攪静定十八時
末ヲ加ヘ以木棍攪静定十八時ス其上清液ヲ取ル又清液ヲ加ヘ以木棍攪静定十八時
ス其上清液ヲ取ル又清液ヲ加ヘ以木棍攪静定十八時

散シ結苞ニ至ル火ヲ下ス濾ノ上底塗ヲ除キ液ヲ丈ニ煮テ浮膜生ス
舍利ノ桐トシ放冷シ遂ニ蒸餾水ヲ以テ外面涂汚ノ故ニ之ヲ結苞セシム剝ス又宜斯適
綠油ヲ洗去リ紙上ニ展ノ乾固貯十倍ノ水ニ溶シ綠礬精ヲ滴加シ沸騰セサルニ至ル
瀉ヲ鎮メ諸筋ノ精力ヲ生シ
痛風結石尋常ノ水腫腹水
友レ酷厲亞爾加利鹽ト為刺衝鑽蝕ノ粘液ヲ利水ス加下劑則
主治牡蠣
滴十ヨリ滴ヲ漸次ニ増ス
孕婦酒石トタルタリスヒツ法
一滴宛加ヘ纔ニ液ス
酸性ニモ非ルヲ和性塩ト為シ
主治粘液ヲ釋シ両便ヲ利酸液ヲ除ク
下痛風結石尋常ノ水腫腹水
八驅風苦味健胃劑ヲ加
酒石液一ウエンス
貯ス
酒石鹽
粘質兼弱者尤有制酸効
心腹痛
酒石鹽水等分
ホイクンストテ法
溶解濾過シ劑
疼癪頭瘡惡瘡二共ニ
主治性酒石ト相

二濾レ沙火ニ上煮テ浮膜生スルニ至ル又剝ス亞斯適
故ニ結苞セシム剝液モ亦如之製ス宜十倍ノ水
ニ溶シ綠礬精ヲ滴加シ沸騰セサルニ至ル
又ニ溶シ其液ヲ濾シ紙ニ展ノ乾固貯
丈ニ煮テ浮膜生ス故ニ結苞セシム
火ニ至ル
治性涼味微苦瀉下多服解凝驅熱
熱産後乳熱蓼黄黄疸肝胖腸間膜壅硬
斯大黄等分ヲ和ヘ加テ良
水腫咖等分ヲ和ヘ摘ニ點服ノ能消水ス解凝利水ニリー
為一服ス用
瀉下ニリ四錢ヨリ六錢
性効如覇王鹽孕鹼酒石◯孕鹼
酒石タルタリスタルリサチユスタ法
スレハ赭色粘稠ノ驗質液トナル成又文火ニ
煮浮膜ヲ生セシメ冷處ニ結苞セシム
主治近于孕
蓼酒石功殊効ノ解凝藥也
十瓦ヨリ半錢ヲ用テ諸壅ノ粘液ヲ溶散ス腳病鬱
憂等ハ蒲公英ノ根等ノ煎越斯大黄幾那等ヲ撰カ入
可シ酒石ノ酸ヲ含亞爾加里酷厲毒ヲ驅ル故ニ瞻液
頑固症可結石黏液ヲ溶解ス
シ能ク水ニ和シ尤能蓼謨華爾斯ヲ溶和ス
外用シ塗

Kitasato Memorial Medical Library

腐臭潰瘍ヲ淨刷ス○酒石葉アセチスポツトアサ法剥篤亞斯蒸餾醋適冝右サ窕醋ニ滴加シテ沸騰止ニ至静定一日其間モ數攪セ偏勝ヲ試磁鍋ニ内文火ニ煮攪セ熱消乾固セシメ又水ニ溶シ紙ニ濾シ又醋ヲ滴シ偏勝無ラシメ煮熬乾固シ納罎貯フ主治中和鹽中解凝ノ最也又利水ノ有峻効故驅水鹽ニ緩性而不刺戟故用熱性病無害胃腸及他藏膠粘膽液壅滯病粘稠腫萎黄疸等ヲ治シ利水シ汚液ヲ排泄ス功累如孕婦石若酒石鹽闕則用此葉剥篤亞斯一北鎦醋適冝滴加シ沸騰止ニ至兩三日冷定シ數攪セ磁鍋ニテ文火ニ煮四十八時トシ平均ヲ何ヒ固封シ貯フ○酒石精スピリチスタルタリ法酒石粗末適宜列篤兒ノ三分ニ二充蒸餾塲ヲ接シ際ヲ塗封シ文火ニテ白ノ蒸氣現ルニ至リ火ヲ増シ精霧ノ如出列篤兒適紅サモ不蒸餾ニ至火ヲ下放閉ス✓ハ帯赤色ノ酸精ト黒色油文出ツ之ヲ分泌シ封ニ貯ス其残黒滓ヲ堝鍋ニ燉テ為灰色又沸湯ニ洋濾シ文火ニ煮熬乾固者則酒石塩也主治精ハ鑽透開達利水發汗リ一一刄ヨ幾油ハ苦臭精微竄透ス外敷

寒和シ急迫ヲ弛寒腫ヲ温散シ支節攣拘難屈伸者ヲ治ス

●薔薇水ローセンワートル○法ウローザイハラ野薔薇等芳香ナルヲ撰花瓣適宜ヲ水ニ浸餾ス香減則止主治精微揮發ノ香精神ヲ活爽シ心胃ヲ健運ス藏徹利清涼シ稀釋ノ汚物ヲ透散粧顔水トシ面壅依刷昆瞼眼頭痛等ニ有効外用疵疹汗斑ヲ消シ滑澤ス若要收強清涼則宜玫花露ト利吐血下血月經過多等ニ内服

●蒸餅パニスブロート又法大麥粉適宜蒸餅母ヲ加拌セ捏テ餅形ヲ為麪炮シ放冷メ貯フ食料ト為小麥ヲ以製者上品也此中心ナル所ノ乳汁ニ煮貼之則硬腫ヲ散ス又水ト醋ヲ加搗為乳數テ欲腫ヲ散ス○蒸餅母ヘルメンテウム法小麥粉ニ加水捏テ為泥壺ニ蓋閉シ暖處ニ置ケハ自ラ泡醱ノ酸味ヲ生ス即麥ノ一種也外敷ノ凝結ヲ解堅硬ヲ軟ケ且稀釋滲透シナ能消散シ又化膿セシム

●蒸餾醋オーフルゲハールデアゼイン法醋適宜木炭極末十六分一攪和シ慢火ニ蒸餾ス初出ル淡薄液ハ除去シ精増焦臭出ル境ニ至ヲ止火性與酒相反ス酒ハ蒸餾ノ初ニ鋭精出後ニ淡

Kitasato Memorial Medical Library

水出醋ハ先淡水出ル後鋭酸出又大ヲ燒酒ニ點スレハ燃醋ニ點スレバ減ス酒ヲ血中ニ之ヲ涼靜ニシテ醒スレバ酒ヲ血行ヲ進增醉シメ醋ハ
レハ湯ひニ加ヘ主治清涼滋潤生
凝固ス醋ヲカレハ忽溶解ス蒸餾醋ハ氣味緩ナレ
津止渴發汗稀防腐解熱爽
ヲ加稀クシ糖ヲカ甘美トナシ諸疫腐熱惡性熱
熱病ノ飲料トシ滋潤止渴解熱
冒寒傷冷加龍腦則殊ニ阿
能發汗防腐ス此蒸
氣ヲ居利害凝血ヲ溶解ス胃ニ與レハ
室ニ薰利害凝固ノ不和酸敢セシムル骨ヲ軟ニス
病等ニ有故ニ拘傻與外用眩暈卒倒鼻孔ニ塗面ニ嘆
ノ功有害不可此症ハ烈醋ヲ用劇
頭痛一味温メ嗅シムル或消
ヲ加水稀クシ打傷青斑
産後脫血加水温メ貼シ或頭ヲ以貼シ或
外部潰敗加藥ヲ〇屋施
苦澁藥ヲ
和スル者膿熱腐熱等
オツシメル是醋塗合敷

●蒸餾水ウゲソアートフルデ法
雨水ヲ蒸餾シ四分一ヲ取壜口ニ滿シメ貯ス
味潔ナレ共塩硫等ヲ含故ニ其汚雜ヲ去雨水ハ自然ノ蒸餾ナレ共尼氣中ノ酸性塩及硫消氣ヲ含泉水ニ比レハ寔透シ粘膜ヲ淨劑ニ用ユ
溶解ス故浸劑地製煉ヤ能物ヲ以テ
●失格刻乙ーシコレイ洋葛公英
一種代用蒲公英ノ主治根莖性涼收斂ス
皮膚脉管ヲ淨除シ蒸氣ヲ閉遠シ諸器ノ硬攣及痛ヲ運行ヲ進可ラサル者可禁
粘稠液内藏壅腸間膜膳液稠厚ヲ稀換ヘ二便ニ排シ
脾病黃腫等ヲ治ス嫩胃肝脾嫩腫胃熱酸泊裏症ニ有功泊
不化者加大黃舍利黃疸衆
腫ニ加
酒石英
●西瑪爾扱シイバ皮主治緩和收濇
加客列幾那ニ及ザルヲ以今用之稀也
●紫莖ーブケヤン名地錦苗和試効解凝丸黃疸膠粘液多クシ胃腸ニ在便秘腹困重ヲ兼者紫莖越斯三錢葛兒爾越斯大黃名半
公英〇解凝

Kitasato Memorial Medical Library

錢二氏ヲ一九錠未ヲ以朝夕十五丸宛用ス○堇紫越斯ヨキスタラクト同ドイヘケルフル法蒲公越斯生薑ヲ以製ス主治粘液膿液ヲ疎釋シ皮表ノ鬱ヲ排シ二便ヲ利シ過腐強壯ス萎黃病（黃膜）肝脾腸間閉塞ヲ開閉歇熱ヲ解腎痛結石ヲ治ス（鹼黃加剌ヲ加フ）

●悉契兎剌斯シケイパスハ分泌ノ義ナリ圖（漏斗）露水精油ヲ分泌スル器露精沉ミ油浮ヒ或ハ油重クメ沉ム者アリ下口ヲ閉開メ分泌之ヲ司ル

●麝香モスキユス毛少ク短縮赭褐色格上ニ置純香無異臭速ニ燃テ殘ル者ハ燃テ多ク消ス者上品白色大囊厚膜者偽下品主治性温揮發竄透衝動ス腦神及心ヲ強壯ニシ稠血ヲ稀釋シ發汗驅風シ精神ヲ欣慰シ鎮痙ス失氣（眩暈心悸胃昏睡病卒厥顫振鬱憂發狂痴腹痛々風傷冷毒內攻弱性ノ肺嫩疫欬壞疽一切咬傷陰具虛寒皆有良効服量（經症ハ一ヨリ四氏ヲ大人一時或一時半毎ニ二氏ヨリ十六氏或半錢迫用テ危急ヲ救ヒ量ハ捷効ナシ小兒ハ一氏ヨリ三氏排泄壅氣而不誘發發熱爽神止痛具汗香氣ア時ナシ或ハ二三倍ノ糖ニ和シ或蜀酒桂丁幾等ニ加用ス）虛熱班熱腐熱神熱用之可壯實多血衝頭痛等ヲ發シ（珠婦人用之則其他任再熱）

則神經ヲ強シ精力ヲ囘ス者口角ヲ痙攣顫痺不遂粘液質昏倒安（大危無生力病在腦者痙ヲ發シ無効或囈語呃逆痙ヲ發シ引者等ヲ没ヲ加ヘ）

者六氏ヨリ十六氏ヲ鬱憂不寐癇ノ發狂宛用ス（八氏ヲ發止スル喘息ニ有効）

驗二氏ヲ殆和ス諸斑諸瘡內攻虛衰者脈遲數ニ隨加減ス鎮痙六氏ヨリ十六氏ヲ牙關緊急而難服者灌腸劑ニ用ヒ睡ラシムベク阿片難

Kitasato Memorial Medical Library

用症麝香的應ス○幾那麝香丸胖病贇憂子宮衝逆其發作ノ間ニ乗シ用麝一錢幾越斯二錢三ㇵヲ一丸トシ銀衣五丸宛用ヿ日ニ四次○魏角麝香丸麝魏鹿精鏁越
斯各十ㇵ結見滅斯涅刺列阿片五ㇵ右ニ兆ヲ為一丸蜱未衣一ヶニ三丸若四丸ヲ服是痛風酷厲毒ヨリ
發ス〃喘急ニ殊効方也○附龍涎香アンベルイレイス紀州三輪寄大地浦等ニテ捕ハマツコ
クジラ麝香ク〃ジラ疷者ノ腹ヨリ取出者是也堀片蠟樣淨潔凝固シ脂氣有水ニ投メ浮碎ケハ末ニ成易キ
者上品也主治如麝香而レ圧刺戟少シ故ニ體質易感動者
或麝ヲ惡ム者ニ用服量リ豌豆大或二ㇵヨ又蜀酒鷄卵一ヲ仍多服ス糖等ニ加
或一ㇵヲ消石十ㇵニ加或一味ヿ錢トシ一二滴ヨリ十滴桂水ニ點服ス
●失歌篤シペツト又モスクスカワト麝香猫ノ義両陰間ノ嚢ヨリ取香液主治油ト痺痿
塩多鎮痙解凝緩和強壯疝痛小兒腹痛子宮硬腫衝逆等瘈瘲ニ攣メ有偉効能油脂
ニ化メ燒酒ニ不和

●失鳩荅シキウタ性酷厲過服スレハ眩昏瘧痺神乱吐利遂ニ胃腸焮腫メ死ス故盡敏ノ
人ニ用片ハ必兼用藥ヲ以其害ヲ防ク解毒徹温湯ニ油若ハ蜜ヲ加與テ催吐シ或吐剤ヲ用又橙汁及
酸味液蔥蒜亦佳且清凉緩和蒂腸ヲ可兼主治刺衝シ麻痺セシム止痛催
腫シ血中ノ酷厲毒ヲ驅凝結ヲ溶釋スル峻藥ニ而堅
硬腺腫ヲ消散ス真菌腫ニハ無効瘰癧ヨリ發諸惡症幾那ヲ加ラ尤良リ頑固腺腫
外藥ヲ不用メ消ス癌瘡樣臭潰瘍外敷内服ニハ越斯ヲ用子宮硬結畾樣有痛臭汚
流泄者乳房硬腫越斯ヲ膏ノ如シ敷打撲硬腫貼之火傷ノ如ナルハ其泡乾ク迄連貼
ス内藏諸腺壅塞硬腫小兒肝脾腸膜壅塞羸痩者其他諸内部硬腫
服之蒸溜之且越斯ヲ貼梅毒諸疼硬腫瘰癧潰瘍等經久者鼻爛蝕
骨汞劑無効者藥末一錢蜜一匁ニ和シ與テ速効ヲ得ヿ有リ或越斯ニ阿片ヲ加用有捷効梅
毒ニ非者モ如前件者皆用テ有驗又障眼初發等ニ良真品ナラサレハ無効虚羸不堪藥

Kitasato Memorial Medical Library

久服者無効病越斯猛悪難敵者無効服量一錢

● 著ドイセンドブラートハコロモ草又メドキ

悪液ヲ浄刷シ鎮痙止痛ス痲諸痙攣ヲ閉塞シ且痙攣及腫結ヲヨリ起ル攣痛ヲ治ス無嫉妬者經不順加客列黙吐血衄者

傷ノ吐血白帯漏精淋下利常僻タル者皆多験

著鐵鎮痙丸　前件諸症兼痙攣者ニ良著越斯四錢魏一錢末和ノ三ト一九ヲ一九ニ丸

○著鐵解凝丸　脾病鬱塞兼蟲有奇効魏二錢撒爾ホ児盧會著越斯各一錢調和六丸ヲ為一九十九宛服ス日二次

此品煎泡散皆良能治腫瘍等ハ煎ノ舎漱

● 蜀羊泉　ビツテルズートヤウトゴ

ヒヨドリジヤ　和試効蔓味苦微甘　生鮮者過服則

悪心眩暈ス　温煖解凝稀釈發汗利尿通經微瀉ス　酷厲毒ヲ駆逐シ浄清血ノ良効有テ肝脾ヲ治ス欬喘ノ疏シ黄痘水腫肺嫩胸脇煩悶胸ノ良効有テ肝脾ヲ治ス欬喘ノ疏シ黄痘水腫肺嫩胸脇煩悶加用

癬頑性皮病　日一ヲ二ヲ湯十二ヲ二泡出シ漸増シ用テ悪心ヲ發スル二至ル梅毒ノ藥

二非レ多量ヲ用ユ梅毒ノ是レ久服ノ有偉効　白帯下煎服ス

和眼ノ斑翳ニ點ス

● 芍藥ペヲニイ　試効鎮痙止痛ス神悪感動ヨリ發ル痙攣有効服法散服

○蔕　搗絞汁ヲ承ケ二ト為ス　○蜀羊實　兩水各半升ニ煮テ一ヲ湯ヲ取リ分ケ一日ノ服量トス

ヨリ来ル者土茯苓ヲ加フ　疼痛ス　乾末ヲ二三錢ヲ用ユ

血ノ出否ヲ論ス　諸痛風兼淋者為ス　瞼眩生者半錢ヲ水十六ヲ以テ減半六ヲ分ケ一日ノ服量トス

舉ノ症有効

Kitasato Memorial Medical Library

●暗厄利瀉利鹽ヱンゲルスピユルゲールソート乃凝水石也法海水ニ粗朴ノ海塩ヲ適宜ニ溶シ煮水氣ヲ蒸散シ乾固シ再水ニ溶シ煮上面膜ヲ生ニ至リ放冷結芒スル者之ヲ別里塩也其剰液ヲ煮上面ニ生膜ニ至リ放冷結芒スル者乃瀉利塩也精製法瀉利塩一分沸湯三分煮製スル了如前

主治苦味清涼下劑也稍刺戟スレ圧不峻稽留熱腎焮酷厲傷冷毒

黄疸水腫内臓壅塞疝痛或桂姜益智等ヲ伍用ス服量一錢ヨリ一匁水或適宜飲液ニ溶シ服

●越栗失爾剌硄布利但ヱリキシルポロプリート法雜腹一匁ヲ焼酒卅匁ニ加嘤ニ内微火上ニ乏了十二時濾シ蘆會没藥末各一匁ヲ加時々振蕩シ淹了三日濾シ封貯主治健胃ス内壅ヲ達シ粘液ヲ解シ大便ヲ通發汗ヲ遏腐ニ血液ノ汚ヲ祛食ヲ化シ通經殺蟲ス内外創傷潰瘍ヲ淨愈ス

●鉛糖ロートツイクル法鉛粉所謂京ヲシロイ一分餾醋十分先粉ヲ磁鍋ニ入醋ヲ加煮甜味去甘ト成ニ至紙ニ濾ス火ニテ水氣ヲ減上面生膜ニ至再濾放冷結芒セシム剰液モ亦如前法製若潔白ナラサレハ醋水等分中ニ投溶シ濾ノ如前製則潔白ノ芒針トナル主治礦性ノ中和塩味甘收斂清涼外敷ノ焮熱ヲ涼解シ酷厲血ヲ甘和シ止痛ス一切焮腫皰疹潰瘍腐蝕ヲ消淨ス焮腫眼薔薇水ニ溶シ點ス咽喉焮腫管ヲ以テ吹入淋ノ酷厲腫一二瓜ヲ薔水或乳汁ニ和水銃ヲ以注入ス面汚斑瘡痕皰疹和薔水塗羅斯其他焮腫瘡瘍表ニ發ス可者ニ外用スレハ内攻ス必勿用服量一日半瓜ヨリ五六瓜ニ至痙ヨリ發ル諸症癇及攣急ニ由嚥下ヲ妨者又纖維弛弱易感動者服之有効鉛毒動モスレハ内ニ閉止シ疝痛等ヲ發起ス

◯鉛醋アセチユムサチユルニ法密陀醋適宜磁鍋ニテ文火ニ煮水氣ヲ散シ密或ハ油ノ稠トス主治如密陀醋而收斂効峻

◯密陀醋法密陀僧十匁醋四十匁頸窄キ格爾弗ニ内數振蕩シ淹了十二時慢火ニ一二時煮テ放冷シ滲藍紙ニ浸

色不變ニ至ル氣ニ至治收斂可嚥甘味アリ外敷收凉シ消腫
憑ス

眼點藥咽燃腫漱劑燃痔湯火傷凍瘡瘃淚漏瘡指疽洗皰疹蟲
咬毒水ヲ加稀シ施ス　強歩ノ蹠蹠燃熱生皰者漏劑或ハ膏

● 越列密ゴムエレミ樹ヨリ滿ル華爾斯徹潔亮淡黄帶緑色味苦尚香氣アリ主治性温
敷凝結ヲ疏解ス衝動消散止痛軟堅釀膿愈瘡之良劑
也頭痛肩背痛ニ燒酒或ハ油ニ溶シ塗○越列密膏一味文火ニ煮溶シ若ハ爾未膏ニ煉和シ主
治前舉諸症

● 阨日多エジタ膏ヨリゲイプチサルフアス銅緑未五ヲ醋七ヲ密十四ヲ文火ニ煮軟膏トス
主治汚穢腐爛ヲ淨刷シ排膿祛壞ノ好肉ヲ生ス壞疽瘡瘍梅毒腺腫其他腐爛

● 越波里ヨモ膏エンタルリーヲ法阿利布五ヲ白蠟二ヲ以文火軟膏トス
主治緩和止痛軟硬消燃釀膿促潰ス傷凍瘡ヲ治ス○

● 鷲嵩スワリユストヲ主治堅硬ヲ軟化シ凝結ヲ散スト毬布ニ貼シ頑固ニ咽喉腫消ス

● 依蘭答ヨイスランドモス含一昼夜水浸スレハ滋養補充シ酷厲毒ヲ包攝緩和ス食減シ痩ル者ノ要藥也胃弱ノ者微利ス苦味去下利ノ功消ス

良液ヲ生ス故乳汁ヲ以煎用之ホ可也○答甘飲痩弱熱肺傷久蚊経久下利傷冷毒液肺ヲ衝蚊甚ク憊者ヲ滋保メ精力ヲ助ク答一ヲ甘三錢先ツ答ニ水一北半ヲ加煮十二ヲトシ沸ヲ度ヲ火ヲ下シ甘ヲ加漫ヲ十六分時去滓服ス天資薄弱動者肺燃後ノ諸壅塞皆有驗ル燃ハ有害肺

Kitasato Memorial Medical Library

二害ナク飧泄利肝崩脱泄諸羸痩等ニ有効服法一ヲ一匁
丸ハ水ニ煮テ四分時以布漉シ七八匁ノ粘汁ヲ取滋養二ハ乳汁乳精等ニ和用苦味ヲ惡者沸湯ニ浸シ八分
時苦味去テ煎服ス泡剤ハ効サ濃煎過粘ハ細纖絡ニ參入シ難シ故水浸最佳○依蘭傑乙列
苦一匁半水ニ丸煎熱六匁トシ糖四匁ヲ加又煎舎利別ノ調トス前説諸症ニ有効
●烟草タバキウム試効用葉麻痺鎮痛性熱刺戟ノ吐下薬也
[illegible]婆曼陀羅ニ比レハ緩也水煎過服スレハ吐瀉少許服ハ利尿疝瘕痛麻痺鎮痛ト瀉下ノ功力ヲ以
其惡液ヲ排ス水腫粘液腎痛無焮症者粘液喘痩欬焮熱ナク神感鈍ナル者ニ良
等ヲ治○烟草解凝飲湯前件ノ遷延症ニ用烟葉一匁沸一丸浸出半時去滓焼酒二匁
ヲ和北滴ヨリ始加テ六十滴水或酒ニ點服ス日兩次○烟草驅水飲消腫利尿ス葉六匁水六
ヲ浸出去滓焼酒一匁忽弗滿液一錢ヲ和每一時半匕滴飲液二點服但隨症增減ス外用卒厥難
甦濃泡剤ノ灌腸頑固便秘或絶僂屈緊脹ニ因者亦前法ノ如頑癬乾癬瘡疥煩痒惡

癘頭瘡臭潰諸瘍洗滌剤トス又殺蟲ノ功ヲ兼○烟草越斯法如失鳩荅越斯
日一八ヨリ漸增量ス
●百合油オレウムレリヲリウム法花瓣ヲ蒸餾メ取主治外敷温煖解凝
止痛堅硬ヲ軟ケ胸病ヲ治ス
●氷絲糖ボルストツイクル和胸糖ノ義アルヘニ氷絲餹ノ義法白糖ヲ水ニ溶シ加卵白煮沸
沫ヲ去放冷又是ヲ大麥加煮熱結スル者凝固セシムゲルストツイル麥糖ノ義主治急迫ヲ
緩メ祛痛シ胸ノ癘液ヲ和ケ粘痰ヲ稀豁シ欬咽中燥
聲嗄ヲ治驗質有テ能凝體ノ強硬ヲ鬆弛シ酷癘ヲ甘化ス欬嗽糖一匁半阿列布半錢ヲ研抄
シ用外用角膜星翳肉翅糖赤石脂酒石英等分點藥便秘灌腸剤トス鼻系
閉塞嚏藥潰瘍水棉樣腐肉撒布シ淨刷ス
●蓖麻油ウヲンドルボームオーリー法去皮搗碎磁鍋ニ入水適宜ヲ加煮油ノ上面ニ浮ヲ抄

取水ヲ分泌ス試効子ハ瀉下ス甘和清澄稍苦無香臭味淡硬ヲ滑利シ不瀉下燥屎ヲ軟化ス腸攣縮劇痛者屎室兼嘔吐者吐糞病膽ノ結石腎痛ノ硬秘ニ有捷効服量四銭ヨリ一匁児ハ一二銭宛數服ス或鶏卵護謨漿等ヲ加乳剤トシ用ユ○鹼油鎮痛飲臨産攣急ヲ緩メ分娩陣痛ヲ進メ催生シ産後ノ痛ヲ預防ス罌粟蘆水二匁蓖油一匁白鹼一銭半過滿託舎利別四銭卵黄一阿片八厘一匕宛

●七葉樹皮ウイルデカスタニー採法葉未敷衍時其枝老ニ過ギス甚細軟ナラサルヲ伐リ皮ヲ剥裏面ノ白ヲ去日ニ乾シ筒巻スル者佳試効形味殆幾那ノ如唯微辛味有ノミ為末者速ニ蛀敗ス毎用新研末ス可ス○末一匁ヲ川篤児ニ蒸餾スレハ初淡水出火ヲ増セハ臭油水ニ浮ム油水四銭有殘炭ヲ焼為灰水ヲ加澆セ上清ヲ煎熬スレハ水固性亞児加里塩半銭ヲ得○緑礬稀精ニ加レハ黄色トナリ酸味ヲ消ス是剥酸ノ兆也○末ヲ半肉ニ掺貯或水浸ヲ膽液若稠血ヲ加貯ルニ腐ラス溶ケス過腐ノ兆ナリ幾那ニ代用シ間歇熱其他ノ病ニ有効ナリ如楊皮服量製剤亦同但不多服則無験○七葉樹實炒末トシ一匁半迄水六碗ニ煮減半朝夕一碗ヲ用テ服ス緩虚継ヨリ發スル諸失血諸脱泄ニ良効アリ

●菲阿斯失亞密ヒヨスシアミスワフルテビルセシコロイト歐羅巴諸邦ノ原湿荒野ニ生ス莖葉根子皆麻毒アリ殊ニ根ニ多シ但莖子ヲ藥用トス麻痺毒瞑眩過用スレハ悪心嘔吐シ脳神経ヲ麻痺メ精神ヲ朦昧シ昏眩瞳開顔筋搐掣脉細疾譫語等ヲ發ス感觸剝ク虚甚シキ症ニハ誤用ノ害阿片ニ下ラス解毒瞑眩甚シキハ速ニ吐之或醋酸類ヲ與ヘ醒解ス過用ノ毒雖如之服量ヲ慎病症精察シ用レハ醫家日用ノ要藥也試効葉ヲ越斯トス以其麻痺毒脳及神經ヲ鎮壓シ甘眠セシム故ニ宛用レハ鎮痙止痛催睡ノ一要藥也阿片ニ比スレハ心藏脉管ヲ刺衝セス其運行ヲ増進セス發熱セス大便ヲ壅塞セス只神経ノ鋭敏ヲ鈍ニシ鎮痙止痛ス却テ血液大過ノ運動ヲ戒シ醋厲液ノ刺戟ヲ抑制ス故ニ一切壯熱諸病ノ劇痛攣急ヲ緩弛シ失血脱泄ヲ静止シ神経ヲ常調ニ復スル有奇効○

Kitasato Memorial Medical Library

或云阿片ハ止痛鎮痙ノ諸服ヲ燥ラス潤シ不寐ノ罷勞ヲ安眠セシメ精力ヲ資補ス然レ𪜈熱性ノ酷厲毒有テ血運ヲ增シ熱ヲ釀シ大便ヲ秘閉スル等ノ有妨害是其藥厲毒アリテ一旦ハ緩和スルニ似タレ𪜈時ヲ經テ故ノ如シ遷延數用久服則諸合分利壅滯シ水腫ス菲阿斯ハ華兒斯及起熱ノ性ナシ却テ大便ヲ瀉シ小便ヲ利シ蒸氣ヲ發ス故ニ閉塞ス故ニ酷厲毒アレ𪜈閉塞せシメ蒸氣ヲ發ス故ニ閉塞ス

ノ禁忌アルニ者

痞腹痛貌僂佝吐糞癖亂失血等ノ神經過感劇症

神經熱痙攣劇頭痛訛語不寐痙搐欬嘔等ヲ兼者靜止ス

嫉衝熱防嫉而用虛熾衝精神懵昧訛語等ヲ治然𪜈壯實的應ス但シ壯熱實嫉ト雖ヒ熱盛ニハ的當せス假熱盛嫉ニ後痙攣運動不止者其効尤也

同用腦神經虛憊症晏阿片ヲ用テ鎮痙スレハ逾罷勞ス稱ス推

菲阿斯ハ然ラズ消耗汁ノ如ハ尤也

○菲香鎮痙飲

茴香水一弓半麻倨一錢消石半錢滿那薄荷舍利各四錢菲阿越斯二

右調和シ半時每ニ二茶匙ヲ服ス

齒ノ期ニ發スル痙攣等ヲ治ス兼テ小兒發熱搐搦或咳嗽偏頭痛ニ有

如

○菲亞定痛飲

神經諸病ニ帶著スル頭痛ニ有捷効亞的兒

纈草丁幾各二錢菲阿私越幾一錢右研和シ

時々十五滴宛服且症ニ隨テ增減ス可シ

傷冷毒劇

顏痛齒痛菲亞定痛散効

阿魏各一錢甘

永十五片菲阿私越幾半錢

○安質菲阿斯鎮痙散

子宮性劇キ偏頭痛其他一

研合為百丸三丸宛用ル

若吐瀉ノ候アレハ服量ヲ

疫嫉痙嫉痙崇ニ用テ鎮定

難痙嫉ヲ鎮メ吐血ヲ防ク

加テ有良効又麻痺及是

多シ菲阿斯越斯半引安質

ヨリ十日三次

○菲阿斯鎮痙散

滴迫用

用主効粗安質菲研

阿斯欽ト彷彿

痙攣急者痙性病泉貌傴僂者癇發狂神思鬱憂痴迷等ノ精神

及諸筋ニ係ル病ヲ鎮定シ酷厲內攣ヲ排泄ス實況固ハ固ヨリ藥越斯ハ三カノ非所及服量

Kitasato Memorial Medical Library

トス或隨症五六匁ヨリ十二匁ヲ一服トス芳香露水或適宜ノ飲液ニ容レ或丸散トスル小兒ハ一匁ヨリ漸加テ四匁ニ至ルヘシ一歲ノ兒ハ日ニ二回ニ分テ研多量而已ト雖モ瞑眩サシ

○菲阿斯越斯製法

花前ノ莖葉ヲ搗キ爛シ布巾ニ包ミ搾テ綱汁ヲ取リ磁鍋ニ入レ慢火ニ煎熬シ火ヲ下シ乾漿四分一ノ越斯ノ調ト固封シ貯フ此劑軍發塩多シ故ニ適宜ノ鎮痛緩和解凝疏散ノ良劑也

○菲阿斯子

麻痺毒尤峻也未一二匁ヲ一日用或麝香甘汞ヲ加エ丸トシ有ヲ鎮痛解凝之峻功

● 白芥子 モストテ

試効温煖衝動開達粘液ヲ釋シ利尿ヲ進メ胃腸機ノ衰急ヲ起シ大便ヲ順利ス粘液腫黄萎處女病キ其胃腸ヲ開キ粘液ヲ分排ス痲痺昏睡衝動ヲ卒仆噎逆ス舌痲言澁含嗽セシム痰欬喘殊ニ胃良者ヲ主治ス健贊白芥各一錢姜盡會各半錢鐵屑極細末合和亞爾鮮越斯ヲ鋼液ヲ疏シ○芥姜健胃丸胃衰諸液不化若發黄ス水腫利尿發汗ス

○芥姜健胃丸

水腫鋼屑極細末兒拱手大ノ者ニ効多キ春發ノ者ニ効多キ秋發ノ者ニ効頓症ハ氣候ニ適宜ニカエ和シ二匁ヲ一服トシ朝夕十九或十二九ヲ丸ト那驅熱ノ動ヲ服法搗砕キ散泡煎諸劑トス刺衝ヲ不扶則無効ヲ要症ハ不鳩砕胃虚諸症日ニ數七宛用失苟兒ニ用テ酸液ヲ減ヲ抑制シ咽喉腫ニ漱藥トシ消シ海塩酷鷹毒ヲ消シ用テ消散ス

● 沒藥 メイルラ

味苦帶辛花沒藥ハ真ニ非ズ沒藥佳

主治温煖衝動強壯解凝稀釋開達防腐止痛

諸鬱塞急慢諸液粘稠ノ病壞液醫帶ノ勞瘵等ニ効有リ

微發汗健胃シ且殺蟲又内藏硬腫依剥昆蕎黄喘咳寒粘液水腫質勞其壯實煩熱アルニハ有害寒

温壯利水粘液沒一錢苗露七匁酒石塩半錢ヲ研化シ撒爾未兒拱咳斯十二匁婆舍利一匁或幾那丁幾六錢ヲ加一七宛日三四次用テ良寒粘液質經閉沒丁幾一匁雜腹丁幾蓼盡丁各四錢ヲ和ス滴宛葛湯或

肺病粘液壅滯者ノ良方咩蛭ニ滴シ用此方催生シ胸衣ヲ下ス

○沒藥糖

沒越斯四錢糖一匁麻倔

Kitasato Memorial Medical Library

涅失一匁研合一卯ヲ以テ宛用ヿ日四五次○珊黃沒藥丸　肺瘍膿魚燉者沒三越斯二錢三八ヲ一丸ト錢ヲ一次ニ蝋未衣每一時用三丸ト服量十氏ヨリ半錢ヲ一次ニ用ヿ日外用咽喉齦爛及失苟兒此ニ明礬試蜜海四次ヲ加テ塗ル若梅毒アルハ汞ヲ内服ス○沒藥丁幾　沒一匁燒酒八匁ヲ用テ夾神健胃驅風ス弛弱家粘滯諸病ヲ衝動健運ス主治耐粘利尿止痛防腐久病贏封貯主治諸香臭ヲ奪腐敗ヲ遏ス魏麝毛加之魚膠散ス腐瘍疽ノ臭腐等ヲ一味未或楊皮粘攀斷爛疹布傳染痢穢物之後

自消シ不傳染

●消石　ニツトリユムヌサ　ペートルペートル亞児加里酸性ノ中和塩也水ニ和レハ寒ヲ生ス清涼功可知

○精製消石　ポツトアスグソルフルデ溶化シ救冷主治性寒解熱結晶せシムル

せス能稠血ヲ稀釋シ咽喉腫壮熱ヲ涼解柳制ス

之則血液ヲ溶解シ却テ脱泄ヲ増

消一錢ヲ扁桃乳ニ和用

他ノ酸精ノ如收斂

或毒横膈ヲ刺

若非燉性者用

燉性失血性

燉性ノ痛風衝煩悶兼嘔者

燉痛羅斯大熱頭痛或熱毒發狂

燉脉強乾欬少シク交血痰者日三四錢迄用之嘔者汞劑ヲ加テ解

燉苦用之嘔者汞劑ヲ加テ解

孕婦頭痛壮熱中暑嘔亂

燉勢減則減量虚弱ノ肝

凝ノ燉性燉性ノ痛風衝煩悶兼嘔者

結ヲ溶化シ閉塞ヲ開分利ノ諸竅ニ排泄ス

止渇シ脉洪大數ヲ減シ腐敗ヲ防護ス諸管ヲ鑽透シ

熱ノ峻藥也血液沸湧ヲ鎮メ

Kitasato Memorial Medical Library

膽液酷爲ノ劑及腸嫩ヨリ糞ル下利熱性ノ經閉産後
瘀露壅滯皆有良効肺腎胃腸力衰者胃腸燃衝如之中和
性熱精力脱者等ニハ有害○爽神涼血散
消石ノ刺戟ニ不堪ノ害アレ共遷延消耗熱及任冉ノ
伏熱ニ比方有効消四錢煽ニ末ス一刃合末蜜貯シ一
卵七宛乳汁ニ點ヨリモ利尿効多シ故水腫屈伸毎服一刃日四次但寒粘
服スル丁日四次○末兒扶斯消石散汗劑消ヲ加レハ又瀉下
家ハ利尿瀉外用温湯ニ溶ル者衰血ヲ散シ冷水ニ溶テ
ノ効多シ凝固セシムル者血液ヲ海鹽ヲ加テ
蒸溜スレハ解熱消散シ濃腸スレハ通燥屎○口噤諸嫩漱劑
玫麥潤涼飲方大麥煎六ヲ玫
密一弓硝三錢ヲ溶化シ嗽温トシ含漱ス○覇王鹽サルボレイト法
合ま鍋ヲ火ニ上せ為通紅一ル之ヲ投メ發焔燒化烟ナキニ至又一ヲ投ス如之シ終リ仍坩上ニ置丁小
半時ニメ火ヲ下シ遽ニ沸湯ニ溶シ紙ニ濾シ靜定シ冷處
淬ヲ去リ又火ニテ水氣ヲ蒸散シ浮膜生スル至冷處

二置ハ白堊ヲ結又其剩液ニ沸湯ヲ加煮製
スル丁如前ス其堊ヲ水洗シ乾カシ貯フ○生治解凝
峻藥中和鹽也功孕鬱酒石ノ如ク解疑劾多メ水ニ化シ易内部壅塞閉
敗液留飲停水腫壯熱煩渴等ヲ治服量半錢ヨリ
一錢○固性消石ハステサルペートル
或末ヲ少宛投スレハ爆聲ヲ發シ焚焼ス數投メ少モ
焚セス硝凝固スルニ至火ヲ増烟無キヲ度トシ放冷
法坩鍋ヲ火ニ上精硝末ヲ投溶シ水炭通紅ノ小片
アルカヘスト液ガラウベリ法固性硝ヨリ製シ速ニ蒸餾水ニ
去渣煮テ油ノ銅トスル者
幼同上○消石錠サルペートケーン
投シ焚焼シ石上ニ主治清涼止渇利尿閉壅稀粘咽壯熱
瀉シ凝固セシムル
熱性尿閉服量半刃ヨリ三錢咽
ユールレ法精乾硝石ま廿四ヲ緑礬油蒸餾水各十二ヲ
トルレ先硝ヲ列篤兒ニ内油ヲ水ニ滴加シテ蒸餾
糖ヲ加口ニ含溶メ有良効○消石精ペートル

Kitasato Memorial Medical Library

壜ヲ接シ塗封シ文火ヨリ漸ニ至テ火ニ增精少モ滴セサルニテ濁氣ヲ蒸散シ封貯ス

此精極テ猛焚力如キ烟ヲ發ス○發烟消石精硝北四弓

綠油十ニ乃至十二ヲ以製ス是乃チ加ヘ熱沸スルテレク窓萬児也油類ニ加レハ忽燃テ發焔ス性

大寒味峻酸以氷雪ヲ作リ生氷ヲ凝シムヘシ主治

壯熱煩性熱ヲ涼解ス津ヲ生シ止渇潤血シ壅塞ヲ達

利尿ス梅家永劑ヲ長服シ體中ニ懸留シ無シ

尿ス効者ニ用レハ融解之而運覆其能服量一

適腐ヲ水一盞ニ加エ適○甘消石精ペールアルコールアルコーリセサルトルアルテル

宜ノ酸味トシ用ユ

法烈燒酒ニ九半費烟硝精一弐右先酒ヲ長頸壜ニ入

精ヲ一滴宛加毎次振蕩スル如右加ヘ畢テハ塞キヤヲ

沙火ニ安シ蒸餾壜ヲ接シ文火ニテ

酒ノ量ノ三分一ヲ取者上品也

主治油質ノ酸性拔爾撒謨質ノ性

能有リ

窒塞鬱結ヲ開達揮散シ

泄シ發汗利尿ス胃ノ諸病ヲ治ス清涼飲ニ加用テ血沸ヲ鎮諸熱ヲ治シ且止渇

忽ニ似テ緩和起熱性少シ故ニ不兼嫩ノ熱病ス

ニ良也鎮痙スルヲ以テ斃班熱ニ有効但赤班熱ハ多

ク欬頭痛等ヲ兼甘消精ノ氣之ヲ刺戟ス故不可用

子宮衝逆胃病鬱兼發ノ拘

攣痛孕婦惡阻婦人ノ頭眩胃冷諸症肢節顫膕等皆有捷効

服量一ニ滴許葡酒或咩埣

一點服ス日三四次○杜松驅水飲主治水腫ヲ諸

實水六弓蔥蜜一弓甘消精二錢安分利ス杜

質沒酒半錢調勻毎一時一

冷毒而蛇啣有痰者腹痛疝痞自胃腸燃衝來者ニ有害

石膽ヒツトリヲユムヒエツトリヲ銅ト抱合スル

天エニテ銅ト抱合スル綠礬トシ亞鉛ヲ綠礬トシ亞鉛抱合スル

ヲ皓礬トス人エモホ右ニ準製ス○皓礬ウイツテヒツトリヲ

味酸涼帶甘比人造法餾水十弓蒸四弓亞

綠礬則不苛烈ル丸油ヲ和シ亞

ヲ少宛加レハ沸濫ス終不溶

ニ煮テ溶シ氣ニ觸テ封貯ス主治鎮痙良藥也癇痙搐掣子宮衝逆神

Kitasato Memorial Medical Library

經諸症内藏壅塞及蚘中毒者ニ刃ヲ飲淡ニ點眼ノ快吐スニ有良驗外

用鵞口瘡致蜜ニ和シ漱藥トス娍腫眼點藥トスハ糖蜜ヲ加淡多角膜瘍若

曇暗胡桃油若乳汁ニ和シ點ス但侵蝕性アリ故ニ一頓ニ多ク勿施出血潰瘍掺之淨愈○

皓礬水九ノ六ヲ水ニ和シ目ノ洗劑トシ蜜ヲ加口鼻潰瘍鵞口瘡等ノ外敷或漱藥トシ有良効

○緑礬ズワーフルヒツトルリヲーールシユール味收斂帯甘多少必鐵ヲ含故鐵九伝傑緑

ナル者鐵多シ主治稍銅礦氣ヲ含ヲ以不内服撒爾末兒扶斯

ヲ用乃人工疑丸外敷失血ヲ止水ニ溶ノ寒壊疽蒸溜藥トス○緑礬油オレ

ウムヒツトリヲリ法先坩堝ニ入煅過ノ黄白色乾固スルニ至五北ヲ陶列篤兒ノ三分ニ二充テ澗大ノ

蒸餾塁ヲ接シ膠泥ヲ以接際ヲ塗乾カシ文火ヨリ漸火ヲ増ス白蒸氣ヨリ油ノ如者續テ出ルニ至リ烈火

ト為列篤兒通紅ト為始テ稠厚ノ液出始出ル精ハ緑精ニ可代主治峻酸酷烈侵蝕外布

スレハ腐爛火傷ノ如シ水ヲ加精トスレハ酸美爽凉ノ味トナリ凝體ノ弛弱ヲ壯ニシ遏腐スル峻効ノ清

凉タル了如緑礬精○緑礬精スピリチスヒツトリヲーリ法緑油一錢蒸餾水六錢油ヲ一滴宛

水ニ加テ混和ス主治清凉滋潤生津止渴利承過腐而血液沸

騰ヲ鎮定ス防腐ノ功比硫酸則峻比海塩精則稈寛カサクメ收斂多シ斂弛緩虚弱ヲ收強ニシ

濁涼スル効ハ多但腐敗ナキ神經熱コルハ間害アリ功ナシ用之也先宜淨除胃腸之

汚物腐熱ノ血液渙崩或兼失血或發斑尤赤斑熱咽喉腐臭ヲ兼者ニ

有功虚憊甚者蘿蔔搗爛扁等壯神藥ヲ可兼用間歇熱無娍衝者ニ壯實嫩性病無効但虚

症ニ應ス的腐性麻疹悲性痘見點ヨリ無次序虚憊スル者必腐敗ニ傾初ヨリ可用灌腸

ノ時ハ腐敗ナク尺膿血中ニ混シ一種ノ腐熱ヲ發シ危篤ニ及ヲ豫防ス故亦可用痘兼失血顯

紫黑斑者ニ氣邪盛ナ加用諸失血崩漏痔血レ壯實者ニ用ハ害アリ腐熱失苟

兒血脉脆薄ノ吐血勞瘵吐血自汗盜汗皆有良効又健

胃之一良藥也腐敗膽液胃ニ鬱スルヲ除ナ後可用越粟幾失兒必篤里等ヲ加ル香竄劑尤良

Kitasato Memorial Medical Library

胃虚食不進噫氣疼悶脾病子宮病皆有験○揮發清血
飲白帯ニ良験アリ亞爾箇兒ニ緑油ニ三錢合和シ十五六滴宛冷水ニ點服スルヿ日ニ三次○健
胃玟瑰煎收斂清爽ノ胃腸ヲ健運シ鎮嘔シ食ヲ進メ纖維弛弱諸病或因熱病而虚痩者或失血崩
漏流走痛等ニ良玟六錢ニ沸湯三丸ヲ注キ蓋浸一時半冷後去滓緑油半錢ヲ攪和シ一茶碗宛用ルヿ日ニ三次
瘡瘀諸皮病乾癬濕癬多血性疥癬萎黄病様ノ人酸性藥害アリ外敷木ヲ
加綿クシ皮病ノ浄刷收斂剤トス又緑油一錢家猪脂一匁ニ煉和シ貼ス又此精ヲ熱壊疽邊圍ニ塗テ過腐
シ疣贅等ヲ消ス膏口瘡ハ玟瑰ニ加塗○亞的兒ズワーフルアーテル法亞爾箇兒緑油各四
式先亞ヲ硝子列篤兒ニ内レ緑油ヲ一滴宛加レハ沸瀁ノ香ヲ放毎滴振盪シ沸騰止冷定メ後濁大ノ薫鎔
曖ヲ接シ沙鍋ニ入慢火ニ蒸鎔シ其液六設昆篤ニ一滴下ルヲ度トシ列篤兒鎔壜ニ硫質ノ蒸氣現レ木様
條縷凝聚メ滴歴スルヲ透見シ火ヲ下シ煆製麻但涅失末少シ宛加テ振盪シ少モ液動セス硫破臭消スル
二至又列篤兒ニ内レ底ニ一小孔アル鎔壜ヲ接シ慢火ニ蒸鎔シ一廾ノ液ヲ取リ蒸鎔水半廾ヲ加振盪シ

上面ニ浮稀油様液ヲ抄取硝壜ニ封貯○晝夜平分ノ半時ヲ六十ニ分ツ其一ヲ密扭篤云ミニユツトヲ六
十ニ分ツ其一ヲセコンド云主治極テ軽清精微也有鎮痙奇効失氣昏冒心
悸子宮衝逆痙性ノ喘急疫欬神熱腐熱ニ有効精神神経ヲ揮
健ス○揮發壯神飲熱病精力脱シ脉弱者或悪性腐熱等ニ良也諸症寛解スレハ後服ヲ止ム
桂露四匁桂丁幾亞的兒揮發香竄精各一錢調匀毎四分時一匕宛用ニ○亞的囬生飲亞的
一匁麝二氏桂露四錢研和為一服痙攣ヨリ發ル疝痛痛風毒等痛散ノ内攻シ煩悶腹痛等ヲ起ニ良功アリ
船暈諸患單味水ニ點服○收斂亞的兒緑油燒酒等分先酒ヲ壜ニ内油ヲ一滴宛加
和シ固封三日ノ後聽用ス主治收斂衝動シ神經感觸知覺甚シキヲ
鎮定ス激衝及瀉ナク諸管弛弱者子宮衝逆脾病神感甚者肢節各部顫振
搐掣頭旋等ヲ治ス服量十五滴並水ニ沸クシ日三次用○鎮痛驅風メ
殊有験方收斂亞的一錢荷水三匁橙皮舎利一匁阿片三氏鎖丁幾二錢一匕宛日四次用○忽

弗滿ホフマン鎮痛液（苛性亞爾第鹽ヲ製シ製ス今ハ亞爾亞的等ヲ和ス）主治清稀液有佳香鎮痙定痛之聖藥也一切神經病二有奇効（微睡セシメ發汗利尿シ血液ヲ收斂セズ凝固セス擇發竄透シ神經ヲ壯ニシ諸劇痛ヲ止メ鎮痙驅風閉遶ノ失氣鎮ノ上衝セス頭ニ欝滯セス精力ノ虛衰ヲ挽回ス）諸癇（兒）子宮衝逆腸攣急（胃腸ヲ淨ノ用）失氣眩暈癇痿搐掣（硝精若干角精三分一ヲ加）痙性ノ喘急疫咳痛風毒肉攻心腹痛劇痢（兒）腹痛頭痛齒痛結石痛ヲ治ス滯諸症（癌腹嘔吞酸吐逆等ハ十五滴ヨリ）崔亂（腹攣急等肉豆蔻ヲ加用）勞瘵（肺傷ノ）內伏毒頑固ノ不寐三日熱白帶瘀血（有止血効）結石腎痛（結石發黃者ヲ治ス能華爾斯ヲ溶化ス壯結石ハ華爾斯質也）熱煩性感動シ易シ（婦人等ノ）諸症ハ用之有害服量（十滴ヨリ四十滴水等ニ點服）

○越栗失爾赫篤立沃利（エリキシルヒツトリヲリ亞爾箇兒ニ綠油三分一ヲ加ス）主治健胃（神經ヲ宮ヲ壯ニス）十滴ヲ用又肺瘍膿ヲ多ク吐ス（有驗）○蓬蘩鹽（ボラクス蓬砂）法（沸湯ニ溶シ用）研和○蓬蘩鹽（ボラクス蓬砂）法（沸湯ニ溶シ用肺蛔肺吐血ニ禁ス）刺戟シテ欬ヲ增ス○膽蘩（コルペルツトリヲル）主治（綠油各適宜蓬ヲ適宜ニ子筋ニナ頻攪シ液羞酸味ヲ帶ニ至リ冷處ニ置ケハ薄苔ヲ結其剩液ヲ煮上面生膜ニ至リ放冷結苔セシムルヿ再四之ヲ乘シテ水ニ洗ヒ乾シ貯）主治（鐵ニ綠油ヲ製ノ後列ニ洗ヒ汚物ヲ乾カシ貯）主治（鐵ニ綠油ヲ滴カシ固封シ微火ニ乾カシテ固封シ貯フ）神經液ノ欝熱（上衝ヲ鎮諸熱ヲ涼散シ催睡ス）瘋狂諸痙（脾病ノヲ治シ通經ス）服量（為未三仄ヨリ十仄飲液ニ點服シ）

Kitasato Memorial Medical Library

ニ比レハ苛列味少ク酷厲酸性塩硫氣多ク水土氣少
シ故ニ潰瘍腐肉ニ搽スレハ刺痛ス外敷メ血ヲ凝固
シ脉管ヲ牽縮ス明礬膽礬各一錢水ニ二ヲニ溶
スル者能ク止血結痂ス細ハ紙ニ浸シ鼻孔ニ挿
○煆膽礬ゲブヲンドゴープルヒツトリヲール法坩鍋ニテ煆焼シ通紅トシ放冷シ白キトナシ貯フ主
治外用一切出血ヲ止頑固ノ衂ハ水ニ溶シ鼻ニ射注ス誤テ喉ニ溢泄スレハ氣管ヲ
害ス少宛用ヘシ大創ニ多ク搽スレハ藥氣血ト共ニ心肺ニ運行メ瘢腫息肉等ヲ發スル也右數品
皆石膽之屬也
●石灰セルキス性焼而未觸大氣者ヲ生石灰云火氣ヲ含ミ脱酸メ慓烈侵蝕如焚酸液ニ加テ不
沸騰水ヲ注ケハ忽焚碎ス既水ヲ注者尋常品ニノ綫也酸ニ遇テ沸ス石灰水ニメ内外用ノ不侵蝕其生者
硝塩ニ同封セサレハ酸性ヲ復ス凡亞爾加利塩ヲ以製スル藥生石灰ヲ加レハ極鋭烈也急製硇精硇加灰
精覺功逕ノ如シ蠣殻蝌石皆石灰性ヲ含ム主治生石灰製劑ニ用ユ外敷メ腐蝕乾燥シ疣息肉
ヲ消ス傷冷痛髖股痛蜜ニ和シ貼ス醫斑生石灰蛤等分末為青貼シ縛帶ヲ施廿八六

時ニメ腐蝕結痂ス於是拔賓利ニ換テ潰膿セシメ愈ス大斑ハ不數貼ハ不消○石灰水セルクワ
ートル法生石灰一夂水十五夂灰ヲ器ニ入水少宛加瀕ニ攪シ静定六時其間モ時々振蕩シ澄沉ヲ候
ヒ上清ヲ取壜ニ封貼ス主治收濇消酸ノ良劑也下利荏苒者其汚物ヲ
去テ後用ユ乳汁ヲ加甘和シ服則不刺戟衰弱ヲ復シ内瘍ヲ治ス赤痢淋及結石腎痛ヲ若ス冷服
ヲ良トス瘰諸症癌瘡其酸酪ノ四ヲ宛用一日數次其汚液ヲ消量服藥大氣ヲ觸シム可ラ
ズ精徹氣消ス外用不侵蝕稍收澁シ乾燥シ釋粘シ弛緩ヲ收强
シ過腐シ淨掃ス諸腐性瘍疽ノ漏劑トス瘻ニハ射注ス又稀膿ヲ稠厚ニス或緑油サヲ加
外敷ノ壊疽ノ腐ヲ止ム梅毒淋ニ陰頭包皮ヲ洗テ下疳ヲ防又灌腸メ蛲蟲ニ有効
●石鹸サボ又ゼープ製法畧之亞爾加利塩ト油ヲ合煮テ造灰白帶黒者苛烈
不可内服外敷或衣汚髮性効温油質與塩質拖和スト粘ヲ去ルニ用雖庀多ク塩ノ功ヲ為
但油ヲ以塩ノ酷厲ヲ包攝シ刺戟性ヲ抑制體ノ油膩膏ト交和シ鹽ヲ啓導

Kitasato Memorial Medical Library

シ諸器ニ牢着スル膠粘液ヲ溶釋淨掃ス故諸粘凝液ヲ疏解シ堅硬ヲ軟化スル要藥トス酸液及乳糜ノ胃ニ滯者ヲ滌淨ス

小兒酸液諸部ヲ侵刺シ腹痛吐乳發搐者等十五人ヨリ其人ヲ適宜飲液ニ溶シ用又尚水等ニ溶シ用モ良

酸液鬱積於腸發諸患者灌腸藥トシ施肺肝脾腸間膜諸腺ノ壅塞凝結硬腫能之ヲ疏解スル要藥也大黄蘆薈安息沒尼海蘿蔔等苦味質弱健胃藥ヲ加テ良

短氣喘息經久者任冉黄疳脉痛不減或游走者單味丸昼夜ニ一錢薩撒白檀甘草白芷剤ヲ以送下之

痛風熱散ノ腹膜ヲ生シ膿液逆流乳糜ヲ加多量ニ與温湯或乳汁ニテ患部ヲ瀕漏スレハ結石自落シ大便ニ通シ去

腎結石ヲ生シ尿砂石ヲ泄シ淋痛者日三錢升汞製石毒消解皆可用

主治産ヨリ發ル一處ニ頑滯

石鹸膏溶解疏散ノ良藥列並ニ丸剤篤亞斯三丸研和

舍利別ーセイロープイス法ニ淨白糖ノ燁去渣煮テ密ノ稠トス

主治急迫ヲ甘メ滋潤シ粘痰ヲ吐シ易ラシム

美服シ易カラシムル也

石長生舍利別リユスセイロープカピルチリユス法薑葉剉一升甘草八寸水八升煮テ四升ヲ漉シ糖四兩ヲ加テ煎テ火ノ如ク稠ニシ先ツ其ノ半ヲ取リ白礬末一兩ヲ入レ攪和シ次ニ殘半ヲ入レ攪和シ冷ヲ候テ可ク久ク攪和シ其勢ヲ扶ケ服則飲食消化ヲ妨ケス

外用

琵琶葉蒸湯數療皆良

傷冷毒痛髖股痛硬結塊腫乳結核或火鳩ヲ寒腫及汚液滲漏瘡瘍ヲ適宜ニ加シ的列並燒酒ニ和シ患處ニ塗ル

石鹸解凝丸胃痛一處ニ頑滯者鹸四錢失鳩越斯二錢越扶屋布斯安質沒扭一錢乘ノ部ニ出ス乳爾坂奴半膽各半錢右三味ヲ為一丸日ニ四次用ス

石鹸丸主治痛風傷冷劇痛鹸的列並越扶屋布斯密涅剌列各三錢金硫二刃右三味護謨安沒尼孕鹸石ノ丸ヲ為ス一丸朝夕十丸又鹸薩用モ良痛極剌者雙鷺菊越斯阿庁ヲ加或汞剌ヲ加用

Kitasato Memorial Medical Library

以適宜ノ沸湯浸二物一昼夜去滓糖ヲ加煮テ製ス主治胸ヲ開攣急ヲ甘メ粘痰ヲ稀豁スル效喘冒寒諸症ニ攪和シ用テ發汗利尿ス

● 接骨木サムビユキス又フリール 試効花ヲ緩和疏散ノ輕發汗藥稍鎮痙ス冒寒傷冷諸症疾ノ初ニ為泡劑氏煙利或亞的児繭草等ヲ加用ル瘡疹類發シ越シ難キ者ニ良○接花汗解飲接花加密列各一種麗春花等撮四錢為泡劇或一味泡劇或加隨症之他藥○接花驅水飲水腫ニ有峻効接花僅列乙海蔥蜜各四錢為劇末一錢調勻シ一時毎ニ三四茶匕ヲ服ス○接花醋内服ノ發汗解熱利尿ノ胸肺諸病ヲ治ス服量一ヲ二ヲ顆ニ擦ノ頭痛ヲ治ス花六ヲ醋四分ヲ温メ浸シ封シ一四日ニ開ク口諸患加減ス腸諸症灌腸羅斯様腫水腫ニ加密列草零陵香小麥ノ粉ヲ加ヘ温湯ニ浸シ貼ス患ノ消散ス○接骨傑列乙ゲ井ハンフ法末ヲ撹爛シ木リイルヲ加ヘ慢火ニ不住手攪ヲ煮テ四分時温ニ乘ノ絞濾シ其汁十五ヲ二和シ速ニ煮沸ス主治輕發汗ス九熱病傷冷毒劇剤ヲ用ル時ハ浮沫ヲ抄去リ下ス則成レハ血ヲ衝動シ壮熱ヲ起症二四錢ヲ可能蒸發ス肺攣急粘痰緩ヲ三ヲ用不増費熱而能之疎豁ス二膿液腐敗症疫熱羅斯痘麻嘔衝病胸腸病血沸皆可用瀉下驅水効接骨木皮ノ水腫ヲ治ス瀉下之功ス主治瀉下利水● 附 蒴藿ウアリール試効停水ヲ吐瀉ス尤良服量錢ヨリ四錢或去諸藥無効水腫ニ有奇効● 栴那葉ラーデン主治性平而瀉下久腹痛下後無便秘不害胃腸不撰劇疾緩急用之而可也膿熟挺熟連綿症粘稠痰凝結疏解水腫停水膿ノ敗液

Kitasato Memorial Medical Library

或糖ニ加用ス　皷服　苗劑ハ煎精ヲ加為服ス　量一錢ヨリ一錢半泡劑煎トスル一頓ニ多服則費區ヨリ一錢

水一北ニ煮沸シ火ヲ下稍ク後去滓三ヲ宛用ユ　㊀抦那煎便秘諸症及留飲停水等ヲ凉下ス抦四錢酒石英三錢益智二錢

○抦那丁幾　胃痛疝痛ヲ治抦四ヲ葛縷子半錢益智十　○抦那清凉　便閉痞滯痔性ノ寒黏液酸液　氏菊酒四錢燒酒一北浸出藥氣封貯ス

飲ニ主治壯熱膽熱班熱等抦二錢半拘攣皮四匁拘攣汁二錢沸湯ヒヲ藥氣ヲ出去滓覆盃ヲ舍利

一ヲ和每半時一小茶碗ヲ與或林疫或中和塩酸賛驅風ノ孕酸石胡荽子ヲ加テ尤良

●舍謨孛黙謨イチユムペ　形地黄而異也野作ノアライ　バブシ是ニ近　主治用根　性涼滋潤緩和收濇厚クシ酷屬ヲ緩和

シ急迫ヲ寛ム　自酷屬發ル失血　殊血ニ下利赤痢蒋血崩漏脫肛

痛風乾欬肺傷死自酷来者皆可用　産根水煎或為舍利或和物或煉蜜用ユ

●燒酒スピリチユスヒニーエイ　又ブピラリンドウエヒーン　以菊酒及穀類之酒蒸餾

シ製　穀類酒ハ杜賓ヲ加造腐敗ル所ノ再三蒸餾則烈○亞爾箇兒　燒酒社度者五北剥篤ニ置ク十二時數振蕩シ其盞塗ノ田ス如ク之剥篤不溶ニ至レハ北ニ度ノ燒酒ト為ス是乃亞爾箇兒也（）鋭烈亞爾箇兒　如前製スル中エ固製ス磁乾ニ至レハ北ニ度ノ燒酒ハ諸藥ニ加テ具砂一北ヲ加蒸餾スレハ四度ノ純粹ト成製煉主用　燒酒ハ諸藥ニ加テ具以之丁幾去爾ヲ制ス水醋酸性液油亞爾箇兒ニ加レハ能燒酒ニ和ス護謨與華爾斯ヲ兼ル品成護謨ノミ

含ム品ハ常ノ燒酒ニ宜綠油消精等亞爾箇兒ニ加レハ其侵蝕酷烈ヲ抑制ス甘和ノ一種ノ壽効藥ト成禽獣魚之ニ亜ク硝曇ニ亜ク歴百年不腐ニ主治性熱慓悍揮發寓透刺戟ス酊レハ雖

蛇酒亞爾箇兒共ニ殊ニ神経ヲ刺衝シ諸器ヲ牽縮收レ過腐ス液中水ト水液ヲ固シ強壮ニシ血ヲ稠厚ニ除ク外悪收固ス血乳汁ニ及固ス故外欬ノ創血及細ニ有捷動又滴宜ニ服之則神経胃運ヲ健ニシ壅鬱發汗暢ヲ通ス血ヲ強ニシ筋ノ蠕疫ヲ避ケ入山谷者冒寒傷冷毒ヲ免ルベシ食後少用之則能消

Kitasato Memorial Medical Library

化シ風ス禁戒内外用功多ケレ圧安用スレハ害亦多食酸而獲之則適醯收ヲ助ク用ヒ慣テ過飲
スレハ胃腸大攣縮ノ漸短促凝聚麻痺不遂ヲナシ逆發ニ至ル過飲誤用則毒血中ニ混循ノ慓悍トナシ腦
運動靈液分泌ヲ急ニシ精神ヲ亂シ又腦神經ニ盈脹埜自シ昏睡或支體瘻弱ノ患ヲ起ス普通ノ酒ト雖圧
過飲スレハ酒中含有銳烈ノ氣此害ヲ成ス瞳闇翳膜墜淚昏盲上瞼低垂或
弛緩外反者加水稀薄ニ少ノ塘シ有効痛風肢節麻痺及轉筋温メ棉毛ニ蘸
シ蒸遏ス寒粘液咽喉懸壅腫為救藥破䐃トコズレ卯白ニ研和シ塗テ有功乳頭
傷爛臨月前ヨリ日々之ヲ擦テ免此患

●消痴露コレイキスピリチユス法桂丁子豆蔻茱沃剌那各四錢胡荽一ヲ焼酒廿二ヲ兩水六
ヲ浸ノ二日蒸餾ツ廿ヲ取ル主治腦心胃ヲ健運シ粘液寒氣風氣蛔ヨ
リ起ル心痛痞滯腹攣肚脹等ヲ治眼暈一錢ヨリ四錢飲液點服

●清涼飲ニヲ匕ウム總テ合服スル飲劑ヲ云○尋常清涼飲水八廿煖皮苓利二

ヲ解毒精一廿調匀ス○解毒精ハ亞鉛除下解毒ノ藥ヲ焼酒ニテ蒸餾スル者主治健胃驅風
發汗利尿九散送下ノ飲液トスルニ良○龍亞清涼飲龍一錢蕤蘂四
六ヲ右龍ニ火酒ヲ滴ノ研末シ亞二水四錢ヲ加溶シ龍ニ和シ糖ニ醋サ宛加溶ノ合和主治疫熱
腐ニ用發汗解毒ス衝逆等龍腦之可適當者有効○麝香清涼飲麝半錢荷
水二錢桂露二ヲ揮發香竄精二錢糖四錢右麝ニ糖ヲ和シ桂荷露ヲ少宛加終テ香竄精ヲ和主治神
熱呃逆癉搐諸症一時或一時半ニ二匕宛○壯神清涼飲桂露四ヲ丁香浸水
蒸餾者二ヲ揮香精剌賢垤児精各二錢橙皮舎利一ヲ右攪和二匕宛用一日三四次主治虛羸精
神虛衰沉惡失氣昏瞶○驅熱清涼飲酒石鹽二ヲ橙汁三ヲ荷水一ヲ舎
利一ヲ水二ヲ右汁ヲ鹽ニ和ス二和シ沸藩止後他品ヲ和ス主治熱毒ノ惡心乾嘔ヲ治蒸
氣及汗ヲ發シ凉解ス嗽症諸有効○和胸清涼飲蔥蜜二ヲ蘐四姓諳安没乳
ヲ調勻一匕宛二三次○蕤讃安没乳方蕤讃安没二ヲ錢糖一ヲ水八ヲ右二品ニ少宛水ヲ加研磨溶和スニ主

治粘痰ヲ豁シ吸喘ヲ治シ胸中壅塞ヲ開ク

●攝綿施那（セメンナン）主治性温苦殺蟲聖藥也腸ヲ健ニシ驅風シ蟲巣粘汚ヲ除ク腹内有燃衝者ニハ有害大黄芍栴那等ヲ加用或藥煎尤良服量藥銭弱兒ハ一茶七ヲ舎利或熱ニハ日一銭ヨリ四銭加香竄ニシ用ス○驅蟲昆設爾弗（便ヲ通シ蟲ヲ下ス）未一刀ヨリ一銭白蜜一ヲ半調匀兒ハ毎一時半一ト大人ハ增加ス或撒爾末兒ニハ毎一時半一ト發スニ銭ヲ加ヘ蟲ヲ下ス攝二銭會北癲ヲ治ス○攝絲驅蟲散頑固ノ蛲蟲ヲ下ス攝二銭會北人ニハ十二分チ一ヲ為散六ル撒爾末兒煅テ為白色者ニハ日ニ三次隨便多サヲ加ヘ完用ス○

●攝爾扁荅利亞（曼生灌木也或草）主治根性温輕ク衝動ス（盧玲ヲ温脳精力憊極ル神經ヲ強ス精細數無進定脉細者熱病虚弱毒未排泄者熱三日惡性熱盧

十瓜ヨリ半銭數用テ有大功或ハ加フ○惡性斑熱麻痘（盧弱加幾）難發者（壮神劑消夫劑丁幾ニ加）惡性熱ノ遊走痛（龍迷迭香ヲ加）間歇熱（加那散）不逐皆可用服量（散半）或神熱腐熱（兒荅刺及角塩ヲ加）寒粘質昏睡癖（内外並施）水腫承閉（内服腰脱邊ニ際）十五滴ヨリ二十滴迄一日三回食前之ヲ用ヒ必下ル無嫩候者良○魏脳掃蟲飲（驅蟲峻劑也脳油半銭魏丁幾式調一匁宛白湯ニ點服又若不下者翌朝此臭者後方ヲ用ス）○魏脳掃蟲丸（脳油二銭魏三銭健質末適宜ヲ一丸トシ一時ニ三九宛用ス○條蟲者月ノ下弦ニ脳油并ニ滴ヲ以水一次ニ服三日連用ノ後用下劑則隨便ヲ下若不下者翌月

●石脳油ヲーリイ試効（緒末如塊赤黯黒色油）竈透刺戟ス風強壮（稍釋愈）創有驅蟲之峻効（細五滴迄一日二次隨意）宛飲條蟲八十滴迄或擦臍邊痛風

Kitasato Memorial Medical Library

● 茵草メーカラプ（用根）　性温味帯苦收濇解凝利水（肝脾腎）
宮ヲ浄刷ス水煎或泡劑（為丁内外）　黄疸水腫腺腫（疏解打撲創傷）　有効ス（服之乳汁及骨ヲ赤ク染骨ノ害ス）　尤骨病（久服則有）
○茵根煎二錢（向僂病長服茵蔯皮十匁）　面十五匁水六匁二煎為二服量トス小児諸骨軟疼痛（定ノ上清ヲ取一日ノ分ヲ分ケ者長服而有効或加）
○葵或乳母（経閉為末日半錢ノ如キ攻泄ノ害無ノ有効）　用可（経閉為末日半錢宛用ル可シ四五次漸増シ）　次至一錢餘

● 青蒿アルテミシヤ（穂）　試効（葉）　苦味香竄（微收濇）　疏解浄刷利水發汗殺蟲ス（粗如亞爾鮮）　経閉痛風處女病（蓂白帯肝脾壅頑滞黄）

ノ間歇熱黄疸（為ま服等ニ良）　灌腸（殺小児蟲）　貼腹（小児蟲症）

● 清涼子フルクレンシ　清涼滋養ノ効有ヲ仁胡瓜子甜瓜子西瓜子壺盧ユウカラ（冬瓜子越瓜シリ子モ可用）　四種清涼子云

為乳劑用之則（扁桃大麻子亞麻仁ノ如シ）　無血中厲液ヲ包攝（甘和）シ刺戟（由是）ヲ減シ熱沸ヲ制シ神經毀傷ヲ和撫シ攣急ヲ寛ム

（涼潤シ蒸發利尿ス）　肺傷勞咳内伏熱ニ有良効　附○乳劑メルキランカ

● 即乳様飲液而効如乳汁法（前舉ノ仁ヲ石臼ニ入レ加為甘美ノ乳劑易渡敗）　沸湯若大麥煎ヲ少宛加ヲ芍藥子胡桃子モ可製（搗爛シ以布濾去滓適宜雜ヲ故ニ新製ヲ可用罌粟子榛子）

● 催睡乳（甘扁桃四粒去皮四箇罌粟）　清涼子二錢白（清涼子十二錢）　○治勞乳（清涼子十二錢甘扁二箇搗爛）　液用（如乳汁蓋閉一時許時々攪シ加糖濾ノ貯臨温テ用ユ）

子一錢半ヲ以為一服臨卧用　十五滴ヲ增加為一服臨卧用　○蘇甘汝扣謨ス（ホヒルガホウム長藤苗ヲホヒルガホ類ス比ニモ能瀉下ス）

洞庭蘭一撮連錢草半握ヲ沸湯ニ浸シ去滓適爾試シ舍利四錢ヲ攪和シ併テ再搗爛シ濾過シ毎朝空心　白乳汁モホ能瀉下ス）　根ヲ加ヘ煎

毎夜臨卧用　○乳舍利別製スル総稱

Kitasato Memorial Medical Library

汁ヲ曝乾者主治性熱峻下劑也留飲停水粘稠液膽液惡物ヲ瀉ス

結液水腫胸痰喘鳴惡液鬱積病腸ノ運動急慢ニメ諸液粘滯者及條蟲ニ効アリ服量四瓦ヨリ十二

瓦咽喉腫等可峻下者ハ十六瓦ヨリ一刄單用スレハ瞑眩甚シ加糖或甘草煎ニ和

●斯百兒麻攝的スペルマセツテ加失碌篤広鯨吾邦ニ真甲鯨ノ腦髓ヲ取粘汚ヲ洗去白片ト爲ス者若色味ヲ變敗スレハ暫燒酒ニ浸洗エハ潔白柔脆ニ復ス主治軟化柔緩ニ諸

管攣急ヲ弛メ潤燥シ凝結ヲ融シ酷厲ヲ甘化シ止痛

ス劇咳厲液侵剌肺者喘肺傷ニ有捷効內部瘍腫ヲ愈シ凝血ヲ散腸攣痛產後腹痛

尿器攣痛兒腹痛等酷厲剌戟ヲ寬解ス服量一刄ヨリ二刄適宜飲液ニ和シ用否レハ發嘔ス或蘋藷ニ和

卵黃糖等ヲ以乳汁ノ如クス○斯百兒膏乳汁過多乳房腫結或乳頭毀潰ニ良斯百兒半比白蠟

家猪ノ脂各一比以文火製此品陳敗スレハ有大害

水銀クウイクシルフル純汞煅煉ヲ不歴者汞礦顯赤色彩帶汞質重メ有硫氣者朱砂

汞鉛色鈑堝粘潤者軟石礦汞共ニ製煉術ヲ以テ汞ヲ分汞汞質粹鑒法汞ハ多ク物交雜ス其

鉛物者光瑩美白如銀流動如水紙上ニ運轉メ濁色渣滓ナシ醋ニ研磨メ有甘味者含鉛也銀匕ニ內レ文

火ニ上セ無爆聲盡ク蒸散者上品ナレ圧仍精製メ藥用ト可爲精製法夾雜氣或大害ヲ爲故ニ必ス

須精製○土質交者鐵格爾弗ニ內レ爐ニ上セ蒸餾壜ニ水ヲ盛接合シ蒸餾スレハ汞ハ壜水中ニ滴留ス○土

質多ク交者草ニ包テ絞濾ス○曬醋ニ海塩ヲ溶シ以テ之ヲ晏淘此レ醋サモ不濁ニ至リ以草絞濾ス○

剌篤亞斯若ハ石灰ヲ水ニ溶シ以之晏淘洗汞性走竄揮發流動如水ナレ圧性揮散メ無量數

ニ分折ス火ニ置ハ烟ト爲升散スレ圧不變體試ニ草ヲ潤シ其烟ヲ覆片ハ悉著テ細珠ヲ爲升汞降汞ニ製

スト雖圧不變體汞ヲ胡荽子大程ニ磨碎シ以顯微鏡ヲ覽レハ二千七百万粒也重量黄金ニ亞水ヨリ重

一十三倍噏引力平滑盤上ニ迸動奔散スレ圧有微塵則忽相聚テ爲一體是噏引力也凡流動物中汞

最此力多シ然圧其體微細奔流メ不能爲堅剛體溶解消化消精塩精綠精醋草木酸液ハ汞ニ混溶

ス而硝石綠礬亞爾加利塩ハ不合和硫ハ殊能ク和ス有硫氣諸品及海塩ハ稍汞ヲ凝固メ消化ス汞毒

Kitasato Memorial Medical Library

服之則諸脈神經ヲ刺戟メ釋ノ壞ト為シ誘窶ニ渦一種ノ熱ヲ起シ血液ヲ烊一シ泄ス殊ニ唾管ニ溢テ止遂シ頸ヲ腫ス故誤用之則神經ヲ損シ諸筋攣引メ支節顫振拘強麻痺血液溶崩漏汗大下利等ノ惡症ヲ發シ充張力衰頑ト為ル禁戒血液稀涼酷厲壞液或安用之

促死

血虛失血脫疲失苟児用梅家ニメノ有右諸症者先對症藥ヲ與治ノ後可

性効

古来無確實說竟可否ヲ分析スルト圖體ヲ為ト也以此疑流二體ニ

滑利寬行ノ緊解疏釋ス故ニ粘滯スルヲ容釋スルヲ以テ是動脈運輸血液充滿ノ活窶ニ由テ之ヲ推轉シ細管ニ分排ノ衆ト共ニ毒ヲ諸排除スルヲ以モ腸腺ト唾腺エ膠稠液ヲ出者ハ此兩

主能脈管ヲ刺戟シ粘凝液ヲ諸竅ニ分排シ

細管ヲ疎シ粘汚ヲ容レ遠キ未ノ細管ニ普遍ス故肝脾腸間膜ノ腺壅硬結頸瘰等ニ有効

水腫

凝

唾ヲ湧起シ發汗シ二便ヲ利シ梅瘡類ノ根荄ヲ絶滅ス

梅瘡ノミナラス頑固諸病ノ惡液ヲ稀釋シ肉臟壅塞ノ閉塞シ腺水脈諸病膜堰腫經久流走痛粘質ノ傷毒兼燃症皮膚病蚘犬咬毒眼疾無シ

肉臟壅塞腺腫

諸腺

水腫

凝

細管ヲ疎シ粘汚ヲ容レ遠キ未ノ細管ニ普遍ス故肝脾腸間膜ノ腺壅硬結頸瘰等ニ有効

水腫

凝

驅水丸

和至無星黎粉適宜研三錢拔爾撒的列並適宜研ヲ加エ三仄ヲ一九トシ夜ノ吸力ヲ以テ凝體ヲ刺戟シ壅滯シ有峻功ハ水腫ニ有速効水銀ヲ發ス

殺蟲

外敷内服共有効小児蟲症生汞ニ仄ヨリ大黄下ヲ用ル可知蚘ニハ無効

皮膚病

皮表細管膠粘液ヲ容解兼用

皮膚病

二丸ヨリ七丸迄用翌朝以金雀花杜實白芥煎湯劑之排除シ血液ノ腐敗ヲ化スル故一切皮病ニ内外施用ス然レハ鎌瀉血シ且下之或清血

一錢迄可用雖甘扁桃油少ニ入ル一時半其水ヲ三ヲ加研シ用或一ヲ半水ヲ煮ノ飲料トシ殺蟲ス純汞ハ

剌ノ用否則内攻ノ恐アリ後川用シ峻室ニ保護シ蒸氣ヲ以テ熏ヲ塗リ熨ヲ以テ故用ヲ以帥湯緩弛シ導泄メ時々下之驅除シ

大便閉

尿ヲ泄ス

諸獸咬毒

毒ヲ發スヘシ

一錢迄可用雖甘扁桃油少ニ入ル一時半其水ヲ三ヲ加研シ用或一ヲ半水ヲ煮ノ飲料トシ殺蟲ス純汞ハ

大便閉

尿ヲ泄ス

諸獸咬毒

毒ヲ發スヘシ

汞ヲ無色味且以其重量與剌戟性腸ヲ衝閉シ滯ナ量減ゼス腸無燃衝者ニ三式ヲ頓服ノ無害若腸ニ滯レハ大便ヲ屢シ壞疽ヲ為慢ニ用ルハ雖内服外敷ノ者ト勿論ノ獸咬毒ヲ痊癒發狂ノ有咬ノ毒ニ由テ血中ニ入リ毒ト共ニ排除シ再發セス其ヲ海塩合水ニテ創ヲ洗創及近傍ニ汞

Kitasato Memorial Medical Library

膏ヲ擦ク日ニ二三次或ハ拔毒貼シ縛帶ノ長ク潰膿セシムル可シ若飲液難服症狂甚者護謨生汞ニ龍麝麝魏或阿片ヲ加ヘ丸用テ有捷効或擦汞膏ニ三周吐瀉セシメ且瘡ヲ一月間分不愈モ良也○瘍地咬ニ際汞膏護謨吐シ服而可救治其危急吐瀉ヲ以テ規ヲ健質越斯ニ研和シ服ス梅其他ノ病ニモ有捷効ト雖モ汞ノ熏臭ヲ嫌フ者ハ先ツ生法ヲ施ス法ヤ先ツ生茯苓薩撒剌倔及下劑ヲ投シ且發温浴シ脉管ヲ弛メ血ノ粘綢ヲ釋シ飲食ヲ節セシ内服吐涎法甘汞尤モ切實而無害丸散煉其宜ニ隨ヒ甘汞五八ヨリ十八ヲ日兩三次吐涎ニ及ヒ休之而大麥煎ヲ與ヒ吐涎ノ量晝夜二三四升迄三五六回連綿せシメ諸患去ニ至ル可シ若涎止而病仍不痊者又前法ニ由ユ用ス更險症ト雖モ已ナラス吐涎少則外敷吐涎法此効速也腓踝ヲ爛ニ温メ汞膏一ヲ毎日一頓ニ擦布片ヲ温メ又法初日睡膝鼠蹊ニ塗二日緊附片二錢ヲ三日ヲ初日ヨリ吐涎試効梅瘡潰瘍下疳便毒淋骨疼骨腫其他頑險諸症諸液膠粘スル頑症惡厲疥癬經久傷冷痛水腫胸水黏腫腺腫瘰癧内藏硬腫黒障眼障眼翳初發諸獸蟲咬毒經久潰瘍皆多泊驗吐涎患害吐涎ス一種稽留熱ヲ發シ口燃熱ヲ面腫ヲ浮窪シ或脱落斷類唇舌痛爛口臭齒牙搖動シ難睡則粘有是汞各部ニ聚着ノ遍血液ニ不融和也○一試法吐涎ノ初黄金ヲ掌ニ握レハ四分時ニノ淡白色ト為數多ク發惡不良法也

先下之ノ四五日血

臭不可當ト

梅毒擦汞法

兩便ニ排泄ス故ニ汞憊勞ノ症無再發之患ニ魚危ノ家ハ朝夕半身浴シ擦前四五日ヨリ擦中モ浴ス長ク坐スルヲ良トス疲勞難堪ノ人ハ一次又症剥者一日一次ト雖モ汞ノ擦法ス孕婦ハ浴有害ニ非梅者多用之則吐涎唾其ノ吐涎ニ排去スト然ル後ニ混ノ汞不吐涎梅根治者不少ニ加研三日許スヘシ汞其ノ家猪脂油ニ研スヘシ汞其ノ家猪脂油ニ沉カ故也

温爆室ニ居キ病ノ輕重ニ隨撒爾弗一

Kitasato Memorial Medical Library

錢半ヨリ二錢ヲ初日遍左脚ニ擦シ二日ヲ隔
又遍右脚ニ擦又両三日ヲ隔テ左脚ニ擦二三日ヲ隔テ
右腰次ニ左股鼠蹊次左腕肘臂次右腕肘
臂ニ擦終リ復初日ノ部ニ還逐次ニ擦テ大抵七八箇
月ニ至リ諸症全治ニ至ルモ可シ手ヲ温メ擦ルヘシ擦
後半時餘臥蓐シ可避冷晩間石鹸溶湯ヲ以テ膏ヲ可
洗去蒸気ヲ通スヘシ此法夏月多効小児虚人孕婦等常法ヨリ
ノ卸テ毒淺者三月ニノ間日ヲ多クス可シ否則吐ヲ
根治セス毒深者三月ニノ治スレハ或云汗下剤ヲ數々與
効サ飲料ハ大麥煎加乳汁或蘆根蒲公英或朴
乳汁鶏卵及易消化蔬菜薤白等ノ煎劑食料穀類
禁ヘシ全治ノ後數下之漸常食ニ復ス愈后不戒食
而死者甚多初生

兒遺毒ハ生母母乳ニ此法ヲ可施十歳以上ハ直ニ施ス汞ニ易感
者或吐涎若爾則擦法ヲ止メ再下之膏ヲ洗去ス汗診
ヲ更ヘ脉強盛十ルハ刺絡シ半身浴シ無吐涎ニ至テ復タ
漸擦又吐涎而治スルヲ以テ今世不准ス
二增量ノ稍吐涎ノ候ニ至ラサレハ効不切實
諸症愈トモ一點態液遺滞則不根治宜用意
升汞
ソウトシユ法水銀四ヲ消石精適宜海塩炒乾者為末
ソクヰツク法膠礬煅過為白色者各五ヲ右汞ヲ硝曇
ニ入消精ヲ適加シ汞ノ消化ヲ度トシ沙火ニ徐水氣
ヲ蒸散シ乾白堀タルニ至塩礬ヲ加白ニ研和長頸瓶
上ニ壜ノ半ニ充テ沙鍋ニ入レテ蒸氣サモ不升ニ至リ
底ヒ漸ク武火トシ曇底涌紅ニ至ヨク升昇シ了テ放冷シ曇ヲ毀テ
底ノ赤塩堀ヲ除キ其白光晶ヲ取リ貯フ毒極テ酷烈
対數息肉硬疣贅肉等ヲ消ス經久一二人ヲ主治頑固梅毒諸病
内服ノ所觸ノ度ヲ侵蝕ス
内服ノ忽口咽胃腸ヲ傷潤シ結茹ス阿片少ヲ加ヘ和ス
消シ腐肉ヲ脱スルハ
無剤痛而消ス腐藥トス

末ヲ糊丸トシ服ス硬膏ヲ攃ヘ正中ニ穿孔シ其孔内ニ點ス升汞礜石内服毒油脂類或乳汁
ヲ多用テ吐セシム○甘汞メルキユリウスドルシスシユブリチウス法升汞一匁水銀九匁
先升汞ヲ臼ニ入銀ヲ加ヱ亞爾箇兒少許滴シ研和シ無星黒灰色ト為ル漸熟研スレハ帯白色緩和性ト為ル是ヲ
ヲ頸闊ノ短壜ニ入レ三分一ニ充以紙ヲ塞口沙鍋ニ内レ文火ニ煮一茶頃磁器蓋閉シ漸大ヲ増シ半時餘ニ
メ為武火ニ變シ升煆スルニ至放冷シ壜ヲ毀シ升着堅固ノ晶ヲ取リ為末一倍水ト比二分一ノ硼砂ヲ加研和煮了
八分時其水ヲ傾ケ去リ又蒸餾水ノ沸湯ニ洗下二三次試少ヲ分石灰水ニ投黄色或白淀ヲ見了無ニ至ル
其末ヲ微火ニ乾シ貯フ○升汞ヲ三回升煆スルヲ甘汞ト云六回スルヲ加魯免兒ト云九回ナルヲ扑那設亞ト云
主治比升汞則緩和輕ク瀉下シ膠粘液ヲ溶釋驅泄シ
治梅ノ良劑也發汗劑ヲ兼用メ珠ニ良諸内攻獸咬毒ノ癲狂咽喉
粘液腫瘰癧節痛蚘皆有殊効大人一二匁ヨリ五六匁時々下之吐瀉ヲ防兒ハ
半匁ヨリ一匁苦味越幾斯ヲ加ヘテ為丸癲癇症自蟲來者幾那ヲ加エ為煉藥用テ有効○驅蟲

汞錠甘汞蘇甘没各一匁半糖二匁二護謨撥適宜研和シ汞二匁ノ量ヲ為一錠一二歳兒日一錠大人ニ
三錠宛用○驅水甘汞散治水腫汞十二匁糖四匁和為三服毎時一服藥劑巳腊一二匁ノ加稍
止瀉ノ候ニ至レハ之ヲ下ス服量蜜或糖ニ和シ或煉膏散丸適宜飲液ニテ用過則吐瀉ス故時々下之
防之一二匁ヨリ六七匁或十四匁ニ至ル兒八四分匁一ヲ糖ニ和シ用或一錢ヲ為八十九毎三四日年數程
用殺蟲ニハ毎日二丸梅家諸症甘汞一匁ニ蚺石末ニ加日一服或一匁糖十匁ヲ吹嚏藥トシ頭
痛ヲ治ス梅淋大麥煎ニ溶シ注瀉尿道痳及悪性潰瘍軟膏ニ加研シ貼又以此劑洗モ良
瞑眩高燥地人ハ少卑濕地入ハ反之但緩性ナル故深重梅毒ヲ不能治也○加羅蔑兒カロ
ーメラス法甘汞細末硝壜ニ内沙火ニテ升煆六七回ヨリ十回精亮白或帯黄浸蝕味去石灰水ニ溶メ黄
色タラサル者主治性尤緩瀉下ノ效減メ發汗力多梅諸症虚弱難堪峻攻
者二的應ス腺ノ壅結瘰便毒淋等梅ニ非ル右峯ノ諸症及肝脾腫等ヲ消解痳悪性頭
瘡經久瘍諸蟲皆的治ス諸藏誄崇壅塞微重長服噎塞多ハ胃管胃腺頑硬ニ因

故用之有効　内障　経久諸眼疾少宛用之頑固痛風刺已等ヲ去ラ膜管ノ悪液凝塞ヲ宛用テ頭水内服之汞膏ヲ外擦メ吐ス

加用　病腹痛　痙ヨリ發者軽量ニ可用　氷瞳　能利汞ス

瀉セムレ　血中悪液　金硫等分ニ用也　服量六氏ヨリ十二氏為煉

藥臨卧テ眼之翌與下劑此藥二三人ニ龍サヲ加用レ

ハ汞カヲ啓導メ細管ヲ竅行ス前擧諸症殊ニ勿有リ

○白降汞　ビメルキユリスペレビタルチウスアルビレシ法　氷銀二ヲ消精適宜汞ヲ右器ニ入精ヲ滴加シ汞溶化シ液澄ニ至水ヲ加攪和シ紙ニ慮去金別ニ餾水二十分一ノ海塩ヲ加ちノ液ニ滴

加スレハ忽濁テ汞沉為白末ヲ傾去白末ヲ水洗シ無鹹酸味ニ至陰乾シ封貯

生治　比赤降汞則緩然氏吐下ス梅毒用殺蟲シ細管腺ノ

及粘液病ニ仏ヨリ十氏為丸

○赤降汞　メルチユスリユブレシビ法　適宜汞ヲ滴加シ乾白堀タルヲ研ミ給ヲ為ル

瘵塞ヲ達ス外用　一錢ヲ弓ニ和ス膏微侵蝕乾燥ス疥癬頭瘡等適

蓋ヲ為度磁鍋ニ煮熬ノ如ク増セハ清澄殷紅ノ堀ト為ル

生治　合酸而侵蝕ス　梅毒日服一二氏有良功是ニ焼適ハ瞑固候結毒半長ヨリ二脈沙ヲ熟ノ焚テ三四回スレ火ヲ為蝋燭等ニ用ル

○安質赤降散　硇砂蝋茯苓各等分研和者能消化ス

○黄降汞　チユルペチウムミヲ滴加シ爐火上ニ四ヲ昇ニヲ蒸飲シ混和シ白色ト為テ弐火トシ乾固レハ是ヲ為ス微量用ル之無瞑眩

梅毒侵骨者　阿片等分二仏ヲ梅畢丸腫自倦

水腫　其他經久沉滯病大効　服量一仏ヨリ二仏

○黄汞驅蟲散　黄汞

Kitasato Memorial Medical Library

五匁鉛剌二匁蛤一匁研合為五服朝夕下服 ○越扶屋布斯密涅剌剤 生汞破華筆分
白ニ入水少ヲ滴加熟研無星為黒色者 主治 性不酷烈無臭味乳糜管吸収管ニ滲入セス血中ニ運輸セ
ス故止涎 不加下劑而能瀉シ加汗劑而能發蒸ス殺蟲 四匁ヨリ
八匁日兩次單用或加攪綿糖兒ハ一匁ヨリ二三匁四五日ヲ間ノ之ヲ下ハ尤良 悪性瘰癧頑腺
結腫悪性瘍頑皮病 四匁ヨリ十匁若二匁加糖用 痛風 傷冷毒痛 痔痛 日十五匁
ヨリ二匁以之發蒸瀉ス毎四日宜兼用他下劑 通服量 大人六匁ヨリ十匁兒ハ臨卧二匁ヲ用翌朝可下
之 外用 下疳便毒水棉樣瘍成搽シ或軟膏ヲ加貼ス ○斯微甸「スウイデ」オ藥酒方
升汞十二匁焼酒二升ニ入テ用レ固封シ汞溶化盡ニ至 主治梅諸症 斯微甸氏始製之不吐涎
而奏良効強實者ハ毎次大參煎一味汞量三匁ニ用テ良服法 水煎シ甘末ヲ加ヘ濾テ根ニ二服
又王伏薩撒剌若煎等ヲ飲料トス輕 多 蒸氣ヲ發セシ 者ニ周ニノ治沆固ハ一二手可連服
卜設者 劑一多劑ハ汗ト承トニ排泄ス 龍六匁ヲ研和ス此 守食禁起居避冷氣

則効最速也 兒孕婦ト雖モ用之而無害 ○溶汞舍利別 アリ法 升汞六匁ヨリ十二匁水二升ニ攪和シメルキユリヲ スリ 紙ニ濾シ盆舍利別適宜ヲ調和シ貯フ 主治悪
汞氣者ニ用ズ 朝夕三錢宛參煎一碗ニ和シ服此味ヲ嫌ハ四錢宛日三次用ユ且七日ニ一回
宼可下之 ○護謨規吉 精製水銀一錢護謨二錢大黄舍利半錢石臼ニ熟研シ星ヲ不見ニ至護謨ハ
汞ト能ク合和ス故ニ血ニ入テ疑聚セス唾腺ニモ沸ラス 全身ニ迸流シ全効ヲ奏ス然ルニ汞精ナラスレハ研和密ナ
ラサレハ又疑聚ス 主治 布連後ナル者始製此劑 用梅毒不吐涎奏殊効 老人小兒
孕婦モ可用 妊娠 内障 腫 眼翳 膜 腺 腫 瘰癧 悪 瘍 腐肉 頑 癧 瘡 皆 有殊効 狂犬
諸蟲獸咬毒 内服 外敷 服量 日汞量一匁ヨリ二三匁為丸錠或舍利別ニ和用兒ハ半匁ヨリ
一人○服中癢粘歛ヲ多服シ可 ○規吉斯麗護謨 温浴シ避冷飲食ヲ慎ヘシ 井クスレイキ
ハ法 汞一錢護謨三錢罌粟殻舍 主治 觸知其梅毒潰瘍 利四錢石臼ニ研和至無星 キ部ノ
劇症ニ外敷ノ有捷効 以水或乳汁稀クシ梅 口咽齊爛ノ漱藥トス 家汞道瘍

注入ス

○華涅満（公ノ子ン）溶汞散

汞四分消精六分錫水二分静定ス白晶ヲ結ブ所汞ヲ少宛加エ溶カシ化シ又錫水五十倍中ニ撒乾シ又錫水ニ滴々ト徐ヲ去ル上清ヲ傾ケ燃セ硝加灰精ヲ撒乾シ冷定スレハ白晶ヲ結ブ所汞ヲ少宛加エ溶カシ化シ又錫水五十倍中ニ撒乾シ冷定ス二回封シ主治ハ梅諸症潜伏頑滞険悪諸症偉効有ル事ヲ実験ス

○規吉撒爾弗リアン（ヨリ）

一眼日一二滴ヲ為シ一服量四分ヨリ半分ヲ一日一二回服ス漸次ニ増加シテ一味ノ境ニ及フ一味ヲ吐泄ノ度多ク少シテ体重ニ随テ増減ス

痛堀腫擦之潰瘍及水棉様瘍敷之破腫眼角膜斑黙翅肉黙之頑癬乾癬禿瘡癌瘙痒朝夕擦之腺硬腫瘰癧九右症ニ擦シ

○芙蓉銀龍膏（汞阿龍各一ヲ）

八汞氣鑽透シ蒸發シ且血一両便ヲ利シ毒ヲ驅或加硫黄ヲ的列並三錢家猪脂適量ヲ研至無星ヲ主治梅ノ畢丸腫便毒等腺腫之

○汞帯デゴル法（汞一ヲ右ノ卵白一ヲ研和至無星泡沫ヲ為ス者緻密布條ニ塗乾シ漸テ縫ヒ合ン腹帯トス）

主治疥癬悪瘍ヲ愈シ且殺虱ス（汞ノ量ヲ多ク乳汁ヲ用テ甘製ノ梅家ノ法過用吐涎不止血液溶解神經衰者軽ク下之或護謨苦乳汁ヲ用テ甘草末或煎ヲ単用シ或土伏煎ニ加用テ汞毒ヲ解散ス）

血液燥崩壊者幾那丸服ニ由テ疲贏甚者幾那劑又服ニ由テ疲贏ヲ一方ニ去ル（石灰一処硫一処半ト密扭篤ニメ取出為末ヲ合和坩鍋ニ固封シ焼テ六ヲ為一服日二次或酸味液ヲ服ス）

○汞解毒法（軽ク下之或護謨苦乳汁ヲ用テ甘草末或煎ヲ単用シ或土伏煎ニ加用テ汞毒ヲ解散ス）

神經衰者軽ク下之或護謨苦乳汁ヲ用テ甘草末或煎ヲ単用シ或土伏煎ニ加用テ汞毒ヲ解散ス）

○汞帯デゴル法（汞一ヲ右ノ卵白一ヲ研和至無星泡沫ヲ為ス者緻密布條ニ塗乾シ漸テ縫ヒ合ン腹帯トス）

主治疥癬悪瘍ヲ愈シ且殺虱ス（汞ノ量ヲ多ク乳汁ヲ用テ甘製ノ梅家ノ法過用吐涎不止血液溶解

神經衰者軽ク下之或護謨苦乳汁ヲ用テ甘草末或煎ヲ単用シ或土伏煎ニ加用テ汞毒ヲ解散ス）

血液燥崩壊者幾那丸服ニ由テ疲贏甚者幾那劑又服ニ由テ疲贏ヲ一方ニ去ル（石灰一処硫一処半ト密扭篤ニメ取出為末ヲ合和坩鍋ニ固封シ焼テ六ヲ為一服日二次或酸味液ヲ服ス）

○朱砂化メ（朱砂ヲ小ン）

主治殿赤堀片銀様光彩アリ其重法ノ如ク末ヲ為シ一ル日ヨリ半年経ル者可為薬料ニ非ス）

癇癇搐諸筋急攣眩冒發狂喘急（腦神諸蟲病

Kitasato Memorial Medical Library

半匁迄為一服　或云硫汞融合而成非汞非硫無臭味不刺戟水醋酒ニ溶ス服之不和乾血液故内外共無功ヲ皆シ（但大量ニ用ルトキハ汞ノ性力ヲ逞發ス）

○水楊梅根ナーゲル試効用辛温芳香收濇神經心胃ヲ強クシ纖維ヲ固メ治疝驅風ヲ稍發汗利尿ヲ又鎮痙ス神熱腐熱間歇熱帶及瘧血諸失血瘰疬梅瘡ニ有効服量末半錢ヨリ一錢（那ノ症經久利赤痢虚崩ニ効アリ）一錢ヨリ一錢半（牡神之良藥也）幹大枝及根皮ヲ取乾シ用（性酷蝕過用スレハ嘔吐ヲ發シ又堕胎ス）

○瑞香メゼレウム和夏坊主又ヲニンパリ（兼入夜）八ノ下ス燃試効煎服發汗利尿梅ノ骨痛潰瘍痛風梅入夜痛劇者骨腫骨疽等有効服量半錢ヲ水六丈ニ煮為四分ヲ一日ニ漸服（初半錢ヨリ一錢ニ増用若瞑眩則酸性藥ヲ與ヘテ救ヒ此藥少量ヲ奏効）

○瑞香發汗煎（前諸症ニ有効瑞香ニ甘草ヲ加ヘ水十六丈ニ煮為四分ヲ一日ニ漸服）

○瑞香解毒煎（瑞香一錢半泉各一錢山午根二錢）

○瑞撒爾午甘煎（瑞香ニ甘草ヲ加ヘ水十六丈ニ煮為四分ヲ一日ニ漸服）

○瑞撒爾午根甘草煎（瑞撒爾午根甘草各二錢以水十六丈ニ煮為四分ヲ一日ニ漸服）

○瑞撒爾午痛風皮病等ヲ治ス瑞撒爾午根甘草石膏味水煎ス

○瑞香煎劑八梅毒諸症及腺腫諸硬腫ニ用テ解凝ノ皐藥也外用侵蝕發泡化膿スル効先ツ生皮最良乾皮ハ醋ニ浸シ形ト為シ硬膏ヲ蓋貼スル感鈍質人ハ先ツ膏ヲ施シ而後可貼頑固頭痛眼疾聾久咳腰痛脚痛遷延經久者皆可試効ス

●睡菜ワートルデリーブラ（睡菜和ミツヅカシワ）味衝動シ如括失亞健胃シ胃腸弱粘液滞リ飲食不化ヲ治ス（険重ノ脾病萎黄黄疸ニ諸藥効アリ）無香鼠揮發純苦無臭ニシテ五六時ニ三分ノ一ヲ施ス（水腫黄疸加ヘ或鐵劑ヲ與ヘテ頑固ノ歇熱頭痛有發作者粘痰多キ喘急黄疸水腫失苟兒等ハ不可）

Kitasato Memorial Medical Library

有驗○睡菜解凝丸 前諸症ヲ治睡菜越斯牛膝各二錢讒祇四錢蛸石末衣每三人ヲ為一丸蛸石末衣每半服四丸但無惡心ヲ度トス一時煎劑一ヲヲ水十二ヲ煎用ス越斯十人ヲ為一服

●斯必竭里亞 ピゲリア苗葉ホ可用草也根ヲ用フ味微苦氣不佳 試効殺蟲ノ聖藥也 一頓ニ過服スレハ發熱眩惡心ス然ルヿ少間ニシテ解 蟲症 患狀百出變不可的識 食噫氣呑酸 吐或酸醋 便秘瀉或下 或瀉者 内伏消耗乾咳頰赤熱頭水鼻孔瘙痒癢 偏枯 等有奇効若過服瞑眩留連セハ雜腹蘭若橙油茴油等ヲ與フ蓋此藥服量ヲ誤ルヿ十二ヲ一服トシ朝夕一服ヲ用ユ ○斯必驅蟲飲 先哲實驗ノ良方也斯必酒葉各一刃雜腹五人 如服量 散劑小兒ハ十人ヲ一服宛大人ハ一錢ヲ一服宛與フ須臾隨症增減 的里亞加水二錢泉水二錢半勢適宜研和シ毎半時一ヲ服

追加

卜部リ部ヤ部 脱落三種

●藤黄 キウテゴム藥舖ニ粹天印仄者上品也竹筒ニ入レ乾ス者形ヒ她蜻蜓樣仄者下品也 其質趙謨華爾斯也 上品ハ大塊固易碎不透亮色雜腹蘭黏綢初無味漸ク辛味ロヲ灼キ水ニ溶スレハ澁濁ス剥篤少美黄無香臭且之ヲ爵テ乾燥ス尤モ燒酒ニ溶化スレハ不溶化ス試効峻下 能粘液ヲ疏解ス故ニ水ニ加ヘレハ尤能化スト雖モ不溶化ス 腫粘液腫等ニ有効粘液質血運變慢ナル ニ尤有効過敏性瘧症ニ有害 服量二仄ヨリ六仄ヲ一服トス過用スレハ吐瀉腹痛ス 諸蟲症 條蟲ヲ驅泄スル健壯ノ剥篤亞斯ヲ加工用レハ下利ノ劾アリ利尿ノ劾アリ 水腫 亞爾加里ヲ加工為ス丸用ル 藤黄驅水丸 主治水腫藤黄海蔥各一刃白礬三錢研合三仄ヲ為シ甘草衣ヲ二五丸宛四次用フ ○加羅藤黄丸 主治胸脇支節腫藤黄一刃加羅十仄ヲ為シ三丸宛用ル丁ヒ

Kitasato Memorial Medical Library

加羅ヲ去ル○護謨蔥輸丸 主治利衆咯痰故水腫欬痰喘膀瘧瘕積諸症ニ有効發謨安没海蔥各二錢石輸四錢茴油八滴或乾姜一錢右二味ヲ為一九朝夕十九宛用ス

●良姜ガラ試効辛熱寛透胃腸虚冷結滞飲食不消健胃驅風ス○姜並健胃酒良香白並健質木香各四錢燒酒二升右硝曼ニ内レ爐中ニ置キ二日浸レ橙皮杜實胡妥子各六ヲ去リ半ヒ宛飲液ニ和シ服スルヿ二日ヲ率シ三次

●耶蔑斯驅熱散ゲイムスフヿドルス法安尊没二ヲ角石一ヲ半消石四ヲ各別ニ為末研合坩ニ入レ蓋閉メ武火ニ焼煆ヲ試効欬熱胸脇煩傷冷シ垂巾ニ入レ蓋閉メ武火ニシ血運ヲ鎮メ他ノ汗劑ヲ則發汗シ魚烟而取出シ周封シ用之ヲ率シ三次熱欬嗽諸症ニ比スレハ緩慢性ニメ捷効切實ナリ虚性ノ熱病最有良驗此劑一錢或錢半時或半時每二服一九

醫學小階遠西醫方要略 卷之二 終

Kitasato Memorial Medical Library

書為余及醫学小稽於余今
小子崇從先生之門亦已有年
矣疫癘起之余崇治救崇已痊愈
然天下如一也崇未及見全
余備言於斯之理則崇之所
以報余一也崇延之余庶幾
什乎哭以記之
戴洋識

凌雲先生創造聚珍活版令良致服其勞矣致因盤桓丹
羽先生艸贊於先生門實天保二年也曩日先生信奉張
長沙傍取古今法方且雖村老野媼之術有益於療病者
悉究訂用焉於其診病處方施術者其應如桴鼓也致從
容問其要領先生示以詩云讀書不博學難成取捨從宜
道自明先哲立言多得失勿甘糟粕殺蒼生致深信伏為
至弘化中令兒良載學滕下者數年歸鄉開業有其所為
興吾呼學異者因質其故載曰先生有疑於世之蘭家者
流故勤讀其譯書遂得精微詳察之意試之實地甚喜合
自已見者更捨固有之說取日新之業矣嗚呼可謂取捨
從宜也於此先生就古今譯書而撰其的實緊要者撮略

Kitasato Memorial Medical Library

之以為門生作醫學小階最從簡便也是致不遠西洋之
醫意而所以服其勞也安政己未南至日關島良致謹識

藏梓　張府　復古齋
製造　信陽　百華園
彫摺　同　鳳巢
扶說　撮要　追出

Kitasato Memorial Medical Library

Kitasato Memorial Medical Library